

醫學三字經卷三
四

醫學三字經卷之三

閩吳航陳念祖修園著

男

元豹道彪古愚
元犀道照靈石

同校字

中風方

小續命湯

千金

中風總方

麻黃

去節
根

人參

黃芩

川芎

白芍

炙草

杏仁

防己

桂枝

防風

各一
木

附子

五分
炮

加生薑三片水二杯半先煎麻黃至二杯入諸藥煎八分服

古今錄驗續命湯

治中風風痲身體不能自收持口不言昏冒不

知痛處或拘急不能轉側

方出金
匱附方

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草

各一

川芎

五分

杏仁

十三枚

又一

錢取三分之一

十一

水三杯煎一杯溫服當小汗薄覆脊憑几汗出則愈不汗更服
無所禁勿當風並治但伏不得臥欬逆上氣面目浮腫

三花湯

治熱風中臟大便不通

大黃

羌活

枳殼

各二錢

水二杯煎八分服

稀涎散

治中風口禁並治單蛾雙蛾

巴豆

六枚每枚

分作兩片

牙皂

三錢

明礬

一兩

先將礬化開却入二味攪勻待礬枯爲末每用三分吹喉中痰

盛者燈心湯下五分在喉卽吐在膈卽下

參附湯 元氣暴脫以此方急回其陽可救十中一二

人參 一兩 附子 五小

水二杯半煎八分服此湯治腎氣脫○以人參換白朮名朮附湯治脾氣脫○換黃耆名耆附湯治衛氣脫○換當歸名歸附湯治營氣脫

三生飲 治寒風中臟四肢厥冷痰涎上湧

生烏頭 二錢 生南星 二錢 生附子 三錢 木香 五分 生薑 五片

水二杯煎七分○薛氏用人參一兩煎湯半杯調服

防風通聖散 治熱風卒中而經絡手足痠癱內而臟腑二便閉

塞用此兩解之較之三化湯較妥亦爲類中風實火治法所用
表藥火鬱發之之義也所用下藥金下抽薪之義也

防風

荆芥

連翹

麻黃

薄荷

川芎

當歸

白芍

白朮

山梔

大黃

芒硝

各五

黃芩

石膏

桔梗

各一錢

甘草

二錢

滑石

三錢

水二杯加生薑三片煎八分服○自利去硝黃○自汗去麻黃

加桂枝○涎嗽加半夏五味

也青欬子 治類中風腎虛火不歸源舌強不能言足廢不能行○

類中風虛火治法

熟地

遠志

山茱肉

巴戟天

石斛

石菖蒲

五味子

肉蓯蓉洗水肉桂

麥冬

附子

茯苓各一錢

加薄荷葉七葉水二杯煎八分服○此方法在輕煎不令諸藥之味盡出其性厚重以鎮諸逆其氣味輕清速走諸竅也

補中益氣湯

治勞役飢飽過度致傷元氣氣虛而風中之○此類

中風氣中虛證更有七氣上逆亦名氣中宜越鞠丸之類

炙者二錢

人參

白朮炒

當歸各一錢

炙草

陳皮各五分

升麻

柴胡各三分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

二陳湯 痰飲通劑

陳皮一錢五分半夏

茯苓各三錢

炙草一錢

加生薑三片水三杯煎七分服○加白朮一錢蒼朮二錢竹瀝
四湯匙生薑汁二湯匙名加味二陳湯治類中風痰中證亦名
溼中以溼生痰也○加枳實膽南星竹茹名滌痰湯

加味六君子湯 治中風王道之劑

方見隔食

加麥冬三錢爲君附子一錢爲使再調入竹瀝五錢生薑二錢
以行經絡之痰久服自愈

資壽解語湯

喻嘉言

治中風膠緩舌強不語半身不遂與地黃飲子同

意但彼重在腎此重在脾

防風

附子

天麻

棗仁

各三錢

羚羊角

肉桂

各八分

羌活

甘草各五分

水二杯煎八分入竹瀝五錢薑汁二錢五分服

喻嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏生地菊花天冬石菖

蒲元參

侯氏黑散金匱治大風四肢煩重心中惡寒不足者○外臺治風癩

菊花四兩

白朮

防風各一兩

桔梗八錢

細辛

茯苓

牡蠣

人參

礬石

當歸

川芎

乾薑

桂枝

各三錢

黃芩

五錢

右十四味杵爲散酒服方寸匕

約有八分余每用一錢五分

日二服溫酒調

服忌一切魚肉大蒜宜常冷食六十日止熱卽下矣

風引湯金匱除熱癰瘤 治大人風引少小驚癰瘖瘖日數十發

大黃 乾薑 龍骨各一兩 桂枝一兩 甘草五不 牡蠣各一兩

寒水石 赤石脂 石膏 滑石 紫石英 白石脂各三兩

右十二味研末粗篩用韋布盛之取三指約六七錢零 井花水一杯

煎七分温服 按乾薑宜減半

○附錄中風俗方殺人以示戒

俗傳中風方 風症以攻痰爲大戒凡人將死之頃皆痰聲漉漉不

獨中風一症元陽無主一身之津血俱化爲痰欲攻盡其痰是欲

攻盡其津血也故錄此以爲戒

濟南星寒臘大傷胃氣且能引痰入於心包肝胆以成其殺

元氣痰盛得此暫關少頃旋而中氣大傷痰涎如湧石菖蒲能開心竅心竅開則痰涎直入其中永無出路半夏

此藥雖能降逆開結但與膽星同用未免助紂為虐秦芩羌活天麻羚羊角防風

以上六味雖風證所不思但無要藥以主持之亦徒成糟粕無用之物天竺黃真者難得然亦治火痰之標品

殭蠶雖祛風之正藥但力薄不足恃牛黃雖為風痰之妙藥然與膽南星石菖蒲積殼同用則反引痰入於心竅驅

之弗竹瀝以薑汁和之難能驅經絡之痰而與膽星等出矣竹瀝同用不得中氣之輸布反致寒中敗胃之患甘草雖元老之才但與諸藥同用小人道長君子道消亦無如之何矣

已上諸品或作一方或分作二三方患者誤服之輕者致重重者即死即倖免於死亦必變為痴呆及偏枯無用之人矣戒之

虛勞方

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大

虛勞方

歸脾湯 此方補養後天第一藥○治食少不眠怔忡吐血下血大

便或溏或秘妄夢健忘七情所傷遺精帶濁及女子不月等證

炙耆 三錢

人參

白朮

蒸

棗仁 炒黑

當歸身

龍眼肉

茯神

各二錢

木香

五分

炙草

一錢

遠志

五分

去心

水三杯煎八分溫服○高鼓峰去木香加白芍一錢五分甚妙

○咳嗽加麥冬二錢五味七分○鬱氣加貝母二錢○脾虛發

熱加丹皮梔子

六味地黃丸 壯水之主以制陽光凡一切吐血下血咳嗽不眠骨

蒸遺精淋濁屬於陰虛者無不統治之

熟地

八兩

山茱肉

四兩

懷山藥

四兩

丹皮

茯苓

澤瀉

澤瀉

澤瀉

研末煉蜜爲丸如桐子大晒乾每服三錢淡鹽湯送下一日兩

服○加五味子名都氣丸○加麥冬名八仙長壽丸治咳嗽○
本方兩改爲錢水煎服名六味地黃湯

八味地黃丸 益火之源以消陰翳治腰膝無力飲食不進腫脹疝
瘦陽痿遺精帶濁屬於元陽虛者無不統治之

卽六味加附子

丸

加附子

肉桂

各一兩

○本方去附子名七味丸能引火

歸源○本方去附子加五味子名加減八味丸治大渴不止○

本方加牛膝車前子名濟生腎氣丸

俗名金匱腎氣丸

治水腫喘促○

本方減兩爲錢水煎服名八味湯

小建中湯

仲景

此方爲治虛癆第一方今人不講久矣凡癆證必有蒸

熱此方有薑桂以扶心陽猶太陽一出則燭火無光卽退熱法

也凡癆證必飲食日少此方溫脾卽進食法也凡癆證必咳嗽此方補土以生金卽治嗽法也凡癆證多屬腎虛此方補脾以輸精及腎所謂精生於穀也今人不能讀仲景書反敢侮謗聖法徒知生脈六味八味歸脾補中及欸冬貝母玉竹百合蘇陳醬地黃炭之類互服至死誠可痛恨

生白芍

三錢

桂枝

一錢五分

炙草

一錢

加生薑一錢五分大棗二枚水

二杯煎八分入飴糖三錢五分烱服○加黃耆二錢名黃耆建中湯治虛勞諸不足飽悶者去大棗加茯苓二錢氣逆者加半夏一錢五分○此方人參當歸白朮俱隨宜加之

金匱炙甘草湯

肺燥肺痿咽痛脈代等證

生地

四錢

桂枝

一錢

阿膠

一錢五分

炙草

二錢

人參

一錢

麥冬

二錢五分

棗仁

原方火麻仁一錢五分

加生薑一錢大棗一枚水一杯酒半杯煎八分服

喻嘉言清燥救肺湯

治燥氣鬱而成癆

桑葉

經霜者去蒂三錢

人參

一錢

石膏

二錢三錢研

杏仁

去皮尖一錢二分

甘草

一錢二分

麥冬

一錢

枇杷葉

去七竇炙一錢三分

黑芝麻

一錢五分炒研

水二杯半煎八分熱服○痰多加貝母三錢○或加梨汁半盞

金匱薯蕷丸 治虛癆諸不足風氣百疾

薯蕷

三十分

當歸

桂枝

麴

乾地黄

豆黃卷

各一分

甘草

二十分

人參

阿膠

各七分

芎藭

芍藥

白朮

麥冬

杏仁

防風

各六分

柴胡

桔梗

茯苓

各五分

乾薑 二分 白朮 二分 大棗 百枚
爲膏

右三十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一九一百丸

爲劑 分去聲古以二錢半爲一分

金匱大黃廔蟲丸 治五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷房

室傷飢傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血肌肉甲錯目黯黑 緩中補虛

大黃 十分 黃芩 一兩 甘草 一兩 桃仁 一升 杏仁 一升 芍藥 四兩

乾漆 二兩 乾地黄 十兩 廔蟲 一升 水蛭 一百箇 蟅螬 一升 廔蟲 半升

右十二味末之煉蜜丸如小豆大酒服五丸日三服

愚按以菟血之品爲補血之用倣於內經四烏鯁骨一蘆茹丸

張路玉以此丸藥料及鮑魚入絨毛雞腹內黃酒童便煮爛汁

乾將雞去骨取肉同諸藥懸火上烘乾爲末加煉蜜爲丸每服

二錢以黃酒送下日三服代麤蟲丸甚安

○咳嗽諸方

六安煎

景岳

治外感咳嗽

半夏

二錢

陳皮

一錢五分

茯苓

二錢

甘草

一錢

杏仁

二錢去皮尖

白芥子

一錢炒研

加生薑七片水煎服○寒甚加細辛七分

○愚每用必去白芥子加五味子乾薑細辛

小青龍湯 治一切咳嗽○方見傷寒○方中隨寒熱虛實加減唯

細辛乾薑五味三藥不去讀金匱者自知

加減小柴胡湯 治發熱咳嗽

柴胡 四錢 半夏 二錢 黃芩

炙草 各錢五分 乾薑 一錢 五味子 八分

水二杯半煎一杯半去滓再煎八分溫服一日二服

五味子湯 千金 治傷燥欬唾中有血牽引胃脇痛皮膚乾枯

五味子 五分 桔梗 甘草 紫苑茸 續斷 竹茹

桑根皮 各一錢 生地黃 二錢 赤小豆 一撮即赤豆之細者

右九味水煎空心服秘旨加白蜜一匙

愚按赤豆易生扁豆五錢圓圖不研最能退熱補肺但有寒熱往來忌之○去續斷赤豆地黃加葳蕤門冬乾薑細辛亦妙

麥門冬湯 千金 治大病後火熱乘肺欬唾有血胸膈脹滿上氣羸瘦五

心煩熱渴而便秘

麥門冬 二錢 去心 桔梗 桑根皮 半夏 生地黃 紫苑茸

竹茹

各一錢

麻黃

七分

甘草

五分

五味子

十粒

生薑

一片

右十一味水煎空心服

瘡疾方

小柴胡湯

方見傷寒

一切瘡病俱治

痢證方

芍藥湯

行血則膿血自愈調氣則後重自除三日內俱可服

白芍

各二錢

當歸

各二錢

黃連

各一錢

黃芩

各一錢

肉桂

四分

檳榔

一錢

木香

六分

甘草

四分

大黃

一錢

厚樸

一錢

枳殼

一錢

青皮

五分

水二杯煎八分溫服○小便不利加滑石澤瀉

滯澁難出虛

者倍歸芍實者倍大黃○紅痢加川芎桃仁

人參敗毒散 喻嘉言最重此方令微汗則陽氣升而陷者舉矣此

法時醫不講余每用此方加陳倉米四錢或加黃芩黃連屢用屢效

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 茯苓 桔梗

人參已上各一錢 甘草一分

水二杯加生薑三片煎七分服○加倉朮名倉稟湯治噤口痢

心腹痛及胸痺方

烏梅丸方見傷寒 治蟲痛

蘇合香丸 治注痛

拙著從眾錄有方論○又鬼注不去宜虎骨鹿茸羚羊角龍骨各三錢以羊肉湯煎入麝香少許服取腥羶之味引濁陰之氣

從陰而泄此喻嘉言寓意草法也

香蘇飲 治氣痛○一切感冒俱佳

香附

二錢
製研

紫蘇葉

三錢

陳皮

甘草

各一錢

加生薑五片水二杯煎八分服○心痛加元胡二錢酒一盞

七氣湯

亦名四
七湯

治七情之氣鬱逆

半夏

厚樸

茯苓

各三錢

紫蘇葉

一錢

加生薑三片水二杯煎八分服

百合湯

治心口痛諸藥不效○亦屬氣痛

○百合

一兩

烏藥

三錢

水三杯煎八分服○此方余自海壇得來

失笑散

治一切血滯作痛如神

○五靈脂

醋炒

蒲黃

各二兩

共研末每服三錢以醋湯送下日二服

桃仁承氣湯 治心腹痛大便不通其人如狂屬死血

桂枝二錢

桃仁十七枚
去皮尖

大黃四錢

芒硝七分

甘草七分

水二杯煎八分去滓入硝二沸溫服

丹參飲 治心胸諸痛神驗婦人更宜○亦屬血痛○亦可通治諸痛

丹參

一兩
白檀香要真者極

砂仁各一錢

○水二杯煎八分服

妙香散方見遺精

平胃散 治一切飲食停滯

蒼朮

厚樸炒

陳皮各二錢

甘草一錢

加生薑五片水二杯煎八分服○肉積加出查○麵積加麥芽

萊菔子○穀積加穀芽○酒積加葛根砂仁

二陳湯

方見中風

十棗湯

治水飲作痛峻劑不可輕用

大戟

芫花

炒

甘遂

各等分
研末

用大棗十枚水二杯煎七分去滓

入藥方寸七

約有七分

服次早當下未下再一服服後體虛

以稀粥調養

理中湯

方見傷寒

治冷痛

吳茱萸湯

仲景

治冷痛○通治食穀欲嘔頭痛如破煩躁欲死者及大

吐不已之證

吳茱萸

湯泡二錢五分

人參

一錢五分

大棗

五枚

生薑

三錢切片

水二杯煎八分溫服

金鈴子散 治心口痛及脇痛腹痛如神○屬熱者

金鈴子

去核

元胡索

各二兩
研末

○每服三錢黃酒送下

厚樸三物湯

金匱

治心腹實痛大便閉者

厚樸

四錢

大黃

二錢
枳實一錢
五分

○水二杯煎八分溫服

厚樸七物湯

金匱

卽前方加

桂枝

甘草

各一錢
五分

生薑

二錢
五分

大棗

五枚

水二杯煎八分服○嘔者加半夏一錢○寒多者加生薑

一錢
五分

附子粳米湯

金匱

治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

附子

二錢
製

半夏

四錢

炙草

一錢

粳米

五錢
布包

大棗

一枚

水二杯煎八分溫服日夜作三服

大黃附子湯

金匱

脇下偏痛發熱脈緊弦者

大黃

附子

各二錢 細辛 一錢

水二杯煎八分服

當歸生薑羊肉湯

金匱

治心腹諸痛虛極諸藥不效者一服如神及脇

痛裏急婦人產後腹中疔痛

當歸

七錢五分

生薑

一兩二錢五分

羊肉

四兩去筋膜用藥戔稱方準

水五杯煎取二杯溫服一杯一日兩服○若寒多者加生薑五

錢○痛多而嘔者加橘皮五錢白朮二錢五分

栝樓薤白白酒湯

金匱

治胸痺喘息欬唾脘背痛寸沉遲關上小緊

栝樓

連皮子搗五錢

薤白

如乾者用三錢生者用六錢

白酒三杯煎八分服○加半

夏二錢名栝樓薤白半夏湯治胸痺不得卧心痛徹背

大建中湯

金匱

治胸大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭

足上下痛不可觸近

川椒

二錢微炒出汗

乾薑

四錢

人參

三錢

○水二鍾煎一鍾去滓入膠

飴四錢煎取八分溫服如一炊頃可食熱粥半碗

隔食反胃方

左歸飲

景岳

卽六味湯去丹皮澤瀉加枸杞炙草

啟隔飲

元

治食入卽吐

川貝母

一錢五分切片不研

沙參

三錢

丹參

二錢

川鬱金

五分

乾荷蒂

三

砂仁殼

四分

杵頭糠

二錢布包

茯苓

一錢五分

石菖蒲

四分

水二杯煎八分服

大半夏湯

金

治反胃

人參 一錢

半夏

俗用明礬製者不可用只用薑水浸二日一日一換清水浸三日一日一換搗起蒸熟曬乾切

片用

長流水入蜜揚二百四十遍取三杯半煎七分服

吳茱萸湯

方見心腹痛

六君子湯

爲補脾健胃祛痰進食之通劑百病皆以此方

收功

人參

白朮 炒

茯苓

半夏

各二錢

陳皮

炙草

各一不

加生薑五片大棗二粒水二杯煎八分服○治反胃宜加附子

二錢丁香藿香砂仁 各一錢

附子理中湯

治反胃

卽理中湯加附子三錢○治反胃宜加茯苓四錢甘草減半

附隔食方法

人鏡經曰內經云三陽結謂之隔蓋足太陽膀胱經水道不行
手太陽小腸經津液枯槁足陽明胃經燥糞結聚所以飲食拒
而不入縱入太倉還出喉嚨夫腸胃一日一便乃常度也今五
七日不便陳物不去新物不納宜用三一承氣湯節次下之後
用脂麻飲啜之陳腐去而腸胃潔穢瘕瘕盡而營衛昌飲食自進

三一承氣湯

大黃 芒硝 甘草 厚樸 枳實各一錢

水二杯煎八分服○按此方大峻姑存之以備參考

氣喘方

蘇子降氣湯 治上盛下虛氣喘等證

紫蘇子二錢前胡

微炒

當歸

半夏

陳皮

厚朴

錢沉香

炙草各五分

加生薑三片大棗二枚水二杯煎八分服

葶藶大棗瀉肺湯

金匱

治支飲滿而肺氣閉氣閉則呼吸不能自如用

此苦降以泄實邪

葶藶子

隔紙炒研如泥二錢二分

水一杯半大棗十二枚煎七分入葶藶子服之

十棗湯

方見心腹痛

小青龍湯

方見傷寒

貞元飲

景岳

陰血爲陽氣之依歸血虛則氣無所依時或微喘婦人血

海常虛多有此證○景岳方意在濟之緩之四字濟之以歸地

緩之以甘草頗有意義今人加紫石英黑鉛之重鎮則失緩之
之義加沉香白芥子之辛香則失濟之之義矣且此方非爲元
氣奔脫而設時醫每遇大喘之證必以此方大劑與服氣升則
火升偶得濡潤之藥氣亦漸平一晌旋而陰柔之性與飲水混
爲一家則胸隔間純是陰霾之氣其人頃刻歸陰矣吾鄉潘市
醫倡此法以局人神智無一人悟及誠可痛恨

熟地黃

五七錢或
一二兩

當歸身

三四
錢

炙草

一二
三錢

水三四杯煎八分服

苓桂朮甘湯

金匱

治氣短

○喻嘉言云此治呼氣短

茯苓

四錢

白朮

桂枝

各二
錢

炙草

一錢
五分

水二杯煎八分服

腎氣丸金匱治氣短○喻嘉言云此治吸氣短卽八味地黄丸但原方

係乾生地黄桂枝

茯苓甘草大棗湯仲景治氣喘臍下動氣欲作奔豚

茯苓

六錢

桂枝

甘草

炙各二錢

大棗

四枚

用甘瀾水三杯半先煎茯苓至二杯入諸藥煎七分服○作甘瀾水法取長流水揚之數百遍或干遍愈妙

眞武湯 鎮水逆定痰喘之神劑○方見傷寒○宜倍茯苓○咳嗽

甚者去生薑加乾薑一錢五分五味細辛各一錢

黑鉛湯 治脾腎虛冷上實下虛奔豚五種水氣中風痰潮危急

喻嘉言曰凡遇陰火逆冲眞陽暴脫氣喘痰鳴之急證舍此方

再無他法可施予每用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲吾身元氣溫養其藥藉手效靈厥功歷歷可紀卽痘症倒塌逆候服此亦可回生

沉香

附子

炮

胡蘆巴

肉桂

各五錢

小茴香

補骨脂

肉豆蔻

木香

金鈴子

去核各一兩

硫黃

黑鉛

與硫黃炒成砂子各三兩

右爲末酒煮麵糊丸梧子大陰乾以布袋擦令光瑩每服四五十九薑湯送下

血證方

麻黃人參芍藥湯

東垣

治吐血外感寒邪內蘊熱

桂枝

五分補表虛

麻黃

去外寒

黃芪

實表益衛

炙甘草

補脾

白芍

安太陰

人參

益元氣而實表

麥冬

補肺氣各三分

五味子

五粒安肺氣

當歸

五分和血養血

水煎熱服○按此方以解表爲止血是東垣之巧思倖中非有定識也觀其每味自注藥性俱悖聖經便知其陋

甘草乾薑湯

金匱

炙甘草

四錢

乾薑

二錢炮

水二杯煎八分服

柏葉湯

金匱

治吐血不止

柏葉

生用三錢無生者用乾者二錢

乾薑

一錢

艾葉

生用二錢如無生者用乾者一錢

水四杯取馬通二杯煎一杯服○如無馬通以童便二杯煎八分服

黃土湯

金匱

治先便後血爲遠血○亦治衄血吐血血不止

竈心黃土

入錢原方四錢

生地

黃芩

甘草

阿膠

白朮

附子

炮各一錢五分

水三杯煎八分服

赤小豆散

金匱

治先血後便爲近血○赤小豆

浸令出芽晒乾一兩

當歸

四錢

共研末每服三錢漿水下

卽洗米水三口後有酸味是也

○按凡止血標藥可

隨宜作引血餘灰

可用一二兩同煎諸血皆驗

○梔子茜草乾側柏治上血

槐花生地黃烏梅續斷治血崩○凡下血及血痢口渴後重脉

洪有力者爲火盛可用苦參子去殼仁勿破外以龍眼肉包之

空服以倉米湯送下九粒一日二三服漸加至十四粒二日效

水腫方

五皮飲

此方出華元化中藏經以皮治皮不傷中氣所以爲治腫

通用之劑

大腹皮

酒洗

桑白皮

生各三錢

雲苓皮

四錢

陳皮

三錢

生薑皮

一錢

水三杯煎八分溫服

○上腫宜發汗加紫蘇葉荆芥各二錢防

風一錢杏仁一錢五分○下腫宜利小便加防已二錢木通赤

小豆各一錢三分○喘而腹脹加生萊菔子杏仁各二錢○小

便不利者爲陽水加赤小豆防已地膚子○小便自利者爲陰

水加白朮二錢蒼朮川椒各一錢五分○熱加海蛤三錢知母

一錢五分○寒加附子乾薑各二錢肉桂一錢○嘔逆加半夏

生薑各二錢○腹痛加白芍一錢桂枝一錢炙甘草一錢

導水茯苓湯

治水腫頭面手足遍身腫如爛瓜之狀按而塌陷胸

腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘瀉溺出如割或如黑

豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此卽漸利而愈

澤瀉

赤茯苓

麥門冬法

白朮酪

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜各一

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢五分

右咬咀每服一二兩水二杯燈草三十根煎八分食遠服○如病重者可用藥二兩又加麥冬及燈草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下小鍋內煎至一鍾五更空心腹

加減金匱腎氣丸

治脾腎兩虛腫勢漸大喘促不眠等證

熟地

四兩

雲白苓三兩

肉桂

牛膝

丹皮

山藥

澤瀉

車前子

山茱萸

各二兩

附子

五錢

研末煉蜜丸如桐子大每服三錢燈草湯送下一日兩服○以

兩爲錢水煎服名加減金匱腎氣湯○但附子必倍用方效○

加川椒目一錢五分巴戟天二錢治腳面腫

風水

因風而病水也

防已黃耆湯

金匱

治風水脈浮身重汗出惡風

防已

二錢

炙草

一錢五分

白朮

二錢

黃耆

三錢

生薑

四片

大棗

一枚

水二杯煎八分服服後如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又
以一被繞腰下溫令微汗瘥○喘者加麻黃○胃中不和者加
芍藥○氣上衝者加桂枝

虛汗自出故不用麻黃以散之只用防已以驅之服後身如蟲
行及腰下如冰云云皆溼下行之徵也然非者尤甘草焉能使

衛氣復振而驅濕下行哉

騷湯

金匱

治惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者

麻黃六錢

石膏八錢

甘草二錢

生薑三錢

大棗五枚

水四杯先煮麻黃至三杯去沫入諸藥煎八分服日夜作三服

○惡風者加附子一錢○風水加白朮三錢

前云身重爲溼多此云一身悉腫爲風多風多氣多熱亦多且屬急風故用此猛劑

杏子湯

脈浮者爲風水發其汗卽已方闕或云卽甘草麻黃湯加

杏仁

皮水

水行於皮中也其脈浮外證跗腫按之沒指日不惡風者不兼風也曰其腹如鼓者外有脹形內不堅滿也日

不渴者病不在內也日當發其汗者以水在皮宜汗也

防已茯苓湯

金匱

治四肢腫水在皮中蠱蠱動者

防已

桂枝

黃耆

各三錢

茯苓

六錢

炙草

一錢

水三杯煎八分服日夜作三服

藥亦同防已黃耆湯但去朮加桂苓者風水之溼在經絡近內皮水之溼在皮膚近外故但以苓協桂滲周身之溼而不以朮燥其中氣也不用薑棗者溼不在上焦之營衛無取乎宣之也

蒲灰散

金匱

厥而爲皮水者此主之

腫甚而潰之逆證厥之爲言逆也

蒲灰

半斤

滑石

一斤

爲末飲服方寸七日三服

愚按當是外敷法然利溼熱之劑亦可內服外糝也

越婢加朮湯

金匱

裏水此主之甘草麻黃湯亦主之○按裏水當是皮

水筆誤也或水在皮裏即皮水之重者亦未可知

方見風水

甘草麻黃湯

甘草

四錢

麻黃

二錢

水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入甘草煮七分服重覆汗出

不汗再服慎風寒○二藥上宣肺氣中助土氣外行水道

正水

水之正伏也其脉遲者水屬陰也外證自喘者陰甚於下也腹與胸中之陽氣相調水氣格陽而喘也其目窠

如蠶兩脛腫大諸證

金匱未言無不俱見

愚按正水金匱未出方然提綱云脉沉遲外證自喘則真武湯小

青龍湯皆正治之矣越婢加附子湯麻黃附子湯亦變證之備方

桂甘麻辛附子湯加生桑皮五錢黑豆一兩爲窮極之巧方此正水之擬治法也

石水

謂下焦水堅如石也其脉自沉外證少腹滿不喘

麻黃附子湯

麻黃 三錢

炙草 二錢

附子 一錢

水二杯先煮麻黃至一杯半去沫入諸藥煎七分溫服日作三服○此卽麻黃附子甘草湯分兩畧異卽以溫經散寒之法變

爲溫經利水之妙

黃汗

汗出沾衣而色黃也汗出人水水邪傷心或汗出當風所按汗與水皆屬水氣因其入而內結則鬱熱而黃其脈沉而遲外證身發熱四肢頭面腫久不愈必致癰膿

黃耆桂枝芍藥苦酒湯治身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗出

沾衣色正黃如藥汁脈自沉

風水脈浮黃汗脈沉

以汗出入宙浴水從毛

孔入得之

水氣從毛孔入而傷其心故水火相侵而色黃水氣搏結而脈沉也凡看書宜活看此說亦有從酒後汗

出當風所致者雖無外水而所出之汗因風內返亦是水凡脾胃受濕濕久生熱濕熱交蒸而成黃皆可以汗出入水之意悟

黃耆

五錢

芍藥

桂枝

各三錢

苦酒一杯半水一杯煎八分溫服當心煩至六七日乃解

汗出於心

苦酒止之太急故心煩至六七日正復而邪自退也

桂枝加黃耆湯黃汗之病兩脛自冷盜汗出汗已反發熱久久身

必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身汗出已輒輕者久久必身

潤潤即胸中痛又從腰以上汗出下無汗腰臑弛痛如有物在

皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利

以上皆黃汗之變證師備疑之以立

治法茲因集隘不能全錄只輯其要

此爲黃汗

言變證雖多而其源總水氣傷心所致結此一句見治法不離其宗

桂枝

芍藥

生薑

甘草

黃耆

大棗

各三錢 各二錢 四枚

水三杯煮八分溫服須臾啜熱粥一杯餘以助藥力溫覆取微

汗若汗更服

前方止汗是治黃汗之正病法此方令微汗是治黃汗之變證法

脹滿蠱脹方

七氣湯

方見心腹痛

治實脹屬七情之氣者○胃苓散

消脹行水

蒼朮

一錢五分炒

白朮

厚樸

各一錢五分

桂枝

一錢

陳皮

澤瀉

猪苓

各一錢五分

炙草

七分

茯苓

四錢

加生薑五片水三杯煎八分服○去桂草以煨半熟蒜頭搗爲

九陳米湯下三四錢一日兩服更妙

三物厚樸湯

七物厚樸湯

二方俱見腹痛

桂甘薑棗麻辛附子湯

金匱

治氣分心下堅大如盤邊如旋杯

桂枝

生薑

各三錢

甘草

麻黃

細辛

各二錢

附子

一錢

大棗

三枚

水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥煎八分溫服

日夜作三服當汗出如蟲行皮上即愈

此證是心腎交病上不能降下不能升日積月累如鐵石難破方中桂甘薑棗以和其上而復用麻黃細辛附子少陰的劑以治其下庶上下交通而病愈所謂大氣一轉其氣乃散也

枳朮湯

金匱

治心下堅大如盤

如盤而不如杯邪尚散漫未結雖堅大而不滿痛也

水飲所作

與

分有別也氣無形以辛甘散之水有形以苦泄之

枳實二錢 白朮四錢

水二杯煎八分服日夜作三服腹中爽即止

禹餘糧丸 治十腫水氣脚膝腫上氣喘急小便不利但是水氣悉

皆主之

許學士及丹溪皆云此方治膨脹之要藥

蛇含石

大者三兩以新鐵銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用銚取蛇黃傾入醋中候冷取出研極細禹餘

糧石

三兩

真針砂

五兩先以水洗淨炒乾入餘糧一處用米醋二升就銚內煮醋乾爲度後用銚并藥入炭

中燒紅銚出領藥淨磚地上候冷研細

以三物爲主其次量入虛實入下項

妙在治水

轉輸此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝

酒浸 桂心

蓬朮

青皮

附子

炮

乾薑

炮

白豆蔻

炮

大茴香

炒

京三稜

炮

白茯苓

當歸酒浸一宿
各半兩

右爲末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵極勻丸如
桐子大食前溫酒白湯送下三十九至五十九最忌鹽一毫不
可入口否則發疾愈甚但試服藥卽於小便內旋去不動臟腑
病去日日三服兼以溫和調補氣血藥助之眞神方也

此方昔人用之屢效以其大能緩水藏也服此丸更以調補氣
血藥助之不爲峻也

暑證方

六一散河間治一切暑病

滑石六兩

甘草一兩

研末每服三錢井花水下或燈草湯下

白虎湯仲景治傷暑大渴大汗之證

方見傷寒○加人參者以暑傷元氣也○加蒼朮者治身熱足冷以暑必挾濕也

香薷飲 治傷暑發熱身痛口燥舌乾吐瀉

甘草 一錢

厚樸一錢五分 扁豆二錢 香薷四錢

水二杯煎八分冷服或溫服○瀉利加茯苓白朮○嘔吐加半

夏○暑氣發搐加羌活秦艽

大順散 治陰暑卽畏熱貪涼之病 乾薑一錢

甘草八分

杏仁去皮尖六分炒 肉桂六分 共爲細末每服三錢水一杯煎七分服

○如煩燥井花水調下一錢

生脉散 却暑良方 人參一錢 麥冬三錢 五味一錢 水一杯煎七分服

清暑益氣湯 東垣 炙耆一錢五分 人參 白朮 蒼朮 青皮

陳皮 麥冬 猪苓 黃柏各五分 乾葛 澤瀉各二錢

神麴八分 炙草各三分 升麻三分 五味三分

加生薑三片 大棗二枚 水二杯煎七分服

一物瓜蒂湯 金匱 瓜蒂二十箇 水二杯煎八分服

泄瀉方

胃苓散 方見脹滿 加減詳三字經小注

四神丸 治脾腎虛寒五更泄瀉

補骨脂四兩 酒炒 肉豆蔻麪煨 去油 吳茱萸炮 五味炒各二兩

用紅棗五兩生薑五兩同煮去薑將棗去皮核搗爛爲丸如桐子大每日五更服三錢臨臥服三錢米湯下○加白朮附子罌粟人參更效

生薑瀉心湯

黃連湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

乾薑黃芩黃連人參湯

厚樸生薑半夏甘草人參湯

已上六方俱見傷寒論讀

按以上諸法與內經中熱消瘴則便寒寒中之屬則便熱一節揆脈證而擇用甚驗張石頑醫通載之甚詳但古調不彈久矣

余新悟出一方有瀉心之意上可消痞下可止瀉腸熱胃寒能分走而各盡其長非有他方卽傷寒厥陰條之烏梅丸也屢用屢驗

醫學三字經卷之四

聞吳航陳念祖修園著

男元豹道彪古愚
元尾道照靈石同校字

眩暈方

一味大黃散

鹿茸酒

二方見上三字經小註

加味左歸飲

治腎虛頭痛如神並治眩暈目痛

熟地

七八錢

山茱萸

懷山藥

茯苓

枸杞

各三錢

細辛

炙草

各一錢

川芎

二錢

肉蓯蓉

酒洗切片
三四錢

水三杯煎八分溫服

正元丹

秘旨

治命門火衰不能生土吐利厥冷有時陰火上衝則頭

面赤熱眩暈惡心濁氣逆滿則胸脇刺痛臍肚脹急

人參

三兩用附子一兩
煮汁收入去附子

黃耆

一兩五錢用川芎一兩
酒煮收入去川芎

山藥

一兩用
乾薑二

錢煎汁收
入去乾薑

白朮

三兩用陳皮五錢
煮汁收入去陳皮

茯苓

二錢用肉桂六錢酒煮
汁收入晒乾勿見火去

桂

甘草

一兩五錢用烏藥二
兩汁收入去烏藥

右六味除茯苓文武火緩緩焙乾勿炒傷藥性杵爲散每三錢
水一盞薑三片紅棗一枚用煎數沸入鹽一捻和滓調服服後
飲熱酒一杯以助藥力

嘔噦吐方

二陳湯

半夏

二錢

陳皮

一錢

茯苓

三錢

炙草

八分

加生薑三片水二杯煎八分服○加減法詳三字經小註

小柴胡湯

方見傷寒

吳茱萸湯

方見隔食反胃

大黃甘草湯 金匱 治食已即吐

大黃 五錢 甘草 一錢五分 水二杯煎八分服

乾薑黃連黃芩人參湯 仲景 凡嘔家夾熱不利於香砂橘半者服此

如神 乾薑 黃芩 黃連 人參 各一錢五分

水一杯半前七分服

進退黃連湯 黃連 薑汁炒 乾薑 炮 人參 人乳拌蒸 桂枝 一錢

半夏 薑製一錢五分 大棗 二枚

進法用本方七味俱不製水三茶杯煎一杯溫服退法不宜用

桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逐味製熟煎服法同但空

腹服崔氏八味丸三錢半飢服前劑耳

癩狂癩方

痰癩丸

王隱君

治一切實痰異症孕婦忌服

青礞石

三兩研如米大同煇硝三兩用新磁罐內封固以鐵線扎之外以鹽泥封固煇過研末水飛二兩實

沈香

五分另研

川大黃

酒蒸

黃芩

炒各八兩

共為末水泛為丸棗豆大每服一錢至二錢食遠沸湯下

生鐵洛飲

治狂妄不避親疏

鐵洛

一盞用水六杯煮取三杯入下項藥

石膏

一兩

龍齒

茯苓

防風

各七分

黑參

藜朮

各五錢

鐵洛水三杯煎一杯服一日兩服

督歸承氣湯

秘傳方

治男婦痰迷心竅踰牆越壁胡言亂走

歸尾

一兩

天黃

酒洗

芒硝

枳實

厚樸

各五錢

炙草

三錢

水二杯煎八分服

溫膽湯、駱氏內經拾遺云癲狂之由皆是膽涎沃心故神不守舍
理宜溫膽亦治癩病

卽二陳湯加枳實鮮竹茹各二錢或調下飛礬分半

當歸龍薈丸 治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸膈痛陰囊腫
脹凡屬肝經實火皆宜用之

葉天士云動怒驚觸致五志陽越莫制狂亂不避親疎非苦降
之藥未能清爽其神識也

當歸

龍膽草

梔子仁

黃柏

黃連

黃芩名二兩

大黃

蘆薈

青黛各五錢

木香二錢五分

麝香五分另研

共爲末神麩糊丸每服二十九薑湯下

丹礬丸

醫通

治五癩

黃丹

一兩

白礬

二兩

二味入銀罐中煨通紅爲

末入臘茶一兩不落水猪心血爲丸硃砂爲衣每服三十九茶

清下久服其涎自便出半月後更以安神藥調之

按猪心血不粘宜加煉蜜少許合搗

磁硃丸

治癩狂癇如神

磁石

一兩

硃砂

一兩

六神麩

三兩

生研

共研末另以六神麩一兩水和作餅煮浮入前藥加煉蜜爲丸

如麻子大沸湯下二錢○解見時方歌括

五淋癰閉赤白濁遺精方

五淋湯

赤茯苓

三錢

白芍

山梔子

各二錢

當歸

一錢

細甘草

一錢四分

加燈心十四寸水煎服○解見時方歌括

滋腎丸 又名通關丸治小便點滴不通及治衝脈上逆喘呃等證

黃柏

知母

各一兩

肉桂

一錢

共研末水泛爲丸桐子大陰乾每服三錢淡鹽湯下

補中益氣湯

方見中風

治一切氣虛下陷

葶藶分清飲

治白濁

川葶藶

四錢

益智仁

芍藥

各一錢半

石菖蒲

一本加甘草稍一錢五分茯苓二錢水二杯煎八分入鹽一捻

服一日兩服

四君子湯

方見時方歌括

歌曰白濁多因心氣虛不應只作腎虛醫四君子

湯加遠志一服之間見效奇

龍膽瀉肝湯

治脇痛口苦耳聾筋痿陰濕熱癢陰腫白濁洩血

龍膽草 三分

黃芩

梔子

澤瀉 各一錢

木通

車前子

各五分

當歸

甘草

生地 各三分

柴胡 一錢

水一杯半煎八分服

五倍子丸

治遺精固脫之方

五倍子

青鹽煮乾焙

茯苓

各二兩

爲末煉蜜丸桐子大每服二錢鹽湯下日兩服

妙香散

懷山藥 二兩

茯神

龍骨

遠志

人參

各一兩

桔梗

五錢

木香

三錢

甘草

一兩

麝香

一錢

硃砂

二錢
此爲

疝氣方

末每服三錢蓮子湯調下

五苓散

仲景

本方治太陽證身熱口渴小便少○今變其分兩借用治疝

猪苓

澤瀉

茯苓

各二錢

肉桂

一錢

白朮

四錢

水三杯煎八分服○加木通川練子各一錢五分橘核三錢木香一錢

三層茴香丸

治一切疝氣如神

大茴香

五錢同鹽五錢炒和鹽秤一兩

川練子

一兩

沙參

木香

各一兩

爲末米糊丸如桐子大每服三錢空心溫酒下或鹽湯下纔服盡接第二料

又照前方加葦撥二兩檳榔五錢共五兩半依前丸服法若未愈再服第三料

又照前第二方加茯苓四兩附子炮一兩共前八味重十兩丸服如前雖三十年之久大如栲栳皆可消散神效

千金翼洗方 治丈夫陰腫如斗核中痛

雄黃末一兩 礬石二兩 甘草七錢

水五杯煎二杯洗

消渴方

白虎湯 調胃承氣湯 理中丸 烏梅丸四方俱見傷寒

腎氣丸 六味湯 炙甘草湯三方俱見虛勞

麥門冬湯 麥門冬四錢 半夏一錢五分 人參二錢 粳米四錢 炙甘草一錢

大棗二枚 水二杯煎八分溫服

麻仁丸 火麻仁二兩 芍藥 枳實各五錢 大黃 厚樸各一兩

研末煉蜜丸如桐子大每服十九米飲下以知爲度

痰飲方

王節齋化痰丸 治津液爲火薰蒸凝滯鬱結成痰根深蒂固以此

緩治之

香附

童便浸炒五錢

橘紅

一兩

瓜蒌仁

一兩

黃芩

酒炒

天門冬

海粉

各一兩

青黛

三錢

芒硝

三錢

桔梗

五錢

連翹

五錢

共爲研末煉蜜入生薑汁少許爲丸如彈子大每用一九噙化
或爲小丸薑湯送下二錢

苓桂朮甘湯

金匱

治胸脇支滿目眩○并治飲邪阻滯心肺之陽令呼

氣短

腎氣方

治飲邪阻滯肝腎之陰令吸氣短二方俱見喘證方

甘遂半夏湯

金匱

治飲邪留連不去心下堅滿

甘遂

大者三枚

半夏

湯洗七次十三枚以水一申杯煮取半杯去滓

芍藥

五枚約今之三錢

甘草

指

一枚炙約今之一錢三分

水二杯煎六分去滓入蜜半盞再煎至八分服

程氏曰留者行之用甘遂以決水飲結者散之用半夏以散痰甘遂之性直達恐其過於行水緩以甘草白蜜之甘堅以芍藥之苦雖甘草甘遂相反而實以相使此苦堅甘緩約之之法也靈樞經曰約方猶約囊其斯之謂與○尤氏曰甘草與甘遂相反而同用之者蓋欲其一戰而留飲盡去因相激而相成也芍藥白蜜不特安中亦緩毒藥耳

十棗湯

金匱

治懸飲內痛○亦治支飲

方見腹痛

大青龍湯

金匱

治溢飲之病屬經表屬熱者宜此涼發之

小青龍湯

金匱

治溢飲之病屬經表屬寒者宜此溫發之

已上三方俱見傷寒

木防已湯金人膈中清虛如太空然支飲之氣乘之則滿喘而痞堅
面色黧黑脈亦沉緊得之數十日醫者吐之下之俱不愈宜以
此湯開三焦之結通上下之氣

木防已

三錢

石膏

六錢

桂枝

二錢

人參

四錢

水二杯煎八分溫服

木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯金前方有人參吐下後水邪因虛
而結者服之即愈若水邪實結者雖愈而三日復發又與前方
不應者故用此湯去石膏之寒加茯苓直輸水道芒硝峻開堅
結也○又此方與小青龍湯治吼喘病甚效

木防已

二錢

桂枝

二錢

茯苓

四錢

人參

四錢

芒硝

二錢五分

水二杯半煎七分去滓入芒硝微煎溫服微利自愈

澤瀉湯陰支飲雖不中正而迫近於心飲邪上乘清陽之位其人若
冒眩胃者昏冒而神不清如有物冒蔽之也眩者目旋轉而乍
見眩黑也宜此湯

澤瀉五錢 白朮二錢 水二杯煎七分溫服

厚樸大黃湯陰治支飲胸滿
支飲原不中正飲盛則偏者不偏故直驅之從大便出

厚樸二錢 大黃二錢 只實一錢五分 水二杯煎七分溫服

葶藶大棗瀉肺湯陰治支飲不得息

方見氣喘

小半夏湯金匱 治心下支飲嘔而不渴

半夏四錢 生薑八錢 水二杯煎八分溫服

己椒蘘黃丸金匱治腹滿口舌乾燥腸間有水氣

防己 椒目

葶蘘熬

大黃略一

共爲細末煉蜜丸如梧子大先飲食服一丸日三服稍增之口
中有氣津液渴者加芒硝半兩

程氏曰防己椒目導飲於前清者從小便而出大黃葶蘘推飲
於後濁者從大便而下此前後分消則腹滿減而水飲行脾氣
轉輸而津液生矣

小半夏加茯苓湯

金匱

治卒然嘔吐心下痞滿膈間有水氣眩悸者

卽小半夏湯加茯苓四錢

五苓散

金匱

治臍下

悸吐涎沫而顛眩此水也

澤瀉一兩六分猪苓

茯苓

白朮各十八株○校十黍為一

桂枝一兩為末白飲和服方寸七日三服多飲暖水汗出愈大株為一

分即今之二錢半也澤瀉原一兩二錢五分猪苓白朮茯苓各應七錢五分也方寸七者七即匙正方一寸大約八九分余用

一錢愚按臍下動氣去朮加桂理中丸法也今因吐涎沫是

水氣盛必得苦燥之白朮方能制水顛眩是土中濕氣化為陰

霾土彌清竅必得溫燥之白朮方能勝濕證有兼見法源變通

附方外臺茯苓飲 治積飲既去而虛氣塞滿其中不能進食此證最

多此方最妙 茯苓 人參 白朮各一錢五分枳實二錢

橘皮一錢二分五釐生薑三錢 水二杯煎七分服一日三服

徐忠可曰俗謂陳皮能減參力此不唯陳皮且加枳實之多補

瀉並行何其妙也

三因白散

滑石 五錢

半夏

二錢

附子

二錢

共研末每服五錢加生薑三片蜜三錢水一杯半煎七分服

傷寒方

太陽

桂枝湯

桂枝

白芍

各三錢

甘草

二錢

生薑

三錢

大棗

四枚

水二杯煎八分溫服服後少頃飲粥一杯以助藥力溫覆微似

汗若一服病止不必再服若病重者一日夜作二服

麻黃湯

麻黃

三錢去根節

桂枝

二錢

杏仁

去皮尖二枚

甘草

一錢

水三杯先煮麻黃至二杯吹去上沫納諸藥煎八分溫服不須

飲粥餘將息如前法

大青龍湯

麻黃

六錢去根節

桂枝

二錢

甘草

二錢炙

杏仁

去皮尖十二枚

生薑

三錢切片

大棗

四枚

石膏

碎以棉裹四錢五分

水四杯先煮麻黃至二杯半去上沫納諸藥再煎八分溫服溫

覆取微似汗汗出多者以溫粉撲之

白朮煨牡蠣龍骨研末

若汗多亡陽

者以真武湯救之

小青龍湯

麻黃

去根節

白芍

乾薑

不炒

甘草

桂枝

各二錢

半夏

三錢

五味子

一錢

細辛

八分

水三杯半先煮麻黃至二

杯半去沫納諸藥煎八分溫服○若渴者去半夏加栝蘆根

二錢

○若噎者去麻黃加附子

一錢五分

○小便不利小腹痛滿去麻黃

加茯苓

四錢

若喘者去麻黃加杏仁二十一枚○按論云若微

利者去麻黃加芫花今芫花不常用時法用茯苓

四錢

代之卽

猪苓澤瀉亦可代也但行道入當於方後註明

桂枝加葛根湯

卽桂枝湯加葛根

四錢

水三杯半先煮葛根至二杯半吹去沫入諸藥煎至八分溫服

不須啜粥

葛根湯

葛根

四錢

麻黃

三錢

生薑

三錢

甘草

二錢

桂枝

二錢

大棗

四枚

白芍

二錢

水三鍾半先煎麻黃葛根至一杯去沫入

諸藥至八分溫服微似汗不須啜粥

陽明

白虎湯

石膏

八錢碎
綿裹

知母

三錢

炙草

一錢

硬米

四錢

水三杯煎一杯溫服

調胃承氣湯

大黃

四錢清
酒潤

炙草

二錢

芒硝

三錢

水二杯半先煮大黃甘草取一杯去滓入芒硝微煮令沸少少

溫服之

小承氣湯

大黃

四錢

厚樸

枳實

各二錢

水二杯煎八分溫服初服當更衣不爾者再煮服若更衣勿服

大承氣湯

大黃

二錢
酒潤

厚樸

四錢

枳實

芒硝

各二錢

水三杯先煮枳實厚樸至一杯半去滓納大黃煮二杯去滓納

芒硝微火煮一二沸服得下勿再服

少陽

小柴胡湯

柴胡

四錢

人參

黃芩

炙草

生薑

各一錢

半夏

二錢

大棗

二枚

水二鍾煎一鍾去滓再煎八分溫服一日夜作三服

胸中煩而不嘔者去半夏人參加括藎二錢○渴者去半夏加人參七分括藎二錢○腹中痛者去黃芩加芍藥一錢半○脇

下痞鞮去大棗加牡蠣二錢○心下悸小便利者去黃芩加

茯苓一錢○不渴外有微熱者去人參加桂枝一錢五分溫服

取微似汗愈○欬者去人參大棗生薑加五味子一錢乾薑一

錢五分

大柴胡湯

柴胡 四錢

半夏 二錢

黃芩

芍藥

枳實

各一錢

生薑

二錢五分

大棗

二枚

一本有大黃五分

水三鍾煎八分溫服一鍾一日夜作三服

太陰

理中丸湯

人參

白朮

乾薑

甘草

各三兩

共研末蜜丸如雞子黃大研碎以沸湯服一九日三四溫服後

飲熱粥以腹熱爲度或各三錢水三鍾煎八分溫服服後飲熱

粥○若臍上築者去朮加桂○吐多者去朮加生薑二錢下多

者還用朮○悸者加茯苓渴欲飲水者加朮○腹痛者加人參

○寒者加乾薑○腹滿者去朮加附子○服湯後如食頃飲熱

粥微自溫勿揭衣被

四逆湯

甘草

四錢炙

乾薑二錢附子生用仁水三鍾煎八分溫服

通脈四逆加人尿猪膽湯

乾薑

六錢

甘草

四錢

附子

二錢生用

水三鍾煎八分加猪膽汁一湯匙人尿半湯匙溫服

桂枝加芍藥湯

桂枝

生薑

二錢

大棗

四枚

芍藥

六錢

炙草

二錢

水三杯煎一杯服

桂枝加大黃湯

桂枝

生薑

各三錢

芍藥

一錢

炙草

一錢

大黃

七分

大棗

四枚

水三杯煎八分溫服

少陰

麻黃附子細辛湯

麻黃

去根節

細辛

各三錢

附子

一錢五分

水三鍾先煮麻黃至二鍾去沫入諸藥煎七分溫服

麻黃附子甘草湯

麻黃 去根

甘草 各三錢

附子 一錢五分

煎法同上

通脈四逆湯

乾薑 六錢

炙草 四錢

附子 二錢

水二杯煎八分 溫服

白通湯

乾薑 三錢

附子 三錢

葱白 二根

水三杯煎八分溫服○

吳茱萸湯

吳茱萸 三錢

人參 一錢五分

大棗 四枚

生薑 六錢

水煎服

猪苓湯

猪苓

茯苓

澤瀉

滑石

阿膠 各三錢

水一杯先煮四味至一杯去滓入膠煎化服

黃連阿膠雞子黃湯

黃連 四錢

黃芩 一錢

芍藥 二錢

阿膠 三錢

雞子黃 一枚

水二杯半煎一杯半去滓入膠烺盡小冷入雞

子黃攪令相得溫服一日三服

大承氣湯

方見陽明

厥陰

烏梅丸

烏梅

九十枚

細辛

大錢

乾薑

一兩

當歸

四錢

黃連

一兩六錢

附子

六錢炮

蜀椒

四錢炒

桂枝

人參

黃柏

各六錢

各另研末合餵之以苦酒浸烏梅一宿去核飯上蒸之搗成泥入煉蜜共搗干下丸如梧子大先飲食白飲服十九日三服漸

加重二十九

當歸四逆湯

當歸

桂枝

白芍

各三錢

甘草炙

木通

細辛

各二錢

大棗

八粒又

一粒取

水三杯煎八分溫服

寒氣盛者加吳茱萸二錢半生薑八錢以水二杯清酒二杯煮

取一杯半溫分二服

白頭翁湯

白頭翁 一錢

黃連

黃蘗

秦皮 各一錢五分

水二杯煎八分溫服

餘詳於時方妙用附錄傷寒門

瘟疫方

人參敗毒散

方見痢疾

防風通聖散

方見中風

藿香正氣散

治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或藿

亂吐瀉或作瘧疾

藿香

白芷

大腹皮

紫蘇

茯苓

各三兩

陳皮

白朮

厚樸

半夏麴

桔梗

各二兩 甘草 一兩

每服五錢加薑棗煎

神聖辟瘟丹留傳在世間正元焚一炷四季保平安

此歌出聶久吾彙函

羌活 獨活 白芷 香附 大黃 甘松

三奈 赤箭 雄黃各等分 蒼朮倍用

右爲末麪糊爲丸彈子大黃丹爲衣晒乾正月初一侵晨焚一炷辟瘟

婦人科方

四物湯 統治婦人百病 當歸身 熟地 白芍酒炒各三

錢 川芎一錢五分 水三杯煎八分服○加製香附二錢研碎炙草

一錢○加減詳三字經

歸脾湯方見虛癆

逍遙散景岳治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源血氣日枯漸至經

脈不調者

當歸

三錢

芍藥

一錢五分

熟地

五錢

棗仁

二錢炒

茯神

一錢五分

遠志

五分

陳皮

八分

炙草

一錢

水三杯

煎八分服

○氣虛加人參 ○經滯痛加香附

按方雖庸陋能磁陽明之燥故從俗附錄之地黃生

佳用

當歸散

金匱

瘦而有火胎不安者宜此

當歸

黃芩

芍藥

芍藥

各一白朮 半斤

共研末酒服方寸七今用一錢日再服

○妊娠常服即易產胎無疾苦產後百病悉主之

白朮散

金匱

肥白有寒胎不安者此能養胎

白朮

川芎

川椒

牡礪

爲末酒服一錢七今用一錢日三服夜一

服但苦痛加芍藥心下毒痛加川芎心煩吐痛不食加細辛半

夏服之後更以醋漿服之復不解者小麥汁服之已後渴者大

麥汁服之病雖愈服勿置

保生無憂散

婦人臨產先服三兩劑自然易生或遇橫生倒產連日不生服二三劑神效

當歸

一錢五分酒洗

川貝母

一錢

黃耆

八分生用

艾葉

七分

酒芍

一錢二分冬日本錢

兔絲子

一錢四分

厚樸

薑汁炒七分

荆芥穗

八分

枳殼

麩炒六分

川芎

二錢二分

羌活

各五分

甘草

各五分

加生薑三片水二杯煎八分空心服

此方全用撐法當歸川芎白芍養血活血者也厚樸去瘀血者也
用之撐開血脉俾惡露不致填塞羌活荆芥疏通太陽將背後一
撐太陽經脉最長太陽治則諸經皆治枳殼疏理結氣將面前一
撐俾胎氣斂抑而無阻滯之虞艾葉温煖子宮撐動子宮則胞胎

靈動貝母兔絲最能滑胎順氣將胎氣全體一撐大具天然活潑之趣矣加黃耆者所以撐扶元氣元氣旺則轉動有力也生薑通神明去穢惡散寒止嘔所以撐扶正氣而安胃氣甘草協和諸藥俾其左宜右有而全其撐法之神也此方人多不得其解程山齡註獨超故全錄之

加味歸芎湯

川芎

三錢

當歸身

五錢

龜板

三錢
生研

婦人生過男女頂門髮

燒如雞
子大

水三杯煎八分服如人行五里卽生

當歸補血湯

當歸

三錢

炙耆

一兩

水煎服○加附子三錢神效或加桂一錢

失笑散

方見心
腹痛

生化湯

當歸

五錢

川芎

二錢

乾薑

五分
炮

桃仁

一錢五分
去皮尖

甘草

一錢
炙

水二杯煎八分服○產後風口噤角弓反張者宜

加荊芥穗三錢○又方中風口噤用華陀愈風散卽荊芥穗一

味焙爲末勿焦黑以童便和酒送下口噤藥不下者用一兩零

再以童便煎好從鼻孔灌下

當歸生薑羊肉湯

方見心
腹痛

竹葉湯

金

治產後中風病瘧發熱面正赤喘而頭痛

鮮竹葉

四十
九片

葛根

三錢

防風

一錢

桔梗

桂枝

人參

附子

炮

甘草

各一
錢

大棗

五枚

生薑

五錢

水三杯煎八分溫服溫覆使汗出日夜作三服○頭項強加附子五分前藥揚去沫嘔者加半夏二錢

愚按自汗者去葛根加括蕁根三錢附子五分○產後痙證十中只可救一除此方外無一善方

甘麥大棗湯

甘草

三錢

小麥

二兩六錢

大棗

十枚

水三杯煎一杯服日作三服

金匱方只錄五首餘見拙著金匱淺說金匱讀內二書即欲梓行集隘不能盡登

小兒科方

小兒無專方已上諸方折爲小劑用之今兒科開口即曰食曰驚曰

風曰疔所用之藥大抵以鈎藤秦艽防風羌活獨活天麻前胡全蝎
殭蠶爲祛風之品硃砂牛黃膽星石菖蒲天竺黃代赭石青黛赤芍
金銀煎湯爲定驚之品以山查神麴麥芽穀芽萊菔子枳殼厚樸檳
榔草果爲消食之品以蕪荑榧子史君子蜈蚣土五穀蟲爲治疔之
品如杏仁葶藶酒芍桑白皮半夏麴蘇陳皮貝母天花粉之類謂爲
通用調氣化痰之善藥父傳子師傳徒其端方皆殺人之具也錢仲
陽以金石之藥爲倡猶有一二方近道處至鐵鏡采薇湯則亂道甚
矣近日兒科只用已上所列諸藥任意寫來造孽無已實堪痛恨

附錄

陰陽

識一字便可爲醫說

客有問於余曰醫之爲道乃古聖人洩天地之秘奪造化之權起死回生非讀破萬卷書參透事事物物之理者不能今非通儒而業此亦能療人病獲盛名何也余曰天地間有理有數理可勝數則有學問之醫遠近崇之遂得以盡其活人之道然仲景爲醫中之聖尙未見許於當時觀傷寒論之序文可見猶宣聖以素王老其身天之意在萬世不在一時也仲景之後名賢輩出類皆不得志於時閉門著書以爲傳道之計而喻嘉言柯韻伯二先生書尤感憤而爲不平之鳴此理數之可言而不可言者矣今之業醫者無論不足爲通儒而求其識字者則爲良醫矣無論其識多字也只求其識一字者亦可

以爲良醫矣客曰此何字也得毋所謂丁字乎余曰亦其類耳不必
他求卽人字是也人乃陰精陽氣合而成之者也左爲陽左邊一ノ
陽之位也右爲陰右邊一ノ陰之位也作書者遇ノ處自然輕手揮
之陽主乎氣輕清之象也遇ノ處自然重手頓之陰主乎精重濁之
象也兩畫不相離陰陽互根之道也兩畫各自位置陰陽對待之道
也ノ在左者不可使之右ノ在右者不可使之左陰陽不離之道也
左ノ由重而輕萬物生於水卽男女構精萬物化生之義由陰而陽
也右ノ由輕而重形生於氣卽大哉乾元乃統天至哉坤元乃順承
天之義陽統乎陰也二者合之則成人合之之義醫書謂之曰抱周
易名之曰交交則爲泰矣試以形景淺言之人之鼻下口上水溝穴

一名人中取人身居乎天地中之義也

天氣通於鼻地氣通於口天食人以五氣鼻受之地食人

以五味口受之穴居其中故曰人中

自人中而上目鼻耳皆兩竅

偶

自人中而下口與

二便皆單竅

奇

上三畫偶而爲陰下三畫奇而爲陽取地天之義合

成泰卦也形景主外猶必合陰陽之象而成人况人之所以生之理乎人之爲義大矣哉子若遇醫者問此一字恐高車駟馬詡詡以名醫自負者亦一字不識也客聞子言亦大笑而去

臟腑

十二官

靈蘭秘典論云心者君主之官也神明出焉肺者相傅之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使

之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣按此以脾胃合爲一官恐錯簡耳刺法補遺篇云脾者諫議之官知周出焉胃者倉廩之官五味出焉採此補入方足十二官之數

心說

心火臟身之主神明之舍也小篆嘗言心字篆文只是一倒火字耳蓋心火也不欲炎上故顛倒之以見調燮之妙也祝無功曰庖氏一畫直豎之則爲一左右倚之則爲人爲人縮之則爲、曲之則爲、圓而神一一八方以直世間字變化浩繁未有能外一一八

結構之者獨心字欲動欲流圓妙不居出之乎一七八之外更索一字與作對不得正以心者新也神明之官變化而日新也心主血脉血脉日新新不停則爲平人否則病矣

其合脉也
色也開竅於舌

肝說

肝木臟魂所藏也肝者幹也以其體狀有枝幹也又位於東方而主生氣時醫昧其理反云肝無補法宜涼宜伐只泥木尅土之一說而不知後天八卦配河圖之象三八爲木居東卽後天震巽之位巽上坤下則爲觀易曰觀天之神道而四時不忒上坤下震則爲復易曰復其見天地之心乎爲義大矣哉

其合筋也其榮爪也開竅於目

脾說

脾爲土臟藏意與智居心肺之下故從卑又脾者裨也裨助胃氣以化穀也經云納穀者昌其在此乎

其合肉也其榮
唇也開竅於口

肺說

肺金臟魄所藏也肺者浦也中有二十四孔分布清濁之氣以行於諸臟使沛然莫禦也內經曰肺惡寒又曰形寒飲冷則傷肺勿只守火剋金之一說也

其合皮也其榮
毛也開竅於鼻

腎說

腎水臟藏精與志華元化謂爲性命之根也又腎者任也主骨而任周身之事故強弱係之甲乙經曰腎者引也能引氣通於骨髓卮言曰腎者神也妙萬物而言也

其合骨也其榮髮
也開竅於二陰

胃說

胃屬土脾之腑也爲倉廩之官五穀之府故從田田乃五穀所出以爲五穀之市也又胃者衛也水穀入胃游溢精氣上出於肺暢達四肢布護周身足以衛外而爲固也

膽說

字從詹不從且胆音檀乃口脂澤也與膽不同今從胆者乃傳襲之訛也

膽屬木肝之腑也爲中正之官中清之府十一經皆取決於膽人之勇怯邪正於此詹之故字從詹又膽者擔也有膽量方足以擔天下之事肝主仁仁者不忍故以膽斷膽附於肝之短葉間仁者必有也

大腸小腸說

大腸傳道之官變化出焉屬金爲肺之腑小腸受盛之官化物出焉

屬火爲心之腑人納水穀脾氣化而上升腸則化而下降蓋以腸者
暢也所以暢達胃中之氣也腸通暢則爲平人否則病矣

三焦說

三焦者上中下三焦之氣也焦者熱也滿腔中熱氣布護能通調水
道也爲心包絡之腑屬火上焦不治則水泛高原中焦不治則水留
中脘下焦不治則水亂二便三焦氣治則脉絡通而水道利故曰決
瀆之官

手心主說

卽心包絡

心乃五臟六腑之主其包絡爲君主之外衛相火代君主而行事也
所以亦有主名何以繫之以手蓋以手厥陰之脉出屬心包手三陽

之脉散絡心包是手與心主合故心包絡稱手心主五臟加此一臟實六臟也

膀胱說

膀胱屬水爲腎之腑經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣言其能得氣化而津液外出滋潤於皮毛也若水道之專司則在三焦之腑故經云三焦決瀆之官水道出焉言其熱氣布護使水道下出而爲溺也內經兩出字一爲外出一爲下出千古罕明其旨茲特辨之又膀胱者旁也胱者光也言氣海之元氣足則津液旁達不窮而肌腠皮毛皆因以光滑也

命門說

越人指右腎爲命門諸家非之余考內經太陽根於至陰結於命門
命門者目也靈樞結根篇衛氣篇素問陰陽離合論三說俱同後讀
黃庭經云上有黃庭下關元後有幽門前命門方悟其處凡人受生
之初先天精氣聚於臍下當關元氣海之間其在女者可以手捫而
得俗名產門其在男者於泄精之時自有關闌知覺此北門銷鑰之
司人之至命處也又考越人七衝門之說謂飛門唇也戶門齒也吸
門會厭也賁門胃之上口也幽門大腸下口也闌門小腸下口也魄
門肛門也便溺由氣化而出又增溺竅爲氣門凡稱之曰門皆指出
入之處而言也况身形未生之初父母交會之際男之施由此門而
出女之受由此門而入及胎元既足復由此門而生故於入門之外

重之曰命門也若夫督脉十四椎中有命門之穴是指外膪而言如

臟六腑
膪一理

非謂命門卽在此也

經絡

經絡歌訣

汪叔菴本草備要後附此宜熟讀之無庸再著

四診

望色

春夏秋冬長夏時

青黃赤白黑隨宜

左肝右肺形呈頰

心額腎頤鼻主脾

察位須知生者吉

審時若遇尅堪悲

更於黯澤分新舊

隱隱微黃是愈期

又有辨舌之法舌上無胎爲在表鮮紅爲火淡白爲寒

主無胎言非謂

胎之淡白也

若有白胎爲半表半裏黃胎爲在裏黑胎病入少陰多

死胎潤有液爲寒胎燥無液者爲火舌上無胎如去油腰子爲亡液不治

聞聲

肝怒聲呼 **心**喜笑

脾爲思念發爲歌

肺金憂慮形爲哭

腎主呻吟恐亦多

又法氣衰言微者爲虛氣盛言厲者爲實

語言首尾不相顧者神昏狂言怒罵者實熱痰聲漉漉者死久病聞呃爲胃絕大抵語言聲音以不異於平時者吉反者爲凶

問症

出景岳全書張心在增潤之

一問寒熱二問汗

三問頭身四問便

五問飲食六問胸

七龔八渴俱當辨

九問舊病十問因

再兼服藥參機變

婦人尤必問經期

遲速閉崩皆可見

再添片語告兒科

天花麻疹虔占驗

切脉

微茫指下最難知條緒尋來悟治絲

舊訣以浮芤滑實弦緊洪爲七表以沉微遲緩濡伏弱濇爲八

裏以長短虛促結代牢動細爲九道李頻湖李士材加入數革散三

三脉共二十七字實難摸索必得其頭緒如治絲者始有條不紊

部分持成定法左寸外以候心內以候膻中右寸外以候肺內以候

候脾兩尺外以候腎內以候腹腹者大小二腸膀胱俱在其中前以

候前後以候後上竟上者胸喉中事也下竟下者小腹腰股膝脛中

事也此照內

八綱易見是良規

浮主表沉主裏二脉於指下輕重辨

經分配之法

之易見也遲主寒數主熱二脉以息

之至數分之易見也大主邪實細主正虛二脈以形之調窄分之易見也長主素盛短主素弱二脈以部之長短分之易見也以此八脈為綱其餘諸脈辨其兼見可也置而弗辨亦可也起四句總提切脈之大法也

胃資水穀人根本而肺受

氣於胃土具冲和脈委蛇不堅直而和緩也脈得中土之生臟氣全憑

生剋驗

審臟氣之生剋為第二要如脾病畏弦木剋土也肺病畏洪火剋金也反是則與臟氣無害

天時且向逆

從窺

推天運之順逆為第三要如春氣屬木脈宜弦夏氣屬火脈宜洪之類反是則與天氣不應

陽為浮數形偏

亢

仲景以浮大動滑數為陽凡脈之有力者俱是

陰則沈遲勢更卑

仲景以沈濇弱弦遲為陰凡脈之無力者皆是

此又提出陰陽二字以起下四句辨脈病之宜忌為第四要

外感陰來非吉兆

外感之證脈宜浮洪而反細弱則正

不勝邪矣

內虛陽現實堪悲

脫血之後脈宜靜細而諸凡偏勝皆成病

偏陽

而洪大偏陰而細弱皆病脈也

忽變非常即弗醫

舊訣有雀啄屋漏魚翔蝦遊彈石

決忽現出反常之象

只此數言占必應脈經鋪叙總支離

病之名有萬而脈象不過數十種且一病

而數十種之脈無不可見何能診脈而即知爲何病耶脈書欺人之語最不可聽

運氣

張飛疇運氣不足憑說

諺云不讀五運六氣檢遍方書何濟所以稍涉醫理者動以司運爲務曷知天元紀等篇本非素問原文王氏取陰陽大論補入經中後世以爲古聖格言孰敢非之其實無關於醫道也况論中明言時有常位而氣無定然猶諄諄詳論者不過窮究其理而已縱使勝復有常而政分南北四方有高下之殊四序有非時之化百步之內晴雨不同千里之外寒暄各異豈可以一定之法而測非常之變耶若熟之以資顧問則可苟奉爲治病之法則執一不通矣