


景岳全書

卷之三十一

六十一卷 婦人
六十二卷 小兒
六十三卷 痘疹



漢書門			
二	一	二	三
四	八	九	五
冊	架	函	號

內閣文庫			
三	二	二	漢
函	四	四	書
四	六	五	
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	12465	
冊數	24	(23)	
函號	301	27	



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale




© Kodak, 2007 TM Kodak



皇朝全書卷之六十一 婦人規古方

長集



婦人

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

安胎飲一 治妊娠五七個月用數服可保全產

人參 白朮 當歸 熟地

川芎 白芍藥 陳皮 甘草炙

紫蘓 炙黃芩 各一錢

婦人

古用薑水煎服○一方有砂仁

安胎散二 治妊娠卒然腰痛下血

熟地 艾葉 白芍炒 川芎

黃芪炒 阿膠炒 當歸 甘草炙

地榆 各一錢

右加薑棗水煎服

泰山盤石散三 治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱

或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患此方平和兼養脾胃

氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加

黃芩更宜戒慾事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮○徐

東臯曰婦人凡懷胎二三月月慣要墮落名曰小產此由體

弱氣血兩虛藏府火多血分受熱以致然也醫家又謂安胎

多用艾附砂仁熱補尤增禍患而速其墮矣殊不知血氣清

和無火煎爍則胎自安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行

欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快

脾氣多用亦耗真氣况香燥之性氣血兩傷求以安胎適又

損胎而反墮也今惟太山磐石散千金保孕丸二方能奪化

工之妙百發百效萬無一失甫故表而出之以為好生君子

婦人

共知也

人參

黃芪

當歸

川續斷

黃芩

各一錢

川芎

白芍藥

熟地

各八分

白朮

二錢

炙甘草

砂仁

各五分

糯米

一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月

之後方無慮也

地黃當歸湯

一名內補丸○治妊娠衝任脉虛補血安胎

熟地

二兩

當歸

一兩

右每服五錢水煎服○爲丸法以當歸炒爲末熟地蒸搗膏

和丸桐子大每服百餘丸溫酒或滾湯下○許學士曰大率

妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最惡陰陽雜亂致生他病惟

枳殼湯所以抑陽四物湯所以助陰耳然枳殼湯其味多寒

若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽不致強陰不

致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

良方

當歸湯

五

治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸

人參

各二三錢

阿膠

炒

甘草

炒各一錢

連根葱白

一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

良方 阿膠散 六 或頓仆或因毒藥胎動不安或脇痛腹痛上搶

短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

川芎

白芍

黃芪

炙甘草

等分

右每服四錢薑棗水煎

良方 膠艾湯 七 治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或

去血腹痛○又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠 炒一兩 艾葉 數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散 八

治胎動腹痛

阿膠 炒

白茯苓

白朮 炒

川芎

當歸

陳皮

各一錢

甘草

炒三分

右薑棗水煎服

良方 黃芪湯 九 治氣虛胎動腹痛下水

糯米 一合

黃芪

炒

川芎

各一兩

右水煎分三服

良方 鈞藤湯 十 治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

鈞藤鈞

當歸

茯神

桑寄生

人參 各一錢
苦梗 一錢半

右水煎服○如有煩熱加石膏

良方白朮散 十一 治妊娠傷寒內熱等證

白朮 黃芩 炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良方三味白朮湯 十二 治妊娠內熱心痛

白朮 四錢 赤芍藥 三錢 黃芩 炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉

良方四味白朮湯 十三 治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿

粥不入

白朮 炒一錢 人參 五分 甘草 炒 丁香 各二分

右薑水煎服

全生白朮散 十四 治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎

腫

白朮 一兩 生薑皮 大腹皮 陳皮

白茯苓 各半兩

右為末每服二錢米飲下○如未應佐以人參甘草

探胎飲 十五 婦人經水不來三月疑似用此驗之

婦人

川芎

不拘多少為末不見火

空心煎艾湯調下方寸七覺腹中動則有胎也臍之下動者乃血痕也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯 十六

治妊娠心腹急痛或去血過多而眩暈

當歸

白芍藥

炒

白朮

炒

茯苓

澤瀉

各一錢

川芎

二錢

右水煎服

益母地黃湯 十七

治妊娠跌墜腹痛下血

生地

益母草

各二錢

當歸

黃芪

炒各一錢

右薑水煎服

獨聖散 十八

治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁

不拘多少帶皮同炒勿令焦黑取仁為末

右用熱酒調服四五分或一錢○此物有安胎導滯易產之

功實妊婦之要藥也

安胎寄生湯 十九

治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生

白朮

茯苓

各五分

甘草

一錢

右水煎服

二黃散 二十

治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁

婦人

作渴或脇肋脹痛等證

生地 熟地

右爲末每服三錢煎白朮枳殼湯下

四聖散 治漏胎下血

條芩 白朮 砂仁 阿膠 各等分

右爲細末每服二錢艾湯調下○一方有芍藥無阿膠○按

此方若改爲湯砂仁用當減半

續斷湯 治妊娠下血尿血

當歸 生地黃 續斷 赤芍藥 各半兩

右爲末每服二錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯 治胎漏下血或因事下血亦進食和中并治惡

阻

枳殼 炒 黃芩 炙各半兩 白朮 炒一兩

右爲末每服一錢白湯調下○前四證若因脾胃虛弱宜用

補中益氣湯加五味○若因脾胃虛陷宜用前湯倍加升麻

柴胡○若因脯熱內熱宜用逍遙散

滑胎枳殼散 此方能令胎瘦產易○湖陽公主每產累

日不下南山道人進此方

粉草

炒一兩

商州枳殼

楚炒二兩

右爲末每服二錢空心沸湯調日三服凡孕六七月宜服之

○溫隱居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

枳殼散

二五

方在寒陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

金鯉魚湯

二六

治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不利或胎死腹中皆效

當歸

各一錢

芍藥

各一錢

白朮

一錢

茯苓

一錢半

橘紅

五分

鯉魚

一尾不拘大小

右作一服將鯉魚去鱗臟白水煮熟去魚用汁鍾半入葯加

生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹中

脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯

二七

治妊娠心驚膽怯煩悶不安各日子煩○一方

有當歸防風梔子仁

白茯苓

麥門冬

黃芩

各二兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四

物○若因中氣虛弱宜兼用四君

紫蘓飲

治妊娠失調胎氣不安上疔作痛名日子懸或

臨產氣結不下等證

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘓葉

當歸

各一兩

人參

甘草

各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜用四君芎歸

安榮散 二九

治妊娠小便澀少遂成淋瀝名日子淋甚妙

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛

等分

右水煎服○一方人參細辛加倍為末每服二錢麥冬湯調服○若因肺經鬱熱宜用黃芩清肺飲○若因膏梁厚味宜用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味道遙散

天仙藤散 三十

治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食

不甘狀似水氣或脚指間出黃水名日子氣

天仙藤

洗畧炒

香附

炒

陳皮

甘草

烏藥

等分

右每服三五錢加生薑木瓜各三片紫蘓三葉水煎食前日進三服○若因脾胃虛弱宜兼六君子○中氣下陷瀆用補

中益氣湯

羚羊角散 三一

治妊娠虛風頸項強直筋脉攣急語言蹇澁

痰涎不利不省人事名日子癇

羚羊角 鎊

川獨活

棗仁

五加皮

薏苡仁 炒

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

去皮尖
各五分

炙甘草

木香

各一分

右加薑五片水煎服○若因肝經風熱或怒火所致瀕用加

味逍遙散

人參橘皮湯 三三

治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲

食少進益胃和中○一名參橘散

人參

陳皮

麥門冬

白朮

各一錢

厚朴 制

白茯苓

各五分

炙甘草

三分

右加淡竹茹一塊薑水煎溫服○若因中脘停痰宜用二陳

枳殼○若因飲食停滯宜用六君加枳殼○若因脾胃虛宜

用異功散

竹茹湯 三三

治孕婦嘔吐不止惡心少食服此止嘔清痰

竹茹

彈子大
一丸

陳皮

半夏

茯苓

各錢半

生薑

一錢

水鍾半粳米一撮煎七分溫服忌羊肉雞魚麵食

良方半夏茯苓湯三四 治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏泡炒黃 陳皮 砂仁炒各一錢 白茯苓二錢

甘草炒五分

右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸在三九

烏附湯三五 治孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏藥 香附制 白朮土炒 陳皮各一錢

人參 炙甘草各八分

水鍾半薑三片煎七分服○吐甚者加丁香砂仁各七粒

千金保孕丸三六 治妊婦腰痛善於小產服此可免墮胎

之患○此卽良方杜仲丸但彼等分用

杜仲四兩同糯米炒去絲 川續斷二兩酒洗

右爲末山藥糊丸桐子大每服八九十九空心米飲下忌酒

醋惱怒

一母丸三七 一名知母丸○治妊娠血熱頓仆胎動不安或

欲墮產

知母炒爲末

右搗棗肉爲丸彈子大每服一丸人參湯嚼送或丸桐子大

每服三四十九白湯下或嚼嚥之

束胎丸 三二八

懷胎七八個月恐胎氣展大難產用此扶母氣

束兒胎易產然必胎氣強盛者乃可服

條黃芩

酒炒勿太熟冬月一兩夏月半兩

白朮 三兩

陳皮 二兩

白茯苓

七錢半

右為末粥糊丸

子桐

大每服五十九白湯下

茯苓丸 三九

治妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓

人參

桂心

乾薑

炮

半夏

泡洗炒黃

橘紅

各一兩

白朮

炒

甘草

炒

枳殼

麩炒各二兩

右為末蜜丸桐子大每服五十九米飲下日三服○右原方

仍有葛根二兩似非所宜也用者當酌之

達生散 四十

四

妊娠臨月服十餘劑則易產或加砂仁枳殼如

兼別證以意增減○詩云誕彌厥月先生如達註曰先生首

生也達小羊也羊子易生故以此名之

人參

白朮

當歸

白芍

陳皮

紫蘇

各一錢

炙甘草

二錢

大腹皮

酒洗晒乾三錢

水一鍾半煎服○一方無當歸白芍白朮

佛手散

四一

一名芎歸湯亦名當歸湯○治產後去血過多

煩暈不省并一切胎氣不安亦下死胎

川芎一二錢

當歸二五錢

右咀每用半兩水煎服○若腹疼加桂○若腹痛自汗頭眩少氣加羊肉若不應用八珍湯○若用下胎當為末以酒調服

錢

氏生化湯

四二

此錢氏世傳治婦人者

當歸五錢

川芎一二錢

甘草

炙五分

焦薑二分

桃仁

十粒去皮尖雙仁

熟地

三錢

右咬咀水一鍾棗二枚煎八分溫服○一方無熟地 附加

減法○凡胎衣不下或血冷氣閉血枯氣弱等證連服生化

湯二三劑卽下或用此送益母丸一丸卽下蓋益母草行血

養血性善走而不傷人者也○一凡婦人無論胎前產後皆

宜此藥○一凡血暈虛暈加荆芥穗六七分○一凡產婦氣

虛氣脫倦怠無力加人參黃芪○一凡陽虛厥逆加附子肉

桂○一脈虛煩渴加麥冬五味○一氣壅有痰加陳皮竹瀝

○一血虛血燥便結加麻仁杏仁菴蓉○一多汗不眠加茯

神棗仁黃芪上體多汗加麻黃根下體多汗加漢防已○一

煩熱加丹皮地骨皮○一口噤如風及張瘕瘕者加荆芥防
風各三四分○一惡露未盡身發寒熱頭痛脇脹其小腹必
然脹痛加紅花丹皮肉桂各三四分玄胡一錢○一內傷飲
食加山查陳皮砂仁或神曲麥芽○一外傷寒濕或加蒼朮
白朮○一血積食積胃有燥糞臍腹脹痛加大黃二錢○一
產後下血不止或如屋漏水沉黑不紅或斷或來或如水或
有塊淋瀝不休此氣血大虛之候不可誤用寒涼其脉浮脫
者可加附子輩諸陽分葯否則無救矣○佛手散單用當歸
三錢川芎二錢此卽其變方也

會稽錢氏世傳曰嘗論產證本屬血虛陰亡陽孤氣亦俱病
如大補則氣血陡生倘失調則諸邪易襲四物避芍藥之寒
四物得薑桃之妙氣毋耗散法兼補虛食必扶脾勿專消導
熱不可用芩連恐致宿穢凝滯寒不宜用桂附反招新血流
崩三陽見表證之多似可汗也用麻黃則重竭其陽三陰見
裏證之劇似可下也用承氣則大涸其血耳聾脇病乃腎虛
惡露之停休用柴胡譫語汗多乃元弱似邪之證毋同胃實
厥由陽氣之衰難分寒熱非大補不能回陽瘕因陰血之虧
豈論剛柔非滋營胡以潤絡潮熱似瘧以瘧治則遷延神亂

如邪以邪論則立困總屬大虛瀆從峻補去血多而大便燥
菹蓉加於生化非潤腸和氣之能通患汗出而小便難六君
倍用參芪必生津助液之可利加參生化頻服救產後之危
活命長生調攝須產前加意

當歸川芎湯 四三

治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸

熟地黃

白芍藥 炒

玄胡索 炒

川芎

桃仁

紅花

香附

青皮 炒

澤蘭

牡丹皮

右水煎入童便酒各小半○若以手按腹愈痛此是瘀血為

患宜用此葯或失笑散消之○若按之反不痛此是血虛宜
用四物參苓白朮○若痛而作嘔此是胃虛宜用六君子○
若或作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸

加味芎歸湯 四四

治分娩交骨不開或五七日不下垂死者

生男女婦人髮

一握燒存性

白死龜殼

一個或占過者亦可酥炙

川芎

當歸

各一兩

右咀每用一兩水煎服良久不開生死胎自下

當歸黃芪湯 四五

方在補陣九八

治姙娠下痢腹痛

芎歸補中湯 四六 治氣血虛半產

川芎 當歸 黃芪 炙 白朮 炒

人參 芍藥 炒 杜仲 炒 艾葉

阿膠 炒 五味子 杆炒各一錢 甘草 炙五分

右每服五錢水煎服○若脾氣虛弱須用補中益氣湯○若氣虛有火宜用安胎飲

保生無憂散 四七 臨產服之補其血順其氣或胞胎肥厚根蒂堅牢者皆可使之易產又治小產瘀血腹痛

當歸 川芎 白芍 乳香

枳殼 南木香 血餘

右等分每服二三錢水煎日二服○若胞衣既破其血已涸或元氣困憊急用八珍湯斤許水數碗煎熟時飲救之飲盡

再制亦有得生

人參黃芪湯 四八 治小產氣虛血下不止

人參 黃芪 炒 當歸 白朮 炒

白芍 炒 艾葉 各一錢 阿膠 炒二錢

右作一劑水煎服

良方 牛膝散 四九 治胎衣不下腹中脹痛急服此藥腐化而下

全書卷之十一
緩則不久

牛膝 川芎

朴硝

蒲黃 各二兩

當歸 一兩半 桂心 半兩

右每服五錢薑三片加生地黃一錢水煎服

局方 黑神散 五十 一名烏金散 靈苑方名肉桂散 ○治產後

惡露不盡胎衣不下血氣攻心腹痛不止及治脾腎陰虛血不守舍吐衄等證

黑豆 一兩炒 當歸 去蘆酒洗 熟地

蒲黃

白芍 甘草 炙 乾薑 炮 肉桂 各一兩

右為末每服二錢童便酒各半調服 ○良方黑神散有炮附子半兩無蒲黃

簡易 黑神散 五一 方在和陣 一一

治一切失血

經驗滑石散 五二 治產難凡水下胎乾胎滯不生用此最效

滑石 飛過一兩 白蜜 香油 各半盞

右將油蜜慢火熬熟三四沸掠去沫調滑石末頓服外以油調於產婦臍腹上下摩之立效

難產方 五三

令產婦以自已髮稍含於口中惡心即下亦治胎衣不下

良方 桂心散 五四 治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心 瓜萸 牛膝 藟麥 各五分 或一錢

當歸 一錢或二三錢

右水煎

桂香散 五五 治胎死腹中不下

桂心 三錢 射香 五分

右為末作一服酒調下

下胎小品方 五六

用麥蘖一升搗碎水二升煮一升服之即下神效○按麥蘖能損氣破血如此故凡脾胃虛弱及飲食不化者不宜用明矣○又方用牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服即下

廣濟 下胎方 五七 并下死胎俱效

天花粉 四兩 肉桂 牛膝 豆豉 各三兩

右咀用水七碗煎二碗半分三服每服後一時許又進一服

扶羸小品方 五八 虛弱人欲下胎宜用此

人參 粉草 川芎 肉桂

乾薑 桃仁 黃芩 蟹瓜

婦人

右等分每服一兩水二鍾煎八分空心服未動再服

下死胎 五九 凡胎死腹中其舌多見青黑口中甚穢而嘔腹

中不動祇覺陰冷重墜者是

用平胃散一兩以黃酒河水各一鍾煎至一鍾入朴硝三

五錢再煎三五沸溫服其死胎即化水而出萬不失一○

又方單用朴硝末三錢以熱酒和熱童便調服立出或用

佛手散以酒調服亦妙

千金去胎方 六一

大麩麩 五升

漬酒一斗煮二三沸去滓分五服隔宿勿食且再服其胎如

糜母無所苦千金不傳

良方 硫黃散 六一

治產後陽氣虛寒玉門不閉

硫黃

烏賊骨

五味子

右為末摻患處日三易

良方 硫黃湯 六三

治產後玉門不斂陰戶突出

硫黃 二錢

兔絲子

吳茱萸

各二錢

蛇床子

一錢半

右研勻用水二鍾煎湯頻洗自收

良方 益母丸 六四

一名返魂丹○治婦人赤白帶惡露時下不

止及治婦人胎前產後經中諸般奇痛無所不療本草云此
草胎前無滯產後無虛故名益母

益母草 一味

一名克蔚子一名野天麻方梗對節生葉
葉顛火麻四五月間開紫花是白花者非

右於五月採取晒乾連根莖葉勿犯鐵器磨為細末煉蜜丸
如彈子大每服一丸用熱酒和童便化下或隨證用湯引送
下○一方以此為末每服二錢或酒或童便或隨證用引服
之○一方凡產時倉卒未合只用生益母草搗汁入蜜少許
服之其效甚大○一益母膏方依前採取搗爛以布濾取濃

汁用砂鍋文武火熬成膏如黑砂糖色為度入磁罐收貯每
服二三匙酒便調下或於治血湯藥中加一匙服之尤妙

良方 奪命丹 六五

治瘀血入胞脹滿難下急服此藥血即消衣

自下○按此方頗有迴生丹之功用下死胎必效須用當歸
方

附子

炮半兩

乾漆

碎之炒
煙盡

牡丹皮

各一兩

右為細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成膏和前藥
丸桐子大溫酒吞五七丸○一方有當歸一兩

迴生丹 六六

治婦人產後諸疾污穢未淨及一切實邪疼痛

死胎瘀血衝送等證

大黃膏法 用蘓木三兩河水五碗煎至三碗去粗聽用

紅花三兩炒黃色用好酒一大壺煮十餘滾去粗聽用

黑豆三升煮熟存汁三碗去豆去皮晒乾為末俱聽用

大黃一斤為末用好醋八碗熬成膏次下紅花酒蘓木湯

黑豆汁攪勻又熬成膏盆內收盛候用將鍋焦焙乾為末

同豆皮末俱入之

人參 白朮 青皮 木瓜 各三錢

當歸 川芎 元胡 蒼朮

香附 童便炒 蒲黃 赤茯苓 桃仁泥

熟地 各一兩 牛膝 三稜 山茱萸

五靈脂 地榆 甘草 羌活

陳皮 白芍 各五錢 良薑 四錢 烏藥 二兩半

木香 乳香 沒藥 各一錢

右為末用前大黃膏為丸彈子大金箔為衣不拘時隨證擇

用湯引送下一丸

斷產灸法 六七 一傳方欲絕產者灸臍下二寸三分陰動脈

中三壯 此當自臍中至骨際拆作五寸約之

千金斷產方 又六七

四物湯 一劑

芸臺子

一撮郎
油菜子

紅花

水鍾半煎八分經後空心服則不受胎

斷產小品方 六八

斷產墮胎有驗

故蠶退紙 方一尺

右燒為末空心酒調服終身不受孕

丹溪斷子法 六九

用白麩麩一升無灰酒五升作糊煮至三升半濾去滓分作

三服候經至前一日晚五更及天明各吃一服經即不一無不字

行終身無子矣

仲景羊肉湯 七十

治產婦腹中疴痛寒痛血氣不足虛弱甚者

及寒月生產寒氣入於子門手不可犯臍下脹滿此產後之

寒證也并治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

精羯羊肉 一斤

當歸 三兩

生薑 五兩

右用水八升煮取三升加葱椒鹽溫服七合日三服○若寒

多者加生薑一斤○痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩

良方羊肉湯 七一

治產婦脾虛寒邪內乘以致腹痛或頭眩臍

脇急痛

精羊肉 四兩

當歸

川芎 各半兩

生薑 一兩

右以水十盞煎至四盞分四次空心服

良方 黃雌鷄湯 七二

治產後虛羸腹痛

當歸

白木 炒

熟地黃

黃芪 炒

桂心 各半兩

小黃雌雞

一隻去頭足腸翅細切

右先用水七碗煮鷄至三碗每用汁一碗葯四錢煎日三服

母鷄湯 七三

治產後褥勞虛汗不止

人參

黃芪

白木

白茯苓

麻黃根

牡蠣 煨各三錢

右用母鷄一隻去毛雜淨水六七碗同葯煮至三碗任意服

之

豬腰湯 七四

治產後褥勞寒熱如瘧自汗無力欬嗽頭痛腹痛

俱效

豬腰 一對

當歸

白芍葯 酒炒各一兩

右以葯二味用水三碗煎至二碗去滓將豬腰切如骰子塊

同晚米一合香豉一錢加葱椒鹽煮稀粥空心日服一次神

效○或加人參更妙

四神散 七五

治產後血虛或瘀血腹痛

全書卷六十一

婦人

三

當歸 二錢

川芎

芍藥 炒各一錢

炮薑 五分

右水煎服

太巖蜜湯 七六

治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地

當歸

芍藥 炒

乾薑

吳茱萸

桂心

獨活

甘草 炒

小草

各一兩 細辛 半兩

右每服半兩水煎服

良方 人參湯 七七

治產後諸虛不足發熱盜汗內熱喘熱等證

○此即參歸湯亦名團參散

人參

當歸 等分

右為末先以豬腰子一枚切片糯米半合葱白二莖入水二

鍾煎汁八分再入藥三錢煎服

白茯苓散 七八

治產後蓐勞頭目肢體疼痛寒熱如瘧

白茯苓 一兩

人參

當歸

黃芪

川芎

白芍藥 炒

熟地

桂心 各半兩

豬腰 一對

右以水三盞入豬腰并薑棗各二事煎一盞去粗入前藥半兩煎一盞服

良方七珍散 七九

治產後不語

人參

石薑蒲

生地

川芎 各一兩

細辛 七錢

防風

朱砂 另研各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調服

良方趁痛散 八十

治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝 酒炒

甘草 炒

薤白 各一兩 當歸

白朮 炒

黃芪 炒

桂心

獨活 加薑各半兩

右每服半兩水煎

補脬飲 八一

治產後傷動脬破不能小便而淋瀝

生黃絲絹 一尺剪碎

白牡丹皮根

白芨 各一錢俱為末

用水一碗同煮至絹爛如餲空心頓服服時不得作聲作聲

則不效

良方止汗散 八二

牡蠣 煨粉半兩

小麥麩 八兩炒黃為細末

右每服三五錢用猪肉汁調服

良方 麻黃根湯 八三

治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

麻黃根

人參

黃芪炒

當歸

牡蠣煨粉

甘草

右每服四五錢水煎服

二味參蘓飲八四

治產後瘀血入肺欬嗽喘急

人參一兩

蘓木二兩

右作一劑水煎服○若既愈當用六君子以補脾胃○若口

鼻黑氣起宜急用此藥加附子五錢亦有得生者

良方 黃龍湯八五

治妊婦寒熱頭疼嘔嘔不食脇痛嘔痰及產

後經後外感風寒熱入胞宮寒熱如瘧等證○按此即小柴胡湯之去半夏也

柴胡二錢

黃苓炒

人參

甘草各一錢

右用水煎服

陳氏 二母散八六

治產後熱血上攻留於肺經欬嗽喘促

知母

貝母

桃仁

杏仁俱去皮尖

白茯苓

右等分每服五錢薑水煎服

猪蹄湯八七

治氣血不足乳汁不下

用八物湯加黃芪漏蘆陳皮木通先以猪蹄煮汁二碗煎藥服之○或加天花粉

又方 用猪蹄一副通草二兩川芎一兩甘草一錢川山甲十四片炒將猪蹄洗切入水六碗同藥煎煮約至三碗加葱薑鹽料取汁飲之忌冷物要喫羹湯助其氣血乳汁自下夏月不可失蓋時用葱湯洗乳為佳

良方 湧泉散 八八

下乳忌食薑椒辛辣飲食

王不留行

藿麥

麥門冬

龍骨

各二錢

右用猪蹄汁一碗酒一杯煎服以木梳於乳上梳下

玉露散 八九

治產後乳脉不行身體壯熱頭目昏痛大便澀

滯

人參

白茯苓

當歸

炙甘草

各五分

桔梗

川芎

白芷

各一錢

芍藥

七分

右水煎食後服○如熱甚大便秘結加大黃三五分炒用

良方 漏蘆湯

治婦人肥盛脉氣壅結乳少

漏蘆 二兩

蛇退 一條

土瓜根

右共為末酒調下二錢

婦人

古方

三

括萸散 九 治吹乳腫痛

括萸 一個 乳香 二錢

右用酒煎服○外用南星為末以溫湯調塗

滑氏補肝散 九二 治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭

暈寒熱發熱或徧身作痛經候不調

熟地 炒各一兩 白朮 炒各一兩 棗仁 炒 獨活 各四兩

當歸 川芎 黃芪 炒 山藥

五味子 炒杵 山茱萸肉 木瓜 各半兩

右咬咀每服五錢棗水煎服

金匱膠艾湯 九三 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不止

阿膠 炒 川芎 炙甘草 各一兩 艾葉

當歸 各兩半 白芍 熟地 各二兩

右咬咀每服五錢水煎服○一方加地榆黃芪即名安胎散

集驗加味八珍湯 九四 治婦人思慮過傷飲食日減氣血兩虛

月經不調夜夢交感或出盜汗寢成勞損

人參 白朮 茯苓 當歸

生地 各一錢 炙甘草 川芎 芍藥

軟柴胡 黃芪 各五分 香附 制 丹皮 各八分

水鍾半大棗一枚煎七分食前服

集驗 調衛養榮湯 九五

治婦人室女一切月經不調或先或後

或絕閉不通憎寒壯熱口苦無味欬嗽躁煩頭眩漸成勞證者

當歸

生地

麥冬

沙參

陳皮

白木

牡丹皮

地骨皮

各八分

柴胡稍

桔梗

各五分

穀芽

一錢

甘草

四分

右加蓮子薑棗水煎服○痰中見血加側柏葉○煩躁口乾加炒山梔倍麥門冬○脇下脹疼加青皮川芎○胸膈滿悶

加黃連薑炒枳實去麥冬地骨皮○夜出盜汗加黃連黃芪

去柴胡桔梗○大便秘結加桃仁倍當歸○欬嗽不已加瓜

蒺藜仁阿膠○小水不利加木通茯苓

良方 當歸散 九六

治經水妄行不止及產後氣血虛弱惡露內

停憎寒發熱宜服此去之

當歸

酒洗

川芎

白芍

炒

白木

炒

黃芩

炒各半兩

山茱萸肉

一兩半

右爲末每服二錢酒調日三服○一方無山茱萸○氣虛者去苓加桂心一兩

婦人

良方丹參散九七良方云丹參一味其治頗類四物湯能破宿血

補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經下產後惡血兼治

冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參酒洗去土晾乾切

右為細末每服二錢溫酒調下○經脈不調食前服○冷熱

勞不拘時服

玄胡當歸散九八亦名延胡索散○治血積小腹疼痛或因氣

逆月經不行肚腹作痛

當歸 赤芍藥 劉寄奴 沒藥

枳殼麩炒 玄胡索炒等分

右為末每服一錢熱酒調下

牛膝散九九治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸膈

當歸酒浸 牛膝酒炒 赤芍藥 桂心

桃仁去皮尖 玄胡索炒 牡丹皮各一兩 木香三錢

右為末每服一錢溫酒調下或每服五七錢水煎服

良方交加散百治經脈不調腹中撮痛或結聚癥瘕產後中風

○又交加散方在和陣二五二

生地一斤取汁 生薑十二兩取汁

婦人

右以地黃汁炒薑祖薑汁炒地黃祖乾爲末每服三錢溫酒
調服○加芍藥玄胡當歸蒲黃桂心各一兩沒藥紅花各五
錢尤效

薑黃散

百一

治瘀血凝滯肚腹刺痛或腹脹發熱等證

薑黃

當歸

酒拌各二錢

蓬朮

醋炒

紅花

桂心

川芎

玄胡索

炒

丹皮

各五分

右水酒各半煎服

琥珀散

百二

治心膈迷悶肚腹撮痛月信不通等疾

烏藥

一二兩

當歸

酒洗

蓬朮

醋制各一兩

右爲末每服一錢溫酒調服

溫經湯

百三

治寒氣客於血室以致血氣凝滯臍腹作痛其脉

沉緊

人參

牛膝

酒炒

甘草

炒各一錢

當歸

川芎

芍藥

牡丹皮

蓬朮

醋炒

桂心

各五分

右水煎服

經

失笑散

百四

治婦人心痛氣刺不可忍及產後兒枕畜血惡

血上攻疼痛并治小腸氣痛

五靈脂 淨者 蒲黃 等分俱炒

右爲末每服二三錢用酒煎熱服○一方用好醋一杓熬成膏再入水一鍾煎至七分熱服○一方用醋糊和丸龍眼大每服一丸以童便和水各半鍾煎七分溫服○按此方若用以止痛蒲黃宜減半若用止血則宜等分或靈脂減半亦可

澤蘭湯 百五 治勞怯經閉

澤蘭葉 一錢 當歸 一錢 芍藥 炒各一錢 甘草 炙五分

用水煎服

當歸沒藥丸 百六 治血瘀作痛及血風筋攣骨痺手足麻木

疼痛

當歸 炒各一兩 沒藥 五錢

右爲末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

醋附丸 百七 治元臟虛冷月候不調腹中急痛赤白帶下渾

身寒熱胎氣壅滯不固

香附米 半斤醋煮焙干爲末

右以醋糊爲丸桐子大每服三四十九米飲下

栝子仁丸 百八 治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦

而生潮熱慎勿以毒葯通之宜栝子仁丸或前澤蘭湯主之

栢子仁 炒研 牛膝 酒拌 卷栢 各半兩 澤蘭葉

續斷 各二兩 熟地黄 三兩酒伴蒸爛杵膏

右為末入地黄膏加煉蜜丸桐子大每服百餘丸空心米飲

下

烏賊魚骨丸 百九 此即內經治血枯方

烏賊魚骨 去甲四兩 蘆茹 一兩即茜根

右為末以雀卵搗丸小豆大每服五丸或十九丸鮑魚煎湯下

以飯壓之○鮑魚即今之淡乾魚也

增損四物湯 百十 治脾虛不攝血去不止

人參 當歸 芍藥 炒 川芎

乾薑 炒各一兩 甘草 炙四錢

右每服四錢水煎服

奇效四物湯 百十一 治肝經虛熱血沸騰而崩久不止

當歸 酒拌 熟地 白芍 川芎

阿膠 炒 艾葉 炒 黃芩

右每服四錢水煎

良方 加減四物湯 百十二 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地

蓬木 三稜 肉桂 乾漆炒烟盡 等分

右咬咀每服五七錢水鍾半煎七分食遠服

四物二連湯百十三 治婦人血虛發熱或口舌生瘡或晝安

夜熱

當歸 川芎 芍藥 熟地

胡黃連 宣黃連各一錢

右作一劑水煎服

人參當歸湯百十四 治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節

作痛或虛煩咽噪

人參 當歸 生地 桂心

麥冬 白芍藥各等分

右用粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去米入藥五錢棗

二枚煎服或總煎之亦可虛甚者用熟地黃

良方 一味防風散百十五 治肝經有風以致血得風而流不歸

經者

用防風去蘆為末每服一錢白湯調服○一名獨聖散每服

一二錢空心食前用酒煮白麵清飲調下極效

龍骨散百十六 治血崩不止

龍骨 煨

當歸

香附 炒各一兩

棕毛灰 五錢

右為細末每服四錢空心米湯調下忌油膩鷄魚炙博物

如聖散 百十七

治血崩三服全愈

棕櫚子

烏梅肉

乾薑

俱燒存性為末各等分

右每服二錢空心烏梅湯調服○一方單用棕皮半燒半生

為末每空心服二錢亦妙

槐榆散 百十八

治血崩及腸風下血

槐花

地榆

等分炒焦

右二味用酒煎飲之

七灰散 百十九

治血崩神效

蓮蓬殼

罌粟殼

醃蟹殼

益母草

旱蓮草

棕毛葉

藕節

各分俱燒存性為末

空心醋點湯調下三錢○一秘方用綿花子以銅鍋炒黑為

末黃酒調下二三錢三兩次即止并治崩漏小產血不止

棕灰散 百二十

方在和陣二一五

治大腸下血及崩漏失血

栢葉散 百二十一

治元氣虛弱崩中漏血年久不愈亦治白帶

栢葉 炒

當歸

生地

續斷

川芎

龜甲 炙

禹餘糧 各一兩半 阿膠 炒五錢

鱉甲 炙兩半

赤石脂 煨

牡蠣 煨

地榆

艾葉 炒

鹿茸 炙各五錢

右為末每服二錢粥飲調下

子苓散 一二二

一名黃苓散 ○治壯熱崩中下血是陽乘陰

分故經血泛溢宜清其北方

條黃苓

不拘多少為細末

右燒秤鑄焯酒食前調下三四錢 ○一方有乾薑白芷 ○一

方以木耳黃苓等分為丸俱效

良方 防風黃苓丸 一二三

治肝經風熱以致血崩便血尿血等

證

條芩 炒黑

防風 等分

右為末酒糊丸桐子大每服三五十九食遠或食前米飲或

溫酒送下

劫勞湯 一二四

治勞嗽發熱盜汗體瘦唾中有血或成肺痿

○此救本也非劫勞也能用此者庶可望生此外恐非佳劑

矣

白芍藥 炒一錢

人參

黃芪 炒

當歸

熟地

甘草炒

白茯苓

五味子

杵炒

阿膠炒

半夏

制各五分 此上乃其原方 似有不足用者仍宜加倍

右薑棗水煎日三服○鄉人楊元鼎女及笄病此甚危百藥無效偶遇名醫得此方服三十餘劑遂愈不發

集驗歸神湯一二五

治婦人夢交盜汗心神恍惚四肢乏力飲食少進

人參

白朮

白茯苓

歸身

各一錢

棗仁

陳皮

各八分圓眼肉七枚

甘草

羚羊角

琥珀

末各五分

右羚羊琥珀二味不煎餘藥煎熟去粗入二末和勻食前服

白芷散一二六

治下元虛弱赤白帶下或經行不止等證

白芷一兩

海螵蛸二枚燒

胎髮

一團煨

右為末每服二錢溫酒調下

海藏白芍藥散一二七

治婦人赤白帶下臍腹疼痛如神

白芍二兩炒

乾薑半兩炒

右為細末每服三錢空心溫米湯調下晚又進一服十日見

效

克應丸一一八

治婦人赤白帶下

熟地

赤芍

各二兩 當歸 二兩

赤石脂

煨醋 焯

龍骨

牡蠣

煨酒焯

茯苓

丹皮

艾葉

製

川芎

各一兩

右為末醋糊丸桐子大每服五十九丸空心白湯送下

良方

滑石散

一二九

治熱淋

滑石

五分研

通草

車前子

葵子

各四分

右為末以漿水調服

芍藥散

百三十

治婦人血滯腰痛

白芍藥

玄胡

炒

肉桂

各一兩

香附米

二兩醋一升鹽半兩

同煮乾

右為細末每服二錢不拘時白湯調下

良方

通氣散

一三一

治腎虛腰痛神效

破故紙

酒炒為末

右每服二錢先嚼胡桃肉半箇空心以溫酒送下

四製香附丸

一三二

調經養血順氣受孕

香附米

一斤分四制酒醋童便米泔各浸一宿晒乾用

當歸

酒洗

熟地

酒洗

白芍藥

四兩

川芎

各四兩

澤蘭葉

白朮

陳皮

各三兩

黃蘗

酒炒

甘草

酒炒各一兩

右為末酒糊丸桐子大每服七十九空心白湯送下

大女金丹 一三三

此韓飛霞方也一名不換金丹○內加熱

地黃一兩即名勝金丹○治婦人久虛無子及產前產後一切病患此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時減痛婦人子宮寒冷無孕如服月餘男女自至又治半身不遂帶濁血崩及產後腹痛吐逆子死腹中氣滿煩悶臍腹作痛月水不通中風口噤痢疾消渴敗血上衝頭疼寒熱血暈血泄見鬼迷悶產後傷寒虛煩勞瘦凡婦人諸疾不問久近並宜服之兼治男子下虛無力等證

人參 白朮炒

茯苓 炙甘草

當歸 川芎

白芍 白薇酒洗

丹皮 白芷

藁本 肉桂

玄胡 沒藥另研

赤石脂另砂上各一兩

香附醋浸三日炒香十五兩

右共十六味為末煉蜜丸彈子大以磁瓶收貯封固每服一丸空心溫酒化下食乾物壓之服至四十九丸為一劑以癸水調平受妊為度妊中三五日服一丸產後二三日服一丸醋湯下亦妙

琥珀丸 一三四 治婦人或老或少或產前產後百病及療三

十六種諸病七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風

十二痺手足瘦疼乳中結核結毒懷胎驚動傷犯不安死胎

不下並治

琥珀 各另研 沉香 阿膠 炒珠

附子 制 川芎 肉桂 五味子

石斛 各五錢 牛膝 酒浸 當歸 肉苁蓉 酒洗晒

人參 熟地 續斷 木香

沒藥 各一兩

一方有牛黃 珍珠 乳香 玄胡 各一兩共二十一

右煉蜜為丸彈子大每服一丸空心食前午後溫酒化開服

○凡服法或薑湯或米湯或酒或燈草湯或隨證用引皆可

下○若傷寒中風角弓反張用麻黃湯隨證改湯引送下○

孕婦臨月宜一日一服至產順利不覺疼痛○凡婦人服至

五服十服之後日倍飲食其功言不盡述服者當自覺也

延年益嗣丹 一三五 滋補元氣益精黑髮○按此方即還元

丹也但製法分兩不同宜參酌用之方在補陣一三九

人參 天門冬 酒浸 去心 麥門冬 同上各 熟地黃 酒蒸 搗

生地黄 各二兩 白茯苓 酒浸 晒乾 地骨皮 酒浸各五兩 何首烏 鮮者半斤

右將何首烏去皮切片如乾者用米泔水浸軟拈切外用砂鍋入黑羊肉一斤黑豆三合量着水上用甌算算上放首烏煮而蒸之以肉爛為度鍋蓋須密勿令洩氣取起晒乾為末煉蜜丸梧子大每服七八十九空心溫酒送下

續嗣降生丹 一三六 治婦人五臟虛損子宮冷憊不能成孕

○并治男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄婦人帶下寒熱諸虛自損盜汗短氣無不感應○此方乃溫隱居求嗣保生篇所載云東京焦員外三世無嫡嗣後遇一神僧問其故曰

無嗣者有三一祖宗無德自身無行二夫妻年命恐犯禁忌三精神不守妻妾血寒焦公曰治之有道乎僧曰先修德後修身三年之後到臺山令行童賜以方葯名續嗣降生丹依方服之後不及二十年子孫數人皆貴顯○此方無怪誕尅代之品且溫且固凡血海虛寒者服之必佳但溫力有餘補力不足倘益以人參白朮熟地川芎炙甘草各一兩則八珍全而溫補贊育之功當非淺也因命名曰加味續嗣降生丹

當歸 酒洗 杜仲 酒炒 茯苓 神 益智仁

龍骨 煨 桂心 吳茱萸 制 乾薑 半生半熟

川椒 去日 台烏藥 各一兩 白芍藥 酒炒 川牛膝 酒浸

半夏 制 防風 秦艽 石菖蒲 去毛

北細辛 桔梗 各五錢 附子 一枚重一兩者臍下作一錢入朱砂一錢麩暴煨熟

取出朱砂留為衣 牡蠣 大片者以童便浸四十九日每五日一換取出用硫黃一兩為末酒和塗徧用皮紙糊實米醋浸濕外以鹽泥厚固之候乾用炭五斤煨過為末每料止用二兩餘可收貯再用

石為末以酒煮糯米糊為丸梧子大以前朱砂為衣每服三五十九丸漸至七八十九丸空心滾白湯或鹽湯溫酒下

河車種玉丸

紫河車 一具 只要母氣壯盛厚大新鮮者但去胞內瘀

血不必挑去鮮紅血脉以米泔水洗淨用布絞乾石白

內生杵如糊用山藥末四五兩收乾捻為薄餅八九個

於砂鍋內焙乾以香如肉脯為妙

大熟地 酒洗烘乾八兩 枸杞 烘乾五兩 白茯苓 人乳拌晒三次 歸身 酒洗

人參 兔絲 制 阿膠 炒珠各四兩 丹皮 酒洗

白薇 酒洗各二兩 沉香 一兩 桂心 山茱萸

香附米 用酒醋水三件各半碗浸三日曬乾畧烘各三兩 大川芎 酒浸切片曬乾二兩

右煉蜜和丸桐子大每服百餘丸空心或酒或白湯鹽湯任

下○如帶濁多者加赤白石脂各二兩須以清米泔飛過用

○服藥後忌生蘿卜生藕葱蒜綠豆粉之類

八珍益母丸 一三八 治血氣兩虛脾胃並弱飲食少思四肢

無力月經不調或腰痠腹脹或斷或續赤白帶下身作寒熱

閉不獲效服一月之後即可受胎虛甚者用藥一觔必能受

子

人參 白朮 土炒 茯苓 川芎 各一兩

當歸 酒洗 熟地 酒洗各二兩 炙甘草 五錢 芍藥 醋炒一兩

益母草 四兩五六月採取止用上半截帶葉者不見鐵器晒杵為末

右為末煉蜜丸彈子大空心蜜湯或酒下一丸或為小丸亦

可○脾胃虛寒多滯者加砂仁一兩薑汁炒○腹中脹悶者

加山查肉一兩飯上蒸熟○多鬱者加香附一兩酒製○此

徐思鶴醫統方又一方名八珍益母十全丸於前方內用益

母草八兩外加沉香四錢○思鶴曰資益坤元補養氣血除

淋帶壯形體胎前和氣產後補虛真婦人之聖劑超古今之

神方有室家者不可不知也予哂斯世之醫惟集古方香附

勝金丹為女人開鬱調經之要藥殊不審古今虛實之異古

人氣實故可用香附開導香附味辛性燥但能開破而已多

用之大耗氣血虛者愈虛病者愈甚而於滋補何有哉今世

十婦九虛非補不可再用香附以耗之寢成怯弱之證是辨
之不早則危殆而難痊矣○婦人經脈不調或氣血兩虛而
身體素弱者宜服此以調養之○經不通者服一料即通不
調者一月即調○素不孕者服一月即孕○胎前間用一服
則胎固而安○產後用一服以童便酒化開調下則無壅滯
血運之候○多服之補虛活血凡治產後諸病極穩○若急
欲取效以酒調化服

烏鷄丸 一三九

治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下
骨蒸不能成胎等疾

烏骨白毛公雞一隻重二斤半許者閉殺之去毛襍外用

艾葉四兩青蒿四兩切碎納一半在鷄肚內以小酒壘

一個人鷄并所剩蒿艾用童便和水灌令沒雞二寸許

煮絕乾取出去骨餘俱同搗如薄餅焙乾為細末聽用

南香附 去毛淨 一斤 分四分用米泔童便酒醋各浸一分春秋

一二日夏一日冬四日取出晒乾畧炒

人參

熟地

當歸

酒浸洗

生地

川芎

白芍

各三兩

黃芪

白朮

川牛膝

柴胡

知母

丹皮

各二兩

鱉甲 醋浸炙 白茯苓 一二兩 秦艽 一兩半 黃連 炒

地骨皮 貝母 玄胡索 乾薑 炮焦各一兩

右俱為末用酒醋各半煮糊為丸桐子大每服五六十九漸加至百丸溫酒米飲任下忌煎炒辛辣等物及莧菜

又烏雞丸 百四十

熟地 當歸 白朮 山藥

山茱萸 棗肉 柿餅 蓮肉 各四兩

黃芪 密炙三兩 鹿角膠 狗脊 杜仲

枸杞 蓮鬚 香附 阿膠

川芎 各二兩 烏葍 一兩半

右葍製淨用烏骨雞一隻悶殺之乾去毛去雜連骨椎碎用酒醋各半同葍煮熟去骨烘乾共為末即將餘汁少入麩打糊為丸任意用引送下

唐氏烏雞丸 一四一

人參 懷生 懷熟 青蒿子 去梗

香附 四制 鱉甲 各三兩 白朮 棗仁肉

枸杞 麥冬 雲苓 地骨皮 去骨

丹皮 去骨 白芍 各二兩 歸身 一兩半 川芎

婦人 四

甘草 各一兩

右先將諸藥備完聽用乃取絲毛烏骨白公雞一隻約重一斤許者撲倒去毛穢頭足腸雜不用將雞切作四塊先以蟹甲鋪銅鍋底次入雜葯以免焦腐漸漸加童便約至斗許煮至極爛撈起晒乾為末將蟹甲去裙并雞骨俱以原汁醃炙至乾為末同前藥煉蜜為丸桐子大每空心用清湯送下百餘丸

秘方 烏雞煎丸 一四二

治婦人百病血氣虛勞赤白帶下

人參

官桂

地骨皮

各二兩 茯苓 三兩

黃芪

蜜炙

當歸

各六兩

生地

熟地

香附

各四兩

右將烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃芪末和炒麩丸如茨實喂雞二七日將雞縛死乾搏去毛并腸雜令淨槌碎其骨入前葯於腹內縫密用酒醋各一瓶煮一宿取去骨焙乾為末用前汁打麩糊丸桐子大每服五六十丸空心鹽湯下

萬病丸 一四三

治月經瘀閉臍腹作痛及產後癥瘕等病

乾漆

炒烟出青白為度

牛膝

酒洗焙各一兩

右爲末生地黄汁一升用砂鍋慢火熬膏丸桐子大每服二
十九空心米飲下

以下通用方

四君子湯 一四四 方在補陣一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯 一四五 方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐吞酸等證

五味異功散 一四六 方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思等證

補中益氣湯 一四七 方在補陣三一

治勞倦傷脾外感不解寒熱瘧痢氣虛不能補血等證

四物湯 一四八 方在補陣八

治一切血虛勞弱之病

八珍湯 一四九 方在補陣十九

治氣血兩虛調和陰陽

十全大補湯 百五十 方在補陣二十

治氣血俱虛補救元陽

歸脾湯 一五一 方在補陣三三

治心脾虛損

人參理中湯 一五二

溫中補脾胃虛寒諸證

逍遙散 一五三 方在補陣九三

治肝脾血虛鬱怒傷肝等證

加味逍遙散 一五四 方在補陣九四

治肝脾血虛發熱等證

七味白朮散 一五五 方在小兒七

治虛熱作渴

六味地黃丸 一五六 方在補陣一二一

壯水制火之劑

八味地黃丸 一五七 方在補陣一二二

治命門火衰之劑

四神丸 一五八 方在熱陣一五二

治脾腎虛寒泄痢

五積散 一五九 方在散陣三九

治感冒寒邪

參蘇飲 百六十 方在散陣三四

治四時傷寒感冒

人參敗毒散 一六一

方在散陣二六

治四時傷寒瘟疫

當歸六黃湯 一六二

方在寒陣六五

治血熱陰虛盜汗

柴胡清肝散 一六三

方在寒陣五九

治肝膽風熱瘡瘍怒火寒熱

梔子清肝散 一六四

方在寒陣六十

治肝膽三焦風熱

八平散 一六五

方在寒陣百十五

治藏府秘結小便赤澀

五苓散 一六六

方在和陣一八二

治小便不利

犀角地黄湯 一六七

方在寒陣七九

治心火動血及斑黃瘡疹

導赤散 一六八

方在寒陣一二二

治心火及小腸熱秘淋澀

桃仁承氣湯 一六九

方在攻陣五

治瘀血小腹作痛其人如狂

玉燭散 百七十 方在攻陣二四

治血虛有滯經閉不通

腎著湯 一七一 方在熱陣百二十

治腎虛身重腰冷

舒筋湯 一七二 方在和陣七七

治產後血滯作痛

交加散 一七三 方在和陣二五二

治產後口吐涎沫不省人事

加味小柴胡湯 一七四 方在散陣二十

治乳母肝火發熱

良 蜜酥煎 一七五 方在補陣六六

補虛潤肺止欬嗽

柴胡石膏湯 方在散陣二三

治少陽陽明外感挾火發熱頭痛

都梁丸 一七七 方在散陣七七

治胎前產後傷風頭痛

瓜子仁湯 一七八 方在外科一六四

治產後瘀血腸癰腹中疼痛

子和通經散 一七九 方在攻陣四六

治氣逆經閉

二神散 百八十 方在寒陣八七

治吐血血崩下血

小薊飲子 方在寒陣百二

治下焦結熱洩血崩淋

愈風湯 方在和陣二二七

治一切失血及產後搐搦

鎖精丸 一八三 方在固陣二六

治白濁白帶

青娥丸 一八四 方在補陣一四五 會稽 張介賓 會卿著 魯超 謙菴訂

治腎虛腰痛

獨參湯 一八五 方在補陣二六

治諸氣虛脫

奪命散 一八六 方在補陣二七

治陽邪傷氣暴脫煩躁發渴

治小兒久病暴瀉

李合煎 一八六 式五蘇刺三小

白朮

白朮 一八五 式五蘇刺三小

白朮

青嫩丸 一八四 式五蘇刺一四五

白朮

白朮 一八三 式五蘇刺一六

景岳全書卷之六十二小兒則古方 長集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

小兒

秘旨 補脾湯 治小兒久病面黃肌瘦咬牙自割頭髮稀少誤

葯所致

人參

白朮

各一錢

白芍藥

酒炒

白茯苓

各八分

川芎

陳皮

各六分

炙甘草

黃芪

蜜炙

當歸 各四分

右每服二三錢薑水煎

調中湯二 治傷乳食瀉後脾胃虛噦吐瀉

人參 茯苓 乾薑炒 藿香

白朮 甘草炙 木香 丁香

香附炒去毛 砂仁等分

右水煎食前服

調中丸三 治脾胃虛寒吐瀉

人參 白朮炒 甘草炒各五錢 乾薑炮四錢

右爲末蜜丸菴豆大每服二三十九白湯下○薛按云前二

方乃本經自病之葯卽人參理中丸也若腎水侮土而虛寒

者當加半夏茯苓陳皮或嘔吐更加藿香泄瀉加木香

人參理中丸四 治中氣虛熱

人參 白朮炒 炙甘草等分

右爲末薑汁糊丸菴豆大每服二三十九白湯下

方局 觀音散五 治內傷嘔逆吐瀉不進飲食漸至羸瘦

人參一兩 神麴炒 茯苓 炙甘草

綿黃芪 白朮炒 白扁豆炒 木香各一錢

石蓮肉 去心 錢半

右為末每服一二錢人藿香三葉薑棗水煎服

助胃膏 六 治脾胃虛寒吐瀉飲食不化等證

人參 白朮 炒 茯苓 甘草 炙

丁香 各五錢 山藥 一兩炒 砂仁 四十個 木香 三錢

白豆蔻 十四個 肉豆蔻 麩煨 四個 一方無木香各香砂助胃膏

右為末蜜丸芡實大每服十九丸米飲化下

錢 七味白朮散 七 一名人參白朮散○治虛熱而渴

人參 白朮 白茯苓 炙甘草

藿香 木香 各一錢 乾葛 二錢

右為末每服三錢水煎溫服如飲水多多服之為妙○按此

方治小兒虛熱而渴如無氣滯吐瀉等證則當減去木香藿

香以避燥而耗氣

白朮散 八 方在和陣三十

治自汗盜汗極效

太和餅 九

人參 白朮 白茯苓 各五錢 山藥 炒四錢

木香 炙甘草 各一錢 肉果 麩煨 四個 白豆蔻 十四個

砂仁 十四個
山查肉 一兩
史君子肉 六十個

煉蜜搗和為小餅量兒大小與服○或再對證加減藥味用之

團參散 十 治心虛血熱自汗盜汗

人參 當歸 等分

右為末用雄猪心一個切三片每服二錢以猪心一片煎湯調服或用水煎服亦可

止汗散 十一 一名敗蒲散○治睡而自汗

故蒲扇 燒存性

右為末每服三錢溫酒調下

調元散 十二 治小兒變蒸脾弱不乳吐乳多啼

人參 白木 陳皮 厚朴 制

香附 各一錢 炙甘草 藿香 各五分

右每服一二錢薑棗煎服

平和飲子 十三 治小兒變蒸於三月後每三日進一服可免

百病百日內宜服

人參 一錢半 白茯苓 一錢 炙甘草 五分 升麻 二分

右咀水半盞煎三分不時服○弱者加白木一錢

調氣散 十四

治變蒸吐瀉不乳多啼欲發慢驚

人參

陳皮

木香

藿香

香附

炙甘草

各一錢

右為末每服一錢薑棗水煎服

錢氏當歸散 十五

治夜啼不乳

人參

當歸

白芍藥

各二錢半

炙甘草

錢二分

桔梗

陳皮

各一錢

右每服一二錢水煎灌之

撮要當歸散 十六

治變蒸有寒無熱

當歸 二錢

人參

炙甘草

木香

官桂

各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參黃連散 十七

治心經蘊熱夜啼

人參 二錢半

黃連

錢半炒

炙甘草

五分

竹葉

二十片

右薑水煎服

無擇燈花散 十八

治心躁夜啼

燈花

二三顆

右研細用燈草煎湯調塗口中乳汁送下日三服一法用燈

花塗乳上令兒吮之○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許亦妙○一法用燈花七枚礪砂一字辰砂少許蜜調塗唇上立安

寶鑑天麻散 十九

治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾

土虛弱肝木乘侮吐瀉不食嗜卧困倦

半夏 七錢

天麻 二錢半

甘草炙

白茯苓

白朮

各三錢

右為末每服一二錢薑棗湯調服

湯氏異功散 二十

止渴消暑生津補脾胃

猪苓

澤瀉

各三錢

人參

白朮

茯苓

各五錢

陳皮

二錢半

朱砂

一錢

右為末蜜丸芡實大每服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散 二一

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

炙甘草

麥冬

各二錢

龍胆草

酒炒黑

防風

各一錢

柴胡

五分

右每服二三錢水煎

柴苓散 二二

治壯熱來去

柴胡

赤茯苓

人參

麥冬

甘草 各半兩
黃芩 一兩

右每服二三錢入小麥二十粒青竹葉三片水煎服

惺惺散 二三
治小兒傷寒時氣風熱頭痛目侈多睡痰壅欬

嗽喘急或痘疹已出未出疑似之間

人參 白朮 炒
茯苓 甘草

北細辛 川芎 桔梗 炒各等分

右為末每服二錢入薄荷五葉水煎服○一方有防風天花粉

星蘊散 二四
治諸風口噤不語

南星 畧炮切

右每服五七分紫蘊五葉薑四片水煎入雄豬膽少許溫服

錢氏黃龍散 二五
治發熱不退或往來寒熱

柴胡 五錢 赤芍藥 三錢 黃芩 炒 甘草 炙各二錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參薑活散 二六
治傷風驚熱

人參 羌活 川芎 白茯苓

柴胡 前胡 獨活 桔梗

枳殼 地骨皮 天麻 各等分 炙甘草 減半

右用生薑薄荷水煎○治驚熱加蟬蛻

牛黃散 二七 治溫熱壯熱或寒熱往來

牛黃 研 甘草 各半兩 柴胡 梔子 酒炒

龍胆草 酒炒 黃芩 炒各二錢半

右為末每服五七分以金銀薄荷湯調下

錢 生犀散 二八 治心經風熱

犀角鎊 三錢 柴胡 葛根 赤芍藥

地骨皮 各一兩 甘草 五錢

右為末每服一二錢水煎

二 黃犀角散 二九 治溫熱心神不安火腑秘結

犀角屑 大黃 酒浸蒸 鈎藤鈎 梔子仁

甘草 黃芩 等分

右為末每服五七分熱湯調下量兒加減

柴胡飲子 三十 解肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脉洪實弦數

大便堅實者

柴胡 人參 各五分 黃芩 芍藥 各七分

當歸 一錢 甘草 四分 大黃 八分

右每服一二錢水煎○按此方用藥頗善但大便如常者勿

得輕用大黃

地骨皮散 三一 治虛熱壯熱

地骨皮 知母 人參 柴胡

茯苓 半夏 甘草 等分

右薑水煎有驚熱加蟬退天麻黃芩

天麻定喘飲 三三 治喘嗽驚風

天麻 防風 羌活 白朮

甘草 炒 人參 桔梗 川芎

半夏 麩 等分

右每服二三錢水煎服

補肺散 三三 一名阿膠散 ○治肺虛惡心喘急久患欬嗽有

痰

阿膠 兩 鼠粘子 炒 馬兜鈴 各半 杏仁 七粒

糯米 一兩 甘草 二錢

右每服二三錢水煎服

錢氏阿膠散 三四 治小兒肺病欬嗽喘急或欬而哽氣喉中有

聲

阿膠 蛤粉炒 鼠粘子 炒 炙甘草 一錢 馬兜鈴 半兩

全書卷六十二 小兒

杏仁 七個去皮尖 糯米 一兩

右每二三錢水煎

丹溪保和丸 三五

治飲食酒積停滯胸膈痞滿腹脹

神曲 炒

陳皮

半夏

茯苓 各一兩

山楂肉 蒸晒

三兩 連翹

蘿蔔子

炒各五錢

右為末粥丸綠豆大○一方尚有炒麥芽一兩黃連五錢

大安丸 三六

治證同前

即前保和丸加白朮二兩

楊氏消食丸 三七

治乳食過多胃氣不能消化

砂仁

陳皮

神麩 炒

麥芽 炒

三稜

蓬朮

各半兩

香附

炒一兩

右為末麩糊丸麻子大白湯送下量兒加減

消乳丸 三八

治嘔吐消乳食脈沉者傷食不化也

香附 炒

砂仁

陳皮

神麩 炒

炙甘草

麥芽

炒等分

右為末米糊丸黍米大每服二十九薑湯下

白餅子 三九

治傷食腹中有癖嘔吐肚疼先用此藥一服推

下食積然後調治不可服冷藥

滑石 輕粉 半夏湯浸焙 南星 各一錢

巴豆二十四粒去皮膜用水一升煮乾研爛

右為末糯米飯丸綠豆大捻作餅每服二三餅煎葱白湯或紫蘆湯下忌熱物量兒加減

薛曰凡用此方及利驚丸紫霜丸三味牛黃丸漏銀丸之類乃斬關奪門起死回生之重劑也必審形病俱實方可施之恐至失手命在反掌經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病乃實實者病氣實而形氣則虛也東垣先生云形病俱實者當瀉不當補形病俱虛者當補不當瀉治者審焉

宣風散四十 治濕痰去積滯通秘結攻黑陷裏實以代百祥

丸牛李膏

檳榔二个 陳皮 甘草各五錢 牽牛四兩半生半炒取頭末一

兩

右為末每一錢量大小增減與服白湯調下○一方有大黃木香連前三味煎成後加牽牛末調服

人參養胃湯四一 治外感風寒內傷生冷寒熱如瘧或嘔逆

惡心

人參 厚朴薑制 蒼朮炒 半夏制

金匱要略卷之六 小兒 七

草果仁

藿香

茯苓

各五錢

橘紅

一錢半

炙甘草 一錢

右每服二三錢薑三片烏梅一個水煎

人參安胃散 四二

治脾胃虛弱傷熱乳食嘔吐瀉痢

人參 一錢

黃芪 二錢

生甘草

炙甘草

各五分

白芍藥

酒炒七分

白茯苓

四分

陳皮

三分

黃連

炒一分

右每服二三錢水煎

生附四君湯 四三

治吐瀉不思乳食凡虛冷病宜先與數服

以正胃氣

人參

白朮

茯苓

炙甘草

附子

木香

橘紅

等分

右為末每服一二錢薑棗水煎服

釀乳法 四四

治胃虛吐瀉睡中吐舌搖頭嘔乳額上汗流驚

啼面黃令兒飢飲

人參

藿香

木香

沉香

陳皮

神麴

炒

麥芽

炒各等分

丁香

右每服四五錢薑十片紫蘓十葉棗三枚水煎每服半盞○
令母食後捏去舊乳方服卧少時却與兒飲按小兒不能飲

藥者凡用補瀉諸劑皆宜此法

銀白散 四五 治胃虛吐瀉

糯米 炒二兩半 匾豆 蒸二兩 白朮 炒一兩 炙甘草 三錢

丁香 藿香 各二錢

右為末紫蘆米飲調下○直指方加炮白附子全蝎木香石

蓮子薑水煎

朱君散 四六 治吐瀉後而為驚為瀉及糞青者

人參 白朮 茯苓 炙甘草

鈞藤鈎 朱砂 各一錢 射香 半分 燈心 圓

右為末每服一錢白湯調下

二順散 四七 治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便血肚

疼

白朮 炙甘草 茯苓 猪苓

澤瀉 乾薑 炒 肉桂 杏仁 去皮尖炒

右為末每服五七分不拘時水調下或用水煎服

香朴散 四八 治積冷嘔吐

藿香葉 厚朴 薑汁炒 陳皮 各七錢 半夏 湯泡七次一兩

炙甘草 一錢

右每服三錢薑棗水煎○瀉甚者加木香肉苳蔻

沉香散 四九 順胃氣止嘔吐

茯苓 二錢 沉香 丁香 木香

藿香 厚朴 炙甘草 各一錢

右為末每服一字米飲湯調服

玉露散 五十 治傷熱吐瀉

石膏 煨 寒水石 各五錢 甘草 二錢半

右為末每服五分白湯調下

六神散 五一 治面青啼哭口出氣冷或泄瀉不乳腹痛曲腰

四肢厥冷

人參 白朮 炒 山藥 炒各五錢 炙甘草 二錢

白茯苓 白扁豆 炒各一兩

右為末每服二三錢薑棗水煎

香橘餅 五二 治傷冷積瀉

木香 青皮 各一錢 陳皮 二錢半 厚朴

神麴 炒 麥芽 炒各半兩

右為末蜜和為餅每服一枚米飲調下

錢 黃芩湯 五三 治挾熱下痢頭痛胸滿大渴或寒熱脇痛脉

洪大而實者

黃芩 一兩半 芍藥

甘草 炒各一兩

右每服二三錢薑水煎○如嘔加半夏二錢

瀉腸散 五四

治小兒久痢腸頭脫出

訶子 炮

赤石脂

龍骨 各等分

右為末臘茶少許和葯摻腸頭上絹帛揉入

破故紙散 五五

治膀胱虛冷夜間遺尿或小水不禁

破故紙 炒

右為末每服一錢熱湯調下

陳氏肉豆蔻丸 五六

治瀉痢水穀或淡黃或白不能止者

肉豆蔻

訶子肉

白龍骨 各半兩

木香

砂仁 各二錢

赤石脂

枯白礬 各七錢半

右為細末麩糊為丸黍米大周歲兒每服三五丸三歲兒

服百丸溫米飲下瀉甚者煎木香散或異功散送下不止多

服○薛按前方治陽氣虛寒腸滑之瀉劑蓋腎主大便若因

腎氣不固而致前證者宜用木香散送四神丸如不應急煎

六君子湯送四神丸補之蓋豆蔻丸滯滯之功多補益之功

少也

寧神湯 五七

治心虛火盛熱躁驚搐等證

人參

當歸身

生地

麥冬

各一錢

山梔仁

黃連 炒

炙甘草

各二錢

石菖蒲

二分

辰砂

入二分

右加燈心半錢水一盞煎七分調辰砂攪勻食後溫服

當歸養心湯 五八

治心虛驚悸

歸身

麥冬

生地

酒洗

人參

炙甘草

升麻

少用

水一鍾半加燈草一圓煎七分食遠服

錢 氏養心湯 五九

治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無寐發

熱煩躁

人參

黃芪

遠志

當歸

川芎

棗仁

五味子

栝子仁

肉桂

白茯苓

茯神

半夏麴

各三錢

炙甘草

四錢

右每服二三錢薑棗水煎

茯神湯 六十

治膽氣虛寒頭痛目眩心神恐懼或是驚癇

人參

黃芪

炒

棗仁

炒

熟地

小兒

白芍炒 栝子仁炒 五味子炒 茯神各一兩

桂心 甘草炒各五錢

右每服二三錢水煎

清神湯六一 治驚癇心虛血熱

犀角鎔屑 遠志薑汁焙 白蘚皮 石菖蒲

人參 甘草等分

右為末每服五七分麥門冬煎湯調服

錢氏酸棗仁湯六二 治心肺虛熱煩躁驚啼痘疹血熱血燥等

證

棗仁 炙甘草 人參 生地

麥冬 當歸身 梔子仁等分

右加燈心水一盞煎六分溫服

黑附子湯六二 治慢脾風四肢厥冷

附子炒去皮三錢 木香 人參各一錢半 白附子一錢

炙甘草五分

右為散每服三錢薑五片水煎○若手足即溫即止後服

鈎藤散六四 治吐利脾胃氣虛慢驚生風

鈎藤鈎 人參 天麻 蝎尾去毒

防風

蟬殼

各半兩

麻黃

殭蚕

炒

炙甘草

川芎

各二錢半

射香

五分

右咬咀每服二三錢水煎服○虛寒加附子一錢

薛按慢驚之證屬脾胃虧損所致前方乃辛溫散表之藥而

無調補之功須審用之

鈎藤飲子

六五

治小兒一切驚風潮搐日視昏迷

鈎藤鈎

防風

獨活

天竺黃

羌活

各三錢

麻黃

升麻

甘草

草龍膽

各二錢

川芎

三錢

蟬退

五个去頭足

右每服二三錢薑棗水煎服○薛立齋曰按右方若外感風

寒形證俱實者宜用之若形氣虛而病氣實者宜用惺惺散

加鈎藤麻黃若外邪少而形病俱虛者宜異功散

錢氏鈎藤飲

六六

治小兒臟寒夜啼陰極發躁

鈎藤鈎

茯神

茯苓

當歸

川芎

木香

各一錢

甘草

五分

右每服二錢薑棗水煎服○撮要方有芍藥一錢○若心經

有熱臉紅便赤去木香加朱砂末一錢木通湯下

薛氏抑肝散

六七

治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱

或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡不安

軟柴胡

甘草

各五分

川芎

八分

當歸

白木炒

茯苓

鈎藤鈎

各一錢

右水煎子母同服○以蜜丸名抑青丸

大青膏六八

治傷風痰熱發搐

天麻

青黛

各一錢

白附子

煨

烏蛇

酒浸取肉焙

蝎尾

各五分

天竺黃

麝香

各一字

右爲末生蜜丸豆大每用半粒薄荷湯化下

地黃清肺飲六九

治肺熱疳蝕穿孔或生瘰肉或鼻外生瘡

桑白皮半兩炒

紫蘓

前胡

赤茯苓

防風

黃芩

當歸

天門冬

連翹

桔梗

生地

甘草

炙各一錢

每服五七錢水煎服次用化蜜丸

甘草湯七十

治撮口

甘草

生用一錢

右水煎以綿毬蘸吮令出痰涎却以猪乳點入口中即瘥

秘旨安神丸七一

治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參

棗仁

茯神

半夏

各一錢

當歸

芍藥炒

橘紅各七分

五味子五粒杵

炙甘草三分

右為末薑汁糊丸芡實大每服一九生薑湯下

七味安神丸七二

治心經蘊熱驚悸

黃連

當歸身

麥門冬

白茯苓

甘草

各半兩

硃砂

飛一兩

冰片

二分半

右為末湯浸蒸餅和豬心血搗丸黍米大每服十九燈心

湯下

丁味安神丸七三

治驚

人參

茯神

麥門冬

山藥

各二錢

片腦一分

龍齒二錢

朱砂

甘草

寒水石

各五分

金箔二片

右為末蜜丸雞豆大燈心湯調下 一方有馬牙硝

硃砂安神丸七四

方在寒陣一四二

清心火養血安神

錢氏安神丸七五

方在寒陣一四三

除火邪熱湯清心化痰

安神鎮驚丸七六

驚退後調理安心神養氣血和平預防之

劑也

天竺黃 另研

人參

南星 薑制

茯神 各五錢

當歸

棗仁 炒

麥冬

生地

芍藥 炒各三錢

黃連 薑汁炒

薄荷

木通

山梔 炒

硃砂 另研

牛黃 另研

龍骨 煨各二錢

青黛 一錢另研

右為末蜜丸綠豆大每服三五丸量兒大小加減淡薑湯送

下

萬氏龍腦安神丸 七七

治驚痰及痘中昏悶譫妄良方

大辰砂 一錢飛

牛黃 一分

龍腦 半分

右研細末取豬心血小豬尾尖血和丸如綠豆大每服一丸或二三丸新汲水化下或燈心湯紫草湯俱可下

鎮心丸 七八

治急驚化痰鎮心

朱砂

龍齒

牛黃 各一錢

鐵粉

人參

茯苓

防風

琥珀 各二錢

全蝎 七枚焙

右為末蜜丸桐子大每服一二丸薄荷湯送下

金箔鎮心丸 七九

治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰

赤夜卧不安譫語狂妄

金箔

十二貼
為衣

朱砂

一兩飛

人參

白茯苓

甘草

各半兩

山藥

一兩半

牙硝

一錢半

射香

五分

片腦

一分

右為末煉蜜丸每一錢作十丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下或含化亦可

辰砂膏

八十

治眼閉口噤啼聲不出吮乳不得口吐白沫

辰砂

三錢

硼砂

馬牙硝

各一錢半

玄明粉

全蝎

真珠

各一錢

射香

一分

右為末每服一豆許諸驚薄荷湯下潮熱甘草湯下月內者用乳汁調塗乳頭令吮之

琥珀散

八一

治急慢驚風涎潮昏冒驚搐目瞪內釣腹痛或

驚癇時發

琥珀

牛黃

膽星

此當倍用

白附子

天麻

僵蚕

炒去絲

代赭石

全蝎

蟬退

乳香

各一錢

朱砂

一錢半

右為末每服一二分白湯調下

金龍膽湯

八二

治月內臍風撮口四肢驚掣發熱吐乳及客

忤鬼氣驚癇加人參當歸

龍膽草 炒黑

鈎藤鈎

柴胡

黃芩 炒

芍藥 炒

桔梗

茯苓

甘草

大黃 煨各二錢半 蠅螂 二枚去翅足

右為末每服一二錢水煎量兒加減

梅花飲 八二

治五藏積熱喉中有痰面色赤白鼻流青涕氣

逆喘急目赤欬嗽或因驚夜啼

硼砂

馬牙硝

芒硝

辰砂 各一錢

人參 二錢

甘草 五分

片腦 半分

射香 一分

右為末磁器收貯每服半匙麥冬湯調服或薄荷湯亦可

擦牙通關散 八四

治風搐關竅不通痰塞中脘留滯百節

南星 二錢

射香 一字

牙皂 二錢燒存性 僵蚕 一錢

赤脚蜈蚣 一條

右為末薑汁蘸藥少許擦牙或調服二三點涎自出

陳抱龍丸 八五

治風痰壅盛或發熱欬嗽或發驚搐等證

胆星 九製四兩

天竺黃 一兩 雄黃

朱砂 各五錢

射香 五分另研或減半亦可

右為細末用大甘草一斤煮極濃汁搗丸每兩作二十九陰

晾乾用薄荷湯或燈草湯下一二九○此方加牛黃四錢卽名牛黃抱龍丸加琥珀卽名琥珀抱龍丸

至聖保命丹 八六 治胎驚內釣肚腹緊硬啼叫不安乃急驚

風眼目上視手足抽搐不省人事

全蝎 十四个 去毒 防風 二錢 炮南星 二錢 白附子 二錢

蟬脫 僵蚕 去絲嘴 炒 天麻 朱砂 各一錢

射香 五分 金箔

右爲末米糊和每兩作四十九丸每服一丸白湯化下有熱者以南星易炮星○此方去天麻加琥珀捏成錠以薄荷湯磨

服卽名保生錠子亦名太乙保生丹治慢驚尚有陽證者

定命丹 八七 治天釣撮口通利痰熱

全蝎 七枚 天麻 南星 炮 白附子 各二錢半

朱砂 青黛 各一錢半 輕粉 射香 各五分

片腦 一字

右爲末米糊丸綠豆大每服一二丸荆芥薄荷湯下可先研

半丸吹入鼻中

九還金液丹 八八 此葯有斡旋造化之功專治男婦痰盛氣

急中風不語口眼歪斜左癱右瘓牙關緊急及小兒急驚風

手足抽搐不省人事痰多氣急等證功效不可盡述

胆星 九制者 飛一兩 朱砂 二兩 生半夏 五錢 僵蚕 五錢炒

牙皂 去皮絃炒 焦三錢 水 射 各五分

小麥麩炒熟煉蜜和勻搗丸芡實大金箔為衣黃蠟匾收藏

○如大人牙關緊急先以通關散開其竅隨用淡薑湯化下

一二丸○若治小兒用薄荷湯化下一丸

膽星天竺丸 八九 治小兒痰涎上壅喘嗽不休

膽星 一兩 天竺黃 二錢 半夏 薑制 白附子 湯泡去皮 臍各五錢

天麻 各一錢 防風 各一錢 辰砂 一錢飛

右為末甘草湯為丸芡實大每服一丸空心薄荷湯或淡薑

湯下

陳氏 溫白丸 九十 驅風豁痰定驚

人參 防風 白附子 生用 真僵蚕 炒

全蝎 焙各一錢 南星 湯泡七次焙 天麻 各二錢

右用末水糊丸桐子大每服三五丸薑湯下

粉紅丸 九一 治小兒心虛困卧驚動痰涎不利或發熱痰嗽

等證

天竺黃 五錢 天南星 朱砂 各一錢 冰

全書卷之三
二十九
胭脂 各一錢

右以牛膽汁和丸芡實大每服一丸砂糖湯下

錢氏 牛黃丸 九二

治風癩因汗出風邪乘虛而入痰涎迷悶手

足搖掣

牛膽南星

全蝎 焙

蟬脫

各二錢

防風

白附子 生用

天麻

僵蚕

炒各一錢半

射香

半字

右為末棗肉和丸加水銀半錢同研細丸綠豆大每服一二丸荆芥生薑湯下

雜著 牛黃丸 九三

治小兒驚風中風五癩天吊客忤潮熱痰涎

壅盛等證

白花蛇

酒浸

白附子

川烏

全蝎

天麻

薄荷

雄黃

各五錢

朱砂

二錢

牛黃

射香

各一錢

冰片

五分

右各另研為極細末和勻用麻黃煎酒搗丸芡實大每服一丸薄荷湯下

萬氏 牛黃清心丸 九四

治心熱神昏

黃連

生半兩

黃芩

山梔仁

各三錢

鬱金

一錢

辰砂

一錢半

牛黃

二分半

右為細末臘雪調麩糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯下

三味牛黃丸 九五 治驚熱消疳積

雄黃 飛 牽牛 各一錢 天竺黃 二錢

右為末麩糊丸粟米大每服五七丸薄荷水下

涼驚丸 九六 治驚疳熱搐睛赤潮熱痰涎牙關緊急

龍膽草 炒焦 防風 青黛 各三錢 鈎藤鈎 二錢

黃連 炒五錢 龍腦 一錢 牛黃 射香 各一分

右為末麩糊丸粟米大每服十丸煎金銀花湯下

利驚丸 九七 治急驚

天竺黃 二錢 輕粉 青黛 各一錢 黑牽牛 炒五錢

一方無天竺黃

右為末煉蜜丸豌豆大每歲一丸薄荷水化下

錢 抑青丸 九八 治肝熱急驚搐搦

羌活 川芎 當歸 防風

龍膽草 等分

右為末煉蜜丸芡實大每服一二丸竹葉湯入砂糖化下○

此方加大黃梔子仁即名瀉青丸

化痰丸 九九 治驚搐喉內痰嚮者暫用

膽星

半夏

制

礞石

制

枳實

各二兩

射香

二分

右為末薑汁糊丸綠豆大朱砂為衣薑湯研化量送

比金丸

治驚癇先用此藥

人參

遠志

薑制取肉炒

白茯苓

南星

川芎

石菖蒲

細蜜者

天麻

朱砂

青黛

琥珀

各一錢

射香

一字

右為末蜜丸桐子大每服一二丸金銀薄荷湯下

虎睛丸

百一

治驚癇邪氣入心

虎睛

細研

遠志

薑汁浸

犀角

鎊屑

石菖蒲

大黃

濕紙包煨

麥冬

等分

蟻螂

去足超炒三枚

右為末米糊丸梧子大每服一二丸竹葉煎湯或金銀薄荷

湯下

五癇丸

百二

一名五色丸○治五癇

朱砂

真珠

各五錢

雄黃

一兩

水銀

一錢半

黑鉛

三兩同水銀結成砂

右為末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

斷癇丹

百三

治五癇瘥後復發證候多端連綿不除者

黃芪 蜜炙

釣藤鈎

細辛

炙甘草 各半兩

蛇脫 一寸酒炙

蟬脫 四個

牛黃 一錢另研

右為末煮棗肉丸麻子大煎人參湯下每服數丸量兒加減

消風丸 百四

治風癩先宜此藥

膽星 一錢

羌活

獨活

防風

天麻

人參

荆芥

川芎

細辛 各一錢

右為末蜜丸桐子大每服二九薄荷紫蘓湯調化下

妙聖丹 百五

治食癩因驚而停食吐乳寒熱大便酸臭是也

礬石 煨醋淬

二錢半

巴霜 二分

硃砂

雄黃

蝎稍 各一錢

輕粉

射香 各一匙

杏仁

微炒二錢

右為末棗肉丸梧子大每服一二九木賊草煎湯送下

漏銀丸 百六

治癩癰膈熱風涎壅盛腹脹喘促實滯者

巴豆

水銀 各五錢

京墨 八錢火燒醋淬

黑鉛 二錢半

水良煎

射香 五分另研

右為末陳米粥丸綠豆大每服二三九煎薄荷湯下

薛

紫河車丸 百七

治癩癰

紫河車 肥大者一具

人參

當歸 二味酌用為末

全書卷之三

小兒

疔

右將河車生研爛入二藥搗丸桐子大每服五七十九日進
三服人乳化下○按此方凡先天不足後天虧敗者俱可隨
宜增用藥物照此制服無不可也然河車必用酒頓熟方善
雖薛氏之意用其生氣但生者腥膩恐不利於胃氣且此物
既離本體尚何生氣之有亦不過取其應求之性味為血氣
之資而已矧人之血氣本皆熟物之所養成故飲食之類凡
生用熟用其補瀉有甚相遠者豈熟之即無益而生之果無
礙耶余故曰熟之為宜

大蕪荑湯 百八

治小兒脾疳發熱作渴少食大便不調髮黃

脫落面黑鼻下生瘡能乳嗜土等證

蕪荑

山梔

各五分

當歸

白朮

茯苓

各四分

柴胡

麻黃

羌活

各三分

防風

黃連

黃柏

炙甘草

各二分

右作二劑水煎服

生熟地黃湯 百九

治疳眼閉合不開

生地黃

熟地黃

各半兩

川芎

赤茯苓

枳殼

杏仁

去皮

川黃連

半夏麴

天麻

地骨皮

炙甘草

各一錢半

右每服二三錢黑豆十五粒薑水煎服

蘭香散 百十 治鼻疳赤爛

蘭香葉 二錢 燒灰 銅青 輕粉 各五分

右為末乾貼

四味肥兒丸 百十一 治小兒食積五疳日生雲翳牙根腐爛

口舌生瘡發熱體瘦肚大筋青髮稀成穗或白禿瘡疥小便

澄白等証

蕪荑 炒 神麩 炒 麥芽 炒 黃連 各等分

右為末猪膽汁丸黍米大每服二三十九丸木通煎湯下

六味肥兒丸 百十二 消疳化虫退熱

黃連 陳皮 川棟子 去核 炒 神麩 炒

麥蘖 炒 各一兩 白蕪荑 半兩

右為末糊丸麻子大每服一二十九丸空心米飲吞下

薛氏曰前方又治脾疳飲食少思肌肉消瘦肚大頸細髮稀成穗項間結核發熱作渴大便酸臭嗜食泥土或口鼻頭瘡肚見青筋齧齒便白五疳用此丸加乾蟾一兩尤妙

七味肥兒丸 百十三 治小兒食積五疳頸項結核髮稀成穗

發熱作渴消瘦等證

黃連

炒

神麩

炒

木香

各一兩半

檳榔

二十個

史君子

酒浸

麥芽

炒各四兩

肉豆寇

炮二兩

麩糊丸麻子大每服三五十九米飲下良久用五味異功散

一服以助胃氣

蘆薈肥兒丸

百十四

治疳熱

蘆薈

龍膽草

酒洗

木香

人參

史君子肉

蚶蚶

酥炙去頭足卽土鱉

麥芽

炒各二錢

檳榔

黃連

去蘆鬚酒炒

白蕪荑

各三錢

胡黃連

五錢

右爲細末猪膽汁爲丸黍米大每服五六十九米飲下

大蘆薈丸

百十五

一名九味蘆薈丸○治小兒肝脾疳積發

熱體瘦熱渴大便不調或癭癰結核耳內生瘡牙頰蝕爛目生雲翳等證

胡黃連

黃連

蘆薈

白蕪荑

炒

白雷丸

破開赤者不用

木香

青皮

鶴虱草

微炒各一兩

射香

一錢另研

右爲末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯送下○立齋日內青皮以龍膽草代之射香不用尤效

加減蘆薈丸

百十六

治證同前尤治小兒疳積腹脹

全書卷之三

古方 小兒

三

蘆薈真者五錢 宜黃連去鬚 胡黃連 枳實

青皮各二錢半 青黛 木香 山查肉各二錢

麥芽炒二錢 射一分 乾蝦蟇一隻酥炙

右為細末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服七八分量兒大小與之○按此方加史君子肉三錢治濕熱生虫亦佳

當歸龍薈丸百十七 方在寒陣一六七

治肝經實火大便秘結

方良 蘆薈丸百十八 方在寒陣一六八

治疳癖發熱諸證

龍膽丸百十九 治腦疳腦熱瘡

龍膽草 升麻 苦楝根皮焙 赤茯苓

防風 蘆薈 油髮灰各二錢 青黛

黃連各二錢

右為末牡猪膽汁浸米糕丸麻子大薄荷湯下仍以蘆薈末

敷入鼻內

木香丸百二十 治疳痢

黃連淨二錢 木香 紫厚朴制 夜明砂紙炒各二錢

訶子肉炒一錢

小兒

右爲末飯丸麻子大乾艾生薑煎湯食前下

黃連丸 一二一 治疳勞

黃連 半兩淨牛膽汁浸晒 石蓮子 瓜萼根 杏仁 去皮尖

烏梅肉 各二錢

右爲末牛膽汁浸糕丸麻子大煎烏梅薑蜜湯下

胡黃連丸 一二二 治熱疳

胡黃連 各五錢 朱砂 二錢

右爲末填入猪膽內以線扎懸掛銚中淡漿水煮數沸取出研蘆薈射香各二錢入之飯和丸麻子大每服一二十九米

飲下

蟾蜍丸 一二三 治小兒頸項結核面色痿黃飲食不甘腹大

發熱名曰無辜疳證一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍 一二個 夏月溝渠深土中取腹大不跳不鳴者是身

多備者佳

右將糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦上焙乾爲末入射香一字粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下其效如

神

天麻丸 一二四

治肝風疔眼

天麻

青黛

黃連

五靈脂

夜明砂 微炒

川芎

蘆薈 各二錢

龍膽草

防風

蟬退

去足各一錢半

全蝎

一枚焙

乾蟾頭

炙焦三錢

射香

右為末猪膽汁浸米糕丸麻子大每服十九薄荷湯下

靈脂丸 一二五

治脾疔食疔

白豆蔻

麥芽 炒

五靈脂

砂仁

蓬朮 煨

青皮

橘紅

史君子

焙各二錢

蝦蟇

炙焦三錢

右為末米糊丸麻子大每服十九米湯下

如聖丸 一二六

治疔熱泄瀉

白蕪荑 炒

川黃連

胡黃連

各二兩半

史君子肉

一兩

射香

五分另研

乾蝦蟇

五個酒煮杵膏

右為末以蝦蟇膏杵丸麻子大每服一二十九煎人參湯下

○薛按疔之為患乃肝脾虛熱津液乾涸之証前方乃專於

治疔清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃

使邪氣退庶可收全功也

全書卷之二十一
古方
三
蝼子丸 一二七 治疔腫脹

蘿蔔子 一兩 微炒 陳皮

青皮 炒

檳榔

五靈脂

蓬朮 煨

黑牽牛 頭末 炒

赤茯苓

木香 二錢半

右為末麵糊丸綠豆大每服十五丸紫蘆湯下

消積丸 一二八

治食積大便酸臭發熱

丁香 九個

砂仁 十二個

烏梅肉 三個

巴豆 二粒去皮心膜

右為末麵糊丸黍米大每服五七丸溫水下

塌氣丸 一二九

治肚腹寒脹

胡椒 一兩

蝎尾 五錢去毒

右為末麵糊丸粟米大每服一二十九陳米飲下

紫霜丸 百三十

治驚積及變蒸發熱不解或食癩先寒後熱

或乳哺失節宿滯不化腹痞便結

代赭石 煨醋碎 七次

赤石脂 各一兩

杏仁 五十個

巴豆 三十枚去心膜油

右先將巴豆杏仁研成膏入代赭石脂研勻湯浸蒸餅丸粟

米大每服三五丸米飲送下

化蠶丸 一三一

黃連 五錢

蜀椒 去閉口者 炒出汗

苦楝根白皮 各二錢

右爲末用烏梅肥者七個艾湯浸去核搗爛和丸艾湯量兒
大小送下

下虫丸 一三二
諸疳蝨諸虫

苦楝根皮 新白者酒浸焙 綠色貫衆 雞心檳榔

桃仁 浸去皮焙 蕪荑 焙 木香 各二錢 鶴虱 炒一錢

輕粉 五分 乾蝦蟇 炙焦三錢 史君子 五十取肉煨

右爲末麵糊丸麻子大每服一二十九天明清肉汁下〇一
方內加當歸川連各二錢五分

史君子丸 一三三
治五疳蚘虫脾胃不和心腹膨脹時復作

痛不食漸瘦

史君子肉 一兩 厚朴 制 橘紅 白芍藥

甘草 炒 川芎 各一錢

右爲末蜜丸皂角子大每服一丸陳米飲化下

白玉散 一三四
治丹瘤

白土 二錢半 寒水石 五錢

右爲末米醋或新水調塗

以下通用方

四君子湯 一三五
方在補陣一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯 一三六 方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐等證

五味異功散 一三七 方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思等證

四物湯 一三八 方在補陣八

治一切血虛等證

八珍湯 一三九 方在寒陣十九

治氣血兩虛

十全大補湯 百四十 方在補陣二十

治氣血俱虛大補元氣

獨參湯 一四一 方在補陣三六

治氣虛氣脫挽回元陽

歸脾湯 一四二 方在補陣三三

治心脾虛損

參朮湯 一四三 方在補陣四一

治氣虛泄瀉嘔吐等證

參朮膏 一四四 方在補陣四十

治中氣虛弱諸藥不應者

參苓散 一四五 方在補陣五四

治睡中汗出

參附湯 一四六 方在補陣二八

治真陽虛極喘急呃逆

參苓白朮散 一四七 方在補陣五五

治脾胃虛弱食少吐瀉

理中湯 一四八 方在熱陣一

治上中二焦虛寒諸證

生脈散 一四九 方在補陣五七

治熱傷元氣止渴消煩定欬嗽喘促

五福飲 百五十 方在新補六

補五藏虛損

五君子煎 一五一 方在新熱六

治脾胃虛寒嘔吐泄瀉

理陰煎 一五二 方在新熱三

治脾腎虛寒諸證

溫胃飲 一五三 方在新熱五

治中寒嘔吐吞酸泄瀉少食

養中煎 一五四 方在新熱四

治中氣虛寒嘔泄

參薑飲 一五五 方在新熱八

治脾肺胃氣虛寒嘔吐欬嗽

六味回陽飲 一五六 方在新熱二

治陰陽將脫等證

六味異功煎 一五七 方在新熱七

治脾胃虛寒吐瀉兼滯者

六味丸 一五八 方在補陣一二一

壯水補腎

八味丸 一五九 方在補陣一二二

益火補陽

胃關煎 百六十 方在新熱九

治脾腎虛寒瀉痢

佐關煎 一六一 方在新熱十

治生冷傷脾瀉痢

五德丸 一六二 方在新熱十八

治脾腎寒滯一切瀉痢殮泄

二陳湯 一六三 方在和陣一

和脾消痰

芍藥枳朮丸 一六四 方在新和十六

健脾胃消積止腹痛除脹滿

枳朮丸 一六五 方在和陣七九

健脾胃消食積

大和中飲 一六六 方在新和七

治飲食留滯

小和中飲 一六七 方在新和八方 長象

治胸膈脹滿脾胃不和 會稽 張介賓 會卿著

四順清涼飲 一六八 方在攻陣二五 趙 謙益訂

治血熱壅滯秘結

青州白丸子 一六九 方在和陣百十二

治風痰嘔吐牙關緊急 劉路著

瀉青丸 百七十 方在寒陣一五一

治肝火急驚目赤

掃虫煎 一七一 方在新和十四

治諸虫上攻胸腹作痛

當損火益氣

新加

大赤

當風寒即上平關緊急

青眼白赤子

一六八

大赤味刺百十二

如血熱壅滯凝結

在和陣七九

四眼青

一六八

大赤文刺二五

當風寒即上平關緊急

小味中

一六八

大赤味刺八

景岳全書卷之六十三痘疹詮古方 長集

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

痘疹

保元湯 治痘瘡氣虛倒陷者

人參 二三錢

炙甘草 一錢

肉桂 五七分

黃芪 二三錢

灌膿 時酒炒同漿

時密 灸

水一鍾半加糯米一撮煎服○此藥煎熟或加入乳好酒各

半盞和服更妙酌宜用之○頭額不起加川芎三五分○面部加升麻三四分○胸腹加桔梗三四分○腰膝加牛膝四分○四肢不起加桂枝○嘔惡加丁香三四分○元氣虛寒加大附子七八分或一錢

調元湯_二

按此卽保元湯無肉桂者名爲調元湯卽東垣之黃芪湯也東垣用爲小兒治驚之劑魏桂巖用以治痘多效因美之名保元湯也蓋小兒元氣未克最易傷殘用此保全誠幼科王道之妙方但能因此廓克則凡氣分血分虛寒虛陷等症皆可隨症增減用之無不可奏神效也

內補湯_三

治痘瘡中虛等症

人參

黃芪

當歸

白朮

川芎

甘草

茯苓

陳皮

厚朴

右等分水煎服

托裏散_四

治痘毒元氣虛弱或妄行尅伐不能潰散用之未

成自消已成自潰并治癰毒內虛不能起發

人參

黃芪

當歸

白朮

熟地

芍藥

茯苓

炙甘草

炒各二錢

酒洗 各一錢 五分

痘疹

右每用三五錢水煎服○外科樞要方有陳皮一錢半無甘草

解毒內托散五 治痘癰

金銀花 黃芪 當歸 赤芍藥

防風 甘草節 荆芥 連翹

木通

右水煎入酒少許服

陳氏托裏消毒散六 治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或

發寒熱肌肉不生

人參 黃芪炒 當歸酒洗 川芎

芍藥炒 白朮炒 茯苓 陳皮各一錢

金銀花 連翹 白芷各七分 炙甘草五分

右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參芪內托散七 治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或為倒靨及瘡

癰膿毒不化膿潰作痛等證

人參 黃芪蜜炙 當歸 川芎

厚朴薑制 防風 桔梗炒 白芷

紫草 官桂 木香 甘草等分

入糯米一撮水煎服○色淡白者去防風紫草白芷多加粘
米○一方有芍藥

參芪四聖散八 治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參

黃芪

白朮

當歸

川芎

芍藥

茯苓

紫草

防風

木通

右用水煎服

陳氏四聖散九

治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草茸

木通

炙甘草

枳殼

黃芪

等分

右每服二錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散十

治痘瘡黑陷倒陷

人參

黃芪

川芎

甘草

紫草

木通

木香

蟬蛻

右加糯米百粒水一盞煎服

如聖湯十一

治毒盛不起

芍藥

升麻

乾葛

甘草

紫草

木通

各三五分

水一鍾薑一片煎七分溫服不拘時

人參固肌湯 十二 治痘瘡發表太過致肌肉不密或痘痂久

粘者

人參

黃芪

當歸

酒洗

甘草

蟬蛻

去土等分

水一鍾入糯米一撮煎服

人參透肌散 十三

治痘瘡虛而有熱雖出快而不齊隱於肌

膚間者

人參

紫草

如無紅花代之

白朮

當歸

芍藥

茯苓

甘草

木通

蟬退

糯米

等分

右每服三錢水一盞煎半盞徐服之

十宣散 十四

十四

一名托裏十補散○調氣補血內托瘡毒五日

後必用之方也亦治癰疽

人參

黃芪

當歸

各二錢

川芎

防風

桔梗

白芷

甘草

炙

厚朴

各一錢

桂心

三分

右為細末每服一錢或二錢木香湯下

芎歸湯 十五

亦名活血散○大能養營起痘

當歸 倍用

川芎

右為細末每服一錢紅花湯調服

活血散 十六

治痘疹血虛血熱已出未盡煩躁不寧腹痛

白芍藥 酒炒

右為末每服一匙糯米湯調下或荔枝湯亦可○此方對四

君子湯加歸芪名參歸活血散

當歸活血散 十七

治痘色淡白

當歸 酒焙

赤芍 酒炒

川芎

紫草

紅花 各五錢

木香 一錢

血竭 一錢

右為末每五歲者服一錢十歲已上服二錢酒下

養血化斑湯 十八

治白疹白痘

當歸身

人參

生地

紅花

蟬蛻 等分

水一盞生薑一片煎六分溫服無時

人參胃愛散 十九

治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食等

證

人參

茯苓

甘草

丁香

藿香

紫蘓

木瓜

糯米

右每服三錢薑棗水煎

二仙散 二十

治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉

難發等證

丁香 九粒

乾薑 炒一錢

右為細末每服五七分白湯送下被蓋片時令脾胃溫煖陰

返陽回則痘變潤矣量大小加減與之

陳氏

木香散 二一

又名十一味異功散○治小兒痘疹虛寒多

滯者宜此

木香

丁香

大腹皮

人參

桂心

炙甘草

半夏 制

訶黎勒

赤茯苓

青皮

前胡 等分

右每服二三錢薑水煎

薛按曰前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸或汗出或寒戰咬牙或欲靨不靨瘡不結痂或靨後腹脹泄瀉作渴此皆脾胃虛寒津液衰少急用此藥治之若誤認為實熱用寒涼之劑及飲蜜水生冷瓜

果之類必不治

陳氏 十二味異功散 二二 治元氣虛寒小兒痘疹色白寒戰咬牙泄瀉喘嗽等證

人參 丁香 木香 肉豆蔻

陳皮 厚朴 白朮 茯苓

官桂 各二錢 當歸 三錢半 制附子 半夏 各錢半

右咀每服二三錢薑棗水煎服○愚按陳氏此上二方溫性有餘補性不足用治寒證則可用治虛證則不及也用者更當詳酌

陳氏 人參麥門冬散 二二三 治痘瘡微瀉

麥門冬 一兩 人參 炙甘草 白朮

陳皮 厚朴 薑制各五錢

右每服三四錢水一大盞煎至六分徐徐溫服量兒增減

薛氏曰前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之若因氣虛作渴宜人參白朮散

柴胡麥門冬散 二二四 治痘瘡壯熱經日不止更無他證者

柴胡 二錢半 龍膽草 一錢 麥門冬 三錢 甘草 炙

人參 玄參 各錢半

右咬咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

按此方解表之功居六清火之功居四養營退熱此方最宜升均湯二五 治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻

乾葛

人參

白朮

炒

芍藥

炒

茯苓

甘草

紫草

如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

升麻葛根湯二六

亦名升麻湯○解發痘毒之良方

升麻

葛根

芍藥

甘草

等分

右咬咀水一盞煎七分溫服無時

萬氏曰古人治痘以升麻葛根湯為主後世好奇多立方法法愈多而治愈難矣苟能通變則痘疹諸證皆可增減用之不特發表解肌而已今以葛根湯爲主治隨證立增損法於後○初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風○口乾渴內熱也加葛粉天花粉麥門冬○自利加條實黃芩○嘔吐加半夏生薑○腹中痛加木香青皮枳殼山查肉○腰痛加獨活北細辛○頭痛加羌活藁本蔓荊子○驚搐加木通生地黃燈心○小便少加木通車前瞿麥○大便秘加大黃○衄

血加山梔仁玄參生地黃○發熱三四日熱甚不減須解其
毒加大力子連翹紫草○瘡不出加防風蟬蛻荆芥穗紅花
子○目痛加龍胆草密蒙花柴胡○瘡出太稠密加人參當歸
木香紫草大力子防風桔梗○咽痛加桔梗連翹○瘡乾或
帶紫或太赤者血熱也加當歸稍生地黃紅花地骨皮牡丹
皮○痘平陷灰白色氣虛也加人參白朮防風木香官桂○
手足瘡不起脾胃不足也加人參黃芪防風官桂○泄瀉者
裏虛也加人參白朮訶子白茯苓○瘡不著痂者濕也加黃
芪防風官桂白芷

愚謂前方乃胃經發表之劑萬氏增減之法大意已悉但此
方性味清涼純於踈泄必陽明多實多熱者乃宜用之然小
兒氣血體質大都虛弱平和者十居七八故凡痘瘡初起乍
見發熱用藥最貴和平兼養營氣則庶乎盡善若預用清涼
未免傷其胃氣全用解散未免虛其表氣二者受傷變患有
不可測矣故余制柴歸飲爲治痘之先着所當酌宜用之若
治麻疹則多屬火證此方乃所宜也

蘓葛湯 二七

初熱未見點發表之劑暫用之分兩宜酌兒大

小以爲增減

全書卷之三
古方
蘓葉 二錢 葛根 二錢 甘草 一錢 白芍藥 錢半

連鬚葱白三根生薑三片水鍾半煎七分熱服○原方有陳皮砂仁各五分此惟氣滯腹痛者宜用之否則不必

連翹升麻湯 二八 散毒清火

連翹 一錢 升麻 葛根 桔梗

甘草 各七分 白芍藥 五分 薄荷 少許

右加淡竹葉燈草水一盞半煎一盞溫服無時

柴胡橘皮湯 二九

柴胡 橘皮 人參 半夏

茯苓 等分 黃芩 等分

右加竹茹一團水一盞煎七分溫服不拘時

人參敗毒散 三十 方在散陣三六

治時疫斑疹

荆防敗毒散 三一 亦名消風敗毒散○發散痘疹俱可用及

時氣風毒邪熱

柴胡 荆芥穗 防風 羌活

獨活 前胡 川芎 枳殼

人參 甘草 桔梗 茯苓 等分

右切細加薄荷葉水一盞煎七分去滓溫服

柴葛敗毒散 三二 疑似傷寒以此解散

柴胡 乾葛 人參 羌活

防風 荆芥 桔梗 蘓葉

甘草

右用生薑三片水煎服

參蘓飲 三三 方在散陣三四五六

治傷風欬嗽傷寒痘疹

加減參蘓飲 三四 初熱見點解利之藥但表邪未達而元氣

強壯者宜暫用之或前後感冒風寒俱可暫用

蘓葉 一錢 乾葛 錢半 前胡 八分 陳皮 七分

枳殼 六分 桔梗 甘草 各四分

水一鍾半加生薑三片煎服

麻黃甘草湯 三五 冬月痘毒熾盛表實者宜用之

麻黃 一錢 生甘草 減半

水煎服

柴葛桂枝湯 三六 表散痘熱

柴胡 乾葛 桂枝 防風

甘草

人參

白芍藥

水一盞加生薑三片煎七分溫服

桂枝葛根湯 三七

解散寒邪

桂枝

葛根

升麻

赤芍藥

防風

甘草

各一錢

右加生薑三片淡豆豉一錢水一鍾煎七分溫服無時

十味羌活散 三八

此初熱見點解利之劑若小兒身壯力強

者可用蘇葛以行表其次者宜此和解疎利之藥若虛而宜

補者必當兼顧元氣不得單用此類

羌活

前胡

防風

各一錢

荆芥

獨活

各八分

細辛

白芷

各三分

柴胡

炙甘草

蟬退

各四分

水一鍾半加薄荷三葉煎五分不拘時服○發搐及熱盛不

退者調入制過珠砂末服之神效

十三味羌活散 三九

解熱散毒治風壅欲作痘疹者

羌活

獨活

防風

桔梗

荆芥

柴胡

前胡

地骨皮

炙甘草

蟬退

川芎

天花粉

天麻 等分

右為細末每服二三錢水一盞入薄荷葉三片煎四分溫服

羌活湯 四十 解發痘瘡兼治用熱驚狂

羌活 川芎 防風 山梔仁

龍胆草 當歸 等分 甘草 減半 淡竹葉

薄荷葉

水煎溫服無時

雙解散 四一 痘疹表裏俱實者非此不解

防風 川芎 當歸 連翹

芍藥 薄荷 大黃 各五分 石膏

桔梗 黃芩 各八分 荆芥穗 白朮

桂枝 各二分 滑石 二錢四分 甘草 二錢

水二鍾加生薑三片煎一鍾溫服無時○此即防風通聖散

減去麻黃苳硝梔子外加桂枝也

柴胡散子 四二 治痘瘡表裏俱實良方

柴胡 防風 當歸 人參

白芍藥 甘草 黃芩 滑石

大黃 等分

右加生薑一片水煎服

桂枝大黃湯

四三

治腹痛大便不通良方

桂枝

白芍

各二錢半

甘草

五分

大黃

一錢半

右剉細加生薑一片水一鍾半煎八分食前溫服

防風芍藥甘草湯

四四

解痘毒及陽明經痘出不快

防風

芍藥

甘草

等分

右每服一二錢水煎服

荆芥防風甘草湯

四五

解痘毒及太陽經痘出不快

荆芥

防風

甘草

等分

右每服一二錢水煎

蟬退膏

四六

治痘瘡虛陷不起

蟬退

當歸

川芎

甘草

升麻

防風

荆芥穗

等分

加人參

白芍藥

右為末煉蜜丸如芡實大每服一九薄荷湯下

消毒散

亦名消毒飲○治痘瘡六七日間身壯熱不大

使其脈緊盛者用此藥微利之

荆芥穗

炙甘草

各一兩

牛旁子

四兩杵炒

右為粗散每服三錢水一盞煎七分不拘時徐徐服

四味消毒飲 四八 治痘瘡熱盛毒氣壅遏無問前後皆可服

人參 炙甘草 黃連 牛旁子 等分

右為粗末每服一錢加薑一片水一盞煎四分去滓溫服不

拘時

六味消毒飲 四九 解痘毒

牛旁子 連翹 甘草 綠升麻

紫草 山豆根 等分

水一盞煎七分溫服不拘時

消毒化斑湯 五十 消風散毒清眼目咽喉

升麻 柴胡 桔梗 甘草

連翹 龍胆草 牛旁子 防風

蟬蛻 密蒙花

水一鍾半加淡竹葉十片煎服

解毒湯 五一 治一切熱毒腫痛或風熱搔痒

黃連 金銀花 連翹

右水煎服

真人解毒湯 五二 治痘母

忍冬花 半斤 甘草節 一兩 木通 防風

荆芥 連翹 各三錢

右分作三劑用水酒各一鍾煎服以腫消痘出為度

葛根解毒湯 五三 解痘毒止渴良方

葛根 升麻 減半 生地黃 麥門冬

天花粉 等分 甘草 減半

右取糯米泔水一盞煎七分入茅根自然汁一合服之

實表解毒湯 五四

人參 黃芪 當歸稍 生地黃

甘草 白芍藥 柴胡 升麻

酒片苓 玄參 地骨皮

右入薄荷葉少許淡竹葉十片水煎服

遡源解毒湯 五五 解胎毒之良方

當歸身 川芎 生地黃 白芍藥

人參 生甘草 黃連 連翹

陳皮 木通 等分

水一盞加淡竹葉十片煎半盞溫服無時

陳氏解毒防風湯 五六 治痘瘡毒氣熾盛

痘疹

防風

黃芩

地骨皮

白芍藥

炒

荆芥

牛旁子

右每服四五錢水煎服或為末白湯調下○外科解毒防風

湯方見本門六三

化毒湯

五七

治痘未出腹痛者

白芍藥

炙甘草

各一錢

木香

青皮

枳殼

各七分

山查肉

連翹

肉桂

各五分

水一盞煎七分溫服不拘時

消風化毒湯

五八

防風

黃耆

桂枝

荆芥穗

升麻

白芍

牛旁子

等分

甘草

減半

右加薄荷葉七片水一盞煎七分溫服無時

涼血化毒湯

五九

治痘瘡初出頭焦黑

歸尾

赤芍藥

生地黄

木通

連翹

牛旁子

紅花

紫草

桔梗

山豆根

右水煎服○或加童便一小盞亦可

犀角化毒丸

六十

治諸積熱及痘疹後餘毒生瘡口舌牙齦

糜爛等證

犀角屑 鎊

生地黄

當歸

防風

荆芥穗 各一兩

牛蒡子 炒杵

赤芍藥

連翹

桔梗 各七錢

薄荷

黃芩 炒

甘草 各五錢

右爲末煉蜜丸芡實大每服一九薄荷湯下

五福化毒丹 六一

治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黄

天門冬

麥門冬

玄參

熟地黄 各三兩

甘草

紺硝 各二兩

青黛 兩半

右爲末煉蜜丸芡實大每服一九白湯或薄荷湯化下

外科 五福化毒丹 六一

方在外科七六

治一切熱毒瘡癰

犀角散 六三

治痘瘡癰毒時毒熱盛煩躁多渴小便赤澁或

赤斑

犀角 鎊

甘草 炙各半兩

防風

黃芩 各一兩

右爲粗末每服二錢水一小盞煎五分溫服無時

紫草化毒散 六四

解實熱毒發痘

紫草

升麻

炙甘草 等分

糯米 五千粒

水煎服

紫草散 六五

治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草

黃芪 炙

炙甘草

糯米

各錢半

右水煎服

紫草飲 六六

治痘瘡黑陷不起

紫草

當歸

芍藥

甘草

麻黃 等分

水一盞煎不拘時服

紫草飲子 六七

治倒陷腹脹大小便秘

紫草

人參

枳殼

山查

木通

穿山甲

土拌炒 蟬蛻 等分

水一盞煎五分作三四次溫服

紫草快斑湯 六八

一名紫草湯○治痘疹血氣不足或血熱

不能起發色不紅活不灌膿等證

紫草

人參

白朮

當歸

川芎

芍藥

茯苓

甘草

木通 等分

糯米

右每服三五錢水煎

紫草木香湯 六九

治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶亂

紫草

木香

人參

白朮

茯苓

甘草

糯米

右每服三錢水煎

紫草木通湯 七十

治痘疹出不快

紫草

人參

茯苓

木通

甘草

減半

糯米

等分

右每服二三錢水煎服

紫草膏 七一

紅紫黑陷者暫用之

紫草茸

白附子

麻黃

去節湯泡去黃沫曬乾用

甘草

炙各半兩

僵蚕

炒

全蝎

炒各八個

右爲細末用白蜜一兩好酒半盞先將紫草煎熬成膏旋入各藥丸皂子大每服一九紫草煎湯化下就用補葯調理○如治驚搐以金箔爲衣薄荷湯下

紅綿散 七二

七二

亦名天麻散○治痘疹身有大熱面赤氣粗無

汗而表未散者可服之此藥以麻黃天麻發表爲主有汗者不可服蓋腠理已開不可再發汗也若有汗而熱則當以惺惺散爲和解之劑故仲景之治表證有宜發汗者有宜和解者有宜調和營衛者若有汗而熱者則和解爲宜虛而熱者

則調和營衛為宜如和中散寒之類是也

麻黃

去節

天麻

荊芥

炙甘草

各二錢

全蝎

全者七枚

右為末每服一錢以水半盞薄荷葉二片入酒四五滴煎二三沸帶熱服之如疹未出再進一服次又一服即傷風寒證服亦無妨

快斑湯

七三

治起發遲

人參

五分

當歸

防風

木通

各一錢

甘草

三分

木香

紫草

蟬蛻

各二分

水一盞煎七分溫服不拘時

快斑越婢湯

七四

治痘瘡手足不起發

黃芪

炙

白芍藥

桂枝

防風

炙甘草

右加生薑一片棗一枚水煎服

快透散

七五

治痘出不快

紫草

蟬蛻

木通

芍藥

炙甘草

等分

右每服二錢水煎

王海藏先生云身後出不快足太陽經也用荊芥甘草防風湯身前出不快手陽明經也用升麻葛根湯四肢出不快足陽明經也用防風芍藥甘草湯此皆解毒升發之藥也不可不知

鼠粘子湯 七六

治痘稠身熱毒盛服此以防青乾黑陷并治

斑疹稠密

牛旁子 炒

歸身

黃芪

炙甘草

柴胡

黃芩 酒炒

連翹

地骨皮

右等分水煎熟退則止服

射干鼠粘子湯 七七

治痘瘡壯熱大便堅實或口舌生瘡咽

喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子

四兩 炒

甘草

炙

升麻

射干

各一兩

右每服三錢水一大盞煎六分徐徐溫服

薛氏曰前方若痘疹初出發熱焮痛根盤赤盛或咽喉口舌疼痛作渴引飲者宜用若因胃氣虛弱發熱而致前症者宜人參麥門冬散

錢氏獨聖散 七八

治痘瘡倒靨陷伏

用川山甲取前足嘴上者燒存性爲末每服四五分以木香

湯入少酒服之或紫草湯亦可

無價散 七九

治一切痘瘡倒陷焦黑危急之症

人牙 猪牙

狗牙

猫牙

右以炭火燒去烟存性等分爲末每服三分熱酒調下○如
痒癢寒戰泄瀉煎異功散調下○一方人牙散只用人牙燒
去烟存性爲末酒調服

三酥餅 八十一

治初發熱用以表汗解毒稀痘神效

辰砂 擇上好明淨無砂石者以絹囊盛之用麻黃升麻

紫草荔枝殼同煮一日夜研細仍用煎湯飛過晒乾

研極細用真蟬酥另調作餅子

麻黃 去節湯泡過晒乾爲極細末亦用蟬酥另調作餅

紫草 研極細亦用蟬酥另調作餅

蟬酥 於端午日捉蟬取酥捻前三餅每餅加射香少許

微炒

右方如遇時行痘疹小兒發熱之初每三歲者將三餅各取
半分熱酒化下蓋覆出汗如不能飲酒用敗毒散煎湯化下
更好○若痘已出滿頂紅紫色爲熱毒之盛宜煎紫草紅花
湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許以解之但痘出之

後不可服麻黃餅也蓋辰砂能解毒紫草涼心火製過亦能發痘解毒麻黃能發表發痘蟬酥能驅臟腑中毒氣從毛滕中作臭汗而出此四藥誠解毒稀痘之神方也

神應奪命丹 八一

治風邪倒陷及痘毒入裏

辰砂 擇墻壁鏡面者以白紗囊盛之用升麻麻黃紫草

連翹四味同入砂罐以新汲水桑柴火煮一晝夜取出

將砂研細仍將煮砂藥汁去滓飛取末待乾聽用二錢

麻黃

連根節酒蜜拌炒焦八分

蟬蛻

洗淨去足三分

紫草

酒洗五分

紅花子

五分

穿山甲

酒炒五分

真蟬酥

三分

右共研細末用醅酒杵丸分作十粒周歲者半丸二歲者一

丸服止三丸熱酒化服厚蓋取汗汗出痘隨出也擇天醫生

烝日修合 此方與三酥餅功同

萬氏奪命丹 八二

治倒陷發痘毒

麻黃

蜜酒炒焦

升麻

各五錢

山豆根

紅花子

大力子

連翹

各二錢半

蟬蛻

紫草

人中黃

各三錢

右研細末酒蜜和丸辰砂爲衣薄荷葉煎湯下

東垣涼膈散 八三

解痘疹裏熱良方

黃芩

連翹 為君

甘草

梔子

薄荷

桔梗

竹葉

右水煎服

退火丹 八四

治痘中狂妄神方

滑石

硃砂 飛各一錢

冰片 三厘

共為細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

陳氏通關散 八五

通心經降心火利小便良方

山梔仁

大黃 炒各一分

木通

甘草 炙

車前子 炒

赤茯苓

人參

瞿麥

滑石 各三分

扁蓄 炒五分

右用水一盞燈草十根煎半盞溫服

玄參地黃湯 八六

治痘疹衄血

玄參

生地黃

牡丹皮

梔子仁 各錢半

甘草

升麻 各半錢

白芍藥 一錢

蒲黃 炒五分

水一鍾煎七分溫服○愚謂此方宜去升麻以塞上衝之源

勿謂但屬陽明即宜用升麻也

萬氏清肺飲 八七

治肺熱喘嗽聲啞

麥門冬

桔梗 各二錢

荆芥穗

天花粉

知母 各一錢

石菖蒲

訶子仁

各八分

右水煎服○此當與清肺湯參用方在後一四五

導赤通氣散 八八

治心虛聲不揚者

木通

生地黃

人參

麥門冬

當歸身

石菖蒲

甘草

右加燈心水煎服

甘桔清金散 八九

治肺熱咽痛聲不清

桔梗 一兩

甘草

連翹

各半兩

訶子皮

三錢

牛旁子

炒七錢

右為細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

加味甘桔湯 九十

咽喉腫痛暫用

桔梗 八分

甘草

錢二分

牛旁子

射干

各六分

防風

玄參

各四分

水一鍾煎服或加生薑一片○熱甚者加黃芩去防風亦可

大如聖飲子 九一

治瘡疹痘毒攻咽噎腫痛熱渴或成腫毒

不消等證

桔梗

甘草

鼠粘子

炒各一兩

麥門冬

五錢

右每服二錢水煎

萬氏 橘皮湯 九二
行滯消痰止嘔吐

橘皮 半去白 炒二錢
半夏 一錢
白茯苓 錢半

右加生薑三片水一盞煎七分溫服

勻氣散 九三
行氣化滯

木香 各五錢
青皮 各五錢
山查肉 二錢半

右為末每服一錢甘草湯調服

前胡枳殼湯 九四
治痰實壯熱胸中煩悶大便堅實卧則喘

急

前胡 一兩
枳殼
赤茯苓
甘草 炙

大黃 各半兩

右咬咀每服三五錢水一大盞煎至六分不拘時溫服此方
宜量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服

薛氏曰前症若屬肺胃實熱氣鬱痰滯大便秘結小便赤澀
煩渴飲冷身熱脈實者宜用之以疎通內臟使邪無壅滯則
痘瘡輕而易愈也

當歸丸 九五
治便堅三五日不通者

當歸 半兩
紫草 三錢
黃連 錢半 炒
炙甘草 一錢

大黃 二錢 半

右以當歸紫草熬成膏下三味研為細末以膏和為丸如胡椒大三歲以下兒服十九七八歲兒二十九食前清米飲下漸加之以和為度

百祥丸 九六

治痘瘡紫黑乾陷熱毒便秘裏實等症紅芽大

戟不拘多少用漿水煮極軟去骨日中曬乾復內原汁中煮

汁盡焙乾研末水丸粟米大每服一二十九研赤芝麻湯下

棗變百祥丸 九七

治同前而稍緩可代百祥丸

紅芽大戟

去骨一兩

青州棗肉

三十個

右用水一碗同煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和

作劑或搗爛為丸從少至多以木香湯吞服至利為度

排毒散 九八

治痘毒發癰

大黃

當歸稍

各一兩

白芷

沉香

木香

各半兩

穿山甲

七片土炒焦

右為細末看虛實大小加減長流水煎沸調服

錢氏苦參丸 九九

治痘後潰爛瘡毒疥癩

苦參 一兩

白蒺藜

何首烏

牛旁子

荆芥穗

各半兩

右為末酒調麵糊為丸竹葉湯下○外科苦參丸見本門八

八

稀痘方 百

用老鼠去皮取肉水煮熟量兒大小與食數次出痘甚稀未食葷時與食尤效屢試屢驗

稀痘酒 百一 最能散毒稀痘

麻黃 去節泡 紫草 各二兩

右二味細切布囊盛之浸無灰酒一小壺泥封固凡遇天行小兒發熱時與半杯或一杯量兒大小服之出微汗為佳

三痘湯 百二 痘發時預服之

大黑豆 赤小豆 綠豆 等分淘淨

右用甘草浸水去渣以甘草水煮豆熟為度逐日空心任意飲其汁自然出少○此方冬月煮熟令兒常食豆尤妙

絲瓜湯 百三 解瘡毒○一方無山查

絲瓜 升麻 芍藥 酒炒 生甘草
山查 黑豆 赤小豆 犀角 鎊等分

右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

辰砂散 百四 預解痘毒

好辰砂 一錢 飛

老絲瓜

近帶三寸連子燒灰存性 此物發痘瘡最好

右研末蜜水調服多者可少少者可無或以紫草甘草湯調服尤佳

保嬰丹

百五

稀痘

纏豆藤

或黃豆或綠豆梗上纏繞細紅藤是也於八月生 悉日擇取陰乾聽用二兩

防風

荆芥穗

牛旁子

炒

紫草茸

去根酒 浸一兩

新升麻

鹽水 炒

甘草

去皮各 五錢

天竺黃

真者 三錢

蟬酥

真者一錢

牛黃

真者一 錢

赤小豆

黑豆

綠豆

各三十粒 畧炒勿焦

好硃砂

用麻黃紫草荔枝殼升麻同煮過復以此汁飛過 三錢

右另用紫草二兩入水二碗煎膏至少半碗入沙糖一小鍾

將前各藥為細末同紫草膏丸如李核大即以硃砂為衣於

未痘之先濃煎甘草湯每磨服一丸大者二丸若已發熱用

生薑湯磨服蓋被睡而表之多者可少少者可無大有神效

○一方無紫草茸仍有經霜老絲瓜一箇連藤蒂五寸燒存

性同用

洗肝明目散

百六

治痘後目疾

當歸

羌活

柴胡

蜜蒙花

川芎

防風

木賊

山梔仁

龍膽草 各等分

右為末每服一錢淡沙糖水調服

洗肝散 百七 翳膜遮睛暫用

歸尾 錢二分 防風 八分 大黃 八分 羌活

川芎 各四分 薄荷 錢半 梔子 三分 甘草

水一鍾薑一片煎服○熱盛便秘加苓柏

羊肝散 百八 治痘毒入眼或無辜疔氣入眼

密蒙花 二錢 青箱子 決明子 車前子 炒各一錢

右為末用羊肝一大葉薄批摻上濕紙裹煨熟空心食之

蒺藜散 百九 治痘瘡入眼腫痛

白蒺藜 穀精草 防風 羌活

生蛤粉 等分

右為細末每服二錢溫水調服即退

蟬菊散 百十 治痘疹入目或病後生翳障

蟬退 去土淨 白菊花 等分

每服一二三錢水八分加蜜少許煎四分食後溫服

秦皮散 百十一 治大人小兒風毒赤眼痛痒澁皴眇淚羞明

秦皮 滑石 黃連 等分

湯泡熱洗日二三

通神散 百十二

治痘瘡入眼生翳膜

白菊花

穀精草

綠豆皮

右為末每服一錢用柿餅一個米泔水一盞同煎候水乾只

喫柿餅每日三五次不拘至七日效

錢 黃柏膏 百十三

用此護眼可免痘毒入目

黃柏 一兩

綠豆末 二兩

生甘草 三兩

右為細末以麻油調成膏用塗耳前眼角目下四五遍若早

塗之痘出必稀若既患眼塗之必滅

痘疥散 百十四

雄黃 一錢

紫草 三錢

右為細末胭脂汁調用銀簪脚挑破黑痘入藥在內此下方皆治痘疥之良方也

四聖丹 百十五

治黑疔

牛黃 錢二分

兒茶 錢七分

硃砂 八分

珍珠 二分

右為極細末以綿胭脂汁或油胭脂調勻先用銀針挑破黑疔拭去惡血乃點藥疔上

萬 氏 四聖散 百十六

治痘不起發變黑而痛者痘疔也

亦名鬼痘

綠豆

四十九粒

菀豆

四十九粒

珍珠

一分

油頭髮

燒存性一分

右為細末用胭脂水調先以簪腳撥開黑痘以此塗之

神效隔蒜灸法

百十七

治痘疔毒氣熾盛使諸痘不能起發

已起發者不能貫膿已貫膿者不能收靨或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散其法用大蒜頭切三分厚安痘疔上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸若紫血出後腫痛不止尤當用灸治者審之○愚在京師嘗見治痘疔者即以線鍼挑破出毒血諸痘隨即貫膿若挑

破不痛不出血者難治若用此法灸之即知痛更用鍼挑破紫血隨出諸痘隨貫亦有生者

胡荽酒

百十八

辟穢氣使痘疹出快

用胡荽一把以好酒二盞煎一兩沸令乳母每含一兩口噴兒遍身或噴頭面房中須燒胡荽香以辟除穢氣能使痘疹出快煎過胡荽懸房門上最妙○或用棗灸之兒聞棗香尤能開胃氣進飲食解毒氣○按此酒惟未出之前及初報之時宜用之若起脹之後則宜避酒氣亦忌發散皆不可用也

茵陳薰法

用乾茵陳研末搗棗膏和丸如鷄子大晒乾用烈火燒烟薰之

水楊湯

百十九

治倒陷之良方

水楊卽忍冬藤也春冬用枝秋夏用枝葉生水邊細葉紅梗枝上有圓果滿果有白鬚散出切斷用長流水一大釜煎六七沸先將三分之一置浴盆內以手試其適可仍先服煎藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯爲度不拘次數洗畢照視若纍纍然起處覺暈暈有系此漿影也如漿不滿宜再浴之若弱者只浴頭面手足亦可此則不厭多洗洗後如無起

勢乃氣血敗而津液枯多不可治

秘傳茶葉方

一二一

鋪床蓆用

茶葉要多揀去粗梗入水一煮取起再揀去梗濕鋪於床上用草紙隔層令兒睡上一夜則膿水皆乾

豬髓膏

一二二

治痘瘡不靨及痂靨不落者塗之卽落

豬骨髓

白蜜

右二味以火熬一二沸退涼用鷄翎掃上卽落

百花膏

一二三

治痘燥痂皮濺起作痛或瘡痂欲落不落者

白蜜不拘多少畧用湯和時時以鷄翎潤痛處瘡痂亦易落

無痕

蕎麥散 一二四

治痘瘡潰爛以此傳之

蕎麥一味磨取細麵痘瘡破者以此敷之潰爛者以此遍撲之絹袋盛撲或以此襯卧尤佳

臙脂汁 一二五

治黑痘之良方

先用升麻一味煎濃湯去滓却用綿胭脂浸於湯內揉出紅汁就以本綿蘸湯於瘡上拭而塗之

敗草散 一二六

治痘瘡搗搔成瘡膿血淋漓謂之班爛用葢屋葢牆爛草多年者佳或曠野白爛者尤佳為末搽搽之○

或氣血虛熱不愈而遍身患者須多摻蒠鋪上令兒坐卧其上其瘡即愈

白龍散 一二七

治爛痘及抓破者

用乾黃牛糞在風露中多久者火煨成灰取中心白者為末以薄絹囊盛裹於瘡上撲之

救苦滅癩散 一二八

治爛痘以此傳面如誤抓破者用之傳

貼最良

蜜陀僧

滑石 各二兩 白芷 半兩

右為細末濕則乾摻之或用好蜜調傳

滅癩散 一二九

治痘後面瘡以此傅之

蜜陀僧

白附子

白蘘豨

白芷

鷹矢白 等分

右研極細末以水調搽面點神效

辟邪丹 百三十

用燒於房中能辟一切穢惡邪氣

蒼木

以黃連代之更妙

乳香

降真香

甘松

北細辛

芸香 各等分

右爲末水丸如豆大每焚一丸薰之良久又焚一丸不可太多只是畧有香氣使之不斷可也

砭法 一三一

治丹瘤

用細磁器擊碎取鋒鋸者以筋一根劈開頭夾定用線縛住兩指輕捻筋梢令磁鋒正對毒頂懸高寸許另用一筋輕擊筋頭令毒血遇刺而出即可解散

熨鍼法

治痘癰及丹瘤

用水蛭大者五六根放腫毒頭上吮去惡血可以消丹瘤夾癰腫

雄黃散 一三三

治痘後牙齦生疳蝕瘡

雄黃 一錢

銅綠 二錢

右爲末乾摻之

綿璽散 一三四

治痘瘡餘毒肢體關節生疔蝕瘡膿水不絕

出蛾綿璽

不拘多少

生白礬

入璽內以炭火煨枯

右爲細末乾貼疔瘡口內○此總治瘡毒膿水淋漓收斂之

外劑

搽牙散 一三五

治痘後餘毒攻牙生疔一日爛進一分急用

此搽之

銅綠

雄黃

五倍子

枯礬

胡黃連

北細辛

烏梅

同褐子包固火煨存性

右等分爲末搽之

吹口丹 一三六

治疔

黃連

青黛

兒茶

片腦

右等分爲末吹之

生肌散 一三七

痘後癰毒不收口用之神效

枯礬 三錢

海螵蛸

赤石脂

煨各二錢 龍骨 煨

黃丹 飛炒

乳香 出汗

沒藥

出汗各一錢 血竭 五分

輕粉

射 各二分

爲細末摻瘡口內外以大乙膏貼之

馬鳴散 一三八

治走馬疔良方

人中白

即尿缸底白塗也以物刮取新瓦盞之火煨如白鹽乃佳半兩

五倍子

生者一錢

另用一錢

馬鳴退

即蚕退紙也火燒過二錢半

枯白礬

二錢即用五倍子一錢入礬於

內煨

右為極細末先以濃米泔水浸洗瘡口以此傳之

以下麻疹方

升麻湯 一三九

○解散疹毒

升麻

去鬚

葛根

去皮各一錢

芍藥

酒浸二錢

水一盞煎五分食遠稍熟服量人大小加減

予按此方即升麻葛根湯也麻疹之證多屬陽明火毒凡欲解表散邪但表實邪盛者最宜用此然愚謂以柴胡代升麻用之更妙若血氣稍虛而邪有未解者惟柴歸飲為最妥

升麻透斑湯

百四十

治疹瘡初見紅點一日至三日

升麻

枳殼

麩炒各五分

柴胡

錢半

桔梗

前胡

各一錢

乾葛

川芎

茯苓

各七分

陳皮

半夏

甘草

各四分

右加生薑一片水一鍾煎五分作十餘次徐服之

葛根麥門冬散

一四一

治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩

悶

葛根 三錢

麥門冬 四錢

人參

川升麻

茯苓

甘草 各二錢

石膏 半兩

赤芍藥 一錢

右咬咀每服三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服仍量兒大小增減

薛氏曰前方足陽明胃經之藥也外除表邪內清胃火兼補元氣若非發熱作渴表裏有熱者不可用若表裏俱虛而發熱作渴者宜用人參麥門冬散

萬氏麥門冬湯 一四二

治表邪內熱欬嗽甚者○此即前方去

人參者但分兩稍異耳

麥門冬

葛根

去皮各一錢

升麻

去鬚四分

赤芍藥

酒炒

茯苓

各六分

炙甘草

四分

石膏

煨一錢半

右水煎服

萬氏柴胡四物湯 一四三

治疹後餘熱

柴胡

當歸身

川芎

生地黃

白芍藥

人參

麥門冬

知母

淡竹葉

黃芩

地骨皮

右剉細水一盞煎七分不拘時溫服

生地黄散 一四四

治小兒癩疹身熱口乾欬嗽心煩者

生地黄 半兩

麥門冬 七錢

欬冬花 陳皮

杏仁 各三錢

炙甘草 二錢

右每服三五錢水一大盞煎六分不拘時徐徐溫服量大小

加減

清肺湯 一四五

治斑疹欬嗽甚者或二母散或麥門冬湯

桔梗 去蘆

片苓

貝母 各七分 防風 去蘆

炙甘草 各四分 知母 七分

右水一鍾煎五分入搗碎蘓子五分再煎溫服

清肺消毒湯 一四六

治疹瘡收完不思飲食鼻乾無涕

防風

枳殼 各五分

連翹 前胡

黃芩

桔梗 一錢

荆芥 炙甘草

右水一鍾煎至五六分作十餘次徐服之

門冬清肺湯 一四七

治疹後欬嗽不止

天門冬 去心

麥門冬 去心

欬冬花 知母

貝母

桔梗

牛旁子 地骨皮

杏仁 去皮尖

馬兜零

甘草 等分

水一鍾半煎七分食後溫服

清肺消毒化痰湯 一四八

治疹後喘嗽聲音不清不思飲食

眼目不清唇口乾燥

牛蒡子

防風

荆芥穗

貝母

各五分

連翹

黃芩

前胡

茯苓

各七分

桔梗

枳殼

各一錢

甘草

三分

右水一鍾煎五分作十餘次徐服之

清金降火湯 百四九

治疹後肺熱聲啞欬喘

當歸

白芍藥

酒炒

生地黃

酒洗

瓜蒌仁

白茯苓

陳皮

貝母

去心

甘草

麥門冬

桑白皮

枯苓

酒炒

山梔

炒

玄參

杏仁

去皮尖

蘓梗

天門冬

黃連

炒

石膏

右等分加薑一片水煎服

二母散 百五十

百五十

方在寒陣四九

治肺熱欬嗽及疹後嗽甚者

透斑和中湯 一五一

一五一

治疹瘡二三日泄瀉

升麻

乾葛

猪苓

澤瀉

陳皮

半夏

川芎

茯苓

各七分

前胡 桔梗 各一錢 柴胡 錢半 甘草 三分

右加生薑三片水一鍾煎至五分作數次徐服之

解毒化滯湯 一五二 治疹後喫食太早咬指甲撕口唇攃眼

毛看手咬人等證

防風 荆芥 枳殼 神麴 炒

麥芽 炒各五分 連翹 黃芩 茯苓

前胡 各七分 桔梗 一錢 山查 甘草 各三分

右水一鍾煎五分作十餘次徐徐服之

大青湯 一五三 解斑疹大毒良方

生地黄 石膏 玄參 地骨皮

知母 木通 甘草 青黛

荆芥穗 各等分

右水一盞加淡竹葉十二片煎七分溫服無時

羚羊角散 一五四 治小兒斑疹後餘毒不解上攻眼目羞明

雲翳眵淚俱多紅赤腫閉

羚羊角 鎊 黃芪 黃芩 草決明

車前子 升麻 防風 大黃

芒硝 等分

水一盞煎半盞稍熱服

羌菊散 一五五

治痘疹熱毒上攻眼目生翳并暴赤羞明

羌活

甘菊花

蟬蛻

蛇蛻

防風

穀精草

木賊

甘草

白蒺藜

山梔子

大黃

黃連

沙苑蒺藜

等分

右爲末每服一錢清米湯調下

以下通用方

人參理中湯 一五六

方在熱陣一

治脾胃虛寒諸證

六物煎 一五七

方在新因二十

治痘疹血氣不足隨證加減用

六氣煎 一五八

方在新因二一

治痘瘡氣虛癢癩倒陷

九味異功煎 一五九

方在新因二二

治痘瘡虛陷寒戰咬牙虛寒諸證

柴歸飲 百六十

方在新因十五

治痘疹初起托散妙劑

柴葛煎 一六一 方在新因十八

治痘疹表裏俱熱散毒養陰

疎邪飲 一六二 方在新因十六

治痘疹初起表邪強實者

五積散 一六三 方在散陣三九

溫散寒邪

四順清涼飲 一六四

治血脈壅熱大便秘結

涼血養榮煎 一六五

治痘瘡血虛血熱地紅熱渴

搜毒煎 一六六 方在新因十九

解痘疹熱毒紫黑乾枯

犀角地黃湯 一六七 方在寒陣七九

治痘疹血熱諸證

仲景黃芩湯 一六八 方在寒陣百五

治熱利

透邪煎 方在新因二三

治痘疹初熱未出者宜此蘇表達邪

化斑湯 百七十

方在寒陣三

治陽明熱渴化斑除煩

小柴胡湯 一七一

方在散陣十九

散肝膽經表邪往來寒熱

益元散 一七二

方在寒陣百十二

解煩熱止渴利小水

四苓散 一七三


方在和陣一八七

利小水去濕滯

導赤散 一七四

方在寒陣一二三

降心火及小腸熱證



文可印

全書卷六十三終

全書卷六十三

方痘疹

三六

方在寒陣百十二


小柴胡湯 方在散陣

散肝膽經表邪往來寒熱

益元散 方在寒陣百十二

解煩熱止渴利小便

方在寒陣百十二



利心火又小柴胡湯

文化甲戌

