

辨病證治類方 二之二


張滿
痰飲

積聚

漢書門	一三〇二	類
函號	二	架
册	六五	

內閣文庫	漢書
三〇二	二
三〇一	六五
架	册

內閣文庫	
番號	漢 13011
冊數	65 (65)
函號	301 63





脹滿
 大氣後...
 根末...
 右...
 飲...
 防...
 防...

醫學館寄病
寮書簿記



脹滿

大承氣湯

見大便不通

枳木湯

金

枳實

柴枚

白朮

貳兩

右咬咀以水五升煮取叁升分温叁服腹中軟即當散也

防已椒蘆丸

金

防已

椒目

葶蘆

炙

大黃

各壹兩

長

意

五

末之蜜為丸桐子大先食飲服拾九日參服
稍增口中自有津液渴者加芒硝伍錢

厚朴七物湯金匱

厚朴 半斤

甘草

大黃 各參兩

大棗 拾枚

枳實 伍枚

桂枝 參兩

生薑 伍兩

水壹斗煮取肆升溫服搦合日參服嘔者加
半夏伍合下利去大黃寒多者加生薑至半
斤

黃芪湯

疑即黃芪建中湯

平胃散

見中食

雙解飲子

見瘧

中滿分消丸

東垣

治中滿熱脹有寒者不治

黃芩

去腐炒夏月壹兩貳錢

黃連

淨炒各伍錢

薑黃

白朮

人參

去蘆

甘州炙

猪苓

去皮各壹錢

白茯苓

去皮

乾生薑

砂仁

各貳錢

枳實

炒黃

半夏

湯泡各伍錢

厚朴

薑製壹兩

知母

炒肆錢

澤瀉

陳皮

各參錢

服海
右除茯苓澤瀉生薑外共為細末入上參味
和勻湯浸蒸餅為丸如桐子大每服壹百丸
焙熟白湯下食後服量病人大小加減
中滿分消湯東垣治中滿寒脹

黃芪

吳茱萸

厚朴

草豆蔻仁

黃檗各伍分

益智仁

半夏

茯苓

木香

升麻各叁分

人參

青皮

當歸

黃連

澤瀉

生薑

麻黃不去節

柴胡稍

乾薑

川烏

薑澄茄各貳分

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服食前大忌房
勞酒麪生冷硬物油膩

廣茂潰堅湯東垣

廣茂煨

黃連

柴胡去蘆

甘艸生用

神麴炒

澤瀉各叁分

陳皮去白

吳茱萸湯泡

青皮去白

升麻各貳分

黃芩去黑皮

草豆蔻仁煨

厚朴 薑製

當歸稍

益智仁 各伍分

紅花 貳分

半夏 柒分 如渴加葛根 肆分

水貳鍾先浸藥少時煎至壹鍾稍熱服忌酒

濕麩

半夏厚朴湯

半夏 壹錢

厚朴 捌分

炒麩 陸分

當歸稍

猪苓

京三稜

升麻 各肆分

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤瀉

橘皮

生黃芩

草豆蔻仁

生甘草

柴胡 各叁分

木香

青皮 各貳分

吳茱萸

乾生薑

黃連 各壹分

紅花

蘇木 各半分

桃仁 柒個

昆布 少許 渴加葛根 叁分

水貳鍾煎至壹鍾去粗稍熱服二服後前證

又減一半却於前藥中加減服之

通幽湯 潤腸丸 俱見大便不通

沉香交泰丸

沉香

橘紅

白朮 各參錢

厚朴 薑製 伍錢

吳茱萸 湯泡

枳實 麸炒

青皮 去白

木香

白茯苓

木澤瀉

當歸 各煎 錢

大黃 酒浸 壹兩

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服伍拾

丸加至柒捌拾丸温湯下微利為度

木香順氣湯 寶鑑 治濁氣在上則生臍脹兩脇刺

痛脉弦而細者

木香

蒼朮

草豆蔻 麵裹煨 各參分

厚朴 製肆分

青皮

益智仁

陳皮

澤瀉

白茯苓 去皮

半夏

乾生薑

吳茱萸 湯泡 各貳分

當歸

人參 各伍分

升麻

柴胡 去蘆 各壹錢

水貳盞煎至壹盞去粗温服食前忌生冷硬物

木香場氣丸 治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子 炒

陳皮 去白 各伍錢

胡椒 貳錢

草豆蔻

麵裹煨

木香

青皮

各叁錢

蝎稍

去毒貳錢半

右為細末麵糊為丸如桐子大每服叁拾丸

溫米飲下忌油膩服白粥百日重者壹年小

兒丸如麻子大桑白皮湯下拾丸日叁服大人

陰囊紅腫冰冷須用青鹽乾薑白麵各叁錢

水和膏攤紙上塗貼

元戎木香塌氣丸

治單腹脹

丁香

胡椒

各貳錢

郁李仁

肆錢

蝎尾

木香

檳榔

各半兩

枳實

白牽牛

各壹兩

右為細末飯丸菉豆大每服拾丸至拾伍丸

陳皮生薑湯任下

木香散 治單腹脹

木香

青皮

白朮

薑黃

草豆蔻

各半兩

阿魏

萹澄茄

各壹兩

右為細末醋糊丸如菉豆大每服貳拾丸生

薑湯送下

藿香正氣散 見中風

五膈寬中散 見反胃

木香流氣飲

沉香降氣湯 俱見氣

香砂調中湯 治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯

不噫或胸腹脹痛

藿香

砂仁 各壹錢 蒼朮 貳錢米泔浸壹宿炒

厚朴 薑製

陳皮 半夏

茯苓

青皮 枳實 麪炒各壹錢

甘草 叁分

太便瀉去枳實青皮加麩蘗山查肉果黃連

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

分心氣飲

紫蘇梗 壹錢半 青皮 芍藥

大腹皮 陳皮 各壹錢 木通

半夏 各捌分 官桂 陸分 赤茯苓

桑皮 炒各伍分

水貳鍾薑叁片燈心拾莖煎捌分食前服

紫蘇子湯 濟生治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

脉虚緊瀉

真紫蘇子

炒槌碎 壹錢

大腹皮

草菓仁

半夏製

厚朴製

木香

陳皮去白

木通

白朮

枳實麩炒各壹錢

人參伍分

甘草炙叁分

水壹鍾半薑伍片煎捌分食遠服

大橘皮湯

橘皮

厚朴薑製各壹錢半猪苓

澤瀉

白朮各壹錢貳分

檳榔

赤茯苓

陳皮

半夏

山查肉

蒼朮

藿香

白茯苓

各壹錢木香伍分

滑石叁錢

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

大異香散

三稜

蓬朮

青皮

半夏麩

陳皮

藿香

桔梗

枳殼炒

香附炒

益智 各壹錢半

甘草 多半錢

右分作貳貼每貼用冰貳鍾生薑參片棗壹枚煎至壹鍾去查食遠服

大半夏湯

大半夏 湯泡

陳皮

茯苓

桔梗

檳榔

甘草 各等分

右剉碎每服參錢水壹盞半生薑參片煎至捌分去滓食前溫服

人參芎歸湯 直治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤

大便黑名血脹

人參

辣桂 去韋皮

五靈脂 炒各貳錢伍分

烏藥

蓬朮 煨

木香

砂仁

炙甘草 各半兩

川芎

當歸

半夏 湯泡各柒錢伍分

右咬咀每服壹兩伍錢生薑伍片紅棗貳枚紫蘇

肆葉煎空心服

七氣消聚散

香附米 壹錢半

青皮

蓬朮

用清
類
三

二稜 俱醋炒 枳殼 麸炒 木香

砂仁 各壹錢 厚朴 薑製 陳皮 各壹錢

甘草 炙肆分

水貳鍾薑參片煎捌分食前服

參朮健脾湯

人參 白茯苓 陳皮

半夏 縮砂仁 厚朴 薑製各壹錢

白朮 貳錢 炙甘草 叁分

水貳鍾薑參片煎捌分服加麴蘖山查肉消

脹尤妙
桃仁承氣湯 抵當湯 俱見畜血

當歸活血散

赤芍藥 生地黄 當歸鬚 酒洗各壹錢半

桃仁 去皮 炙 紅花 酒洗 香附 童便浸 各壹錢

川芎 牡丹皮 玄胡索

蓬朮 各捌分 炮 三稜 炮 青皮 各柒分

水貳鍾煎柒分空心服

補中益氣湯 見勞倦

長補
頁
三

化滯調中湯

白朮 壹錢 伍分

人參

白茯苓

陳皮

厚朴 薑製

山查肉

半夏

各壹錢

神麴

炒

麥芽

炒各 捌分

砂仁

柒分

脹甚者加蘿蔔子炒 壹錢麵食傷尤宜用

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參苓白朮散

見滯下

胃風湯

見下血

人參生脉散

葶藶大棗瀉肺湯

俱見

小青龍湯

見咳嗽

枳殼散

本

治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶

嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痞癖

消積聚

枳殼

三稜

陳皮

益智仁

莪朮

檳榔

肉桂

各壹 兩

乾薑

厚朴

甘艸

青皮

肉苳蔻

木香

各半 兩

咬咀每服叁錢水壹盞薑棗同煎至柒分熱

服不拘時

索氏三和湯三倍加白朮方

白朮

厚朴

陳皮 各參兩

檳榔

紫蘇 各貳兩

木通

甘草

海金砂

大腹皮

白茯苓

枳殼 各壹兩

右水煎服

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝

生薑 各參兩 甘草 壹兩

太棗

拾貳筒

麻黃

細辛

各貳兩

附子

壹筒炮

右柴味以水柴升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取貳升分溫參服當汗出如蟲行皮中即愈

加味枳朮湯

治氣為痰飲所隔心下堅脹名

曰氣分

歌云氣分中滿并胸痺二者雖殊皆此類胸痺氣實中滿虛氣分挾飲茲

為異跌陽微遲寸遲澀兩處推求病端的陰痺不通則骨疼陽氣不通身冷劇陰氣前通痺不在陽氣前通惡寒慄陰陽相得氣乃行氣轉即散分虛實實則失氣虛遺尿腹滿脇

用... 鳴何以療心下堅大似... 旋盤桂附未湯為最妙... 枳殼 麩炒 辣桂 紫蘇莖葉

陳皮 檳榔 桔梗 木香 各貳錢半

白朮 五靈脂 炒 茯苓 甘草 各伍錢

半夏 右咬咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹

鍾去滓食前溫服 調榮飲 治血分見水腫

奪命丹 治瘀血入衣胞脹滿難下急服此藥

血即消衣自下

附子 半兩炮 牡丹皮 壹兩 乾漆 壹兩碎之 炒令烟盡

右為細末好醋壹升大黃末壹兩同熬成膏 和藥丸如桐子大溫酒吞伍柒丸

黑神散 見鼻衄

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小

便不通血化為水

椒仁 甘遂 續隨子 去皮研

附子 炮 郁李仁 黑牽牛 炒

長青 頁五 六六

五靈脂 研碎 當歸

吳茱萸

延胡索 各伍錢 芫花 壹錢 醋浸

虻青 拾枚 去頭翅足 同糯

米炒黃去

蟹螯 拾枚 去頭足 翅糯米炒黃去米

膽礬

信砒 各壹錢

石膏 貳錢

右為末，麵糊為丸，如豌豆大，每服壹丸，橘皮湯下。此方藥雖峻厲，所用不多，若畏而不服，有養病害身之患。常治虛弱之人，亦未見其有悞也。

人參丸 治經脈不利，化為水流，走四肢，悉皆

腫滿，名曰血分。其候與水相類。若作水治之，非也。宜用此。

大人參 當歸 大黃 濕紙裹飯上蒸熟去

紙切炒 桂心 瞿麥穗

赤芍藥 白茯苓 各半兩 葶藶 炒另研壹錢

右為末，煉蜜丸，如桐子大，每服拾伍丸，加至貳叁拾丸，空心飲湯下。

晞露丸 寶鑑 治寒傷於內，氣凝不流，結於腸外。

久為癥瘕，時作疼痛，腰不得伸。

京三稜 同炒深黃色 蓬莪朮 入巴豆參拾粒切碎

去巴豆不用 乾漆 洗去腥 川烏 炮各半兩

硃砂 肆錢 輕粉 壹錢 茴香 鹽炒

青皮 去白 雄黃 另研 穿山甲 炒各叁錢

麝香 伍分

右為細末研勻生薑汁煮麪糊和丸如梧子大每服貳拾丸至叁拾丸生薑湯送下温酒亦得空心食前

木香通氣散 寶鑑 治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可忍

忍

木香 戎鹽 炒 京三稜 炮各半兩

厚朴 壹兩 枳實 炒 甘草 炙各叁錢

乾薑 炮 蓬莪 炮各貳錢

右為末每服叁錢淡生薑湯調下食前

見現丸 寶鑑 治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕

聚堅大久不消者

附子 炮去皮 鬼箭羽 紫石英 各叁錢

澤瀉 肉桂 玄胡索

木香 各貳錢

檳榔 貳錢半

血竭 壹錢半

水蛭 壹錢炒

京三稜 伍錢

桃仁 參拾粒湯浸去皮尖

研

大黃 貳錢剉用酒同焙

右拾參味除血竭桃仁外同為末入另研貳

味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服

參拾丸淡醋湯送下食前温酒亦得

和血通經湯寶鑑治婦人室女受寒月事不來惡

血積結堅硬如石

當歸

京三稜

炮各伍錢 廣茂 炮

木香

熟地黄

肉桂 各參錢

紅花

貫衆

蘇木 各貳錢

血竭 壹錢

右十味除血竭外同為細末和勻每服參錢

熱酒壹盞調下食前忌生冷及當風大小便

附方

小温中丸丹溪治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮

半夏 湯泡去皮

神麴 炒

茯苓 各壹兩

白朮 貳兩

香附子 不要烘晒

針砂 各壹兩半 醋炒紅

苦參 炒

黃連 炒各半兩 甘艸 參錢

右為末醋水各壹盞打糊為丸如桐子大每服七八十九白木陸錢陳皮壹錢生薑壹片煎湯吞下虛甚加入參壹錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕者服此九陸柒兩小便長病甚服壹斤小便始長

禹餘糧丸 因三治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆主之 許學士及丹溪皆云此方治膠

要藥之

蛇含石 大者叁兩以新鉄銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用銚取蛇

黃傾入醋中候冷取出研極細禹餘糧石 兩

真針砂 伍兩先以水淘淨炒乾入餘糧下處用米醋貳升就銚內煮醋乾為

度後用銚并藥入炭中燒紅銚出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物為主其次量入虛實入下項 治水多惟此方三物既非太戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

- 羌活
- 木香
- 茯苓
- 川芎
- 牛膝 酒浸
- 桂心

服法
類

白豆蔻 炮

大茴香 炒

蓬木 炮

附子 炮

乾薑 炮

青皮

京三稜 炮

白蒺藜

當歸 酒浸壹宿
各半兩

右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下參拾丸至伍拾丸最忌鹽下毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動臧府病去日日參服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也

木香化滯散

破滯氣治心腹滿悶

木香

薑黃

青皮 去白

縮砂仁 去殼

人參

檳榔

白朮 各貳錢

白豆蔻 去殼

藿香葉

橘皮

大腹子

白茯苓 去皮

白檀香

桔梗 各伍分

甘草 炙四分

右為細末每服參錢水壹盞半煎至壹盞稍熱服食前沸湯點服亦可忌生冷硬物
導氣丸 治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便

長清

頁

三

結祕小腸腎氣等疾功效尤速

青皮 用水蛭等分同 莪朮 用蜜虫等分同炒赤去蜜虫

胡椒 茴香炒 三稜 乾漆炒 檳榔 班猫炒

赤芍 川椒炒 乾薑 硃砂炒 附子 青鹽炒

茱萸 牽牛炒 石菖蒲 桃仁炒

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用祗以青皮等拾味為細末酒糊為丸如梧桐子大每服伍拾丸加至柒拾丸空心用紫蘇湯送下

三稜煎丸 治心腹堅脹脇下滿硬胃中痞塞

喘滿短氣常服順氣消積滯除膨脹

京三稜 生半斤搗為細末以酒參升於銀右器內熬成膏

杏仁 湯泡去皮小大炒冷黃色 乾漆 炒烟盡

麥蘖 炒已上 青皮 去白 蘿蔔子 炒

神麴 炒已上 硃砂 飛研壹兩

右為細末以三稜膏和丸如桐子大每服貳拾丸食後温米飲送下

沉香散 治腹脹氣喘坐卧不得

沉香

木香各貳錢半

枳殼麩炒

蘿蔔子炒各參錢

右作壹服水貳鍾生薑參片煎至壹鍾不拘

時服

溫胃湯治憂思聚結脾肺氣凝腸不能正大

腸與胃氣不平脹滿上衝欬食不下脉虛而

緊澹

附子炮去皮臍

厚朴去皮生用

當歸

白芍藥

人參

甘草炙

橘皮各壹錢半

乾薑壹錢壹分

川椒去閉口炒出汗參分

右作壹服水貳鍾薑參片煎至壹鍾食前服

木通飲治脇肋刺痛膨脹小便赤澀大便不

利或浮腫

木通

陳皮

紫蘇莖

甘草炙各參錢

右作壹服水貳鍾生薑參片紅棗貳枚燈心

拾莖煎至壹鍾不拘時服

參香散治一切氣脾虛作脹痞氣

用酒

人參

官桂

甘草炙各未分

桑白皮

桔梗

陳皮

枳實麩炒

麥門冬去心

青皮

大腹皮

半夏各壹錢

紫蘇子

茯苓

香附子

木香各壹錢貳分

右作壹服水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚煎至

壹鍾食前服

平肝飲子 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃

心腹脹滿頭眩嘔逆脉來浮弦

防風去蘆

枳殼麩炒

桔梗去蘆

赤芍藥

桂枝各壹錢半

木香不見火

人參

檳榔

川芎

當歸

陳皮

甘草炙各捌分

右作壹服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘

時服

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂

成脹滿有妨飲食甚則腹痛

人參

青皮去白

陳皮去白

長

頁二

七

服滿

類方二

廿三

丁香 各貳錢

白木 壹錢

附子 炮去皮臍

草果仁

乾薑 炮各壹錢

厚朴 薑製

甘草 炙各伍分

嘔加半夏 傷麩加萊菔子

各錢

水貳鍾薑參片紅棗貳枚煎壹鍾不拘時服

甘露散 腫脹用下藥得利後以此補之

人參

白朮

茯苓

猪苓

各半兩 滑石 陸兩

澤瀉

甘草

各壹錢

右為細末每服參錢食前白滾湯調下

敷藥

治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘

草嚼後用此

大戟

芫花

甘遂

海藻 各等分

右為細末用醞醋調麩和藥攤於綿紙上覆

積塊丸

治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹

中飽脹或蟲積疼痛皆能取効如神不傷元

氣

張滿

類方二

廿三

本草綱目卷之十一
藥部
五十二

京三稜 莪朮 自然銅

蛇含石 各燒紅醋淬柒

雄黃

蜈蚣 全用焙燥各壹錢貳分

木香 壹錢半

鐵華粉 用糯米醋炒壹錢

辰砂

沉香 各捌分 冰片 伍分

蘆薈

天竺黃 阿魏

全蝎 洗全用焙乾各肆錢

右為極細末用雄猪膽汁煉為丸黑狗膽汁尤妙丸如梧桐子大每服柒捌分重者壹錢五更酒送下塊消即止不必盡劑

孫一奎曰予在吳下時有吳生諱震者博雅君子也一日偶談及鼓脹乃詰予曰鼓有蟲否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之本事方云臍腹四肢悉腫者為米但只腹脹而四肢不甚腫者為蠱註謂鼓即鼓脹也由是參之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三虫為首豈無音哉愚謂鼓脹即今云氣虛中滿是也以其外堅中空腹皮紉急有似於鼓故以鼓脹名也彼蠱證者中實有物積聚已久理

長篇
頌方二
三六

或有之吳生曰子質何其敏也予堂嫂病鼓
三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名
劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火焚燒至腹忽
響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高
二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之
皆虺也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復
生小蟲多者十五六條或十數條或五六條
蟲在人腹中蕃息若此曷不令人脹哉惜乎
諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然

猶未親見其異也歲萬曆癸巳赴督漕理刑
吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年
十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四
肢瘦削發熱晝夜不退已年半矣醫惟以退
熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾喉中
兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其
腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色
淡不嗜飲食今若此者得非蟲乎投以阿魏
積塊丸服之果下蟲數十大者二一紅一黑

長尺餘蟲身紅線自首貫尾蟲腹中有蟲大者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也

月治 卷之二
肥氣丸 東治肝之積在左脇下如覆杯有頭足

積聚

大七氣湯 治積聚癥瘕隨氣上下心腹疝痛

上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

京三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮

各去白

藿香葉

桔梗

去蘆

肉桂

不見火

益智仁

各壹兩半

甘草

炙柒錢半

香附

炒去毛

壹兩半

哎咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食前溫服

肥氣丸 東治肝之積在左脇下如覆杯有頭足

久不愈令人咳逆瘖瘡連年不已其脉弦而

細

柴胡 貳兩 黃連 柒錢 厚朴 半兩

椒 炒去汗去目及 甘草 炙參 錢

廣茂 炮 昆布 人參 各貳 錢半

阜角 去皮弦 白茯苓 去皮各壹錢半

川烏 炮去皮臍分 乾薑 巴豆霜 各伍分

右除茯苓阜角巴豆外為極細末再另研茯苓阜角為細末和勻方旋旋入巴豆霜和勻

煉蜜丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸

日加貳丸漸加至大便微溏再從兩丸加服

周而復始積減大半勿服在後積藥依此

法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋

冬加厚朴壹半通前重壹兩減黃連壹錢半

若治風癩於壹料中加人參茯苓菖蒲各參

錢黃連只依春夏用柒錢雖秋冬不減淡醋

湯送下空心服

加減肥氣丸 東垣春夏合此治同前

續聚

續方二

三九

柴胡 厚朴 人參

乾薑 各半兩 川烏 巴豆霜 各叁錢

肉桂 貳錢 黃連 壹兩 川椒

甘草 各伍分

右除巴豆霜外同為細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二十日加貳丸漸加至太便微澹再從貳丸加服淡醋湯下空心服 秋冬去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

三因肥氣丸

當歸頭 蒼朮 各壹兩半 青皮 壹兩 炒

蛇含石 火煨醋淬 柒錢半 三稜

蓬朮 鐵孕粉 各叁兩與三稜蓬朮同入醋煑一伏時

右為末醋煑米糊丸如棗豆大每服肆拾丸

用當歸浸酒下食遠服

鼈甲丸 治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲 壹枚可用重肆兩者淨洗以醋和黃泥固濟背土可厚叁分令乾

荆三稜 炮剉 枳殼 穉炒微黃去穰各叁兩

川大黃剉炒木香不見火桃仁湯浸去皮

用麩炒微黃細研如膏各壹兩半

右除鼈甲外搗為細末後泥一風爐子上開
口可安鼈甲取前藥末并桃仁膏內鼈甲中
用好米醋貳升時時旋取入鼈甲內以慢火
熬令稠取出藥却將鼈甲淨洗去泥焙乾搗
為細末與前藥同和搗為丸如梧桐子大每
服貳拾丸空心溫酒送下晚食前再服
息賁丸東垣治肺之積在右脇下覆大如杯久不

也令人洒淅寒熱喘嗽發肺癰其脉浮而毛

厚朴薑製黃連炒壹兩人參去蘆

乾薑炮白茯苓去皮川椒炒去汗

紫苑去苗各壹錢半桂枝去麩皮桔槔

京三稜炮天門冬 陳皮

川烏炮去皮臍白豆蔻各壹錢青皮伍分

巴豆霜肆分

右除茯苓巴豆霜旋入外餘藥共為細末煉
蜜丸如桐子大每服貳丸一日加壹丸二日

加貳丸加至大便微溏再從貳丸加服煎淡薑湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴伍錢通前壹兩參錢黃連減柒錢用陸錢

加減息賁丸東垣仲夏合此其積為病寒熱喘咳氣上奔脉瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏

乾薑

白苳蔻

桔梗

各壹錢

紫苑

厚朴

川椒

炒去汗

天門冬

去心

京三稜

茯苓

各壹錢

人參

桂枝

各貳錢

陳皮

捌錢

黃連

壹兩

巴豆霜

肆分

紅花

少許

青皮

柒分

右為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸加至大便微溏為度再從貳丸加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麵腥辣生冷之物

三因息賁湯

半夏

湯泡

桂心

人參

去蘆

吳茱萸

湯泡

桑白皮

葶藶

炙甘州

各壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑伍片紅棗貳枚煎

至壹鍾食前服

半夏湯

治肺積息賁咳嗽

半夏

湯泡去滑焙乾

細辛

去苗葉

桑根白皮

前胡

去蘆各壹兩半

桔梗

炒

貝母

去心

柴胡

去苗

訶梨勒

煨去核

人參

去蘆

白朮

炙甘草

各壹兩

右吹咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗叁枚擘破同煎至柴分去滓温服食後臨臥各壹

服

枳實散

治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘

不利

枳實

碎炒

木香

檳榔

赤茯苓

去皮

五味子

甜葶藶

隔紙炒令紫色

訶梨勒

去核

甘州

微炙各半兩

杏仁

壹兩湯洗去皮尖雙

仁炒黃色

右咬咀每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至

陸分去滓溫服不拘時

伏梁丸 東垣治心之積起臍上大如臂上至心下

久不愈令人煩心其脉沉而芤

黃連

去鬚壹兩半

人參

去蘆

厚朴

去麤皮薑製各半兩

黃芩

叁錢

肉桂

茯苓

去皮

丹參

炒各壹錢

川烏

炮去皮臍

乾薑

炮

紅豆

菖蒲

巴豆霜

各伍分

右除巴豆霜外為末另研巴霜旋入和勻煉

蜜為丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二

日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服

淡黃連湯下食遠周而復始積減大半勿服

秋冬加厚朴半兩通前共壹兩減黃連半兩

只用壹兩黃芩全不用

三因伏梁丸

茯苓

去皮

人參

去蘆

厚朴

去麤皮薑製炒

枳殼去瓢炒 三稜煨 半夏湯泡
白朮各等分

右為細末，麵糊丸如梧子，大每服伍拾丸，食遠用米飲湯下。

乾漆丸 治伏梁氣橫在心下，堅牢不散，胃中連背多疼。

乾漆搗碎炒 芫花醋拌炒 鼈甲去襖爛
硃砂研已上 桃仁去皮尖炒 木香不見火
川烏頭去皮臍剉鹽拌炒 雄黃細研

麝香研各貳錢半

右為細末，入別研藥，令勻，醋煨麵糊為丸，如菘豆大，每服拾丸，食前用溫酒送下。

半夏散 治伏梁積心，下硬急滿悶，不能食，胃背疼痛。

半夏湯泡去滑 鼈甲醋炙各壹兩半 川大黃剉炒
訶梨勒皮 桂心 前胡
當歸焙 青橘皮去白 檳榔
木香 荆三稜炮各壹兩

右為末每服參錢水壹中盞生薑半分煎至
陸分去滓不拘時稍熱服

治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴參兩為末空心溫酒下桃奴是實著
樹不落者正月採樹上乾桃是也

痞氣丸東垣治脾之積在胃脘腹大如盤久不愈

令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚其脉
浮大而長

厚朴製半兩 黃連去鬚 吳茱萸洗參

黃芩 白朮各貳錢 茵陳酒製

縮砂仁 乾薑炮各壹錢半 白茯苓另為末

人參 澤瀉各壹錢 川烏炮去皮

川椒各伍分 巴豆霜另研 桂各肆分

右除茯苓巴豆霜另研為末旋入外餘藥同
為細末煉蜜丸桐子大初服貳丸一日加壹
丸貳日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸
加服淡甘草湯下食遠周而復始積減大半
勿服

續後 頁三

加減痞氣丸東垣孟秋合此

厚朴壹錢 黃芩酒製 黃連酒製

益智仁 當歸尾 橘皮去白

附子各叁分 半夏伍分 吳茱萸

青皮 澤瀉 茯苓

神麴炒 廣茂 昆布

熟地黄 人參 炙甘艸

巴豆霜 葛根各貳分 紅花半分

右為細末蒸餅為丸如桐子大依前服法

三因痞氣丸

赤石脂火煨醋淬 川椒炒去汗 乾薑炮各貳兩

桂心 附子各半兩 大烏頭炮去皮臍貳錢半

右為細末煉蜜和丸如梧子大以硃砂為衣

每服五十丸食遠米湯下

蒜紅丸 治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不

得者

丁香 木香 沉香

縮砂仁 青皮去白 檳榔

續聚

酒方二

八

陳皮去白 蓬莪朮 草果去皮

牽牛各壹兩 粉霜 肉豆蔻麵裹煨

白茯苓去皮 人參各半兩 蒜貳百瓣半生用半火煨熟

右為細末以生熟蒜研膏生絹絞取汁和藥

為丸如梧子大每服伍柒丸加至拾伍丸食

後淡鹽湯送下忌鹹酸魚鮓茶醬淹藏鷄鴨

生冷馬牛雜肉之類只可食淡白粥百日

鼈甲丸 治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散

腹脇疼痛體瘦成勞不能飲食

鼈甲叁兩去殼爛以米醋壹小盞化細砂壹兩用塗鼈甲炙以醋盡為度

附子炮去皮臍 京三稜炮 乾漆搗碎炒烟盡

木香各壹兩 吳茱萸半兩湯泡微炒

川大黃貳兩剉碎醋拌炒令乾

右為細末醋煑麵糊丸如桐子大每服貳拾

丸空心溫酒送下

勻氣湯 治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

陳麴炒 麥蘖炒 桂心去蘆皮

郁李仁半生半炒 厚朴去蘆皮 白朮各壹兩

貴聚

大腹子貳枚 牽牛壹兩半 良薑炮半兩
甘草炙貳兩

咬咀每服參錢水壹盞生薑參片棗壹枚擘
破同煎至米分去滓食遠稍熱服日參名

沉香飲子 治痞氣升降陰陽

沉香 木香 羌活

桑白皮微炒 人參 獨活

白茯苓 紫蘇葉各等分

咬咀每服參大錢水壹盞半生薑五片大棗

貳枚煎至七分去滓食前溫服一滓又作壹服

奔豚丸東垣 治腎之積發於小腹上至心下若豚

狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痠少
氣及治男子肉結疝女子痕聚帶下其脉
沉而滑

厚朴薑製 黃連炒伍錢 苦棟子酒煮

白茯苓另末 澤瀉 菖蒲各貳錢

玄胡索壹錢 附子去皮 全蝎

獨活各壹錢

川烏頭炮

丁香各伍分

巴豆霜肆分 肉桂貳分

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微澹再從貳丸加服淡鹽湯下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前壹兩貳錢如積勢堅大先服前藥不減於壹料中加存性牡蠣參錢疝帶下勿加如積滿腹或半腹先治

其所起是何積當先服本藏積藥諸疾自瘳是治其本也餘積皆然如服藥入覺熱加黃連如服藥人氣短加厚朴如服藥人悶亂減桂

三因奔豚湯

甘李根皮焙 乾葛 川芎

當歸 白芍藥 黃芩

甘草炙各壹錢半 半夏湯泡柒次貳錢

右作壹服水貳鍾薑伍片煎至壹鍾食前服

沉香石斛湯 治腎藏積冷奔豚氣攻少腹疼

痛上衝胸脇

沉香

石斛

陳麴

赤茯苓

去皮人參

巴戟

桂心

去麤皮

五味子

白朮

芎藭

各半

木香

肉豆蔻

各半

破煎至陸分去滓食前熱服

木香檳榔散 治積氣不散結伏奔豚發即上

衝心胸令人喘逆骨痿少力

木香

檳榔

磁石

訶梨勒

去核

牡蠣

桂心

懷香子

芎藭

沉香

白芷

炒各

陳橘皮

湯浸去白

右為細末每服貳錢炒生薑鹽湯下

萬病紫苑丸

元戎

治臍腹久患痲痺如碗大及

諸黃病每地氣起時上氣衝心繞臍絞痛

切蟲咬十種水病十種蠱病及反胃吐食

逆惡心食不消天行時病女人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛服之皆効

紫苑 去苗土 菖蒲 九節者去毛 吳茱萸 湯洗柴

柴胡 去鬚 厚朴 薑製壹兩 桔梗 去蘆

茯苓 去皮 旱莢 去皮弦 桂枝

乾薑 炮 黃連 去鬚 蜀椒 去目及閉口者微炒出

巴豆 去皮膜 人參 去蘆各半兩 川烏 炮去皮臍

羌活 獨活 防風 各半兩

右為細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服參丸漸加至伍丸柴丸生薑湯送下食後臨卧服有孕者不宜服此方分兩一依元板下有分兩而無各字川烏乃云半兩加參錢不知何謂考溫白丸方惟川烏貳兩半餘藥各半兩亦恐有訛重於變古姑仍之

痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血

痢米飲易下 墮傷血悶四肢不收酒下

蛔蟲咬心檳榔湯下 氣噎憂噎荷葉湯下
 打撲損傷酒下 中毒蒂灰甘草湯下
 一切風升麻湯下 寸白蟲檳榔湯下 霍
 亂乾薑湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆
 淋酒下 陰毒傷寒溫酒下 吐逆生薑湯
 下 飲食氣塊麩湯下 時氣井花水下
 脾風陳皮湯下 頭痛水下 心痛溫酒下
 大小便不通燈草湯下 因物所傷以本
 物湯下 吐水梨湯下 氣病乾薑湯下

小兒天吊風搐防風湯下防已亦可 小兒
 疳痢葱白湯下 小兒乳食傷白湯下 月
 信不通紅花酒下 婦人腹痛川芎酒下
 懷孕半年後胎漏艾湯下 有子氣衝心酒
 下 產暈痛溫酒下 血氣痛當歸酒下
 產後心腹脹滿豆淋湯下 難產益智湯下
 產後血刺當歸湯下 赤白帶下酒煎艾
 湯下 解內外傷寒粥飲下 室女血氣不
 通酒下 子死腹中葵子湯下 又治小兒

驚癇大人顛狂一切風及無孳婦人身上頑麻狀如
蟲行四肢俱腫呻吟走痛等疾楊駙馬患
風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服五丸至
七丸至二十日瀉出肉塊如蝦蟆五六枚白
膿二升愈趙侍郎先食後吐日無所見耳
無所聞服至五十日瀉青蛇五七條長四寸
許惡膿三升愈王氏患大風病眉髮墮落
手掌生瘡服之半月瀉出癩蟲二升如馬尾
長寸許後愈李靈患肥氣日服伍九經一

月瀉出肉鼈三枚愈茹黃門卒中風病發
時服藥泄出惡膿四升赤黃水一升肉蟲
如亂髮愈李知府妻楊氏帶下病七年月
崩不止骨痿着床日服五丸至十九十五丸
取下膿血五升黃水一升肉塊如雞子狀愈
此藥治一切萬病如神唯初有孕者不宜服
溫白丸和劑治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黃
疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下
堅結上來搶心傍攻兩脇十種水氣八種痞

塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛
積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切
諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉
髮墮落及療七十二種風三十六種遁尸症
忤及癩癩及婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝
五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及
腹中一切諸疾有似懷孕連年羸瘦困憊或
歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈即前
萬病紫苑丸方減羌活獨活防風

易老治五積 肺息賁人參紫苑 心伏采
葛蒲黃連桃仁 脾痞氣吳茱萸乾薑 肝肥氣
柴胡川芎 腎奔豚丁香茯苓遠志 俱於
溫白丸內加之
萬病感應丸於上溫白丸內加羌活三稜甘遂
杏仁防風各壹兩伍錢 威靈仙壹兩 却減蜀椒
厚朴丸見反胃
千金硝石丸 止可磨塊不令困人須量虛實
硝石陸兩 大黃捌兩 人參

甘州 各參兩

右為細末以三年苦酒也醋參升置器中以竹片作準每入壹升作壹刻先入大黃不住手攪使微沸盡壹刻乃下餘藥又盡壹刻微火熬便可丸如鷄子黃大每服壹丸如不用大丸作梧子大每服叁拾丸服後下如鷄肝米泔赤黑色等物下後忌風冷宜軟粥將息醋煮三稜丸寶鑑治一切積聚不拘遠年近日治之神効

京三稜

肆兩醋煮而炙竹刀切片曬乾

川芎

貳兩醋煮微曬切片

大黃

半兩醋浸濕紙裏煨過切

右為末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸温水下無時病甚者一月効小者半月効

神功助化散無大專治男子婦人腹中痞塊不拘

氣血食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄

瞿麥穗

大麥蘗

各伍錢

神麴

貳錢半

沉香

木香

各壹錢半

甘州

伍錢

大黃

貳兩

右為細末淨依分兩和勻男以燈心淡竹葉
二味等分煎湯及無灰酒同調服湯多於酒
婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒
同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事
一月藥須於黃昏服大小便見惡物為度

聖散子

寶鑑

治遠年積塊及婦人乾血氣

硃砂 各捌錢 大黃 各捌錢 麥蘖 陸兩炒
乾漆 炒煙盡 扁畜 茴香 炒
檳榔 各壹兩 婦人乾血氣加穿山甲 貳兩

右為細末每服伍錢臨卧溫酒調下仰卧此
藥只在心頭至天明大便如爛魚腸小便赤
為驗藥並無毒有神効小兒用壹錢十五以
上參錢空心服之更効此按古本校定今綱
目刻本硃砂乃陸兩
大黃乃捌兩
豈不悞人

雞爪三稜丸

治五藏疝癖氣塊

雞爪三稜 石三稜 京三稜
木香 青皮 去白 陳皮 去白
硃砂 參錢 檳榔 肉豆蔻 各壹兩

右為細末生薑汁打麵糊為丸桐子大每服
貳拾丸薑湯下空心臨卧各壹服忌一切生
冷硬粘物

硃砂煎丸 寶鑑 消磨積塊痞癖一切凝滯

黑附子 貳枚各重伍錢以上正坐受者炮裂去皮臍刻作窰子

硃砂 各壹兩 木香 各叁錢 破故紙 隔紙微炒

草撥 各壹兩

右將硃砂末用水壹觔續續化開納在窰內
火上熬乾為末安在附子窰內却用刻出附

子末填蓋口用和成白麵裹約半指厚慢灰
火內燒勻黃色去麵同木香等為細末卻用
元裏附子熟黃麵為末醋調煑糊為丸如桐
子大每服拾伍丸至叁拾丸生薑湯下
紅丸子 見傷飲食

削堅丸 治五積六聚氣結成塊食積癖痕心
腹脹滿瘦悴少食

鼈甲 醋浸兩宿去裙襴再醃醋炙黃取末秤

乾漆 搗碎炒令烟出取末秤 京三稜 剉如半棗大好

醋浸兩宿焙取末

細松烟墨燒去

沉香

肉桂去麁皮

乾薑炮

沒藥另研

蘿蔔子

乾蠍去毒炒

胡椒

檳榔

木香

硃砂

通明者為末用湯內飛另研各半兩

乳香另研

粉霜

另研

輕粉各貳錢半

為細末研勻好醋煮薄麵糊為丸如小菘豆
大每服貳拾丸淡醋煎生薑湯送下日進二
服夜間一服如未利漸加丸數服微利即減

二賢散 消積塊進飲食

橘紅壹斤淨

甘草肆兩

鹽半兩

右用水貳肆碗從早煮至夜以爛為度水乾
則添水晒乾為末淡薑湯調下有塊者加薑
黃半兩同前藥煮氣滯加香附貳兩同前
藥煮氣虛者加沉香半兩另入
噤口痢

加蓮肉貳兩另入

妙應丸即控涎丹見行痺

龍膏丸見脇痛

積聚

阿魏丸

去諸積

山查肉

南星

阜角水浸

半夏

同南星浸

麥芽

神麴

黃連

各壹兩

連翹

阿魏

醋浸

貝母

瓜萇

各半兩

風化硝

石碱

胡黃連

白芥子

各貳錢半

蘿蔔子

蒸壹兩

右為末薑汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治

嗽

阿魏丸

去肉積

阿魏

山查肉

各壹兩

連翹

伍錢

黃連

陸錢半

右三味為末以阿魏醋煮為糊丸如梧桐子

大每服伍陸拾丸食前用白湯送下脾胃虛

者用白朮

參錢

陳皮茯苓

各壹錢

煎湯送下

導痰湯

五飲湯

俱見痰飲

散聚湯

因三

治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下

發作心腹絞痛攻刺腰脇小腹臌脹大小便

不利

積聚

積聚

積聚

半夏湯洗 棗榔 當歸各柴錢半

陳皮去白 杏仁去皮尖 桂心各貳兩

茯苓 炙甘草 附子炮去皮臍

川芎 枳殼去穰炒 厚朴薑製

吳茱萸湯浸各壹兩

每服肆錢水壹盞薑參片煎柒分食前溫服

大便不利加大黃

沉香降氣散見氣 蘇合香丸見中風

宣明三稜湯 治癥瘕疝癖積聚不散堅滿痞

膈食不下腹脹

京三稜貳兩 白朮壹兩 蓬朮

當歸各半兩 檳榔 木香各柴錢半

右為末每服叁錢沸湯調下

三聖膏

用石灰拾兩細篩過炒紅急用好醋熬成膏

入大黃末壹兩 官桂末半兩 攪勻以瓦器封

貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

阿魏膏 治一切痞塊更服胡連丸

羌活

獨活

玄參

官桂

赤芍藥

穿山甲

生地黄

兩頭尖

大黃

白芷

天麻

槐柳桃枝

紅花

木鼈子

亂髮

右用香油貳斤肆兩煎黑去粗入髮煎髮化

仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏

蘇合油乳香沒藥各伍錢麝香叁錢調勻即

成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用真正

者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙盖用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨加減四物湯東垣治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黄

廣茂

桂去麋皮

京三稜

乾漆

炒烟盡各等分

右為麤末每服貳錢水貳盞煎法如常

當歸丸

丹溪

治婦人月經不調血積證

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黄

廣茂

京三稜

各半錢

神麴

百草霜

各貳錢半

右為細末酒糊為丸桐子大溫水下

牡丹散雲岐治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼

心痛

牡丹皮

桂心

當歸

玄胡索

莪朮

牛膝

赤芍藥

京三稜

壹兩半

右為麤末每服參錢水酒各半盞煎服
化氣湯三因治息積

砂仁

桂心

木香

各貳錢半

甘草

茴香

丁香皮

青皮

陳皮

乾薑

蓬朮

胡椒

沉香

各壹錢

右為細末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯下

痰飲

水煮金花丸古潔

南星

半夏各壹兩 俱生用天麻伍錢

雄黃貳錢

白麴叁兩

右為細末滴氷為丸每服伍拾丸至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮為度漉出淡漿水浸另用生薑湯下

防風丸和劑治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項

背拘急目眩旋暈心怔煩悶手足無力骨節

痰飲

八類之三

百四

此處為另一頁的模糊文字，內容難以辨認，但可見有「甘草」、「丁香」等字樣。

痰痺言語蹇澀口眼瞶動神思恍惚痰涎壅塞昏憤健忘虛煩少睡

防風洗

川芎

天麻去苗酒浸壹宿

甘草炙各貳兩

硃砂半兩研水飛

右為末煉蜜為丸每兩作拾丸以硃砂為衣

每服壹丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

川芎丸和劑

消風壅化痰涎利咽膈清頭目治

頭痛旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢

體煩癢皮膚瘙痒腦昏目疼鼻塞聲重面上

遊風狀如蟲行

川芎

龍腦薄荷葉焙乾各柒拾伍兩

桔梗壹伯兩

甘草燼叁拾伍兩

防風去苗貳拾伍兩

細辛洗伍兩

右為細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾丸

每服壹丸臘茶清細嚼下食後臨卧

化痰玉壺丸見頭痛

丹溪搜風化痰丸

人參

僵蠶

槐角

白礬

天麻

陳皮

去白

荆芥

各壹兩

半夏

肆兩湯浸

辰砂

半兩

右為末薑汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每服肆拾丸薑湯下

小黃丸

潔古

治熱痰咳嗽

南星

湯洗

半夏

湯洗

黃芩

各壹兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服伍柒拾丸生薑湯下食後

小柴胡湯

見寒熱

下之痰而不能食厚朴湯主之

胡椒理中丸

和劑

治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘

急逆氣虛痞胸膈噎悶脇腹滿痛迫塞短氣

不能飲食嘔吐痰水不止

欬冬花

去梗

胡椒

甘草

炙

葶撥

良薑

細辛

去苗

陳皮

去白

乾薑

各肆兩

白朮

伍兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸加至伍拾丸温湯温酒米飲任服無時日

吳茱萸湯仲景

吳茱萸壹升 人參叁兩

生薑陸兩

大棗拾貳枚

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服柒合

日叁服

桂苓味甘湯

見短氣

十棗湯

見水腫

小胃丹

芫花

好醋拌勻過一宿於瓦器內不住手攪炒令黑不可焦

甘遂

濕麩裹長流水浸半月煮晒乾

大戟

長流水煮壹時再用

大黃

濕紙裹煨勿令焦切焙乾再

黃礬

炒叁兩

右爲末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨卧津液

吞下或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消

息之欲利空心服

一方加木香檳榔各半兩

大青龍湯

仲景

麻黃

陸兩

桂枝

貳兩

甘草

貳兩

杏仁

肆拾粒

生薑

叁兩

大棗

拾貳枚

石膏 如鷄子大 碎如米

右七味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫
內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

小青龍湯 見咳嗽

小半夏湯 見嘔吐

澤瀉湯 仲景

澤瀉 伍兩

白朮 貳兩

水貳升煮壹升分溫再服

倍朮丸 和劑 治五飲 一曰留飲 停水在心下 二曰

澀飲 水在兩脇 三曰痰飲 水在胃中 四曰溢

飲 水溢在膈 五曰流飲 水在脇間 瀝瀝有聲
皆由飲水過多 或飲冷酒所致

白朮 貳兩

桂心

乾薑 各壹兩

右為末 蜜丸 每服貳拾丸 溫米飲下 加至叁
拾丸 食前服

大五飲丸 千金 翼

遠志 去心

苦參

藜蘆

白朮

烏魚骨

甘遂

大黃

石膏

桔梗

痰飲

領五

百九

五味子

半夏湯泡

紫苑

前胡

芒硝

栝蒌

桂心

肉蓯蓉

貝母

芫花

人參

當歸

茯苓

芍藥

大戟

葶藶

黃芩各壹兩

常山

甘州

薯蕷

厚朴

細辛

各柒錢

巴豆

參拾粒去皮心熬

右三十二味為細末煉蜜丸桐子大酒下參

丸日參服稍加之忌肉食生物飴飴冷水

五飲湯海藏治五飲最効

旋覆花

人參

陳皮去白

枳實

白朮

茯苓

厚朴製

半夏製

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

白芍藥

炙甘草已上各等分

右每壹兩分肆服薑拾片水貳盞煎至未分去滓溫服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

黃芩利膈丸

見卷二

滾痰丸

養生主論

痰之為病成偏頭風成雷頭風

成太陽頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或口
眼瞶動或眉稜耳輪俱痒或頷腮四肢遊風
腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則癢疹隨
生皮毛烘熱色如錦斑或齒頭似痒似痛而
疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噁氣吞酸
鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽隘不利
咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉

動而唾其痰如墨又如被絮或如桃膠或如
蜆肉或心下如停冰鐵閉滯妨悶噁噓連聲
狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劒戟或夢入人
家四壁圍繞暫得一竇百計得出則不知何
所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲
鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而
寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光
數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼
痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起

乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕
或卧如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不
舉或手足重滯或眼如薑蜚膠粘痒澀開闔
甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發
則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴
嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼
前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞶肉惕治之
者或曰腠理不密風府受邪或曰上盛下虛
或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾

苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣
交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼
花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間涌起凜然毛
豎噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍
止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫
緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而寧終不
能逐去病根乃得神祕沉香丸方屢獲大効
愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之
詩曰甌裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相

逢二八求斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中
零半兩水丸梧子意須斟除驅怪病安心志
水瀉雙身却不任

大黃蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過黃芩各捌兩

青礞石硝煨如金色沉香

百藥煎此用百藥煎乃得之方外秘傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎

聚于一處然後利下甚有奇功曰倍若沉者言五倍于與沉香非樣倍于沉之謂也以上各伍錢

右為朱水丸如梧子大白湯食後空心服

一切新舊失心喪志或癩或狂等證每服壹
百丸氣盛能食狂甚者加貳拾丸臨時加減
消息之一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或
通或結者每服捌玖拾丸或加至百丸永無
秘結之患一切陽證風毒脚氣遍身遊走
疼痛每服捌玖拾丸未効加至百丸一切
無病之人遍身筋骨疼痛不能名者或頭疼
牙痛或搖或痒風疰等證風寒鼻塞身體或
疼或不疼非傷寒證者服捌玖拾丸痰盛氣

百藥煎
百藥煎
百藥煎

實者加之。一切吞酸嘔逆膈氣及胸中疼悶腹中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如反胃心下恍惚如畏人捕怵傷不安陰陽關格變生垂證食飢傷飽憂思過慮心下嘈雜或痛或噦或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉赤眼每用加減服。一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭運目眩加減服之。一切顛頤腫硬若癩癧者及口糜舌爛咽喉生瘡者每服陸柒拾丸加蜜少許一處嚼碎噙化睡時徐徐嚥之曾

有口瘡者服貳叁拾丸依前法噙之二三夜瘡一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫煖者量虛實加減服之若事屬不虞之際至於百丸即便回生未至顛危者虛弱疑似之間只服三十九或五十九立見生意然後續續進之以瘡為度兼服生津化痰溫中理氣之藥。一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒內外等證或酒色過度或吐血或月事愆期

卷之二
頁之三
百一

心煩志亂或腹脹脇痛勞倦痰眩或暴行日
 中因暑伏痰口眼喎邪目痛耳憤鼻塞骨節
 酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無效眾
 醫不識者依前法加減服之効太抵服藥須
 臨卧在牀用熟水一口許嚥下便卧令藥在
 喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不
 可忍必欲急除者須是一依前卧法服大半
 日不可食湯水及不可起身行坐言語直候
 藥丸除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動

作方能中病每夜須連進二次次日痰物既
 下三五次者仍服前數下五七次或直下二
 三次而病勢頓已者次夜減貳拾丸頭夜所
 服並不下惡物者次夜加拾丸入壯病實者
 多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰服
 咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相
 攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往病
 久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者
 服藥下咽即仰卧頓然百骸安靜五藏清寧

痰食 類方二
次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物看甚麼糞用水攪之盡是痰片粘涎或稍稍腹痛腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉氣滑腸裏急後重者狀如痢疾片飽即已若有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者蓋因連日病苦不安一時為藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸太瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中

糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當目知之

利痰丸 玄珠

南星

阜角

石膏

牽牛 頭末

芫花 已上各貳兩

右為細末用薑汁糊丸如梧子大每服壹貳拾丸量入虛實用之薑湯下一方加青鹽伍錢巴豆許少青礞石色伍錢若風痰壅塞此

痰食

類方二

百六

痰飲

類方

百七

藥乃為先鋒服之痰即已如寒不宜用

導痰丸珠

大半夏

陸兩分作參分一分用白礬壹兩

為末浸水一分用肥阜角

明本二字闕

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半

月要常動水令二藥相透次相合處揀去巴

豆并阜角將餘水以慢火煮令水乾取出半

夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後入

甘遂製

百藥煎各貳兩

全蠍

殭蠶各壹兩

右為細末薄糊丸如梧子大每服拾丸或拾

伍丸亦量入虛實白湯下

妙應丸即控涎丸見行痺

祛風丸寶鑑

有人喜食酸鹹酒色過節滲注成

痰飲聚於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻

木升則頭目昏眩降則腰脚疼痛深則左癱

右瘓淺則厥然仆地此藥寬中祛痰搜風理

氣和血駐顏延年益壽

痰飲

類方

百七

半夏麴

荆芥 各肆兩

槐角子 炒

白礬 生

橘紅

硃砂 各壹兩

右為末薑汁糊丸每服伍陸拾丸生薑皂角

子仁湯送下日叁服

川芎丸 本

治膈上痰

川芎

貳兩細剉
慢火熬熟

川大黃

貳兩蒸
令乾

右件焙乾為末用不蛀皂角伍柒挺溫水揉

汁絹濾出查瓦罐中熬成膏和前貳味為丸

如桐子大每服拾伍丸小兒叁丸薑湯下

保和丸

見傷食

消暑丸

見傷暑

蘇子降氣湯

見氣

導痰湯

濟生

治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏

湯洗柒
次肆兩

天南星

炮去
皮

枳實

去瓤
麸炒

赤茯苓

去皮

橘紅

各壹兩

甘草

炙半兩

右以咀每服肆錢水壹盞薑拾片煎捌分食

後溫服

小半夏茯苓湯

和劑

半夏

茯苓 各等分

每服伍錢水壹盞半薑伍片煎柒分服無時

丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣

行水穀故為痰飲結聚胃膈嘔吐惡心脹滿

不食常服温脾順氣方見肩背痛

二陳湯和劑 治痰飲為患或嘔逆惡心或頭眩

心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃

不和並宜服之

半夏湯洗 橘紅 各伍兩 白茯苓 參兩

炙甘草 壹兩半

右吹咀每服肆錢水壹盞薑柒片烏梅壹枚

煎陸分不拘時熱服

青州白丸子 見中風 來復丹 見中暑

八神來復丹濟生

硝石 壹兩同硫黃為末磁器內以微火炒

五靈脂水澄清濾去 太陰玄精石 飛研壹兩

陳皮去白各 舶上硫黃透 沉香

木香堅實者 天南星粉白者 各壹兩

痰次 頁二

右為末飛麵糊丸如梧桐子大每服參拾丸
空心米飲送下

八味丸 見虛勞

六君子湯

人參

白朮

茯苓

陳皮

製半夏 各壹錢

炙甘草 伍分

水貳盞薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時温服
理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少
食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中

氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮 炒

乾薑

甘草 炙

茯苓

半夏 薑製

右為末水丸桐子大每服肆伍拾丸白湯下

補中益氣湯 見傷勞倦

七氣湯 見氣

越鞠丸 見鬱

附方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮

茯苓

半夏 各壹錢半

痰飲 卷之三 百二十一

旋覆花 青皮 桔梗 人參 各壹錢

枳殼 薑製 細辛 甘草 半錢

右作壹服用水貳鍾薑伍片煎壹鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡 半夏 薑製 茯苓 各貳錢

陳皮 木香 紫蘇

枳殼 甘草 各壹錢

右作壹服用水貳鍾生薑叁片烏梅壹箇煎

至壹鍾食遠服

桔梗湯 治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗 炒 半夏 薑製 陳皮 去白 各叁錢

枳實 麩炒 壹錢半

右作壹服水貳鍾薑伍片煎壹鍾不拘時服

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮 焙 草豆蔻 各半 前胡

枇杷葉 拭去毛炙黃

半夏 湯泡

痰飲 類方二 百二十一

類方二 百二十一

類方二 百二十一

類方二 百二十一

茯苓

去皮

人參

大腹皮

白朮

厚朴

去麤皮薑汁炙各壹兩

右咬咀每服肆錢水壹中盞生薑半分煎至

陸分去滓不拘時熱服

旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草

炙各半兩

枳殼

去瓢炙炒

石膏

細研各貳兩

赤茯苓

麥門冬

去心

柴胡

去苗

人參

各壹兩

犀角屑

防風

去叉

黃芩

各柒錢半

右咬咀每服伍錢水壹大盞生薑半分煎至五分去滓食後良久溫服

化涎散 治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石

煨研壹兩

鉛白霜

另研

馬牙硝

另研

雄黃

另研各壹錢

白礬

枯研

甘草

炙各貳錢半

龍腦

少許

右爲細末研勻每服壹錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用沙糖水調下半錢此藥大涼不可多服

辰砂化痰丸

治風痰安神志利咽膈清頭目

辰砂

飛研為衣

白礬

枯研各半兩

天南星

炮壹兩

半夏麴

叁兩

右為細末薑汁煮麴糊和丸如桐子大辰砂

為衣每服叁拾丸食後生薑湯下

半夏利膈丸

治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不

利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胸脇

引痛腹內有聲

半夏

湯洗叁兩

白附子

生用貳兩

白茯苓

去皮

白礬

生用

人參

去蘆

白朮

滑石

貝母

各壹兩

天南星

生用壹兩半

右為細末麴糊和丸如梧子大每服叁拾丸

食後薑湯下

破痰消飲丸

治一切停痰留飲

陳皮

去白

川薑

炮

京三稜

炮搥碎

草果

麴裏煨

良薑

濕紙裏煨

蓬朮

炮

青皮

各壹兩

半夏

湯泡七次叁兩

右為細末水煮麴糊和丸桐子大陰乾每服

痰飲

類方二

百三

伍拾丸食遠薑湯送下

化痰鐵刷丸 治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣

痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如
拽鋸竝皆治之此藥墜痰止嗽定喘

白附子炮 南星炮 半夏洗

白礬生用 寒水石 皂角去子

乾薑半 硃砂 輕粉各壹錢

右為細末水煮麵糊和丸如梧子大每服貳
參拾丸食後用淡薑湯下

沉香墮痰丸 治宿食不消咽膈不利咳嗽痰

涎頭自昏暈嘔逆惡心胸膈不快

沉香 木香各貳錢 青皮去白貳錢半

檳榔大者貳枚用 半夏麩貳兩

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大
每服貳拾丸不拘時薑湯下

茯苓丸 一名指迷 本治臂痛具指迷方中云有

入臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏
痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四

痰飲 類方二 百結

肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人爲此臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏 貳兩

茯苓 壹兩

枳殼 去瓢 肆兩

風化朴硝 貳錢伍分

如一時未易成但以當風處即乾如法

硝刮取用亦可

右爲細末生薑汁煮麵糊爲丸如桐子大每服參拾丸薑湯送下 累有久爲痰所苦夜

間兩臂如人抽掣兩手戰掉茶盞亦不能舉服此隨愈痰藥方多唯此立見功效

神仙墜痰丸 治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角 無虫蛀者刮去皮弦酥炙

白礬 壹兩貳錢生用 黑牽牛 壹斤取頭末肆兩

爲細末滴水丸梧子大每服參拾丸漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半月一月愈久服永無癱瘓之疾

搜飲丸 治證同前

痰飲 類方二 百壹

木瓜壹枚切下頂去瓢作罐用生白礬半夏
麴等分爲細末填木瓜內却用原頂蓋定麻
纒繫縛於飯甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和
丸如桐子大每服叁伍拾丸不拘時薑湯下
治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏叁兩搗爲末 皂角陸兩叁兩去黑皮酥炙

子搗碎以酒壹升接取汁去滓煎成膏將

半夏以膏和作餅以青蒿蓋出青衣如造

麴法搗羅爲細末 旋覆花壹兩 木香

檳榔各貳兩

右爲細末酒煮麵糊和丸如桐子大每服貳
拾丸食前用薑湯下

破飲丸 治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩

脇脹滿氣促胸腹結爲癥癖支滿胸膈旁及

兩脇搶心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心

疼積年宿食不消久瘧久痢遁戶疰忤顛瀧

厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉

能治之

葶撥 丁香不見火 縮砂仁

痰飲 類之三

蝠稍

胡椒

木香

不見火

烏梅肉

青皮

巴豆

去皮膜
各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日濾出
同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久
細研為膏入藥末和勻丸如菉豆大每服伍
柴丸臨睡生薑湯送下

八珍丸

治膈痰結實滿悶喘逆

丹砂

研半兩

犀角

鎊

羚羊角

鎊

茯神

去木

牛黃

研

龍腦

研各貳
錢半

牛膽南星

礪砂

研各壹兩

右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服
壹丸食後細嚼人參荆芥湯下

鵝梨煎丸

治熱痰凉心肺利胸膈解熱毒補
元氣

大鵝梨

貳拾枚去皮核
用淨布絞取汁

薄荷

生半斤
研汁

阜角

不蛀者拾挺去皮子
漿水貳升接取濃汁

白蜜

半升

生地黄

半斤研取汁同上伍
味慢火熬膏和藥

人參

白茯苓

去皮

白蒺藜

炒去刺

痰飲

類之三

百七

肉苁蓉 酒浸切 牛膝 酒浸 半夏 湯泡

木香 各壹兩 檳榔 煨貳兩 防風 去叉

青橘皮 去白 桔梗 炒 羌活

白朮 山藥 各柒錢半 甘艸 各半兩

右為細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子

大每服拾伍丸加至貳拾丸食後荆芥湯送

下日貳服

麝香丹砂丸 治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香 另研 木香 丁香

犀角 甘草 炙各貳錢半 龍腦 另研壹錢

人參 藿香 去梗 牛膽南星

防風 去叉 黃芪 各半兩 麥門冬 去心柒錢

丹砂 另研壹兩

右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每服壹丸

食後嚼破用荆芥湯下

金珠化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心

忪恍忽胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗑不利

阜角子仁 炒 天竺黃 另研 半夏 湯浸洗柒次生薑貳

痰飲

類之三

百七

兩去皮同搗作餅炙微黃白礬透明者枯過另研以上各肆兩

龍腦另研辰砂水飛研

右將阜角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁

煮麵糊丸如桐子大金箔貳拾片為衣每服

拾伍丸加至貳拾伍丸食後薑湯下

阜角化痰丸東垣治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉

中不利涕唾稠粘嗑塞吐逆不思飲食或時

昏憤

阜角木白皮酥炙

白附子炮

半夏湯洗

大南星炮

白礬枯

赤茯苓去皮

人參各壹兩

枳殼炒貳兩

右為細末生薑汁麵糊丸如梧子大每服叁

拾丸溫水送下食後

法製清氣化痰丸 順氣快脾化痰消食

半夏 南星去皮臍白礬

阜角切 乾薑各肆兩

右先將白礬等叁味用水五碗煎取水叁碗

却入半夏貳味浸兩日再煮至半夏南星無

白點為度晒乾

陳皮

青皮 去穰

紫蘇子 炒

蘿蔔子

炒另研

杏仁

去皮尖炒研

葛根

神麴

炒

麥蘖

炒

山查

香附

各貳兩

右為末蒸餅丸桐子大每服伍柒拾丸臨卧食後茶湯下

薛新甫曰一男子素厚味胸滿痰盛余以膏梁之人內多積熱與此丸服之而愈彼見有

驗修合餽送脾胃虛者無不受害

飛礬丹

化痰神効

白礬

通明者貳兩枯

白殭蠶

壹兩半用米醋浸一宿炒

半夏

湯洗朱次

南星

各壹兩切作片子用阜角壹兩半去皮弦用水

阜角不用只用南星

細末薑汁糊丸如桐子大米丸亦可每服拾

伍丸至貳拾丸薑湯下又治喉閉用薄荷

兩葉以新汲水浸少時嚼薄荷吞藥用水送

下嚥不得即用拾伍丸搗細用阜角水調灌

下即開 又治小兒急慢驚風牙關緊急不可開者亦用草角水調塗牙齦上入咽即活法製半夏御藥消飲化痰壯脾順氣用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏壹兩用白礬壹兩半研細溫水化浸半夏上留米兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸伍日夜取出焙乾用鉛白霜壹錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾以磁器收

貯每服壹貳粒食後細嚼溫薑湯下又一法依前製成半夏每壹兩用白礬水少許漬半夏細飛硃砂末淹一宿歛乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬焙用

神芎導水丸心印下同

黃芩壹兩

黃連

川芎

薄荷各半兩

大黃貳兩

滑石

黑牽牛頭末各肆兩

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久

病熱鬱無問瘦瘠老弱并一切證可下者始
自十九丸以為度常服此藥除腸胃積滯不傷
和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦
不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下
者使服四五十九丸未効再服以意消息常服
二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病
下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因
而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃
經虛風熱所鬱色黑齒稿身瘦萎黃或服甘

熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁
擾病於內則神志躁動佛鬱不開變生諸證
皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脉遲者或
婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服

十棗湯 見水腫

舟車神祐丸

甘遂

芫花

大戟

各壹兩 俱醋炒

大黃

貳兩

黑牽牛

頭末 肆兩

青皮

陳皮

木香

檳榔

各半兩

輕粉壹錢取蠱加蕪荑兩半為末水丸空心服
 河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切
 水濕為病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂
 溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣
 蠱腫留飲癰積氣血壅滯不得宣通風熱燥
 鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘡癩等患婦人
 經病帶下皆令按法治之病去如掃故賈同
 知稱為神仙之奇藥也緣此方河間所定初
 服五九日三服加至快利後却常服以病去

為度設病愈後平人能常服保養宣通氣血
 消運飲食若病痞悶極甚者便多服反煩滿
 不開轉加痛悶宜初服二九每服加一九加
 至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨
 強弱增損三四歲者三五丸依前法加減至
 戴人變為神芎丸神祕不傳然每令病人夜
 卧先服百餘粒繼以濬川等藥投之五更當
 下種種病出投下少未再服和膈藥須以利
 為度有五日一下者二日一下者病輕者可

一上度止重者五六度方愈是擒縱卷舒之
妙臨證制宜非言可諭觀其藥雖峻急認病
的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸
行事予每親製用之若合符節然又隨人強
弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治
法行之神効

大聖濬川散

- 大黃煨
- 牽牛取頭末
- 郁李仁各壹兩
- 木香叁錢
- 芒硝叁錢
- 甘遂半錢

評曰此下諸積之聖藥也諸濕爲土火熱能
生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥
乾濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能
宣通停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生
而熱氣多爲兼病內經云明知標本正行無
問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者
股膝腫厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去
者久則化氣在陰不去者久則成形世俗不
詳內經所言留者攻之但執補燥之劑怫鬱

轉加而病愈甚也法當求病之所在而為施
治瀉實補虛除邪養正以平為期而已又嘗
考戴人治法假如肝木乘脾土此土不勝木
也不勝之氣尋救于子巳土能生庚金庚為
大腸味辛者為金故大加生薑使伐肝木然
不開脾土無由行也遂以舟車丸先通閉塞
之路是先瀉其所不勝後以薑汁調滑川散
大下之是瀉其所勝也戴人每言導水丸必
用禹功散繼之舟車丸必以滑川散隨後如

寒疝氣發動腰脚膝急痛者亦當下之以瀉
其寒水世俗闇於治體一槩鹵莽有當下而
非其藥終致委頓而已豈知巴豆可以下寒
甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如
是分經下藥兼食療之非守一方求其備也
故戴人曰養生與攻病本自不同今人以補
劑療病宜乎不効是難言也

本草綱目卷之二十一
藥考
三

隨氣味甘平不燥不寒
姑蘇人曰養主與女麻本自不同今人又將
長分錄不藥兼食藥之非字下亦不其開
甘者表其何心不麻大黃皆前何人不可
非其藥於其年與而曰豈欲言其何也
其藥米其子開水飲之與麻本不同而

27

