

新中醫課程標準適用

中西合璧

醫藥湯頭歌訣

鮑國昌主編

范鳳源註釋

汪詠庵原著

(包括中醫有效驗方，中藥化學成分)

物品效高第一



消治龍牙膏

首創 化學 牙膏 消治 口腔 疾病

售出有均  房藥國全

信誼化學製藥廠發行

Préface

"The Song of Chinese Medical Prescriptions" was written by Mr. C. A. Wong at 1694. He was a rich pawnshop owner, tenderhearted person, who supported plenty of old experienced doctors, to make complete research work, collect all Chinese effective prescriptions, and compile them in written form as a long song, so that it would be easily read and remembered by all young doctors. In this way, this book was so famous and well-circulated throughout China, and is even now.

Sine Laboratory, under Mr. K. C. Bao's management, is well organized scientific medical laboratory, and manufactures all foreign up-to-date drugs. Mr. K. C. Bao was interested in this book, and instructed his staff to undertake extensive research of all Chinese medical ingredients, analyze the chemical constituents and test them by biological experiments. I collected the data, made the new notes in the old book under each paragraph, wishing that people who take the modern drugs and at same time take Chinese old drugs, understand how they effect their bodies.

This book, as originally written, contains 296 different Chinese drugs, which are usually used in prescriptions of present old-fashioned Chinese doctors. We wish that those who are interested in these drugs, make a farther research work of these ingredients

Dr. F. Y. FAN

October 11, 1946

時序

湯頭歌訣一書，爲清代康熙甲戌年，休寧汪認庵氏所編纂，汪氏係典當商，家富有，性慈善，但好虛名，懼末世而名不彰，乃聘請當地富有經驗之醫家多人，組成私人主持之研究集團，編訂醫書數種，醫方集解，即該集團中得意之代表作。嗣因卷帙浩繁，攜帶不便，復因敘述註解之體裁，記誦困難，乃撮其大要，編成韻言，節爲本書。又恐未能充分普及，乃斥貲刊印數萬本，以慈善名義，普遍分送，故流傳之廣，爲清代各家醫書中所僅見。（凡長江黃河流域之鄉里醫家，幾無不備本書者，其流傳之普遍，可見一斑。）其中所選方藥甚爲平允。凡傷寒，金匱，千金，外台，及宋明醫家，各方一律搜羅，毫無門戶之見，醫家或有奉爲鴻寶者，或有目爲庸俗者，見仁見智，各有不同，其實本書分門別類，實有一種擴清改進與整理之意義存在，較諸前此之醫學入門中方歌三百，東垣方歌二百八十首，便利甚多。至其對於中國醫學上有功與否，固另一問題也。

現代醫家認爲中醫學理，過於荒疏。惟中藥多可用之材，於是羣趨研究中藥之一途。但中藥之功用，實因中醫而顯著。中醫之經驗，以虛實寒熱等病情爲辨別之方針，於中藥上實有相當之聯係。苟廢除中醫，而專講化學及動物試驗之藥理，勢必將數千年之經驗，完全拋棄，而中藥之聯係，亦因此中斷矣。日本廢除漢醫，改用西藥之際，日醫尾孫城氏曾著和漢醫藥科學的研究一書，有云「倘將和漢醫藥，按於科學上而爲科學的研究，則所獲必有出人意外者。」近來日本新藥發明甚多，在世界醫學上已佔有相當地位。試一考其內容，尙多根據本草綱目所載藥理，認爲彼所發明者。我國醫藥界，苟不迎頭趕上，恐再經若干年後，中藥之爲日醫改裝發明，儘量買

於世界醫學之林，所餘無幾矣。中國醫學院教授，謝斐予氏，持醫藥湯頭歌訣一帙，囑余留一言，以爲紀念。鮑氏爲信誼藥廠總經理，取中醫通行之湯頭歌訣，用科學方法，規定主治，增加批語，並附以化學試驗及動物試驗等記載，證明方藥之功效，主治。西醫界得此可知中醫方劑之應用，中醫界得此，可知化學及動物試驗之證明。倘更再進一步，與中醫經驗混合研究，互相提攜，預期必有更多收穫也。茲舉下走所知，略述一二，以資印證。人參功效在恢復神經疲勞，促進新陳代謝，故有大補元氣之稱。但同時有堵塞淋巴液之副作用，故誤服之，或致胸悶。白朮有促進乳糜管吸收之效力，中醫以補脾胃之，內經載脾爲胃行其津液，中醫術語胃代表整個消化器具，脾爲胃行其津液云者，非乳糜管之功用而何，是可爲研究中藥多一參考材料也。

查編著之通例，與編著者有深切之關係，乃爲之作序表彰之，贊揚之。余與鮑氏，素昧平生，本無作序之資格，因斐予之囑，不願以不敏辭。中華民國廿九年雙十節時逸人氏誌於上海旅次

盛序

有清一代，名醫輩出，葉天士首倡於先，薛生白繼起於後，尤在涇，吳鞠通，費伯雄，馬培之，一再稱盛於世。而孟河遂爲一時名醫產生之地。余年十九，習醫於孟河馬培之徵君，初讀湯頭歌訣，醫宗金鑑，靈樞素問，仲景金匱，溫病條辨，傷寒類聚，繼隨師侍診，十有餘年，每日視察數十人，病情複雜，處方各異，深嘆中國醫藥之深奧，後來退上，與盛宜懷創辦廣仁善堂，担任醫務，臨診四十餘年，視察病人數萬以上，病有輕重，藥分大小，審情處方，頗費苦心。近年來科學昌明，西方醫藥灌輸東來，然而對於我中國向來難治之症，亦鮮良方，深嘆數千年來之醫藥，猶未登庶民於健康不病之路。醫藥難矣哉。我國古代雖多名醫，然未能使一切疾病，化爲烏有。我國古代醫書，多如汗牛，然良方妙藥，至有清一代，經多人深究，亦已發明殆盡，不過未經今日所謂科學方法整理而已。日本醫學初推崇於漢醫，繼採取醫學於西方，其研究之苦功，不謂不巨，然對於漢藥之發明，猶未及有清諸名醫之甚。西方醫藥，固有勝過於漢藥者，然治療之精細，則不及中醫之精微。同是中國人，同是中西醫，救人爲第一，固不論中藥西藥，但求有效則爲有功。近代仕女，偶有疾病，或求診於西醫，或求診於中醫，或皆全愈，或竟不能全愈，其過失不在中西之藥物，而在醫者之學歷與經驗深淺。中醫甚難研究，讀古書又費解，故終其生，能爲良醫者，必係絕對聰明且絕對用功之人。今而後利用科學分析，改良中醫，則中國醫藥之前途必有可觀也者。湯頭歌訣，在中國醫藥界中爲有價值之書，藥固平淡，用法則大有進出。必深察其意，用適其當，始不姑負任認庵先生最初輯輯是書之苦心。有清一代，如葉天士與鞠通等，莫不在此書深得三昧。豈可謂此書太淺者哉。鮑范二君用科學方法，整理此書，屢以結果，識諸於予，予惟以舊日臨床經驗，儘量告述。俾此書之成，有益於世，書成問序於余，余略綴數語以爲序。中華民國廿九年十一月二十四日盛伯藩序於廣仁堂，時年六十有五。

敘言

自有天地。即有生物。自有生物。即有醫藥。何以故。愛生而惡死者。生物之恒情也。凡生物之所以維護其生命之本能與技術。即醫藥產生之緣始也。試觀自然界中。動物之有靈性者。如鳥獸蟲蛇之類。有足以妨害其生命者。靡不有自療之本能。以維護其生命。何況人為萬物之靈。充其維護生命之本能。則謂醫藥之技術。從鴻荒開闢。即隨有生以俱來可也。惟當開化之初。生活簡單。且以人獸雜處。欲期克服環境。其有妨於生命者。如蟲獸飲食之所傷。及風雪水火之所侵。其所以自療之技術。始以憑藉草木金石。由偶然之發現。漸積歷驗而特為維持生命之要案。故醫藥之初步。僅為單方時代。此神農本經之所由集也。嗣後人事日繁。疾病之感染。勢必趨於複雜。更足為生命之威脅。思欲合併治療。以冀疾病之速愈。於是有複方之組織。此伊尹湯液之所由助也。及夫周秦兩漢。各種技術。日臻完密。如和緩越人長桑淳於元化之徒。起病之神妙。稽諸簡策。斑斑可考。南陽張氏仲景。著傷寒雜病論以後。而治療之定律。及方藥之變化。學者始有所遵循。泊乎唐宋金元之間。則發皇已達於極點。如真人之千金要方。搜羅鴻富。更為詳備。而巫明之和劑局方。則以定方頒於全國。為斷者祇須視病投劑。等於按圖索驥。果能對證發藥。靡不效如桴鼓。是故推原中國醫藥之真實價值。無須乎誇張歷史之悠久。亦不在乎侈談奇妙之理論。而在乎方藥之實驗。與夫治療之定律。蓋識病在乎辨證。辨證根據乎定律。憑定律以處方。按方制以配藥。岐伯有方之制。先賢又有十二劑之別。藥有君臣佐使。至於性味功用。各有專主與其副作用。誠能深切認識藥物之個性。根據治療之定律。則雖同是一方。可以兼治諸病。同是一病。而處方又自各殊。蓋其君臣佐使。性味功用。則隨各方之配合組織。而各奏其效能焉。故不明藥性。則無以制方。辨證不審。則無以識病。定律無深切之認識。不但所

處之方。不成其爲方。而以藥試病。病未有能愈者也。斯則對於醫者用藥處方。觀察其奏效與否。而優劣判矣。由此以觀。中醫之真實價值。既在乎藥效。當今科學昌明時代。從每種藥物。以分析其化學之成份。則對於病理之變化。生理之作用。以期合處方辨證之定律。未始非促進中醫於完全科學之階梯也。陸菴二君。少年英俊之士也。究心醫藥。抱融貫中西之思想。爰取中醫所結晶實驗之成方。採汪詡菴所纂之馮頭歌訣。將方中諸藥。擷取近代最新發現之藥理。加以詮釋。並酌附心得驗方。藉以介紹於學者。其志可嘉。殺青有期，爰爲述其涯略以告同志。

中華民國二十九年民族復興紀念日武進盛心如敘於春江之湄廬

目次

第一章 補液之劑

(胃痛，腹痛，虛弱，食慾不振，夢遺，肺癆，怠倦，咳嗽，自汗，盜汗，吐血，四肢酸痛，目昏，耳鳴，耳聾)

- 四君子湯.....一
- 六君子湯.....一
- 異功散.....一
- 香砂六君子湯.....二
- 升陽益胃湯.....四
- 黃耆建中散.....六
- 范氏月華丸.....六
- 牽朮建中散.....八
- 桑朮扶瀉湯.....九
- 紫苑湯.....一〇

目次

第二章 發表劑

- 百合同金湯.....一一
- 補肺阿膠散.....一一
- 小建中湯.....一三
- 黃耆建中湯.....一三
- 十四味建中湯.....一三
- 益氣聰明湯.....一五
- 范氏治肺結核法.....一六
- 范氏冲和膏.....一六

(傷寒，頭痛，身痛，腰痛，骨節痛，項背痛，惡寒，發熱，中風，乾嘔，氣喘，小腹痛，失眠，無汗，目痛，鼻乾，發斑，頭面腫，口渴，感冒，風寒咳嗽，瘰癧，癰疽，柔痲，喉痺，毒痢，斑疹，濕毒流注，赤眼，口瘡，便秘)

467632

麻黃湯.....一七
 桂枝湯.....一八
 大青龍湯.....一八
 小青龍湯.....一八
 葛根湯.....一九
 升麻葛根湯.....二〇
 九味羌活湯.....二一
 十神湯.....二二
 神朮散.....二三
 太無神朮散.....二三
 梅藏神朮散.....二三
 白朮湯.....二三
 麻黃附子細辛湯.....二四
 人參敗毒散.....二五
 再遣散.....二六
 麻黃人參芍藥湯.....二六
 神白散.....二七
 范氏治腥紅熱喉腫法.....二七

第三章 攻裏之劑

（傷寒，胃寒，便秘，發熱，譫語，自汗，擦擦，潮熱氣喘，中風，大小便不通，心煩，口渴，瘧疾，瀉痢）

大承氣湯.....二八
 小承氣湯.....二九
 三化湯.....二九
 調胃承氣湯.....二九
 木香檳榔丸.....三〇
 根實導滯丸.....三一
 溫脾湯.....三一
 蜜煎導法.....三二
 豬膽導法.....三二
 范氏治痢疾方.....三三

第四章 涌吐之劑

（卒中，痰壅，煩狂，昏沈，五疇，腹滿發乾，痰

厥，虛煩，頭痛，心下懊憹，身熱，心下結痛，霍亂，
(喉痺)

瓜蒂散……………三四

三聖散……………三四

參蘆散……………三五

梔子鼓湯……………三五

丹溪許白雲法……………三五

乾霍亂吐方……………三五

稀涎散……………三八

范氏治霍亂方……………三八

范氏痧藥水……………三九

范氏喉紅腫方……………三九

范氏治舌下腫方……………三九

范氏治赤眼方……………三九

范氏治瀉血方……………三九

第五章 和解之劑

(傷寒，中風，寒熱，胸脇痞滿，不欲食，心煩，喜

嘔，腹中痛，脇下痛，小便不利，口苦，耳聾，目眩

，頭痛，手足冷，便秘，下痢，咳嗽，月經不調，血

少，目暗，氣喘，中寒，吐瀉，霍亂，倦怠，嗜臥，

口渴，便赤，痛瀉)

小柴胡湯……………四〇

四逆湯……………四二

黃連湯……………四二

黃芩湯……………四二

黃芩加半夏生薑湯……………四二

芍藥甘草湯……………四三

逍遙散……………四三

八味逍遙散……………四三

藿香正氣散……………四四

六和湯……………四四

清脾飲……………四六

痛瀉要方……………四六

范氏治痢方……………四六

范氏治黃疸方……………四七

范氏治小腸瘵方.....四七

范氏治胸痺方.....四七

第六章 表裏之劑

(傷寒，發熱，汗出不解，熱結在腸，心下痞鞭，嘔而下利，往來寒熱，煩渴，譫語，胸滿，便秘，表證未除，裏證又急，風寒暑濕，氣血拂鬱，三焦俱實，頭目昏暈，目赤睛痛，耳鳴鼻塞，口苦舌乾，咽喉不利，唾涕稠黏，咳嗽上氣，小便赤澀，疳積腫毒，折跌損傷，瘀血，便血，腸出血，痔瘡，手足癩癢，丹毒癩疹，或身熱無汗，頭痛身痛，胸膈惡食，嘔吐腹痛，胸氣，癆疝，瘰癧，經水不調，或身體重疼，腰脚酸疼，或狂叫欲走，煩燥大渴，面赤鼻乾，兩目如火，身形拘急，鼻衄，黃疸，咳嗽，噎氣)

大柴胡湯.....四八

柴胡加芒硝湯.....四八

桂枝加大黃湯.....四九

防風通聖散.....四九

五積散.....五〇

熱料五積散.....五〇

五積突加散.....五一

三黃石膏湯.....五一

葛根黃連黃芩湯.....五二

參蘇散.....五二

芎蘇散.....五三

香蘇散.....五三

茵陳丸.....五四

大羌活湯.....五四

范氏手足麻痺風濕神經痛方.....五六

范氏治滿口發麻方.....五六

范氏治胃腸炎方.....五六

第七章 消導之劑

(胃不消化，痰飲，痞滿，瀉悶吐瀉，不服水土，胃寒，腹痛，瘵疫，痢疾，身重足軟，肢酸膚腫，胃痛，食積，泄瀉，吐酸，下痢，氣鬱，痰厥或結或瀉，

，或惡食懶倦，或久病不愈，腹中結塊，滯積，頭痛，小便不利）

- 平胃散.....五七
- 藿香平胃散.....五七
- 人參養胃散.....五八
- 除濕湯.....五八
- 和解散.....五八
- 對金飲子.....五八
- 厚朴溫中湯.....五八
- 加味平胃散.....五八
- 保和丸.....五九
- 小保和丸.....五九
- 大安丸.....五九
- 健脾丸.....六〇
- 益氣健脾丸.....六〇
- 養榮健脾丸.....六〇
- 理氣健脾丸.....六〇
- 舒鬱健脾丸.....六一

目 次

- 化痰健脾丸.....六一
- 清火健脾丸.....六一
- 和中健脾丸.....六一
- 妙應丸.....六一
- 寬中進食丸.....六一
- 參耆白朮散.....六一
- 損實消痞丸.....六二
- 鼈甲飲.....六四
- 葛花解醒湯.....六五

第八章 理氣之劑

（煩勞，頭痛，惡寒，惡食，便秘，自汗，血少，乏力，脾弱，咳嗽，胸膈痛，風濕一身痠痛，胃寒氣滯，腹脹，咽痛，大便滯泄，食不知味，食入反出，口渴，經水不調，或中風，傷身頑麻，骨節疼痛，語言蹇澀，口眼喎邪，喉中氣急有痰，肺逆喘嗽，或胸膈痞痛，心腹絞痛，或嘔逆不已，或氣喘）

- 補中益氣湯.....六六

調中益氣湯	六七
參朮益胃湯	六七
升陽順氣湯	六七
益胃升陽湯	六七
補中益氣加黃柏生地湯	六八
順氣和中湯	六八
調營養衛湯	六八
烏藥順氣湯	六九
越鞠丸	七一
蘇子降氣湯	七二
四七湯	七三
七氣湯	七三
四磨湯	七四
五磨飲子	七四
代赭旋覆湯	七四
紺珠正氣天香散	七五
橘皮竹茹湯	七五
金匱樹皮竹茹湯	七五

丁香柿蒂湯	七六
定喘湯	七七
范氏治淋疾法	七七
范氏治耳聾出膿發癢方	七八

第九章 理血之劑

(血虧，止血，目赤，生瘡，便溺，經水色黑，肺痿，肺癰，吐血，舌焦，口渴，失眠，尿血，胃出血，大便色黑，瀉痢，腹痛，小便不瀉，四肢煩痛，寒熱，小便刺痛，鼻衄，跌傷，半身不遂，胎動，面腫，頭痛，手足攣痺，錯語失神，毛髮脫落，發汗過多，怔忡，健忘，胸膜炎，舌卷，陰痿瘡，手足厥冷，陽毒發斑，痔瘡，痔漏，子宮出血)

四物湯	七九
知柏四物湯	八〇
滋陰降火湯	八〇
坎離丸	八〇
三連四物湯	八一

三黃四物湯	八一	人參養榮湯	八七
三黃補血湯	八一	歸脾湯	八八
元戎四物湯	八一	養心湯	八九
治風六合湯	八一	當歸四逆湯	八九
治血六合湯	八一	桃仁承氣湯	九〇
神應養真丹	八一	桃仁承氣飲	九〇
防風當歸散	八一	犀角地黄湯	九〇
四神湯	八一	咳血方	九一
膠艾湯	八一	秦艽白朮丸	九二
艾附煖宮丸	八一	秦艽蒼朮丸	九二
婦寶丹	八二	秦艽防風湯	九二
芎歸湯	八二	秦艽羌活湯	九二
佛手散	八二	秦芫當歸湯	九二
八珍湯	八二	槐花散	九三
十全八補湯	八三	槐角丸	九三
大補黃耆湯	八二	加減四物湯	九三
三合散	八二	當歸和血散	九三
生地黃連湯	八三	加減槐花散	九三

- 小薊飲子.....九四
- 四生丸.....九四
- 復元羌活湯.....九五
- 范氏治痺滯方.....九五
- 范氏治肺癆吐血方.....九五

第十章 祛風之劑

（中風不省人事，半身不遂，口眼喎邪，語言蹇澀，風濕腰痛，柔痲，剛痺，麻木不仁，痰壅尿酸，瘡風，腰膝作痛，頭目昏痛，項背拘急，鼻壅聲重，皮膚頑癩，癩疹癢癢，婦人面腫，正偏頭痛，惡風有汗）

- 小續命湯.....九六
- 麻黃續命湯.....九七
- 桂枝續命湯.....九七
- 白虎續命湯.....九七
- 葛根續命湯.....九七
- 附子續命湯.....九七
- 桂附續命湯.....九七

- 羌活連翹續命湯.....九七
- 古今錄驗續命湯.....九七
- 千金大續命湯.....九七
- 大秦朮丸.....九八
- 易老天麻丸.....九八
- 三生飲.....九九
- 地黃飲子.....〇〇
- 獨活湯.....〇〇
- 順風勻氣散.....〇一
- 黃柏蒼朮丸.....〇一
- 獨活寄生湯.....〇二
- 羌活續命湯.....〇二
- 消風散.....〇三
- 川芎茶調散.....〇四
- 清空膏.....〇四
- 人參荊芥散.....〇五
- 范氏治尿酸痛風方.....〇五
- 范氏治口唇歪斜舌大言語模糊不清方.....〇五

第十一章 祛寒之劑

(傷寒腹痛，自利不渴，寒多而嘔，腹痛裏瀉，脈沉無力，厥冷拘急，結胸吐衄，麻寒霍亂，服瀉藥而不瘳者，頭痛，發熱，鼻淵，泄瀉，口燥，咽乾，四肢沉重，小便不利，或欬或嘔，汗出不解，心悸頭眩，風濕相搏，身體煩疼，中寒發厥，心痛，惡寒，腳掣，急，項痛，吐沫，寒疝，臍下冷，引腰膀而痛，陰黃，直，膚粟胸痞，小便赤少，飲水不入咽，指甲唇青，無脈，五更泄瀉)

理中湯	〇六
理中丸	〇六
附子理中湯	〇六
枳實理中丸	〇六
理中安就丸	〇七
桂枝人參湯	〇七
連理湯	〇七
補中湯	〇七

溫胃湯	〇七
黃耆湯	〇七
治中湯	〇七
真武湯	〇八
附子湯	〇八
四逆湯	〇八
尤附湯	〇九
乾姜附子湯	〇九
姜附歸桂湯	〇九
姜附歸桂參甘湯	〇九
白通湯	〇九
四逆加入參湯	〇九
茯苓四逆湯	〇九
芍藥甘草附子湯	〇九
甘草乾姜湯	〇〇
茱萸四逆湯	〇〇
當歸四逆湯	〇〇
茵陳四逆湯	〇〇

同陽返本湯	一一〇
漿水散	一一〇
白通加入尿猪胆汁湯	一一二
葱熨灸灸法	一一二
吳茱萸黃湯	一一三
吳茱萸附子湯	一一三
益元湯	一一四
回陽急救湯	一一四
四神丸	一一五
二神丸	一一五
五味子散	一一五
二香四神丸	一一五
厚朴溫中湯	一一五
導氣湯	一一六
疝氣方	一一六
檳榔丸	一一七

第十二章 祛暑之劑

(感冒，暑氣，頭痛，頭重，自汗，肢倦，煩悶，吐瀉，傷風，咳嗽，身熱，腹脹，怔忡，咳則心痛，喉中介或腫，無乳，痢疾，失眠，消渴)	
四味香薷飲	一一八
黃連香薷飲	一一八
三物香薷飲	一一八
五物香薷飲	一一八
六味香薷飲	一一八
十味香薷飲	一一八
二香散	一一九
清暑益氣湯	一一九
黃耆人參湯	一一九
補肝湯	一二〇
糖脾飲	一二〇
生脈散	一二〇
五味子湯	一二〇
補氣湯	一二〇
茯神湯	一二一

六一散	一一三
益元散	一一三
鷓鴣散	一一三
碧玉散	一一三
溜六丸	一一三
溜六丸	一一三
三生益元散	一一三
茱萸六一散	一一三
黃耆六一散	一一三
范氏治暑天食後胸悶不舒消化不良方	一一三
范氏治夏月小兒滿身紅腫小便短赤方	一一三

第十三章 利濕之劑

(傷寒外感，口乾，汗出，失眠，小便不利，微熱，泄瀉，身熱頭痛，頭重，膀胱積熱，便秘，霍亂，吐瀉，痰飲，濕痺，身痛，身重，嘔吐，腹脹便赤，眩冒，泄瀉，水疝，大汗不止，黃疸，反胃，食入即吐，水腫，水脹，喘呼，一身蠱痛，淋濁，尿血，膀胱

目次

炎，脚氣	一一四
五苓散	一一四
四苓散	一一五
辰砂苓五散	一一五
蒼朮五苓散	一一五
茵陳五苓散	一一五
元戎五苓散	一一五
桂苓甘露飲	一一五
豬苓散	一一五
桂苓丸	一一五
澤瀉湯	一一五
茯苓白朮湯	一一五
白茯苓湯	一一五
春澤湯	一一五
二朮四苓湯	一一六
陶節庵導赤散	一一六
茯苓琥珀湯	一一六
胃苓湯	一一六

留菴湯	一二六
榮菴湯	一二六
姜棗五苓散	一二六
小半夏加茯苓湯	一二七
大半夏湯	一二七
腎著湯	一二七
舟車丸	一二八
瀼川散	一二八
疏鑿飲子	一二九
實脾飲	一二九
五皮飲	一三〇
羌活勝濕湯	一三〇
羌活除濕湯	一三〇
升陽除濕湯	一三〇
大榆皮湯	一三一
茵陳蒿湯	一三一
茵陳三物湯	一三二
茵陳將軍湯	一三二

八正散	一三二
草解分清飲	一三三
縮泉丸	一三三
當歸拈痛湯	一三四
范氏右腦氣痛方	一三四
范氏左腦痛方	一三四

第十四章 潤燥之劑

(心動悸，肺痿，咳嗽多，呃逆，血少，皮膚皸枯，筋急爪枯，大便乾秘，津液枯少，胃脘有死血，食下作痛，翻胃，全不思食，痔瘡，肛門燥澀，幽門不通，中風，偏身虛癢，脈來浮數，腸出血，癱瘓，腎消，腰脚無力，兩腿漸細，早洩，擾護腺炎，咽乾面赤，喘促，頭眩體重，身痛肢倦，口渴)

炙甘草湯	一三五
滋燥養榮湯	一三五
活血潤燥生津湯	一三六
菲汁牛乳飲	一三六

潤腸丸.....	一三七
活血潤燥丸.....	一三七
潤燥湯.....	一三七
枳實潤腸丸.....	一三七
通幽湯.....	一三八
當歸潤腸湯.....	一三八
搜風順氣丸.....	一三八
消渴方.....	一三九
白茯苓丸.....	一三九
豬腎腎荒湯.....	一四〇
地黃飲子.....	一四〇
酥蠶糖膏.....	一四一
消燥湯.....	一四一
范氏治精尿方.....	一四二
范氏治風濕痺痛方.....	一四二
范氏五苓四物湯.....	一四二

第十五章 瀉火之劑

目次

(內熱，狂躁，煩心，口燥咽乾，乾嘔，錯語，失眠，吐血，衄血，發斑，二便閉結，濕痰，夜熱，頭項腫痛，目赤口瘡，消渴，羸瘦，癡汗，咬牙，夢語，驚悸，勞嗽，骨蒸，胸滿不痛，胸痞，飲食不下，臨下有水氣，下利，遺尿，濕溫，濕熱，濕瀉，暑嗽，肌熱，小兒急驚，痘瘡黑陷，遺精，淋濁，崩帶，口臭，喉瘡，齒齦寬露，牙痛，肺癆，臍痛，耳聾，胆溢口苦，陰腫陰痛，洩血，頭暈目眩，盜汗，噤口痢，胃脘痛，痧子，麻疹，雷頭風，咽痛，喉痺，中風不語，吐酸，疔肉，鼻淵)	
黃連解毒湯.....	一四三
柏皮湯.....	一四三
梔子柏皮湯.....	一四三
三黃瀉心湯.....	一四三
三黃丸.....	一四三
三黃石膏湯.....	一四四
三黃金花丸.....	一四四
梔子金花丸.....	一四四

大金花丸.....	一四四	甘露飲.....	一四九
附子瀉心湯.....	一四四	桂苓甘露飲.....	一四九
半夏瀉心湯.....	一四五	瀉胃散.....	一五〇
甘草瀉心湯.....	一四五	瀉黃散.....	一五〇
生薑瀉心湯.....	一四五	錢乙瀉黃散.....	一五〇
枳實消痞丸.....	一四五	瀉白散.....	一五一
白虎湯.....	一四六	加減瀉白散.....	一五一
人參白虎湯.....	一四六	瀉清丸.....	一五一
白虎加蒼朮湯.....	一四六	龍胆瀉肝湯.....	一五二
桂枝白虎湯.....	一四六	當歸頭會丸.....	一五二
柴胡石膏湯.....	一四六	左金丹.....	一五三
化斑湯.....	一四六	秦連丸.....	一五三
竹葉石膏湯.....	一四七	戊己丸.....	一五三
升陽散火湯.....	一四七	瀉附六一湯.....	一五三
火鬱湯.....	一四七	導赤散.....	一五四
陶節庵升陽散火湯.....	一四七	瀉骨散.....	一五四
涼膈散.....	一四八	普濟消毒飲.....	一五四
蓮子清心飲.....	一四九	清蘆湯.....	一五五

甘桔湯	一五五	四肢不和，肺炎，嗜雜，驚悸，健忘，麻木，心懸如飢，中風，痰迷，舌強不能言，口眼喎邪，癱瘓，小兒驚風，泄瀉，堅痰，五更咳嗽，傷風，頭目昏痛，
甘草湯	一五六	喘疾
甘桔防風湯	一五六	二陳湯
如聖湯	一五六	六君子湯
桔梗湯	一五六	陳皮半夏湯
訶子清音湯	一五七	桔梗半夏湯
枳桔湯	一五七	半夏茯苓湯
清咽太平丸	一五七	茯苓半夏湯
消斑青黛散	一五七	二陳加樹連生薑湯
辛夷散	一五八	砂仁枳殼二陳湯
蒼耳散	一五九	導痰湯
妙香散	一五九	葛蒲導痰湯
范氏治肺癆方	一五九	順氣導痰湯
范氏治肝胃不和胸肋膈中作痛方	一五九	加味二陳湯
		溫中化痰丸
		三瓊丸

第十六章 除痰之劑

(痰飲，咳嗽，脹滿，嘔吐，惡心，頭眩心悸，便秘，眼閉，喉閉，顛狂，面黃，嗜臥，口臭，脅下痛，

橘皮湯	一六二
生薑半夏湯	一六二
消界丸	一六二
潤下丸	一六三
潏痰湯	一六三
青州白丸子	一六三
清氣化痰水	一六四
順氣消食化痰丸	一六四
礞石滾痰丸	一六五
竹瀝達痰丸	一六五
奪命丹	一六五
金沸草散	一六六
半夏天麻白朮湯	一六六
常山飲	一六七
欬癆七寶飲	一六七
范氏治癆方	一六八

第十七章 收瀉之劑

（滑精，白濁，強中，消渴，胃中濕熱，滲入膀胱，虛寒泄瀉，腸鳴腹痛，脫肛，小便數而短，盜汗，發熱，發厥，飢倦）	
金鎖固精丸	一六九
養菟丹	一七〇
治濁固本丸	一七〇
詞子散	一七一
桑螵蛸散	一七一
真人養臟湯	一七二
當歸六黃湯	一七二
柏子仁丸	一七三
壯羈散	一七三

第十八章 殺蟲之劑

（吐衄，寒厥，胃脘發熱，咳而嘔，久痢，腸胃，諸蟲）	
烏梅丸	一七四
化蟲丸	一七四

范氏治疥疽風癩方.....一七五

第十九章 癰瘍之劑

(癰疽腫毒，惡瘡，癆瘵，肺癰)

與人活命飲.....一七六

金銀花酒.....一七六

同毒金銀花湯.....一七七

忍冬膏.....一七七

託莖十補散.....一七七

託莖溫中湯.....一七八

託莖定痛湯.....一七八

散腫潰堅湯.....一七九

范氏治乳疽結塊方.....一七九

范氏治脫疽方.....一七九

第二十章 經產之劑(附痧痘方)

(妊娠傷寒，頭痛，身熱，無汗，有汗，肢節煩痛，

濕毒發斑，胸滿，便秘，咳嗽，失眠，血崩，胞衣不

下，胎死腹中，昏暈，中風，子癰，瘵勞，產後虛損，
血塊走注，經行不正，潮中，經中止，痘症)

表實六合湯.....一八〇

表虛六合湯.....一八一

風濕六合湯.....一八一

升麻六合湯.....一八一

柴胡六合湯.....一八一

大黃六合湯.....一八一

人參六合湯.....一八一

朴實六合湯.....一八一

梔子六合湯.....一八一

石膏六合湯.....一八一

茯苓六合湯.....一八一

膠艾四物湯.....一八一

附子六合湯.....一八一

四物大黃湯.....一八一

膠艾湯.....一八一

當歸散.....一八三

黑神散·····	一八三	固經丸·····	一八七
清魂散·····	一八四	柏子仁丸·····	一八七
羚羊角散·····	一八四	望梅丸·····	一八八
雷歸羊肉湯·····	一八五	骨灰固齒散·····	一八八
當歸生薑羊肉湯·····	一八五	軟脚散·····	一八八
遼生散·····	一八五	稀痘神丹·····	一八九
參朮飲·····	一八六	元參薏苡子丸·····	一九〇
朱丹溪參朮湯·····	一八六	種牛痘法·····	一九〇
牡丹皮散·····	一八六	范氏紫石門冬丸·····	一九〇

湯頭分析

鹽類

腦神經細胞亢奮，容易癱瘓……………二敗湯
動脈硬化，容易中風……………大桑朮丸

人體缺乏各種物鹽之結果：——

胃口不佳……………升陽益胃湯，調中益氣散

流汗……………黃耆龍甲散，秦艽龍甲散

疲乏……………黃耆龍甲散，秦艽扶蘇湯

肌肉酸楚……………小建中湯，人參養榮湯

失眠……………歸脾湯，三生益元散

人體缺乏石灰質之結果：——

抵抗力減少……………四君子湯，建脾丸

生活力衰弱……………十四味建中湯

心理憂鬱……………舒鬱健脾丸，二陳湯

齒骨酸痛……………骨灰固齒散

人體缺乏銅質之結果：——

赤血球與鐵不易溶合……………加味平胃散，歸脾飲

人體缺乏鈣質之結果：——

人不生愛情，生殖器發育受阻……………紫石門冬丸

人體缺乏磷質之結果：——

腦力神經細胞核缺少營養……………四君子湯，金鎖固精丸，桑螵蛸散

人體缺乏鐵質之結果：——

貧血……………露天膠，代糖旋覆湯，白茯苓丸

人體缺乏碘質之結果：——

肩形展露指，人覺疑呆..... 柏子仁丹，牡蠣散

甲狀腺不分泌..... 黃耆蠶甲散

新陳代謝作用減低..... 秦尤扶羸湯

元氣衰弱..... 秦尤扶羸湯

發育阻害..... 黃耆蠶甲散

人臨癆瘵脂肪作用阻止..... 黃耆蠶甲散

咽喉容易腫大..... 百合固金湯

人體缺乏鎂質之結果：——

消化不良..... 藿香平胃散，六合湯

大便不通..... 保和丸

痰多鼓脹..... 六君子湯

癆瘵虛損..... 十四味建中湯

人體中礦物鹽太多之結果，（須用維他命B

治療之）

腎虛炎..... 五苓飲

人體之血液中鎂質太多之結果：——（須用

維他命A治療之）

細胞之酸化作用減低，脂肪不易吸收，人易衰老..... 四君子湯

維他命類

人體缺少維他命A之結果：——

皮膚乾燥..... 柏子仁丸

淚腺分泌停止..... 防風通聖散

眼粘膜乾燥，赤眼..... 人參敗毒散

男女生殖機能減退性慾消失..... 十四味建中湯，大補黃耆湯

肺炎..... 加減瀉白散

氣管支炎..... 人敗毒湯散

中耳炎..... 益氣聰明湯

尿道炎..... 人參養榮湯，防風通聖散

小兒腹中蛔蟲..... 烏梅丸

人體缺乏維他命B₁之結果——（即維他命F）

水腫..... 五皮飲，實脾飲

脚氣病.....五皮飲

心臟障害.....小柴胡湯加竹葉梗米

頭痛.....半夏天麻白朮湯

貧血.....四君子湯，神應養真丹

手足麻痺.....神應養真丹，小續命湯加竹瀝石膏

髮白.....養血五苓散

神經末梢退縮.....白茯苓丸

兩腿肌肉弱而痛.....白茯苓丸

胃擴張.....加味平胃湯

嘔逆.....檀皮竹茹湯

腹痛泄瀉.....保和丸，升陽除濕湯

人體缺乏維他命B₂之結果：——（即維他命G）

不眠.....歸脾湯

毛髮脫落.....四君子湯

指甲損動.....四君子湯

大腸炎，慢性下痢.....香砂六君子湯

皮膚炎.....人參養榮湯

渴頭分析

白內障.....益氣聰明湯

人體缺乏維他命C之結果：——

白斑病.....人參敗毒散

牙牀易出血.....甘露飲

人體缺乏維他命D之結果：——

軟骨病.....十四味建中湯，桑朮扶羸湯

肺結核.....黃耆蠶甲散，月華丸

人體缺乏維他命E之結果：——

生殖器官萎縮.....健脾胃丸

人體缺乏維他命H之結果：——

脂漏性皮膚病.....人參養榮湯，四君子湯

禿頭.....養血五苓散

人體缺乏維他命I之結果：——

腸管障礙.....六和湯

人體缺乏維他命J之結果

肺炎

加減瀉白散

人體缺乏維他命K之結果

皮下出血

黑神散

人體缺乏維他命L之結果

乳汁分泌停止

大補黃耆湯

人體缺乏維他命P之結果

出血性紫斑病

二陳湯

糖類(碳水化合物)

人體缺乏糖類(碳水化合物)之結果

乏力

歸脾湯

人體中糖類太多之結果

糖尿病.....白茯苓丸, 消渴丸, 范氏替尿方

多汗.....秦光扶真湯

尿少.....五苓散

筋骨酸痛.....黃柏打虎丸

尿毒.....小柴胡湯, 大秦芩丸

中風.....小續命湯

卒倒.....三生飲

齒齦.....甘露飲

血液酸性.....回生丸

蛋白質

人體缺乏蛋白質之結果

消瘦.....當歸羊肉湯

瘡疾.....逍遙散

人們多食蛋白質之結果

腎臟炎.....五皮飲

感冒病	防風通聖散
瘰癧石病	加味枳朮湯，茵陳丸，越鞠丸
濕疹	升麻葛根湯，茵陳四逆湯
癩癬疹	茵陳四逆湯
皮膚發癢	犀角消毒散
神經靈敏	歸脾湯
失眠	五苓散，歸脾丸
便秘	補中益氣湯
血脈亢逆	獨活湯，小續命湯
動脈硬化	烏藥順氣散
神經病	順風勻氣散
神經衰弱	人參養榮湯
常習性頭痛	清空膏
腦溢血	人參荊芥散
眼底出血	犀角地黄湯
胃潰瘍	當歸澤蘭湯
盲腸炎	桃仁承氣湯
膀胱結石	益元散

湯頭分析

脫疽	范氏脫疽方
肉類中毒	歸脾湯
眩暈	川茶芎藭散
嘔吐	大牛夏湯
頭痛	消風散，生地黃連湯
放惡臭之屁	素食，細嚼
白髮	菟絲五苓散

脂肪類

人體缺乏脂肪之結果：——

與人體缺乏維他命A與D之結果，同

人多食脂肪之結果：——

停止發育

中風

新陳代謝減退

衰老

動脈硬化

人參養榮湯

獨活湯

四君子湯

四君子湯

烏藥順氣散

虛石..... 越鞠丸，茵陳丸

肝竅結石..... 越鞠丸，茵陳丸

賀爾蒙

人體缺乏新陳代謝的賀爾蒙如甲狀腺，腺髓

，副腎甲狀腺之結果.....

新陳代謝阻止..... 秦朮扶瀉湯

粘液水腫症..... 牡蠣散

糖尿病..... 范氏治糖尿方

人體缺乏生育之賀爾蒙（如腦下垂體，胸腺，

松果腺）之結果.....

生育機能不發達，生殖器萎縮..... 健脾丸

人體缺乏生殖的賀爾蒙（如睪丸，卵巢，胎盤）

，之結果.....

精液缺乏..... 豬腎雞尾湯

不孕症..... 紫石門冬丸，朱丹溪參朮湯

檢血

(1) 白血球多..... 發炎..... 黃芩湯，白虎湯，

白血球少..... 傷寒..... 大柴胡湯，五苓散，

調胃承氣湯，麻黃湯，桂枝湯

，柴葛解肌湯，越婢加半夏湯

，犀角大青湯，三黃解毒湯

癆病..... 黃芩雞甲散，月華丸，范氏治

肺結核方

瘧疾..... 范氏治瘧方，木香檳榔丸，欬

總飲，保和丸

白血球數 7000—8000..... 正常無病

(2) 赤血球多..... 心臟衰竭病..... 加減瀉白散，補氣湯

中煤氣毒..... 人參敗毒散

赤血球少..... 貧血..... 露天膠，代豬旋覆湯，白茯苓丸

赤血球數 5000000—6000000..... 正常無病

(3) 分類 (a) 多形核白細胞..... 發炎..... 黃芩湯，小柴胡湯

(b) 淋巴細胞..... 癆病..... 月華丸

傷寒..... 麻黃湯

(c) 大單核白細胞..... 寄生蟲..... 烏梅丸，化蟲丸

(d) 嗜伊細紅細胞(衰假幸)寄生蟲....., 烏

梅丸, 化蟲丸

(e) 嗜嗜中性細胞: 骨病: 地黃飲子, 白茯苓丸

(4) 血色素..... 貧血..... 代替旋覆湯, 白茯苓丸

(5) 血球沉降..... 沉降速: 抵抗力少: 四君子湯, 健脾丸

(6) 流血時間..... 流血太快..... 不宜開刀..... 紫葳湯

..... 流血太慢..... 補中益氣湯

..... 流血正常(二分鐘至八分鐘)

(7) 梅毒....., 六〇六注射, 銀鈹磷汞治療, 五寶丹

白濁..... 消治龍, 導赤散, 革薢清心飲

(9) 傷寒..... 犀角大青湯, 越婢加半夏湯

(10) 斑疹傷寒(溫病發疹)..... 普濟解毒飲, 消斑青黛散

(11) 瘧疾..... 范氏瘧疾方

(12) 回歸熱(風邪濕熱)..... 二陳湯, 桔梗湯

檢査大便

(1) 寄生蟲卵..... 烏梅丸, 化蟲丸

(2) 培養..... 烏梅丸, 化蟲丸

(3) 傷寒..... 麻黃湯

(4) 霍亂..... 范氏治霍亂方

(5) 痢..... 范氏治痢方

(6) 原蟲類..... 烏梅丸

(7) 阿米巴..... 范氏治痢方

(8) 匿血..... 腸出血..... 加減槐花散, 秦光白朮丸

檢査小便

(1) 蛋白質..... 發炎..... 黃苓湯, 小柴胡湯

..... 有孕..... 遠志散

..... 腎臟炎..... 五苓散

(2) 糖..... 糖尿病..... 范氏治糖濁方

..... 癆病..... 月華丸

..... 正傷寒症..... 麻黃湯

(3) 重氮(Diazo)..... 副傷寒..... 小柴胡湯

..... 麻疹..... 普濟消毒飲

(4) 胆色素..... 黃疸..... 范氏治黃疸方

(5) 尿胆素..... 黃疸..... 范氏治黃疸方

湯頭歌訣

(6) 尿管原..... 黃疽..... 范氏治瘧疽方

..... 糖尿..... 范氏帶瀉方

(7) 丙酮..... 吐瀉..... 生薑半夏湯

..... 中酸毒..... 人參散毒散

..... 空胃受餓..... 理中湯

(8) 沉澱..... 用顯微鏡檢查細菌

(9) 圓柱體 (Casts)..... 腎臟炎..... 海藏神朮散，五苓散

(10) 圓筒體 (Cylinder)..... 不重要

(11) 上皮細胞..... 不重要

(12) 腎上皮細胞..... 腎臟炎..... 海藏神朮散，五苓散

檢查痰液

(1) 結核菌..... 癆病..... 月華丸

(2) 肺炎..... 肺炎..... 瀉白散

(3) 纖維素 (Elastic Fibers)..... 癆病..... 月華丸

檢查喉液

(1) 白喉..... 注射疫苗，加減大青煎湯

(2) 鏈球菌..... 范氏五苓四物湯

(3) 葡萄菌..... 范氏五苓四物湯

一般檢查

斑蟊反應..... 斑蟊..... 當歸散

淋菌抹片..... 淋濁..... 草解分清飲

藥物目次

人參 (Panax Ginseng, C.A. Mey)	2
白朮 (Atractylis ovata, Th.?)	2
茯苓 (Pachyna Coccos, Fr.)	2
甘草 (Glycyrrhiza glabra, L.)	3
半夏 (Pinellia tuberifera, Ten.?)	3
槲皮 (Citrus Aurantium, L.)	3
稻香 (Lophanthus rugosus, Fisch)	3
砂仁 (Ammonium globosum, Lour)	3
真薯 (Astragalus Hoartchy, Franch?)	4
黃連 (Coptis Teeta, Wall?)	4
葛根 (Alisma plantago, L?)	5
防風 (Siler divaricatum, Bth. et Hk.)	5
羌活 (Angelica sylvestris, L?)	5
獨活 (Angelica grosseserrata, Max?)	5
紫菀 (Bupleurum falcatum, L?)	5
白芍 (Paeonia albiflora, Pall)	5

生薑 (Zingiber officinale, Rosec.)	5
大黃 (Zizyphus vulgaris, Lam.)	5
鱉甲 (Shell of Amyda Sinensis, Wiegmann.)	7
天門冬 (Asparagus lucidus, Lindl.)	7
秦艽 (Justicia Gendarussa, L?)	7
地骨皮 (Lycium chinense, Mill?)	7
桑白皮 (Morus alba, L.)	7
紫苑 (Aster tartaricus, Th)	7
生地 (Rehmannia glutinosa, Lib?)	7
知母 (Anemarrhena asphodeloides, Ege.)	8
桔梗 (Platycodon grandiflorum, A. DC.)	8
肉桂 (Cinnamomum Loureiri, Nees)	8
當歸 (Angelica polymorpha, Maxim, var. sinensis, Oliv.?)	9
芍藥 (Pyrnus Mume, S. et Z.)	9
蒼朮 (Artemisia apiacea, Hec)	9
阿膠 (Glue)	10
川貝母 (Fritillaria Roylei, Hook)	10
貝母 (Fritillaria verticillata, Willd)	10

種百特十 (Kadsura japonica, Dunn)	10	石膏 (Gypsum)	13
半耳客N (Schizandra chinensis, Baill)	10	犀角 (Asarum Sieboldi, Miq)	19
百合 (Lilium Brownii, Spae?)	11	白芨 (Angelica anomala, Pall)	20
芍藥 (Scrophularia Oldhami, Oliv.?)	11	草薺 (Scutellaria baicalensis, Georg.?)	20
歸身龍 (Aristolochia debilis, S. et Z.?)	12	蘇木 (Nepeta japonica, Maxim?)	20
芍藥十 (Arctium Lappa, L.)	12	瑞草 (Forsythia suspensa, Vahl)	21
木瓜 (Prunus Armeniaca, L.)	12	紫葳 (Lithospermum officinale, L. var. erythrorhizon, Clarke.)	21
藜麥 (Oryza Sativa, L. var. glutinosa, Mats)	12	紫葳 (Perilla nankinensis, Deene)	22
葶藶 (Cinnamomum Cassia, Bl.)	14	赤芍 (Cyperus rotundus, L.?)	22
川芎 (Conioselinum univittatum, Turcz.?)	14	赤芍 (Paeonia rubrae, Bret.)	22
絲瓜客 (Liriope spicata, Lour.)	14	蘇木 (Nothosmyrnium japonicum, Miq?)	24
極細草 (Orobanchae ammophyla, Meyer.?)	15	蘇 (Allium fistulosum, L.)	24
旋十 (Aconitum Fischeri, Reich)	15	蘇 (Magnolia officinalis, Reh & Wil)	24
旋藜 (Pueraria hirsuta, Schneid'?)	15	丹靈 (Acorus gramineus, Ait.)	24
轉羅十 (Vitex trifolia, L. var. ovata, Mak.)	15	蘇 (Peucedanum decursivum, Maxim.)	25
欒葉 (Phellodendron amurense, Rupr.?)	16	蘇 (Citrus trifoliata, L.)	26
升麻 (Cimicifuga foetida, L.?)	16	蘇 (Mentha arvensis, L.)	26
麻黃 (Ephedra equisetina, Bge.?)	17	蘇 (Glycine Soja, S. & Z.)	27

大黃 (Rheum officinale, Baill.?)	28
芒硝 (Natrium Sulphate)	28
枳實 (Citrus trifoliata, L.)	29
薔木香 (Rosa Banksiae, R. Br.)	30
升木香 (Inula Helenium, L.)	30
薔木香 (Aplotaxis lappa)	30
檳榔 (Areca Catechu, Willd.)	30
香皮 (Citrus Aurantium, L.)	31
刺川椒 (Scirpus maritimus, L.)	31
寧川椒 (Cyperus Serotinus, Roth)	31
蕪荳 (Kaempferia pandurata, Roxb.)	31
蕪荳牛 (Ipomoea hederacea, Jacq.)	31
神麴 (Yeast)	32
蜜汁 (Honey)	33
膽汁 (Bile)	33
皂土 (Soap)	33
甜瓜蒂 (Cucumis Melo, L.)	35
藥木豆 (Phaseolus Mungo, L. var. subtrilobata, Fr. et. Sav.)	36

藜蘆 (Veratrum nigrum, L.?)	36
龍令 (Curcuma longa, L. var. macrophylla, Miq.?)	36
菲 (Allium odorum, L.)	36
人參蘆 (桔梗屬) (Stem of Platycodon glaucum, Nakai)	37
竹瀝 (Phyllostachys Puberula, Munro.)	37
梔子 (Gardenia florida, L.)	37
苦參 (Sophora flavescens, Ait.)	37
燒鹽 (Natrium chloride)	37
真便 (Urine)	38
皂角 (Gleditschia sinensis, Lam.)	38
白礬 (Alum)	38
括蕒 (Trichosanthes multiloba, Miq.)	41
天花粉 (Trichosanthes multiloba, Miq.)	41
竹葉 (Phyllostachys puberula, Munro)	41
牡蠣 (Ostrea Testae)	41
檉蕒 (Artemisia capillaris, Th.)	41
牡丹皮 (Paeonia Moutan, Sims)	43

大腹皮 (Areca Catechu, Willd.)	44	藤腹子 (Raphanus sativus, L.)	60
半夏糖 (Yeast made with Pinellia Ternata)	44	柏子仁 (Thuja orientalis, L.)	62
扁豆 (Dolichos Lablab, L.)	45	葶藶 (Nelumbo nucifera, Gaertn.)	62
木瓜 (Cydonia sinensis, Thoun.)	45	南星 (Arisaema Thunbergii Bl.)	62
香薷 (Eisobolizia cristata, Willd.)	45	蛤蚧 (Meretrix meretrix, Linné)	62
苜蓿 (Ammannum costatum, Roxb.)	46	猪苓 (Paehyria Hoelen, Rumph.)	62
滑石 (Talc)	49	山藥 (Dioscorea SC)	63
吳茱萸 (Evodia rutecarpa, Bth)	50	葦以甘 (Coix lachryma, L.)	63
艾 (Artemisia vulgaris, L.)	51	荷花 (Pueraria hirsuta, Schneid?)	65
蕪朮 (Nelumbo nucifera, Gaertn.)	53	肉豆蔻 (Myristica fragrans, Houtt)	65
芫胡荽 (Corydalis ambigua, Cham. et Sch.)	54	葶藶 (Zingibar nigrum, Gärtn)	68
常山 (Oriza japonica Th?)	54	旋覆花 (Inula britannica, DC)	68
巴豆 (Croton Tiglium, L.)	54	款冬花 (Tussilago Farfara, L.)	68
使君子 (Menispermum dauricum DC)	55	天竺黃 (Lindera strychnifolia, Vtl)	69
木香 (Cocculus trilobus, DC.)	55	衡州烏藥 (Cocculus laurifolius DC)	69
防己 (Stephania tetrandra, Moore.)	55	枳椇 (Citrus nobilis, Lour)	70
麥芽 (Hordeum vulgure, L.)	58	昆蟲 (Silkworm dried)	70
薔朮 (Atractylis ovata, Th)	59	續斷 (Lanium album, L.?)	70
山萸 (Crataegus cuneata, S.&Z.?)	60	檉柳 (Clematis chinensis, Reitz?)	70

手莖 (*Achryanthes bidentata*, Blume?)70
 斑尾葵 (*Acanthopanax spinosum*, Miq?)71
 草薺 (*Polygonum tinctorium*, Lour)71
 蛇床 (*Saponite*)72
 紫斗 (*Prunus Persica*, S. et Z. var. *vulgaris*, Maxim)72
 罌粟 (*Carthamus tinctorius*, L)72
 蘇合 (*Perilla nankinensis*, Deene)73
 扇葵 (*Aquilaria Agallocha*, Roxb?)73
 紅樓花 (*Red Hematite*)74
 竹根 (*Phrillostachys Henonis*, Miq.)75
 赤茯苓 (*Pachyma Cocos*, Fr.)76
 斑龍蕪 (*Eriobotrya japonica*, Lindl.)76
 丁香 (*Eugenia caryophyllata*, Willd)76
 地蘇 (*Diospyros Kaki*, L.f.)76
 白蘇 (*Ginkgo biloba*, L.)77
 木犀 (*Akebia quinata*, Dene)83
 蘇合 (*Succinum*)83
 龜殼 (*Tortoise Shell*)83

人乳 (*Human Lac*)84
 蒲黃 (*Typha latifolia*, L.?)84
 京墨 (*Carbon black*)84
 蘇木 (*Caesalpinia Sappan*, L)84
 血竭 (*Calamus Draco*, Willd)84
 地榆 (*Sanguisorba officinalis*, L)84
 百草霜 (*Soot*)84
 棕壓殼 (*Chamaerops excelsa*, Th)85
 鎮珀 (*Boschniakia glabra*, C.A. Mey.)85
 神石 (*Lycium chinense*, Mill)85
 夏枯草 (*Brunella vulgaris*, L.)85
 卷柏草 (*Leonurus sibiricus*, L.)85
 丁香 (*Pistacia Khinjuk*, Stocks?)85
 斑蘇 (*Aquilaria Agallocha*, Roxb)85
 五寶龍 (*Secretion of Pteropus pselaphon* Lay)86
 雙花桂 (*Tecoma grandiflora* Loisel)86
 檳 (*Nelumbo nucifera*, Gaertn.)86
 鹿角膠 (*Giac from Horn of Elaphurus davidianus* Milne-Edwards)8

霞天膠 (Cow Glae)	87	巴戟天 (Bacopa-Monierra, Hayata)	106
胡蘆 (Picrorhiza Kurroa, Bth)	87	玉桂 (Dendrobium moniliforme, Sw.)	106
天麻 (Gastrodia elata, Bt)	87	白薇 (Cynanchum atratum, Bge)	101
山茶黃 (Cornus officinalis, S. et Z.)	87	龍膽草 (Gentiana scabra, Bge)	101
錦雞 (Polygala tenuifolia, Willd)	88	桑寄生 (Loranthus Yadoriki, S. & Z.?)	102
麥蘗 (Pachyma Cocos, Fr)	89	罌殼 (Cicada Shell)	103
龍腦 (Nepelium Longana, Camb.)	89	川椒 (Xanthoxylum piperitum, D.C.)	107
酸漿子 (Zizyphus vulgaris, Lam. var. spinosus, Bge)	89	蜜汁 (Honey)	111
犀角 (Horn of Rhinoceros unicornis, Linné)	91	人尿 (Urine)	111
犀角子 (Gleditschia sinensis, Lam)	92	豬膽 (Gall of Pig)	112
槐花 (Sophora japonica, L.)	93	麝香 (Musk)	112
劉柏葉 (Thuja orientalis, L.)	94	醋 (Vinegar)	113
小蘗 (Cnicus chinensis, Maxim)	94	麩皮 (Wheat Gliadin)	113
穿山甲 (Scales of Manis pentadactyla, Linné)	95	補骨脂 (Psoralea corylifolia, L.)	115
羚羊角 (Horn of Antelope)	98	川棟子 (Melia Azedarach, L.)	115
蜜蠟 (Dioscorea Tokoro, Mak)	99	炮薑 (Foeniculum vulgare, Mill.)	116
杜仲 (Eucommia ulmoides, Oliv.)	99	荔枝核 (Litchi chinensis, Sonn.)	116
川芎 (Aconitum Fischeri, Reich)	99	檳榔 (Seeds of Citrus nobilis, Lour.)	117
		檳榔 (Sarcassum siliquastrum, Ag.)	117

紫蘇 (Laminaria religiosa, Miyabe)	117
葛根 (Laminaria japonica, Aresch)	117
蔞子 (Juncus effusus, L.)	122
蘇葉 (Sulphur)	122
蘇合 (Cinnabar)	122
蘇精 (Yeast from rice)	123
牛乳 (Cow Bezoar)	123
蘇水石 (Calcareous spar)	126
蘇杏仁 (Prunus japonica, Th.)	127
蘇茶子 (Ipomea hederacea, Jacq.)	128
甘藷 (Euphorbia Sieboldiana, Morr. et Dene.)	128
大戟 (Euphorbia pekinensis, Rupr.)	128
芫花 (Daphne Genkwa Sieb. et Zucc)	128
蘇葉 (Calomel)	129
蘇強 (Phytolacca acinosa, Roxb)	129
蘇瓜子 (Plantago major, L.)	132
蘇子 (Dianthus superbus, L.)	133
蘇葉 (Polygonum aviculare, L.)	133
甘藷粉 (Glycyrrhiza glabra, L.)	133
蘇子 (Sesamum indicum, L.)	135
牛乳 (Milk of Cow)	135
蘇子 (Saccharum officinarum, L.)	136
蘇配 (Wine)	137
蘇葉 (Adenophora remotifolia, Miq)	137
蘇葉 (Phragmites communis, Trin.)	137
白蘇葉 (Imperata arundinacea, Cyr.)	137
蘇子 (Cuscuta japonica, Choisy?)	139
蘇子 (Rubus coreanus, Miq.)	139
蘇子 (Selinum japonicum Miq.)	139
蘇子 (Stomach of Gallus domesticus, Brisson)	140
蘇子 (Ferromagnet)	140
豬腎 (Kidney of pig)	140
蘇子 (Glycine Soja, Benth)	140
蘇子 (Rice candy from malted rice)	140
蘇子 (Stemona tuberosa, Lour.)	141
蘇米 (Oryza sativa, L.)	147
金器 (Gold)	148

蘆薈 (Aloe vulgaris, Lam.)	153	罌米殼 (Papaver somniferum, L.)	171
聚繭菜 (Polygonum tinctorium, Lour.)	155	桑螵蛸 (Mantis Nest)	172
蠟蚶 (Lycoperdon bovista, L.)	155	米粉 (Oryza sativa L.)	173
雪蘆子 (Arctium Lappa, L.)	155	繭繭 (Carpesium abrotanoides, L?)	175
雙蓮 (Diospyros Kaka, L. E.)	157	苦棟根 (Melea japonica, Don.?)	175
半枝 (Magnolia Conspicua, Salisb)	158	蕪荳 (Ulmus macrocarpa, Hcc.)	175
椴木片 (Xanthium Strumarium, L.)	158	椴木子 (Quisqualis indica, L.)	175
紫葳 (Thea sinensis, L.)	159	黃臘 (Yellow Wax)	177
白木子 (Brassica juncea, Coss)	162	雄黃 (Orpiment)	177
甘肅末 (Kieselguhr)	165	亞細 (Eupatorium japonicum, Th)	184
亞細 (Saltpetre)	166	黃精 (Duxus sempervirens, L.)	186
草酸 (Crude Glauber's Salt)	166	羊豬胞 (Placenta of Sheep and pig)	186
菘菘 (Tribulus terrestris, L.)	169	鱉皮 (Alanthus glandulosa, Desf.)	187
芡芡 (Furayale ferox Salisb.)	169	卷柏 (Selaginella involvens, Spr.)	188
獨紫 (Nelumbo nucifera, Gaertn)	169	猪羊骨 (Bones of pig and Sheep)	188
獨骨 (Bone of Mastodon)	169	梅花 (Prunus Mume, S. et Z.)	189
獨木葉 (Nelumbo nucifera, Gaertn)	170	綠豆 (Phaseolus Mungo, L.)	189
獨茸 (Velvet Horn of the sika deer)	170	綠瓜藤 (Luffa cylindrica, Roem.)	189
珍珠 (Pearl of Oyster)	170		

信誼良藥

內科類 Medicine

貧血及萎黃病 (Anemia and Chlorosis)

- 皮西提命 (Biotinin)
- 鈣深固斯 (Calcicose)
- 四維鈣對生 (Calsun A B C D)
- 西他新 (Chistin)
- 畏命新鈣 (Glucocal)
- 四維葡萄糖 (Glucose A B C D)
- 甘油磷酸鐵 (Glycerophosphate of Iron)
- 甘油磷酸鈣 (Glycerophosphate of Iron)
- 海石維 (Hexavite)
- 砒糖基鐵 (Iron Cacodylate)
- 力康肝 (Livex)
- 力康肝 (Livex Compound)
- 新重鈣 (Neo-Glucoal)
- 新力弗肝 (Neo-Livex)

- 鈉化砒糖基 (Sodium Cacodylate)
- 滅南樂克氏液 (Solution Locket's)
- 超力弗肝 (Super-Livex)
- 維康通 (Vigoton)
- 維他賜保命 (Vita-spermin)
- 維他多勁 (Vitatodin)

氣喘 (Asthma)


- 腎上腺 (Adrenalin)
- 壓氣抹喘 (Asthmasal)
- 氯化鈣 (Calcium Chloride)
- 鹽酸麻黃素 (Ephedrine Hydrochloride)
- 喬公碘 (Jotodin)
- 信雷咳 (Sineco)

腳氣症 (Beriberi)

- 四維葡萄糖 (Glucose A B C D)
- 海石維 (Hexavite)
- 力康肝 (Livex Compound)
- 維他命 N (Vitamin B)
- 維他新 (Vitamin)

信 誼 良 藥

四 一



維他命保命 (Vita-spermin)
食母生 (Zymasun)

枝管氣炎 (Bronchitis)

喬德鈣 (Jodinal)
信寄咳 (Sineco)

心臟及呼吸器病 (Cardiac and Respiratory Diseases)

過勞液 (Aecordin)
腎上腺 (Adrenalin)
壓氣林膠 (Asthmasal)
咖啡因 (Cafein)
安息香酸鈉咖啡因 (Cafein Sodium Benzozate)
柳酸鈉咖啡因 (Cafein Sodium Salicylate)
樟腦油 (Camphor oil)
開提心 (Cardisin)
洋地黃素 (Digitaline pure)
鹽酸麻黃素 (Ephedrine Hydrochloride)
葡萄糖 (Glucose)
羅培林 (Lobeline)

信寄咳 (Sineco) (with or without codein)

司得命 (Stamin)

康吡箭毒牛蒡 (Strophantin)

士的寧 (Strychnine Arsen.)

霍亂 (Cholera)

檸檬水 (Cholera Drops)

口服霍亂疫苗 (Sine Cholera Oral Vaccine)

霍亂疫苗 (Sine Cholera Vaccine)

德琴霍亂混合疫苗 (Sine T. C. Combined Vaccine)

四合疫苗 (Sine Tetra Vaccine)

滅菌樂克氏液 (Solution Loekei's)

滅菌林格氏液 (Solution Ringer's)

食鹽水 (Solution Sodium Chloride)

便秘 (Constipation)

安樂萬片 (Phenosal)

信宜酵母 (Sine Yeast)

食母生 (Zymasun)

腹瀉 (Diarrhea)

快刺福 (Guanifa)

百哥消片 (Pepposol)

信証酵母 (Sine Yeast)

消發藥片 (Sulfamide)

消治菌 (Thiazon)

維他命助 (Vitamin)

痢疾 (Dysentery)

阿米脫劑 (Amoetren)

滅痢苗汁 (B. D. Phage)

鹽酸吐根素 (Emetine Hydrochloride)

快痢福 (Guanifa)

樂泰平 (Lactobin)

新發菌消治菌 (Neo-Solu-Thiazon)

百哥消片 (Pepposol)

痢疾疫苗 (Sine Dysentery Vaccine)

性痢素 (Sinlasol)

消治菌及新發菌消治菌 (Thiazon & Solu-Thiazon)

發熱 (Fever)

敗熱藥 (Bagsal & Bagsal Strong)

雙鹽藥片 (Quinine Bi-hydrochloride)

思凡解 (Sinvagin)

柳酸鈉 (Sodium Salicylate)

司得命 (Stamin)

司泰靈 (Starin)

諾靈保藥劑 (Transpulsal)

腸病 (Gastro-intestinal Diseases)

四維鈣樹生 (Calsun A B C D)

果百雅 (Capaya)

樂泰平 (Lactobin)

馬痛靈 (Magnoxide)

新重鈣 (Neo-Glucoceal)

百哥消片 (Pepposol)

信証酵母 (Sine Yeast)

胃天定 (Venidin)

食母生 (Zymasun)

一般虛弱 (General Debility)

皮西提命 (Bicomin)

鈣深固斯 (Calcicose)

長命新藥 (Glucoseal)

葡萄糖甲 (Glucose A)
葡萄糖乙 (Glucose B)
葡萄糖丙 (Glucose C)
葡萄糖丁 (Glucose D)
四維葡萄糖 (Glucose A B C D)
甘油磷酸鐵 (Glycerophosphate of Iron)
好力生 (Halisun & Halisun Strong)
椰石糖 (Hexavite)
樂泰平 (Lactobin)
力弗肝 (Livex)
力康肝 (Livex Compound)
新重鈣 (Neo-Glucozal)
新力弗肝 (Neo-Livex)
婦萬定及婦萬定強 (Ovaden & Ovaden Strong)
婦萬多年 (Ovartonic)
信泰福生 (Sinophosan)
賜保命 (Spermin)
賜保多年 (Sper tonic)
超力弗肝 (Supper-Livex)

得勢天生 (Testison)
維康適 (Vigoton)
維他賜保命 (Vita-Spermin)
維他多勁 (Vitalogin)
頭痛 (Headache)
息凡靜 (Sinvaqin)
司泰靈 (Starin)
萬可靜 (Vecosin)
痔瘡 (Hemorrhoid)
拔痔根藥膏 (Piles Cure)
安的敷藥膏 (Antifasal)
高血壓 (High Blood Pressure)
喬安碘 (Jotodin)
消化不良 (Indigestion)
果百雅 (Capaya)
樂泰平 (Lactobin)
胃痛靈片 (Magnoxide)
百哥消片 (Pepposol)
信誼酵母 (Sine Yeast)

維康通 (Vigoton)

維他賜保命 (Vita-Spermin)

維他多勁 (Vitalogin)

食母生 (Zymasan)

傳染性疾 (Infectious Diseases)

過勢滅定 (Acemidin)

愛借克淋 (Acicrin)

愛克淋鈣 (Acrical)

高力量及脫露力草 (Gallinan & Solu-Gallinan)

快爾福 (Guanifa)

新脫露精治菌 (Neo Solu-Thiazon)

撲滅定 (Promadin)

腦膜炎疫苗 (Sine Meningitis Vaccine)

足可淨 (Sococsin)

消發滅定及磺精消發滅定 (Sulfamidine & Solu-Sul

famidine)

精治菌及脫露精治菌 (Thiazon & Solu-Thiazon)

烏羅脫素 (Urotrosal)

感冒 (Influenza)

敗熱速 (Bagsal & Bagsal Strong)

魯通 (Beton)

鹽酸麻黃素 (Ephedrine Hydrochloride)

鹽酸奎寧 (Quinine Bi-Hydrochloride)

信雷咳 (Sineco)

司泰靈 (Starin)

皮膚癢症 (Itching of Skin)

皮可淨 (Benecozin)

傑可立汶 (Jecromide)

新雷鈣 (Neo-Gluccal)

足可淨 (Sococsin)

精治菌藥皂 (Thiazon Soap)

瘧疾 (Malaria)

敗熱速 (Bagsal & Bagsal Strong)

新精花散 (Neo-Sypharsan)

鹽酸氫奎寧 (Quinine Bi-Hydrochloride)

鹽酸尿素奎寧 (Quinine Bi-Mur. Carbanid)

奎寧新鈣 (Quinine Gluccal)

超力弗肝 (Supper-Livex)

息德靈 (Sinabrin)

息熱定 (Sinadin)

信証痢疾片 (Sine Malaria Tablet)

雷德登 (Sinequin)

腎臟炎 (Nephritis)

透鈣酸定 (Acemidin)

愛雷克林 (Acicrin)

愛克淋錳 (Acrinex)

烏羅透賽 (Urotrosal)

神經痛 (Neuralgia)

司泰靈 (Statin)

菴可靜 (Vaccosin)

神經衰弱 (Neurasthenia)

恩德靈 (Andromon)

皮西根命 (Bicomin)

鈣深固斯 (Calcicose)

溴化鈣 (Calcium Bromide)

昆命新鈣 (Glucocal)

四維葡萄糖 (Glucose A B C D)

甘油磷酸鐵 (Glycerophosphate of Iron)

甘油磷酸鈉 (Glycerophosphate of Sodium)

好力生 (Halsum & Halsum Strong)

海石維 (Hexavite)

吡嘰鐵士的雷 (Iron Arsenite & Strychnine)

樂泰平 (Lactobin)

力弗肝及新力弗肝 (Livex & Neo-Livex)

力康肝 (Livex Compound)

新重鈣 (Neo-Glucocal)

信乃生 (Sinason)

鈉化硫鎂基 (Sodium Cacodylate)

賜保命 (Spermin)

賜保蛋黃素 (Spermin-Lecithin)

賜保多年 (Sper tonic)

士的寧 (Strychnine Arsen.)

超力弗肝 (Supper-Livex)

得勢天生 (Testison)

維康通 (Vigoton)

維他賜保命 (Vita-Spermin)
 維他多勁 (Vitatogin)
 神經梅毒 (Neuro-syphillis)
 喬安鈣 (Jodineal)
 喬安礦 (Jodoin)
 腦絡借花液 (Neuro-Syphamide)
飛烟 (Opium Addiction)
 皮西提命 (Bicjomin)
 鈣深固斯 (Calcicose)
 苦路平 (Curopin)
 長命新鈣 (Glucoseal)
 四維葡萄糖 (Glucose A B C D)
 力弗肝及新力弗肝 (Livex & Neo-Livex)
 鹽酸嗎啡 (Morphine Hydrochloride)
 婦萬定 (Ovaden & Ovaden Strong)
 婦萬多年 (Ovartonic)
 百得消片 (Pepposol)
 多年可 (Toncol)
 萬可靜 (Vecosil)

信 誼 良 藥

維康適 (Vigoton)
 維他賜保命 (Vita-Spermin)
 維他多勁 (Vitatogin)
 食母生 (Zymosan)
百日咳 (Pertussis)
 提脫咳 (Pertucal)
 信甯咳 (Sineco)
 維他多勁 (Vitatogin)
肋膜炎 (Pleuritis)
 安的敷 (Antifasal)
 安息香酸咖啡因 (Caffein Sodium Benzoate)
 鈣類製劑 (Calcium Preparations)
 長命新鈣 (Glucoseal)
 好力生 (Halissun & Halissun Strong)
 新瓦錫 (Neo-Glucoseal)
肺炎 (Pneumonia)
 過鈣滅定 (Acemidin)
 安的敷 (Antifasal)
 敗熱速 (Bagsal & Bagsal Strong)

四 十

鹽酸麻黃素 (Ephedrine Hydrochloride)

高力皇及雄雞高力皇 (Gallian & Solu-Gallian

新製錫消治龍 (Neo-Solu-Thiazon)

肺康 (Phicon)

雙鹽酸奎寧 (Quinine Bi-Hydrochloride)

信常咳 (Sineco)

消登滅定及理露消發滅定 (Sulfamidine & Solu-Sulfa
midine

消治龍及理露消治龍 (Thiazon & Solu-Thiazon)

託寶保樂而 (Transpulsal)

多發性神經炎 (Polyneuritis)

葡糖糖 N (Glucose B)

海石維 (Hexavite)

維他命 N (Vitamin B)

維他命 (Vitamin)

中毒 (Poisoning)

開提心 (Cardisin)

新重鈣 (Neo-Gluco-cal)

烏羅透紫 (Urotrosal)

維他多助 (Vitatogin)

肺結核 (Pulmonary Tuberculosis)

愛地命 (Admin)

皮四提命 (Bicomin)

鈣深固斯 (Calcicose)

氯化鈣 (Calcium Chloride)

碘化鈣 (Calcium Iodide)

四維鈣精生 (Calsun A B C D)

鈣精生 (Calsun D)

幾阿莖 (Creosote Pure)

長命新鈣 (Glucocal)

怪阿寇祇糖基 (Guaicol Cacodylate)

十維好力生 (Halisun Compound)

好力生 (Halisun & Halisun Strong)

海石維 (Hexavite)

力康肝 (Livex Compound)

新重鈣 (Neo-Gluco-cal)

新力弗肝 (Neo-Livex)

肺康 (Phicon)

超力弗肝 (Super-Livex)

維他命製劑 (Vitamin Preparations)

回發熱 (Relapsing Fever)

砒製劑 (Arsenic Preparations)

新精花散 (Neo-Spharsan)

雙鹽亞奎寧 (Quinine Bi-Hydrochloride)

複發安錫英生 (Solo-Antikzor)

風濕痛 (Rheumatic Pain)

安的數 (Anthasal)

柳酸咖啡因 (Caffein Sodium Salicylate)

苦路士 (Caropin)

奎寧新錫 (Quinine Glucoal)

思熱定 (Sinadin)

司泰環 (Sarin)

萬可靜 (Vecosin)

佝僂病 (Rickets)

鈣類製劑 (Calcium Preparations)

好力生 (Halsun & Halsun Strong)

海石維 (Hexavite)

力康肝 (Livex Compound)

維康通 (Vigoton)

維他命 D 液劑 (Vitamin D Liquid)

維他多勃 (Vitatogin)

血清病 (Serum Diseases)

腎上腺 (Adrenalin)

鈣劑 (Calcium Preparations)

鹽酸麻黃素 (Ephedrine Hydrochloride)

腺垂腺 (Pituitary)

性神經衰弱 (Sexual Neurasthenia)

恩德蒙 (Andromon)

皮西提命 (Briomnin)

鈣深固斯 (Calcicose)

四維葡萄糖 (Glucose A B C D)

海石維 (Hexavite)

力康肝 (Livex Compound)

賜保命 (Spermin)

得勢天生 (Testison)

多卑可 (Tonicoil)

維康通 (Vigoton)

維他賜保命 (Vita-Spermin)

維他多勁 (Vitatogin)

皮膚病 (Skin Diseases)

砒酸鐵製劑 (Arsenic & Iron Preparations)

皮可淨 (Bencosin)

皮西提命 (Bicomin)

鈣深固斯 (Calciose)

溴化鈣 (Calcium Bromide)

藥可立波 (Jecoromide)

息魯疥 (Sinegal)

信証藥膏 (Sine Ointment)

信証酵母 (Sine Yeast)

足可淨 (Soeosin)

鈉化吡嗪酸 (Sodium Cacodylate)

丟納茲 (Terpinal)

滑治龍藥膏 (Thiazon Ointment)

滑治龍藥皂 (Thiazon Soap)

維他命製劑 (Vitamin Preparations)

失眠 (Sleeplessness)

導眠諾 (Dormanol)

維他多勁 (Vitatogin)

胃病 (Stomach Diseases)

果百雅 (Cappax)

樂泰平 (Lactobin)

胃痛靈 (Magnoxide)

百舒消片 (Pepposal)

信証酵母 (Sine Yeast)

胃天定 (Ventidin)

食母生 (Zymosan)

梅毒 (Syphilis)

秘司莫撤爾 (Bismosal)

碘化鈣 (Calcium Iodide)

養泰 (Hydrary Cyanide)

喬碘鈣 (Jodinea)

喬安碘 (Jotodin)

新借花散 (Neo-Sypharsan)

腦絡借花液 (Neurosyphamide)

碘化鈉 (Sodium Iodide)

肌安借花散 (Thio-Spharsan)

破傷風 (Tetanus)

專效諾 (Dormanol)

烏羅透藥 (Urotrosal)

甲状腺 (Thyroid)

信敏甲状腺片 (Sine Thyroid Tablets)

傷寒及副傷寒 (Typhoid & Paratyphoid)

亞借克淋 (Acicrin)

皮西提命 (Bicomin)

鈣深固斯 (Calcicose)

純淨葡萄糖 (Glucose Ampoules)

四維葡萄糖 (Glucose A B C D)

快劑福 (Guanifa)

息熱定 (Sinadin)

信顯酵母 (Sine Yeast)

消治龍及現露消治龍 (Thiazon and Solu-Thiazon)

鴉藥密配混合疫苗 (Typho-Chlorea Combined Vaccine)

四合疫苗 (Tetra Vaccine)

烏羅透藥 (Urotrosal)

外科類 (Surgery)

麻醉劑 (Anesthesia)

疼克因 (Dentacin)

奴佛克賽 (Novocasal)

盲腸炎 (Appendicitis)

邁勢滅定 (Acemidin)

新聖露消治龍 (Neo-Solu-Thiazon)

消發滅定及現露消發滅定 (Sulfamidine & Solu-Sulfamidine)

famidine)

消治龍及現露消治龍 (Thiazon & Solu-Thiazon)

橫痃 (Bubo)

安的數 (Antifasal)

一天蔡 (Atilin)

新聖露消治龍 (Neo-Solu-Thiazon)

息那倫 (Sinolen)

消發滅定及現露消發滅定 (Sulfamidine & Solu-Sulfamidine)

Famidine)

消治龍及深露消治龍 (Thiazon & Solu-Thiazon)

癌腫 (Cancer)

恩脈命 (Embromin)

中毒 (Erysipelas)

恩露滅疾 (Acemidin)

安納敷 (Antifasal)

高力皇及短露高力皇 (Galliman & Solu-Galliman)

新露露消治龍 (Neo-Solu-Thiazon)

奎雷新露 (Quinine Glucoceal)

消發滅定及短露消發滅定 (Sulfamidine & Solu-Sul-

famidine)

消治龍及恩露消治龍 (Thiazon & Solu-Thiazon)

烏羅透露 (Urotrosal)

出血 (Hemorrhage)

腎上腺 (Adrenaline) (only local application)

鈣深固斯 (Calcicose)

氯化鈣 ((Calcium Chloride)

鈣攝生一 (Caisun D)

西他新 (Cirsasin)

麥角素 (Ergotine)

尼合新鈣 (Glucoceal)

葡萄糖針 (Glucose Amp.)

鹽酸嗎啡 (Morphine Hydrochloride)

新露露 (Neo-Glucoceal)

滅菌藥克兒露 (Solution Locket's)

滅菌林格露 (Solution Ringer's)

食鹽水 (Solution Sodium Chloride)

局部麻醉 (Local Anesthesia)

奴佛克露 (Novocasal)

奴佛克露與腎上腺素 (Novocasal & Adrenalin)

婦產科類 Obstetrics and Gynecology

子宮內膜炎 (E dometritis)

恩露滅定 (Acemidin)

愛特克淋 (Acterin)

愛克淋露 (Acrinical)

安納敷 (Antifasal)

新露露消治龍 (Neo-Solu-Thiazon)

婦美素 (Omensal)

保德儂 (Prosteron)

信乃通 (Sinestroe)

消發滅定及亞羅消發滅定 (Sulfamidine &

Solu-Sulfamidine)

消治醜及亞羅消治醜 (Thiazon & Solu-Thiazon)

維他賜保命 (Vita-Spermin for Female)

備生 (Induce Labour)

腦垂腺 (即催生針) (Pituitary)

白帶 (Leucorrhoea)

亞發滅定 (Acemidin)

愛昔克淋 (Acierin)

愛克淋鈣 (Acrinca)

一天霖 (Atilin)

氯化鈣 (Calcium Chloride)

新亞羅消治醜 (Neo-Solu-Thiazon)

婦美素 (Omensal)

消發滅定及亞羅消發滅定 (Sulfamidine & Solu-Sulf)

消治醜及亞羅消治醜 (Thiazon & Solu-Thiazon)

月經病 (Menstrual Disturbances)

高波丁 (Corlutin)

麥角素 (Ergotine)

婦美素 (Omensal)

婦濟定 (Ovaden & Ovaden Strong)

婦萬靈 (Ovarin Crystalline)

信乃通 (Sinestron)

保德儂 (Prosteron)

萬可靜 (Veeasin)

維他賜保命 (Vita-Spermin for Female)

敗血症及產後熱 (Septicemia & Puerperal

Fever)

亞發滅定 (Acemidin)

愛昔克淋 (Acierin)

愛克淋鈣 (Acrinca)

高力量及亞羅高力量 (Gallinan & Solu-Gallinan)

新亞羅消治醜 (Neo-Solu-Thiazon)

息熱定 (Sinadin)

消發滅定及亞羅消發滅定 (Sulfamidine & Solu-Sulf)

消治龍及瘰癧消治龍(Thiazon & Solu-Thiazon)

烏羅滋藥(Urotrocal)

不妊(Sterility)

高滋丁(Corluthin)

婦萬定(Ovaden & Ovaden Strong)

婦萬錠(Ovarin)

婦萬多年(Ovartonic)

保德價(Prosteron)

信乃通(Sinestrin)

維他命E(Vitamin E)

維他命保存(Vita-Spermin for Female)

妊娠嘔吐(Toxemia Pregnancy)

及西提命(Bicomin)

鈣深固斯(Calcicose)

西他新(Citasin)

高滋丁(Corluthin)

葡萄糖丙(Glucose C)

四維葡萄糖(Glucose A B C D)

維他命多助(Vitafolin)

食母生(Zymosan)

齒科類 Dental Diseases

愛惜夫拉文(Acifavin)

西他新(Citasin)

疼克因(Dentain)

海石維(Hexavite)

消治龍牙膏(Thiazon Tooth Paste)

眼耳鼻喉科類 Eye, Ear, Nose, Throat

腺體增殖(Adenoid)

及西提命(Bicomin)

鈣深固斯(Calcicose)

碘化鈣(Calcium Iodide)

昆命新鈣(Glucoal)

四維葡萄糖(Glucose A B C D)

甘油磷酸鐵(Glycerophosphate of Iron)

好力生(Halsun & Halsun Strong)

海石維(Hexavite)

砒酸鐵士的亞(Iron Arsenite & Strychnine)

力康肝 (Livex Compound)

新重鈣 (Neo-Gluccocal)

超力弗肝 (Super-Livex)

甲狀腺片 (Thyroid Tab.)

多力司 (Tonicol)

維康通 (Vigoton)

維他命甲乙戊 (Vitamin A B E)

維他新 (Vitasin)

維他多助 (Vitatogin)

咽喉炎 (Angina)

愛倍夫拉文 (Acifavin)

散熱速 (Bagsal & Bagsal Strong)

司泰靈 (Starin)

消治酸及眼痛消炎靈 (Thiazon and Solu-Thiazon)

眼病 (Eye Diseases)

二明眼藥水 (Eyemin Eye Drops)

葡萄糖甲 (Glucose A)

好力生淚 (Halsun Strong)

海石維 (Hexavite)

新靈滴消治眼 (Neo-Solu-Thiazon)

瓦尼西靈眼藥膏 (Penicillin Ophthalmic Ointment)

消治酸眼藥水 (Thiazon Eye Drops)

消治酸及眼痛消治靈 (Thiazon & Solu-Thiazon)

消治酸眼藥膏 (Thiazon Ophthalmic Ointment)

維他命甲 (Vitamin A)

鼻病 (Nasal Diseases)

腎上腺 (Adrenalin Solution)

鼻通 (Beton)

泌尿生殖器類 Genito-urology

下疳 (Chancre)

亞發敏定 (Acemidin)

新消花散 (Neo-Sypharsan)

淋病及其併發症 (Gonorrhoeal & Gonorrhoeal Diseases)

亞發敏定 (Acemidin)

愛倍夫拉文 (Acifavin)

愛克淋藥 (Acrinac)

安敏散 (Anthifasal)

一天素 (Atilin)

萬力星及萬星萬力星 (Gallinan & Sotu-Gallinan)

新級靈消治靈 (Neo-Sotu-Thiazon)

西尼西靈 (Penicillin)

撲滅定 (Promadin)

卓那合 (Sinolen)

妥精液 (Terpinsal)

精治靈及現靈精治靈 (Thiazon & Sotu-Thiazon)

烏羅羅素 (Urotrosal)

尿道消毒藥 (Urinary Disinfectant)

愛精克淋 (Acierin)

愛克淋藥 (Acirneal)

烏羅羅素 (Urotrosal)

科學醫藥湯頭歌訣

原著者 汪詡庵先生

第一章 補益之劑

四君子湯中利義 參朮茯苓甘草比 益以夏陳名六君 祛痰補氣陽虛餌

除却半夏名異功 或加香砂胃寒使

四君子湯——治一切懶虛氣弱。脾衰肺損。飲食少思。體瘦面黃。皮聚毛落。人參一錢 白朮二

錢 土炒 茯苓二錢 炙甘草五分

范世：此方是補氣健脾營養之劑。常服使人色澤身強。

六君子湯——治氣虛挾痰，脾虛鼓脹。四君子湯加 半夏二錢五分 陳皮一錢

異功散——調理脾胃。四君子湯加 陳皮一錢

范批：此方健運脾胃。調暢中樞。常服能使食慾亢進，亦健身營養之劑也。

香砂六君子湯——治虛寒胃痛或腹痛泄瀉。四君子湯加 木香一錢 砂仁二粒

范批：此方和胃化濁，理氣寬中之劑。

人參 爲滋養之劑。內含鈣質，鎂質，磷質，甲種維他命，次乙種維他命，丙種維他命及「人參

素」Panacen ($C_{15}H_{21}$) 與 $C_{27}H_{45}O_2$ 滋養補身之配糖體甚多，又有人參油 Panaxapogenol ($C_{27}H_{45}O_2$) 及 ($C_{27}H_{45}O$) 等油質，對大腦有鎮靜作用。使血管運動神經及呼吸中樞有興奮之功。直接催促人體細胞新陳代謝，間接治療貧血，衰老，神經衰弱等症。爲中西諸藥之王。最有益於人。

白朮 含有甲種維他命甚多，香味甚佳，能刺戟消化器粘膜，使消化液亢進分泌，於是促進消化機能。亦爲國藥中有益於人體之物。

茯苓 含菌體，果糖，葡萄糖等質，爲利尿之藥。使腎臟內血液循環旺盛，腎臟分泌細胞機能亢進。

甘草 內含甘草酸 Glycerhizin ($C_{41}H_{68}O_{13}$) 與蔗糖，鉀鹽，鈣鹽，鎂鹽等成分，有鎮咳祛痰之功，且爲緩下劑。常食有益。

半夏 含少量之芳香半夏油千分之一。有麻醉局部之功。尤以麻醉咽頭嘔吐中樞神經而抑制嘔吐爲最有效。且含鎂質百分之四十九·四。鈣質百分之十四·八。故治腸胃病有效。據鈴木云：半夏之鎮靜作用，由於其所含有之脂肪 Phosterin 而使然。

陳皮 應稱陳橘皮或陳橙皮，含芳香右旋林檎精 d-Limonen 與林檎配糖體 Hesperidin ($C_{28}H_{44}O_{15}$) 及丙類維他命 Vitamin C，爲苦性之芳香健胃藥。

藿香 含芳香藿香精油，能健胃止嘔，治食傷感冒，頭痛。古人云：凡無食積者不必用之。近時中醫，則在夏天常用之。

砂仁 應名縮砂仁，含芳香砂仁精油與香脂，收斂健胃驅風，止痛功效甚大。然心跳脈數忌用之。因其刺激心臟也，使心跳數增加也。

升陽益胃參朮著 黃連半夏草陳皮 苓瀉防風羌獨活 柴胡白芍棗薑隨

升陽益胃湯——治脾胃虛弱。怠惰嗜臥。體重節痛。口苦舌乾。心不思食。食不知味。大便不調。

小便頻數。兼見肺病。瀉泄惡寒。慘慘不樂。人參一錢 白朮二錢 黃耆一錢 黃連三分 半夏一錢 炙甘草五分 陳皮一錢 茯苓三錢 澤瀉一錢 防風三錢 羌活三錢 獨活三錢 柴胡八分 炒白芍三錢 生薑二片 大棗三枚

范批：此方能調脾胃失和。退虛熱。除濕痺。解鬱悶。爲調和脾胃，助陽勝濕之要劑。

黃耆 爲荳科蝴蝶花植物，植物名木黃耆，日本名木綿蔓，含有一種膠質，與不溶性性粘液質

Bassorin 使腦部充血，能治風濕麻痺等症。

黃連 根含「小蘗鹼」*Berberin* ($C_{20}H_{21}NO_9$) 甚多。地下莖含軟脂鹼 *Palmatin* ($C_{21}H_{33}NO_9$) 黃

連鹼 *Coptisin* ($C_8H_{13}NO_3$) 川連鹼 *Worenin* ($C_{20}H_{25}NO_4$) 乃健胃苦味藥。主治消化不

良，腹痛與慢性下痢。刺激呼吸中樞神經，使呼吸深而其數增加，又能使腸收縮。并有遏止
微菌運動。與使人體白血球與赤血球縮小。故治痢最效。然五更泄瀉，婦人產後煩熱，小兒
痘疹作瀉，均忌用之。

澤瀉 有澤瀉揮發油，又含澱粉，黃烈性樹脂，故有刺戟性，能利尿消水腫。故小便利者不用澤瀉與茯苓。又腎虧目虛不明，滑精者忌用之。

防風 有揮發油。爲感冒藥。又含有機鹼，能治痛風，有利尿通便之功。自汗有汗者忌用之。

羌活 乃繖形科植物，與獨活皆含胡椒園有機鹼 Piperidin alkaloid 及有機酸，治頭痛，中風，痛風有效。

柴胡 乃解熱要藥。治寒熱病最有效。亦含胡椒有機鹼 Piperidin alkaloid 及有機酸，又含肥皂草素。能阻止原蟲發育，并能消滅之。

白芍 含安息香酸，與天冬素。有祛痰之功。又治腹痛。鎮胃痙攣，利尿。療婦人病。古人稱平肝和血，今人謂之殺菌劑也。

生薑 含生薑甙 Zingeron ($C_{15}H_{14}O_2$)，生薑辛味油 Shoganol ($C_{17}H_{24}O_2$)，生薑素 Zingiberen ($C_{15}H_{22}$)，生薑油 Zingiberol ($C_{15}H_{24}O$)，檸檬香醛 Citral 甲庚醛 Methylheptenon, 壬醛 Nonylaldehyd. 橙葉香油 Linalool 龍腦油 α -Gorneol 辛味精油。刺戟胃腸粘膜，使之充血

，充進機能，故能健胃。古人云：目疾與痔瘡者不可用。

大棗 含有糖分，與果酸。能鎮靜安眠。治神經衰弱與不眠症，又治心悸充進頗有效力。古人云：

小兒疳病，及大人中滿者忌用之。

黃耆 鼈甲地骨皮 苒菴參苓柴半知 地黃芍藥天冬桂 甘桔桑皮勞熟宜

黃耆 鼈甲散——治男女虛勞客熱。內心煩熱，四肢怠惰。咳嗽咽乾。自汗食少。或且肺熱。炙蜜黃

耆三錢 炙鼈甲三錢 天冬一錢五分 秦艽三錢 柴胡八分 地骨皮三錢 茯苓三錢 桑白皮一

錢五分 紫苑一錢五分 半夏一錢 芍藥二錢 生地黃三錢 知母一錢 炙甘草五分 人參一錢

桔梗一錢 肉桂五分

范批：養陰清肺。退虛熱。止自汗。鎮咳逆。調氣血之劑。治虛勞肺癆。與我家「月華丸」功效並著。

范氏月華丸——天冬一兩 麥冬一兩 生地一兩 熟地一兩 山藥一兩 百部一兩 沙參一兩 川貝一兩 阿膠一兩 茯苓五錢 鱘肝五錢 「廣三七」五錢 用菊花二兩 桑葉二兩 熬膏 將阿

膠化入和藥。蜜丸，每服一九，重二錢，治肺結核極效。

鼈甲

含動物膠及碘質銅質及丁種維他命，內服使血多糖量，故治虛勞發熱有功。我家治鶴膝風之腫痛者，用鼈甲，龜版，黃柏，知母，當歸，芍藥各一錢，常服一月全愈。

天門冬

配天冬素，故鎮咳，利尿，強壯滋補。惟風寒咳嗽忌之。

秦艽

含秦艽素 Justicine，有人疑係「蓍牀」，然蓍牀，俗稱老母草，治赤眼，英文名 Justice Procumbens，未知孰是。惟本草謂花係紫色，山谷生，諒即蓍牀。含有苦味質，寄生雜果。毒性有機鹼 Vasicin ($C_{17}H_{19}N_2O$) 利尿，治風濕效。

地骨皮

即枸杞皮。含有甜菜鹼 Betaia，能使人身血糖量增添。故為強壯劑，且功能解熱。

桑白皮

含果糖及葡萄糖及微量膠質鈣質與丙類維他命。為鎮咳祛痰利尿藥。此物對於人體亦使血糖量增添，與地骨皮有相輔相合之功。

紫苑

內含槲樹皮黃色素 Quercetin 結晶體，紫苑肥皂草素 Astersaponin ($C_{27}H_{44}O_{12}$) 紫苑精 Shionon ($C_{27}H_{44}O$) 故為鎮咳之有效藥。

生地黃 含甘露蜜醇 Mannit 與糖質，能增添人體血糖量，為補血強壯藥，故治生殖力衰老及身虛虛弱肺結核病殊有效。又為止血藥。

知母 含有毒之有機酸，配糖體，苦味質，肥皂草素，為調節體溫之解熱藥。治虛勞寒熱有效。

桔梗 含桔梗肥皂草素 Kilyosaponin (C₂₁H₃₉O₁₁) 對赤血球有溶解作用。為刺激性之祛痰藥。又含菊糖，須與甘草相伍而用。治咽喉病肺炎效。

肉桂 含有肉桂香油 Cassiain 及肉桂酸 Zimmtsäure 肉桂甙 Zimmtaldehyd. 及樟腦等。有毒性。能制止微菌發育。又為健胃強壯藥。治微有熱度之尿赤病極效。

秦艽鼈甲治風勞 地骨柴胡及青蒿 當歸知母烏梅合 止嗽除蒸歛汗高

秦艽鼈甲散——治風勞骨蒸。午後壯熱。咳嗽肌瘦。頰赤盜汗。脈來細數。炙鼈甲一兩 秦艽三錢 知母一錢 當歸一錢 柴胡八分 地骨皮五錢 烏梅一個 青蒿五葉

范批：此方退熱歛汗。養陰止咳之劑。治初二期肺癆稱效。惟診斷不明。切忌妄投。反之，致有引病入室之患。

當歸 含有正丁炔正草剛鄰炭酸 n-butyliden n-valerophenon-o-carbonsäure。香氣芳菲。

能鎮靜大腦而麻醉之。使呼吸機能初期亢奮及後麻痺，血壓及體溫降下，脈搏緩徐。故爲鎮靜藥。又爲通經藥。又爲婦人產後要藥。能補血。排膿。止頭痛等。

烏梅 含枸橼酸與林檎酸，爲解熱鎮咳祛痰鎮嘔有效藥。又能止瀉，除蛔蟲。然風寒初起，表邪未去時，忌用酸質，故亦忌此物。

青蒿 含芳香精油，爲解熱發汗，鎮嗽利尿，殺蟲之劑。然泄瀉者忌用之。

秦艽扶羸龜甲柴 地骨當歸紫菀借 半夏人參乘炙草 肺勞蒸嗽服之諧

秦艽扶羸湯——治肺痿骨蒸。或寒或熱。虛勞咳嗽。聲啞不出。體虛自汗。四肢倦怠。柴胡八分

秦艽一錢 人參一錢 當歸一錢 炙龜甲二錢 地骨皮三錢 紫菀一錢 半夏一錢 炙甘草五分

加薑一片 棗三枚煎。

范批：此方治肺癆失音。寒熱往來。自汗效逆稱效。兼俱扶養體元。調和氣血之功。

紫菀湯中知貝母 參苓五味阿膠偶 再加甘桔治肺傷 咳血吐痰勞熱久

紫菀湯——治肺傷氣急。勞熱久嗽。吐痰吐血。及肺痿癰癩。紫菀一錢洗淨炒 阿膠一錢蛤粉炒成珠 知母一錢 貝母三錢 桔梗一錢 人參一錢 茯苓三錢 甘草五分 五味子十二粒

范批：補陰潤燥。清熱止血之劑。化頑痰。止久嗽。為肺傷出血。虛勞發熱之良方。

阿膠 含動物膠，內服使血中多糖質，故凝血。治失血有效。按阿膠係山東阿縣阿井水熬養牛皮或驢皮而成之一種「白明膠」Gelatine 動物膠質。阿井水甘鹹無毒，疑係明礬類之富有鉛質者，熬膠時可沉澱蛋白質，使煮出之膠不臭。性更凝固。

貝母 川貝母含甲種貝母鹼 Fritillin ($C_8H_{11}NO_2$) 乙種貝母鹼 Fritillarin ($C_{19}H_{25}NO_2$) 甲種輪橈鹼 Verticin ($C_{19}H_{25}NO_2$) 乙種輪橈鹼 Verticillin ($C_{19}H_{25}NO_2$) 有麻痺中樞神經，使呼吸緩和，脈搏動數減低之功，故能鎮咳。象貝母含甲種象貝素 Peimine 及乙種象貝素 Peimine 能祛痰。

五味子 南五味子含分解乳糖素 Galactan 與樹膠素 Arabin 粘液，為祛痰滋養強壯劑，北五味子則為極強之收斂藥。古人云：感冒不舒，及痧疹初起，不可用之。

百合固金二地黃 玄參貝母桔甘藏 麥冬芍藥當歸配 喘咳痰血肺家傷

百合固金湯——治肺傷，咽痛，喘嗽痰血。生地黃二錢 熟地黃三錢 麥冬錢半 百合一錢 炒芍

藥一錢 當歸一錢 貝母一錢 生甘草五分 元參一錢 桔梗八分

范批：養血平肝。滋腎補肺之劑。爲肝肺腎三者之同治方。肺傷咳血。咽痛作哈。治得其法。

收效頗捷。

〔百合〕 有一種苦味配糖體Glukomanna與蛋白質及脂肪澱粉，故不易消化，且有利尿之功。

〔元參〕 含有脂肪油，糖質，肥皂草素，揮發油。甘香味苦，用治療癰與咽喉諸症甚効。古人云：腹

痛泄瀉，血少目昏者不可用之。蓋脂肪油滑腸之故也。

補肺阿膠馬兜鈴 鼠粘甘草杏糯停 肺虛火盛人當服 順氣生津嗽哽甯

補肺阿膠散——治肺虛有火。嗽無津液。而氣哽者。蛤粉炒阿膠一錢 焙馬兜鈴一錢 炙甘草五分

牛蒡子炒香一錢 杏仁三錢去皮尖 糯米三錢

范批：潤肺清熱。止欬生津之劑。專治肺有鬱熱。痰中帶紅。氣哽津竭之症。

兜鈴

含苦味質，有有機酸及精油，有毒性。能收縮末梢血管，即腸管子宮，亦起強收縮之影響。

雖稱有鎮咳祛痰之功。僅肺氣腫及氣管枝炎及肺炎始可用。若喘嗽尖音則宜少用之。

牛蒡子

含牛蒡配糖體 Arctiin 與脂肪油。利尿通便。治浮腫咽喉疼痛腫脹甚効。解毒殺菌，使

化膿而散。但大便泄瀉，癰疽已潰，即不可再用。

杏仁

刺激呼吸中樞而麻痺之，因含有毒質精酸，故呼吸鎮靜而止咳。又含銅質，及苦杏仁配糖體

Amygdalin (C₂₀H₂₇NO₁₁) 故潤喉止咳。

糯米

含精米素及糊精澱粉錳質，內服使血中多糖質，故凝血。風濕痺病不能轉動者宜少服之。

小建中湯芍藥多

桂薑甘草大棗和

更加飴糖補中藏

虛勞腹冷服之瘥

增入黃耆名亦爾

表虛身痛效無過

又有建中十四味

陰斑勞損起沉疴

十全大補加附子

麥夏菴蓉仔細啜

小建中湯——治虛勞悸衄。裏急腹痛。夢遺失精。四肢酸痛。手足煩熱。咽燥口乾。虛勞黃疸。桂

枝二錢五分 生薑一錢五分 芍藥三錢 炙甘草五分 大棗十二枚 入飴糖三錢 以水七杯微火

黃取三杯。每服一杯。

范批：此方兩調氣血。補中緩脾。通利二便。肢痠不眠。黃疸勞熱。亦能兼顧。可知古人用心

密抱矣。

黃耆建中湯——治虛勞諸不足。亦治傷寒。汗後身痛。表虛惡寒。脈遲弱者。小建中湯加黃耆一錢五分。

范批：此方治氣血失調。體元虛弱。腰以上汗出不止。小溲不利。關節痠痛。施治得當。療治得當。可獲特效。

十四味建中湯——治氣血不足。虛損勞瘵。短氣嗜臥。欲成勞瘵。及陰證發斑。寒甚脈微。蜜炙黃耆三錢 人參一錢 土炒白朮一錢 茯苓三錢 蜜炙甘草五分 薑製半夏一錢 酒炒當歸一錢 酒炒白芍二錢 熟地二錢 川芎一錢 麥冬一錢 肉蓯蓉三錢 附子一錢 肉桂五分 加薑一片 七棗枚煎。

范批：補肺健胃養血祛寒溫通之劑。適合乎初期肺病及初期虛勞症。

桂枝 有毒性精油，及桂皮醛 *Zimtaldehyd.* 及松脂類「萜」質 *Terpen* 能制止微菌發育，健胃強心。惟用量須小。

甘露 含甘露蜜醇配糖質 *Mannit* 與肥皂素，脂肪油等，補血健身。治虛癆，肺結核性衰弱極有功。又止咯血子宮出血等。惟胸膈悶鬱，消化不良者，不可多用。

川芎 有精油百分之二。乃芎藭酮 *Cnidiumlacton* ($C_{12}H_{16}O_2$) 芎藭酸 *Cnidiumsäure* ($C_{12}H_{16}O_2$) 繅草酸 *Sedanosäure* 所組成。其刺激性能使血管運動神經中樞，呼吸中樞及脊髓之反射中樞興奮。而大腦麻痺。結果自動運動減少，鎮靜，血壓沉降，體溫下降及一般運動麻痺。故為中樞神經鎮靜藥。治頭痛，眩暈，腦病，中風，筋攣氣鬱等症。但骨蒸盜汗忌用之。

麥門冬 含粘液質，解熱鎮咳，治肺病効。對高熱，口渴，嘔吐，催乳皆有功。又為滋養強壯劑。古人云：心臟衰弱，失音失血，及泄瀉者皆不可用之。

肉苁蓉 含列當素，醣質 *Inulin* 脂肪油與糖質，乃強壯補精藥。亦肺病良藥，又為止血劑。

附子 烏頭之根。含烏頭素 *Aconitin* ($C_{34}H_{48}NO_{10}$) 為鎮痛藥。治熱性諸病如胸膜炎，肺炎，心

囊炎，神經痛等症甚効。吾家治鶴膝風之不痛者，用附子地黃二味各一錢，常服治愈。

益氣聰明湯葛荆 升葛參著黃柏并 更加芍藥炙甘草 耳聾目障服之清

益氣聰明湯——治內障目昏。耳鳴耳聾。黃耆三錢 人參二錢 葛根一錢 葛荆子一錢 白芍二錢

黃柏一錢 炙升麻八分 炙甘草五分

范批：化濁利要和胃緩脾，平調肝腎之劑。治頭目昏眩。耳中鳴響。及口渴少津。感冒透疹均有效。

葛根 含多量澱粉。并有黃色結晶物質，膠質，配糖體，有機鹼及揮發油，功能發汗解熱。治熱性病，口渴，頭痛，感冒，甚効。古人云：已有汗者及斑痘已見紅點者不宜再用。

葛荆子 含樟腦精油 Kampfer, 雙戊烯醇 Dipentenalkohol, 醋酸萜 Terpeneolacetate, 二環萜 α -pinen 等物，乃強壯劑，清涼藥，用治頭痛感冒。

黃柏 含軟脂鹼 Palmatin 小藥鹼 Berberin ($C_{21}H_{23}NO_2$) 甲種黃柏素 Obakulacton ($C_{15}H_{15}O_6$) 乙種黃柏素 Obakunon ($C_{15}H_{15}O_7$) 等汁。有殺菌力。對大腸菌霍亂菌尤具功效。治腹痛，消化不

良等。

〔升麻

含有機鹼升麻素Oenigenin乃解熱藥，解毒藥，治麻疹効。又能治神經痛，子宮痛，經閉，且可治舞蹈病（即精神錯亂舞蹈病，點頭性舞蹈病，雞爪瘰）慢性風濕病，慢性氣管枝炎。古人云：吐血衄血，咳嗽多痰，及麻疹痘後已見點者忌再用之。

范鳳源治肺結核法——肉桂三分 生地四錢 姜半夏三錢 炙紫苑一錢半 山萸肉三錢 五味子三分 附子片五分 當歸一錢半 製冬朮三錢 潞黨參二錢 破故紙三錢 橘紅五分 綿萆一錢半 白芍一錢 每日一帖 九十帖痊愈。凡結核性癆瘵，遠年不愈，用此藥汁擦塗數次收功。

范氏冲和膏——定痛消腫，散瘀血，治淋巴腺炎。獨活三兩 紫荆皮五兩 赤芍二兩 白芷二兩 石菖蒲一兩 醋調敷核。二三日內，完全消散。

第二章 發表之劑

麻黃湯中用桂枝 杏仁甘草四般施 發熱惡寒頭項痛 傷寒服此汗淋漓

麻黃湯——治傷寒。邪氣在表。發熱頭痛。身痛，腰痛，骨節痛。項背痛。惡寒惡風。無汗而喘。

脈浮而緊。麻黃一錢 桂枝一錢 炙甘草五分 杏仁二錢

宜透發汗解表之劑。治喘聲重不揚。無汗壯熱。頭部及週身痛楚。力量峻猛。屢建奇效。
范批：風寒咳喘脈浮之劑。治感冒受寒全身疼痛頭痛有效。

麻黃 合麻黃鹼-Ephedrin ($C_{10}H_{15}NO$) 甲種偽異性麻黃鹼 α -Pseudoephedrin ($C_{10}H_{15}NO$)、

乙種正偽異性麻黃鹼 α -Nor-Pseudoephedrin ($C_9H_{13}NO$)、 甲基左旋麻黃鹼 1-Methyl-ephedrin ($C_{11}H_{17}NO$) 甲基偽異性麻黃鹼 α -Methyl-Pseudoephedrin ($C_{11}H_{17}NO$) 刺激心臟。而使發汗。能使氣管枝筋弛緩，故治喘息咳嗽甚効。

桂枝湯治太陽風 芍藥甘草葶藶同 桂麻相合名各半 太陽如瘧此爲功

桂枝湯——治頭痛發熱汗出惡風。桂枝一錢 芍藥三錢 生薑一錢五分 炙甘草一錢 大棗四枚

范批：治感溫氣血不和。形寒發熱。頭痛乾嘔。無汗自汗。和治氣血。實表解表之特效劑。

大青龍湯桂麻黃 杏草石膏葶藶藏 太陽無汗兼煩躁 風寒兩解此爲良

大青龍湯——治中風。脈浮緊。身疼痛。發熱惡寒。不汗出而煩躁。又治傷寒脈浮數。身不痛。麻

黃一錢 桂枝一錢 炙甘草一錢 杏仁三錢 石膏五錢 生薑二片 大棗十二枚

范批：此方集麻桂湯兩方互成。爲表裏兩解之劑。外束風邪。內受寒涼。及時施投。可獲奇功。
石膏，含硫酸鈣（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ），入胃分解，能消炎利尿。

小青龍湯治水氣 喘咳嘔噦渴利慰 葶藶麻黃芍藥甘 細辛半夏兼五味

小青龍湯——治傷寒。表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。或喘或渴或利，或小便不利。少腹滿

。短氣。不得臥。麻黃一錢去節 桂枝一錢 酒炒芍藥三錢 細辛五分 炙甘草五分 乾薑五分

半夏 一錢五分 五味子八分

范批：發汗宜透和中利水之劑。平氣逆。除痞滿。亦治煩懊嘔吐。欬嗽不已。

細辛

有精油，細辛酮 Asarylketon ($C_{15}H_{24}O$)，($C_{15}H_{26}O_2$)，軟脂酸 Palmitinsäure，1-環萜

1-β-Pinen, 細辛鹼 Eucaryon ($C_{15}H_{24}O_2$)，甲基丁香油 Methyl Eugenol，能使心臟興奮而後

陷麻痺狀態，故爲鎮靜藥。且能發汗祛痰，治感冒頭痛。凡心臟病，有汗，發熱咳嗽者均忌用之。

葛根湯內麻黃囊 二味加入桂枝湯 輕可去實因無汗 有汗加葛無麻黃

葛根湯——治偶感風邪。項背几几。無汗惡風。葛根三錢 麻黃五分 生薑五分 桂枝一錢 芍藥

三錢 甘草五分 大棗十二枚

范批：宜透解表之劑。有發汗退熱。生津止渴之功。治傷風破傷風均效。

升麻葛根湯 錢氏 再加芍藥甘草是 陽明發熱與頭疼 無汗惡寒均堪倚

亦治時疫與陽斑 痘疹已出慎弗使

升麻葛根湯——治傷寒。中風。頭疼身痛。發熱惡寒。無汗口渴。目痛鼻乾。不得臥。及傷寒發斑

。欲出不出。寒暄不時。人多疾疫。升麻八分 芍藥三錢 芍藥二錢 炙甘草五分 加薑煎。如頭痛加川芎一片白芷一錢。身痛背強，加羌活一錢防風一錢。熱不退，春加柴胡三錢黃芩五分防風三錢。夏加黃芩三錢石膏三錢。頭面腫，加防風三錢荆芥三錢連翹三錢白芷一錢川芎一錢牛蒡一錢石膏一錢。咽喉炎加桔梗一錢。斑出不透，加紫草茸一錢。脈弱加入參一錢。胃虛食少，加白朮一錢。腹痛則芍藥四錢。

范批：輕揚發表，升津止渴之劑。感染熱毒。膚發疹斑，隱而不現。壯熱身痛。口渴無汗，服之甚效。

白芷 有酸質 Oxy-pentadecylic Säure 與一種白芷癩變毒素 Angelicotoxin 能使血管經運動神經中樞與呼吸及迷走神並奮起興奮作用。血壓上升。脈搏緩徐。治感冒齒痛効。通經亦効。止鼻衄尿血，下血。

黃芩 合甲種黃芩色素 Woogonin ($C_{15}H_{12}O_5$) 及乙種黃芩色素 Baicalin ($C_{21}H_{18}O_9$) 爲利尿解熱有效藥。
荆芥 有油，爲右旋「荷薄荷醇」 α -Menthon 及「檸檬油」 α -Limonen 爲發汗驅風藥。

連翹 含有連翹配糖體 Phyllirin，爲內服消毒藥。治疥癬癩瘡効。古人云：癰疽已潰，及胃弱作洩者不宜用之。

紫草茸 有結晶紫色素一種 Acetylshikonin ($C_{17}H_{17}O_6$) 與 Shikonin ($C_{16}H_{16}O_5$) 治皮膚病濕疹甚効。

古人云：脾胃弱而洩瀉及小便清利者不宜多用。

九味羌活湯用防風 細辛蒼朮與川芎 黃芩生地同甘草 三陽解表益薑蔥

陰氣虛弱人禁用 加減臨時在變通

九味羌活湯——治傷寒。傷風。憎寒壯熱。頭痛。身痛。項痛。脊強。嘔吐。口渴。無汗。及感冒

四時不正之氣，溫病。熱病。羌活三錢 防風三錢 蒼朮一錢半 細辛五分 川芎一錢 白芷一

錢 生地黃一錢 甘草五分 加生薑一兩葱白一個煎。

范批：發表宣化之劑。功能利關節。燥寒濕。解表邪。治傷風頭痛。肢痠無汗。

十神湯裏葛升麻 陳草芎蘇白芷加 麻黃赤芍兼香附 時行感冒效堪誇

十神湯——治風邪頭痛。麻黃一錢 葛根三錢 升麻八分 川芎一錢 白芷一錢 紫蘇一錢 甘草

五分 陳皮一錢 香附一錢 赤芍藥三錢 加薑一片葱白一個煎。

范批：宜肺利氣之劑。能透解表裏風寒。治感冒頭痛。無汗惡寒。身熱肢痠，及痘毒破傷風諸症極效。

紫蘇 含紫蘇醛 *Perillaaldehyd* (C_9H_8O) 爲有効之殺菌藥。能制止腸內異常發酵，并驅除十二指腸蟲。

香附 含香精油達百分之一，中爲「香附精」*Cyperen* (C_9H_{16}) 與「香附油」($C_{15}H_{24}O$) 及其脂肪酸與石灰酸 *Prenol* 性物質。爲婦科要藥。對於通經與鎮瘰有效。但經水先期而淡，則不用之。

赤芍藥 含天冬精 *Asparagin* 與安息香酸 *Benzoesäure*，治婦科病。對腹痛胃痙攣，腸炎，下痢等病爲鎮瘰藥。又利尿効。

神朮散用甘草蒼 細辛藁本芎芷羌 各走一經祛風濕 風寒泄瀉總堪嘗
太無神朮卽平胃 加入菖蒲與藿香 海藏神朮蒼防草 太陽無汗代麻黃

若用白朮易蒼朮 太陽有汗此湯良

神朮散——治傷風。頭痛無汗。鼻塞聲重。及風寒咳嗽。時行泄瀉。蒼朮一錢 川芎一錢 白芷一

錢 羌活二錢 藜本一錢 細辛五分 炙甘草五分 加薑一斤葱三椀煎。

范批：疎風發汗勝濕之劑。治傷風頭痛鼻塞無汗身痛稱效。

太無神朮散——治感山嵐瘴氣。憎寒壯熱。一身盡痛。頭面腫大。癍瘡時毒。蒼朮一錢泔浸 薑汁

炒厚朴一錢 陳皮去白一錢 炙甘草五分 藿香二錢 石膏蒲一錢五分

范批：理氣和胃。辟穢通竅之劑。治感寒腹痛。肢節痠楚。頭面腫大之症。

海藏神朮散——治內傷冷飲。外感寒邪而無汗者。亦治剛瘧。製若朮一錢 防風三錢 炙甘草五分

加生薑一斤葱白一椀煎。

范批：發表和裏。化濕溫運。治破傷風項強無汗。宜加麻黃獨活當歸白芷天麻，收效見速。

白朮湯——治內傷冷飲。外感寒邪有汗。亦治柔瘧。白朮一錢 防風三錢 炙甘草五分 薑三片

范批：疎宣發表。溫運和胃之劑。外感風邪身熱有汗不解者。宜用桂枝和洽之。

基本 有精油千分之十三。名「基本油」Nonthosmyrhol爲治頭痛之要藥。去風邪甚効。又含雙甲

氧基丙烯苯 Dimethoxyallylbenzol 及少量軟脂酸 Palmitinsäure 亦能除風邪頭痛。古人云

：發熱口渴，骨痛，產後心臟有疾忌用之。

微 含蘋果酸 Apfelsäure、磷酸鹽 Phytin 及硫黃化合物 Allylsulfid 殺肺結核菌效，然多汗者，及服

地黃常山者均忌之。能祛痰。亦爲強心利尿劑。

厚朴 其樹皮含厚朴素 Magnol 百分之五，能麻痺知覺神經及血管運動神經，使血壓上升。治瘧疾

腹痛嘔吐，甚効。且藥力之持續性甚久。

石菖蒲 含精油千分之八。名「菖蒲醇」Asaron $C_{12}H_{16}O_8$ (4 Propenyl-1-2-5 trimethyl oxy

benzene) 又含軟脂酸 Palmitinsäure 及石灰酸 Phenol 等，故爲鎮靜止痛健胃驅蟲藥。又爲婦人腰冷腹痛要藥。治神經衰弱，記憶力減退效。古人云：滑精多汗者，不宜用之。

麻黃附子細辛湯 發表溫經兩法彰 若非表裏相兼治 少陰反熱曷能康

麻黃附子細辛湯——治傷寒。始得之，反發熱，脈沉者。麻黃一錢 細辛五分 炮附子五分 先煎

麻黃。去沫。納諸藥煎。

范批：大表大散峻烈之劑。能溫發心臟。發腎經膀胱之虛寒外達。此方表散之中兼寓溫補之意。前人立方。旨微可見。然頗難應用。投治失當。至爲危險。

人參敗毒茯苓草 枳桔柴前羌獨芎 薄荷少許薑二片 時行感冒有奇功
去參名爲敗毒散 加入消風治亦同

人參敗毒散——治傷寒頭痛。憎寒壯熱。項強睛暗。鼻塞聲重。風痰咳嗽。及時氣疫癘。嶺瘴鬼疔。
。或聲如蛙鳴。赤眼口瘡。濕毒流注。脚腫腮腫。喉痺毒痢。諸瘡斑疹。人參一錢 羌活三錢
獨活三錢 柴胡八分 前胡一錢 川芎一錢 桔梗八分 枳殼三錢 茯苓三錢 甘草五分 加薑
三片。薄荷三分煎。

范批：疎宣解化。肅肺固表之劑。虛人感受風寒。中氣虛餒。邪難外達。此方見功

前胡 有香氣，含前胡配糖體 $\text{Nodakenin C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_6$ 能加水分解，爲前胡素 $\text{Nodakenetin C}_{14}\text{H}_{16}\text{O}_4$ 及葡萄糖，故能鎮痛鎮咳祛痰。

{枳殼 合檸檬精油 Limonen 橙葉香油 Linalool, 醋酸橙葉香酯 Linalylacetat 鄰氨基苯甲酸香酯

Anthranilsäuremethylester。爲健胃藥。又爲止瀉藥。

{薄荷 含薄荷腦 Menthon, 薄荷油 Menthol, 一環萜 Pinen, 醋酸薄荷香酯 Menthylacetate 等, 能

麻痺中樞神經系。

再造散用參薯甘 桂附羌防芎芍參 細辛加棗煨薑煎 陽虛無汗法當諳

再造散——治便秘。頭痛。項強。發熱惡寒。不能作汗。人參三分 黃耆三錢 桂枝一錢 甘草五

分 炮附子五分 細辛五分 羌活三錢 防風三錢 川芎一錢 煨薑一錢 棗二枚 加炒芍藥三

錢煎。

范世：宜和發表。補中益氣。虛人體抗力薄弱。感受風邪不易外達，此方主之。

麻黃人參芍藥湯 桂枝五味麥冬襄 歸薯甘草汗兼補 虛人外感服之康

麻黃人參芍藥湯——治內蘊虛熱。外感大寒。而吐血。麻黃一錢 白芍三錢 黃耆二錢 當歸一錢

五分 炙甘草五分 人參三分 麥冬一錢 桂枝五分 五味子五粒

范批：半表半裏，攻補兼施，治虛人外感寒邪，內蘊虛熱，洵實表解表，半攻半守之妙。

神白散用白芷甘 薑葱淡豉與相參 一切風寒皆可服 婦人鷄犬忌窺探

肘後單煎葱白豉 用代麻黃功不慚

神白散——治一切風寒，頭痛身熱。白芷一錢 甘草五分 淡豉五十粒 薑三片 葱白三寸 煎服
范批：表散和解強心取汗之劑。

淡豉 除胃中積熱，治水病脹滿，含葡萄糖，配糖質，單寧質，膠質，脂肪油，發揮油及黑豆色素
Kurumamin, 赤色素 Cynidinchlorid 與維他命 K，故爲止血劑，滋養劑，利尿劑。治傷寒
腸熱症效。然消毒殺菌不及西藥「烏羅屈洛平」(又名胺仿)，*Protopine* 之大。

范鳳源治腥紅熱喉腫方——土牛膝搗汁一杯，加陳醋一調羹，嗽喉退腫吐粘痰。另服下方；牛蒡子
三錢 蟬衣一錢 桔梗一錢 杏仁三錢 赤苓三錢 桑葉三錢 薄荷八分 丹皮一錢半 大貝母
三錢 天花粉三錢 茅根三錢。如發不透，加淡豉三錢使出汗。如已透則可不加，連服五帖愈。

第三章 攻裏之劑

大承氣湯用芒硝 枳實大黃厚朴饒 救陰瀉熱功偏擅 急下陽明有數條

大承氣湯——治傷寒。陽邪入裏。胃寒。不大便。發熱譫語。自汗出。不惡寒。痞滿。燥實堅。三焦大熱。脈沉實者。亦治剛瘧。大黃五錢 芒硝五錢 厚朴一錢 枳實五枚 先煎朴實。將熟。納大黃煮二三沸。傾碗內。和芒硝服。得利卽止。

范批：攻瀉潤燥破氣軟堅峻瀉之劑。治邪滯鬱留腸胃。不食不便。胸腹脹悶欲死，得領首銜。

大黃含 「鼠李素」Emodin $C_{15}H_{10}O_5$ 與「橘黃色結晶大黃酸」Chrysophanic saure，及大黃素 Rhein 等，故能健胃而同時爲緩下藥。用以治頭痛，胃腸病，腳氣，痢疾，甚效。外用拌醬油治白癬效。老年人血枯氣衰，及婦女妊娠後氣血虛弱者忌多用之。

芒硝 含硫酸鈉，爲峻下劑。孕婦忌之。

枳實 含配糖體 Aeglin 故爲健胃藥，治胸滿，胸痛，腹滿，腹痛效。

小承氣湯朴實黃 譫狂痞鞭上焦強 益以羌活名三化 中風閉實可消詳

小承氣湯——治傷寒。譫語便鞭。潮熱而喘。及雜病。上焦痞滿不通。大黃五錢 薑炒厚朴一錢

枳實三枚 麩炒

范批：力量稍遜於大承氣。爲和胃理氣通腑之緩下劑。

三化湯——治中風。邪氣作實。二便不通。大黃五錢 薑炒厚朴一錢 麩炒枳實三枚 羌活二錢

范批：疎風逐濕。利尿通便之劑。治外感風邪。內蘊濕滯釋效。

調胃承氣消黃草 甘緩微利將胃保 不用朴實傷上焦 中焦燥實服之好

調胃承氣湯——治傷寒。不惡寒。反惡熱。口渴。便秘。譫語。腹滿。中焦燥實。及傷寒吐後腹脹

滿者。胃腸病不吐不下而心煩者。大黃一錢 酒浸 芒硝三錢 炙甘草五分 少少溫服。

范批：和胃緩中。潤燥軟堅之緩瀉劑。治傷寒初。邪已入裏。並治消渴症，洩多善食。

木香檳榔青陳皮 枳殼柏連稜菴隨 大黃黑丑兼香附 芒硝水丸量服之

一切實積能推蕩 瀉痢食瘧用咸宜

木香檳榔丸——治胸腹積滯。痞滿結痛。二便不通。或瀉泄下痢。裏急後重。食瘧實積。木香六分

檳榔一錢 青皮醋炒五分 陳皮去白五分 枳殼一錢 黃柏酒炒一錢五分 黃連茶萸湯炒六分

三稜醋炙五分 莪朮醋炙五分 酒浸大黃一錢 香附二錢 黑索牛二錢 芒硝水丸。

范批：行氣解鬱。消痞除滿之劑。能行食滯。達氣滯。為治痢疾瘧疾之要方。然非實積。不宜

輕投。

廣木香 含精油千分之三。其主要成分為鎖狀化合物 Δ piotaxen $C_{15}H_{24}$ 又有樟腦素 Camphen, 木香

精三種 α - β -costen C_5H_8 , Costuslacton $C_{12}H_{20}O_2$, Dihydro Costuslacton $C_{12}H_{20}O_2$ 木香酸

Costussäure $C_{12}H_{20}O_2$ 木香油 Costol $C_{12}H_{20}O$ 為芳香健胃藥。

檳榔 含有檳榔鹼 Arecolin 此物對副交感神經之末端，起興奮作用，故能刺激中樞神經，使口涎

增加，使眼瞳縮小，同時并驅除雜蟲。

青皮 即青橘皮，含甲乙丙種維他命，及檸檬精 Limonen, 及林擒配糖體 Hesperidin 等為芳香健

胃劑。但能添增口涎，減輕病毒。

荆三稜 含矽鈣鈉氣等質 (SiO₂, CaO, Na₂O, Cl) 催乳通經。故妊婦禁忌。其效與香附並用，則更甚。心臟有病者忌多用。

莪朮 含香精油百分之一。其主要成分為「樟腦油」Cineol樟腦 Kampfer。乃芳香性健胃藥。脾胃素弱，又無積滯者不宜多用。

黑牽牛 含峻下劑百分之二。即樹脂配糖體「牽牛素」Pharbitin。故利尿通便甚效。

枳實導滯首大黃 芩連麴朮茯苓麴 澤瀉蒸餅糊丸服 濕熱積滯力能攘

若還後重兼氣滯 木香導滯加檳榔

枳實導滯丸——治脾胃傷於濕熱之物，不得施化。痞悶不安。腹內硬痛。積滯泄瀉。大黃三錢 麴

炒枳實一錢五分 酒炒黃芩一錢五分 酒炒黃連一錢五分 炒神麴一錢五分 土炒白朮一錢 茯苓

芩一錢 澤瀉一錢 蒸餅爲丸。多寡量服。

范批：利濕洩熱。破氣導滯之劑。治濕熱鬱於腸胃。胸腹痞脹。

神效 含菌母體，能治感冒發熱頭眩。消積食。孕婦不宜多用。

溫脾參附與乾薑 甘草當歸硝大黃 寒熱並行治寒積 臍腹絞結痛非常

溫脾湯——治久痢赤白。脾胃冷實不消。人參一錢 附子一錢 甘草一錢 芒硝一兩 大黃五錢

當歸一錢五分 乾薑一錢 煎服一日三次。

范批：溫運脾胃。調理氣血之劑。加黃連。可治日久赤白痢下。

蜜煎導法通大便 或將膽汁灌肚中 不欲苦寒傷胃府 陽明無熱弗輕攻

蜜煎導法——治胃腸病。自汗。小便利。大便秘者。蜂蜜用銅器微火。蒸頻攪。勿令焦。候凝如餡

。捺作挺子。頭銳如指。摻皂角末少許。乘熱納肛門中。用手抱住。欲大便時去之。

范批：治偏虛之津液枯耗，大便燥結。

豬膽導法——豬膽一枚取汁。入醋少許。用竹筒。長三四寸。以一半納肛門中。將膽汁灌入大腸中

。頃刻大便。

范批：此亦外用通便法，與蜜煎導法稍異，治大腸燥熱便結之偏實症。

蜜汁，膽汁，皂汁，灌入肛門內，皆能滑腸通大便。

范鳳源治痢疾方——生熟大黃三錢 川黃連五分 白蘚皮一錢 馬齒莧三錢 苦參子一錢 炒黃柏

二錢 槐花米一錢 馬鞭草一錢 細生地二錢 黃芩一錢半 蒲黃五分 炒山梔一錢 仙遺糧二

錢 陳皮一錢 人中黃二錢 蒼朮二錢 桔梗一錢 滑石一錢 香附一錢半 如赤痢用白芍三錢

白頭翁三錢 秦皮三錢 當歸三錢 車前子三錢 昆布三錢 萊菔子一兩 海藻三錢 枳壳三錢

檳榔三錢 如有寒熱，加柴胡一錢，防風一錢 西法赤痢，噤口痢，細菌痢，服「滅痢菌汁」

「消治龍」每隔四小時服一片，至病除爲止。治阿米巴痢疾，休息痢則每六小時服西藥「藥特

靈」二片，連服四次。或服西藥「次硝酸鉍」，又名「次硝酸蒼鉛」，每六小時，服一克，約合

新秤三分半。連服三日全愈。痢疾治療以愈早爲愈妙。國藥功效極小。治療適當，幸能全愈。然

科學進步，醫藥以救人爲第一。奉勸國醫，改用西藥，萬試萬靈。毋再固執。

第四章 涌吐之劑

瓜蒂散中赤小豆 或入藜蘆鬱金湊 此吐實熱與風痰 虛者參蘆一味勾

若吐虛煩梔豉湯 劇痰烏附尖方透 古人尙有燒鹽方 一切積滯功能奏

瓜蒂散——治卒中痰迷。涎潮壅盛。顛狂煩亂。人事昏沉。五癰痰壅。及火氣上衝。喉不得息。腹滿噎乾。欲吐不出。甜瓜蒂炒黃三錢 赤小豆三錢 共爲末。熱水或酸醃水調下。量人虛實服之。吐時須令閉目。緊束肚皮。吐不止者，葱白湯解之。良久不出者，含砂糖一塊卽吐。

范批：吐有形之物而寬舒中樞之劑。治痰濁壅遏氣道。驟然形黃氣喘。神志昏迷之症。

三聖散——瓜蒂散 除赤豆，加防風三錢 藜蘆一錢五分。又瓜蒂散 除赤豆，加鬱金二錢 薑汁五錢 鵝翎探吐。亦治中風，風痲，痰厥，頭痛。

范批：此方亦係吐利之劑。

參蘆散——治虛弱之人。痰涎壅盛。人參蘆，研爲末。水調下。一二錢。或竹瀝和服。

范批和胃滑痰之劑。虛人痰濁蘊鬱。宜吐利培補兼施。

梔子豉湯——治傷寒，汗吐下後。虛煩不眠。劇者反覆顛倒。心下懊憹。及大下後。身熱不退。心下結痛。或痰在膈中。梔子十四枚 淡豉三錢 服後令微吐。

范批：開鬱除煩之劑。治偏虛之身熱懊憹胸痞滿症。若令吐利，則加苦參藜蘆各一錢半。丹溪治許白雲法——用瓜蒂梔子苦參藜蘆屢吐不透。後用米漿水和烏頭附子尖服之。始得大吐。

范批：此丹溪方，有效，治胃腑虛餒而風痰屬實。護胃氣吐膠痰爲虛實兼治方。

乾霍亂吐方——治乾霍亂。欲吐不得吐。欲瀉不得瀉。腹中大痛者。燒鹽三錢 熱童便一杯 三飲而三吐之。又單用燒鹽熬水調飲。以指探吐。名燒鹽探吐法。亦治傷食。痛連胸膈。痞悶不通。手足逆冷。尺脈全無者。

范批：此方性頗和平，力量單薄。以治便秘燥熱有功。於霍亂恐無能爲力矣。

瓜蒂 味苦，有苦味結晶「溝繁縷果毒素」Elatarin $C_{15}H_{21}O_5$ 能刺激胃之知覺神經，及嘔吐中樞而

嘔吐。治食傷霍亂效。

赤小豆

含脂肪，脂肪酸，肥皂草素三種，第一種肥皂草素 Saponin 1. ($C_{47}-48H_{71-72}O_{15}$) 加水分解，得 $C_{21}H_{41}O_5$ 及肥皂草素油狀物 Sapogenin 能在腸內呈刺激作用，又含葡萄糖 Glucose, 甲基五氧糖 Rhamnose, 膠質五氧糖 Arabinose 等皆滋補身體，遂津液，利小便。下水腫。消炎緩下。又含乙種維他命，能抗神經炎症，治腳氣效。

藜蘆

含藜蘆鹼 Jervin $C_{25}H_{27}NO_5$ 與「活性藜蘆毒素」Protoveratrin $C_{23}H_{25}NO_2$ 爲劇吐劑。亦爲農產殺蟲劑。外用治疥癬效。內服雖能治急性肺炎，急性關節炎，作解熱之用，但頗危險。

鬱金

含「鬱金黃色素」Curcumin $C_{21}H_{20}O_6$ 千分之三。精油百分之五。澱粉百分之四十。及多量檸檬鉀 Kaliumoxalat 與樟腦，治吐血，鼻衄，血尿効。又外塗治痔，創傷，膿腫甚效。又有人用鬱金一錢半 明礬五分 治羊癲效。

灌 有惡臭，含有硫黃化合物，配糖體，肥皂草素，苦味質，用碳酸煮沸，能呈蟻醛 Formaldelyd

反應故能殺菌。功能治噎膈，反胃，吐血等。生韭汁，因有惡臭，能引起嘔吐。韭菜子能治陰萎遺精遺尿。

人參蘆 係桔梗之蘆，含肥皂草素，性苦。用以催嘔吐，甚效。昔人常用桔梗假冒人參。故人參蘆實係桔梗蘆。

竹瀝 含乙種維他命及右旋葡萄糖等質 d -Glucose，纖維左旋五氧糖 l -Xylose 故治打傷黃疽，外敷消腫消炎。除痰，利尿，治吐血，肺痿。

梔子 含苦味質梔子黃色素 Gardenin 及梔子配糖體 Genipin 甘露蜜醇 Mannit 揮發油等甚多。生咳能令人作吐。內服解熱，淨血。治頭痛，感冒。

苦參 含「苦參鹼」*Matrin C₁₅H₂₁N₃* 約百分之二。能最初使大腦麻痺。次癱瘓中樞神經興奮，而發強度痙攣。又含脂肪油，及少量揮發性鹽基金雀花素 *Cytisin (C₇H₁₁NO)* 故為健胃藥。又為驅除蛔蟲藥。外用殺動物性寄生蟲。

燒鹽汁 能刺激胃部而嘔吐。又能減少血中毒素。

童便 依化學分析，含有鹽質，及尿素 Carbanide $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 及性慾刺激素 Hormone 能安神而催眠。

稀涎皂角白礬班 或益藜蘆微吐間 風中痰升入眩仆 當先服此通其關
通關散用細辛皂 吹鼻得嚏保生還

稀涎散——治中風暴仆。痰涎壅盛。氣閉不通。先開其關。令微吐稀涎。續進他藥。亦治喉痺。不進。食能皂角四挺，去皮弦炙 白礬一兩 爲末。溫水調下五分。或加藜蘆一錢五分。

范批：滌痰開竅之劑。治中風神迷痰壅。有開竅豁痰之功。

皂角 含皂莢素 Gleditsiasaponin $\text{C}_{57}\text{H}_{100}\text{O}_{24}$ 百分之十。能溶血球，故爲祛痰藥。又治淋病。亦爲利尿藥。體涉虛弱，及腥紅熱鎖喉風，或孕婦均忌之。

白礬汁 含硫酸鉛。巨量吞服，則吐。能使呼吸緩遲。便秘。蓋其力能使胃腸收縮也。

范鳳源治霍亂方——牙皂二錢五分 硃砂二錢五分 桔梗一錢四分 木香二錢 貫仲二錢 明雄黃二錢 藿香二錢 廣皮二錢 甘草二錢 薄荷二錢 細辛二錢 防風二錢 白芷二錢 廣玉金二

錢 枯礬二錢 麝香一錢 此藥內服三錢 或吹鼻孔中。小兒減半。

范鳳源痧藥水——廣木香十二兩 公丁香九兩 川朴一斤半 草果九兩 生蒼朮十八兩 茴香九兩

生大黃九兩 細辛九兩 石菖蒲九兩 小青皮九兩 新會皮三兩 樟腦六兩 薄荷冰六兩 取淨

汁四十茶碗，約七百廿盎斯，二萬西西光景。每次服十滴至三十滴。

范鳳源治喉紅腫方——桑葉三錢 射干五分 掛金燈二錢 黃藥十三錢 炒殭蠶二錢 絲瓜絡二錢

馬勃六分 金果榴三錢 土牛膝二錢 象貝母二錢 番瀉葉一錢 薄荷後下一錢 一劑治愈

范鳳源治舌下腫方——古稱重舌。薑汁炒川連五分 生地三錢 當歸尾一錢 赤芍三錢 木通一錢

連翹三錢 防風一錢 荆芥二錢 連服三劑愈。

范鳳源治赤眼方——煨牡蠣三錢 石決明三錢 淡竹茹二錢 車前子二錢 龍胆草一錢半 澤瀉三

錢 金銀花八分 生甘草一錢。四劑愈。

范鳳源治溺血方——當歸三錢 白朮二錢 川芎五分 生地二錢愈。

第五章 和解之劑

小柴胡湯和解供 半夏人參甘草從 更用黃芩加薑棗 少棗百病此爲宗

小柴胡湯——治傷寒。中風。往來寒熱。胸脇痞滿。默默不欲食。心煩喜嘔。或腹中痛。或脇下痛。或渴或咳。或利或悸。小便利。口苦耳聾目眩。或汗後餘熱不解。及春月時嗽。瘧發寒熱。

亦治傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。不欲食。大便鞭。脈細者。婦人寒熱。柴

胡八分 半夏一錢 人參三分 甘草五分 黃芩三錢 大棗十二枚 嘔逆加生薑五分 陳皮一錢

煩而不嘔，去半夏人參，加括蕒三錢。渴者去半夏，加花粉三錢。若不渴，外有微熱，去人參，加桂枝一錢，覆取微汗。咳嗽去參棗生薑，加五味子五分，乾薑五分。虛煩加竹葉一錢，粳米一錢。齒燥無津，加石膏三錢。痰多加括蕒三錢，貝母三錢。腹痛去黃芩，加芍藥三錢。脇下痞鞭，去大棗，加牡蠣三錢。脇下痛，加青皮一錢，芍藥三錢。心下悸，小便不利，去黃芩，加茯苓

蒼三錢。頭痛加川芎一錢。發黃加茵陳一錢。

范批：調和氣血。解熱止渴。和胃健脾之劑。虛人方可用參，否則反有戀邪之患。

括萎 含括萎色素 *Trichoxanthin* 及澱粉，脂肪。治咳嗽效。又爲治熱性病口渴之要藥。對於肺結

核，止咯血，解熱甚效。又利尿，催乳亦效。但胃寒食少，

天花粉 卽括萎根，含澱粉甚富。又含括萎色素及脂肪，故解熱利尿，甚効。古人云：胃寒食少，

脾虛泄瀉者均少用之。

竹葉 含維他命丁及萆酸等，功能利小便。

杜蠟 含銅質礦質甲種丁種維他命，炭酸鈣，磷酸鈣，硅酸等。能消硬腫。去尿酸，使痞者消，硬

者軟。

茵陳 有精油，二環萜 β -Pinen，茵陳香精 *Capillen* $C_6H_8 - C_7H_8$ 與結晶物，其果實則含茵陳素 *Dime*

tyriscauletin 爲黃疸之特效藥。能使肝臟及膽道退腫，使胆汁變化，又有發汗利尿作用。

四逆散裏用柴胡 芍藥枳實甘草須 此是陽邪成厥逆 斂陰泄熱平劑扶

四逆散——治外感風邪入裏，四肢逆而不溫。柴胡八分 芍藥三錢 炒枳實五分 炙甘草五分
范批：解熱和胃通便之劑。

黃連湯內用乾薑 半夏人參甘草棗 更用桂枝兼大棗 寒熱平調嘔痛忘
黃連湯——治傷寒。胸中有熱而欲嘔。胃中有寒而腹痛。黃連八分炒 乾薑一錢炒 桂枝一錢 甘
草五分 人參一錢 半夏一錢五分 大棗十二枚

范批：和胃止嘔之劑。以消化不良，食入作嘔，胸腹脹痛效。

黃芩湯用芍芍并 二陽合利棗加烹 此方遂爲治病祖 後人加味或更名
再加生薑與半夏 前證兼嘔此能平 單用芍藥與甘草 散逆止痛能和營

黃芩湯——治小腸三焦合病。自下痢者。黃芩一錢 芍藥三錢 甘草五分 大棗十二枚
范批：補腸胃虛弱，解表裏邪熱之合劑。

黃芩加半夏生薑湯——治前證兼嘔者。亦治咳嗽而嘔苦水如膽汁者。黃芩湯 加半夏一錢五分 生
薑三片

范批：大體與黃芩湯同。爲和胃止嘔解熱之劑。兼治痢下。

芍藥甘草湯——治腹中不和而痛。白芍藥三錢 甘草五分。

范批：氣血不和之理氣和血劑。治膨脹且痛效。

逍遙散用當歸芍 柴芩朮草加薑薄 散鬱除蒸功最奇 調經八味丹梔薯

逍遙散——治血少肝燥。骨蒸勞熱。咳嗽。潮熱往來。寒熱口乾。便澀。月經不調。柴胡八分 酒

拌當歸一錢 酒炒白芍三錢 土炒白朮二錢 茯苓三錢 炙甘草五分 加煨薑五分薄荷一片煎。

范批：補血潤燥健脾和胃解鬱除熱之綜合劑。治婦女月經不調，帶下淋瀝及一切難治之症。

八味逍遙散——治怒氣傷肝。血少目昏。逍遙散，加丹皮一錢五分 梔子一錢五分。

范批：平肝利濕涼血洩熱之劑。餘與逍遙散同治。

牡丹皮 含有「牡丹香醇」 $\text{Paeonol C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ 與醇素及配糖體，葡萄糖及植物脂臘脂 Phytosterin 等

。爲治頭痛腰痛關節炎之鎮痙藥。又治婦人月經不順，產後諸病。蓋亦止血藥也。

藿香正氣大腹蘇 甘桔陳苓朮朴俱 夏蠶白芷加薑棗 感傷嵐瘴並能驅

藿香正氣散——治外感風寒。內傷飲食。憎寒壯熱。頭痛嘔逆。胸膈滿悶。咳嗽氣喘。及傷冷傷濕。瘧疾中暑。霍亂吐瀉。藿香一錢 紫蘇二錢 白芷一錢 大腹皮一錢 茯苓三錢 土炒白朮二錢 陳皮一錢 半夏麩一錢 薑製厚朴一錢 桔梗八分 甘草五分。加薑一片棗七枚煎。

通用方。

大腹皮 乃檳榔樹之樹皮。含檳榔有機酸 *Arecaussalbaloid* 富檳榔素 *Arecolin* 能刺激中樞神經 與末梢臟器，使利尿而通大便。亦能驅蟲。虛弱者少用之。

半夏麩 含醇質與鎂質。消食積，止嘔吐。

六和藿朴杏砂呈 半夏木瓜赤茯苓 朮參扁豆同甘草 薑棗煎之六氣平
或益香薷或蘇葉 傷寒傷暑用須明

六和湯——治夏月飲食不調。內傷生冷。外傷暑氣。寒熱交作。霍亂吐瀉。及伏暑煩悶。倦怠嗜臥。口渴便赤。中酒等證。砂仁五分 藿香一錢 厚朴一錢 杏仁三錢 半夏二錢五分 扁豆一錢 木

瓜二錢 人參一錢 白朮二錢 赤茯苓三錢 甘草五分 加薑一片棗七枚煎。傷暑加香薷一錢。傷冷加紫蘇一錢。

痘批：健脾消食寬中利尿之劑。治霍亂暑濕，及夏日胸悶食少等症。

扁豆 含維他命C與精酸等，利尿最效，治水腫脹滿，及腎臟炎腎臟病，殊有功效。

木瓜 有二種，一產於熱帶，如台灣南部琉球等處，屬番瓜樹科又名萬壽果，學名，*Carica papaya*，L₁含多量蛋白分解酵素Papain，為蛋白質消化劑。又驅除雜蟲與其他腸寄生蟲。最有效

力。蓋寄生蟲外皮皆有抵抗力。惟蛋白分解酵素能有力侵犯之。又木瓜葉含「木瓜鹼」*Carbacin* $C_{15}H_{15}NO_2$ 有強心作用。殺赤痢菌有效。但本草所言之木瓜，產於浙江，屬蕃薇科木瓜屬，學名*Cydonia Sinensis*, Thunin含多量之有機酸，如林檎酸，及糖類外，尚含利尿藥Arbutin及配合糖體，*Nitroglycosid*功能治腎盂炎，膀胱炎，乃尿道腎臟之防腐收斂藥也。

香薷 含香薷酮*Eisholtziaketon* $C_{10}H_{16}O_2$ 百分之一。為利尿發汗藥。治腹痛，吐瀉，霍亂，腳氣，口臭效。

清脾飲用青朴柴 芩夏甘苓白朮借 更加草葉薑煎服 熱多陽瘧此方佳

清脾似——治瘧疾。熱多寒少。口苦溢乾。小便赤澀。脈來弦數。青皮一錢 厚朴醋一錢炒 柴胡

八分 黃芩三錢炒 薑製半夏一錢五分 茯苓三錢 土炒白朮二錢 炙甘草五分 草葉一錢 加

薑一片煎。

范批：解熱散寒和胃健脾行痰破滯，通利二便之劑。截痰瘧（即間日瘧）頗效。

草葉 卽草豆蔻。含揮發油，苯爾Phenylketon，能驅風殺菌。又爲芳香性健胃藥。

痛瀉要方陳皮芍 防風白朮煎丸酌 補土瀉木理肝脾 若作食傷醫便錯

痛瀉要方——治痛瀉不止。土炒白朮三錢 炒白芍二錢 炒陳皮一錢半 防風一錢 或煎或丸。久

瀉加升麻一錢。

范批：平肝和胃燥濕運脾之劑。調氣止痛。實脾止瀉，治腹痛洩瀉有效。

范鳳源治療方——馬鞭草三錢 柴胡八分 黃芩一錢五分 人參一錢 甘草五分 大黃二錢 當歸

三錢 芍藥二錢 半夏一錢五分 茯苓三錢 知母一錢五分 葛根一錢 檳榔一錢 白朮一錢五

分 丹皮一錢五分 宜木瓜二錢 川朴花八分 青皮一錢。大便秘用赤芍，便瀉用白芍，去大黃。熱甚加甜茶葉一錢 寒甚加草菓一錢 寒多與泄瀉加烏梅一錢 久瘡加鼈甲一錢 製首烏一錢 瘡母卽脾脹大，加桃仁一錢 紅花一錢 三稜一錢 蓬莖朮一錢 此方於中日戰爭時，頒發於軍隊中，頗獲奇效。蓋馬鞭草爲國產治瘡聖劑，內含「馬鞭草素」Verberalin $C_{17}H_{15}O_4$ 結晶性配糖體，故能促進血液凝固，能治瘡也。

范鳳源治黃疸方——皮膚橘黃色，尿如油狀，乃胃腸發炎，是謂陽黃疸，用大黃二錢 黃柏二錢

梔子三錢 茵陳一錢 黃芩一錢 甘草一錢 二星期全愈。若皮膚黑裏帶黃，乃肝腎疾患，是謂陰黃疸，用附子一錢，肉桂一錢 乾姜一錢，茵陳一錢，約四星期全愈。

范鳳源治小腸癱方——肚脹四周作硬，不必服瀉藥，用下方四劑治愈。當歸三錢 赤芍三錢 連翹

三錢 大貝母三錢 天花粉三錢 丹皮二錢 苡米一兩 澤瀉三錢

范鳳源胸痺方——治胃病痰多，胸中閉塞，不能多食，大便不通，半夏一錢半 薤白三錢 全瓜蒌四錢 枳殼一錢 白酒少許。

第六章 表裏之劑

大柴胡湯用大黃

枳實芩夏白芍將

煎加薑棗表兼裏

妙法內攻併外攘

柴胡芒硝義亦爾

仍有桂枝大黃湯

大柴胡湯——治傷寒發熱。汗出不解。外邪入裏。熱結在腸。心下痞鞭。嘔而下利。或往來寒熱。

煩渴譫語。腹滿便秘。表證未除，裏證又急。脈洪或沉實弦數者。柴胡八分 半夏一錢 黃芩三錢 芍藥三錢 生薑三片 大棗十二枚 枳實四枚 大黃三錢

范批：解表攻裏調和氣血和胃止渴。治傷寒表邪有汗不解。熱結便秘。胸悶嘔噦。口乾少津。柴胡加芒硝湯——治通便秘熱。柴胡八分 半夏一錢五分 人參一錢 甘草五分 黃芩三錢 生薑

三片 大棗十二枚 芒硝五錢

范批：此方與表裏兩能之大柴胡同義。治傷寒潮熱。與兩和氣血滌蕩腸胃。

桂枝加大黃湯——治通便解熱。桂枝一錢 芍藥三錢 生薑三片 甘草五分 大棗十枚 大黃三錢
范批：解傷寒未盡之表邪。攻內陷之熱邪。亦係表裏兩解之劑。

防風通聖大黃硝 荆芥麻黃梔芍翹 甘桔芎歸膏滑石 薄荷芩朮力偏饒
表裏交攻陽熱盛 外科瘍毒總能消

防風通聖散——治一切風寒暑濕。飢飽勞役。內外諸邪所傷。氣血怫鬱。表裏三焦俱實。憎寒壯熱。頭目昏暈。目赤睛痛。耳鳴鼻塞。口苦舌乾。咽喉不利。唾涕稠黏。咳嗽上氣。大便秘結。小便赤澀。疥癬腫毒。折跌損傷。瘀血便血。腸風痔滿。手足癩癢。驚狂譫妄。丹斑癩疹。防風三錢 荆芥二錢 連翹二錢 麻黃五分 薄荷五分 川芎五分 當歸一錢 白芍二錢 白朮二錢 黑山梔一錢五分 酒蒸大黃三錢 芒硝三錢 黃芩三錢 石膏五錢 桔梗八分 甘草五分 滑石一錢 加生薑一片葱白三個煎。自利去硝黃。自汗去麻黃。加桂枝一錢。涎嗽加薑製半夏一錢。范批：表散發汗破結通便和血補肝瀉胃清肺健脾利濕之大綜合劑。治一切外瘍及全身瘡癢效。

滑石 卽含水硅酸鎂 $H_2Mg_3Si_2O_8$ 。西名Talc。乃利尿之劑。

五積散治五般積 麻黃蒼芷芍歸芎 枳桔桂薑甘茯苓 陳皮半夏加薑蔥

除桂枳陳餘略炒 熟料尤增溫散功 溫中解表祛寒濕 散痞調經用各充

五積散——治外感風寒。內傷生冷。身熱無汗。頭痛身痛。項背拘急。胸滿惡食。嘔吐腹痛。寒熱

往來。腳氣腫痛。便秘。寒疝。寒癍惡寒。無汗。婦人經水不調。白芷六分 陳皮六分 厚朴六

分 當歸一錢 芍藥一錢 茯苓三錢 桔梗八分 蒼朮一錢 枳殼七分 半夏一錢 麻黃四分

乾薑一錢 肉桂五分 甘草五分 加薑一片葱三梗煎

熟料五積散——五積散 除桂芷枳殼陳皮。餘藥慢火炒。攤冷。入桂芷同煎。有汗去蒼朮麻黃。氣

虛去枳桔，加人參一錢白朮一錢。腹痛挾氣，加吳茱萸五分。胃寒加煨薑一錢。傷寒股冷虛汗。加

附子一錢。婦人調經，加醋艾一錢。——

五積交加散——治寒濕。身體重疼。腰腳酸疼。五積散合人參敗毒散。

范批：解表散寒，除痰燥濕，寬中利氣消痞調經之劑。統治多病。明理活法者得變而通之。

吳茱萸 含「吳萸炔」 Evodenolone 之芳香味，係「吳萸鹼」 $\text{Evodiamin } \text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{NO}$ 及「吳萸腦」

Butacarpin $C_{15}H_{21}N_2O$ 結晶體所組成。爲芳香性健胃藥。治腹痛吐瀉便秘，消化不良。甚效。又治外痔疾，疝氣，腳氣，水腫效。

〔攪 主要成分爲「樟腦油」Cineol 香精油。其他香精則爲偏柏油 α -Thujon $C_{10}H_{16}O$ 一・五醇醇及 Sessquiterpenalkohol Sessquiterpen 等。因含有鉀類有色酸 Gerbsaures Kalium 及氯化鉀 Chlorkali 故爲有效力之解熱藥。兼能健胃，治消化不良，腹痛吐瀉等疾。又煎服，功能止血。治子宮出血，衄血等，止血甚効。

三黃石膏芩柏連 梔子麻黃豆豉全 薑棗細茶煎熱服 表裏三焦熱盛宣

三黃石膏湯——治傷寒溫毒。表裏俱熱。狂叫欲走。煩燥大渴。面赤鼻乾。兩目如火。身形拘急。而不得汗。或已經汗下。經旬不解。三焦大熱。譫狂鼻衄。身目俱黃。六脈洪數。及陽毒發斑。石膏一兩半 黃芩三錢 黃連五分 黃柏三錢 梔子十個 麻黃五分 淡豉三錢 薑三片 棗二枚 細茶一撮。煎熱服。

范批：發表邪清裏熱之合劑。治傷寒表裏之邪俱盛。腸胃熱熾。懊憹發斑症。

葛根黃芩黃連湯 甘草四般治二陽 解表清裏兼利胃 喘汗自利保平康

葛根黃連黃芩湯——治頭痛發熱，項脊強，身體痛，惡風自汗，脈浮緩者宜用桂枝湯。而醫反下之。遂利不止。脈促喘而汗出。以湯治之。葛根三錢 炙甘草五分 黃芩二錢 先煮葛根，納諸藥煎。或加薑一片棗三枚。

范批：解表清裏和胃治病之劑。

參蘇飲內用陳皮 枳殼前胡半夏宜 乾葛木香甘桔茯 內傷外感此方推
參前若去芎柴入 飲號芎蘇治不差 香蘇飲僅陳皮草 感傷內外亦堪施

參蘇散——治外感內傷。發熱頭痛。嘔逆咳嗽。痰塞中焦。眩暈。嘈煩。傷風泄瀉。及傷寒已汗。

發熱不止。人參一錢 紫蘇一錢 乾葛一錢 前胡一錢 薑汁炒半夏一錢五分 茯苓三錢 陳皮
去白一錢。甘草五分 麸炒枳殼一錢 桔梗八分 木香五分 每五錢。加薑一片棗三枚煎。外感
多者。去棗。加葱白三梗。肺中有熱。去人參，加杏仁三錢，桑白皮一錢。泄瀉加白朮三錢。扁
豆二錢，蓮肉三錢。

范批：宜透風寒，補中健脾，止嘔行氣破滯。治外感風寒，內傷氣滯。肢倦體重，胸腹不舒甚效。

芎藭飲——治傷風寒。外有發熱，頭痛惡寒。內有咳嗽吐痰氣湧。參蘇散去人參前胡。加川芎一錢柴胡八分 薑棗煎。

范批：因肺經有熱，故去人參前胡之辛滯，加川芎柴胡，乃沖和氣血之義也。

香蘇散——治四時感冒。頭痛發熱。或兼內傷。胸膈滿悶。噯氣惡食。炒香附二錢 紫蘇二錢 陳皮去白一錢 甘草七分 加荏葱煎。傷食，加消導藥，如神麩二錢。咳嗽加杏仁三錢 桑皮一錢。有痰加半夏一錢。頭痛加川芎一錢，白芷一錢。傷風自汗，加桂枝一錢。傷寒無汗，加麻黃一錢。乾薑一錢。傷風鼻塞頭昏。加羌活三錢，荊芥二錢。心中卒痛。加延胡索一錢，酒一杯。

范批：發散表寒行氣消食之劑。治外感寒邪，內傷氣滯，頭痛咳嗽，胸悶腹脹之症甚效。

蓮肉 含微量之有毒植物鹼質。名「蓮毒素」(Nelumbin)，刺激心臟，故利尿。含蛋白質甚多，故為強壯滋養劑。能止嘔吐，治口渴，夜尿，又能止血，治婦人白帶等症。

延胡索 含「罌粟止痛鹼」Protopin $C_{21}H_{21}NO_5$ 及「玄胡索鹼」Bulbocapain $C_{19}H_{23}NO_4$ 。及右旋四氫軟脂鹼 *d*-Tetrahydropalmatin 乃治身上諸痛之妙藥。破瘀血，通經，鎮極。治頭痛，腹痛，月經痛，極有效。

茵陳丸用大黃硝 鼈甲常山巴豆邀 杏仁梔豉蜜丸服 汗吐下兼三法超
時氣毒癘及瘧痢 一丸兩服量病調

茵陳丸——治時氣瘴氣，黃疸病癢癢，赤白痢等證。茵陳一錢。梔子二錢。炙鼈甲三錢。芒硝三錢。大黃三錢。常山一錢。炒杏仁三錢。巴豆去皮炒一分。豉五錢。蜜丸。梧桐大。每服一九。或吐。或利。或汗。如不應。再服一九。不應。可作煎劑投之。老爛幼量意加減。

范批：發汗涌吐通便利濕之劑。汗吐下之法合備，佳方也。

常山 含常山鹼 Orixine, Orixidin, Isoorixin, Kokusa gin 等，功用解熱鎮咳祛痰甚效。又能消毒滅蟲，毒蛇之毒。脾胃虛弱者忌之。

巴豆 有巴豆油 Crotonharz $C_{21}H_{31}O_2$ 百分之三十至四十五。含兩種毒性蛋白質 Crotonglobulin,

Crotalbuin 故係峻下劑。又外用和軟膏成皮膚引赤藥。此物不可誤用，乃劇毒藥劑。

古人云：如無寒積，何必用之。

大羌活湯即九味 己獨知連白朮暨 散熱培陰表裏和 傷寒兩感差堪慰

大羌活湯——治外感風邪，內感傷寒。羌活一錢 獨活一錢 防風一錢 細辛五分 防己三錢 黃
芩三錢 黃連五分 蒼朮一錢 白朮三錢 炙甘草五分 知母一錢 川芎一錢 生地黃一錢。熱
飲。

范批：踈風發表利濕清熱健脾強心之劑。

防己 有二種，一曰漢防己。全株無毛。一曰木防己。全株有短毛。中國之漢防己乃植物名 *Strychnos nuxvomica* 有二種，一曰漢防己。全株無毛。一曰木防己。全株有短毛。中國之漢防己乃植物名 *Strychnos nuxvomica* *phania tetrandra*, S. Moore 僅含中國漢防己素 Tetrandrins $C_{17}H_{25}NO_2$ 乃胃腸藥，可治毒蛇咬傷，不能治神經痛。日本之漢防己，乃植物名 *Sinomenium acutum*, Rhder et Wilson, 日本防己含「西拿米尼」Sinomenin $C_{17}H_{25}NO_2$ ，使反射機能亢進，中樞性神經麻痺，乃利尿之劑。治筋肉及關節麻木及神經痛肩凝腰痛甚效。中國木防己含「木防己素」Trilobin

$C_9H_7NO_3$ 係治神經痛之驗藥，亦能利尿。兼合同性木防己素 Homotrilobin, 木防己腺 Triloba min, 皆治神經痛，風濕有功。故醫生用藥，須註明木防己，則治中風，面疔，喘息，尿道症，風邪，膀胱炎，水腫，癰，及利尿，方始有效。

范鳳源治手足麻痺風濕神經痛方——蜜炙黃耆四錢 生白芍二錢 炒白朮二錢 當歸一錢 生甘草一錢 茯苓三錢 茯神三錢 川桂枝一錢 北沙參三錢 製豬苓二錢 柏子仁三錢 冬青子三錢 生薑五分 紅棗三個 連服一月愈。

范鳳源治滿口發麻方——口乾不飲，痰痰不爽，時欲泛惡，身熱，喉音帶嘶，脈形軟滑。川石斛一錢 沙參三錢 光杏仁三錢 象貝母三錢 白薇三錢 連翹三錢 白蔻花一錢 瓜蒌皮三錢 炒竹茹一團 荷梗一尺 十劑愈。

范鳳源治盲腸炎方——大腸癢，右足屈縮，莖仁一兩 桔梗一兩 麥冬一兩 敗醬六錢 丹皮六錢 茯苓六錢 甘草六錢 生薑六錢 丹參一兩，芍藥一兩。六劑愈。

第七章 消導之劑

平胃散是蒼朮朴 陳皮甘草四般藥 除濕散滿驅瘴嵐 調胃諸方從此擴
或合二陳或五苓 硝黃麥麩均堪著 若合小柴名柴平 煎加薑棗能除瘴
又不換金正氣散 卽是此方加夏薑

平胃散——治胃不消化，脾有停濕痰飲。痞膈宿食不消。滿悶嘔瀉。及山嵐瘴霧。不服水土。泔澀
蒼朮二錢 薑製厚朴一錢 陳皮去白一錢 炙甘草一錢 加薑棗煎。傷食加神麩三錢麥芽三錢，
或枳實一錢。濕勝加茯苓三錢 豬苓三錢 白朮一錢 澤瀉三錢 肉桂五分。痰多加半夏一錢。
脾倦不思食，加人參一錢 黃耆一錢。痞悶加枳殼一錢 木香一錢。大便秘加大黃三錢 芒硝
三錢。小便赤濕，加茯苓三錢 澤瀉三錢。傷寒頭痛，加葱一錢 大豆豉三錢。取微汗。
藿香平胃散——平胃散加藿香一錢半夏一錢。亦名不換金正氣散。治胃寒腹痛嘔吐。及瘴疫濕癘。

人參養胃湯——藜香平胃散再加人參一錢 茯苓三錢 草果一錢 生薑五分 烏梅五枚。治外感風寒。內傷生冷。夾食停痰。嵐瘴瘟疫。或飲食傷脾。發爲癘瘧。

除濕湯——平胃散合二陳湯。加藜香一錢。治傷濕腹痛。重身軟足。大便秘瀉。

和解散——平胃散加藜本枳殼桔梗各一錢。治四時傷寒頭痛。煩燥自汗。咳嗽吐利。

對金飲子——平胃散一兩。加桑白皮一錢。治脾胃受濕。腹脹身重。飲食不進。肢痠膚腫。

厚朴溫中湯——平胃散除蒼朮加木香一錢草薹一錢乾薑一錢茯苓三錢。治脾胃虛寒。心腹脹痛。

加味平胃散——平胃散加麥芽三錢炒麴三錢。治宿食不消。吞酸噯臭。

范批：和胃健脾利濕除滿消食寬中之脾胃良劑。功效頗佳。若重感他種不適則可循是劑細味病

源而與加減治之。

麥芽 含有多量消化酵素，如糖化酵素 Amylase, (Diastase)，轉化酵素 Invertase、解油酵

素 Lipase, 蛋白酶素 Protease, 能消食積。開胃。又含鈣質，銅質，及甲種乙種戊種維他命

及維他命 K, 能滋養強壯人體，古人云：麥芽性能墮胎，孕婦忌之。

蒼朮 有特別香氣之精油，約百分之二十，爲「蒼朮酮」Atractylon $C_{14}H_{20}O$ ，性不安定，其他爲蒼朮醇 *Atractylol* $C_{15}H_{22}O$ 及 1-五萜醇 *Sesquiterpenalkohol* 有鎮靜胃之神經作用而使反射機能亢進，乃芳香健胃劑。

保和神麩與山查 芩夏陳翹菴子加 麩糊爲丸麥湯下 亦可方中用麥芽
大安丸內加白朮 消中兼補效堪誇

保和丸——治食積飲停。腹痛泄瀉。痞滿吐酸。積滯惡食。食痰下痢。山查三錢 炒神麩一錢 茯苓一錢 半夏一錢 陳皮五分 萊菔子微炒五分 連翹五分 麩糊丸。每服三錢。麥芽湯下。或加麥芽一錢。入藥亦可。

小保和丸——助脾進食。保和丸加白朮一錢 白芍三錢。去半夏菴子連翹。蒸餅糊丸。

大安丸——保和丸加白朮二錢。又保和丸加人參一錢。治飲食不消。氣虛邪微。又保和丸加白朮一錢香附一錢黃芩三錢黃連一錢厚朴一錢枳實一錢。治積聚痞塊。又保和丸合越鞠丸。扶脾開鬱。

范批：治內傷飲食，痰濕阻鬱，致胸悶腹脹，大便溏洩。爲健脾和胃調氣消導之劑。

〔山查〕 有酸質，枸橼酸Plausäure，又含山查配糖體Ameliarosid 故能消食化滯，去油膩之積，古人云：多食令人嘈煩易亂。

〔萊菔子〕 含有精滑性之液汁，與脂肪油，硫酸等，功能健胃祛痰。古人云：虛弱者多服，容易氣喘難息。

健脾參朮與陳皮 枳實山查麥蘖隨 麵糊作丸米飲下 消補兼行胃弱宜

枳朮丸亦消兼補 荷葉燒飯上升奇

健脾丸——治脾虛氣弱。飲食不消。人參二錢 土炒白朮二錢 陳皮二錢 炒麥芽二錢 山查去核

一錢半 枳實三錢 神麴糊丸。每服三錢米飲下。

益氣健脾丸——健脾丸去山查麥芽。加茯苓三錢 炙甘草一錢。治脾虛食少。

養榮健脾丸——健脾丸去山查麥芽陳皮。加當歸一錢 芍藥一錢 芎藭一錢 麥冬一錢 柏子仁三

錢。治脾陰不足。飲食不消肌膚。

理氣健脾丸——健脾丸去人參枳實麥芽。加香附一錢 木香一錢 半夏二錢 茯苓三錢 神麴三錢

黃連三分，當歸一錢，芍藥二錢。荷葉燒飯丸。治脾胃虛弱。久瀉久痢。

舒鬱健脾丸——健脾丸去人參山查麥芽。加神麴三錢 川芎一錢 香附一錢 麴糊丸。治脾氣鬱滯

。飲食不消。

化痰健脾丸——健脾丸去山查麥芽。加半夏一錢 膽星一錢 蛤粉一兩 茯苓三錢。神麴糊丸。治
內傷挾痰。

清火健脾丸——健脾丸方去人參山查麥芽。加半夏一錢山樞三錢黃連一錢水丸。治便秘脾虛。

和中健脾丸——健脾丸去人參山查麥芽。加木香一錢 檳榔一錢 厚朴一錢 半夏一錢 甘草五分

。治胃虛飢不欲食。

妙應丸——和中健脾丸。再加人參。治胃虛不能食。臃腫或結或瀉。本方健脾丸去山查。加半夏一

錢 青皮一錢 木香一錢 砂仁五分 草薳一錢 乾薑一錢 炙甘草一錢 茯苓三錢 豬苓三錢

寬中進食丸——補脾胃。進飲食。澤瀉三錢蒸餅丸。

范世：消食健脾之劑，脾胃虛弱，食入消連乏權之人，常服通便強身。

柏子仁

含有油質，甲種偏柏油 α -Thujiol 乙種偏柏油 β -Thujiol 龍腦酯 Borneol ester 等，爲滋養強壯藥。治風濕。能鎮咳祛痰，止喘息。其葉能止血。

鴉菜

能宣解暑熱，疏理滯氣。含刺激心臟毒素 Nelumbin 故能利尿。

膽南星

係南星與牛膽汁所製。南星含鎂質，澱粉，肥皂草素 Saponin 及毒性有機鹼，乃內服用以祛痰與鎮痙，外用以消腫治風濕痛。牛膽乃腸之抗毒劑與瀉藥，能助脂肪之消化，對於十二指腸紊亂所致之慢性便秘，及糞內脂肪排出太多，皆能治效。故能治中風。按南星醋調，能外擦腫瘤，使之漸消，蓋鎂質破壞蛋白質之功也。

蛤粉

爲碳酸鈣，磷酸鈣，硅酸之成分等，能化痰消堅潤下。

猪苓

爲楓樹下之菌，有一種酸脂，蘋果酸 *Apple-säure*，爲利尿劑。治水腫淋病，解大熱，開腠理氣。

參苓白朮扁豆陳

山藥甘蓮砂薏仁

桔梗上浮兼保肺

棗湯調服益脾神

參苓白朮散

治脾胃虛弱，飲食不進，胸中痞滿，人參一錢 茯苓一錢 白朮土炒一錢 陳皮一

錢 山藥一錢 炙甘草一錢 炒扁豆一錢二分 炒蓮肉五分 砂仁五分 炒以仁二錢 桔梗五分
共爲末。每服二錢。棗湯或米飲調下。

范批：健脾和胃利肺止咳滋補之劑。暑日常服。得益非淺。

山藥 含蛋白質物(Mucin)及「牛尿素」Allantoin「鮭卵素」Arginin, 「膽汁鹼」Cholin 及「糖

化酵素」Diastase爲助消化劑。且爲強壯長壽劑。又能祛痰。外敷癰腫，能吸出內部之毒。

苡仁 含穀類蛋白質 Prolamin, Glutelin 及「膝臟酸」，又名「胰酸」Leucin 「陳乾酪酸」Tyrosin

「穀酸」Glutamin Säure 及薏苡仁油，爲良好之營養品，利尿及健胃藥，古人云：津枯便

秘，遺洩，及孕婦則忌之。又治浮腫，白帶，除疣，消炎，鎮痛。日本吉村氏名薏苡仁之蛋

白質爲Coicin。

枳實消痞四君全 麥芽夏麩朴薑連 蒸餅糊丸消積滿 清熱破結補虛痊

枳實消痞丸——治心下虛痞。惡食懶倦。右關脈弦。麩炒枳實五分 薑汁炒黃連五分 薑炒厚朴四

分 半夏麩一錢 炒麥芽一錢 人參一錢 土炒白朮一錢 茯苓三錢 炙甘草五分 乾薑五分

蒸餅糊丸。每服三錢。

范批：健脾胃開鬱胃消痞之劑。爲攻補兼施方。

鼈甲飲子治瘧母 甘草耆朮芍芎偶 草菓檳榔厚朴增 烏梅薑棗同服煎

鼈甲飲——治瘧久不愈。腹中結塊。名曰瘧母。醋炙鼈甲三錢 土炒白朮三錢 黃耆一錢 芎藭一

錢 酒炒白芍一錢 檳榔一錢 麴娘草果一錢 厚朴一錢 陳皮一錢 甘草五分。薑三片。棗一

枚。烏梅半個煎。

范批：調和氣血消痰益陰之劑。爲治療母良方。

瘧疾用常山截瘧飲治之，七日而愈。然亦有不愈而死者十之三。用金鷄納霜治之，迅速有效，但多

服齒腫流血，亦有不能愈者，唯其數較少。又有所謂脾胃虛弱之瘧疾，用六君子加薑棗，五

劑而愈，此鼈甲飲在久瘧後可用之，然非治瘧之劑也。

葛花解醒香砂仁 二苓參朮蔻青陳 神麴乾棗兼澤瀉 溫中利濕酒傷珍

葛花解醒湯——專治酒積。或嘔吐。或泄瀉。痞塞頭痛。小便不利。葛花一錢 豆蔻一錢 砂仁一

錢 木香三分 青皮五分 人參五分 炒白朮一錢 茯苓三錢 炒神麴一錢 乾薑五分 豬苓一錢 澤瀉三錢

范批：發汗利尿調補中氣之合劑。治過飲之人，濕熱鬱積腸胃，胸腹痞塞，小便不利，大便秘洩。

葛花

其葉合「胰液素」Adenin「天冬素」Asparagin「穀酸」Glutamin Säure 及「酪酸」Buttersäure 樟腦油 Kämpferol 葡萄糖 Glucosid 與黃色結晶物，故功能解熱發汗解酒毒。

豆蔻

含左旋二環萜 α -Pinen, 雙戊烯 Di-penten, 肉荳蔻精 Myristicin 等芳香揮發油，及軟油脂肪 Olein 亞麻仁乾性油脂 Linolein 脂肪等，功能健胃驅風鎮吐，而中國白豆蔻之果實，治嘈雜嘔吐，溜飲肺病皆有功效。古人云：多量服用，恐起中毒，而致通經墮胎之虞。又瀉痢及小便短少者均忌之。

第八章 理氣之劑

補中益氣者朮陳 升柴參草當歸身 虛勞內傷功獨擅 亦治陽虛外感因

木香蒼朮易歸朮 調中益氣暢脾神

補中益氣湯——治內傷煩勞。心煩身熱。頭痛惡寒。懶言惡食。脈洪大而虛。或噤或渴。或便秘自汗。或血少乏力。或瘡痲脾弱。久不能愈。蜜黃耆炙二錢半 人參一錢 炙甘草一錢 土炒白朮五分 陳皮留白五分 當歸五分 升麻二分 柴胡二分 薑三片。棗二枚煎。如血不足，加當歸一錢。精神短少，加入人參一錢，五味三分。肺熱欬嗽，去人參。噎乾加葛根二錢。頭痛加蔓荊子一錢。痛甚加川芎一錢。腦痛加基本五分，細辛五分。風濕相搏，一身盡痛，加羌活二錢防風三錢。有痰加半夏一錢生薑一錢。胃寒氣滯。加青皮一錢，蔻仁一錢木香一錢益智二錢。腹脹加枳實一錢厚朴一錢木香一錢砂仁五分。腹痛加白芍一錢甘草五分。熱痛加黃連五分。能食而心下痞

悶，加黃連五分。咽痛加桔梗五分。有寒加肉桂五分。濕勝加蒼朮一錢。肝旺便秘加黃柏一錢。知母二錢。大便泄瀉去升麻，加熟地二錢山茱二錢山藥二錢。大便秘，加酒煨大黃三錢。咳嗽，春加旋覆一錢款冬三錢，夏加麥冬二錢五味五分，秋加麻黃一錢黃芩三錢，冬加不去根節麻黃一錢。天寒加乾薑一錢。泄瀉去當歸，加茯苓三錢蒼朮一錢益智一錢。

闕中益氣湯——治脾胃不調。胸滿肢倦。食少短氣。口不知味。及食入反出。補中益氣湯除當歸一錢白朮三錢。加木香一錢蒼朮一錢。本方加白朮三錢五味子五分。亦名調中益氣湯。治體虛多汗。餘治同前。

參朮益胃湯——治內傷勞倦。燥熱氣短。口渴無味。大便澆薄。補中益氣湯加蒼朮五分，半夏黃芩各一錢。

升陽順氣湯——治飲食勞倦所傷。滿悶短氣。不思食。不知味。時惡寒。補中益氣湯去白朮。加草薺一錢，神麴一錢，半夏一錢，黃柏一錢。

益胃升陽湯——治婦人經水不調。或脫血後。食少水瀉。補中益氣湯，加炒芩三錢，神麴三錢。

補中益氣加黃柏生地湯——治腎虧肝旺。發熱甚甚。有汗短氣。口渴無味。補中益氣湯加黃柏一錢，生地一錢。

順氣和中湯——治清陽不升。頭痛惡風。脈弦微細。補中益氣湯加白芍一錢，細辛五分，川芎一錢，荊芥一錢。

調營養衛湯——治勞力傷寒。身痛體熱。惡寒微渴。汗出身痛。脈浮無力。補中益氣湯加羌活一錢，防風三錢，細辛一錢，川芎一錢。

范批：補肺健脾和胃調氣養血實表解熱之劑。此方進退加減，旨理頗奧，惟明者可鑒。

益智 含芳香性揮發油「萜」Terpen ($C_{10}H_{16}$) 一·五「萜」Sesquiterpen ($C_{15}H_{24}$) 及一·五「萜」醇」Sesquiterpen alcohol 香氣佳快，健胃驅風，和中益氣。

旋覆花 含揮發油，土木香精，又名菊糖Alantolacton，又能強心殺菌。功能利水祛痰健胃驅蟲，對於肺結核患者有強壯之効。又治喘息。

款冬花 其葉含有有機酸，配糖質，沒食子酸Callussäure糊精Dextrin 菊糖Inulin植物脂Phytoster

in, 軟脂 Palmitine, 其花含植物脂蠟脂 Phytosterin, 有色體 Gerbstoff, 牛脚油, 又名牛脚二元醇 Eradiol。功能祛痰鎮咳。

烏藥順氣芎芷薑 橘紅枳桔及麻黃 蠶蠶灸草薑棗服 中氣厥逆此方詳

烏藥順氣散——治中風。偏身頑麻。骨節疼痛。步履艱難。語言蹇滯。口眼喎邪。喉中氣急有痰。

烏藥二錢 橘紅二錢 麻黃去節一錢 川芎一錢 白芷一錢 桔梗一錢 炒枳殼一錢 蠶蠶去絲

嘴炒五分 炮薑五分 炙甘草五分 加薑一片葱三梗煎。虛汗者，去麻黃，加黃耆一錢。手足不

能舉動，加防風三錢，續斷三錢，威靈仙三錢。拘攣加木瓜一錢。腳氣加牛膝獨活五加皮各一錢

范批：發汗解寒散風活血利氣行瘀之劑。治猝然中風口眼喎斜。舌強定篤頗效。氣虛病久者大

非所宜。

天台烏藥 含「甲種烏藥鹼」Linderan $C_8H_9O_2$ 「乙種烏藥鹼」Linderen $C_{12}H_{15}O_2$ 「烏藥油」Linderol

$C_{12}H_{15}O_2$ 「烏藥酸」Linderasäure $C_{12}H_{17}O_2$ COOH 結晶物質及「烏藥酯」Linderolester 乃

芳香健胃藥，功能止痛通滯，調脾胃，通腎臟。衡州烏藥含末梢神經麻痺藥 Coclaurine 治

橘紅

喘息，中風，胃痙攣，痢病，疝氣，霍亂，小兒腹中蟲疾。古人云：婦女月事先期者忌之。含橘皮之芳香精油，右旋林檎香精 α -Limonen, 林檎配糖體 Hesperidin, 又含多量甲乙種維他命，乃苦味芳香健胃滋養強壯藥。

殭蠶

乃蠶患白殭病而死者，由一種細菌，寄生蠶體，吸取精液，致蠶殭死。死後體硬而外有白色粉末，即菌之孢子，經炒過殺菌後，此種死菌，功能清血中之毒，故治喉痺，丹毒，風癢，疔瘡甚效。

續斷

屬唇形科。四月開紫花，根色赤黃，入藥。川產者佳。含「麝香草酚」 Thymol 與配糖質 Stachyose 肥皂草素等，治金瘡癰瘍及筋骨折跌效。

威靈仙

屬毛茛科。含「白頭翁鹼」 Anemone, 其性甚猛，連用有毒，治痛風尿酸風濕。最效。外用消腫。

牛膝

含鉀鹽達百分之二，且有粘液質，通經，治月經不順，又利尿，消癰腫，強精，止膝痛，又治血淋效。古人云：夢遺失精，婦女血崩不止，經閉未久，疑似有妊，或已有妊均忌用之。

五加皮 含有機酸體，多「肥皂草素」類似之配糖體，治疝氣腹痛。又爲強壯藥，治陰痿效。以南五加皮有效。北五加皮，天津產，味苦，係羅摩科植物，有毒性，常服容易癡變而死。

越鞠丸治六般鬱

氣血痰火濕食因

芎藭香附兼梔麩

氣暢鬱舒痛悶伸

又六鬱湯蒼芎附

甘苓橘半梔砂仁

越鞠丸——消痰，行氣，化滯，治胸膈痞悶。吞酸嘔吐。飲食不消。醋炒香附一錢 泔浸炒蒼朮一錢 撫芎一錢 炒神麩三錢 炒黑梔子三錢 麩糊爲丸。每服三錢。如體重腹滿，痰涎腫脹，小便短少，是謂濕鬱，加茯苓三錢，白芷一錢。牙痛齦宣，腮頰頰腫，目黃喉痛，便秘頭眩，是謂火鬱，加青黛一錢。痰結喘滿，心跳發汗，是謂痰鬱，加南星一錢，半夏一錢，栝篋三錢，海石三錢。胸膈刺痛，四肢無力，能食善怒，血滯閃挫，是謂血鬱，加桃仁一錢，紅花一錢。求謀不遂，貧窘暴怒，思慮過度，胸滿脅痛，不可俛仰，是謂氣鬱，加木香一錢，檳榔一錢。噯酸腹悶，不能食，或爲黃疸，鼓脹，痞塊，皆謂食鬱，加麥芽三錢，山楂三錢，砂仁五分。腹痛腸鳴，泄注暴變，足不任身，關節不利，屈伸不便，是謂挾寒，加吳茱萸五分。又或春加防風三錢。夏

加苦參一錢。冬加吳茱萸五分。

范批：理氣達鬱之劑，治肝經鬱勃，胃脹且痛之肝胃氣痛良方。

靛藍 乃靛青製成。含「靛原質」配糖體 Indican $C_{14}H_{17}NO_6$ ，加水分解，成葡萄糖及「吲哚酚」

Indoxyl，後者經空氣氧化而成「靛青」Indigo。外用消腫毒，治毒蟲刺傷，內服解毒解熱。治腸胃腐爛，發癩發疹。

浮石 原係火山噴出之花崗岩，經海水沖洗，其中鎂鐵錳等皆已消失，祇留石灰質，雲母質，與鉀鉛化合物，故多孔而浮，又名海浮石。功能軟堅祛痰。多服損人。

桃仁 含粘液百分之三，及「苦杏仁素」Amygdalin。故能鎮咳銷癥，利尿通便，行血通經。

紅花 含「紅花黃色素」Safforogelb $C_{21}H_{30}O_5$ 「紅花紅色素」Carthamin $C_{21}H_{30}O_5$ 為通經要藥。

蘇子降氣橘半歸 前胡桂朴草薑依 下虛上盛痰嗽喘 亦有加參貴合機

蘇子降氣湯——治痰涎壅盛，肺逆喘嗽，胸膈噎塞，蘇子 橘紅 半夏 當歸 前胡 薑汁炒厚朴 各一錢 炙肉桂 甘草各五分 加薑一片煎。一方無肉桂，加沉香五分。

范批：平氣消痰暢中通便之劑。治氣喘痰壅不得平臥之症甚效。

蘇子 卽紫蘇子，氣味芳香異特，合「蘇子醛」Perilla aldehyd $C_{10}H_{14}O$ 甚多，乃健胃藥。又能祛

痰利尿。

沉香 含配糖體，揮發油，洋菜醇 *Acario* 及有機鹽及色素等，助陽，刺激腎臟，利尿。不宜多用。

四七湯理七情氣 半夏厚朴茯苓蘇 薑棗煎之舒鬱結 痰涎嘔痛盡能紓

又有局方名四七 參桂夏草妙更殊

四七湯——治胸滿脅痛，不可俛仰。痰涎結聚。心腹絞痛。或膨脹喘急。人參 官桂 半夏各一錢

甘草五分 加薑煎。心腹痛。加延胡索一錢。

范批：溫胃補氣消痰解鬱之劑。治皖中虛冷而痛頗效。

七氣湯——治痰涎結聚。咯不出。嚔不下。胸滿喘急。或欬或嘔。或攻衝作痛。薑汁炒半夏五錢

薑汁炒厚朴三錢 茯苓四錢 紫蘇二錢 加薑一片，棗三枚煎。本方加白芍一錢，陳皮一錢，人

參一錢桂心五分。治胸脅痞滿噎塞。吐利交作。寒熱眩暈。

范批：散鬱暢肺和胃之劑。

四磨亦治七情侵 人參烏藥及檳沈 濃磨煎服調逆氣 實者枳殼易人參

去參加入木香枳 五磨飲子白酒斟

四磨湯——治氣逆喘急。妨悶不食。怒則氣上。思則氣結。憂愁不已。氣多厥逆。重則眩仆。輕則喘急，滿悶妨食。檳榔 沉香 烏藥 人參 等分。每服三錢濃磨。煎三四沸。溫服。一方人參易枳殼。

五磨飲子——四磨湯去人參。加枳實一錢，木香一錢。白酒磨服。治暴怒卒死。名曰氣厥。

范批：止痛鎮靜消食之劑，治胸腹作痛，上下無定，此謂氣痛，是方功效頗大。

代赭旋覆用人參 半夏甘薑大棗臨 重以鎮逆鹹軟痞 痞鞭噫氣力能禁

代赭旋覆湯——治傷寒發汗。若吐若下。解後心下痞鞭。噫氣不除。旋覆花三錢 代赭石五錢 人

參一錢 甘草五分 半夏一錢五分 生薑一錢 大棗十二枚

范批：和胃止嘔鎮靜之劑。

代赭石 乃山西代縣出產之輝鐵礦也。由養化鐵與粘土所成。按鐵質入血，能使中樞神經鎮靜，且能補血，利尿，通便，治萎黃病。

紺珠正氣天香散 香附乾薑蘇葉陳 烏藥舒鬱兼除痛 氣行血活自經勻

紺珠正氣天香散——止痛和胃。香附八錢 烏藥二錢 陳皮 蘇葉各一錢 乾薑五分 每服五六錢
范世：平肝調氣溫胃止痛之劑

橘皮竹茹治嘔呃 參甘半夏枇杷麥 赤茯再加薑棗煎 方由金匱此加關

橘皮竹茹湯——治久病虛羸。呃逆不已。亦治利吐後。胃虛呃逆。橘皮一錢 竹茹一錢 人參一錢
甘草五分 半夏一錢五分 麥冬一錢 赤茯苓三錢 枇杷葉六片 加薑一片，棗三枚煎。胃寒而不易消化者，去竹茹麥冬。加丁香五分。便秘去人參。

金匱橘皮竹茹湯——治噦逆。橘皮三錢 竹茹二錢 人參一錢 甘草五分 生薑三片 大棗三十枚
范世：和胃補氣，治久病虛弱，呃逆頻頻。

竹茹 乃竹去表皮刮下之白屑，含澱粉，蛋白質，右旋葡萄糖質 α -Glucose 右旋五氧糖 β -Xylose 及

乙種維他命，及神經營養劑。治吐血肺痿衄血。

赤茯苓 原爲菌體，中含葡萄糖 Glucose，果糖 Fructose，故利尿消腫，治淋症。

枇杷葉 含肥皂草素與糖質，解渴，止嗽，和胃，清熱。

丁香 含丁香油 Eucalyptol 能增進食慾，治弛緩性消化不良，口臭，呃逆。含之可治齒痛，外用擦風

濕痛。

丁香柿蒂人參薑 呃逆因寒中氣戕 濟生香蒂僅二味 或加竹茹用皆良

丁香柿蒂湯——治久病受寒而呃逆。丁香二錢 柿蒂二錢 人參一錢 生薑五片 一方加陳皮一錢，半夏一錢，茯苓三錢，甘草五分，良薑一錢。本方除人參生薑。亦名丁香柿蒂湯。治同。本方除人參生薑。加竹茹一錢橘紅一錢。又名丁香柿蒂竹茹湯，或名橘紅竹茹湯。東醫寶鑑丁香柿蒂湯，去人參。加青皮一錢陳皮一錢。陳無提三因方，去人參，加良薑一錢甘草五分，名丁香散，治同。

范批：暖胃補氣開鬱止呃之劑。

柿蒂 中可得一種不含氮原素之有機結晶體，其融點爲攝氏二百七十五度，但其成分尙未明瞭，然

其功效確能，止吃逆。

定喘白菓與麻黃 款冬半夏白皮桑 蘇杏黃芩兼甘草 肺寒膈熱喘哮喘

定喘湯——治氣喘，欬嗽。感寒則氣逆。膈熱則哮喘。白菓炒黃二十一枚 麻黃三錢 薑製半夏二

錢 款冬花三錢 蜜炙桑白皮一錢 蘇子二錢 杏仁去皮熟一錢半 黃芩一錢五分 甘草一錢

加薑煎。

范批：發表清肺平氣定喘之劑。

白菓 卽銀杏，含次乙種維他命及「銀杏酸」Ginkgolsäure 甲種銀杏油 Bilobol, 乙種銀杏油 Ginnol,

含氫銀杏酸 Hydroginkgolsäure，觸皮膚起炎症，或發疹子。功能鎮咳祛痰解毒。兼能殺

雙球菌淋菌鏈鎖菌，以生食爲有效，治肺炎肺癰淋疾效。又含澱粉百分之九十七·六，蛋白

質百分之十三·一，脂肪百分之二·九，及五炭糖 Pentosan 等。多食容易神經發炎。

范鳳源治淋疾法——川萆薢三錢 大黃一錢 射干一錢 銀杏七枚 牛膝梢二錢 滑石五錢 澤瀉

三錢 冬葵子三錢研末 石菖蒲鹽水炒五分 細木通一錢 甘草梢一錢 另吞西血珀三分，治急

性淋疾三十帖愈。慢性及攝護腺炎，則服「革藤分清飲」每日一帖，七八十帖愈。西法內服「消治龍」2 (P-aminobenzene sulfonamid) thiazol 達二瓶。每日三次。每次一二片，肌肉或靜脈注射「阿梯共」Arthigon 達輕重二盒，亦能治愈。但中西藥物，雖皆見効。均容易中毒。又治療時，切忌內服蛋黃及硫酸根藥物。倘能用藥物直接治療，傳染後三十六小時內，用麻醉藥局部麻醉，再用百分之五硝酸銀液局部點滴，則一次可愈。急性時以服藥爲妥，謹慎注洗，迨膿已停止，先用局部麻醉再用尿道鏡視察，局部用電灼或百分之十硝酸銀液直接病竈塗抹，則一二次亦愈。又慢性而不易斷根者，則全身通以十八公尺，五百瓦特，短波電熱，達體溫攝氏四十二度，數小時或數次持續，同時依上述治療，亦能斷根。(革藤分清飲載本書一三三頁)

范鳳源治耳聾出膿發癢方——桑葉二錢，牛蒡子三錢，大貝母三錢，杏仁三錢，丹皮一錢半，蟬衣一錢，連翹二錢，殭蠶三錢，天花粉四錢，澤瀉三錢，苡米四錢，赤苓四錢，連服四劑愈。外用硼砂水洗，再用橄欖油滴入。

第九章 理血之劑

四物地芍與歸芎 血家百病此方通 八珍合入四君子 氣血雙療功獨崇

再加黃耆與肉桂 十全大補補方雄 十全除却耆地草 加粟煎之名胃風

四物湯——治一切血虧及婦人經病。當歸酒洗三錢 生地黃二錢 芍藥二錢 芎藭一錢半 凡血證

通用四物湯。如散瘀化滯，消毒止血，古稱涼血。心加黃連五分，治目赤，口舌生瘡，產後大便
秘結。肝加條芩三錢，治婦人經水如黑豆汁。肺加桔芩三錢，治肺痿肺癰吐血。大腸實，加黃芩
三錢。治便秘舌焦口渴。膽加黃連一錢，治心煩不能睡眠。腎膀胱加黃柏三錢，治尿血，陰莖瘡
。脾加生地三錢，治胃出血，大便色黑。胃加大黃，治瀉痢久不愈，膿血稠粘。三焦加地骨皮三
錢，治骨蒸背熱。心包絡加丹皮一錢，治婦人久虛羸瘦，血塊走注，心腹疼痛，不思飲食。小腸
加山梔三錢木通一錢，治小便不通。如清氣退熱。心與包絡加麥冬一錢，治婦人寒熱，四肢煩痛

• 肺加枳殼三錢，下氣消痰，治久嗽發熱。肝加柴胡五分，青皮一錢，治婦人寒熱似瘧。脾加白芍三錢，治冷疝腹痛。胃加乾葛三錢，石膏三錢，治傷寒舌焦。大腸三焦加連翹三錢，治便血。小腸加赤茯苓三錢，治寒熱無汗，心煩身重。膀胱加滑石三錢，琥珀五分，治小便刺痛。血少加龜版三錢。噎膈加入乳一杯。損傷瘀血，加桃仁七錢，紅花一錢，韭汁半杯，童便一錢行之。鼻血加薄荷一錢，玄參一錢散之。血不止，加炒蒲黃三錢，京墨一錢。久不止，加升麻一錢。婦人經血紫黑，脈數爲熱，加黃芩三錢，黃連一錢。血淡，脈遲爲寒，加肉桂五分，附子一錢。人肥有痰，加半夏一錢，南星一錢，橘紅一錢。人瘦便秘，加黑山梔三錢，知母二錢，黃柏一錢。鬱者加木香一錢，砂仁五分，蒼朮一錢，神麴三錢。跌傷瘀滯加桃仁二錢，紅花一錢，延胡索一錢。肉桂五分。體弱加入參一錢，黃耆一錢。便秘加枳殼一錢，厚朴一錢。

知柏四物湯——四物湯加黃柏一錢，知母一錢，治腎虧虛火。

滋陰降火湯——知柏四物湯再加玄參一錢。治陰虛有火。

坎離丸——知柏四物蜜丸。治陰虛嗽血。

二連四物湯——四物湯加黃連一錢，胡連一錢。治虛勞煩熱。夜分發熱。

三黃四物湯——四物湯加黃柏一錢，黃芩一錢，甘草一錢，治體虛潮熱。

三黃補血湯——四物湯用生熟地各三錢，加黃耆一錢，丹皮一錢，升麻五分，柴胡五分。治亡血。

血少。六脈俱大。按之空虛。

元戎四物湯——四物湯加桃仁一錢，紅花一錢，治臟結便秘。撲損瘀血。

治風六合湯——四物湯加羌活三錢，防風三錢。（一用秦艽一錢）治風虛眩暈。便秘。如用蜜丸，

則名補肝丸。

治血六合湯——四物湯加木香一錢，檳榔三錢。治血少氣滯。

神應養真丹——四物湯加羌活二錢，天麻一錢，蜜丸，治受風寒暑濕，癱瘓不遂，語言蹇澀，及血

少脚氣。本方加桃仁一錢，紅花一錢，竹瀝一錢，薑汁少許，治半身不遂，在左者屬瘀血者。

防風當歸散——四物湯去白芍，加防風三錢，治發汗過多，而成瘰癧。

四神湯——四物湯去地黃，加乾薑一錢。治婦人血少，心腹疼痛。

膠艾湯——四物湯加阿膠一錢，艾葉一錢，甘草五分。治身體虛損，經水淋瀝，及血少下痢。

艾附緩宮丸——四物湯加艾葉一錢，製香附一錢，醋丸。治子宮虛冷。

婦寶丹——艾附緩宮丸湯再加阿膠一錢，治虛寒，經水不調。又四物湯加丹皮一錢，地骨皮三錢，

治婦人骨蒸。

芎歸湯——四物湯除芍藥地黃。治血少。

佛手散——又名一奇散，又名君臣散，芎歸湯爲末，治產後血少，頭痛，胎動，下血，服此自安。

子死腹中，服此卽下，催生神效。

八珍湯——四物湯合四君子湯，治心肺虛損，氣血兩虧。

十全大補湯——八珍湯再加黃耆一錢，肉桂五分，兼助陽固衛。

大補黃耆湯——十全湯，去白芍，加山茶萸一錢，五味五分，防風三錢，菴蓉三錢。入薑一片，棗

三枚煎。治氣血兩虧，自汗不止，及便秘發厥。

三合散——四物湯四君子湯，合小柴胡湯，治產後日久虛勞。

生地黃連湯——四物湯四物各四錢，加防風一兩，梔子黃芩黃連各三錢，每服五錢，如脈實，加大黃。治婦人面直浮腫，頭痛腦裂，手足攣瘳，是謂血風證，去血過多，因而燥潤，循衣摸床。撮空閉目，揚手擲足，錯語失神，脈弦浮而數。

范批：補血平肝調氣止痛安胎調經之劑，爲婦科主要方。木方變通至激，能者得運用裕如，極盡胥悉之功。

木通 含「木通結晶性配糖體」Akebin ($C_{25}H_{38}O_8$) 及葡萄糖，並含有鉀鹽，故用作利尿通經藥。能治腎臟疾患，腳氣，浮腫等病，古人云：滑精及孕婦忌之。

琥珀 含樹脂與琥珀酸，多服使血球減少，功能殺菌治淋病，又能發汗利尿鎖瘻。

龜版 含一種膠質 Glue。其性質雖係蛋白質所組成，但僅能用水浸胖，而不能用火熱之，使之凝結，且雖用化學藥品如黃血鹽等，不能使之沉澱，內服能增加血中糖分，營養有功，蓋此種蛋白質容易被腸吸收，使人血分易於凝結，故對肺出血，腎出血，及血友病（此病古時稱血有風熱，蓋血不凝結，抓破，則流血不止之症也）有功，而古稱龜版滋陰，其說雖不同，其功

固甚確實也。古人云：便溏及孕婦均忌之。

人乳

含胰液 Pancreatic 與乳糖，脂肪，維他命 A, B, C, D, E, F. 及鈣質，磷質，食鹽質，皆人體營養劑。

蒲黃

治脂肪油達百分之三十，又有配糖體「異性鼠李素」 Isorhamnetin $C_{15}H_{14}O_6$ 能止血利尿。

京墨

含炭素與動物膠，皆能凝血。

蘇木

合「蘇木精」 Brasilin $C_9H_8O_6$ 故為收斂劑，治腹瀉止痢效，又治月經不順。

血竭

含肉桂酸，有機鹼，脂肪油與安息香酸，外用止血生肉，內服入血殺菌。

地榆

含有色體，糖類，及地榆肥皂草素 Sanguisorbin $C_{27}H_{34}O_8$ 等，治咯血，月經過多等效，蓋亦止血藥也。

亦止血藥也。

百草霜

乃竈額中墨烟，完全為炭質鉀質，外用能吸收氣體與養化，雷氣之微菌如淋菌，流行性感

冒桿菌，使該菌體受養氣分解而成有臭味之抗毒體，惟不能殺活菌。內服能吸收腸胃中氣體，解除腸胃氣悶，又能解除植物毒質如鴉片，番木鱉子，烏頭等，蓋炭質能吸收有機鹼質也

棕櫚炭 皆糖質燒成之炭質，其吸收氣體之能力，較百草霜更巨。

鎖陽 含一種脂肪油與糖質及醇質等，其力能催陰強壯。又能通大便。治肺病，及止血効。日本富士山。附近之人，稱爲不老不死之靈藥，其珍重可知。性較肉蓯蓉更佳。

枸杞 含「甜菜鹼」Betain 氨基酸類，故能解熱，且爲強壯藥。古人云：功能滑腸。

夏枯草 含水可溶性之無機鹽，約百分之三·五，其中鹽化鉀達百分之六十八。又含水難溶性有機鹼物質。能使血壓下降，呼吸運動增大，而呈利尿作用。故治淋疾利尿効。古時以此爲治療癰要藥。

益母草 含茺蔚素結晶質 Leonurin $C_{23}H_{31}N_3O_4$ ，脂肪油，腦分，樹脂，能增加子宮運動之頻度，又能利尿，故可供產婦產後之止血，及男子補精藥。又能治眼疾。古人云：性能滑腸。脾胃虛弱者少用之。

乳香 含無結晶形之樹脂，中多膠質 Gummi，揮發油 Aetherische Oel 及「萜類」Terpen 松脂質。按膠質內服，僅有遮護精液膜之表面。在胃中有一部份分解成糖，被吸收殊遲，故僅微

有滋養作用。但揮發油，微有刺激性，使腹之上部覺熱，入血後，使多形核白血球增多，以攻食死血，又刺激腎肺，使能祛痰與利尿。此物與沒藥醋調，敷一切腫硬塊核甚效。

沒藥

合樹膠達百分之四十，一種揮發油，名沒藥油 Myrrhol $C_{10}H_{16}O$ 百分之二，又有一種樹脂名沒藥脂 Myrrhin 約百分之四十五，外用爲和平之消毒劑，爲潰瘍之敷料，蓋皆樹脂油之功也。內服爲健胃驅風藥，治消化不良，貧血，大便秘結，又能增加白血球之數，略有發汗利尿之作用。亦爲一種子宮與畜劑與通經劑。

五靈脂

係某種蝙蝠之糞，此種翼手動物，古稱寒號蟲，因其喜食松實脂果，而未消化，故糞中含樹脂甚多，人服之白血球增多，利尿通經，且使胃部受刺激而興奮，故古人用此物炒過，治胃氣疼，又用以行血墮胎。

凌霄花

含一種苦味質及有機鹼與配糖體及色素，功能通經。孕婦忌之。

稱 含天冬素 Asparagin 及胍卵酸 Arginin, 「尼古丁」甲基甜菜鹼 Trigonellin, 陳乾酪酸 Tyrosin,

蛋黃素 Lecithin 等與蔗糖及丙種維他命葡萄糖等，故能強壯身體，治口渴嘔吐亦效。

鹿角膠 含膠質軟骨質與磷酸鈣及碳酸鈣，故能增進血中糖質，及使血易凝結，治吐血血崩，強壯身體，治虛損。

覆天膠 乃肥嫩牛肉煎糜去渣，再熬成膏，富戊種維他命及滋養料，且容易消化，故養胃健脾。

胡連 含胡連鹼 *Picrohinin* 及有機酸 *Cathartic Saure*，故治痢疾有功效。又為健胃苦味藥。更有退熱補助消化之功。

天麻 含精液質及鈣質，乃強壯藥，又治眩暈頭痛有效。口乾便閉血少，心臟衰弱者忌多用。

山茱萸 含沒食子酸，林檎酸，酒石酸及一種融點二百四十五度之結晶性酸，乃強精藥，並可代金雞納霜治瘧。

人參養榮卽十全 除却川芎五味聯 陳皮遠志加薑棗 脾肺氣血補方先

人參養榮湯——治脾肺不健，體弱氣虛。榮血不足。驚悸。健忘。寢汗。發熱。食少無味。身倦。肌瘦。色枯。氣短。毛髮脫落。小便赤澀。亦治發汗過多。身振。脈搖。筋惕。肉瞤。人參一錢 白朮一錢 炙黃耆一錢 炙甘草五分 陳皮五分 桂心五分 酒拌當歸一錢 熟地黃七分 五味

子炒杵三分 茯苓三錢 遠志五分 白芍一錢半 加薑棗煎。

范批：；養肝健脾補肺滋腎大補氣血之綜合劑，有新陳代謝之功。統治一切虛弱症。

遠志

含「肥皂素」Saponin及遠志素Polygalin (1.5—Anhydromannit) 樹脂及結晶性之配糖體遠志配糖體 Onsiein $C_{24}H_{40}O_8$ ，乃祛痰之劑。古人云：腎虧者不宜多用。

歸脾湯用木參著 歸草茯神遠志隨 酸棗木香龍眼肉 煎加薑棗益心脾

怔忡健忘俱可却 腸風崩漏總能醫

歸脾湯——治思慮過度。勞傷心脾。怔忡。健忘。驚悸。盜汗。發熱。體倦。食少不眠。或脾胃不能攝血。致血妄行。及婦人經帶。人參二錢 白朮炒二錢 茯神二錢 棗仁炒二錢 龍眼肉二錢 炙黃耆一錢半 當歸酒洗一錢 遠志一錢 木香五分 炙甘草五分。薑一片，棗三枚煎。

范批：滋陰養容，兩補血脾不足。有安神寧心之功。心臟衰弱，心悸不寐。寐有汗洩，怔忡健

忘。可以常服，功效甚著。

茯神 含葡萄糖Glucose、果糖Fructose、故補血安神。

龍眼肉 含甲乙種維他命，蔗糖，酒石酸，故爲滋養強心劑。治心臟脾臟衰弱有效。

酸棗仁 含有色體及肥皂素等，故爲健胃滋養藥，又爲不眠症之鎮靜藥。

養心湯用草蓍參 二 茯苓歸柏子尋 夏麴遠志兼桂味 再加酸棗總寧心

養心湯——治心虛血少。神氣不甯。怔忡。驚悸。蜜炙黃耆一錢 茯苓一錢 茯神一錢 當歸酒洗

一錢 川芎一錢 半夏麴一錢 炙甘草五分 柏子仁去油一錢 酸棗仁炒一錢 遠志去心炒一錢

五味子三分 人參五分 肉桂五分 每服五錢。

范批：養血安神健脾消痰之劑。血衰心悸，聞聲驚惕，夜不寧寐，此方主之。

當歸四逆桂枝芍 細辛甘草木通蓍 再加大棗治陰厥 脈細陽虛由血弱

內有久寒加薑棗 發表溫中通脈絡 不用附子及乾薑 助陽過劑陰反灼

當歸四逆湯——治傷寒而至厥陰證者，蓋傷寒而致腦膜炎之一種也。少腹滿，舌卷，陰囊縮，煩躁

，厥逆，消渴。手足厥寒。脈細欲絕。當歸一錢 桂枝一錢 芍藥三錢 細辛五分 炙甘草五分

通草（即木通）五分 大棗十枚 張仲景曰。其人素有久寒者。加吳茱萸五分。生姜五分。酒少

許。和衷。名四逆加吳茱萸生薑湯。

范批：利關節，散厥寒回陽氣，散寒和血強心利尿。治傷寒四肢厥冷，九竅窒塞，功能血脈。

桃仁承氣湯——**五穀奇** **甘草硝黃併桂枝** **熱結膀胱小腹脹** **如狂畜血最相宜**

桃仁承氣湯——治傷寒。外證不解。熱結膀胱。小腹脹滿。大便秘。小便利。躁渴譫語。畜血發熱

如狂。及血瘀。胃痛。腹痛。脇痛。瘕疾。實熱。痢疾。畜血急痛。桃仁五十枚去皮尖研，大黃

四錢 芒硝二錢 甘草一錢 桂枝一錢。

桃仁承氣飲——桃仁承氣湯，加青皮一錢。枳實一錢。當歸一錢。芍藥一錢。蘇木汁一錢。柴胡五分。

范世：和胃潤燥破血蕩滯之劑。治傷寒表邪未解。少腹脹滿瘀滯中停之症。

犀角地黃湯——**犀角地黃湯** **血升胃熱火邪干** **斑黃陽毒皆堪治** **或益柴苓總伐肝**

犀角地黃湯——治傷寒。胃火熱盛。吐血。衄血。嗽血。便血。畜血如狂。漱水不欲嚥。及陽毒發

斑。生地黃一錢半 白芍一錢 丹皮二錢 犀角五分。熱甚如狂者。加黃芩一錢。因怒致血者。

加梔子三錢，柴胡五分。陶節菴加當歸一錢，紅花一錢，桔梗一錢，陳皮一錢，甘草五分，藕汁

半杯。名加味犀角地黃湯。所治同。

范批：清熱涼血之劑。治一切血症及感染熱毒，腐發斑疹，傷寒熱邪入裏，迫血妄行。

犀角

含有角質 Keratin $C_{21}H_{33}O_4N_7S_2$ 及硫化乳酸 Thiomilchsäure, 碳酸鈣, 磷酸鈣及膠質 Zystin

，能強心，解毒，使白血球減少，故治吐血有效，治腸胃病有功。古人云：孕婦忌服。若渴而飲不多，且復吐者不宜服之。

咳血方中訶子收 括萋海石山梔投 青黛蜜丸口嚙化 欬嗽痰血服之瘳

咳血方——治欬嗽。痰血。青黛水飛一錢 括萋仁去油三錢 海石去砂三錢 炒黑山梔三錢 訶子

肉一錢 爲末。蜜丸。每服三錢。嚙化。嗽甚加杏仁三錢。

范批：平肝清肺退熱潤燥之劑。有止血消痰斂肺定喘之功。

訶子肉 含沒食子酸與沒食子單甯酸，故收斂止血，止痢止咳。

東垣秦艸白朮丸 歸尾桃仁枳實攢 地榆澤瀉皂角子 糊丸血痔便艱難

仍有蒼朮防風劑 潤血疎風燥濕安

秦朮白朮丸——治痔瘡痔漏。有膿血。大便燥結。痛不可忍。秦朮一錢 白朮一錢 歸尾酒洗一錢

桃仁一錢研 枳實麩炒五分 皂角子燒存性五分 澤瀉五分 地榆三分 麵糊丸每服三錢。

秦朮蒼朮湯——秦朮白朮丸，除白朮枳實地榆，加蒼朮一錢，黃柏一錢，大黃三錢，檳榔一錢，防風三錢。治同。

秦朮防風湯——秦朮白朮丸，除皂角枳實地榆。加防風三錢，升麻一錢，柴胡一錢，陳皮一錢，大黃三錢，黃柏一錢，紅花一錢，炙甘草一錢。治痔漏。大便時疼痛。

秦朮羌活湯——秦朮白朮丸用秦朮一味，加羌活一錢，防風三錢，麻黃一錢，升麻一錢，柴胡五分 薑本一錢，細辛五分，黃耆一錢，炙甘草一錢，紅花一錢。治痔漏。成塊下垂。不任其癢。

秦朮當歸湯——秦朮白朮丸，除地榆，加大黃三錢，紅花一錢。治痔漏。大便燥結疼痛。

范批：潤燥健脾通便止腸血之劑

皂角子 含一種肥皂素 Gleditschiasaponin $C_{55}H_{103}O_{21}$ 百分之十，有溶血作用。能祛痰利尿。

槐花散用治腸風 側柏黑荆枳殼充 爲末等分米飲下 寬腸涼血逐風功

槐花散——治痔瘡膿毒下血。槐花炒 側柏葉杵 荆芥炒黑 枳殼炒等分爲末。每三錢。米飲下。
槐角丸——槐花散除柏葉荆芥。加當歸一錢，黃芩三錢，防風三錢，地榆三錢。酒糊丸。治同。
加減四物湯——槐花散加當歸一錢，生地一錢，川芎一錢。入烏梅一錢，生薑一錢煎。治同。
當歸和血散——槐花散除柏葉枳殼。加當歸一錢，川芎一錢，熟地一錢，白朮一錢，青皮五分，升麻五分。治腸澀下血。濕毒下血。

加減槐花散——槐花散除柏葉枳殼。加青皮等分。治血痢。腹不痛。不裏急後重。單用槐花一錢，荆芥炒黑一錢爲末。酒服。亦治下血。

范批：燥濕清血利氣通瘀之劑，爲止腸出血要藥。若久病不愈，宜兼用溫補升提，卽本方內加入人參黃耆白朮甘草升麻之類。

槐花 含配糖體，曰「樺木配糖體」*Frutin*，加水分解成「樹皮黃色素」*Quercetin* 與葡萄糖。內服治衄血，咯血，膀胱出血，腸止血。

側柏葉 含一種側柏揮發油，陰乾後，治吐血，衄血，腸出血，子宮出血。乃止血之劑。

小蘗子飲藕蒲黃 木通滑石生地裏 歸草梔子淡竹葉 血淋熱結服之良

小蘗飲子——治下焦結熱。而成血淋。小蘗 蒲黃炒黑 藕節 滑石 木通 生地黃 梔子炒 淡

竹葉 當歸 甘草各五分

范批：涼血止血通瘀利尿清熱之劑。治濕熱走注，小腸膀胱，小洩不利，溺時血淋刺痛甚效。

小蘗，又名野蘗，含苦味質揮發油，甙基物 *Cyanogens* 配糖體 *Glycosid*，故利尿，消水腫，其根汁

外用治湯火傷有效。

四生丸用三般葉 側柏艾荷生地協 等分生搗如泥煎 血熱妄行止衄愜

四生丸——治血熱妄行，或吐或衄。側柏葉一錢 艾葉一錢 薄荷叶一錢 生地一錢 搗服。

范批：上止血衄為清肺，下止血宮出血為溫攝，清上溫下之合劑也，治女子月經初通，血不歸

經，絮亂不一。

復元活血湯柴胡 花粉當歸山甲俱 桃仁紅花大黃草 損傷瘀血酒煎祛

復元羌活湯——治從高墜下。惡血留於腸下。疼痛不可忍者。柴胡五分 當歸一錢 括蕒根三錢

穿山甲二錢 甘草一錢 紅花二錢 桃仁三錢去皮尖研 酒浸大黃五錢 加酒煎。以利爲度。

芫花：通瘀止痛之劑。治肝經惡血凝阻，胸脇劇痛。

穿山甲 能使血中增添白血球之數，因此可以消乳塊，驅便毒，爲外科要藥。

范鳳源治梅毒方——金橋核五錢 金銀花三錢 大楓子仁三錢 連翹一錢 川草薺六錢 土茯苓四

兩 牛蒡子二錢 皂莢子七枚 白蒺藜二錢 當歸一錢半 白芷一錢半 穿山甲三錢 川大黃一

錢 桂枝一錢 另吞五寶丹一日一錢。連服十五日完功。如能加入黃楊葉一錢，則更見效。五寶

丹係珍珠二錢，滴乳石四錢，硃砂二錢，冰片一錢，犀黃四錢，研極細粉末，方可秤量吞服。大

人每日一錢，小人每日五分爲度。上二方作爲注射鉍劑鉍劑時之補助劑亦無妨害，且增加治愈效

力不少。蓋鉍劑與鉍劑不可每日注射，而此藥可每日服也。不過藥資昂貴，貧人無力購服耳。

范鳳源治肺癆吐血方——冬桑葉五錢 炮姜炭一錢 夜交藤二錢 石決明二兩半 廣鬱金一兩 紫

苑三錢 大生地五錢 白茅花五錢 馬兜鈴五錢 茜草根一兩 全瓜蒌五錢 黑山梔五錢，分五

日煎服，五日病瘥。

第十章 祛風之劑

小續命湯桂附芎 麻黃參芍杏防風 黃芩防己兼甘草 六經風中此方通

小續命湯——治中風不省人事。神氣潰亂。半身不遂。筋急拘攣。口眼喎邪。語言蹇澀。風濕腰痛

。痰火併多。中風。及剛柔二瘧。防風一錢二分 桂枝八分 麻黃八分 杏仁去皮尖炒研八分

芎藭酒洗八分 白芍酒炒八分 人參八分 炙甘草八分 酒炒黃芩八分 木防己八分 附子四分

每服三錢。加薑一片棗三枚煎。筋急語遲，脈弦者，倍人參，加慧仁三錢，當歸一錢。去芍藥

，以避中寒。煩燥不大便，去桂附，倍芍藥，加竹瀝一錢。日久不大便，胸中不快，加大黃二錢

枳殼二錢。臍寒下利，去防己黃芩，倍附子，加白朮三錢。嘔逆加半夏一錢，語言蹇澀，手足戰

抖。加石膏三錢，菖蒲五分，竹瀝一錢。身痛發搐加羌活三錢。口渴加麥冬二錢，花粉三錢。煩

渴多驚，加犀角一錢，羚羊角五分。汗多去麻黃杏仁，加白朮三錢。舌燥去桂附，加石膏三錢。

麻黃續命湯——小續命湯倍麻黃杏仁防風。治中風。無汗惡寒。

桂枝續命湯——小續命湯倍桂枝芍藥杏仁。治中風。有汗。惡風。

白虎續命湯——小續命湯去附子。加石膏三錢，知母一錢。治中風。無汗身熱。不惡寒。

葛根續命湯——小續命湯加葛根三錢。桂枝一錢，黃芩三錢。治中風。身熱有汗。不惡風。

附子續命湯——小續命湯加附子一錢，乾薑一錢，甘草一錢。治中風。無汗。身涼。

桂附續命湯——小續命湯倍桂附甘草。治中風有汗無熱。

羌活連翹續命湯——小續命湯加羌活三錢，連翹三錢。治中風。或麻木不仁。

古今錄驗續命湯——小續命湯去防風防己附子白芍。加當歸一錢，石膏三錢。治中風痲身。不自收口。

。不能言。冒昧不知痛處。或拘急不能轉側。

千金大續命湯——古今錄驗續命方，去人參，加乾薑一錢，黃芩三錢，荆瀝一錢。治五臟偏枯賊風。

范批：發表和裏，補血疎風，補氣燥濕之混雜劑。治最初類中風有效。如病已成，則無補於事。

矣。

羚羊角 含磷酸鈣及角質 Keratin $C_{12}H_{19}O_4N_5S$ 與不溶化礦物鹽，故能治肺炎，肝炎，驚厥，中風，腦病，風濕病。

大秦朮湯羌活防 芎芷辛芩二地黃 石膏歸芍苓甘朮 風邪散見可通營

大秦朮丸——治中風。手足不能運掉。舌強不能言語。秦朮一錢 石膏三錢 酒洗當歸一錢 酒炒

白芍三錢 川芎一錢 酒洗生地二錢 熟地二錢 土炒白朮二錢 茯苓三錢 炙甘草五分 酒炒

黃芩三錢 防風三錢 羌活三錢 獨活二錢 白芷一錢 細辛五分 每服三錢。雨濕加生薑。春

夏加知母。心下痞加枳殼。

易老天麻丸——天麻 牛膝 葶藶 玄參各六兩 杜仲七兩 當歸十兩 生地一斤 羌活十兩 炮

附子一兩 蜜丸。每服三錢。一方有獨活五兩。

范批：養血祛風化濕利關節之劑。大秦朮丸。能使腸部退腫，但治中風未必見效。易老天麻丸，有鎮神祛風之功。至於市上入參再造丸，醫治中風，亦不見效。中醫各藥，經余試用，僅木防已烏藥與肉桂，對於中風半身不遂，略有功效。然終不能治愈病也。

葶藶 根含葶藶素 $\text{Dioscin C}_{21}\text{N}_3\text{O}_7$ 及葶藶毒素 $\text{Dioscorea-Sapotoxin C}_{28}\text{H}_{53}\text{O}_{15}$ 皆肥皂草素，有強力

溶血功用。性有毒，故治梅毒淋病。

杜仲 含橡皮百分之二十五，樹脂百分之七十，乃強壯藥。

三生飲用烏附星 三皆生用木香聽 加參對半扶元氣 卒中痰迷服此靈

星香散亦治卒中 體肥不渴邪在經

三生飲——治中風卒然昏噴。不省人事。痰涎壅盛。語言蹇澀等證。生南星一兩 生川烏去皮五錢

生附子去皮五錢 木香二錢 每服一兩 加入參一兩煎。

范批：溫脾散寒行氣除痰之猛峻劑。虛人應倍用人參。否則不惟無益，適蒙其害。

川烏 含烏頭素 $\text{Aconitin (C}_{27}\text{H}_{47}\text{NO}_{11})$ 中間烏頭素 $\text{Mesaconitin C}_{27}\text{H}_{47}\text{NO}_{11}$ 高烏頭素 Hypaconitin

$(\text{C}_{27}\text{H}_{47}\text{NO}_{11})$ 低烏頭素 $\text{Jesaconitin C}_{27}\text{H}_{47}\text{NO}_{11}$ 治神經痛風濕病有效。又為鎮痙症藥。古人

云：血液衰少者宜少用之。

地黃飲子 山茱斛 麥味菖蒲遠志茯 菴蓉桂附巴戟天 少入薄荷薑棗服

瘖厥風痺能治之 火歸水中水生木

地黃飲子——治中風舌瘖。不能言。足廢不能行。此名曰風痺。急當溫之。熟地黃 巴戟天去心

山茱萸 肉蓯蓉酒浸 附子炮 官桂 石斛 茯苓 石菖蒲 遠志 麥冬 五味子 等分。每服五錢。入薄荷少許。薑棗煎服。

范批：強壯安神靜鎮滋補之劑

巴戟天 含丙種維他命，可供祛痰用，亦爲滋養劑。

石斛 含粘液質，及石斛素Dendrobin，乃強壯藥，健胃藥，治陰痿盜汗甚效。

獨活湯中羌獨防 芎歸辛桂參夏萸 茯神遠志白微草 瘖瘖昏憤力能匡

獨活湯——治體虛癱瘓。昏瞶不覺。或爲寒熱。獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微 當歸 芎藭 半夏 人參 茯神 遠志 萸 高蒲各五錢 加炙甘草二錢半 每服一兩。加薑一片棗煎三枚。

范批：祛風除痰補氣活血安神利尿之劑。治虛人手足拘攣，伸屈不利，表邪未解移邪於心有功

白微 含配糖體，揮發油等，白微油Cynanchol $C_{15}H_{20}O$ 乃白微醇 Cynanchocerin與白微質Cynan

CaCl₂之混合物，能解熱及利尿，治尿酸効。

順風勻氣朮烏沈 白芷天麻蘇葉參 木瓜甘草青皮合 嗚僻偏枯口舌瘡

順風勻氣散——治中風半身不遂。口眼喎邪。白朮二錢 烏藥一錢半 人參五分 天麻五分 白芷

三分 蘇葉一分 木瓜一錢 青皮一錢 炙甘草五分 磨沉香三分 加薑煎

范批：調氣疎風逐濕之劑。

黃柏蒼朮天南星 桂枝防己及威靈 桃仁紅花龍胆草 羌芷川芎神麴停

痛風濕熱與痰血 上中下通用之聽

黃柏蒼朮丸——黃柏酒炒 蒼朮泔浸 南星 薑 棗 各二兩 防己 桃仁去皮尖 龍膽草 白芷

川芎 炒神麴各一兩 桂枝 威靈仙 紅花 羌活 各二錢半 麴糊丸。每服三錢。

范批：和血調氣除痰燥濕之劑。週身不舒，筋骨肢節異常痛楚，爲痛風之統治方也。

龍膽草 含苦味龍膽配糖體 Gentiopicrin $C_{15}H_{21}O_9 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ 及龍膽三糖體 Gentianose $C_{18}H_{27}O_{12}$ 乃

苦性健胃藥。

獨活寄生羌防辛 芎歸地芍桂苓均 杜仲牛膝人參草 冷風頑痺屈能伸

若去寄生加蒼續 湯名三痺古方珍

獨活寄生湯——治肝腎虛熱。風濕內攻。腰膝作痛。冷痺無力。屈伸不便。獨活 桑寄生（如無真者以續斷代之） 秦艽 防風 細辛 酒洗當歸 酒炒芍藥 酒洗川芎 熟地黃 杜仲薑汁炒斷 絲 牛膝 人參 茯苓 甘草 桂心 等分。每服四錢。此卽前湯，除黃蒼續斷，加桑寄生。羌活續斷湯——獨活寄生湯除獨活寄生，加羌活二錢，續斷三錢。治同。

范批：補氣血祛風濕之劑，虛人氣血不足，風濕內盛，肢節屈伸不便，此方主之。

桑寄生 原不易採獲，因桑樹上欲其寄生另一植物，必須賴鳥食果實時，遺落種子於桑樹上始生。

但近時所謂桑寄生者，原不皆生於桑樹，乃槲寄生科植物寄生於朴樹及樺枹栗枹之上。此種植物，我國古時謂能止痛，安胎，下乳，殺虫，生髮，退風濕病，今則化驗之，知其含一元醇 Cetylalcohol, Melissyalcohol, 樹皮黃色配糖體 Quercitrin。能催乳補血，止血安胎，乃強壯劑也。

消風散內羌防荆 芎朴參苓陳草并 蕪蠶蟬蛻藿香入 爲末茶調或酒行

頭痛目昏項背急 頑麻癩疹服之清

消風散——治風熱上攻。頭目昏痛。項背拘急。鼻嚏聲重。及皮膚頑麻。癩疹瘙癢。婦人面腫。荆

芥一錢 陳皮去白五分 薑汁炒厚朴五分 炙甘草五分 防風一錢 羌活一錢 藿香一錢 洗炒

蕪蠶一錢 蟬脫一錢 川芎一錢 茯苓一錢 人參一錢。茶湯下。疥癬，酒下。

范此：發汗散風健脾調暢之劑。治外感風熱，內蘊風濕。

〔蟬脫〕 乃蟬所解之皮。按近代臟器製劑之原理，動物體內之內分泌，計分二種，一爲積極的分泌，

乃血中輸送之物質，對於身體組織上所需要之物，或刺激機能之化學品。一爲消極的分泌，乃身體新陳代謝之際，凡有毒之產物，在身體內部或表面，則循環系統必攝取一種解毒之物質，以破壞毒質，所謂免疫，或解毒生體。今蟬在暑熱之氣候，脫退之皮，必蟬體抵抗暑熱之氣候，或抵抗某種毒質，而致成此蟬脫，則此蟬脫，能解毒消熱，可以無疑。

川芎茶調散荆防 辛芷薄荷甘草羌 目昏鼻塞風攻上 正偏頭痛悉平康

方內若加僵蠶菊 菊花茶調用亦減

川芎茶調散——治正偏頭痛。惡風有汗。憎寒壯熱。鼻塞痰盛。頭暈目眩。薄荷五分川芎五分 荆芥五分 羌活一錢 白芷五分 炙甘草五分 防風一錢半 細辛一錢 食後茶調服。一方加菊花一錢 僵蠶五分 名菊花茶調散。治頭目風熱。

范批：解表散風清利頭目之劑。治感冒頭暈目眩正偏頭痛有效。

青空芎草柴苓連 羌防升之入頂巔 爲末茶調如膏服 正偏頭痛一時蠲

清空膏——治正偏頭痛。年深不愈。及風濕熱上壅。頭目及腦。苦痛不止。青苓酒炒一錢 黃連酒炒五分 羌活一錢 防風一錢 柴胡七分 川芎五分 炙甘草五分 如頭痛，足寒氣逆，脈細沉，加細辛五分。如痰多體重，腹痛痰癖，頭痛，脈緩，有痰，去羌活防風川芎甘草，加半夏一錢。如偏頭痛，服之不愈，減羌活防風川芎一半，加柴胡一倍。如自汗發熱，惡熱而渴，此便秘頭痛，可與石膏三錢 知母一錢 甘草一錢 粳米一錢 白芷五分煎服。

范批：散風清熱除濕緩痛之劑。按頭痛爲近因。頭風爲遠因。此方治頭痛有效。治頭風則非效。

日之功可癒也。

人參荆芥散熟地 防風柴枳芎歸比 酸棗鼈羚羊桂朮甘 血風勞作風虛治

人參荆芥散——主治面目浮腫，頭痛欲裂，手足攣痺。人參 白朮 熟地黃 酸棗仁炒 鼈甲童便

炙 羚羊角 枳殼 柴胡 荆芥 防風 甘草 芎藭 當歸 桂心各五分 加薑一片煎。

范批：止汗解熱補氣活血寧神之劑。

范鳳源治尿酸痛風方——秦朮三錢 獨活三錢 羌活三錢 防風三錢 五加皮三錢 黃柏一錢 蒼

朮一錢五分 晚蠶沙二錢 澤瀉三錢 當歸三錢 桑枝三錢 威靈仙一錢半 四劑愈。

范鳳源治口唇歪斜舌大言語模糊不清方——白朮四錢 烏藥三錢 黨參一錢 天麻一錢 沉香五分

白芷五分 紫蘇五分 木瓜五分 青皮五分 炙甘草五分 生薑三片 連服七劑愈。

第十一章 祛寒之劑

理中湯主理中鄉 甘草人參朮黑薑 嘔利腹痛陰寒盛 或加附子總扶陽

理中湯——治傷寒腹滿。自利不渴。寒多而嘔。腹痛蕪滯。脈沉無力。或厥冷拘急。或結胸吐衄。以及感寒霍亂。白朮二錢東壁土炒 人參一錢 炮乾薑一錢 炙甘草一錢 每服四錢。自利腹痛者，加木香一錢。不痛利多者，用白朮三錢。渴者倍白朮。踈臥沉重，利不止，加附子一錢。腹滿去甘草。嘔吐去白朮，加半夏一錢薑汁少許。臍下動氣，去朮，加肉桂五分。悸加茯苓三錢。陰黃加茵蘆三錢。寒結胸加枳實三錢。

理中丸——理中湯等分蜜丸。治同。

附子理中湯——理中湯三錢，加附子一錢，治中寒腹痛身痛。四肢拘急。

枳實理中丸——理中湯加枳實二錢，茯苓三錢，蜜丸，治寒實結胸欲絕，胸膈高起，手不可近，用

大黃芒硝不瘥者。

理中安虬丸——理中湯去甘草。加茯苓三錢，川椒五分，烏梅五分。治胃寒吐虬。

桂枝人參湯——理中湯加桂枝一錢，倍甘草。治頭痛發熱，表證不除，而數下之，腸熱而利，心下

痞鞭，表裏不解者。

連理湯——理中湯加黃連一錢，茯苓三錢，治傷暑濕而作瀉。

補中湯——理中湯加陳皮一錢，茯苓二錢，治泄瀉。瀉不已，加附子。惡食，食不化，加砂仁五分

溫胃湯——理中湯加當歸一錢，白芍二錢，陳皮一錢，厚朴一錢，川芎一錢，入薑煎，治憂思鬱結

，脾肺氣凝，脹滿上衝，飲食不下。

黃耆湯——理中湯加黃耆一錢，白芍二錢，陳皮一錢，蒼香二錢。治腹滿。

治中湯——理中湯加青皮一錢，陳皮一錢，治腹滿痞悶，兼食積者。

范批：補氣健脾溫胃散寒之劑。治病後脾胃消連乏力，胸腹虛痞，大便溏薄症頗效。

川椒 含檸檬油 Citronellal 二環萜 Dipenten, 左旋胡椒萜 1-g-Phellandren, 玫瑰香醇 Geraniol

胡椒辛味油 *Sanshol Oil* *Hg. NO* 有機鹼，維他命 P，治間歇熱之瘧疾，又用作健胃藥及殺蟲之藥劑。古人云：大腸積滯者不宜用之。

真武湯壯腎中陽 茯苓朮芍附生薑 少陰腹痛有水氣 悸眩暈惕保安康

真武湯——治口燥咽乾而渴或咽痛，腹痛。小便不利。四肢沉重。疼痛。自下利者。或欬或嘔或小便利。又頭痛發熱病。發汗。汗出不解。仍發熱。心悸頭眩。筋惕。肉瞤。振振欲擗地。體虛惡寒。白朮三錢炒 泡附子一枚 茯苓三錢 炒白朮三錢 生薑二錢，欬者，加五味子五分，細辛五分，乾姜一錢。小便利，去茯苓。下利去芍藥三錢，加乾姜一錢。嘔去附子，加生姜一倍。附子湯——真武湯去生薑。加入參二錢，治口燥咽乾而渴或咽痛，身體痛，手足寒，骨節痛，脈沉者。及此病，得之一二日，口中燥，背惡寒者。

范批：溫運脾胃調和氣血之劑。治胃脘虛冷，飲食難消，腹痛須便洩等症。

四逆湯中薑附草 三陰厥逆太陽沉 或益薑蔥參芍桔 通陽腹脈力能任

四逆湯——治起病無發熱頭痛惡寒蜷臥，身痛。與少腹俱，腹痛。下利。惡寒不渴。四肢厥冷。或

反不惡寒。面赤煩躁。裏寒外熱。或乾嘔。或咽痛。脈沉微細欲絕。附子一枚生用 乾姜一錢 炙甘草五分 冷服。面赤者，加葱九莖。腹痛者，加芍藥二錢，咽痛，加桔梗一錢，利止，脈不出，加人參一錢。嘔吐血，加生姜三片。

尤附湯——四逆湯加白朮一錢，大棗三枚，治風濕相搏，身體煩疼，及中寒發厥心痛。

乾姜附子湯——四逆湯除甘草，治下後復汗，晝躁夜靜，不嘔不渴，無表證，脈微無大熱者。又治中寒厥逆眩仆無汗。或自汗淋漓，及外熱煩躁。

姜附歸桂湯——姜附湯，加當歸一錢，肉桂五分，入蜜和服。治同。

姜附歸桂參湯——姜附歸桂湯，再加入人參一錢，甘草一錢，加姜煎。治同。

白通湯——四逆湯除甘草，加葱四莖。治同。

四逆加入參湯——四逆湯加入人參一錢，治惡寒，脈微，復利，利止亡血。

茯苓四逆湯——四逆加入參湯再加茯苓三錢，治汗下後，病不解而煩躁。

芍藥甘草附子湯——四逆湯除乾姜，加芍藥三錢，治傷寒發汗不解，反惡寒者。

甘草乾姜湯——四逆湯除附子，用甘草一錢，乾姜一錢，治傷寒，脈浮自汗，小便數，心煩，微惡寒，腳攣急。用桂枝湯，誤攻其表，得之便厥，咽中乾，煩躁，吐逆，與此湯，以救之，若厥愈足溫者，更作芍藥湯服之，其腳即伸。（芍藥甘草各四錢。）

茱萸四逆湯——四逆湯加吳茱萸一錢，治腹痛，項痛，吐沫，四肢冷厥，脈浮緩。

當歸四逆湯——四逆湯加當歸一錢，木通五分，治感寒，手足厥冷，脈細欲絕，及男婦寒疝，臍下冷，引腰膀而痛。

茵陳四逆湯——四逆湯加茵陳三錢，治陰黃疸，肢重身寒，膚粟胸痞，滿腹跪臥，自汗自利，小便赤少。

回陽返本湯——四逆湯加生脈散二錢，陳皮一錢，治身冷自汗，脈浮而數。

漿水散——四逆湯加官桂五分，良薑五分，半夏一錢。治虛寒水瀉，冷汗。脈微甚者，嘔吐，此為急病。

范批：表散寒邪補中健胃止癉厥之劑。

蜜汁 含蜂糖，爲潤下劑。又爲潤喉鎮咳劑。古人云：性能滑腸，泄瀉者忌之。

人尿 含尿素，尿色素，併含硫酸鹽，食鹽，磷酸鈉，鉀，鈣，鎂，等，能安神催眠補身。按近人謂男女性慾所損失之物，女性損失者爲「女生殖素」Oestrone，「女生殖油」Oestriol「女生殖醇」Oestradiol「治和鹼」Equilene「治和素」Equilenin「卵巢素」Phenanthrene 男性損失者如「磷質丙種維他命」Calciferol「男生殖素A B」Auxin A B等質。女性損失雖多。但食物中有此原素。故仍補足。男性則所損失之「男生殖素A B」，一切食物中，絕無此素，故無法補足，因此男性壽命較女性爲短促。男子尿中常含有微量「男生殖素」，童便尤多，雖入胃十九破壞無用，然藥物中，採用人尿童便，亦略有功效。婦人之所損失者在植物中能含有之，有人謂以楊花，橡實，繡中有之。雌動物生殖之花心，與胎盤所含較多，孕婦晨起之尿，亦富是質。至於男性損失物，如睾丸素 Androsterone，副腎素 Testosterone則植物中亦有含之者，尤以童便，男性之腎Testicis中所含較多。

猪膽汁 含腸之抗毒素。能使腸之消化脂肪力增強。係瀉藥。古人云：體虛者不可多用。

白通加尿豬膽汁 乾薑附子兼蔥白 熱因寒用妙義深 陰盛格陽厥無脈

白通加人尿豬膽汁湯——治口燥咽乾而渴。下利。脈微者。與白通湯。利不止。厥逆無脈。乾嘔而煩。服此湯後。脈暴出者死。微續者生。蔥白四莖 乾姜一錢 泡附子一枚 人尿五杯 豬膽汁少許 腹痛者。去蔥，加芍藥二錢。嘔者加生姜二錢。痛者加桔梗二錢。利止脈不出者，加人參二錢。葱熨灸法——專治手足逆冷，腹痛暴絕。服白通湯，或四逆湯後，用葱一大握，以繩纏束，切去兩頭，留白寸許，以火炙熱，安臍上。先將麝香半分，填臍中，次放葱餅，用熨斗盛火熨，令熱氣從臍入腹，痛甚者，連熨二三餅，身溫有汗，即瘥。否則不治。或用艾灸「關元」「氣海」(臍下一寸五分名氣海。二寸為丹田。三寸名關元。)各二三十壯。內外悉攻。務令一時之內。得汗而解。或曰。用礮醋拌麩皮，炒熟，袋盛蒸熨。比前法尤捷。

范批：通陽散寒止痛治痢之劑。

麝香 含麝香揮發油，麝香甙 $Muskon\ C_{15}H_{11}O$ 及脂肪，膠質，蛋白質等，內服外用，功能補力鎮

痙安撫神經。凡身體衰弱而有虛弱性熱病，甚至神經受制阻者，可以麝香一分，澱粉少許，

和水灌入腸內，能挽救虛脫，又重類呃逆亦可服此。

醋 含醋酸。外用可除痣，有腐蝕作用。又夜盜汗可以醋洗之。又出血鼻衄，可以稀醋洗之。有止血之功。可用以軟化皮膚，使藥力侵入。

麩皮 卽浮小麥之皮。含麩皮蛋白質Glutin，澱粉，砂糖，及乙種維他命。內服止汗，治盜汗。外用治湯火瘡爛。

吳茱萸湯人參棗 重用生薑溫胃好 陽明寒嘔少陰利 厥陰頭痛皆能保

吳茱萸湯——治食穀欲嘔。若得湯，反劇者，又治吐利，手足厥冷。煩躁欲死者。又治乾吐嘔涎頭痛。

痛。吳茱萸一錢泡 人參一錢 大棗十二枚 生姜一錢

吳茱萸附子湯——吳茱萸湯加附子一錢，治寒疝腰痛，牽引辜丸，尺脈沉遲。

范世：暖胃散寒補氣健脾之劑。治胃空作痛著效。

益元艾附與乾薑 麥味知連參草將 薑棗蔥煎入童便 內寒外熱名戴陽

益元湯——治面赤身熱。不煩而躁。飲水，不入咽。泡附子一錢 乾姜一錢 艾葉一錢 黃連五分

知母一錢五分 人參五分 麥冬一錢 五味子五分 甘草五分 加生薑一片，棗三枚，葱白四枚煎，入童便一匙。冷服。

范批：補氣助陽斂陰退熱之劑。

回陽救急用六君 桂附乾薑五味羣 加麝三釐或胆汁 三陰寒厥見奇功

回陽救急湯——治初病身不熱。頭不痛。惡寒戰慄。四肢厥冷。引衣自蓋。蹇臥沉重。腹痛吐瀉。

口中不渴。或指甲唇青。口吐液沫。或無脈。或脈沉遲無力。附子一錢泡 乾姜一錢 肉桂一錢 人參五分 白朮一錢 茯苓一錢 半夏一錢 陳皮七分 甘草五分 五味子九粒 加薑一片煎，入麝香三厘，調服。無脈加豬胆汁少許。瀉瀉加升麻一錢，黃耆一錢。嘔吐加姜汁少許。吐涎沫，加鹽炒吳茱萸一錢。

范批：此方為溫補大劑。治大感寒涼，四肢厥冷，指甲唇皮色現青白，脈搏沉遲，形神萎靡不堪，有氣脫陽亡之象者。

四神故紙吳茱萸 肉蔻五味四般須 大棗百枚薑八兩 五更腎瀉火衰扶

四神丸——治五更泄瀉。破故紙四兩酒浸一宿炒 五味子三錢炒 肉豆蔻二錢麩裏炒 吳茱萸一錢

鹽湯泡 用大棗十枚。生姜八兩。切片同棗煮爛。去棗取棗肉爲丸。每服二錢。臨臥鹽湯下。

二神丸——四神丸，單用破故紙肉豆蔻，治同。

五味子散——四神丸單用五味子吳茱萸，治同。

二香四神丸——四神丸去五味子吳茱萸，加茴香一錢，木香五錢，姜棗棗丸，治同。

范批：暖胃健脾固腸之劑。治日久洩瀉，五更爲甚之症有效。

補骨脂（即破故紙）乃豆科植物，含揮發油，膠質，配糖質及樹脂，功能滋補。古人云：夢遺滑

血，大便閉結者均忌之。

厚朴溫中陳草苓 乾薑草薺木香停 煎服加薑治腹痛 虛寒脹滿用皆靈

厚朴溫中湯——治腹痛虛寒脹滿。厚朴一錢 陳皮一錢 甘草五分 茯苓五分 草薺五分 木香

五分 乾薑三分 加薑煎

范批：溫胃止痛調暢樞機之劑。治胃氣痛甚效。

寒疝痛用導氣湯 川棟茴香與木香 吳茱煎以長流水 散寒通氣利小腸

導氣湯——治寒疝疼痛。川楝子四錢 木香三錢 茴香二錢 吳茱萸一錢 湯泡 長流水煎。

范批：調氣溫通燥濕利尿之劑。治寒疝有效。

川楝子 含川楝脂肪油 Zedrochol，故驅虫利尿解熱。治膀胱炎，疝氣等效。古人云：脾胃虛弱者少用之。

茴香 含精油百分之三至八。如茴香油 Anethol $C_9H_{10}O$ 佔精油百分之六十，又有右旋性「茴香醇」 α -Fenchon 及二環萜 α -Pinen，雙戊烯 Dipenten 右旋檸檬精 α -imoren 功能健胃驅風祛止痛。刺激腎臟，利尿興陽。

疝氣方用荔枝核 梔子山查枳殼益 再入吳茱萸厥陰 長流水煎疝痛釋

疝氣方——治疝氣疼痛。吳茱萸 枳殼 梔子 山查 荔枝核 等分爲末。空心長流水下二錢。
范批：治寒疝之劑。功與導氣湯彷彿。

荔枝核 含一種揮發油及咖啡精 caffeine 肥皂草素，功僅能止咳。此方治疝九受寒而痛，乃吳茱萸之功，而非治微菌攻入疝丸之疝丸疼痛也。

橘核丸中川棟桂 朴實延胡藻帶昆 桃仁二木酒糊合 癩疔痛頑鹽酒吞

橘核丸——治四種癩疔。橘核 川棟子 海藻 海帶 昆布 桃仁各二錢 延胡索 厚朴 枳實

木通 桂心 木香各五分 酒糊丸。每服三錢鹽湯。或酒下。

范批：除濕散寒調氣活血利尿尿洩熱之綜合劑。統治疔氣方也。

橘核 含丙種維他命，功能解熱。治咽喉痛麻疹咳嗽梅毒。惟以金橘核爲有效。

海藻 含碘質千分之二，鐵鈣鉍等質，治癩疔，結核，結氣腫，又利尿。

海帶 含碘質千分之三·五，甘露蜜醇Mannit，昆布酸Alginsäure，洋菜膠Galactan 鐵鈣鉍等，消

血消毒，治癩疔，結核，結氣腫，又利尿。

昆布 含碘質千分之三·五，昆布酸Alginsäure $C_{12}H_{16}O_{12}$ ，洋菜膠Galactan $C_{12}H_{18}COO H$ 甘露

蜜醇Mannit 鐵鈣鉍等質，治心臟病，利尿，清血消毒，治腫疔，結核氣腫，又利尿。

第十二章 祛暑之劑

三物香薷豆朴先 若云熱盛加黃連 或加荅草名五物 利濕祛暑木瓜宣

再加參耆與陳朮 兼治中傷十味全 二香合入香蘇飲 仍有藿薷香葛傳

四味香薷飲——治一切感冒暑氣。皮膚蒸熱，頭痛頭重。自汗肢倦。或煩渴。或吐瀉。香薷一錢

薑汁炒厚朴五分 扁豆五分炒 薑炒黃連三分 冷服。

黃連香薷飲——四味香薷飲除扁豆，治中暑熱盛，口渴心煩，或下鮮血。

三物香薷飲——四味香薷飲除黃連。治傷暑嘔逆吐瀉。

五物香薷飲——三物香薷飲，再加茯苓三錢，甘草五分，驅暑和中。

六味香薷飲——五物香薷飲，再加木瓜一錢，治中暑濕盛。

十味香薷飲——六味香薷飲，再加入參一錢，黃耆一錢，白朮一錢，陳皮一錢，治暑濕內傷，

吐利，身倦神昏。按三物香薷飲，加羌活一錢，防風三錢，治中暑，兼中風，假仆搦搐。或再加黃耆一錢，芍藥三錢。三物香薷飲，加乾葛一錢，名香薷葛根湯，治暑月傷風咳嗽。本方加茯苓。治瘧瘧。

二香散——四味香薷飲用香薷一錢，扁豆一錢，厚朴一錢，木瓜一錢，甘草五分，加香附一錢，陳皮一錢，蒼朮一錢，紫蘇一錢，治外感內傷，身熱腹脹。

范批：解暑除煩化濕清熱之劑。

清暑益氣參草薈 當歸麥味青陳皮 麴柏葛根蒼白朮 升麻澤瀉棗薑隨

清暑益氣湯——治長夏濕熱炎蒸。四肢困倦。精神減少。胸滿氣促。身熱心煩。口渴惡食。自汗身重。肢體疼痛。小便赤澀。大便澀黃。而脈虛者。黃耆一錢 人參三分 白朮炒三錢 蒼朮一錢 神麴三錢炒 青皮一錢麩炒 陳皮一錢留白 炙甘草五分 麥冬一錢 五味五分 酒炒當歸一錢 黃柏酒炒二錢 澤瀉二錢 升麻八分 葛根二錢 姜棗煎。

黃耆人參湯——清暑益氣湯，除青皮澤瀉乾葛，治暑傷元氣，長夏倦怠，胸滿自汗，時作頭痛。

補肝湯——清暑益氣湯，除白朮青皮麥冬五味，加茯苓三錢，豬苓三錢，柴胡一錢，防風三錢，羌活一錢，連翹一錢，知母一錢，治陰汗如水。陰冷如冰。脚痿無力。

范批：補氣強脾除濕解熱消食生津之劑。治感暑體傷脈虛不足。

縮脾飲用清暑氣 砂仁草葉烏梅暨 甘草葛根扁豆加 吐瀉煩渴溫脾胃

古人治暑多用溫 暑爲陰證此所謂 大順杏仁薑桂甘 散寒燥濕斯爲貴

縮脾飲——清暑氣，除煩渴，止吐瀉霍亂，及暑月酒食所傷 砂仁五分 草果一錢煨去皮 烏梅

錢甘草四分炙 扁豆一錢炒研 乾葛二錢

范批：清暑利氣滲濕健脾生津解渴之劑。

生脈麥味與人參 保肺清心治暑淫 氣行汗多兼口渴 病危脈絕急煎斟

生脈散——治熱傷元氣。氣短倦怠。口渴多汗。肺虛而咳。人參五分 麥冬五分 五味子七粒

五味子湯——生脈散，加陳皮一錢，甘草五分，如蒸餅爲丸，則名補氣丸。治肺虛少氣，咳嗽自汗

補氣湯——生脈散加黃耆一錢，甘草五分，桔梗五分。治體虛自汗，怔忡。

扶神湯——補氣散，再加扶神三錢，遠志一錢，木通一錢。治脈虛，咳則心痛，喉中介介或腫。

范批：補氣潤肺斂汗清熱之劑，治心臟衰弱之氣促喘咳症有效。

六一滑石同甘草 解肌行水兼清燥 統治表裏及三焦 熱渴暑煩瀉痢保

益元碧玉與鷄蘇 砂黛薄荷加之好

六一散——治傷寒中暑。表裏俱熱。煩躁口渴。小便不通。瀉痢熱瘧。霍亂吐瀉。下乳滑胎。解酒

食毒。治石淋。滑石六錢。甘草一錢爲末。每服三錢。冷水或燈心湯調下。中暑者，加硫黃一分。

益元散——六一散加辰砂一分。治中暑。

雞蘇散——六一散加薄荷三分。治中暑。

碧玉散——六一散加青黛五分，治中暑。

清六九——六一散加紅麴五錢，治赤痢。

溫六九——六一散加乾姜三錢，治白痢。

三生益元散——六一散加生柏葉三錢，生車前一錢，生藕節一錢，治血淋。加牛黃五分，治虛煩不

得眠。

茱萸六一散——六一散除甘草，加吳茱萸三錢，治濕熱吞酸。

黃耆六一散——六一散除滑石。加黃耆六錢，大棗煎熱服。治諸虛不足，盜汗消渴。

范批：清暑解熱利濕行水之劑。爲暑日常用方。宜於體盛濕多之人。反之則令津液耗劫也。

燈芯 含膠質 Aralon, 纖維質 Xylan, 功能解熱利尿。惟小便不禁者忌之。

硫黃 外用殺害寄生蟲，內服爲緩下劑，多服中毒而窒息。又此物能麻痺神經。不宜久服。

辰砂 乃湖南辰州之錦砂，又名硃砂，乃橘紅色之五硫化銻，因銻質極能鎮定背脊神經，故用以鎮

神鎮瘧。與銀朱斷然不同，銀朱乃硫化汞，又名丹砂，有毒，不可內服。今人頗多以辰砂爲丹砂，而謂其成分爲硫化汞，誤也。按銻質服大量令人嘔吐，小量能使脈搏弱遲，血壓減低，使不驚瘧，銻又能使呼吸進展，精神疲倦，而安眠，故治瘧變甚效。又使溫度減低，祛痰發汗，利尿。又辰砂頗多以假冒品代之，卽用代赭石與血竭配合，亦能安神，惟不及辰砂之巨。此物獨用，令人呆悶。現今藥肆中辰砂，皆硫化汞礦石。

紅麴 用粳米與麴母入酒釀，製成。含酒麴，能使胃中覺熱，胃汁增多，助消化，血液流通迅速，而神經麻痺。孕婦忌之，因易墮胎也。

牛黃 爲牛膽中生成。乃肝汁，膽汁，及腸之抗毒素，能使十二指腸之紊亂改善，通便秘，助腸胃之消化脂肪機器。又含鐵質。

范鳳源治暑天食後胸悶不舒，消化不良方——厚朴一錢 枳壳一錢 蘇梗一錢五分 陳皮一錢 神
麴三錢 佩蘭葉一錢五分 薏米三錢 猪苓三錢 赤苓三錢 澤瀉二錢 砂仁後下八分 荷梗一
尺 一劑愈。

范鳳源治夏月小兒滿身紅腫，小便短赤方——杏仁三錢 丹皮二錢 赤芍三錢——赤苓三錢 澤瀉
三錢 猪苓三錢 桂枝一錢 梗通五分 貝母三錢 白朮二錢 六一散三錢（包） 荷梗一尺。
三劑愈。

第十三章 利濕之劑

五苓散治太陽府

白朮澤瀉豬茯苓

膀胱化氣添官桂

利便消暑煩渴清

除桂名爲四苓散

無寒但渴服之靈

豬苓湯除桂與朮

加入阿膠滑石停

此爲利濕兼瀉熱

疸黃便閉渴嘔寧

五苓散——治傷寒外感。發汗後。大汗出。口中乾。煩躁不得眠。欲飲水者。少少與之。令胃氣和則愈。若脈浮，小便不利，微熱消渴者，此湯主之。及受風邪發熱，六七日不解，而煩，有表裏證。渴欲飲水，水入即吐，名曰水逆。及中寒痞滿，服瀉心湯不解，渴而煩躁，小便不利。通治諸濕腹滿。水飲水腫，嘔逆泄瀉，水寒肺濕或喘咳，中暑煩渴，身熱頭痛，膀胱積熱，便秘而渴，霍亂吐瀉，痰飲濕瘧，身痛身重。豬苓三錢 茯苓三錢 白朮三錢 澤瀉三錢 肉桂一錢 爲末。每服三錢。服後多飲熱水。汗出而愈。傷暑者，加硃砂二分，燈心一錢煎。

四苓散——五苓散去肉桂。治小便不利。

辰砂五苓散——五苓散加辰砂二分，並治小便不利。

蒼朮五苓散——五苓散加蒼朮一錢，治寒濕。

茵陳五苓散——五苓散加茵陳一錢，治濕熱發黃，便秘，煩渴。

元戎五苓散——五苓散加羌活一錢，治中焦積熱。

桂苓甘露飲——五苓散加石膏一錢，滑石二錢，寒水石三錢，以清六腑之熱。

豬苓散——五苓散去桂澤瀉，治嘔吐，病在膈上，思飲水者。

桂苓丸——五苓散單用肉桂茯苓等分蜜丸，治胃暑煩渴，引飲過多，腹脹便赤。

澤瀉湯——五苓散單用澤瀉五兩，白朮二兩，治心下支飲。常苦眩暈。

茯苓白朮湯——五苓散單用茯苓白朮等分，治脾虛不能制水，濕盛泄瀉。

白茯苓湯——茯苓白朮湯再加郁李仁一錢，入姜汁服。治水腫。本方加川楝子一錢，治水疝。

春澤湯——五苓散加入參一錢，再加甘草一錢亦名春澤湯。治無病而渴，與病瘥後渴者。

二朮四苓湯——五苓散去桂，加蒼朮一錢，甘草一錢，芍藥二錢，梔子三錢，黃芩三錢，羌活一錢。
。通治表裏濕邪，兼清暑熱。本方倍桂，加黃耆一錢，治傷暑，大汗不止。

陶節庵導赤散——五苓散加甘草一錢，滑石三錢，梔子三錢，入食鹽少許燈草一束煎，治熱畜膀胱，便祕而渴。如中濕發黃，加茵陳一錢。治結胸，加木通一錢，本方合益元散，治諸濕淋漓。

茯苓琥珀湯——五苓散再加琥珀五分，治小便數而欠。

胃苓湯——五苓散合平胃散，一名對金飲子，治中暑傷濕，停飲夾食，腹痛泄瀉，及口渴便秘。

齋苓湯——五苓散合黃連香薷飲，治傷暑泄瀉。

柴苓湯——五苓散合小柴胡湯，治發熱泄瀉，口渴，瘧疾，熱多寒少，口燥心煩。

姜棗五苓散——張仲景用本方。治髮白，及禿落。朮三錢 桂一錢 茯苓三錢 豬苓三錢，澤瀉三錢。並加姜棗煎。

范批：五苓散，健脾除濕解表寬中止渴利尿之劑。

寒水石 卽方解石，乃結晶性碳酸鈣或硫酸鈣，此物內服功能利尿，溶化尿酸。

郁李仁 含揮發油，及氫基配糖體 Cyanogenglycoside，功能利尿，治水腫。

小半夏加茯苓湯 行水消痞有生薑 加桂除夏治悸厥 茯苓甘草湯名彰

小半夏加茯苓湯——治卒嘔吐。心下痞滿。間有水眩悸。半夏一錢 茯苓三錢 生姜五分 本方除茯苓。名小半夏湯，治支飲，嘔吐不渴，亦治黃疸。

大半夏湯——小半夏加茯苓湯，除茯苓生薑。加人參一錢，白蜜少許。少許。治反胃。食入即吐。

范批：和胃止嘔利尿除濕之劑。治胸腹痞悶嘔噎類作甚效。

腎著湯內用乾薑 茯苓甘草白朮襄 傷濕身痛與腰冷 亦名甘薑苓朮湯

黃耆防己除薑茯苓 朮甘薑棗共煎嘗 此治風水與諸濕 身重汗出服之良

腎著湯——治傷濕。身重腹痛。腰冷不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。滯於小便，上爲清涕

。泡乾姜一錢 茯苓四錢 炙甘草一錢 炒白朮二錢 有寒者加附子一錢。經心錄加肉桂五分，澤瀉一錢，杜仲一錢，牛膝一錢。治同。

范批：和胃健脾燥濕利水之劑。

舟車牽牛及大黃 遂戟芫花楛木香 青皮橘皮加輕粉 燥實陽水却相當

舟車丸——治水腫水脹。形氣俱實。黑牽牛四兩炒 大黃二兩酒浸 甘遂麩裏煨一兩 大戟麩裏煨

一兩 芫花醋炒一兩 青皮炒一兩 橘紅一兩 木香五錢 輕粉一錢 水丸。每服一錢至三錢。

瀝川散——舟車丸減芫花大戟青皮陳皮木香，加芒硝三錢，郁李仁三錢，姜湯下五分。治同。

范此：利水行氣燥濕運脾，爲治水腫之厲劑。非體元充實，則不可妄投。

黑牽牛 又名黑丑，含「牽牛素」配糖體 Phorbilin 有瀉下作用。

甘遂 乃有毒植物，含毒性苦味質，及揮發油及有機鹼，功能利尿，爲水腫藥。古人云：不宜用於

脾胃衰弱之人。

大戟 亦有毒植物。含大戟素 Euphorbin 與膠質及一種有機鹼，通便甚良，治月經不順效。古人

云：過量則孕婦墮胎。不宜濫用。

芫花 乃有毒植物。含「芫花醇」Sitosterol $C_{27}H_{46}O$ ，芫花黃色結晶物 Genkwamin，「鴨兒芹

香精」Apigenin $C_{15}H_{10}O_5$ ，安息香酸，及刺激性油狀物，功能利尿祛痰。體弱者不可用。

〔輕粉〕 乃氯化汞之結晶物，外用殺菌，內服爲瀉藥，利膈，多服中毒。能使貧血，流涎。最大劑量

爲八厘。普通劑量四厘，多則中毒。然製藥或有不純，則誤服喪命。

疏鑿檳榔及商陸 苓皮大腹同椒目 赤豆芫羌瀉木通 煎益薑皮陽水服

疏鑿飲子——治偏身水腫。喘呼口渴。大小便秘。羌活 秦艽 檳榔 大腹皮 茯苓皮 椒目 木通 澤瀉 陸商 赤小豆 等分。每服二錢。加姜皮煎。

范批：治水濕泛濫，一身盡腫，亦係利水行氣燥濕之厲劑也。

〔商陸〕 含「植物膠毒素」Phytolaccatoxin $C_{21}H_{32}O_9$ 及多量硝酸鉀 Kaliumnitrat KNO_3 ，故爲利尿藥。

實脾苓朮與木瓜 甘草木香大腹加 荳蔻附薑兼厚朴 虛寒陰水效堪誇

實脾飲——治肢體浮腫，色悴聲短，口中不渴，二便通利。白朮土炒二錢 茯苓二錢 炙甘草五分 厚朴姜炒一錢 大腹皮一錢 草荳蔻一錢 木香一錢 木瓜一錢 附子一錢 黑姜一錢 棗三枚

范批：此方與舟車丸疎鑿飲子二方，適相反背。治偏虛之遍體浮腫症，設令妄投行水破氣腐劑

則多致不救。

五皮飲用五般皮 陳茯薑桑大腹奇 或用五加易桑白 脾虛膚脹方此司

五皮飲——治水病。腫滿上氣。喘急。或腰以下腫。五加皮三錢 地骨皮三錢 茯苓皮三錢 大腹

皮一錢 生薑皮一錢 一方五加皮易陳皮。有人五加皮易桑白皮。治病後脾肺氣虛，而致脹滿。

范批：利水散寒健脾滲濕之劑，治肢腹皮下腫浮有效。

羌活勝濕羌獨芎 甘蔓藜本與防風 濕氣在表頭腰重 發汗升陽有異功

風能勝濕升能降 不與行水滲濕同 若除獨活芎蔓草 除濕升麻蒼朮充

羌活勝濕湯——治濕氣在表。頭痛頭重。或腰脊重痛。或一身盡痛。微熱昏倦。羌活 獨活各一錢

川芎 藜本 防風 甘草各五分 薑荊子三分 如身重，腰中沉沉然，中有寒濕也，加酒洗防己

二錢，附子一錢。

羌活除濕湯——治風濕相搏，一身盡痛。前方除獨活蔓荊川芎甘草。加升麻一錢蒼朮一錢。

升陽除濕湯——羌活勝濕湯除川芎。加黃耆一錢，當歸一錢，蒼朮一錢，升麻五分，治水疝腫大，

陰汗不絕。再加麥芽二錢，神麴三錢、豬苓三錢，澤瀉三錢。除當歸黃耆，亦名升陽除濕湯，治脾虛瀉痢。

范批：發表散風除濕止痛之劑。

大橘皮湯治濕熱 五苓六一二方綴 陳皮木香檳榔增 能消水及腫瀉泄

大橘皮湯——治濕熱內攻，心腹脹滿，小便不利，大便滑瀉，及水腫等症。滑石 甘草各一錢 赤

茯苓一錢 豬苓 澤瀉 土炒白朮 桂各五分 陳皮一錢半 木香 檳榔各三分 加姜煎。每服

五錢。

范批：健脾和胃利濕之劑。爲六一散五苓散再參調氣之合方。

茵陳蒿湯治疸黃 陰陽寒熱細推詳 陽黃大黃梔子入 陰黃附子與乾薑

亦有不用茵陳者 仲景柏皮梔子湯

茵陳蒿湯——治傷寒，但頭汗出，腹滿口渴，二便不利，濕熱發黃，脈沉實者。茵陳三錢 大黃三

錢酒浸 梔子七枚炒。

茵陳三物湯——茵陳湯，大黃易黃連一錢，治同。

茵陳將軍湯——茵陳湯加厚朴一錢，枳實一錢，黃芩三錢，甘草五分，入生姜一片，燈草一束煎，

治同。本方去梔子大黃，加附子一錢，乾姜一錢，治寒濕陰黃。

范批：清熱除濕通利二便之劑。治陽黃頗效。治陰黃疽，須用茵陳附子肉桂乾薑之屬，蓋茵陳

爲治黃疽之君藥，詳證分別其佐使之藥餌可也。

八正木通與車前 扁蓄大黃滑石研 草梢瞿麥兼梔子 煎加燈草痛淋濁

八正散——治濕熱下注。咽乾口渴。少腹急滿。小便不通。或淋痛尿血。或因熱爲腫。車前子三錢

包 木通一錢 瞿麥一錢 扁蓄一錢 滑石三錢 甘草梢一錢 梔子三錢炒黑 大黃三錢 加燈

草一束煎。一方加木香一錢。

范批 利濕洩熱之劑。治濕熱下注，小便淋濁。

車前子 含配糖體，如「桃葉珊瑚鹼」 $\text{Aucubin C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_{10}$ 「車前子鹼」 $\text{Plantagin C}_6\text{H}_8\text{O}_5$ ，又含

琥珀酸，「車前子酸」 Plantenolsäure 故能鎮咳，使分泌神經亢奮，增加氣管枝之粘液，增加

消化液之分泌，并能殺菌，故利尿治淋止瀉鎮咳効。

罌粟 含有揮發油，其主要成分爲立體烯醛類 Stearoptene $C_{27}H_{46}$ ，醋酸桂皮脂 Cinnamylacetat,

醋酸檸檬脂 Citronellylacetat. 功能利尿，治淋疾水腫，又能通經，多量則孕婦常致流產。

扁蓄 含氧蔥屬配糖體 Oxyanthrachinonglycosid, 治黃疸，腹痛，霍亂，又能利尿驅小兒腹蟲

，女子陰癬及痔瘡。

甘草梢 含甘草酸 Glycyrrhizin $C_{42}H_{62}O_{16}$ 蔗糖，林醇酸，粘液等，功能緩下，鎮咳，利尿。

萹藤分清石菖蒲 草梢烏藥益智俱 或益茯苓鹽煎服 通心回腎濁精驅

縮泉益智同烏藥 山藥糊丸便數需

萹藤分清飲——治白濁。小便頻數。漩白如油。名曰膏淋。川萹藤二錢 石菖蒲一錢 烏藥一錢

益智仁一錢 甘草梢五分 入食鹽煎服。一方加茯苓。

范批：滲濕清熱利尿止濁之劑。治日久淋濁之慢性淋濁症有效。

縮泉丸——治小便數而欠。烏藥三錢。益智仁三錢。山藥糊丸。

當歸拈痛羌防升 猪澤茵陳苓葛朋 二朮苦參知母草 瘍瘡濕熱服皆應

當歸拈痛湯——治濕熱相搏。肢節煩痛。肩背沉重。或偏身疼痛。或脚氣腫痛。脚膝生瘡。膿水不絕。及濕熱發黃。脈沉實緊數動滑者。茵陳一錢酒炒 羌活一錢 防風三錢 升麻八分 葛根三錢 蒼朮一錢 白朮三錢 炙甘草五分 酒炒黃芩三錢 酒炒苦參一錢 酒炒知母一錢五分 當歸一錢 豬苓一錢 澤瀉三錢 空心服。一方加入參一錢。

范批：散風除濕健脾利尿之劑。

范鳳源右脇氣痛方——枳殼一錢 桂心五分 桔梗一錢 生薑二片 鬱金一兩 炙甘草五分 陳皮一錢 大棗三枚 十劑愈。飲食須謹慎。亦治肺病前期淋巴腺，痛胃氣痛。

范鳳源左脇痛方——柴胡一錢 陳皮一錢半 川芎一錢 赤芍一錢 枳殼一錢 醋香附一錢 炙甘草五分 大瓜蒌三錢 紅花七分 七劑愈。亦治感冒胸部淋巴腺痛。

第十四章 潤燥之劑

炙甘草湯——治傷寒，衰不能相續。心動悸。及肺痿，咳唾多。心中溫溫液液者。又用治呃逆。甘

草五分，生薑五分 桂枝一錢 人參一錢 蛤粉炒阿膠二錢 生地黃三錢 麥冬去心一錢 麻仁

一錢研 大棗十二枚 水酒各半煎。納阿膠烱化服。

范批：補血強心生津潤燥之劑。

麻仁 含脂肪油百分之四十五至五十五，即胡麻仁油，功能潤腸。婦人白帶，男子滑精，均忌之。

滋燥養榮兩地黃 芩甘歸芍及芎防 爪枯膚燥兼風祕 火燠金傷血液亡

滋燥養榮湯——治肺燥。血少風燥。皮膚皴揭。筋急爪枯。或大便乾秘。酒洗當歸一錢 生地黃

熟地黃 炒芍藥 酒洗黃芩 秦朮各一錢 防風 甘草各五分

范批：養血平肝滋潤退熱之劑。

活血潤燥生津飲 一二冬熟地兼括萋 桃仁紅花及歸芍 利便通幽善澤枯

活血潤燥生津湯——治內燥，津液枯少，當歸 白芍 熟地黃各一錢 天冬 麥冬 括萋八分 桃

仁 紅花各五分

范批：滋陰活血潤腸之劑

菲汁牛乳反胃滋 養榮散瘀潤腸奇 五汁安中蓋梨藕 三般加入用隨宜

菲汁牛乳飲——治胃脘有死血。乾燥枯槁。食下作痛。翻胃便秘。菲菜汁 牛乳 等分。時時呷之

。有痰阻者，加姜汁。本方去牛乳，加陳酒，治血膈。

范批：大便秘結反胃膈噎之症宜之。兼服四物湯尤佳。

牛乳 含乳糖及胰液 Pancreatic Juice 與脂肪質，又含乙種丙種己種維他命 Vitamin B、C、F 及鈣

質，磷質，助消化，滋養有功。

甘蔗汁 含糖汁，鉀質，枸橼酸，乳酸，果酸，葡萄糖，能使鈣質溶化入血。

陳酒 含酒精成分，能使胃之消化汁增加，幫助消化機能。凡有癆腫，不宜服之。

葶藶 含肥皂草素及配糖體與有機鹼，功能解毒又祛痰。古人云：多食令人患腳氣。孕婦忌之。肺

炎咳嗽均忌之。

蘆根 含天冬素，止嘔鎮吐。

白茅根 含砂糖，蛋白質，功能利尿，治吐血，衄血，又爲止血藥。

潤腸丸用歸尾羌 桃仁麻仁及大黃 或加羌防皂角子 風祕血祕善通腸

潤腸丸——治腸胃有積。大便秘滿。全不思食。大黃 歸尾 羌活各五錢 桃仁研 大麻仁去殼各

一兩 蜜丸。一方有防風三錢。風濕加秦朮一錢，皂角子一錢。

活血潤燥丸——潤腸丸加防風三錢皂角仁一錢，蜜丸，治同。

潤燥湯——潤腸丸去羌活，加升麻五分，紅花一錢，生熟二地各一錢，治同。

枳實潤腸丸——大黃煨熟一錢，當歸酒浸一錢，枳實炒一錢，等分蜜丸，治痔病肛門燥澀。

范批：活血潤腸之劑

通幽湯中二地俱 桃仁紅花歸草濡 升麻升清以降濁 噎塞便閉此方需

有加麻仁大黃者 當歸潤腸湯名殊

通幽湯——治幽門不通。上攻毀門。噎塞不開。氣不得下。大便艱難。名曰下脘不通。治在幽門。

當歸身 升麻 桃仁研 紅花 炙甘草各一錢 生地黃 熟地黃各五分 或加檳榔末五分。

當歸潤腸湯——通幽湯加大黃一錢，麻仁一錢，治同。

范批：養血潤燥通降之劑。治胸脘噎塞，大便秘結甚效。

搜風順氣大黃蒸 郁李麻仁山藥增 防獨車前及檳枳 兔絲牛膝山茱仍

中風風祕及氣祕 腸風下血總堪憑

搜風順氣丸——治中風。便溺阻隔。偏身虛痿。脈來浮數。亦治腸風下血。中風癱瘓。大黃五兩九

蒸九曬 大麻仁 郁李仁去皮 山藥酒蒸 山茱肉 車前子 牛膝酒蒸各二兩 菟絲子酒洗 獨

活 防風 檳榔 枳殼麸炒各一兩 蜜丸。每服三錢。

范批：潤燥通便，搜風順氣，平補脾胃之混雜劑。

菟絲子 含菟絲子樹脂樣配糖體 Cuscutin Glycosid，乃強壯又強精藥。

消渴方中花粉連 藕汁地汁牛乳研 或加葶蜜爲膏服 瀉火生津益血瘡

消渴方——治渴證。胃熱。善消水穀。黃連一錢 天花粉三錢 生地汁三錢 藕汁三錢 牛乳三錢

將黃連花粉爲末，調服。或加姜汁蜂蜜爲膏，噉食。

范批：潤燥除熱生津止渴之營養良劑，

白茯苓治腎消 花粉黃連革薺調 二參熟地覆盆子 石斛蛇床鹿脂要

白茯苓丸——治腎消。兩腿漸細。腰脚無力。茯苓 黃連 花粉 革薺 熟地黃 覆盆子 人參

玄參各一兩 石斛 蛇床子各七錢五分 雞蹠脰三十具 蜜丸每服三錢 磁石一兩煎湯送下。

范批：此劑功能清肺胃之鬱熱。滋補肝腎之不足。兼能分利膀胱小腸之濕熱而止洩數。

覆盆子 含林檎酸，配糖體，揮發油與糖分，規那酸 China Sature $C_6H_7(OH_4)$ —— $COOH$ 。爲收

斂性滋養劑。

蛇床子 含精油百分之一·三，爲左旋性「二環萜」L-Piper，右旋性「樟腦」L-Kamphen 及異性

植草酸龍腦脂 Izovalerianyl bornylester 故爲陰痿藥，又爲婦人陰腫藥，更是強壯藥。

雞臍豆 又名雞內金，乃鷄胃臟，含有一種胃激素，又名胃荷爾蒙，(Ventriculin) 及丙種維太

命，故功能消食積，治疳疾，療反胃，能中和腸中鹼液，故止泄治痢。

磁石 含鐵質，功能補血，鎮神。

豬腎薺萐參茯神 知芩葛草石膏因 磁石天花同黑豆 強中消渴此地珍

豬腎薺萐湯——治腎虧早洩，濕火下注淋濁。心中懸蕩。豬腎一具 大豆一升 薺萐 人參 石膏

各三兩。磁石綿裹茯神 知母 黃芩 葛根 甘草 花粉各二兩。先煮豆腎去滓。以藥分三服。

范世寧心安神補腎清熱之混合劑。治腎虧心悸不寧，濕熱下注而小溲淋濁日久不愈者。

豬腎 含腎旁腺精 Epinephrine 及維他命等 Vitamin A, B, C, F, K. 功能補身。

黑豆 含蛋白質，配糖體，有機酸，膠質，磷質及維他命 K，功能利尿消腫。

地黃飲子參耆草 二地二冬枳斛參 澤瀉枳實疏 一府 躁煩消渴血枯含

地黃飲子——治消渴煩躁。咽乾面赤。人參 蜜炙黃耆 炙甘草 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬

蜜炙枇杷葉 石斛 澤瀉 枳殼麩炒 等分。每服三錢。

范批：潤肺養津止渴利尿之劑。此方治虛人胃有鬱熱肺傷喘咳症。

酥蜜膏酒用飴糖 二汁百部及生薑 杏棗補脾兼潤肺 聲嘶氣憊酒溫嘗

酥蜜糖膏——酥蜜 飴糖 棗肉 杏仁 細研 百部汁 生薑汁 共煎一炊。久如膏。溫酒細細嚥下。服之潤肺。

范批：潤肺止咳和養之劑。治久咳不愈，音聲低賦，心中嘈懊有效。

〔飴糖〕 含糖質 Maltose，對於身體衰弱而有微薄消化力者，為極有價值之食品，能人身為脂肪質。

古人云：胃炎腎臟炎不宜用之。

〔百部〕 含「甲種百部鹼」Stemonin $C_{17}H_{21}NO_2$ 、乙種百部鹼 Stemonidin Stemonidin 及「百部根

素」Hodorin $C_{16}H_{25}NO_2$ ，有機鹼，能使呼吸中樞之興奮性減退，功能鎮咳，外用殺皮膚寄生蟲，該物古來盛稱其效力，但按之動物實驗，其生理作用微弱，功效亦小。

清燥二朮與黃耆 參苓連柏草陳皮 豬澤升柴五味麩 麥冬歸地痿方推

清燥湯——治肺受濕熱之邪。痿蹙喘促。胸滿少食。色白毛敗。頭眩體重。身痛肢倦。口渴便秘。
黃耆一錢半 蒼朮炒一錢 白朮炒 陳皮 澤瀉各五分 人參 茯苓 升麻各三分 當歸酒洗
生地黃 麥冬 甘草炙 神麴炒 黃柏酒洗 豬苓各二分 柴胡 黃連各一分炒 五味子九粒。
每服五錢。

范批：補肺健脾利水退熱之劑。

范鳳源治糖尿病方——古稱腎消。蚌肉水搗出，在飯鍋溫服。病漸消失而愈。此吾范氏秘方也。

范鳳源治風濕絆痛方——老年人腿上肌肉作痛，覺如絆帶束縛，以大蒜十枚和白糖煮食，痛即止。

數次全愈。此亦吾范氏奇方也。

范氏五苓四物湯——豬苓三錢 茯苓三錢 澤瀉三錢 細生地二錢 赤芍一錢半 丹皮一錢半 黃柏三錢 知母一錢半 黃芩二錢 苡米仁五錢 治流火丹毒，鏈球菌，葡萄菌

第十五章 瀉火之劑

黃連解毒湯四味 黃柏黃芩梔子備 躁狂大熱嘔不眠 吐衄斑黃均可使

若云三黃石膏湯 再加麻黃及淡鼓 此爲傷寒溫毒盛 三焦表裏相兼治

梔子金花加大黃 潤腸瀉熱真堪倚

黃連解毒湯——治一切內熱。表裏俱盛。狂躁煩心。口燥咽乾。大熱乾嘔。錯語不眠。吐血衄血。

熱甚發斑。黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分，每服三錢。

柏皮湯——黃連解毒湯去梔子，治三焦實熱。用粥丸，名三補丸，治三焦有火，噎燥喉乾，二便閉結，及濕痰夜熱。

梔子柏皮湯——黃連解毒湯去芩連，加甘草一錢，治傷寒發黃，身熱。

三黃瀉心湯——黃連解毒湯去黃柏梔子，加酒浸大黃一錢，治心下痞熱，心氣不足，吐血衄血。

三黃丸——黃連解毒湯中大黃用酒蒸曬九次，蜜丸，治三焦積熱，頭項腫痛，目赤口疳，心膈煩燥，大便閉結，小便赤澀，及消渴羸瘦。

三黃石膏湯——黃連解毒湯加石膏三錢，淡豉三錢，麻黃一錢。治傷寒煩熱。

三黃金花丸——黃連解毒湯，水丸，治中外諸熱，癧汗咬牙，夢語驚悸，吐衄淋秘，勞嗽骨蒸。

梔子金花丸——黃連解毒湯加大黃一錢。治同。

大金花丸——黃連解毒湯去梔子，加大黃一錢，治略同。

范批：清血消炎解毒之劑。治腸胃鬱熱。狂燥煩懊。甚至血溢或膚透斑疹有特效。

附子瀉心用三黃 寒加熱藥以維陽 痞乃熱邪寒藥治 惡寒加附始相當

大黃附子湯同意 溫藥下之妙異常

附子瀉心湯——治傷寒心下痞。而復惡寒汗出者。大黃三錢 黃連一錢 黃芩二錢 附子一枚炮去皮破剝煮取汁。本方去附子，名三黃瀉心湯，再去黃芩，名大黃黃連瀉心湯，治傷寒心下痞，按之濡。圍上脈浮。

范批：利水消痰之劑。方中所以加附子者，乃溫護之義，瀉中寓補，斯爲妙方。

半夏瀉心黃連芩 乾薑甘草與人參 大棗利之治虛痞 法在降陽而和陰

半夏瀉心湯——治傷寒。下之早。胸滿而不痛者。爲痞。身寒而嘔。飲食不下。半夏一錢五分 黃

連五分 黃芩三錢 炙甘草五分 人參三分 乾姜一錢 大棗十二枚。

甘草瀉心湯——半夏瀉心湯除人參，再加甘草一錢，治傷寒中風。醫反下之，下利穀不化，腹中雷鳴，心下痞鞭而滿，乾嘔心煩，醫復下之，其痞益甚。

生薑瀉心湯——半夏瀉心湯加生薑二錢，治汗解後，胃中不和，心中痞鞭，乾噎，食臭，完穀不化，腸下有水氣，腹中雷鳴，下利。

枳實消痞丸——半夏瀉心湯除黃芩大棗，加枳實一錢，厚朴一錢，麥芽一錢，白朮一錢，茯苓三錢，蒸餅糊丸。

范批：和胃止嘔健脾消痞之劑。

白虎湯用石膏煨 知母甘草粳米陪 亦有加入人參者 躁煩熱渴舌生胎

白虎湯——治傷寒脈浮滑。表有熱。裏有寒。及身熱惡寒，足冷項強，頭熱而腫，目赤頭搖，口噤背反張。脈浮大。腹滿身重。難以轉側。口不仁。而面垢。譫語遺尿。發汗則譫語。下之則頭上生汗。手足逆冷。自汗出者。又胃腸病，脈洪大而長。不惡寒。反惡熱。頭痛自汗。口渴。舌胎。目痛鼻乾。不得臥。心煩燥亂。日晡潮熱。或陽毒發斑。胃熱諸病。石膏五錢 知母一錢 甘草五分 粳米三錢 先煮石膏數十沸。再投藥米。米熟湯成。溫服。

人參白虎湯——白虎湯加人參一錢，治傷寒渴欲飲水，無表證者。亦治傷寒無大熱，口燥渴，心煩，背微惡寒者。亦治身熱汗出惡寒，足冷，脈微而渴。亦治火傷肺胃，傳為膈消。

白虎加蒼朮湯——白虎湯加蒼朮一錢，治濕溫，脈沉細者。

桂枝白虎湯——白虎湯加桂枝一錢，治溫瘧，但熱無寒，骨節疼痛，時嘔。

柴胡石膏湯——白虎湯加柴胡一錢、黃芩一錢、半夏一錢，治暑嗽喘渴。

化斑湯——白虎湯加人參一錢，除粳米，治胃熱發斑，脈虛者。

范批：清肺胃之熱，養耗劫之津液，為消炎和養之合劑。

粳米 含澱粉，蛋白質，砂糖，乙種維他命，與「非丁」(Panit)及鈣質，爲神經營養劑。

竹葉石膏湯人參 麥冬半夏與同林 甘草生薑兼粳米 暑煩熱渴脈虛尋

竹葉石膏湯——治傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐。亦治傷暑發渴脈虛。竹葉七片 石膏五錢 人

參三分 炙甘草五分 麥冬一錢 半夏一錢 粳米一錢 加薑煎。又方。竹葉一錢，石膏一錢，

木通一錢，薄荷五分，桔梗五分，甘草五分，亦名竹葉石膏湯。治胃實火盛而作渴。

范批：補肺和胃利水退熱之劑。有益氣生津豁痰止嘔之功。

升陽散火葛升柴 羌獨防風參芍儕 生炙一草加薑棗 陽經火鬱發之佳

升陽散火湯——治肌熱表熱。四肢發熱。骨髓中熱。熱如火燎。捫之烙手。此病多因血少得之。及

胃弱。過食冷物。柴胡八分 防風二錢五分 葛根三錢 升麻八分 羌活一錢 獨活一錢 人參

三分 白芍三錢 炙甘草三分 生甘草二分 每服五錢。加薑棗煎。

火鬱湯——升陽散火湯，除人參獨活，加葱白三枚，治同。

陶節庵升陽散火湯——治傷寒，又手冒心。尋衣摸牀。譫語昏沉。不省人事。人參一錢，白朮一錢

，茯神一錢，甘草五分，陳皮一錢，麥冬一錢，當歸一錢，柴胡五分，芍藥三錢，黃芩三錢，加生薑一片，棗三枚，金器煎。

范批：表散發汗解熱之劑。治虛人熱鬱於裏不得外達。

金器

古代謂其能鎮神，而最近醫學以其製作注射劑，以殺肺癆菌，謂治初期肺癆有效。又按實驗，金與白金之可溶性鹽類，對於人之毛細管有麻痺作用，令血壓沉降，而內臟神經分布區域之毛細血管亦往往變麻痺而起下痢，或腎臟出血。

涼膈硝黃梔子翹 黃芩甘草薄荷饒 竹葉蜜煎療膈上 中焦燥實服之消

涼膈散——治心火上盛。中焦燥實。煩燥口渴。目赤頭眩。口疔唇裂。吐血衄血。大小便秘。諸風癩癧。胃熱發斑。發狂。及小兒急驚。痘疹黑陷。連翹四錢 大黃酒浸 芒硝 甘草各二錢 梔子炒黑 黃芩酒炒 薄荷一錢爲末。每服三錢。加竹葉一錢，生蜜少許煎。

范批：除熱通便之劑。

清心蓮子石蓮參 地骨柴胡赤茯苓 瞿草麥冬車前子 躁煩消渴及崩淋

蓮子清心飲——治憂思抑鬱。發熱煩躁。或酒食過度。口苦咽乾。漸成消渴。遺精淋濁。遇勞即發。四肢倦怠。五心煩熱。夜靜晝甚。及女人崩帶。石蓮肉 人參 黃耆 茯苓 柴胡各三錢 炒黃芩 地骨皮 麥冬 車前子 炙甘草各二錢 空心服。每服三錢

范批：利濕清熱滋補合劑。治淋濁淋帶及應勞發熱甚效。

甘露兩地與茵陳 苓枳枇杷石斛倫 甘草二冬平胃熱 桂苓犀角可加均

甘露飲——治胃中濕熱。口臭喉疔。齒齦宣露。及吐衄齒血。生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 等分。每服五錢。

桂苓甘露飲——甘露飲，加肉桂一錢，黃芩二錢。本事方加犀角。劉河間桂苓甘露飲：滑石四錢，石膏二錢，寒水石二錢，甘草各二錢，白朮茯苓澤瀉各一兩。豬苓肉桂各五錢。每服五錢。治中暑受濕。引飲過多。頭痛煩渴。濕熱便秘。張子和去豬苓；減三石爲一半，加人參乾葛各一錢。藿香五分。木香三分。每服三錢，亦名桂苓甘露飲，治伏暑類渴，脈虛水逆。

范批：清理腸胃濕熱之劑。又治小溲涸滴不利。

清胃散用升麻連 當歸生地牡丹全 或益石膏平胃熱 口瘡吐衄及牙宣

清胃散——治胃有積熱。上下牙痛。牽引頭腦。滿面發熱。其牙喜寒惡熱。或牙齦潰爛。或牙宣出血。

或唇口頰腮腫痛。生地黃一錢 牡丹皮一錢 黃連五分 當歸一錢 升麻八分 一方加石膏三錢

范批：涼血瀉火之劑，治牙出血，頰腮腫痛効。

瀉黃甘草與防風 石膏梔子藿香充 炒香蜜酒調和服 胃熱口瘡並見功

瀉黃散——治脾胃積食。口燥唇乾。口瘡口臭。頰渴易飢。熱在肌肉。防風四錢 藿香七分 山梔

一錢炒黑 石膏五分 甘草二分 右末。微炒。香蜜酒調服三錢。

范批：暑天瀉胃之劑

錢乙瀉黃升防芷 芩夏石斛同甘枳 亦治胃熱及口瘡 火鬱發之斯爲美

錢乙瀉黃散——白芷 防風 升麻 枳殼 黃芩各錢半 石斛一錢二分 半夏一錢 甘草七分。治

同前證。或唇口皸爛燥裂，

范批：瀉胃退熱利水之劑，治唇燥舌裂甚効。

瀉白桑皮地骨皮 甘草粳米四般宜 參茯知苓皆可入 肺炎喘嗽此方施

瀉白散——治肺熱。皮膚蒸熱。洒淅寒熱，日晡尤甚。喘嗽氣急。桑白皮 地骨皮一錢 甘草五分
粳米百粒 一方加黃連一錢。

加減瀉白散——瀉白散加人參一錢，五味五分，茯苓三錢，陳皮一錢，青皮一錢，治欬嗽，喘急，嘔吐。又瀉白散加知母一錢，黃芩二錢，桔梗一錢，青皮一錢，陳皮一錢，亦名加減瀉白散，治欬而氣喘，煩熱口渴，胸膈不利。又瀉白散除甘草粳米，加黃芩三錢，知母一錢，麥冬一錢，五味五分，桔梗一錢，治過飲傷肺，出腥臭，唾涕稠黏，咽喉不利，口苦乾氣。

范批：利胃清肺止欬除熱之劑，瀉白散，治蒸熱效。加減瀉白散，治肺炎効。

瀉青丸用龍膽梔 下行瀉火大黃資 羌防升上芎歸潤 火鬱肝經用此宜

瀉青丸——治肝火鬱熱。不能安臥。多驚多怒。筋痿不起。目赤腫痛。龍胆草 山梔炒黑 大黃酒

蒸 川芎 當歸酒洗 羌活 防風 等分。蜜丸。竹葉湯下三錢。

范批：治肝經鬱物，煩躁易怒，目赤腫痛有效。爲瀉肝之劑也。

龍膽瀉肝梔芩柴 生地車前澤瀉偕 木通甘草當歸合 肝經濕熱力能排

龍胆瀉肝湯——治肝胆經實火。濕熱。脇痛耳聾。胆溢口苦。筋痿陰汗。陰腫陰痛。白濁溲血。龍

胆草酒炒 黃芩炒 梔子酒炒 澤瀉 木通 車前子 當歸酒洗 生地黃酒炒 柴胡 甘草生用

各一錢，東垣無黃芩梔子甘草，亦名龍胆瀉肝湯，治前陰熱痒臊臭。一方除當歸生地木通澤瀉車前，加人參一錢，五味五分，天冬一錢，麥冬一錢，黃連五分，知母一錢，亦名龍胆瀉肝湯。治筋痿變急。口苦爪枯。亦治前證。

范批：洩肺胃肝胆之鬱熱。利小腸膀胱之濕熱，為瀉火利濕之劑，治蒸腫而痛，小洩溲血淋濁等症。

當歸龍薈用四黃 龍膽蘆薈木麝香 黑梔青黛薑湯下 一切肝火盡能攘

當歸龍薈丸——治一切肝胆之火。神志不甯。驚悸搖擗。躁擾狂越。頭暈目眩。耳鳴耳聾。胸膈痞塞。咽嗑不利。腸胃燥澀。兩脇痛引小腹。肝移熱於肺而欬嗽。亦治盜汗。當歸酒洗 龍胆草酒洗 梔子炒黑 黃連炒 黃柏炒 黃芩炒各一兩 大黃酒浸 青黛水飛 蘆薈各五錢 木香二錢

麝香五分 蜜九薑湯下三錢

范批：瀉肝火之緩下劑

蘆薈 含蘆薈潤腸素 Aloe emodin 乃下劑與通經劑。

左金茱連六一丸 肝經火鬱吐吞酸 再加芍藥名戊己 熱瀉熱痢服之安

連附六一治胃痛 寒因熱用理一般

左金丸——治肝火燥盛。左脇作痛。吞酸吐酸。筋疝痞結。亦治噤口痢。湯藥入口卽吐 黃連六錢

薑汁炒 吳茱萸一錢鹽水泡 水丸。每服一錢。

茱連丸——左金丸加炒芥三錢，蒼朮一錢，陳皮一錢，治同。

戊己丸——左金丸加芍藥一錢等分爲丸，治熱痢熱瀉。

連附六一湯——左金丸除吳茱萸，加附子一錢，治胃脘痛。

范批：清火平肝之劑。治胸脘塞窒，嘔吐酸涎有效。

導赤生地與木通 草梢竹葉四般攻 口糜淋痛小腸火 引熱同歸小便中

導赤散——治便赤淋痛。而赤狂躁。口糜舌瘡。咬牙口渴。生地黃 木通 甘草梢 淡竹葉 等分 各一錢煎。

范批：利水消炎涼血止痛之劑。治小溲淋漓不暢，莖中作痛，

清骨散用銀柴胡 胡連秦艽鼈甲符 地骨青蒿知母草 骨蒸勞熱保無虞

清骨散——治骨蒸勞熱。銀柴胡六分 胡黃連 秦艽 鼈甲童便炙 地骨皮 青蒿 知母各一錢 炙甘草五分。

范批：退熱治骨蒸之劑。此方治虛勞骨蒸有特效，非病已入祛，切忌妄投。

普濟消毒芩連鼠 玄參甘桔藍根侶 升柴馬勃連翹陳 殭蠶薄荷爲末咀

或加人參及大黃 大頭天行力能禦

普濟消毒飲——治初覺憎寒體重。次傳頭面腫盛。目不能開。上喘咽喉不利。口渴舌燥。黃芩酒炒

一錢 黃連酒炒五分 陳皮去白一錢 甘草五分生用 玄參二錢 連翹一錢 板藍根一錢，馬勃
一錢 鼠黏子一錢 薄荷一錢 殭蠶一錢 升麻七分 柴胡七分 桔梗二錢 時時服之。或蜜拌

爲丸：噙化。一方無薄荷，有人參三錢。亦有加大黃二錢，治便秘者。或酒浸。或煨用。

范批：散腫消毒之劑。此方治小兒痧子麻疹，極效。

板藍根 合「靛原質」Indican $C_{16}H_{17}NO_6$ 。與醋酸，外用消腫毒，內服解毒。

馬勃 含尿素(uracil)，功能止血，又治咽喉炎。

鼠黏子 卽牛蒡子，含牛蒡素Arctiin及軟脂Palmitin 臘脂臘Stearin 油脂Olein，乃利尿治浮腫，咽喉疼痛，解毒。

清震湯治雷頭風 升麻蒼朮兩般充 荷葉一枝升胃氣 邪從上散不傳中

清震湯——治雷頭風。頭面疙瘩腫痛。憎寒壯熱。狀如傷寒。升麻五分 蒼朮三錢 荷葉一枚。

范批：發散消毒之劑

桔梗湯中用防己 桑皮貝母括婁子 甘枳當歸薏杏仁 黃耆百合薑煎此

肺癰吐膿或咽乾 便祕大黃可加使

甘桔湯——治咽痛。喉痺肺癰。吐膿乾欬。無痰。亦治心臟發欬。欬則心痛。喉中介介如梗狀。甘

草二兩 桔梗一兩 或等分。王好古加法：失音加訶子一錢。聲不出，加半夏一錢。上氣加陳皮一錢。涎嗽加知母一錢貝母三錢。欬渴加五味五分。酒毒加葛根一錢。少氣加人參一錢。嘔加半夏一錢。生薑一錢。吐膿血加紫苑一錢。肺病加阿膠一錢。胸膈不利，加枳殼一錢。痞滿加枳實一錢。目赤加梔子三錢。大黃面腫，加茯苓三錢。膚疔加黃耆一錢。發斑加荆芥一錢防風三錢。痰火加牛蒡子一錢大黃一錢。不得眠加梔子一錢。

甘草湯——甘草湯，除桔梗，治同。

甘桔防風湯——甘桔湯，加防風三錢，治同。

如聖湯——甘桔湯，加防風三錢，荆芥一錢，連翹一錢，治上焦風熱。

桔梗湯——甘桔湯加連翹一錢，薄荷五分，竹葉一錢，梔子三錢，黃芩三錢，治上焦壅熱，喉痺熱腫。又方桔梗一錢，桑皮一錢，貝母三錢，括蕩三錢，當歸一錢，枳殼一錢，苡仁三錢，防己三錢，黃耆一錢，杏仁三錢，百合一錢，甘草五分 加薑煎，亦名桔梗湯，治肺癰吐膿，噎乾多渴。如大便閉，加大黃一錢。小便赤，加木通一錢。

訶子清音湯——甘桔湯，加訶子一錢，加童便半杯服，治中風不語。

枳桔湯——甘桔湯，除甘草，加枳殼一錢，治胸中痞塞，噫氣吐酸，或欬。

范批：清肺利膈除熱止欬之劑。治肺有鬱火，喘欬無痰，或痰略如膿而腥穢者甚效。

清咽太平薄荷芎 柿霜甘桔及防風 犀角蜜丸治膈熱 早間咯血頰常紅

清咽太平丸——治肺出血，薄荷十兩 川芎 柿霜 甘草 防風 犀角各二兩 桔梗三兩 蜜丸。

每服三錢。

范批：治肺傷欬血甚效

柿霜 含「甘露蜜醇」Mannit 及單甯酸，治咯血，衄血，吐血，子宮出血效。

消斑青黛梔連犀 知母元參生地齊 石膏柴胡人參草 便實參去大黃躋

薑棗煎加一匙醋 陽邪裏實此防稽

消斑青黛散——治傷寒。熱邪傳裏。裏實表虛。陽毒發斑。青黛一錢 黃連五分 犀角五分 石膏

一錢 知母一錢 元參一錢 梔子一錢 生地黃三錢 柴胡八分 人參五分 甘草五分 加薑棗

煎。入苦酒一匙。和服。大便實者，去人參，加大黃一錢。

范批：宜表瀉火解鬱消毒之劑。治血熱膚發疹斑，腸胃因熱極而出血之症頗效。

辛夷散裏藥防風 白芷升麻與木通 芎細甘草茶調服 鼻生瘰肉此方攻

辛夷散——治鼻生瘰肉。氣息不通。不聞香臭。辛夷 白芷 升麻 藜本 防風 川芎 細辛 木

通 甘草 等分爲末。每服三錢。茶調下。

范批：芳香祛風去熱利濕通竅之劑。治肺熱鼻竅堵塞極效。

辛夷 除含精油，如林檎油 Citral 丁香油 Eugenol 樟腦油 Cineol 二環萜 Pinen 羊脂酸 Caprin

酸 Säure. 油酸等外，又含有機驗，功能起癢癢，而治頭痛腦漏鼻病。齒痛者忌之。

蒼耳散中用薄荷 辛夷白芷四般利 葱茶調服疎肝肺 清升濁降鼻淵瘵

蒼耳散——治鼻淵。白芷一兩 薄荷 辛夷五錢 蒼耳子二錢半炒 爲末。食前葱茶湯調下二錢。

范批：芳香疎風逐濕通竅之劑。治鼻淵腦漏兩症，頗俱功效。以桑葉元參二味煎湯送尤佳。

蒼耳子 含蒼耳子黃色無晶形配糖體 Xanthostrumarin 解熱發汗效。治頭痛，外塗治疥癬濕疹虫

傷。古人云：體弱者少用之。

茶葉 含「咖啡精」Caffein $C_8H_{10}N_2O_2$ 、「黃花色精」Xanthin $C_7H_4N_4O_6$ 及「異性可可鹼」Theophyllin $C_7H_8N_2O_2$ 。功能興奮利尿，又綠茶葉含多量丙類維他命 Vitamin C，外用撒布，以止臭氣，內服消渴止血。

妙香山藥與參耆 柑桔二 茯遠志隨 少佐辰砂木香麝 驚悸鬱結夢中遺

妙香散——止遺精。山藥二兩乳汁炒 人參 炙黃耆 茯苓 茯神 遠志炒各一兩 桔梗 甘草各

三錢 辰砂二錢 木香二錢半 麝香一錢 爲末，每服二錢，酒下。

范批：滋補安神寧心解鬱之劑。治遺精不用固瀉之品。是方可謂心裁別出，其意深且長也。

范鳳源治肺癆方——肺部兩面作痛，吐臭痰，每日搗生白果七枚，用溫水沖服，痰日漸少，約二十

日愈。如臭痰已除，再將白芨爲末，和搗雞蛋白一枚，燉服，三十日則病完全治愈。

范鳳源治肝胃不和胸肋膈中作痛方——紫丹參三錢 西砂仁一錢杵後下 檀香片一錢 天台烏藥二

錢 金鈴子三錢 元胡索二錢 全瓜蒌三錢 宋半夏二錢 薤白頭二錢 廣鬱金二錢 杭白芍三

錢 黃蘗米三錢 金橘餅三枚

第十六章 除痰之劑

二陳湯用半夏陳 益以茯苓甘草臣 利氣調中兼去濕 一切珍飲此爲珍

導痰湯內加星枳 頑痰膠固力能馴 若加竹茹與枳實 湯名溫膽可甯神

潤下丸僅陳皮草 利氣祛痰妙絕倫

二陳湯——治一切痰飲爲病。欬嗽脹滿。嘔吐惡心。頭眩心悸。薑製半夏二錢 陳皮去白 茯苓各

一錢 甘草五分 加薑一片煎。治痰通用二陳。風痰加南星一錢白附子一錢皂角一錢竹瀝一錢。

治脈弦而青。肢脅滿悶，便溺秘澇，時有躁怒，其痰清而多泡。寒痰加薑汁半夏一錢，治脈沉面黑，小便急痛，足寒而逆，心多恐怖，痰色稀白，或有黑點。火痰加石膏三錢青黛一錢，治煩熱燥結，頭面烘熱，或爲眼爛，喉閉，顛狂嘈雜，頭腫，驚眩懊憹怔忡，其痰色多黃。濕痰加蒼朮一錢白朮一錢，治脈緩而黃，肢體沈重，嗜臥不疲，腹脹食滯，其痰滑而易出，色白而多。燥痰

加瓜蒌三錢杏仁一錢，治脈澀面白，氣上喘促，瀉浙寒熱，悲愁不樂，其痰澀而難出，或如米粒，黏亮而少。食痰加山查三錢麥芽三錢神麴三錢，治飲食不消，日久生痰，或挾瘀血，遂成窠囊，多見痞滿不通，口出臭氣。粘痰加枳實一錢海石三錢芒硝三錢。澀痰加香附一錢枳殼一錢。脇下刺痛，手不可按，痰在皮裏膜外，加白芥子一錢。四肢不和，痰在經絡，加竹瀝一錢。

六君子湯——二陳湯加入參一錢白朮一錢，治體虛有痰。

陳皮半夏湯——二陳湯去茯苓甘草。除痰濕。

桔梗半夏湯——陳皮半夏湯再加桔梗一錢。治肺炎。

半夏茯苓湯——二陳湯去陳皮甘草，再加生薑一片，名小半夏加茯苓湯，皆治水氣嘔惡。

茯苓半夏湯——加黃芩，治熱痰，脈洪而赤，口乾唇燥，時多喜笑，其痰堅而成塊。

二陳加稻連生薑湯——二陳湯加黃連一錢，梔子三錢，生薑一片，治膈上熱痰，令人嘔吐，去生薑治嘈雜。

砂仁枳殼二陳湯——二陳湯，加砂仁五分，枳殼一錢，行痰利氣。

導痰湯——二陳湯加膽星一錢，枳實一錢，治頑痰膠固，非二陳湯所能除者。

菖蒲導痰湯——導痰湯再加菖蒲五分，治驚悸健忘，怔忡不寐。

順氣導痰湯——二陳湯加木香一錢，香附一錢，治痰結胸滿，喘欬上氣。二陳湯加枳實一錢，括萎

三錢，萊菔子一錢，山楂一錢，神麴三錢，治食積痰嗽發熱。

加味二陳湯——二陳湯加蒼朮一錢，枳殼一錢，片子薑黃一錢，治痰攻眼腫，併酒家手臂痛麻木。

溫中化痰丸——二陳湯除甘草，加乾薑一錢，薑汁少許糊丸，治胸膈寒痰不快。

三聖丸——二陳湯除茯苓甘草，加黃連一錢，麴糊丸，薑湯下，治痰火嘈雜，心懸如飢。

橘皮湯——單用陳皮一錢，生薑一錢，治乾嘔噦，及手足厥者。

生薑半夏湯——單用半夏薑汁，治似喘不喘。似喘不喘。心中憤憤然無奈者。

消暑丸——二陳湯，半夏醋煎，除陳皮，薑汁丸。化暑天食積。

范批：化痰消積順氣滲濕之劑。

白芥子 含芥子配糖體 *Sinigrin* 及加水分解之芥子酵素 *Myrosin*，又有揮發芥子油 *Allyl Sentiol*

脂肪油及有機酸芥子酸 $\text{Erucasäure } \text{C}_{21}\text{H}_{41}\text{COOH}$ ，落花生酸 $\text{Arachinsäure } \text{C}_{19}\text{H}_{39}\text{COOH}$ 等，外用能引赤，治風濕神經痛，內服能使食慾亢進。

潤下丸——治膈中痰飲。廣陳皮八兩 甘草二兩蜜炙 蒸餅糊丸。或將陳皮，鹽水炙烟曬乾，同甘草爲末，名二賢散，煮湯下。濕勝加南星半夏各一錢。火盛加黃芩三錢黃連五分。

范批：順氣行痰潤腸軟堅之劑。治胸膈痰聚。氣不利而便不通。

滌痰湯用半夏星 甘草橘紅參茯苓 竹茹菖蒲兼枳實 痰迷舌強服之醒

滌痰湯——治中風。痰迷心竅。舌強不能言。薑製半夏 膽星各二錢五分 橘紅 枳實 茯苓各二

錢 人參 菖蒲各一錢 竹茹七分 加薑煎。

范批：消痰燥濕寧心安神開竅通便之劑。治痰涎阻塞，神識不慧，舌強難語有功。

青州白丸星夏并 白附川烏俱用生 晒露糊丸薑薄引 風痰癱瘓小兒驚

青州白丸子——治風痰湧盛。嘔吐涎沫。口眼喎邪。手足癱瘓。小兒驚風。及痰盛泄瀉。白附子生用 南星生用各二兩 半夏七兩水浸生衣生用 川烏五錢去皮臍生用 爲末。絹袋盛之。水攪出

粉。曬乾。糯米糊丸。如綠豆大。每服二十丸。薑湯下。癱瘓酒下。驚風薄荷湯下三五丸。

范批：祛風散寒除痰去濕之劑。有強心安神豁神開竅之功。兼治痰注經絡而肢極或癱瘓之症。

清氣化痰星夏橘 杏仁枳實括蕒實 芩苓薑汁爲糊丸 氣順火消痰自失

清氣化痰丸——治熱痰堅塊。半夏薑製 膽星各一兩半 橘紅 枳實麴炒 杏仁去皮尖 括蕒仁去

油 酒炒黃芩 茯苓各一兩 薑汁糊丸。淡薑湯下。

范批：除痰燥濕順氣清熱。治痰熱之通劑。

順氣消食化痰丸 青皮星夏蕒蘇攢 麴麥山查葛杏附 蒸餅爲糊薑汁搏

順氣消食化痰丸——治酒食生痰。胸膈膨悶。五更欬嗽。薑製半夏 膽星各一斤 青皮 陳皮去白

蘇子沉水裏炒 炒山查 炒麥芽 炒神麴 葛根 杏仁去皮尖炒 製香附各一兩 萊菔子一兩生

用一薑汁和蒸餅練丸。每服三錢。

范批：化痰降氣消食之劑。消食積而絕其生痰之源。痰不生則氣得順而欬可止。痰積既化則胸

膈痞悶自舒無疑矣。

滾痰丸用青礞石 大黃黃芩沈木香 百病多因痰作祟 頑痰怪證力能匡

礞石滾痰丸——治實熱老痰。怪證百病。青礞石一兩 沉香五錢 大黃酒蒸 黃芩八兩 右將礞石打碎。用朴硝一兩。同入瓦罐。鹽泥固封。曬乾。火煨。石色如金爲度。研末。和諸藥水丸。量入虛實服之。薑湯送下。服後仰臥。令藥在胸膈之間。除逐上焦痰滯。不宜飲水行動。本方加玄明粉一兩，硃砂爲衣，治同。

竹瀝達痰丸——礞石溶痰丸減大黃黃芩各六兩，加橘紅半夏各二兩，甘草一兩。竹瀝薑汁爲丸，治同，力稍和緩。

奪命丹——單用礞石一味，治如前法，薄荷自然汁，蜜調溫服，治小兒急慢驚風，痰涎壅盛，藥不得下，命在須臾。

范批：此方性頗悍猛，能攻陳積夙痰，除熱通降，苟非體實，不可輕投。

青礞石 卽珪藻土 *Zeolite* 乃鋁化合物，苦土（鎂質），石灰，粘土，有機物等所成，按鑲鹽爲瀉劑，鉛鹽則係吐劑，亦爲瀉藥。

焙硝 乃硝酸鉀，係養化劑，用以除去青礬石中之有機物，及除去其中鐵質與石灰質之原料，非藥劑。不可誤服。

朴硝 乃硫酸鈉 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 之結晶體，又名風化硝，至於芒硝，係硫酸鈉，皆瀉劑也，但可用以煅煉青礬石也。

金沸草散前胡辛 半夏荆甘赤茯苓 煎加葶藶除痰嗽 肺感風寒頭目掣

局方不用細辛茯苓 加入麻黃赤芍均

金沸草散——治肺經傷風。頭目昏痛。欬嗽多痰。旋覆花 前胡 細辛各一錢 荆芥一錢半 赤茯苓六分 半夏五分 炙甘草三分 加葶藶煎。局方加麻黃一錢赤芍一錢，無赤茯苓細辛。如滿悶，加枳殼一錢桔梗一錢。有熱，加柴胡一錢黃芩三錢。頭痛加川芎一錢。

范批：發表取汗消痰順氣之劑。治傷風頭昏欬嗽痰略如油沫。

半夏天麻白朮湯 參耆橘柏及乾薑 苓瀉麥芽蒼朮麩 太陰痰厥頭痛良

半夏天麻白朮湯——治脾胃內傷。眼黑頭眩。頭痛如裂。身重如山。惡心煩悶。四肢厥冷。薑製半

夏 麥芽各一錢半 炒神麴 炒白朮各一錢 蒼朮泔浸 人參 蜜製黃耆 陳皮 茯苓 澤瀉
天麻各五分 乾薑三分 酒洗黃柏二分 每服五錢。

范批：消化臟器工作失常。則血液受其阻礙。故頭痛如裂。四肢發冷，本方先用參耆補氣強心。
。佐以陳皮二朮之健脾胃。澤瀉黃柏之利尿洩熱。天麻乾薑之散寒止痛。神麴麥芽之運
中消食。方頗周密。故著功效。

常山飲中知母取 烏梅草菓檳榔聚 薑棗酒水煎露之 却痰截瘧功堪詡

常山飲——瘧久不已者。用此截之。常山燒酒炒二錢 煨草果 檳榔 知母 貝母各一錢 烏梅二
個薑二片。棗一枚。半酒半水。煎露一宿。日未出時。而東空心溫服。渣用酒浸煎。待瘧將發時
，先服。一方有良薑一錢甘草一錢，無檳榔。一方加穿山甲三錢甘草一錢。

范批：消食却痰截瘧之劑。古人云。無痰不成瘧。瘧由痰積鬱阻，氣血失和而作。治瘧之本。
貴在却痰。絕痰之源必先消積。此方之設也。其意如此。

截瘧七寶常山菓 檳榔朴草青陳夥 水酒合煎露一霄 陽經實瘧服之妥

截瘧七寶飲——治間日瘧。久發不止。寸口脈。弦滑浮大者。不問三日瘧日瘧，並皆治之。常山酒炒 煨草果 檳榔 青皮 厚朴 陳皮 甘草 等分各一錢。用酒水煎，熟絲縣蓋之。露一宿於當發之早。而東溫服。

范批：此方與常山飲同義。利氣除痰消積，合爲截瘧之劑。

范鳳源治瘧方——玄參七錢 瞿麥七錢 桔梗五錢 山梔五錢 紫背天葵七錢 薄荷五錢 麥芽五錢 海藻五錢 昆布五錢 連翹七錢 酒炒黃芩五錢 平番貝母五錢 雅連五錢 煉蜜爲丸。每服三錢。飯後二時用糯酒送下。不可間斷。二料可愈。禁食肉類。則淋巴腺容易消腫也。如髮常落，須驗血，是否梅毒。如是，照梅毒療法。服配尼西靈。每小時一片，連服十五片。

第十七章 收澇之劑

金鎖固精芡蓮鬚

龍骨蒺藜牡蠣需

連粉糊丸鹽酒下

澇精祕氣滑遺無

金鎖固精丸——治精滑不禁。沙苑蒺藜炒 芡實蒸 蓮鬚各二兩 龍骨酥炙 牡蠣各一兩，鹽水煮一夜煨粉 蓮子粉爲糊丸。鹽湯下。每服三錢。

菴批：補腎固澇之劑。治腎虧夢遺，精固不固，滑洩不覺效。

蒺藜 含氧化單甾質 Phlobaphen 與甲種維他命及脂肪油等，功能治療蕩，且爲強壯藥。

芡實 含一種粘液，含水炭素等，爲強壯藥，治風濕疼痛效。多食不消化。

蓮鬚 含「蓮毒素」Nelumbin 等，止血，治夜尿效。

龍骨 爲象類動物 Mastodon 之骨，埋山中業已化石，故掘得謂之龍骨。爲碳酸鈣磷酸鈣之化合物，治癆瘵，貧血，及神經衰弱。

蓮子粉 含蓮毒素，維太命J及銅質，乃強壯藥，治夜尿症。古人云：大便燥結者忌之。

鹿茸 含碳酸銨 Ammonium Carbonate (NH₃)₂CO₃，蛋白質，膠質，軟骨質，鹿茸 Hartshorn

精，對於人之血，頗多營養成分。又治遺精盜汗虛損甚效。惟須採用上等鹿茸，方始有效。

珍珠 含碳酸鉀鈣百分九十一 Calined Potassium Carbonate 及有機物，功能去眼翳。凝血。

茯菟丹療精滑脫 菟苓五味石蓮末 酒煮山藥爲糊丸 亦治強中及消渴

茯菟丹——治遺精白濁。及強中消渴。菟絲子十兩 五味子八兩 石蓮肉 白茯苓各三兩 山藥各

六兩，將菟絲用酒浸。浸過。餘酒煮山藥。糊爲丸。漏精，鹽湯下。赤濁，燈心湯下。白濁，茯

苓湯下。消渴，米湯下。

范批：固腎澀精健脾利濕之劑。治腎虧遺洩，溲淋白濁，均極有效。

治濁固本蓮蕊鬚 砂仁連柏一二苓俱 益知半夏同甘草 清熱利濕固兼驅

治濁固本丸——治胃中濕熱。滲入膀胱。下濁不止。蓮鬚 炒黃連各二兩 黃柏 益智仁 砂仁

薑製半夏 茯苓各一兩 豬苓二兩 炙甘草三兩

范世：治濕熱走注小腸膀胱，小溲淋漓淋血，但不能治染毒之淋濁症。

訶子散用治寒瀉 炮薑粟穀橘紅也 河間木香訶草連 仍用朮芍煎湯下

二方藥異治略同 亦主脫肛便血者

訶子散——治虛寒泄瀉。米穀不化。腸鳴腹痛。脫肛。及作膿血。日夜無度。御米穀五分炒 煨訶

子七分去核 炮乾薑六分 橘紅五分 右末。空心服。河間訶子散：訶子一兩半生半煨 木香五

錢 甘草一錢 黃連三錢 爲末。每服二錢。用白朮芍藥湯調下，治久瀉腹痛。已瀉漸下漸少。

以此止之。如不止。加厚朴一兩。竭其餘邪

范批：收斂大腸之劑。功能住洩瀉，收脫肛。

御米穀 卽罌粟殼。含膠質，單甯質，鉀質，功能利尿，因此可以瀉腸。痢疾初起，不宜用之。

桑螵蛸散治便數 參苓龍骨同龜殼 菖蒲遠志及當歸 補腎寧心健忘覺

桑螵蛸散——治小便數而欠。能安神魂。補心氣。療健忘。人參 茯苓 遠志 鹽炒石菖蒲 鹽水

炒桑螵蛸 煨龍骨 酥炙龜板（一方用醋炙鼈甲） 當歸 等分爲末。臨臥服二錢。人參湯下。

范批：本方乃補腎固精寧心安神之劑。如小便數而欠，係膀胱約束失司，可服縮泉丸。小兒遺尿，可服知柏地黃丸。大人遺尿，可服四君子湯。皆易治愈也。

桑螵蛸，又名螳螂窠，含蛋白質，能安神經，故功能治遺精。

真人養藏用粟穀 肉蔻當歸桂木香 朮芍參甘爲瀉劑 脫肛久痢早煎嘗

真人養藏湯——治瀉痢日久。赤白已盡。虛寒脫肛。亦治下痢赤白。臍腹痛。日夜無度。罌粟殼三

兩六錢 訶子麴裏煨一兩三錢 肉豆蔻麴裏煨五錢 木香二兩四錢 肉桂八錢 人參 炒白朮

當歸各六錢 炒白芍一兩六錢 生甘草一兩八錢 每服四錢。臍寒甚，加附子。一方無當歸。

范批：滋補調氣和血瀉欬之劑。治偏虛之日久洩瀉痢下症。

當歸六黃治汗出 耆柏苓連生熟地 瀉火固表復滋陰 加麻黃根功更異

或云此藥太苦寒 胃弱氣虛在所忌

當歸六黃湯——治陰虛有火。盜汗發熱。當歸 生地黃 黃芩 黃柏 黃連等分 黃耆加倍。每服

三錢。附撲汗法：白朮 萹本 川芎各二錢半，米粉一兩半，爲末。絹袋盛。週身撲之。治汗出不止。又方。龍骨 牡蠣 糯米等分爲末。撲之。

范批：固表清裏止汗之劑。治虛人蒸熱汗出如瀉，有效。

米粉 含乙種維他命及澱粉質，鈣質。外用功能止汗。

柏子仁丸人參朮 麥麩牡蠣麻黃根 再加半夏五味子 陰虛盜汗棗丸吞

柏子仁丸——治肌膚濕而尺脈滑，發熱盜汗。柏子仁二兩炒研去油 人參 白朮 半夏 五味子

牡蠣 麻黃根一兩 麥麩五錢 棗肉丸。米飲下。五十九。日三服。每服三錢。

范批：養心安神和胃燥濕之斂汗劑，可治癡呆。

陽虛自汗牡蠣散 黃耆浮麥麻黃根 撲法芎藭牡蠣粉 或將龍骨牡蠣捫

牡蠣散——治身體倦怠，發厥自汗。牡蠣煨研 黃耆 麻黃根各一錢 浮小麥百粒 煎服。

范批：固表除煩清熱之斂汗劑。

第十八章 殺蟲之劑

烏梅丸用細辛桂 人參附子椒薑繼 黃連黃柏及當歸 溫藏安虻寒厥劑

烏梅丸——治寒厥吐衄。亦治胃脘發欬。欬而嘔。嘔甚。則長蟲出。亦主久痢。烏梅三百個 細辛

桂枝 人參 泡附子 黃柏各六兩 黃連一斤 乾薑十兩 川椒去汗 當歸各四兩 苦酒（醋也）

（浸烏梅一宿。去核。蒸熟和藥蜜丸。每服一錢至半錢。

范批：甲種雜太侖安虻劑。腹中虻厥爲患，先使其靜伏，後以腐劑殺滅之。又名烏梅安虻丸。

化蟲鶴虱及使君 檳榔蕪荑苦棟羣 白礬胡連糊丸服 腸胃諸蟲永絕氛

化蟲丸——治腸胃諸蟲爲患。鶴虱 炒胡連 苦棟根 檳榔各一兩 蕪荑 使君子各五錢 枯礬二

錢二分 爲末。酒煮麴糊作丸。量人大小服之。一歲兒可五分。

范批：殺滅蟲患之腐劑。

鶴虱 卽天名精。含苦味質與揮發油，功能驅除蟣蟲。

苦楝根 含單寧酸，故爲驅蟲藥。古人云：脾胃弱者不可多服。

蕪荑 卽榆莢，含單寧酸，糖質等，利尿祛痰。

使君子 含脂肪油百分之二十五，含棕櫚酸，又名軟脂酸 *Palmitinsäure* 與油脂酸 *Oelsäure* 之甘

油脂 *Glyceride* 功能驅除蛔蟲。

范鳳源治疥疥肌癢方——內服犀黃三分 牛蒡子一錢 炙甘草五分 荆芥三錢 防風一錢 金銀花

三錢。外用水銀二錢 硫黃一錢半 大風子油二錢 洋樟腦一錢半 木鼈子仁二錢 蛇床子二錢

巴豆肉四錢 磨細粉，豬油包擦。一星期止癢全愈。

第十九章 癰瘍之劑

真人活命金銀花 防芷歸陳草節加 貝母天花兼乳沒 穿山角刺酒煎嘉

一切癰疽能潰散 潰後忌服用毋差 大黃便實可加便 鐵器酸物勿沾牙

真人活命飲——治一切癰疽腫毒。初起未消者。金銀花三錢 陳皮去白 酒洗當歸各一錢半 防風

七分 白芷 甘草節 貝母 天花粉 乳香各一錢 沒藥五分，二味另研候藥蒸下 皂角刺五分

穿山甲三大片（剉蛤粉炒，去粉用） 用好酒煎。毒在上飽服。在下飢服。善飲者，多飲酒以行

藥勢。忌酸物鐵器。

范批：清熱解毒排膿消毒之劑。

金銀花酒加甘草 奇瘍惡毒皆能保 護膜須用蠟礬丸 二方均是瘍科寶

金銀花酒——治一切癰疽惡瘡。不問發在何處。或肺癰瘍癰。初起。便服奇效。金銀花五兩乾者亦

可，不及生者力速。甘草一兩，水二碗。煎一碗。再入酒一碗。略煎。分三服。一日夜一服盡。重者二劑服。至大小腸通利，則藥力到。外以生者搗爛，酒調，敷毒四圍。

回毒金銀花湯——金銀花酒，用金銀花二兩，甘草一兩，加黃耆四兩，酒一升重湯煎服；治痛瘍色變紫黑者。

忍冬膏——金銀花，一名忍冬藤，四月採鮮花，搗汁熬膏，茶酒任點服，補虛療風。尤宜于火熱熾盛之人。永無疔疽之患。蜜酒亦佳。花葉同功。而花香尤勝。

范批：收斂殺菌之劑，一切外瘍初起紅腫作痛。

黃蠟 含「脂酸」Myricin $C_{27}H_{44}C_{12}H_{21}O_2$ 百分之八十。蓋皆脂肪酸也。如與酒同服。功能活血。雄黃 含硫化砷。入血，能增添紅血球之數，能治皮膚病。不可多服久服。

託裏十補參薯芎 歸桂白芷及防風 甘桔厚朴酒調服 癰瘍脈弱賴之充

託裏十補散——治癰瘡初發。或已發。瘡盛。形羸。脈無力者。黃耆 人參 當歸 川芎 桂心

白芷 防風 厚朴 桔梗 甘草各一錢 每服二錢。加至六錢。熱酒調下。本方加芍藥三錢，連

翹一錢，木香一錢，乳香一錢，沒藥一錢，亦名託裏散，治發背疔瘡。

范批：補氣活血排膿抗毒之劑。有解表托裏之功。

託裏溫中薑附羌 茴木丁沈共四香 陳皮益智兼甘草 寒瘍內陷嘔瀉良

託裏溫中湯——治疔瘡因心臟衰弱。變而內陷。膿出清稀。皮膚涼。心下痞滿。腸鳴切痛。大便微

溏。食則嘔逆氣短。呃逆。不得安臥。時發昏憤。附子四錢泡 乾薑泡三錢 羌活三錢 木香一

錢半 茴香 丁香 沉香 益智仁 陳皮 炙甘草各一錢 加生薑五片煎。

范批：強心溫運托裏之劑。治疔瘡內陷。

託裏定痛四物兼 乳香沒藥桂心添 再加蜜炒罌粟殼 潰瘍虛痛去如拈

託裏定痛湯——治疔潰虛痛。當歸一錢 地黃一錢 川芎一錢 白芍一錢五分 乳香一錢 沒藥一

錢 桂心五分蜜炒 罌粟殼三錢煎服

范批：定痛之劑。其定痛之效力，完全為川芎之功。

散腫潰堅知柏連 花粉黃芩龍膽宣 升柴翹葛兼甘桔 歸芍稜莪昆布全

散腫潰堅湯——治同前證。黃芩八錢半酒炒半生用 知母 黃柏酒炒 龍膽草酒炒 花粉酒洗 桔梗 昆布五錢 柴胡四錢 升麻 連翹 灸甘草 酒洗三稜 酒洗炒莖各三錢 葛根 酒洗當歸尾 芍藥各二錢 黃連一錢 每服六七錢。先浸半日。煎熱服。服後仰臥。取藥在上脘。另料蜜丸。留藥湯吞之。量虛實服。

范批：消腫軟堅清血化毒之劑。

范鳳源治乳疽結塊方——蒲公英三錢 漏蘆三錢 炒山甲一錢半 浙貝母三錢 皂刺三錢 炒乳香三錢 炒沒藥三錢 金銀花三錢 絲瓜絡一錢 括婁皮三錢 大腹皮一錢 半防風一錢 連翹三錢 赤芍三錢 鹿角膠後下一錢 小金丹二粒 十劑愈。

范鳳源治脫疽方——石斛三錢 生地三錢 山梔三錢 丹皮一錢半 天花粉一錢半 當歸三錢 每日煎服，同時注射脫疽血清。皮膚表面用電氣燒灼，則收功全愈。

第二十章 經產之劑（附痧痘方）

海藏妊娠六合湯	四物爲君妙義長	傷寒表虛地骨桂	表實細辛兼麻黃
少陽柴胡黃芩入	陽明石膏知母臧	小便不利加苓瀉	不眠黃芩梔子良
風濕防風與蒼朮	發斑升麻連翹嘗	胎動血漏名膠艾	朴痞虛實頗相當
脈沉寒厥亦桂附	便秘畜血桃仁黃	安胎養血先爲主	餘因各證細參詳
後人法此治經水	過多過少別溫涼	溫六合湯加芩朮	色黑後期連附商
熱六合湯梔連益	寒六合湯加附薑	氣六合湯加陳朴	風六合湯加羌羌
此皆經產通用劑	說與時師好審量		

表實六合湯——治妊娠傷寒頭痛。身熱無汗。脈緊。當歸一兩 地黃一兩 川芎一兩 白芍一兩
名四物。麻黃 細辛各五錢 每服三錢。

表虛六合湯——四物四兩。加桂枝。地骨皮各七錢，治妊娠傷寒。表虛自汗。身熱。惡寒。頭痛。項強。脈浮而弱。

風濕六合湯——四物四兩，加防風。蒼朮各七錢，治妊娠傷寒，中風濕氣，肢節煩痛，頭痛，身熱，脈浮。

升麻六合湯——四物四兩，加升麻連翹各七錢，治妊娠傷寒，下後，經過不愈，濕毒發斑如錦紋。柴胡六合湯——四物四兩，加柴胡。黃芩各七錢，治妊娠傷寒，胸脇滿痛，而脈弦。

大黃六合湯——四物四兩，加大黃五錢，桃仁十枚，麩炒，治妊娠傷寒，大便秘，小便赤，氣滿，而脈沉數，急下之。

人參六合湯——四物四兩，加人參。五味各五錢，治妊娠傷寒，汗下後，欬嗽不止。

朴實六合湯——四物四兩，加厚朴。枳實麩炒各五錢，治妊娠傷寒之後，虛痞脈滿。

梔子六合湯——四物四兩，加梔子。黃芩各五錢，治妊娠傷寒，汗下後，不得眠。

石膏六合湯——四物四兩，加石膏。知母各五錢，治妊娠傷寒，大渴而煩，脈長而大。

茯苓六合湯——四物四兩，加茯苓 澤瀉各五錢，治妊娠傷寒，小便不利。

膠艾四物湯——四物四兩，加阿膠 艾葉各五錢，治妊娠傷寒，汗下後，血漏不止，損動胎氣者。

附子六合湯——四物四兩，加附子 肉桂各五錢，治妊娠傷寒，四肢拘急，身涼微汗，腹中痛，脈

沉遲者。

四物大黃湯——四物四兩，加生地 大黃各五錢，治妊娠傷寒，畜血證。

范批：表實六合湯爲養血安胎發表發汗之劑。婦人懷孕感冒施治，皆以養血安胎爲首，餘可分

證立法，然終不脫四物湯爲君也。

膠艾湯中四物先 阿膠艾葉甘草全 婦人良方單膠艾 胎動血漏腹痛痊

膠艾四物加香附 方名婦寶調經專

膠艾湯——治婦人漏下。或半產後。下血不絕。成妊娠下血。腹痛。爲胞阻。亦治損傷銜任。月水

過多。淋瀝不斷。阿膠 芎藭 炙草各二兩 艾葉 當歸各三兩 白芍四兩 生地黃二兩 水五

升。煮取三升。納阿膠烊化服。一方加乾薑三兩。嚴氏治胎動經漏，腰痛腹滿，搶心短氣：加黃

著一斤，又方。蛤粉炒阿膠一錢。艾葉數莖，亦名膠艾湯，治胎動不安，腰腹疼痛，或胎上搶心，去血，腹痛。指迷方：加秦朮一錢。

范批：養血止血之劑。治胎動經漏頗效。

當歸散益婦人妊 朮芍芎歸及子芩 安胎養血宜常服 產後胎前功效深

當歸散——婦人妊娠。宜常服之。當歸 芎藭 白芍 黃芩各一斤 白朮半斤 爲末。酒調服。日

二次。易簡方：加吳茱萸五分。治經三四月不行。或一月再至。

范批：養血退熱止痛安胎之劑。

黑神散中熟地黃 歸芍甘草桂炮薑 蒲黃黑豆童便酒 消瘀下胎痛逆忘

黑神散——治惡露不盡。攻衝作痛。及胞衣不下。胎死腹中。熟地黃 歸尾 赤芍 蒲黃炒 桂心

乾薑炒 甘草各四兩 黑豆半升去皮炒 每服二錢。酒童便各半煎。古黑神散：百草霜白芷等分

。每二錢。煎入童便醋少許和服。治橫生逆產。及胎前產後。虛損崩漏等證。

范批：破血行瘀之劑。治血瘀凝滯，月經停閉，產後惡血不行，少腹劇痛之症。按方中蒲黃生

用行血，熱用清血。

清魂散用澤蘭葉 人參甘草川芎協 荆芥理血兼祛用 產中昏暈神魂帖

清魂散——治產後。惡露已盡。忽昏暈不知人。澤蘭葉 人參各三分 川芎五分 荆芥一錢 炙甘草三分。爲末。溫酒調下。更宜燒漆器，燂醋炭於床下之前。使聞其氣。

菴批：養血補氣疎表。治產後感冒，頭目眩暈，神志不慧，此方有鎮靜中樞，發散風邪之功。澤蘭 含有機鹼與配糖體香精油及澤蘭苦味質 *isoflavanon*，爲婦人產前產後要藥，能退產後水腫，

常與防己合用。外傷用敷腫。

羚羊角散杏薏仁 防獨芎歸又茯神 酸棗木香利甘草 子痢風中可回春

羚羊角散——治妊娠中風。涎潮忽仆。目弔口噤。角弓反張。名子痢。羚羊角屑一錢 獨活 防風

芎藭 當歸 棗仁炒 茯神 杏仁 薏仁各五分 木香 甘草各二分半 加薑煎。一方有五加皮

菴批：涼肝活血疎風安神之劑。治孕婦子痢頭痛眩暈心悸癱瘓症效。

當歸生薑羊肉湯 產中腹痛羸勞匡 亦有加入參耆者 千金四物甘桂薑

當歸羊肉湯——治產後發熱自汗。肢體疼痛。名曰羸勞。黃耆 人參 當歸各七錢 生薑五錢 用羊肉一斤。煮汁。去肉。入前藥煎服。如惡露不盡，加桂五分。惡露下多，加川芎一錢。冷厥加吳茱萸五分。血少潮熱，加生地汁半杯。咳逆氣短，加細辛五分。

當歸生薑羊肉湯——當歸羊肉湯除人參黃耆，用羊肉一斤，薑五兩，當歸三兩，治產後腹中疝痛，及寒疝腹痛，虛勞不足。

范批：培補氣血之劑。產後血少，體虛汗多，虛熱用以調補甚宜。

達生紫蘇大腹皮 參朮甘陳歸芍隨 再加蔥葉黃楊腦 孕婦臨盆先服之

若將川芎易白朮 紫蘇飲子子懸宜

達生散——婦人妊娠八九月。服數十劑。易生有力。當歸酒炒 芍藥酒炒 人參 白朮土炒 陳皮 紫蘇各一錢 炙甘草二錢 大腹皮三錢 入青葱五葉。黃楊腦子七個煎。或加枳殼一錢，砂仁五分。或春加川芎一錢。夏加黃芩三錢。冬如本方。或有別證。以意消息。

范批：補氣血疎壅滯之劑。孕婦服之有臨產不致留難之功。

黃楊 含「黃楊鹼」Buxin $C_{15}H_{11}NO_3$ 及「對位黃楊鹼」Parabuxin $C_{15}H_{13}NO$ 有機鹼，揮發油，

脂肪油，蠟等。其藥治痛風風濕梅毒效。

妊娠轉胞參朮飲 芎芍當歸熟地黃 灸草陳皮兼半夏 氣升胎舉自如常

參朮飲——治妊娠轉胞。當歸 熟地黃 川芎 芍藥 人參 白朮 陳皮留白 半夏 炙甘草各一錢 加薑煎。空心服。又法。將孕婦倒豎胞轉，而小便自通矣。

朱丹溪參朮湯——人參二錢五分 白朮二錢 黃耆一錢半 茯苓 陳皮各一錢 炙甘草五分 用羊

猪胞。煮湯入藥。煎服。治產後胞損，成淋瀝證。

范批：補血健身安胎之劑。

羊猪胞，含子宮分泌汁，女性生殖素 Oestrogens, Progesteron 等，功能治補身。

牡丹皮散延胡索 歸尾桂心赤芍藥 牛膝稜菘酒水煎 氣行瘀散血癥削

牡丹皮散——治血塊走注。丹皮 桂心 歸尾 延胡索各三分 牛膝 赤芍藥 菘朮各六分 三稜 四分水酒各半煎。

范批：行氣破血散結止痛之劑。治婦女卵膜炎，卵巢劇痛，卵巢腫大，甚效。

固經丸用龜板君 黃柏樗皮香附羣 黃芩芍藥酒丸服 漏下崩中色黑殷

固經丸——治經行不止。及崩中漏下。紫黑成塊。炙龜板四錢 芍藥酒炒 黃柏酒炒各三兩 黃芩

二兩炒 香附童便酒炒 樗皮炒一兩半。酒丸。每服三錢。

范批：養血清熱收斂之劑，治淋毒性子宮內膜炎，子宮腫脹，下腹劇痛，甚效。

樗皮 含苦味質，與軟脂 Palmitin, 鹼蠟脂蠟 Stearine, 油脂 Olein, 及中國蠟質 Cetylalkohol, 植物

蠟脂蠟 Phytosterin, 有色體 Gerbstoff, 氧化單甾質 Phlobaphene, 苦楝素 Quassin $C_{21}H_{32}O_6$

等為收斂藥。治婦女崩血，產後出血，淋病，月經不順。

柏子仁丸 熟地黃 牛膝續斷澤蘭芳 卷柏加之通血脈 經枯血少腎肝匡

柏子仁丸——治經行復止。血少神衰。柏子仁去油 牛膝酒浸 卷柏各五錢 澤蘭 續斷各二兩

熟地黃一兩 蜜丸。米飲下。

范批：滋補安神活血通經之劑。治女子抑鬱善憂血少經閉。

〔卷〕 其灰與茶油相揉，治小兒腦膜炎。又藥治婦女月經病。及外治刃傷。但孕婦不可服之。

望梅丸用鹽梅肉 蘇葉薄荷與柿霜 茶末麥冬糖共搗 旅行資服勝瓊漿

望梅丸——鹽梅肉四兩 麥冬去心 薄荷葉去梗 柿霜 細茶各一兩 紫蘇五錢去梗 爲極細末
白糖四兩。共搗爲丸。鷄子大。旅行帶之，每含一九。生津止渴。加參一兩尤妙。

范批：生津止渴之劑。旅行家最忌喉症，常備極佳。

骨灰固齒猪羊骨 臘月醃成煨研之 骨能補骨鹹補腎 堅牙健啖老尤奇

骨灰固齒散——用臘月醃猪羊骨火煨細研。每晨擦牙不可間斷。至老而其效益彰。

范批：擦牙之劑常用有益。近日市上通用碳酸鎂擦牙，爲能除乳酸等質，功用亦佳。

猪羊骨 含磷酸鈣及骨質。故補骨髓

軟脚散中芎芷防 細辛四味研加霜 輕撒鞋中行遠道 足無箴疱汗皆香

軟脚散——防風 白芷各五錢 川芎 細辛各二錢半。爲末。行遠路者撒少許於鞋內。步履輕便。
不生箴疱。足汗皆香。

范批：外用活血健步殺菌之方也。

稀痘神丹三種荳 粉草細末竹筒裝 臘月廊中浸洗淨 風乾配入梅花良

絲瓜藤絲煎湯服 一年一次三年光

稀痘神丹——用赤小豆 黑豆 綠豆 粉甘草各一兩。細末。入竹筒中。削皮留節。鑿孔入藥。杉木塞緊。溶蠟封固。浸臘月厠中。一月取出。洗浸風乾。每藥一兩。配臘月梅花片三錢。以雪中花片落地者。不著人手。以針刺更妙。如急出用。入紙套中。略烘即乾。兒大者服一錢。小者五分。以霜後絲瓜藤上小藤絲煎湯。空腹服。忌葷腥十二日。解出黑糞爲驗。每年服一次。三次可稀，永不出矣。

范批：涼血清熱解毒之劑。

梅花 含枸橼酸 Citronen Säure 與蘋果酸 Apfel Säure 解熱發汗健胃止瀉。

綠豆 含有機鹼，膠質，揮發油，故能利尿消腫。

絲瓜藤 含硝酸鉀質。故鎮咳利尿。

又方蜜調忍冬末 不住服之效亦強 更有元參菟絲子 蜜丸如彈空心嘗


白酒調化日兩次 或加犀麥生地黃 此皆驗過稀痘法 爲力簡易免倉皇

元參菟絲子丸——菟絲子半斤。酒浸二宿。煮乾去皮。元參四兩。共爲細末。蜜丸。彈子大。白湯調下。每日二次。或加犀角一兩。生地四錢。麥冬四錢。又方生地麥冬各四錢。犀角二兩。

范批：以上二方，皆後人所添。皆無顯著功效。

種牛痘法——每年在小兒手臂上，破一小縫，滴牛痘苗漿少許，卽能免生天花水痘。較上法爲佳。牛痘不宜種於腳上，因種後大勝灣，必起腫脹，數日亦自然消去。大人種牛痘於腳上，數日間行步不便，不免疑生橫痃，反爲不佳。摩登仕女，尙以種牛痘於手臂爲佳。

范氏紫石門冬丸——治婦人不能孕育。紫石英三兩（水飛）。天門冬三兩。當歸，川芎，紫葳，卷柏葉，桂心，地黃，石斛，辛夷，禹餘糧各二兩。柏子仁一兩。人參，桑寄生，續斷，細辛，厚朴，丹皮，燥薑，食茱萸，牛膝，山藥，甘草各一兩六錢。研爲極細之末，煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服十九。每日三次。漸增至三十九，以腹中熱爲度，一舉得子，不必再服。蓋紫石英含有錳質，能使女子生殖力發育也。



適用於孩提者
：倘患病，營
養失調，抵抗
傳染病力減弱
，瘦弱症，功
能助長發育，
強健骨骼。



適用於成人者：
傳染病抵抗力薄
弱，呼吸器病，
尤以肺癆爲最危
，雄婦，乳婦，需
用甲丁二種維他
命補給營養者。

好力生

康健和樂快到你使能
劑合命他維種丁然天與精油肝魚目比

售出有均房藥各埠外本



位百一劑囊膠攝公十五劑滴

信誼化學製藥廠發

醫藥湯頭歌訣

(全一冊)

◀ 印 翻 准 不 · 有 所 權 版 ▶

主編者

鮑

國

昌

批註者

范

鳳

源

發行者

上海白克路五七一弄六〇號
范鳳源電化實驗室
電話六二四八三

經售者

作

者

書

社

上

海

福

州

路

千

上

海

漢

口

路

堂

#141
22/100

維他賜保

天然治療強壯劑

返弱為強



近世臟器療法，在醫學上佔重要地位，本品為提高臟器之荷爾蒙精汁，合以各種必需之維他命與礦物質而成。

維他賜保命之成份
 男用：牡牛睾丸荷爾蒙結晶，胎盤，腦下垂體全體，腎上腺，甲狀腺，鹿茸精，乙維他命結晶，丙維他命結晶，丁種維他命。
 女用：卵巢荷爾蒙結晶，胎盤，腦下垂體全體，腎上腺，甲狀腺，鹿茸精，乙維他命結晶，丙維他命結晶，丁種維他命。



主治各症

神經衰弱
 未老先衰
 性能不振
 腎虧遺精
 腰酸背痛
 發育不全
 腦弱肺病
 貧血瘦弱
 臟躁脾虛
 產後貧血
 經期不準
 痛經崩漏

本外埠均有出售



凡劑每盒一百粒
 針劑每支二十粒

信誼化學製藥廠發行