



詩

經

四

光緒壬辰秋月重刊

板藏順邑龍山  
鄉桃盛京果店

琴棋書畫

枕善主人題

君曼

合刻後序

白喉疫症向少專科業醫者以症不常見復少詳求其治法雖散見方書然症遇危疑猝難繙閱戊寅春需次酒泉戎幕得黃炳乾新編張善吾蕭海雍兩先生所著時疫白喉證論因經辨治詳列諸方守約而施博庚辰夏隨節移屯哈密長途熇暑戈壁風沙軍中患此症頗多按方施治隨手奏效入關後歷肅州平遠各路遇此症亦視此書爲定盤鍼乙酉調秦州兩當縣州憲余二田刺史浙人寄籍湖湘通靈素學深悉此症險惡剖毫析芒時因公謁見暇喜談醫言隴南山高土燥患喉最多以公餘所輯喉症全書見示凡例中論列綦詳茲不復贅戊子秋解

組南旋攜二書置行篋粵地人多火臘倘遇證得此編爲指南  
車或不至毫釐千里吾鄉守愚居士見書而贊之遂合刻以廣  
其傳所謂齊心同所欲矣因爲誌所自來

光緒十八年歲在壬辰中秋節順德周兆璋雲稼甫書於枕善居



序

人之一身百病皆可致危而咽喉之病尤危之危者蓋咽感地氣爲胃之系主通利水穀喉應天氣爲肺之系主出入氣息人身唯此二關爲最要故患病亦唯此二關爲最險世之業是科者多學無師授往往株守一偏稱爲秘授非自許扁鵲卽人頌華陀及其臨證則茫無主張試起扁鵲華陀而問之果無愧乎又有咽喉發白一證古方所無諸書未載爲害尤烈乾隆四十年以前無此證卽有亦罕自道光中盛延於江浙漸及荆湘黔滇燕魯近來秦隴塞外所在皆有病者苦無良醫醫者苦無良方膠時疫之說者專用寒涼則虛寒者殆矣孰虛寒之說者專

用辛溫則時疫者危矣是皆以人之性命試彼無形之斧刃持此而欲救世得乎余不揣固陋爰集古今專科世業善本與治白喉經驗良方良法悉心探索不當者去之未備者補之並折衷羣書詳加印證俾病情方藥概歸至當以爲喉證指南醫家既可據病以校方病者亦可檢方以自療從此藥到病除永絕咽喉之患咸登益壽之堂豈不懿歟時光緒十三年歲次丁亥夏五嚴江寄湘漁父識於甘肅秦州官舍之知足知不足齋

喉症指南卷首

凡例

一喉科向少成書。卽醫家著述中偶論及之。亦多略而不詳。故精者絕少。是編以程鍾齡、程瘦樵、鄭梅澗、陳雨春、張善吾、黃冉生、黃陶普諸家之說爲底本。並博採專科善本。經驗秘傳各方法。揣摩印證。彙集成編。俾一覽無遺。庶易於融會貫通。人身十二經中。惟足太陽主表。別下項。餘皆內循咽喉。盡得以病之。而要不離乎肺與胃。蓋胃爲水穀之海。肺爲諸臟之華。蓋其氣皆直透咽喉。故咽喉病。亦惟肺胃之火爲獨盛。一醫士辨證。如文家相題。相題之法。須先尋脈理。辨證之法。須

先分寒熱。是編每論一證。必先將寒熱二字。反覆推敲。再於寒熱中分表裏。分虛實。分氣血。分輕重。然後斟酌方藥。自無毫釐千里之謬。

一用藥如用兵。兵不精則賊不滅。藥不當則疾不瘳。喉病用藥。自內攻出爲上策。取痰攻上爲中策。沉爲下策。熱重者令去。內熱用藥取病歸上。攔定風熱。使其在上不下。然後隨證用藥。此爲善治。若其內熱未盛未結。卽用清劑攻法。致病入胃膈。因傳於心肺。變生他證。是用藥者之咎也。

一醫士臨證。如戰士臨陣。固貴心細膽大。尤宜通權達變。若心粗氣浮。或以猛劑而治輕病。或以重病而投平劑。或遇胎產

婦人。小孩。衰老。或值大病。甫痊。元氣未復。俱難任攻伐。如必拘泥成方成法。不顧本元。殺人易於反掌。

一喉證。用單紙印方傳送。雖屬善舉。究竟誤事何也。其人或曾患熱證。服涼劑而愈。則所傳者必涼劑也。倘患寒證者信之。鮮能救矣。其人或曾患寒證。服溫劑而愈。則所傳者必溫劑也。倘患熱證者信之。鮮能救矣。

一前賢所定喉證方法。名言精論。煞費苦心。時醫以獨開生面。不襲爲高。而予輯此編。凡有經驗神效者。或於序中。或於凡例。或於辨證。或於用藥。或於證治。或於醫案。或於方後隨處萃集。正與時醫相反。覽斯編者。或以勦說見譏。余則甘受而

不辭也

一咽喉起白如腐。俗稱白喉嚨。亦寒暑不時血氣不調所致。鄭  
梅澗醫語云。此證屬足少陰一經熱邪伏其間。蓋其肺金母  
氣。故喉閒發白。陳雨春白喉嚨證論云。此證乃足三陰受病。  
傳之於肺。似與他經無涉。其有兼及他經者。皆後之傳變也。  
然有時疫癆證虛寒。蛾風轉變之別。治法亦迥不相侔。今時  
醫概以時疫目之。治以清涼之劑謬矣。又或變時疫之說。概  
目爲虛寒。治以溫補之劑更謬矣。經云赤屬熱。白屬寒。果如  
所云。則白喉祇有寒而無熱。若概指爲疫。則白喉祇有熱而  
無寒。於理安在。蓋肺屬金。其色白。爲諸臟之華。蓋喉爲肺之

息道。凡風寒之入。內火之熏。肺未有不先受其傷者。肺既受傷。其本色必見。若不辨證脈。因其色白。卽投以桂附炮薑。一遇火證。是謂抱薪救火。愈熾愈烈。而寒證可類推已。

一是編宜分看。合看分看。一證有專治之方。合看各證有通用之方。如除瘟化毒神功辟邪神仙活命諸方。是治時疫白喉專方。亦可兼治乳蛾、喉癰、喉腫諸證。姑舉其一以例其餘。庶臨證不致顧此失彼。

一木舌重舌舌齶蓮花舌牙癰牙宣牙齶走馬牙疳。以及腮癰、繭脣等證。程氏醫學心悟列之咽喉門中。殊不謂然究其源方書皆然。不自程氏始茲仍採入附於咽喉證治之後。每條

加一附字以示區別。

一採方製藥。各以類從。首湯劑。次吹劑。次噙劑。次敷劑。凡一切應用丹丸散錠。均須預爲製備。收儲瓷餅封固。勿令洩氣。若俟臨時始製。則緩不濟急。必致誤人性命。

一醫家治驗之醫案。卽醫家閱歷之功夫。最廣識見。略採數則附後。以備參考。

一是編病證提綱用。分論病證形狀用。精義切要處用。俾閱者一目了然。

一自兵燹後。患喉證者甚多。是編甫出。各直省均無此板。遨遊遠方者。如能重刊廣布。或多帶送人。功德無邊無量。

喉證指南卷首目次

卷一

辨證論

辨證總括

辨經絡

辨寒熱

辨初起病形

辨腫痛

辨面色

辨風涎

辨脈法

辨舌胎

辨小便熱寒

辨飲食

辨脣鼻目

辨白喉

辨氣血寒熱

辨咽喉

辨頭痛熱寒

辨白喉

辨小便熱寒

辨白喉

辨頭痛熱寒

辨白喉

辨頭痛熱寒

卷二

用藥類

用藥總括

宣肺

熱證

寒證

熱盛陽虛

慎用表藥 热證過服涼藥

寒證過服熱藥

解誤藥

旁取法

旁取法

用藥次第

用藥口訣

藥不須忌

白喉四證

白喉兼證

白喉傳染

白喉誤死

服藥後忌

看證防護

用鍼法附

製鍼法

煮鍼藥方

附鍼式圖

鍼穴圖

附

### 卷三

#### 證治類

證治總括

喉痺

緊喉風

慢喉風

纏喉風

走馬喉風

纏舌喉風

啞瘴喉風

弄舌喉風

上嚶癰

鎖喉毒

喉癰

喉閉

喉瘻

乳蛾

喉瘤

喉疔

喉瘻

肉瘻

表裏咽痛

肺絕喉痺

經閉喉腫

梅核氣

時疫白喉

蛾風白喉

癆證白喉

虛寒白喉

舌證附

齒證附

脣證附

鼻證附

腮證附

耳證附

治醫案附

## 卷四

採方類

服劑七十一方

吹劑二十六方

噙劑四方

敷劑十四方

採方總括

服劑加味桔湯

紫地湯

升陽解熱湯

連翹飲

清咽利膈湯

敗毒散

參蘇飲

五積散

溫胃湯

附桂理中湯

子瀉心湯

甘桔湯

雄黃解毒丸

四君子湯

四物湯

少陰桔湯

減八味湯

六味地黃湯

黃連解毒湯

牛黃心丸

清

黏解毒湯

知藥地湯

清露飲

潤燥膏

歸脾湯

廣筆黏鼠湯

加逍遙散

益氣金湯

生脈散

八味丸

滋腎丸

秘授甘飲

人養榮湯

薑附湯

理中湯

四逆湯

半夏桂甘湯

獨參湯

全大補湯

除瘟化毒湯

神辟邪散

神仙活命飲

龍虎二仙丹

清心肺湯

養正湯

銀花四君子湯

陰清肺湯

蟾酥丸

清解毒湯

清胃散

蘆薈消疳飲

陰清肝毒湯

人參粥

清解毒飲

神授衛生湯

雙解貴丸

雙通聖散

鴻黃散

清涼甘露飲

涼膈散

奇藿香丸

天羅散

補中益氣湯

柴胡清肝湯

黃岑湯

柴胡葛根湯

升陽火散

柴胡清肝湯

理陰煎

鎮陰煎

附

立馬飲

附

開關飲

附

回生丹

白降雪散

冰蓬散

搖鼻散

金鎖匙

紫雪散

燒鹽散

寶珍珠散  
八珍散

礬精散

清涼散

捷妙散

赤麌散

消瘤碧玉散

冰片散

麝香散

瓜霜散

青鳳散

涼心散

真功丹

聖功丹

消蘆散

生肌散

血竭散附  
冰蓬散附

萬應丹

柏薑散

火仙方

桐油餳

泥拔毒散

摩風膏

太乙丹

刺異功散

開關散

蒜硝砂散

人中白散

蘆薈散

離宮錠

黃連膏

神功丹附

辰砂定痛散

真君妙散

獨勝散

紫花散

附

萬益丹

附

喉證指南卷一

嚴江寄湘漁父蒐輯

辨證總括

凡辨證必先辨經絡。次辨病形。次辨色脈。次辨寒熱。次辨虛實。虛實初定。雖雜證百出。可一以貫之。如大方脈中有喉科一門。喉科中復有白喉一證。白喉中又分時疫癆證。虛寒蛾風轉變四證。業是科者。非株守喉風無非熱證。白喉無非時疫二語。卽拘執白屬寒三字之說。膠於偏見。有識者所不許也。茲將咽喉各證條分縷晰。一寒一熱。舉以爲對。而寒熱之中。又分輕重。氣血虛實表裏。辨證最爲詳悉。閱者宜留心詳審焉。

辨經絡

考人身十二經中惟足太陽主表別下項餘皆內循咽喉盡得以病之而其中足太陰之脈上膈挾咽連舌本散舌下足少陰之脈循喉嚨挾舌本足厥陰之脈循喉嚨上入頑額下絡舌本凡咽喉病兩關及左尺脈多沉數有力以此觀之病屬足三陰經明矣但咽爲胃之系喉爲肺之系肺胃之氣皆直透咽喉其病雖屬足三陰而其證總不離乎肺與胃

辨初起病形

凡喉證初起預先必作寒發熱喉內或微痛或不痛甚則頭痛煩渴大便秘結小便赤濁切勿認作傷寒證

辨面色

額心鼻脾左頰肝右頰肺顴腎面上之部位可察也。肝青肺白心赤脾黃腎黑。面上之五色可察也。部位察其相生相尅五色察其有神無神。大抵外感不妨滯濁久病忌呈鮮妍。唯黃色見面目既不枯槁又不浮澤爲欲愈之候。此凡病皆然。不獨喉證但須證脈合參不可拘泥。

辨脈法

熱證脈主浮浮細而數爲風熱。其熱輕浮洪而數按之有力爲實火。其熱重按之無力乃是假熱。若沉數而弦長。胃氣絕矣。不治寒證脈主緊浮數而緊爲風寒。其寒輕沉細而遲緊重按不

見爲虛寒。其寒重遲緩而緊。按之有神。其寒在表裏之間。若浮數而弦緊。按之不拘。有力無力。不治。

辨寒熱

辨證宜相天時度地勢審人事。大約夏秋多熱春冬多寒住平洋者多熱住深山者多寒體强者多熱體弱者多寒好酒者多熱好色者多寒少壯者多熱年老者多寒此其大較也。

辨喉色寒熱

熱證滿喉皆紅色或紅絲寒證滿喉皆淡紅色或淡紅絲紅色者重紅絲者輕淡紅色者重淡紅絲者輕。

辨舌苔寒熱

舌乃心之苗。凡病熱證。舌苔或黃或黑燥者。是實熱潤者。是假熱寒證。舌苔必白。或閒黃黑潤者。寒重燥者。寒輕。

### 辨脣鼻目寒熱

脣乃脾之應。熱證脣紅潤者。熟輕燥者。熟重寒證。脣白燥者。寒輕潤者。寒重。鼻孔乃肺之竅。乾燥肺有熱也。流清涕肺有寒也。然有火燥肺而鼻孔燥者。有肺氣將絕而鼻孔燥者。有脾火伏而脣燥者。有胃氣不升而脣燥者。有傷食而脣燥者。有胃氣將絕而脣燥者。俱宜詳審。至目則察其畏風與否。畏火與否而已。

### 辨小便寒熱

熱證小便必赤。赤而熱者。是實熱。赤而不熱。且長而多者。是假。

熱若清長的是寒證矣。

### 辨腫痛寒熱

熱證必腫寒證不腫喉內反大而空亦有虛腫者熱證必痛痛無止息寒證不甚痛或時痛時止。

### 辨風涎寒熱

熱證有風涎風涎少者輕風涎多者重寒證則斷無風涎如係風寒亦有風涎但較清冷耳。

### 辨飲食寒熱

凡熱證畏熱畏辯寒證不畏熱不畏辯可用生薑湯試之熱證飲食喜冷惡熱寒證飲食喜熱惡冷熱證飲水不甚痛喫飯則

痛寒證飲水痛喫飯不甚痛熱證必渴喜飲水喜溫者輕喜冷者重寒證不渴雖渴不多飲水喜溫者輕喜極熱者重熱證不思食亦不能食寒證能食而不甚思食

### 辨氣血寒熱

上午痛者屬氣分下午痛者屬血分氣分實熱風熱風寒等證俱痛無止息虛寒上午痛必至下午方減血分不拘寒熱下午痛必至交子時方減

### 辨頭痛寒熱

凡喉證頭痛不止者屬外感表證也乍痛乍止者屬內傷裏證也偏頭痛者左屬風與血虛右屬痰熱與氣虛

辨白喉寒熱

喉間起白如腐爲害甚速。鄭梅澗云此卽白癰喉風證。如初起脈洪數或沉數有力其候惡寒發熱頭痛背脹偏身骨節疼痛舌微硬有黃苔。喉內或極痛或微痛或不痛而喉內微硬此時疫白喉證也。如初起脈沉細而數或發熱或不發熱其候咽痛而水米難下漸至朽爛形容枯槁此癆證白喉證也。如初起脈沉遲無力其候不惡寒發熱惟喉內起白皮或白塊隨落隨長此虛寒白喉證也。如初起脈浮數有力其候咽喉疼痛或兩邊或一邊紅腫如乳頭是卽雙單蛾治之不善卽變爲白此蛾風白喉證也。此外如白點在外關小舌旁邊者多屬熱在內關小

舌內邊者多屬寒。熱證白點必乾澀。寒證白點必明潤。實熱證其白自外而內虛寒證其白自內而外。熱證白塊浮於肉上起凸。寒證白塊陷於肉內凹而不凸。熱證忌滿喉。白滿喉腫者必閉死。寒證不忌腫。並不忌滿喉。白只忌失音動痰。若失音動痰則不救矣。近見有好奇之輩一遇此證卽用象牙片動手於喉中妄刮其白。是益傷其喉更速其死。豈不哀哉。

辨咽喉不治證

咽喉證或胸前脹急。或咽痛音啞。或唇翻鼻扇。或煩燥神昏。或鍼少商穴無血。或出氣喘促。四肢厥冷。或證脈相反。二便秘結。或面黑頭汗。鼻息閉塞。或咽喉腫爛。乾痛無涎。或潮熱往來時。

發譫語。或面青唇白。鼻流冷涕。或心胸繁滿。吐痰不出。或舌捲  
胸紅面赤浮腫。兩目斜視。或眼直口開。氣出無收。兩手垂散。  
虛陽上攻。腰冷痛癢。不知口中痰多。唇黑。或婦人產前咽喉腫  
痛難忍。心頭疼脹脈浮。此皆不治之證。

### 辨白喉不治證

白喉證。或音啞無聲。或白塊自落。或咽乾無涎。或天庭黑暗。或  
兩目直視。或脣面俱青。或角弓反張。或痰壅氣喘。或汗出如漿。  
或藥不能下。或七日滿白不退。或服藥大便不通。或未服藥大  
便瀉。或大便連瀉不止。或頷下發腫不消。或服藥嘔吐不止。此  
皆不治之證。

喉證指南卷二

嚴江寄湘漁父蒐輯

用藥總括

人之一身百病皆可致危而咽喉之病尤易致危咽喉中有白喉一證尤危之危者不炊黍間斃可立待雖居近良醫之門旋發旋治猶若恨晚而林荒山僻之境更可知已茲於辨證之後採集用藥經驗各方法條分縷晰瞭如指掌俾人人挾是書以防患於未然微特林荒山僻之境不能入市問藥者不啻家有一醫卽居近醫者之門而旣有此用藥經驗之書亦較愈於踵其門而求試其萬有一效之技者矣。

宣肺

咽喉證無論寒熱總宜宣肺不宣肺則熱不退寒必歛加味甘桔湯○鄭氏紫地湯的是要藥

熱證

熱證必先升散服升陽解熱湯再察其熱之輕重投藥輕者服連翹飲重者用清咽利膈湯加減

寒證

寒證如風寒必有表熱宜解表服敗毒散參蘇飲之類虛寒無熱卽有亦是虛熱不必解表先察其寒之輕重投藥輕則服五積散重則服溫胃湯及附桂理中湯之類

熱盛陽虛

邪熱既盛而真陽復虛之證。其脈浮緊而濡下之則恐亡陽。不下則邪熱復熾。此中秘竅人多莫識。宜附子瀉心湯寒熱並用。斯爲有制之兵。

慎用表藥

表藥不過暫藉宣發內邪。使無遏抑。原不宜過用。須審的證候。或涼或溫急宜轉方。蓋表藥多辛竄。過用不但耗散真氣。且虛者必至氣壅。至咽喉乾燥者尤不可用。表藥發汗。此由足三陰精血虛少。不能上滋。若誤汗之。命將難全。

熱證過服涼藥

熱證尚輕。過服大黃。黃連而病愈加者。急宜轉服荆防敗毒散。  
加升麻。遲則恐邪陷。不得出也。若因寒涼傷胃。則必重用附子。  
方克奏效。

寒證過服熱藥

寒證尚輕。過服薑附而見燥證者。不必用涼劑解。擇黃土地掘  
下三尺深。取黃土。用水攪濁。煎服數椀。再審何證。斟酌用藥。若  
係虛寒。誤服硝黃者。其見證與實火無異。舌苔或黃而黑膚。或  
乾而燥。但潤而不渴耳。非用煨生附子莫治。法以生附子一枚。  
用黃土調溼。裹置火內煨。至土乾。取出煎服。如無生附子。用熟  
附片二三兩。煎服亦可。

解誤藥

熱證過服表劑者。雖不愈。尚不死。誤服補劑者。不急解。斷難生。  
虛寒證過服表劑。雖不死。必增劇。誤服下藥者。不急解。必立斃。  
解之之法。熱證誤服表散溫補者。用生菜豆三四兩研細末。冷  
水調服。虛寒證誤服表散寒涼者。用蜜炙附片一二兩噙嚥其  
汁。再酌用寒熱對證飲散煎出。令患者先喫大米粥一椀。然後  
服藥。則誤服之劑卽解除矣。

旁取法

凡喉證勢來猛急。藥力難敵。須急用旁取之法。以分其勢。如喉  
腫宜刺血。喉風宜吐痰。喉癰宜放膿。乳蛾宜鍼破。此皆古法。寓

有精意

用藥次第

喉證初宜疏風解毒。繼則滋水養陰。若元氣漸虛。急顧脾胃。如六味滋水。四君補脾。皆爲要藥。否則真氣虧敗。勢難挽矣。

用藥口訣

喉證用藥多有秘授口訣。如湯劑宜用開水泡蒸。不宜用火熬煎。吹噙藥宜置日中曬研。不宜用火烘焙。外敷藥宜取生質搗研。不宜另加炮製。

藥不須忌

喉科專家傳授各有忌藥。有忌升麻者。有忌細辛者。有忌麻黃。

者有忌白朮地黃者。更有全忌表藥者。種種惡習。遂可懲歎夫。  
證。有必用。雖砒霜皆要藥證不可用。雖參茸皆毒藥。若舍證而  
言藥。何藥不忌。

### 白喉四證

白喉用藥須先辨明時疫癆證。虛寒蛾風轉變四證。如由火毒  
內盛而發白者。此爲疫證白喉。如由蛾風治之不善。久而變白  
者。此爲風證白喉。如初起無惡寒發熱。喉內起白皮。隨落隨長  
者。此爲虛寒白喉。如由真陰虧損。虛火爍金。咽喉久而成白者。  
此爲癆證白喉。疫證殺人最速。且多傳染。宜急治之。風證證異  
治。同宜敗毒去風清火。表不治。補死瀉危。專用吹藥。或恃鍼灸。

均危。虛寒宜桂附。癆證宜熟地。誤危別有喉癰治同疫證。

### 白喉兼證

白喉或寒或熱必兼感雜證。若萬難兼理。只治白喉不理雜病。而雜病自愈何也。病未有不相因也。或白喉已愈而雜證未愈。或白喉已愈而雜病又生。則在醫者變而通之。神而明之也。

### 白喉傳染

白喉不無傳染。然未必因熱證傳染者卽爲熱證。而用涼藥。因寒證傳染者卽爲寒證。而用熱藥。當視人稟受之強弱氣血之虛實下藥。庶無刺謬。

### 白喉誤死

白喉非死證也。惟用藥者止知有熱證。而不知有寒證。或知有寒證。而不知有熱證。以故白喉之死。非死於附桂。卽死於硝黃。是誤於時疫二字者半拘於白屬寒之一說者半甚矣。證之宜審。用藥之宜慎也。

### 服藥後禁忌

凡服藥後切忌風吹。並忌一切酒肉油膩辛 辣之物。愈後猶須禁忌兩旬。或一月。服藥時蔬菜中忌食萊菔。愈後忌。

### 附看證防護

看證。日間令病人向光明處正坐。醫者左手按髮際。右手持箸。按住舌心。細看喉嚨兩邊。是何證看的。再擬方用藥。晚間則用

兩油紙燃。一照腦後。一照口前方。看得明的醫者。亦須自防護。  
不可空腹入病家看證。須先飽食。或飲雄黃酒一杯。或食蒜一  
二瓣。卽不傳染。

附用鍼法

喉風諸證。皆由肺胃臟腑深受風邪鬱熱。風火相搏。致氣血閉  
澀凝滯。不能流行。而風痰得以上攻。結成種種熱毒。非用鍼法  
開導經絡。以助藥力。難期速效。如緊喉風、纏喉風、喉閉、乳蛾、喉  
癰、時疫白喉等證。宜先從少商、少衝、合谷三穴。男左女右。各依  
鍼法刺之。以出惡血。次用蒜泥拔毒散敷經渠穴。以洩毒水。如  
服藥不退。心中惡逆。精神困憊。昏迷不醒。語言不清。疼痛難忍。

者再於舌根底下兩邊青筋上輕輕刺之深以半分許爲度俟放出惡血隨用涼水漱淨其舌底下當中直連上下青筋上切不可刺若誤刺傷筋血出不止立死無救慎之慎之再考人神所在忌用鍼刀如每月初五日人神在口忌鍼上嚙齶雙單蛾喉疔舌根下初六日人神在手忌刺少商少衝合谷諸穴十五日人神在偏身無論何證何穴均不宜鍼刺此外如乙日人神在喉己日人神在手戌日在咽喉亥日在項卯時在面辰時在口項俱忌用鍼刀不可妄施誤人性命所有用鍼各穴道另繪圖列後閱者宜留心而熟玩焉

附  
製鍼法

製鍼須用馬口久銜環鐵翦去兩頭取中間挨舌挨齒一段。以馬屬午。午屬火。火尅金。取尅制能解鐵毒之義也。其煅鍊之法將鐵煅紅錘鍊冷後再煅再鍊去盡鐵屑專取精華照後圖式製煉長約五六寸一頭圓尖一頭三稜尖用蟾酥塗鍼上復入火中微煅勿令紅取起復照前塗蟾酥煅鍊三次乘熱插入臍肉皮之裏肉之外將後煮鍼藥用水三碗煎沸以鍼連肉納於水內煮至水乾傾入清水中待冷將鍼取出於黃土中插百餘下俾去火毒再用細磨石磨光隨用松子油塗之以潔布揩淨須常近人氣方不起銹若以真金銀製鍼用之更妙其鍼式及煮鍼藥另繪圖列方於後。

用  
煮鍼藥方

真磁石

一兩俗名吸鐵石將石用手掌擦熱距鐵鎗二二分遠引之鍼卽搖動者良能引諸藥入鍼內乃鍊醫鍼要藥

真沉香

五錢上有鷓鴣斑點者名黃沉如牛角黑色者名黑沉試之沉水嗅之無香以水磨汁含口內滿口皆香者真

膽礬

二錢圓扁如鷄齒外面微白中透亮如藍色玻璃磨鐵作銅色者真市人多以醋揉青礬偽之

穿山甲

明珠砂

三錢當歸尾三錢川芎三錢沒藥三錢鬱金三錢細辛三錢甘草節五錢

石斛

一錢麝香分上藥可煮鍼十枚如鍼少藥分兩照鍼數減之

附  
鍼式圖

鍼長五六寸一頭圓尖一頭三稜尖式製鍊

附  
用鍼穴圖

# 仰手圖

# 覆手圖

經渠丁少商

少商

少衝

考經渠在手腕寸脈後陷窩中。少商在手大指內側端去指甲角一韭葉許。少衝在手小指內側端去指甲角一韭葉許。三穴均屬肺經。合谷在手大指次指歧骨間。陷中屬大腸經。此四穴是治喉證鍼刺要穴。餘勿妄鍼。

合谷

少商



喉證指南卷三

嚴江寄湘漁父菟輯

證治總括

咽喉生於肺胃之上。咽居喉後能嚥物。應乎地氣。主通利水穀。爲胃之系。乃胃氣之通道也。長一尺六寸。重六兩。屬脾土。其變動爲溼。溼則腫而脹。喉居咽前中央空。應乎天氣。主氣息出入。爲肺之系。乃肺氣之通道也。內九節。長一尺六寸。重十二兩。屬肺金。其變動爲燥。燥則塞而閉。咽喉雖稱並行。其實異用也。人身惟此二關最爲緊要。氣之呼吸食之升降而人命之存亡係焉。凡咽喉之病。挾熱者十之六七。挾寒者十之二三。而風寒包

火者則十之八九。古人開手一方。只用甘草、桔梗三因方。加以  
荆芥。其他牛蒡子、薄荷、貝母、黃連之類。皆出後人增入。可見咽  
喉之病不便輕用寒涼清降之劑。而專主開發升散者。所謂結  
者開之。火鬱發之。是已。及其火勢極盛。則清劑方施。熱結下焦  
而攻法始用。非不得已也。方書雜稱咽喉病有三十六證。命名各  
殊。治法亦異。眩人心目。茲特詳加訂正。不遺不贅。並集時醫治  
自喉方法。擇其平善至效者。次於各證之後。誠以咽喉關要之  
地。命如懸縷。學者宜盡心焉。

### 喉痺

凡喉間腫痛。統名之曰喉痺。經云一陰一陽。結謂之喉痺。王太

僕云一陰者手少陰心一陽者手少陽三焦也心爲君火三焦爲相火二火衝擊咽喉痺痛法當散之清之古人通用甘桔湯加味甘桔湯鄭氏通用紫地湯加減然有虛火實火之分不可不審故下條先列緊喉慢喉二證一虛一實以爲各證準繩

### 緊喉風

緊喉風脈浮數有力實火實證也由膏粱厚味太過致肺胃積熱復受風邪風熱相搏上壅咽喉腫痛暴發甚則風痰壅塞湯水不下聲音難出治法先用三稜鍼刺少商穴出惡血以瀉其熱痰盛者用桐油餞導吐痰涎吐後以甘草湯漱之隨用清茶送服雄黃解毒丸五六丸再以辛烏散加摩風膏內噙外敷吹

回生丹。白降雪散。俟關開後。熱輕者。內服加味甘桔湯。兼用紫地湯加銀花、黃芩。連翹清散之。熱重者。用清咽利膈湯。加減治之。考少商穴。係手太陰肺經所屬。在手大指內側。去指甲角旁韭葉寬便是。

### 慢喉風

慢喉風脈沉遲無力。虛火虛證也。由平素體虛更兼暴怒或過食五辛。或憂慮太過以致脾氣不能中護。虛火易至上炎。其發緩。其色淡。其腫微。其咽乾舌見滑白。胎濁清便利。飲食減少。脣如礬石。午前痛甚者屬陽虛。宜四君子湯加清涼。如麥冬、玄參、桔梗、半夢子之類。午後痛甚者屬陰虛。宜四物湯倍生地。加桔

梗玄參之類不效。用少陰甘桔湯宣達之不效。用加減八味湯加牛夕主之。有虛熱六味地黃湯主之。俱兼用冰蓬散一錢。加燈草煅灰存性三分吹之。

纏喉風

纏喉風脈浮數有力實熱實證也。亦由醇酒厚味太過致肺胃積熱復受風邪上壅咽喉所致。其候麻癩腫痛紅絲纏繞聲音難出。湯水不下。痰涎壅塞之聲頗似拽鋸。初發暴速急鍼少商穴出惡血以洩其熱。用桐油餳導吐痰涎。吐後以甘草水漱淨隨用清茶送服雄黃解毒丸七丸並用辛烏散加摩風膏內噙外敷以散其毒。如或腫勢達外繞及頸項頭面紅如火光藥力。

難敵者用瓷鋒於頸項腫處砭出惡血。以雞子清調乳香末潤之。如或口中腫脹紫黑。用銀鍼輕刺出血。以淡鹽湯洗之。隨吹回生丹白降雪散。俟關開後。熱輕者內服加味甘桔湯。兼用紫地湯加銀花、黃芩連翹清散之。熱甚者用清咽利膈湯加減治之。此證雖與緊喉風相似。而病勢險惡尤甚。若非吐痰解毒。煎丸並進。刀鍼砭石。按法施治。鮮克有濟。

### 走馬喉風

走馬喉風脈浮數有力。由邪熱客於心肺火熾所致。喉舌之間暴發。暴腫轉腫轉大。不速治卽殺人。急用鍼點刺出血。以鹽湯洗之。吹冰蓬散外敷。救急異功散。內服加味甘桔湯加銀花一

二兩兼用紫地湯加減閒服之。若牙關緊急，則用搐鼻散吹鼻。  
中隨以雄黃解毒丸、醋磨七丸灌之。兼用太乙紫金丹噙嚥其  
汁更佳。此丹治咽喉諸證，無往不神驗也。

### 癟舌喉風

癟舌喉風脈浮數有力，其證硬舌根而爛兩旁，此由脾腎火鬱  
所致。急服紫地湯吹冰蓬散，噙太乙紫金丹緩則不救。爛處須  
先用甘草水漱洗淨，然後吹藥。

### 啞瘡喉風

啞瘡喉風脈浮數有力，證與緊喉風相類。由肺胃蘊熱積久，生  
痰外復受風邪，與痰熱相搏壅塞，咽膈之上而成。初起咽喉腫

痛湯水難嚥。語言不出牙關緊急。此屬險候。急用雄黃解毒丸。水化五六丸。用細竹管將藥水吹入鼻孔。直達咽喉。藥入作嘔。卽令吐之。其牙關頓鬆。咽喉卽漸開。先與清米湯飲之。次服清咽利膈湯。噙辛烏散。吹冰蓬散。外敷救急異功散。用藥不應者。陰。若唇黑鼻流冷涕者逆。

弄舌喉風

弄舌喉風脈浮數有力。由心脾實火。與外寒鬱遏凝滯而成其候。咽喉腫痛痰涎堵塞。音啞言澀。舌出不縮。時時攬動。覺舌脹悶。常欲以手捫之。急鍼少商穴出血。口噙蟾酥丸。徐嚥藥汁。若痰涎上湧。不能嚥藥者。急用桐油錢探吐痰涎。隨服清咽利膈。

湯吹金鎖匙。若喉內起如松子。如魚鱗狀。不堵不塞者。此係虛陽上浮。不宜鍼刺。急用蜜炙附子片噙嚥其汁。卽效。鄭梅澗云。此卽喉風三十六證中之魚鱗風。松子風證。不可妄用鍼刀。宜服紫地湯。便秘者加犀角木通。玄明粉一錢。兼用辛烏散。冰蓬散。相間吹噙勿斷。自然獲效。

上噦癰

上噦癰亦名懸癰。生於口中上。噦其脈浮數有力。由心脾二經蘊熱而成形。若紫葡萄舌。難伸縮。口難開合。鼻中時流紅涕。令人寒熱大作。輕者宜服加味甘桔湯。紫地湯。重者宜服黃連解毒湯。加桔梗。玄參。均用冰蓬散。紫雪散。辛烏散。太乙紫金丹。相

間吹噙。或日久腫硬下垂不潰。用鍼輕輕點破癰頭。以鹽湯攬淨瘀血。若是生在上腭中間。乃七竅相連之處。萬勿誤用鍼刀。宜用燒鹽散。日點四五次。仍吹冰蓬散。服加味甘桔湯。紫地湯。此證若過時失治。或口耳鼻中有一處出膿血者。即是毒氣上攻頭腦。月穿七竅。必致不救。

鎖喉毒

鎖喉毒脈浮數有力。由心與小腸積熱外感風寒凝結而成。初生於耳前聽會穴。形如瘰癧。漸攻咽喉。腫塞疼痛。妨礙飲食。證須速治。宜服牛黃清心丸。開關解熱。兼服清咽利膈湯。吹冰蓬散。並用太乙紫金丹。內噙外敷。方能成功。考聽會穴係膽經所

屬在耳珠下。動脈宛宛中。開口有空側臥。張口取之。卽是。

### 喉癰

喉癰脈浮數有力。實熱實證也。初起脈洪數有力。自頭至胸皆腫痛異常。口不能張。食不能下。頸前結喉兩旁探之有核。此由足厥陰肝足陽明胃二經火毒上攻所致。法用生土牛夕根煎水服數次。引熱下行。再按第二十五條治時疫白喉方法治之。自能見效。

### 喉閉

喉閉證脈浮數有力。由肝肺火盛復受風寒相搏而成。其候面赤腮項漫腫。喉中有塊如拳。湯水難嚥。語言不出。暴起身發寒

熱急刺少商穴出血。或鍼合谷穴以開咽喉。初宜疎散。服荆防敗毒散。寒熱已退。卽酌用清咽利膈湯兼吹紫雪散。隨以薑汁漱口。以宣其熱。或用醋漱。以消積血。痰涎壅塞者。桐油錢探吐之。作膿脹痛者。防透咽喉。不可輕鍼。急用皂角末吹鼻取嚏。並以皂角末醋調厚敷項腫處。少項其腫。卽破。初腫時宜用生羊肉片貼之。又有酒毒喉閉。由酒毒蒸於心脾二經。熱壅咽喉。喉腫色黃。其人面赤目睛上視。仍以桐油錢導吐痰涎。內服鼠黏解毒湯。亦用紫雪散吹之。

### 喉痟

喉痟證。脈細而數。由腎液久虧。相火上炎。消鑠肺金所致。初起

微腫微痛。噦涎淡紅。覺咽喉乾燥如毛草。常刺喉中。日久腫痛漸增。聲啞痰臭。破爛腐衣疊若蝦皮。遂致妨礙飲食。胃氣由此漸衰。而虛火益盛。煩燥者宜知柏地黃湯。吐酸噦涎者宜清露飲加川連。便燥者兼服潤燥膏。面脣恍白。貪眠嬾食者宜歸脾湯加酒炒黃連。腫吹紫雪散。腐吹入寶珍珠散。或可十全一二。

喉癬

喉癬。右脈浮數。由過食炙燙藥酒五辛等物。以致熱積於胃。胃火熏肺而成其候。咽喉乾燥初覺時。癢旋生苔蘚。色暗木紅。燥裂疼痛時。吐臭涎妨礙飲食。宜服廣筆鼠黏湯。未潰吹礬精散。已潰吹清涼散。患者清心寡欲。戒厚味發物。或者十全一二。若

呻吟指掌 卷三  
失治兼調理不謹致生徽爛延漫開大疊起腐衣旁生小孔若蟻蛀蝕之狀多致不救

### 乳蛾

乳蛾脈浮數有力實熱實證也有單有雙雙者輕單者重由肺經積熱受風邪凝結感時而發生咽喉之旁狀如蠶蛾其候咽喉紅腫疼痛難以吞嚥或惡寒發熱或不惡寒發熱生於關前者形色易見吹藥易到手法易施則易治生於關後者形色難見吹藥難到手法難施故難治初起切勿妄施鍼法宜用捷妙散吹鼻中打噴嚏四五次卽消不效再按法施治先以摩風膏少許入辛烏散井水調噙並以鵝翎挑塗蛾上令患者閉目噙

長久俟滿口痰來吐出再吹赤磨散冰蓬散外敷救急異功散  
輕者內服紫地湯重者兼用清咽利膈湯加減易見者膿熟鍼  
之難見者用鷄翎探吐膿血若兼痰壅氣急聲小探吐不出者  
陰急鍼少商穴出紫血仍吹服前藥緩緩取效

### 喉瘤

喉瘤脈微數無力虛證也由肝肺二經鬱熱更兼性躁多言損  
氣而成形如圓眼紅絲相裹或單或雙生於喉旁不犯不痛或  
因醇酒炙燙或因怒氣喊叫犯之則痛最忌多言耗神戒用鍼  
刀宜服加味逍遙散益氣清金湯點消癰碧玉散並用夏枯草  
鬱金煎水代茶飲日久自然消退

喉疔

喉疔脈浮數多生外關小舌旁邊形似韓釘但差長耳多由心肺二經火毒所發先用鍼輕輕點破疔頭吹點冰片散隨用甘桔湯重加白菊花煎服蓋菊花連根帶葉皆消疔之聖藥也每用四兩加甘草五錢煎湯頓服一切疔毒皆能消散生津尤效。

喉瘡

喉瘡形如粟米有虛實二證實證由於風熱初起必作寒熱瘡色紅黃右脈浮數有力此因平昔過食煎炙熱積胸膈兼新受風邪感觸而發治宜先用辛烏散調噙導去痰涎若瘡勢灌膿以銀鍼挑破隨用荆芥湯洗之吹冰片散服紫地湯其上腭生

瘡者脾熱也。舌上生瘡者心熱也。治如前法。虛證由於內傷多因咳嗽吐血之後而發。初起不作寒熱。惟內熱口渴兩尺脈浮數無力。其瘡色白燥不潤。此乃真陰虧損相火上炎。肺金所致。若以六味補水。其水不能驟生。以參麥保肺。而久炎之金又非參麥能療。以八味降火。而咽喉之地難受桂附之性。以滋腎丸互治水火。而水火不能既濟。惟急用甘露飲治之。使水火各安其位。得以濬其源而安其流。能導龍歸海。俾五行自有相生之象。然後再察色脈分別治之。或六味或歸脾或養榮諸方佐之。自然獲奏神效。此證若過時失治。雖有靈丹亦屬無濟。

肉。毬。脈。如。常。生。於。咽。喉。之。上。舌。根。之。旁。有。肉。線。長。五。寸。餘。吐。毬。  
出。方。可。飲。食。以。手。輕。捻。痛。徹。至。心。多。是。心。脾。二。經。鬱。熱。所。致。用  
甘。桔。湯。加。疎。風。降。火。藥。每。服。加。麝。香。二。分。再。吹。以。麝。香。散。肉。線。  
自。化。而。愈。若。妄。用。鍼。刀。傷。斷。肉。線。即。不。可。救。

### 表裏咽痛

咽。痛。有。表。裏。寒。熱。之。分。不。可。不。辨。如。感。冒。風。寒。在。表。而。兼。咽。痛。  
者。脈。必。浮。緊。此。風。火。聚。於。肺。也。宜。用。甘。桔。湯。加。荆。芥。防。風。薄。荷。  
枳。殼。牛。蒡。之。類。以。散。之。若。足。少。陰。裏。證。兼。咽。痛。者。以。少。陰。之。脈。  
循。喉。嚨。挾。舌。本。也。宜。分。寒。熱。治。之。如。傷。寒。傳。經。少。陰。口。燥。舌。乾。  
而。咽。痛。者。其。脈。沉。細。而。數。甘。桔。湯。主。之。甚。則。加。黃。連。玄。參。牛。蒡。

之屬如寒邪直中少陰逼其無根失守之火浮游於上以致咽痛者其脈沉細而遲必兼下利清穀手足厥冷諸證但溫其中治其寒而咽痛自止宜薑附理中四逆等湯加桔梗主之復有伏氣咽痛此乃非時暴寒潛伏足少陰經越旬日而後發當用辛溫以散半夏桂枝甘草湯主之更有發汗過當內損津液而成咽痛者宜用參耆歸朮調補元氣收斂汗液而痛自除總之咽痛宜通用甘桔湯加減投治在表者加散藥在裏者分別寒熱加溫涼藥無有不效者

肺絕喉痺

肺絕喉痺此由喉痺日久頻服清降之藥以致痰涎壅於咽喉

聲如搜鋸。此肺氣將絕之候。證在難治。宜用獨參湯加橘紅兼進十全大補湯。早服者可救十中之二三。

經閉喉腫

經閉喉腫脈微數。由婦女中情鬱結。經水不調壅塞。經脈所致。宜用四物湯加牛夕。茺蔚子。香附。桃仁。服之俾經脈流通。其腫自消。

梅核氣

梅核氣脈如常。男婦皆同。喉中如有物吞不入。吐不出。宜用甘桔湯加蘇梗。橘紅。香附。金沸草之類。漸次可愈。

時疫白喉

時疫白喉一證乃纏喉急痺至危至險小孩血氣未充尤易傳染初起脈洪數或兩關左尺沉數而躁其候惡寒發熱頭痛背脹偏身骨節疼痛狀類傷寒初無形迹可見唯舌微硬有黃苔頰頸微腫喉內或極痛或微痛或不痛而喉內微硬與傷寒無異有隨發而白隨見者有至二三日而白始見者或由白點白條白塊漸至滿喉皆白治法皆同若誤投表劑致毒散滯或擅用硝黃誅伐無過或辨證未明率投平淡之劑此爲優容養茲必至病入膏肓治法初起用葛根蟬退殼蠶以散風退熱用牛蒡連翹金銀花土茯苓以消腫敗毒用玄參地黃天門冬麥門冬以清金生水用黃芩黃連生梔仁山豆根生石膏以瀉火救

水用木通澤瀉車前子以引熱下行重者酌加馬勃龍膽草。每日另用生土牛夕根或於未服藥之先既服藥之後煎水閒服再以萬年青搗汁或服或噙又每日食生青果十數枚如無生青果卽用乾青果煎水當茶飲輕者以除瘟化毒散主之重者以神功辟邪散主之再重者以神仙活命湯主之輕者日服一二劑重者日服三四劑將疫毒由上焦引至下焦俾從二便而出二便通利火毒下行此爲吉兆若大便閉塞少加元明粉便通卽去服藥後喉內或白收緊或白稀疎或白微亦或白轉黃此卽藥之功效若日服藥二三劑而白不退連服十數劑而白愈有加治者當詳審病源細察脈情或舌苔黃黑喉燥脣焦或

小便短澀而黃或大便瀉泄帶黑此乃火毒凝結臟腑病勢過重藥力尙輕應兼服龍虎二仙湯如或熱毒堵塞咽喉呼吸不通用雄黃解毒丸五分日噙以津液徐徐送下卽通然究係厲劑不宜輕用多服白點退完後當用清涼之劑收功以清心滌

肺湯主之日服一劑二三劑即可撤盡餘毒再服養陰之劑以

養正湯主之脾胃素弱者兼服銀花四君子湯總賴以圓機行活法也如遇牙關緊閉不能看證者以烏梅擦牙卽開不效用開關散又或初起之時及服藥後咽喉痛不可忍神疲音啞者

急鍼少商穴出惡血用蒜泥拔毒散敷經渠穴出毒水用秘製青梅乾口噙取津先吐後嚥再用瓜霜散白降雪散吹之如咽

喉、頸、項、腫、痛、以、救、急、異、功、散、敷、之。痰、涎、壅、甚、者、用、桐、油、餞、頻、塗、喉、內、導、吐、其、痰、或、用、辛、烏、散、冷、水、調、噙、均、能、見、效。以、上、各、方、法、除、癆、證、白、喉、寒、證、白、喉、外、凡、乳、蛾、喉、癰、及、喉、內、腫、痛、諸、證、均、可、按、方、依、法、治、之。但、藥、味、須、視、其、人、之、強、弱、察、其、證、之、輕、重、酌、量、加、減、耳。按、經、渠、穴、係、手、太、陰、肺、經、所、屬、於、手、腕、寸、脈、後、陷、窩、處、取、之、便、是。又、考、鄭、梅、潤、治、白、喉、悉、用、大、劑、養、陰、清、肺、湯、吹、青、鳳、散、投、之、多、效。並、錄、以、備、急、用。

### 蛾風白喉

蛾風白喉脈浮數有力由乳蛾治之不善則氣閉不起日久轉變白喉爲禍甚烈先用生土牛夕根煎服引熱下行再以治時

疫白喉方法治之。或兼用鄭氏大劑養陰清肺湯。自可獲效。

### 癆證白喉

癆證白喉脈沉細而數。按之無力。由陰虛火燥所致。非時疫白喉證也。其候咽喉痛極。而水米難下。漸至朽爛。形容枯槁。面目憔悴。宜用鄭氏大劑養陰清肺湯。重加生熟二地。兼吹青鳳散。不可間斷。服至白退。痛減方止。若以此證誤認爲時疫白喉治以時疫白喉方法。差之毫釐。失之千里矣。

### 虛寒白喉

虛寒白喉脈沉遲無力。由秉質素弱。兼感寒邪所致。非時疫白喉證也。初起無惡寒發熱。飲食如常。惟脣白面青。精神疲倦。喉

內起白皮或白塊隨落隨長非附桂不愈宜多服溫胃湯附子  
理中湯白退自安若以此證誤認爲時疫白喉治以時疫白喉  
方法必致不救

附舌證

凡舌腫木硬不能轉動曰木舌舌上血脉脹起狀如小舌曰重  
舌舌下浮腫靠牙根連起數瓣曰蓮花舌皆由心脾火熾所致  
脈多浮數宜先用水洗去舌上白垢若有黑點可於黑點上輕  
輕鍼破出血惟蓮花舌只可於左右邊瓣上鍼之中瓣切勿妄  
鍼蓋舌下當中有一筋直連上下若誤傷筋立死無救此數證  
均宜用辛烏散冰蓬散相間吹噙內服紫地湯加連翹黃連舌

疔證亦由心脾火毒而成舌上起紫泡如豆堅硬寒為疼痛應  
心初起宜用蟾酥丸含於舌下隨化隨嚥或先服三粒以解內  
毒甚者於疔頭上鋸之內用黃連解毒湯重加白菊花煎服兼  
用紫雪散吹噙徐徐燕之舌劙證專由心火上炎致血熱妄行  
其候舌上生孔如鍼尖血出不止熱甚孔色紫黑須防腐爛宜  
服清熱解毒湯倍生地加犀角或用甘桔湯重加生地丹皮兼  
吹涼心散冰片散帝中風證卽俗名小舌風此亦由心脾火熾  
所致初起多痰小舌紅腫作痛不能飲食日久漸長大出來甚  
有長出寸許攔腰爛去半截或小舌全行爛去者雖屬惡證仍  
爲無害治法先用辛烏散冰蓬散相間吹噙內服紫地湯忌用

鍼刀如日久小舌黑爛者回生丹不宜用當以真功丹去牙硝吹之或聖功丹相間互用至於水劑仍以紫地湯加減出入投治不可拘執呆方也

附齒證

牙疔牙癰牙齶牙宣合架風等證脈多浮數皆由陽明胃經溼熱火毒上攻所致牙疔生兩旁牙縫腫起一粒形如粟米痛連腮項急用鍼挑破出血先以蟾酥丸噙化徐徐嚥之再服黃連解毒湯牙癰初起牙牀腫痛隨生癰毒宜先用辛鳥散冰蓬散相間吹噙再服紫地湯清胃散用陳茶薄荷金銀花煎水頻飲牙宣牙根宣露於外牙齶牙縫出血不止治同牙癰合架風在

上下牙牀盡根句合之處起一紅核腫痛難忍甚則關緊閉  
不能開口宜先用辛鳥散調噙次用鍼輕輕點破出血吹冰蓬  
散赤塵散內服紫地湯清胃散如患者畏鍼刀用燙蘆散熏之  
卽破後難於收功用生肌散吹之至走馬牙疳多由癧疾積  
火痘疹餘毒上攻而成其候牙根作爛隨變黑腐臭穢難聞治  
法由癧疾積火攻牙者初宜服蘆薈消疳飲由痘疹餘毒所中  
者初宜服清肝解毒湯脾胃虛弱者兼服人參茯苓粥外勢輕  
者用人中白散擦之若堅硬青紫漸腐穿腮齒搖動者用蘆薈  
散擦之凡牙疳見紅肉流鮮血者吉若頑肉不脫腐爛漸開身  
熱不退者皆屬逆證再牙疳愈後最易復發惟慎飲食者可免

如山藥栗子鵝蟹甜幹燒炙煎燙等物俱宜痛戒

附脣證

脣病右脈浮數其證有四曰脣疔曰脣疽曰脣風曰繭脣俱由脾胃火毒結聚而成脣疔生脣稜偏裏初起寒熱交作痛癢麻木宜按疔門用蟾酥丸五味消毒飲汙之忌用灸法脣疽腫硬木痛形似小棗初起寒熱交作宜服神授衛生湯裏實者雙解貴金丸外塗離宮錠脣風初起發癩色紅作腫日久破裂流水痛如火燎宜內服雙解通聖散外抹黃連膏繭脣上起小泡如豆粒漸長似蠶繭堅硬疼痛初起宜用蒜片艾綿灸之再用蟾酥丸磨塗內服瀉黃散清涼甘露飲便秘者兼用涼膈散

附鼻證

鼻證右脈浮數。其名不一。俱由肺經鬱熱與外感風邪上攻所致。如鼻竅腫塞痛引腦門。脣腮浮腫。此鼻疔證也。宜蟾酥丸。汗之並用蟾酥丸研末吹入鼻竅外塗離宮錠。太乙紫金丹。再以加味甘桔湯加白菊花煎服。如鼻竅時流黃水濁涕。此鼻瘻證也。宜奇授藿香丸服之。若久而不愈。鼻中淋瀝腥穢血水頭眩暈而痛者。此蟲蝕腦也。宜用天羅散兼服補中益氣湯。如鼻內生如石榴子漸大下垂色紫微硬擰塞鼻孔者。此名鼻痔宜服辛夷清肺飲。外點硝砂散。如鼻竅內初覺乾燥疼痛狀如粟米或鼻外紅腫痛似火灸。此名鼻瘡宜黃芩湯清之外用油紙撫。

黏辰砂定痛散送入鼻孔兼用黃連膏抹之。

附  
腮證

腮證一名腮癰一名穿腮發初起均寒熱往來脈浮數有力腮癰生腮下無論左右總發端於陽明胃熱宜先用辛烏散冷水調噙次用瓷鋒於焮腫紫黑處砭出惡血內服柴胡葛根湯吹冰片散緩緩取效穿腮發起於耳前連及腮頰乃手少陽三焦足陽明胃二經風火所致初起熱不甚者宜服升陽散火湯外以清胃散擦牙真君妙貼散敷腮自能取效此二證皆繞喉焮腫若初起過服涼藥致毒攻喉者險。

附  
耳證

耳證脈如常或浮數其候耳內悶腫出膿因膿色不一而名亦各殊如出黑色臭膿者名耳疳出青膿者名震耳出白膿者名纏耳出黃膿者名停耳俱由胃溼與肝火相兼而成概用柴胡清肝湯主之兼用太乙紫金丹辛烏散相間噙敷自能獲效

### 治驗醫案

常僊珊患白喉初起惡寒發熱寢食爲艱延張善吾診視是時疫白喉證治以除瘟化毒散日服三劑病加沉重改用神功辟邪散仍日服三劑連日投之病無增減其家驚恐異常善吾曰此證危險雖四五日服藥十餘劑實因藥不勝病縱不見減亦未有加特恐信任不專另更別方必生敗證其家深信之善吾

又以神仙活命湯投之。白點稀疎。其家猶未之知也。而善吾已知其大有起色矣。十日內食不下咽。投藥三十餘劑而白退盡。方能飲食。以清心滌肺湯收功。後談及諸證。始知僂珊深於醫術。故信之堅。此見證確。信任專服藥守方之明驗也。

周堯階患喉證。自頭至胸皆腫痛。口不能張。食不能下。經十餘日。衆醫束手。延善吾診視。尙無敗證。細探頸左右。各有一核。知爲喉癰。以土牛夕根煎服數次。引熱下行。隨服除瘡化毒散二劑。喉內痰涎湧出不移時。吐膿一日夜約三四椀之多。病稍減。復用神功辟邪散。神仙活命湯加減去土茯苓。金銀花。馬勃。日二劑。服至十餘劑。始愈。此證異治同。加減合法之明驗也。

周姓女患白喉脣白面青精神疲倦無惡寒發熱證喉內白塊隨落隨長飲食如常服消風敗毒藥不效善吾診視脈沉遲無力知爲虛寒投附子理中湯而愈此虛寒用熱劑之明驗也馬媼年逾六旬患喉痛忽然音啞無聲無惡寒發熱而喉內亦無白點此爲風寒入肺善吾投羌活麻黃而愈但表藥爲白喉所最忌非審證明確不可妄投此審證用藥之明驗也

張姓患白喉小舌旁一邊一點脈浮數而細延黃再生診視先用敗毒散繼用連翹飲未服而再生有故他往其家恐藥力太輕證不可用重劑之明驗也

周姓婦懷孕數月。病白喉月餘。因不甚痛。兼有雜證。其家並不  
知爲白喉。一日偶言喉痛。視之內關盡白。冉生曰。幸而未服涼  
藥。急與溫胃湯數日而愈。夫附子半夏孕婦忌藥也。竟無恙。後  
生一女。此虛寒用溫補之明驗也。

某富翁五十得子。護惜甚。凡食物稍寒。不許入口。忽患白喉。痛  
極。冉生視之。知有積熱。用清咽利膈湯。翁不與服。冉生辭去。後  
醫迎其意。與以附尤。三日死。此實熱必用寒涼之明驗也。

周姓有子三。俱患白喉證。伯與季已死。人薦冉生往視。其仲白。  
將滿矣。服理中湯而愈。後其家傳染者三人。一五積散。一連翹  
飲。一理中湯而愈。此傳染不可拘方之明驗也。

喉證指南卷四

嚴江寄湘漁父菟輯

採方總括

古人製方。佐使君臣配合恰當。從治正治。意義深長。如金科玉律。以爲後人楷則。惟在善用者。神而明之。變而通之。如淮陰背水陣。諸將疑其不合兵法。而不知其正在兵法中也。茲將喉科應用諸方。擇其理法兼備者。分湯劑。吹劑。噙劑。敷劑。挨次採登。其證中未收用者。載一附字以別之。復於湯劑中。分寒熱輕重。氣血虛實。吹噙敷劑中。區別宜忌。如風痰積熱。宜清輕寒涼。忌用辛溫。咽痛惡寒。宜薑汁漱口。忌用收滯。婦人有孕咽痛。忌用。

麝香久病氣血兩虛。臟寒喉痛。忌用冰片。以二味辛香走竄。反致昏曠墮胎也。餘可意會類推。

服劑

加味甘桔湯。通治咽喉痺火鬱在肺。

喉證通劑

甘草一錢。桔梗一錢。荆芥牛蒡子炒川貝各一錢。薄荷四分。水煎服。內熱甚或飲食入口卽吐。加黃連口渴舌燥。加黃芩黃柏。黃連梔仁。燉腫加金銀花。

紫地湯。統治喉風三十六證。百發百中。至神至奇。

喉證通劑

紫荆皮。小生地各二錢。淨茜草一錢。又名地蘇木。荆芥穗。防風。

京赤芍。牡丹皮。芽桔梗各八分。蘇薄荷葉。生甘草各六分。

北細辛四分去茹引加燈心二十節。茜草藤一錢。開水泡藥蒸服。  
證輕者日二服。證重者日三服。加減法。孕婦去丹皮加。

四物湯。熱甚加連翹犀角。頭痛閉塞加川芎撫白芍。煩渴。

加天花粉大元參。潮熱加柴胡黃芩。咳嗽加麥冬知母。

大便秘結小便赤濇加木通。數日不大便者加元明粉。

熱壅肺閉氣息喘促加麻黃五分先滾去浮沫再入藥內合蒸。

痰稠者加川貝。陰虛合四物湯。

升陽解熱湯。治咽喉風熱初起。熱證輕劑

芽桔梗 荆芥 紅柴胡 防風 川貝母各一錢 薄荷

連翹去心去射干 牛蒡子炒前 胡殼蠶各一錢 升麻八分 蟬退五分 薄荷

呻吟指掌 卷四  
生薑片一水煎食遠服。

連翹飲。治肺胃邪熱。熱證輕劑。

連翹 葛根 牛蒡子 元參 黃芩 桔梗各二錢 赤芍

梔仁 淡竹葉 甘草 木通各一錢 升麻六分 水煎服。

清咽利膈湯。治肺胃積熱。與新受風邪相搏。上壅咽喉。咽腫喉痺。及緊喉纏喉乳蛾喉閉等證。熟證重劑。惟此方最妙。餘宜慎用。

荆芥 防風 連翹去心 牛蒡子 炒芽桔梗 薄荷 甘草

金銀花 玄參 黃連 生梔子 黃芩 大黃 芒硝

淡竹葉各一錢。水煎食遠服。

荆防敗毒散。治風熱風寒初起。寒熱輕劑。

荆芥 防風 羌活 獨活 紅柴胡 前胡 陳枳殼 燥

潞黨參 芽桔梗 川芎 白茯苓 甘草各一錢 薄荷葉六分

生薑三片 水煎服。

參蘇飲。治內傷外感。寒證輕劑

潞黨三錢 紫蘇八分 葛根 前胡 製半夏 茯苓各二錢 陳皮

桔梗 一枳殼 甘草各一錢 木香五分 生薑一片 葱白一寸 水煎服。

五積散。治寒積食積氣積血積痰積。寒證輕劑

麻黃五分 桂枝五分 白芷 厚樸製法夏 陳皮各六分 枳殼七分

當歸酒

川芎

白茯苓

白芍

酒

甘草

桔梗各八分

乾薑三分

加生薑一片 蔥一寸 水煎服。

溫胃湯 治脾胃虛寒。脹滿上衝飲食不下。寒證重劑。

潞黨參 白朮土炒附片、乾薑各二錢、當歸酒洗、白芍酒炒、川椒

厚樸製、法夏 陳皮 甘草各一錢，炙水煎服

附桂理中湯 治虛寒。卽理中湯加附片、肉桂水煎服。

寒證重劑

附子瀉心湯 治熱盛陽虛。心下痞滿惡寒汙出。

熱證重劑

大黃 黃連 黃芩各一錢六分合煎熟，附子一枚泡去皮，別煮汁兌服。

甘桔湯 治咽喉痺。

咽喉通劑

甘草 桔梗等分水煎服。

雄黃解毒丸 治一切急喉痺極危證。險證重劑。

明雄黃一兩，色赤似雞冠，明微不臭者良。

川鬱金一兩，體銳圓如蟬肚，外黃內赤，微香味苦，蒂甘者真。

巴豆十四粒去殼去油淨共研極細醋煮麪糊爲丸如菉豆大。每服七丸清茶送下或含噙津液徐徐嚥下吐出痰涎立卽取效。如已垂危心頭猶溫急用烏梅擦開牙齒研末灌之但得下咽無有不生。如小兒驚熱痰涎壅塞或二丸三丸量兒大小斟酌服之亦神效。

四君子湯。治氣虛倦怠少食。氣虛之劑。

潞黨四錢白朮土炒一錢茯苓各二錢甘草一錢加生薑大棗水煎服。

四物湯。治一切血虛血燥。血虛之劑。

熟地四錢九製當歸三錢酒洗白芍二錢川芎一錢水煎服。

少陰甘桔湯。治慢喉風午後作痛作渴忌用苦寒者。

芽桔梗二錢甘草一錢川芎 黃芩 陳皮 立參 柴胡各六分

升麻

羌活各四錢

蔥白一根水煎食遠服

加減八味湯。

治虛火上炎。引而歸元。陰虛之劑。

熟地

四錢九製

山萸肉去核

各二錢

丹皮

茯苓

澤瀉

各一分

各一錢

肉桂

五錢分

各五錢

水煎服。

六味地黃湯。

治腎水真陰不足。

血虛之劑。

大熟地

八錢九製

山萸肉酒潤

各四錢

淮山藥

各二錢

牡丹皮

白茯苓

建澤瀉

各三錢

水煎溫服。

黃連解毒湯。

治一切陽熱實火。

熟證重劑。

黃連

黃芩

即牛蒡子

黃芩

生梔子

各二錢五分

水煎服。

牛黃清心丸

治緊喉鎖喉熱阻關竅痰涎壅塞等證

解痰熱重劑

九轉膽星

兩明雄黃 黃連

各二錢

茯神 立參 天竺黃

五倍子

荆芥 防風

桔梗

蟬蛻

犀角 當歸

京牛黃

八分冰片

麝香 珍珠

各六分豆腐煮

各研極細末共合一

處再研勻甘草熬膏和丸如龍眼大硃砂水飛一錢爲衣日中曬乾收入瓷瓶內將瓶口用黃蠟封固勿令洩氣臨服薄荷湯化下一丸按牛黃丸方頗多其功效俱在搜風化痰甯心通竅如非痰涎壅熱阻關竅不宜輕服

鼠黏解毒湯

治喉閉酒毒閉等證

解熱輕劑

鼠黏子炒桔梗

青皮 升麻

黃芩 花粉 生甘草

立參 生梔子 捲川黃連 連翹

去葛根 白朮土炒 防風

生地黃

各等分

水煎食後服。

知檗地黃湯

治陰虛火動

卽地黃湯加知母黃檗之劑

清露飲

治慢喉風脈虛大面赤咽乾不渴

虛熱之劑

天冬

去心麥冬

生地 熟地

九製黃芩

枇杷葉

蜜炙鮮石斛

陳枳殼

炒熟茵陳蒿

甘草

各等分

水煎食後服。

萬氏潤燥膏

治陰虛喉痛

潤燥之劑

豬脂

一斤煉去渣

白蜜

一斤煉熟

二味合攬候凝。每服二匙日三次。

歸脾湯

治怔忡驚悸

脾傷之劑

潞黨

錢白朮土炒

茯神 藜仁

研黃耆

龍眼肉

各二錢

當歸

酒洗

甘草炙各一錢。遠志去心各一錢。木香分五分。煨薑三片。大棗三枚。水煎服。

廣筆鼠黏湯。治喉癬。解毒之劑。

生地黃川貝母各三錢。去心各三錢。玄參。甘草各二錢。鼠黏子研炒。

花粉射干連翹各二錢。白僵蠶一錢。苦竹葉一錢。水煎飢時服。

加味逍遙散。治肝家血虛火旺咽喉乾痛。

解鬱之劑。

柴胡一錢。當歸半錢。洗白芍酒炒。白朮土炒。茯苓。牡丹皮。梔子各一錢。

薄荷八分。甘草五分。加煨薑一片。水煎食。遠溫服。

益氣清金湯。專治喉癌。清熱平劑。

生潞黨參川貝心桔梗各二錢。麥冬去心牛蒡子炒黃芩各一錢。研黃芩五分。

白茯苓陳皮生梔仁薄荷生甘草淡竹葉各一錢。

紫蘇水煎溫服

生脈散。治火熱傷肺保肺之劑。

人參五分。晉者以西洋參五錢代之。麥冬五分。五味子七粒。水煎服。

八味丸。治命門火衰。卽六味地黃丸加熟附子、肉桂各一兩。

煉蜜爲丸。火衰之劑。

滋腎丸。治熱在下焦。小便癃閉而口不渴者。滋腎之劑。

黃柏酒炒。知母各二兩。肉桂一錢。煉蜜爲丸。

秘授甘露飲。治真陰虧竭。火炎灼肺。虛損失血。內熱發爲咽瘡喉癬。喉瘡等證。降陰火神劑。

取童便半酒罐。要罐口大者。先用鐵絲作四股絡子。懸飯碗。

一箇於罐內約離童便三寸許用鉛打成兩笠式作蓋反蓋  
罐口四圍用鹽泥封固外加皮紙數層糊密勿令漏氣再用  
磚搭成爐將罐安放於上用桑柴文武火燒煉一柱香久去  
火候溫再將鉛蓋輕輕取起勿令泥灰下落則罐中所懸椀  
內自有清香童便露一椀取出另傾茶椀內令病者每日早  
晚服一鐘自有神效取童便須擇無病無瘡癩者五六人每  
早烹松蘿茶一大壺令各童飲之俟便出時去頭尾不用取  
中間者以罐盛之此環山方岫雲秘傳之仙方識者珍之

鉛笠



罐式



人參養榮湯 治氣血虛弱發熱惡寒體瘦作瀉等證

(氣血兩虛之劑)

潞黨參二錢白朮土炒茯苓

當歸酒洗杭芍各一錢

熟地四錢酒炒

甘草炙一錢遠志七分去心

陳皮五分桂心一分

五味子各五分

加生薑一片

大棗一枚水煎服

薑附湯 治中寒不嘔不渴脈沉細身無大熱者

(寒證重劑)

乾薑

製附片

(各等分)

水煎頓服

理中湯 治寒客中焦臟腑不調口失滋味嘔利不渴等證

潞黨參

白朮土炒

甘草炙

乾薑各二錢

水煎溫服

(寒證重劑)

四逆湯 治三陰脈沉厥逆等證

(寒證重劑)

甘草

五錢

乾薑

二錢

附子

一枚泡皮

生用

水煎溫服

半夏桂甘湯 治非時暴寒潛伏腎經咽痛 散寒輕劑

法半夏 桂枝 甘草各等水煎服

獨參湯 治元氣大虛昏絕脈微欲死 氣虛之劑

人參分兩隨證水濃蒸頓服

十全大補湯 治陰陽並虛而畏冷 氣血兩虛之劑

熟地四錢潞黨三錢白朮土炒茯苓 黃耆蜜當歸酒洗白芍各二錢  
甘草炙川芎各一錢 肉桂六錢加大棗二枚水煎服

除瘟化毒湯 治時疫白喉初起並喉蛾風火喉痛 疫喉輕劑

粉葛根 白殭蠶炒黃芩 小木通 生梔 各二錢 川貝

生地各三錢 山豆根 蟬蛻 各一錢 甘草各二錢 冬桑葉二錢 水煎服

神功辟邪散

治時疫白喉。量證酌服。不拘劑數。

疫喉輕劑

粉葛根

牛蒡子

淨連翹

黃芩

金銀花

小木通

馬勃

各二錢  
絹包煎

川貝

白殭蠶

麥冬

去心  
蟬蛻各三錢

生地黃

四錢

生青果

五枚  
搗

爲引。無青果用冬桑葉

二錢代之

神仙活命飲

治時疫白喉。日服二三劑少則不效

疫喉重劑

龍膽草

蟬退

各一錢

金銀花

木通

車前子

各二錢

川貝

白殭蠶

黃芩

生石膏

馬勃

各三錢  
絹包煎

生地

四錢

土茯苓

五錢

生青果

五枚  
爲引

如無青果用冬桑葉

二錢代之

按此方與上除

瘟化毒湯

神功辟邪散減去土茯苓

金銀花馬勃治喉癰喉

蛾及一切喉內紅腫等證亦效。

龍虎二仙丹

治時疫白喉。

疫喉重劑量證酌服

生地黃

生石膏

各一兩

犀角錢

直殼蠶

黃芩

各五錢

玄參

鼠麴子

板藍根

知母

木通

馬勃

各四錢

綢包煎

川黃連

生梔仁

各三錢

龍膽草

生甘草

各一錢

粳米

三兩

生青果

七枚搗爲

引無青果用冬桑葉

五錢代之

清心滌肺湯

治心肺虛熱

清熱輕劑

生地黃

四錢

川黃藥

黃芩

麥門冬

去心

川貝母

天門冬

去心

知母

天花粉

各二錢

白殼蠶

生甘草

各一錢

日服一劑

以二

三劑爲度體氣素弱者加條參或生玉竹亦可。

養正湯

治真陰虧損勞熱

滋陰平劑

生玉竹

五錢

淮山藥

熟地

製首烏

各四錢

生地

女貞子

白茯苓

各三錢

麥冬去心

白芍

酒炒各二錢

天花粉

各二錢

水煎服

銀花四君子湯

治脾胃素弱

氣虛之劑

潞黨

四錢白朮

土炒各三錢

甘草

炙冬桑葉

金銀花

各二錢

煎

養陰清肺湯

治喉閒起白如腐

清涼之劑

生地

四錢玄參

三錢麥冬

二錢甘草

二錢川貝

去心丹皮

白芍

各一錢六分

錢

薄荷

一錢

日服

二三劑

質虛者加熟地

熱甚者加連翹

去白芍

躁甚者加天冬

茯苓如有內熱及發熱不必投表藥照方服

去其熱自退按鄭梅澗與其弟旣均治喉閒起白專用此方

加減數十年未嘗誤一人宜其自稱秘授也。

蟾酥丸

治諸疔毒及諸惡瘡外用化腐消堅內服驅毒發汗

蟾酥

酒化明雄黃各二硃砂三錢水飛輕粉

枯白礬

寒水石煅

銅綠

膽礬

乳香去油

沒藥去油

麝香各一錢

牛一隻

各爲末

稱準

於端午日午時在淨室中先將蠅牛研爛同蟾酥和研

稠黏方入各藥共搗極勻

丸如綠豆大每服三丸用葱白五

寸令患者嚼爛吐於手心內

將丸藥裹入蔥泥內用無灰熟

黃酒一茶鍾送下

被蓋約人行五六里路病者出汗爲度甚

者二服外用或搓作餅隨證用口涎塗貼毒上以膏藥蓋之

修合時忌婦人雞犬見之

解毒重劑

清熱解毒湯

治心火暴盛

熱證輕劑

生地錢黃連 金銀花各二錢 薄荷 連翹心去赤芍 木通

生甘草錢 各一錢 加燈心爲引水煎服。

清胃散 治陽明實火。牙痛口瘡等證。

熱證輕劑

石膏四錢 煅生地三錢黃連 連翹 丹皮各二錢 升麻八分煎服。

蘆薈消疳飲 治肝胃積熱。

熱證輕劑

蘆薈生 胡黃連 銀柴胡 羚羊角銑 生梔子 牛蒡子炒

石膏煅桔梗 生大黃各六分 玄參 薄荷葉各五分 生甘草

淡竹葉各一錢 水煎食遠服。

清肝解毒湯 治走馬牙疳。

熱證輕劑

石膏四錢 人中白 川黃連 紅柴胡 知母生 淨連翹心去

牛蒡子炒。真犀角。鎊玄參。荆芥。北防風。淡竹葉。錢各一。

燈心。五十枝。水煎食。遠服。加蘆葦根。

人參粥。治脾胃虛弱。飲食短少。補土之劑。

潞黨白茯苓。三錢。共研末。同粳米一茶鍾。熬成粥。先以鹽湯。將口漱淨。後再食粥。

五味消毒飲。治諸疔瘡。化毒之劑。

金銀花。野菊花。蒲公英。紫花地丁。天葵子。各一錢。

水煎熱。加無灰黃酒半鍾。再滾二三沸。熱服。蓋被出汗。

神授衛生湯。治諸瘡惡毒。宣熱散風。行瘀活血。消腫解毒。疎通臟腑。乃表裏兩實之劑。功效甚速。

金銀花 歸尾 皂角刺 天花粉 大黃 甘草節

各一錢

羌活八分

防風

白芷

穿山甲

炒連翹

沉香

石決明

乳香

去油紅花各六分

水煎

病在上部先飲酒一杯

後服藥病在下部先服藥

後飲酒一杯

以行藥力氣虛便利者去大黃

雙解貴金丸

治諸毒初起木悶堅硬便秘脈沉實者

解毒之劑

生大黃一斤

白芷十兩

百合研末水丸

每服三錢五更時用連鬚蔥

三根黃酒一椀

煮蔥爛取酒送藥服畢

蓋被出汗過二三時

俟大便行一二次立效

此宣通攻利之劑

濟之以蔥酒力能

發汗故云雙解體弱者中病即止

行後以四君子湯補之

雙解通聖散

治胃火風熱疎表清裏

和解之劑

當歸酒洗白芍酒炒淨連翹去心白芷炒川芎薄荷葉麻黃

梔子名五黃芩石膏煅桔梗各一

甘草二兩

滑石三兩共研

梔子錢黃芩石膏煅桔梗兩

甘草二兩

滑石三兩共研

細末每用五錢水蒸去滓溫服

瀉黃散治胃熱口瘡清胃之劑

石膏四錢

藿香三錢

山梔炒防風各二

甘草一錢加燈心煎服

甘草一錢

加燈心煎服

清涼甘露飲治齒脣潤燥止渴生津

熟證輕劑

麥冬去心知母黃芩石斛

枳殼炒枇杷葉去毛犀角

蜜炙

犀角鏹

銀柴胡生地茵陳甘草淡竹葉各一

燈心一圍爲

引水煎食遠服

涼膈散治膈上實熱口渴脣焦大便燥結等證

熟證重劑

黃芩

薄荷

生梔子

連翹

去心

生石膏

甘草

芒硝

大黃

各等分

苦竹葉

二十片

水煎加蜂蜜

三匙

和服

奇授藿香丸

治鼻流黃色濁涕

寒氣清劑

藿香連枝葉

八兩研細末

雄豬膽汁和丸如梧子大

每服五錢

食後黃酒送下

天羅散

治蟲蝕腦髓鼻流血水淋漓腥穢

通解之劑

絲瓜藤

近根處者良燒存性爲末

每服三錢食後黃酒下

補中益氣湯

治中寒下陷四肢困倦嬾於言語

氣虛之劑

潞黨參

三錢

黃耆

錢半蜜炙

白朮

土炒當歸酒洗

炙甘草

各一錢

陳皮

五分留白

柴胡

升麻

各三分升麻分

加生薑大棗水煎溫服

辛夷清肺湯。治肺熱肺熱輕劑。

石膏煅知母 桔子生黃芩 麥門冬去心百合各一  
甘草五分升麻三分枇杷葉三片去毛蜜炙或加羌活防風連翹薄荷葉各一  
錢水煎食遠服。

黃芩湯。治肺火上攻鼻竅聚而不散鼻內生瘡。

熱證輕劑

黃芩二錢酒炒麥冬去心桑白皮生山梔子連皮酒炒淨連翹去心赤芍  
桔梗 薄荷 荆芥穗各一錢甘草八分水煎食遠服。

柴胡葛根湯。治胃經溼熱。

解熱輕劑

柴胡 葛根 石膏煅天花粉 黃芩 牛蒡子炒研連翹去心  
甘草 桔梗各一錢升麻三分水煎服。

升陽散火散。治陽經火鬱。散熱輕劑。

潞黨二錢 柴胡 香附各一錢 僵蠶五分 葛根 升麻 白芍酒炒

蔓京子

防風

羌活 獨活

甘草各一錢半生半炙 川芎五分加

生薑一片 紅棗一枚 水煎食。遠溫服。

柴胡清肝湯。治胃溼肝火。耳內悶腫出膿。

解熱輕劑

當歸酒洗去心 連翹各二錢 柴胡 生地 牛蒡子炒 赤芍各一錢五分

川芎 黃芩 生梔子 天花粉 甘草節 北防風各一錢 水煎食。遠服。

理陰煎。附治陰虛受喚證。此爲上品血虛之劑。

熟地三錢 當歸一錢 甘草一錢 乾薑 肉桂各五分 寒甚加熟附子

麻黃細辛之類氣短加潞黨參水煎溫服。

鎮陰煎附治陰虛於下火浮於上此爲降火神方

降火輕劑

熟地三錢附子九製甘草牛膝澤瀉各一錢肉桂五分水煎服

立馬開關飲附治一切喉閉腫痛湯水不下諸急證神方

生雞子

一枚去殼傾入碗內勿攬

生白礬

五六分或一錢研極細末挑入雞子黃內勿攬

將病者

扶起正坐囫圇灌下

立效

○又方牙皂角

錢半去皮弦搗水煎滾取起

去渣。入生雞子白一枚服下卽吐喉內立鬆其效如神

吹劑

回生丹。治一切喉證有奇功

蓬砂一錢提牙硝三分用水煎滾投白蘿蔔一二片收盡浮沫傾入瓦盆內噴冷水一口另以瓦盆蓋之露

一宿沉結成馬牙者

大梅片

六釐

麝香

釐

共研極細未收儲袋

餅封固臨用挑少許於淨細長筆管內吹患處孕婦去麝香開關後次日體虛頭暈者亦去麝香名品雪丹毒腫漸平並用鍼刺破後者再去牙硝名呂雪丹加青黛名青雪丹

白降雪散 治喉風腫痛聲難風火搏結

石膏

一錢五分

蓬砂一錢焰硝

膽礬各五分

玄明粉三錢

冰片二分

共研極細末收儲袋

研極細末收儲袋

餅封固臨用挑少許吹喉內

冰蓬散 通治咽喉腫痛及一切口瘡

冰片

五分

硃砂

六分

水飛

蓬砂

五錢

玄明粉

五錢

共研極細末收儲袋

餅

封固

臨用挑少許吹患處立效

擣鼻散

治諸喉證牙關緊急不省人事奇效

細辛

皂角

各一兩去皮弦

生半夏五錢共爲極細末

收入瓷瓶如法

封固勿令洩氣

臨用取少許吹鼻中有嚏者生無嚏者難治

金鎖匙

治弄舌喉風喉閉纏喉風痰涎壅塞口禁不開及一

切心脾實火

名外寒凝滯等證

冰片

三 分白殭蠶

一錢明雄黃

二錢蓬砂

五錢焰硝

一兩各研極細末

和勻收儲

錢餅封固

臨用挑少許吹喉內腫處

紫雪散

治一切咽喉腫痛及重舌重嘔舌疔等證

玄參

二兩犀角尖

鎊羚羊角鎊

生石膏

寒水石

升麻

各一兩

生甘草

八錢沉香

木香

各五錢

用水五椀煎藥

剩湯一椀將渣

用絹瀝去。再將湯煎滾。投提淨牙硝。三兩六錢文火漫煎。俟水氣。

將盡。欲凝結之時。傾潔淨碗內。下飛淨硃砂。各三錢預

分研極細和勻。將藥碗安入冷水盆中。候冷凝如雪爲度。再輕輕研極細。收入瓷瓶中。用黃蠟封口。大人每用一錢。小兒二分。十歲者五分。徐徐嚥之。卽效。或用燈心煎湯化服亦可。凡咽喉腫痛。一切熱證。取少許吹之。尤效。

燒鹽散 治上喉癰。

食鹽火枯白礬各等分合研極細末。以筋頭蘸點患處。

八寶珍珠散 治喉瘡及一切咽喉腐爛等證。

人中白二錢兒茶 黃連 川貝母去青黛各一錢官粉

紅褐燒灰存性黃藥末魚腦石微煅琥珀各一錢蓬砂八分大梅片

京牛黃各六分珍珠豆腐內煮半炷香時取出研末麝香各五分各研極細末再合研勻臨用取少許吹入喉內腐爛處

清溪秘傳礬精散治胃火熏金喉癬未潰

白礬上不拘多少研末用方瓶一塊燒紅灑水於上將礬散瓶上覆以瓷盆四面灰擁一日夜礬升盆上取用二錢

白霜梅二箇去核明雄黃穿山甲各一錢炙合研極細末收儲瓷

餅封固臨用挑少許吹喉內

清涼散治冒火熏金喉癬已潰

蓬砂三錢人中白二錢黃連末一錢薄荷六分冰片五分青黛四分合研

極細末收儲瓷餅臨用挑少許吹入腐處

捷妙散

治雙單蛾風神效

絲瓜子一兩。牙皂角一兩。二味放新瓦上文火炙乾爲極細末。加冰片少許收儲。瓷餅封固。每遇蛾風用少許吹鼻中。打噴嚏二三次。卽消在左吹右在右吹。在右吹左。雙蛾左右並叻。

赤磨散。治一切喉痺。纏喉。久喉。蛾風諸惡證。吹之立吐痰涎。卽時獲效可代鍼刀。真神丹也。惟喉癬喉瘡不宜。

真血竭五錢。巴豆七粒去殼去油淨。明白礬一兩。三味打碎同入新砂鍋。

煉至礬枯爲度。每兩加大梅片三分。蓬砂二錢。共研極細收儲。瓷餅封固。用時以冷茶漱口。挑少許吹患處。立效。此環山方岫。

雪山人家藏秘方。治喉風諸證。其效不可勝言。

消瘤碧玉散 治喉瘡

蓬砂三錢 冰片 膽礬各三分 合研極細末收儲瓷瓶封固臨用  
挑少許以筋頭侵冷水蘸患處

冰片散 治緊喉纏喉蛾風纏舌諸惡證

人中白一錢 蓬砂各五錢 蒲黃 甘草各三錢 黃檗蜜炙 明雄黃  
燬

龍花 川黃連 立明粉各二錢 雞內金即雞肫皮燬 大梅片各一錢

銅青五分炒 各研極細末和勻收儲瓷瓶封固用時挑少許吹  
患處立效一方加牛黃熊膽珍珠各一錢 兒茶八分 膜香三分 程鍾  
齡治喉證吹藥多用此方

麝香散 治肉癩

麝香二錢黃連一錢冰片三分合爲極細末收儲瓷瓶封固用時挑

少許吹患處一晝夜吹五六次

瓜霜散 治時疫白喉蛾風火喉等證

西瓜霜一兩法以刀切開瓜頭如酒杯大去盡瓢水裝入提  
成冰與瓜外發出自白霜一並掃真珠砂二錢人中白  
下再裝瓜內復取一次其力更大真珠砂水飛淨人中白  
冰片各一明雄黃三分合研極細末收儲瓷瓶封固勿令洩氣  
臨用挑少許頻頻吹之無不立效

青鳳散 治白喉及喉風一切熱證

青果炭三錢川貝黃檗兒茶薄荷葉各一錢冰片八分  
鳳凰衣五分各研極細末再入乳鉢內和研勻收儲瓷瓶封固

用時取少許吹患處立效。

涼心散。治心脾積熱上攻血熱妄行。

建青黛 蓬砂 黃藥 黃連 人中白 各二錢 風化硝一錢

冰片 三分合研極細末入瓷瓶封固臨用取少許吹患處立效。

真功散 治孕婦患喉證。

大冰片二分 提牙硝三分 熊膽陰蘆甘石 乾薑各一分  
用羌活煎湯送服。每服七次。晒乾。蓬砂一錢。  
合研極細末收儲瓷瓶。黃蠟封口。臨用取少許吹患處。毒腫漸平。及鍼刺破後者去牙硝。

聖功丹 治一切牙痛有奇效。

蓬砂五分 人中白二分 蒲黃 馬勃 兒茶各一 甘草節八釐  
分

殭蠶。冰片各五分。麝香一錢。共爲極細末。水漱口淨。吹數次。卽愈。瘡重加青黛黃藥等分。

消蘆散。治患者畏鋸刀。以此方熏之。立卽穿破。

金毛狗脊五錢。茵草。紫荆皮根兩錢。蘆根二兩。用米醋同藥入小罐內。以厚紙封口極固。放火中煮好。罐口開一小孔。如箸頭大。對腫處熏之。若一時未破。加巴豆肉七粒。同煮再熏。卽破。如破後不能速於收功。吹生肌散。

生肌散。治毒盡後。用以收功。

赤石脂水飛數次。再用真龍骨火煅紅淬入乳香。各一兩。沒藥三錢。蓬砂。輕粉。孩兒茶各二錢。大梅片五分。各研極細末。和勻。

收儲瓷餅。患處毒已盡。用少許點敷。立卽收功。

血竭冰蓬散

附

治時疫白喉。及緊喉纏喉。蛾風火喉等證。

淨蓬砂

一兩

真血竭

磨指甲上紅透指甲者爲真。有腥氣者是海母血作僞勿用。

真兒茶

甘草

各三錢去皮

明雄黃

二錢鮮紅大塊者良。有臭氣者勿用。

玄明粉

錢半

真殭蠶

大梅片

各一錢

上麝

四分

上九味各研極細末。稱準入乳鉢內合

研再入血竭末拌勻。孕婦去麝香加冰片慎之。

萬應丹

附

治一切咽喉口舌腫閉。並穿腮腐臭。延爛等證。其效

甚速。真神方也。

建青黛

五錢水飛三四次去盡渣晒乾

青梅乾

五錢煅存性臨用酌加入

人中白

五錢火煅三次

牛膽硝

三錢去殼

山梔仁

三錢去殼

黃連

三錢生黃芩

三錢孩兒茶

三錢蓬砂

枯白礬二錢銅青二錢雞肫皮二錢半

洗炙

直熊膽一錢

大紅絨灰一錢

錢

西牛黃一錢

雄黃一錢

珍珠二分半

豆腐煮梅片一分

麝香八分

臨用酌上

加孕婦忌用

十九味

各研極細末

除留青梅乾

麝香臨用酌

加外餘俱人

乳鉢內研勻

收儲瓷瓶

用烏金紙塞口封固

臨用取少許

日夜徐徐吹患處

流出痰涎卽漸愈

如有腐臭急用蚌水洗淨

或馬齒莧區柏子

和搗加水去渣洗淨

再以前藥去青梅乾

加滴乳香二錢

吹之附秘製

青梅乾法大青梅

一斤去核略搗碎

入白礬青鹽

各五錢

拌和再加蜒蠍

不拘多少層層間之

夜取梅曬乾

收盡汁再曬乾

煅存性臨用加入

附製膽硝法

冬月酌入提牙硝

在黑牛膽內懸挂屋簷當風處

一百二十

日去膽用硝此乃第一應驗神方

柏薑散。附治陰虛火盛。

黃柏二錢乾薑八分合焙成炭存性研極細末吹之。

火刺仙方。附治一切喉痺、纏喉、脹滿、氣塞不通。命在頃刻者無

不立效。

法用巴豆油塗紙上撚作條子火上點然煙起卽吹滅令病人張口急刺於喉間俄頃吐出紫血卽時氣寬能言飲水啖粥再按證治之夫咽喉諸疾發於六腑者引手可探或刺破照前諸方法治之無不獲效若發於五臟者則受毒牢深手法藥力難到惟用油紙撚刺喉間爲第一妙法蓋熱則宣通。

故以火治之。火氣熱處使巴油皆到。又以火散結。以巴瀉熱邪。以煙吐出痰涎。此一舉三善之捷法也。

噙劑

桐油餳。治諸喉風痰涎壅塞。屬熱證者。

溫水半椀。加桐油四匙攪勻。用硬雞翎蘸油探入喉內撲之。連探四五次。其痰卽壅出。再探再吐。以人醒聲高爲度。

辛鳥散。治喉證風痰壅塞如神。

紫荆皮 赤芍稍 草烏各一兩 赤小豆六錢 桔梗 荆芥穗

甘草 連翹 細辛 皂角 小生地各五錢 柴胡三錢 上藥十二味不宜見火。置日中曬燥。各爲極細末。稱準入大乳鉢內。

拌勻收人瓷瓶封固用紙布繫緊勿令洩氣臨用以冷水調噙口內導取風痰如神若痰涎極盛加摩風膏四五匙其力愈速凡遇頸項及頭面紅腫卽以此散用水調敷或將此散與荆芥同煎頻頻洗之仍用此散敷上取效甚速

摩風膏 治喉風痰壅神效

川烏尖卽大附子之尖每用尖一箇以粗碗底濃磨汁調入辛烏散 燈心灰五分

太乙紫金丹 治咽喉諸證及飲食藥毒癰疽疔瘡時疫勞瘵

山嵐瘴氣惡蛇瘋犬蟲蝎咬毒婦人邪氣鬼胎中風中氣目眼歪邪等證無不神效

雄黃三錢鮮紅大塊者良 硫砂三錢有神氣者良 膜香三錢當門子良川五棓子二兩搗破

洗紅芽大戟

杭產紫大戟爲上。北產棉大戟色白者性烈傷人勿用。取上品去盡蘆根洗焙爲末一兩五錢。

山慈姑

二錢洗去毛皮焙乾研末。千金子

一兩又名續隨子。揀仁白者去油。

上七味各擇

精品於淨室中各研極細未製畢候端午七夕重陽或天德

月德天醫黃道上吉之辰。凡入室合藥之人三日前俱宜齋

沐更換潔淨衣帽。臨日方入室中淨手熏香預設藥王牌位。

主人率衆焚香拜禱事畢各將前藥稱準入於大乳鉢內再

合研數百轉。方入細石臼中加糯米濃汁調和。輒硬得中方

用杵搗千餘下極至光潤爲度。每錠一錢。每用一錠病勢重

者連用二錠。或噙嚥其汁。或磨塗患處。或開水磨服。病在上

者必吐。在下者必利。吐利後以溫粥補之。修合時除在事合

藥人外餘皆忌。見雞犬尤忌。蓋此丹全在修合人精誠潔淨。  
方克有濟。否則不效。

敷劑

救急異功散 治喉風一切急證神效。

蟹螯

四錢去頭翅足。糯米拌炒去油。全蠍以米色微黃爲度。去糯米乳香淨。沒藥淨。

真血竭

用少許磨指甲上。紅透指甲者爲真。有腥氣者是海母血作偽勿用。

玄參各六分

麝香

大梅片

各三分

上藥除血竭另研外。餘合研極細。再將血竭末

拌入研勻。收入瓷瓶封固。凡遇時疫白喉。蛾風緊喉。癰喉關  
內外並頸項漫腫。咽喉將閉。及爛喉痧等證。不拘何膏藥。以  
此散用黃豆大置膏藥上貼頸項。閒須對喉內腫處。左腫貼

左右腫貼右。左右腫則貼兩邊。閑五六時揭去。貼處卽起水泡。用鍼刺破揩去。毒水立能消腫止痛。誠救急良方也。

開關散。治牙關緊閉。

番木鼈二片去殼。好黃酒半杯用粗碗磨濃汁。將病人扶坐靠端。以

雞翎蘸汁塗於兩牙齦盡後處。漸開再塗天花板並舌根下。卽開涎出以微溫水漱淨。凡看證遇牙關緊閉。卽依法治之。○○○○○○○○○○但木鼈爛肉藥汁切勿沾喉慎之慎之

蒜泥拔毒散。治急喉證拔毒奇效。

老蒜二瓣如泥。用梧子大許敷經渠穴。以皮紙包裹微繫。閑五  
六時。取視。卽起水泡。用銀鍼刺破揩盡毒水。

人中白散 治走馬牙疳

人中白五錢枯白礬各二錢白霜梅燒存性共研極細末先用韭根松籜茶煎成濃汁乘熱以雞翎蘸洗患處去淨腐肉見鮮血再敷此散日三四次若爛至咽喉以蘆筍啖之

蘆薈散 治牙疳腐爛穿腮

蘆薈二錢黃蠶五錢人言四分用棗四枚去核每棗共研細末先納人言一分火燒存性

用米泔水漱淨疳毒再敷此散於堅硬及腐處

離宮錠 治疗瘡腫毒一切皮肉不變漫腫無頭等證

項煙陳墨兩血竭一錢膽礬各三錢蟾酥二錢硃砂一錢水飛麝香五分上味各研極細末再入乳鉢合研勻用涼水調成錠仍以涼

水磨濃塗之立效。

黃連膏。治諸燥瘡。

生地一兩歸尾錢五

黃連

黃檗

薑黃各三錢

麻油十二兩

將各藥

傾入鍋內文火燥枯用粗夏布濾去渣下黃蠟四

兩

溶化盡傾

八瓷盃內以柳枝不時攬之候凝爲度凡遇燥瘡塗以潤之。

硝砂散。治鼻痔。

明雄黃輕粉各三錢  
大梅片一錢  
研極細末水調濃。  
用穀草細硬咬毛蘸塗痔上。

辰砂定痛散。治鼻瘡乾燥消痛散熱。

胡黃連二兩石膏一兩辰砂五分冰片二分研極細末聽用。

真君妙貼散 治諸毒惡瘡頑硬散漫無膿及皮破血流天泡

火丹肺風酒刺等證。

蕎麪一斤麥麪一斤明淨硫黃二斤研細末三味共一處用清水微拌。

乾溼得宜趕成薄片微曬單紙包裹懸掛當風陰乾收藏用。

時取少許研細末新汲水調敷不痛者卽痛痛者卽止如皮

破血流溼爛者用麻油調敷天泡火丹酒刺者用靛汁調塗。

獨勝散附治一切牙疳穿腮破脣奇效。

白茄蒂不拘多少陰乾瓦上炙燥爲極細末加冰片少許和

勻摻患處卽愈。

紫花散附治小兒口疳神效。

甘蔗皮燒灰研末加冰片一字摻之。

神功丹。附治一切牙疳神效。

人中白二兩、兒茶一兩、薄荷葉、黃檗、青黛各六錢、水飛淨冰片分共爲極細末收儲。凡牙疳先用韭菜根煎水頻漱口再擦此散日七八次涎外流不止者吉。若無涎則毒氣內攻卽屬不

治之證。

萬益丹。附治鍼誤用血流不正神效。

乳香去油淨、沒藥去油淨、真血竭、蓬砂各一兩、味各研極細末。再入乳鉢合研收儲瓷瓶每用少許吹敷傷處立卽止血。


序

古今名醫喉科諸書。言喉證者詳矣。獨未載有時疫白喉證。自道光中葉始於江浙。迄乎荆湘黔滇間。發作無時。傳染甚速。巷陌街衢死者踵相接。惟時西北諸郡邑無有焉。邇來疫氣流行。與時變遷。秦隴地方亦丁其阨。雖塞外徼荒所在皆有。庸醫辨證未明。不審脈之虛實。證之寒火。狃於偏見。總以西陲係砂磧嚴凝之區。率皆寒證。又或拘泥古方。不知時異勢殊。漫無變通。輒投表散辛溫滋補之劑。爲害最烈。百無一全。同鄉張善吾學博蕭海雍封翁。細心考究。詳察病源。所著白喉證論一書。中列飲散。屢見功效。活人甚多。乾嘗肄業及之。惟疫證愈出愈險。有

朝發夕死者。有癱痛難忍立刻斃命者。乾臨證日久。每悉心討論。更兼博訪旁諮。又得鍼刺要訣。名手秘方。爲兩先達書中所未備。光緒紀元乾。幕遊湟中。次年夏。適白喉疫證。蔓延湟郡。各屬。乾將諸方及鍼法。進都人士。而口授之。照方醫治。應手輒效。百不失一。嗣是而甘泉。而酒泉。患此證者。倩乾。調理。效皆立奏。欲將兩先達良方。及陸續所獲鍼法方畧。并付剞劂。以公諸世。而垂久遠。廣醫學。而起沈疴。顧所費不貲。勢難獨任。幸賴學士大夫。愷悌慈祥。或分鶴俸。或解錦囊。成茲義舉。可補醫經。仁人君子。愷悌慈祥。或分鶴俸。或解錦囊。成茲義舉。可補醫經。之缺畧。從此慈航普渡。壽域同登。其有裨於天下後世者。豈淺鮮哉。

光緒歲在屠維單閼仲夏月穀旦湘西黃炳乾陶普氏謹識於

酒泉公解



貴公藏書

中華人民共和國郵政部印

專治時疫白喉捷要合編目錄

時疫白喉證論

白喉續論

白喉嚨看法

附認寒火證

白喉嚨治法

開關散

鍼法附煉藥鍼法

蒜泥拔毒散

救急異功散

除瘟化毒散

神功辟邪散

神仙活命湯

龍虎二仙湯

雄黃解毒丸

清心滌肺湯

養正湯

銀花四君子湯

瓜霜散

附取西瓜霜法

血竭冰蓬散

石青消毒散

蜘蛛救苦丹

膽礬散

無治之證

蜒蚰辟毒散

回生萬應丹

硇砂破蛾散

藥方歌括

專治時疫白喉論

白喉有時疫一證。其發無時。其傳染甚速。其病至危至險。治者每多束手無策。修考之諸書。臨證日久。竊以爲其治有十難焉。蓋此證乃纏喉急痺。緩治則死。凡咽喉不利。口渴舌燥。頸腫目赤。耳痛唇紅。皆上攻頭面之證。邪熱客於心肺之間。似與他經無涉。其有兼及他經者。體氣虛弱。邪氣乘之而入。皆後之傳變。名曰越經。時未傳及他經。不察其源。治以他經之藥。其難一也。大抵其證初起。惡寒發熱。頭痛背脹。精神倦怠。遍身骨節癱痛。喉內有極痛者。有微痛者。初無形迹可見。似傷風傷寒表證。若投以麻桂羌防升柴細辛蘇葉之類。致毒漬散。無可挽回。其難二也。

二也。彼其惡寒發熱乃毒氣初作於內。至二三日喉內見白。見後寒熱自除。或者不悟。誤以爲表藥有功。豈知白見後。卽不服表藥。而發熱亦止耶。一起誤服羌防麻桂。非徒無益。而又害之。其難三也。按此病熱證多。寒證少。有以色白爲寒者。不思此證初發於肺。肺屬金。其色白。爲五臟六腑之華蓋。處至高之位。毒氣薰蒸。自下而上。肺病曰深。故其本色日著。治宜解五臟之毒。使之下行。勿令蓄積於肺。若因白色。疑爲寒證。投以附桂炮薑。是謂抱薪救火。愈熾愈烈。其難四也。卽有知爲火毒。不可輕用升提開散之品。輒以芒硝大黃下之。不知此證已傳至上焦。氣分與中下焦無涉。旣上焦氣分受傷。又以硝黃攻伐太過。使中

下焦有損元氣愈傷其難五也。見證確藥當守方有火毒甚者初起用消風敗毒引熱下行之劑治法良是乃日服二三劑而白不退連服十數劑而白愈有加是猶杯水車薪與事無濟治者當詳審病源或舌胎黃黑喉乾唇焦小便短澀而黃大便瀉泄帶黑是謂火毒凝結內病不除白何能淨愈發白愈守方久久投之自有效驗若另更別方必生變故其難六也察之旣精圖治不容緩此乃瘟疫之變證殺人最速過七日不起庸醫辨證未明投以平淡之劑不求有功但求免過是謂優容養姦迨延至五六日毒氣重矣元氣傷矣善治者不得不以猛劑攻之然病已垂危成則無功一旦不起病家不咎優容之過反云猛

劑非宜。此非誤於後。而實誤於前。其難七也。有非白喉而轉爲白喉者。初起喉痛紅腫。或惡寒發熱。或不惡寒發熱。一邊腫名曰單蛾。兩邊腫名曰雙蛾。治之稍緩。則氣閉不起。宜用生土牛膝兜引熱下行。大便閉結。用大黃。否則不必用此。與白喉證異治同。倘不預防。轉爲白喉。爲禍甚烈。其難八也。又有勞證白喉。陰虛火燥。痛極而水米難下。漸至朽爛。形容枯槁。面目憔悴。必需補劑。使元氣充滿。而喉痛自癒。若以時行疫證白喉。誤認陰虛。差之毫釐。失之千里。其難九也。更有一種白喉。無惡寒發熱等證。喉內起白皮。隨落隨長。的是寒證。非附桂不癒。卽誤服消風敗毒之藥。亦無大損。若以時行疫證白喉。認爲此證。爲害不

淺其難十也。知此十難。臨證審治十不失一難。不終難修持此法。活人多矣。時疫流行。而益不敢自私。謹將看法治法方法。編次成書。非敢云濟世之良方。亦足爲刀圭之一助云爾。楚南淮川張紹修善吾氏著。

### 白喉嚨續論

白喉治法浩渺無憑。修自稽考以來。時深討論。每臨篇得其法。未必見其病。臨病見其證。未必合其方。可見病態多端。惟貴圓通。而知其要耳。修曾立白喉嚨證論一篇。以傳於世。奈白喉之證。愈出愈險。有朝發夕死者。延街合巷。互相沾染。治之不速。十難全一。噫。真可慘也。竊此證乃瘟疫惡證。必需詳審外證。細察

脈情看明喉嚨內外兩關。白多白少及小大厚薄方可下藥。否則以輕劑而治重病。其禍甚烈。以重劑而治輕病。其害尤深。過猶不及。誠哉是言也。其證初起。憎寒壯熱。口渴喉乾。聲音不出。湯水不入。痰涎壅塞。脹閉癱痛異常。滿喉皆白。脈多洪數。甚者且無至數。此乃時行厲氣爲病。喉證中最急者也。或者謂咽喉病忌用寒涼。謬妄殊甚。每見投以荆防敗毒散。大承氣湯者。指不勝屈。不知以硝黃瀉胃中之實熱。是謂誅伐無過。病以適至其危篤。以羌防理太陽之遊風。致使渙散其毒。病必漸入於膏肓。修立除瘟化毒散。神功辟邪散。神仙活命湯已用之屢矣。皆能立起沈疴。但恐病勢太重。猶嫌藥力稍輕。再立龍虎二仙湯。

日服三四劑。連服數日不必更方。縱食不下咽。斷不至寒涼過度。胃氣告匱。所謂有病則病受也。白退而藥即止。徐徐調理。元氣不難充滿。惟證尤烈者。實火爲患。臟腑積熱太深。堵塞咽喉。隘地呼吸不通。服雄黃解毒丸亦妙。究係厲劑。不可輕用。慎之。然所論雖屬詳明。治者尤宜達變通權。兼以閱歷。方能隨手應效。活人之法當無出此。若輕忽怠玩。耽閑日期。使面青唇黑。氣急痰壅。煩燥神昏。攻之不可。達之不及。雖盧扁復生。不可爲也。管見如此。望高明酌之。

### 白喉嚨看法

初起惡寒發熱。頭痛背脹。遍身骨節癱痛。喉內或極痛或微痛。

或不痛而喉內微硬。有隨發而白隨見者。有至二三日而白始見者。或由白點白條白塊漸至滿喉皆白。所治皆同。服藥後喉內或白收緊。或白稀疏。或白微小。或白轉黃。久之必然退淨。但此病非比他病。貴在見機早。尤貴治者精。若心虛氣浮。輕視此證。有非白喉而妄稱爲白喉。遽以猛劑攻之者。有眞白喉又不識爲白喉。僅以平劑投之者。有胎產婦人。幼孩老人。大病後虛勞。內傷。皆難任攻伐者。治不得當。鮮不輕者重。重者危矣。看法將病人向光明處正坐。左手按髮際。右手持箋片或箸。按住舌心。細看喉嚨兩邊。係白喉。係單雙蛾。係風火喉。看的方好。下藥晚間則用兩油紙撫一照。腦後一照。口內方看得明。醫是病者。

宜防護自己不可空腹入患家看病或飲雄黃酒一杯或食大蒜亦可保不傳染且入臥房病人前需先正其心行坐言語不可嬉戲貪淫邪念切不可起

附認寒火證

火證白喉白塊浮於肉上起凸喉中紅腫飲食喜冷惡熱舌胎黃黑甚至大小便不通痛無已時如係寒證虛證則不紅不腫飲食惡冷喜熱天花板上紅絲數條卽間有白塊亦陷於肉內凹而不凸大小便如平時喉中微痛或咽則痛不咽不痛不得以治白喉之法治之

曰喉嚨治法

初起用葛根殭蠶蟬蛻以散風熱。以牛蒡子連翹金銀花土茯苓消腫敗毒。元參生地黃天門冬麥門冬清金生水黃芩黃連生梔仁山豆根生石膏瀉火救水。木通澤瀉車前子引熱下行重者再加馬勃龍膽草。外用生土牛膝燒或於末服藥之先既服藥之後煎水開服。再以萬年青搗汁或服或噙。又每日食生青果十餘枚。輕者以除瘟化毒散主之。重者以神功辟邪散主之。再重者以神仙活命湯主之。輕則日服一二劑。重則日服三四劑。將疫毒由上焦引至中焦。由中焦引至下焦。從大小腸膀胱而出。大便瀉泄。火毒下行。此爲吉兆。大便閉塞。少加熟大黃。如仍閉塞。改用生大黃。大便瀉即去。服十餘劑。愈者有之。母白

點退淨爲度。其藥味分量之加減劑數之多寡。需臨證制宜。不必另更別方。連日投之。自然全癒。屢試屢驗。同治丁卯冬。白喉險證極多。有漸至危篤者。延余診視。詢前所服之藥。皆消風敗毒引熱下行之劑。治法良是。終莫能起。不解。故余詳審外證。細察脈情。再三思之。想必是實火爲患。熱毒凝結臟腑。雖用瀉火敗毒之藥。仍是杯水車薪。與病奚濟。擬一龍虎二仙湯。日服四劑。服十餘劑。痊瘍者有之。有服至二三十劑。而白尚未退淨。眼雄黃解毒丸一服。仍服龍虎二仙湯十餘劑。而瘍故遂處此方。全活甚衆。卽將此方續列於後。以備選用。白點退完。當用清涼之品。以清心滌肺湯主之。日服一劑。徹盡餘毒。再服養陰之。

劑。以養正湯主之。脾胃素虛者。用四君子湯加生何首烏金銀花。總賴以圓機行活法也。如遇牙關緊閉。不能看證者。治以開關散。卽開。又或初起之時。及服藥後痛不可忍。神疲音啞者。急以鍼法施之。兼用蒜泥拔毒散。蜒蚰辟毒散。並吹藥卽鬆。如喉內頸項腫甚。以救急異功散傳之。以上白喉治法。除勞證白喉寒、證白喉之外。凡單雙蛾喉癰及喉內紅腫。均可依法治之。但藥味需酌量加減。慎之。服藥後切忌風吹。並忌一切酒肉油膩辛辣之物。瘡後亦須禁兩旬或半月。服藥時蔬菜中忌食萊菔。瘡後不忌。又有辨證未明。誤投升提開啟滋補辛溫之劑。視病之輕重。以生菜豆碾細末。重者一茶碗。或一茶盅。輕者一大酒

杯冷水調服。再酌用以後所列諸飲散煎出。并煮天米粥一碗。先服粥。後服藥。則誤服之劑。卽解除矣。如痰涎漸甚。用生桐油灌入喉內。雞翎毛攬之。嘔出痰涎。須陸續灌盡桐油四五兩方妙。

開關散

番木鼈二片去壳

黃醋半杯

麤碗磨濃汁。雞翎毛蘸汁塗於兩邊牙齦至儘後處。漸開再塗。天花板并舌根下。卽開藥汁切勿沾喉。涎出以微溫水漱淨看證。每遇牙關緊閉。以此法治之。

鍼法

凡遇白喉單雙蛾風火喉之重者。服藥不退。心中惡逆精神困憊。昏迷不醒。語言不清。癱痛難忍。以藥鍼於舌根底下兩邊毒筋上刺入。以分許爲度。放出惡血。涼水漱淨。其中間之毒筋切不可刺。慎之。須再刺少商穴。係平大指甲盡處。側邊離睛一分即是。令病人平坐。袒衣露出手。擇有力者。以兩手從頸上用力順拉而下。至大指頭尖止。連拉四五十下。將綿帶從大指頭尖處起。緊密纏至肉甲相連處止。以藥鍼先放口內含微熱。向穴上先刺內邊。後刺外邊。捻出惡血。男則先左後右。女則先右後左。如蛾子腫大。亦用藥鍼刺破出血。急以膽礬散或硇砂破蛾散吹之立破。惟每月初五日人神在口。忌刺蛾子舌根下。初六

人神在手忌刺少商穴十五日人神在遍身均不可刺如鍼經藥鍊卽以馬銜鐵鍼及瓷鍼銀鍼鐵鍼刺之亦可

附鍊藥鍼法

用柔鐵鍛鍊惟馬銜鐵良按本草云柔鐵卽熟鐵有毒馬銜鐵則無毒馬屬午屬火火尅金解鐵毒故鍊藥鍼以此爲最用舊馬銜鐵翦去在口外者取中段挨舌挨齒處鍛紅錘鍊冷川山甲三錢北細辛三錢沈香五錢甘草節三錢當歸尾

三錢硃砂三錢真慈石一兩

鴨嘴膽礬塊片長而圓扁狀類鴨嘴外面微白中透亮如藍色明玻璃者爲真市肆多以整塊青礬作僞沈香以黃沈角

沈黃蠟沈爲上嗅之無香磨汁含入口內滿口皆香者真市肆皆係油柞木久浸水內取出用真沈香少許同煎入水亦沈以此混充慈石俗呼吸鐵石吸得鐵動將慈石向掌中擦熱距鐵鍼一二分引之鍼卽搖動者良能引諸藥入鐵內乃鍊藥鍼要藥石藥一料可鍊藥鍼十口如鍼少藥之分量亦須照鍼數遞減

鍼式如膽礬沈香慈石無真者卽用舊馬銜鐵照式錘鍼不用藥煮亦可

圓尖

三稜尖

### 蒜泥拔毒散

老蒜一瓣獨子者更佳搗如泥以豌豆大數經渠穴係大指伸

直近手腕寸脈後有窩處卽是男左女右用瓦楞子或小蚌壳  
蓋上紮住閑五六時起一水泡將銀鍼或鐵鍼刺破揩淨毒水

救急異功散

蟹螯四錢真血竭六分製乳香六分大元參六分  
製沒藥六分去油全蠍六分去油全蠍六分大元參六分

上麝三分 上梅片三分

蟹螯去頭翅足。煙米拌炒以米色微黃爲度。去糯米。除血竭外。  
合諸藥共研極細。另研血竭拌勻。盞瓶收貯。按血竭用少許磨  
指甲上。以紅透指甲者爲真。若與諸藥同研。則血竭飛去。市肆  
多以海母血作僞。有腥氣。凡遇白喉。單雙蛾。纏喉風。關內外慢  
腫。並頸項發腫。咽喉將閉。及爛喉痧證。不拘何膏藥。開攤小張。

將此散用黃豆大置膏藥上距耳垂下半寸許輒處貼之。左腫貼左右腫貼右。左右發腫皆貼閱五六時貼處卽起水泡用銀鍼或鐵鍼刺破揩淨毒水能消腫止痛誠救急良方也。

除瘧化毒散

粉葛根二錢浙貝母三錢羌蠶二錢生地黃三錢山豆根一錢  
蟬蛻一錢 生梔子五錢 小木通一錢 黃芩一錢 生甘草五分

冬桑葉二錢引

此方白喉初起宜之。凡單雙蛾及風火喉痛皆可服。

神功辟邪散

粉葛根二錢浙貝母三錢羌蠶三錢 生地黃一錢麥門冬三錢  
生地黃一錢麥門冬三錢去心

蟬蛻三錢 牛蒡子二錢 淨連翹一錢 黃芩一錢 金銀花一錢

小木通二錢 馬勃二錢

用絹包煎

生青果三箇 引

無生青果  
用冬桑葉

神仙活命湯

龍膽草一錢 浙貝母三錢 差蠶三錢 生石膏三錢 生地黃四錢

蟬蛻一錢 土茯苓五錢 金銀花一錢 黃芩一錢 車前子一錢

小木通三錢

馬勃

一錢用  
絹包煎

生青果五箇 引

無生青果  
用冬桑葉

以上二方白喉重者宜之。日服二三劑。少則不效。凡單雙蛾喉癰及喉內紅腫去土茯苓金銀花馬勃其餘藥均可斟酌加減服之。

龍虎仙湯

龍膽草一錢 生地黃一兩 元參四錢 真犀角八錢 川黃連三錢

黃芩五錢

鼠粘子四錢卽牛蒡子

直卷蠶五錢 馬勃四錢卽組包前

板藍根四錢

生梔仁三錢 知母四錢 生石膏一兩 小木通四錢

甘草一錢

大青葉五錢 穰米三兩引

雄黃解毒丸

明雄一兩選透明者碾極細水飛取輕浮者澄去水曬乾

鬱金一錢曬乾  
碾細過篩

巴豆十四粒去壳去皮取白色者  
炒熟碾如泥用紙包壓去油

三味各如法製碾然後合碾用米醋熬濃汁和爲丸茶豆大。每用四分茶湯泡軟。杵融送下。小人減半。○纏喉走馬急證。緩治則死。明雄能破結氣。鬱金能散惡血。巴豆斬關奪門。能下惡涎。

下咽無不活者。但此屬厲劑。乃惡藥也。不得已而用之。苟非急證。不可妄投。

清心滌肺湯

生地黃三錢 川黃柏二錢 黃芩一錢 麥門冬三錢去心 浙貝母一錢  
知母二錢 天門冬二錢去心 天花粉二錢去蕊 一錢 生甘草五分

不用引。日服一劑。以二三劑爲度。體氣素弱。恐難參或  
生玉竹亦可。

養正湯

生玉竹五錢 生地黃三錢 花粉二錢 懷山藥四錢 熟地黃四錢  
茯苓三錢 製首烏四錢 麥門冬二錢去心 白芍一錢 女真子三錢

不用  
火

銀花四君子湯

臺黨參五錢製於朮四錢茯苓三錢生首烏四錢金銀花二錢

炙草一錢

冬桑葉一錢引

瓜霜散

西瓜霜一兩上辰砂二錢上片一錢人中白一錢明雄黃一分

共研細末再入乳鉢內。乳至極細爲度。瓷瓶收貯勿令洩氣。如遇白喉蛾喉風火喉頻頻吹之。若蛾喉重者。急以膽礬散硝砂破蛾散吹之立效。

附取西瓜霜法

西瓜開孔去淨瓢水。以皮硝灌入。懸於屋簷當風處。下以瓮盤懸空接之。水滴盤內結成冰塊。及瓜外起白霜一并埽下聽用。查喉科指掌所載。將刮下之霜灌入西瓜內。再做二次。藥力更大。務須遵照製之。

### 血竭冰蓬散

真血竭三錢 直差蠶一錢 兒茶三錢 明雄黃三錢 上硝片一錢  
上麝三分 元明粉一錢半 淨蓬砂一兩 甘草三錢去皮

血竭認法製法詳上救急異功散先將諸藥共碾極細。次入乳細血竭拌勻。用法同瓜霜散。若孕婦患各喉證。須去上麝。多加

冰片慎之。

石青消毒散

生石青

一兩般

人中白

五錢鑛

青黛

一兩

鴨嘴膽礬

五錢上長砂

蓬砂

一兩

元明粉

五錢

山豆根

三錢

上片

五分

鴨嘴膽礬認法。詳前鍊藥鍼方內製法用法同血竭冰蓬散孕婦忌。

蜒蚰辟毒散

蜒蚰二三條

鹽梅

一二枚陳者良

按蜒蚰俗呼鼻涕蟲。又呼涎泥。生陰溼處。及花鉢邊鉢底。下身長五六分。前銳後大而禿。灰色。中間淺黑條遍身。涎沫沾濡。跂行遲重。遇處遺有涎沫者。卽是。先將鹽梅肉刮下。蜒蚰挿入。

少頃。蜒蚰悉化爲水。曬乾備用。每遇各喉證之重者。以小塊噙於口內取津。先吐後嚥。或用水少許化開搗融。以舊筆洗淨蘸水塗喉內白處。腫處卽退。此散。先時臨時製造均可。若臨時製造。趁蜒蚰化水卽塗患處。不必曬乾。

蜘蛛救苦丹

地蜘蛛三隻

上梅片五厘

地蜘蛛生壞礮內土面上結有蛛網。挖出藏於網窠內。身小而黑者是焙焦存性。合冰片研極細。遇各喉證之極險者。吹之神效。實有起死回生之功。然與蠅蚰辟毒散非遇險證。或偏僻地方。無藥可辨者。不必輕用。亦所以惜物命也。

回生萬應丹

真牛黃一錢 刺黃連四錢 兒茶五錢 真珍珠一錢 川鬱金四錢  
白芷二錢 建青黛三錢 蘇薄荷七錢 蓬砂三錢 滴乳石五錢  
川黃柏三錢 甘草三錢 真血竭三錢 上梅片一錢

牛黃用少許磨指甲上。以黃染透指甲者爲真。市肆多以駱駝黃混充。真珍珠不論圓扁。以通身有五彩光芒者爲真。大乳浸二日。晾乾碾細。如堅結不能成粉。用豆腐煮兩晝夜。卽能搗爛爲柔。再合諸藥。同碾極細。方加乳細血竭拌匀。瓷瓶收貯。此散能治白喉單雙蛾喉痺喉癰。喉風爛喉瘍。陰虛喉痛等證。神效無比。如牛黃珍珠血竭不真。則不效。須揀選真者。早年京中

傳染喉證俗呼狼指脖傷人最多各方罔效後得此方救人甚衆此乃喉證第一神方也。

一 膽礬散

鴨嘴膽礬一錢

手指甲五分

人中白五分煅

鴨嘴膽礬認法詳前鍊藥鍼方內假者不能破蛾化痰爲害不淺務求真者手指甲翦碎炒炮以深黃色爲度三味共研極細蛾喉腫甚連吹數次卽破吐出惡血涎痰痊癒。

硇砂破蛾散

眞硝砂

青鹽

白礬

右等分均勻研極細凡蛾喉腫痛吹之立破必須眞硝砂方效。

若石硝鹹硇無用此藥真者難得價極昂貴不若膽礬散價廉而易辦且功效相埒

無治之證

七日滿目不退。

服藥大便不通。

未服藥大便瀉

大便連瀉不止。

領下發腫不消。

服藥嘔吐不止。

音啞無聲。

白塊自落。

喉乾無涎。

天麻黑暗。

兩目直視。

面唇俱青。

角弓反張。

痰壅氣喘。

汗出如漿。

藥不能下。

藥方歌括

開關散最有奇功。醋磨木鼈汁須濃。牙齦舌根天花板矣第塗之立卽通。

鍼法加諸急證利舌根兩邊青筋刺再向少商穴上施放出惡血真奇秘。

蒜泥拔毒散尤良。經渠穴上審端詳水泡起時鍼剔破拔去惡毒自安康。

救急異功散如神。蟹螯竭蠍乳沒等片麝元參膏藥傅項間泡起可重生。

除瘧化毒葛地佳。蠶蟬芩梔通貝加豆甘再合冬桑葉白喉初起永無差。

神功辟邪散有靈。葛地蠶蟬麥貝芩翹牛通勃銀花果白喉重者服之輕。

神仙活命膽草芩蠶蟬地膏土茯苓通貝前勃銀花果日投數劑著奇能。

龍虎二仙膽草犀元母地膏蠶芩梔連通勃鼠藍草并引用青葉粳米宜。

雄黃解毒水飛淨鬱金曬碾巴豆并米醋煎濃和爲丸茶湯送下醫急證。

清心滌肺地貝芩天麥二冬殼蠶等知粉柏甘去餘熱酌加玉竹與條參。

養正湯推玉竹先生熟地與粉芩聯懷芩首烏女貞麥白喉初退服之痊。

銀花四君子。交濟參北芩。烏甘草繼。引用冬桑葉。最良脾胃素。

虛養榮衛

瓜霜散。取人中白。硃砂明雄冰片。共研極細。頻頻吹。調治喉證。有真訣。

血竭冰蓬散。何神兒茶明雄上麝。臨蠶草元明粉。吹入喉內保清平。

石青消毒膽礬加硃黛豆片及蓬砂。元明粉共人中白細研吹喉分外佳。

蛇蠍辟毒散。神奇鹽梅陳者兩相須。搗融蘸水塗患處。退淨紅腫與白皮。

蜘蛛救苦丹訣。良合將冰片是神方。呼吸不通立刻癒。險證獲此保無傷。

回生萬應丹訣。特牛黃乳石金珠列連柏蓬黛芷兒茶合將荷草有真訣。

膽礬散。耑療乳蛾。人中白共指甲和。若敎吹入紅腫處。破開堵塞。功效多。

硇砂破蛾散。若何青鹽白礬共同科。不論單雙咽喉閉。吹入立待起沈疴。