

青海省地方史志
資料摘欽集

青海省通志編纂委員會

各縣地理

互助縣

地理

位置 居省會之東北部。縣治在北緯 $36^{\circ}00'$ 、東經

$101^{\circ}50'$ 。西南距省會90里。東界樂都。及甘肅之永登

南界西寧。西界大通。北界鹽源。

沿革 本縣于民國19年由西寧劃出而成。縣治設威

遠堡。故其沿革與西寧同。

廣袤 東西50里。南北150里。

面積 10,820平方公里合5,520,980畝

地勢 北高南低。沙棠川紅崖子溝河及蘇木連河等

縱貫境內，故沿河一帶，土地肥沃，最宜墾植。

山脈 本縣山嶺，多由北南向，狀如裙帶，除供放牧牲畜外，平山多已墾植。

河流 湟水、沙棠川河、安定河、景陽川河、蘇木連河、西漢渠河、哈拉溝河、紅崖子溝河等，均由北南流，灌溉田畝不少。

氣候 1. 雨量——1—4月份少，5—8月份多。

2. 霜期——秋霜降于8月，春霜止于5月下旬。

3. 冰期——自10月至翌年2月共3個月。

西寧縣

地理

位置 居本省之東部，為省會所在地，縣治在北緯 $36^{\circ}53'$ ，東經 $101^{\circ}00'$ ，東界樂都，互助，南界化隆，共和，西界湟源，北界大通。

沿革 西寧古稱湟中，漢趙充國屯田於此，置西平郡，西都縣，隋為湟水縣，唐為鄯城縣，後沒於吐蕃，宋為西寧州，明為西寧衛，清為西寧縣，民國因之。

廣袤 東西 200 里，南北 100 里。

面積 $10,610$ 方里合 $5,729,400$ 畝。

地勢 南北多山，湟水橫貫中部，故南北高而中部低，沿湟一帶，土地肥沃，為農業最適之區，縣治海拔10,955公尺。

山脈 南有鳳凰、拉脊、阿米吉力等山，西有白象、西元等山，北有土樓、旱坪、金蟻等山，總計約占全縣面積半數。以上，查上列各山，不毛之地固多，然適于放牧及種植者，亦不在少數。

河流 有湟水、麒麟河、蘇木連河、雲谷川河、西納川河等，均饒灌溉之利。

土質 為粟鈣土、黑鈣土與沖積平原及沖積扇形坡之

石灰質土壤。

氣候 本縣氣候與互助同。

大通縣

地理

位置 居省會之北部·縣治在北緯 $41^{\circ}10'$ ·東經 $100^{\circ}50'$ ·南距省會 200 里·東界互助·南界西寧·西界都蘭·北界鹽源。

沿革 大通縣古為西羌地·漢為臨羌縣北塞·清為大通縣·民國因之。

廣袤 東西 165 里南北 80 里。

面積 $11,333$ 方里合 $9,103,600$ 畝。

地勢 四境負山·北川河貫流中部·為本省產糧之區。

山脈 南有金蛾山、西有大坂山等、其間如廣惠寺附近
諸山、森林密茂、水草迷離、放牧採木、頗利賴之、此外
如北川沿岸兩山、志加壑關、種植之勤、在本省實無出
其右者。

河流 有北川河、撿科河、黑林河、東碇河、及東寫溝等
80餘道、分灌全縣田地。

土質 為黑鈣土栗鈣土等。

氣候 1. 雨量 —— 5月份最少、8月份最多。

2. 霜期 —— 秋霜降于11月、春霜止于翌年3月上旬

3. 冰期 —— 9月上旬至翌年3月上旬共6個月。

民和縣

地理

位置 居省會之東南部、縣治在北緯 $36^{\circ}10'$ 、東經 $102^{\circ}50'$ 。西距省會 700 里、東北界甘肅永登、南界循化及甘肅永靖、西界化隆、北界樂都。

沿革 西漢為龍支縣故地、晉為小晉興城、明清置古鄯馬驛、為樂都縣地、民國十八年、由樂都東部劃出老鴉碛以東各地設立民和治設上川口。

廣袤 東西 100 里 南北 150 里。

面積 6973 方里合 $2,685,420$ 畝。

地勢 西南負山較高東北因湟水橫貫較低、故沿湟兩岸
耕田均饒灌溉之利。

山脈 南有小積山、西南有拉脊山等、常年積雪、為河
渠之源。

河流 有黃河、湟水及其支流蘆草溝河、新順堡河、米
拉溝河、巴叔溝河、紅嘴堡河、西納溝河等、本縣渠道、
均利賴焉。

土質 為粟鈣土、未成熟之淡粟鈣土、灰鈣土、黃灰色
漠境土及石灰質土壤。

氣候 1、雨量——5月份最少、8月份最多。

2. 霜期 — 秋霜降于9月、春霜止于翌年5月下旬

樂都縣

地理

位置 居省會之東部、縣治在北緯36°30'、東經102°20'、西距省會150里、東界民和及甘肅永登、南界化隆、西界西寧、互助。

沿革 樂都古湟中地、漢為破羌縣、晉為樂都郡、南凉秃髮烏孤都此、北魏及周為西都縣、隋唐為湟水縣、五代為湟州、宋為樂州、元為西寧州地、明為碾伯衛、清為碾伯縣、民國17年改今名。

廣袤 東西180里、南北100里。

面積 7,611方里合7,109,940畝。

地勢 東北正南兩方皆山，湟水橫貫中部，形成狹谷，兩岸裝田饒灌溉之利，縣治高度1,215公尺。

山脈 有小積石山與祁連山，支脈綿延，占縣境面積不少也。

河流 有湟水、勝耆溝河、崗子溝河、雙塔溝河、高店溝河、馬哈拉溝河、峯堆溝河、虎狼溝河、下水磨溝河、卯寨溝河、弩木只溝河、上水磨溝河、羊官溝河、迭爾溝河等，湟水灌田最多，勝耆溝及崗子溝河次之，羊官溝及迭爾溝兩河最小。

土質 為栗鈣土、未成熟之淡栗鈣土、黑鈣土等。

氣候 1、雨量——7、8月份最少、9月份最多。

2、霜期——秋霜降于8月中旬、春霜止于翌年分

月下旬。

湟源縣

地理

位置 居省會之西部、縣治在北緯 $36^{\circ}50'$ 、東經 100° 。

沿革 秦漢為西羌地、王莽置西海郡、隋置西海河源諸
郡、唐(黑齒常於河源屯田 5000 餘頃)寶應時溢於吐
蕃、五代至宋、魏稱西蕃、清為丹噶爾廳、民國二年

改今名。

廣袤 東西 60 里 南北 68 里

面積 $3,093$ 方里 合 $2,670,220$ 畝。

地勢 四周多山、惟湟水橫貫中部、地勢較平、灌溉
稱便、為農業發達之區、縣治海拔 $2,000$ 公尺。

山脈 東有日月山、東南有峨博山、東北有八寶山、南
有翠山、西有拉拉達板山、北有河拉大山等地高氣
寒、適於牧畜。

河流 境內有湟水、巴燕河、藥水河、白水河、毛吉河、
阿家兔河、拉拉河、仲隆河等、農田水利頗利賴焉。

氣候 1. 雨量—— 6 月份最少 10 月份最多

2. 霜期——秋霜降于 8 月、春霜止于 8 月。

鹽源縣

地理

位置 居省會之北部、縣治在北緯 $35^{\circ}57'$ 、東經 100° 。

西、南距省會約 100 里、東界甘肅永登、南界大通、互助、西界西寧、都蘭、北界甘肅武威、永昌、民樂、張掖。

沿革 本縣于民國 19 年由大通縣劃出北大通永安堡一帶

、西寧縣劃出仙米寺一帶而成、治設北大通。

廣袤 東西 300 里、南北 75 里。

面積 $16,409$ 方里合 $8,860,860$ 畝。

地勢 四周負山、浩鹽河橫貫中部、兩岸平坦、適於種植。

山脈 東北有祁連山、南有大坂山、西北有經陽嶺、祁連山終年積雪、酷暑不消、惟水草繁茂、頗適牧畜。河流 有大通河（即浩靈河）、老虎溝河、硫磺河、卧牛河等。可資灌溉。

土質 為黑鈣土、淡栗鈣土、栗鈣土及寒冷峻嶺薄土。氣候 1. 雨量——10月份最少、1—2月份最多。

2. 霜期——秋霜降于8月春霜止于翌年5月。
3. 冰期——立秋後至清明前止。

共和縣

地理

位置 居省會之東部、縣治在北緯 $36^{\circ}10'$ 、東經 99° 。

北距省會 100 里、東界化隆、南界貴德、西界都蘭、北界西寧、湟源。

沿革 本縣前為藏民遊牧地、民國 18 劃上下郭密恰布恰及沙珠玉一帶而成治設曲溝、現移恰布恰。

廣袤 東西 90 里 南北 120 里。

面積 $25,577$ 方里 合 $13,524,780$ 畝。

地勢 東北面山、南瀕黃河、故地勢東北高而沿河

低。兩岸土地肥沃。農業較為發達。

山脈 東有日月山、拉脊山、素爾苟山、甘家大山、郭什則山、北有文傳塞什家山等。約占全縣面積一大半。惜氣候寒冷。未能種植。

河流 有黃河、龍克河、倒淌河、恰布恰河、沙珠玉河等。多資灌溉。

土質 為黑鈣土、栗鈣土、未成熟之淡栗鈣土等。

氣候 1. 雨量——6月份最少 9月份最多。

2. 霜期——秋霜降於8月 春霜止於5月下旬。

循化縣

地理

位置 居省會之東南部、縣治在北緯 $36^{\circ}00'$ 、東經

$102^{\circ}00'$ 、西北居省會 170 里、東界甘肅臨夏、永靖、

南界甘肅夏河、西界同仁、貴德、北界化隆、民和。

沿革 古為高貢雍州地、東晉為臨津縣、唐為米川縣

、宋為積石軍、元為積石州、明為積石所、清為循

化廳、民國改今名。

廣袤 東西 70 里 南北 70 里。

面積 4823 方里 合 2604.400 畝。

地勢 四周多山。岡陵起伏。黃河自西而東。經流本縣

北界凡一百里。南岸土地肥沃。為本縣農耕之區。

山脈 東有大力架山。南有唐述山。北有小積石山等。放牧採木。均仰賴之。

河流 有黃河、清水河、街子河等。饒灌溉之利。

土質 未成熟之栗鈣土。及淡栗鈣土。石灰質土。灰鈣土。及黃灰色之漠境土。

氣候 本縣氣候溫和。上等水地一年可望兩熟。茲另列雨量等如次

一、雨量——6月份最少。8—10月份最多。

2、霜期——秋霜降於9月春霜止於5月下旬。

3、冰期——自9月至翌年2月止約六個月。

化隆縣

地理

位置 居省會東南部、縣治在北緯 $36^{\circ}10'$ 、東經 $102^{\circ}00'$ 。北距省會 180 里、東界民和、南界循化、貴德、西界共和、北界西寧、樂都。

沿革 東晉為黃河郡、北魏及周為廣成縣、隋為化隆縣、唐復為廣成縣、五代為末格川縣、宋為廓州、元明均屬西寧州、清為巴燕戎格廳、民國改今名。

廣袤 東西 310 里、南北 90 里。

地勢 四周多山、地勢極高、黃河自西東流、澆灌本

縣南界一部份平地。

面積 八〇一三·五方里 合六、七三五·〇二畝。

山脈 東有青沙山、毛洞山、南有孛家山、西有河米吉利山、北有馬彥山、克欠山等、占全縣面積不小。

河流 有黃河、馬燕河、青沙河等可資灌溉。

氣候 1. 雨量——6月份最少、11—12月份最多。

2. 霜期——秋霜降於9月春霜止於6月下旬。

3. 冰期——11月至翌年9月共八個月。

貴德縣

地理

位置 居省會之東部、縣治在北緯 $36^{\circ}10'$ 、東經 $101^{\circ}00'$ 、北距省會 150 里、東界循化、南界同仁、西界遊牧地、北界共和、化隆。

沿革 本縣在漢晉為河關縣、東晉為洮河縣、周為洮河縣、隋為河津縣、唐為積石軍、元為貴德州、明屬貴德、清為貴德廳、民國二年改今名。

廣袤 東西 600 里 南北 190 里。

面積 $31,008$ 方里 合 $16,744,320$ 畝。

地勢 境內多山、黃河流貫北部、僅一部份平地、適於農業。

山脈 東有郭兔山、駐馬山、仙跡山、六娃山、東南有五柞山、果卜札山、圓柱山、寒塘山、南有石門大山、莫却山、剛咱山、龍池山、西有八湖山、多拉山、三泉山等、饒林木之利。

河流 有黃河、東河、西河、暖泉、清水河等、足資灌溉。

氣候 1. 雨量——6月份最少、8月份最多。

2. 霜期——秋霜降於8月、春霜止於翌年5月。

下旬。

都蘭縣

地理

位置 居本省之西北部、縣治在北緯 $37^{\circ}00'$ 、東經 $98^{\circ}20'$ 、東距省會 110 里、東界湟源、東南界共和、東北界疊源、西界新疆、西南界玉樹、北界甘肅。
沿革 為蒙藏民族遊牧地、民國十二年、設都蘭理事、
19年設縣、縣治設希里溝。

廣袤 東西約 1567 里、南北約 200 里。

面積 $258,000$ 方里、合 $463,320,000$ 畝。

地勢 四周多山、中部平坦、因壘成極廣天之柴達木

盆地。

山脈 東有克拉牙壑沙拉拉山、東南有當哈伊廉
圖山、南有布青山、積石山、西南有巴顏克拉山、西
有列庫而烏蘭達布遜山、北有祁連山、歐西喜山、磁
窰山、布諾哈山、黎頭山、拜王圖嶺、中部有阿來哈
山等、高峰插雲、積雪難消、林木而外、甚少利用。

河流 有拉干池河、阿里克河、伊克烏蘭河、巴汗烏蘭
河、旦吉河、布哈河、巴燕光耳河、察汗烏蘇河、察上
音卡河、柴達木河、伊克克爾河、傳門果勒河、却爾
根果勒河、哈拉哈圖河、寨什克河、都蘭寺河、莫湖

爾河等、農田水利、多利賴之。

湖泊 有青海、英額池、沙爾池、吉遜湖、烏爾寧湖、

把哈泊、察卡鹽池、希里溝池、柯柯鹽池、伊哈淖爾及
庫色池等、含鹽鹼甚重、故產青鹽不少。

土質 粟鈣土、淡栗鈣土、灰鈣土及黃灰色之漠境土、

石灰質壤土。

沙漠 柴達沙漠、廣漠無際、普通圖籍所載之沮洳地、

據實地旅行者言、僅四周沮洳難行、中則全係沙漠云。

氣候 1. 雨量——六月份最少、八月月份最多。

2. 霜期——秋霜降于八月、春霜止于五月下旬。

3. 冰期——本縣屬地廣濶，冰期亦不一致。