

幼 幼 集 成

五

中國醫學大成第十集

兒科類甲  
兒科叢刊之一

幼幼集成五

上海大東書局印行

# 幼幼集成

清 羅浮 陳復正 飛霞輯訂

鄞縣 曹赤電炳 章園校

## 卷五

### 萬氏痘癩

### 天元賦

痘本胎毒。俗曰天瘡。傳染中於外感。輕重過於內傷。初起太陽。壬水尅乎丙火。次歸陽明。血水化爲膿漿。所喜者紅活鮮潤。可畏者黑陷焦黃。勢若燃眉。變如反掌。皮膚臭爛。血氣虛耗。若救焚兮徙薪。如何焦頭似拯溺兮落井不及寬裳。原乎一元肇化。二索成祥。慾火動而妄作。胎毒熾而流殃。啼聲驟發。機毒深藏。命門養火。胞戶收鎔。待四時之疫癘。動五臟之皮囊。榮氣逆於腠理。惡血發於膀胱。二火相

煽。四大成瘡。毒之輕者發則微。貴乎調養。毒之重者發則密。急於隄防。至於運氣推遷。在於勝復升降。時令乖異。無非寒熱溫涼。苟陰陽之逆理。爲氣候之反常。五行鬱而災見。九曜莽而變彰。厲氣流行。無論郡邑鄉黨。惡毒傳染。豈分黎庶侯王。此則不形於診。貴則能制其亢。先事解散兮十全八九。臨時區處兮恥尋常。

大抵氣運先歲。痘診屬陽。春夏爲順兮。樂其生長。秋冬爲逆兮。惡其收藏。暴寒兮。恐邪毒之鬱遏。暴熱兮。慮腠理之開張。膿疮春而不療。黑陷夏以爲殃。秋斑實惡。冬疹非祥。此逆四時之令。休誇三世之良。且如證候殊形。臟腑異狀。肝主淚而米泡。肺主涕而膿漿。心斑紅豔。脾疹赤黃。惟腎經之無證。惟變黑而可妨。所以觀乎外候。因而辨其內臟。呵欠煩悶兮。肝木之因。咳嗽噴嚏兮。肺金之相。手足冷而昏睡兮。脾土困於中央。面目赤而驚悸兮。心火炎於膈上。耳聾屬腎。溫煖如常。二處爍熱兮。下極火炎而必斃。四肢厥冷兮。中州土敗而傾亡。

先分部位。次察災祥。陽明布於面中。太陽行於頭上。心肺居胸膈之要。肝膽主脇腋之旁。手足司於脾胃。腰背統於膀胱。泄瀉者邪甚於下。嘔吐者邪甚於上。氣逆而腹痛隱隱。毒深而腰痛皇皇。心熱甚而搐搦。胃邪實而顛狂。鼻燥咽乾。肺受火

邪而液竭。尿軟溺澀。腎由火旺而精亡。氣弱減食者。不任其毒。神強能食者。不失其常。

欲決重輕。但觀發熱。如占順逆。須認其瘡。毒甚兮。身如炎火。熱微兮。體或清涼。若寒熱之來往。定徵兆之佳祥。數番施出兮。春回陽谷。一齊湧出兮。火烈崑岡。蚊跡蚤斑。刻期而爲鬼籙。蛇皮蠶殼。引日而還泉鄉。不喜珠紅。更嫌灰白。最宜蒼蠅。切忌紫黃。常要明潤兮。恐薄嫩之易破。不能乾枯兮。防搔癢之難當。惡候如此。上工審詳。面頰稀而磊落。清安可保。胸膈密而連串。凶吉難量。頂要尖圓。不宜平陷。漿宜飽滿。切忌虛空。兼之顏色喜老而惡嫩。皮膚愛糙而怕光。談起根窠。終防癢塉。白浮皮肉。必主夭殤。頭面預腫兮。三陽亢甚。手足厥冷兮。五臟摧傷。瘡堆喉舌。毒纏頸項。咽喉痛而呼吸則難。飲食少而呞吐則嗆。此天命之安排。豈人力之可仗。煩燥悶亂兮。七神離散。譖語眩冒兮。五毒猖狂。鼓項戰慄兮。肺敗咬牙口噤兮。腎傷渴不任兮。焦膈瀉不止兮。滑腸失聲兮。咽爛吼氣兮。腹脹晝夜搔爬兮。將營衛或外脫。乳食斷絕兮。必胃氣之受戕。腫忽消。毒歸於裏。色反黑。疔起於瘡。食穀則嗆兮。在嬰見之命促。飲水則噴兮。較醫工之短長。輕重反復。調理乖張。輕變重

而可畏。重變輕而莫慌。風寒素慎。飲食如常。出入禁乎男女。蓋覆適其溫涼。內無妄動。治不乖方。此則變輕之候。實爲保命之良。若當犯乎禁忌。或誤投乎九湯。徒肆房室。不順陰陽。外感不正之氣。內傷不時之糧。平人且病患者焉。當是以順則逆而逆則險。宜乎輕變重而重則亡。

發自肺經。相連脾臟。氣熱味辛。燥金受尅。形寒飲冷。華蓋先傷。恣飲則水來侮土。而成泄痢。過食則脾不運化。而作痞脹。皮毛虧損。肌肉虛短。起發遲而不胖壯。收醫緩而作膿瘡。輕則延綿乎時日。重則泣送於郊邙。奈愚夫不知曉。致生命之夭亡。不信醫而禱諸神鬼。枉殺牲而號呼穹蒼。

藥貴中病。醫不執方。喜行溫補者。動稱乎文山。專用涼瀉者。祖述乎仲陽。貴其因人而治。相時而行。正氣爲先。戒開門延寇。解毒爲急。休視虎執狼。首尾不可汗下。法之固執。緩急各有權宜。治之經常。拘其繩墨者。如守株之待兔。惑於方書者。似多岐以亡羊。且如紅掀紫腫兮。涼血爲上。灰白平陷兮。補氣最良。出不快兮。責表實。而發散可用。便或祕兮。責裏實。而疏利何妨。毒不能速解。毒甚令微汗之散越。熱不可盡除。熱劇者使小便之清長。三陰多寒兮。必投辛熱。三陽多熱兮。無過

苦涼。安可惡寒而喜熱。莫如貴陰而賤陽。是故補氣者參耆白朮。養血者歸芍地黃。發散表邪。輕葛根而重官桂。疏通裏實。微枳殼而甚大黃。解毒兮芩連梔子。快斑兮荆防牛蒡。連翹藥內之要領。甘草方中之君相。咽痛求諸甘桔。頭腫取乎羌防。木通利其小水。人屎攻其黑瘡。氣逆兮青皮陳皮。胃寒兮丁香木香泄瀉無如芩朮。嘔吐莫若生薑。麥冬乾葛而止渴。厚樸腹皮而消脹。望月砂退翳有準。穿山甲排毒無雙。枳殼麥芽山楂子。消宿食而尅化。大黃乾葛地骨皮。解餘熱以清涼。咳嗽以枳桔。又用杏仁。痢疾以黃連。再同木香。苦參主乎熱毒。漏白治其瘡瘍。用之合宜。工可稱良。其諸藥物各有主張。春夏桂枝而少服。秋冬芩連而莫嘗。瘡若乾枯。白朮非其所貴。色如紅豔。黃耆豈可入方。裏虛少食者勿投枳實。表虛多毒者休使生薑。汗自出兮用乾葛。重虛其表。溺本數兮加木通。再損其陽。泄瀉酸臭兮。訶寇不宜輕用。嘔吐清冷兮。連梔安得作湯。凡用芩連必資炒製。如加丁桂。須假寒涼。應制伏而不誅無過。保和平而萬壽無疆。

大勢若平。餘邪須講。熱毒流肝兮。雙睛生翳。火邪入脾兮。四肢成瘍。口內生瘡兮。爛齦破舌。腹中作痢兮。腐胃敗腸。皮膚嫩而洗浴太早。因以添熱。臟腑虛而甘肥。

太過。遂致自傷。若中風寒。凝痰作嗽。灰白頂陷。灌蝕歸瘡。

嗟夫。惟此證候。其苦非常。外纏皮肉。內連腑臟。改換形容。如蛇之皮龍蛻骨。淋漓膿血。若蚓在灰。蟮在湯。軒岐置而未言。秦漢棄而無方。古無此證。或云起於建武。今有是疾。相傳得於南陽。拘於日數者。不知輕重之責。執其偏見者。枉增虛實之防。本溫再熱。已寒又涼。徒自膠而必固。反致惡而見殃。透骨髓之真詮。非其人而不授。宣肺腑之祕奧。牢記誦而莫忘。

痘疹西江月

凡四十首

痘疹毒從何起。母胎火毒流傳。生來穢物下喉咽。藏在命門裏面。一旦天行時氣。感令相火熬煎。毒從骨髓見皮間。彼此一般傳染。

五臟各有形證。認時須要分明。往來寒熱睡脾經。呵欠頓悶一證。咳嗽噴嚏受肺。面紅驚悸屬心。惟腎清靜忌邪侵。手足耳尻俱冷。五臟各有一證。其間治法難同。肝爲木火。肺爲膿。大小瘡形異種。脾證發爲疹子。心經現作斑紅。腎爲黑陷。病多凶。縱有靈丹何用。

痘疹要知順逆。天時人事相隨。大端陽火是根基。若遇陰寒不喜。春夏發而多吉。秋冬逆以何疑。如逢稠密必凶。危稀少方爲平易。治法而今不定。清涼溫補分明。各持一見論紛紜。自曰予爲神聖。解毒喜行涼瀉。補中愛使辛溫。不明時令與元神。枉自捕風捉影。假令天時暄熱。辛溫助爲災殃。嚴凝涼解雪加霜。病者何如抵擋。壯者再行溫補。虛延又使寒涼。虛虛實實伐元陽。無異隔靴爬癢。看取時行疫癘。天時熱氣炎炎。精神肥健食能兼。解毒清涼甚便。若是風寒火甚。虛羸吐瀉連綿。此宜溫補法爲先。又在醫人活變。痘疹要知輕重。吉凶順逆精通。毒輕瘡少順家風。湯藥不宜妄用。瘡密毒重爲逆。皮膚寸寸成膿。此般形證例多凶。仔細扶持休縱。輕者三四次出頭面胸背稀疎。小便清利大便稠。飲食如常充足。重者遍身齊出。狀如麻子麥麸。咽疼泄瀉悶悠悠。飲食不思可惡。多有先輕後重。只因觸冒風寒。房勞不避穢腥。食飲偏於冷暖。閒雜人帶穢厭。諸般禽獸盤桓。庸工術淺誤湯丸。反使痘疹變換。

重者變輕何以常常和暖衣衾。房中謹密少人行飲食隨時添進未見誤投湯藥。不曾妄啖酸腥此爲人事奪天靈安可歸於有命。要識痘瘡死證無過五證分明紫黑喘渴悶何寧。癰壩咬牙寒噤灰白頂陷腹脹皮嫩易破成坑泄瀉氣促見鬼神聲啞頭面足冷。

旣識五般死證其間吉病如何瘡頭飽滿作膿窠任是推磨不破四畔根盤紅活安眠靜臥平和光狀收醫不蹉跎管取疥疾勿藥。

黑陷乾枯腎敗咬牙寒戰肝傷失聲嗽氣肺摧創泄瀉脾虛腹脹癰壩悶亂心死狂言見鬼神亡皮嫩易破氣無陽便血陰崩模樣。

首尾不可汗下汗時腠理開張風寒易入透斑瘡收醫不齊火旺誤下必犯脾胃無事自取內傷泄瀉黑陷致傾亡在使魂靈飄蕩。

大抵痘瘡未出先須升葛參蘇如斯不出汗忙疏紅點見時藥住大便若還祕結。

輕輕四順相符假饒自利伐無辜定與閻羅掌簿。

調痘無過二法補中解毒兼行補中參朮草耆蒼枳實山查有應解毒芩連梔藥連翹枳實荆防芎歸養血妙如神加減消詳前定。

血氣要分虛實。但於瘡色推求。紫腫紅掀血實由。四物內加解毒藥。灰白中陷氣弱。四君子是良謨。略加解毒藥相符。補氣實脾無誤。

但是痘瘡初出。如逢熱盛昏醒。解毒發散藥先行。莫待臨渴掘井。桔根升麻乾葛。連翹甘草黃芩。牛蒡梔子木通荆蟬蛻防風作引。

若是如常潮熱。只消乾葛升麻。芩連甘草赤芍加。牛蒡連翹無價。或用參蘇飲子。青皮木香內加。煎來一服勝靈砂。痘見表疎繼罷。

初熱多生搐搦。急將導赤疎通。木通甘草與防風。生地黃連同用。再着辰砂調服。須臾救護朦朧。此方端的有神功。管取行之必中。

壯熱不曾出現。大便祕結難通。顛狂脣裂眼珠紅。此證凶危堪慟。急與芩連梔檗。大黃酒炒疎中。連翹牛蒡與木通。貫衆射干俱用。

自此出而獨祕。認他虛實調醫。虛家泄瀉色如灰。大補十全堪取。若是腫掀紅綻。芩連梔檗芎歸。翹夢丹葛桔甘奇。此個真機妙祕。

灰白不能起發。又加泄瀉頻頻。溫中妙藥不宜停。急急扶危濟困。當歸黃芩芍藥。甘草乾薑人參。木香梔子及青陳。官桂丁香靈應。

毒甚常生咽痛。可憐飲食難嘗。射干甘桔最相當。連翹升柴牛蒡。若是痘堆頭項。  
此名鎖膈悽惶。一朝破爛合將亡。變作喑啞水滈。

起發狀如蠶殼。乾枯不見水漿。此名血竭毒歸藏。不治必然命喪。當歸地黃養血。  
參耆甘草溫良。連翹牛蒡與木香。桔梗青皮發旺。

起發當將燃視。切防黑陷來攻。若然黑陷現其中。藥點許多妙用。碗豆七粒燒過。  
亂髮火煅和同。珍珠水浸胭脂紅。針破搽之自腫。

藥點反加黑陷。喪門吊客忽忽。百祥牛李與宣風。總是脫空賣弄。不如人貓鷄犬。  
四般舉煅和同。木香湯引妙無窮。妙法半文不用。

起發初生搔癩。比於瘡瘍爭差。傷寒身癩表留邪。痘亦同茲休訝。治用疎風涼血。  
荆防翹蒡芎麻。地黃歸葛效堪誇。竹葉木通無價。

大抵痘宜脹痛。最嫌虛癩相干。只因飲食溼邪攢。心火尅而悶亂。外宜茵陳艾炬。  
內宜參朮湯丸。若還止癩證方安。抓破面皮凶斷。  
何爲正面怕癩。面含五臟精華。假如破損實堪嗟。氣散魂飛魄罷。尤忌先傷正額。  
心經火帶虛邪。幾番試驗不爭差。寄語明人體察。

相火位竅正額。出現脾壯休先。果然額上痘蟬聯。大抵凶而不遠。喜是兩頤口鼻。  
始終都在其間。任教稠密勢纏綿。到底終無傾險。  
起發成漿欲癧。忽然泄瀉來攻。此時脾胃不宜空。變出百端可憚。多是內傷飲食。  
只求藥有神功。若還清腫泄淋膿。父母北邙泣送。  
先用人參白朮。黃耆炙草煨薑。茯苓山藥及木香。大劑煎來溫養。不效次求荳蔻。  
木香艾實良方。這番只有異功奇效。實盡頭酌量。  
記取成漿醫皴。最防厭穢腥膻。大黃蒼朮共燒烟。可解一切穢厭。內服調元飲子。  
黃耆炙草人參。當歸蒼朮酒芩連。犯着荆防卽變。  
到得成漿痘熟。飯時都要成痂。若還腐爛臭腥加。此是表虛堪訝。急進參耆歸朮。  
荆防蒼葛升麻。連翹牛蒡密蒙花。休得弄真成假。  
若是痘疹熟爛。皮破膿血淋漓。內服歸朮與黃耆。牛蒡連翹官桂。外用多年敗草。  
晒乾研細成灰。鋪開床席合施爲。最解火邪毒氣。  
痘熟不能收效。反行破爛成瘡。一時焦痛甚難當。請問如何發放。但取甘草滑石。  
辰州豆粉清涼。蜜調塗上便安康。此法不留書上。

有等痘瘡純正。緣何日久難收。請君仔細問根由。不可臨時差謬。或是曾傷冷水。或因祕結熱留。兩般治法各推求。不枉青囊異授。

果是曾傷冷水。溼傷脾胃皆虛。脾應肌肉主中樞。無怪血膿流注。可用參耆蒼白。青陳甘桔無拘。丁香官桂有方書。救裏收表妙處。

如是大便祕結。主竅一切不通。此爲熱氣內蒸烘。因此毒難開縱。內服歸黃麻子。大黃略入相攻。再行膽導妙無窮。管取成痂去壅。

收後許多餘證。醫家須要分明。毒留肝臟自生疔。翳瞳人隱隱。毒入肺脾癰腫。責歸手足陽明。內傷外感要調停。免致多少怪病。

兩目忽然腫痛。痘家毒入肝經。輕爲浮翳掩瞳睛。重則終身廢病。去翳菊花蟬蛻。蒙花蒺藜穀精。各爲細末共和勻。湯煮豬肝作引。

癰毒發於肢節。常常膿血不乾。不知調理早求安。廢疾終身爲患。內服千金托裏。外塗方千金丹。排膿長肉未爲難。任是千金不換。

痘後不宜潔浴。痘疤皮嫩易傷。不知禁忌受寒涼。遍體熱生痛僵。此因傷寒勞復。不宜官桂麻黃。只須九味羌活湯。次以補中調養。

痘後或傷飲食。致令腹痛非輕。不宜轉下損脾經。消導方爲對證。白朮人參枳實。

黃芩瞿麥青陳。山楂白茯與砂仁。積化痛疼俱定。

痘爛不齊收靨。正面灌痛流膿。急防兩目毒來攻。解毒清涼好用。酒炒芩連梔蘖。

連翹蟬蛻木通。升麻牛蒡苦參同。細研酒丸酒送。

大凡痘瘡一證。名爲百歲聖瘡。如龍蛻骨換心腸。又似蟬蛻殼樣。出現光壯收靨。

落痂顏色相當。飲食寒暑順陰陽。自此精神長旺。

### 痘有順險逆并五善七惡之症

順證 氣血冲和。痘毒宣暢。精神素健。飲食如常。不必施治。

險證 氣血不舒。痘毒壅遏。或雜證攬擾。開落失期。速宜施治。

逆證 痘毒凝結。氣血乾枯。怪證叢生。病不對藥。治之無功。

五善 一飲食無常。二大小便調。三瘡色紅活。皮厚堅實。四脈靜身涼。手足溫暖。五聲音清亮。動止安和。五者不能盡得。得一二方自常音。

七惡 一煩燥悶亂。譖妄恍惚。二嘔吐瀉利。飲食不能。三黑陷焦枯。癟壩破。

爛。四頭面預腫。鼻煽肩擡。目張脣裂。  
寒顫咬牙。聲啞色黯。七腹脹喘促。四肢厥冷。  
七惡之外。又有渾身血泡。心腹刺痛。伏陷不起。便溺皆血。  
尋衣撮空。是又卒死而不可救者。

痘疹總略歌凡一十五首

痘雖火毒肇胚胎。不遇天行不見災。郡邑若逢疵癟日。預施靈藥解將來。  
凡痘疹之證。皆由父母胎毒蓄於命門之中。命門者下極丹田也。爲人身生化之  
源。或遇冬溫。陽氣暴泄。人則感之。觸動相火。至春夏生長之時。卽發傳染相似。是  
謂天行疫厲也。未出痘疹者。但覺冬溫。宜先服解毒之藥。如辰砂散。三豆湯。代天  
宣化丸之類。使毒氣無預伏。留連之患。如脾胃素弱者。更宜調其胃氣。間以四君  
子湯。加陳皮木香之屬。與之使胃氣和暢。榮衛流通。痘瘡易出易醫也。  
予按代天宣化。卽韓氏之五瘟丹也。苦寒尅削。損胃敗脾。縱能解疫厲之毒。未  
必能預解先天之毒。即使能之。亦只可行於藜藿稟實之兒。倘膏粱稟怯。不察

妄投。吾恐毒未解而胃先損。痘未至而中已寒。預伐無辜。暗傷真氣。及出痘時。反不能救。夭枉相仍。咎將誰諉。蓋藜蘆稟實而毒輕。無俟於解。膏粱稟薄而毒重。勢不能解。豈有先天之毒深藏。潛伏於命門之中。毫未發覺。而敢用此沉陰沴寒之品。預伐其生機。誠爲危道。必不可行。即欲解之。又不若三豆湯之爲得也。

欲知痘疹吉凶機。察色觀形在細微。年壽山根猶緊要。鮮明可喜黯青非。痘疹未出之先。欲知吉凶重輕。但於面部推之。其色紅黃明潤者吉。青黑昏黯者凶。相書以山根管命宮。年壽管疾危。所以二處猶爲緊要也。

汗下雖然謂不宜。刻舟求劍豈通醫。能分虛實知權變。可越乾坤造化維。首尾不可汗下。誠痘科固執之言。然亦自其平證語之耳。若遇風寒外襲。應出不出。則汗劑仍不可少。如大便連日不通。煩悶狂燥。不與下之。寧不失人生命。是下劑在所必用。但能消息虛實與權變。斯可謂之通醫。

始終便溺自謂嘉。便若艱難事可嗟。腹脹喘呼多壅遏。急行疏導免留邪。比吉可利。則利者大抵痘瘡。始終小便清利。而大便滋潤者爲順也。若小便或祕

急宜利其小便。宜入正散。若大便祕結。速用通幽湯滋潤之。

痘家脈證喜中和。徐疾由來不可過。弦急浮洪爲實候。微遲短濶屬虛多。夫人以胃氣爲主。脈亦當以胃氣爲主。脈有胃氣則氣象中和。所謂弦不弦石不石者是也。太過爲實。不及爲虛。最宜消息。

痘疹傷寒證一般。上下臨證貴詳端。休將汙下輕相試。解表和中病自安。痘疹發熱與傷寒相似。但傷寒只見脈經形證。若痘疹則五臟之證皆見。如呵欠頓悶。肝證也。乍冷乍熱。手足稍冷好睡。脾證也。面燥腮赤。咳嗽噴嚏。肺證也。驚悸不寧。心證也。尻涼耳涼。腎之平證也。若尻耳俱熱。則邪伏腎經也。

痘疹雖然本屬陽。往來微熱始相當。倘逢晝夜身如火。解毒須教小便長。凡痘疹屬陽。非熱不成。故治痘不可盡除其熱。如熱太甚。毒未發盡。只宜解毒兼利小便。宜連翹升麻葛根湯。

飲食能多。胃氣充。自然榮衛兩豐隆。休言食少無他慮。但恐脾虛毒內攻。痘疹始終能食者。其人脾胃素強。自然氣血充實。易壯易醫。若一口食游。即宜詢問。或咽喉腫痛。宜甘桔湯。傷食者。橘皮湯。若非已上二證。因脾胃氣弱。不能消食。

者宜參苓白朮運用之。

最宜安靜號平和。表裏無邪心自清。忽爾躁煩宜審諦。更防神爽欠分明。  
痘瘡以安靜爲貴。此表裏無邪不必服藥。但有煩躁必毒氣壅併。表裏安寧宜審  
諦之。如搔爬不寧瘡癩也。心神不寧裏熱也。呻吟不止瘡痛也。非折肱之手。莫能  
識其病情。已上治見後

四時分治證須真。暑溼風寒各有因。異氣莫教輕觸犯。災危反復立纏身。  
大凡治病之道。春夏養陽。秋冬養陰。故春病治在肝。夏病治在心。秋病治在肺。冬  
病治在腎。不可逆也。治痘之人切須識此。如天有烈風暴雨。酷暑嚴寒。常要謹其  
帷幕。適其寒溫。寒則蓋覆欲厚。熱則居處欲清。苟傷熱則血氣淖澤。瘡易腐爛。偏  
寒則血氣凝滯。瘡難起發。若有觸犯。輕則變重。卒生異證。是謂災怪。如暴風連日。  
病見傷風之證。治以桂枝葛根湯。如寒威凜烈。病見傷寒之證。治以正氣散。若酷  
暑熏蒸。病見熱證。治以人參白虎湯。倘值久雨侵溼。有受溼之證。泄瀉身重。治以  
胃苓湯。

治痘皆言在補脾。補中有害少人知。虛虛實實休輕放。審症施方貴合宜。

凡痘瘡始終以脾胃爲本。若飲食如常。六腑充實。不須服藥。若補其脾。反增煩躁。爲害匪輕。倘不能食。常多泄瀉。此氣虛也。宜四君子湯助之。

入方

辰砂散 預解時行痘毒。

鏡面砂一錢研末水飛

乾絲瓜近蒂三寸連皮帶子燒灰有性

右研末。蜜水調分三次服。

三豆湯 預解痘毒。不損元氣。

紅飯豆一升

黑大豆一升

鮮菉豆一升

生甘草三兩

右以三豆淘淨。甘草切碎。入雪水八升。若無雪水。以長流水代之。同煮豆熟爲度。去甘草。將豆晒乾。又入原湯內。再浸再晒。汁盡爲度。逐日取豆與兒食之。最解病毒。

代天宣化丸即五丹 預解時行疫癘。傳染相似。併治痘毒。

人中黃屬土甲之年爲君 黃芩屬金乙之年爲臣 黃蘗屬水丙之年爲君 黑梔仁屬木丁之年爲臣

雅黃連屬火戊癸鮮苦參佐

荆芥穗佐

北防風佐

淨連翹佐

山豆根佐

牛蒡子佐

家蘇葉佐

前五味視年之所屬者爲君。其餘四味俱以爲臣。爲君者分兩倍之。爲臣者半之。爲佐者如臣四分之三。冬至之日修合爲末。取雪水煮升麻湯加竹瀝在內。煮神麴糊爲丸。龍眼核大用辰砂明雄黃爲衣。每服一丸。竹葉湯下。製人中黃法。取大甘草不拘多少。納入竹筒中。緊塞。卽日放在糞缸中。浸七七日。取起晒乾聽用。

八正散 治痘疹小便祕。宜清心火利膀胱。

淮木通

白滑石

小甘草

淨連翹

綠升麻

結豬苓

赤茯苓

陳瞿麥

淡竹葉已上各一錢

燈心十莖

水煎熱服。

通幽湯 治痘疹大便祕結。宜潤腸涼血降火。

紫草茸

當歸尾

懷生地

火麻仁

陳枳殼

酒大黃

尖檳榔

鮮紅花

桃仁泥各等分

生薑一片爲引

水煎熱服。

連翹升麻葛根湯。治痘毒不能盡發。宜升托之。

淨連翹

綠升麻

粉乾葛

京赤芍

芽桔梗

酒黃芩

黑梔仁

淮木通

麥門冬

牛蒡子

白滑石

炙甘草

淡竹葉七片

燈心十莖爲引

水煎熱服。

加味甘桔湯。治痘疹不能飲食。由咽喉作痛。

大甘草君

芽桔梗君

牛蒡子

鮮射干

綠升麻

荆芥穗

燈心十莖

水煎熱服。

橘皮湯。治痘疹不能飲食。由傷食所致。

廣陳皮

杭青皮

陳枳殼

南木香

生甘草

山查肉

白雲苓

麥芽

一撮爲引

參苓白朮散

治痘疹脾胃虛弱。不思飲食。

官揀參

漂白朮

白雲苓

粉甘草

京查肉

真廣皮

芽桔梗

南木香

砂仁三粒爲引

桂枝葛根湯

治痘疹初起。傷風咳嗽自汗。

柳楊桂

京赤芍

粉乾葛

炙甘草

生薑三片

大棗三枚

北防風

水煎熱服。略暖蓋覆。

正氣散 治痘疹初起。因傷於寒。作熱無汗。頭身痛。肢強。

漂蒼朮

廣陳皮

川厚朴

南木香

淨麻黃

柳楊桂

炙甘草

生薑三片

大棗一枚

水煎溫服。

人參白虎湯 治痘疹初起。夏月傷暑。大熱煩躁作渴。

官揀參

淨知母

熟石膏

大麥冬

蜜香葉

白扁豆

炙甘草

梗米一撮爲引

水煎。熱服。

胃苓湯 治痘疹初起。傷溼泄瀉身重。

漂蒼朮

廣陳皮

紫厚樸

白雲苓

結豬苓

宣澤瀉

炙甘草

燈心十莖

水煎。熱服。

四君子湯 治痘疹脾虛食少。更多泄瀉。

官揀參

漂白朮

白雲苓

炙甘草

生薑三片

大棗三枚

水煎服。

四物湯 治痘疹能食。大便祕。瘡紅腫。

白當歸

正川芎

杭白芍

懷生地

生薑二片

水煎服。

發熱證治歌

凡二十五方

痘瘡初起身先熱。輕重吉凶何以別。熱輕毒淺吉堪云。熱重毒深凶可說。  
凡發熱乍進乍退與微熱者。其痘必稀而輕。毒亦淺。不必服藥。若蒸蒸作熱。煩躁  
昏眩。其痘必密而重。毒亦深。宜發表解毒。托裏加味葛根湯。

初逢熱渴邪藏裏。切忌冰瓜兼冷水。生津止渴是良圖。小渴任之而已矣。  
凡發熱作渴。因痘毒內蒸。銷其津液。故令口乾而渴。微者頻以炒米湯與之。切不

可以冷水凍過柑梨西瓜菱角之類。食之反傷胃氣。亦不可以板薑湯飲之。恐主瘡毒而有他變。渴甚不止。宜解毒葛根湯。

如痘已出齊。或起發。或收醫而渴不止者。宜人參麥冬散。

如泄瀉不止而作渴者。此脾胃虛弱津液枯也。宜七味白朮散。

腹痛剛逢發熱時。毒攻於裏報君知。大腸祕結須攻下。莫待臨危悔已遲。  
書云。發熱腹中痛。痹瘡毒內攻。發多生不久。發少更防癱。可見痘疹腹痛。即是毒氣內攻。便當托裏化毒爲上。不可逡巡以生他變。若飲食如常而腹痛者。宜化毒湯。如大便祕結。煩躁作渴而腹痛者。宜三黃解毒湯。若泄瀉而腹痛。宜建中托裏湯。

發熱腰疼毒伏留。幾人逢此得優游。人參敗毒真奇結。痛減瘡稀病可瘳。

凡痘疹發熱腹痛。其證最惡。遂用人參敗毒散托之。服藥後痛止者吉。不止者凶。

初時發熱多風搐。要識病源屬肝木。木能勝土又歸心。風人相爭脾不足。  
凡痘瘡發熱。有作搐者。因木邪盛而侮土。以導赤散加辰砂服之即止。此痘甚好。  
以搐擣發散於四肢故也。

如痘應出不出而搐搦不止。宜瀉青導赤散解之。服藥後搐止。但心煩啼叫用麥冬導赤散清之。

若痘已收醫。餘熱不退而作搐。此大虛之候。多不可救。但父母不忍坐視。強而治之。當以寧神湯合抱龍丸。倍加人參服之。輕者可愈。

熱時吐瀉相兼作。上下毒仰無鬱遏。三焦火盛熱中求。日久須防脾胃弱。凡痘瘡發熱。有嘔吐者。有泄瀉者。有吐瀉兼作者。不可驟止。令毒上下得出。但痘瘡現形。吐瀉即止者。吉兆也。如久不止。先以理中湯和之。如仍不止。以豆蔻丸止之。服藥後吐瀉既止。更服調中湯。使脾氣實。其痘易壯易壓也。

狂言躁擾。疑逢鬼神。識昏迷熱在裏。鎮心解毒以平期。譫妄不休應不起。凡痘瘡發熱。妄有所見而譫語者。或昏昏好睡。夢中囁語喃喃。或狂走尋衣摸牀。皆毒氣內攻。神室不清所致也。急用鎮心解毒之藥。以辰砂導赤散主之。服藥神情復舊者吉。不止則凶。不可治也。

渾身發熱四肢寒。脾胃虛衰陰冷干。益氣補中應令暖。仍前瘡盛急尋棺。凡痘瘡渾身宜熱。獨正尻二處宜涼。所以痘疹之證。頭宜涼。手足宜溫。若反冷者。

此脾胃虛弱也。四肢脾胃所司。宜補中益氣。扶其脾胃。斯可矣。

發熱熏蒸血妄行。不知何道。血如傾。但從鼻出。方無忌。別道來時。禍立萌。人身之血不可妄動。痘疹之火重。燦於內。迫血妄行。隨火而動。或從口出。或從大小便出。皆死證也。但從鼻出者。或有可救之機。宜玄參解毒湯清之。若煩燥悶亂。出血不止。此陽痘出血之證。多不可治。

晨昏發熱渾無歇。口舌生瘡脣破裂。咽喉塞痛食難嘗。方用黃連及甘桔。凡痘未出而熱不止。晝夜躁煩。口舌生瘡。脣裂咽痛。此毒火熏蒸。其熱甚急。治不宜緩。急以黃連解毒湯合甘桔湯治之。服藥不效者。不治。

微微熱汗吉之機。腠理疎通痘發稀。但恐汗多陽氣弱。調元固胃效無違。凡痘疹發熱自汗。此不必治。蓋腠理疎通。毒氣發越。無鬱遏也。所以古人喻如庖人蒸籠之法。但欲其鬆耳。如恐汗出太多。衛氣反弱。痘瘡不能成熟。用調元湯以止之。

惡熱憎寒且戰兢。表虛邪正兩相陵。但將柴葛加官桂。升散除邪吉可稱。痘疹所忌者。寒戰如發熱之時。憎寒振振戰動者。其人表氣素虛。痘疹欲出不出。

留連於肌腠之間。邪正交爭。戰人之象也。宜柴葛桂枝湯升散之。

發熱綿綿不現形。其間凶吉費調停。解肌托裏須斟酌。施治詳明內外寧。凡痘發熱三日便出者常期也。如過四五日猶不出。熱勢綿綿無休歇者吉凶之兆。未可卜也。急與解肌托裏分內外治之。疎者吉密者凶。如勞苦之人皮膚粗厚。腠理閉塞。及風寒外感。瘡爲外邪所遏。不易出者。此外因也。宜麻黃解毒湯。如因虛吐瀉。毒氣內陷而不出。及傷飲食。陳物菀萃腸胃之間。與毒合併鬱而不  
出者。此內因也。體虛者以托裏十補湯托之。體實者以枳實導滯湯微利之。

發表之時少定方。古人專用葛根湯能通權變知增減何必勞勞問短長。時師治痘方。逢發熱但知用葛根湯一見紅點便禁而不用。此乃不知權變者也。如痘見熱除表裏無邪。所以不可再用葛根湯。若痘已見熱甚不退。此毒深於內。尙恐葛根力小不足勝任。寧可止而不飲耶。

解毒升麻湯最良。紅斑雖見飲何妨。時師膠柱無通變。一見紅斑未敢嘗。

凡痘發熱初用解毒之劑。詳見各條之下。此不重贅。但附葛根湯加減之例於後。俾臨證擇用可也。

入方

加味葛根湯 治痘初熱毒氣深重。大熱眩暈。

綠升麻

粉乾葛

京赤芍

炙甘草

荆芥穗

北柴胡

牛蒡子

白桔梗

淨連翹

淮木通

北防風

水一碗淡竹葉一片爲引。如大便結。加紫草紅花。作渴。加麥冬花粉。不痛。加酒大黃。或祕結。亦用酒大黃解之。

解毒葛根湯 治痘疹初熱口渴不止。

粉乾葛

天花粉

綠升麻

杭麥冬

懷生地

酒黃芩

粉甘草

茅根汁

水煎衆藥熟。香茅根調服。

人參麥冬散 治痘已出。或收或癰而渴不止。

官揀參

杭麥冬

粉乾葛

漂白朮

天花粉

酒黃芩

炙甘草

水煎。以竹瀝乳汁對服。

七味白朮散

治痘因泄瀉。津液不足而作渴者。

官揀參

白雲苓

漂白朮

南木香

藿香葉

炙甘草等分

乾薑君

水煎。徐徐代茶飲。

化毒湯

治痘初起。飲食如常。別無他證而腹痛。

粉乾葛

杭白芍

杭青皮

陳枳殼

京查肉

淨連翹

水煎熱服。

三黃毒湯 治痘初熱煩燥作渴。大便祕結腹痛。

酒黃芩

酒黃連

紫草茸

小枳實

淮木通

小檳榔

水煎滾熱服。

鮮紅花  
酒大黃

建中托裏湯 治痘初熱。因泄瀉而腹痛。

官揀參

炙甘草

綠升麻

粉乾葛

白雲苓

陳枳殼

芽桔梗

小川芎

北柴胡

川獨活

北防風

水煎薑引加竹瀝對服。或五苓散加獨活亦可。

導赤散 治痘初起。發熱作搐。

大生地

淮木通

蘇薄荷

川羌活

炙甘草

鏡辰砂等分

燈心十莖

水煎以辰砂末調服。

瀉青導赤散

治痘應出不出而作搐。

當歸尾

淮木通

黑梔仁

北防風

小川芎

酒黃連

淡竹葉七片

心十莖

可以竹瀝對服。

麥冬導赤散 治搐搦後心煩啼叫不寧。

淮木通 杭麥冬

黑梔仁

生甘草

燈心引

水煎服。

寧神湯 治痘後作搐搦。至危之候。

黑梔仁

川雅連

淮木通

官揀參

炙甘草

石菖蒲

白茯神

燈心爲引

水煎入竹瀝人參湯對服。

抱龍丸 合前寧神湯。治痘後搐搦。

膽南星四錢

天竺黃五分

真牛黃三分

明雄黃五分

鏡辰砂二分

共爲末。甘草煎濃湯。煮麵糊爲丸。不用麝香。以痘瘡忌麝故也。  
理中湯 治痘已現形而吐瀉不止。

官揀參一錢

漂白朮二錢

炙甘草一錢

綠升麻一錢

生薑三片 大棗三枚

煎服。

荳蔻丸 治痘出。其瀉服理中湯不止者。

南木香三錢

西砂仁二錢

石龍骨五錢

白枯礬七錢

肉荳蔻五錢  
麵包煨

訶子肉五錢  
淨肉

赤石脂錢五分  
煅過七分

共爲末。米糊爲丸。如胡椒大。三歲兒十九。四歲以下二十九。陳米飲下。

調中湯 治吐瀉既止。速調中氣。

官揀參

炙甘耆

漂白朮

杭白芍

南木香

廣陳皮

炙甘草

大棗三枚爲引

水煎服。若三焦火盛者。又當甘涼之劑解之。不在此例。

辰砂導赤散 治痘毒內攻。神室不清。或譖妄狂惑。

官揀參

正雅連

黑梔仁

漂白朮  
燈心十莖

淮木通 水煎入竹瀝調辰砂末服之。

補中益氣湯 治痘初熱四肢厥冷中氣弱也。

炙黃耆

漂白朮

廣陳皮

當歸身

青化桂

炙甘草

官揀參

煨薑大棗引水煎服。服藥後手足暖者生逆冷不回者死。

玄參解毒湯 治痘初熱火毒薰蒸而見鼻血。

潤玄參

枯黃芩

炒梔仁

芽桔梗

懷生地

粉乾葛

荆芥穗

炙甘草

水煎入茅根汁加京墨磨濃調服。

黃連解毒合甘桔湯 治痘煩熱不止口舌生瘡咽喉痛。

酒黃連

酒黃芩

黑梔仁

熟石膏

芽桔梗

淨連翹

南薄荷

荆芥穗

牛蒡子

生甘草

水煎和竹瀝服。

調元湯 治痘證自汗過多衛氣反傷宜止之。

炙黃耆

條黃芩

漂白朮

杭白芍

杭麥冬

炙甘草

大官揀

水煎服。如汗不止。加地骨皮麻黃根。以猪心肺煮湯。對前藥服更妙。  
柴葛桂枝湯 治痘將出而憎寒振戰。此毒氣留連於腠理間也。

北柴胡

粉乾葛

川羌活

大揀參

北防風

嫩桂枝

牛蒡子

炙甘草

水煎熱服。

麻黃解毒湯 治痘未形。發熱不退。腠理閉塞。及風寒外遏不出。

陳麻黃

去根節用蜜酒煮黑

川羌活

綠升麻

荆芥穗

粉乾葛

北防風

淨蟬蛻

芽桔梗

牛蒡子

炙甘草

水煎入燒過人屎調服。

托裏十補湯 治痘因泄瀉。毒氣內陷而不出。

炙黃耆

青化桂

香白芷

水煎調牛蒡子末服。

炙甘草

正川芎

紫川樸

茅桔梗

北防風

官揀參

枳實導滯湯 治痘因傷飲食鬱滯而不出。

小枳實

淨連翹

法半夏

山查肉

炙甘草

紫草茸

酒黃連

水煎調檳榔末服。

升麻葛根湯 治痘證初熱。將出未出。以此助其升生。

綠升麻

粉乾葛

白芍藥

炙甘草

口渴加天花粉杭麥冬絲茅根汁。腹痛加小枳實淮木通山查肉。腰脚痛。  
加漂蒼朮川黃柏川羌活淮木通。頭痛加小藁本香白芷。擣搗加淮木通。  
水竹瀝蘇薄荷淨連翹。泄瀉加官揀參漂白朮白茯苓懷山藥。譖妄加石  
菖蒲黑梔仁淮木通辰砂。四肢冷加官揀參炙黃耆黑薑炭青化桂。嘔

吐。加漂白朮白雲苓法半夏廣陳皮。衄。加潤玄參黑梔仁枯黃芩茅根汁。  
咽痛。加芽桔梗牛蒡子鮮射干。咳嗽。加廣皮家蘇葉陳枳殼信前胡。大  
便祕。加懷山藥紫草茸鮮紅花當歸尾。多啼哭。加淮木通黑梔仁正雅連大  
麥冬。吐舌弄舌證。並加正雅連北防風黑梔仁。已上皆用淨水煎服。隨證  
加味用之。

見形證治歌凡一十八首

發熱三朝痘出稀。方爲毒淺吉之機。先期痘甚渾無制。過此多因血氣微。

凡痘發熱三日而出。常期也。出而稀者。不須服藥。如發熱一二日即出者。此毒氣  
太甚衝擊榮衛。一齊湧難以制服。大凶之象。必欲治之。不過消毒救裏。使無陷伏  
耳。宜消毒快斑湯。

如過期四五六日始出。此血氣本虛。不能載毒使出。當補中托裏發表。宜增損入  
物湯。

痘出遲遲有數般。皮膚閉塞屬風寒。裏虛吐瀉宜分治。痘壅三焦治却難。

凡痘出有常期。若應出不出。或外感風寒。六腑閉塞。不能卽出。其證頭眩身痛。發熱無汗。喜蓋覆猥。懷中此惡風寒之象也。當發散之。宜加味參蘇飲。若曾經吐瀉。裏虛不能快出。宜加減調中湯。如發熱煩躁。狂妄大渴。脣燥舌裂。此毒氣壅併。留而不洩。毒火鬱於三焦。榮衛不行。上下不通而死矣。

應期不出事如何。發表諸方切忌訛。腹脹便堅。煩躁甚。消斑承氣理沉疴。

凡痘疹應出不出。或外感風寒。內虛吐瀉。治各不同。如前參蘇飲。調中湯。敗毒散。葛根湯之類。皆良法也。若熱甚。腹脹。氣粗煩燥悶亂。大便祕結。此毒火內蓄。急以

### 消斑承氣湯解之。

痘出身涼吉可期。如逢熾熱。履明夷。終朝漸密。無空隙。怪證叢生。必定疑。

痘瘡之熱。毒火爲之。未出之先。毒火在內。故發熱於外。旣出之後。其毒發外。熱當盡退。毒本輕而痘亦稀也。若痘旣出。熱仍不退。是毒積於中。未可爲輕。急用解肌化斑升托之服藥後。熱漸退。方可言吉。更不退。其痘繫繫而出。痘空中始雖稀。而終朝漸密。最怕生出他證。或狂妄。或泄瀉。或腹痛。或搔瘡。或失聲。或錯喉乾嘔。或喘促黑陷。皆不可治。

出現先觀面部中。其間凶吉最難通。遠脣夾頰方爲吉。額上眉心未可逢。  
人之面部五臟精華皆見於此。故左頰屬肝木。右頰屬肺金。須屬腎水。鼻屬脾土。  
又正額太陽脈之所會。脣頰陽明脈之所經。兩耳旁少陽脈之所過。痘爲陽毒。故  
隨陽位而見於面。但陽明胃與大腸積陳受污氣血俱多。先於其部出現者吉。若  
太陽則水火交戰之位。少陽則木火相併之衝。若於其位出現者凶。不但出形忌  
於正額眉間耳之前後。凡起灌收齧。但從此處先者。皆逆象也。

頭爲元首稱至尊。更有咽喉闔闢門。若使痘瘡多出此。蒙頭鎖項受災連。  
經曰。頭者精明之府。五臟精華皆現於此。至尊至貴不可凌犯者也。咽者胃腕水  
穀之道路。主納而不主出。喉者肺管呼吸之往來。主息之出入。人非此則水穀絕。  
呼吸廢而死矣。故謂闔闢之門。瘡痘最要頭項稀少。如頭面多者。謂之蒙頭。咽喉  
多者。謂之鎖項。蒙頭則視聽昏廢。神明失居。鎖項則內者不出。外者不入。正所謂  
神出則機息氣止則化絕。死之兆也。

頭面胸前痘欲稀。四肢雖盛毒猶微。渾身碎密多惆悵。疏解當知發散機。  
頭面諸陽之會。胸前諸陽之聚。臟腑受氣之區。陳氏曰。痘疹輕者。作三四次出頭。

面稀少胸前無。以清陽之分不可錯亂也。至於四肢。雖爲陽之本。乃身之役使。卒伍卑賤之職。故不畏其多也。若遍身稠密瑣碎。急爲解毒。疎通榮衛。令氣得其均。血得其活。一齊起發。庶無乾枯黑癰之變。用疎毒快斑湯隨證加減而調之。

痘瘡磊落不須防。叢聚相黏定見傷。蠶殼蛇皮生不久。蚤斑蚊跡禍難量。凡痘瘡初出。須看相去遠近。若相去三五寸一粒者。輕證也。一二寸者頗密。如二三成叢者。必密而重。其候多變瘻壩。如蠶之殼。蛇之皮者。此氣至而血不隨也。當行氣補血。宜祛風勾氣散。如蚤之斑。蚊之跡者。此血至而氣不隨也。當涼血補氣。宜參耆和氣飲。

一出形來豔色嬌。定知皮嫩氣虛枵。溶溶破損生難久。個個成漿喜氣饒。痘瘡出形如平日正色者吉。痘色帶豔而赤。其後多皮嫩易破癢不可救。但見帶豔。卽防後日瘻壩之變。早用風疎固表消毒之藥。使血氣充實。邪火漸退。正氣不虧。光壯乾收。如期不亂可也。宜固陽散火湯解毒固表。

最怕頭焦雖色封。雖音陶青黑色也又愁皮嫩水溶溶。頭焦變黑多歸腎。皮嫩須防癢揚攻。

痘瘡初出。所喜明潤而鮮。堅實而厚。若頭焦帶黑。此毒在血分。不急治之。則變黑而歸腎難救也。宜涼血解毒湯。解散血中之邪。若皮嫩齶薄。此毒在氣分。不急治之。則癢塉而死。宜加味固陽散火湯。

痘瘡切要解咽喉。喉痺咽瘡毒火浮。但恐一朝封管籥。鎖喉聲啞枉營謀。凡痘瘡未有咽喉不痛者。如煙囱之狀。火焚於下。燄升於上。宜乎作痛。宜鼠粘子湯。外用一聖散吹之。

惟恐斑瘡入眼中。膏煎黃藥妙無窮。但觀眼內多紅赤。急瀉心肝免損瞳。痘瘡之毒。第一防眼。所以古人用護眼之法。其慮深矣。宜黃藥膏塗之。若眼內有紅筋縈纏。或眼腫閉。多生眵淚。急瀉心肝之火。宜蟬花散清解之。

痘瘡只出一般奇。斑疹相審最不宜。消疹化疹宜急解。倘仍不解勢傾危。錢氏曰。痘只一樣爲善。若已現形。間有碎密如芥子者。此夾疹也。皮內鮮紅成塊。此夾斑也。皆毒火熏爍於內。故使斑瘡夾出於外。急宜解毒。使斑瘡消散。痘得獨成。宜荆防解毒湯消散之。

痘標纔見兩三窠。爬搔渾身瘡癩多。此是火邪留腠理。急清風火證應瘥。

凡痘初出之時。遍身作癢。爬搔不止。此火邪留於肌肉皮膚之間。不能盡出故耳。與傷寒不出汗作癢同。非癰塉之例也。宜瀉心肝火邪。其癢自除。宜清風去火化毒湯升散之。

口中腥臭氣衝衝。邪毒炎蒸肺作癰。瀉火清金須急用。淹延七日禍相從。凡痘初出。若口中之氣腥臭衝入。此肺中邪火熬煎炎燥。故令腥臭出於口。急與清金瀉火湯解之。倘淹延不治。至七日而死矣。經曰。肺絕者七日死。此證之變。或失聲。或喘。或乾嘔。皆其候也。

皮口簇簇如寒粟。肉腫隆隆似熱瘤。如此豈能延日月。哀哉不久返瀛洲。凡痘初出。欲其窠粒分明。皮肉柔潤。若簇簇生於皮間。似風寒粟子之狀。此痘變於反掌。不待起發。卽隱而不見。啼叫煩悶而死矣。或有正面腰背。胸膈手足。腫硬成塊。似丹癰之狀。此證候起發之時。其處瘡先黑陷。破爛不能成漿。乾硬而死。皆爲不治。

出形未定先涌水。起發之時便戴漿。漿水未成收醫急。休誇妙術有青囊。凡痘初出一點血。血化爲水。水化爲膿。膿成而毒解。此自然之序。若初出之時半

爲水泡。或將起發。便戴白漿。或膿水未成。忽然收靨。此毒火太甚。失其自然之序。不應至而至。謂之才過。不久倒陷入裏而死。無有治矣。蓋不應至而治。所謂早發還先萎也。比之應至不至者。因其氣血不充。尚有補救。所謂人奪天功。此則不相侔矣。

鼻如竈突。面烘烟皮似塗硃。或橘然脣舌咽喉痘叢聚。任敷和緩莫回天。

凡痘瘡之症。始終歸重於太陰陽明。手太陰肺。手陽明大腸。足太陰脾。足陽明胃者是也。蓋鼻者肺之竅。貴於滋潤。鼻乾黑燥如竈突之狀。火刑金也。面者陽明經所聚。貴於鮮明。面黑而枯。精華散矣。皮者肺之合。欲其色紅白如常。色若塗硃。火之象也。或如橘柚。火極如上。則黃矣。咽喉肺胃之管籥。脣吻脾之竅也。舌者脾之絡也。痘甚於此。其毒極矣。安可治哉。

## 入方

消毒快斑湯 治痘未期而出。毒氣太甚。

北防風

芽桔梗

荆芥穗

京赤芍

炙黃耆

牛蒡子

當歸尾

潤玄參

淨連翹

信前胡

淮木通

天花粉

炙甘草

增損八物湯

治痘過期而出。氣血虛弱。

官揀參

漂白朮

炙黃耆

白當歸

正川芎

牛蒡子

荆芥穗

京赤芍

淨連翹

北防風

芽桔梗

粉甘葛

炙甘草

水煎。不拘時熱服。

加減參蘇飲 治痘應出不出。由外感風寒。玄府閉塞。

官揀參

家蘇葉

粉乾葛

廣陳皮

信前胡

香白芷

芽桔梗

陳枳殼

川羌活

北防風

炙甘草

竹葉  
葉爲引片

水煎服。

加減調中湯 治因吐瀉。因氣痿弱。痘出不快。

官揀參

漂白朮

炙黃耆

南木香

上薄桂

白雲苓

法半夏

廣陳皮

炙甘草

生 薑薑爲引

水煎服。

消斑蒸氣湯 治痘因毒火鬱遏。應出不出。大便祕結。宜下之。

錦莊黃

陳枳殼

川厚樸

片黃芩

川黃蘖

黑梔仁

淨連翹

淮木通

炙甘草

熱甚者。加芒硝紫草。生薑三片爲引。水煎。滾熱服。  
解毒化斑湯 治痘出熱仍不退。由毒氣未盡也。

綠升麻

粉乾葛

淮木通

牛蒡子

芽桔梗

天花粉

地骨皮

荆芥穗

片黃芩

川黃藥

大便結。加紫草茸。水煎熱服。

疏毒快斑湯

治痘出渾身瑣碎稠密。

官揀參

北防風

荆芥穗

淨連翹

牛蒡子

當歸尾

芽桔梗

赤芍藥

炙甘草

熱甚。加酒黃芩酒黃連地骨皮。

渴者。加粉乾葛天花粉大麥冬。

氣虛。加炙

黃耆南木香。

便堅。加紫草茸陳枳殼。

溺赤。加車前子淮木通。

食少。加漂

白朮京查肉廣陳皮。

癢者。加好上薄桂南薄荷。

腹脹。加川厚樸大腹皮。

喘咳。加淨知母桑白皮。

泄瀉。加上薄桂訶子肉黑薑炭。

作痢。加白芍藥酒

黃芩。俱加燈心。引水煎服。

祛風勾氣飲 治痘出如蠶殼蛇皮由氣至而血不隨也。

官揀參

正川芎

大當歸

赤芍藥

杭麥冬

北防風

杭青皮

荆芥穗

南木香

上薄桂

炙甘草

水煎半飢服。

參耆和氣飲 治痘出如蚤之斑。蚊之跡。由血至而氣不隨也。

官揀參

炙黃耆

淨連翹

牛蒡子

酒黃芩

粉乾葛

淨蟬蛻

當歸身

淮木通

芽桔梗

炙甘草

水煎服。服後氣血均隨者吉。如舊者凶。

固陽散火湯

治痘出色黯面赤。切防癩瘡。

官揀參

炙黃耆

炙甘草

當歸尾

北防風

懷生地

荆芥穗

大棗三枚爲引

綠升麻

淮木通

水煎服。

涼血解毒湯

治痘出頭焦帶黑。血分有毒。防變黑陷。

京赤芍

當歸尾

懷生地

淮木通

牛蒡子

淨連翹

紫草茸

芽桔梗

鮮紅花

山豆根

生甘草

水煎入燒過人屎一錢調服。

固陽散火湯 方見前此加漂白朮白雲苓減去生地黃。

鼠黏子湯 治痘出咽喉作痛。

鮮射干

芽桔梗

淨連翹

牛蒡子

水煎入竹瀝和服。

一聖散 苦參不拘多少切片略焙乾研爲末每用一二分吹之甚效若不早治。

咽喉煩燥吸門腫塞水入則嗆食入則嘔咽啞失聲救之遲矣。

黃蘗膏 治出痘預護其眼免致痘瘡入目。

厚川藥二兩

粉甘草二兩

研爲細末用新菜豆五合新汲水三碗浸豆一晝夜去豆入紅花一兩煮之其水約減二盞又去紅花然後入前二末慢火熬成膏每用敷眼胞上下厚塗之。

則痘瘡不入眼矣。

蟬花散 治痘出兩目腫閉。多生眵淚。此非封眼之時。急治之。

淨蟬退

密蒙花

酒黃連

當歸尾

淮木通

草龍膽

北柴胡

正川芎

黑梔仁

北防風

白豆蔻

淡竹葉十片

水煎熱服。

荆防解毒湯 治痘出夾斑夾疹。

官揀參

北防風

荆芥穗

枯黃芩

牛蒡子

淨知母

川黃蘖

生甘草

潤玄參

綠升麻

熟石膏

淨連翹

淡竹葉爲引

水煎服。服此斑疹仍不消者。不治。

清風去火化毒湯 治痘初出。風熱作癢。表未解也。非癢塉之謂。

北防風

綠升麻

杭白芍

柳桂枝

荆芥穗

粉乾葛

牛蒡子

淡竹葉爲引

清金瀉火湯

治痘出口中腥臭之氣衝入。謹防肺癰。

淨知母

懷生地

枯黃芩

熟石膏

芽桔梗

黑梔仁

杭麥冬

紫草茸

淮木通

天花粉

生甘草

鮮桑葉七片爲引

依前竹瀝對服。

起發證治歌

凡五十六首

起發出來無定期。庸常計日強猜疑。不知毒氣分深淺。莫執方書只神脾。  
時俗醫云三日發熱。三日出形。三日起發。此鄙論也。蓋毒氣有深淺。元氣有厚薄。  
出之先後。壯亦因之。大抵不出五六日間。假毒淺氣厚者。其起發常易。毒深氣薄  
者。至五六日始壯者有之。未可以常期準也。俗醫見其起發之遲。不認毒氣之淺  
深。概謂正氣不足。妄用補脾之劑。殊不知曾因吐瀉不能食者。補脾以助長可也。

若如吐瀉能食。六根堅固。復用補藥。不免黨邪爲害。非徒無益。而反害之。

起發如期。貴適從過。猶不及類。皆凶。先期痘出。充膚腠。過後斑瘡。腹裏壅。

痘瘡凡起發。只在六七日。謂之得中。蓋自發熱算起。正當六七日也。如未及期而驟發。此毒火太甚。榮衛氣虛。直犯清道而出。謂之邪氣太過。法當固表解毒。以防

癰瘡之變。宜黃耆芍藥湯。

如過六七日不起發。此臟腑虛弱。毒留於中。壅塞不出。謂之正氣不及。法當托裏解毒。以防倒陷乾黑之變。宜內托護心散。

出形已定。視根窠紅活。充眼氣象和。倘若青乾兼紫黑。急宜解托勿蹉跎。凡痘出現已盡。時當起發。謹視根窠。以決輕重。如形充滿。色紅潤。此氣血和暢。毒氣發越。大吉之兆。不須服藥。若形扁而塌。色枯而黑。此氣血多滯。毒氣壅遏。不能起。急用解毒托裏之藥。用十宣散內托之。

痘出稀疎。正得宜。如斯平順。不須醫。若然稠密。伏輕易解。毒當常慮。險危。凡痘出稀少。不須服藥。若稠密。其毒必盛。防氣血不足。起發不透。漸生變易。當服解毒托裏散。服藥之後。紅活光壯。此氣血內實。毒不能留。即止後服。如服後病勢

淹延。此邪氣盛。正氣虛。不能成就。宜屢服之。如服此藥當起。不起此必有變。不可治之。反取怨尤也。

鄂郭充肥完且堅。色多蒼蠟或紅鮮。如逢破損多鬻薄。縱有良方恐莫延。

凡痘鄂郭充實。皮囊堅厚。以指擦之。堅實不破。其色蒼蠟而紅活。皆順證也。不喜乾燥溼溼。若蒼雖紅鮮。反乾燥而不充。肥火之甚而血不足。宜輕清之劑。退火涼血。用四物快斑湯。

凡瘡充肥而帶溼滯。此溼盛而氣不足。宜利溼補氣兼風藥治之。蓋風能勝濕故也。四物快斑湯。如瘡紅活充肥。以指擦之隨破。此名皮嫩瘡。破後必癢塉。不可治。宜大補快斑湯。

如當起發。如浮囊空殼。如蠶之殼。麥之麸。皮中無水色者。此血氣俱虛。用大補快斑湯治之。服藥後。若轉而潤澤。中涵水色者可治。否則塉癢悶亂。叫哭而死矣。形色須教着意觀。紫紅實熱白虛寒。倘然錯認分毫處。咫尺身臨禍害端。

凡痘瘡起發。須諦觀形色。以定輕重吉凶。如根窠紅潤。須瘡蠟色者上吉。根窠紅頂灰白色者次之。根窠赤頂亦赤而滯艷者。此火勝。用解毒瀉火湯清之。服藥已

退者生。不退者凶。

如純白色者。作寒論。此血寒氣虛也。虛則補之。十全大補湯。加丁香鹿茸。回其陽氣。四肢冷者。加附子。如純紫赤色者。作熱論。此血熱氣實也。實則瀉之。黃連解毒湯。加犀角之類。以平爲期。服藥瘡色同者。十死一生。

四圍起發陷居中。陽氣虧衰尙未通。若是中枯成黑子。此名疔痘類非同。  
痘瘡起發。其形不一。有緊小而充實者。俗呼珍珠痘。此痘易壯易壓。有粗大而飽滿者。俗呼天痘。此痘早壯遲癧。有四圍起中心落陷者。俗呼茱萸痘。此痘有吉凶。有輕重。稀者輕而吉密者重而凶。蓋因中氣不足。時日未到。但四圍起發而中心上是好肉。未得起發耳。時日既到。自然充括而成血漿。輕稀者不須治。重密者用解毒化斑湯。若先有水。忽然乾枯黑陷。此名疔痘。不可與中氣不足同例論。

中心微起四圍乾。不久焦枯變一般。毒火熏蒸津液竭。開關啓籥治應難。  
凡痘有中心微起含水色。四畔乾枯者。此毒火熏蒸。津液枯竭。急以疔痘之法治之。否則盡枯。又復煩躁叫哭。喘渴者不治。

痘疗只爲火傷陰。濟急無如砭與鍼。解毒透肌兼發散。胭脂四聖效應深。

大抵痘之初出一點血。此一點屬正氣。覺毒氣衝擊。隨腠理而出現。其後毒與血化爲水。水化爲膿。膿成毒解。若毒太甚。熬煎陰血。其血乾枯而變黑色。不得化水。反閉塞毒出之路。以致毒氣陷伏。不得出。此名倒陷。其人煩燥腹脹。喘滿口渴。多不可救。故古方外以鍼刺破。吮出其血。或用燈火淬之。無非欲其開闢導瀉。而使毒氣得出也。宜四聖珍珠散治之。用藥後。其瘡便回者吉。如不回。反添黑陷。死證也。不可妄治。內服之藥。有用川山甲燒人牙者。藥既非解毒發表之藥。又無托裏快斑湯。倘愚者執而用之。適足誤事。又不若四聖快斑散。屢多奇效。密齋曰。錢氏用百祥丸。牛李膏。必其人大小便祕結。煩躁口渴。故宜服之。若其人大便自利。身無大熱。則必不可用。今改去百祥丸。牛李膏。以宣風快斑散代之。服此以通爲度。通後瘡回。以四君子湯徐調之。若或因泄瀉。其瘡由灰白而變黑陷。此名倒醫。宜木香快斑散治之。

予按痘中壞證。惟黑陷最惡。凡見黑陷者。大便未必自調。身體未必不熱。神情未必不擾攘。宣風快斑散。或可治其輕者。若大便祕結。煩躁。大熱。口渴舌上黃黑者。捨百祥無以挽回。蓋黑陷凶危之證。非峻厲之方。不足以制其猖獗。

今凡如百祥丸。及棗薑百祥丸。無價散。與胡荽酒。併外治。忍冬湯五方。宜預制。以便臨證酌用。萬氏錢氏兩存可也。

黑陷瘡爲壞證先。此名惡候古今傳。若教出現渾身上。盧扁無功莫怨天。凡黑陷用方法救治。其瘡紅活依期光壯。吉兆也。倘服藥如故。則不可治。若痘本稀。其中起發者。多略有數個黑陷。此則可治。假如稠密。又不起發。或灰白。或紫赤。或青乾。又加黑陷者。治之無功。

灰白退延頂復平。紫紅掀腫候須明。且將氣血分虛實。莫棄圓機執一行。

凡痘瘡喜紅活充實。若不紅活充實。虛也。紅腫太過。實也。假如灰白色。當起不起。而頂平附者。此氣虛也。必問其人初起證候。如初因吐瀉。不能飲食。其後瀉止。而灰白頂平者。此正氣虛弱。宜大補快斑湯以補之。如泄瀉一向不止。用異功快斑湯兼荳蔻丸。如服已上之藥。泄瀉仍甚。用附子理中湯以溫其中。

若其人素日虛怯。而吐瀉不止。此元氣不足。用補元快斑湯。如誤服解毒寒涼。及誤飲冷水者。用調中快斑湯。若灰白色。又加癰塊頂陷腹脹。此不治之證。假如紅掀紫腫。血熱也。宜涼血快斑湯。若其人素實。初起誤服熱藥。以致紅掀紫腫。

宜三黃解毒湯清解之。若紫赤變黑。喘渴不寧者。不治。

起發猶如錫餅鋪。皮膚兀若水精壺。其人能食方無慮。不食將爲鮑肆枯。  
凡痘瘡稠密。要依次起發。紅活尖者吉。一齊起發。遍身白色如錫餅形。頭目浮腫。  
此惡候也。但看其人之飲食何如。若能食。大便堅。小便清。無他證。往往延至日久。  
渾身皮脫而愈。若不能食。後加吐瀉熱渴搔癩必死。人之證能食者。宜服解毒之  
藥。用助脾快斑湯。扶其中氣。

起發之時未試漿。口脣瘡色豆焦黃。如斯惡候無人識。慢自矜誇強立方。  
口脣脾之候也。脾司運化以養血氣。所以痘瘡不宜脾胃受傷。如初出起發之時。  
漿水未試。口唇瘡色內帶黃漿。此惡候也。時人不識。喜其成漿。便呼爲醫。不知六  
七日間。其瘡先齧。剝落一層而死矣。

瘡頭起發漿先白。不問何經皆是賊。慢誇妙手有仙方。七日應爲泉下客。  
凡痘出紅點而水泡。由水泡而膿泡而結痂。有自然之序。初起發時。頭帶白漿。此  
疫癘也。不可治。

發時磊落最堪誇。相串牽連事可嗟。若又四圍添小粟。定然搔癩證來加。

凡痘起發。顆粒分明。尖圓磊落者吉。若彼此牽連成一片者凶。如上分氣血虛實。用解毒快斑湯治之。或本痘起發。或於根窠四畔。又旋出小者。攢簇本瘡。成叢似粟者。不待養漿。卽加搔癢而死矣。

起發時常驗四肢。發而不透或凶危。此緣脾胃多虛弱。發散還須當補脾。凡痘瘡宜視手足何如。若手足循序起發。此脾胃素強。毒氣得越。不必憂慮。若遍身俱起。手足起不透。此脾胃本弱也。蓋脾胃主灌溉四肢。今既虛弱。不能行其津液。使毒得越。所以手足起發不齊。宜補脾快斑湯。助長可也。

起發之時貴謹扶調和。何必問醫巫。暑寒飲食須當慎。後悔噬臍莫可圖。痘瘡有輕變重者犯禁。或調醫藥。或犯風寒。有重變輕者反是。然輕重吉凶之變。存乎起發之時。調護不可縱弛也。或遇暴風驟雨。迅雷閃電。卽當以密布幃幙。緊閉房戶。以防客風怪氣之侵。如夫調護爲寒涼所鬱。不能起發。宜正氣快斑湯。凡痘起發之時。遇久陰雨。不能起發。宜平胃快斑湯。以燥其溼。凡痘當起發。遇天氣暄熱。俗人不知謂痘欲溫暖。蓋覆太厚。以致毒火鬱遏。不得發越。此壯火食氣。反虛其氣。宜白虎快斑湯。

凡痘當起發。誤傷生冷。以致脾虛不能起者。用理中快斑湯。

凡痘瘡起發。內傷飲食。腹中飽悶或痛。以致中氣鬱遏。不能起透者。寬中快斑湯効。

自此常宜大便堅。如常調理保安然。若逢泄瀉無休歇。寒熱須教仔細研。痘瘡自起發之後。大便要堅。雖三四日一次亦無事。小便常要清利。若見小便赤少。宜四苓新加湯。或有忽然泄瀉。宜分寒熱治之。視其所泄之物。或焦黃酸臭。此內熱也。或傷飲食。宜胃苓和中湯。若泄出之物。清白澄冷。裏寒也。用附子理中湯。方見前。如久泄不止。用理中湯吞送豆蔻丸。方見前。

其人能食。素脾強。大便雖溏也不妨。但用補中逍導藥。六君加味是良方。其人能食。雖有泄瀉。不能爲害。當用補中之藥。宜六君子湯。固其中氣。

起發預防頭面腫。大頭時氣可兼醫。瘡宜磊落色宜潤。反此傾危命必隨。凡痘瘡起發。有頭面由漸而腫。此毒氣發越。聚於三陽。欲作膿血。故皮肉掀腫。此雖正病。亦當解毒護目。救咽喉而兼治之。宜解毒化斑湯。若頭面不腫。必瘡本稀疏磊落。痘根輕淺。雖作膿血。却不占處。故宜不腫。不必治之。若痘稠密。應腫

不腫。此毒鬱於內。不能起發。急服托裏快斑湯。服藥後瘡起者吉。不起者凶。至於腫時。又若觀其皮色如何。磊落紅活者吉。模糊黑黯灰色者多不可治。亦有痘漿起發。便頭目先腫。此天行疫癘之氣。名大頭瘟者是也。急解其毒。宜苦參散。而腫頭浮眼不開。如斯惡候。實堪哀。未應開處偏開。早搔癩。頻加凶禍來。

痘瘡起發頭面浮腫。有不閉目者。但觀其痘之輕重疎密。若疎輕者。目雖不閉。亦不防。重密者。其目要閉。宜閉不閉者凶。蓋眼封鼻塞。神氣內固而不外馳。吉兆也。但遇封眼之時。必待其收醫之時。而後漸開可也。若未及收醫。漸生搔癩。而腫消目開者。大凶。

痛癩原來有實虛。癩虛痛實載於書。都來痛者終爲吉。諸癩難言吉自如。大凡諸痛爲實。癩爲虛。謂之實者。邪氣實也。謂之虛者。正氣虛也。蓋痘瘡始終氣以載之。血以養之。氣血充實。則禁固其毒。不得橫行。所以緊實而爲痛也。痛乃美事。不須服藥。苟欲治之。宜涼血芍藥湯。瘡痘作癩。邪氣橫行。泛濫皮肉。不住條約侵蝕。是爲癩也。蓋痘瘡惟向頭作癩。容或有之。此否極泰來之兆。若發熱及養漿時作癩。皆危證也。內宜托裏解毒之藥。外用熏洗之法。令無致於癩壞破陷可。

矣。仍要分虛實治之。若能食而大便祕者。此邪氣內實。正氣外虛。宜加味四聖解毒湯。外用洗法。若有泄瀉而作瘡者。乃正氣裏虛。邪氣外實。宜調元托裏解外用熏法。

起法之時渴又臨。火邪內迫。熱偏深。急宜解毒生津液。休得俄延向外尋。  
凡痘瘡起發。身上作熱。不可除其熱。若不熱則痘不發。如熱大過。甚於常時。脣焦  
口燥。小便短少。不可不治。宜導赤解毒湯。微解之。

若痘瘡作渴。此是常事。蓋由胃中津液不能滋養本元。內則熾於毒火。外則灌潤  
於瘡。故宜渴耳。凡一切瓜果生冷之物。不可與食。惟炒米湯飲之爲宜。若渴太甚。  
看其人虛實而治。

若飲食如常。大便堅實而渴者。此內熱也。宜生津地黃湯潤之。

若泄瀉而渴。此內虛津液不足。不能上潮於口。宜七味白朮散滋之。

聲啞無音。更咬牙。憎寒燥擾。亂紛譁。咽喉乾嘔。多昏悶。形氣俱傷。最可嗟。

痘瘡始終要聲音清明。人事安靜。五臟堅實。飲食如常。若起發之時。忽然失聲咬  
牙。寒戰煩躁。昏迷嗰水。咽喉乾嘔。痰氣喘急。泄瀉不止。腹痛悶亂。俱皆凶證。古人

云。痘出而聲不變者。形病也。痘未出而聲變者。氣病也。痘出而聲不出者。形氣俱病。將欲治之。誠難爲力。咳嗽而失聲者。非此論。

痘兒嘔噦。不謹聞。不是寒邪。是火焚。妄進湯丸。如拙匠。內傷臟腑。匪妖氛。凡痘瘡乾嘔無物。或時常嘔逆。此臟腑內傷。衝任之火。上犯清道。故爲嘔噦之惡聲。經曰。絃敗者。聲必嘶。木陳者。葉必落。病敗者。聲必噦。鍼灸無功。湯藥無效。此之謂也。若飲食而嘔。當分寒熱而治。

如曾傷冷物。受寒氣。此寒嘔也。宜二陳理中湯。如未傷冷物及寒氣。此熱嘔也。宜二陳一連湯和之。

若飲食哽塞而嘔噦者。咽中有瘡。必作痛。閉塞而嘔。宜加味鼠黏子湯。外用控涎散吹之。

渾身痘密。精神耗。補瀉無功。煩復燥。狂言啼哭。見鬼神。臟腑敗。傷天命到。凡痘稀少。自然易壯密者。切防氣血虧損。起發不透。即是病之紅點。如前法治之。虛則補之。實者瀉之。在氣補氣。在血補血。隨機應變。每中權衡。不可執方以誤人命。若補瀉無功。反增沉重。或啼哭不止。日夜呻吟。煩躁悶亂。狂言妄語。如見鬼神。

此臟腑傷敗。神魂離散。復何爲哉。

## 入方

黃耆芍藥湯 治痘起發不快。毒火作祟。

官揀參

炙黃耆

生白芍

淨連翹

北防風

牛蒡子

粉乾葛

荆芥穗

炙甘草

水煎服。

內托護心散 治痘起發太遲。正氣不足。

官揀參

大當歸

北防風

酒黃芩

酒黃藥

牛蒡子

淮木通

青化桂

淨蟬蛻

水煎。入燒過人屎調服。

便祕。加大黃紫草。

十宣內托散 治痘起發之時。形扁壩。色枯黑。

酒黃芩  
芽桔梗  
淡竹葉十片爲引

酒黃連  
荆芥穗  
炙甘草

酒黃連  
荆芥穗  
炙甘草

炙黃耆

全當歸

正川芎

芽桔梗

荆芥穗

牛蒡子

官揀參

北防風

炙甘草

大便祕加酒大黃紫草。小便澀加木通。渴加花粉麥冬葛根。水煎入燒過人屎同服。燒過人屎。痘科之聖藥也。

解毒托裏散 治痘出過於稠密。防起發不透。

芽桔梗

牛蒡子

荆芥穗

鮮紅花

北防風

當歸尾

淨蟬蛻

綠升麻

粉乾葛

赤芍藥

淨連翹

炙甘草

水煎入燒過人屎同服。令易壯易靨。

四物快斑湯

治痘瘡乾燥形不充肥。

京赤芍

懷生地

綠升麻

粉乾葛

淨連翹

鮮紫草

全當歸

正川芎

荆芥穗

牛蒡子

水煎。和燒過人屎服。

四君快斑湯

治痘雖充肥。面帶溼溼。

白雲苓

柳桂枝

荆芥穗

北防風

廣陳皮

官揀參

杭白芍

炙甘草

香白芷

淨水煎。熱服。

大補快斑湯

治痘起發。皮嫩易破。防癩瘻。

官揀參

炙黃耆

全當歸

赤芍藥

懷生地

大川芎

炙甘草

北防風

柳楊桂

水煎。入燒過人屎同服。

解毒瀉火湯

治痘出根窠紅赤。頂赤帶艷。

酒黃芩

牛蒡子

當歸尾

淨連翹

山豆根

生甘草

黑梔仁  
芽桔梗

綠升麻

粉乾葛

地骨皮

水煎入燒過人屎調服。服後色退者生。不退者凶。  
十全大補湯 治痘出純白色。此血寒氣虛也。

官揀參

漂白朮

白雲苓

青化桂

當歸身

大川芎

炙黃耆

公丁香

嫩鹿茸

煨薑

大棗

懷生地

水煎服。

黃連解毒湯

治痘出純紫赤色。血熱氣實也。

正雅連

川黃芩

杭白芍

懷生地

牛蒡子

炙甘草

水煎熱服。

解毒化斑湯

治痘四圍起發。中心陷下不起。

生甘草

當歸梢

正川芎

牛蒡子

黑梔仁

燈心  
十根爲引

北防風

浮連翹

荆芥穗

官揀參

炙黃耆

上薄桂  
冬月加

官揀參

水煎入燒過人屎煎服。

四聖珍珠散 治痘瘍。

油頭髮一撮燒灰

海蜂珠七粒研末

新豌豆

新菜豆各四十粒燒灰存性

右將四味研爲細末。用胭脂取汁。和上四味調勻。以鍼挑破其疔。納藥於中。更以胭脂汁塗四圍。其瘡色回者吉。不回反添黑陷者死。

四聖快斑散 治痘瘍黑陷。解毒托裏。

生黃耆

鮮紅花

鮮紫草

炒麻黃

絲瓜連蒂燒灰

鏡辰砂另研俱等

人中黃

淮木通

淨連翹

燒過人屎俱分

共爲細末。白湯調服二三錢。

宣風快班散 治黑陷而身無大熱。大小便調者。

淮木通

陳枳殼

尖檳榔

川大黃

牽牛末

甘草節等分

水煎服。以大小便通利爲度。

木香快班散 治痘灰白而癰黑用。

青化桂

杭青皮

訶子肉

炙甘草

當歸身

漂白朮

廣陳皮

官揀參

南木香

炙黃耆

薑棗引。水煎服。中病即止。不可多服。恐增熱證。

百祥丸 治痘黑陷。大小便祕。煩躁煩亂。喘急舌黑。紅芽大戟不拘多少。

水煮極軟去骨。日中晒乾。復內涼汁中煮汁盡。焙乾爲末。水丸如粟米大。每一  
二十九。研赤脂麻湯下。

棗變百祥丸 治證如前方稍緩。

青州大紅棗

二十個去皮核

紅芽大戟

一兩去骨

右用水一碗。以前二味同煮。水乾爲度。去大戟不用。將棗肉搗爛爲丸。從少至  
多。木香湯下。以利爲度。

無價散 治黑陷由疫毒而致。用人貓豬狗糞等分。於臘月內燒灰。磁瓶收貯。用時以砂糖水調服二三錢。

胡荽酒即芫荽也 治痘疹倒陷不起。胡荽四兩切碎。以好酒入瓶內。先煎一二沸。入胡荽在內。蓋定勿煎。勿令泄氣。放冷。每吸一口。微噴患者。從背至足。勿噴頭面。病人常令聞此胡荽氣。

外浴忍冬湯 治痘瘡倒陷。黑陷不起。皆良。忍冬藤。俗名金銀花是也。春冬用枝。夏用枝葉。剉碎。以長流水一大釜。煎七分。將三分之一置浴盆內。以手試之。溫熱得中。先服。宜用湯藥。然後浴。洗漸漸添湯。以痘起光壯爲度。不拘次數。予按忍冬湯。治痘焦枯倒陷不起。誠爲良法。第嚴寒時令。深爲可慮。予嘗見寒月當風浴洗。痘未起而作擣死者矣。蓋傷於寒也。愚意必於帳中捲去被褥。用小盆盛湯。抱兒入帳中。垂帳以洗。則暖氣熏蒸。斷不致受寒生變。此法有益無損。不可不知。

大補快斑湯 治痘起發。由吐瀉不能飲食而灰白。

官揀參

炙黃耆

漂白朮

炙甘草

杭白芍

全當歸

川芎

南木香

上薄桂

廣陳皮

藿香葉

大棗三枚爲引

水煎半錢服。

異功快斑湯

治痘證久瀉不止。

官揀參

炙黃耆

炙甘草

漂白朮

南木香

全當歸

青化桂

廣陳皮

公丁香

白雲苓

訶子肉

大棗三枚爲引

水煎半錢服。

豆蔻丸 治譖同前。服異功不愈者。

肉荳蔻煨

南木香煨

西砂仁炒

石龍骨煅

赤石脂煅已上各五錢

白枯礬七分

共爲末。麵糊爲丸。胡椒大。每服十五丸。米飲化下。

附子理中湯 治痘證中寒泄瀉。糞色青白。

官揀參

漂白朮

黑炮薑

熟川附

炙甘草

量兒大小加減分兩水煎溫涼服。

補元快斑湯

治痘兒脾胃元氣素弱而泄瀉不止。

官揀參

炙黃耆

漂白朮

全當歸

炙甘草

當歸土炒拌

薑棗引水煎服。

調中快斑湯

治痘疹誤服寒涼及冷水以致泄瀉。

漂白朮

白雲苓

法半夏

炙甘草

青化桂

南木香

官揀參

廣陳皮

漂蒼朮

川厚樸

藿香葉

生薑爲引

水煎服。

涼血快斑湯

治痘疹紅掀膿腫血熱故也。

當歸尾

懷生地

鮮紅花

綠升麻

牛蒡子

生甘草

淨連翹

大便祕。加紫草。甚者加大黃。小便祕。加木通。燈心十莖爲引。水煎。熱服。

三黃解毒湯 治痘初起。誤服熱藥。以致紅掀紫腫。

酒黃芩

酒黃連

酒川葵

淮木通

生甘草

黑梔仁

綠升麻

淨連翹

牛蒡子

淡竹葉爲引

助脾快斑湯 治痘稠密。一齊起發。形如錫餅。

山楂肉

荆芥穗

牛蒡子

南木香

杭青皮

陳枳殼

廣陳皮

淮木通

炙甘草

水煎服。一二劑。不宜多。

補脾快斑湯 治痘疹手足起發未齊。

官揀參

炙黃耆

北防風

柳楊桂

炙甘草

漢防己

水煎服。若手足痘見而復隱。起而復壞。此本根已廢。枝葉先萎之象。必死不治。  
正氣快斑湯 治痘犯暴風疾雨。寒涼所鬱。不能起發。

川羌活

漂蒼朮

北防風

芽桔梗

當歸身

粉乾葛

香白芷

正川芎

炙甘草

冬月加正薄桂生薑爲引。水煎服。

平胃快斑湯 治痘值天時久雨溼滯。不能起發。

川蒼朮

廣陳皮

川厚朴

川羌活

北防風

上薄桂

結豬苓

白雲苓

炙甘草

淨水煎。半錢熱服。

白虎快斑湯 治痘值炎天暑月。誤用蓋覆。以致毒火鬱遏。閉其腠理。不能起發。

官揀參

熟石膏

大麥冬

粉乾葛

綠升麻

淡竹葉

生甘草

昏迷者加辰砂末。小便赤者加木通。大便堅者加生石膏粳米一撮爲引。以米熟爲度。熱服。

理中快斑湯 治痘誤傷生冷寒凝。不能起發。

漂白朮

白雲苓

青化桂

黑薑炭

南木香

炙甘草

官揀參

嘔吐加半夏泄瀉。加懷山藥生薑三片。大棗三枚爲引。水煎服。

寬中快斑湯 治痘誤傷飲食中氣抑遏。不能起發。

廣陳皮

法半夏

漂白朮

陳枳殼

六神麪

山楂肉

西砂仁

正雅連

南木香

川紫樸

杭青皮

淨連翹

炙甘草

生 薑一 片  
爲 引

水煎。熱服。

四芩新加湯 治痘已起發。小便赤少。

結猪苓

宣澤瀉

赤茯苓

淮木通

白滑石

淨連翹

甘草梢

燈心

淡竹葉

爲引

水煎服。

胃苓和中湯

治痘已起發。忽變泄瀉。或傷飲食。

宣澤瀉

漂白朮

白雲苓

廣陳皮

訶子肉

炙甘草

結豬苓

川黃連

南木香

綠升麻

藿香葉

梗米一合爲引

水煎服。

六君子湯

治痘起發。能食而泄瀉。雖然無害。亦宜調其中氣。

官揀參

漂白朮

白雲苓

廣陳皮

法半夏

炙甘草

西砂仁

六神麩

南木香

綠升麻

生薑

大棗

爲引

水煎服。

爲引

消毒化斑湯 治痘瘡起發。頭面作腫。

芽桔梗

牛蒡子

淨連翹

北防風

紫草茸

綠升麻

淨蟬蛻

密蒙花

龍膽草

人中黃

水煎食後服。

托裏快斑湯 治痘瘡稠密。頭面應腫不腫。

牛蒡子

芽桔梗

綠升麻

荆芥穗

淨連翹

粉乾葛

川羌活

北防風

當歸梢

上薄桂

炙甘草

竹葉爲引  
十片

水煎服。

苦參散 治痘瘡初壯。頭面未應腫而腫。天行癟疫也。

川羌活

北防風

牛蒡子

芽桔梗

淨連翹

酒黃芩

荆芥穗

嫩苦參

人中黃

水煎。入竹瀝薑汁調勻。徐徐服。

四聖解毒湯 治痘瘡作癰能食。而大便祕。

紫草茸

淮木通

陳枳殼

炙黃耆

柳桂枝

錦大黃酒炒

水煎。空心熱服。

洗法 治痘瘡作癰。

綠升麻

漂白朮

全麻黃

柳樹皮

煎濃漫乘熱拭之。

調元托裏湯 治痘瘡作癰而兼泄瀉。

炙甘草

南木香

廣陳皮

嫩柳桂

北防風

川羌活

炙黃耆

赤芍藥

荆芥穗

水煎服。

熏法 治痘瘡作癰。泄瀉內虛者。

茵陳蒿

蘄艾葉

二味燒烟熏之。如用上二法而癢止者吉。反甚者不治。

導赤解毒湯

治痘起發時。身熱太甚。脣焦口渴。

淮木通

北防風

大麥冬

淨連翹

地骨皮

綠升麻

白芍藥

粉乾葛

懷生地

天花粉

炙甘草

燈心十根

水煎服。

生澤地黃湯

治痘起發。大便堅實而渴。

懷生地

天麥冬

淨知母

天花粉

炙甘草

竹葉十片

南木香

水煎熱服。

七味白朮散

治痘起發泄瀉而渴。

官揀參

漂白朮

炙甘草

白雲苓

粉乾葛

生薑

藿香葉

大棗爲引

水煎服。

二陳理中湯 治痘曾傷冷物。受寒氣而嘔者。

官揀參

漂白朮

廣陳皮

法半夏

炙甘草

生薑

三片爲引

水煎服。

二陳一連湯

治未傷冷物。嗰氣而嘔者。熱也。

廣陳皮

法半夏

白雲苓

炙甘草

竹茹

生薑

爲引

水煎熱服。

加味鼠黏子湯

治咽中生瘡。閉塞而嘔者。

芽桔梗

牛蒡子

新射干

山豆根

廣陳皮

荆芥穗

北防風  
淨連翹

炙甘草

水煎。熟服。

控涎丹 吹咽中生瘡。

明雄黃五分

共爲末吹喉中。

兒

茶五分

川黃柏五分

