


萬國
藥方



權量分準

Tables of Weights and Measures

西國
TABLE OF WEIGHTS

藥秤 自林士爲始

磅號 1gr 或

四百三十七林士半爲一兩 西名一安士

磅號 1oz.

十六兩爲一觔

西名一磅

磅號 1lb.

兩內有常用之砝碼開列於左

十林士爲半士古倍

磅號 3lb.

二十林士爲一士古倍

磅號 6lb.

三十林士爲半打拉門

磅號 12lb.

四十林士爲二士古倍

磅號 24lb.

六十林士爲一打拉門

西名一地麻

磅號 48lb.

一百二十林士爲二打拉門

砝號 30

以上六等砝碼原不屬於常秤因其便宜故用之

一百零九林士有奇爲一兩四分之

砝號 $\frac{1}{4}$ oz 或 4 DRAM

二百十八林士有奇爲半兩

砝號 $\frac{1}{2}$ oz 或 8 DRAM

四百三十七林士半爲一兩

即七打拉門零
十七林士半

砝號 1oz

西國藥秤較中國爲小但中國之秤亦不一今本書所用之

秤乃遵照庫秤而定因庫秤通行各省也

看下中西秤譜

西國藥秤一兩名一安士卽中國庫秤七錢六分也

較庫秤每兩少二錢四分

西國藥秤一打拉門卽中國庫秤一錢零五厘也

較庫秤一錢每打拉門多五厘

中國庫秤一兩卽西國藥秤五百七十五林士半

較西藥秤每兩多一百三十八林士半

中國庫秤一錢卽西國藥秤五十七林士半

較西藥秤之打拉門少二林士半

西國

TABLE OF MEASURES.

藥量 自林士爲始一林士與一滴不甚差

記號 *m* 或 *m*

六十林士爲一打拉門

西名地康量

記號 *F3* 或 *Fl. oz.*

八打拉門爲一兩

西名安士量

記號 *F5* 或 *Fl. dr.*

二十兩爲一盆

即一盈式

記號 *O* 或 *Pd.*

八盆即八
勑量爲一桶

西名一闊圓

記號 *C* 或 *I. Gal.*

此量之數由秤之一兩而起其法先用水熱至六
十度者秤足一兩傾一器內視其至處畫一記號為一
兩量再將此水分爲八打拉門各畫記號爲
打拉門量每打拉門再分爲六十林士卽得

小兒服藥之數

按大人之分數折扣

一歲者按十二分之一服
二歲者按七分之一服

DOSSES FOR CHILDREN

三歲者按五分之一服，

四歲者按四分之一服，

五歲者按七分之二服，

六歲者按三分之一服，

七歲者按十一分之四服，

八歲者按五分之二服，

九歲者按七分之三服，

十歲者按十一分之五服，

十二歲者按一半之數服，

此即大概之數也，又有可多服者，如癩瘡等，又有必
宜少服者，如鴉片等是也。若加詳察，須看嬰兒科。

配藥例言

Dispensing
Preparations
of Medicines

一 凡書中配藥之數，多用分字。此分字乃份字之意，非兩錢分釐之分。如多製配，則每斤可作一分；少製配，則每釐亦可作一分，勿爲所拘。

二 凡藥屬流質者，皆以量量之。每量可作一分，如水、酒、油、藥等類是也。藥屬定質者，皆以秤稱之。每秤可作一分，如藥膏、藥散及五金等類是也。藥方內間有流質不
量者必註一秤字

三 凡藥方配製用一天者，乃一晝一夜也。

四 凡藥之通行常用者，其名高擡四頭，次則三頭。藥方之常用者，其方高擡兩頭，次則一頭。俱按英國本草定例。抬四頭兩頭者皆在英國本草內抬三頭一頭者間在美法中華本

五 凡配藥之方，其多少先後，俱係一定，不可疎忽錯亂。

六 凡書所說寒暑表之度數，俱以髮倫表數爲準。

七 凡猛厲藥與藥精等間，有用一林士分作幾分者。

因英國藥劑以林士爲極小之數，故欲少服藥者，必分林士爲幾分，如半林士、一林士三分之一、二林士十分之一之數是也。

搭配須宜謹慎。如作丸用，可同別藥仔細研勻，如要單服，可用法化開，然後分服。如有成方，照成方之法化服。

Comparative Table of English and Chinese Weight
按西國藥秤 較 中國庫秤圖

Comparative Table of English and Chinese Weights.

按西國藥秤較中國庫秤圖

萬國藥方 卷三

萬國藥方

相思子

又名 紅豆

ABUS PRECATORIUS.

Preparations.

Materia Medica

Pharmacopeia

此藥出於南亞美利加及印度等處，入藥用樹子。

外用 治眼胞內生米粒瘡及皮類病。

思子泡水

製法 相思子

研末涼水

分五百

泡一天

再加沸水

分五百

候涼過

INFUSUM ABRI.

淋紙爲度，日三次點眼內，令其生炎出膿，退雲翳，並治米粒瘡用之。

相思子

糊 製法

相思子

二百分

去皮

涼水

分五百

浸一天，入臼打糊，再加水足八百

分爲度，治皮類病，用毛筆蘸搽。

肥皂

又名

肥皂麩

ACACIA CONCINNA
PULPA.

此藥出中國等處，由肥皂莢製出。

白樹膠又名

ACACIA GUMM

亞拉伯膠

此藥出亞非利加及亞拉伯印度等處乃阿楷西耶樹之膠結顆粒畧圓上多坼紋色灰白不過光因其色白故名

化法 冷水一分分化後變酸不堪用沸水易化但化後變酒伊打 油類均不化

功用 潤劑 養生 又配別藥常用之

主治 乾癥癥 每用一塊放口內噙化

反藥 酒 伊打 阿摩尼亞水 鉛霜 硼砂 強水類

白樹膠製法四分零塊汽水六分裝有蓋器內間時調勻以化爲度

每服一至四打拉門 治癥癥藥內添少許最妙此漿能令油與水化勻服藥油者便用 又方膠漿三打門藥油一兩皆可各樣入臼研勻漸加

水研極勻爲度

MUCILAGO ACACIAE

白

樹膠勻水 製法 白樹膠漿一分 水糖一分 汽水二分 十共化勻爲度 治

內熱 亦治服毒後腹內煩熱

德國方 白樹膠十五分 細末 煉白糖十五分 細末 水一百七分 共化勻爲度法國方 白樹膠一分 細末 水糖三分 柑花汽水一分 汽水十分 共化勻爲

度

樹膠糖 製法 十分研末 汽水三十分 白糖六十 先將白樹膠入汽水內

化開 再入燙鍋加白糖化勻 過布濾渣爲度

醋

ACEITUM.

又名

乾醋

此藥之濃淡以醋精多寡爲定 製法有粟米或果實及別物之異 按百分中函醋精三分至六分者爲通行之品 英國漁肆用者每百分中函醋精五分有奇

功用 收斂 解熱 利小便

主治 热症 自汗 盗汗 乾渴

服法 每服一打拉門至一兩加水用之。

外用 治跌打損傷 閃腰扭挫 石灰逐目。

反藥 石灰 阿摩尼亞 反酸類 炭養鹽類。

醋漱水 製法 荆芥泡水一兩 糞醋一兩 和勻仰漱治咽喉類病。

一名 醋精化名炭輕養 即輕炭輕養

純醋酸 GARGARISM ACETICUM

醋酸 TUM.

此純酸不易製造亦不入藥用用者按函醋精之多寡分濃淡冰三種。

濃醋酸 ACIDUM ACETICUM

濃醋酸 ACIDUM ACETICUM

此藥由木內蒸出復用法煉成者無色極酸嗅之刺鼻其性酷烈不可

單服惟配佐他藥方可用之 每百分中計有
醋精三十三分

淡醋強酸

製法 濃醋酸 一分 汽水 七分化勻爲度 每百分中計有
醋精四分有奇

功用 收斂 解熱 利小便 與驗醋同。

冰醋酸又名

ACIDUM ACETICUM
GLACIALE

冰醋强酸

服法 每服一二打拉門加水冲服。

此藥結冰無色過光味極酸氣息刺鼻按百分中計有
醋精九十九分

化法 水全化 此藥能化樟腦 藥脂類 藥香類 蒸油類等

功用 丹類 不可內服

外用 治瘊瘍等症 楊梅瘊子 燒瘡

醋酸製法 冰醋酸七十 丁香油九分 拉彎大油六分 陳皮油六分 伯格

莫油三分 台茂油三分 肉桂油一分 共化勻過淋紙爲度諸藥之分皆用秤

又方 拉彎大油一分 薄荷油一分 迷迭香油一分 側柏油一分 肉桂

油一分 檸檬油二分 丁香油二分 濃酒三百 淡醋酸四百五 汽水一千二 共

和勻浸數日過淋紙爲度。

又方 冰醋酸五百 樟腦五十 肉桂油分 丁香油一分 拉彎大油半

分共化勻過淋紙爲度。

又方 青蒿 艾葉 迷迭香 荆芥 薄荷 濡草 拉彎大花 各

五分

水菖蒲 肉桂 丁香 肉豆蔻 蒜頭 各二分

樟腦 四分

冰醋酸 十

分 酢醋 一千分

葡萄酒製色白者佳

先將樟腦與冰醋酸化開聽用後將各藥入醸醋浸

十天用絞盤絞渣加入樟腦醋酸和勻過淋紙爲度以上四方功用

相同可提神以代鼻烟西國婦人多用之嗅其氣極美

信石

又名

ACIDUM ARSENICOSUM.

砒霜

粗質名信石煉成者爲砒
此書所論皆是煉成者

一名鼻霜 又名靈養酸

化名靈養

舊名鉛養

此藥自砒石煅過再升煉而成色白質重無臭無味性酷毒不可單服
常用者惟信石銥水靈碘汞水二方

化法

冷水

一百分

沸水

二十分

濃酒

五百分

鹽強水

化一分

甘油

六分化

銥養水

十一分

功用

補腦

改病

解熱

解瘧

順氣

主治 濕癬 皮膚久病 久風濕 痘疾 腦氣筋疼 跳舞風

楊梅類病 拘攣風濕 氣喘

服法 每服一林士六十分之一至十二分之一多加水化之飯後服
外用 丹類亦宜慎用

治毒瘡惡瘡等症

反藥 鐵鹽類 鎌養 石灰水 收斂藥類

解藥 解此毒先服吐藥後服濕鐵養或鐵綠鐵養水或鎌養成淡阿摩尼亞水或無名異或石灰搽油皆可

總以溼鐵養鐵綠鐵養水為妙

又經驗良方 鎌養十五水二百分之一和勻入瓶再用上礦強鐵水一百水

二百五十分之一 和勻入瓶用時將二水各一半和勻服之卽解此毒

或一斤或半斤酌服可也

鋸水 製法 信石八十七炭養鋸八十七拉彎大製酒

五打汽水二十 先將汽

水信石炭養鋸入鍋熬化候冷入拉彎大製酒加水仍足二十兩爲度

每服二至八林士加水冲服日二三次飯後用之

每五十五林士內計有信石半林士

鹽強

信石水

製法

信石

八十七
林士 鹽強水二十
拉門汽水
兩 先用水四兩加鹽強水

與信石熬至消化再加餘水仍足二十兩爲度

服法同上

每五十五
林士
內計有信石半

士林

石糊

製法

信石二分磺強莫非續一分幾阿蘇

酌用

共研成糊爲度

治牙痛用此糊一米粒點棉花上塞入牙穴內外用軟蠟封固過二三時許取去卽愈

此藥能敗牙內之膿氣筋致永不再痛但
塞藥之時必痛可先搽高告蘆水以免痛

又方 信石

一分
研末

木炭

一分
細末

硃砂

四分
研細

水酌用共研勻成糊爲度外

用治毒瘤等瘡

石洗水

製法

信石

十分
研末

汽水

十六
兩

謙落膏

一兩

淡鉛水

三兩

鴉片酒

打門拉
士共和勻爲度治毒瘤瘡疼每日一次洗之

石丸

製法

信石

一
土

胡椒

八十
生細末

用饅頭屑研爲團作二十丸爲度每

服一粒

信

VINUM ARSENICALIS.

石葡萄酒製法信石十五林士 汽水二斤入鍋熬至信石消化候涼過淋紙再加汽水仍足二斤之數末加白葡萄酒或黃酒二斤共和勻爲度 每服半

至一打拉門

每四兩內計有
信石一林士

靈強酸

ACIDUM ARSENICUM.

此藥自信石與硝強鹽強二水製成色白成塊不過光露空氣自化

化法 凉水六分化 沸水二分化

功用 補腦 改病 與信石同 性較信石爲烈

服法 每服一林士四十分之一多加水冲服

一名安息香酸 化名炭輕養 即輕炭輕養

此藥從安息香製出形如片珠體輕而薄色白臭香味甜而辛

ACIDUM BENZOICUM.

化法 冷水四百三十分 沸水十二分 濃酒五分半 伊打五分半 哥羅方六分化一分 辨蘇一分
化二分 甘油四十五分 熟甘油十二分 反酸水類均化 加硼砂少許畧易化

功用 行氣 化痰

主治 癲癇 遺尿 腸胱發炎

服法 每服五至十五林士，多加水沖服。或用糖漿或甘油作丸服亦可

匿酸冰糖製法

辨佐匿酸三百六十林士煉白糖二十七五兩

白樹膠細末一兩

白樹膠漿

二兩汽水酌用先將上三藥研勻，再加膠漿與水共調勻成團，分七百二十塊，焙乾爲度。

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

此藥有生成在火山中，後經煉而出者，亦有由硼砂與礦強水製煉而成者，結冰形如片珠，色白半過光。

化法 冷水二十分 沸水三分化一分 甘油四分化一分 濃酒三十分化一分

功用 免臭氣 胃治內發釀

服法 每服五至三十林士

辨佐

化名

TROCHISCI ACIDI BEN-ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

每服一至五塊

硼酸

化名

ACIDUM BORICUM.
ZINC.

輕硼養舊名補養

每塊內計有辨佐匿酸半林士

</

外用 免臭爛 治火眼 及潰瘍惡瘍等。用此藥一分，沸水三分。

化合將麻絨布加入浸透，提出曬乾，敷患處，治瘡症最妙。

硼酸

油膏

製法

硼酸

細末

軟巴喇粉

四分

硬巴喇粉

二分

先將二巴喇粉化

勻，再將硼酸過細羅於內，調勻至冷爲度。治瘡類症。

又方

硼酸

一分

辨佐匿

猪油

六分

調勻爲度。

又方

硼酸

細末

鯨腦油膏

一兩

共調勻爲度。治眼胞米粒瘡用

此方

基淡惟
治眼用

酸洗水

製法

硼酸

二林士
細末

汽水

一兩

化勻爲度。治火眼用。

化名
炭輕養

即輕炭輕養。

此藥自蒸煤氣所剩之脂製出，分定流二質，定者形如片珠，色白過光，有極淨不函水者，名紛哪理。內服多用此種。

化法

冷水

十二分

洋橄油

二分化

甘油

一分化
三分半

哥羅方

一分化
三分

伊打

一分化
四分

濃酒

一分化辨蘇二分化

炭磺二分化半鍼養水

油類同化

此酸大奇多加水必
十三分方化一分少

六分加水每一分水可
化酸四至九分

功用 發表 解熱 行氣 免臭氣 殺蟲

主治 乾嘔 肚瀉 热症 天花 癲症 瘰子 哮咳嗽

服法 每服一至三林士加甘草末作丸用或多加水冲服或配甘油

用

外用 解毒氣 免臭爛 治牛皮癬作癢 濕癬 惡瘡 皮類病

湯火傷

反藥 反酸類

解藥 解此毒者先服吐藥或用抽水節後服淡礦強水 甜石灰水

雞蛋青 洋橄油 萝麻子油 濃加非水或茶以免困倦

匿酸甘油 製法 架波匿酸 一分甘油 四分研至化勻爲度 每服五至

十林士多加水冲服

又方 流架波匿酸 一分 甘油 四分 化勻爲度

外用 摻瘡或加水一半 摻咽喉內 治白疙瘩 梅核腫大等症 因此

藥易化 配架波匿酸洗水常用之

架波

SUPPOSITORIA ACIDI CARBOLICI CUM SAPONE.

匿酸胰子小丸

製法

架波匿酸

十二分

脂油胰子

一百八十

粉子

甘油

四十

林士

研末

架波

林士

粉子

甘油

四十

林士

架波

UNGUENTUM ACIDI CARBOLICI.

匿酸油膏

製法

架波匿酸

一分

軟巴喇紛

十二分

硬巴喇紛

六分

先將二

巴喇紛用火化勻 再入架波匿酸 調至冷爲度

美國方

架波匿酸

一分

黃油膏

九分

調極勻

爲度

治瘡類症

波匿酸漱水

製法

架波匿酸

一林士

水

四兩

化勻

爲度

用水節射入膀

CARGARISMA ACIDI CARBOLICI.

喉類病 及口發臭氣

架

INIECTIO ACIDI CARBOLICI.

波匿酸射水

製法

架波匿酸

一林士

水

四兩

化勻

爲度

用水節射入膀

胱或陰戶以解臭氣。

架

波匿酸洗水 製法 架波匿酸三十水八兩化勻爲度

洗諸瘡症最妙

亦治蚊咬瘻痛

又方 架波匿酸甘油二三打水十兩化勻爲度 洗瘡用

又方 架波匿酸十五至三十五林士水一兩化勻爲度 洗惡瘡

波匿酸香油 製法 架波匿酸一分香油十分化勻爲度

治湯火傷最良

良 搽各樣瘡口亦可

波匿酸化汽水 製法 架波匿酸二十水一兩化勻爲度 入噴氣燈內

候藥水化汽令病者吸之 治咽喉不利及口發臭氣

流架波匿

製法定架波匿酸 十分汽水一分化勻爲度

功用 同前此則便用

ACIDUM CARBOLICUM
LIQUIDUM.

VAPOR ACIDI CARBOLICI.

OLEUM CARBOLATUM.

LOTIO ACIDI CARBOLICI.

濁架波

匿酸

此藥色棕而黑、內函雜質。

功用 惟解毒氣、不宜別用。

置茅廄中除惡氣爲用

波匿酸化名炭輕養、礦養土水

此藥從礦強水與架波匿酸製出、與底類能化合成鹽者。

功用 配以下各鹽類服之勝於單解毒、免臭

解血內釀毒

礦强架

波匿阿摩尼亞

AMMONII SULPHO-CARBO-LAS.

礦强架

波匿鉛

CALCHI SULPHO-CARBO-LAS.

礦强架

波匿銅

COPRI SULPHO-CARBO-LAS.

此藥結冰色淺藍過光、外用、免臭爛。

礦強架

波匿鐵

FERRI SULPHO-CARBO.

礦強架

波匿鎂

MAGNESII SULPHO-CARBO.

礦強架

波匿鋅

POTASSII SULPHO-CARBO.

紛哪達

波匿鋅

PHENOL-PHTHALEIN.

此藥結白色之冰

每服十至十五林士

林化名炭輕養。

此物自紛哪理與衲地連酸製成，結散色白而黃，原不入藥，惟化學家試驗藥性用之。該類鑑類見此物變深紅。

鎔

又名

CHROMIUM

鎔強酸

化名

鎔養

舊名鎔養。

此原質甚脆而堅，與別質化合，色皆悅目，與養氣化合，成酸類。

ACIDUM CHROMICUM

此酸自雙鎘強銻與礦強水製成，結冰形如鍼芒，色現紅紫，味酸而濃，露空氣自化。

化法 水二分化酒雖化而敗壞

一分

外用 丹劑 免臭爛 治瘊子 惡瘡 頑瘡 毒癰等症

加水用
見下

鎘強

LIQUOR ACIDI CHROMICI

酸水

製法

鎘強酸 一分汽水三分化合爲度

作丹類治瘡症以玻璃

條點之。若洗瘡須多加水

一盆水約用
此藥幾滴

法國方 鎘強酸 一分汽水一分化勻爲度 點瘊子用

檸檬酸

化名

炭輕養 輕養 即輕炭輕養

此藥自檸檬汁（或洋金礬汁）製出者，結珠無色，味酸而涼。

ACIDUM CITRICUM

化法

水六分化

甘油二分化

濃酒十五分

伊打五十分

辨蘇一分

哥羅方微化

功用

解熱

解渴

服法 每服十至三十林士，加水二兩和服

SYRUPUS ACIDI CITRIOLI

檳

反藥 葡酸銹 反酸炭養鹽類 醋酸鹽類 硫磺鹽類

酸糖 製法 檸檬酸二十分水糖九百六十分汽水二十分檸檬酒一分調勻爲度

又方 檸檬酸八分水糖九百八十分汽水八分檸檬酒四分調勻爲度 與

檸檬汁同用

架泐酸一名
ACIDUM GALLICUM.

沒石子酸化名
炭輕養輕養即輕炭輕養輕養

此藥自沒石子製出，結珠頗細，恍似針芒，色白而黃，味畧酸而濁。

化法 冷水百分之一分沸水三分化一分子濃酒八分化一分伊打五十分化一分甘油二十分化一分熱甘油五分

分化一分子

功用 收斂 治內部血出 虛癆自汗 吐酸 子宮血出 吐血

尿帶蛋青類

服法 每服三至十林士，日三次服之。尿帶蛋青者，可服十至六十林士。吐血，十至三十林士。

反藥

強水類

五金鹽類

炭養鍊

炭養鑪

石灰水

銻錫葡

吐藥

甜硝伊打酒

衣必格

鴉片等

架泐

GLYCERINUM ACIDI
GALLICI

架

UNGUENTUM ACIDI
GALLICI

架泐酸油膏

製法

架泐酸

一分辨佐匿

猪油九分研勻爲度

治痔瘡

頑瘡等類

架泐酸丸

製法

架泐酸

三十林士甘油三林

共研勻分作六丸爲度

火架泐

ACIDUM PYROGALLICUM
PILUULA ACIDI GALLICI.

架泐酸

化名

炭輕養

即炭輕養輕

此藥由架泐酸加熱自三百五至四百度製出故名之結冰色白而亮味極苦

化法

水二分化一分

濃酒十分化九分

伊打能化

外用

治皮類病

烏髮

照像者恒用之

火架溴酸油膏

製法 火架溴酸 六十
林士辨佐置猪油一兩調勻爲度 治白

UNGENTUM ACIDI PYROGALLICUM.

癬最良

火架溴酸烏髮水

製法 火架溴酸一分汽水十六分化勻另入瓶用時將二瓶之水各少許次第擦於髮際

LIQUOR TINCTILIS CRINALIS.

銀一分水份三十化勻另入瓶用時將二瓶之水各少許次第擦於髮際

立能變黑

淡溴輕酸

化名 輕溴土水

此酸自溴質與硫磺輕氣製出濃者不入藥用

淡溴輕水

又名 淡溴輕水

此藥無色無臭味極酸每百分紅而純溴輕酸十分按正方此藥不易配下有便方配

之

功用 平腦 改病 與銻溴鹵溴同二者常服可以此酸代之

服法 每服十五至五十林士 加水與水糖服之

製法 鈸溴二百五十 汽水二兩 化勻，再用葡萄酸三百十 汽水二兩 化勻，將二七林士

七林士 汽水二兩 化勻，將二

水調治過淋紙爲度，每服三十至六十林士

鹽強酸一名

ACIDUM HYDROCHLORICUM.
GUM DILUTUM.

鹽強水又名輕綠酸化名輕綠土水

此酸從食鹽與礦強水製成者，其形如水，無色過光，觸之刺鼻，味極酸性猛烈。每百分秤計酸輕綠酸氣三十二分

功用 不可內服，惟加水和爲淡者，方可用之。

解藥 解此毒者，火石粉、鎂養、蛋青、石灰搽油、胰子水、潤水類，後用鴉片酒及伯蘭地酒，和牛內湯，同射入肛門。

淡鹽強酸又名淡輕綠酸

ACIDUM HYDROCHLORICUM.
GUM DILUTUM.

製法 鹽強水八分 汽水足二十 化勻，候涼至六十度而量之。每百分秤計酸輕綠酸氣十分半有奇

功用 补劑、解熱、免臭爛。

服法 每服十至三十林士，多加苦草藥類泡水和服。

如龍膽草泡水及高林布泡水等是也

反藥 銀鹽類 鉛鹽類 錫錫葡萄藥 反酸類 反酸炭養類

鹽

GARGARIUM ACIDI HV.
DROCHLORICUM

強酸漱水

製法

淡鹽強水

一打

玫瑰泡水 八兩 和勻仰漱 治咽喉類

輕炭淡

ACIDUM HYDROCYANI
CUM DILUTUM.

酸 又名 輕衰 化名 輕炭淡

此酸自黃鐵炭淡銻與礦強水製成，乃無色流質，別具一種氣臭，其性最毒，不敢單服，人若誤服淨者，卽一二林士，立刻喪命。

酸 又名 淡輕衰水

ACIDUM HYDROCYANI
CUM DILUTUM.

此藥無色，味辛，性酷毒，別具一種氣臭，宜存玻塞瓶堵嚴，每百分種計兩純
輕炭淡酸二分

功用 平火安心 解轉筋

主治 嘔吐 胃氣疼 飯不消化 心跳

服法 每服二至八林士 小心慎用

外用 治皮膚癰瘡

反藥 銀鹽類 銅鹽類 鐵鹽類 三仙丹 硫磺鹽類

解藥 解此毒用青礬十林 鐵酒一打水一兩調勻服之 再用炭養
鋤二十水一兩化開服之

輕炭

HAUSTUS ACIDI HYDROCY.
VAPOR ACIDI HYDROCY.
ANICL.

淡酸化汽水製法 淡輕炭淡酸十至十汽水六十化勻爲度 入噴氣燈
內俟藥水化汽令病者吸之 治內部受傷 治眼疼用此薰之

炭淡酸製勻水製法 淡輕炭淡酸五林士汽水六十化勻爲度 拉門薄荷水四兩雙炭養鑪半兩汽

水四兩共化勻爲度 每服半至一打拉門 治胃疼 心跳

炭淡酸洗水製法 淡輕炭淡酸二打薔薇汽水八兩和勻爲度 用布

薰洗患處 治皮膚瘙癢

LOTIO ACIDI HYDROCY.
ANICL.

炭淡酸油膏製法 淡輕炭淡酸半至一打銻養油膏一兩調勻爲度

乳酸化名 炭輕養一水 即輕炭輕養一水

ACIDUM LACTICUM.

又名
UNGUENTUM ACIDI HY.
DROCYANICI

嬌酸

此藥從各嬌用法提出或自嬌餅與白糖鉛粉溫水製出形如水糖色

淡黃味極酸

每百分中計有純
嫩酸即
炭
輕
養
七十五分

化法水

濃酒

伊打同化

哥羅方不化

功用治飯不消化

尿變甜

服法每服五至四十林士

加水與白糖日三次服之治胃不消化

宜加胃酸和服

外用作化汽水

治白疙瘩或化水內刷咽喉亦可

酸化汽水

製法嫩酸一分水十六分化勻爲度入噴氣燈用之能去白

疙瘩假皮

淡嫩酸

又名

製法嫩酸三分汽水足二十分化勻爲度

淡乳酸

製法嫩酸三分汽水足二十分化勻爲度

功用與嫩酸同而力較遜

服法每服三十至一百二十林士

ACIDUM LACTICUM DILUT.
T.U.M.

VAPOR ACIDI LACTICI.

鹽酸鐵

PEPERI LACTAS.

化名 鐵炭輕養·輕養

此藥從鹽酸與鐵質製出，色綠而白，味甜無臭。

化法 溫水四十分沸水十二分酒不化。

功用 補血 開胃 嬰兒胃弱便服。

服法 每服一至五林士。

化名 炭輕養 即輕炭輕養

此藥由鴉片製出，狀如鱗片，色棲味酸。

化法 冷水一百五十分化一分沸水雖化而變質 濃酒四十五分

功用 配美幹泐莫非糖。

硝強酸 又名 淡養酸 化名 輕淡養土水 舊名 輕養淡養土水

此酸自硝強銹（或稱強鍾）與礦強水蒸出，無色，味極酸。每百分種計函純硝強酸即輕淡養七十分。

功用 配淡硝強酸 濃者不宜內服。

ACIDUM NITRIGUM.

ACIDUM MECONICUM.

外用 大丹類 治楊梅疔毒 點諸般惡毒瘡去腐肉。

解藥 解此毒者用火石粉 鎂養 蛋青 石灰搽油 香油 腺

子水 潤水類 後用鴉片酒及伯蘭地酒和牛肉湯同射入肛門

強酸洗水 製法 濃硝強水 十二林士水 十二兩 和勻爲度 洗諸般瘡症用之

淡硝
強酸

硝

又名 淡硝強水

製法 硝強水 六分汽水 足三十一分 化勻候涼至六十度而量之 每百分秤計函純硝
強酸十七分有奇

功用 解熱 補劑 免臭氣

主治 肝類病 久氣管痰 楊梅結毒

服法 每服十至三十林士多加水服

外用 免臭爛 點頑瘡

反藥 酒 反酸類 養氣鹽類 青礬 鉛霜 炭養鹽類 硫磺

鹽類 解此毒見上

NITROHYDROCHLORICUM
ACIDUM NITROHYDROCHLORICUM

硝鹽強

酸 又名合強水 又名皇強水

因其能化
金泊故名

製法 硝強水 三分鹽強水 四分和勻，待自沸後，入玻瓶封固，放陰冷處。

候一天爲度。忌光，不宜久存。

此藥爲黃色流質，味極酸，臭如綠氣，性猛烈。

功用 不可內服，配淡者常用。

解藥 解此毒，先服吐劑，或用抽水節，後多服雞蛋青。

淡硝鹽強

酸 又名淡合強水

MIXTUM ACIDUM NITROHYDROCHLORICUM DILUTUM

製法 硝強水 三分鹽強水 四分汽水 二十分 和勻，共入玻塞瓶內，存十四天爲度。

又方 濃王強酸 七分汽水 二十分 和勻爲度。

功用 补劑 開胃 改病。

主治 肝塞胆汁少 黃疸。

服法 每服五至二十林士加水一二兩沖服。

反藥 與硝強鹽強水同，解此毒者見上。

硝

鹽強沐浴水

製法 淡硝鹽強酸八兩

溫水一桶熱至

九十八度

和勻爲度

用呢

子布寬約一尺，長須圍腰二週，入此水內浸透提出，畧去水濕圍於腰間，外套油布，日換二次。貯水之器須用玻璃，木磁等爲之方安。治肝塞胆閉。

阿沕酸

化名炭輕養

即輕炭輕養

此藥自油類製出，乃引高度蒸氣經過而得，爲黃色流質，無味無臭，與反酸類能化合成鹽類。

化法 濃酒 哥羅方 伊打 辨蘇 松節油 榨油類皆可化水不化。

功用 配油流汞、油流鉛、油流鋌等，均係外用，治皮類病。

油流汞

又名

阿沕汞

製法 黃汞養 一分 油流酸 九分 先將油流酸入臼，調之，漸加黃汞養研。

勻，再間時研至化勻爲度。此藥不一有用汞十分之一者，有用汞二十分之一者，有用汞五分之一者，惟五分之一者可以久存。

外用 治禿瘡 皮類病 骨節變大 吸核變大。

又方 黃汞養 一百五 十林士硝強水 三十 油流鍊水 二十 汽水 酌用 先將汽

水 二兩 與強水調勻，再將黃汞養化勻，加水足四十兩，漸加油流鍊水

調治，用文火候變質，後用溫水洗淨取出，仍加文火烘乾爲度。此方尤良，又易貯存。

每百分中計有汞質二十八分有奇，用時加油流酸多少，按作濃淡減加之。

油流錠 又名 OLEUM TUNICI.

阿泐錠

製法 錠養 一分 油流酸 九分 調勻候一時，再入燙鍋化勻爲度。

外用 治溼癬 皮類病

又方 醋酸錠 一百八 十林士汽水 四十 化開，再加油流鍊水 二十 漸加漸調，候其降散，再用涼水洗淨取出，文火焙乾爲度。此方比前方較濃，用時多加油順。

油流鉢

鋸油膏

製法 油流鋸一分 軟巴喇紛一分 用文火化勻 調至微涼爲度

又名 阿泐鉢

OLEUM ALUMINIUM
UNGENTUM ZINCIOLEA

油流鉢

製法 白礬二百四十林士 汽水四十兩 化勻 加油流鑄水二十兩 用文火候變質 使溫水洗淨抒出 仍以文火焙乾爲度

又名 阿泐銀

OLEUM ARGENTII
UNGENTUM ARGENTI

油流銀

製法 銀丹二百四十林士 汽水四十兩 化勻 漸加油流鑄水二十兩 候變質 用涼水

洗淨取出 放陰處晾乾爲度

又名 阿泐靈

OLEUM ARSENII
UNGENTUM ARSENII

油流靈

製法 信石十至二十一林士 甘油二十兩 化勻 加汽水四十兩 再漸加油流鑄水二十兩 用

文火候變質 使溫水洗淨取出 仍以文火焙乾爲度

又名 阿泐鉢

OLEUM BISMUTHI
UNGENTUM BISMUTHI

油流鉢

製法 硝強鉢二百八十林士 甘油四兩 合化 漸加油流鑄水二十兩 調勻 用文結冰者

火候變質，使溫水洗淨取出，仍以文火焙乾爲度。

油流銅

又名阿泐銅

製法 磺強銅

一百八
十林士汽水

四十兩

合化漸加油流鑄水

二十兩

用文火候變質

使溫水洗淨取出，仍以文火焙乾爲度。

外用 治瘊子 雞眼 皮類病

流銅油膏

製法 油流銅

一分花士玲

四分火化

調至冷爲度 治皮類病

又名 阿泐鐵

製法 上磺強鐵水

二百十乞
十林士水

四十兩

和勻漸加油流鑄水

二十兩

用文火候

變質，使溫水洗淨取出，仍以文火焙乾爲度。

又名 阿泐鉛

製法 鉛霜

二百八
十林士汽水

四十兩

和化漸加油流鑄水

二十兩

用文火候變質，溫

水洗淨取出，仍以文火焙乾爲度。

油流鉛

OLEUM PLUMBI.

油流鐵

製法 油流銅

一分花士玲

四分火化

調至冷爲度 治皮類病

油流鉢

LIQUOR POTASSII OLEATI.

水

製法 沸汽水八斤 雙炭養鉢五兩 化勻 候沸定 加油流酸十四兩 种 漫火熬

至變質候涼加水足十六斤爲度

功用 配油流鹽類以上諸方用此水代油流鹽水亦可

油流鑄

OLEUM SODII OLEATI.

水

製法 白胰子一分 研末 汽水五分 用文火化之 加水足二十分爲度

功用 配油流鹽類代油流酸用

油流厄

OLEUM ACONITINAE.

哥匿顛續

製法 厄哥匿顛續八林士 油流酸一兩 化勻爲度

功用 治腦氣筋痛

油流丫

OLEUM ATROPINAE.

刀邊續

製法 丫刀邊續八林士 油流酸一兩 化勻爲度

功用 同上

油流高

OLEATUM COCAINE.

告糖

製法 高告糖

四十五至
九十五林士

油流酸 一兩化勻爲度

功用 同上

油流莫

OLEATUM MORPHIN ET
HYDARGYRI.

非糖

製法 莫非糖

八至二十
四林士

油流酸 一兩化勻爲度

功用 同上

油流莫

製法 油流汞 一兩

莫非糖

八至二十
四林士

化勻爲度

非糖汞

製法 油流汞 一兩

莫非糖

八至二十
四林士

化勻爲度

油流桂

OLEATUM QUININA E.

尼糖

製法 桂尼糖

二十二林士或四十四
林士或一百十林士

油流酸 一兩化勻爲度

桂尼糖 一兩化勻爲度

桂尼糖 一兩化勻爲度

油流草

OLEATUM VERATRINAE.

外用 擦鼻孔 治伏中氣喘，

喇抵癟

製法 草喇抵癟

八至二十
四林士

油流酸 一兩化勻爲度。

外用 止腦氣筋痛

以上七方所用藥精皆係純
者與油流酸則能化合成鹽。

惡西酸

ACIDUM OXALICUM

又名 草酸 化名輕炭養·輕養

此酸自硝強水與白糖

或加火硝

製出結冰無色過光味極酸。

化法 凉水

八分化

沸水全化

濃酒

二分化

伊打不化

功用 配惡西鹽類或試驗藥用。

惡西阿

AMMONII OXALAS.

摩尼亞

化名輕淡炭養·輕養

此藥自惡西酸與炭養阿摩尼亞製出結冰色白無臭。

功用 試藥性用之。

惡西鐵

FERRI OXALAS.

化名鐵炭養·輕養

此藥自礦強鐵與惡西酸製出，結散色黃，無臭。

功用 與鐵類同。

服法 每服一二林士。

化名 輕燐養土水
舊名 輕養燐養土水

ACIDUM PHOSPHORICUM
CONCENTRATUM.

此藥自燐質與硝強水煉出，形如糖漿，無色極酸。
每百分中計箇純燐強酸即輕燐養土水六十六分有奇。

功用 配淡燐強酸，濃者不宜內服。

又名 淡燐強水

ACIDUM PHOSPHORICUM
DILUTUM.

製法 濃燐強酸三兩 汽水足二兩 調勻爲度。
每百分中計箇純燐強酸即輕燐養土水十三分半有奇。

功用 補劑 解熱 與礦強酸同而味較美 补腦最良

主治 乾癥 便濁 消渴即尿變甜 膽汁生多嘔苦

服法 每服十至三十林士，加水及苦酒，或香糖類同服。治小兒弓腰，宜和燐強鈷加水服之。

反藥 石灰水 鉛鹽類 炭養餾

冰燐強 酸 (化名輕燐養。舊名輕養燐養。

此藥結冰無色過光形如碎玻味極酸。

化法 水全化 露空氣自化。

功用 配濃淡燐強酸宜按數加水。

火燐強 酸 (化名輕燐養。舊名輕養燐養。

此酸係流質無色極酸因須多火製成
故冠一火字。

枯燐強 酸 (化名燐養。舊名燐養。

此藥乃燐質在養氣內焚化所剩之灰色雪白。

功用 補腦 與燐強水類同。

服法 每服一林士多加水服。

燐養酸 (化名輕燐養。舊名輕養燐養。

下燐養

ACIDUM HYPOPHOSPHORICUM OSUM.

此酸自燐綠與汽水製出，結冰無色過光，與底類化合而成鹽類。
化名輕燐養土水，舊名輕養燐養土水。

此酸自燐質與銻養水及硝強水製出，乃無色流質。
功用 與反酸類化合而成鹽，補腦常用。

主治 瘡病 虛弱等症。

燐養鹽製糖 製法 下燐養酸 一分 下燐養鐵糖 一分 下燐養銻糖 一分

下燐養銻糖 一分 下燐養鉻糖 一分 共和勻爲度 每服一二打拉門

治小兒弓腰 瘡病類 瘰癧類最妙。

SYRUPUS HYPOPHOSPHORICUM COMPOSITUS.

美國方 下燐養鉻 三十 下燐養銻 十二 下燐養鉻 十二 檸檬酸 一分

濃檸檬酒 二分 煉白糖 五百分 汽水 足一千分 先用下燐養鹽三樣，加水 三百五十分

化勻 若未化淨，候澄清取出水，再加檸檬酸，渣易化 再加檸檬酒，同過淋紙，加水漂淋 足五百分，後加白糖

調治化勻，過布爲度。此糖加奶酸鐵，每糖百分加鐵一分研勻更妙。

沙利先酸

ACIDUM SALICYLICUM.

一名柳皮酸 化名炭輕養 即輕炭輕養

此藥自架波匿酸與鑄養過炭養氣製出，亦有從柳樹、櫟樹等

皮製出者內服佳

結珠頗細，色白

而亮，味畧瀰。

化法 冷水

七百六十
分化一分

沸水

九分化
一分

淡酒

十五分
化一分

濃酒

三分半
化一分

伊打

二分化
一分

哥羅方

化法 洋橄油

一百二十
分化一分

甘油

一百九十五
分化一分

溫豬油

八分化
一分

功用 免臭氣

解熱

解血內

釀毒

主治 新風溼最良

白疙瘩

外用 免臭爛

治皮類病

惡瘡等

服法 每服五至十林士化酒內或沸水服之

此酸與鐵舖結成
鹽者屬常用之品

先酸油膏

製法

沙利先酸

一分

軟巴喇紛

十八
分

硬巴喇紛

九分

先將二

巴喇紛化勻，再加沙利先酸調至冷爲度。

又方 沙利先酸

三十
林士

辨佐匿

豬油

一兩

入燙鍋化勻

調至冷爲度。

治濕癬 白癬 金錢癬 惡瘡

利先製散 製法 沙利先酸

麥粉子 十分 細末 滑石

八十七林 土細末

共研勻爲度

治腳底汗臭 德國軍士常用之

PULVIS SALICYLICUS.
GUM TALCO.

沙

利先個老殿安

製法 沙利先酸

三十分

印度麻膏

五分

軟個老殿安

二百分之一

化勻爲度 治雞眼

礦強水 又名 硫強水 化名 輕礦養土水

舊名 輕養硫養土水

ACIDUM SULPHURICUM.
COLLODUM SALICYLI-
CUM.

此酸由焚硫礦所發之氣，化於水內製出，狀如油，無色，味極酸，性甚猛烈。
每百分秤計函純礦強酸
即輕礦養土水
九十八分

功用 配淡與香二礦強酸 濃者不可內服

外用 大丹類 與木炭末調成糊，潰瘍用

解藥 解此毒，用鎂養 火石粉 油類

與硝強酸
解法同

淡礦強酸
又名 淡硫強水

ACIDUM SULPHURICUM.
DILUTUM.

製法 磺強酸 七分 陸續加汽水足八十三分半化勻爲度 候涼至六

十度量之 每百分秤計面純磺
強酸十三分半有奇

功用 補劑 解熱 收斂 開胃

主治 飯不消化 盜汗 癪漏 便濁

服法 每服五至三十林士多加水冲服

反藥 反酸類 反酸炭養類 鈎鹽類 鉛鹽類

凡服強酸藥類皆用
淨者濁者不入藥用

礦強香酸

ACIDUM SULPHURICUM
AROMATICUM.

製法 磺強酸 三分 濃酒六分 濃肉桂酒二分 濃薑酒二分 先將磺強酸

漸次加入濃酒調勻 再加桂薑二酒調勻爲度 每百分秤計面純
磺強酸十二分半

功用 與淡磺強水同而較易服

服法 每服五至三十林士多加水冲服

強製香酸 製法 肉桂 丁香 乾薑 共爲末 石菖蒲 八分 良薑 十二分 荆芥

ACIDUM SULPHURICUM COM-
AROMATICUM POSITUM.

四分薄荷 四分畢澄茄 二分肉豆蔻 二分沉香 一分檳榔皮 一分金粟皮 或用

冰糖 三十分濃酒 一百四十分 磺強水 九十六分共浸二十一天用絞盤絞渣過淋

四分秤 分秤

分秤

紙爲度 功力同上 每服五至十林士

磺養酸

一名

ACIDUM SULPHUROSUM.

磺養水 化名 磺養土水 舊名 硫養土水

此酸自磺強水與木炭製出狀如水無色味酸臭同硫磺每百分秤計能
大奪養氣亦減草類不耐久存宜現配製存貯須用有色玻璃瓶

見黃藥即變磺發水矣

功用 免臭氣 治胃內發醱嘔吐

服法 每服半至一打拉門多加水服之

外用 免臭爛 治白疕瘡 氣管痰 損傷 瘡症 用法見下

養酸漱水 製法 磺養水 一分水 五分和勻爲度 治咽喉類病

養酸洗水 製法 磺養水 一分水 二分和勻爲度 洗瘡症及湯火傷

養酸化汽水 製法 磺養水 一分水 二分化勻爲度 用噴氣燈化汽令

VAPOR ACIDI SULPHURO-

MIC ACIDI SULPHUROSI.

GARGARISMA ACIDI SUL-
PHUROSI.

磺

磺

炭匿酸一名

病者吸之，治白疙瘩與咽喉類病。

槲皮酸又名

沒石子霜化名炭輕養。

此藥原從槲樹皮內取出，今有用沒石子者，體質輕鬆，色畧黃，味濃而
斂，入口能令舌縮。

化法

水

五分化

濃酒

六分化

純酒

一分化

伊打

百分化

甘油

三分化

熱甘油

二分化

洋橄油

化少許

辨蘇

哥羅方

微化

功用

收斂

止血

主治

血山崩

痢疾

瘻渴

服法

每服二至十林士。

外用

治毒癰

湯火傷

頭風鼻塞

喉鬆

久白濁

反藥

強水類

反酸類

錫鉛銀鐵等鹽類

藥精類

明牛膠

勻水類

炭匿

GLYCERINUM ACIDI
TANNICI.

酸甘油製法 炭匿酸 一分 甘油 四分 入白研匀 再入鑊鍋文火化勻爲度 每服十至四十林士 外用 治聾耳

炭匿

SUPPOSITORIA ACIDI
TANNICI.

酸尖丸製法 炭匿酸 三十六 林士 得波麻油 一百四十 四林士 先用得波麻油四十四林士和炭匿酸入溫白內研勻 再將餘得波麻油用文火化之 共調治入模爲丸每丸內計有炭酸三林士

治痔瘡漏血

炭匿

SUPPOSITORIA ACIDI
TANNICI CUM SAPONE

酸胰子尖丸製法 炭匿酸 三十六 林士 粉子甘油 三十 林士 脂油胰子 一百 林士 粉子五十林士或酌用研末 先將前三樣研勻 再加粉子末共成團 分作十二丸爲度每丸內計有炭酸十林士

有炭匿酸
三林士

又方

炭匿酸 六十 林士 粉子甘油 三十 林士 脂油胰子 六十 林士 粉子

研末

共研

匀分作六丸爲度

每丸內有炭酸十林士

炭匿

酸冰糖製法 炭匿酸

三百六 林士 到魯酒 半兩 煉白糖

二十五 两

白樹膠

細末 一兩

白

樹膠漿 二兩 汽水 一兩

先將炭匿酸入水消化 次將到魯酒 白樹膠漿

TROCHISCI ACIDI TANNICI.

和勻加入，再將白樹膠、煉白糖研勻，共和勻成團模分七百二十塊，焙乾爲度。每塊中計有炭
匿酸半林士 每服一至六塊。

SUPPOSITORIA ACTI
TANNICI CUM OPIO.

炭

匿酸鴉片尖丸製法 炭匿酸三十 林鴉片一林士 士的亞連十一 共化勻作一丸爲度。

治痔疾。

炭

匿酸陰尖丸製法 炭匿酸十 林士的亞連五十 共化勻作一丸爲度。

治白帶。

PESSUS ACIDI TANNICI.

又方 炭匿酸三十 林士 甘油七 林士 研勻作一丸爲度。納陰戶內外以海絨塞住。或棉花亦可 治血崩。

炭

匿酸條丸製法 炭匿酸三十 林士 鴉片一林士 甘油酌用 共研勻分作五丸爲度。放馬口內治久白濁。

SUPPOSITORIA ACIDI TAN
TANNICI URETHRALE.

匿酸油膏製法 炭匿酸 一分 辨佐匿豬油 九分 調勻爲度。治湯火傷。

匿酸鴉片油膏製法 炭匿酸三十 林士 鴉片三十 林士 煉豬油 一兩 共調勻爲

炭

UNGENTUM ACIDI TAN
TANNICI CUM OPIO.

UNGENTUM ACIDI TAN.

度。治痔瘡。

匿酸射水

製法

炭匿酸

八林士

冷水一兩化勻爲度，以小水節頻射於

鼻孔，治頭風鼻塞，射入馬口，治久白濁。

匿酸洗水

製法

炭匿酸

五林士

水一兩化勻爲度，洗濃瘡用。

匿酸香油

製法

炭匿酸

一分

香油六分或用洋油亦可

化勻爲度，搽患處，治湯火傷最效。

火傷最效。

匿酸丸

製法炭匿酸

四林士

甘油

一林士

研勻作一丸爲度。

匿酸化汽水

製法

炭匿酸

六十林士

薔薇汽水

十兩或用清水亦可

化勻爲度，用噴氣燈化汽，令病者吸之，治喉鬆。

果酸

化名

炭輕養

即輕炭輕養

此藥由雙葡酸銨取出，結冰色白，味酸而涼。

化法

水八分化十分

濃酒

五分化一分

純酒

四分化一分

甘油

四分半化一分

伊打

六十分化一分

辨蘇

哥羅

ACIDUM TARTARICUM

又名

葡酸

VAPOR ACIDI TANNICI.

PIXAULA ACIDI TANNICI

OLEUM TANNATUM.

LOTUS ACIDI TANNICI.

INJECTIO ACIDI TANNICI

方微化

功用 解熱 解渴 與檸檬酸同

服法 每服十至三十林士加水冲服

反藥 鉻鹽類 銆鹽類 水鹽類 鉛鹽類 收斂草藥類

化名 炭輕養 即輕炭輕養

ACONITUM VALERIANICU

此藥由甘松鑪與礦強水製出係無色流質味酸臭臊與底類能化合成鹽如甘松鋸甘松桂尼穠等是因此酸原從甘
松製出故名

烏頭 四名厄哥尼貸

ACONITUM
VALERIANICU

此藥出於歐洲印度中華等處根葉皆入藥味甜而苦辛入口能令唇

舌麻木刺痛內函一精名
厄哥匿彌祿

功用 審睡 止疼 平腦 平脉 解熱 解炎

服法 見下膏酒等方

主治 痛風 胃氣疼 毒癰 心體變大 梅核生炎 牙關緊閉

癆瘻 過服能使遍體麻木。

外用 治風濕疼 腦氣筋疼 但藥性酷烈，宜慎用之。

解藥 解此毒 先用吐劑，後用內外行氣劑。

草烏頭葉

ACONITI FOLIA

此用鮮葉配膏汁等，其力較根稍遜。

草烏

EXTRACTUM ACONITI

頭膏 製法 草烏頭解葉連梗 一百十斤 捣爛扭汁，入鍋加熱至一百三十度。

過布留渣，此渣色綠，有藥未盡。 再將汁入鍋加熱至二百度，過布去渣，入燙鍋散氣。

成薄水糖形，再將前留之渣，過羅回入燙鍋，攪勻散氣，熱不過一百四十度，成膏爲度。每服半至一林士。

草

烏頭汁 製法 草烏頭鮮梗葉扭出之汁 三分濃酒一分和勻，候七天，過

淋紙爲度。每服十五至二十林士。

STUCCUS ACONITI

草烏頭根

又名烏頭根

ACONITI RADIX.

此藥色外棕內白，嗅味若泥土，用乾根配酒及擦酒等，功力比葉尤峻。服法 每服半至一林士，或作酒膏等服。

草烏

LINIMENTUM ACONITI.

頭擦酒製法 草烏頭根細末二十分 樟腦 一分 濃酒三十分 先用酒二十分浸烏頭在有蓋器內，放暖處，間時搖動，候三天，裝淋箇，淋於有樟腦器皿中。

淋乾，再加酒漂淋，足三十分爲度。治腦氣筋疼常用之。若用此酒一半，橘子擦酒一半，或樟腦製。

擦酒一半，和勻
擦處最妙。

草烏

TINGUITURA ACONITI.

頭酒製法 草烏頭根一分濃酒八分 先用酒六分浸二天，間時搖動，裝淋箇，淋乾，加餘酒漂淋，用絞盤絞渣，再加酒仍足八分爲度。每服五

至十五林士，解熱，每半點鐘服半林士，加水服。服草烏頭，多用此酒。

草

EXTRACTUM ACONITI.
RADICIS ACONITI.

烏頭根酒膏製法 草烏頭根一百分 葡酸一分 濃酒酌用 先用酒四十分化，加酒潤烏頭末，實裝長圓淋筒，再加酒潤透藥末，並上浮一層，見淋

口下滴，卽塞住，上蓋嚴，浸二天，去塞過淋，漸加酒漂淋，至無藥味為止。先淋九十分另存，餘淋入燙鍋散氣，熱不過一百二十二度，成軟膏為止。將前九十分和勻，再加酒足一百分之數為度。每服一林士三分之一至半林士。

草

TROCHISCI ACONITI.
CHLOROPFORMUM ACONITI.
EXTRACTUM ACONITI.

烏頭流膏製法草烏頭根百分
極細末葡萄酸一分濃酒酌用先用酒四十分化葡萄酸潤藥末，按流膏公法裝淋筒淋淨，先淋九十分另存，餘酒入燙鍋散氣，按公法製成一百分為度。

烏頭哥羅方製法草烏頭根二十分
極細末哥羅方酌用先用哥羅方少許潤末，裝伊打淋筒，再加哥羅方淋足二十分為度，搽患處，治腦氣筋疼。用若此藥一分，草烏頭搽酒七分，共和勻，用毛筆塗患處最妙。

草

CHLOROPFORMUM ACONITI.

烏頭冰糖製法按冰糖公法製成，每塊內約有草烏頭酒半林士，每半點鐘服一塊，解熱，治喉蛾。

TROCHISCI ACONITI.

EMPLASTRUM ACONITI

草

烏頭貼膏

製法

草烏頭根酒膏

一分松香貼膏一分胰子貼膏一分先將貼膏二樣入燙鍋化勻再加烏頭膏調極勻爲度貼患處治疼痛

草

烏頭丸

製法

草烏頭根

一林土
極細末白麪七林入白研勻再酌加蜂蜜和勻作八丸爲度解熱每半點鐘服一丸

厄哥匿顛

CONTINUA.糲即草烏頭精化名

戾輕淡養

此藥自草烏頭提出色白無臭味苦而辛

化法

冷水

一百五十
分化一分

沸水

五十分
化一分

濃酒

六分化一分

哥羅方

五分化一分

伊打

二十五分
化一分

功用

此藥最毒不可內服外用止腦氣筋疼

作油膏用

厄哥

匿顛糲油膏

製法

厄哥匿顛糲

八林土

濃酒

半打
盐門

煉豬油

一兩

先用濃酒

UNGENTUM ACON.LINNE.

化厄哥匿顛糲再加煉豬油調勻爲度治腦氣筋疼

皮有損傷處忌擦恐其毒入內也

煉豬油

又名

熟豬油

俗名熟大油

製法 鮮豬脂十四斤 除去胞膜，懸掛風乾，切爲碎塊，入石臼搗勻，再入燙

鍋加熱不過一百三十度或用磁盆浮開水鍋內亦可

化透過細呢子布爲度。

照此方製成配藥合宣加大熱則變形矣。

化法 加熱至一百度自化。

伊打二十二分

松節油十六分

功用 潤皮劑 配油膏類

古惟用此油今多用花土替代之

用敷藥類將此油攤上易於

取去。若擦髮際功能薦虱。

猪油 此油自冷猪油榨出，成爲流質。

功用 與洋橄油同。

辨佐匿豬油

ADEPS BENZOATIUS.

OLEUM ADIPIS.

製法 煉豬油十六兩 辨佐匿香一百四十林士研末

共入燙鍋鎔化兩點鐘時，屢次攪

動過淋布，漫調至冷爲度。

又方 煉豬油九兩 辨佐匿酒一兩 先將豬油入燙鍋鎔化，再加辨佐

匿酒調勻，俟酒味出盡，漫攪至冷爲度。

石長生

ADIANTEUM.

一名鳳尾草

此藥出美國、英國、及中華山西等處。

功用 化痰 治久咳嗽 作糖服

長生糖 製法 石長生一分沸水十分泡一天過淋紙加煉白糖十九分化

勻爲度 每服一二打拉門

伊打

一名

礦強伊打 又名以脫化名 見純伊打

此藥由礦強水與濃酒蒸出，乃無色流質，味辛而甜，別具一種氣息，露置則化汽飛去。每百分中計有純伊打 即炭輕+鹽九十二分

化法 水十分濃酒全化

功用 大行氣 化痰 審睡 解轉筋 去風

主治 氣促 胃氣痛 肚腸痙攣 傷食風 嘔吐 經疼

功用 配油膏類如鉛礦鋸油膏等，此較煉豬油尤耐久存。

伊打

服法 每服二十至四十林士，多加水冲服。
內服常用者即伊打酒或伊打製酒。

酒

製法

伊打

一分濃酒二分和勻爲度。每服三十至六十林士，加水

冲服。

伊打

製酒

製法

礦強水

六十兩

濃酒

四十兩

將強水漸加酒內調勻，候一天入玻

甌蒸出。

待甌內之酒畧變黑色爲止。

將所蒸之酒入玻瓶，加石灰水一

半撞勻，穩定分兩層。

用酒撤抒出上層，傾於盆內，露空氣六個時辰爲

止。

將此藥即伊打油三打拉門，與伊打入兩濃酒十六兩，和勻爲度。

每服三十至一百二十林士。

美國方

伊打

三十分

濃酒

六十分

伊打油

三分

和勻爲度。

服法同上。

打油

此油從礦強水與濃酒蒸出。

化法

濃酒

伊打全化

水微

化

配伊打製酒，便用。

純伊打

化名

OLEUM ETHERIUM.

伊

SPIRITUS ETHERIUM.

製法 伊打四十 汽水二十 共入玻璃瓶撞勻。俟伊打與水分開，用酒撤將上面伊打掄出，另加水二十分，如前法將伊打洗淨掄出，入玻璃瓶內，加枯鉢綠四分 新石灰粉一分，令瓶嘴與受氣瓶相接，候一天加文火蒸回爲度。

外用 蒙藥 嗅之令人昏迷，不覺疼痛，西醫割治症常用之。

醋酸伊打

ETHER ACETICUS.

化名 炭輕養 即炭輕炭輕養

此藥自濃酒與濃醋酸或醋酸油 及礦強水蒸出，無色流質，別具一種氣息，化法 濃酒 伊打全化 水九分化一分

功用 行氣 解轉筋 去風

服法 每服二十至六十林士

外用 治風濕疼

甜硝伊打

ETHERIS NITROSI SRI

又名 硝養伊打酒 化名 炭輕淡養土酒

此藥由硝強水與礦強水、紅銅絲及濃酒蒸出後加酒者色白臭香味
辛而甜氣息如伊打遇火卽焚兼能化汽飛盡每百分中計酒硝發伊打
即淡輕淡黃五分

功用 行氣 發表 利小便 解熱

主治 眩症 頭風 患各樣熱症服之畧解

服法 每服半至二打拉門 治小兒身熱用此酒一分大黃香糖二分
和勻每服一打拉門最妙

反藥 鉛礦 磷強鐵 反酸炭養類 圭厄禁酒 架泐酸 炭匿酸
硝伊打製酒製法 甜硝伊打一兩草烏頭酒八林 和勻爲度 功能解

熱 每服半至一打拉門加水沖服

鹽強伊

ETHERIS MURIATICUS.
SPIRITUS.

SPIRITUS ETHERIS
NITROSI COMPOSITIUS.

甜

打酒化名炭輕綠土酒

此藥由鹽強水與濃酒蒸出後加酒者味辛而甜氣息如伊打

功用 與甜硝伊打同

臭椿又名

ATLANTUS

此藥出中國印度等處入藥用樹根皮

藥肆所存係此樹皮非純根皮也

臭椿

服法 每服半至一打拉門

功用 開胃 收斂 級蟲

服法 每服五至十林士

樗泡水製法臭樗根皮一分沸水二十分泡兩點鐘濾渣爲度 每服一二兩

臭

INFUSUM ATLANTHI.

INFUSUM ATLANTHI. 製法臭樗鮮根皮汁三分濃酒一分和勻候七天過淋紙爲度

宜存陰涼處 每服二三打拉門

蒜頭又名

ALLIUM

此藥各國皆有味辛而熱其臭刺鼻

蒜頭

功用 化痰 開胃

外用 吊炎

頭敷藥製法

蒜頭使用 入白搗爛爲度 敷患處治肚疼胃疼

蒜

SYRUPUS ALII.

頭糖 製法蒜頭四兩醋十二兩浸半天濾渣加白糖一斤煙熱令化過布

爲度 治嬰兒咳嗽 每服半至一小酒杯

啞囉

又名
ALOE.

鴉囉 一名洋沉香 又名番蘆薈

此藥出索哥德拉及巴巴豆好望角等處類分三種用則相同近來恒用者推索哥德拉所產爲上品共函一精即啞囉咽入藥取該樹葉內之汁焙乾爲團狀如蘆薈色黑味苦遇熱則軟遇寒則硬

功用

瀉劑

專治大腸

殺蟲

調經

開胃

動膽汁

服法

見下各種啞囉

主治

經脈不調 腸膜核疳 經閉便燥 飯不消化

外用

作射水兼能助瀉殺蟲

煉啞囉

又名
淨啞囉

煉法

啞囉二十分各研皆可

濃酒

三分

先將啞囉入燙鍋鎔化加酒和勻再用

ALOE PURIFICATA.

極細羅，沸水泡濕，將啞囉過淨，入燙鍋散氣，漫調和，候提出成絲，擊之有堅脆性，去火候涼，搗塊爲度，玻塞瓶存貯。

服法 每服一至五林士。

啞囉烟 即ALOIN.

啞囉精 化名炭輕養。

此藥自啞囉提出，結珠，色淡黃，味先甜，後極苦。

化法 凉水四百分之一分濃酒七十分之一分沸水 沸酒 鍊養水 鍊養水皆易化。

伊打微化。

功用 漁劑 與啞囉同，而力較勝。

服法 每服半至二林士。

巴巴豆啞囉

ALOE BARBADENSIS.

此藥出巴巴豆海島，色紅棕，味苦，悶，研末色黃而綠。

化法 水化四分之三不化盡，濃酒全化。

功用 開胃 濁劑 濁力大於索哥德拉

服法 每服二至四林土。

射水 製法 巴巴豆啞囉

四十林士 或用索哥德啞囉亦可

炭養銥

十五林士

粉子漿十兩 共和勻

爲度 作一次射之 治經脈不調之便秘 大腸生蟲

豆啞囉膏 製法 巴巴豆啞囉

一斤碎屑沸汽水一桶調極勻浸十二點鐘自

化後將上面淨水抒出餘者過布濾渣共入燙鍋散氣成膏爲度 每

服一至三林土 啞囉每百分能出膏七十五分

豆啞囉丸 製法 巴巴豆啞囉

八分研末胰子四分

胡荽油半分玫瑰糕四分

共和勻作丸爲度 每服五至十林土

啞囉丸 製法 巴巴豆啞囉

二分研末礞強鐵一分肉桂製散三分玫瑰糕六分

共和勻作丸爲度 每服五至十林土

啞囉甘草丸 製法 巴巴豆啞囉

四兩水化濾渣再加甘草膏四兩糖膠四

PILULA ALOES BARBA-DENSIS.

PILULA ALOES BARBA-DENSIS.

PILULA ALOES BARBA-DENSIS.

EXTRACTUM ALOES BARBADENSIS.

ENEMA ALOES.

啞囉

啞

兩 白胰子 四兩 切片 共入燙鍋散氣成膏形爲度 每服三四林士 治飯

不消化

索哥德拉

ALOE SOCOTRINA.

啞囉

此藥出索哥德拉海島色紅棕而黃味苦臭香

研末色
濃黃

化法 水化半倍 淡酒全化

功用 瀉劑 因滻力緩常與他藥同服調經

服法 每服二至六林士

啞囉

製煮水

製法

索哥德拉啞囉膏

熟末

沒藥半分

番紅花半分

炭養鉢

半分

甘草膏

半分

分 甘草膏 四分 或用甘草流膏十分

草豆蔻製酒

三十

汽水

酌用

先將啞囉膏

沒藥和

炭養鉢 甘草膏 共入有蓋鍋內加汽水四十分漫火煮五分鐘去火加番紅花候冷加草豆蔻製酒蓋嚴浸兩點鐘過呢布再加汽水漂淋足

百分爲度 功能解酸輕瀉滋補 每服半至二兩 每兩內計有啞囉膏四林士有奇

EXTRACTUM ALOES 3000.
TRINNE.

索哥

德拉啞囉膏製法索哥德拉啞囉碎屑沸汽水一桶調極勻浸十二點鐘自化後將上面淨水抒出餘者過布濾渣共入燙鍋散氣成膏爲度。

每服一至三林土。

索哥

德拉啞囉丸製法索哥德拉啞囉

八分研末胰子四分研末肉豆蔻油半分

玫瑰

糕四分共和勻作丸爲度每服五至十林土。

阿魏丸製法索哥德拉啞囉

一分研末阿魏一分研末胰子一分研末玫瑰糕一分或少角研末共

和勻作丸爲度每服五至十林土輕瀉

解轉筋

沒藥丸製法索哥德拉啞囉

二分研末沒藥一分研末番紅花半分研末玫瑰糕一分或少角研末共

油酌用共和勻作丸爲度每服五至十林土調經用

PLUMA ALOES ET MYRRHAE.

啞囉

酒製法索哥德拉啞囉

一分粗末甘草膏三分淡酒酌用先用酒三十分共

浸七天間時搖動過淋紙再加酒足四十分爲度每服一二打拉門

葡萄製法索哥德拉啞囉

兩半粗末乾薑八十林十粗末草豆蔻八十林士獨碎白葡萄酒四十共

TINCTURA ALOES

啞囉

VINUM ALOES.

啞

浸七天過淋紙加酒仍足四十兩爲度。每服一二打拉門。治滯積。
嚙製酒 製法 索哥德拉啞嚙三分研末 龍膽草五分 **大黃** 五分研末 天竺乾薑五分
來番紅花五分淡酒一千先用酒七百五分研末浸兩天裝淋桶淋乾再加餘酒漂淋仍足千分爲度。功能治滯積。每服一二打拉門。

啞

嚙番木鼈丸 製法 索哥德拉啞嚙三林士研末 番木鼈膏一林共和勻作三丸
爲度。每服一丸。治久滯積。

啞

嚙大黃監文尼丸 製法 索哥德拉啞嚙一分大黃二分監文尼一分白
胰子酌用共研末和勻作丸爲度。每服三至五林士。治膽汁少。

輕

瀉丸 製法 啞嚙膏十六林士研末 簗黃四林士研末 渣笠八林士研末 哥羅新四林士研末 單綠汞四林士研末
白胰子四林士研末 薄荷油半林丁香油一林共和勻作八丸爲度。治腹痛。

滯積妙極。

望角啞

此藥出亞非利加好望角等處，與前二者相似，而功力較遜。

沉香

西名

AGALLOCHUM

此藥出印度、安南、波斯及廣東等處，入藥用木心，味畧苦臭，香

此藥古來
珍重，新舊

約所云蘆薈者，
非是乃沉香也。

阿迦噓香

蘆薈

又名

ALOE CHINENSIS

象膽

功用 可代拉彎大赤檀等，取其色麗

此藥即一種樹所流之汁結成者，色黑味苦，形似啞囉。

功用 開胃 殺蟲

西醫不入藥用

服法 每服十至三十林士。

鉢

又名

ALUMINIUM

此原質色白，體堅於銀，輕於玻，爲白礮之底，按五色石脂及高嶺土俱函鉢養玻養等。

鉢

又名

鉢綠冰

化名 鉢綠輕養

CHLORALUM.

此藥從礦強鉢與鉻綠製成，但非純鉢綠，內函雜質。

功用 解毒氣。

綠水 此卽鉢綠冰在水內化治者。

功用 同上。

溴鉢綠

BROMO CHLORALUM.

此藥從溴質與鉢綠水製成，無色無臭。

功用 同上 氣力較大。

高嶺土

KAOLIN.

此藥出中國江西省，色白無臭無味，屬鉢類雜質，內有鉢養玻養等。

外用 治皮類病。

作摸粉，或
作油膏用。

高

嶺土油膏 製法 高嶺土 一分 花士玲 一分 硬把拉紛 一分 先將二油消

化再加高嶺土調至冷爲度 治皮類病

五色石
脂一名五色符

此類內函釁養鎂、養玻養等，雖有數樣，所函者不甚相遠。

石

LITHOMARGYRUM
TERRA FULLONICA.

脂粉 此粉或用五色石脂，或用高嶺土研極細末，用水飛淨，晒乾而得。治皮膚破損，或紅熱溼淫，用絹袋盛之，撲於患處。

礦強鉄釁

又名明礬化名釁、礦養、鉄礦養、輕養

此藥自礬石煉成，色白透光，味甜而滑，後則畧酸。

化法

冷水一分化一分沸水一分化三分甘油三分化一分濃淡酒皆不化。

功用 收斂 吐劑 解血中鉛毒

主治 血癆 久痢疾 消渴尿變甜 內腎血出 嘔吐痰涎

服法 每服十至二十林土，日三次蜜水調服。治內部血出及解鉛毒，宜用十至十五林土。吐劑用二至四打拉門，治小兒哮暎，每服

一打拉門加蜂蜜和服以吐爲愈。治小兒哮喘癥，每服二至十林士。
按小兒大小酌加可也。 治嘔吐痰涎，每服十林士，加雙葡酸銨士，薑末三林，和勻，日三次服之。

外用 收斂 止血 治咽喉類病 白帶 白濁

甘油

製法

白礬

研末一分

甘油

五分

入磁鍋文火鎔化候涼傾出清油爲度。

白礬

CATAPLASM ALUMINIS,
GLYCERINUM ALUMINIS,

白礬敷藥一百八十林士，雞蛋青二枚，調勻爲度，敷眼胞上，治火眼最效。亦治凍瘡、損傷。

白礬漱水

製法

玫瑰花

一百八十林士搗碎

淡礦鹽水

三打門

汽水

十兩

共入瓶內，加熱

不過一百度，浸兩點鐘，過布足八兩爲止，再將白礬一百二十林士，白糖四十林士，濃酒四打拉門，共入前八兩水內消化爲度，用時加水一倍漱之，治喉痙。此水能久存。

GARGARESMA ALUMINIS

又方 白礬 林士 蜂蜜 二打門 水 六兩 共化勻爲度 仰漱 治喉鬆

又方 白礬 六十 沒藥酒 半打門 水 四兩 共化勻爲度 漱咽喉用

又方 白礬 一分沸水 一分消化爲度 治嘎喉

礬鹽汁

製法

白礬 一百二十 牛糞 二十 共入鍋熬至凝塊過布留汁爲度

每服一二兩 服白礬此法甚便

礬射水 製法 白礬 六十 水 二十 化勻爲度 水節射之治白濁 白帶

礬洗水 製法 白礬 二至六 水 一兩 化勻爲度 治膿火眼

礬兒茶陰尖丸 製法 白礬 十五 林兒茶 十五 林得波麻油足作一丸 治白帶

釩礦養鉢礦養

製法 白礬 便用 入磁鍋鎔化加熱不過四百度 煅枯研末爲度

得百分計
得枯礬五分

十四 分 存玻璃塞瓶 露天氣便潮

外用 丹類 去菌肉 治口瘡

ALUMEN EXSICCATUM.
PESSUS ALUMINIS CUM
CATECHU.

INJECTIO ALUMINIS.
LOTIO ALUMINIS.

SERUM ALUMINATUM

白

白

白

白

白

白

白

白

白

化名

枯白礬

化名

阿摩尼亞

ALUMEN [AMMONIA].

白礦

一名礦強阿摩尼亞鉢化名鉢礦養輕淡礦養輕養此藥自礦強阿摩尼亞與礦強鉢製出狀如白礦西國常用之

功用 服法 皆與白礦同

鐵礦

又名

FERRO-ALUMEN.

阿摩尼亞鐵礦

化名鐵輕淡礦養輕養此藥與白礦同類乃鐵質代鉢與阿摩尼亞或鐵質化合者結冰色淺藍

味酸而濁

化法

冷水三分化沸水四分化

功用 與白礦畧同而收斂之力倍之

服法 每服五至十林士

化名鉢輕養

ALUMINII HYDRAS.

製法 白礦十一炭養鑪十分即汽水酌用先用汽水一百五十分化白礦過淋紙入鍋加火至沸又用汽水一百五十分化炭養鑪過淋紙入大

鍋加火至沸，漸加熱白礬水頻調，再加沸汽水百分待澄清，抒出上面淨水留渣，用沸汽水二百分洗渣，仍抒出上面淨水，將渣裝入藥漏過汽水洗。至研洗水加鉛綠試驗不變濁為度候水漏盡，加熱不過一百零四度，烤乾研末為度，此藥結散色白，無臭無味，水酒皆不化。

功用 解酸 除溼 與鍊養同 治滯積 肚瀉

服法 每服三至六林士外用同鍊養。

火絨西名

此卽一種木耳晒乾，狀如絨易燃，故名。

功用 作貼膏 治雞眼 腫子等。

阿麼慝一名

此藥出波斯、印度等處，係樹膠凝結而成，色紅黃，剖開則白，味苦而辛，別具一種氣息，手捻之漸軟如蠟，用水調和，恍同牛蠶。

化法 濃酒水 化五分之四 伊打 醋均化少許

功用 行氣 化痰 解轉筋

主治 久頭風 氣管痰 氣喘

服法 每服十至二十林士

阿麼 恩汞貼膏

見下汞類篇

EMPLASTRUM AMMONIAE.
GELIUM HYDROARGYREI

阿麼

恩勸水 製法 阿麼恩 半分粗末水 入白漸加水研勻過布濾渣爲度

每服半至一兩

用土圭盧酒十五林士或阿摩尼亞莫酒十五林士和服均可

阿麼恩製勸水

製法 阿麼恩勸水

七打拉門 鴉片樟腦酒

半打拉門 土圭盧醋酸蜜

半打拉門 共和勸作一服 治癆病咳嗽

阿麼恩衣必格勸水 製法 阿麼恩勸水 半兩 衣必格葡萄酒 十林 路卑利伊

打酒 十林 水 足一兩 共和勸作一服 治癆痰

MISTURA AMMONIAE.
IPECACUANHA.

MISTURA AMMONIAE.
COMPOSITA.

阿

阿摩尼亞

化名輕淡

此物無自然生成者，製造亦難，並不易存，乃藍色流質也，雖非原質，卻屬底類，與酸類能化合成鹽類，如原質然。

阿摩尼亞

AMMONIA
TINCTURE LIQUOR FOR
TIOR.

氣化名輕淡

濃阿摩尼

此氣無色，嗅之刺鼻，化於水內，則成阿摩尼亞水，水一分能壓此氣七百分

亞水又名濃輕淡水，化名輕淡土水

此藥自阿摩尼亞綠與熟石灰及汽水煉出，乃無色流質，別具氣息，嗅之刺鼻，此水每百分計阿摩尼亞氣三十二分半

功用 配淡阿摩尼亞水與酒等。

外用 作丹類 或與別物作搽藥類。

摩尼亞製酒

製法 濃阿摩尼亞水二十兩 洋乳香一百二十林士 濃酒九打拉門 拉彎大

油十四林士 共和勻爲度，每服五至十林士，多加水沖服，功能行氣。

解轉筋

阿

摩尼亞洗髮水

製法

濃阿摩尼亞水一兩

洋杏仁油一兩

迷迭香酒四

兩

兩

迷迭香酒四

四

LICQUOR AMMONIÆ
CRINALIS.

淡阿摩尼亞

亞水

又名 淡輕淡水

製法 濃阿摩尼亞水一分汽水二分和勻爲度。

每百分秤計兩阿摩尼亞氣十分。

功用 行氣 解酸 解轉筋 提神

服法 每服十至二十林士多加水沖服。

外用 領皮熱 止疼 抹患處治蜂螯蛇咬 嗅之能解昏倒

反藥 酸類 酸鹽類

尼亞搽油

製法

淡阿摩尼亞水一分

洋橄油

三分

或

香油

亦可

擰勻爲度

治風

濕疹

阿摩尼亞

LINIMENTUM AMMONIÆ

阿摩尼亞

SPIRITUS AMMONIÆ FER.
TIDIUS.

臭酒

又名 輕淡臭酒

製法 濃阿摩尼亞水二分 阿魏一分半 濃酒酌用 先用酒十五分浸阿魏

碎屑

濃酒 酌用

先用酒十五分浸阿魏

一天入甌蒸出加濃阿摩尼亞水再加酒足二十分爲度

功用 行氣 解轉筋 治老人氣喘 久頭風

服法 每服半至一打拉門 加阿摩尼亞水和服更妙

反藥 酸類 酸鹽類

此類多帶酸故名

摩尼亞水又名輕淡醋水化名輕淡炭輕養土水

AMMONII ACETATIS
LIQUOR FORTEOR.

製法 炭養阿摩尼亞十五分半或酌用

濃醋酸

五十分汽水 酌用

先將炭養阿摩尼亞研末漸入濃醋酸內至令變性以不酸亦不反酸爲止

用小玻筒盛少許溫之再用試紙驗之至立性再加汽水足六十分爲度

此藥乃醋酸阿摩尼亞在水內化者無色味鹹而涼

功用 發表 解熱 生津液

主治 經痛 熱症類 痘症

服法 每服二十至六十林士加水冲服。

反藥 酸類 錫養 鎗養 炭養錫 炭養鎗 石灰水 鉛鹽類

銀鹽類

淡醋

Liquor AMMONII ACETATIS
AMMONII ACETATIS LIQUOR

酸阿摩尼亞水 製法 濃醋酸阿摩尼亞水一分汽水足五分和勻爲度者濃易存淡者便 每服二至六打拉門外用治火眼加水十倍洗之或加淡酒

一倍洗身過熱亦可。

酸阿摩尼亞製水

製法 淡醋酸阿摩尼亞水二打門炭養阿摩尼亞八林

檸檬汁二打拉門或金紫汁亦可 水糖一打拉門

樟腦汽水半兩 汽水足四共和極勻爲度

每服一兩日二三次 治熱症

摩尼亞化名輕淡炭輕養

辨佐匿阿
AMMONII BENZOAS

製法 淡阿摩尼亞水三分或酌用 辨佐匿酸二分 汽水四分 先將汽水與淡阿摩尼亞水三分化辨佐匿酸入燙鍋用文火散氣片時間用試紙驗之若見酸性漸加阿摩尼亞水

許令其
變反酸

去火放陰涼處候其結冰取出爲度。

此藥結冰色白味苦鹹而辛。

化法 水五分化一分濃酒二十二分一分甘油八分化一分

功用 利小便 與辨佐匿酸同。

主治 酒風脚爲其能解血中之酸 痴症 白淋 便濁。

服法 每服十至二十林士多加水沖服。

反藥 上鐵鹽類 錫養水 酸類。

溴化名輕淡溴

阿摩尼亞

AMMONIUM BROMIDE

此藥自溴輕酸與阿摩尼亞水製出結冰無色過光研細爲白色之散，味鹹而辛。

化法 水三分化二分濃酒十五分一分

功用 補腦 解轉筋。

主治 婦女鬱病 驚悸不寐 腦氣筋疼 頭疼 哮癆癥 羊癇
風 解癬癬之癩癩

服法 每服五至二十林士 治小兒哮癆癥 每服一至五林士 日三次 加水沖服

反藥 強水類 強水鹽類 甜硝伊打酒

摩尼亞溴冰糖 製法 按冰糖公法製出 每塊中宜有阿摩尼亞溴二林士 每服一至三塊

治小兒哮癆癥

TROCHISCI AMMONII BRO
MIDI.

GARGARISMA AMMONII
BROMIDI

阿
摩尼亞溴漱水

製法 阿摩尼亞溴五林水 一兩化勻爲度 治咽喉類病

尼亞

又名 氣砂

化名 輕淡炭養

舊名 輕淡養

古法從鹿角製出 結冰色白過光味辛

此藥自阿摩尼亞綠與火石粉升煉而成

古法從鹿角製出 結冰色白過光味辛

嗅之與阿摩尼亞氣同

化法 水 四分化一分 酒 二百分化一分 甘油 五分化一分

功用解酸行氣發表化痰佐衣必格同服治新氣管痰最效
服法每服三至十林士加樟腦水少許易服若過服至三十林士使人嘔吐外用開關通竅

阿摩
SPIRITUS AMMONIAE
AROMATICUS.

反藥 酸類 酸鹽類 土鹽類 石灰水

尼亞香酒

製法

炭養阿摩尼亞四兩濃阿摩尼亞水八兩肉豆蔻蒸油

四打拉
門半

檳榔油

六打拉
門半

濃酒

一百二十兩

汽水

六十兩

先將油酒水入瓶蒸出一百四

十兩另存又重蒸九兩和二

阿摩尼亞同入一

玻璃瓶

約略二十
熱不過一百四十度

漸次搖動至消化爲止候

涼用透濕棉花

繩扎緊用溫水燙之

熱不過一百四十度

塞瓶口以

過淋再將前留之一百四十兩陸續加入調勻爲度

一百六十兩

每服二

十至六十林士能提神

治頭疼加哥羅方製酒更妙

摩尼亞香鹽

製法

丁香油

半打

拉

灣大油

一打

伯格莫油

二打拉

濃阿摩

尼亞水十兩化勻爲止用時將炭養阿摩尼亞粗細末各一半裝滿小

門半

阿摩尼亞水

十兩

化勻爲止用時將炭養阿摩尼亞粗細末各一半裝滿小

門半

阿摩尼亞水

十兩

化勻爲

瓶，再加前化勻之藥，以不能食爲度。此藥能開關通竅，西國婦人常用之，解憂悶昏倒。

阿摩尼亞

綠中名矗砂
化名輕淡綠

此藥製法不一，古人自駝糞升煉而出，今有自蒸煤氣餘水，或蒸鹽水與礦強水及食鹽製出升煉者，又有自鹽強阿摩尼亞二水製出者，結冰色白無臭，半過光，味鹹而辛，其形有一二種成塊，剖開紋理多直，一種如砂，功力則同。

化法 水三分化一分濃酒五十五分化一分

功用 化痰 動膽汁 調經 發表 利小便 改病

主治 久氣管痰 咳嗽 風濕 眩症 吸核變大 面部腦筋痛
服法 每服五至二十林士，治吸核變大，每服十至三十林士，加水半杯，日三次服之。治眩症及面部腦筋痛，每服二三十林士，日三次。

肝體發炎結膿時服之亦可。

外用 化瘤 治瘊子與雞眼等症，用此藥搽患處。

反藥 反酸類 反酸炭養類 鉛鹽類 銀鹽類

摩尼亞綠勻水 製法 阿摩尼亞綠十五林士 檸檬酒四十五林士 哥羅方酒十林水

兩半一化勻爲度，作一服治癩癩。

摩尼亞綠洗水 製法 阿摩尼亞綠一兩濃酒一兩水十兩化勻爲度

洗跌打傷等症，或加礬醋少許亦可。

摩尼亞綠冰糖 製法 按冰糖公法製成，每塊中計有阿摩尼亞綠二三林士，每服一三塊，治療癩

摩尼亞綠製水 製法 阿摩尼亞綠一兩甘草製勻水八兩化勻爲度

每服一二打拉門，治癩癩最妙。

LIQUOR AMMONII CHLO-

RIDI COMPOSITUS.

TROCHISCI AMMONII CHLORIDI.

HASTUS AMMONII CHLORIDI.

阿

阿

阿

又方 磨砂一兩 甘草二兩水二斤 先用水熬甘草剩一斤去渣，再加
磨砂，化勻爲度。每服一小酒杯。

濃檸酸阿

AMMONII CITRATIS LI.
QUOR FORTIOR.

摩尼亞水 化名輕淡炭輕養土水

製法濃阿摩尼亞水十分或酌用

一分研末

汽水酌用

先將檸檬酸加入濃

阿摩尼亞水直至變性既不酸亦不反酸爲止宣用試紙驗之再加汽水足二十

四分爲度

此藥乃檸酸阿摩尼亞在水內化者無色味鹹

功用解熱發表

服法 每服三十至九十林士加水沖服

酸阿摩尼亞水

製法

濃檸酸阿摩尼亞水

十分

汽水四分

和勻爲度

每服一至六打拉門

阿摩尼

AMMONII IODIDUM.

亞碘 化名輕淡碘

此藥自礦強阿摩尼亞與銨碘製成結冰色先白後黃而棕味鹹而辛
若棕色深
不宜用

化法 水三分化濃酒三分化甘油四分化

四分一分

三分

功用 改病 與銻碘同而力倍之。

服法 每服二至五林士日三次服之。

阿摩尼亞碘油膏 製法 阿摩尼亞碘一百二十林士 煉豬油一兩調勻爲度

治皮類病。

AMMONII NITRAS.
UNGUEUM AMMONII
TODDI.

硝強阿摩

尼亞 化名輕淡淡養 舊名輕淡養淡養

此藥自阿摩尼亞硝強二水製成結冰成塊色白味苦而辛

化法 水三分化濃酒十四分

一分

功用 祇配喜氣 即淡養氣見淡氣類 他無所用

尼亞 化名輕淡輕燐養 舊名輕淡養燐養

此藥自淡燐強酸與阿摩尼亞水製成結冰無色過光味鹹露天氣即發潮而不過光

AMMONII PHOSPHAS.

燐強阿摩

化法 水二分化一分濃酒不化。

功用 發表 散瘤 解尿酸。

主治 酒風脚 風濕 秋石淋等症。

服法 每服五至二十林士，日三次水服。

下燐養 阿摩尼亞

AMMONII HYDROPHOS.
PHIS.

此藥結冰色白，不過光，味惡而鹹。

功用 補腦 與燐藥類同。

服法 每服一至六林士。

甘松阿 摩尼亞 化名輕淡炭輕養

此藥自阿摩尼亞綠與甘松酸及熟石灰製成，結冰色白，半過光，味甜而濬，嗅之如甘松酸。

功用 提神 治腦氣筋疼 療類病。

洋杏仁

西名

AMYGDALA.

阿門子

此藥分甜苦二種，俱含油質，惟苦者內有毒，不可過服。

功用 潤劑 化痰 治癩癩類病。

洋甜杏仁

MISTURA AMYGDALAE.

約但阿門子

此藥出西班牙等處，狀如土杏仁而甜美殊勝。

功用 潤劑 治癩癩類病。

甜杏

MISTURA AMYGDALAE.

仁勻水又名杏仁茶 製法 甜杏仁製散一分 汽水八分 先將散入臼，加水少許研勻如漿，再漸加餘水研勻，過布濾渣爲度。每服一二兩，治欬嗽用。

甜杏

PULVIS AMYGDALAE COMPOSITUS.

仁製散製法 甜杏仁八分 煉白糖四分 白樹膠一分 先用開水泡去杏仁皮，以軟布摸乾，入臼研爲泥糊，再將白糖、樹膠研勻，共入臼搗勻，過

洋杏

粗羅爲度，每服六十至一百二十林士。

仁油 製法 此油從苦杏仁或甜杏仁榨出者，苦者雖毒，經
榨則不毒矣。此油無色味甜無

苦者雖毒經
權則不毒矣

味甜無

洋

臭化法伊打化二分半哥羅方全化濃酒微化每服二至四打拉門
杏仁製白水製法杏仁油一兩白樹膠漿半兩白糖一百一十五克汽水六兩共
研勻爲度每服一兩治癩癩

白砂糖十林士治水

洋苦杏仁

西名苦阿門子

此藥出亞非利加之摩勒哥地，狀如土杏仁，味苦而力較勝。

杏仁勻水 製法與甜杏仁勻水同 每服半兩至兩半。治癩癩。此

藥有毒不宜過服，外用作洗水治皮膚癩癬。

杏仁製散 製法 與甜杏仁製散同 每服三十至六十林士

二十至六十林士

杏仁油 製法 此油自苦杏仁蒸出，質流而色黃，別具氣臭。化法 濃酒

此油自苦杏仁蒸出，質流而色黃，別具氣臭。化法濃酒

化法濃酒

OLFUM AMYGNALE
RÆ

伊打同化 水微化，此油甚毒，因內函輕炭淡酸少許，而功力畧同。

每服一林士四分之一。

苦

杏仁汽水

製法 苦杏仁油

林士

炭養鎂

六十

汽水

三

兩

先將油與炭養

AQUA AMYGDALÆ AMA.
RÆ

鎂入臼研勻，再漸加水研勻，過淋紙爲度。

每服二至四打拉門。代

輕炭淡酸用。治癰癩。

苦杏仁油

製法 此油已將仁內之輕炭淡酸煉出，故無毒。

屬香類，可與難服之藥和服。

杏仁

又名

杏核仁

DRUPPE FRUINI ARMI.
AMYLOM.

此藥中國各處有之，內函油質，與洋杏仁油相似。

功用 化痰。與洋杏仁畧同。

小粉

一名

漿粉

此粉不一，有麥粉、包米粉、梗米及菉豆、小米等粉是也，粉異而用同。

功用 潤劑。外作撲粉，治皮類病。

分子

甘油

製法分子一分甘油五分汽水三分調勻入磁鍋加熱至二百四十度頻調至透亮爲度

GLYCERINUM IODATUM

分子

漿

製法分子一百二十林士汽水十兩和勻入鍋熬至成漿爲度作射水等用或用布縫入漿內泡透提出裹紮患處治骨斷折最效

香

粉

又名紫蘭粉此卽小粉研極細加艷色及香藥類製成者作撲

粉用

香如紫蘭故名

海碘粉

子又名藍碘粉

AMYLUM IODATUM

製法海碘五分

分子九分汽水酌用先將海碘入臼加汽水少許研勻漸加分子研至成黑藍團爲止後加熱不過一百零四度焙乾研細爲度功用改病與碘類藥同

服法 每服六十至一百二十林十 治蠟蚧瘡

洋茴香

ANETHUM

此藥出歐洲英國等處屬香味類入藥用子

功用 行氣 祛風 與土茴香同

主治 肚風 呃逆

服法 每服二三十林士

洋茴

AQUA ANETHI.

香汽水 製法 洋茴香一分
搗爛水二十分共入甑蒸出十分爲度 每服半至一兩

又方 洋茴香油三十林士炭養鎂六十林士汽水三十兩先將油鎂入白研勻漸加水研治過淋紙爲度

香油 製法 此油從洋茴香子按公法蒸出者化法濃酒伊打全化

每服一至四林士滴白糖內吞服

懷香

ANTISUM.

此藥出英法及中國之甘肅等處屬香藥類入藥用子

功用 行氣 祛風 化痰 治肚風 佐瀉樂同服能免其肚痛

服法 每服二三十林士

土茴

AQUA ANISI.

香汽水

製法

土茴香

一分

揭燭水

二十分

共入甑蒸出十分爲度

又方 土茴香油

三十林士

炭養鎊

六十林士

汽水

三十兩

先將油、鎊入臼研匀，漸

加水研治，過淋紙爲度。每服半至一兩。

美國方 見一卷汽水公法

土茴

OLEUM ANISI.

香油

製法此油自土茴香子，按公法蒸出。

化法濃酒

二分化一分

純酒全化

每服一至四林士，加白糖服。

八角子

ANTISEPTIC STELLATA

此藥出福建、廣西、與日本等處，屬香類，入藥用子。

功用 行氣 祛風

服法 每服三十至六十林士

大茴香

又名

OLEUM ANJUIC STELLATI.

大茴

ESSENTIA ANISI.

大茴

每服一至四林士，治肚疼。佐瀉劑同服，能免其肚疼。

香酒

製法

大茴香油一分濃酒四分化勻爲度。

每服十至二十林士。

治腹痛

茴香子酒

製法

大茴香子一分濃酒五分研末。

浸二天裝淋桶淋乾再加酒濃酒五分浸二天裝淋桶淋乾再加酒。

茴香子酒

研末

濃酒五分浸二天裝淋桶淋乾再加酒。

每服十五至三十林士。

TRINCUTA AMISI STELLATI.

小茴香

PENICULUM

甜茴香

此藥各國皆產屬香味類顆粒長圓面凸背平較土茴香洋茴香稍異。

功用 行氣 祛風 治小兒肚痛。

服法 每服十五至三十林士。

香汽水

製法

小茴香一分搗爛水二十分。

共入甑蒸出十分爲度。每服一二兩。

又方 小茴香油

半打

炭養鎌

六十

汽水

三十

先將油鎌入臼研勻再

AQUAE AQUAE.

小茴

漸加水調治過淋紙爲度。

美國方 見一卷汽水公法。

小茴香泡水

製法

小茴香

一百二十至一百八十林士 研末

沸水

十六兩

泡一刻鐘濾渣爲度。

每服半至二兩 治小兒肚疼。

作射水用亦可。

小茴香油

製法

此油自小茴香子按公法蒸出。

每服五至十五林士 加

白糖服 治腹疼。

西名 安替米司

此藥出英國美國等處屬香味類入藥用乾花味香而苦。

功用 补劑 開胃

作泡水或配膏服之。

主治 滯積 過服亦能令人嘔吐。

洋苦

製法

洋苦菊花

十六兩

洋苦菊花油

十五林士

汽水

一百六兩

先將菊花入

水熬至將半濾渣用絞盤絞之過淋紙入燙鍋散氣成膏爲止微熱時

加洋苦菊花油調勻爲度。每服二至十林士。

洋苦

INFUSUM ANTHEMIDIS

菊花泡水製法洋苦菊花半分沸汽水十分納有蓋器皿中泡一刻鐘濾渣爲度。每服一至三兩空心用治胃弱飯不消化。若服五至十兩卽能致人嘔吐。

洋苦

OLEUM ANTHEMIDIS.

菊花油製法此油從花內按公法蒸出化法濃酒三分化淡酒四分化水微化。每服一至四林士能行氣祛風佐他藥同服能免疼痛。

苦菊花

ANTHEMIS APICIFOLIA

功用 與洋苦菊花畧同而力較遜。

野菊花

MATRICARIA CHAMOMILLA
LA.

功用 補劑 開胃 香味不如洋苦菊花。

甘菊花

CHRYSANTHEMUM?

功用 按洋苦菊花法製成泡水洗火眼最妙。

錫

又名

錫質

一名
鐵

此原質色銀白與銕畧同而堅脆之性過之其顆粒方正外成花紋若加大熱則燒發光甚亮竝發白霧甚多與養氣綠氣硫磺等化合卽成錫養錫綠硫磺錫養矣

錫綠水

化名

錫綠上鹽強水

此藥乃煉黑錫在鹽強水內火化卽變爲錫綠於強水中也其色黃紅恒用以配錫養

功用 丹類 不可內服 加水可洗毒癰等症

解藥 解此毒者錫養 炭養鑪

錫養

化名

錫養

舊名
錫養

此藥自錫綠水與炭養鑪製出結散色灰而白

化法 水酒 硝強水皆不化 鹽強水易化 葡酸加熱水亦能化

ANTIMONIUM OXIDUM.

ANTIMONIUM CHLORIDI LA.
QUORUM.

功用 發表 力較葡萄酸銨錫稍遜

服法 每服一至三林士作丸服之

錫養

PULVIS ANTIMONIALIS

散 製法 錫養

一分 磔強鉢

二分 研勻爲度

每服二至六林士

發表

解熱用之

煉黑錫

一名

ANTIMONIUM NIGERUM
PURIFICATUM

黑錫礦 化名錫礦 舊名錫硫

此藥自生成之黑錫煉成，結散，色黑而灰，

功用 配硫磺錫養，錫綠水，硫磺輕氣等。

硫磺錫養

ANTIMONIUM SULPHURUM

TUM

化名 錫礦土 錫養 舊名錫硫錫養

此藥自煉黑錫與硫磺粉及鍾養礦強二水製成，結散，色如赤金，無臭無味。細覈此藥內，錫養之分數無定，雖有硫磺錫養及硫磺錫養降散，金色硫磺錫養等目，而功用則同。惟硫磺錫養之力較勝，慎勿過服。

化法 水不化 鍤養水 热鹽強水皆化

功用 改病 發表 吐劑 此藥入胃，殊不易化，惟胃中酸多者化

之尙易。

服法 每服一至五林士 佐單綠汞與圭厄禁爲丸 能解楊梅毒 並治楊梅皮類病 和閭羊花或謙落爲丸 治久風濕

葡酸銻錠

ANTIMONIUM TARTARICUM.

又名銻錠 葡吐藥

西名 呵呵伊蜜的

化名

銻錠

養炭

輕姜

舊名銻

錠

養鉀養果酸

此藥自錠養與雙葡酸銻製成 結冰無色過光 體有稜芒 味辛而濁悶
露空氣變爲白散 不過光

化法 冷水十五分化一分沸水二分化 淡酒畧化 濃酒不化

功用 發表 解炎 化痰 平脉 多服壓氣令吐 少服常服 則生津發汗而平脉

主治 肺體生炎 新氣脴癆 肺胞膜炎

服法 每服一林士十六分之一 至六分之一 平脉每服一林士六

分之一至一林士 吐劑每服一二林士

外用 作油膏引病外出見皮膚起斑點 卽宜小心勿致中其毒也

反藥 架泐酸 炭匿酸 反酸類 鉛鹽類 收斂泡水藥類如大黃金雞納

泡水等
是也

解藥 解此毒者用炭匿酸 兒茶 收斂草藥類

鉛錫油膏製法 葡酸鉛錫一分 白油膏四分 調勻爲度 鈞炎用之

鉛錫葡酒製法 葡酸鉛錫四十

細末

白葡萄酒二十兩

或黃酒亦可

消化過淋紙爲度

因酒不易化開再加酒足二十兩便可

每服五至三十林士 能發表治癰癩

二歲內小兒宜用二林士

洋朴硝二兩 磺強莫非糖一林士半

半

酸鉛錫朴硝勻水製法

葡萄酸鉛錫二林士半

洋朴硝二兩

磺強莫非糖一林士半

磺強香酸三十

汽水十兩 青藜蘆酒九十林士或

草烏頭酒亦可

水糖二兩 或共化勻爲度

每服二至四打拉門 受傷者服此藥可解熱解炎亦令安睡

甜水化名見汽水

AQUA.
即

MISTURA ANTIMONIO.
SALINA.

VINUM ANTIMONIALE.
TARTARATE.

水

萬國藥方

卷三

九十五

入藥須用極淨甜水過淋方妥，或用雪水冰水，雨水亦佳。配久存之藥，必須汽水。

冷水

AQUA FRIGIDA

功用解熱平脉。凡患熱症，皆可飲之。
外用止血消炎。沐浴退熱。

沸水

AQUA PERVENS.

功用發表。

外用行氣運血。沐浴發汗。

熱氣此卽沸水所發之氣。功能化痰。

蒸水化名輕養舊名輕養

製法淨水八斤入甌，先蒸出四兩不用，後以蒸至六斤爲度。

功用配藥水類，便用，易存。

汽水又名VAPOR AQUEUM

AQUA DESTILLATA.

冰

GLACIES

一名

凌

功用解熱解炎

主治咽喉類病 胃內皮生炎 大小腸內皮生炎 腸胞膜生炎

嘔吐不止

外用止血 消炎 治腦類病
裝紙皮袋用或猪尿泡亦可

當歸

ARALIA EDULIS.

此藥出四川陝西等處入藥用該草之根

功用開胃緩胃

當歸酒

製法當歸一分濃酒八分先用酒六分浸二天間時搖動裝淋箒

淋乾再加餘酒漂淋仍足八分爲度每服一二打拉門

檳榔子

ARECA

一名仁頻

此藥出中華印度等處入藥用該樹之子

TINCTURA ARALIAE

功用 收斂 殺蟲 治腹內蛔蟲

服法 每服半至一兩

外用 燒成炭研末作刷牙散

檳

榔膏

製法

此膏自檳榔子與蘇木、石灰等製出，後用荳葉包塊，中國南

省及日本人不時噙化以抵消閒。

銀

ARGENTUM.

又名

白銀

此原質爲最白之金，可抽爲絲，可打爲箔，其堅在金銅之間，在空氣中或燥或濕，養氣皆不能侵蝕，惟鎔化時能收養氣極多，待至冷結則又放出矣。配藥之銀
概用足色

銀丹

一名

硝強銀

西名

各息的化名

銀淡養

舊名

銀養淡養

ARGENTI MITRA

製法足色銀屑三兩 硝強水二兩 汽水五兩 共入玻瓶，加文火至銀消化，用酒揩拭出上面淨水去渣，入燙鍋散氣，候冷結冰取出，餘水仍入

燙鍋散氣候冷再結冰取出，將冰放玻璃溜內漏淨晾乾爲度。
此藥結冰片大而過光，色白，味苦而清。

化法 水二分一分化濃酒十八分一分化

功用 補劑 解轉筋

主治 羊癇風 霍亂 急心疼 多年胃疼嘔吐 胃癰

服法 每服一林士六分之一，至三分之一，加饅頭屑或高嶺土油膏爲丸，日三次服之。治胃癰，每服一林士。治肚腹熱症所生腸癰，每服一林士四分之一，至半林士。補腦，每服一林士六十分之一。按內服宜用淨者，但此藥不宜久服，恐使人面皮變黑難退，且服藥後若見牙齦生黑點，宜服雙鈎酸銻解之。

外用 爲丹錠 治一切傷毒 膿泡瘡 惡瘍 子宮癰肉 明角
罩潰爛。

反藥 反酸類 反酸炭養類 綠氣鹽類 鈸碘 信石鍼水 收

歛泡水類 除硝強醋酸二水外，餘強水皆不相合。

解藥 解此毒用食鹽水，解此丹誤染之色用該碘或炭淡跡加水洗之。

銀丹

錠

製法

銀丹片

九分五分

火硝

五分共入白金鍋內，亦可

轉磁鍋

加火化合入銀模爲錠。治瘡症用之。

淡銀

丹錠

又名硝強銻銀

製法

銀丹

一分火硝

二分共入白金鍋內，火化調

勻入銀模爲錠。治眼類病常用之。

此錠若配甚淡者可用火硝三四分。

丹射水

製法

銀丹

三四林士水

六兩化勻爲度。

射肛門內治肚腹熱症所生之腸癰。治障耳用銀丹五至十林士水一兩。

丹漱水

製法

銀丹

十林士水

一兩化勻爲度。

使絨探刷蘸點喉內漱之，治喉鬆。若治白疙瘩，宜倍加銀丹。

銀

丹洗水

製法

銀丹

二至四林士水

一兩化勻爲度。

治明角罩潰爛。口舌生瘡。外吹乳。若治凍瘡，可用銀丹六十林士水一兩。

GARGARISMA ARGENTI NITRATIS.

LOTIO ARGENTI NITRATIS.

銀養

化名

銀養西名銀養

此藥自銀丹與石灰水製出，結散色棕而黑。

化法 水不化 硝強水全化。

功用 收斂 治內部血出，

該藥力與硝強銀同，但非丹
類也。內服不使人面皮變黑。

服法 每服半至二林土，爲丸服之。

按此藥與銀氣類爲
九，宜防其烘擊之害。

阿莫賴夏

俗名馬蘿蔔

此藥出英美等國，狀似蘿蔔，續根而生，味甚辣，臭刺鼻，與中華所產有
別，功力較勝。

功用 行氣 開胃緩胃 生津液 利小便 酒、水均能提出功力，
主治 胃弱 滯積 久風濕 失音。

製酒

製法

辣菜鮮根

二十分

陳皮

二十分

肉豆蔻

半分

淡酒

一百六十分

水

六十共

入瓶，蒸出一百六十分爲度，每服一至三打拉門。

辣

根製泡水

製法

辣菜鮮根

一分切片

黑芥子

一分切片

辣根製酒

一分沸汽水

十二

INFUSUM ARMORACIÆ
COMPOSITUM.

分先用水將辣根，芥子浸兩點鐘，濾渣，再加辣根製酒和勻爲度。每

服一二兩 煙胃行氣用 治失音以此水漱之。

亞匿架俗名

ARNICA.

此草出歐洲之中及南方等處，花葉根皆入藥用。

功用 行氣 提神 痘見困憊狀者可服。

外用 運血 治跌打傷

配酒或擦酒用

解藥 解此毒用鴉片、莫非糖等。

亞匿架根

ARNICA RHIZOMA.

此用乾根配酒及擦酒流膏等。

亞匿

TINCTURA ARNICA.

架酒 製法 亞匿架根 一分細末 濃酒 二十分 先用酒十五分浸二天，間時搖動，裝淋箇淋乾，加餘酒漂淋，用絞盤絞渣，過淋紙，再加酒仍足二十分爲。

度，每服半至一打拉門外用加沸水一半和勻，浸麻絨布敷患處，治跌打傷。

亞匿架搽酒

製法 亞匿架酒五分、樟腦一分、白胰子四分、濃酒十分共入

燙鍋文火化勻，濾渣爲度。

匿架流膏

製法 亞匿架根細末淡酒酌用先用酒四十分潤末，按流膏

公法裝淋笛淋淨，先淋九十分另存餘者入燙鍋散氣，按公法製成一百分爲度。

亞匿架花

此用乾花配酒。

ARNICA FLORES.

匿架花酒

製法 亞匿架花六分、濃酒二十分、汽水四分、淡酒八分酌用先將濃

酒與水和勻，用少許泡花，搗碎實裝尖淋笛，加餘酒水過淋，再加淡酒漂淋，足三十二分爲度。每服十五至三十林士，與上同用。

TINCTURA ARNICA FLO.
RUM

LINIMENTUM ARNICA
EXTRACTUM ARNICA
LIQUIDUM.

亞匿架

ARNICÆ FOLIA

葉

此用乾葉配酒。

亞

TINCTURA ARNICÆ FOLIÆ
ORUM.

匿架葉酒 製法 亞匿架葉一分濃酒八分先用酒六分浸二天裝淋箇
淋乾再加餘酒漂淋仍足八分爲度。與上同用。

鍾

一名

靈

ARSENİUM.

此原質爲灰藍色之金如鋼而甚脆可研爲粉加熱不能鎔但化氣飛
散與養氣化合成爲極毒藥即信石。
見碘

靈碘

舊名鉀碘

化名

靈碘

ARSENİI IODIDUM

製法 信石六十海碘三百

林士

海碘 三百

林士

先將信石入臼研細再加海碘共研極細入

玻瓶畧塞口加火鎔化但鎔化之時宜將瓶底微歪漫漫旋轉方能化勻否則海碘聚於一處不能化盡傾於磁板上候涼

分作碎塊爲度。玻塞之瓶存貯。

此藥色黃而紅露氣則碘飛去。

化法 水三分濃酒一分加熱則化汽飛去

功用 解楊梅毒 治皮類病

服法 每服一林士三十份之一

靈礦

LIQUOR ARSENII ET HYDROARGYRI IODIDI.

汞碘入臼加水兩半研勻至將化盡過淋紙再加酒淋渣足十兩爲度每服十至三十林士治皮類病最良

雄黃

又名

信石汞水 製法 灵礦四十五林士 紅汞碘四十五林士 汽水 酥用先將靈礦

研末

水

酒

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

功用 補劑 開胃 配泡水用

蒿

INFUSUM ARTEMISIAE.

阿魏

ASAFOETIDA.

阿虛

此藥原產印度之阿弗干，取該樹之汁製成酒水，均能提出功力，色紅黃而白，味苦而辛，其臭頗烈。

功用 行氣 化痰 輕瀉 解轉筋

主治 肚風 鬱病 痰病類 癥癥 久氣管痰

服法 每服五至二十林士

阿魏

ENEMA ASAFOETIDA.

射水 製法 阿魏 三十 林士 汽水 四兩 先將阿魏入臼，漸加水研勻爲度。作

一次用去肚風。嬰兒抽搐亦可用。

阿魏

PIJULIA ASAFOETIDA.
COMPOSITA.

製丸 製法 阿魏 二分 加比農 二分 沒藥 二分 糖漿 一分 共入燙鍋調至化勻，作丸爲度。每服五至十林士。

或用此丸一半與大黃
製丸一半和服更妙

開鬱悶

阿魏

酒 製法 阿魏 一分 碎塊

濃酒 八分 先用酒六分浸七天間時搖動過淋紙加

TINCTURA ASTRACTYLOIDIS

酒仍足八分爲度 每服半至一打拉門 加阿摩尼亞香酒或白樹

膠漿調水和服更妙 加甘松酒、鬧羊花酒同服治鬱病之肚風

白朮

又名

ATRACTYLOIDES ALBA.

於朮

此藥出安徽浙江江蘇等處入藥用該草之根

功用 開胃緩胃 行氣 利小便

服法 每服半至一打拉門

白朮酒

製法 白朮一分濃酒八分先用酒六分浸二天間時搖動裝淋筒淋

TINCTURA ATRACTYLO-

DIS

乾加餘酒漂淋過淋紙再加酒仍足八分爲度 每服半至一打拉門

蒼朮

又名

ATRACTYLODES RUBRA

赤朮

此藥出湖北山東江蘇等處入藥用根

功用 與白朮相同

木香又名

AUKLANDIA COSTUS.

南木香

此藥出廣東西藏印度及敘利亞等處入藥用根

功用 開胃暖胃 行氣外用免虫蛀

木香酒

製法 木香一分研末濃酒八分先用酒六分浸二天裝淋筒淋乾加餘

酒漂淋過淋紙再加酒仍足八分爲度 每服半至一打拉門

苦橘皮

AURANTII CORTEX.

此藥出法國西班牙國與中國南方等處入藥用該藥之皮鮮乾皆可

功用 溫補 祛風 開胃暖胃 配他藥用味甚適口

鮮苦陳皮

TINGUTA AURANTII RE
GENTIS.

此鮮皮配酒油等用

鮮陳皮

TINGUTA AURANTII RE
GENTIS.

製法 鮮苦陳皮六分切片濃酒酌用先用酒十八分浸七天間時搖動濾渣絞乾過淋紙再加酒足二十分爲度每服一二打拉門此酒

與淡強水類，金雞衲類同服甚宜。

陳皮

VINUM AURANTII.

釀酒

又名陳酒。製法：此酒自鮮苦陳皮及白糖清酒按製黃酒法釀成。

每百分中計有酒
精十至十二分。與葡萄酒同用。

皮油

製法：用此油自鮮陳皮榨出，屬香味類，臭同陳皮。

化濃酒
分七

分一 純酒全化 每服一至五林士。與檸檬油同用。

乾苦陳皮

AUREUM AURANTII CORTEX DESICCATA.

此乾皮配酒、糖、泡水等用，按市肆所售者，恆有柑皮、橘皮、枸橘皮等類相雜，功力則同。

泡水

製法：

苦陳皮

切碎

沸水

二十

浸

一刻時

濾渣

爲度

每服

一二兩

製泡水

製法：

苦陳皮

半兩

鮮檸檬皮

一百一十二林士或

用鮮金棗皮亦可

丁香

五十

六林士

搗碎

沸水

二十

浸一刻時

濾渣

爲度

每服

一二兩

陳皮

SYRUPUS AURANTII.

糖

製法：

陳皮酒

一分

水糖

七分

化勻

爲度

每服

一二打拉門

陳皮

酒

乾苦陳皮

一分切絲淡酒十分浸七天間時搖動裝淋箒淋乾用絞

TINCTURA AURANTII

盤絞渣過淋紙再加酒仍足十分爲度每服一二打拉門

柑花汽水

AUEANTII FLORIS OUA'

橘花蒸者謂橘花
汽水與此無別

製法乾柑花

四十兩水十六斤共入甌蒸出八斤爲度

功用溫補配他藥常用

服法每服半至一兩與難服之藥同服能解其惡味

柑花

SYRUPUS AURANTII FLO.
RIS.

糖 製法 柑花汽水八分煉白糖四分汽水十六分先將汽水和白糖入鍋

化勻濾渣候微冷再加柑花汽水共調勻爲度

該有機五十四兩量七十二兩秤

每服一二

打拉門

花油

製法此油自鮮柑花蒸出屬香味類臭同柑花

化法濃酒純

酒全化

每服一至五林士與難服之藥同服能解其惡味

柑

花酒

製法柑花油一分濃酒九分化勻爲度配他藥取其味美

化法濃酒純

SPIRITUS AURANTII FLO.
RUM.OLEUM AURANTII FLO.
RUM.

功用 配金綠水、覈驗藥性，及照像用之。

雀麥粥
又名
葛麥粥
又名
粗麥粥

AZADIRACHTE CORTEX.

此麥出英國、美國及蒙古等處。
與蕎麥不同

功用 養生 費粥保養病人最宜。

棟根皮
又名
苦棟皮

AZADIRACHTE CORTEX.

此藥出中國、及印度等處，鮮乾根皮皆可用。

功用 收斂 殺蟲。

根煮水
製法
鮮棟根皮二兩水二兩入鍋熬至十兩爲度，每服半兩

根酒
製法
棟根皮二兩半淡酒一觔納有蓋器內浸七天，間時搖動，絞渣過淋紙，再加酒仍足一觔爲度，每服補劑半至二打拉門，殺蟲二至四打拉門。

苦棟子
又名
金鈴子

AZADIRACHTE FRUCTUS

此藥卽棟樹所結之子，色黃味苦。

功用 補劑 殺虫。

棟子酒

製法

苦棟子

一分
搗爛

濃酒

八分

先用酒六分浸二天，裝淋笛淋乾。

再加餘酒漂淋，仍足八分爲度。每服半至二打拉門。

葛筠脂

俗名 印度木油

此藥出印度等處，與哥拜把同類，爲棕色流質，味苦而香。

功用 輕瀉 利小便 改病 發表。

主治 大麻瘋內外兼用 亦治白濁。

服法 每服三十至一百二十林士。

筠匀水製法 葛筠脂一分 石灰水三分 和勻爲度。每服二至四打拉

門外用 搽大麻瘋。

秘魯脂又名

BALSAMUM PERUVIANUM.

MISTURA DIPTEROCARPI.

葛

萬國藥方

卷二

一百十三

此藥出中亞美利加，與秘魯國等處，色棕而黑，味苦，別具一種氣息。

化法 濃酒一分化伊打，哥羅方全化水，洋橄油不化。

功用 行氣溫補化痰。

主治 久頭風，久氣管痰，氣喘，風濕。

服法 每服十至十五林士，加白樹膠或雞蛋黃和水調服。

外用 治頑瘡，吹乳。

魯油膏製法秘魯脂一分，煉豬油七分，調極勻爲度，治外吹乳，唇裂。

魯松香油膏製法秘魯脂一分，松香油膏一分，調勻爲度，攤綿花上。

貼患處，治隱瘡最良。

到魯脂又名

BALSAMUM TOLUTANUM.

UNGuentum B. PERU.
VIANI RESINOSUM.

到魯漿

此藥出南亞美利加之到魯城，色棕臭香。

化法 濃酒一分化辨蘇三分化哥羅方二分化冰醋酸一分化沸水化多半

炭礦微化

功用 行氣 化痰 與秘魯脂同惟治癥癥較勝。

服法 每服十至二十林士加白樹膠漿與白糖作勻水服之。

糖 製法

到魯脂 二分半

白糖 六十四分水四十分

先將到魯脂與水入鍋蓋之熬半點鐘間時攪和候涼加水足三十二分過淋紙再加白糖入燙鍋化勻爲度 每服一二打拉門 與癩癩藥同服最良。

又方 到魯水 一分水糖四分 和勻爲度。

酒 製法

到魯脂 一分濃酒八分

先用酒六分與到魯脂同入玻瓶浸之

塞緊歪倒間時旋轉至消化過淋紙再加酒足八分爲度 每服十五至三十林士

魯水 製法

此水卽到魯脂與酒及汽水熬成水糖形者配到魯糖便用

到魯伊打

製法 到魯脂一分伊打一分化勻爲度 作各樣丸料外衣

免受濕氣較易存易服

Liquor B. totulati
etherus.

芭蕉根

BANANE RADIX.

一名蕉頭

此藥出南方近赤道各處用其樹乾根

功用 改病 治癩癩類症 配流膏用

芭

EXTRACTUM BANANAE
LIQUIDUM.

蕉根流膏

製法 芭蕉根一百分粗末

淡酒 酌用 先用酒三十五分潤末照流膏公

鋇

又名
BARIUM.

鋇質

此原質屬金類色白可打爲箔煅至紅色卽鎔其雜質有數樣與養氣

綠氣強水類易化合

銀綠

化名

銀綠輕養

舊名銀綠輕養

此藥自炭養鋇與鹽強水製出結冰色白味苦而濬

BARIUM CHLORIDUM.

功用 作試水以覈藥質。如無強烈酸鹹等種類
加此藥水即變薄降散

銀

綠水製法 銀綠一分汽水十分化勻過淋紙爲度 見上

榜葛刺木瓜

此藥出印度之榜葛刺等處惟取樹間半熟之果晒乾備用

功用 收斂 治癰漏 痘疾配流膏用

果流膏製法 卑拉果一斤汽水十五斤濃酒三兩先用水五斤浸十二點鐘

傾出再用水五斤浸一點鐘傾出如此二次用絞盤絞渣過呢布共入
燙鍋散氣剩十三兩爲止候涼再加酒和勻爲度 每服一二打拉門

卑拉打拿

頭茄西名 BELLA DONNA.

此藥出歐洲及美國等處與佛茄兒閼羊花同類實大如李內函多核
入藥用根與葉內函一精即丫刀邊精

功用 大寧睡 止疼 發表 解轉筋 利小便 補陽

卑拉菓又名 LIQUOR BARI CHLORIDI.

BALI FRUCTUS DURE.

EXTRACTUM BALE LIQUOR DURE.

主治 風癇 腦氣筋疼 眩暎 癱風 瘡病類 便秘 遺尿

陽痿 遺精 風濕

服法 見下膏酒等方，服此藥每令喉乾須知無妨。

反藥 反酸類 士的年精 鴉片

按番木鱗鴉片確與顛茄不合但同服均於病有益，可酌用之。

解藥 解此毒者先服礦強銅十林士或用礦強鋸二十林士和水服之待其

吐後繼服鴉片膏鴉片性毒可按所服顛茄多少酌用，慎勿妄加。或服綠養冰或啤羅加邊禡或非西

格民糲皆可。

顛茄葉

BELLADONNEE FOLIA

此藥乾鮮葉皆用配膏酒等。

膏製法顛茄鮮葉嫩枝一百十二斤入石臼搗爛扭汁入鍋加熱至一百三十

度過布留渣此渣色尚綠仍存藥性，恐見熟敗壞故先取出待用。將汁再入鍋加熱至二百度過布去渣

又入燙鍋散氣成水糖形即將前留之渣過馬尾羅回入燙鍋攪勻散

BELLADONNEE EXTRACTUM

氣熱不過一百四十度成膏爲度。每服一林士四分之一至半林士，常服則可漸加至一二林士。治風濕宜用一林士爲丸服之。治便秘用一林士六分之一至半林士空心服之。

顛茄

SUCCUS BELLA DONNAE.

汁製法顛茄鮮葉汁三分濃酒一分和勻候七天過淋紙爲度。存陰涼處。每服五至十五林士。

顛茄

TINCTURA BELLA DONNAE.

酒製法乾顛茄葉一分粗末淡酒二十分先用酒十五分浸兩天間時搖動裝淋箇淋乾加餘酒漂淋用絞盤絞渣過淋紙再加酒仍足二十分爲度。每服五至二十林士。治遺尿每服五至十林士與鐵酒各半同服。茄番大鼈丸製法顛茄膏一林番木鼈膏一林大黃製丸十二林士共研勻作四丸爲度。治便秘最效。

顛

PILULA BELLA DONNAE C.
TINCTURA VOMICA.

顛

SUPPOSITORIUM BELLA
DONNAE.

治痔瘡疼痛。

茄尖丸製法顛茄膏一林土或用顛茄

酒膏半林土亦可

士的亞連十三

林士共化勻作一丸爲度。

顛茄根

BELLADONNE RADIX.

此用乾根配貼膏、酒膏、搽酒等。

顛茄

EMPLASTRUM BELLADON-

貼膏 製法 顛茄酒膏一分 松香貼膏一分 腺子貼膏一分 先將二貼膏入燙鍋化合，再將酒膏細調勻爲度。 治風溼痛 胸前痛妙。

酒膏

製法

顛茄根十六兩 濃酒四十兩 汽水酌用 先用酒入有蓋器內浸二

天，裝淋箆淋乾，再加汽水漂淋，仍足四十兩之數，入燙鍋散氣成膏爲度。 每服一林土十六分之一至四分之一。

顛茄

LINIMENTUM BELLADON-

搽酒 製法 顛茄根二十分 細末 樟腦一分 濃酒酌用 先用酒二十分浸三天，裝

淋箆架在盛樟腦器皿上淋乾，再用酒漂淋，足三十分爲度。 治腦氣筋疼，用此酒與鴉片搽酒各一半，或樟腦製搽酒一半，或三者各用一分，和勻搽患處最效。

美國方 顛茄流膏九十分 樟腦五分化勻爲度。

顛茄

油膏

製法

顛茄酒膏

五十
林士

辨佐匿豬油

一兩調勻爲度

治小便頻數

宜塗海底處

茄甘油

製法

顛茄酒膏

一兩濃酒

一打
拉門

入溫白內研勻再加甘油一兩

研勻爲度

治癆子痛

新膿瘡痛

癰瘡痛

茄哥羅方

製法

顛茄根

二十分
研末

哥羅方

酌用

將顛茄裝伊打淋箇加哥羅

方淋足二十分爲度

治風濕疼

腦氣筋疼

腰骨疼

用此藥與

樟腦搽油各一半

和勻搽之最效

此與搽油頗能合
與搽酒類不合

茄製搽酒

製法

顛茄搽酒

七分顛茄哥羅方

一分和勻爲度

治腰痛

茄流膏

製法

顛茄根

百分
細末

濃酒

酌用

先用酒三十五分潤末按流膏公

法裝淋箇淋淨先淋九十分另存餘者入燙鍋散氣

熱不過一百
二十二度

按公法

製成一百分爲度

顛茄精

化名
七十

炭輕懷養

此藥自頭茄提出，結槍形之珠色白或微黃，味苦辛無臭。

化法 水五百分化一分濃酒三分化伊打二十五分哥羅方一分化

功用 寧睡 止疼 與頭茄同而力較勝。

服法 每服一林士一百二十分之一至三十分之一。

外用 點眼令瞳人散大，治眼簾發炎。射皮內治腦氣筋疼。

解藥 解此毒者亦與頭茄同。

丫刀

UNGENTUM ATROPINAE SULPHATIS

邊矯油膏製法丫刀邊矯八林濃酒半打辨佐匿豬油一兩先用酒化丫刀邊矯再加油調勻爲度。每用不過三十林士塗患處治腦氣筋疼。

邊矯化名炭輕淡養輕矯養。

礦強丫刀

ATROPINAE SULPHATIS

此藥自丫刀邊矯與礦強水製成結冰色白無臭無味。

化法 水四分化一分濃酒三分化伊打哥羅方不化。

功用 與丫刀邊矯同，因易化，便用之。

服法 每服一林士一百二十分之一至三十分之一 解鴉片毒每
服一林士三十分之一至六分之一

丫刀

LAMEILLE ATROPINE HY-

放眼內令瞳人散大

丫刀

LIQUEUR ATROPINE SUL-
PHATIS.

邊續輪子 製法 磩強丫刀邊續九林樟腦汽水十六打
一林士半拉門半化勻爲度 每服一

至四林士或用空針射入皮內亦可 解鴉片毒用五至十五林士

每一輪子宜有丫刀邊

百十林士內計有礪
強丫刀邊續一林士

刀邊續點水

製法 磻強丫刀邊續一二林士汽水一兩化勻爲度 點眼用

刀邊續空針輪子

製法 此藥係礪強丫刀邊續和明牛膠製成 每一輪子內
計有丫刀邊

弱一林士一百二十分之一
用時化溫水內以空針射之

後瑪刀

HOMATROPINIA.

邊續花名炭輕淡養

此藥自丫刀邊續煉出變形而成故名後瑪刀邊續與酸類能化合成

鹽

功用 與丫刀邊糖同。

瑪刀邊糖化名炭輕淡養輕溴

此藥自後瑪刀邊糖與溴輕酸製出，結白色之冰。

功用 與上同。

安息香西名BENZOINUM.

BENZOINUM.

辨佐匿香

此藥出暹羅國及隣近諸島，種類分數等，入藥者大約二種，一成塊如松香，一顆粒粘連，內函一醣即辨佐匿香按百分中計有此醣十五至二十分

化法 濃酒五分化一分伊打一分化銤養水全化。

功用 行氣 化痰 止血。

服法 每服十至三十林士。

安息

香製酒製法安息香八分 煉蘇合香六分 到魯脂二分 索哥德拉啞囉

TINCTURA BENZOINI
COMPOSITA.

HOMATROPINE HYDRO
BROMAS

溴輕後

一分濃酒八十分共浸七天，間時搖動過淋紙用酒漂淋，仍足八十分爲度。

每服半至一打拉門與白樹膠或雞蛋黃研勻加水和服治久癩。

癩外用治頑瘡損傷金刃傷。

安息香

酒製法安息香一分濃酒十分浸七天過淋紙爲度作安息香。

豬油便用。

息香洗水

製法安息香酒一分薔薇花汽水四十分和勻爲度去雀斑用。

地骨皮

又名土地骨

此藥出江蘇河南陝西甘肅等處用樹根之皮。

功用補劑解癰發表。

骨皮膏

製法

地骨皮切片

淡酒四斤

先用酒二斤浸一天裝淋箣淋乾。

加餘酒漂淋入甑將酒蒸回多半再入燙鍋散氣成膏爲度每服十

至十五林士治瘧疾二三十林士。

EXTRACTUM BERBERIS.

BERBERIS LVCIUM.

LOTIO BENZOINI.

TINCTURA BENZOINI.

地INFUSUM BERBERIS.

骨皮泡水製法地骨皮半兩切片沸水十兩納有蓋器內浸一點鐘濾渣爲度每服一至三兩。

骨皮酒製法地骨皮六分切片淡酒二十分浸七天絞渣過淋紙再加酒仍足

切片分

浸七天絞渣過淋紙再加酒仍足

二十分爲度每服補劑三十至一百二十林士解瘧三至六打拉門

又名樺樹脂

此油從樺樹皮蒸出狀如松脂色紅而棕別有一種氣息

外用 治多年頑癬

鉍BISMUTHUM.

又名

此原質爲硬脆之金與別金配合有大用獨自一質惟鍛器具多用之
色白微紅顆粒爲立方形質畧輕於錫受熱易鎔與養氣炭養氣及硝
強水化合成鹽則入藥劑配藥宜用燒者

鍊鉍

又名

淨鉍

此卽鉍質與硫磺及鉀衰鎔化後與炭養銻炭養鍗鍊成者配鉍類藥用之。

炭養鉍

化名
BISMUTHI CARBONAS.

鉍養炭養·輕養卽鉍養炭養·輕養
舊名鉍養炭養·輕養

此藥自煉鉍與硝強酸及炭養阿摩尼亞製出結散色白無臭。

化法 水不化 硝強水全化

功用 平胃 與下硝強鉍同

服法 每服五至二十林士

養鉍製水

製法 炭養鉍一百二
十林士輕炭養鍮六十
林士卡喇桿二十林士
研末柑花汽水二
打

門柑花糖二打
拉門水足六
兩共研勻爲度 每服三四打拉門飯後用 治吐酸

檸酸鉍

化名
BISMUTHI CITRAS.

鉍炭輕養舊名鉍養炭輕養

此藥自下硝強鉍與硝強水和檸酸與雙炭養銻製成者爲白色之散無味無臭。

化法 阿摩尼亞水能化。

功用 平胃 與下硝強鉍同。

服法 每服二至五林士。

檸酸
BISMUTHI ET AMMONII
CITRAS
LICUOR BISMUTHI ET AMMONII CITRATIS.

阿摩尼亞鉍水

製法 檸酸鉍
八百
林士

淡阿摩尼亞水

汽水 各酌
用

先將檸

酸鉍入白加汽水少許研爲稠糊漸加淡阿摩尼亞水調勻至消化爲

止再加汽水足二十兩爲度。

又方

檸酸阿摩尼亞鉍

二兩
冰片

汽水

淡阿摩尼亞水

各酌
用

先用汽水

十六兩化鉍片卽加阿摩尼亞水數滴令鉍水變清再加汽水足二十兩爲度每服三十至六十林士。

檸酸阿摩

化名
輕淡炭輕養鉍輕養

BISMUTHI ET AMMONII
CITRAS

製法 檸酸阿摩尼亞鉍水 便用 入燙鍋散氣成糖漿形爲止再鋪於磁板或玻片上加熱不過一百度焙乾爲度 玻塞甌存貯。

下硝強鉍

BISMUTHI SUBNITRAS.

化法 水 一分 分化濃酒微化。

功用 平胃 與下硝強鉍同。

服法 每服二至五林土。

西名鉍司母 化名鉍養淡養·輕養
舊名鉍養淡養·輕養

此藥自煉鉍與硝強水製出，後多加汽水令降爲散，色白，無臭無味。

化法 酒 水均不化 硝強水 鹽強水皆化。

功用 渗溼 平胃 微收斂。

主治 胃熱吐酸 瘟瀉 滯積作疼。

服法 每服五至二十林土，空心服之。

服此藥大便必黑須知無妨

與
水法同

作製水服之亦可。

鉍祕製
水法同

治痘瀉，二十至六十林土。

外用 作洗水治皮類病 作撲粉用亦可。

反藥 鋫養 鍗養 阿摩尼亞水 炭養鋫 炭養鍩 炭養阿摩

尼亞 錄典

鉢司

母水糖 製法 下硝強鉢一千四百
一兩 炭養鎂四兩 炭養鉛降散六兩 煉白糖 九兩

白樹膠 一兩 細末 白樹膠漿 一兩 薔薇花汽水 酌用 先將上五味研勻，再加白樹膠漿研勻，後加薔薇花汽水調成團，分作七百二十塊，焙乾爲度。

每塊內計有下
稍強鉢二林士 每服一至六塊。

司母油膏 製法 下硝強鉢一分 白油膏 四分 攪勻爲度，治白癬。

司母洗水 製法 下硝強鉢十林士 水 兩足 調勻爲度，治溼癬。

司母製散 製法 下硝強鉢三百六十林士 白樹膠 六十林士 細末 鹽強莫非羶 二林士 共研

勻爲度，用吹笛吹入鼻孔，治頭風鼻塞。

司母鴉片散 製法 下硝強鉢二十林士 鴉片表散 三半 炭匿酸 三林士 研勻爲度，作一服，治久瀉。

司母條丸 製法 下硝強鉢十林士 得波麻油 二十林士 化勻作一丸爲度，治

PULVIS BISMUTHI COMPO-
SITUS.

UNGUENTUM BISMUTHI.
LOTTO BISMUTHI.

TRACHISOL BISMUTHI.

SUPPOSITORIA BISMUTHI
OPII URETHRALA.

鉢必

白濁

硝強鉍

BISMUTHI NITRAS

化名 鉍淡養·輕養 舊名 鉍養·淡養·輕養

此藥自煉鉍與硝強水製出，結冰無色過光，無臭無味。

化法 甘油能化，水雖化而變形。

外用 治皮類病。

硝
強鉍甘油

又名 鉍司母甘油

製法 硝強鉍十林 甘油一兩和勻爲度。

治皮類病。

鉍養

化名

鉍養 舊名 鉍養

BISMUTHI OXIDUM.

製法 硝強鉍十六分 鍗養水八十分 和勻，熬五分鐘，候涼見鉍養降爲散，即

擣出上面之水，提出降散，用汽水洗淨，入燙鍋煎乾爲度。

此藥結散色淡黃，無臭無味。

化法 水不化，強水能化。

功用 平胃 與下硝強鉢同。

服法 每服五至十五林士。

鉢綠養

化名 鉢綠·鉢養·輕養舊名鉢綠·鉢養

BISMUTHI OXYCHLORI
DUM.

此藥自煉鉢與硝強水及鑄綠製出，結散色白無臭。

功用 平胃 與下硝強鉢同

外用作撲粉

波祿兜

BOLDO.

一名 波樓杜

此藥出南亞美利加支利國，入藥用該樹枝葉。

內面一精，名波祿敵，又雨一油百分中能出二分。

功用 動膽汁 治滯積 飯不消化。

波祿兜酒

製法 波祿兜葉一分 淡酒八分 先用酒六分浸七天，裝淋箒淋

乾，加餘酒漂淋，用絞盤絞渣過淋紙，再加酒仍足八分爲度。 每服十

至三十林士。

礎

又名

礎

TINCTURA BOLDI

硼砂

一名

BORAX

此原質爲綠櫻之色，無自然獨成者，常與養氣三分化合成硼養，但產處甚少，惟與鍍養化合爲硼砂者多。

月石

又名雙硼酸鑪，化名鍱硼養。

輕養

舊名鈉養硼，

差養

輕養

此藥出西藏、印度、南亞美利加等處，生成而經鍊者，結冰無色過光，露空氣微化，外成白散，味始畧甜，繼則畧鹹而苦，內函一酸卽硼酸，化法 冷水_{二十二分} 化一分 沸水_{一分} 分化 甘油_{一分} 分化 濃酒不化，與白樹膠漿化合，則變硬。

功用 解熱 利小便 動經 令子宮收縮 佐耳臥達及肉桂汽水同服，治胎衣不下。

服法 每服五至三十林土。

外用 治皮類病 治白屑風及連環癬，宜將此藥入水內，至濡而不化，洗之最效。

反藥 強水類 強水鹽類 白樹膠漿

甘油

製法 研末

甘油 四分 汽水 二分 共研勻入燙鍋化合爲度

GLYCERINUM BORACIS.

硼砂

每服半至一打 拉門半

蜜

製法 研末

硼砂 二分 煉蜂蜜

十六 分 甘油

一分 共研勻爲度 治口瘡

砂漱水

製法 研末

硼砂 五十 林士 蜂蜜

二打 拉門水

足五 分 共化勻爲度 治咽喉類病

砂洗水

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

又方 砂

一分 甘油

一分 薔薇花

汽水 十六 分 共化勻爲度 婦人洗

面用之

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 沒藥

一分 叫龍水

十六 分 水 三分 水糖 三分 共化勻爲度 治牙齦紅腫 亦刷牙用

又方 砂

一分 甘油

一分 沒藥酒

一分 化勻爲度 治牙齦紅腫 亦刷牙用

砂油膏

製法 研末

一分 白油膏

八分 研勻爲度 治凍瘡 外吹乳

TINGUITA, EVERILAE ET
BORACIS.

硼

砂油膏

製法 研末

一分 白油膏

八分 研勻爲度 治凍瘡 外吹乳

GARGARISMA BORACIS.

硼砂

MEL BORACIS.

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

硼砂

製法 研末

硼砂 一分 薔薇花

汽水 二十 分 化勻爲度

PESSUS BORACIS.

硼

砂陰尖丸 製法 硼砂十五林士得波麻油足用化勻作一丸爲度 治子宮口生瘡

又名

溴質

BROMUM.

此原質海水內皆有之，每七千分中約有一分，又考數處泉水內亦有之，數種金類內亦含之，與鎂化合者尤多，但取法繁冗不必細論，其爲紅色之流質，臭畧如綠氣而猛烈過之，凡動物沾之易被燬傷，與鈦質，鋸質，阿摩尼亞等，化合成鹽，爲常用之藥。

化法 水三分化一分濃酒十分化一分伊打亦化

外用 丹類 治毒癰

射水 製法 溴十二林士濃酒二打水兩化勻爲度 治子宮毒癰，用此水節射之

溴

INJECTIO BROMI.

TINCTURA BROMI.

萬國藥方

卷二

酒 製法 溴十二林士濃酒一打化勻爲度 治子宮毒癰，用麻絨蘸塗患處

天花粉

又名 白藥

BRYONIA.

此藥出中國美國等處，乃以枯樓根作粉，其色潔白如雪，故名。

功用 化痰 多服能吐瀉。

主治 癪癥 肺胞膜發炎。

服法 每服二十至六十林士。

天花粉酒

製法 天花粉一分濃酒十分先用酒七分浸二天裝淋箇淋乾。

再加餘酒漂淋，仍足十分爲度。

標咗

又名

TINCTURA BRYONIAE.
BUCHU.

此藥出亞非利加之好望角，入藥用葉，味苦而香，酒水均能提出功力。

功用 补劑 開胃 利小便 發表。

主治 小便類病 便閉 遺尿 膀胱蒂核之病 滯積 久風濕

皮類病 瞰症。

服法 每服二十至四十林士 研末服之。

或作泡水
酒等用

泡水

製法 布球一分 揭爛 沸汽水二十分 泡半點鐘，濾渣爲度。

每服一至四兩。

酒

製法 布球一分 淡酒八分 先用酒六分浸二天，間時搖動，裝淋筩淋粗末，再加餘酒漂淋，用絞盤絞渣，過淋紙，再加酒仍足八分爲度。

每服一

至四打拉門，

布

球流膏

製法 布球一百分 濃酒二分和汽水一分 酣用 先用酒水三十分

潤末，實裝長圓淋筩，按流膏公法淋盡，先淋八十五分另存，餘者入燙鍋散氣，按公法製成一百分爲度。每服二三十林士，加水服之。

鐸質

此原質爲白色之金，形如錫，性如銻，常含於銻礦內而不多，煅礦取銻，初見棕色之光，即鐸也。

CADMUM.

又名

鐸

CADMUM.

化名

鐸碘

CADMUM IODIDUM.

萬國藥方

卷三

一百三十七

此藥自鐸質與海碘製出，結冰如片珠，色白過光。

化法 水三分化濃酒一分甘油二分化

一分

外用 配油膏 治皮類病 骨節變大 瘡癩類病

碘油膏 製法 鐸碘一分 白油膏七分研勻爲度 治凍瘡 骨節變大

化名 鐸碘養·輕義

此藥自鐸質與炭養鱗及硝強礦強二水製出，結冰無色，味酸而濃。

化法 水五分化濃酒不化

功用 收斂 去眼內雲翳

加非又名哈非

CAFFEA.

此藥出呂宋及印度海島等處，入藥用仁，內函一精，即加非精。

功用 開胃 行氣 解洋烟毒

非煮水又名加非茶製法 加非二至五兩沸水二十熬五分鐘，放暖處泡十

加非癮

即

分鐘爲度 治氣喘 解洋烟毒多用加非一倍
加非精 化名炭 輕淡養輕養

此藥自加非提出 結冰色白 味苦無臭 與茶葉精無別

化法 水八十分濃酒四十分 哥羅方七分化一分 伊打四百分一分 純酒一百六十分化一分

功用 行氣 提神 行血 補心

主治 頭疼 腦氣筋疼 心體無力

服法 每服一至五林士 治頭疼每點鐘服一林士 行血補心日

三次每服二三林士 代毛地費用 解鴉片毒每服十林士

非癮穴針射水 製法二十林士沙利先鑄十七林士半汽水足一打拉門化勻爲度 加非癮

每次用一至六林士 治頭疼 解酒醒

癮化名炭 輕淡養輕炭輕養

樟酸加非

CAFFEIN & CITRAS.

INJECTIO CAFFEINÆ &
HYPODERMICA.

製法 加非癮 一分 檸檬酸 一分 汽水 二分 先將汽水 檸檬酸入燙鍋消

化，再添加非穠調勻化合，散氣頻調至乾，研細爲度。

此藥結冰色白，味苦無臭。

化法 濃酒十二分水十二分化一分沸水易化。

功用 提神 與加非穠同。

服法 每服二至十林士。

溴輕加

功用 與加非穠同。

服法 每服二至十林士。

非穠

功用 與加非穠同。

服法 每服二至十林士。

甘松加

功用 服法 同上。

加枝撥油

CAFFEINE VALERIAN,
CAFFEINE HYDROBROMIC
MAS

化名炭輕輕養

此藥出新嘉坡等處，從該樹葉內蒸出，味辛而香，色綠而藍。

CAJAPUTI OLEUM.

化法 濃酒全化 松節油 油類皆化

功用 行氣 發表 解轉筋

主治 眩症 久風濕 鬱病 肚風絞痛 痢類病

服法 每服一至三林士滴白糖中服之或加白樹膠漿服之亦可

外用 運血 治風濕痛酒風脚疼可用此油一分香油二分和勻搽之 治牙疼用棉花蘸此油塞牙穴內或用麻絨布蘸貼腮上亦可

撥酒 製法 加枝撥油一分濃酒四十五分化勻爲度 每服五十至一百林士

又名 白菖

CALAMUS
EXTRACTUM CALAMI.

水菖蒲

此藥出中國美國印度等處入藥用根味苦辛而香

功用 開胃暖胃 治飯不消化

作膏酒等服之

蒲膏 製法 水菖蒲一斤淡酒酌用先用酒一斤泡八天裝尖淋箇淋乾再加酒漂淋至藥無味入燙鍋散氣成膏爲度 每服三至五林士

EXTRACTUM CALAMI.

菖

菖

INFUSUM CALAMI.

TINCTURA CALAMI.

菖

蒲泡水

製法

水菖蒲

一分

沸水

十六分

泡一點鐘，濾渣爲度。

每服三四兩。

蒲酒

製法

水菖蒲

一分

濃酒

五分

浸八天，絞渣過

淋紙，再加酒

仍足五

分爲度。

每服二一打拉門。

石菖蒲

又名劍草

此藥出西國，並中華陝西、四川、貴州等處，入藥用根。

功用 開胃暖胃 與水菖蒲同。

ACORUS GRAMINEUS.