

傷寒補天石

(2)



辨伏脈第十七

頭疼發熱惡寒。一手無脈。或兩手全無者。此因寒邪。不得發越。便爲陰伏。故脈伏必有邪汗。當攻之。或用三時羌活沖和湯。 麻黃湯。又有六七日以來。別無刑剋證候。或昏沉易昧。不知人事。六脈俱無此正欲汗也。勿攻之。當用五味子湯。以生脈補元。元氣來復。一汗而涼也。二者俱陰重。欲雨之象。意。 傷寒腹痛。脈必伏。或吐瀉脫元。而無脈者。隨病而施。將薑汁磨木香。調麝香半分。入獨參。



湯服下脈至者生不至者死。按一手無脈誠伏脈也。
兩手全無者須重按全無方是伏脈。若有而無者則
又爲陽證見陰脈矣。慎之。

脈知可解第十八

可解之脈浮而虛不可解之脈浮而實浮而虛者只是在表浮而實者知已在裏也。汗多不解者轉屬陽明也。傷寒三日脈浮數而微病人身涼和者此爲欲解也。解以夜半寸關尺三處浮沉遲數大小同等雖



有寒熱不解此脈陰陽爲和平雖劇當愈凡冬間正
傷寒看脈用藥無有不應惟溫疫時證不須論脈但
無怪證怪脈則不妨又不可發汗汗之熱仍不退日
重其虛只須小柴胡見熱甚合解毒扶之使正或一
七日或二三七日自然汗出身涼而愈也

看證大略第十九

大凡看傷寒先看兩目或赤或黃次看口舌有胎無
狀及小便無大通

大便通否口渴與不渴曾服何藥或久或新察其病
情端由參合脈證相對與否以斷吉凶

風寒辨第二十

一般頭痛身熱項強腰脊強惡寒惡心拘急身體
骨節痛但惡寒無汗脈浮緊有力爲寒傷營治宜發
表散邪冬月麻黃湯三時芎蘇飲冲和湯若惡風有
汗脈浮緩無力爲風傷衛治宜解表散邪冬月桂枝
湯三時參蘇飲加減冲和湯內去蒼术如白术腹痛



小建中湯痛甚。桂枝加大黃湯此太陽初病傷風傷寒。如此分治。若傳諸經。傷風傷寒同治也。傷風者。先咳嗽鼻塞聲重者是也。內經風論分屬五臟。畢竟屬肺者多。治用辛溫或辛涼之劑以散之。大要風寒用辛溫。風熱用辛涼。

傷風鼻塞聲重不頭疼体痛者。只用參葛飲加減治之。

內傷外感辨第二十一

內傷外感俱有寒熱。不得概作傷寒。妄施汗吐下溫之法也。夫外感有餘者。寒熱齊作而無閒。外感惡寒。

雖近烈火不除。外感惡風乃禁一切之風。外感顯在鼻。故鼻氣不利。壅盛有力。外感則邪氣有餘。發言厲先輕後重。外感則手背熱而手心不熱。左手脈來緊盛。右手和平。此是外感傷寒也。當作正傷寒治之。內傷不足者。寒熱閒作而不齊。內傷惡寒。得煖卽解。內傷惡風。微惡些少。賊風。內傷顯在口。故口不知味。而腹中不和。內傷則元氣不足。出言懶怯。先重後輕。內傷則手心熱而手背不熱。右手脈來空大無力。左

手脈來或微或濶此內傷不足也當用補中益氣湯
治之若內傷與外感兼病內證多則是內傷重而外
感輕當補養爲先解表爲次外證多則是外感重而內
傷輕當發表爲先補養爲次

勞力傷寒第二十二

勞力內傷血氣又兼外感寒邪頭疼身熱惡寒微渴
濶然汗出身體痛脚腿酸疼無力沉倦左手脈緊盛
右手脈空大無力治以溫補兼發散寒邪調營養氣

湯卽東垣補中益氣湯加減。有下證者宜緩治之。大柴胡湯。

夾食傷寒第二十三

內傷食鬱又兼外感寒邪頭疼身熱惡寒拘急惡心痞滿或嘔吐或腹痛或泄瀉脈左右俱緊盛有力治以解表爲先未發熱霍香正氣散已發熱芎蘇散消食爲次大柴胡湯。

夾痰傷寒第二十四



內傷痰鬱又兼外感寒邪手熱惡寒隱隱頭痛喘咳
煩悶胸脇體痛左手脈緊盛右手關脈洪滑或寸脈
沉伏治以痰藥兼發散寒邪金沸草湯小半夏湯後
以消痰兼降火柴胡半夏湯有憎寒壯熱頭痛昏沉
迷悶土氣喘急口出涎沫此內傷七情以致痰迷心
竅神不守舍舍空則痰生名挾痰如見鬼狀與痰證

神火空
舉
同法治加味導痰湯臨服入薑汁竹瀝

夾氣傷寒第二十五

內傷氣鬱。又兼外感寒邪。頭痛身熱。惡寒身疼。脇痛。眼滿氣鬱不舒。左手脈緊盛。右手脈沉。治以氣藥兼發散寒邪。

夾血傷寒第二十六

內傷血鬱。又兼外感寒邪。頭疼身熱。惡寒煩渴。胸脇小腹痛。左手脈緊濡。有手脈沉數。治以解表爲先。桂枝湯下瘀血爲次。輕則犀角地黃湯。重則桃仁承氣湯。有刑頭痛。惡寒止身熱。煩渴小便利。次便黑口語。

無倫此內傳心脾二經使人昏迷沉重名挾血如鬼
祟狀當歸活血湯。

內傷似外感始爲熱中病第二十七

氣高而喘身熱而煩短氣上逆鼻息不調怠惰嗜卧
四肢困倦無氣以言無力以動或大熱悶亂心煩或
渴久病或不渴。

病久邪深入絡故不渴有濕亦不渴如渴者是心
火炎上冠肺金故也。

或表虛惡風寒。慎不可與寒涼藥。惟以補中益氣湯溫之。以補元氣而瀉火邪。東垣曰。火與元氣不兩立。脾胃氣虛。則下流於腎。陰火得以乘其土位。故脾證得氣高而喘。身熱而煩。其脈大而頭痛。或渴不止。其皮膚不任風寒。而生寒熱。蓋陰火上衝。則氣高而喘。煩熱。頭痛而渴。脈洪。脾胃之氣下流。使穀氣不得升浮。是春生之令不行。無陽以助其營衛。則不任風寒。乃上寒下熱。此皆脾胃不足所致。與外感風寒似同。

而實異。內傷不足之中。又當分別飲食傷爲有餘。勞倦傷爲不足。凡飲食不節。勞役過甚。則心脈變見於氣口。是心火刑肺。其肝木挾心火之熱。亦來薄肺經。曰侮所不勝。寡于畏者。是也。故氣口急大而數時。代而澁也。澁者。肺之木。脈代者。元氣不相接。脾胃不足之脈也。洪大而數者。心脈刑肺也。急者。肝木挾心火而反尅肺金也。若不甚勞役。惟右關脾脈大而數。謂獨大於右脈。數中顯緩。時一代也。如飲食不節。寒



暑失所則先右關胃脈損弱甚則隱而不見惟內顯
脾脈之大數微緩時一代也宿食不消則先右關脈
沉滑也補中益氣湯。

黃芪 人參 白朮 炙草 陳皮 當歸
柴胡 升麻 薑 聚

東垣曰脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其
土位其次肺金受邪須多用黃芪而人參甘草取
之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而固

腠理不令自汗。損其元氣。上喘氣促。故以人參補之。心火乘脾。用炙草甘溫。以瀉火熱而補脾元。若脾胃急痛。併太虛腹中急縮。宜多用之。中滿者減之。白朮苦甘溫。除胃中之熱。利腰臍間血。胃中清氣在下。必加升麻柴胡以升之。引參芪甘草甘溫之氣味上升。以補胃氣之散。而實其表。又緩帶脈之縮急。氣亂於中。清濁相攻。用去白陳皮以理之。又助陽氣上升。以散滯氣。脾胃氣虛爲陰火傷其

云味苦平。味之薄者陰中之陽。能清氣升。

動搖甘草鴻明。乾金丸加葛根。不計半升。



生發之氣。管血大虧。血減則心無所養。致令心鬱。
而煩病名曰悵。故加甘辛微溫之劑。以生陽氣。仲
景之法。血虛以人參補之。陽旺則能生陰血。更以
當歸和之。少加黃柏以救腎水。瀉陰中伏火。如煩
猶不止。少加生地。補腎水。水旺則心火自降。如氣
浮心亂。以硃砂安神丸鎮固之。則愈。

內傷似外感未傳寒中病第二十八

胃脘當心而痛。上支兩脇。咽膈不通。飲食不下。或作

涎及清涕。唾多。溺多。或足下痛。不能踐地。骨乏無力。
喜睡。兩睂丸冷。腹隱隱而痛。腰脊背皮皆痛。其脈盛。
大而濶。名曰寒中病。東垣曰。脾胃不足。腎水反來侮。
土所勝者妄行也。作涎及清涕。唾多。溺多。而惡寒是。
也。土火之復及。任脈爲邪。則足不任身。足下痛不能。
踐地。骨乏無力。兩睂丸冷。腹中隱隱而痛。妄聞妄見。
腰脊背皮皆痛。用乾薑附子烏頭蒼朮白朮茯苓猪
芩澤瀉治之。

內傷似外感陽明中熱病第二十九

天氣大熱時勞役得病其病肌體壯熱躁熱悶亂無
熱渴飲水漿與陽明傷寒白虎湯證相似口鼻中氣
促上喘此乃脾胃大虛脈或微弱若白虎證其脈洪
大有力與內傷中熱不同用清暑益氣湯經曰陽氣
者衛外而爲固也熱則氣泄今暑邪干衛故身熱自
汗以黃芪甘溫補衛爲君人參橘皮當歸甘草甘微
溫補中益氣爲臣蒼白术澤瀉滲利而除濕升麻葛

根甘苦平解肌熱又以風勝濕也。濕勝則食不消而作痞滿故用神麴。甘辛青皮辛潤消食順氣。腎惡燥急食辛以潤之。故以黃柏苦辛寒。偕甘味瀉熱補虛以滋化源。以人參五味麥冬甘酸微寒救天暑之傷。

辛金也

黃芪 人參 白朮 蒼朮 神麴 青皮
陳皮 甘草 麥冬 五味 當歸 黃柏
澤瀉 升麻 葛根 薑 棗

內傷似外感濕熱病第三十

長夏濕熱火勝蒸蒸而熾人感之四肢困倦精神短少。願於動作胸滿氣促肢節煩痛或氣高而喘。身熱而煩心下膨痞小便黃赤而數大便溏而頻或利出黃而糜或如白泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少血先病而氣不病也其脈洪緩若濕氣相搏脈必加遲病雖互換少差其天暑濕冷則一也宜以清燥之劑治之。清暑益氣湯。按此節疑有錯與

內傷似傷寒病第三十一

凡似傷寒煩躁不絕聲。汗後復熱。服細數。五七日解補中益氣湯倍加人參。用竹葉同煎。甚者加
睡食五味知母。似傷寒至五七日。汗後煩躁喫水者。補中益氣加附子。似傷寒三戰後。勞乏煩躁昏倦。四君子加當歸黃芪知母麥冬、五味。舌有黑燥。大便滑泄。食在大腸。煩躁夜不安。宜防風當歸。引子。內傷病後燥渴不解者。有餘熱在肺。參芩甘草少加薑汁冷服。虛



者人參湯又能治胸痺短氣

瘡瘍發熱傷寒第三十二

經曰諸脈浮數當發熱而酒淅惡寒若有痛處如當蓄積有膿也又曰脈數不解則生惡瘡也凡病人寒熱交作不可便以傷寒治之須視病人頭面脊背有無瘡頭若有小紅瘡須當辨之

癆病傷寒第三十三

癆病者嶺南烟瘴之地多有之乃溪毒砂蠶水弩射



寒病

散

其官

似熱

煩

解

氣

血

沙

之解

急

工蠅短狐蝦之類。俱能含砂射人。被其毒者。憎寒甚。熟百體分解似傷寒初發狀。彼土人以手搘痛處用角筒入肉。以口吸出其砂。外用大蒜煙搗膏封點瘡口。而愈。彼地有鶲鷂鷂鷂等鳥。專食以上諸蟲。以此鳥毛糞燒灰。眼之。及籠此鳥於病者身畔。吸之。其砂聞氣自出而病愈也。

勞損傷寒第三十四

凡內傷寒熟。狀類傷寒。但起於跌撲或踢打或閃肭。

或努力爲異而凡內傷有瘀血作痛者脈必芤濶或
數其證發熱自汗小便利大便黑心胸脇下小腹滿
痛按之手不可近此內有瘀血也當歸導滯湯復元
活血湯桃仁承氣湯量其元氣下其瘀血則愈經曰
肝爲血海凡有瘀血必蓄積於肝之部分兩脇小腹
皆肝部也凡損傷切不可飲冷水血見寒則凝但一
絲血入心卽死

辨證傷寒第三十五



凡中脘停痰。胸滿氣衝。憎寒壯熱。惡風自汗。狀如傷寒。但頭不痛。項不強。爲異耳。涎多者。亦隱隱頭痛。凡痰脈必弦滑。痰在上部。寸脈弦滑。或沉伏。痰在中部。右關滑大。痰在下部。尺脈洪滑。有痰氣內鬱。右脈必沉滑。有痰飲內着。右脈必沉弦。若關脈左右滑大者。膈上有伏痰也。若右關洪滑。或右脈沉伏而左手緊盛者。夾痰傷寒也。凡痰病之源。有因熱而生痰者。

熱則薰蒸津液而生痰。

有因痰而生熱者

痰則阻礙氣道而生熱也

有因風寒暑濕而得者有因驚而得者

驚則神出舍空空則生痰也

有因氣而得者有因食積而得者

食鬱有火氣上動而生痰也

有因酒食而得者

酒氣上升爲火肺與胃脘皆受邪故鬱滯而生痰

有脾虛不能降火而生者。

脾氣虛津液不運而生痰

有腎虛不能降火而生者。

腎水虛弱則心火上炎以致津液濁敗而爲痰。有血氣虧乏而痰滯中焦者熟痰。則多煩熱風痰多成癱瘓奇證。寒痰多成骨痺濕痰多成倦怠軟弱。驚痰多成心痛癲證。食積痰多成癖塊痞滿。酒飲痰多成脇疼臂痛。凡痰新而輕者清白稀薄氣味亦淡久

而重者黃濁稠粘凝結亦難出漸成惡味甚至帶血王節齋曰痰乃津液所化因風寒暑濕所感或情飲食所傷以致氣逆液濁變爲痰飲或吐咯或凝滯胸膈或留腸胃或流經絡四肢隨氣升降無處不到其爲病也或喘或咳或恶心嘔吐或痞膈壅塞關格異病或溏泄或眩暈或嘈雜或怔忡驚悸顛狂或寒熱或痛腫或牽引或走串或目睛微定或如烟煤或昔肥今瘦或胸中漉漉有聲或背心常如



一點冰冷或四肢麻痺不仁皆痰之所致也。痰有新
久輕重之殊。治法痰涎生于脾胃。宜實脾燥濕。又暢
氣而升。宜順氣爲先。分導次之。又氣升隨火。順氣在
於降火。熱痰則清之。風痰則散之。寒痰則溫之。濕痰
則燥之。鬱痰則開之。頑痰則軟之。食積痰則消之。在
上者則吐之。在中者則下之。又中氣虛者。宜固中氣
以運痰。若攻之太重。則胃氣虛而痰愈甚矣。凡頭目
眩暈。卒時暈倒者。此風痰眩暈也。名曰痰暈。二陳加

川芎天麻膽星之類。去甘草。若胸膈悶痛。咯吐不出者。此熱痰稠結也。名曰痰結。二陳加芩連梔子。具
瓜蔞桑皮杏仁枳殼桔梗蘇子之類。去半夏。若骨節
疼痛或腫而痛。塊作此濕痰流注也。名曰痰塊。二陳加姜
活白芷蒼术白芥子南星黃芩甚加海石朴硝之類。
若昏迷卒倒。厥冷脈沉細者。此寒痰壅塞也。名曰痰
厥。二陳加薑桂熟附南星木香蘇子枳實。若咳嗽氣
悶。煩躁不寧者。此痰鬱胸膈也。名曰痰燥。二陳合溫

膽加砂仁之類。若驚氣怔忡。癲狂亂語者。此痰。尅心包也。名曰痰結。二陳加梔子芩連瓜蔞貝母枳實。桔梗前胡蘇子之類。用薑汁調辰砂溫服。若咽喉結核。咯不出。嚥不下者。此痰氣鬱寒也。名梅核證。二陳加薑桂砂仁枳實厚朴香附子之類。若寒熱咳嗽。發作有時者。此痰火上升也。名曰痰火。二陳加黃柏知母。麥冬五味桑皮黃芩及四物之類。若痰成塊。吐咯不出。兼氣鬱者。難治。痰熱氣實難治。凡治痰。二陳湯爲



中医药大学图书馆版本所

主隨證加減

半夏 陳皮 茯苓 甘草

按此湯半夏燥濕橘紅利氣茯苓降氣滲濕
和中補脾脾健則不生濕燥濕滲濕則不生痰
利氣降氣則痰消解真可謂治痰之聖藥也
寒痰加附子薑桂濕痰加蒼朮白术熟痰加芩連梔子風
痰加南星皂角食痰加薑麥山楂燥痰加瓜蔞鬱
痰加香附枳殼老痰加海石芒硝氣虛加四君血



虛加四物脾虛加六君腎虛加六味氣滯加陳皮
滯加韭汁痰熱瘀血成窠囊者加蒼朮喘加
杏仁桑皮滿悶加枳殼桔梗外熱加柴胡內熱加
芩連頭項痛加川芎威靈仙腳腫加牛膝木瓜瘀
在腸胃可下而愈痰在經絡非吐不可痰在脇下
非白芥子不能達痰在皮裏膜外非竹瀝薑汁不
能導凡痰發出者宜吐不宜下厭厭不測變生他
病矣古人治痰通用二陳實脾燥濕若痰因火上

凡痰药用甘潤之物如杏仁桑皮等

杏仁白芥子等

凡痰久停結狀若寒凝者須用溫藥引導

溫藥引導

肺氣不清。咳嗽時作。而成老痰鬱痰。吐咯難出者。
宜節菴化痰丸。

天冬 薏仁 黃芩 海粉 香附 桔梗

連翹 大青 朴硝 膁皮

吐痰用瓜蒂散。

甜瓜蒂 赤小豆

食積傷寒第三十六

凡中脘停食。頭痛身熱。惡寒但身不痛。爲異耳。凡食

積之脈左手平和右手緊盛者若夾食傷寒則左右
脈俱緊盛矣凡惡食。嘸酸。惡心。嘔吐。嗳氣。短氣。胸滿。
腹脹。胃口痛。按之亦痛。此食積類傷寒也。用香砂平
胃散。若發熱惡寒。頭疼體痛。惡心拘急。中脘痞滿或
痛。或嘔吐。或瀉利。此夾食傷寒也。藿香正氣散。若已
經發熱者。芎蘇散。若發熱體痛者。冲和湯。先解其表
後消其食。大抵治夾食傷寒必須解表散邪後方可
攻食。否則胃口先虛。表邪乘虛而入矣。凡食在胃口。

若先攻食

氣

未入胃者宜吐。不吐則宜消導。待食下入於胃。變化糟粕。表證已解。乃可下其食也。凡脾胃氣虛不能運化水穀。水穀停積。則爲濕痰。曰補氣。曰消食。曰燥濕。三者不可偏廢也。病之新久要分。而用藥寒溫。不可不察。凡脾胃虛弱。不能運化水穀。初時則爲寒濕。用辛香燥濕之劑以散之。若停積日久。濕能生熱。熱化爲火。火能傷血。則爲燥熱。用辛甘苦寒之劑以潤之。飲食又宜分治。經曰。因而大飲。則氣逆。因而飽食。卽



經脈橫解則腸癖爲痔飲者無形之氣傷之則宜發汗利小便食者有形之物傷之則宜損穀其次莫若消導重則或吐或下凡飲酒所傷作濕熱治之或發汗或利小便使上下分消其濕是也然小便赤澁者可利小便清利者不可利只宜發汗若輕利小便不惟腎水重涸且酒毒亦不能去致土下不通而溺澁則爲發黃入血室則爲蓄血也當服葛花解醒湯

葛花 白蔻 猪苓 白术 荻苓 澤瀉

陳皮 青皮 人參 沙仁 神薑 木香

微
浮
尺

生薑

虛煩傷寒第三十七

經曰陰虛生內熱。夫虛煩卽虛熱也。則胸中鬱鬱不
安。故曰虛煩。凡諸虛煩熱狀類傷寒。但頭不疼。身不
病。不惡寒爲異耳。凡脈數主熱。數而有力爲實熱。數
而無力爲虛熱。故虛煩之脈雖大。按之必無力。並人
脈浮大。左寸關脈。或濡或弱。或一或濶。皆虛脈也。又



北京中医药大学图书馆版权所有

平人脈大者必虛勞也。凡飲食不節喜怒失調房事勞役皆損其真氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土四肢困倦而熱。懶言沉卧。少氣以動。動則氣促而喘。或表虛自汗惡風。當以甘溫之劑補其中氣。溫其真陰。其熱自愈。切不可以苦寒之劑重瀉脾土也。經曰勞者溫之。損者益之。補中益氣湯黃芪甘草甘溫能除虛熱。相火發熱及大病後。皆宜此湯輕劑如竹葉石膏湯。十味溫膽湯。皆病後虛煩之聖藥。要在選而用。

之。凡虛煩不可攻熱。熱去則寒起矣。戒之戒之。

脚氣傷寒第三十八

原闕今從全生集補

腳氣之作必發寒熱。嘔逆但起于脚膝。踈軟爲其症也。

要須察其足腫掀赤腫者濕熱也。黃白腫者寒濕也。

脈浮主風小續命湯加羌活木通木瓜龍膽草牛膝

並用加減

沉遲或緊主寒桂枝湯加羌防木瓜木通牛膝蒼朮

脈數有力主熱小柴胡湯加黃柏知母半膝羌防木

通脈沉濡主濕五苓散加蒼朮木通羌防牛膝木瓜

禁用補劑及林光



然傷寒則無足痛之患以別之因有發熱惡寒故狀

類傷寒也

大頭傷寒第三十九

凡先發于鼻額紅腫以致兩目盛腫而不開并額上
面部皆赤者此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥咽
喉腫痛不利脈來數大者普濟消毒飲主之

柴胡 升麻 牛蒡 連翹 桔梗 白芷

甘草 元參 黃連 黃芩 馬勃 瘤蘆

板藍根

內熱實甚者。通聖消毒飲。若發於耳之上下前後。并額角紅腫。此屬少陽也。或肌熱。或日晡潮熱。往來寒熱。口苦咽乾。目痛。脇下滿小柴胡加天花粉羌活荆芥連翹黃連黃芩主之。若發於頭上。并腦後項下及目後亦腫。此屬太陽也。荆芥敗毒散主之。若三陽俱受邪。併於頭面耳目鼻者。用普濟消毒飲。外用清涼散苦散。凡頭面清虛之分。治法不宜太峻。恐邪氣不除。

伏而反攻內傷人也。宜先緩後急。邪自伏也。先緩者。
宜退熱消毒。虛人兼補元氣。胃虛食少。兼助胃氣。候
大便熱結。以大黃下之。拔其毒根。凡時行頭面赤腫。
咽喉堵塞。水藥不受。此臟腑素有積熱。發爲腫毒。症
瘡一切惡瘡紅腫。並宜解之。漏蘆湯。凡頭風頭面疙
瘩。腫痛。憎寒壯熱。四肢拘急。狀似傷寒。清震湯。夫雷
屬震卦。震象仰盂。故用青荷葉。中通外直。以類象形
治之效也。咽喉腫痛。用綠雲散。

青黛 滑石 冰片 芒硝

元明粉 寒水石

山豆根

車前共研細吹喉中

諸腫處各砭出血

爲妙

黃耳傷寒第四十

凡耳中策策痛者皆風入腎經也不治流入腎卒然

變惡寒發熱脊強背直如瘡狀此非正傷寒乃類傷

寒也名黃耳傷寒小續命湯荆防敗毒散又一草方

藤天竹

紫金皮

雞屎子

馬蹄金

苦參

散加白芷蔓荆子蟬退黃芩芍藥紫金皮二方選用



兩面龜 許死子 酒和服

又方用苦參磨水滴入耳中。或用虎耳草或用猴薑根汁。或用薄荷土木香汁滴入耳中尤佳。

赤膈傷寒第四十一

凡胸膈赤腫疼痛。發熱惡寒。頭痛身痛。此非正傷寒。乃類傷寒也。名赤膈傷寒。荆防敗毒加赤芍芩連瓜蔞仁紫金皮元參升麻。若有表復有裏證。防風通聖加瓜蔞仁黃連紫金皮。若表證已退。大便燥實涼膈。

解毒加瓜蔞仁紫金皮枳殼桔梗赤芍又宜於腫處
鍼刺出血若半表半裏柴胡桔梗加蔞仁紫金皮赤

腫處

芍

紫金皮網目印中甘附

結陽傷寒第四十二

結陽者肢腫也諸陽脈不行陰府留結或熱爲四肢
腫痛也萬全木通散五苓散八正散

結陰傷寒第四十三

結陰者便血也陰氣內結不能通行血氣無宗滲入



腹中則下血也。四物阿膠湯。三黃補血湯。桂附六合

湯。

血風證第四十四

婦人血風證。因崩漏大脫血。或前後俱去。因而涸燥。其熱未除。循衣摸牀。撮空閉目。不省人事。揚手擲足。搖動不安。錯語失神。脈弦浮而虛。內有燥熱之極氣。粗鼻乾上下通燥。此爲難治。生地黃連湯治之。男子去血過多。亦有此病。此湯妙不可言也。



熱入血室第四十五

婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而瀉之婦人中風七八日得寒熱發作有時經水適斷此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之婦人傷寒發熱經水適來晝則明了暮則譫語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上中二焦凡陽盛譫語如



鬼狀宜下此熱人血室不可下恐犯胃氣不可發汗
恐犯上焦衛氣不可刺期門恐犯中焦但守之待經
行盡熱退血去而自愈矣陽明病下血讞語者此爲
熱入血室但頭汗出者刺期門穴隨其實而瀉之識
然汗出則愈啟元子云衛爲血海諸經朝會男子則
運而行之女子則傍陽而止之皆謂之血室凡熱入血
室女子並用小柴胡湯加生地丹皮紅花歸尾枳殼
香附主之男子輕用犀角地黃湯重用桃仁承氣湯

主之若行湯遲則熱入胃令津液上焦中焦不行而
成血結胸須刺期門可也有下證與桃仁承氣相似
者四順飲子 當歸 大黃 赤芍 甘草

妊娠傷寒第四十六

經曰婦人重身毒之奈何岐伯曰有故無殞亦無殞
也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死凡妊
婦傷寒大要安胎爲主兼用傷寒藥爲當不可輕用
發表攻裏之藥以傷胎氣宜汗者冲和加四物蘇葉



葱頭柴胡主之宜下者酒製大黃主之宜和解者小
柴胡去半夏加四物主之宜溫者炒製薑桂必如黃
連甘草兼用沉香隨之外用護胎法

伏龍肝 井底泥 青黛 各等分調塗於臍上

二寸許如乾再塗以保胎孕也。妊婦忌藥蠚斑水
蛭及蟲烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛
膝薏苡與蜈蚣三稜代赭茺花射大戟蛇脫黃雌
雄牙硝芒硝桂丹皮槐花牽牛皂角同南星半夏

與通草瞿麥乾薑桃仁通硼硇乾漆蟹甲爪地膽
茅根胡粉同

婦人傷寒發熱四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不得
往來者桂枝紅花湯

桂芍紅花甘草末

產後傷寒第四十七

產後始生氣血俱虛外失于衛護內無主持最宜調
養故曰胎前宜養血安胎產後宜大補氣血雖有雜
證以末治之若產後患傷寒妄用汗吐下之法必變

鬱冒昏迷。肉瞞筋惕。四肢厥冷。或大便閉結不通。或等証。

下利不止者。用八物湯加減治之。茯苓乾薑。乃爲主。

藥不可少也。凡產婦發熱。脈虛大無力。內無痛者去

血過多。或產時用力。或早起勞動。乃血虛發熱耳。用

四物湯赤芍加芩木參去芍藥者。以酸伐生氣也。加

參木芩者。以淡味滲泄其熱也。如大熱不止。加煨乾

薑神效。蓋乾薑辛熱。能引血藥入血分。以補血。引氣

藥入氣分。以補氣。有陰長陽生之妙。又產婦昏沉不

醒者亦用四物加參术苓乾薑治之。凡產婦發熱惡寒。腸肋脹滿。大小腹有塊作痛惡路不盡。乃瘀血發熱耳。四物湯加紅花桃仁立胡靈脂丹皮香附青皮乾薑官桂酒水各一種。黑豆一撮。後磨木香入童便薑汁溫服。取下瘀血爲效。又產婦瘀血上衝。昏暈不醒者。亦用四物加紅花桃仁靈脂丹皮薑桂治之。凡產婦惡寒。發熱。嘔氣作酸。惡聞食臭。胸膈飽悶。右關脈緊盛者。乃停食發熱耳。用治中湯加當歸川連神

鞠山查砂仁治之。凡產後發熱惡寒。乳閉脹硬疼痛者。乃蒸乳發熱耳。但令產婦自揉其乳。汁下竅通熱。自除矣。凡胎產數證。俱有發熱惡寒頭痛。實非傷寒也。若誤治之。殺人甚速。故產後雖有寒熱疼痛。及口眼歪斜。手足搐搦者。乃血虛所致。不可作風寒病治之。若果產後不謹。虛中入風者。用四物湯加防風荆芥。白芷。殼蠶人參。乾菖香附。烏梅主之。又有產後感冒風寒。發熱惡寒。頭疼體痛。脈浮緊。表證宜汗之。四

物加羌活。蒼朮。白朮。乾薑。蘇葉。山梔。少佐葱頭。若自汗去。蒼朮。蘇葉。加白朮。若熱邪傳裏。燥渴大便不通。脈沉實者。輕則蜜導。重則四物加柴胡炒黃芩。大黃微下之。就用四物加乾薑少許。大用參朮。以溫補其氣血。若邪傳至半表半裏。寒熱嘔而口苦。脈弦數者。四物合小柴胡湯主之。

溫病傷寒第四十八

溫病者。冬月伏寒之所變也。冬月伏陽在內。感寒不

卽病伏藏於肌膚之間。至春時溫氣將發。又受暴寒。
故春變爲溫病。旣變之後。不得復言爲寒矣。又傷寒
汗下後。過經不解。亦名溫病。並不可發汗。蓋過經而
發。不在表也。已經汗下。亦不在表也。經曰。不惡寒而
渴者。蓋言溫病也。不惡寒。則病非外來。渴則明其熱。
自內達外。因無表證明矣。溫病之脈行在諸經。不知
何經之動。隨其經之所在。而取之。如太陽病。頭痛身
熱。汗後過經不愈。診得尺寸俱浮者。太陽病溫也。如

身熱目疼。汗下後過經不愈。診得尺寸俱弦長者。陽明病溫也。如脇腹痛。汗下後過經不愈。診得尺寸俱弦者。少陽病溫也。如腹滿嗌乾。過經不愈。診得尺寸俱沉者。太陰病溫也。如舌乾口燥。過經不愈。診得尺寸俱微沉者。少陰病溫也。如煩滿裏縮。過經不愈。診得尺寸俱微緩者。厥陰病溫也。要在隨其經而取之。如發斑。乃溫毒也。節菴曰。太陽溫病者。羌活沖和湯。陽明病溫者。解肌湯合葛蘇散。加蒼朮。少陽病溫者。

加柴葛葛白蘿蔔。自汗者去葛。加桂枝芍藥。若汗下兼行加大黃。芩。辰。柏。甘草。新陳。

小柴胡合芍蘇散兼有太陽者人參羌活散兼有少陽者。明者羌活散加葛根芍藥溫病傳進三陰治法與傷寒同惟發表不與傷寒同蓋因春時溫氣而發非寒初傷於表也故宜辛涼之劑解之凡溫病發於三陽者多發於三陰者少若發於陰必有所因也或因飲食內傷而得之或因慾事先傷腎經而得之治例與傷寒同凡壯熱脈浮大有力可治細小者難治以溫病大熱滾滾脈小足冷者多死也三月得此病者為

晚發治與傷寒溫病同

熱病傷寒第四十九

熱病者。冬月伏寒之所變也。冬月伏陽在內。感寒卽病。伏藏於肌膚之間。至夏時暑熱將發。又受暴寒。故夏變爲熱病。旣變之後。不得復言爲寒矣。凡熱病所起所因。所感所發。證脈治法。並與溫病同。凡熱病一二日。瀉利腹滿。煩熱甚者死。三四日。神昏譏語。熱甚。脈小者死。五六日。舌本焦黑。燥渴者死。七八日。吐



中華書局影印

中医药大学图书馆版权所有

衄下血燥熱脈大者死八九日發瘡兼昏沉者死凡
熱病脈沉伏細小結促皆難治熱不得汗脈暴急者
亦難治也已得汗而熱反甚脈暴急者死也

秋涼傷寒第五十

白露至秋分行坐卧露水間寒客皮膚名秋涼傷寒
其脈濶濶者中霧露故也

冬溫傷寒第五十一

冬有非節之暖名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬

溫復有先後更相重沓亦有輕重藜麌湯大渴瓜葛
湯咽痛甘桔湯斑疹化斑湯卽白虎湯溫疫通用取
毒散傷寒無汗脈浮緊冬溫無汗脈不浮也

傷寒補天石卷上終

