

卷四

備用要方

醫通番沙論 附

藥性便覽

痧證彙要卷四

太倉孫玉鶴隄編輯

青浦何其偉書田校閱

備用要方

防風散痧湯 治痧有因於風者

防風

陳皮

細辛

銀花

荆芥

枳殼 各等分

頭面腫

加薄荷
甘菊

手足腫

加歲靈
倍銀花

腹脹

加大腹皮
厚朴

痰多

加貝母

寒熱

獨活
柴胡

吐不止 加童便

小腹脹痛 加青皮

血滯加茜草
丹參

咽喉腫加山荳根
射干

食積腹痛加山查
葡萄

心痛加蓬朮
延胡索

面黑血瘀也
蘇木紅花

口渴加花粉
薄荷

赤白痢加檳榔
荆芥

穢觸加藿香
薄荷

放痧不出倍細辛蘇木
桃仁荆芥

水二鍾煎七分稍冷服

荆芥湯 治痧有鬱氣不通者

荆芥 防風各一錢
連翹三分 陳皮

青皮

連翹各八

食不消

加山楂
葡萄子

有積

加枳柳
桃仁

血壅

加紅花
桃仁

鬱悶

不舒加細辛
枳實

大便不通

大黃加木通

小便不通

澤瀉加桑皮

咳嗽

加桑皮
鈴子

煎服同上

陳皮厚朴湯

治癆有因於氣阻者

陳皮

紫朴

山查

烏藥

心煩熱

去川芎
加黑山梔

痰多

加白芥子
貝母

氣壅

加香附
蓬朮

食積

加蓬朮
稜

暑熱

加香薷
紫朴

喉痛

去川芎
加薄荷

射干

六力子

青皮

分等

痰多

加貝母

白芥子

血瘀

加香附元胡

索

口渴

加薄荷花粉

桃仁

痧筋不現

荆芥

細辛

頭汗

加大黃

枳實

稜朮湯 治痧因食積者

山稜

葛子

蓬朮

青皮

烏藥

枳榔

枳實各一錢

煎服 同上

藿香湯 治痧因穢氣者

藿香

香附

各四分

薄荷 七 分 枳殼

山楂

連翹

各一錢

薄荷湯 治痧因於暑者

薄荷

香薷

各七錢

連翹

各一錢

紫朴

銀花

木通

各七分

煎服同上

紫蘇厚朴湯 治痧有暑脹不已者

紫蘇

香薷

紫朴

枳殼

紅花

青皮

陳皮

葡萄

山查等分

煎服同上

防風勝金湯 治痧因於食積血滯者

防風

烏藥

桔梗

枳殼

元胡索各七分

葛子二錢

梔榔

銀花

山查

連翹

赤芍各一錢

煎同上稍冷服

紫朴湯 治痧有食氣壅盛者

紫朴

小查

葛子

山稜

蓬朮

枳實

連翹

青皮

陳皮 細辛等分

煎服同上

必勝湯 治癥因於血實者

紅花

香附各四分

桃仁去皮六

大黃

貝母

山楂

赤芍

青皮

五靈脂各一錢

煎全微溫服

獨活紅花湯 治癥因於血鬱者

獨活

紅花

桃仁去皮六

蒲黃

元胡索

白蒺藜

炒為末

烏藥各一錢

香附

三分

枳殼

七分

煎服同上

射干兜鈴湯

治癆似傷風咳嗽

射干

桑皮

兜鈴

薄荷

元參

花粉

枳殼

甘菊

銀花等分

煎同稍冷服

嗽甚加童便飲

當歸枳殼湯 此養血和中之劑

歸身

山查

枳殼

紅花

赤芍

青皮

茜草

連翹

丹參

續斷

各一錢

煎全微溫服

荆芥銀花湯

此治血滯之劑

荆芥

紅花

茜草

丹皮

銀花

赤芍

各一錢

香附

烏藥

白蒺藜

去刺搗末八分

煎服同上

桃仁紅花湯 此治血結不散之劑

桃仁

去皮尖

紅花

蘇木

各一錢

青皮

八分

烏藥

四分

獨活

六分

白蒺藜

去刺搗末一錢

二分

煎服同上

紅花湯 此治血痰之劑

紅花

蒲黃

青皮 錢各一

香附四分

貝母二分

枳殼六分

煎服同上

清涼至寶飲 此清痧熱之劑

薄荷

地骨皮

丹皮

黑山梔

元參

花粉 等分

細辛 倍加

煎同稍冷服

如聖散 治痧有咽喉腫痛

牛蒡子

蘇梗

薄荷

甘菊

銀花

川貝母

連翹

枳殼錢各一

桔梗

五分

烏藥

四分

水煎微溫加童便冲服

寶花散

此治痧之仙劑

麝金

一錢。凡方中用此味者不細辛三
可用薑黃代後有藥性當閼細辛兩

降香

三分

荆芥

四分

錢

共為細末每服三匙清茶調稍冷服

沉香

麝金散

此治痧氣寒凝之劑

沉香

木香

麝金各一錢

烏藥三錢

降香

二錢

細辛

五錢

共為細末每服三分砂仁湯稍冷服

圓紅散

治血鬱不散

沒藥

置箬內放瓦上炭火炙去油為末三錢

細辛

四錢

桃仁

去皮尖

元胡索

各一兩

降香

三錢

白蒺藜

一兩

搗去刺

共為細末

每服一錢紫荆皮湯溫服

化毒丹

治痧痰氣壅盛

銀花

薄荷

各一兩

細辛

枳殼

各五錢

川貝母

二兩

共為末每服六分細茶稍冷服

三香散 治過飲冷水癆不愈者

木香 沉香

檀香等分

共為細末每服五分砂仁湯微冷下

三香丸 治過飲冷水痞悶者

木香

沉香

檀香各五錢 砂仁

葛子各八錢

五靈脂六錢

共研末水發為丸白湯微溫下
救苦丹 此治痧氣鬱悶之劑

枳實

葛子

各一錢

金錢

烏藥

連翹各八錢

共為末清茶稍冷下

冰硼散 治炒咽喉腫痛

硼砂

天竹黃

各二錢

硃砂

元明粉

厘八

冰片

三分

共為末吹入喉中

牛黃丸 治痰涎喘急

胆星

天竹黃

各三錢

雄黃

五分

硃砂

牛黃

麝香

各四分

湯稍冷服
共為末甘艸水為丸如梧桐子大每服二丸淡薑

細辛大黃丸 治癆大便乾結氣血不通煩悶壅盛昏

沉者

細辛

大黃

枳實

紫朴

麻仁

青皮

桃仁

去皮尖等分

共研末水發為丸每服一錢重者二錢再重者三
錢淡薑湯稍冷下

和脾宣化飲 治癆氣食結胸中飽悶腹內絞痛

廣皮

葛子

細辛

前胡

大腹皮

去黑翳黑
荳湯泡洗

麥芽

各一錢

山楂

二兩煎
湯代水

消癆解毒散

治癆後牙痛

天花粉 兒茶 官硼 青黛

水澄各一錢

人中白 錢三 薄荷 甘艸 黃連各五分

牛黃 珠子各一兩 前茶五分 氷片一分

研細以無聲為度先用濃茶拭淨去其腐肉吹之

牛黃八寶丹 善化痧後諸般惡毒惡瘡此丹有靈氣

雄黃 透明元參各五錢 瓦上焙

羌活炒

川連土炒 羚羊角 犀角

川貝母

淨炒

乳香出盡汗沒藥各三錢 青黛水澄琥珀各二錢

水飛

真珠分四牛黃冰片各二錢 分五錢

右十五味如法製成為細末聽用外將揀淨銀花二兩

甘菊一兩 甘草一錢 胡桃肉二兩 紫花地丁二兩 長流水五

五

碗砂鍋內慢火煎至及半取汁將查絞乾以綿濾

淨桑柴火熬膏入煉熟老蜜盞許再熬至粘筋將

前藥和丸每丸三分年幼者一丸年長者二丸每

日蜜湯調服

活絡透毒飲 治痧後熱毒流連餘毒在所不免却不易來者以此湯預活之

羌活

紅花

荆芥

牛蒡子

木通

當歸

牛膝

蟬退

青皮

連翹

等分

水煎溫服

忍冬解毒湯 治痧後餘毒竊發者

金銀花 土貝母 甘菊 荆芥穗

牛蒡子 紅花 甘草 紫花地丁

連翹等分 胡桃肉一枚

水煎溫服

撥雲散 治痧後餘毒在肝兩目通紅甚至起障者

生地 黃連 木通 荆芥穗

穀精艸 甘艸 赤芍 羚羊角

大黃(二分至六分)

木賊艸 甘菊

羌活

銀花

望月砂

賽金化毒散

治癆後熱毒流連疼痛不已發癰發疔者

乳香

沒藥各出汗

川貝母去心炒

雄黃

天花粉

生用黃連各一錢

甘艸七分

生炒

赤芍二錢

牛黃二分

大黃二錢半

半晒

冰片一分

珠子四分

研至無聲為度

共為極細末用蜜湯調服

加味活命飲

治一切癆後留滯熱毒發為腫毒疔瘡

穿山甲

土炒銀花

大黃

錢各三

歸尾

陳皮各一分一錢 花粉

薄荷 甘草節

生地

白芷 防風

貝母

乳香各一錢

皂角刺

五分沒藥

赤芍一錢

毒在背

加皂角刺一錢五分

毒在面

加白芷一錢五分

毒在胸

加瓜萎仁二錢

毒在頭面手足

加金銀花二錢

水二大鍾煎八分空心溫服

忌醋併諸毒物禁房事

參歸化毒湯

治癰後餘毒流連氣血虛不能即潰以

此化毒托出之

人參

當歸

黃芪

甘艸

冰花

牛膝

紅花

貝母

山查

皂角刺

白芷

等分

水二鍾加胡桃肉一個煎七分空心溫服

奏凱和解飲 痘退之後調理和解

銀花

土貝母 牛蒡子 山藥

白扁豆

山查

荆芥

當歸各一錢

人參

甘草分四分三

水二鍾加核桃肉一個蓮肉六粒煎七分空心溫服
參苓歸朮散 痘氣退盡氣血虛弱者以此補之

人參

白茯苓 當歸

白朮

白芍藥

陳皮

黃芪

川芎

熟地

甘草

水煎空心溫服

沉香丸 治痧氣急胸腹脹痛迷悶昏沉

沉香

檳榔

各五錢

葛子

枳實

厚朴

各七錢

山稜

蓬朮

廣皮

天仙子

即朱蓼子各六錢

白豆仁

烏藥

各四錢

木香

三錢

薑黃

五錢

水發丸

如綠豆大每服三十九砂仁湯稍冷下

沉香阿魏丸

治痧氣壅血阻昏迷不醒癥身沉重不能

轉側

五靈脂

廣皮

各一
兩

青皮

天仙子

薑黃

蓬朮

山稜

各七
錢

枳實

六

白荳仁

烏藥

各五
錢

木香

沉香

各二
錢

阿魏

一
錢

如前稍冷湯下

丁香阿魏丸

治痧食積成塊痛而不已推上移下月
夕叫喊病久不愈者

葛子

五靈脂

查肉

神麴

青皮

枳實

各一
兩

蓬朮

厚朴

各八
錢

山稜

梔榔

各七
錢

白豆仁

烏藥

薑黃各五錢

木香

沉香各三錢

阿魏二錢

丁香一錢

水發為丸如綠豆大每服十九丸紫荆皮湯溫下

阿魏丸

治食積壅阻痧毒氣滯血凝疼痛難忍頭面

黑色手足俱腫胃腹脹悶

延胡索

蘇木

五靈脂

天仙子各二錢

蓬术

廣皮

枳實

山稜

厚朴

梔榔

薑黃各七錢

烏藥力錢

降香

沉香

各三錢

阿魏二錢

香附四錢

蜀子

一兩

丸法如前每服十五丸砂仁湯稍冷下

蘇木散

治癰毒血瘀成塊堅硬突起不移者

蘇木

二兩

紅花

延胡索

白蒺藜

搗去刺

桃仁

去皮尖各一兩

獨活

三錢

五靈脂

七錢

降香

薑黃

赤芍

各六錢

大黃

五錢

烏藥

山稜

蓬术

陳皮

青皮

皂角刺

香附

酒炒四錢

共為細末每服二錢溫酒下

蒺藜散

治食積瘀血癰毒凝滯成塊日久不愈

白蒺藜

搗去刺二兩

澤蘭

薑黃

薑子

查肉

茜草

土貝母

淨各一兩

延胡索

五靈脂

各一兩

梔榔

錢七

銀花

八錢

烏藥

青皮

各六錢

桃仁

去皮共一兩

五錢

共為末每服一錢溫酒下

探吐法

用鹽湯或礬湯稍冷服令吐去所食以解痧

毒所阻必須多飲則吐

當歸枳殼湯 消食順氣和血之劑

歸尾

枳殼

赤芍

各一錢

山楂

薑子

各二錢

紫朴

八分

水煎微冷服

清氣化痰飲

治痧痰氣壅塞之劑

貝母二錢

薑黃一錢

各

細辛

橘紅各八分

青皮

紫朴

各七分

荆芥六分

烏藥

五分

蒲黃飲

治痧毒散瘀引火下行之劑

牛膝三錢

獨活

枳殼

連翹

桃仁去皮

澤蘭

赤芍

山查

薑黃

蒲黃各一錢

水煎微冷服

烏藥順氣湯 治痧氣內攻之劑

山稜

蓬术

葛子

白芥子

延胡索

各一錢

枳殼

青皮

烏藥

各八分

紅花

七分

香附

四分

水煎稍冷服

降香桃花散 治痧氣中腎之劑

降香

五錢

牛膝

二兩

桃花

紅花

大紅鳳仙花

各七錢

白蒺藜

一兩

共為末黑砂糖調童便沖服

木通湯 治痧毒結於膀胱之劑

牛膝

三錢

丹皮

細辛

連翹

銀花

澤蘭

白芨

蒲黃

木通

延胡索

各一錢

水煎加童便微溫服

枳實大黃湯

治痧毒結於大腸之劑

赤芍

青皮

枳實

桃仁去皮

大麻仁

銀花

槐花

黃芩

炒酒

連翹

各一錢

大黃

三錢

水煎微溫服

連翹薄荷飲

治痧食積氣阻之劑

香附

葛子

枳榔

山查

陳皮

連翹

薄荷

等分

木香

二分磨冲

水煎加砂仁五分稍冷服

荆芥薄荷湯 治癆氣血阻塞之劑

荆芥

炒黑

赤芍

等分

薄荷

白蒺藜

搗去刺爲末

青皮

陳皮

等分

水煎微冷服

失笑散

治癆後毒氣退盡尚留瘀血在脣脛間作痛

蒲黃

五靈脂

等分

共爲末每服二錢酒下

絕癆方 治數患癆症必癆症已愈然後可服

甘草

明礬

食鹽

各一兩

川烏

一錢

乾薑

三錢

共爲細末米飯搗爲丸每服五分白湯溫下新犯
癆者一二服即愈久犯癆者十服全愈不復發矣
蓋用甘艸以助胃用乾薑川烏以充胃用明礬以

解毒用食鹽以斷痧誠為良方但烏薑性熱恐人
有宜有不宜故每服止用五分為則惟取其能絕
痧根焉爾若人屬虛寒者必加倍多服方能有效
補原本未列方

加味五苓散

治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉及膀胱積熱

脫積熱便秘

猪苓

茯苓

澤瀉

蒼朮 淡浸

車前

木通

胃苓湯

治中暑傷濕夾食腹痛泄瀉及口渴便秘

猪苓

茯苓

澤瀉

蒼朮 淡浸

厚朴

陳皮 去白

六和湯 治伏暑霍亂吐瀉或寒熱或痢疾

厚朴

一錢
五分

赤苓

霍香

扁豆

蒼朮

泔浸

木瓜

各一錢

半夏

人參

杏仁

甘艸

各五分

中暑

加香薷

感寒

加紫蘇

藿香正氣散

治風寒傷食頭痛寒熱及霍亂吐瀉

藿香

紫蘇

白芷

茯苓

腹皮

各三錢
桔梗

紫朴製

半夏麴

白朮

土炒陳皮各二錢

甘艸一錢

每服五錢

此方與六和湯俱以薑棗為引痧症勿輕用

續補備用方

祛瘴辟瘟丹

治感受時行不正之氣瘟疫痧脹老幼

男婦皆同

厚朴

蒼朮

羌活

防風

陳皮

牛蒡子

枳實

香附

梔榔

白芷

藿香

川芎

細辛各四分

甘草三分

八分

加薑葱煎服

無汗加蘇葉

薄荷

口渴加葛根

天花粉

身重汗出

加防已石羔

溫瘧加柴胡半夏

遍身疮瘡

加蘭葉大黃姜桑

大便閉結

加大黃

肌肉發紅紫黑癥

加元參大青連翹

頭痛

加川芎

先中溫又中暑

加白芍香茹

風溼身體灼熱

加黃芩連梔子

咳嗽唾涕頭目昏眩

加荆芥金沸草

加減聖功散

治傷寒時疫風濕陰陽兩感表裏未辨

或外熱內寒或外寒內熱肢節拘急頭

項腰脊疼痛發熱惡寒嘔逆喘咳鼻塞

身重及食飲生冷傷在胃脘胸膈飽憊

腸脇脹痛心下痞結手足逆冷腸鳴泄

瀉水穀不消小便不利等證

厚朴

防風

蒼朮

藁本

藿香葉

紫胡

獨活

澤瀉

石菖蒲

枳殼

細辛

錢各五

枳榔

元胡索

陳皮

砂仁

葡萄

草豆蔻

十個去殼

炒各

八錢

共為粗末，每服用五錢，水一盞半，煎一盞，去渣溫服，不計時候，取遍身微汗即愈。時氣不和，空心飲之，可辟邪疫。○此方原名聖散子，即東坡治杭時見民多癘疫，設劑投治，全活者萬餘人。今有痧證相類，療之無有不效。

白虎湯

治溫病身熱，自汗口乾，脈來洪大，霍亂傷暑

發痧神妙

石膏

五錢
煨熟

知母

三錢

甘草

一錢

粳米

一撮

加竹葉名竹葉石膏湯

病在陽明肌肉，則巨陽之表邪已解，故外不惡寒，又無頭痛身疼之症，但自汗而發熱也。經曰：熱淫所勝。佐以苦甘，以知母甘草解其熱。蓋熱則傷氣，用粳米甘草之甘，以益其氣，且治不眠煩躁也。煩者肺躁者腎也，以石羔為君，佐知母之苦，以清腎之源。因石羔體堅而重墜，知母沉寒而走下，故用

米草之甘以緩之使不速達於下焦也白虎金神
司秋者也暑火至秋而衰且知母苦寒又能保太
陰肺金之氣故名白虎以為三陽經一解表藥耳
雖是三陽解表藥切記有汗當施無汗當戒蓋無
汗者必須柴葛升麻以解表邪不可見其身熱誤
用白虎以鬱遏其熱使不能外越也

大羌活湯此解利兩感神方也若痧證與此彷彿可

加減用之

羌活

獨活

防風

防已

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

細辛

炙草

等分

知母

川芎

生地倍用

每服共兩半煎一大鍾熱飲之不解再服

經云兩感者死不治一目太陽與少陰俱病頭痛
發熱惡寒口乾煩懣而渴太陽者府也自背俞而
入人所共知少陰者藏也自鼻息而入人所不知
也鼻氣通於天故寒邪無形之氣從鼻而入腎為
水水流濕故腎受之又云天之邪氣感則害人五
臟以是知內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲
下之則有表表裏既不能一治故死矣然所稟有

虛實所感有淺深，虛而感之者必死，實而感之淺猶或可治。

潤下丸 治大腸燥實，二便秘結，痧毒壅盛者。

大黃

酒製四兩炒頭末二兩

牙皂煎汁丸鳳仙子大，每服一錢，多至二錢止。燈心湯下不獨潤腸，兼利小便。疑分量太重參閱下大黃條

藥性便覽

藥宜

烏藥 善行周身之氣，凡痧氣阻滯者，得此無處不到。用三分至五分。

卷四
紅花銀花茜草 治血解痧用六分至一錢

葛子山楂麥芽神曲 痘為食壅取其善消而不暴也
大黃 大便不通痧氣閉塞非此不能攻而下之用五
分至一錢五分允宜為丸以備急用若痧脹之極必
須急服此以攻之丑黃等分粥丸三分稍冷湯下
陳皮青皮 陳行痧氣青伐肝氣痧氣壅阻不行者非
此不利用六分至一錢

枳殼枳實 破瘀氣驅毒氣除脹氣下食氣積滯壅塞
者非此不開但枳殼性緩枳實性速各有所宜用五
分至一錢五分

桃仁 破瘀活血，瘀為血阻，非此不流，瘀為血滯，非此不順，去皮而用，為皮味澁而阻血路也，用七分至一錢六分。

秦艽 活血驅風，消瘀毒，筋骨疼痛，壯熱不清者，非此不解，用三分至六分。

桔梗 入肺經，為諸藥之舟楫，其性上而復下，故能引積殼破胸中最高之氣，用六分至八分。

香附 行血中之氣，恐其香燥，須用便製，欲其行血，必要酒炒，取其斂血，在于醋炒，用三分至八分。

木香 瘡後心腹疼痛不休，胸脇脹悶，寒凝氣滯，得此

而抒若痧始發忌用用一分至三分

砂仁 順氣開鬱散痧消食此始終可用之要藥用三分至一錢

穿山甲 土炒為末透痧消痰破瘀托毒善走經絡引諸藥所不能到者即到所犯經絡血分之所用一分至五分

童便 解痧毒消痰降火最速定痛治血痢痢下血水諸藥莫及

天蠍 能治血分之痰佐山甲透經絡以破瘀毒用須炒末自一分至二分

荆芥 透肌解表散痧毒。痧筋隱隱不發者，非此不現。

用四分至八分止。

防風 透肌發表為臣使之助。寒熱往來，痧毒壅滯，鬱遏不發者，非此不清。用三分至七分止。

細辛 開竅破血，散痧之要藥也。用三分至五分。

痧證寒熱不由外感。其毒從鼻吸而入。搏擊肌表。荆芥細辛善能透竅。使由竅入者亦由竅泄。防風為使。取為透竅之佐。不比麻黃羌活專主發表。反有升發

火毒之慮也。

連翹 消痧毒解諸經火邪。清熱而不滯。治痧之要藥。

也用七分至一錢。

薑黃 其性雖溫，善能消痰，下氣破惡血，用二分至四分。

川鬱金 入心經，散鬱消瘀，痧毒攻心者，非此不能立奏其功，方中所載鬱金，不得以價貴，謂薑黃亦能下氣消瘀而代之也。

貝母 川者專消熱痰，土者兼破瘀血，用一錢至一錢五分。

白芥子 脇下之痰，非此不達，用四分至六分。

雄黃 牛黃 胆星 天竹黃 消痰丸中宜用。

麝香 開竅散瘀功亦甚大

當歸 頭身尾各有所宜用須斟酌

紫胡 和解表裏專治少陽膽經寒熱往來用六分至

一錢

乾葛 散陽明胃經之邪兼能解渴用六分至八分

前胡 痰風消痰治嗽表熱者宜用用六分至八分

桑皮 治嗽瀉肺用四分至八分

兜鈴 瀉肺嗽用三分至五分

杏仁 瀉肺潤腸胃利氣消痰涎去皮尖用四分至一

錢

麥冬天冬潤肺消痰一治其本一治其標去心用七分至一錢五分

山楂蓬术食積心疼痧毒滯痞悶者宜用六分至八分

五靈脂善消宿血血塊凝滯不散非此不破用五分至八分

龜甲去兩腸酥炙為末破宿血勝於靈脂在胸者用上半截在下者用下半截

蘇木敗惡血新瘀者莫及用五分至一錢五分延胡索活血行氣氣血凝滯作痛用五分至一錢

香薷

通上徹下利水氣治暑氣之要藥用五分至一錢

紫朴

寬中治嘔消痰下氣用六分至八分

牛膝

活血引瘀氣下行用八分至二錢

薄荷

辛涼利竅稍腫解毒清氣清喉用五分至一錢

紫蘇

疎風順氣身熱當用用三分至六分

角刺

透毒能引諸藥至於痧毒血癥之所立奏其功

牛蒡子

解痧毒清喉痧中要藥用七分至一錢

沒藥

止痧痛破瘀血用四分至一錢

晚蠶炒

解痧毒治熱

阿魏 破積聚逐惡血其功甚大

大麻仁 潤大腸腸胃燥結者宜用

獨活 發散治熱其性至頸而還力薄不能遠發且可

活血解痧毒是治痧要品

芋艿 治痧熱解毒有痧患者食之甘美

黑砂糖 活瘀血解痧毒故瘀血作痛者得此則安

食鹽 解痧毒定痛用之吐去新食

明礬 解痧毒消瘀定痛用之探吐宿食甚妙

其中分數如遇西北強壯人當加一二三倍不可執

赤芍

血熱發癧者可用

丹參

有去癧生新之妙

劉寄奴

散癧血解痧毒

紫花地丁

解毒化癧

陳香圓

破結氣可用

澤蘭

解痧毒

地骨皮

退熱除蒸止陰虛勞熱骨蒸

石膏

病痧暑天最多自汗大渴用白虎湯即解

板藍根

即靛葉普濟消毒飲中以解瘟毒

小青

一名血見愁清熱除蒸最速

梅花 得一元之氣治癆上品取半開者紙籠懸當風處陰乾

桃花 苦平下宿水除痰食消積聚利二便取貯之法同上

甘菊花 清心解毒葉亦可用

天仙子 即紅蓼子治癆塊多用亦能去痞積
益母草 女人胎產俱宜

梔子 涼心去火發癩及癆根紅者可用

青黛 治癆至妙之品

自赤芍以下從徐氏本補

丹皮

瀉血中伏火，破積血，通經脈，和血涼血。

蒲黃

性滑，行血消癥，通經脈，利小便。

白蒺藜

散肝風，瀉肺氣，破血消癥，通乳墮胎。

降香

辛溫辟惡氣。

金鈴子

即苦棟子，苦寒能入肝，舒筋能導小腸膀胱

之熱，因引心包相火下行，通小便。

浮石

降火軟堅，止渴止嗽，通淋，除上焦痰熱。

以上從王氏本補

案王氏本云：細辛極散真氣，過服即能殺人。壯實而痧重者，多止錢許。老稚單弱，酌減少用。痧輕者，

可勿用兜鈴清熱降氣但肺虛挾寒者大忌即貝母亦非風寒濕滯諸痰症所宜

射干

瀉火解毒散血消痰治咽痛利大腸

山荳根

瀉心火消腫止痛治喘滿熱咳腹脹

白扁豆

調脾暖胃通利三焦降濁升消暑治濕

暑之止渴止瀉

脾胃能消

續斷

補肝腎通血脉理筋骨破瘀血治腰痛

桑寄生

益血安胎治崩漏

石斛

補脾胃平胃氣除虛熱

以上從原方中補

樟木

辛溫無毒治中惡心腹痛霍亂腹脹宿食不消

蘆粟

即稷也甘平益氣和中宣脾利胃治霍亂吐瀉

如神按粟即高粱

羊糞

苦平無毒燔之治小兒洩痢腸鳴驚癇

已上新增

宜忌參半

元參

清氣消痰滋陰潤肺但色黑止血痧有瘀血忌用

生地

涼血血熱者可用血瘀者非其所宜

黃連黃芩

冷性凝滯痧中忌用用須酒炒或薑汁製

羌活

痧證忌其發表太過若頭痛或又因受寒而起

更兼痧證欲用之引太陽經止可用半分至二分
川芎 上行頭目頭角骨痛者必需下通血海肝臟不
華者當用一分至三分止恐提痧氣上騰也

檀香 瘴後心腹疼痛不休胸脇脹悶寒凝氣滯得此
而抒若痧始發忌用用一分至三分

乾薑 過服寒冷之水宜少用善散寒氣也若用之不
當亦能助熱毒當忌

木香車前澤瀉 瘴氣鬱阻小便不利在所當求若鬱
熱太重不因小水更在所禁用二分至五分

大腹皮 下氣行水治痞脹稍涉虛者勿用酒洗再黑
大豆汁洗

晒炭
火煨

威靈仙 善走十二經絡，治諸風痰積，浮腫閉結，大走真氣耗血。

瓜蔓 降痰治嗽，蕩熱滌垢，清咽，利腸胃虛，脾泄者忌用。

旋覆花 軟堅下氣，行痰水，通血脉，入肺，與大腸經冷利大腸虛者宜戒。

白豆蔻 利三焦，暖脾胃，散滯氣，消酒積，若火升作嘔，因熱腹痛，氣虛諸症宜禁用。

梔榔 破滯散邪，消食行痰，瀉胃中至高之氣使之下。

行氣下陷者勿用

藥忌

參耆白术山藥 用之恐補痧氣

甘草 用之恐成痧塊難治在所忌用

茯苓猪苓 恐其滲漏轉實痧氣俱在禁例

升麻 禁用恐提痧氣上升

麻黃 發表太過禁用

肉桂附子吳茱萸 禁用恐助痧毒

木瓜五味子 酸斂忌用

半夏白芷蒼朮 性燥忌用半夏雖治吐要藥獨炒證

用之助火益邪。

藿香 惟取其正氣以治穢解，然亦必痧毒無阻，乃可俟冷飲之。倘腸胃中有食積血瘀，留滯痧毒，用以止

吐適成真毒

下通痧毒
其吐自止

花粉 性沉寒，止渴，痧毒未清者忌用。恐凝滯痧氣。
竹瀝 性寒，忌用。用須薑汁炒方走經絡。
熟地白芍 補血，斂血，痧所大忌。

杜仲補骨脂，枸杞子 即腎痛不可用。

茯神柏子仁，棗仁 即虛煩不可用。

蓴蓉巴戟 尤忌用。

黑丑 通上徹下 痘毒脹滿必須用此於丸散中救人立功 凡破氣之味俱莫能及 但耗散真氣究宜慎用
案木瓜霍亂轉筋必用之品 花粉降火止渴方中間用若蒼朮升麻半夏白芷等於治痧丹丸中用之要亦非所禁也

痧證彙要卷四終

番沙論 張氏醫通內錄出

嘗攷方書從無沙證之名。惟觸犯臭穢而腹痛嘔逆。
世俗以磁器蘸油刮其脊上隨發紅斑者謂之曰沙。
甚則欲吐不吐欲瀉不瀉乾嘔絞痛者曰絞腸沙。近
時有感惡毒異氣而驟發黑沙俗名番沙卒然昏倒。
腹痛面色黑脹不呼不叫如不急治兩三時即斃。有
微發寒熱腹痛麻瞀嘔惡神昏者或濺濺汗出或隱
隱發斑此毒邪焮發於表也亦有發即瀉利厥逆腹
脹無脉者此毒邪內伏不能外發也所患最暴多有

不及見斑而殂者。經謂大氣入於藏府。雖不病而卒死是也。初覺先將紙燃點猝頭額。即以蕎麥焙燥去殼。取末三錢。溫湯調服。重者少頃再服。即安。蓋蕎麥能鍊腸胃。滓穢降氣寬胸。而治濁滯為沙毒之耑藥。但服過蕎麥者。後患別病。藥中有綠礬者。切勿犯之。其毒甚。面黑者急於兩膝後委中穴。砭出黑血。以泄毒邪。蓋驟發之病。勿慮其虛。非此急奪。束手待斃。以此病起於漠北流入中原。故以番沙目之。原夫此病與瘴癘相似。瘴則觸冒山嵐瘴氣。此則觸冒惡毒異。

氣與時行疫癘不殊。但時行則沿門闔境傳染。此則一人驟感死於一日半日之間。不似時行之可以遷延數日也。又此病與傷寒之伏氣相似。伏氣發溫熱毒自裏達表。此則遍身驟感異氣。無分表裏藏府。亦不似中寒暍暑本虛不勝寒暑之暴也。又此病與揮霍撩亂相似。霍亂是客邪與水穀之氣相併。此則正氣暴逆不能與邪相亢也。又此病與關格相似。關格是上下不通。病純屬裏。此則兼有斑沙表證也。大畧與臭毒相類。然臭毒所觸穢氣。此則觸冒惡毒較之。

疫癘尤劇。初起昏憒不省。脉多沉匿不顯。或渾渾不清。勿以腹痛足冷而與溫藥。倘蕎麥一時難得。或服之不應。即宜理氣為先。如香蘇散加薄荷荆芥辛涼透表。次則辟邪為要。梔子豉湯加牛蒡生甘草解毒安中。表熱勢甚。清熱為急。黃芩湯加連翹木通分利陰陽。如見煩擾腹脹。脉來數疾。急投涼膈散。如局方以竹葉易生薑。則毒從下奪。熱劇神昏。雖合三黃。多不可救。煩渴引飲。遺尿速清。陽明白虎湯加葱豉。使毒從表化。以上諸法。然未經誤藥。庶可挽回一二。若

病家疑信未真。慎毋輕治。脫或變生反掌。取咎未便。
曾見一商。初到吳會。暢飲酣歌。席間霎時不安。索生
薑湯一啜而逝。又有朔客到楓。覓混濁浴。忽然眩暈
嘔逆。到舟即斃。繼有醫者。飯後寒熱腹痛。手足逆冷。
不終夕而告殂。更有文學鄉居。到郡作弔。歸即腹痛。
坐立不寧。語言不次。然見客猶能勉力作揖。診之。六
脉模糊。是夜即便捐館。邇來卒患腹痛死者。比比皆
然。雖無斑現。靡不謂之番沙。近有年少新婚。陡然腹
痛麻瞀。或令飲火酒半甌。而腹痛轉劇。旋增癲脹。身

發紅點與蘆根汁得吐迺鮮。復有鼻衄口燥胸腹畧見紅斑。啜童子小便皆安。醫與葱白香豉濃煎仍入童便續續與之得大吐汗出而痊。若斑點深赤毒在血分者濃煎茺蔚少投生蜜放溫恣服取効最捷。以其專下惡血也。或加生菜菔汁半杯總取散血之功。且有誤認傷寒而與發散周身焮紫如雲而死者。亦有誤認麻疹而與檉柳櫻桃核湯咽痛失音而死者。况有停食感冒誤認番沙而與寒涼解毒反減去衣被不慎風寒煩熱躁擾而死者。以其卒犯惡毒異氣。

無以脉診故辨治尤難。是以近世多用火焫砭刺之法。須知因感惡毒異氣而致者。此屬外因。火焫為當。因觸臭毒穢氣而致者。屬不內外因。非砭刺不足以奪其勢。然刺之無血。不可救也。

新安張承恩堂刊