

孫文垣醫案

一

中 國 醫 學 大 成 第 十 二 集

醫 案 類

孫 文 垣 醫 案 上

上海大東書局印行

國史館典藏
由國家圖書館數化



0172503

孫文垣醫案提要

明孫泰來孫明來同編。休寧人。孫一奎爲文垣之子。是編卽所輯一奎醫案也。有三吳醫案二卷。計九十六症。新都醫案二卷。一百十四症。宜興醫案一卷。四十一症。是編不分證而分地。蓋以治之先後爲次序。一奎深究醫理。是篇要旨。具載赤水玄珠。醫旨緒餘二書之中。旁文多於正論。大意主於標榜醫名。而不主於揮發醫理。惟辨症用藥尙合。來源多可師法。故魏之琇續名醫類案亦多採之。

孫文垣醫案 提要

孫序

蓋士君子有濟世之心者。必託經世之術以運之。遇不遇無論也。何也。得時而駕。則宇內之休戚利害。隱然共之。視其患若切於身之疾痛疴癢。不措之。安全不止。此士君子之心得位以行之者也。不幸不獲遇。澤不及物。而心不得施。有志君子。往往懷其道。而隱於醫。故是昔人謂濟人利物。無位者不能。惟醫以救死扶生爲功。故業之者。可以推不忍之心。及於物。而於道有益。有味乎其言之也。然醫豈易言哉。吾聞其宗旨。自內經本草以來。書之藏於有司者。一百七十九家。非博通鉅儒。超悟上哲。顥攻其業。何能探討洞明。其陰陽寒熱靜躁虛實。消息盈縮之奧。而措之行事。夫人之待命於醫。生死攸係。迺以未諳淺薄者嘗試之。其不賊人之命者。幾希。醫以濟人。至於賊人。可不畏耶。此醫之所以難言也。余頃多病。謁告山居。嘗嘆濟物之衷。未措於用。顧思延醫以求濟其身。然而醫之良者。苦不一遇也。迺壬申仲秋。吳君柳溪譚新安海陽有孫君東宿者。醫可謂稱良矣。余亟請而相印證之。耳。其論渢渢乎素難之旨。而表裏夫張、劉、孫、李、丹溪、伯仁諸家。其視余疾也。

未投藥先譚余之經絡色脈機能與受病之自卽勿藥而余病爽然若失及詳察其端方之度沉著之思淵淵之闡奧則杳焉莫竟其涯非所謂深於道而隱於醫者耶余因詰之曰神農嘗百草先天而命之藥黃帝岐伯後天而著之經此天以神授聖以神符不可及矣嗣後若和扁華佗淳于意仲景思邈河間東垣朱滑莫不簾弄化機制人命於掌上術亦神也何今之事是業者不能踵其芳躅耶抑世代之不同也孫君勃然曰古今人非不相及用心殊爾宋儒有言古之仕者爲人今之仕者爲己不佞亦謂古之醫者爲人今之醫者爲己道不同而受病一也夫士君子之視天下與吾身血脈相流通天下病若痼瘍之切身天下安則愜然而無恨雖以道爲藥石者其濟廣以醫爲道術者其濟狹其心一也故古之醫也以救死扶生爲心其業專而用方也慎專則精而造詣入室慎則審而投藥奏功此和扁諸名家所以悉臻祕妙稱神奇今之醫則異是也將以市利非以濟人黃岐以來諸書非不剽竊以資口說迺其心則實胡越一膜視天下率以利之盈虘爲心之重輕人之濟與否若與吾術不相關此何以比古人而接其芳躅哉不佞奎何能造古賢哲之間奧第無愧於此心爾余聞而喟然嘆曰孫君充是心而行是

術。其將大有裨於時矣。雖隱而亦顯也。因次其語而歸之。爰以訂夫業是術者。是爲序。時

萬歷癸酉中秋日吳江孫質庵從龍敬書於符丸草堂

孫文垣醫案 孫序

孫文垣醫案目錄

卷一 二二吳治驗

萬歷龍飛二年吳小峰小川目疾

萬歷甲戌沈中丞案

張孝廉後渠大頭疫

吳江孫行人痛風

鄭都諫公子痘

張文學子心病虛弱

大宗伯董潯陽翁脾胃疾

董龍山夫人便血

馬廚瘡痢併發

吳肖峰令政腹痛

書號

藏

晉

袁第

太

一

三

四

五

七

九

一〇

一一

一三

大光祿龐太夫人寒熱頭痛飽悶	一五
光祿公痰火脇痛	一六
張思軒夫人心痺	一七
馬迪庵公內傷腹脹大小便不利	一八
潘大司馬腸風	一八
馬鳳林內子隱疾	一九
舜田臧公氣虛中滿	二二
金谿令君臧老夫人大頭疫	二二
潘見所公半身不遂	二三
見所公白濁	二三
凌夫人孕	二三
金元岩令眷產後痢	二五
沈別駕夫人產後發熱	二六
吳太夫人白帶	二七
	二八

吳北海令政經行四肢纍纍發塊紅紫

一九

周芻玉白濁

二九

竹匠婦妊娠吐血胸腹脹痛

三〇

李妓夢遺咳嗽

三一

金妓時疫

三二

曹鏗胸鬲不暢

三二

李雙痛風

三三

沈別駕門下老僕三陽合病

三四

蔡中林內人陽明少陽合病

三四

吳九宜先生早晨泄瀉

三五

沈大官左膝腫痛不能起止

三五

沈繼庵下痢脫肛 內人乾霍亂

三六

沈晴岳先生五更耳鳴

三七

潘景宇內人頭痛作瀉

- 臧六老上吐血下瀉血 三七
臧氏婦臍邊痛下痢紅白 三八
丁耀川令堂吐血左脅肛門互換作痛 三九
丁文學令姊暈厥 四〇
金良美咳嗽吐紅潮熱右脇不能臥 四一
倪五娘子口眼歪邪 四二
王祖泉令政頭痛惡寒汗出如雨 四三
溫巽橋子婦帶下 四四
溫一渠內人血虛咳嗽 四五
溫巽橋二令媳產後右脇脹痛白帶如膿 四六
溫天衢病目吐血 四七
張二娘子孕七月嘔吐不止 四八
王敬泉內眷痰嗽腹脹 四九
溫南溪內人大便祕結 五〇

陳春野公令愛丁奚疳症

四六

潘敬齋令媳血下筋膜如手大者一二二桶

四六

張懷赤公早晨洩瀉下元虛寒

四七

臧七房二老夫人痢

四七

蔡樂川令眷頭痛如破

四八

周蘆汀迺眷胃脘痛

四八

卷一一二二吳治驗

王文川令郎內傷發黃

一

施涇陽先生內人痰火

二

屠侍軒尊眷產昏憒不知人事

二

屠學恆乃眷產後作瀉

三

周鑑泉令政傷寒譫語

三

臧顧渚老先生兩耳掀痒

三

- 王南崗咳嗽氣湧 三
張桃津乃政小產後臍下痛 四
陳光祿五更胸膈飽脹 四
溧水令君夫人五更倒飽洩漏 五
李悅齋夫人腹痛譫語如狂鼻衄 五
吳仲峰脾洩 六
張後溪令孫瘡疥發腫 六
張五橋夫人喘嗽 七
方東埜脊骨痛牽引胸腹皆痛 七
張淨宇發熱腹痛洩瀉嘔吐 八
張近川胃脘痛 八
閔文川公肛生一毒膿潰不收口 八
李古愚胸膈飽悶大便溏泄 八
姚惠齋夜多洩瀉 九

姚老夫人右手疼

一僕時疫頭痛發熱

一僕時疫頭痛如破

一僕時疫嘔吐煩躁口渴

馬鳳陽咳嗽內熱

倪二南內人小水不禁

嚴柱史令媳腹中有塊疼痛

陳鹿塘脹風臟毒大便燥結

張道南內人腹痛

張道南尊堂鬲上痰痞而惡心

馬迪庵內人奇痰症

董老夫人眩暉

張裕齋惡寒發呃

嚴老夫人胸膈痞悶

- 王谷泉頭眩洩瀉汗出不止
方東埜兩脇痛.....一六六
- 一婦懷孕內熱咳嗽.....一六六
- 一婦心痛唇紅蟲痛症.....一六六
- 倪二南內人小產後小腹痛暈厥.....一六六
- 倪少南右頰車浮腫疼痛.....一六六
- 倪少南內人經行如崩頭暈.....一六六
- 高仰山內人痔血裏急後重.....一六六
- 姚娘子小腹疼.....一六六
- 張五橋先生令政痰喘咳嗽.....一六六
- 徐文學三泉令郎右脇脹痛.....一六六
- 王祖泉乃眷遍身痛.....一六六
- 費少垣乃眷孕痰喘胎逆.....一六六
- 費一吾令政孕子淋.....一九九

六娘子遍身痛汗大出昏昏如醉

八娘子頭痛咳嗽痰多有血

姚弁山內人胸脇痛

李坦渠令子室咳嗽心痛腰疼

周衡宇咯血痰火作痞

張分守腰膝痠痛

鄭春元頭痛內寒

徐老夫人胸膈痞悶

張麗川咳嗽多痰糞門發癟

陳仰山內人小產二月而血大下

張溪亭乃眷喉中梗梗有肉如炙燭

張溪亭令媳夢亡過祖母打其背

陳茂之勞倦色慾傷寒

陳五山胃脘痛

吳小峰酒積作痛	二五
沈大參痰飲痞滿	二五
王敬泉胸膈飽悶頭暈作吐	二六
張二官傷寒	二六
大司馬令媳產後暈厥發狂	二七
孝廉臧苕泉瘧後作痢	二八
包繼可先生令眷孕而發瘧	二九
張氏婦胎異	二九
吳比部公子病眼	三〇
丘太守令姪筋痿	三一
一書辨下消	三二
韓僉憲令媳怒後夜臥不安	三四
韓老夫人夜來臍腹痛甚	三四
丁春元令郎瘧母	三五

孫令君令媳產後譫語發熱洩瀉

三五

吳東星先生楊梅風毒

三七

潘見所老先生小盛價疳積

三九

凌繹翁痰火吐紅喘嗽

四〇

周鳳亭濕熱壅滯發熱煩躁

四一

周采石濕熱生痰痞悶

四二

又令孫女龜背

四三

閔蜃樓虛損咳嗽令脊痛風奇疾

四三

金寄閒令堂痢而胸膈膨脹

四五

徐中宇之婦汗出如雨昏憒又胸膈要人足踹

四六

金達泉令政孕三月而痢赤白

四六

金元岩赤白痢

四七

金達泉瘧痢交作

四八

金寄閒少陽陽明合病爲瘧

四八

淮陰胡少泉令郎夢遺令愛發熱嗽咳又友人奇疾	四九
吳氏婦隱疾	五〇
染匠之婦腸癰	五一
王祖泉臟毒下血	五二
南都大司馬洪溪洩瀉	五三
崔百原公溼痰風熱病	五四
卷二 新都治驗	
瓊兄內傷飲食外感風邪	一
程龍邱翁每行動卽作熱發渴嘔惡腰與環跳穴常痛	二
汪松崗原傷於酒夜分發熱咳嗽咯血	二
族妹經不行者八十日每飲食入腹卽疼痛吐出迺止	二
孫華野喉痛頰車腫	三
顯兄每辛苦及酒多則咯血數口	三

吳遂兄濕發黃

族姪明之痰火上逆大吐痰沫因而嘔血一涌數椀

四

族嫂程氏肺癰

五

姪熄葉氏身面四肢浮腫

六

族姪孫伍仲善飲好內便小血淋疼痛

七

令眷吐紅發熱

八

亮卿令愛右目紅腫

九

太學少竹眼紅腫脹

一

一僕婦產後惡露不盡腹中作痛

二

程好吾令孫右耳後生毒腫痛

三

華岳令堂右手臂肢節脹痛

四

程兩峰令眷血痢

五

程七護兄臍腹右邊疼痛小水不利嘔吐不進食

六

程社貴兄醉後御色次早胃脘痛極

七

晉
袁第
大
藏
書號

- 汪松崗令眷左脇痛咳嗽內熱 九
贊皇令堂產後左脇痛甚 九
許少峰中風先兆 九
朱宅女眷熱入血室 九
孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡病多夢鬼 九
愛泉傷風咳嗽聲啞右邊不能貼席 九
姪婦戴氏有妊五月忽血大下午後發熱 九
靈岳乃眷胃脘疼頭痛暎舌麻 九
吳人峰先生內人兩脇脹急痛拒胃脘 九
陳鐵兄內人產後腹痛發熱下痢膿血 九
程石洲乃眷因產難子死憂悶小腹有塊作痛復因多食圓眼腹益 九
大脹堅如石大如斗氣促不安 九
程嫗年八旬頭暈脚軟大便洩小水淋瀝 九
程道吾先生令政覽而驚時常暎厥 九

一僕婦瘧疫以勞食復作

程方塘年六十四風癱不能步者三載腿肉盡消

一六

汪省吾瘧三日一發發於夜

一七

汪東之丈七月初旬虛陽口瘡

一八

汪東之令眷姪中咳嗽

一九

吳東渠瘧後虛憊

二〇

吳西源令眷以艱子多鬱思肌肉盡削皮膚燥揭遍身生瘡體如火

二一

族嫂程氏環跳穴邊腫痛寒熱并發不能動止

二二

垣宇瘡後遭跌環跳脫出不能復收

二三

姪孫女周歲發慢驚

二四

程少湖以飲生酒面浮胸脹

二五

吳斗一原有腸風又感風邪發熱多痰腹痛下痢

二六

姪孫二水體甚肥胖患溫瘧疾

二七

堪輿張錫泉先生左脇皮裏膜外疼痛	二四
族姪雲岳偏墜臍腹腰俞脹痛	二四
一婦妙齡感風寒致成鼻淵	二四
程兩峰瘀血發黃吐出穢惡如爛豬肺狀大便色如墨	二四
予表嫂小產後腹痛暈厥	二六
陳士美傷寒熱症漏底	二六
程松逸兄酒疸	二七
仲諫患跨馬癰	二七
一婦咳嗽痰中有紅	二九
族姪春溫鼻衄寒戰	二九
汪氏婦腹脹如斗	二九
仲登陽症作陰	三〇
汪希明性躁痰火咳嗽吐紅	三二
祝弘吾潮熱咳嗽汗流不止	三二

汪宥翁老年勞倦感冒胸鬲大熱而痞

三三

汪鍊兄內人經水紫黑血塊不止

三三

程相如令政姪發寒熱

三四

余文台壯年咳嗽吐紅

三四

邵伯成女經行而浴感冒大發寒熱嘔吐煩躁

三五

金氏婦血崩後四肢浮腫

三五

張雲門令郎囊癰

三六

朱宅內眷懷姪受驚而成子懸

三七

胡隣泉女吐血潮熱

三七

汪思石令堂怒後暈厥

三八

姪孫君寶遍身筋骨疼狀如虎噉

三八

葉子黑內人疫後虛憊

三九

孫如亭令政右眼皆突生白泡二寸餘嘔吐眩暈

四〇

吳勉齋腹痛欲死

四〇

黃熙齋內子產未彌月醉犯房事血來如崩	四二
程心章兄頰腮紅腫	四二
程六十喘後發腫	四二
程七護丈發熱痛伏梁積塊下痢紅白	四三
程孺人黃氏春溫過時熱病	四三
程有望孺人月汎當止不止	四四
上舍近洲胸脇脹痛	四四
黃源金先生內人吐血洩瀉發喘	四五
族姪合溪八旬而發寒熱咳嗽汗出不止飢飽連聲	四五
孝廉方叔度令嫂江氏脹滿	四九
吳天威丈便癰	五〇
文貴時疫漏底發寒譫語	五一
鍾澤程夢奎孺人哭子過傷因發寒熱	五二
欽潛口汪召南丈令郎蠱脹	五六

岩鎮鄭景南丈痰飲積塊跳動不止

卷四 新都治驗

五七

孫子元瘡後沐浴鼻出紅涕面足浮腫一

一婦食積痰飲瘀血流於下部左跨脣腹脹痛一

恒宇令堂右肩筋搐腫痛二

孫君錫頭痛胸背脹飲食作吐咳嗽二

孫爾嘉內人三姪而三小產三

孫薇垣內人咳唾紅痰三

戴萬奇文中瘡後兩手足不能動三

亮卿內眷頭痛玉戶撮急肛門逼迫遍身皆疼三

梓林兄內眷右手痛風小水頻迫四

一婦經閉三月洩瀉嘈雜吐酸四

程氏婦下午喉痛痰多暈厥五

- 江鋐兄時疫熱病汗出不止 五
何明吾時疫食復不省人事循衣摸床 五
孫元素春溫飲復發斑 五
孫安空飢勞感疫食復發斑 五
一人喉痛夜臥氣壅面足浮腫 六
何洗心虛寒腎洩 六
程湘孺人鼻衄後眩暈嘈雜嘔吐清水 六
孫君孝春溫誤作陰虛治 六
一僕婦頭疼喉痛咳嗽嘔惡胸膈作脹 六
族姪婦范氏乳癰 六
表姪女黃氏姪七月患血痢 六
程氏婦小產後患赤痢 六
孫竹埜受暑作吐又傷酒麵身黃成疸 六
程菊泉暑月喘嗽 六

程應禎兄咳吐紅痰胸背脹痛眩暈

虛山內人胸脹痛五更嘈雜

一婦暑月小便不利玉戶腫大便血

弟婦戴氏臍腹痛白帶如注裏急後重下痢赤白

族弟應章胃脘當心而痛

弟淑南三陽合病暑症

一富婦轉脬

文約孺人年八十三胃脘疼痛

應章弟三陽瘧

程好吾春溫

程氏婦屁從子戶出

族子應章之弟十月發三陰瘧

吳中岳孺人疫後瘻症

鮑子五保時疫耳聾洩瀉

僕子孫守中麻後咳嗽無痰唇厚聲啞	一
僕子得貴春溫頭痛	一
元素住令政春溫後經水適止	一
朱氏子天送時疾頭疼身若燎炭	一
朱桃源內人胃脘痛常苦夢遺經水一月兩至	一
桂亭大兄痰積瘀血作痛	一
熊二官疫後食復	一
堂弟東里內子咳嗽吐紅	一
程竹坡內人年六十瘟疫昏憤	一
程內眷新寡七日染疫適值夢洩神昏譫語	一
太學從明滯下純血	一
查少川喘後腫脹	一
夏益吾肢節腫痛手足灣痛腫尤甚	一
初陽姪內人肺癰	一

仲木內人氣喘作脹

姪孫女十歲大便脫肛鼻中出血

二八

唐岩祈患痢赤白腹脹氣喘四肢冷陰囊腫

二九

姪婿程東山患休息痢下皆紫血

二九

陳氏婦腸鳴腹痛合目汗出下午潮熱

三〇

九德姪耳鳴

三〇

陳覺宇上盛下虛合目亂語痰火吼喘

三一

程紹溪中年患鶴膝風

三一

堂嫂程氏喉間有物如癆咯之不出嚥之不下

三二

一婦產後咳嗽發熱咳出之痰色黑而臭

三三

表嫂孀居二十年右癱不能舉動神情恍惚亂言多悲泣

三三

桂亭大兄墜轎後腰脇脹痛

三三

堂嫂王氏吐紫黑血塊足跟掀腫痛痒

三四

堂婦程氏妊娠五月痢下膿血

三四

嫂汪氏頭痛遍身痛痢下赤白	三五
仲闇氣虛中滿	三五
朱懷竹楊梅毒氣內攻上迫於肺將成肺癰下流陰囊囊潰見子	三六
查良本兄令眷每飲食悉從背後而下	三八
後溪大兄孺人戴氏患血痢	三九
邵敬圃令眷胃脘痛	四一
蘇望臺患瘧	四一
汪氏嫗寒痰壅滯	四一
徐客兄子筋痿風	四三
邵老封君手足麻而無力	四三
程巢父迺郎痢後風	四五
葉潤齋心膈嘈囦好啖肉尤好鷄腹大痛蟲症也	四五
程相如令政孕七月患痢	四六
程曉山中風先兆	四六

迺郎麻後疳症

一婦疫後虛寒

四七
四八

從獻長郎七歲患痢後成疳

四八
四九

姪孫子忠痢下紅膿如爛魚腸腹大痛日夜百次

五
五

元素內人雙胎難產

五一
五

邵馬兄患嘔吐所出皆如爛豬肺

五一
五

許卓峰上吐血下洩血咳嗽聲啞

五二
五

族嫂鈞儒人患痢赤白嘔吐痰涎粒米不入口者兩月

五三
五

邵來儀丈令眷咳桃紅痰如桃花膿色

五四
五

程玄祖兄春溫食復僵寢如屍

五四
五

汪郎兄蠱痛

五四
五

查景川氣虛瘡疥

五四
五

程玉吾內人孕七月內吹

五五
五

一黃氏婦受身足月發癟

五五
五

吳見南令郎心脾痛	五六
又令郎八歲疳積蟲痛	五六
姪女入歲腹高於胸咳嗽嘔吐甚則噴血	五六
從兄鎔年五旬左脇痛手足抽搐不能履步	五六
小童上達脾虛發腫	五六
族姪良詮血痢腹痛	五八
一婦胸膈有痰大便洩瀉大發寒熱	五九
從弟婦程氏右脇痛不能睡背心疼胸膈作梗痰中有血	五九
黃懷虛原患吐血又咳嗽嘔吐左脇不能着席	五九
一族姊年六十咳嗽口渴常吐蛇蟲	五九
姪婦戴氏心痛徹背心脹痛	六〇
老僕來興痰火上壅胸膈背心脹痛	六〇
一婦生女不生子多思多鬱小便祕而不通轉脬症也	六〇
崑池太學內人牙痛一晚暈厥三次	六一

一 僕婦產難子宮墜出戶外半月不收

姪孫媳程氏體肥經閉者八年

六一

熊成入官早起行路眼見邪火一團滾來大被驚駭

六二

從姪食從鼻出

六三

程達菴四媳戴氏產後腿疼

六四

卷五 宜興治驗

徐檢老患腸風下血數桶

一

吳儀制主政尚卿先生患肺經痰火症更兼鼻衄

四

宜興令君宋太夫人病胸腋脹痛予診左部俱散亂無緒兩尺無神

四

預斷不治

五

吳宮詹少溪先生以酒積致胃脘疼又加腰眼足跟肢節皆疼

五

宜興令君胡太夫人年七十二脾洩十五年不愈又加吐紅咳嗽多

痰癥不易出

五

曹同府東崗先生患右脇痛予以脈知其傷風傷食所致

宜興令君胡鏡陽公上焦浮熱胃中食積痰飲又因勞心動火頭面

瘡癧作疼

吳鵝源先生咳嗽口乾腹中如火滾動不思飲食右脇痛

吳鶴洲先生太夫人八十六原有痰火大便日三四行夜兩起腸鳴

臍腹膨脹脈三四至一止七八至一止人皆不治予獨起之

吳鶴洲如夫人胃脘痛百治不效目爲怪疾予作肝脾相勝之症治

之而愈

曹宜崗常夢遺予語以神志不足又疝氣嘈囦食硬喉中作梗

吳荆樵文學疝氣半年兩跨結核硬痛

吳鶴洲先生中焦有痰肺氣不足發瘧熱多寒少口渴小水不利體

倦頭痛

吳雪舫先生左脇下紅塊大如雞子傍有小苦蘂作疼予作肝膽二

經有熱毒治而愈

吳孝廉球泉先生心血不足胃中有痰下元陽氣不充

李思椿胸膈脹痛痰有紫色瘀血

吳雙泉公病陽亢陰微之候上盛下虛

李寅齋先生患血淋小水艱澁難出竅痛不可言二年不愈

徐熙宇文學內眷前後心痛耳鳴眩暈吐逆吐酸四肢痠軟

湯簡庵封君素善飲致發腸風且心腎不交

吳仰玄先生患胃脘痛痛徹於背痛時冷汗如雨

杭芝崗文學酒後近內行採戰之法致成血淋

吳中翰漢源先生腸風下血腹中微痛

吳大柱史安節公脾肺二經有痰火中焦有濕熱流於膀胱爲淋濁

吳宮詹少溪翁有酒積而頻傷怒致右脇之火衝上作痛耳鳴眩暈

大便艱滯

吳孝廉球泉公內人痢疾後感寒而經至發熱口渴遍身疼等症

吳西雲先生庶母筋骨無力不能起止將成痿症

- 蔣近思令郎脇痛氣促胸滿喉疼痰有血屑下午潮熱 一五
徐學士檢老正月食新蒜炒肉而又冒風寒咳嗽喉疼聲啞 一五
萬肅庵先生令郎發熱旬日口渴舌乾色如沉香 一六
大宗伯黃履庵老夫人右脇痛咳嗽喉乾間吐紅腸鳴洩瀉 一七
白雲仰令眷觸怒暈厥手足冷汗如雨氣息微合目靜坐一時始定 一七
吳心逸先生之使患勞倦傷寒 一八
吳文學霽陽先生以積學勞心而心肺之神不足 一八
宜興令君胡鏡陽公夫人患陰虛陽搏之候 一八
太史徐檢老向苦癩症而妨生育 一九
吳宮詹少溪翁以長君秋捷受賀過勞而傷飲食 二一
吳別駕勉齋翁體豐腴連跌而口眼歪邪左手足不能動 二二
少冢宰徐檢老以賀壽而腎生痔癰 二三
宮詹吳少翁患痢赤白兼下裏急後重 二四
臧少庚年五十七飲食不順利喉管中梗而難下 二五

孫文垣醫案

明 新安 孫一奎文垣甫輯

鄞縣 曹赤電炳章圈點

卷一

二 吳治驗

萬歷龍飛二年小春月。予始遊茗之東雙林。於時族兄吉泉之友吳小峰。與其弟小川俱病目。專科者愈治愈重。其自始紅腫。次加太陽痛。繼則白星翳疊出。予不以目科名而識者。予稱大方。因謀於吉泉曰。醫以通變爲良。昔秦越人過邯鄲。聞貴婦人。則爲帶下醫。過雒陽。聞周人愛老人。則爲耳目痺醫。聞東宿君國手也。必能隨俗爲變。願一言去吾兄弟目疾。吉泉邀予。予曰。嘉靖間論醫者。必首西吳。如周仲仁氏。凌漢章氏。王賓湖氏者。皆擅一時名。其家世必有傳也。何需於予。吉泉曰。渠家慕弟久矣。且其尊人受博士易。爲西吳名家。弟好易。幸一

往。藉此爲談易地。母遜。診其脈。小峰之脈濡而緩大。兩目血縷直貫瞳人。薄暮則疼。小川之脈皆洪大鼓指。黑珠有浮翳痕。隱澁難開。大小便皆不利。故於小峰用補。先以清肝散與之。夏枯草五錢。香附四錢。甘草一錢五分。細茶五分。以徹其痛。藥兩進而痛止。繼用參白茯苓。熟地黃。枸杞子。桂心。牛膝。破故紙。白蒺藜。牡丹皮。服八日而愈。於小川用瀉。內用瀉肝湯。及當歸龍會丸。外用象牙、白冰片爲末點之。七日全愈。其尊君我峰翁喜詣予曰。二目均病。年同齒染同時。諸醫同治而同不愈。先生一補一瀉。而二病均愈。何哉。予曰。此陰陽虛實之辨也。經云。實者正治。虛者從治。令姪之症。惟厥陰肝火熾盛。肝嘗有餘。有餘者瀉之。正治也。郎君下虛。又爲怒所激。怒則火起於肝。肝爲藏血之地。故血絲貫瞳人。而薄暮作痛。方用夏枯草。香附爲君。疏其肝氣。經云。肝苦急。急食甘以緩之。故用甘草爲臣。茶能清頭目。用以爲使。先爲去此痛。經又云。水流溼火就燥。故復用甘溫補其下元之虛。俾火得歸原。此從治也。若用苦寒降火之劑。不惟血凝而痛加。抑且激其火而使愈熾矣。我峰聞之語人曰。孫君本陰陽而治寒熱。故是用易爲醫也。故補者補効。攻者攻効。語曰。不知易者。不可以爲太醫。孫君神。

於易而於醫乎。何有。願於吾茗懸一壺也。予哂之。謂昔韓伯休且不欲人間知其名。予又何壺之可懸哉。

萬歷甲戌。其年自仲秋徂冬。瘡子盛行。三月內。予所治男婦嬰孩共七十二人。茗之望族沈最著。大中丞觀頤公當考功時。幼君瘡喘嗽不寧。聲啞。發熱洩瀉。斑紫不斂。予以小無比散愈之。夫人姪腹痛昏厥者五日。名醫如高陳二公者。沈姻姪無巨細。悉任之。亦不能措手。予至診之。兩手脈皆洪大。法當下。衆僉以姪難之。予曰。經云。有故無殞。亦無殞也。姪已九月將解。卽胎動奚傷。若當下不下。不獨其痛難忍。而變且不測。考功偶冒風頭痛倦怠。發寒熱如瘧。脈浮絃而數。予曰。此小柴胡仁下之而安。考功偶冒風頭痛倦怠。發寒熱如瘧。脈浮絃而數。予曰。此小柴胡湯症也。一劑而瘥。考功請告家居者二十年。篤好方書。予初之茗。茗人未知予考功聞予。亟欲識之。謂予治病甚奇。又與予論傷寒痘疹胎產皆中寡深然之。語人曰。良相良醫等爾。如孫君所詣。卽千金不足爲其重。特譏醫說書於冊。以不朽孫君云。

張孝廉後渠丁年。患大頭疫。頭大如斗。不見項。脣垂及乳。色如紫肝。昏憒不知人。

事見者駭而走。其年疫甚癘。人畏傳染。至廢弔慶。張與考功公子同受春秋於會稽陶春源所。陶邀予診之。其脈皆浮絃而數。初以柴胡一兩。黃芩。玄參各三錢。薄荷。連翹。葛根各二錢。甘草一錢。服三劑。寒熱退。絃脈減。但洪大。予知其傳於陽明也。改以貫衆一兩。葛根。天花粉各三錢。甘草一錢。黑豆四十九粒。一劑腫消其半。再劑全消。漿粒不入口者二十日。再與小柴胡湯兩劑。服之始納乾糕如指者兩條。次日進粥而漸平矣。丁酉秋闈報捷。

吳江孫質庵老先生行人。時患痛瘋。兩手自肩頸及曲池。以至手梢。兩足自膝及跟尻。腫痛更甚。痛處熱。飲食少。請告南還。而伏蓐者三年。里有吳君九宣者。沈考功西席也。見予起後渠疾。因語行人逆予。診其脈。皆絃細而數。面青肌瘦。大小腿肉皆削。予與言此病得之稟氣弱。下虛多內。以傷其陰也。在燕地又多寒。經云氣主煦之。血主濡之。今陰血虛則筋失養。故營不營於中。氣爲寒束。百骸拘攣。故衛不衛於外。營衛不行。故肢節腫而痛。痛而熱。病名周痹是也。治當養血舒筋。疏濕潤燥。使經絡通暢。則腫消熱退。而痛止矣。痛止。卽以大補陰血之劑。實其下元。則腿肉復生。稍愈之後。願加珍重。年餘始可出戶。行人聞而喜曰。

果如公言。是起白骨而肉之也。吾卽未藥。病似半去。惟公命劑。予先以五加皮、蒼朮、黃柏、蒼耳子、當歸、紅花、苡仁、羌活、防風、秦艽、紫荆皮服之。二十劑而筋漸舒。腫漸消。痛減大半。更以生地、龜板、牛膝、蒼朮、黃柏、晚蠶沙、蒼耳子、苡仁、海桐皮當歸、秦艽三十劑而腫痛全減。行人公益喜。予曰：病加於小愈。公下元虛憊。非歲月不能充實。古取難足而易敗者陰也。須痛戒酒色。自培本根。斯飲藥有効。而沉疴可除。據公六脈輕清流利。官必腰金願葆真以竣之。萬母自輕。來春氣和可北上也。乃用僊茅爲君。枸杞子、牛膝、鹿角膠、虎骨、人參爲臣。熟地黃、黃柏、晚蠶沙、茯苓、蒼耳子爲佐。桂心、秦艽、澤瀉爲使。密丸服。百日腿肉長完。精神復舊。又喜語予曰：貧官何以稱報。譏次公濟人澤物盛德於沈考功冊後。以彰盛美云。後十年。行人官至江西副憲。

鄭都諫春寰公長君四歲。患痘稠密煩躁。醫者星羅。皆以爲熱盛不退。形枯色紫。頂有焦勢。症逆。必不可爲。將辭去。予至細觀之。見兩太陽圓淨。神氣蒼厚。謂當急爲涼血解毒。用赤芍藥、生地黃各三錢。紫草二錢。連翹、黃芩、貝母、山楂、木通各一錢。蟬退、甘草各五分。藥成劑。而衆止之曰：麻要清涼痘要溫。故博愛心鑑。

以保元湯爲良。吾儕將劑而進之。乃公獨主寒涼保元之謂何。予曰。用藥貴對症。保元湯良矣。必血活熱清而後可用。今血熱毒盛而用溫劑。是火熾添油也。衆曰。若慮毒未解。吾苦醇法甚佳。用桑蟲鷄冠血酒調服之。痘卽立起。而慎氏王氏茅氏皆苦上專門名家。亦以爲言。予曰。此法亦可用於清解之後。經曰。諸痛瘡瘍。皆屬心火。火未退而用是。以毒攻毒。其勢愈熾。予故欲先清解而後保元也。惟楚銅璧山人黃桂峰者。治痘高手也。獨語鄭公曰。孫公之劑。實與症對。衆論皆膠固不達變者。第恐清解之劑用遲一日爾。試煎服之。以觀其後。鄭公命僕速煎。衆猶持議曰。如必服此劑。亦當揀去貝母。山查。鄭公聽其減去。至夜予始聞。隨語桂峰曰。減去二味。恐七八日後不能無它症。桂峰曰。何以故。予曰。此痘內傷外感俱未清楚。今帶熱而出。故其腹猶膨脹。去貝母。恐搶喉。去山查。恐洩瀉。七八日痘毒出盡。腹內空虛。變從虛出。諸君素以痘專科。何不慮及此。其夜服藥後。卽嗒然而睡。天明痘色明潤。焦頂盡退。血亦漸活。惟嘔噦搶喉。衆又以昨日之劑太寒所致。予曰。此火毒未盡徹也。宜進竹茹湯。而慎雲峰佛然曰。吾家世世業痘。年亦七十有五。曾未見治痘用竹茹者。春寰公令弟樂津公。

檢痘疹全書用竹茹者以正慎語塞。悻然而去。藥進而噦止。至八日果洩瀉發。痒。予以保元湯加白朮以治瀉。大加何首烏以止痒。一帖而痒止。至十四日。天庭兩顴皆回漿作癰。惟兩頤漿未回。洩瀉不止。予因偶出北門。半日歸。見其口開項軟。手足痘氣盡癟。腹又作脹。已成內攻。舉家啼泣。予亦茫然。不遑爲計。嘆息出門。樂津公把而送之。少間揖別。而聞衣間痘臭。語樂津曰。公聞臭乎。曰聞。予曰。似有生意。亟還起之。予思兩頤乃腎經部位。獨不回漿者。腎元虛也。峻補腎元。庶可使活。先以紫河車一錢。用酒漿調服。因其元氣服後即睡。繼以人參一兩。黃耆。免絲子各三錢。作大劑服之。一日夜服人參一兩八錢。黃桂峰是夜自松江還。時已四鼓。亟叩門而入。鄭語之變。且告之服藥。黃曰。唉。吾看作何狀。見其結瞖之下。腹灌一線黃漿。贈痘盡起。桂峰也。萬全矣。非孫公不能起此病。桂峰由此益昵。予出必聯舟。歸則同榻。相印正者三年。鄭公感予而作序。以贈親書孫憲副公冊後。識不忘也。

張文學子心二尹。可泉公長君也。自知醫。弱冠病。吳下名醫皆胗之。僉曰療治久不効。子心亦自分必死。督家人具祕器。已沐浴。衣襚衣而臥正寢。斷粒絕藥者。

二日可泉聞予治高第張星岳之婦奇。因訪予曰。病心痺而尸寢浹旬者。能起之。誰不嘖嘖稱公高手。吾子病且革。幸憐而診之。予至診其脈。左寸短弱。右關略絃。餘皆洪大。其症咳嗽。下午熱從兩足心起。漸至頭面。夜半乃退。面色青形羸氣促。多夢遺交睫。臥床褥奄奄一息耳。時則七月初旬也。診畢語可泉公曰。郎君病可治。不宜豫凶器也。可泉公曰。諸醫僉謂火起九泉者十不救。一大肉盡削者死。咳嗽加汗者死。脈不爲汗衰者死。又當茈鑠石流金之候。又恐肺金將絕。豚子亦自謂無生理。先生何言可治也。予曰。汗多者孤陽幾於飛越也。可泉公曰。飛越亦死候也。予曰。幾者將成未成之辭也。症雖危。其色其聲音其脈尚有生意。終不可以一凶而廢三善。兩顴不赤。心火未焚也。聲音不啞。肺金未痿也。耳輪不焦。腎水未涸也。相書云。面青者憂疑不決。左寸短者心神不足。關略絃者謀爲不遂。夫心者萬事萬化之主。內經曰。主明則下安。主不明則十二官危。又肝主謀爲膽主決斷。謀爲不決。故色青症與色與脈皆非療也。蓋郎君志願高而不遂其欲。殆心病非腎病也。經曰。色脈相得者生。予故謂郎君之病可起也。病者聞言。明日語其父曰。吾今猶寐者初寤矣。從來未有此論。心吾心。

脾也。吾病由星士許決科於癸酉。是年予落第而同窗者中故快快至此。先生得吾心於色脈神矣。此言可當藥石謹拜命予爲定方。煎方名調肝益神湯。以人參、酸棗仁、龍骨爲君。丹參、石斛、貝母、麥冬、五味子爲臣。山梔、香附爲佐。服二十帖而病起。丸方則大龜板、熟地黃、枸杞子、人參、麥冬、五味、茯苓蜜丸。服三月而精神健。肌肉完。次年生女。可泉公苕中名士。奇予治而延譽聞於大宗伯董。

潯陽公宗伯交驩余者。由可泉公始也。

大宗伯董潯老年六十七。有脾胃疾。翁以過啖瓜果。而胸鬲脹痛。時當處暑也。延予治。診其脈寸關絃緊。觀其色神藏氣固。翁門下蔣虹橋沈樂閒者多藝人也。翁素親信。二公詰予曰。症脈何如。予曰。症脈雖胸腹脹痛。然易瘳也。二公曰。翁生平不能素食。食輒瀉。今不茹葷者半月。燕居好奕。好看書。好作詩文。卽盛暑亦手一編不言倦。日永亦不瞌。今不親筆硯者月餘。不櫛沐者七日。它一切無所事。事倦極矣。諸名家如沈竹亭、沈春宇、金樗丘者。劑備嘗之無益也。而公何言易。予曰。諸公不過用二陳平胃。加山楂、麥芽等消導劑耳。與症何涉。蓋翁傷於瓜果。而爲寒濕溼勝。經云。寒溼所勝。治以辛溫。然瓜果非麝香、肉桂不能消。

此諸公所以不能愈翁疾也。予以高良薑、香附各一兩爲君。肉桂五錢爲臣。麝香一錢爲佐。每服二錢。酒調下之。藥入腹胸次便寬。再而知餓。三服而巾櫛交接賓客如未病者。翁語沈蔣曰。孫君所見所養度越諸人若是。往聞治張氏子。氣絕兩日而能活之。今於活吾病益信。誠臨蓄虢國之遺。特書一軸以彰其高。因以紀一時之良遇云。

大宗伯郎君董龍山公夫人。爲憲副茅鹿門公女。年三十五而病便血。日二三下。腹不疼。諸醫診治者三年不効。予診之。左脈沉濇。右脈漏出關外。診不應病。予竊謂血既久下。且當益其氣而升提之。以探其症。迺用補中益氣傷加阿膠地榆側柏葉服入劑。血不下者半月。彼自喜病愈矣。偶因勞而血復下。因索前藥。予語龍山公曰。夫人之病必有瘀血積於經隧。前藥因右脈漏關難憑。故以升提兼補兼磁者。以探虛實耳。今得病情。法當下而除其根也。龍山公曰。三年間便血。雖一日二三下。而月汎之期不爽。每行且五日。如此尚有瘀血停蓄耶。予曰。此予因其日下月至而知其必有瘀血停蓄也。經云。不塞不流。不行不止。今之瘀實由塞之行也。不可再磁。古人治痢。必先下之。亦此意也。公曰。明日試卜。

之。予曰。卜以決疑。不疑何卜。公隨以語夫人。夫人曰。孫先生非誤人者。識見往往出尋常。宜惟命。蓋夫人讀書能文。聰明謀斷。不啻丈夫。故言下便能了悟。即用桃仁承氣湯。加丹參、五靈脂、荷葉蒂水煎。夜服之。五更下黑瘀血半桶。其日血竟不來。復令人索下藥。予曰。姑以理脾藥養之。病根已動。俟五日而再下未晚也。至期復用下劑。又下黑瘀如前者半。繼以補中益氣湯、參苓白朮散調理全愈。

大宗伯董潯老門下有馬廚者。七月初旬患病二十餘日。愈劇而勢甚獘。時宗伯對余奕正酣。而蔣虹桥沈樂閒報曰。馬廚危在旦夕。宗伯聞之。推枰嘆息曰。吾命吾命。予叩其故。語曰。能廚者不下二十人。獨此廚適吾意。實恃之以怡晚節。今病不可起奈何。予詰何病。翁顧蔣與沈曰。第詳道其狀。蔣沈述其症。大發寒熱。寒至不憚入灶。熱至不憚下井。痢兼紅白。日夜八十餘行。腹痛惡心。汗多神氣倦甚。究其脈曰脈不吉。下痢脈洪大者死。細微者生。今洪大逆也。予曰。痢固忌洪大。寒熱亦非細微所宜。其中必有故。二公曰。幸一往決之。潯翁不可謂何可以細人而勞長者。予曰。醫寄人生死。何論巨細。矧事翁之人。猶不可坐視不

救也。潯翁欣然握手偕行。至宅後橋。余入門。同居數十家皆執香拱立以伺。診其脈。察其症。果如蔣沈所言。其面色微紅。汗淋淋下。予究病所由起。渠謂過客衆。廚間燥熱。食瓜果。菱藕過多。晚又過飲御內。而寢於樓簷之下。次日即寒熱腹痛。因而下痢。雖得其病情。尙未融通一治法。因沉思之。不覺行至橋。而潰老猶立而俟。予見予無歡容。知病重。遂置之。因如前握手而回。蔣沈謂予可治否。予曰。徼幸先生寵靈。偶有一得。迺背水陣也。人參、白朮、石膏、滑石各五錢。知母、炮薑各三錢。大附子、炙甘草各二錢。作一大劑煎之。蔣沈將問予。潰翁卽命近侍煎於其側。不欲蔣沈問也。熟則付飲之。飲訖卽睡。老先生曰。服後何狀爲佳。予曰。倘得一睡。則陰陽始和。和則汗可斂。而寒熱嘔惡可止也。蔣沈曰。聞已睡矣。明日巳刻。二公鼓掌來言。夜來痢減半。汗吐全無。脈亦斂矣。再用人參、石膏、白朮、白芍藥、滑石各三錢。炮薑、肉桂、知母各二錢。炙甘草、附子各一錢。服後瘧止。痢又減半。飲食漸進。神氣漸轉。改用白芍藥酒炒五錢。人參、白朮、滑石各二錢。甘草、陳皮、炮薑、肉桂各一錢。三劑而痢全止。飲食加漸。就安矣。蔣沈問曰。公寒熱均投。此爲何症。而劑何名也。予笑曰。此滑公所謂混沌湯也。潰老又

問予對曰。經云。夏傷於暑。秋必癰痢。白虎湯。益元散。皆解暑之劑。爪果寒涼。傷其中氣。酒後御色。損其下元。附子理中湯。正所以溫中補下者。內經文云。實者邪氣實也。故以白虎湯。益元散應之。虛者正氣虛也。故以理中湯應之。若以寒熱均用爲疑。而張仲景附子甘草瀉心湯。既用大黃。黃連。又用乾薑。附子。此何說哉。蓋假對假真對真也。潯翁躍然喜曰。先生惟是。故能起垂斃之人而生之。余詩冊中臨菴號國之談。非虛語矣。

吳江吳太僕長君肖峰令政。大宗伯董潯老次女也。患咳嗽體倦。多汗腹痛呻吟不絕口者半月。吳江之醫不効。訪遠近名最著者。如姑蘇盛氏。後湖王氏。后山震澤沈氏。竹亭先後遞治之。而痛愈加。予適寓苕城龍山公邀予乘快舡兼程而進。至則診其脈。左手三五不調。右手沉絃。面色青而息甚微。腹中濾濾有聲。予因問上年夏月曾病否。肖峰曰。曾頭痛體倦多汗。動止無力。不能親事。但不咳嗽。不腹痛。今月初病如上年。而市醫謂傷風所致。用參蘇飲表之。始咳嗽。沈爲其清嗽。則加腹痛。王與盛謂通則不痛。以沉香滾痰丸下之。則勢憊而不可支。予方殫思。謂此迺注夏病。仲景謂春夏劇。秋冬瘥者是也。而龍山公詰問

注夏何爲咳嗽。予曰原不咳嗽。由參蘇飲而咳嗽也。汗多又重發汗。肺金受傷。故燥而嗽。何爲腹痛。予曰原不腹痛。因治嗽而寒其中氣。腹故痛也。後事者。又不究其因寒而痛。乃謂通則不痛。而用寒涼滾痰之劑。重傷其中氣。不思五月六陽之氣皆散於外。汗而又汗。汗多則亡陽。夏至一陰將萌。腹中尙虛。虛而復下。下多則亡陰。陰陽俱亡。不憊何待。予欲酌一方以起之。恐從事者又將議其後。龍山促之。乃用酒炒白芍藥五錢。甘草黃耆各三錢。桂枝二錢。大棗二枝。水煎。臨服加飴糖一合。吳下諸公果羣然又辯。龍山公曰不必辯。病者望此以甦其生。速煎飲之。飲訖而睡。自巳至申不醒。先事者皆搖首。命僕急攜藥囊將去。且語龍山公曰。奪令妹之速者。孫君也。本草云。夏不用桂。伐天和也。諸痛不補。助邪氣也。故一飲而不醒。吾儕行矣。龍山公以其言語余。因詰病者之熟睡。予曰。所喜者以其睡也。睡則陰氣生。陰生則汗可斂。痛可止也。假令藥不對症。安得有此。又詰所投之劑何名。予曰。此仲景小建中湯也。出金匱要略。蓋建者立也。中者。陽明所主。今腹痛如縛。帶脈急縮也。東垣治例。腹痛以芍藥爲君。惡寒而痛。加桂甘草緩帶脈之急縮。用以爲臣。經曰。急者緩之。面青脈絃。肝氣盛也。

肝屬木。木盛則脾土受制。而又誤下。因傷之極。故痛之猛也。經云。木得桂而枯。佐以黃耆。伐肝補脾。又能斂汗止痛。此建中之所由名也。語未竟。內報病者醒而索粥。予曰。與之穀氣進。則有本矣。粥後又睡。至天明。腹全不痛。惟稍咳嗽。加五味子。麥門冬。兼治。注夏而全瘳焉。龍山公述病之始末。劑之藥味。報大宗伯。宗伯公致書於予曰。足下以四味之常藥。振不起之危疴。名震三吳。聲溢兩浙。伯昔宋景濂爲朱丹溪立傳。吾固不敏。幸先生以所治節條付之。俾序以傳於後。俾工是術者。有所藉手。予撫然語龍山公曰。何修而得老先生寵幸之深也。第令妹被寇。伐太過。陰陽俱亡。今病雖愈。而脈絃不退。猶可爲慮。幸叮寧戒暴怒。節飲食。謝去人事。恬澹多補。庶可永年。不然亥月陰極陽生。恐不能保無患也。慎之慎之。後至期。與肖峰齟齬。怒而絕藥。果以凶聞。茗人多予之。直與先見云。大光祿龐公子達。吳江人也。其太夫人病頭痛惡寒。胸鬲憊且痛。時發寒熱。吳醫王后山者。有時名。吳人最所篤信。延治五日不瘥。聞予居吳。禮致爲治。診其脈。右滑大。左浮絃而數。問服何劑。光祿公曰。不識而有藥在。予視之。偶失言曰。左矣。時有西席項姓者。聞言而厲聲曰。此三吳最名士也。渠發劑而有議者。輒面

唾之。幸不在爾。予笑曰。渠是而議者非。則當唾人渠非而議者是。自唾且不暇。何暇唾人。四物湯。玄胡索。牡丹皮。香附子。養血調經劑也。太夫人七十餘矣。而有經可調哉。投劑之左。由生平守常套。而不知因人因症隨俗爲變也。項子曰。此何症。予曰。仲景有云。頭痛惡寒。外感病也。浮絃而數。胸鬲憊痛。少陽脈症具在右脈滑。飲食滯而爲痰。彼用當歸地黃芍藥。皆滯痰閉氣之味。內傷何由得消。外感何由得出。此症只宜用柴胡湯合平胃散。一二帖可瘳也。項猶有言。光祿公曰。勿辯。飲藥而涇渭明矣。一飲而寒熱除。再飲而胸鬲泰。光祿喜曰。奇公名不虛附矣。予私問項子。何極譽王。光祿曰。項初受業於王。未睹大方。而獨是其師說。多見其識之不廣也。

光祿公後有事於莊所。值中秋乘酒步月。失足一跌。扶起便脅痛不能立。晝夜不寧。行血散血活血之劑。一日三進。閱三月服二百餘帖。痛不多減。因迎予治診之。脈左絃右滑數。予曰。此痰火症也。公曰。否。賤軀雖肥。生平未嘗有痰。徒以遭跌。積瘀血於脅間作痛爾。予曰。據脈實痰火也。痰在經絡間。不在肺。故不咳嗽而亦不上出。脈書云。滑爲痰。絃爲飲。予據脈而認痰火。如瘀血脈必沉伏。或芤

或濇也。面色亦必帶黃。前諸君以瘀血治者。皆徇公言。不以色脈爲據。且多服峻厲。尅伐破堅之劑無効。此非瘀血之積明矣。公欣然請藥。卽用大瓜蔞帶殼者二枚。重二兩。研碎。枳實、甘草、前胡各一錢。貝母二錢。與四帖。公以爲少。予曰。愚見猶以爲多。此症服此一二劑可瘳。又卽報我爲製補益之藥可也。公得藥一更矣。仍前服。五更腹中漉漉有聲。天明大瀉一二次。皆痰無血。痛減大半。再服。又下痰數碗許。痛全止。隨能挺立。三服。腹中不復有聲。亦不瀉。蓋前由痰積瀉也。今無痰。故不瀉。公曰。望聞問切四者。醫之要務。人人皆著之口吻。有先生獨見之行事。卽予母子之疾。先有事者。皆吳之名流。微先生。吾殆撞壁矣。何能還輒而生哉。吾於是益服先生之高。

進賢三尹張思軒公。與潘少保印川公。皆受室於施氏。稱聯襟云。施故富家。而張公夫人賢慧。治家勤篤。爲人精潔周致。以產多而氣血憊。又以婚嫁繁而費用不支。積憂年將五十。因病心痺。發則暈厥。小水短澁。胸鬲痛不可忍。煩躁乾嘯。惡內蒸熱。氣贔又上騰。肌削骨立。月汎不止。苕城時輩有認爲氣怯者。有認爲鬲食者。皆束手無措。尸寢浹旬。漿粒不入口者五日。凶具備而待斂。舉家計無

所之。惟神是禱。予適在藩府。逆予診之。脈左絃大。右滑大而數。診畢。予曰。可生也。病機云。諸逆吐酸。皆屬於火。諸風掉眩。皆屬於木。法當調肝清熱。開鬱安神。諸醫羣然目攝而背謹曰。書云。骨蒸肉脫者死。形瘦脈大。胸中多氣者死。絕穀食者死。孫君獨許其生。果藥王再世哉。予若不聞。而檢藥以進。竹茹。滑石各三錢。白荳蔻仁七分。半夏。麌橘紅。薑連。茯苓各一錢。甘草五分。水煎。令一口口嚥之。服畢。嘔止。暈定。次日用溫膽湯調辰砂益元散三錢服之。胸鬲頓開。漸進飲食。小水通長。煩躁盡減。駸駸然安若無事。後用遙逍散。六君子湯加黃連。香附三越月。而肌肉全。精神如舊。苕人駭然曰。能起此病。信藥王矣。

馬二尹迪庵公。年五十五。以掃墓而過。食鰻肉捲餅。心腹脹痛。市醫不知用吐。而遽用硝黃下之。大便不行。脹痛愈增。繼至者。以用木香枳榔丸。繼又有下。以小承氣湯者。有下。以大承氣湯者。十日多脹痛益甚。飲食粒不能進。大便並不行。小水亦僅點滴。後醫又以大黃、芒硝多服不行。謂非白餅子不可。服五日而脹痛尤加。又謂非備急丸不可。服三日。脹痛益不可當。又用甘遂、芫花、大戟、牽牛之屬。服三日。不惟大便不行。并小便點滴亦無矣。脹不可言。衆醫大叫稱怪。自

三月初二日起至是念二日矣有名士王南野者用灸法灸中脘三十餘壯毫不爲動因斷其越三日爲念五戌時當乘人間。迪老四子皆逢掖聞言涕泗時有張太學懷赤者。迪老甥也見予起張思軒夫人疾。喻亟請予予至觀其色蒼黑神藏不露聲音亮惟腹大如覆箕不能反側診其脈兩手皆滑大兩尺尤有力究其受病之源查其歷服之藥予駭然以爲未間且見也因思一治法先用六君子湯加木香砂仁參朮俱用二錢乃傍有錢小松者自稱家世受醫見劑爭之予曰非若所知也彼猶喋喋詰予謂人言中滿者瀉之於內大小便不利者當先利大小便然歟予曰非人言素問云云也又云諸痛不得用參朮蒼黑之人尤忌先生旣知素問奈何不用通而用塞也予愀然不答顧迪老諸予言曰錢君拘儒常見何能起尊君病尊君非中滿鼓脹症內傷症也當始傷時猶在上鬲法當用吐素問云在上者因而越之是也不用吐而用下藥以傷其脾脾氣傷則失運動之職是以急下愈傷愈傷愈脹不思脾氣傷而神不爲用藥不能行茲以峻厲之味益下之是遵何說也予因脾傷故用六君子湯以醒其脾木香砂仁助其運動再用吐法吐出前藥予劑非治尊君之病治諸君藥也。

予初欲爲諸君諱。何錢君激予而使暴其短哉。且予不慮大便不行。獨慮行之不止也。錢又謬言急則治標。今法用盡不能使一行。何以不止爲慮。予曰。君試思常人能服硝黃幾何。服芭荳、白餅子幾何。今硝黃服過五斤。芭荳白餅之屬服過五六兩。又加甘遂、牽牛、芫花、大戟。至悍至急之劑。幸而大便未行。藥性未動。尙可爲計。若一行而諸藥性動。譬瓶水底漏。其中能蓄點滴哉。危矣。錢又詰迪老多服下藥而大便不行何也。予曰。此易知之。始爲食傷。繼爲藥傷。所傷在上中二焦。下元未損。故兩尺脈尙有神氣。難經曰。人有兩尺。如樹之有根也。內經曰。腎者。胃之關。蓋腎主大便。觀其色蒼黑。神藏氣固。皆由根本未動。賴此猶可爲也。服藥後。腹中大痛。予知其藥力已動。改用人參蘆、防風蘆、升麻、桔梗各三錢。水煎服之。少頃。用鵝翎探喉中。令吐之前服藥物。一湧而出十數碗。病者以手加額。曰。目前光矣。此已時也。予曰。酉時大便必行。可預買人參數斤。以備不虞。至午進至寶丹一帖。以溫中氣。未申間。腹中汨汨有聲。濁氣下滾。頃刻間。腹寬數寸。至晚。大便行一次。小水略通。予卽用人參、白朮各五錢。炮薑三錢。茯苓二錢。木香、甘草各五分。陳皮一錢。令急煎服四鼓。又大便一次。小水繼至。脹

痛漸減。次日大便瀉十次餘。因以前理中湯劑爲丸。與煎劑兼補。腹脹全消。飲食漸進。共瀉七十二日。服人參二斤餘。苔人聞以補收功。羣然異之。而錢小松始帖然心服。曰。奇哉。奇哉。人多用攻。孫君獨用補。人多用下。孫君獨用吐。由見之真。而所投者確也。醫可易言哉。今而後知孫君之高矣。

潘大司馬公嘗有腸風之疾。八月丁祭學博餽鹿血食之。而血暴下。致予治。用槐角子五錢。黃連。枳殼。地榆。貫衆各三錢。一服而止。大司馬善其方。書之粘壁間。遇有便血者。輒依方藥之。無不立愈。喜甚。鼓腹謂諸子曰。往而姨之疾。族醫無不言必死。孫君獨能生之。神哉。進乎技矣。予曰。昔扁鵲有言。予非能生死人也。此當自生者。越人使之起耳。予何能。亦張安人當自生也。大司馬公由是益重予。病無巨細。悉任之。而予亦得盡其術云。

迪老之子鳳林。見予起乃翁疾。乘間語曰。內子包有隱疾。每月汎行。子戶傍輒生一腫毒。脹而不痛。過三五日。以銀簪燒紅針。破出白膿。盡餘而消。不必貼膏藥。而生肉無疤痕。初間用針刺。近只以指搘之。膿即出。但汎行即發。或上下左右而無定所。第不離子戶也。於今八年。內外科歷治不効。且致不孕。先生學博而

思超幸爲籌之。予沉思兩日而悟曰。此中焦濕痰隨經水下流壅於子戶也。經下而痰凝故化爲膿。以原非毒故不痛。用白螺螄殼火煅存性爲君。南星半夏爲臣。柴胡甘草爲佐。麵糊爲丸。令早晚服之。未終劑而汎行不腫。次年生女。舜田減公。吳車駕湧瀾公岳也。年將六旬。爲人多怒多慾。胸鬲否脹。飲食少。時醫治以平胃散。枳朮丸。香砂丸不効。復以檳榔三稜莪朮之類日消之。而大便溏瀉。兩足跟踝皆浮腫。漸及兩手背。醫又以其手足浮腫而認爲黃胖者。以針砂丸與之。腫益加。面色黃且黑。自二月醫至八月。身重不能動止。又有以水腫治者。車駕公雅善予。因延診之。脈沉而濡弱。予曰。此氣虛中滿病也。法當溫補兼升提。庶清陽升則大便可。實濁陰降則胸鬲自寬。以人參白朮各三錢。炮薑同陽陳皮各一錢。茯苓黃耆各二錢。澤瀉升麻肉桂蒼朮防風各七分。三十帖而安。客有疑而詰予曰。此症諸家非消導則淡滲。而先生獨以溫補收功。腹生積而爲滿爲腫者。從何道而去也。予曰。脹滿非腫滿比也。故治不同。腫滿由脾虛不能攝水。水滲皮膚。遍身光腫。今脹滿者。先因中虛。以致皮腫。外堅中空。腹皮脹緊象鼓。故俗名鼓脹。蓋由氣虛以成中滿。若氣不虛。何中滿之有。氣虛爲本。

中滿爲標。是以治先溫補。使脾氣健運。則清濁始分。清濁分而脹斯愈也。

金谿令淨涵臧公尊堂太夫人。以季春眉壽連看戲文二十餘本。且多食魚腥蝦蟹。偶發寒熱。三日不退。第四日。左耳前後及頰車皆紅腫。第五日。右邊亦腫。第六日。腫及滿頭。紅大如斗。眼合無縫。昏憤不知人事。譫語若有邪祟。粒米不進者八日。舉家驚惶。逆予爲治。診其脈六部皆洪長而數。予曰。此大頭疫也。卽以貴衆石膏各六錢。柴胡葛根各三錢。赤芍藥。天花粉各二錢。甘草一錢。黑豆四十九粒。煎服之。日進二帖。脈始減半。第九日。方進粥飲半盃。前藥除石膏。又四帖而安是役也。人皆爲予危。且以八十之尊年。八日之絕粒。頭大如斗。體熱如燔炭。昏憤譫語。乃不去而治。何冥行不知止如此。而其婿閔懷海亦言病勢如此。吾心亦危疑。見先生安閑而甘寢食。賴以少慰。予曰。此疾爲陽明少陽二經熱壅而然。夫陽明多氣多血之經也。以高年故不敢用硝黃。惟投以輕清解散之劑。使因微汗而解。症脈相對。雖重可生。假如人言以高年病危而棄不治。豈惟非醫之存心。於病家相托之意亦孤矣。可乎哉。

丙申夏。見所藩公謁予於海陽邑邸。時霪浹旬。邑市水漲。公至。予驚問曰。公貴倨

也者。何堪此。公曰。與君間者闊矣。且先君服闋。秋當北上。不卜補任南北。謁求一診。他何計。予究何疾。公曰。無。第年甫踰疆。微覺陽痿。次早診畢。語其隨行俞金二子曰。公脈上盛下虛。上盛爲痰。與火下虛爲精元弱。切宜戒色慎怒。劑宜清上補下。不然。三年內恐中風。不免。蓋由痰生熱。熱生風也。謹之識之。乃爲立方。別去。公亦未暇製服。公次年八月。往返武林。不無勞怒。又屆中秋。連宵酒色。平常色後。輒用鹿角膠三錢。人參一錢。酒送下。以連宵有犯。乃用鹿角膠五錢。人參三錢。空心服之。十七日薄暮。偶與社友談詩筵間。左手陡然顫動。把捉不住。隨歸房。左手重不能舉。十八日早。左邊半體手足皆不爲用矣。亟令人逆予。予適在前塚吳宅。及至。公驚喜交集曰。君何先見若此也。先少保患在左體。不遂者三年而歿。不佞今亦左體。其風水致然歟。第先少保年七十餘。不佞四十有七。先少保不能遇先生。不佞賴有先生。或可企無恙也。予始觀面色赤。口微渴。向右脣麻。手足蟬拽。已成癱瘓。胗其脈。左絃大。右滑大。先用烏藥順氣散。帖服後。昏睡半日。醒覺。面更加赤。渴亦稍加。知痰盛使然。卽以二陳湯加全蝎、僵蠶、天麻、黃芩、石菖蒲、紅花、秦艽。水煎。臨服加竹瀝一小酒盃。生薑汁五茶匙。

一日兩進晚。更與活絡丹服至第六日。手指梢頭略能運動。足可倚棹而立。予喜曰。機動矣。改用歸芍六君子湯加紅花、鈎藤、天麻、竹瀝、薑汁。服二十帖。可行二十步矣。手指先麻木不知痛痒。至是能執物。繼用天麻丸兼服全鹿丸。調理百日。病去十之九。次年二月北上補任。永清公以病後能戒色斷酒。自知培養。故藥功獲奏。此症予歷治歷効者。良由先爲疏通經絡。活血調氣。然後以補劑收功。惟經絡疏通。宿痰磨去。新痰不生。何疾不瘳。此治類中風之法也。

見所公弱冠隨尊君大司馬印老治河居北。患白濁精溼溼下。自北地山東淮揚鎮江及江右三吳諸名家醫藥三年不效。癸酉冬禮予診之。其脈兩寸短弱。兩關滑。兩尺洪滑。觀其人襟期瀟洒出塵。而神色閒雅。真翩翩佳公子也。一接見便就暱而信余請藥。予曰。公疾易愈。第待來春之仲。一劑可瘳。而今時不可。公固請曰。先生大方而善拯人之急。以大醫而治小疾。試可力效。何待來年。予曰。非祕其術不售也。素問有云。升降浮沉必順之。又曰。天時不可伐。公脈爲濕痰下流症也。經曰。治痰必先理氣。而脈書亦謂洪大而見於尺部者。陽乘於陰也。法當從陰引陽。今冬令爲閉藏之候。冬之閉藏實爲來春發生根本。天人一理。

若不顧天時而強用升提之法。是逆天時而洩元氣。根本既竭。來春何以發生。
故素問曰。必先歲氣。毋伐天和。必養必和。待其來復。公疾本小。而歷治三年不
效者。良由諸醫不知脈。不識病。不按時也。公聞言。唯唯。乃尊君所遣之醫踵接。
治竟無效。至春分而逆。予以白螺獅殼火煅四兩爲君。牡蠣二兩爲臣。半夏、葛
根、柴胡、苦參各一兩爲佐。黃柏一兩爲使。麵糊爲丸。名曰端本丸。令早晚服之。
不終劑而全愈。公復書曰。賤疾果如先生言。今勿藥也。何歷治三年不效。竊謂
天下無藥。服端本丸而愈。又信天下有藥矣。

少司空凌繹老夫人蔣適。繹老無幾。腹脹痛發熱。經過期不行者五日。諸醫皆以
經期作痛。爲調經不效。而繹老召予診。左寸洪滑。兩尺皆滑數。左尺之外。更有
神氣。予喜而語繹老曰。經閉非病。孕也。產必男。繹老雅信予。因究其說。予曰。滑。
非經閉之脈。左尺尤有神氣。是以知產必男也。繹老謂果孕矣。奈發熱腹痛何。
予曰。何傷。氣虛血熱耳。以安胎飲加減調理。卽安也。用人參、白朮、白芍藥爲君。
川芎、當歸爲臣。香附、柴胡、蘇梗、條芩、甘草爲佐。四帖。腹痛減熱除。至期果生子。
繹老德予而多推轂云。

金文學元岩之眷。產後兩日腹痛。下痢純紅。脹鳴三越月。時當孟秋。而脈皆軟弱。用佛手散加減以治。川芎三錢。當歸五錢。艾葉、炮薑各一錢。桂心五分。酒炒白芍藥二錢。連進三帖。而疾減半。後因食新菱新栗。又連爲怒氣所激。日晡暈厥。以生薑湯灌甦。腹脅大痛。手不可近。用二陳湯。加香附、砂仁、桂皮、炮薑與之。痛亦不減。且胸鬲脹甚。自以手探喉中。吐出菱栗。痛稍定。少頃復痛。又用手探吐。吐後瀉三四次。而元氣脫矣。脈皆散亂如解索狀。神氣憊而恍惚。循衣摸床。病勢危急。用人參、白朮各五錢。酒炒白芍藥二錢。砂仁、炮薑、肉桂、甘草各一錢。急煎進之。痛乃稍定。精神清。仍瀉二次。次日復進前藥。痛減瀉止。加白朮又四帖。而飲食進。精神勃勃興起矣。此因初痢時。醫者不以產後爲重。徒以治痢苦寒之劑傷其中氣。又爲菱栗生冷所損。中氣益壞然也。治可不慎哉。

沈三石別駕公夫人嚴。產三日而腹不暢。南潯女科陳姓者爲下之。大瀉五六次。遂發熱惡心。又用溫膽湯止吐。小柴胡退熱。服四日。熱吐四日。粒米不進。亦四日。又進入珍湯加童便。服後昏憤耳聾。眼合口渴腸鳴。眼胞上下及手足背皆有虛浮。因逆予治。診其六脈皆數。時五月初二日也。予曰。脈書云。數脈所主。其

邪爲熱。其症爲虛。法當以十全大補湯加炮薑進之。夜半稍清爽。進粥一盂。始開目言語。次日午時。以承值者倦而藥不相接。且言語太多。復昏昧不知人事。初四日。以人參、白朮各三錢。炮薑、茯苓、陳皮各一錢。甘草五分。煎服訖。體微汗。遍身癟痙。熱退而神爽。下午又藥不接。又動怒。昏昧復如前。六脈散亂無倫。狀如解索。癟痙沒而虛極矣。亟以人參、白朮各五錢。炙甘草、炮薑、大附子各一錢。連進二帖。是夜熟寢。唯呼吸之息尚促。初六日。脈又數。下午發熱不退。環跳穴邊發一毒。如碗大。紅腫微痛。夫人父嚴翁與陳女科交譜之曰。向之發熱惡心。皆此所致。由附子、乾薑溫補誤也。須急用寒涼解毒之劑。予正色而諭以理曰。此乃胃中虛火遊行無制。大虛之症。非毒也。若作毒治。而用寒涼。速其死爾。內經云。壯者氣行則愈。怯者着而成病。惟大補庶可萬全。三石翁然予言。急煎附子理中湯進之。日夕兩帖。參朮皆用七錢服。熱癟痙復出。毒散無蹤。熱亦退。沾沾喜矣。復以參苓白朮散調理而全安。皆由產後誤用下藥。致變百出。噫唏。彼不達變之專科。其可任哉。

誥封吳太夫人者。車駕湧瀾公母也。年餘六十。久患白帶。歷治不效。變爲白崩。逆

予治之。診得右寸滑。左寸短弱。兩關濡。兩尺皆軟弱。予曰。據脈心腎俱不足。而中焦有濕。脈經云。崩中日久爲白帶。漏下多時。骨未枯。今白物下多。氣血日敗。法當燥脾兼補心腎。以既濟丹補其心腎。以斷下丸燥中宮之濕。則萬全矣。服果不終劑而愈。旣濟丹方。鹿角霜當歸。白茯苓各二兩。石菖蒲。遠志各一兩。五錢。龍骨。白石脂各一兩。益智仁五錢。乾山藥打糊爲丸。梧桐子大。空心白湯下七八十九丸。斷下丸方。頭二蠶沙炒三兩。黃荆子炒二兩。海螵蛸磨去黑甲。樗根白皮各一兩。麵糊爲丸。下午白湯送下六十九丸。

吳北海太學令政。每月經行期之前。四肢癟癟發塊。紅紫脹痛。不思飲食。胃脘亦常痛。經水多不及期。診其脈兩手皆駛。以症脈參之。肝脾二經有鬱火也。蓋肝主怒。脾主思。多思多怒。隱而不發。鬱滯於中。故臨經癟癟發紅腫於四肢也。以柴胡、川芎、香附、烏藥、白芍藥、青皮、丹參、玄胡索、鬱金酒炒黃連、山梔子治之而愈。

吳之清客周芻玉者。豪放不拘。人言有晉人風。酒後益恣。而好男色。因患白濁。吳醫有以補中益氣湯升提者。有以六味地黃丸補陰者。有以五苓散、六一散滲

利者。有爲降火者。有爲溫補者。不效。又以草頭藥亂進之。肌瘦如削。膝軟如瘞。患有所年所矣。因紹介吳太學北海而謁余。懇爲治之。診其脈右寸關皆數。予曰。皆由酒後不檢所致也。中宮多濕多痰。積而爲熱。流於下部。故濁物溼溼而下。久不愈矣。與以加味端本丸。服之而瘥。白螺獅殼四兩。牡蠣苦參葛根黃柏各二兩。陳皮半夏茯苓各一兩。甘草五錢。麵糊爲丸。令早晚白湯下三錢。

丁酉夏。予寓雉城顧鄉宦宅。其門下竹匠婦懷姪五月。而患心痛。究其所由起。謂由失足墜樓也。始教飲堇菜汁一盞。而痛隨止。其夫又從它醫贖藥二帖歸。令煎服。服既心復痛。吐鮮血盈盆。胸間冲沖上抵。疼不可言。危在頃刻。竹匠告急。予僕孫安安憐之。懇予診治。六脈皆洪。大汗出如雨。喘息不相續。其婦樓居低小。予令亟移居樓下。隨與益元散五錢。令用紫蘇湯調服。又囑之曰。今夜若睡。聽其自醒。切勿驚動。汗止即甦也。服後果睡至曉。汗斂而胸鬲不痛。喘息亦定。再與固胎飲一帖。煎服而全安矣。先是鄰醫診其脈。謂吐血之脈宜沉細。今反洪大而汗出。喘息不休。危在今夜。及病起來。詢余曰。姪婦不得汗。不得下。不得利。小便是謂三禁。昨日之劑悉犯之。而反獲效何哉。予曰。醫貴審症。蓋婦之患

非由病汗。以樓居低小。常酷暑而熱逼故也。汗血去而胎失養。故忡忡上抑。喘息不續。移居樓下以避暑氣。益元散爲解暑之聖藥。而紫蘇又安胎下氣之妙品。氣下則血歸原而病痊矣。此對症之藥法。出王海藏醫壘元戎中。四血飲是也。特諸君檢閱不徧。卽檢閱亦不知爲胎產之治。余何能不過融會前人之法。用之而不膠焉耳。隣醫俛首唯唯而退。

壬申秋仲。予東遊。橋李而王松泉、吳小峰偕行。小峰語予中秋至矣。此間一妓李姓者。行第七。殊可人意。須訪之。晚令佐酒。至則見其態度果澹雅風致。坐少頃。連咳兩聲。小峰究其病曰。偶耳。小峰謂毋誑。孫公知人生死。不啻扁鵲。可求一診。診之。兩寸短濇。兩尺洪滑。關絃予未語。而小峰問脈。予曰。脈甚怪。公可問經行否。曰。行僅一日。亦僅點滴。予曰。此脈在良家主夢遺。若不宜有也。妓曰。良然。卽御客時亦或遺。遺則冷汗溼溼。體倦而不能支。小峰爲請藥。予曰。故置之。小峰問何故。予曰。金木相勝。心神無主。法當不治。小峰謂人尙無恙。何得便至於此。予曰。絃爲春令。當金旺之時。猶然猖獗。設在卯月。木旺火相。肺金枯痿。水之上源已竭。且腎脈洪滑。妓以慾勝。陰血既虧。溼火愈熾。書云。陰虛則病。陰絕則

死。今已咳嗽。其兆見矣。可治乎。次年二月果死。

有老妓金姓者。其嫂三月患頭痛。身熱口渴。水瀉不止。身重不能反側。日漸昏沉耳聾。眼合夢多。亂語。嘉秀醫者歷試不效。視為必死。予適吳江歸。便道過橋李。訪南溪吉泉二兄。吉泉兄以是症見詢。且言諸醫有以補中益氣湯進者。有以附子理中湯進者。二藥已煎成未服。幸弟至。乞為診之。六脈洪大。觀其色內紅外黑。口脣乾燥。舌心黑胎。不知人事。予曰。此疫症也。法當清解。急以小白湯進之。猶可生也。若附子理中湯殺之耳。安可用。南溪兄問小白何湯也。予曰。小柴胡白虎湯合而一之是也。南溪兄謂洩瀉昏沉如此。恐石膏不可用也。予曰。此挾熱下利。但使清陽上升。則瀉止熱退。而神氣自清也。服訖。夜半神氣甦醒。惟小水不利。熱渴不退。予思仲景法。謂渴而身熱不退。小水不利者。當利其小便。乃以辰砂六一散一兩。燈心湯調服之。兩帖而瘳。南溪兄曰。生死信乎命也。弟頃刻不至。必服理中湯。此婦不為泉下人哉。

有曹姓諱鏗者。九月重陽。以胸鬲不舒暢。而謁南溪兄為治。診未竟。予至。南溪兄起語曹曰。舍弟高手。浼診之。診訖未有言。而南溪私問曰。曹何如脈。予曰。不治。

會易貨者沓至。予亦別去。曹果次年二月死。南溪兄問曰。向曹無它病。而弟見脈卽斷不治。何也。予曰。其脈兩寸洪滑搏指。兩關微絃。兩尺微弱。難經所謂溢脈也。九月深秋。木彫零時也。不宜絃大。大則上盛下虛。至一月木旺。木能生火。火木性皆上升不下。下無直陰以相濟。是有陽無陰。有升無降。內經曰。出入廢則神機化滅。升降息則氣力孤危。是以斷曹子二月當嘔吐而死也。

嘉善之妓李雙。號素琴。體雖肥而性冲澹。態度閒雅端重。歌調倡家推其擅場。與予邑程芹溪處厚。患痛風。自二月起至仲冬。諸治不效。鴆母惶毒。遂視爲痼疾。不爲治。而芹溪固懇予診之。六脈大而無力。手足肢節腫痛。兩跨亦痛。不能起止。肌肉消其半日。僅進粥二碗。月汎兩月。一行甚少。予曰。此行渾也。芹溪問病可治否。予笑而應曰。君能娶予能治之。芹溪曰。嫁娶乃風月中套語。公長者。乃至此言。予曰。觀此子。雖墮風塵。實有良家風度。予故憐之。且君斷絃未續。而彼有心於君。或天緣也。芹溪曰。誠吾素願。恐鴆母高其價。而難與言。予謂乘其病而盟之。易與耳。芹溪以予言爲然。乞爲治之。以人參、白朮、苡仁各三錢。當歸、枸杞、杜仲、龜板、蒼耳子各二錢。晚蠶沙、秦艽、防風各一錢。大附子、甘草、桂枝、黃柏

各五分。十帖而痛止。腫退。改用歸芍六君子。加苡仁、丹參、紅花、石斛、紫荆皮。三十帖而全愈。芹溪娶之。善持家。舉族稱賢。而亦羨予知人焉。

沈別駕翁有老僕。頭痛。遍身骨節痛。面色黑。發熱口渴。胸膈膨脹。飲食七日不入。復感寒。人皆危之。予診其脈。左絃數。右洪大。以藿香、蒼朮、防風、葛根、白芷、紫蘇、甘草、陳皮、大腹皮、麥芽、枳實服後。胸鬲稍寬。熱與痛更甚。改以麻黃、葛根、柴胡各二錢。石膏滑石各三錢。紫蘇葉、白芷、蒼朮各一錢。甘草五分。薑三片。服後大汗出而熱痛皆除。惟口渴。又以白芍藥當歸、石膏、知母、柴胡、黃芩、麥冬、葛根、陳皮煎服全愈。別駕翁喜詰予曰。老僕病甚重。無不謂其必死。先生三日起之。此何症。而何湯劑飲之使起也。予曰。此三陽合病。先爲飲食所傷。予故先用藿香正氣湯。加消導之劑。治其本。又以六神通解散。相助表之藥。治其標。病雖重。年雖高。喜其色脈相對。故投以對症之藥易愈也。翁曰。在先生然耳。若它人輕者且重。况重者乎。吾未見其能起也。

蔡中林文學內人。發熱口渴。舌上燥裂。小腹痛嘔吐。藥食不能入者七日。諸醫之技殫矣。皆視爲鬲食而不可爲。吳我峰翁固邀予診。右寸脈絕不應指。關沉滑

有力。左手絃數。予曰。此陽明少陽合病。邪熱壅於上焦然也。非鬲食法當解散。
數劑可愈。無恐。以軟柴胡、石膏各五錢。半夏麯、枳實、黃芩、黃連、葛根、竹茹、人參
各二錢。藥三片煎服。藥納而不吐。五更下黑糞數塊。熱痛減半。次日仍與前藥。
右寸脈至是亦起。粥始進。改用小柴胡加橘紅、竹茹、葛根。服三帖而全安。

吳九宜先生。每早晨腹痛洩瀉者半年。糞色青。腹膨脹。人皆認爲脾腎洩也。爲灸
關元三十壯。服補脾胃之藥皆不效。自亦知醫。謂其尺寸俱無脈。惟兩關沉滑
大。以爲憂。以人言洩久而六脈將絕也。予爲診之曰。君無憂。此中焦食積痰洩
也。積膠於中。故尺寸脈隱伏不見。法當下去其積。諸公用補謬矣。渠謂敢下耶。
予曰。何傷。素問云。有故無殞。亦無殞也。若不乘時。久則元氣愈弱。再下難矣。以
丹溪保和丸二錢。加備急丸三粒。五更服之。已刻下稠積半桶。脹痛隨愈。次日
六脈齊見。再以東垣木香化滯湯調理而安。渠稱謝言曰。人皆謂六脈將絕爲
虛極。公獨見之真而下之。由公究理深邃。故見之行事。著之談論。皆自理學中
來。他人何敢望其後塵。

沈大官左膝腫痛。不能起止者年半。大便瀉一日三次。診其脈絃緊。予曰。此脾虛

有濕熱凝於經絡。流於下部也。古謂腫屬濕。痛屬火。用蒼朮、黃柏、薏苡仁爲君。澤瀉、猪苓、五加皮爲臣。炙甘草、防風、桂枝爲佐。木通爲使。四帖痛減。腫消。洩瀉亦止。改用蒼朮、蒼耳子、五加皮、苡仁、當歸、枸杞子、杜仲、丹參、黃柏、烏藥葉酒糊爲丸。調理月餘。步履如故。

沈繼庵先生。下痢十二日。腹痛脫肛後重。噯氣不知飢。一友用補中益氣加白芍藥。腹痛愈加。後重亦甚。予脈之。右關滑大搏指。曰此積滯固結腸胃間。故後重脫肛也。當爲推蕩。以其素弱多鬱。不敢只爲調氣而兼消導。木香、山楂、檳榔、枳實、川芎、白芍藥、黃連、黃芩、秦艽。服後稍寬。次日用七傷丸二帖全愈。其內人患發熱頭痛。遍身痛。乾嘔口渴。胸膈脹悶。坐臥不安。醫與以參蘇飲。乾嘔愈甚。又加煩躁。予診之。右手洪大倍於左。左浮數。予曰乾霍亂症也。與以藿香正氣散。減去白朮、桔梗。加白扁豆、香薷。一帖吐止。食進。遍身痛除。惟口渴額痛未除。小水不利。以石膏、香薷、滑石各五錢。橘紅、藿香、葛根各二錢。檳榔、木瓜各一錢。甘草五分。薑三片。一帖而愈。

沈晴岳先生。五更耳鳴。腹不舒暢。稍勞則烘然熱自汗。脈右關滑大有力。左脈和

緩。原爲當風睡臥而得。素來上焦有痰火。午後過勞或受餓。大作眩暈。冷汗津津。再不敢動。稍動則嘔吐。此皆痰火所致。蓋無痰不作暈也。先與藿香正氣散一帖。以去表裏之邪。繼與溫膽湯加天麻。服後眩暈嘔吐皆止。次日診之。右關脈仍滑。此中焦食積痰飲膠固已久。卒難動搖。姑以二陳湯加枳實、黃連、滑石、天花粉、天麻、竹茹調理後。以當歸龍會丸加牛膽、南星、青礞石。凡數帖全愈。

潘景宇內人。後半夜不睡。面黃肌瘦。兩太陽及眉稜骨痛。大便溏。稍勞動則體熱。四肢無力。其脈左寸洪滑。自春至秋皆然。此由脾虛。肝心二經火盛然也。先用四君子加酒連、柴胡、白扁豆、澤瀉、滑石調理。夜與錢仲陽安神丸數粒。燈心湯送下。服八日得睡。兩太陽亦不痛。繼用六君子加黃耆、秦艽、柴胡、澤瀉、當歸、白芍藥、黃柏全安。

臧六老。上吐血。下瀉血。胸膈背心皆脹。原從怒觸。又犬肉所傷。故發熱而渴。醫者皆作陰虛火動。而爲滋陰降火。胸背愈脹。血來更多。予診之。兩關俱洪滑有力。謂曰。此肝脾二經有餘症也。作陰虛治左矣。內經曰。怒傷肝。甚則嘔血。并下洩。胸背脹痛。瘀血使然。脾爲犬肉所傷。故不能統血。今誤用地黃、麥冬、黃柏。知母。

等劑。是以脾益傷。而上焦瘀血愈滯也。惟調氣健脾兼之。消導則萬全矣。六老曰。人皆謂勞怯。故發熱吐紅血。上吐陽絡傷也。血下行。陰絡傷也。陰陽俱傷法當不治。公獨認非陰虛何也。予曰。脈書云。脈數無力者。陰虛也。今脈固非陰虛。書又曰。凡陰虛之熱。發以申酉戌間。夜半而退。明日猶是。如潮信然。以下午乃陰分主事。故曰。陰虛潮熱也。今熱不分晝夜。而症亦非陰虛。故曰。作陰虛治者左也。六老聞言大喜。曰。公誠見垣一方者。幸惠一七以生之。即與山楂、香附、枳實、調氣消導爲君。丹參、丹皮、桃仁、滑石、茅根。化瘀血爲臣。黃連、蘆根。解犬肉之熱爲佐。四帖。胸背寬。血吐止。惟腹中不舒。仍以前藥同丹溪保和丸與之。四帖。大便下極臭黑糞半桶。寢食俱安矣。

有臧氏之婦。原以有痰火。服降火之藥過多。至秋痰積因令氣下行而滯於大腸。臍邊有硬塊。按之甚痛。痢下紅白八日。下惟點滴。日夜二十餘行。腹痛潮熱口渴。小水不利。大便裏急後重。飲食不進。身重不能轉側。予診之。喜左脈皆有神氣。卽從劉守真之法。行血則便膿自愈。調氣則後重自除。治之用白芍藥、滑石、桃仁爲君。當歸爲臣。木香、檳榔、山楂、酒芩、酒連、枳殼爲佐。服下。大便稍流利。腹

中稍寬舒。次日仍與前藥。則滯下大行。痢減大半。第三日用芍藥。當歸。滑石。桃仁。炙甘草。酒連。木香。與保和丸同服。下午大便行。上午所服丸藥隨糞而下。乃知積滯已盡。諸症悉減。惟臍邊痛未全止。以仲景小建中湯加當歸。木香。服之而安。

丁耀川文學令堂。年四十四。常患胃脘痛。孀居十五年。日茹蔬素。其年七月。觸於怒。吐血碗許。不數日平矣。九月又怒。而吐血如前。加腹痛。至次年二月。忽裏急後重。肛門大疼。小便短濶。出惟點滴。痛不可言。腰與小腹之熱。如滾湯泡者。日惟仰臥不能側。一側則左膀并腿作痛。兩跨原有痛。小便疼。則肛門之痛減。肛門疼。則小便之痛亦減。肛門以痛之故。不能坐。遇驚恐。則下愈墜而疼。經不行者兩月。往常經來時。腰腹必痛。下紫黑血塊甚多。今又白帶如注。口渴。通宵不寐。不思飲食。多怒。面與手足發虛浮。喉中梗梗有痰。肌肉半消。診之。脈僅四至。兩寸軟弱。右關滑。左關絃。兩尺濶。據脈上焦氣血不足。中焦有痰。下焦氣凝血滯。鬱而爲火。蓋下焦之疾。肝腎所攝。腰跨肝之所經。而二便乃腎之所主也。據症。面與手足虛浮。則脾氣甚弱。飲食不思。則胃氣不充。不寐。由過於愁憂思慮。

而心血不足。總爲七情所傷故爾。內經云。二陽之病發心脾。女子得之則不月。此病近之。且值火令當權之候。誠可慮也。所幸者脈尚不數。聲音清亮。尤可措手。因先爲開鬱清熱。調達肝氣。保過夏令。後再爲驟補陰血。必戒絕怒氣。使血得循經。而病可痊。不然。則倉扁亦難奏功矣。初投當歸龍會丸。以徹下部之熱。繼以四物湯。龍膽草。黃柏。知母。柴胡。澤蘭葉。煎吞滋腎丸。連服四日。腰與小腹之熱始退。後以香薷石葦。龍膽草。桃仁。滑石。杜牛膝。甘草梢。軟柴胡。煎吞滋腎丸。大小便痛全減。

丁文學長令姊。常患暈厥。吐痰碗許乃甦。一月三五發。後又口渴。五更倒飽。腸鳴。腹疼。洩瀉。小水短濶。咳嗽。予脈之。兩寸濡弱。兩關滑大。此中焦痰積所致也。先與二陳湯。加蒼朮。山楂。麥芽。以健脾去濕爲臣。以白芍藥止痛爲君。以滑石。澤瀉引濕熱從小便出爲佐。黃芩爲裨佐。十帖。二陰之痛俱止。改以六味地黃丸。加黃柏。知母。牛膝。服之全安。

有金良美者。年十八。患咳嗽吐紅。下午潮熱。夢遺。市醫進四物湯。加天麥門冬。黃柏。知母之類。治半年。反加左脇脹疼。不能側臥。聲音漸啞。飲食輒惡心。肌肉大

削六脈俱數。醫告技窮。因就予治。觀其面色白。又隱隱有青氣夾之。兩足痿弱無力。予語之曰。此症氣虛血熱而肝脈甚絃。絃則木氣太旺。脾土受虧。不能統血。殆始怒氣所觸。繼爲寒涼之劑所傷。以致飲食惡心。肌肉瘦削。書云。脾胃一虛。肺氣先絕。以肺金不足。則肝木愈不能制。濁痰瘀血凝於肺竅。故咳嗽聲啞。滯於肝。故左脇不能貼席而臥。病勢危矣。喜在青年。猶可措手。因急用人參二錢。鱉甲五錢爲君。白朮。白芍。陳皮。茯苓。通草。貝母各一錢爲臣。甘草。牡丹皮各七分爲佐。桔梗五分爲使。二十帖。潮熱止。咳嗽減大半。三十帖。聲音開亮。左脇亦能貼席而臥。後以大造丸。調理全安矣。乃囑之曰。病愈雖可喜。而絃脈未退。須切忌怒氣。及勞心勞力之事。庶幾可保無虞。苟不守予言。而勞怒相觸。血來必不能禦。戒之防之。此後精神日旺。肌體豐肥。六年無事。一日遇事拂意。大怒。而又結算勞心。則血如泉湧。頃刻盈盆。上脣黑腫。汗出淋漓。急請予診。脈亂無倫。診畢渠語近侍。欲大解。予曰。此死徵也。陰陽乖離矣。辭而出。未離門而氣絕。父母哭謝予曰。始守翁訓。苟活六年。一旦不戒。遂如翁所料。死生雖命。亦不自慎致之。其爲人也。量窄而緊於財。因記此以戒世之重財輕生者。

倪五娘子。以中風暈厥之後。口眼歪斜。左脚右手不能屈伸。口渴小水不利。兩頰緊出語艱澁。問之則期期而對。不問默然亦不思飲食。行年五十矣。諸醫不效。予治始與涼膈散。加石菖蒲、遠志煎湯化錢氏安神丸二顆服之。其夜大便四行。次日神氣遂清。口眼半正。惟頰車尚緊。未能開聲。細察形氣似弱也。即與六君子湯加麥門冬、滑石、天花粉、石菖蒲、遠志、當歸、薄荷。服後神思大清爽。能自坐。不須人扶。語言亦稍利。改以六君子湯加麥冬、天花粉、石菖蒲、當歸、五加皮、薏苡仁、紅花、天麻。十帖全愈矣。

王祖泉令政。患頭疼夜熱。洒淅惡寒。汗淋漓如雨。上身熱。下身寒。渴不思飲。遍身疼。腹有一塊。大如拳。硬如石。腸鳴小水短少。飲食俱廢。脈則右關滑。左絃數。究所由起。謂大怒後卽傷於食。市醫皆以地黃門冬芩連黃柏之劑治之。熱愈甚。脾氣大虛。予治用平胃散。加山楂、麥芽、砂仁、香附、木香、川芎、枳實。連進四帖。中氣稍能運動。而夜熱如前。再與補中益氣湯。寒熱俱退矣。而腹痛裏急後重。予知其積滯將行也。乃與白六神丸。而腹痛後重皆除。改進以參苓白朮散。加香附、烏梅、山楂。服之病良已。

溫巽橋子婦。吳車駕湧瀾公長女也。發熱惡心。小腹痛。原爲怒後進食。因而成積。左脚酸痛已十日矣。南潯有陳女科。始作瘧疫療治。嘔噦益加。又作瘧治。粒米不能進。變爲滯下。裏急後重。一日夜三十餘行。陳技窮而辭去。且言曰。非不盡心。犯逆症也。下痢身涼者。生身熱者死。脈沉細者。生脈洪大者死。今身熱脈大。而又噤口。何可爲哉。因請予治脈之。兩手皆滑大。尺部尤搏指。予曰。症非逆誤。認爲疫爲瘧。治者逆也。雖多日不食。而尺脈搏指。內經云。在下者引而竭之。法從下可生也。卽與當歸龍會丸一錢五分。服下去稠積半盆。痛減大半。不食者十四日。至此始進粥一甌。但胸鬲仍飽悶不知餓。又與紅六神丸一錢。胸膈舒而小腹軟。惟兩跨痛。小腹覺冷。用熱磚熨之。子戶中白物綿綿下。小水短濇。改用五苓散。加白芷、小茴香、白雞冠花、柴胡服之。至夜滿腹作疼。亟以五靈脂醋炒爲末。酒糊爲丸三錢。白湯送下。通宵安寢。次日精神清健。飲食大進。小水通利矣。而獨白物仍下。再用香附炒黑存性。枯礬各一兩。麵糊爲丸。每空心益母草煎湯送下二錢。不終劑而白物無病全愈矣。專科報然稱奇而服錄其案驗而去。

溫一渠內人。平素血虛咳嗽。近爲飲食所傷。不知飢餓。專科作陰虛治。而胸膈愈脹。予脈之。右關滑大。左手軟弱。法當先健脾。消去飲食。然後治嗽。若爲滋陰降火。不惟咳嗽無功。恐脾胃轉傷。腹脹瀉洩。變將不測。何也。脾胃喜溫而惡寒也。卽以二陳湯加山楂、麥芽、枳實、白朮、川芎、香附與之一劑。而胸膈寬。再劑而飲食進。繼用桑白皮、地骨皮、甘草、陳皮、貝母、瓜蔞仁、馬兜鈴、桔梗、紫苑十帖而愈。咳嗽脫然矣。

溫巽橋二令媳產後五十餘日。右脇脹痛。手不可近。赤白帶多。下如膿。發熱。大便燥結。予曰。此惡露未盡。瘀血化爲膿。治宜急也。嘗見數婦有此病。而不識治。積而成毒。有成腸癰者。有內成腫毒。潰從腰俞出者。皆以不知治法。則瘀血無從出故也。急用澤蘭葉、山楂子、五靈脂。消惡露爲君。川芎、當歸、茯苓、白芷爲臣。益母草爲佐。香附、青皮爲使。外與當歸龍會丸潤大便。使熱從大便去。服後次日。腹脇皆寬。痛亦盡止。又因食葷與雞子。復作疼。但不如前之甚。隨與保和丸用山楂煎湯送下三錢。而痛愈矣。

溫天衢氏。冬月病目。醫爲發散太過。至春間吐血碗餘。及夏。下午潮熱咳嗽。胸膈

脹疼。早晨冷汗淋漓。大便溏。一日二行。飲食少。肌肉消十之七。脈數據症脈法。在不治里中諸長老。以其素行端厚。羣然懇予措劑。予以衆懇不能辭。乃用瀉白散。加五味子。白芍藥。貝母。馬兜鈴。服下。其夜帖然而臥。不嗽。惟大便溏。前藥加白扁豆。山藥。茯苓。汗亦漸止。復與瀉白散。加石斛。馬兜鈴。貝母。陳皮。薏苡仁。白芍藥。山藥。五味子。桔梗。調理三月而全。

張二娘子姪七月而嘔吐不止。氣壅咳嗽。胸與兩脇皆脹。不能伏枕。予先與金花丸。二服以止吐。服下立應。繼與大腹皮。陳皮。枳殼。半夏。甘草。竹茹。茯苓。旋覆花。前胡。紫苑。黃芩。生薑。服二帖。氣平嗽止。安然睡矣。

金花丸者。雄黃一錢五分。半夏一兩。檳榔二錢。薑汁浸蒸餅糊爲丸。是也。王敬泉內眷。患痰嗽。腹飽脹。洩瀉腸鳴。裏急後重。發熱。口鼻之氣如火。塞以六君子湯。加山楂。麥芽。柴胡。秦艽。青蒿。白芍藥。益智仁。與香連丸兼服。兩劑。氣舒嗽減。大便結實。鼻仍塞。前方加川芎。減白芍藥而安。

溫南溪內人。居常大便祕結。面赤。不思飲食。頭時眩暈。診其脈。右關尺滑大有力。此痰火症也。用瓜蔞四錢爲君。滑石三錢。枳實二錢。半夏一錢。半爲臣。蘿蔔子。

薑黃各一錢爲佐。兩帖愈矣。又教以或遇大便祕結。每服當歸龍會丸。加牛膽、南星一錢。立應。

陳春野孝廉二令愛。患丁奚疳痢。四肢浮腫。以布袋丸。與大安丸同服。則大瀉。用參苓白朮散。加澤瀉。山楂。麥芽。瀉亦不止。神氣大弱。穀粒不入口。小水不利。大便一日仍三五次。積滯未除。改以參苓白朮散。加肉果與服。瀉稍止。食粥一盞。下午因食紅棗數枚。夜分痰忽起。其勢甚危。急與蘇合丸服之而愈。再以參苓白朮散。加石菖蒲。藿香。炮薑。肉果。調理全安。

潘敬齋令媳。原因經水不行。醫投安胎之劑。越七月。經水忽大行。內有血塊筋膜。如手大者一二桶。昏冒困憊爲劇。逆予治其脈。右關洪滑。左寸洪數。兩尺皆洪。大病形夜分咬牙亂語。手心熱。口噤。時手足皆冷。心頭脹悶不快。面色青。始諸醫皆謂難治。予曰。無恐。此濁痰流滯血海。以誤服安胎之劑。益加其滯。夫血去多。故神魂無依。痰迷心竅。故神昏語亂。急爲調氣開痰。安神養血。可生也。即以溫膽湯。加石菖蒲。酒芩。天麻。酸棗仁。丹參與服。其夜子丑時。咬牙亂語皆減半。次日。仍與前藥。每帖加竹茹五錢。臨睡。又與黑虎丹數粒。諸症悉去而愈。敬齋

問曰。藉高手病痊矣。而每發於夜半何也。予曰。此心包絡與膽經有痰熱。故每至其時而發。單治此兩經。痰既消而神魂俱安也。敬齋曰善。

上舍張懷赤。每早晨腸鳴瀉一二度。晚間瀉一度。年四十二。且未有子。予診之。尺寸短弱。右關滑大。予謂此中焦有濕痰。君相二火皆不足。故有此症。以六君子湯加破故紙、桂心、益智仁、肉荳蔻煎服。瀉遂減半。又以前藥加杜仲爲丸。服之而愈。次年生子。

臧七房二老夫人。年六十八。患痢。痢後過食熟菱與腐湯。以致大便滑洩不固。飲湯水徑直下不停。胸膈否悶。語言無力。舌乾口燥。生瘡。嚥津液則喉疼。元氣大虛而熱。皆虛火所致。且長素二十餘年。又當痢後。益知非有餘之症也。脈又尺寸俱弱。兩關滑大。內經云。清氣在下。必生飧洩。濁氣在上。必生腹脹。此之謂也。法當提清降濁。補助元氣。用四君子湯。加葛根、白芍藥、黃連清虛熱。止燥渴。爲君桔梗輔佐。葛根升提清氣爲臣。陳皮、麥芽降其濁氣。以消胸膈否悶爲佐。加烏梅爲使。上使生津。下使止濁。連服二劑。尺寸之脈稍起。飲食亦得停腹。駸駸然始有生氣。仍以前方。加白扁豆、神麃打糊爲丸。調理而安。

蔡樂川令眷。患頭痛。痛如物破。髮根稍動。則痛延滿頭。暈倒不省人事。踰半時乃甦。遍身亦作疼。胸膈飽悶。飲湯水停膈間不下。先一日吐清水數次。蛔蟲三條。原爲怒起。今或惡風。或惡熱。口或渴或不渴。大便祕。脈則六部皆滑大有力。予曰。此痰厥頭痛症也。先以藿香正氣散止其吐。繼以牛黃丸、黑虎丹、清其人事。頭仍疼甚。又以天麻、藁本各三錢。半夏二錢。陳皮、白芷、薄荷、麻黃、生薑、葱白煎服。得少汗而頭痛少止。至晚再服之。五更痛止大半。而人事未全清。予謂此中焦痰盛。非下不可。乃用半夏五錢。巴霜一分。麵糊爲丸。每服三十九。生薑湯送下。下午大便行三次。皆稠粘痰積也。由此飲食少進。餘症差可。惟遍身仍略疼。改用二陳湯。加前胡、石膏、藁本、薄荷、枳殼、黃芩、石菖蒲調理而安。

周蘆汀乃眷。患胃脘痛。手心熱。嘔吐不食者。四日晝夜叫痛不輟聲。脈則兩手皆滑數。予謂當以清熱止痛爲先。故先與清熱止痛末藥二錢令服之。不一飯頃。痛遂止而睡。家人皆色喜。予曰。未也。此火暫息耳。其中痰積甚固。不乘時而下之。勢必再作。因與總管丸三錢。服下腹中微痛。再服二錢。又睡。至天明乃寤。而腹痛亦止。大便下痰積甚多次日。以二陳湯。加枳實、薑黃、香附、山梔、黃連與之。

服後胃脘之痛全止。惟小腹略覺膨脹。予謂其痰積未盡也。再與總管丸三錢。
夜服之。天明又行一次。痰積之下如前。而胃脘之痛亦絕不發矣。

孫文垣醫案 卷一 三吳治驗



孫文垣醫案

二

中國醫學大成第十一集

醫案類

孫文垣醫案中

上海大東書局印行

孫文垣醫案

明

新安

孫一奎文垣甫輯

鄞縣

曹赤電炳章圈點

袁大晉藏書
號

卷二

二二吳治驗

王文川令郎。原傷飲食。又傷於冷菱等物。遍身發黃。眼如金色。夜發熱。天明則退。腹痛手不可近。號叫通宵。市醫因其黃而曰胡苔真矣。衆議以草頭藥進。予至急止之。曰。向以草藥幾誤其母。復欲誤其子乎。蓋脾胃喜溫惡寒。且此症乃食積釀成。而黃爲濕熱所致。法當健脾。用溫暖之劑下之。濕熱去而黃自退。草頭藥性多寒。用之是損脾土。而益其疾也。可用哉。卽以保和丸一錢。入備急丸五分。作一次服之。少頃瀉一次。又少頃連下三次。積物所下甚多。腹痛盡止。再與調中丸服一月。不但一身之黃盡退。而步履輕捷如飛。其父喜曰。神不誤我。問

其故。曰。始議進草頭藥者十九。而孫君獨叱其非。余不能決。而決於神。神允孫君。服果有效。而吳我峰小樓等曰。亦孫君之藥神爾。設無孫君。神雖靈。何所顯哉。衆拊掌而噱。

施涇陽先生內人。年五十八。左脅有痰飲。每升至咽間。卽脹悶不知人事。遍身皆脹。不能臥。小水赤。診其脈兩寸關洪滑。六部皆數。予謂此痰火症也。痰生熱。熱生風。故每發人事。不知爾。乃與牛黃清心涼膈丸。同黑虎丹。服之。夜遂得睡。人事亦安靜。再以二陳湯。加滑石、竹茹、鬱金、薄荷、黃芩、前胡。加燈心、生薑。煎服全安矣。

屠侍軒尊眷。產一日而觸於怒。大便洩瀉。昏憤不省人事。大熱氣促。汗多。衆醫謂產後脈不宜大。今脈大而左手且散亂。又汗出喘促。法在不治。予曰。固然。書云。醫而不起者有矣。未有不藥而起者也。且不藥而視其死。與藥而或可圖生者孰優。予試之。亟與人參五錢。白朮三錢。炙甘草一錢。五分炮薑二錢。肉果六分。五味子七分。煎服。其夜遂稍睡。予竊喜。補而得睡。其陰陽和矣。次早脈果稍收斂。喘促亦緩。大便前半夜瀉三次。五更啜粥半盂。小便通利。大有生意也。再以

人參、阿膠固元氣定喘爲君。白朮、炮薑補脾爲臣。澤蘭葉退產後之熱。五味子斂神止汗。肉果止瀉爲佐。甘草和中爲使。五帖而安。

屠學恆先生乃眷。以產後欠補養。而精神疲困。脾胃亦弱。腹中間作痛。作瀉。脈兩手皆濡軟無力。以六君子湯加藿香、砂仁、香附、蒼朮、澤瀉。調理而安。

周鑑泉令政。病傷寒發熱。譫語口渴。咳嗽。胸膈痛。洩瀉嘔吐。遍身發斑。診之。六脈洪滑。予曰。此少陽陽明合病之症。勢亦重矣。急以升麻葛根湯加滑石、五味子進之。服後汗大出。下午卽退涼而譫語止。晚進柴芩湯加五味子、滑石。其夜瀉止。神思始清。次日左脈已和。右脈亦稍收斂。予喜曰。可無恙也。改用白芍藥爲君。陳皮、柴胡、酒芩、五味子、牡蠣、滑石、茯苓、澤瀉、白朮。服四帖而痊可。

大國博臧顧渚先生。病兩耳掀痒。脣燥舌乾。咳嗽吐濃痰。脈左稍浮弦。右洪滑。此胃中痰火流入肺經。鬱積久而生熱生風也。先以總管丸導其痰。又與黑虎丹祛其風熱。繼以天花粉、薄荷、鬱金、葛根、白藥子、甘草、黃連、連翹、蟬退煎服而安。王南崗。咳嗽氣湧不能伏枕。吐痰不已。下午微熱。胸膈膨脹。不知飽餓。口乾舌上白胎厚。小水短少。大便裏急後重。間有紫黑血脈。右關洪滑。左手濶。據脈症胃

中有瘀血痰積。而肺氣亦虛也。法當先補而後瀉。以人參、白朮、白芍藥、柴胡、黃連、陳皮、半夏、五味子、桔梗。與三帖後。察其肺脈已旺。乃與總管丸下之。去黑血屑極多。諸症悉減。再與紅六神丸調理而痊。

張桃津乃政。原有小便癃閉之症。又小產後三日。臍下作疼。夜分發熱。口渴。大便溏。日三四度。先與補中益氣湯。加玄胡索、澤蘭葉、牡丹皮服之。連進三帖。大便實矣。惟小便頻數。滴滴不斷。一日夜二十餘次。夜分尤多。精神甚憊。脈雖五至。不甚充指。此血虛有熱。而氣亦滯也。濕熱在氣分。故口中渴。血虛。故臍下痛。法當峻補其陰。而淡滲其陽。以熟地黃三錢。黃柏一錢。補陰爲君。草薢去濕熱爲臣。瞿麥穗、澤瀉淡滲爲佐。烏藥調氣。甘草爲使。服下。臍痛全止。小便其夜亦不起。連進三帖。病脫然矣。

陳光祿松巒翁。長厚君子也。而存心博愛。常五更胸膈脹疼。三吳名家遍延而治。寒熱溫涼藥味備嘗。竟無一効。禮予診之。右寸軟弱。左平兩尺亦弱。予曰。此肺腎二經之不足也。補而斂之。可無恙矣。以補骨脂、山茱萸、人參各三兩。鹿角膠、鹿角霜各五兩。杜仲、巴戟、白茯苓、車前子各一兩五錢。乾山藥二兩。鹿角膠酒

化爲丸。空心淡鹽湯送下。又以御米殼去筋膜蜜水炒三兩。訶子麵煨去核一
兩。陳皮一兩半。煉蜜爲丸。五更枕上白湯送下一錢服。一月病不再發。翁由是
交予極驩也。及見予玄珠稿大稱快語曰。醫家凡得一方。輒自祕以爲高。君獨
欲公諸人。是有意於壽蒼生者。亟付剞劂。予當助梓。因手錄予百餘方。製丸散
以施。而亦無人德我之望。

溧水令君吳湧瀾公尊夫人。每五更倒飽。必瀉一次。腹常作脹。間亦痛。脈兩手寸
關洪滑。兩尺沉伏。予曰。此腸胃中有食積痰飲也。乃與總管丸三錢。生薑湯送
下。大便雖行。不甚順利。又以神授香連丸和之外。用滑石、甘草、木香、枳殼、山楂、
陳皮、白芍藥、酒連。調理而安。

李悅齋先生夫人。胸脇大腹作疼。譫語如狂。寅卯辰三時稍輕。午後及夜痛甚。晝
夜不睡。飲食不進者十八日。究其故。原有痰火。與頭疼牙疼之疾。又因經行三
日後。頭疼發寒熱。醫以瘡治。因大惡熱。三四人交扇之。而兩手浸冷水中。口噙
水而不嚥。鼻有微衄。又常自悲自哭。目以多哭而腫痛。時卽壁上。亦欲飛去。劇
則咬人。小水直下不固。喉梗梗吞藥不下。脈則左絃數。右關洪滑。予曰。此熱入

血室症也。誤服治瘧剛燥之劑。而動痰火。以致標本交作。諸人猶謂熱入血室。當夜間譫語如狂如見鬼。何至胸脇疼痛劇咬人也。予曰。仲景云。經水適來適止。得疾皆作熱入血室治之。治同少陽。而以小柴胡湯爲主。加涼血活血之藥。此古人成法可守也。痛極咬人者。乃胃虛蟲行求食而不得。故喉中梗梗然也。卽以小柴胡湯加桃仁丹皮。而譫語減。次日以安蠶湯與服。而疼隨止。飲食進。遂駸駸有生意。

吳仲峰先生邀予診時。爲仲秋初二日也。六部皆沉微。而左尤甚。隱隱如珠絲之細。症則原以腸風去血。過服寒涼。致傷脾胃。自春至秋。脾洩不愈。日夜十二三行。面色黃白帶青。兩頤浮腫。四肢亦浮。小水不能獨利。利必與大便並行。腸鳴四肢冷。口不渴。飲食大減。口脣齦肉皆白。其爲人也多憂思。夫四肢者。脾之所主。清冷爲陽氣不充。兩頤乃腎經部位。浮腫益見腎氣之不足也。脈沉微。與面色黃腫。皆屬於濕。書云。諸濕腫滿。皆屬脾土。合脈症觀之。由脾虛不運。積濕而然。虛寒明矣。病至此勢亦甚危。第形症相符。色脈相應。又能受補。庶幾可生也。法當大溫補升提。以東垣益胃升陽滲濕湯加減調理。人參三錢。白朮五錢。黃

耆二錢。茯苓、益智仁、蒼朮、澤瀉各一錢。大附子五分。炮薑、炙甘草、升麻、防風各五分。連服八帖。諸症悉減。乃囑之曰。病雖暫愈。宜戒生冷憂思。庶服藥有效。切勿輕犯。犯之非藥石可回也。翁曰諾。敢不唯命。

張後溪先生令孫遍身瘡疥浮腫。腫自足背起。漸腫上大腿。今且至腹。大便洩瀉。發熱不得安寢。此風濕之症。當令與時違之候。治從開鬼門、潔淨府二法。使清陽升則瀉可止。小水利則浮腫可消。上下分去其濕之意也。蒼朮一錢。薏苡仁、桑白皮各三錢。青蒿、防風、升麻、柴胡各五錢。大腹皮、五加皮、赤茯苓、澤瀉各六分。入帖全安。

府佐張五橋先生夫人。患喘嗽。夜分氣壅不能仰臥。體素弱。脈右滑大。左細弱。每咳嗽必連。連數十聲。痰不易出。甚至作吐。以東垣人參平肺散加減治之。四日而愈。人參、桑白皮、地骨皮、青皮、茯苓、五味子、知母、滑石、麥芽、天麻、粳米、甘草。水煎服。夜與白丸子。

方東垣患脊骨痛。牽引胸腹皆疼。舌上黃胎甚厚。脈沉滑而數。先與川芎、羌活、炙甘草、蒼朮、薑黃、防風、藁本、枳殼、桔梗、柴胡服之。服後背脊痛減。腹仍痛。與木香、

檳榔、薑黃、香附、青皮、酒連、大瓜蔓、柴胡、川芎服之。腹痛稍減。腰疼甚。知其痰積下行。欲去而不能也。卽以木香檳榔丸下之。連行三四次。舌上黃胎始退。腹痛全止。脈亦軟弱。改以人參當歸、白芍、甘草、茯苓、陳皮、白芥子、香附、柴胡、青皮、白朮調理而安。

張淨宇文學。發熱腹疼洩瀉口渴。嘔吐不止。時師有認寒者。有認熱者。有認傷食者。予至診之。曰。此時疫瀉也。以二陳湯倍白朮。加青蒿、葛根、酒芩、白芍藥、猪苓、澤瀉、滑石。一劑而安。

張一尹近川翁。始以內傷外感。過服發散消導之劑。致胃脘當心而痛。六脈皆絃而弱。此法當補而斂之也。白芍藥酒炒五錢。炙甘草三錢。桂枝一錢半。香附一錢。大棗三枚。飴糖一合。煎服。一帖而瘳。

閔文川先生。肛上生一腫毒。月餘膿潰矣。但稍動則出鮮血不止。大便結燥。胸膈飽脹。飲食不思。脈兩寸短弱。關絃尺洪滑。此氣虛血熱陷於下部。法宜補而升提也者。不然痔漏將作。可慮也。黃耆二錢。歸身。地榆。槐花。枳殼各二錢。升麻。秦艽各七分。荆芥穗五分。甘草三分。服後胸膈寬。惟口苦甚。前方加酒連。連翹各

五分而愈。

李古愚先生。每食後即大便。腹皮稍脹急。胸膈飽悶。醫與參朮。則痞悶愈甚。小水清而長。予脈之。左寸濇。右寸滑。按之如黃豆大。且鼓指。關尺之脈皆絃小。左尺脈迢迢有神氣。據脈乃積痰鬱滯於肺。莫能出。以致大便之氣不固也。法當效丹溪治。乃叔用吐。吐去上焦痰積。而大便自實矣。先用苦梗、蘿蔔子各三錢。白豆仁、橘紅、山梔仁各一錢。川芎五分。生薑三片。葱三根。水煎服之。取吐。服後半時許。惡心吐出清痰。心惡之勢雖有。乃痰積膠固。猶不易出。又以蘿蔔子一合。搗漿水加蜂蜜。與半碗飲之。始吐出膠痰二碗餘。平日每小水。則大便並行。吐後。小水始能獨利。連行三四次。而胸腹寬舒。初亦以吐為懼。至是豁然稱快。大便五日不行。始以予言為不謬也。再以二陳湯。加白朮、旋覆花、麥芽。調理而全可矣。

姚惠齋先生。夜多洩瀉。瀉必三五次。甚且十數次。小腹時作疼。按亦疼。口不渴。小便長。醫半年不愈。予診之。左寸滑。餘五部皆濡弱。此陽氣大虛。虛中有寒也。治當溫補下元。兼之升舉。人參一錢半。黃耆、白朮各二錢。白芍藥酒炒三錢。大附

子五分。肉桂一錢。杜仲、補骨脂各一錢半。升麻、防風各七分。薑棗煎服。其夜大便減半。次早雖瀉。俱是白積如生豆汁狀。小腹痛止。再診之。右脈稍起。連服四帖而瘳。翁喜言曰。抱病半年。藥無虛日。今收功於四劑。何速哉。認病真而投劑確也。敢不銘心。

大京兆姚畫老夫人。年幾七十。右手疼不能上頭。醫者皆以痛風治。不效。益加口渴煩燥。請予診之。右手脈浮滑。左平。予謂此濕痰生熱。熱生風也。治宜化痰清熱。兼流動經絡。可瘳也。二陳湯倍加歲靈仙、酒芩、白僵蠶、秦艽四劑。而病去如脫。

一僕發熱頭疼。口渴腹疼。小便赤。大便瀉。日夜不睡者六日。予診之曰。據脈汗後浮數。熱尚不減。乃疫症也。以滑石三錢。青蒿、葛根、白芷片。芩各一錢半。炙甘草、升麻各五分。一帖即得睡。熱減大半。頭痛全除。惟小水赤。頭暈。腳膝無力。此病後血虛之故。以四物湯加青蒿、酒芩、薏苡仁服之而安。

一僕病與前類。而身如火燶。頭痛如破。大便不瀉。小水赤。口渴鼻乾。不得眠。胸膈膨脹。腹飢不能食。六脈弦而數。用竹葉石膏湯加知母、枳殼、白芷、葛根。大加青

蒿。一帖而熱痛減半。胸膈亦寬。惟口渴小水短濶。睡臥不安。又與化癧丹三錢。井水化下。渴止。稍得睡。頭暈脚軟。喘急。與四物湯加青蒿、酒芩、薏苡仁、木瓜。服之全安。

一僕之病亦與前相似。以服丘一齋藥而大吐大瀉。熱益增。頭痛莫能當。煩躁口渴。鼻乾嘔吐。小水短濶。寢食廢者十四日。勢甚危急。詢前所服藥。乃藿香正氣散。加砂仁、厚朴、山楂。大耗元氣之味。且五月火令當權之疫。當以甘寒之劑治之。何可以辛熱香竄者。益其火而枯其津也。其勢危矣。此皆不知因時達變。惟習常膠故以誤人者。用急投人參白虎湯。加竹茹、葛根、青蒿、升麻。一帖而熱除。再帖而頭痛止。諸症盡去。後連治數人。多如此類。何也。此天行之疫。故一方見之。治多先以甘寒清解之劑。投之熱退。即以四物湯以補陰血。稍加清熱劑。而青蒿之功居多。此固一時自得之愚。用錄之以告同志者。使知治法。當隨時俗爲變。而常套人可不脫也。

馬鳳陽文學。五月患咳嗽內熱。額上多汗惡風。脈左絃數。右滑數。予曰。據絃數爲陰虛。滑數爲有痰。不亟調治。恐成虛怯。以白芍藥、川歸、茯苓、五味子、白朮、甘草、陳

皮、貝母、天花粉、酒芩、麥冬、知母、桑白皮。十帖。諸症皆瘳。七月復瘧。間日一發。寒熱相半。寒熱亦俱極渴甚。上身汗多。以石膏五錢。人參黃耆、白芍藥。麥冬、知母各二錢。柴胡三錢。桂枝、甘草、陳皮、貝母各一錢。竹葉三十片。一帖而愈。

倪二南先生內人。小水不禁。一日二十餘起。脈右寸洪而有力。左寸虛。右尺沉微。此心腎不交之症也。以當歸、遠志、丹參、牡丹皮、桑螵蛸、人參、山茱萸、益智仁、黃柏、知母爲丸服之。五日而安。後凡遇辛苦則發。以此服之立效。

柱史嚴印老長媳。少司空沈鏡老女也。患腹痛。有小塊。蘊蘊然。腹覺冷甚。兩寸關皆滑數。兩尺皆沉微。此脾氣弱而飲食不消。又當秋令濕溼之候。不利亦瀉。宜預防。與白朮、蒼朮、茯苓、甘草、白豆仁、木香、半夏、陳皮、澤瀉煎服。其夜果瀉一度。次早又瀉一度。小腹仍疼不少減。且裏急後重。蓋其稟賦素虛。當補中兼消兼利。白芍藥三錢。桂心一兩。甘草、人參、茯苓、澤瀉、陳皮、白朮各八分。升麻、葛根各六分。服後脈皆軟弱不滑。蘊塊亦消。改以人參、黃耆、白朮、白芍藥各二錢。炙甘草、陳皮、澤瀉、葛根、柴胡、茯苓各一錢。調理而痊。

新市陳鹿塘先生。原有腸風臟毒之症。大便燥結。數日不能一行。痛苦殊甚。此胃

寒腸熱之症。其脈兩寸皆數。兩關皆弦而無力。兩尺洪滑。而左尤甚。診畢。渠告予曰。病數年。百醫不效。望生難矣。聞公治多奇中。冀一奇而生之。實再造之恩也。予憐其苦。而俛想久之。因思李東垣有云。大腸喜清而惡熱。脾胃喜溫而惡寒。以胃屬土。而大腸屬金也。今治腸胃相兼之疾。必寒非淒淒。熱非灼灼。始可乃詳酌一方。專以腸風臟毒之藥爲君主外。以養血之劑裹之。使不傷胃氣。蓋藥先入胃。而方傳入大腸。入胃時裏藥未化。及入大腸。則裏藥化而君藥始見。庶幾兩不相妨。亦假道滅虢之策也。因以大黃酒浸九蒸九晒者二兩。槐花三兩。木耳二兩。郁李仁。皂角子。象牙屑。條芩各一兩。血餘灰。升麻。荆芥穗。各五錢爲末。煉蜜爲丸。赤豆大。外以四物湯加蒲黃各一兩爲衣。米湯送下。空心及下午。各服二錢。服此果然血止而大便不燥。飲食日加。鹿塘大喜曰。古稱用藥如用兵。奇正相生。鮮有不克敵者。其公之謂乎。

張道南先生內人。以飲食忤於氣。因腹痛不飲食五日矣。逆予診之。兩寸關弦。尺滑。予曰。此上焦氣虛。下有鬱滯也。以薑黃。青皮爲君。山楂。檳榔。當歸。杏仁。烏藥。枳殼爲臣。柴胡。木香爲佐。吳茱萸爲使。服後氣稍順。然後用葱二斤。煎湯浴洗。

腰腹。卽將熟葱擦摩腰腹。使氣通透。洗畢。卽安臥。少頃。其夜大便通。先下皆黑硬結塊。後皆水。此積滯行而正氣虛也。以建中湯。加山楂。茯苓。澤瀉。柴胡。香附。薑。連調攝之而痊。

張道南先生尊堂老夫人。以勞倦致早晨膈上有痰痞而惡心。每食熱物。目中卽出淚。脈右寸關皆滑。左寸短弱。此心血不足。而肺胃有痰也。以六君子湯。加麥芽。白豆仁。旋覆化洽之而愈。

馬迪庵先生內人。原以飲食過傷。又爲風寒外襲。以內傷外感治之。後復至五更。發熱脣燥。胸中衝跳不已。手足皆冷。脈兩寸俱滑數。予謂此奇痰症也。以小陷胸湯。加白芍藥。蘿蔔子。前胡。酒芩。二帖。次早大便行。下蛻蟲入條。胸中卽不衝跳。但覺力怯。再診之。兩寸減半尺。脈稍起。以二陳湯。加白朮。白芍藥。酒芩。調理後四帖。加當歸而全愈。

大宗伯董潯老夫人。常眩暈。手指及肢節作脹。脈右寸軟弱。關滑。左脈弦長。直上魚際。兩寸皆弱。此亢而不下之脈。難經所謂木行乘金之候也。總由未生育而肝經之血未破爾。內經云。諸風掉眩。皆屬肝木。兼有痰火。治當養金平木培土。

化痰。以白朮半夏天麻湯。正與此對。服兩帖而眩暈平。再與六君子湯。加天麻、白僵蠶以治其暈。加白芍藥以瀉肝。麥門冬人參以補肺。金麥芽、枳實、神曲、蒼朮以健脾。使宿痰去而新痰不生。少用黃柏二分爲使。引熱下行。令不再發。

張裕齋惡寒痰多作呃。胸膈不寬。兩寸俱短弱。關洪大。尺濇此上焦氣虛。中焦有痰。下元不實也。法當清中補下。不然後將有中風之患。二陳湯加白豆仁、香附、薑香以開胃氣。白芥子、蘿蔔子、杏仁以降痰而潤大便。兩帖諸症悉去。乃錄八味腎氣丸方與之。令自調理。

大柱史嚴印臺夫人年近六十。已孀居十年餘。以孀居而食長素。其婿張懷赤善予語曰。外母近鼻塞。大便瀉。胸膈不暢。醫者下之益甚。予曰。王海藏有云。雜病酒積下之早。必成痞滿。所當慎也。用拉予診之。兩寸沉弱。關弦大。兩尺亦弱。予曰。此陽氣甚弱。脾氣大虛。不當下而誤下之。故鼻作塞。而胸痞悶也。用蒼朮、川芎、桂枝、白芷、防風、桔梗以疏風而升陽氣。白豆仁、蘿蔔子寬胸利膈。麥芽以助脾氣。服後鼻不塞而胸猶痞。復用東垣木香化滯湯。加吳茱萸、乾薑而安。乃囑之曰。病雖漸愈。第陽氣虛。脾氣弱。不宜久食素。恐中氣不充。防作中滿。謹識之。

謹識之。

王谷泉大便作瀉。上身熱。耳中壅塞。頭眩暈。胸膈不寬。口渴痰多咳嗽。六脈俱濡弱。汗大出。此正氣大虛。或由尅伐太過所致。當以補養爲先。人參、白朮、白芍藥、酒炒各四錢。柴胡、石菖蒲、陳皮各一錢。炙甘草五分。澤瀉、茯苓各一錢。兩服而神清膈寬脾健。惟汗不斂。眩暈未除。再與人參、白朮、黃耆、酒炒白芍藥各二錢。炙甘草五分。大附子五分。桂枝三分。澤瀉一錢而愈。

方東埜兩脅痛。上壅至胸。發熱。飲食不進。脈左手沉而弦數。乃積氣也。右手滑。痰飲也。關脈濡弱。脾氣不充也。據症或觸於怒。故痛之暴耳。治當先去積熱。消痰氣。然後用補。瓜蔞仁六錢。枳殼、薑、連、半夏各一錢。半白芥子一錢。牡蠣二錢。炙甘草五分。柴胡一錢。五分二帖。諸症盡去。飲食進矣。然恐其復發也。與當歸龍會丸使行之。以刈其根。服下。果行二次。

一婦人懷姪七月內熱咳嗽。胸膈飽悶。以條芩二錢。瓜蔞仁、白芍藥、紫苑、貝母、桑白皮各一錢。甘草三分。枳殼、紫蘇梗、知母、陳皮各七分。二帖而愈。

一婦人心痛脣紅。痛則大發熱。頭疼。少頃出汗。脈大小不一。予曰。此蟲痛之症。痛

吐白沫可徵也。檳榔、川椒各二錢。杏仁一錢五分。石菖蒲一錢。烏梅七個。炮薑、草豆仁、陳皮各五分。山梔仁一錢。一進而痛減半。再進而痛全除。
倪二南內人小產後。小腹痛。夜分作熱。作暈。予曰。此氣血虛而惡露未盡也。川芎一錢半。當歸三錢。澤蘭、益母草、香附、丹參各一錢。人參七分。荆芥穗五分。山楂、桂皮各一錢。一帖而小腹痛止。再帖而熱暈悉除。

倪少南右頰車浮腫而疼。直衝太陽。大發寒熱。兩手寸關俱洪大有力。此陽明經風熱交扇所致。以軟石膏三錢。白芷升麻各一錢。葛根二錢。生熟甘草一錢。薄荷、山梔子、牡丹皮、連翹各七分。天花粉、貫衆各一錢半。兩帖腫痛全消。

倪少南內人。經行如崩。勢不可遏。頭暈眼花。脈右寸極軟弱。左近駛。此氣虛血熱之候。由氣虛而血不固也。仲景云。血脫益氣。特用人參、黃耆各三錢。白朮二錢。粉草五分。荆芥穗、蒲黃、側柏葉、薑炭各一錢。三帖全瘳。

高仰山內人。痔血裏急後重。飲食入腹。大便即行。晝夜行五六度。五更咳嗽。喉中痰響。肌肉脫口作渴。由服痔科涼血之藥過多。致脾虛不能統血也。脈六部皆軟弱無力。以四君子湯。加荆芥穗、秦艽、陳皮、炮薑。四帖而飲食進。血全止。嗽定

而睡寧。後減炮薑。倍加何首烏。又四帖而數年不發矣。

姚娘子小腹疼。飲食及藥入腹皆疼。疼來遍身無力。此由血崩而致。宜急治之。人參、黃耆各二錢。白朮一錢。茯苓、陳皮各八分。白芍藥、貫衆各一錢。薑炭、荆芥穗、蓮蓬殼燒灰各三分。煎服而安。

張五橋先生令政。鄭都諫春寰公令姊也。痰喘不能伏枕。且咳嗽甚。則吐痰涎碗餘乃止。以旋覆花湯爲主治之。旋覆花、紫蘇子各一錢。半夏一錢五分。厚朴、桂皮、粉草各三分。茯苓、陳皮、桑白皮、葶苈子各八分。薑三片。水煎服。臨臥以養正丹二十粒。白湯送下。兩帖。痰嗽喘各減十之七。乃去葶苈子。加白芥子、蘿蔔子。二帖而痊。

徐文學三泉先生令郎。每下午發熱。直至天明。夜熱更甚。右脇脹痛。咳嗽弔疼。坐臥俱疼。醫以瘧治罔效。延及二十餘日。熱不能退。後醫謂爲虛熱。投以參朮爲主。痛益增。逆予診之。左弦大。右滑大。搏指。予曰。內經云。左右者陰陽之道路。據脈。肝膽之火爲痰所凝。必勉強作文。過思不決。木火之性。不得通達。鬱而爲疼。夜甚者。肝邪實也。初治。只當通調肝氣。一劑可瘳。誤以爲瘧。燥動其火。補以參

朮閉塞其氣。書云。體若燔炭。汗出而散。今汗不出。舌上之胎已沉香色。熱之極矣。設不急治。立見凶危。乃以仲景小陷胸湯爲主。大瓜蔞一兩。黃連三錢。半夏麵二錢。前胡、青皮各一錢。水煎飲之。夜服當歸龍會丸微下之。諸公猶爭之曰。病久而食不進。精神狼狽若此。寧可下乎。予曰。經云。肝常有餘。且脈亦爲有餘。故有餘者瀉之前時誤認爲虛。投補左矣。豈容再誤哉。服後夜半痛止。熱退。兩帖全安。

王祖泉乃眷。朝飯後稍寒。惡風發熱。遍身疼痛。汗大出不止。口中熱。腹中不知餓。小水短。六脈皆濇。以白芍藥五錢。白朮二錢。桂皮、黃芩各一錢。甘草八分。二帖而汗止。寒熱除。減去白朮。加當歸。而遍身痛止。

費少垣乃眷姪。已九月。痰多喘嗽。胎氣上逆。眼撩不起。兩太陽微疼。予曰。此子懸症。兼痰火也。以大紫蘇飲爲主。纔服一帖。逆即不逆。胸膈頓寬。惟喘嗽不止。與七製化痰丸而安。

費一吾先生令政。娠已四月。夜不能睡。小便淋痛。痰嗽內熱。脈右關滑。左寸微弱。兩手皆數。與橘紅、貝母片芩、黃連、茯苓、澤瀉、枳殼、蘇梗、前胡。水煎服之。其夜即

能安寢。次日再以四君子湯加當歸、香附、貝母、陳皮、條芩、紫蘇梗、前胡調理足月而產一子。

令弟媳六娘子遍身痛。發熱汗大出。昏昏如醉。臥不能起。兩寸脈短弱。兩手皆數而無力。此勞倦之餘故汗大走也。黃耆三錢。白芍四錢。粉草一錢五分。桂皮八分。當歸一錢。石斛二錢。一帖熱除痛汗皆止。惟倦而不能起。仍以前方加入參、陳皮。兩帖而痊。

又入娘子頭痛咳嗽。痰多有血。夜分發熱。喉中常作血腥。每經水行必腹中先痛。二日用香附、牡丹皮、滑石、甘草、桃仁、川芎、當歸、柴胡、白芍、山梔子、茅根八帖而瘳。

姚弁山老先生內人。自上年十月左足不能履地。至十二月產後忽好。三日復不能動。時常胸脇作痛。素多痰火。而治者年以四物湯、天麥門冬爲主。間服獨參湯。服將彌年而病如故。予診之。兩寸脈俱洪滑而數。夜分發熱。此係濕痰凝滯。補塞太重。故遷延不脫。乃以二陳湯加蒼朮、黃柏、歲靈仙、五加皮、生地、黃白芥子、白芍藥。當歸兩帖。胸脇痛止。熱除。再加薏苡仁八帖而足能舉步矣。

李坦渠老先生令子室。十月發寒熱起。一日一發。咳嗽心痛。腰亦痛。至次年正月十七日始間日一發。肌肉大瘦。喉疼。汗出如雨。白帶如注。飲食減少。百試而汗不止。延予爲診。其脈右手軟弱。左手散亂。此汗多而脈不斂。病勢至此。危之甚矣。書云火熱似瘡。此病之謂歟。以黃耆二錢。白芍一錢五分。粉草。阿膠各一錢。鼈甲三錢。桂枝五分。烏梅一個。水煎服。其夜汗止。次早診之。左脈已斂。神氣亦回。前方加何首烏。石斛。牡蠣。其日寒熱亦不發。飲食稍加。駸駸然有幽谷回春之象。

太學周衡宇先生。吳江瀾溪人。大家宰白川公之令孫也。近來咯血色紫。胃中痰火素盛。壅於胸鬲。作痞作疼。痰與瘀血挾而爲熱。脈左寸洪大。右寸關皆滑。兩手盡數。此有餘之候。總管丸四錢。再以滑石、桃仁各三錢。山楂二錢。枳殼、梔子、貝母、紅花、丹皮各一錢。茅根五錢。水煎服之。次日大便行三次。痰積極多。內帶瘀血。改以山梔子、紫苑、丹皮各一錢。滑石三錢。桃仁一錢五分。小薊三錢。茅根五錢。水煎。加童便一酒盃。三帖全安。

大參張公分守杭嘉湖道。因喪夫人。衙中亡者八口。心中惶。又因凌繹翁交厚。而

禮予爲診。左寸脈短。關弦。右關滑。兩尺亦弦。據脈心血不足。中焦有痰。流於下部。凝於經絡。以故腰膝痠疼。居常背心作脹。頭多眩暈。夜睡多汗。先時諸醫悉投風劑。非所宜也。予以陳皮、白芍藥、木瓜、牛膝、五加皮、苡仁、黃柏、酒芩、甘草、生地、當歸、歲靈仙。調理十劑。諸症悉愈。

大都諫鄭春寰老先生爲春元時。頭痛內熱。入夜尤甚。汗出如流。通宵不止。小水短赤。舌上黃胎。右脅脹疼。先與桂枝白虎湯一帖。解其內熱。斂去浮汗。再與白芥子一錢。瓜蔞仁四錢。枳實、薑黃、黃連各八分。水煎服。外與當歸龍會丸一錢。五分下之。而脅痛安。

大參、徐天目老夫人。胸鬲痞悶。不思飲食。咳嗽多痰。或時惡心。上焦頭目俱不清利。向來長素。兩寸關滑大如豆。兩尺沉微。痰火症也。二陳湯加酒芩、薄荷、前胡、枳殼、蒼朮、香附、鬱金、川芎。調理而安。

張麗川咳嗽多痰。面青潮熱。肌瘦性躁。而多自用。以數考不利。悒悒成疾。又新婚之後。飲食不節。脈之。右關滑大。餘部皆無神氣。且糞門已發瘻瘍。潰流膿血。予曰。此陽病極而下也。法在不治。果不逾月而亡。

陳仰山先生內人。小產後三月。而血大下。白沫如注。五更洩瀉。面虛浮。下午身熱。口渴。面色青黃。脈右手大豁近乾。左濡弱。據此大虛之候。血海尚有瘀血不盡。以致新血不得歸源。稍動氣卽下如崩。蓋脾乃統血之經。虛則不能約束。且面浮食少。脾虛劇矣。急宜溫補。勢或可爲。人參白朮各二錢。薑炭粉草各五分。茯苓六分。香附八分。丹參炒過一錢。水煎服。四帖而瀉止。再以人參白朮各二錢。茯苓。丹參。黃耆。蒲黃各一錢。薑炭。澤蘭葉。粉草各五分。調理全愈。

張溪亭乃眷。喉中梗梗有肉如炙蠻。吞之不下。吐之不出。鼻塞頭暈。耳常啾啾不安。汗出如雨。心驚膽怯。不敢出門。稍見風。卽遍身疼。小腹時疼。小水淋漓而疼。脈兩寸皆短。兩關滑大。右關尤搏指。此梅核氣症也。以半夏四錢。厚朴一錢。紫蘇葉一錢。五分。茯苓一錢三分。薑三片。水煎食後服。每用此湯調理多効。

溪亭子室。姪已七月。夢見亡過祖母揮拳背打一下。驚醒。卽覺胎動不安。血已下。大小便皆急。腰與小腹脹疼者五日。此亦事之奇也。迓予爲治。兩寸脈俱短弱。此上焦元氣大虛。當驟補之人參。阿膠。黃耆。白朮各二錢。當歸。白芍。條芩。杜仲各一錢。砂仁。香附各五分。苧根嫩皮三錢。葱白六錢。一劑而血止。兩劑諸症悉

除而神漸安。四帖後減去苧根、葱白。調理旬日。足月而產一女。

陳茂之勞倦之後。勉強色慾精竭。而血繼至。續感風寒。發熱頭痛。胸鬲飽悶。始從太陽而傳至少陽。胸脇痛而耳聾。嘔逆口苦咳嗽。六脈俱弦數。此少陽症也。以小柴胡湯加枳殼、桔梗、竹茹而嘔逆止。熱退。因進粥早。復熱口渴。小水不利。大便一日夜六七次。所行皆清水。日晡熱甚。舌上黃胎。昏沉振顫。此食復之候。書云渴而小便不利者。當先利其小便。以猪苓湯爲主。猪苓澤瀉各二錢。滑石三錢。赤茯苓一錢。柴胡八分。升麻、木通各五分。連進二帖。小便利而大便實。但熱不退。以六神通解散一帖。其夜熱仍不退。次早診之。左脈不弦數矣。兩寸脈虛。以故服藥無汗。口渴漱水而不欲嚥。咽熱。此邪傳陽明經。不急涼血。必作鼻衄。病勢至此。可謂極惡矣。投黃芩芍藥湯合生脈散。以止嗽渴。用葛根湯以解飢熱。白芍藥三錢。葛根、升麻、黃芩各一錢。人參一錢。麥冬、滑石各三錢。甘草、五味子各五分。烏梅一枚。急煎二帖飲之。日中大便下燥糞十數枚。始得微汗。就得睡矣。晚進粥一盂。夜臥向安。

陳五山胃脘疼。醫作勞倦治不効。又醫作寒氣治。而用剛燥。痛轉極。又醫以巴豆

丸下之。大瀉皆水。亦無積滯之物。痛雖稍減。然而有虛浮。胸痞足腫。又張醫以人參白朮各二錢。大補脾胃。則痰嗽氣逆。上膈熱甚。喉嚨乾燥。右脇不能貼席。大便一日二三行。因向被巴豆丸瀉起。迨今七日。猶瀉不止。飲食大減。延予爲治。診兩寸濡弱。兩關滑。兩尺洪大。予曰。據症原起於鬱火。亂投湯劑。大推大扳。以致加重。若平平治之。自當尋愈。二陳湯加薑。連枳實。薑黃。桔梗。蘿蔔子。前胡。一帖而熱嗽除。右脇亦可貼席。再劑而飲食進。大便實。其晚又爲怒氣所加。痰嗽脇痛如舊。且多煩躁。改用橘紅。貝母。瓜萎。茯苓。山梔子。前胡。青皮。甘草。桑白皮。蘿蔔子。水煎飲之而平。

吳小峰年五十未有子。素有酒積作疼。晌午卽瀉。所下多稠粘之物。腹痛之疾。年已久矣。治當清潔中焦。分濕熱兼養脾法。用白滑石三兩。粉草。肉果各五錢。白芍藥酒炒一兩五錢。木香三錢。紅麵四錢。神麵糊爲丸。每早晚白湯送下二錢。服未竟而疾除。始舉一子。

沈大參玉陽老先生。中焦有食積痰飲而作痞滯。以故大便了而不了。間或作脹。予脈之。兩寸短弱。關滑。兩尺沉滑有力。予曰。脾胃經有濕痰。蘊而爲熱。但清其

中宮使清陽升。濁陰降。而氣血自旺。此不補之補也。以二陳湯加枳實、酒連、酒芩、滑石、薑黃、木香、乾葛、山楂兩劑而愈。

王敬泉頭暈且痛。起則倒仆。胸鬲脹悶。如繩束縛。嘔吐而飲食皆不得入。六脈俱濇。此痰飲挾木火之勢而作暈也。先以濟生竹茹湯而吐不止。且煩躁發飽發熱。再與蘆根湯連進二碗。氣飽稍定。再以吳茱萸一兩爲末。以鷄子清調塗兩足心。引火下行。外用二陳湯加薑汁炒黃芩、黃連、旋覆花、枇杷葉、丁香、白豆仁、梔榔、柴胡。水煎服之。服後熱退。大便亦行。頭暈嘔吐皆止。惟胃脘有一塊作痛。仍與前藥兩劑。而塊亦消。

張二官發熱頭痛口渴。大便祕結三日未行。脈洪大。此陽明少陽二經之症。用大柴胡湯行三五次。所下者皆黑糞。夜出臭汗。次日清爽。惟額上仍熱。用白虎湯。加葛根、天花粉。因食粥太早。復發熱。咳嗽口渴殊甚。且惡心。用小柴胡。加枳實、山梔子、麥芽。次日渴不可當。改以白虎湯加麥門冬、天花粉。外與辰砂益元散。以井水調下五錢。熱始退。渴始定。不虞夜睡失蓋。復受寒邪。天明又大發熱。不知人事。急用小柴胡湯。加升麻、葛根、前胡、薄荷。進之。而汗出熱退。神思大爽。四

肢皆冷。語言懶倦。且咳嗽。以生脈散加石斛、百合、大棗、白芍藥。服後咳嗽尋止。
精神日加。飲食進而向安矣。

大司馬潘印川第三令子室尙書蔣公孫女也。年二十五。體素弱。語言端謹。因難產傷力。繼以生女。拂意後。又女死悲戚。卽時暈厥。醒而神思昧昧。手足瘓癰。目作上視。予更後始至。因瘓癰不能診脈。細詢之。自女落地。惡露絕無。比有女醫在旁。乃昔所親信者。時與人參大嚼。及獨參湯并粥亂進。參與粥皆壅塞鬲上。不下。以故神昏瘓癰不已也。予教以手於喉中探而吐之。喜其隨手吐出痰飲。粥藥盈盆。瘓癰方定。乃與川芎、山查、澤蘭葉、陳皮、半夏、茯苓、香附進之。稍得睡。予亦出中堂就寢。不虞女醫又私與補藥二帖。子丑時。陡然狂亂如降神之狀。口中亂語云。我是觀音大士降壇。所言皆儒雅官話。問答如流。聲甚壯厲。殊無產後不足之態。生平不諳漢聲。至是出語如生成者。人皆異之。目爲神附。禳禱百般。予獨諭之。語諸左右曰。此惡露不盡。乃蓄血如見鬼之症。非真有神佛相附也。徐以正言叱之。卽緘默。繼以清魂散。加滑石、童便與之。至天明。小水乃行。狂亂皆定。迨予出房少頃。詎知女醫意欲要功。又不知與何藥服之。少刻。狂亂

如前。再與川芎一錢五分。當歸四錢。澤蘭葉。益母草各一錢。臨服加童便。連飲二帖不效。予逆思之。胸中必有餘痰作滯。前劑中無佐使之品。故藥力不行也。卽用前劑大加山楂與之。惡露稍行。神思卽靜。嗣後稍睡少時。手足微動。或自以手掌其面。或自以手搥其胸。昏亂不息。診其脈近虛。早間面紅而光。申酉時面色白。此血行火退。故脈虛而當補矣。與人參、川芎、澤蘭葉各一錢。當歸、山楂各二錢。茯苓、陳皮各八分。捲荷葉一片。煎熟。調琥珀末子五分。服下半時許。嗳氣二聲。予喜曰。此清陽升而濁陰降矣。自此安靜。夜中惡露微行。大便亦利。乃索粥飲。問其昨日漢聲何來。答曰。不知也。諸君始信蓄血如見鬼之言。爲不誣。昔秦越人有言曰。病有六不治。信巫不信醫。一不治也。古稱用藥如用兵。以郭子儀之英明。而以魚朝恩監之便。不成功。予固非郭令公之儔。彼女醫之誤。則又有過於魚朝恩矣。噫。寧不慎哉。

孝廉臧茗泉先生。脈左弦數。右寸弱。關大重則滑。右尺微。原以瘧後復傷飲食。大便瀉而變痢。一日夜雖只五六行。皆積滯無糞。腹疼後重難安。午未後發熱。至天明始退。此夏傷於暑。而秋爲瘧痢也。其熱乃瘧之餘邪。當先解散。然後以

補劑投之。則大便自愈矣。與神授香連丸一服。服訖。腹中腸鳴。須臾大便行。且較前更多。方有糞下。改以白芍藥四錢。澤瀉、黃連各一錢。滑石二錢。粉草、桂皮、木香各四分。山楂七分。兩日後。乃與補中益氣湯加木香、黃連、白芍藥。調理半月。潮熱大便皆愈。

包繼可先生令眷。孕三月而瘧疾發。先寒後熱。胸鬲大脹疼。口渴。湯水入卽吐。譫語無汗。胎氣上衝而成子懸。脈皆弦大。以川芎、柴胡、黃芩、知母、甘草、橘紅、紫蘇、枳殼、砂仁。水煎服之。吐止痛除。

一張氏婦。年纔二十一。其夫延予診之。左寸關短弱。尺滑。右寸亦滑。關濡弱。尺沉微。診畢。問予曰。脈何如。予曰。心神脾志皆大不足。肺經有痰。夫曰。不然。乃有身也。予曰。左寸短弱如此。安得有孕。夫曰。已七十日矣。予俛思久之。問渠曰。曾經孕育否。夫曰。已經二次。今乃三也。予問二產皆足月否。男耶女也。夫曰。實不敢諱。始產僅九箇月。手足面目完全。而水火不分。鬚肉一片。生下亦無啼聲。抱起已身冷矣。細檢之。乃知其無水火也。次亦九個月產下。又無啼聲。看時口中無舌。二胎之異。不知何故。聞先生能細心察人病。特祈審之。予方悟前二胎之不

完者。由心脾二經不足所致也。今左寸右關之脈可見矣。迺爲籌思一方。專以補心血爲主。令其多服。以百帖爲率。酸棗仁、遠志、茯神各一錢。白朮二錢。白芍藥當歸。枸杞子各一錢五分。甘草五分。生地黃八分。艾絮二分。龍眼肉五枚。水煎服。足月而產一子。次年又有身。不以前事爲意。至九個月產下。形體俱具。外有脂膜一片。包其面耳目口鼻不見。但不能去此脂膜。產下卽歿。因思上年之子爲藥之力也。因予久不至。其家以予方粘於壁間。一覺有身。卽照方服之。後生二子一女。里中以此方爲補天手云。

癸巳仲夏。吳比部鳳麓父母以次君絃臺先生。眼目紅痛。恐學道按臨。速於取效。乃聽眼科磬寒涼而治。兩越月無驗。又眼科視之曰。目疾不宜多用寒涼。恐冰其血。以人參五錢。枸杞子一兩。悉溫補之劑。凡用人參。枸杞子五六斤矣。目腫如桃。絕不能開。又專科語之曰。紅腫而痛。明是熱症。誤服溫補。反助其熱。寧不益腫。顧其勢。卽百寒涼亦不易瘳。捷徑無如用下。此釜底抽薪法也。絳臺惟求速效。一聽下之。用大黃、芒硝、枳殼作大劑。下五六次。而飲食日減。惡心畏風。則不能出房門矣。又專門謂前劑欠當。大瀉之後。正合補也。又聽補之一補而目

腫如舊。又有眼師云。目疾熱症多。寒症少。只當滋補腎水。水升則火自降。火降而目疾斯愈矣。用是以滋陰降火之劑爲恃。纔數服。而精滑不禁。一夜夢遺二次。神氣大脫。投補則目腫痛。用降則精元滑脫。屢試屢如是。諸醫無策。悉謝而退。乃修書命使自淮陰之海陽。懇祝令君介紹徵予爲治。予始以遠爲懼。祝再四爲渠言。予亦素爲渠重。義不得以遠爲辭。乃介行李嚮往。至卽診之。左寸脈甚短。右寸大而無力。左關弦弱。右滑。兩尺亦滑。予見其坐在幔中。略不敢見風。問其日食幾何。答曰。三次計二碗許。葷腥絕不能用。予曰。夜臥安否。答曰。邇來甚苦於睡。纔合目。卽夢魘可畏。或被虎蛇交咬。或有鬼來勾攝。或落橋墜井。或與人爭鬥而負。猛然驚悟。冷汗淋漓。四肢癱軟。不能動憚。少頃乃定。今幸公不遠千里而臨。足徵素雅。予曰。足下始無大恙。只緣大推大扳。以致狼狽。若是彼專科者。不足恃也。經謂五臟精華。皆上注於目。今專科局局然守其死法。安知五臟盈虛陰陽消長。隨時出入哉。以愚管見。但平平治之易與耳。據足下之脈。心神脾志。互相不足。肝膽之火鬱而不散。致生目痺。今爲補養心脾。壯其神志。則飲食日加。寢臥安穩。而精元有守。神水盈溢。何目痺之不愈哉。絃臺曰善。

惟先生命劑。乃以歸脾湯減去黃耆、木香。加丹參而補心脾。以大安丸專助脾胃而磨穀食。俾新痰不生。則氣血可繼。日而旺矣。後五日而飲食加。十日而夢魘少。尋能出戶。不畏風日。半月而肌肉生目可觀矣。津津然而有萬全之兆。不虞專門張氏。予復至。以白眼藥日頻點之。一日凡七八次。從此復不能開。瞞肉風粟生滿。適予有南都之往。卒爲所誤。後幸有李少塘打去風粟。眼始能開。李雖手法精熟。然於軒岐闡奧。尙亦未窺籜籬。予後自南都至。見左目雖愈。右目終成內障。予故曰。彼專科者不足恃也。豈虛語哉。

丘太守鎮山翁。令姪淮陰人也。丁年患兩手筋攣。指掉不能屈伸。臂肉瘦削。體瘠面白。寢食大減。市中諸友調治無驗。乃任京口諸名家療之。半年肉更消。色更瘁。聞予在吳比部衙中。敦予爲治。診其脈六部俱弦。重按稍駛。診竟叩其受病之源。太守公曰。自上年冬底偶發寒熱。筋骨疼痛。迨於仲春。寒熱雖退。而筋骨之疼不減。服藥無虛日。甚之日三四進。肉漸消去。指掉不隨。似有加於往昔。醫之來者。一曰風。二曰風。三四五六皆曰風。卽十數輩。又莫不皆曰風者。竭技盡方。卒無一應。奄奄床第。絕不知爲何病。予對公曰。此筋痿症也。乃少年不謹慾

而受風濕。邪氣乘虛而入。醫者不察天時。不分六經。概而汗之。仲景治風濕之法。但使微汗津津。則風濕盡去。若汗大出。則風去而濕存。由是血氣俱虛。經云。陽氣者。精則養神。柔則養筋。虛則筋無所養。漸成痿弱。乃不足之疾。故陳無擇。朱丹溪。劉宗厚。皆謂諸痿。切不可作風治。誤則成痼疾。公聞言。愕然曰。服風藥。幾二百劑矣。顧今已痼。奈之何。予對曰。令姪青年。猶可圖也。公曰。用何法。予曰。法當大補氣血。經云。氣主煦之。血主濡之。氣血旺。則筋柔而軟。由是乃可以束骨而利機關也。抑何掉之有哉。病者聞言。大喜曰。聆先生詳病之源。治法之略。雖未服藥。已覺沉疴去體矣。卽請劑。予以五加皮、薏苡仁、紅花、人參、鹿角膠、龜板虎骨。當歸、丹參、地黃、骨碎補、蒼耳子之類。服兩月。肌肉漸生。飲食大進。兩手指掉亦平復。

一書辨年過五十。糟酒縱慾無憚。忽患下消之症。一日夜小便二十餘度。清白而長。味且甜。少頃凝結如脂色。有油光。治半年不驗。腰膝已下。皆軟弱。載身不起。飲食減半。神色大瘁。脈之六部。大而無力。書云。脈至而從。按之不鼓。諸陽皆然。法當溫補下焦。以熟地黃六兩爲君。鹿角霜、山茱萸各四錢。桑螵蛸、鹿角膠、人

參、白茯苓、枸杞子、遠志、菟絲子、懷山藥各三兩爲臣。益智仁一兩爲佐。大附子、桂心各七錢爲使。煉蜜爲丸。梧桐子大。每早晚淡鹽湯送下七八十九。不終劑而愈。或曰。凡云消者。皆熱症也。始公具方人多議之。今果以溫補成功。此何故哉。予曰。病由下元不足。無氣升騰於上。故渴而多飲。以飲多小便亦多也。今大補下元。使陽氣充盛。熏蒸於上。口自不乾。譬之釜蓋。釜雖有水。若底下無火。則水氣不得上升。釜蓋乾而不潤。必釜底有火。則釜中水氣升騰。熏蒸於上。蓋纔濕潤不乾也。予已詳著醫旨。緒餘中茲不多贅。

食憲韓約齋老先生令子室。每怒動則夜臥不安。如見鬼魅。小水淋瀝。今又大便祕結。腹中疼痛。腰跨脹墜。如生產狀。坐臥不安。因痛而脈多不應指。此肝經鬱火所致。法當通利。以杏仁、桃仁各三錢。柏樹根皮、山梔仁、青皮各一錢。檳榔五分。枳殼八分。水煎服之。少頃。大便通。痛脹隨減。

僉憲韓約齋老先生夫人。向來夜分臍腹疼極甚。必用炒鹽熨之。兩時久乃止。次日必頭痛。兩太陽如箍。遍身亦疼。此上盛下虛症也。先用柴胡、川芎、粉草、酒連、薄荷、天麻、橘紅、茯苓、半夏、蔓荆子水煎服。數帖。頭痛全止。惟咳嗽胸前略痛。兩

寸脈浮滑。兩尺弱。再用鹿角霜、鹿角膠、補骨脂、遠志、枸杞子、金鈴子、香附子、煉蜜爲丸。梧桐子大。每空心及下午食前。淡鹽湯送下七十丸而瘳。

孝廉丁震瀾。丈令郎。纔二歲。瘧母。上壅咳嗽。每午後發熱。至子丑時乃退。終日啼哭不止。鵝口白屑。神氣大弱。痘後遍身瘡疥未愈。多方治之不效。有灸之者。有割之者。有以膏藥貼之者。種種施之。全然不應。予曰。乳下嬰孩。臟府薄脆。不可亂攻亂補。參耆足以增其嗽。灸割適以驚其神。安能取效。予教以白朮、鼈甲各一錢五分。青蒿、麥芽、陳皮各八分。烏梅一枚。貝母、知母各六分。甘草三分。入帖全愈。

武進令君孫康宇公子。室臧位。字文女也。年十六。初產女。艱苦二日。偶感風邪。繼食麵餅。時師不察。竟以參朮投之。卽大熱譫語口渴。汗出如洗。氣喘洩瀉。瀉皆黃水無糞。一日夜不計遍數。小水短少。飲食不進。症甚危惡。時當六月初旬。女科見熱不除。乃投黃芩、芍藥、黃連寒涼之劑。諸症更甚。又以參朮大劑。肉果、乾薑等止瀉。一日計用人參二兩四錢。瀉益頻。熱益劇。喘汗轉加。譫語不徹口。醫各縛予辭謝。曰。書云。汗出如油。喘而不休。死症也。又汗出而熱不退。瀉而熱不

止。且譫語神昏。產後而脈洪大。法皆犯逆。無生路矣。惟附子理中湯。庶徼倖於萬一。適予爲顧太守肖溪公延至。卽過爲一診。六脈亂而無緒。七八至。獨右關堅硬。躡躇久之。因思暑月汗出乃常事。但風邪麵食瘀血。皆未消溶。補劑太驟。書云。蓄血如見鬼。治當消瘀血。麵食解其暑氣。猶可圖生。勿遽棄也。有臧玉宇者。位宇堂兄也。醫有雅致。深以予言爲然。而速予措劑。予曰。劑憑症發。難拘常套。不常之症。須用不常之藥。乃用益元散六錢。解暑氣。清熱爲君。仲景云。渴而小便不利者。當先利其小便。況水瀉尤當用之爲君也。以糖毬子三錢爲臣。紅麵、澤蘭葉各一錢五分。消瘀血。安魂爲佐。香附一錢五分。爲裨佐。橘紅、半夏、麵、茯苓。乃統理脾氣爲使。京三稜五分。消前參朮。決其壅滯爲先鋒。水煎飲之。飲下卽稍睡。譫語竟止。連進二劑。其晚大便減半。次日仍用前劑飲之。其夜熱大減。大便只二次。有黃糞矣。惡露略行。黑血數枚。又次日診之。脈始有緒。神亦收斂。進粥一盞。大有生意。前方減去京三稜。紅麵。加白扁豆。其夜大便一次。所下皆黑糞。從此熱盡退。大便亦實。改用四君子湯。加益元散。青蒿。香附。白扁豆。酒炒白芍藥。炮薑。調理而安。

吳東星上舍。辰州太守公長君也。冒暑赴南都試。落第歸而快快。因成瘧。自八月中旬。延至十月。瘧雖止。而腰痛白濁。日夜咳嗽。肌肉大消。藥劑亂投。認爲風者。以羌活、防風、續斷等發散。認爲虛者。以六味地黃丸爲補。認爲火者。以芩連梔子、黃柏、知母、天花粉、生地黃瀉其火。認爲半虛半實者。投以獨活寄生湯。認爲寒者。以大附子、肉桂、鹿角膠、參朮溫補之。痛劇欲死。叫撼四鄰。予脈之。左弦細。右滑大。俱六至。口渴赤。予知其昔患楊梅瘡。餘毒尙伏經絡。適因瘧後氣血不足。舊毒感動。故痛而暴也。以當歸、芍藥、甘草、牛膝、鈎藤、苡仁、木通、白蘚皮、用土茯苓四兩。煎湯代水煎前藥。服下而痛止。咳嗽亦除。脈緩其半。連服數劑。大效。精神漸復。乃起而督工視事。冬至日爲酒興鼓舞。縱慾無忌。次日。腰如束縛。足面亦疼。左眼赤。小水短。足底有火。從兩胯直衝其上。痛不可言。予以當歸、鈎藤、甘草、白芍藥、牛膝、苡仁、石斛、紅花、生地、黃柏。調理三日。症已守定。略無進退。適大雪寒凍殊甚。有女醫爲渠宅所親信者。因其大便燥結。一日夜服玄明粉一兩五錢。大便且不行。而腰痛愈猛。兩足攣縮。氣息奄奄。一語而三換氣。面青慘。渠自覺危急。迺喚內人及弟叔囑其後事。天明予至診之。六脈俱伏。痛使然也。

扣其由。乃知服玄明粉所致。予曰。症雖熱。便雖燥。但公病不在腸胃而在經絡筋骨間。徒瀉腸胃無益也。且冬月陽氣閉藏。藏瀉則陽氣虧乏。來春無發生根本矣。今四肢拘縮。腰胯痛劇者。由日來天令寒極。經絡凝滯也。寒主收斂。法當溫散寒邪之標。使痛定。然後復治其本。庶可保全。乃用桂心、杜仲、炙甘草、蒼朮、破故紙、五加皮。連與二劑。痛定而四肢柔和。飲食始定。予知渠宅素喜速效。予適有荆溪之往。迺宣言曰。足下之疾在經絡。顧今天令嚴寒。幸寧耐以俟春和。爲足下拔去病根。渠宅不以予言爲然。迺用張雲溪調理。予亦讚張之可守。蓋張氏藥用養血清熱。雖不去病。亦不害事。迨二月太守公歸。迺改用沈春宇。沈揣渠必以酒色而致陰虛。迺純用滋陰降火之劑。以爲旬日可奏功也。及調治月餘。略無影響。予從荆溪歸而謁渠。爲三月初旬也。渠聞予至。卽以沈藥呈予。且語予。公許春和拔除病根。此其時也。予知太守公方篤信沈。隨以溫語慰渠。曰。沈公名士也可。使彼展盡底蘊。沈又調理半月。以無功而行。沈去。予再以煨腎散進。大瀉五六度。四肢冰冷。舉家大恐。以予瀉之爲非也。予曰。病從此日減矣。夫奚憂後進理脾藥。服數帖。神氣始轉。腰胯柔和。可下床舉數步矣。方始信。

而問予曰。人皆以補爲治。公何得病源之真。於三月之前。先已預定。節節如公語也。予曰。此楊梅瘡餘毒伏於經絡。豈補劑所能去哉。予故先爲疎通濕熱。然後以補劑收功。則無反覆之患。後仍以歲靈仙末。子二錢。入猪腰子內。煨熟食之。又瀉一二度。病根盡拔。改用苡仁。當歸。生熟地黃。白芍藥。牛膝。黃柏。丹參。龜板。調理全安。

潘見所老先生有一小盛價。年可十六七。發熱於午後。城中周友以爲陰虛。而爲滋陰降火。服三十餘劑。熱益加。且腹中漸脹。面色清白。仍以六味地黃丸。加黃柏。知母。麥冬。五味子之類。又三十劑。而腹大如斗。堅如石。飲食大減。髮黃成穗。額顱光亮。口渴不可言。兩腿大肉消盡。眼大。面肉皆消。肌膚枯燥如松樹皮。奄奄一骷體耳。予觀其目之神。尙五分存。欲爲治劑。潘公門下諸人語予曰。形症如是。死在目下。尙可服藥乎。予曰。症非死候。爲用藥者誤耳。譬之樹木。若根本壞而枝葉枯焦。非力可生。今焦枯乃斧斤傷其枝葉。而根本仍在也。設灌漑有方。猶可冀生。安可遽棄。予以神授丹日用一丸。煮豬肉四兩。飼之。十日。腹軟其半。熱亦消其半。神色漸好。潘見老詰余曰。此何症。公能肉枯骨如此之神。予曰。

此疳積症也。彼誤認爲腎虛而用補陰之藥。是以滯益滯腹焉得不大不堅。公曰。彼純用寒而熱愈熾。君用非寒而熱反退。此何說焉。予曰。此熱迺濕熱由脾虛所致。補陰之劑皆濕類。蓋脾屬土。惡濕喜燥。今以大蘆會丸肥兒丸。調理一月可全瘳矣。公曰善。無先生此僕已爲泉下物矣。

少司空凌繹泉翁年已古稀。原有痰火之疾。因正月上旬爲令孫大婚過勞。偶占風寒。內熱咳嗽。痰中有血。血多而痰少。痰堅不易出。鼻流清水。舌生芒刺。色焦黃。語言強硬不清。大小便不利。喘急不能睡。亦不能抑。惟坐高椅。椅前安桌。桌上安枕。日惟額伏枕上而已。市醫環治半月不瘳。敦予診之。兩手脈浮而洪。兩關滑大有力。知其內有積熱。痰火爲風邪所閼。且爲怒氣所加。故血上逆。議者以高年見紅脈。大發熱爲懼。予曰。此有餘症。諸公認爲陰虛。而爲滋陰降火。故不瘳。法當先驅中焦痰火積熱。然後以地黃補血等劑收功。斯不失先後着也。翁以予言爲然。用瓜蔞石膏各三錢。橘紅、半夏、麴、桑白皮、前胡、杏仁、酒芩、紫蘇、子水煎。臨服加入蘿蔔汁一小酒盞。一劑而血止。次日診之。脈仍浮而洪大。尙惡寒。予曰。古云傷風必惡風。傷寒必惡寒。此其常也。只因先時失於清散。表中

之熱未徹。竟用滋陰之劑。又加童便收斂。降下太速。以致風寒鬱而不散。故熱愈甚也。改以定喘湯一劑。而喘急減半。再劑熱退而不惡寒。復爲診之。兩手浮體已無。惟兩關之脈甚鼓指。此中焦痰積膠固已久。不可不因其時而疎導之。以清中丸。同當歸龍會丸。共二錢進之。其夜大便所下稠粘穢積甚多。予憶朱丹溪有云。凡哮喘火盛者。以白虎湯加黃連枳實有功。此法正繹翁對腔劑也。與十劑外。以清中丸。同雙玉丸。夜服調理而安。

周鳳亭公年五十有八。正月腸風下血。又飲食過傷大吐。而朱友以枸杞地黃膏一斤進之。不知此公肝氣素盛。中焦原有痰積。且多思傷脾。又值卯木正旺之月。投以地黃枸杞。適以滋其濕而益滯其痰耳。由是飲食減少。肌肉日消。腹中痞滯。又吳友以歸脾湯進之。詎知濕寒未除。先用溫補。是以油撲火。勢成燎原。以致大便燥結。口乾舌燥。據巳午未三時。中焦蒸發熱煩悶。酉時而退。此皆濕熱壅滯於脾無疑矣。且面色黃中帶黑。下午足面有浮氣。皆是濕熱傷脾之微。法宜清肅中焦。徹去濕熱。則飲食自加。而新痰不生。宿痰磨去。庶五穀精華不生痰而生血矣。血充則精神長而肌肉可復。且秋來無瘡癧之患。公曰。清肅

中焦當用何劑。予曰。二陳湯加薏苡仁。酒炒白芍藥。麥芽以養脾而消痰。以枳實黃連洩痞而去熱。以青蒿分利陰陽而消其黃。葛根升引清陽之氣使肌熱清而口渴可止矣。當服十劑。公曰。先生之方善。但枳實、黃連恐體虛者不足以當之。予曰。惟此二味適可以去公之病根。舍是則不效。緣中焦有餘之疾。非此不能去。亦非他藥所能代。公半信半疑。服四劑而諸疾皆愈。公遽中止。不復服完。至七月盡。果發瘧疾。而以木香檳榔丸下去稠積甚多。迺追悔予言而延之診。予教以前方。仍服十劑。夜以丹溪保和丸調理。則永無瘧痢之患矣。

令郎采石先生。中焦濕熱。生痰否悶。五更倒飽。且下午兩股或膝下筋脈抽掣疼痛。時常噯氣。面色帶黃。間常夢遺。予以清氣大安化痰丸及猪肚丸二方調治。而安猪肚丸。用白朮五兩。苦參酒炒二兩。牡蠣煅過三兩爲末。將雄猪肚子一具。摘去油甘草湯洗過。將藥裝入肚中。縫其口。飯中熬極爛爲度。搗極勻爲丸。此方極健脾去濕熱。固精丸也。清氣大安化痰丸。用白朮四兩。橘紅、半夏、山楂各三兩。黃芩、黃連俱生薑汁炒各一兩五錢。枳實、瓜蔞仁各二兩。白芥子、蘿蔔子各炒一兩。薑黃鹹水煮乾一兩。青黛五錢。麥芽取麴打糊爲丸。茱萸大。每食

後及夜茶送下二錢。

令孫女纔六歲。忽發寒熱。一日過後。腰脊中命門穴間骨節腫一塊。如大饅頭之狀。高三四寸。自此不能平身而立。絕不能下地走動。如此者半年。人皆以爲龜背癟疾。莫能措一法。卽如幼科治龜背古方治之。亦不效。予曰。此非龜背。蓋龜背在上。今在下部。必初年乳母放在地上坐早之過。比時筋骨未堅。坐久而背曲。因受風邪。初不覺。其漸入骨節間而生癟挺。致令骨節脹滿而大。不急治之。必成癟疾。今起未久。可用萬靈黑虎比天膏貼之外。再以晚蠶沙醋洗炒熱。絹片包定。於膏上帶熨熱之一夜熨一次。再以歲靈仙爲君。五加皮、烏藥、紅花、防風、獨活水煎服之。一月而消其半。骨節柔軟。不復腫硬。便能下地行走如初矣。人皆以爲神奇。此後三個月。驀不能行。問之。足膝痠軟。載身不起。故不能行。余知其病去而下元虛也。用杜仲、晚蠶沙、五加皮、薏苡仁、當歸、人參、牛膝、獨活、蒼耳子、仙茅水煎服二十劑。行動如故。

閔文學蜃樓患虛損咳嗽。晝輕夜重。乃政丁氏長興富翁女也。軀甚肥。性甚躁。患痛風手不能沐櫛。足不能履地。凡痛處略腫。呻吟喊叫。比有朱遠齋氏爲時推

重。夫婦倚朱治者七越月。纖毫不減。吳九宜翁迺舉予治。至其家。蜃樓大兄岳樓。旦暮與偕。診畢。語岳樓曰。令弟之症。雖易見功。然非百日不能斷根。丁氏症。十日便可刈其根。但恐不能盡吾劑。奈何。岳樓曰。何謂也。予曰。令弟咳嗽。由肺火未清。誤服參朮太過而然。但爲清肺利肺。咳可立止。止後以補心安神之劑養之。則萬全矣。藥用麥門冬、桑白皮、白藥子、貝母、桔梗、甘草、黃芩、枳殼。十帖。咳嗽全止。惟心血不足。神不固精。以酸棗仁、遠志、麥冬、連花心丹參調養百日。果能出戶肄業。丁症迺濕痰凝滯經絡作痛。朱公作血虛而投以地黃、芍藥、當歸、人參、牛膝之類。宜其痛愈加而病愈久也。今必須燥濕流動之劑。疎決一番。庶經絡通暢。雖不服補劑。而五穀精華足以自充。但疎決之劑不能止痛。恐其不余信而中止也。岳樓曰。先生旣已言明。惟命是聽。用二陳湯加烏藥葉、蒼朮、殭蠶、海桐皮、南星服至五帖。果不憚而欲止藥。岳樓白。孫君已先言十帖見功。今過半。何不勉強而使功虧一簣哉。又服一帖而止。百般強之不從。迺揚言曰。請醫療痛而反加痛。吾何藥爲。後四劑斷乎不敢奉命矣。時已申刻。予知其富家矯態。亦不強服。隨以芫花醋炒過三分。海金沙一分爲末。白湯調下。至晚瀉。

一次下稠痰半盆。足痛減大半。稍能動止。初更後。吾輩酒猶未散。忽報云。腹中大痛。促予進看。行至後堂內。中人出而止曰。病者卒矣。不勞進看。乃曰。此必痛厥。非長逝也。烏可不進一看。至卽冷汗淋漓。兀坐溺器。面青息斷。執而診之。手冷如冰。但六脈俱在。惟沉伏耳。知其爲痛極使然。用生薑湯灌之而甦。徐語近侍女使曰。適來腹中痛甚耳。後火光濺出。肛門如焚。大響一聲。不知瀉下何物。衆看之。迺血鰍一條。長六寸。闊半寸餘。鱗目俱在。盆中尙能遊動。衆皆悚駭。岳樓問曰。此鰍下可好否。予應之曰。此尤物也。得下豈不好。但下症實由痰作。予特爲行痰。初不知其有蟲如是。第藥中有芫花。迺殺蟲之物。故偶中亦令弟之福也。次日手足皆能動。仍以二陳湯加苡仁、紅花、五加皮。四帖脫然如故。閔宅以予不矜功而益重予。

金寄閒令堂。暑月患痢。小腹窘迫。胸鬲膨脹。口舌焦渴。右寸關脈洪滑。左脈弦迺氣鬱食積痢也。先與木香檳榔丸。開而下之。微利一二度。因口渴食西瓜一片。卽惡心而吐。昨日大便利後。胸鬲寬快。就進飯一碗。致腹飽悶。兀兀欲吐。所吐皆痰涎。乃以溫膽湯加減治之。半夏四錢。枳實一錢五分。竹茹二錢。橘紅、茯苓

各一錢。甘草五分。薑連八分。生薑五片。水煎服之一飲而胸鬲舒暢。便能就枕而睡。惡心頓無。痢亦尋止。

徐中宇之婦。汗出如雨。昏昏憒憒。兩手無所着落。胸要人足踹之。不少放。少放即昏憒益甚。氣促不能以息。稍近風則嘔惡暈厥。與九龍鎮心丹一丸服下。卽稍定。少間則又發。始知胸喉中有物作梗而痛。湯水難入。卽藥僅能吞一口多則弗能嚥下。乃以蘇合香丸與之。暈厥尋止。心痛始萌。昨日六脈俱伏。今早六部俱見。惟左寸短濇。知其痛爲瘀血也。用玄胡索、桃仁、丹皮、丹參、青皮、當歸、香附。其夜仍暈厥一次。由其痛極而然。再與玄胡、丹皮、桃仁、丹參、香附、青皮、烏梅、人參、貝母、桂枝、赤芍藥。服此痛減大半。乃自云心虛有熱頭眩。加山梔仁。居常多夢交之症。近更甚。以其心虛故也。人參石斛、丹參、貝母、當歸、白芍藥、酸棗仁、酒連、香附。調理全安。

金文學達泉先生令政。暑月患痢赤白。一日夜三十餘度。後重腿急口渴。小腹痛。孕已二月。幸而腰不痛。右手脈弦。左脈滑。與白芍藥三錢。黃連、黃芩、當歸、陳皮、木香附各一錢。桂皮、木香各五分。水煎服。外與香連丸。服下後重稍輕。因進飯太

早其夜仍十數度。次早診之。右絃減半。前藥煎成。吞女金丹一帖。痢減大半。六脈已和。但軟弱。此氣血不足。宜從補養。用八珍湯加陳皮、香附、阿膠、條芩。一帖全安。凡孕婦痢疾。後重稍輕。腹痛稍減。獨痢不止。必須補養血氣爲主。加調氣之劑爲佐。庶可保胎。斯亦丹溪虛回而痢自止之意也。

金元岩文學。下午發熱。痢下紅多白少。一日夜七十餘度。後重下墜。飲食不思。左脈細數。右脈滑。此陰虛之候。詢知二日前曾夢遺。續得痢疾。陰虛明矣。但滑脈主食積。法當先補後攻。乃與小建中湯一帖。白芍藥三錢。桂枝七分。粉草酒連、酒芩各八分。當歸一錢。檳榔五分。水煎飲之。夜半復診。脈稍充指。改與枳殼三錢。桃仁一錢。當歸四錢。煎熟。吞木香檳榔丸一錢五分。至天明。大便瀉三次。則見糞矣。次日午進飯。又食火肉。隨卽大便頻併。後重如前。與山查枳朮丸一服。不效。再爲診之。六部皆虛軟無力。獨右關滑。此進肉飯太早。脾弱不能消磨。宜健脾氣兼爲升舉。人參黃耆各二錢。白朮一錢。升麻三錢。防風、藿香、炮薑、粉草各五分。白芍藥一錢。牛茯苓八分。連進二帖。痢減而後重寬。因食狗肉過多。復傷脾氣。前方加砂仁、山楂。調理全愈。

金文學達泉先生。因食肝白腸內傷續又冒風。就成瘧痢。日夜四十餘度。小腹痛甚。每登廁。汗出如雨。下迫後重。小水澁痛。頭疼口渴。下午發熱。天明始退。左脈浮弦而數。右軟弱。中部稍滑。此內傷飲食外感風邪。瘧痢併作。法當速治。否則深秋陽氣潛藏。邪因陷下。未易瘳也。乃先與柴苓湯一劑。小便即清不痛。瘧發時寒多熱少。晚與人參敗毒散加減。人參、乾葛、防風、桂枝、粉草、茯苓、枳殼各五分。柴胡、白芍藥各一錢。水煎飲之。次日頭痛痢疾俱減。夜纔起三次。改與補中益氣湯。加酒芩、桂枝、白芍藥。其夜瘧止。但微熱。再改胃風湯。人參、白朮、桂皮各二錢。白芍藥四錢。當歸一錢五分。茯苓、川芎各八分。酒芩、酒連各一錢。炮薑二分。地榆五分。服後寒熱殄迹。夜起一次。已是真糞。前方減去桂枝。再三劑而巾櫛出戶矣。

金寄閒先生七月既望。患頭痛口渴。汗大洩不斂。嘔惡發寒熱。間日一發。而發於陽日。迺爲診之。兩寸洪大有力。左浮弦而數。右脈稍軟亦絃長。此少陽與陽明合併爲瘧。以柴葛解肌湯主之。柴胡、葛根各二錢。白芍藥、石膏各二錢。粉草、桂枝各五分。知母一錢。薑三片。水煎飲之。次早。左脈稍退。迺與補陰鱉血何首烏

丸截之。又與黃耆芍藥湯一帖。以防作痢。白芍藥、石膏、黃耆各三錢。桂枝五分。
知母、粉草各一錢。柴胡七分。薑三片。煎服後。加人參七分。瘧竟全止而向安矣。
淮陰胡少泉翁。麗水縣三尹也。令郎年弱冠。患夢遺。百治不應。體倦而氣弱。食少
而汗多。四肢痠軟。頭眩。肌熱將成瘵疾。知余在理刑吳比部衙中。敦余爲治。其
脈兩寸短。左寸尤甚。餘部滑數。余曰。郎君之脈心氣大弱。蓋心者神之舍。神者
精之主。神旺始能固精。今遺不禁。由神弱不能固攝。其精致多妄洩。時近端陽。
諸症叢集。迺兼注夏病也。法當養心安神。庶不成瘵。翁曰。然前此諸公每爲滋
陰降火。多不見功。徒見損脾減食。今先生主以養神。願以先生是聽。迺與人參、
黃耆、石蓮子、酸棗仁、蓮花心、石菖蒲、遠志、當歸補心安神爲君。俾精固汗斂。經
曰。汗者心之液。汗多則心血愈虛。故佐以甘草、白朮、黃精、麥門冬、五味子。兼治
注夏。使飲食加而四肢壯緩而圖之。可萬全矣。藥進甚妥。竟以此方調理。果精
固神全。肌熱盡退。又令愛及笄。頭痛微熱。經水愆期。日多咳嗽。食漸減。肌漸消。
口渴。睡臥不寧。喉中血腥。四肢不勞而疲。體不動而汗。六脈弦而且數。左關長
出寸口。余以逍遙散加石斛、丹參、牡丹皮、酸棗仁、山梔子、麥門冬調理而瘳。又

一文學貧士也。忘其姓氏。與胡少泉翁爲碩交。有奇疾。兩足不瘳不痛。每行動。絕不聽其所用。或扭於左。而又墜於右。或扭於右。而又墜於左。之玄而行。不能步步正走。此亦目之稀覩。竟不識爲何疾。書無所考。予臆度之。由筋軟不能束骨所致。故行動則偏斜扭墜也。夫筋者。肝之所主。肝屬木。木縱不收。宜益金以制之。用人參、黃耆、白芍藥以補肺金。薏苡仁、虎骨、龜板、杜仲以壯筋骨。以鐵華粉專制肝木。煉蜜爲丸。早晚服之。別後三載。族姪理問公敬亭南還。道出淮陰。胡少泉寄語云。向者鐵粉所愈之疾。淮人極以爲奇。遠邇敦錄其方。布傳以頌。自恨貧儒。弗能致一芹爲謝。旦暮額手南斗。以識不忘云。

一吳氏婦有隱疾。其夫訪於予。三造門而三不言。忸怩而去。後又至。未言而面先赧。予因詰之曰。諸來詣予者。皆謂余能爲人決疑療患也。今子來者四。必有疑於中。疑而不露一語。雖百來而疑終不可決。疾終不可去矣。且盈天地間。怪事甚多。非聖智所能盡識。然亦非聖智不能通療也。彼折肱錄、醫鑑、醫說等集。怪症蠅毛。假非明哲決而治之。何以擴後人之聞見也。其夫乃俛首徐應曰。言之無任主臣。先生長者。卽言之。諒無哂。山婦子戶中突生一物。初長可三寸。今則

五寸許矣。狀如堅筋。色赤大可拱把。脹而且痛。不便起止。憎寒壯熱。寢食俱減。羞憊于言。每求自盡。聞先生能爲人決疑療怪。不啻扁華。特相訪而祈一決。予曰。疾成幾年。對曰。將百日。予曰。蓋凡所謂怪者。耳目無所聞覩。書籍無所註載。今所言者。迺陰挺症也。書有所徵。奚足言怪。夫曰。陰挺何自而生。何法而治。幾何月日而可愈也。可無妨干生育否。予曰。子戶屬厥陰肝經。肝屬木。肝有溼熱。故生陰挺。猶木有溼熱而生蕈。然法當以龍膽瀉肝湯及蟬皮散。當歸、黃芩、牡蠣、蟬皮、赤芍藥爲末。每用二錢。空心米飲調下。卽而治之。大計月餘。可消釋也。奚生育之有妨哉。其夫合手頂禮於地。曰。願如藥王言。敢徼一料。隨按法措劑。畀之而去。甫三月。來報云。前疾果如所言。消釋無痕。茲爲汛期。一月不至。敢問予曰。此有身也。夫曰。疾纔愈。未必卽能受身。恐防他疾。予曰。前恙匪肝經有餘之疾。肝爲血海。書云。女人血盛則懷胎。據血盛行當先期。今汛踰期。實孕耳。匪病也。後果足月而產一子。

前症一染匠之婦。腹痛兩月矣。或以爲寒。爲熱。爲氣。爲虛。爲食積。爲蟲。遞嘗試之。轉加。一醫與膏藥如斗大者一個。滿腹貼之。痛益劇。迺揭去。膏藥卽粘牢不可

起火熨油調百計不能脫分寸。如生在肉上相類無可奈何。知予在吳鄉宦宅中迺買舟就予診。及抵吳門轎口。匠乃偕迺母迺姑四人盡力扶挽絕不能動移一步。岸上環視如堵。莫不語。匠曰病勢若此時刻難抵。固迺強其起而欲汚吾轎口耶。匠迺止婦舟中。起而懇予爲治。至舟中見其面色蒼黑。及伸手求診。皮膚燥若老松樹皮之狀。六脈皆洪數。問其腹中之痛何在。匠卽爲解衣露腹。指其痛所。始知膏藥粘牢之故。此甚希覲。叩其不能舉步之由。婦曰非力弱不能行。迺左脚不可動。動卽痛應於心。是以一步不能舉也。予俛思若色若脈皆非死候。胡治而益劇也。此必腸癰。左脚莫能舉。是其徵也。與營衛返魂湯加金銀花爲君。與四帖酒水各一碗煎服一帖。痛稍減。二帖下臭膿半桶。痛全減。腹上膏藥不須手揭。自脫而下。由熱去而膏脫也。四帖完。其婦同匠詣吳宅拜謝。予并求善後之方。吳宅見之。一族皆驚。

王祖泉大便裏急後重。腹痛日夜下紫黑稠粘三四十度。市中凡有名者雷同痢治。自秋歷冬三越月不瘳。形色瘦瘁。匙筋厭舉。卽勉強僅一盞而止。眼闔懶開。悉以爲不治棄去。訪予脈之。六部濡弱。觀其所下之色甚晦。如芋苗汁之狀。予

曰。觀此色非痢。迺臟毒下血症。醫說中人參樗皮散。正此對腔劑也。卽製與之。其夜果減半。終劑全愈。方以人參、樗根白皮各二兩爲末。每空心米飲調服二錢。忌肉汁生菜魚腥。

癸巳秋仲。南都大司馬裏洪溪老先生。以兼署工部都察院。操江印。日衝暑往來各衙門。而經略其政事。致發熱燥渴。因解燥渴。而過食水浸瓜梨新藕。遂成洩瀉。小水短少。醫以胃苓湯加滑石、木通、車前子利之。而瀉止。大便又因之結燥。難澁不堪。迺用潤腸丸。復瀉不止。又進以前通利之劑。瀉雖止。而小水竟不得流通直。遂臍下脹急。立起解之。則點滴不出。臥則流之不竭。以頻取夜壺。致通宵不得寐也。治半月餘而精神削。寢食廢。聞予寓崔勳部衙。而徵予治。初見卽告以受病之源。又謂都城諸醫俱不識爲何症。將認爲癰。則立解時點滴不出。認爲祕。臥則涓涓而流。謂爲脾約。大便又不結燥。謂氣虛下陷。心血不足。而補中益氣湯。與安神丸。服過十晝夜無益。雅聞先生高手。願一診以決之。探其脈。兩寸短弱。關緩大。兩尺洪大。語之曰。此餘暑未解。而司馬素善飲溼熱流於下部也。今已下午。恐診之未準。俟明早細察而再定方。公曰。延頸吾子久矣。適所

言近似。願亟求一劑飲之。徼夜間一睡。余不得已。以益元散三錢。煎香薰湯之略無進退。次早復診。六脈如昨。予思之而恍然悟。又語之曰。此症尿竅不對也。司馬曰。名出何書。予曰。內經云。膀胱者。脬之室也。脬中溼熱下墜。故立解而竅不對。小水因不得出。臥則脬不下墜。而尿滲出膀胱。亦以竅不對。小水雖涓涓而流。亦不能通達直遂。故了而不了也。治惟提補上中二焦元氣。兼清下焦溼熱。斯得矣。又有一法。今氣虛下陷已久。一兩劑未能取效。安得伏枕而睡。且此不寐。非心血不足之故。因着心防閑。小便之了而不了。而不敢寐也。暫將舊衣或布襯於席上。不必防而任其流出。又免取夜器而勞動其神。自然熟睡矣。以補中益氣湯。提補上中二焦之元氣。加黃柏。知母祛下焦之溼熱。夫清陽升則濁陰自降。脬無溼熱。則不下墜。竅可對。而病可瘳矣。司馬忻然請藥。夜如法襯之。果嗒然一睡。相忘其尿之出不出也。次早視襯布雖溼而不甚。以久不闔目。得此一睡。神氣頓回。胸臆爽快如未病者。調理四日。而病全安。司馬大喜。而欲留久住。緣漕運李公相延之亟。弗克也。差大馬缸鼓吹送予。阡闕而還。

崔百原公者。河南人也。年餘四十矣。而爲南勳部郎。患右脇痛。右手足筋骨俱痛。

艱於舉動者三月。諸醫作偏風治之。不效。馳書邑大夫祝公徵予治。予至。視其色蒼。其神固。性多躁急。診其脈。左弦數。右滑數。時當仲秋。予曰。此溼痰風熱爲。痺也。脈之滑爲痰。弦爲風。數爲熱。蓋溼生痰。痰生熱。熱壅經絡。傷其營衛。變爲風也。公曰。君何以治。予曰。痰在經絡。雖不害事。然非假歲月不能愈也。隨與二陳湯。加鈎藤。蒼耳子。薏苡仁。紅花。五加皮。秦艽。歲靈仙。黃芩。竹瀝。薑汁飲之。數日。手足之痛稍減。而脇痛如舊。再加鬱金。川芎。白芥子。痛俱稍安。予以赴漕運。李公召而行速。勸公請假緩治。因囑其慎怒內觀。以需藥力。公曰。內觀何爲主。予曰。正心。公曰。儒以正心爲修身先務。每苦工夫無下手處。予曰。正之爲義。一止而已。止於一則靜定。而妄念不生。宋儒所謂主靜。又曰。看喜怒哀樂未發以前。作何氣象。釋氏之止觀。老子之了得。一萬事畢。皆此義也。孟子所謂有事勿正。勿忘。勿助。長是其工夫節度也。公曰。吾知止矣。遂上疏請告。予錄前方。畀之北歸。如法調養半年。而病根盡除。

孫文垣醫案 卷二 三吳治驗

五六

孫文垣醫案

明

新安

孫一奎文垣甫輯

鄞縣

曹赤電炳章圈點

卷二

新都治驗

瓊兄內傷飲食。外感風邪。洒淅惡寒發熱。煩躁不寧。已經表汗瀉吐之後。小水短赤。口渴。腹中疼。夜不能睡。耳聾氣塞。神魂不安。懊憹不已。予脈之。兩寸滑大。左關弦右關滑。兩尺皆弦。皆七至。據此迺少陽陽明兩經合病。仲景云。渴而小便不利者。當利其小便。先與柴苓湯加竹茹進之。耳稍聰。稍得睡。熱仍不退。聞食氣即嘔。以濟生竹茹湯。加人參、麥冬、黃連。外與辰砂六一散三錢。服後神稍清。手足心仍熱。用竹葉石膏湯。而熱亦不退。且懊憹殊甚。合目即譫語。按仲景謂傷寒汗吐下後。懊憹不得眠者。熱在心胸之間。宜輕湧之。以梔子豆豉湯主之。

服後晚間仍不得眠。兩耳氣塞難當。改以小柴胡湯合白虎湯進之。卽得睡。睡中汗出二次。耳頓通利。因進食早。及發熱口渴。舌上黃胎。此陽明餘熱復萌。乃用石膏七錢。甘草一錢。知母三錢。黃連一錢五分。百合。竹茹各一錢。竹葉三十片。急進而熱全退。始得獲安。

程龍塙翁每行動卽作熱。發渴嘔惡。腰與環跳常痛。脈左沉細。右寸滑。關尺濡弱。此上焦有痰火。下焦有濕熱。治當流濕舒筋。然後施補。先用苡仁三錢。蒼朮。歲靈仙。牛膝。黃柏。烏藥葉。紫荆皮各一錢。紅花。桂皮。防己各五分。水煎服。外以鹿茸。虎骨。晚蠶沙。仙茅。黃柏。龜板。蒼朮。牛膝。杜仲。蜜丸服之而安。

汪松崗翁原傷於酒。夜分有熱。咳嗽咯血。不思飲食。左脇氣不調。左寸脈芤。關濶。尺弱。右寸短。關滑。此胃中痰火正旺。氣血俱虛。宜先清胃保肺。然後大補。麥冬。知母。寒水石。甘草。紫苑。人參。牡丹皮。白芍藥。當歸。貝母。桑白皮。煎服一帖。紅仍未止。加側柏葉。茅根。四帖而紅止。過後四月。又爲怒氣所傷。血又動。左不能睡。桃仁。滑石。紅花。當歸。人參。貝母。山梔仁。甘草。香附。青皮。牡丹皮。煎服而安。予囑渠令子曰。寄語令堂。諸凡得意事可與尊翁知之。如不得意者。切不可使之聞。

也。蓋肝爲藏血之所。況血去多。肝火剛燥。心主不足。內經云。主不明則十二官危。不可不謹防之。且左不得眠。肝脹可知。予甚爲尊翁慮。後三年果爲怒復。乃命使迎予。予固辭謝曰。向曾叮囑。今病之來。非不僂所堪任也。不逾旬而歿。

族妹經不行者八十日。每飲食入腹。卽疼痛必盡吐出乃止。居常亦吐酸水上焦。熱下焦寒。大便半月始一行。食飲不進者四十日。六脈皆數。左滑右軟弱。妹能事者。以其夫多病。且不諳世故。由是悒悒病從思慮而得。恐成膈症。今大便燥結吐酸。乃膈之徵。急宜拂慮。庶藥有功。先與丁靈丸一粒而吐止。繼用溫膽湯。加大腹皮。薑連。痛吐全安。故以二陳湯加香附、條芩、山梔仁、丹參、砂仁。調理兩月經行。大便始潤。而膈症斯不作矣。

孫華野脈沉弦而數。喉痛頰車腫。兩太陽作脹疼。遍身皆脹痛。憎寒發熱。乃痰火上壅而變風熱。將欲作毒也。宜急治之。薄荷、甘草、升麻、白芷、石膏、枳殼、天花粉、桔梗、大力子、連翹、玄參。一帖而愈。

顯兄每辛苦及酒多。則咯血數口。脈兩寸皆短弱。關尺洪數。此胃中有痰火。而下焦有陰火。由壯年酒色所傷故耳。以丹參、滑石各三錢。白芍藥二錢。麥冬、貝母、

桃仁、紫苑、牡丹皮各一錢。當歸七分。甘草五分。煎服而安。

歙邑吳遂兄木商也。在吳興年七十。因冒雨勞力汗出。又以冷水澡浴。因而發熱口渴。心與背互相脹疼。小水長而赤。舌上黃胎。夜不得臥。眼目如金皮膚盡黃。吳興之醫見之遠走。不敢措劑。謂其年高不宜此病。讚勸回家。乃敦訪予治。診得左脈浮數。右濡弱。兩手皆有六至。予曰。此濕熱發黃症也。病雖重。年雖高。有是症。當有是藥。毋用倉皇。乃以柴胡三錢。酒芩。葛根。青蒿。香薷。天花粉各一錢。人參七分。粉草五分。連進二帖。晚得微汗。卽能睡。次早熱退其半。舌胎稍淡潤。不焦燥矣。胸膈餘熱作煩。身黃如舊。以竹茹。青蒿。葛根各一錢。人參。麥門冬。天花粉。知母各八分。白芍藥六分。二帖熱退食進。精神陡長。後與補中益氣湯。加青蒿。麥門冬。天花粉十帖。而眼目肌膚之黃盡釋然矣。吳興諸公悉服其精當。各錄方而傳。

族姪文學明之。以作文過勞。痰火上逆。大吐痰沫。因而嘔血。一涌數椀。昏暈汗出。奄奄而臥。略不敢動。稍動卽嘔吐而血隨出色鮮紅。飲食湯水皆不敢入。入卽吐而眩運。血卽隨之。里有婺君程聞野氏爲之診。駭而走曰。血如涌泉。體熱脈

大眩運而藥食難入。似無佳兆。乃速予治。予診視畢。語其乃兄勉之曰。可生也。
何舉家張皇若此。勉之以程言告余。余曰。看症要圓活。勿拘泥。據經云。心主血。
肝藏血。又曰。怒則氣上。又曰。脈虛身熱。得之傷暑。今左脈弦大。右脈虛大。明之。
不獨作文勞心動火。且亦被怒傷肝。抑又爲暑所逼。以致木火上升。弦運作吐。
經曰。諸風掉眩。皆屬肝木。諸嘔吐逆。皆屬於火。又諸動屬火。內爲木火上升。衝外。
爲暑氣所迫。故吐而汗多。血隨吐出也。醫責識病。有是病則有是藥。予特以白。
丸子三錢。解其暑氣。清其痰飲。抑其衝逆。則吐可止。吐止氣平。則血自能歸經。
腹後果嗒然而睡。醒則吐止。食進。眩暈尋已。繼用滑石、香薷各三錢。甘草五分。
黃連、白扁豆各一錢。五分竹茹一錢。四帖全安。

從嫂程氏。年近五十。患咳嗽吐臭膿血。一日夜一椀餘。發熱晝輕夜重。肌肉大瘦。
六脈浮而洪滑且數。人皆謂嘔血身熱脈大。法在不治。予曰。此非嘔血比也。此。
係釀酒傷肺。又爲怒氣所觸。瘀血濁痰。滯於肺之氣竅。無從而出。久之化而爲。
膿。成肺癰也。治宜開肺竅。活血化痰。使膿盡當自愈也。諸人治之二年不效。予。
教以白芍、薏苡仁各三錢。牡丹皮、桔梗、苦根、歸尾、山梔子、貝母、白芍藥各一錢。

甘草、葶苈子各五分。三十帖全愈。後壽七十三。以他病而終。此疾再不復發。
族姪媳葉氏。年三十。身面四肢浮腫。漸而入腹。腹大不可言。眼泡腫而無縫。飲食
大減。小水不利。此滯氣水脹也。以大腹皮、茯苓皮、薑黃、蒼朮、厚朴、澤瀉、木香、烏
藥、陳皮。服三劑而眼目能開。飲食稍進。卽爲食傷而復腫。予改用七傷丸。調理
全安。

族姪孫伍仲立年。善飲好內。小便血淋疼痛。予以滑石、甘草梢、海金沙、琥珀、山梔
子、青蒿、茅草根煎膏爲丸。梧桐子大。每空心及食前燈心湯送下三錢。不終劑
而愈。後五年。因子遲服補下元藥過多。血淋又發。小便中痛極。立而不能解。必
蹲下如婦女小解樣。始能解出。皆大血塊。每行一二碗餘。如是者半月。諸通利
清熱之劑。靡不遍嘗。不應。脈俱洪數。予以五靈脂、蒲黃、甘草梢各二錢。小薊、龍
牙草各三錢。水煎空心服。二帖而痛減半。血仍舊。改用蘆麥、山梔子、甘草各二
錢。茅根、杜牛膝、連葉車前草各三錢。生地黃、柴胡、黃柏、木通各一錢。四帖痛全
減。血全止。惟小便了而不利。六脈亦和緩不似前矣。後以人參、葛根、青蒿、白朮、
茯苓、甘草、白芍藥、升麻、黃柏、知母、調理萬全。

令眷辰州太守石峰公女也。吐紅發熱。經水二十日一行。或一月行二次。白帶且多。胸膈飽脹。脈洪數。以丹參生地、山梔子、白芍藥、小薊、鹿角膠水煎。臨服加入童便一盃。酒二十劑而瘳。

亮卿令媛。右目紅腫。如腹中飽。眼乃能開。飢則眼不能開。此疳積虛寒症也。以夏枯草二錢。甘草、穀精草各一錢。香附一錢五分。煎服四帖而安。

姪孫少竹。太學生也。眼紅腫脹。余雲谷以苦寒治時疾之劑與之。眼愈腫。且增兩太陽痛。前藥中再加石膏。不惟眼腫不消。頭痛不止。且令遍身脹悶。寢食俱廢。予爲脈之。弦大而無力。乃用蔓荆子、桑白皮、柴胡、香附、夏枯草、甘草、芽茶一帖而痛定。兩帖腫消。四帖全瘳。

一僕婦產後惡露不盡。腹中作痛。且冒風咳嗽。嘔吐頭暈。腳麻木不知痛痒。亦不能轉側。與糖毬子、紫蘇、旋覆花、烏藥、五靈脂、茯苓、川芎、當歸、澤蘭葉、玄胡索。加沙糖煎服而痛止。再進惡露行。咳嗽嘔吐皆愈。上舍程好吾公令孫。右耳後生一毒腫痛。遍身生大泡瘡。憎寒發熱。與金銀花、當歸尾、甘草、赤芍、連翹、殭蠶、大力子、玄參。兩劑而消。