

510.87
12-1
26

26



63297

醫列孫真人備急千金要方卷之二十四

解食毒第一

論一首

方二十九首

解食毒第一

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖又設其法以救活之正為貪生嗜樂忍而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以今述神農黃帝解毒方方法好事者可少留意焉
治諸食中毒方

飲黃龍湯及羣角汁無不治也飲馬尿亦良

治飲食中毒煩滿方

苦蕒二兩以酒一升半煮取一升頓服取吐愈

治食百草中毒方

掘地深一尺以水滿坑中取芎藭七枚燒令煙

以出坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但
搗山薯水即取飲之

又方 服生韭汁數升 **又方** 含貝子一枚須臾吐食物瘥

治食六畜肉中毒方

各取六畜乾屎為末水服佳若是自死六畜肉毒水
服黃蘗末方寸匕須臾復與佳

又方 燒小豆一升為末服三方寸匕神良

又方 水服竈底黃土方寸匕

治食生肉中毒方

掘地深二尺取土二升以水五升煮土五升六沸取
上浮清者飲一升立愈

治食牛肉中毒方

狼牙燒灰水服方寸匕良

一作猪牙

又方 温湯服猪脂良

又方 水煮甘草汁飲之

治食牛馬肉中毒方

飲人乳汁良

治食馬肉血洞下欲死方

豉貳斤粒

杏仁貳拾枚

右一味以咀葱五升米下飯熟擣之再服令盡

又方 蘆根汁飲以浴即解

治生食馬肝毒殺人方

牡鼠屎一七枚兩頭尖者是以水研飲之不瘥更作

治食野豨馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人

又方 燒狗屎灰水和絞取汁飲之方愈

又方 燒出骨為末水服方寸匕日二

治食百獸肝中毒方

頓服豬脂一斤佳亦治陳肉毒

治食狗肉不消心中堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂言

妄語或洞下方

杏人一升合豆及研以沸湯二升和絞取汁分二服狗

肉完片皆出即靜良驗

治食猪肉中毒方

燒猪屎為末服方寸匕犬屎亦佳

治漏脯毒方 張文仲云茅室諸水迷脯為漏脯

擣韭汁服之良大豆汁亦得

治癰肉濕脯毒方 張文仲云肉閉在密器中如蟹膏者為癰

燒狗屎為末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不用深藏
密蓋不泄氣皆殺人又肉汁在器中密蓋氣不泄者

亦殺人

治脯在黍米中毒方

麩一两鹽兩撮以水一升煮服之良

治中射罔脯毒及餅臠中毒方

取貝子為末水服如豆佳不瘥又服

人以雉肉作餅臠因食皆吐下治之方

犀角為末服方寸匕得靜甚良

治食鵝鴨肉成病實滿面赤不下食者方

服秫米泔良

治食魚中毒方

煮橘皮停極冷以之立驗用後方云治食魚中毒面腫煩亂者

治食魚中毒面腫煩亂及食鱸魚中毒欲死者方

劉蘆根春取汁飲良并治解毒亦可取蘆薹茸汁

飲之愈

治食魚鱸及生肉在胸膈中不化吐之不出便成癥瘕方

厚朴叁兩 大黃貳兩

右二味咬咀以酒一升煮取一升盡服立消人強者

大黃用酒二升煮取一升再服之

治食魚鱸不消方

大黃叁兩切 朴消貳兩

右二味以酒一升煮取一升頓服之仲景方有橘皮膏

猪肉遇冷不消必成
痲下之方小兒無痲皮

又方 春馬鞭草飲汁一升即消生薑亦良用後方云亦宜服諸叶藥

又方 鮫魚皮燒灰水服無完皮壞刀裝取之一名鮫魚皮

古方云錄驗云治食鮫魚傷毒

又方 魚皮燒灰水服方寸匕

又方 魚鱗燒灰水服方寸匕食諸鮑魚中毒亦用之

治食蟹中毒方

冬瓜汁服一升冬瓜亦可食

治食諸菜中毒方

甘草

長齒

胡粉各等分

右三味治下篩水服方寸匕小兒乳乳汁共服一升

治食山中樹菌中毒方

又桑汁服一升良

解百藥毒第一方十一首

解毒二十八條

論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒葱湯下咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒余每試之大懸絕不及甘草又能加之為其豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸治嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此則成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

石藥毒用白鴨屎
人參汁雄黃毒用防己

鐵物毒用磁石
麝石毒用大豆汁
白鴉屎

防葵毒用葵根汁

桔槩毒用白粥

逐毒用大豆汁

大戟毒用葛蒲汁

蠱蠹毒用槐子汁

雞子毒用溲醕

馬刀毒用清水

野羊毒用土漿

人糞汁

杏人毒用藍子汁

百藥毒用甘草

薺老

大小豆汁

藍葉根實汁

金銀毒用

水銀服數兩即出

雞子汁及屎白燒猪脂和

水淋雞屎汁煮葱白汁

鴨血及屎汁

光花毒用

防已

防風

甘草

桂汁

葛毒用

雞子清

葛根汁

甘草汁

鴨頭熱血

猪膏

雞屎

人屎

藜蘆毒用

雄黃

温湯

煮葱汁

烏頭天雄附子毒用大豆汁遠志 防風 棗肉 飴糖

射罔毒用藍汁 大小豆汁 竹瀝 大麻子汁

藕菱汁 六畜血 貝齒屑 蚯蚓屎

半夏毒用生薑汁及煮乾薑汁

葶藶毒用薺苳 甘草 犀角 蟹汁 升麻

狼毒毒用杏仁 藍汁 白斂 鹽汁 木占斯

巴豆毒用煮黃連汁 大豆汁 煮寒水石汁 生薑汁射後下

芎藭蒲汁 煮寒水石汁

蜀椒毒用葵子汁 蒜 桂汁 豉汁 人尿 冷水

土漿 雞毛燒吸煙及水調服

斑蝥元青毒用猪膏 大豆汁 戎鹽 藍汁

鹽湯煮猪膏 巴豆

服藥過齊悶亂者

水和葛粉

地漿

藜荷汁

粳米泔

豉汁

乾薑

黃連

飴糖

飲藍汁

吞雞子黃

解諸菌毒

掘地作坑以水沃中攪令濁澄清飲之各地漿

解一切毒藥發不問草石始覺惡即服此方

豉叁升

葱白

生麥門冬

各捌兩

右三味收咀以水七升煮取一升半分二服

雞腸草散解諸毒方

雞腸草

叁分 薺芫

升麻

各肆分 芍藥

當歸

甘草

各貳分 空土

壹分

藍子

壹分 合口

右八味治下篩水服方寸匕多飲水為佳若為蜂蛇等

毒蟲所螫以針刺螫上血出者藥如小豆許於瘡中令
濕糜為射罔箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏
一繞水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血
出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解毒藥方

藜蘆 壹分

藍并花 貳分

右二味七月七日取監陰乾搗篩水和服方寸匕日二

又方 中毒者取秦熟毛二七枝燒灰服

解一切毒方

母猪屎水和服之又水二升二合和米粉飲之

解鴆毒及一切毒藥不止煩瀉方

甘草

蜜 各肆分

梁米粉 壹升

右三味以水五升煮甘草取一升去滓散大熱內粉湯
中攪令勻調內白蜜更煎令熟如薄粥適寒溫飲一升
治食棗若悶亂如卒中風或似熱盛狂病服藥即劇方
飲甘草汁監青汁即愈

治野葛毒以死口噤者方

取青竹去兩節拄兩脇臍上內冷水注之暖即易須
臆口開開即服藥立活惟須數易水

治鈎吻毒困欲死面青口噤逆冷身痺方

時後方云鈎吻
藥更食芥相

薺菜八兩咬咀以水六升煮取三升冷如人體服五

合日三夜一凡煮薺菜惟令濃佳

又方煮桂汁飲之

又方噉葱淨佳

治腹中有鐵方

白折炭刮取末并花水服二錢不過再服

解五石毒第二

論二首

證一十八條

方三十五首

論曰人不服石以庶事不佳惡瘡疥癬温疫瘧疾年年常
患寢食不安興居常惡非止已事不康生子難育所以石
在身中萬事休泰要不可服五石也人年二十已上可服
石藥若素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上
三年可服一劑六十已上二年可服一劑七十已上一年
可服一劑

又曰人年五十已上精華消歇服石猶得其力六十已上
轉惡服石難得力所以常須服石令人手足温暖骨體充
實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服

之凡石皆熟煉用之凡石之發當以惡寒頭痛心悶發
有時狀如溫瘧但有此兆無過取冷水淋之得寒乃止一
切冷食惟酒須溫其諸解法備如後說其發背疽腫方見
前二十一卷中

又曰凡服石人甚寡不得雜食口味雖百品具陳終不用重
食其肉諸雜既重必有相賊聚積不消遂動諸石如法持
心將攝得所石藥爲益善不可加余年二十八九嘗服五
六兩乳自是以來深深體悉至於將息節度頗識其性養
生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地清白光潤羅紋
鳥翻一切皆成白可入服其非土地者慎勿服之多皆殺
人甚於鴆毒紫石白石極須外內映徹光淨皎然非此亦
不可服寒石五石更生散方舊說此藥方上古名賢無此

漢末有何侯者行用自皇甫士安已降有進餌者無不發
背解體而取顛覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者
不一所以寧食野葛不服五石明其大大猛毒不可不慎
也有識者遇此方即須焚之勿久留也今但錄主對以防
先服者其方以從煙滅不復須存為含生害也

葱白 湯鍾乳對木文對枯萋其治主肺上通頭胃木動
鍾乳管塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤
海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣有時木動鍾乳直頭
痛胃塞然鍾乳與木為患不過此也雖所患不同其治一
矣發動之始要有所由始覺體中有異與上患相應宜速
服此方

葱白 半斤 豉 一斤 人參 外臺用吳 甘草 兩

右四味以水一斗五升煮葱白作湯澄取八升
內藥煮取三升分三服纔服便使人按壓搖動口中嚼
物然後仰卧覆以暖衣汗出去衣服湯執飲即便冷淘
飯燥脯而口若服此不知解復服

甘草湯方

甘草 參兩

桂心 貳兩

豉 貳升

葱白 半斤

右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣
復服

桂心湯方

桂心

麥門冬

各參兩 人參

甘草 各貳兩

豉 貳升

葱白 半斤

右六味合服如煎法

此方與時後散發身體半去暑

及湯方用重分兩小異

杜仲湯 硫黃對防風又對細辛其治主脾腎通主腰脚防

風動硫黃煩熱脚疼腰痛或嘔忿無常或下利不禁防風

細辛能動硫黃而硫黃不能動被始覺發便服此方

杜仲 參三兩

枳實

甘草

李核人 各實兩

香豉 實升

梔子人 拾肆枚

右六味合服如上法若不解復服

大麥奴湯 方

大麥奴 肆兩

甘草

人參

芒消

桂心 各半兩

麥門冬 半斤

右六味合服如上法若不解此已解脾腎猶有餘熱氣或

冷復服

人參湯 方

人參

乾薑

甘草

當歸各二兩

附子宜

右五味合服如上法

生麥門冬湯

白石英對附子其治上胃通主脾腎附子動

白石英煩熱腹脹白石英動附子嘔逆不得食或口噤不

開或言語難手脚疼痛始覺發宜服此方

生麥門冬二兩甘草

麻黃各二兩豉一升

右四味合服如上法不解再服

大黃湯

方若煩加細辛一兩

大黃三兩

豉一升

甘草二兩

梔子一枚

右凡五味合服如上法頻服得下便止不下服盡若熱

勢未除視瞻高而患渴復服

栝實根湯

方

栝藹根 大麥奴兩其早貳兩貳升 葱白半斤

右五味合服如上法稍稍

便可食少糜動口若已解

芒消湯方

芒消 桂心各 通草 甘草各

白木壹兩 大棗壹拾 枝李核人貳拾膏枝

右七味合服如上法若腹

人參湯紫石英對人參其治

石莖外動紫石英人心急而

誤失性發狂昏昏欲眠或情

或耳聾目暗又防風雖不

外意三云防風雖不對紫石莖人能動紫石莖人亦能動人亦能動人

項強始覺服此方外基服麻黃湯

人參

白朮各參三兩

甘草外基無

桂心各貳兩

細辛壹兩

豉參升

右六味合服如上法若嘔盛加大黃黃芩枳子各三兩
若甚心誤狂發猶去除服

生麥門冬湯方外基此方治與若石發

生麥門冬

葱白各半斤

甘草參兩

人參壹兩

豉壹升

右五味合服如上法溫牀暖覆牀下著火口中嚼物使
身稍汗一日便解若心有餘熱更服

人參湯方

人參

防風

甘草各參三兩

桂心 貳兩

生薑

白木 各壹兩

右二味合服如上法

大麥散方

赤石脂對桔梗其治主心通主胃背桔梗動石

脂心痛寒噤手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗頭痛目

赤身體壯熱始覺發宜且溫清酒飲之隨能否須酒勢行則

解亦可服此方

大麥藪令汗出燥止勿令大焦春去皮細搗絹篩以

冷水和服之

千金翼云炒土人皮及淨海藻
令熟曝乾熬令香乃為末

葱白鼓湯

礬石無所偏對其治主胃發則令人心急口噤

骨節疼強或節節生瘡始覺發即服此方

外臺云服
麥門冬湯

葱白 半斤

鼓 貳升

甘草 貳兩

右三味以水六升煮取一升半分三服若散發身體

生麥門冬湯

生麥門冬湯方

生麥門冬 伍兩 甘草 參兩

桂心 貳兩

人參 壹兩半

葱白 半斤

豉 貳升

右六味服如解鍾乳湯法

木對鍾乳木發則頭痛目疼或舉身壯熱解如鍾乳法

附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆手脚疼體強

骨節痛或項強面自滿腫發則飲酒服麩自愈若不愈與

白石英同解

人參對紫石英人參發則煩熱頭項強與紫石英同解

大黃對赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗發

則頭痛目赤身壯熱解與赤石脂同茯苓發則壯熱煩

悶宜服此方

大黃

黃芩

梔子

兩鼓黃升

葱白切

右五味以水六升煮取一升半分二服

牡蠣發則四肢壯熱心腹煩悶極渴解與赤石脂同

乾薑無所偏對

海蛤對枯薑海蛤先發則手足煩熱枯薑先發

則噤寒有涕出宜服此方

枯薑根

甘草

各一分

大黃黃升

梔子

人

右四味合服如解鍾乳法

白石英發先腹脹後發熱

石硫黃發通身熱兼腰膝痛

礬石發徧身發熱兼口噤

牡蠣發頭痛而煩滿熱

茯苓發直頭痛

梓樓發頭面熱

海蛤發心中發熱

已上除海蛤外宜浴

紫石英發下寒乍熱

赤石脂發八噤身熱頭目赤

已上二味宜酒

石硫黃礬石桔梗牡蠣茯苓此五物發宜浴白石英亦可
小浴其餘皆不宜浴礬石發宜用生熟湯茯苓發熱多攻
頭即以冷水洗身漬之

浴法初熱先用暖水後用冷水浴時慎不可洗頭垂
冰可以一二三升灌之丸藥宜浴便得解即佳不瘥可
餘治之

赤石脂紫石英發宜飲酒得酒即解凡藥發或有宜冷或
有宜飲酒不可一槩也

又一法云寒食散發動者宜草藥氣力易盡石性沈滯獨

主胃中故今數發欲服之時以絹袋盛散一匕著四合酒中塞其口一宿後飲盡之其酒用多少將御節變自如舊法此則藥石之勢俱用石不住胃中何由而發事甚驗也

枳子散湯

治食宿飯陳臭肉及羹宿菜發者方

枳子 參三升

香豉 參三升

甘草 參三兩

右三味以水八升煎取三升分三服亦可加人參
葱白

葱白豉湯

治因失食發及飲酒過醉發者方

葱白 壹升

豉 貳升

乾薑 伍兩

甘草 貳兩

右四味以水七升煮取三升分三服不解宜服

理中湯方

人參

甘草

白朮

各參三兩

乾薑 貳兩

右四味以水六升，煮取三升，半分三服。

人參湯 治因瞋怒太過發者方

人參

枳實

甘草

各四分

白朮

乾薑

枳實根

各四分

右六味以水九升，煮取三升，分三服。若短氣者，稍

稍數飲。金匱要略云：主散發氣逆，心腹絞痛，不得氣息，命在轉燭者。

情色過多發，宜服薑黃湯。方本闕。

將冷太過發，則多壯熱，以冷水洗浴，然後用生熟蕩湯五六

石灌之。已食少，暖食飲少，熱酒行步自勞。

將熱太過發，則多心悶，時時食少。冷食若夏月大熱時，散

發動多起於渴飲多所致。水和少麩服之，不瘥復作，以瘥

為度。

冷熱熨法 治大小便秘塞不通或淋瀝弱血陰中疼痛此是執氣所致用此法即愈

其法前以冷物熨小腹已次以熱物熨之又以冷物熨之若小便數此亦是取冷所為暖將理自愈

治藥發下利者方

乾服豉即斷能多益佳

檳榔湯 凡服散之後忽身體浮腫多是取冷過所致治之

檳榔三十枚搗碎以水八升煮取一升分再服千金

子搗作末下篩以湯煮升煮取真升去滓內子末為再服

治凡散發瘡腫方

蔓菁子炙 杏仁 黃連 胡粉各壹兩 水銀貳兩

右五味別搗蔓菁子杏仁如膏以猪脂合研令水銀滅

以塗上日三夜一

治散發赤腫者方

生地黄伍兩大黃壹兩

生商陸叁兩杏仁肆拾枚

右四味切醋漬一宿猪膏一升煎商陸令黑去滓摩腫

上日三夜一

治散發生細瘡者方

黃連

芒消各伍兩

右一味咬咀以水八升煮黃連取四升去滓內芒消令

烱漬布取帖瘡上數數易換多少皆著之

治散發瘡痛不可忍方

冷石二兩下篩為末粉碯上日五六度即燥須臾痛

亦定

治服散勿發動方

乾薑五兩改咀以水五升煮取三升去滓內蜜一合
和絞頓服不瘥重作

鴨通湯 解散除熱方

白鴨通五升沸湯貳斗半淋之澄清取汁貳斗 豉參升 梔子人貳拾枚

麻黃兩 冷石貳兩 甘草伍兩 石膏參兩

右十味五味咀咀以鴨通汁煮取六升去滓內豉三沸
分服五合若覺體冷小便快濶其間若熱猶盛小便赤
促服之不限五合宜小勞當漸進食不可令食少但勿
便多耳

解散治盛熱實大小便赤方

升麻 大黃 黃連 甘草

黃蘗 各三兩 芍藥 陸兩

黃芩 肆兩

梔子 人枚

竹葉切

破 各膏升

白鴨通 伍合

右十一味 哎咀 以水三斗 先煮鴨通 竹葉 取一斗二升 去滓 澄清 取一斗 次內藥 煮取三升 分三服 若上氣者 加杏仁五合 腹滿 加石膏二兩

下散法 治藥發熱困方

千金翼云六月散數發熱無賴下去 又云諸用及金石等同用之

黍米二升 作糜 以成煎 猪脂一斤 和令調 宿不食 曰 空腹食之 令飽 晚當下藥 神良 不盡 熱發 更合服之

又方 肥猪肉

伍斤

葱白

薤 各半斤

右二味 合煮 治如食法 宿不食 曰服之 令盡 不盡 明日

更服

又方 治發熱 數數 患熱 困厭 藥下之之方

猪腎脂一具不令中水以火炙承取汁適寒温一服
三合每日夜五六服多至五六升二日稍隨大便下
又方作肥猪肉臄一升調如常法平旦空腹頓服令盡少
時腹中雷鳴鳴定藥下隨下以器盛取用水淘得石
不盡更作如前服之

蠱毒第四論一首 方二十首

論曰蠱毒千品種種不同或下鮮血或好卧闇室不欲光
明或心性反常乍喜乍哀不喜或四肢沈重百節酸疼如此種
種狀貌說不可盡亦有得之二三年乃死急者一月或百日
即死其死時皆於九孔中或於脇下肉中出去所以出門
常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱猫鬼狐狸老
物精魅亦不敢著人養生之家大須慮此俗亦有灸法初

中蠱於心下捺便大炷灸一百壯并主猫鬼亦灸得愈又
當足小指尖上灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上
得者有飯出肉菜上得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡
上出

凡中蠱毒令人心腹絞切痛如有物蟻或吐下血皆如爛
肉若不即治蝕人五臟盡乃死矣欲驗之法當令病人唾
水沈者是蠱不沈者非蠱也

凡人患積年時復大便黑如擦或堅或薄或微赤者皆是
蠱也

凡人忽患下血以斷下方治更增劇者此是中蠱也

凡卒患血痢或赤或黑無有大小此皆是蠱毒粗醫以斷

劑藥處之此大非也

世有拙醫見患蠱脹者徧身腫滿四肢如故小便不甚澀
以水病治之延日服水藥經五十餘日望得痊愈日復增
加奄至墮歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬
不失一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云耳
凡人中蠱有人行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當
使呼喚將去若欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作末以飲
服方寸匕須臾自呼蠱主姓名可語令去則愈又有以蛇
涎合作蠱藥者飲令口中使人得瘕病此一種積年乃死療
之各自有藥江南山間人有此不可不信之

太上五蠱圖 法百蠱吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉舌聾
不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟
身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐狸作魅卒得心痛

上义曾脇痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主之方

雄黃 椒目 巴豆 莽草 羌花

真珠 外基用木香 鬼臼 礬石 藜蘆各分

附子 五分 獺肝 一分 蜈蚣 一枚 斑蝥 叁拾枚

右十二味為末密和更擣二千杵丸如小豆先食飲服

一丸餘密封勿泄藥氣十九為一劑如不中病後日增

一丸以下利為度當下盡種種狀貌不可具述下後七

日將息服一劑二十年百病盡除忌五辛

大乙道命圓治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心痛

積聚腫脹疝瘕宿食不消吐逆嘔噎寒熱瘰癧蠱毒婦人

產後餘疾方

蜈蚣 青散 丹砂 附子 礬石 鹽石

雄黃

藜蘆

鬼臼

巴豆

貳分

古八味為末蜜丸如麻子一服二九日一服傷寒一二
日照一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下痢服一丸一
丸塞下部蠱毒服一丸在外膏和摩病上在膈上吐膈
下利有瘡一丸塗之毒自出產後餘疾服一丸耳聾綿
裹塞耳

治人得樂雜蠱方

斑蝥陸校桂心

藜蘆各如指大金月下土

如彈丸大

占四味治下篩水服一錢匕下蟲蛇蝮螭蜈蚣毒俱出

萬病圓治蠱注四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀死

後轉易家人一名蠱脹方

小口咽各如雄黃丸一名萬病丸

雄黃

巴豆

莽草

鬼臼

各肆分蜈蚣

右五味為末蜜和搗二千杵丸如小豆密封勿泄氣宿
勿食平日空腹一九一炊久不知更加一九當先下清
水次下蟲長數寸及下蛇又下蝦雞子或白如膏下後
作葱豉粥補之百種暖將息

治中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝病變無常處

方用後古今錄驗方俱云用鐵精烏雞肝和丸如梧子以酒服三九日用其甚者不過十日千金用後方疑千金

殺羊皮方伍犀角

芍藥

黃連

牡丹各壹兩

蘘荷肆兩

梔子入

右七味以水九升煮取三升分三服葛氏崔氏

梔子用苦參汁麻當歸

犀角圓治蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方

犀角屑 鬼臼膏 桂心末 羚羊角屑各身錢匕

天雄

莽草

真珠

雄黃

各壹兩

貝子伍錢

蜈蚣

伍節

巴豆

伍枚

麝香

貳分

射罔

如雞子黃

大言散

右十二味為末合搗蜜丸如小豆服一九日二合咽不

知少增之卒得腹滿蜚尸服如大豆許二丸若惡氣腫

以苦酒和塗上縫袋子盛藥繫左臂辟不祥鬼瘡蠱毒

可以備急

治蠱毒方

茜根

藁薺根各叁兩

右二味咬咀以水四升煮取一升頓服肘後方云冷中

皆如爛肝者自知蠱主姓名

又方

蝟皮灰

亂髮灰

各壹方寸

生麻子汁伍升

桃根皮

柰樹北陰白皮

各伍兩

右五味先煮榭皮桃根取濃汁一升和麻子汁髮交等
令勻患人宿少食日服一太升須臾著盆承以雞翎攪
吐水中如牛涎犢胎及諸蟲並出

又方榭樹北陰白皮一大握長五寸水三升煮取一升空

腹服即吐蟲出亦治中蠱下血

又方蝟皮交水服方寸匕亦出蟲

又方大戟五月五日桃白皮
必效方云以東引者火烘之各肆分

斑猫壹分

右三味治下篩日空腹以水一雞子許服八捻用一指

相著如開頓服之若指頭相離取藥太多恐能損人後

方云服棗核大不瘥十日更服必效方云服半方寸
其毒即出不出更服李饒州云若以酒中得則以
酒服以食中得以飲服之

治蛇蠱方 蛇毒入菜果中食之令人得病名曰蛇蠱

大豆末以酒漬絞取汁服半升

治諸熱毒或蠱毒鼻中及口中出血醫所不治者方

取人采尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦

解百毒時氣熱病之毒服已溫覆取汗勿輕此方極

神驗

治蠱吐下血方

搏皮 廣伍寸長壹尺

蘆荻根 伍寸如足大指

右二味以水二升煮取一升頓服極下蠱

治中蠱下血日數十行者方

巴豆 貳柒枚

元青

藜蘆

附子

礬石 銘

右五味為末別治巴豆合篩和相得以綿裹藥如大豆

許內下部中日三瘰

又方 苦瓠一枚以水一升煮取一升稍稍服之當下蠱及

吐蝦蟇蝌蚪之狀一月後乃盡范汪方云苦瓠毒當

云用苦瓠壹升煮

治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍者方

芎根 升麻 犀角 桔梗

黃蘗 黃芩 地榆 白蘘荷

右八味咬咀以水九升煮取一升半分三服此蠱利血

用之

又方 桔梗 犀角 各等分

右二味為末酒服方寸匕日三不能自服絞口與少之藥

下心中當煩須臾自靜有頃下服至七日止可食猪脾

臟自補養治蠱下血如雞肝日夜不解欲死者皆可用
治腸蠱先下赤後下黃白法連年不瘥者方

牛膝一兩槌散切以淳清酒一升漬一宿平旦空腹
服之再服便愈

北地太守酒 治萬病蠱毒風氣寒熱方

烏頭 甘草 芎藭 黃芩 桂心

藜蘆 附子各肆兩 白斂 桔槩 半夏

拍子人 前胡 麥門冬各陸兩

右十三味七月麴十斤秫米一斛如醞酒法咬咀藥以

絹袋盛之沈於瓮底酒熟去糟漉取藥滓以青布袋盛

沈著酒底泥頭秋七日夏五日冬十日空腹服一合日

三以知為度藥有毒故以青布袋之服勿中二十日

大有病出其狀如漆五十日病愈愈有婦人年五十七被
病連年腹中積聚冷熱不調時時切痛遠脘絞急上氣
胸滿二十餘年服藥二十七日所下三四升即愈又有女
人病偏枯絕產服二十日吐黑物大如刀帶長二尺許
即愈其年生子又有女人小得癩病服十八日出血二
升半愈有人被杖崩血內瘀臥著九年服藥十二日出
黑血一二升愈有人耳聾十七年服藥二十五日鼻中
出血二升耳中出黃水女升便愈古方一至熹平二年北
地太守臣光上然此偏主蠱毒有人中蠱毒者服無不
愈極難瘥者不過二七日所有效莫不備出曾有一女
人年四十餘偏枯羸瘦不能起長臥牀枕耳聾一無所
聞兩手不收已經二年余為合口之遂得平復如舊有人

中蠱毒而先患風服茵芋酒傷多吐出蠱數十枚遂愈
何況此酒而不下蠱也嘉其功效有異常方故具述焉

胡臭漏脫第五論一首 方十五首

論曰有天生胡臭有為人所染臭者天生臭者難治為人所染者易治然須二年醋傳礬石散勿止并服五香丸乃可得瘥勿言一度傳藥即瘥正亦傳藥時暫得一瘥耳五香丸具前第一卷中凡胡臭人通忌食五香五辛治之終身不瘥

石交散 治胡臭方

石交青升

楓香沈香

丁香

薰陸香

青木香各二兩

礬石肆兩

橘皮

陽起石各三兩

右八味治下篩以綿作篋子粗如指長四寸長取藥使

著家上以絹袋盛著腋下先以布指令清然後挾之

又方 二年苦酢和石灰傳之

治胡臭方

辛夷

芎藭

細辛

杜衡

藁本各兩

右五味以咀以淳苦酒漬一宿煎取汁傳之欲傳取臨

卧時以瘻為度

又方 青木香

附子

白灰

各兩

礬石半兩

右四味為散著粉中常粉之

肘後無礬石

又方 赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復

又方 柎葉切二升以水五升煮取一升用洗腋下即以白

苦瓠燒令煙出熏之數數作用

又方 辛夷

細辛

芎藭

青木香肆分

右四味治下篩熏竟粉之

又方馬齒菜一束擣碎以蜜和作團以絹袋盛之以泥紙

裹厚半寸曝乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱

勿令冷先以生布指之交藥腋下藥痛久忍之不能

然後以手中勒兩臂

又方牛脂

胡粉各等分

右一呷煎令可丸塗腋下一宿即愈不過二劑肘後方

塗以

又方伏龍肝作泥傅之

六物散治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕臭

者方

乾枸杞根 乾薔薇根時後作薔薇根 甘草各半斤

商陸根

胡粉

滑石 各壹兩

右件藥治下篩以苦酒少少和塗膏當微汁出易衣復重塗上不過二著便愈或一歲復發發復塗之

又方 水銀

胡粉外其藥作粉霜

右二味以面脂研和塗之良驗

又方 石灰

叁升

銀膏 膏并一作銅膏

右二味合和絹囊盛汗出粉之妙

又方 正日以尿洗腋下神妙

又方 黃礬石燒令汁盡治為末絹袋盛粉之即瘥

脫肛第六方十一首 灸法三首

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫縮生瘻

通方

白蜜三升煎令燥冷水中調可得為丸長六七寸內

肛門中到身向上頭向下少時取烊斯須即通洞泄

猪肝散肛門主大腸大腸寒應肛門寒則洞瀉肛門滯出

猪肝令燥

黃連

阿膠

芎藭各貳兩

艾葉壹兩

烏梅肉伍兩

右六味治下篩溫清酒一升服方寸匕半日再若不能

酒與消白米飲亦得

壁中散治肛門滯出方

故屋東壁土壹升皂莢叁挺各長壹尺貳寸

右一味先擣土為散挹粉肛頭出處次取皂莢炙暖更

燒熨取入則止

又方灸故麻履底按令入頻按令入求瘥

又方 驚頭

故敗麻後辰 各壹枚

右一味燒驚頭擣為散傳肛門滯出頭次將復辰按入即不出矣

又方 礞石 肆兩

桂心 壹尺

蝟皮 壹枚

右三味治下篩飲服方寸匕日一服即縮慎舉重及急

帶衣斷房室周年乃佳 肘後方云治女人陰脫出外用驚頭壹枚為肆味

又方 女萎一升以器中燒坐上熏之即入

治脫肛方

蒲黃二兩以豬脂和傳肛上內之一二度即愈

治腸隨肛出轉廣不可入方

生括蔓根為粉以豬脂膏溫塗隨手抑按自得縮入

治積冷利脫肛方

枳實一枚石上磨令滑澤鑽安杓蜜塗炙令暖熨之
冷更易取縮入止

又方鐵精粉內上按令入即愈

治脫肛歷年不愈方

生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再

又方死鼈頭一枚燒令煙絕治作膏以傅肛門上進以手

按之

灸法

病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨白壯○又灸龜尾七壯龜尾即後

瘦弱用第七方十一首

證二條

治石瘦氣瘦勞瘦土瘦憂瘦等方

海藻

龍膽

海蛤

通草

昆布

礬石

礬石一作松蘿各參分

麥麩

肆分半夏貳分

右九味治下篩酒服方寸匕日二禁食魚猪肉五辛生

菜諸難消之物十日知二十日愈

又方

小麥麩

海藻

特生礬石拾兩

右二味以三二年米醋漬小麥麩曝乾各搗為散合和服

一方寸匕日四五服藥含極乃咽之禁薑五辛猪魚生

菜大吹大讀誦大吐語等

又方

昆布

松蘿

海藻

各參兩桂心

海蛤

通草

白欬

各貳兩

右七味治下篩酒服方寸匕日二

又方

海藻

海蛤

昆布

半夏

細辛

土瓜根

松蘿各壹兩

通草

白斂

龍膽各壹兩

右十味治下篩酒服方寸匕日再不得作重用

又方 昆布二兩洗切如指大醋漬令咽汁盡愈

又方 海藻壹斤小 小麥麴壹升

右二味以三年醋一升漉麴末曝乾往反醋盡合搗為

散酒服方寸匕日三服忌勞力 崔氏云療三十二年癭瘤

五癭圓方

葛蒲貳兩

海蛤

白斂

續斷

海藻

松蘿

桂心

蜀椒

到掛草

半夏各壹兩

神麴叁兩

羊鬻泊枚

右十一味治下篩以牛羊髓脂為丸如梧子日服三五丸

又方 取鹿鬻以佳酒浸令沒炙乾內酒中更炙令香合

汁味盡更易盡十具愈

灸法

癭惡氣灸天符五十壯千金翼卷之六又灸胃堂百壯

癭上氣短氣灸肺輸百壯 癭上氣胃滿灸雲門五十壯

癭勞氣灸衝陽隨年壯 癭氣面腫灸通天五十壯

癭灸天瞿二百壯橫二間寸灸之○又灸中封隨年壯在

兩足趺上曲尺宛宛中

諸癭灸肩髃左右相當宛宛處男左十八壯右十七壯女

右十八壯左十七壯或再二取瘥止○又灸風池百壯使

項兩邊○又灸兩耳後髮際一百壯○又灸頭衝項頭

衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所注處灸之各隨年

壯千金翼卷之六又灸胃堂百壯

凡肉瘤勿治治則殺人慎之 附後方云不得針灸

陰腫散 治一二十年癭瘤及骨瘤脂瘤石瘤肉瘤膿瘰癧血

瘤或息肉大如杯杆并斗十年不瘥致有漏潰令人骨消

肉盡或堅或軟或潰令人驚悸寤寐不安身體瘰癧縮愈而

復發方

烏賊骨 石硫黃各壹分 白石英 紫石英

鍾乳各貳分 丹參叁分 琥珀 附子

胡鷲菜 大黃 乾薑各肆分

右十一味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡濕即傳若瘡

乾猪脂和傅日三四以乾為度若汁不盡者至五劑十

劑止藥令人不痛若不消加芒消一二兩佳

治癭瘤方

昆布

桂心

逆流水柳鬚各壹兩

海藻

乾薑各壹兩

羊靨殺陰乾

右六味為末蜜丸如小彈子大含一九咽津

又方 礬石

芎藭

當歸

大黃

黃連

黃芩

白斂

芍藥各壹兩 吳茱萸壹分

右九味治下篩雞子黃和塗故細布上隨翳大小厚薄

帖之乾則易著藥孰當用濃脂細細從孔中出須探膿

血盡著生肉膏若膿不盡復起如故

生肉膏治癰疽潰漏及金瘡白瑤方

當歸

附子

甘草

白芷

芎藭各壹兩

薤白貳兩

生地黄各二兩

右七味以猪脂二升半煎白芷黃去滓稍以傳之

又方以狗屎糞雞子傳之土去膿水如前方說傳生肉膏取

瘥方見前二十一卷

陰癩第八灸法十八首

二十一首

論曰癩有四腫有腸癩卵脹氣癩水癩腸癩卵脹難瘥氣
癩水癩針灸易治

癩癩方

挑人

蜘蛛又名伍

挂心

疾癩子

地膚子

澤瀉

防風

五味子

橘皮

茯苓

防葵

芍藥又名亂

牡丹皮

細辛

海藻又名苦蕒

狐陰又名

右十六味為末蜜和丸如梧子服十九粒稍加至二十丸

艾方 取楊柳枝如脚趾大長一丈一十枝水煮令極熱以
故布及氈掩腫處取熱柳枝更互柱之如此取瘥

治癩疔卵偏大氣上作腫不能動方

防風

牡丹皮各置兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二翻後方云小兒用

五味小兒膏刀圭二十日愈
嬰兒以乳汁和夫只許與之

灸法

治卒癩以蒲橫度口如廣折之一倍增之布著小腹大橫

文今度中央上當臍勿使偏僻灸度頭及中央及隨

年壯好自養勿舉重大語怒言大笑 又牽陰頭正上灸

莖頭所極 又牽下向穀道又灸所極 又牽向左右髀

直行灸莖所極各隨年壯 又灸足厥陰在左灸右在右

灸左三壯在足大趾本節間

卯偏大上入腹灸三陰交在內踝上八寸隨年壯○卯偏

大癩病灸肩并在肩解臂接處隨年壯○陰卯偏大癩病

灸關元百壯○又灸泉陰百壯二報在橫骨邊

男陰卯大癩病灸玉泉百壯報之穴在崑骨下陰以其處

卑多不灸之及泉陰穴亦在其外○又云灸足太陽五十

壯三報之 又灸足太陰五十壯在內踝上一夫○又云

灸大敦在足大趾一毛中隨年壯 又灸足大拇趾內側

去端一寸赤白肉際隨年壯雙灸之 又灸橫骨兩邊二

七壯使蒸真

男癩灸手季指端七壯病在右可灸左左者灸右○癩病

陰卒腫者令並足合兩拇趾令爪相並以一艾灸兩爪端

角處一九令頓上兩爪角各令半丸上爪指佳七壯愈

陰癩灸足大趾下理中十壯隨腫邊灸之肘後方云灸足大趾第二

即下攝文正中中央五壯○男兒癩先將兒至碓頭祝之曰姚氏云足生趾本生二壯

坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一枚灸訖便牽

小兒令雀頭下向著囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗

艾炷獨簪頭許○大凡男癩當騎碓軸以足伸置軸上齊

陰莖頭前灸軸木上隨年壯

論曰有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有

五勞七傷而得陰下癢濕搔之黃汁出者宜用補丸散主

之仍須傳藥治之亦有患妬精瘡者以妬精方治之夫妬

精瘡者男子在陰頭節下婦人在土門內並似甘瘡作曰

齊食之大痛甘即不痛也

寒熱藥子湯 凡虛熱石熱當路門冷濕傷肌執聚在裏變成
 熱及水病腫滿腹大氣急大小便不利腫如皮紙盛水臭
 異如老蠶色陰虛堅腫為瘡水出此皆腎熱虛損強取風
 陰濕傷脾胃故也治之法內宜依方服諸利小便藥外以
 此湯洗四肢竟以葱白膏傳之別以猪蹄湯洗莖上**莢藜**
子湯方

莢藜子

赤小豆

葱心青皮

又呈膏升

菘菜子

蒴藿

巴豆

膏散入口及散

右六味咬咀以水二斗煮取八升以淋洗腫處

猪蹄湯 治胆石發熱因勞損熱盛當風露卧莖腫方

猪蹄 膏雙

蒴藿 各升

莢藜子

膏升碎

葶藶子 伍合

黃蘗 伍兩

德白膏方
右五味以水一斗煮取三升冷浴陰歷日三

葱白

松葉子

葶藶子

蒴藿根

蒺藜子

丹參

各半升

猪膏

伍升

右七味以水一斗煮取三升冷浴陰歷日三

治男子陰腫大如升斗核痛人所不能療者方

雄黃

壹兩研

礬石

貳兩研

甘草

壹尺切

右二味以水五升煮減半洗腫痛處

集驗方無藥味

治陰腫皮癢方

燧桃人令香為末酒服方寸匕日三

有人陰冷冷氣漸入陰囊腫滿恐死日夜疼悶外臺作日夜即痛悶

不得眠方

取生椒擇令淨以布帛裹著丸囊入之厚半寸須臾熱氣通日再易取消瘥止

方 搗莧菜根傳之

又方 釜月下土雞子白和傳

方 醋和熟灰熨之

又方 車前子為末飲服之

又方 醋和麩熨之

又方 煮大薊根汁服一升日二三不過二劑愈

治陰腫痛方

灸大敦二壯

治卒陰痛如刺汗出如雨方

小蒜

韭根

楊柳根各等分

右三味合燒以酒灌之及熟以氣蒸之即愈

治陰痛方

甘草

石蜜

右二味等分為末和乳塗之

治妬精瘡方

用銀釵綿裹以臘月猪脂裏膏火上暖以釵收瘡上
令熟取乾槐枝燒滿塗之

又方麝香

黃礬

青礬各等分

右二味為末小便後傅上不過二度

治陰蝕瘡方

蒲黃

水銀

右二味研成粉小便後即傅之瘡止

又方以肥猪肉五斤水三斗煮令極爛去肉以湯令極熱

便以漬瘡中冷即愈

又方 狼牙兩把切以水五升煮取一升溫洗之日五度
治陰蝕生瘡或癢方

雄黃

雄石 各一分

麝香 半分

右三味治下篩為粉粉瘡上即瘥

治陰惡瘡方

蜜煎甘草末塗之

葛氏云此見有月人患此頭腫攻下瘡欲愈者自以猪肉湯漬洗之并用

黃蘗黃連末塗之

治男女陰去瘡方

石硫黃為末以傳瘡上

治男女陰癢生瘡方

嚼胡麻傳之佳

治陰下生瘡洗湯方

地榆

黃蘗 各別冊

右一味咬咀以水一斗五升煮取六升去滓滴入酒
洗瘡日再或只煮黃蘗汁洗亦佳

重刊孫真人備急千金要方卷之二十四

還書日期

本校畢業生，現讀生及研究生均須照上述日期還書，若無其他讀者借閱，即可續借，本校教員與其他人員則須在每年第三學期末歸還所借書籍。

書 號 碼

善
510.87
12-1

V.26

著 譯 者 孫思邈

書 名 (唐)孫真人備急千金要方

號 數	借 期	還 期	號 數	借 期	還 期
	出借得不				

出借得不

借閱者注意

- (一) 加意愛護勿失原有形狀
- (二) 損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四) 逾期不歸還者應照章納金

圖書號數

善
510.87
12-1

V.26

圖書冊數

登記號數

63297

