


傷寒論成註

3153



區圖

卷四



第

四

邊園藏書



注解傷寒論卷第四

漢張仲景述

王叔和撰次

成無已注解

成無已

已注解

辨太陽病脈證并治法下第七

問曰病有結胸藏結其狀何如答曰按之痛寸脈

浮關脈沉名曰結胃也何謂藏結答曰如結胃狀飲

食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊名曰藏結

舌上白胎滑者難治結胸者邪結在胃藏結者邪結

裏所致下後邪氣入裏與陽相結者為結胃以陽受


氣於胃中故雨與陰相結者為藏結以陰受之則入

五藏故爾氣宜通而塞故痛邪結陽分則陰氣不得

上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞭

痛寸脈浮關脈沉知邪結在陽也寸脈浮關脈小細

沉緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲



食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時時自下利陰得
陽則解藏結得熱證多則易治舌上白胎滑者邪氣
結胃中亦寒藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌
故云難治

上胎滑者不可攻也藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌
法當下無陽證為表無

熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以丹病發
田有熱胃中有寒邪氣以表裏皆寒故不可攻

於陽而反下之人因在結胃病發於陰而反下之

因作痞所以成結胃者以本之太早故也發熱惡寒者發於陽

也而反下之則邪入裏結於胃中為結胃無

於心下結胃者項亦強如柔痙狀下之則和宜大陷

胃丸方結胃病項強者為邪結胃中胃膈結滿心下
緊實但能仰而不能俛是項強亦如柔痙之

狀也與大陷胸丸下結泄滿

大陷胃丸方

大黃

半斤味苦寒

葶藶

半斤味苦寒

芒硝

半斤味鹹寒

杏仁

半升去皮尖熬黑味甘温

大黃

芒硝

所以

下

熱葶藶杏仁之苦甘所

以泄

滿甘遂

其真

遂

白蜜取其潤利皆以下泄

滿實物也

右肆味搗篩取味內杏仁芒硝合研如脂和散取

如彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢七白蜜貳合泔貳

升煮取壹升温頓服之壹宿乃下如不下更服取

下為効禁如藥法

結腎證其脉浮大者不可下下之則死

結腎為邪結腎中屬上焦

之分得寸脈浮關脈沉者為在裏則可下若脈浮大

心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣

復結則難可制結胃證悉具煩躁者亦死結胃證悉具邪結已

故云下之則死結胃證悉具煩躁者亦死結胃證悉具邪結已

深也煩躁者正氣散亂太醫病脈浮而動數浮則為

也邪氣勝正病者必死必死太醫病脈浮而動數浮則為

風數則為熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗

出而反惡寒者未解也醫反下之動數變遲膈內

拒痛胃中空虛客氣動天雨流芳膈短氣躁煩心中懊懣陽氣

內陷心下因鞅則為結胃大陷胃湯主之若不結胃

但頭汗出餘處無汗刺頸而還小便不利身必發黃

也動數皆陽脈也當責邪在表睡而汗出者謂之盜

盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛

其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脈邪在裏則

見陰脈邪氣內陷動數之脈所以變遲而浮脈獨不
變者以邪結胃中上焦陽結脈不得而沈也客氣者
外邪乘胃中空虛入裏結於胃膈中拒痛者客氣
動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁
煩心中懊憹皆邪熱為實陽氣內陷氣不得通於隔
壅於心下為鞭滿而痛成結胃也與大陷胃湯以下
結熱若胃中空虛陽氣內陷不能發黃若但頭汗出身
中者遍身汗出為熱越不能發黃若但頭汗出身
無汗劑頸而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胃湯方

大黃

陸兩去
皮苦寒

芒硝

壹升
鹹寒

甘遂

壹錢七
苦寒

大黃謂之將軍以苦蕩滌
能更鞭夫間有甘遂以通水也甘遂若夫間之遂
其氣可以直達透
結胃陷三物為允

右叁味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒硝

煮壹兩沸內甘遂末温服壹升得快利止後服

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞭

者大陷胸湯主之病在表時下之熱八因作結胸此

傳裏之實熱也沈為在裏緊為裏實以心下痛傷寒

十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結

胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大

陷胸湯主之傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復

柴胡湯下之但結胸無大熱者非熱結也是水飲結

於胸脇謂之水結胸無汗身出者是水飲外散則愈

若但頭微汗出餘處無汗是水飲不得外太陽病重
泄停畜而不行也與大陷胸湯以逐其水
發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡時

小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷

胃湯主之重發汗而復下之則內外重亡津液而邪

日晡潮熱者屬胃此言晡小有潮熱非但在胃從心

下至少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪

氣俱甚也與小結胃病正在心下按之則痛脈

浮滑者小陷胃湯主之也正在心下按之則痛是熱

小陷胃湯方

黃連

壹兩

黃芩

半升

洗

枳實

大者壹

苦以泄之辛以散之黃連括蕞實

之苦寒以泄熱半夏之辛以散結
右叁味以水陸升先煮括蕞取叁升去滓內諸藥

煮取貳升去滓分溫叁服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脈微弱者

此本有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四

日復下之此作協熱利也太陽病二三日邪在表也

者以心下結滿則氣壅而愈甚故不能卧而但欲

起也心下結滿有水流分有氣分今脈微弱知

本有寒分醫見心下結而反下之則太陽表邪乘虛

入裏利止則邪氣留結為結胃利不止至次日復如

前下利不止者邪熱也太陽病下之其脈促不結胃

者此為欲解也脈浮者必結胃也脈緊者必咽痛脈

弦者必兩脇拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必

欲嘔脈沉滑者協熱利脈浮滑者必下血此太陽病下之後邪

氣傳變其脈促者為陽盛下後脈浮為上焦陽邪結而為結
不作結胃為欲解下後脈浮為上焦陽邪結而為結
胃也經曰結胃者寸脈浮關脈沈下後脈緊則太陽
之邪傳於少陰經曰脈緊者必咽痛
少陰之絡令人嗌痛可內食所以脈緊者必咽痛
脈弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽
受病也其脈循膈絡於耳所以脈弦者必兩脇拘急
下後邪氣傳裏頭痛當止脈細數為邪未傳裏而
傷氣也細為氣少數為在表故頭痛未止脈沈緊則
太陽之邪傳於陽明為裏實也沈為在裏緊為裏實
陽明裏實故必欲嘔脈滑則大陽之邪傳於腸胃以
滑為陰氣有餘邪氣入裏于於下焦也沈為血勝
氣虛是為協熱利浮為氣勝血虛是知必下血經病
曰不宜下而便攻之諸變不可勝數此之謂也

在陽應以汗解之反以冷水澀之若灌之其熱被劫

不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服

文蛤散若不差者與五苓散寒實結胃無熱證者與

三物小陷胷湯白散亦可服病在陽為邪在表也法

當汗出而解反以冷水

濕之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏彌更益

煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者

裏有熱也反不渴者寒在裏也與文蛤散以散表中

水寒之氣若不差是表也執相搏欲傳於裏與五苓散

發汗以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻

於裏結於胷膈心下鞅痛本以水寒伏熱為實故謂

之寒實結於胷膈心下證者外無熱而熱悉收歛於裏

也與小陷胷湯以證者外無熱而熱悉收歛於裏

文蛤散方

文蛤 五兩

鹹寒

鹹走腎則可以勝水氣

右壹味為散以沸湯和壹

服湯用五合

白散方

桔梗

叁分味辛苦微温

巴豆

壹分去皮心熬黑研如脂辛温

貝母

三分味辛苦平

辛散而苦泄桔梗貝母用以下氣巴豆之辛用散實

右上叁味為散內巴豆更於臼中杵之以白飲和

服強人半錢天羸者減之病在膈上必吐在膈下

必利不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身

熱皮粟不解天引衣自覆者若水以澀之洗之益

令熱劫不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹

中痛與芍藥叁兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胃心下

痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發

汗則讖語脉弦五六日讖語不止當刺期門太陽之

下項頭項強痛者太陽表病也少陽之脉循脊絡脇

如結脊心下痞鞭者少陽裏病也太陽少陽相併為

病不純在表故頭項痛而或眩胃亦未全入

裏故時如結脊心下痞鞭此邪在半表半裏之間也

刺大椎第一間肺俞以瀉太陽之邪刺肝俞以瀉少

陽之邪邪在表則可發汗邪在半表裏則不可發

汗發汗則亡津液損動胃氣少陽之邪因干於胃土

為木刑必發讖語脉弦五六日傳經盡邪熱去而

讖語當止若復不止瀉脉曠之氣婦人中風發熱惡寒

熱甚也刺期門以瀉脉曠之氣

經水適來得之七八日熱除而脉遲身涼脊脇下滿

如結胸狀讖語者此為熱入血室也當刺期門隨其

實而瀉之中風發熱惡寒表病也若經水不來表邪

傳裏則人府而不入血室也因經水適來

血室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛

而入於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷

而

而

也肖脇下滿如結肖狀讖語者熱入血室而裏實期
門者肝之募肝主血刺期門者瀉血室之熱審看何
經氣實更隨婦人東風七日續得寒熱發作有時
其實而瀉之

經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀

發作有時小柴胡湯主之中風七八日邪氣傳裏之本無寒熱而續得寒熱

經水適斷者此為表邪乘血室虛入於血室與血相
搏而血結不行經水斷也血氣與邪分爭致寒
熱如瘧而發作有時與小婦人傷寒發熱經水適來
柴胡湯以解傳經之邪

晝日明了暮則讖語如見鬼狀者此為熱入血室無

犯胃氣及上工焦必自愈傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室空虛邪

熱乘虛入於血室若晝日讖語為邪客於府與陽爭
也此晝日明了暮則讖語如見鬼狀是邪不入府入
於血室與陰爭也陽盛讖語則宜下此熱入血室不
可與下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴

胡湯散邪發汗此雖熱八血室而不留結不可與發
 汗藥犯其上焦熱八血室胃脇滿如結胃狀者可刺
 期門此雖熱八血室而無滿結不可刺期門犯其中
 焦必自愈者以經行則熱隨血去血下也已則邪熱
 悉除而愈矣所為發汗為得也上焦者發汗則動衛氣
 衛氣出上焦故也刺期門犯中焦者刺期門則動
 榮氣榮氣出中焦故也脈經曰無犯胃傷寒六七日
 氣及上二焦必自愈豈謂藥不謂針耶傷寒六七日
 發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者

柴胡桂枝湯主之傷寒六七日邪當傳裏之時支散

不可攻裏與柴胡桂枝湯以和解之傷寒五六日

已發汗而復下之胃脇滿微結小便不利渴而不嘔

但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝

乾薑湯主之傷寒五六日已經汗下之後則邪當解



頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣猶在半表半裏之間為未解也胃脇滿微結寒熱心煩者邪在半表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥也若熱消津液令小便不利而渴者其人必嘔今渴而不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝乾薑湯以解表邪

柴胡桂枝乾薑湯方

芳流雨天

柴胡

半斤

桂枝

三兩去皮

乾薑

二兩味辛熱

括蕁根

四兩味苦寒

黃芩

三兩味苦寒

牡蠣

二兩熬味鹹寒

甘草

二兩炙味甘平

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳裏之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在表之邪鹹以熯之牡蠣之鹹以消胃脇之滿辛以潤之乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而為

渴苦以堅之括萋
之苦以生津液

右柴味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎取叁
升溫服壹升日叁服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲

食大便鞭脈細者此為陽微陽微結必有表復有裏也脈

沉亦在裏也汗出為陽微陽微天雨流芳令純陰結不得復有外

證悉入在裏此為半在裏半在外也脈雖沈緊不得

為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非

少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解傷寒五六

日邪當傳裏之時頭汗出微惡寒者表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者邪結於裏也

大便鞭為陽結此邪熱雖傳於裏然以外帶表邪則
熱結猶淺故曰陽微結脈沈雖為在裏若純陰結則
更無頭汗惡寒之表證諸脈皆至頸背中而還不
上循頭今頭汗出非少陰也與小柴胡湯以除半
表半裏之邪服湯已非證罷而不了了者為裏
熱未除與湯取其微利則愈故云得屎而解 傷寒

五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴

胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸

蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此為

結胃也大陷胃湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡

不中與之宜半夏瀉心湯

表半裏之證是為柴胡證具以他藥下之柴胡證不

罷者不為逆却與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者

邪在半表半裏則陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏

亦有陰陽之異若下後陽邪傳裏者則結於胃中為

結胃以胃中為陽受氣之分與大陷胸湯以下其結
陰邪傳裏者則留於心下為痞以心下為陰受氣之
分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發於陽而反下
之熱入因作結胃病發於陰而反下之因作痞此之
也謂

半夏瀉心湯方

半夏

半升 味辛平

黃芩

味苦 寒

乾薑

味辛 熱

甘草

三兩 味甘平

人參

已上各三兩 味甘溫

黃連

味苦 寒

大棗

十二枚 擘味甘溫

辛入肺而散結氣苦入心而泄

熱黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩

之人參甘草大

棗之甘以緩之

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升溫

服壹升日叁服

太陽少陽併病而反下之成結胃心下鞭下利不止

水漿不下其人心煩

太陽少陽併病為邪氣在半表

虛而入太陽表邪入裏結於胃中為結胃心下鞭少

陽裏邪乘虛下于腸胃遂利不止若邪結陰分則飲

食如故而為黃芩此為陽邪

脈浮而緊而復下之緊

內結故水漿不下而心煩

反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

浮而緊浮為傷

發其汗而反下之若汗入裏為陽邪入裏則作結太

胃浮不入裏而為陰邪入裏則作痞

陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出

發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗

出不惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

邪也邪在裏者可下亦須待表解者乃可攻之其人

熱熱汗出發作有時不惡寒者表已解也頭痛心下

痞鞭滿引脅下痛乾嘔短氣者邪熱內畜而有伏飲是裏未和也與十棗湯下熱逐飲

十棗湯方

芫花

熬味辛温

甘遂

味寒

大戟

味苦寒

大棗

拾枚擘

辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之甘遂大戟之苦以泄水水者腎所主也甘者脾之味也大棗

之甘者益土而勝木

右三味等分各別搗為散以水壹升半先煮大

棗肥者拾枚取捌分去滓內藥末強人服壹錢七

羸人服半錢温服之平旦服若下少病不除者明

日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏

俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面

色青黃膚暍者難治今色微黃手足溫者易愈太陽

發汗遂發熱惡寒者外虛陽氣邪復不除也因復下

之及虛其裏虛邪內陷傳於心下為痞發汗表

虛為竭陽下之裏虛為竭陰表證罷為無陽裏有痞

為陰獨又加燒針虛不勝火火氣內攻致胃煩也傷

寒之病以陽為主其人面色青膚肉暍動者陽氣大

虛故云難治若面色微黃手足溫者即陽氣得復故

云易愈

湯主之心下鞭按之痛關脈沉者實熱也心下痞按

之濡其脈關上浮者虛熱也大黃黃連湯以

大黃黃連湯方

大黃 貳兩味 苦寒

黃連 壹兩味 苦寒

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱以麻沸湯漬

服者取其氣薄而泄虛熱

右貳味以麻沸湯貳升漬之須臾絞去滓分溫再

服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之心下痞者虛熱

內伏也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽本以下之故心下

痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者

五苓散主之本因下後成痞當與瀉心湯除之若服

者為水飲內畜津液不行非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忍之一日乃愈者不飲者外水不入

所停之水得行而痞亦愈矣 傷寒汗出解之後胃中不和心下痞

鞭乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉

心湯主之

胃為津液之主陽氣之根大汗出後外七

要略曰中焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭者胃虛而不殺穀

勝水也與瀉心湯以傷寒中風醫反下之其人下利

日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心

煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚

此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也甘草瀉

心湯主之

傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表醫反下之虛其腸胃而氣內陷也下利日數

十行穀不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞭乾嘔心煩不得安者胃中空虛客氣上逆也與瀉

心湯以攻表加甘草以補虛前以汗後胃虛是外傷
陽氣故加生薑此以下後胃虛是內損陰氣故加甘

草傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已復

以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者

理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不

止者當利其小便傷寒服湯藥下後利不止而心下痞鞭者氣虛而客氣上逆也與瀉

心湯攻之則痞已醫以他藥下之又虛其裏致利

不止也理中丸脾胃虛寒不利者服之愈此以下焦

虛故與之其利甚聖濟經曰滑則氣脫欲其收也

如開腸洞泄便溺遺失泄劑所以收之此利由下焦

不約與赤石脂禹餘糧湯以瀉洞泄下焦主分清濁

以利者水穀不分也

其氣赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂 壹斤碎 味甘温

禹餘糧 壹斤碎 味甘平

本草云澁可去脫石脂之澁以收斂之重可去怯餘糧之重以鎮固

已上貳味以水陸煎者煮取貳升去滓叁服

傷寒吐下後發汗虛煩脉甚微八九日心下痞鞭脇

下痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者以而成痿吐下

後發汗則表裏之氣俱虛虛煩脉甚微為正氣內虛

邪氣獨在至七日正氣當復邪氣當罷而心下痞

脇下痛氣上衝咽喉眩冒者正氣內虛而不復邪氣

留結而不去經脈動惕者經絡之氣虛極久則熱氣

還經必傷寒發汗若下解後心下痞鞭噫氣不

成痿弱

除者旋復代赭石湯主之胃氣弱而未和虛氣上逆

故心下痞鞭噫氣不除與旋

復代赭石湯降虛氣而和胃

旋復代赭石湯方

旋復花

叁兩味鹹温

人參

貳兩味甘温

生薑

五兩切味辛温

代赭石

壹兩味苦寒

大棗

拾貳枚味甘温

甘草

叁兩炙味甘平

半夏

半升洗味辛温

鞭則氣浮重劑以鎮之

散也生薑半夏之辛以散之

則氣浮重劑以鎮之

散也生薑半夏之辛以散之

則氣浮重劑以鎮之

散也生薑半夏之辛以散之

則氣浮重劑以鎮之

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煎取叁升温

服壹升日三服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與

麻黃杏子甘草石膏湯

前第三卷甘六證云發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘

無大熱者為與此證治法同汗下雖殊既不當損正氣則一和氣所傳既同遂用一法治之經所謂若發汗若下若吐

後者是矣
太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主

之外證未除而數下之為重虛其裏邪熱乘虛而入裏虛協熱

下痞者可與得湯若下利表不解而心下痞者

可先解表而後攻痞以表裏不解故與桂枝人參湯

桂枝人參湯方

桂枝 四兩去皮
甘草 四兩炙
白朮 叁兩味

人參 叁兩味
乾薑 叁兩味

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯也

右伍味以水玖升先煮四味取伍升內桂更煮取

參升溫服壹升日再夜壹服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可

攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞

宜大黃黃連瀉心湯大下後復發汗則表裏之邪當

之邪俱不解也表裏不解而下之為心下痞先與桂

枝湯解表表解心下痞者從外之內而盛心下痞者

先治其外而後調其內傷寒發熱汗出不解心下痞

鞭嘔吐而下利者大柴胡湯主之傷寒發熱寒已成

和而裏病也吐利心腹濡更為裏虛嘔吐而下利病心下痞鞭者是裏實也與大柴胡湯以下裏熱

如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胃中痞鞭氣上

衝咽喉不得息者此為胃有寒也當吐之宜瓜蒂散
病如柱枝證為發熱汗出惡風言邪在表也頭痛項
強為桂枝湯證其表頭不強則邪不在表而
傳裏也浮為在表沉為在裏今寸脈微浮則邪不在
表亦不在裏而在胃中也胃中與表相應故知邪在
胃中者猶如桂枝證而寸脈微浮也以胃中痞鞭氣
上衝咽喉不得息知寒邪客於胃中而不在表也干
金曰氣浮上部壅塞胃中滿者
吐之則愈與瓜蒂散以吐胃中之邪

瓜蒂散方

瓜蒂

壹分 熬黃 味苦寒

赤小豆

壹分 味酸温

其高者越之越以瓜蒂香豉之苦在上者湧
之湧以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄為陰

右貳味各別搗篩為散已合治之取壹錢匕以香

豉壹合用熱湯柒合煮作稀糜去滓取汁和散温

頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家

不可與瓜蒂散

病脇下素有痞連在臍傍引少腹人陰筋者此名

藏結死素有宿昔之積結於脇下為痞今因傷寒邪

致連在臍傍傷寒病若吐若下後七八日不解

熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩

欲飲水數升者白虎加人參湯主之若吐若下後七

不解而熱結在裏表熱者身熱也裏熱者內熱也本

因吐下後邪氣乘虛陷為結熱若無表熱而純為

裏熱則邪熱結而為實此以表熱未罷時時惡風若

邪氣純在表則惡風無時若邪氣純在裏則更不惡

風以時時惡風知表裏俱有熱也邪熱結而為實者

則無大渴邪熱散漫則渴今雖熱結在裏表裏俱熱

未為結實邪氣散漫熏蒸焦膈故大渴舌上乾燥傷
而煩欲飲水數升與白虎加人參湯散熱生津

寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯

主之無大熱者為身無大熱也口燥渴心煩者當作

陽也背為陽背惡寒口中和者少陰病也當與附子

湯今日口燥而渴雖惡寒此裏熱也則惡寒亦不至

甚故云微惡寒與白虎湯和傷寒脈浮發熱無汗其表不解不渴

表散熱加人參止渴生津白虎湯欲飲水無表證者白虎

加人參湯主之傷寒脈浮發熱無汗其表不解不渴

所宜大渴欲水無表證者亦可與白虎加太陽少陽

併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎
勿下之心下痞鞭而眩者少陽也頸項強者太陽也

傷寒論 卷四 六

俠脊故爾肝俞以瀉少陽之邪以膽為肝之府故爾
 大陽為在表少陽為在裏即是半表半裏證前第八
 證云不可發汗發汗則譫語是發汗攻太陽之邪少
 陽之邪益甚干胃必發譫語此云慎勿下之攻少陽
 之邪太陽少陽併病而反下之成結胃經
 曰太陽少陽併病而反下之成結胃經
 合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑
 湯主之
 太陽陽明少陽合病自下利為在表當與葛根湯
 發汗陽明少陽合病自下利為在裏可與承
 氣湯下之此太陽少陽合病自下利為在半表半裏
 非汗下所宜故與黃芩湯以和解半表半裏之邪嘔
 者胃氣逆也故加半夏
 夏生薑以散逆氣

黃芩湯方

黃芩

叁兩味 苦寒

甘草

兩炙 味甘平

芍藥

兩味 酸平

大棗

拾貳枚 味甘溫



虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦
酸以堅歛腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草
大棗之甘以補固腸胃之弱

右肆味以水壹斗煮取叁升去滓溫服壹升日再

夜壹服若嘔者加半夏半升生薑叁兩

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連

湯主之濕家下後舌上如胎者以丹田有熱胃上有

寒是邪氣入裏而為下熱也胃中有邪氣使陰陽不交

氣傳裏而為下寒上熱也陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而

獨治於上為胃中熱嘔吐與黃連湯升降陰陽之氣

黃連湯方

黃連味苦

甘草炙味甘平

乾薑味辛

桂枝

去皮味辛熱各叁兩

人參

貳兩味甘溫

半夏

半升洗味甘溫

大棗

拾貳枚擘味甘溫

上熱者泄之以黃連以辛桂薑半夏之辛以苦陰脾欲緩急食甘以緩

之人參甘草大棗之甘以益胃

右柒味以水一斗煮取陸升去滓溫服壹升日叁

服夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔

不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之

傷寒與中風家至七八日

再經之時則邪氣多在裏身必不苦疼痛今日數多復身體疼煩不能自轉側者風濕相搏也煩者風也身疼不能自轉側者濕也經日風則浮虛脉經日脉來濇者為病寒濕也不嘔不渴裏無邪也脉得浮虛

而瀆身有疼煩知風濕但在經也 若其人大便鞭小

與桂枝附子湯以散表中風濕 桂發汗走津液此

便自利者去桂枝加白朮湯主之 小便利大便鞭為

津液不足 去桂加朮

桂枝附子湯方

桂枝 四兩 去皮 附子 八錢 炮 去皮 破 生薑 參兩 切

甘草 貳兩 炙 大棗 拾貳枚 擘

風在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在經者逐以 附子之辛熱薑棗辛甘行榮衛通津液以和表也

右伍味以水陸升 煮取貳升 去滓 分溫叁服

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗 出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草

附子湯主之

風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪亂

痛劇也風勝則衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣
為風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫為
濕外搏也與甘草附子湯散濕固衛氣

甘草附子湯方

甘草

貳兩味甘平

附子

貳枚炮去皮味辛熱

白朮

貳兩味甘溫

桂枝

肆兩去皮味辛熱

桂枝甘草之

散風邪而和衛

附子白朮之

解濕氣而溫經

右肆味以水陸升煎取叁升去滓溫服壹升日叁

服初服得微汗則解能食汗止復煩者服五合恐

壹升多者宜服六七合為始

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之浮為在表滑為在裏表有熱外有熱也裏有寒有邪氣傳裏也以邪未入府故止言寒如瓜蒂散證云胃上有寒者是矣

白虎湯方

知母

陸兩味苦寒

石膏天雨流芳壹斤碎味甘寒

甘草

貳兩味甘平

粳米

陸合味甘平

內經曰熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以益氣散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益氣

右肆味以水壹斗煮米熟湯成去滓温服壹升日

參服

傷寒脉結代心動悸多甘草湯主之

結代之脉動而中止能自還者

名曰結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而復脈

炙甘草湯方

甘草 肆兩炙

生薑 叁兩切

桂枝 叁兩去皮

人參 貳兩

生地黄 壹斤

阿膠 貳兩

麥門冬 半升去心

麻子 半升

大棗 三十枚擘

補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣

桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津耗散為枯

五藏痿弱榮衛澀流濕刺所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之潤益血復脈通心也

右玆味以清酒柒升水捌升先煮捌味取叁升去滓內膠烱消盡温服壹升日叁服一名復脈湯

脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而

中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動

而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者

必難治結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脉

留結名曰結陰若動而止不能自還更來小數止是邪氣

陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治之脉

經曰脉結者生代者死此之謂也

釋音

俛音免俯也 矐如倫切 置求位切 痿於危切 爽音軟 椎

音掣昌列切 涸乎各切 焯音羊

注解傷寒論卷第五

仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨陽明病脉證并治法第八

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂

也答曰太陽陽明者脾約是也陽明胃也邪自太陽

太陽陽明經曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小

便數大便因鞭者與小承氣湯邪自陽明經傳入府者

也正陽陽明者胃家實是也謂之正陽陽明經曰陽

明病脉遲雖汗出不惡寒其手足必重短氣腹滿而喘

有潮熱者外欲解可攻裏也即少陽陽明者發汗利小

大便已胃中燥煩實大便難是也邪自少陽經傳之入

經曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則讖語此屬胃即少陽陽明病也

明之為病胃家實也邪傳入胃熱毒留結則胃家為實華佗曰熱毒入胃要須下去

之不可留於胃中是知問何緣得陽明病答曰太

邪在陽明為胃家實也

陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉

屬陽明不更衣實大便難者此名陽明也本太陽病不解

因汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬

陽明古人登廁必更衣天不更衣者通為不大便不更

衣則胃中物不得泄故為內實胃無津

液加之畜熱大便則難為陽明裏實也問曰陽明病

外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也陽明病為

邪入府也邪在表則身熱汗出而惡寒邪既入府

則表證已罷故不惡寒但身熱汗出而惡熱也問

曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得

之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也邪客在陽明當發熱

而不惡寒今得之日猶發熱而惡寒者即邪未

全入府尚帶表邪表邪入則更無惡寒必自汗

出而惡熱也問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬

物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病

也胃為水穀之海主義困旁四旁有病皆能傳入於

傳陽明陽明病傳之胃則更不傳少本太陽初得

病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明也傷寒傳經

太陽二日陽明此太陽傷寒發熱無汗嘔不能食而

傳經故曰轉屬陽明

反汗出濇濇然者是轉屬陽明也傷寒發熱無汗嘔

病也若反汗出濇濇然者太陽之邪傷寒三日陽明

轉屬陽明出經日陽明病法多汗

傷寒三日陽明

傷寒三日陽明

傷寒三日陽明

傷寒三日陽明

傷寒三日陽明

脉大傷寒三日邪傳陽明之時經日尺寸俱長者陽

經是以傷寒脉浮而緩手足自温者是為繫在太陰

太陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八

日大便鞭者為陽明病也浮為陽邪緩為脾脉傷寒

陽則手足熱邪在太陰也三陰則手足寒今手足自温是知

繫在太陰也太陰土也雨為邪身黃小便自利者熱不天內蓄不能發黃至七八傷寒

日大便鞭者即陰之邪入府轉屬陽明也傷寒則無汗陽明

轉繫陽明者其人澀然微汗出也法多汗此以傷寒

邪轉繫陽明故陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱

惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便難也脉浮在表

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘者熱傳於裏也發熱惡寒者表仍未解也若下之裏邪雖去表邪復入於

裏又亡津液故使陽明病若能食名中風不能食名

腹滿而小便難陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之海

中寒陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之海風為陽邪陽邪殺穀中風者能食寒為陰邪

陰邪不殺穀故陽明病若中寒不能食小便不利手

足澱然汗出此固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃中冷水穀不別天雨流芳故也陽明中寒不能食者寒

津液不化也陽明病法多汗則周身汗出此手足澱然汗出而身無汗者陽明中寒也固瘕者寒氣結積

也胃中寒甚欲留結而為固瘕則津液不得通行而大便必鞭者若汗出小便不利者為實也此以小便

不利水穀不別雖大陽明病欲食小便反不利大便

便初鞭後必溏也自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂澱然汗

出而解者此水不勝穀氣與汗其併脈緊則愈陽病客熱

初傳入胃胃熱則消穀而欲食陽明病熱為實者則
小便當數大便當鞭今小便反不利大便自調者熱
氣散漫不為實也欲食則胃中穀多內經曰食入於
陰長氣於陽穀多則陽氣勝熱消津液則水少經曰
水入於經其血乃成水少則陰血弱金匱要畧曰陰
氣不通即骨疼其人骨節疼者陰氣不足也熱甚於
表者翕翕發熱熱甚於裏者蒸蒸發熱此熱氣散漫
不專著於表裏故翕翕如有一熱狀奄忽也忽然發狂
者陰不勝陽也裏故翕翕如有一熱狀奄忽也忽然發狂
并乃狂陽明蘊熱為實者須下之愈熱氣散漫不為
實者必待汗出而愈故雨云濕然汗出而解也水穀之
等者陰陽氣平也水不勝穀氣是陰不勝陽也汗出
則陽氣衰脈緊則愈故云與汗其并脈緊則愈陽明病欲解
無偏勝則愈故云與汗其并脈緊則愈陽明病欲解

時從申至戌上

胃為陽明土王於申酉
戌向申時是為欲解

陽明病不能

食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以其人本

虛故攻其熱必噦

不能食胃中本寒攻其熱復虛其
胃虛寒相搏故令噦也經曰關脈

弱胃氣虛有熱不可大攻陽明病脈遲食難用飽飽
之熱去則寒起此之謂也

則微煩頭眩必小便難此穀疸雖下之腹滿如

故所以然者脈遲故也陽明病脈遲則邪方入裏熱未為實也食入於陰長氣於

陽胃中有熱食難用飽飽則微煩而頭眩者穀氣與
熱氣相搏也兩相合消搏津液必小便難利者不

能發黃言熱得泄也小流便不利則熱不得泄身必發

黃疸黃也以其發於穀氣之熱故名穀疸熱實者下
之則愈脈遲為熱氣未實雖下之腹陽明病法多汗

滿亦不減也經曰脈遲尚不可攻

反無汗其身如蟲行皮中狀者以此久虛故也胃為津液

之本氣虛津液少病及無汗胃候身之陽明病反
肌肉其身如蟲行皮中者知胃氣久虛也

無汗而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛
若不欬不嘔手足不厥者頭不痛

陽傷寒而寒氣內攻也至二三日

邪發於外也必苦頭痛苦不咳不嘔手足不厥者

外發其頭亦不痛也陽明病但頭眩不惡寒故能食

而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛

惡寒者陽明中風而風氣內攻也經曰陽明病若能

食名中風風邪攻胃胃氣上逆則緩

欬甚則咽傷故咽痛若胃氣

不逆則不欬其咽亦不痛也

利心中懊憹者身必發黃

中懊憹者熱氣鬱蒸

欲發於外而為黃也

陽明病被火額上微汗出小便

不利者必發黃

而甚

泄越不能發黃今額上微汗出而小便

不利則熱不得越鬱蒸於胃必發黃也

陽明病脉浮

而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出

浮為在經緊者

裏實脈浮而緊者表熱裏實也必潮熱發作有時若
但脈浮而不緊者止是表熱也必盜汗出盜汗者睡
而汗出也陽明病裏熱陽明病口燥但欲漱水不欲
者自汗表熱者盜汗陽明病起於鼻絡於口陽明裏熱則
嚥者此必衄渴欲飲水此口燥但欲漱水不欲嚥者
是熱在經而裏無熱也陽明氣血俱陽明病本自汗
多經中熱甚妄行必作衄也
出醫更重發汗病已差天雨流芳尚微煩不了了者此大便必

鞅故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞅當問其小
便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便

不久出今為小便數以津液當還入胃中故知不

久必大便也先亡津液使大便鞅小便數傷寒嘔多

雖有陽明證不可攻之全入府故不可下陽明病心

傷寒論 卷五

下鞭滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

陽明病腹滿者為邪氣入府不可下之心下鞭滿則邪

氣尚淺未全入府不可下之得利止者為邪氣去

正氣安正氣安則愈若因陽明病面合赤色不可

利不止者為正氣虛而死

攻之攻之必發熱色黃小便不利也合通也陽明病

在經也不可下下之虛其胃氣耗其津液經陽明

中之熱乘虛人胃必發熱色黃小便不利也

病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯吐後心煩謂

心煩謂之虛煩陽明病不吐不下心煩即陽明病

是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱

脈遲雖汗出不惡寒者其必重短氣腹滿而喘有

潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此

大便已鞅也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者

外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通

者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下陽明病脈遲若汗出

多微發熱惡寒者表未解也若脈遲雖汗出而不惡

寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入

府也四肢諸陽之本津液不足為熱之其手足

濇也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱

不潮是熱未成實故不可與大承氣湯雖有腹大

滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣

大承氣湯方

大黃 四兩 苦 寒 酒洗
厚朴 半斤 苦 溫
枳實 五枚 苦 寒 炙

芒硝 三合 鹹 寒

內經曰燥淫所勝以苦下之大黃枳實之苦以潤燥除熱又曰燥淫於內治以苦溫厚朴之苦下結

身寒論 卷五 六

燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之鹹以攻蘊熱

右四味以水一斗先煮二物取伍升去滓內大黃

煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再

服得下餘勿服

小承氣湯方

大黃四兩

厚朴二兩炙


枳實三枚大者炙

大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故於大承氣湯去芒硝又以結不

至堅故不減厚朴枳實也

右三味以水肆升煮取壹升二合去滓分溫二服

初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之



陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不

與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小

承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若

不轉失氣者初頭鞭後必澹不可攻之攻之必

脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必

大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎

不可攻也潮熱者實得大便微鞭者便可攻之若不

不大便六七日恐有燥屎先與小承氣湯漬之如

有燥屎小承氣湯藥勢緩不能宣泄必轉氣下失若

不轉失氣是胃中無燥屎但腸間少鞭爾止初頭鞭

後必澹攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食也胃中

乾燥則欲飲水水人胃中虛寒相搏氣逆則噦其後

却發熱者則熱氣乘虛還復聚於胃中胃燥得熱必

大便復鞭而少與小承氣湯微利與和之
所以重云不轉失氣不可攻內慎之至也
夫實則讖

語虛則鄭聲鄭聲重語也
內經曰邪氣盛則實精氣

神識昏也鄭聲由精氣奪而聲不全也
讖語者言語

不次也鄭聲者鄭音不正也
論語云惡鄭聲之亂樂

又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不正也

今新差氣虛也聲轉者是所謂重語者也
若聲重亦

聲轉直視讖語喘滿者死不利者亦死
直視讖語邪

之氣上脫下利為氣發汗多者重發汗者亡
其陽讖語

下脫是皆主死

脈短者死脈和者不死
亡陽胃燥讖語者脈短津

為正氣未衰傷寒甚吐若下後不解不大便五六日

而猶可生也

上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀

若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視

脈弦者生濇者死微者但發熱讖語者大承氣湯王

之若一服利止後服若吐若下皆傷胃氣不大便五六日者亡津液胃

氣虛邪熱內結也陽明王申酉戌日晡所發潮熱

熱者陽明熱甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼

狀者陽明內實也以為熱氣有餘若劇者是熱氣甚

大也熱夫甚昏胃正氣使不識人至於循衣摸

牀惕而不安微喘直視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝

而陽絕者死熱劇者為陽勝脈弦為陰有餘澁為陰

不足陽熱雖劇脈弦知陰未絕而猶可生脈澁則陰

絕故不可治熱微而未至於劇者但發熱讖語

可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下藥中病即

止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則止後服

陽明病其人多汗以濇液外出胃中燥大便必鞕鞕

則讖語小承氣湯主之若一服讖語止更莫復服津

液胃燥大便鞕而讖語雖無大熱內結亦須與小承

氣湯和其胃氣得一服讖語止則胃燥以潤更莫復

八

與承氣湯以本陽明病讖語發潮熱脉滑而疾者小
無實熱故也

承氣湯王之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服

一升若不轉失氣更與承氣湯明日不大便脉反微澀

者裏虛也為難治不可更與承氣湯也陽明病讖語發潮熱若脉

沉實者內實也則不可下若脉滑疾為裏熱未實則

未可下先與小承氣湯和之湯入腹中轉失氣者中

有燥屎可更與小承氣湯一升以除之若不轉失氣

者是無燥屎不可更與承氣湯至明日邪氣傳時脉

得沉實緊牢是裏實也反得微澀者裏氣大虛

也若大便利後脉微澀者止為裏虛而猶可此不會

大便脉反微澀是正氣內陽明病讖語有潮熱反不

衰為邪所勝故云難治

能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭爾

宜大承氣湯下之讖語潮熱為胃熱當消穀引食反不能食者胃中有燥屎而胃中實

四五日脉沉而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越

出大便為難表虛裏實久則讖語邪氣入內之時得

具也則當下之反發其汗津液越出胃中

乾燥大便必難久胃實必發讖語

病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讖語遺尿發

汗則讖語下之額上生汗手足逆冷若自汗出者

白虎湯主之腹滿身重以反側口不仁難讖語者陽

垢者少陽也遺尿者太陽也三者以陽明證多故出

陽明篇中三陽合病為表裏有邪若發汗攻表則燥

熱益甚必愈讖語若下之攻裏表熱乘虛內陷必額

上汗出手足逆冷其汗出者三陽經熱甚也內經

曰熱則腠理開榮衛通汗大

泄與白虎湯以解內外之熱二陽併病太陽證罷但

發潮熱手足熱熱汗出大便難而讖語者下之則愈

宜大承氣湯

木太陽病併於陽明名曰併病太陽證罷是無表證但發潮熱是熱併陽明一

身汗出為熱越今手足熱熱汗出是熱聚於胃也必大便難而讞語經曰手足熱然而出者必大便已

鞭也與大承氣湯陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿以下胃中實熱

而喘發熱汗出惡寒反惡熱身重若發汗則躁心

憤憤反讞語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之

則胃中空虛客動隔心中懊懍舌上胎者梔子豉

湯主之脈浮發熱為邪在表咽燥口苦為熱在經脈

在裏此表裏俱有邪當解之若發汗攻表表熱

雖除而內熱益甚故躁而憤憤反讞語憤憤者心亂

經曰榮氣微者加燒針則損動陰氣故怵惕煩躁不得

表裏有熱苦加燒針則損動陰氣故怵惕煩躁不得

眠也若下之裏熱雖去則胃中空虛表客邪之氣

乘虛陷於上焦煩動於隔使心中懊懍而不了了也

乘虛陷於上焦煩動於隔使心中懊懍而不了了也

舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

若下後邪熱者為虛煩此下後邪熱不客於上焦而客於中焦若脈者為乾燥煩渴與白虎加人參湯散熱潤燥若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

此下後客熱客於下焦三焦俱帶熱也脈浮發熱者上焦熱也欲飲水者中焦熱也小便不利者邪客下焦清利不得下通也與猪苓湯利小便以清下焦之熱也

猪苓湯

猪苓

王皮

茯苓

甘

阿膠

甘


滑石

碎甘

澤瀉

甘鹹寒

甘甚而反淡淡味滲泄為陽猪苓茯苓之甘以行小便鹹味湧泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水滑利竅



阿膠滑石之滑以利水道

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿

膠烱消溫服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中

燥猪苓湯復利其小便故也針經曰水穀入於口輸

寒衣薄則為溺天熱衣厚則為汗是汗溺一液也汗

多為津液外泄胃中乾燥故不可與猪苓湯利小便

也脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之浮

表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒若胃中虛冷不能食

寒甚也與四逆湯溫裏散寒者飲水則噦噦者咳逆是也千金曰咳逆者噦逆之

而脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄脈浮發熱口乾

也能食者裏和也熱甚於經迫血為衄胃中虛令陰
勝也水入於經其血乃成飲水者助陰氣逆為噦發
熱口乾陽勝也食入於陰長氣於陽能食陽明病下
者助陽血妄為衄三者偏陰偏陽之疾也

之其外有熱手足濕不結胸心中懊懣饑不能食但

頭汗出者梔子豉湯主之表未罷而下者應邪熱內

無手足寒今外有熱而手足溫者熱雖內陷然而不

深故不作結胃也心中懊懣天雨流芳饑不能食者熱客胃中

為虛煩也熱自胸中熏蒸於上故但頭汗出陽明病

而身無汗與梔子豉湯以吐胸中之虛煩

發潮熱大便溏小便自可胃脇滿不去者小柴胡湯

主之陽明病潮熱為胃實大便鞭而小便數今大便

溏者應氣降而胃脇滿去反不去者邪氣猶陽明

在半表半裏之間與小柴胡湯以去表裏之邪

病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可與小柴胡

湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然而汗出解

也陽明病腹滿不大便舌上胎黃者為邪熱入府可

下若脇下鞭滿雖不大便而嘔舌上白胎者為邪

未入府在表裏之與小柴胡湯以和解之上焦

得通則嘔止津液得下則胃氣因和汗出而解

明中風脈弦浮而短氣腹都滿脇下及心痛久按

之氣不通鼻乾不得汗雨流芳晴出一身及面目悉黃小便

難有潮熱時時噤耳前後腫刺之小差外不解病過

十日脈續浮者與小柴胡湯脈但浮無餘證者與麻

黃湯若不尿腹滿如噤者不治浮大為陽風在表也

短氣腹滿脇下及心痛風熱壅於腹中而不通也若

傷寒

卷五

三

攻不干表也。一身面日悉黃，小便難有，潮熱時時噦者，風熱攻於胃也。陽明之脈出大迎，循頰車上耳前，過客主人熱，勝則腫。此風熱在經，故耳前後腫刺之，經氣通腫則小差。如此者，外證罷則可攻，若外證不解，雖過十日脈續，浮者邪猶在半表，半裏與小柴胡湯以和解之。若其脈但浮而不弦大，無諸裏證者，是邪但在表也，可與麻黃湯以發其汗。若不尿腹滿，加噦者，關格之疾也，故去不治。難經曰：關格者，不得盡其命。陽明病自汗出，若發汗，小便自利者，此為津液內竭，雖鞭不可攻之。當須自欲大便，宜蜜煎導而通之。若士瓜根、大猪膽汁皆可為導。津液內竭，腸胃乾燥，大便

因鞭此非結熱故不可攻，宜以藥外治而導引。

蜜煎導方

蜜七合一味，內銅器中，微火煎之，稍凝似飴狀，攪

之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指
長二寸許當熱時急作冷則鞭以內穀道中以手
急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食

頃當大便出

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜

桂枝湯

陽明病脉遲汗出多當責邪在裏以陽明病
微惡寒知表未解與桂枝湯和表陽明病

脉浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯陽明傷寒表
實脉浮無汗

而喘也與麻黃湯以發汗陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃

也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿

者此為癆熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之但頭汗

汗劑頸而還者熱不得越也小便不利渴引水漿者

熱甚於胃津液內竭也胃為土而色黃胃為熱蒸則

色奪於外必發黃也

與茵陳蒿湯逐

茵陳蒿湯方

茵陳蒿

陸兩苦

拾肆枚

大黃

二兩去

小熱之氣 微寒 和之 大熱之氣 寒以取之 茵陳梔

子之 苦寒 以逐 胃燥 宜下 必以 苦宜 補必 以酸 大

右三味以水

一斗

先煮茵陳減陸升內二味煮取

三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色

正赤一宿腹減黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘀

血故令喜忘尿雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯

下之內經曰血并於下亂而喜忘此下本有久瘀血

鞭大便反易其色黑也津液少大便鞭以畜血在內尿雖

胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻

之若有燥屎者宜大承氣湯下後心中懊憹而煩者

若胃中有燥屎者非虛煩也可與大承氣湯下之其

腹微滿初鞭後澹是無燥屎也此熱不在胃而在上也

故不病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者

此有燥屎故使不大便也不大便六七日者則大便

氣不得下通故繞臍病人煩熱汗出則解又如瘧狀

痛煩躁發作有時也日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者

宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯雖得陽明證未可便

為裏實審看脈候以別內外其脈實者熱已入府為實可與大承氣湯下之其脈浮虛者是熱未入府猶

在表也可與桂枝湯發汗則愈六下後六七日不大便煩不解腹滿

痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜大承

氣湯大下之後胃弱不能消穀至六七日不大便則宿食已結不消故使煩熱不解而腹滿痛是

知有燥屎也與大承氣湯以下除之病人小便不利大便乍難乍易時

有微熱喘胃不能卧者有燥屎也宜大承氣湯利則

大便鞅此以有燥屎故小便不利而大便乍難乍易胃熱者發熱喘胃無時及嗜卧也此燥屎在胃故時

有微熱喘胃不得卧也食穀欲嘔者屬陽明也吳茱

萸湯主之得湯反劇者屬胃焦也上焦主內胃為之受食穀欲嘔者胃

不受也與吳茱萸湯以溫胃氣得湯反劇者上焦不內也以治上焦法治之

吳茱萸湯方

吳茱萸

一升洗

天雨流芳

生薑

六兩切

大棗

十二枚

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三

服

服

太陽病才緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔

但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡

寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更

衣十日無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之

渴者宜五苓散太陽病脈陽浮陰弱為邪在表今寸

出復惡寒者表裏解也傳經之邪入裏裏不和者必

嘔此不嘔但心下痞者天雨下之早邪氣留於心下也

如其不下者必漸不惡寒而渴太陽之邪轉屬陽明

也苦吐若下若發汗後小便數大便鞭者當與小承

氣溼和之此不更衣十日無所苦也候津液還入胃中

無滿實雖不更衣十日無所苦也候津液還入胃中

小便數少大便必自出也渴欲飲水者少少與之以

潤胃氣但審邪氣所出以法救之如渴不止與五苓

散是脈陽微而汗出少者為自和也汗出多者為太

過脈陽微者邪氣少汗出少者為適當故自陽脈實

和汗出多者反損正氣是汗出太過也

因發其汗出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津

液大便因鞭也

陽脈實者表熱甚也因發汗熱乘虛

亡其陽陽絕於裏脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤

相搏胃氣生熱其陽則絕浮芤相搏陰陽不諧胃氣

其陽跌陽脈浮而澁浮芤胃氣強澁則小便數浮澁

相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之跌陽者脾胃

陽知胃氣強澁為陰知脾為約約者儉約之約又約

束之約內經曰飲入於胃遊澁精氣上輸於脾脾氣

散精上歸於肺通調水道下輸於膀胱水精四布五

經並行是脾主為胃行其津液者也今胃強脾弱約

束津液不得四布但輸膀胱致小

麻仁丸方

麻子仁 二升 甘平

芍藥 半斤 酸平

枳實 半斤 多 苦寒

大黃 一斤 去 皮 苦寒

厚朴 一尺 炙 去 苦 溫

杏仁 一升 去皮尖熬 別作脂 甘溫

內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津

液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴大黃之苦苦結而泄胃強也

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九日三服

漸加以知為度

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承

氣湯主之 蒸蒸者如蒸氣言甚熱也太陽病三日發汗不解則表邪已罷蒸蒸發熱胃熱為

甚與調胃承傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯 內

氣湯下胃熱 日諸脹腹大皆屬於熱熱在上焦則吐吐後不解復腹脹滿者邪熱入胃也與調胃承氣湯下其胃熱

太陽病若吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者

與小承氣湯和之愈

吐下發汗皆損津液表邪乘虛傳裏

邪入裏也小便數者邪在表也微煩者其脾為約也小承氣湯和之愈得病二三日脈弱無

太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承

氣湯少少與微和之安至六日與承氣湯一升

若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後

必澹未定成鞭攻之必澹須小便利尿定鞭乃可攻

之宜大承氣湯

針經曰脈軟者病將下弱為陰脈當責邪在裏得病二三日脈弱是日數

雖淺而邪氣已入裏也無太陽證為表證已罷無柴

胡證為無半表半裏之證煩躁心下鞭者邪氣內甚

也胃實熱甚則不能食胃虛熱甚至四五日雖能食

亦當與小承氣湯微和之至六日則熱甚與大承氣

湯一升若不大便六七日小便多者為津液內竭
便必鞭則可下之小便少者則胃中水穀不別必初
鞭後澹雖不能食為胃實以小便利尿定鞭乃可攻之傷寒六
成鞭亦不可攻須小便便利尿定鞭乃可攻之傷寒六

七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱

者此為實也急下之宜大承氣湯內經曰諸脈者皆

日邪氣入裏目中不了了睛不和者邪熱內甚

上熏於目也無裏證大便難者裏實也身大熱者

表熱也身微熱者裏證也針經曰熱病目不明熱不

已者死此目中不了了睛不和則證近危惡也須急


與大承氣湯陽發熱汗多者急下之宜大承氣湯

邪熱入府外發熱汗多者熱迫津液發汗不解腹滿

將竭急與大承氣湯其府熱發汗不解腹滿

痛者急下之宜大承氣湯成腹滿痛者傳之迅也是

須急腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯腹滿不減



邪氣實也經曰大滿大實自可除下之大承氣湯下其滿實若腹滿時減非內實也則不可下金匱要畧

曰腹滿時減復如故此為寒陽明少陽合病必下利當與溫藥是減不惡言也

其脈不負者順也負者失也互相尅賊名為負也脈

滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯陽明土少陽木二經

合病氣不相和則必下利雨流芳少陽脈不勝陽明不負是

不相尅為順也若少陽脈勝陽明脈負者是鬼賊相尅為正氣失也

則胃氣實下利利當微厥今脈滑數知胃有宿食

與大承氣湯病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數

者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀善飢至

六七日不大便者有瘀血宜抵當湯七八日邪入府之時病人無表

裏證但發熱雖脈浮數亦可與大承氣湯下之浮為熱客於氣數為熱客於血下之邪熱去而浮數之脈

俱當解若下後數脈去而脈但浮則是榮血間熱併
 於衛氣間也當為邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀
 潮熱發渴之證此下之後浮脈去而數不解則是衛
 氣間熱合於榮血間也熱併合迫血下行胃虛協
 熱消穀善飢血至焦若大便利者下血乃愈若六
 七日不大便則血不得行畜積於下為瘀血與抵當
 湯以下若脈數不解而下不止必協熱而便膿血也
 去之若脈數不解而下不止必協熱而便膿血也
 下後脈數不解者是熱不得泄畜血於下
 為瘀血也若下後脈數不解而下利不止者為熱得
 下泄迫血下傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒
 行必便膿血

濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之
 要畧曰黃家所起從濕得之汗出熱去則不能發黃
 發汗已身目為黃者風氣去濕氣在也脾惡濕濕氣
 內著脾色外奪者身目為黃若瘀血在裏發黃者則
 可下此以寒濕在裏故不可下當從寒濕法治之

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵

陳蒿湯主之

當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄於外內經曰膀胱者津液藏焉氣化

則能出小便不利小腹滿者熱氣甚於外而津液不得下行也與茵陳湯同

傷寒

身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

傷寒身黃胃有瘀熱當須下去之此以發

熱為熱未實與梔子蘘皮湯解

梔子蘘皮湯方

梔子

二十五箇擘

甘草

二兩炙

黃蘘

二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分温再服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆湯主之

濕熱相交民多病痺痺黃也傷寒為寒濕在表發黃為瘀熱在裏與麻黃連軹赤小豆湯除熱散濕

麻黃連軹赤小豆湯方

麻黃

二兩甘
溫去節

赤小豆

一升
甘平

連翹

二兩連翹
根也苦寒

杏仁

四十箇甘
溫去皮尖

大棗

十二枚
甘溫

生梓白皮

一升
苦寒

生薑

二兩辛
溫切

甘草

二兩炙
甘平

內經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘平以汗為
故不助濕氣此之謂也又煎用潦水者亦取其水味薄則

右八味以潦水一

斗先煮麻黃再沸去上沫內諸

藥煮取三升分溫三服半日服盡

辨少陽病脈證并治法第九

少陽之為病口苦咽乾目眩也

足少陽膽經也內經曰有病口苦者名曰

膽痺甲乙經曰膽者中精之府五藏取決於膽咽為
之使少陽之脈起於目銳眥少陽受邪故口苦咽乾

目眩少陽中風兩耳無所聞目赤胃中滿而煩者不可

吐下吐下則悸而驚少陽之脈起於目眚走於耳中

則為熱少陽中風氣壅而熱故耳聾目赤胃滿而煩

邪在少陽為半表半裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者

悸以下除滿下則傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽

亡血血虛者驚此屬胃胃和則愈胃不

少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不

和則煩而悸經白三部俱發者少陽受病脈細者邪

少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗亡津液胃

中乾燥少陽之邪因傳入胃必發譫語當與調胃承

氣湯下之胃和則愈下則胃本太陽病不解轉入

為少陽木邪干之故煩而悸胃本太陽病不解轉入

少陽者脇下鞅滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下

脈沉緊者與小柴胡湯太陽轉入少陽是表邪入於

裏脇下鞅滿不能食往來寒

熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脈沉緊者邪氣入府為裏實尚未經吐下而脈沉緊為傳裏雖深未全入府外猶未解也若已吐下發汗溫鍼譫語柴與小柴胡湯以和解之

胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之少陽之邪在表裏之

間若妄吐下發汗溫鍼損耗津液胃中乾燥木邪干胃必發譫語胡證不能者則不為逆柴胡證罷者壞病也詳其書何陽合病脈浮大上關上但欲治之逆以法救之

眠睡目合則汗關脈以候少陽之氣太陽之脈浮陽病膽熱則睡也陽合病但欲眠睡目合則無汗以陰不得有汗但欲眠睡日合則汗知三陽合病膽有熱也

傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故

也表為陽裏為陰邪在表則外有熱六七日邪氣入裏之時外無大熱內有躁煩者表邪傳裏也故曰

陽去傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食

而不嘔此為三陰不受邪也傷寒、四日表邪傳裏裏不和則不能食而嘔今

反能食而不嘔是邪傷寒邪傷寒、三日邪傳少陽脈小者欲已也

內經曰大則邪至邪至、平傷寒、三日邪傳少陽脈當弦緊今脈小者邪氣微而欲已也

欲解時從寅至辰少陽木王之時

釋音

廁初吏切瘕音假疴音旦憤古對切怵勅律切

惕音踢敬也瘳丁賀切

天雨流芳



