


類聚方庸

全

武
325







醫範

萬病一毒。茶皆毒也。以毒攻毒，是醫要道。人身如春，此為常體。偏陰偏陽，此其病狀。病必害性，是以謂毒平毒也。無形必乘有形，其証乃見乘氣也。氣變為乘血也。血變為乘水也。水變為其入口者，飲食二而化為血也。是以右三物為三物之精。循環則為養，停滯則為病。失其常度，或急或逆，或虛或實，諸患前記。各異其狀，証緣物而生。隨証而分，証者未也。物者本也。雖有見証，不令其物何益之有。譬



如望雲霓，不知曙西也。凡病論以陰陽古之
法也，是方其大體而已。茶方未可施矣。大陝
病有主，支湯有葛根湯，有廣黃湯，一病而三
方，所以有氣血水之辨也。其人頸痛，發熱汗
出，惡風，是氣之變而桂枝湯証也。以其發熱
知血不凝，以其汗出知水不滯，其血凝者，虫
自汗出，不得發熱，項背強，凡之葛根湯証，是
也。其水滯者，虫必發熱，不得汗出，身疼喘鳴，
廣黃湯証是也。如此証備，則不弁三物，虫曰
某湯証而可也。或變証出，或見一証，長沙方

中，無可徵証，以何論病，以何置方，此時乘類
推證，以分三物，辨其主客，審其所在，知其四
態，謂之規矩。何曰主客，黃連、阿膠湯、瓜蒂散、
建中湯，同治心中煩，而其方異者，主客異也。
黃連、阿膠湯，氣主而水血為客，故但煩而已。
建中湯，血主而氣水為客，故悸而煩，悸者，血
也，劇則致衄，不得發熱，是其候也。瓜蒂散，水
主而氣血為客，故滿而煩，滿者，水也，氣不發
散，必上衝吐水，則愈，是其候也。主者先見，而
客者後出，是知主客之一法也。何曰所有病

晴恐眼字

位也表裏內外是也一身頭項背腰此為表也外體面目鼻口咽喉胸腹此為裏也內外者出入之辭以晴舌心骨髓為內極位也外也者自內而外出也內也者自外而內陷也對內一則表裏俱外也內外有經也表裏者緯也桂枝湯治胸中煩者其氣一體而治方煩柴胡湯治胸中煩者其氣一體而治方何異以其所在異也譬如虹之在東則為晴候在西則為雨兆也何曰四態急逆虛實是也急者循行而進之謂也逆者却行而退之

謂也虛者虧而不足之謂也實者盈而有餘之謂也心煩者物同其所在而治方何異以其態異之故也梔子豉湯証熱氣見於外身熱煩熱或頭汗出是急而心煩也白虎湯証熱氣伏於內口舌乾燥或渴其背惡寒是逆而心煩也酸棗仁湯表裏無熱不得眠是虛而心煩也兼氣湯証表裏有熱太便鞭是實而心煩也一煩之變如此矣萬病之變雖難窮極統之則不出矣三物之變也三物之變三極之道也以此推証何病不分証也者

末也、物也者本也、不知其本、孰能分其末、學者思諸、

類聚方庸 平安 南涯吉益先生口授

桂枝湯 病起在表也

治氣急血窒而難發散者也其証曰惡寒
曰頭痛曰身疼痛曰煩曰上衝者皆主症
而遂發熱汗出是氣急之候也雖已發熱
汗出其為寒為痛者以血窒也煩者上衝
者身疼痛者不發熱不汗出是其劇症也
論曰頭痛者必衄是氣逐血之明徵也
惡寒而有汗出不發熱者發熱而有汗

出者也。汗出而不發熱者，急迫之症也。發熱而不汗出者，外襲之証也。以其由來異，雖已異証，其所在與物不異，故治方一也。頭痛者，或有發熱而後致者，或有吧而後致者，或有身疼而後致者，或有煩熱而後致者，皆桂支之非証。初起所致者，此湯主之。身疼痛者，下利後所致者，此湯主之。初起所致，非桂支之症也。煩者，身疼痛而煩，乾燥而煩，懊惱而煩，下利後煩之類，皆非桂支之証也。他無兼症，但煩者，此湯主

之。上衝者，或心下逆滿，或胸中痞鞞，或咳逆而所致者，皆非桂支之症。無水氣變者，此湯主之。脈舉浮弱，或浮數者，示水血不凝滯也。

桂支加桂支湯 表病薄于裏也

治本方症而氣逆甚者，其症曰：氣從少腹上衝心，是氣逆甚而上攻，所以加桂支也。曰：燒針令其汗者，示以燒針氣逆也。以汗出，明血不內陷也。

桂支加芍藥湯 表病陷于脈，而血滯于裏

桂支加芍藥湯 陽例于茲可也

也

治本方証而血滯甚者其証曰時痛是血滯氣欲行不能行也作痛而不上衝者是血滯之劇症所以加芍藥也曰本大陽病者示其症似裏為表病也曰下之者明陷裏也版滿時痛者血氣主而水氣為客水氣主者痛無休時非此湯之症也
桂支加芍藥大黃湯表病陷于版而氣實治前症而血

也

氣實者其証曰大實痛審其狀痛甚而無

体恐体字

体作是實痛也當有或版中牽急或鞞滿或大便不通等之症痛有体作氣急則痛不急則不痛是時痛也

桂支加芍藥生薑人葶湯表病也

治血氣窘迫血滯氣難暢者其症曰身疼痛者血滯也痛者氣難暢也曰發汗後者示血氣窘迫非水之所致也表有水不發汗則脉當浮或浮緊廣黃症也此脉沉遲是血滯氣難暢也
桂支去芍藥湯表病陷無水也

暢字下恐脫也
桂
所字下恐脫致字欵

治氣欲外發不能發者其症曰胸滿是氣
欲外發不能發也曰下之後者示為表病
也脈促不痛者是血不滯也凡胸滿者滯
氣水鬱之候也今此病無水氣獨鬱下後
變症故不加逐水藥也凡去芍藥者氣逆
而水滯也加芍藥者氣急血滯是其別也
支去芍藥加附子湯表病陷血氣不暢
治前症而血氣不暢者其症曰微惡寒是
血氣不暢也凡曰微惡寒者非外襲所虛
寒也附子主之芍藥甘草附子湯同症而

有芍藥其別如何芍藥甘草附子湯發汗
變病即急之狀也此病下後變病即逆之
狀也急逆之別也異其治方是古之法也
桂支加附子湯發汗後變病故在芍藥附
子瀉心湯下後變病故無芍藥也以急逆
異而雖治方不同所以加附子一也
桂支去芍藥加皂莢湯表病陷胸有涎沫

治涎沫聚胸而氣急者其証曰吐涎沫是
其候也吐者氣急而所致也
在版則吐食

字下恐脫也字桂

在心下則吐水在胸則吐涎沫其所以吐者一也
支去芍藥加苓朮湯 表病陷心下有水
治水聚心下而氣急者其証曰心下滿微
痛小便不利者是水聚心下也曰頭項強
痛是血氣急也曰發熱無汗者明雖痛由
水所致而非血氣也此湯本去桂支今作
去芍藥歷觀諸症无去桂之理本去桂則
治小便自利加桂支則治不利今小便不
利不可去桂也氣由懸懸則芍藥論中

水氣之氣恐急字

之例也此湯症氣由水氣也當作去芍藥也

桂支去芍藥加竜骨蜀漆牡蛎湯

表症陷迫于心也

治血氣俱陷薄于心者其証曰以火迫却
之臥起不安者煩之劇症而氣逆之候也
此湯之意以桂支加竜骨牡蛎湯考之桂
支加竜骨牡蛎湯証曰弦急曰目眩皆急
之狀故有芍藥此湯也証從表而陷者逆
之狀去芍藥以可知其意矣

桂支加竜骨牡蛎湯。病在裏而上攻者也。治血氣急血凝滯氣不能循環者。其症曰少脈弦急曰目眩是血氣急也。曰陰頭寒曰失精是血凝氣不能循環也。凡竜骨牡蛎症按其脈心有動也。有動者按之必堅是血凝也。

桂支加葛根湯 表病也。

治氣急而血凝項背者。其証曰項背強。凡久是血凝之候也。不舉發熱而舉惡風者。示熱氣鬱滯也。凡由水作項背強者。無凡

之之狀。而必發熱也。曰反汗出者。明水不為主也。

桂枝湯 表裏病也。

治血凝氣欲行不能行者也。其症曰身體強。凡久脈沈遲者是血凝也。曰大陽病其症備。是示氣欲行之狀也。方名不。桂支加。桂枝湯。而曰桂枝湯者。桂枝治凝血。其在表者作強。其在裏者作渴。是血主而氣為客。故主用桂枝。以桂支湯為佐。方名所以異也。

桂支加黃耆湯

從裏外行也

治血氣急水氣在皮膚者其証曰自腰以上行出曰煩燥是氣急也曰腰體弛痛如右物在皮中狀曰身疼重是水氣在皮膚也曰小便不利是示裏水外行也凡黃耆症必作水狀不見水形若則加防己身重有兩義水為主者汗不出身卒痛凡黃耆之氣為主者汗出身疼者黃耆主之凡黃証逆也黃耆症順也順逆之狀是其別也

桂支加厚朴杏仁湯

表病陷胸也

若下恐見水形三字欵

關恐開

桂支麥黃辛附湯

從表逆裏也

治表水下陷而血氣欲行不能行者其症曰微喘是表水下陷血氣欲行不能行也曰下之者明表水下陷非裏冰上攻也喘也凡曰微喘者是血氣急所致而非外開也水也

大如盤是水聚心下也若血凝澀者必作水聲水結而硬者不作水聲是水血之分也其証同於枳實湯而冠首氣分二字前

章舉其症有手足逆冷。惡寒不仁等症。是血氣逆主而水為客也。

桂枝加附子湯。表病而及裏也。

治表邪未散。津液脫。有失機狀者。其症曰。惡凡。是表邪未散也。曰小便難。是津液脫也。曰以難屈伸者。是失機之狀也。曰小便。曰四肢。是迫裏症也。此方及桂枝去芍藥。加附子湯。同加附子。而芍藥有無。自有急逆之別也。裏病急而見表証也。

烏頭圭支湯。裏病急而見表証也。

治血氣不循。有失機之狀。而遂迫表者。其証曰。腹中痛。是血氣不循也。曰逆冷。手足不仁。是失機之狀。附子所主也。曰身疼痛。是血氣外行迫表。桂枝所治也。方名曰烏頭圭支湯。而不謂圭支加烏頭湯。是烏頭証主。而圭支症為客也。

桂枝附子湯。去圭加木湯。表病內攻也。

治桂枝附子湯証。而血氣內攻。無上逆之証。水下降者。其証曰。大便硬。是血氣內攻也。曰小便自利。是水下降也。自利者。不待

菜力自通也。自利比不利。其病在深。多無
 上逆之症。所以去圭也。若不利。上逆之証
 猶未止。則必用圭支。木不能逐。其逆氣也。
 小建中湯。病在裏也。
 治血滯裏氣急。上逆者。其証曰。急痛。曰。煩。
 是裏氣急也。曰。痛。曰。悸。是血滯也。曰。衄。曰。
 悸而煩。是上逆也。心中悸而煩者。氣急而
 血滯也。其脈中痛者。血滯多而氣急。未
 劇也。悸。衄。脈中痛者。血滯多。氣急。甚。而急
 迫也。故倍甘草。加膠飴也。

當飲建中湯。病在于裏也。
 治前症。而血凝者。其証曰。刺痛。曰。少腹拘
 急痛。之引腰背。是血凝之証也。小建中湯。
 當飲建中湯。同治脈中痛。各有其別。當飲
 之証。曰。刺痛。曰。病痛。不悸。不煩。不致。衄。是
 血凝也。小建中湯。血不凝。但滯而已。故氣
 急劇。則為衄。為悸。有逐血之証。無悸。衄。証。
 則圭支。加芍藥湯。當飲建中湯。症何以別
 之。當飲建中湯。曰。刺痛。曰。病痛。血凝。有急
 狀。甚也。圭支。加芍藥湯。曰。時痛。急。狀。緩也。

曰版滿氣暢血不凝也

黃耆圭支五物湯 自裏迫表也

治氣急血窒皮層有水氣者其証曰身侷
不仁是血窒也此方比圭支加黃耆湯血
窒而不能外榮身不疼重汗不出雖未見
水氣証不仁者非全無水故倍黃耆逐水
氣一倍生薑桑散其氣方中無甘草者不
煩不痛無逆氣之証也
黃耆圭支苦酒湯 自裏迫表也
治血氣急有水氣者其証曰身侷重是有

和

水氣也曰桑熱汗出曰黃汗是血氣急也
血氣急者脈當浮而及沈者氣已雖外榮
血滯所以有芍藥也曰渴是氣急而裏水
外出也凡苦酒者止血氣清酒者行血氣
自及對之品也此方比前方水氣多而身
侷重故倍黃耆証疑似於廣黃黃汗出廣
黃無汗如越婢湯汗出者何以別之黃耆
桂支甘草湯 病在裏也
治氣上逆者其証曰心下悸欲得按是上

逆甚也。此悖非水，何以知之？由水悖者，不欲按之。今欲得按者，按之則逆止，而悖自安也。此方比桂支湯，汗出多而津液脫，故上逆而不上衝，所以無芍藥大棘也。水之不滯，無氣不聚之患，所以無生姜也。

桂支附子湯 表病發裏也。治血氣壅塞，氣逆不能循環，有失神機之狀者，其証曰：身體疼煩，是血氣壅塞，有氣逆之狀，故主用桂支也。曰不能轉側，是失神機之劇者，所以為附子三枚也。此方中

無芍藥，諸症逆而非急也。其方同於去芍藥加附子湯，而異者，倍桂附，以惡寒與疼煩者，輕重也。

桂支甘草附子湯 病自表迫裏也。治桂支附子湯証劇，而血氣不暢，倍失神機，重有水氣者，其証曰：骨節疼煩，製痛不得屈伸，是血氣不暢，倍失神機也。曰短氣，小便不利，是上逆而裏有水氣也。曰汗出，身微腫，是裏水見表也。曰惡風，不欲去衣，示表病迫裏，表未解也。自汗出，血氣不逆。

所以無生薑也。製痛之証應內大棗。今不
內者血氣壅塞而所致。非血氣急之症也。
桂支甘草龜骨牡蛎湯。病在裏也。

治氣血內攻者。其症曰。因燒針煩躁者。氣
逆也。躁者血陷也。是內攻之証也。龜骨牡
蛎治其血。桂支甘草逐其氣。其証之不劇。
氣雖逆未迫心。血雖陷未致狂驚。氣血拘
迫。故諸菜等分。桂一兩也。煩燥為血。何以
知之。其病不劇。無他証可明之。故曰燒針
而示為其血也。

羊夏散 裏病也。

治咽中有疼飲而氣上逆者。其証曰。咽中
痛。是氣上逆也。其以所在。知為疼飲也。
桂支人參湯。表裏有病也。

治心下血凝氣不行。表裏有熱而逐水者。
其症曰。心下痞硬。是血凝氣不行。曰數下。
之。而示為其逆也。曰協熱。曰表裏不解。是
亦表裏有熱也。曰利下。而不曰下利。此利
非氣不行。而水下降者。為熱所逐。而利。故
曰協熱而利。不用黃芩。而所以加桂也。

人參湯裏病而在於心下也。

治血凝氣不行。心下有水者，其証曰寒多，是血凝氣不行也。曰喜唾，曰不用水，是心下有水也。

茯苓甘草湯裏病而迫于心下也。

治氣上逆而水聚於心下者，其証曰心下悸，曰汗出不渴，是氣上逆而水聚於心下也。

苓桂木甘湯裏病而在心下也。

治心下水滯而氣不得外榮，上逆者，其証

曰逆滿，曰支滿，曰短氣，是水滯氣不得外

榮也。曰上衝胸，曰目眩，曰頭眩，是上逆也。

此茯苓甘草湯証，氣上逆而動水，故悸而

不滿，用生姜逐其氣也。此方証水閉氣，故

滿而不悸，汗不出，加木以逐其水也。

苓桂甘麥湯裏病而在膈下也。

治衝氣劇而膈下水欲上行者，其証曰膈下悸，是衝氣劇而水欲上行也。曰榮汗後者，示血氣急也。此茯苓甘草湯悸在膈下，是其水多而衝氣不至心下，故倍茯苓也。

雖未至心下，其勢猛而將攻心，故加桂支
甘草也。大棘緩其氣也。

苓桂五味甘草湯 裏病也。

治衝氣甚而水上行，胃心者，其証曰：氣從
少腹上衝胸咽，曰其面翕然如醉狀，是衝
氣甚也。曰小便難，時又冒者是水上行，冒
心也。比前方証以水少上至心，故減茯苓
而圭支甘草如故也。五味子逐所其冒之
水。

苓甘五味姜辛湯 裏病也。

治前証而衝氣即低，水氣在胸者，其証曰：
咳胸滿，是水氣在胸也。加細辛于姜逐其
水氣在胸也矣。以無上衝之狀，故去圭支
也。

苓甘姜味辛芩湯 同上

治前証而心下有水氣者，其証曰：嘔是心
下有水氣也。加半芩逐其水也。

苓甘姜味辛夏仁湯 同上

治前証而水氣見於表者，其証曰：形腫是
水氣見于表也。加杏仁逐其水氣也。按當

有喘

苓甘姜味辛复仁黄汤 同上

治前証而气上衝面熱者其証曰面熱如

醉状是熱气上衝也加大黄解其熱也

茯苓杏仁甘草湯 病在胸也

治水在胸塞气者其証曰气塞是水從上

塞气也杏仁主之曰短气者水滯而不得

息也茯苓主之曰气塞曰短气之逆而不

暢所以有甘草也

茯苓戎鹽湯 病在裏也

治血澁滯而水气不行者其証曰小便不利是水气不行也血滯証脫以載在淋瀝部考之則血滯也明矣苓朮以逐水气戎鹽以循血也

葵子茯苓散 病在表裏也

治血气不循表裏水滯者其証曰身重小

便不利是表裏水滯也曰洒淅惡寒是血

气不循之候也此病不用圭支甘草者血

滯而裏急由水气逆者葵子循血茯苓導

水也

茯苓澤瀉湯 病在版也

治血氣急而心下有水或吐出水津液內
竭者其証曰吐而渴是血氣急津液內竭
也欲飲水者是水竭氣熾為熱也此方比
五苓散水滯多故倍苓朮逐水以生姜甘
草逐氣逆澤瀉緩血氣也

澤瀉湯 病在心下也

治血氣急心下有水而冒心者其証曰心
有支飲是水也曰冒者水冒心也以朮逐
之曰眩者血氣急也澤瀉治之

五苓散 病在表也

治血氣急水外出而津液內竭或氣急甚
而膈下有水上攻于心者其証曰發汗后
大汗出曰發汗已曰汗出而渴示水外出
也曰脈浮數曰頭痛發熱身疼痛是血氣
急而見表候也曰消渴曰渴而欲飲水曰
煩燥小便不利是津液內竭也曰水入則
吐曰吐涎沫是血氣急之劇者也曰膈下
悸者是水也曰癰眩者是攻心也若邪氣
外襲不得汗出而血氣急者水入則吐也

若血氣急極而脈下有水。上攻于心則吐涎沫而癡眩也。凡澤瀉証渴則不眩。之劇易也。

茵陳五苓散 同上

治五苓散証而不汗出水滯有瘀血者曰

黃疸瘀熱之候也

猪苓湯 病在內也

治血氣迫於心水滯不行津液內竭者其証曰心煩而不得眠是血氣迫于心也曰

下利曰咳而吧曰小便不利雖發熱不汗出是水滯也曰渴而欲飲水是津液內竭也如此之証血氣不循而小便不利故能治淋瀝也白虎湯証氣伏不暢故惡寒或厥或遺尿也猪苓湯証氣急不伏或發熱或吧或小便不利是其別也五苓散猪苓湯發熱小便不利何以別也五苓証汗出或吐水水外行也猪苓証汗不出或下利或咳而吧水滯不行是其別也猪苓散 病在內也

治水去氣急津液不渴者其証曰嘔吐後
思水者以水去氣急也不渴者血不迫津
液未竭故無澤瀉也有精苓無沢瀉則思
水而不渴有沢瀉而無精苓則渴而不思
水是其別也

八味丸病在少腹也

治少腹血滯而氣急不循環有小便之變
者其証曰小腹不仁曰腰痛是血滯也曰
小腹拘急曰煩熱不得臥是氣急不循環
也曰小便不利曰短氣曰倚息水上攻也

散胸氣腰

牡蛎澤瀉湯病在胸也
血氣急劇則消渴小便反多此方也証病
在血分水氣不為主故小便有利不利也

治血凝氣不循腰以下有水氣者曰大病
差後曰腰以下有水氣者示血氣不循也

當宜有有字

枯呂瞿麥丸病在內也
其症不具當胸腹有動而渴之症

治血凝氣不急無水變者其証曰渴是血
凝也不欲水者氣不急也小便不利不見
水形者是瀝淋而水不行也載在淋瀝之

用恐欲字

部治淋也。明矣。凡渴者。石羔。沃瀉。瓜。呂根。各有其別。石羔之渴。曰口燥渴。曰身熱而渴。為主。沃瀉之渴。曰汗出而渴。曰吐而渴。以無水也。石膏澤瀉。必欲飲水。枯呂根。不用水。無熱與水。變但血凝而已。主治渴者也。

麻黃湯 表病也

治表水閉氣者。其証曰身疼。曰無汗而喘。曰喘而胸滿。是表水閉氣也。發熱。或胸滿者。以為水氣也。脈浮緊者。亦水氣之徵也。

之字恐衍文

凡由氣閉者。不能發熱。不為渴。脈亦不浮也。發熱。身疼者。積日之証。血氣已急。故痛而不喘。而胸滿者。是其劇証。故滿而不發熱也。

麻黃加朮湯 同上

治前証。而水氣及裏者。其証曰煩。是水之氣及裏也。劇則當小便不利也。凡煩由水者。雖其初不發熱。必遂發熱也。

裏止字衍文也

麻黃附子細辛湯 病在表裏也

治氣不行。表水溜滯。血氣外發者。其証曰

其字下脫症字

桑熱是血氣外榮也。脈沉者氣不行。表水溜滯之候也。陰病者毒在表而脈自沉也。

麻黃附子甘草湯病在表也。治氣不行表水溜滯血氣不循者証關。其曰少陰病二三日無裏証者示病在表不及裏也。曰水之為病其脈沉小。屬少陰少

陰者。是氣不行表水溜滯也。不榮熱身體不痛。是血氣不循也。麻黃杏仁甘草石羔湯病在裏也。治表水去裏水未得去而熱伏者。其証曰

汗出是表水去而有伏熱也。曰喘是裏水未去也。曰無大熱者非全無熱之謂。當有大熱而無大熱。示伏熱也。葛根黃連黃芩湯症曰喘而汗出是血氣迫也。故兼下利。此湯之症汗出而喘其始無汗者服桑汗劑則汗出表水去後裏水未去而喘也。廣黃得圭支則逐無汗之水氣去圭支加石羔則解汗出而未榮之熱也。廣黃杏仁甘草薤苳湯病在表也。治表水閉血分氣急而作熱實之狀者其

証曰身尽痛是表水閉血分也曰桑摠日
晡所劇者作熱實之狀也不言日晡所熱
而云桑熱日晡所劇者是外閉之熱而
示非實熱也用薏苡仁而不用圭支者此
以血氣急而作熱實之狀也

牡蛎湯 表病迫於心也

治血氣迫于心而表裏有水者其証明曰
牝癭者多寒之狀而是血氣薄於心也當
胸版有動

小青龍湯 表邪及于裏也

治表水不去血氣上逆動心下之水者其
証曰乾嘔桑摠曰咳逆是表水不去氣上
逆也裏証者當嘔逆今不嘔逆而咳氣逆
而動心下水也曰心下有水者示為本所
在之水飲也作咳喘者心下之水飲上攻
也凡咳而喘者半夏之主而非杏仁之所
治也曰渴曰利曰噎曰吐涎沫曰倚息不
得臥者是血氣急水動搖之候也作其喘
者表水未能去也血氣急所以有芍藥也
大青竜湯 表病也

治表水外閉氣急不能發有熱伏之狀者
其証曰身疼曰不汗出曰乍有輕時是血
氣急也曰煩躁是熱伏之狀也此方圭支
湯廣黃湯合方而去芍藥加石羔也去芍
藥以水氣外閉也加石羔者煩躁或身重
乍有輕時以有熱伏之狀也

越婢湯 表病也

治大青竜湯証而外不閉水氣已發血氣
未散者其証曰一身悉腫者是水氣已發
見水狀也脈浮自汗出不發熱也不惡寒

身不痛疼者外閉解也惡凡無大熱者血
氣未得散也曰不渴續自汗出者明是異
防已黃耆之水也無其杏仁者不喘身不
疼水氣已發也無圭支者自汗出不發熱
不惡寒以無氣逆之証也倍大棗者自汗
出以血氣急也

越婢加木湯 病在表裏也

治本方之証而表裏有水氣不能外發伏
熱者其証不曰一身腫而曰面目黃腫曰
脈沈曰小便不利是裏有水而氣不暢所

以加木也。曰黃腫者，熱候見於表也。不汗出，不惡風者，以裏有水而不能外發也。

越婢加半夏湯 同上

治本方証而留飲有狀^伏熱者，其証曰咳而喘者，留飲之証也。肺浮大者，是有伏熱也。上氣而喘，不見黃腫者，留飲而氣不能外行，所以加半夏也。

葛根湯 表病也

治血上攻凝滯，氣不能循，表有瘀水者，其証曰項背強几几，曰口噤不得語，是血上

攻凝滯之証也。曰惡風，曰氣上衝胸，曰下利，是氣不循之証也。曰無汗者，表有瘀水也。桂枝加葛根湯之証，無瘀水，故自汗出。六黃有無，可以分別矣。

葛根加半夏湯 表病及裏也

治本方証而有留飲者，其証曰不下利，但嘔者，是水留滯而不下利，因致此嘔，所以如半夏也。

葛根黃芩黃連湯 同上

治表未解，血氣上攻，水下降者，其証曰利

遂不止。是水下降之証也。曰喘而汗出者。是血气上攻之証也。脉促者。表未解也。

小柴胡湯裏病也

治水襲气。血气逆。而有留飲者。其証曰。胸脇滿。曰脇下滿。曰脇下硬滿者。是水襲气之証也。曰往來寒熱。曰腹中痛。胸下痞硬。曰頸項強者。是血气逆之証也。曰嘔。曰悸。曰咳者。是有留飲之証也。往來寒熱而汗不出。嘔而衄。汗不出者。气欲衄。衄不能衄。是水襲气也。

柴胡圭支湯同上

治小柴胡湯劇証。而血气外行者。其証曰。衄。熱惡寒。曰支節煩疼。是血气外行之証也。曰心下支結。曰心版卒中痛者。脇下之毒已迫于心下。是小柴胡湯劇証也。彼曰五六日。是曰六七日。示其劇易也。

柴胡去半夏加枳呂湯

治小柴胡湯証。而無留飲。血气凝者。其証曰。發渴。此血气凝。而無留飲之証也。

柴胡姜桂湯裏病迫于内也

水襲氣血凝迫于心者其証曰胸脇滿微
結者水襲氣之証也曰小便不利渴而不
呼者血凝水竭之証也曰頭汗出往來寒
熱心煩者血氣迫于心不結胸之証也異
於大小柴胡者心下無留飲而血氣逆內
攻劇者也此病人當胸脇有動

柴胡竜骨牡蛎湯 同上

治水氣在胃血氣逆攻心不能循環者其
証曰胸滿小便不利是水在胃之証也曰
煩驚曰譫語是血氣攻心之劇者也曰不

可轉側者不能循環之証也曰一身盡重
者是血氣不循水在表也此病人亦當有
動也

大柴胡湯 裏病迫于心下也

治水襲于心下氣急者其証曰嘔不止曰
嘔吐曰心下滿是水襲心下之証也曰心
下急曰往來寒熱曰頭汗出曰發熱汗出
曰心下痞硬嘔吐而下利曰心下滿痛是
氣急之証也論其劇易心下急者易証也
心下滿痛者其次也心下痞硬者最劇証

也。

柴胡加芫硝湯

裏病及于心也。

柴胡湯証而推實者其証曰日晡所

祭潮推者是推實之証也。

白虎湯

病在裏也。

治血氣伏而作推水不能行者其証曰難

以轉側曰不仁曰逆冷曰遺尿曰厥曰背

微惡寒者是血氣伏之証也曰譫語曰燥

渴心煩曰渴欲飲水曰口乾舌燥者是作

推也曰腹臑身重是水不行也雖然水非

其所主病以自汗出示之也曰渴欲飲水

曰煩渴此二証疑似於五苓散何以別之

五苓散水外行而渴也此方伏推甚而渴

也故五苓散証祭推必汗出而渴此証口

乾燥或身推而渴也五苓散脈浮數此方

脈洪大或滑五苓散之証有氣急之狀白

虎湯之証有氣逆之狀是其別也。

白虎加桂支湯

裏病而及外也。

治本方証而血氣外行者其証曰骨節疼

煩是血氣外行也未離白虎湯之位故身

熱而不發熱。骨節疼煩而身不疼也。
白虎加人參湯。裏病而在于心也。

治本方証而氣不暢。血滯不能循者。其証曰汗出。曰身熱。是氣不暢之証也。曰惡寒。是血滯不能循之証也。

厚朴三物湯。裏病也。

治氣滿甚而未實者。此方以厚朴為君。菜此小承氣湯。証脈滿甚而氣不外發。故無發熱。汗出。小便數等之証。比大承氣湯未熱實。故不譟語。二便秘閉不硬。無燥屎也。

脫滿字

厚朴七物湯。表裏有病也。

治厚朴三物湯症而有外証者。其証曰脈。是水氣之滿也。厚朴三物湯主之也。曰發熱。脈浮數者。是外証也。桂枝湯主之。曰飲食如故者。示非內攻發熱也。

小承氣湯。裏病也。

治水聚于腹。氣急未熱實者。其証曰腹大。滿。曰噦。是水聚于腹之証也。曰發熱。曰汗多。曰小便數。是氣急之証也。曰大便溏。曰下利。曰脈滑而疾者。是未熱實之証也。此

噦出胃中噦
出心

方之症。或大便硬。或譫語者。非由熱實所致。以氣急水外出也。故有汗多小便數等証也。

大承氣湯 從裏內攻也。

治水滯而實熱者。其証曰。短氣。腹滿而喘。曰腹滿痛。曰喘。胃不得臥。曰腹脹。不大便。曰胸滿。是皆水滯之証也。曰潮熱。大便微硬。曰燥屎。曰直視。譫語。曰目中不了了。睛不和。曰口乾。咽燥。曰口噤。是皆熱實之証也。

瀉心湯 內病也。

治心氣鬱滯者也。其証曰。心下痞。是心氣鬱滯之証也。曰梅之滯者。非水結。非血凝。示氣鬱滯也。鬱氣劇。則致吐血。衄血也。

附子瀉心湯 同上。

治瀉心湯証。而虛狀者。其証曰。復惡寒。是虛狀。而非外襲之惡寒也。

大黃附子湯 裏病也。

治飲水留滯。而血氣外奔者。其証曰。脇下偏痛。是飲水留滯之証也。曰奔豚。脈緊強。

者血氣外泄之証也。凡附子之証而兼此者，汗不出也。

大黃甘遂湯 裏病也。

治少腹結水者，其証曰：少腹滿如敦狀，是結水血之証也。凡水血俱結者，按之不可近也。曰：小便難而不渴者，示為水結也。小。唯有水涸而致者，何以別之？水涸者，當渴，今不渴，以知為水結也。

抵當湯 內病也。

治瘀血冒心者，少腹硬滿，小便不利者，水

既便字

也。小便自利者，是瘀血也。曰：發狂，曰喜忘者，是血冒心也。曰：大便易，其色必黑，曰消穀善餓，是瘀血之証也。

下瘀血湯 裏病也。

治瘀血也。其証曰：腹中痛，曰經水不利，異於抵當湯者，以病在裏，不發狂，不喜忘，腹中痛，少腹不硬滿，是其別也。

土瓜根散 表裏之病也。

治經閉也。其証曰：經水不利，少腹滿痛，是經閉之証也。曰：滯下者，血滯之血變為白

体
脱下字

六

物而下或所滯之經水再見也經閉者身
林肥滿痛而不硬也瘀血者身体瘦少腹
滿白物不經不再見是其別也白陰癰腫
者血滯於陰也

大黃牡丹湯 自裏而及內也

治血滯而為熱外者水者其証曰少腹腫

痞以有水也按之則痛如麻者是血滯也

曰桑熱自汗出者為熱也此方鼓脹青筋

出者小便快利則愈

桃仁承氣湯 內病也

淋
恐晚用於二字

治內有熱血上攻者其証曰如狂是血上
攻之証也曰急結者以有熱故也此方用
於胞衣不下者治効也

調胃承氣湯 內病也

治熱實迫于心者其証曰譫語曰莖々

熱是熱實之証也曰心煩曰箭々微煩是

迫于心也其劇者大便溏或下利或腹微

滿或脹滿是以血氣迫于心而腹中之不

能消仁也

大黃甘草湯 同上

仁恐化字

恐裏字

治熱氣實上攻者其証曰食止即吐者以
熱氣上攻也大便當不通矣

大黃硝石湯 裏病也

治痰熱在裏表解裏未解者其証曰黃疸
痰熱在裏也曰腹滿小便不通是利未解
也曰自汗出是表已解也異於茵陳蒿湯
者汗出與不出也

橘皮大黃朴硝湯

治宿食在胸中者凡有宿食者心惡食在
胸中則胸中必痛在腹中則腹中必痛劇

甘草湯 則吐下手足厥冷也
裏病而迫于上也

治氣逆而急迫者少陰病者氣逆之狀也
曰咽痛者是急迫也

桔萸湯 同上

治血凝氣逆而急迫者其証曰咽痛曰肺
癰振寒脈數咽乾者是血凝氣逆而急迫
之証也咽痛者甘草湯桔萸湯以何別之
桔萸湯証劇則腫痛甘草湯証雖劇不腫
是其別也

排膿湯、同上

治枯蕒湯証而作膿者其証關方名可考諸癰之類用此方可也

芍藥甘草湯裏病也

治血滯氣急而不能循者其証曰脚掣急是其候也

芍藥甘草附子湯表病也

治血氣急而氣脫血滯不能循環者曰癉汗者示血氣急也曰惡寒者氣脫血滯不能循環也

甘遂半夏湯裏病而在心下也

治血氣急而心下有留飲者其証曰自利此血氣急之候也曰心下續堅滿者是留飲之証也雖半夏治留飲堅滿之水結實所致非甘遂力不去也

甘麥大麥湯內病也

治血氣逆而氣迫於心者其証曰薇躁者氣逆之証也曰喜悲傷欲哭者是迫於心之候也

甘草粉蜜湯同上

治血氣逆而血攻心者其証曰吐涎是血
氣逆也曰心痛者是血攻心之候也
生薑甘草湯裏病也

治涎沫留滯血氣迫津液脫者其証曰咳
唾者涎沫留滯也曰咽乾而渴者是血氣
迫而津液脫也

甘草乾姜湯裏病也

治血氣上逆甚者其証曰眩曰咽乾煩躁
是氣上逆也曰多涎沫者氣不循環而涎
沫聚也曰厥者氣逆甚也曰遺尿小便數

者氣上逆不能循環也
乾姜附子湯同上

治血氣脫不能循環者其証曰晝日煩躁
是欲循不能循也曰不得眠夜而安靜者
血氣脫也曰不吧不渴無表症者明不外
襲也曰下之後復發汗者示所以血氣脫
也不曰發汗下之後復發汗者示初雖下
之以復發汗水血不下陷也此方有附子
無甘草以氣脫而不逆也其証不得眠而
無下利咽乾吐逆遺尿小便數等之逆狀

必恐心字
本下恐脫湯字

也

四逆湯

裏病也

治血氣逆而外行水下降者其証曰四支厥曰厥冷是血氣逆也曰榮熱頭痛曰身作疼痛是血氣外行也曰下利曰下利清穀是氣逆甚而水下降之証也黃芩同治下利其異者必氣鬱滯而所致也故曰痞硬曰喘曰煩表不見熱身不疼痛是其別也

通脈四逆湯

同上

治本方証而外行甚者此証下利則必清穀是氣逆甚也曰手足厥而不曰冷曰汗出是外行甚也厥未已而冷自復脈欲絕是篤劇之証也

四逆加人參湯

治四逆湯証而氣不循血滯者其証曰脈微而利者是氣逆而不循也曰利止者氣已循之証也氣循則惡寒當止而不止者是血滯也

茯苓四逆湯

治四逆湯証而水滯於血分者其証曰煩躁者水滯於血分也煩躁者有血滯而所致者何以別之其病不劇則他無兼証別之無由故以燒針與下之別其病理也此方之証劇則當有肉瞤筋惕或振之搖或身重或心下悸或滿小便不利等之証也通脈四逆加豬膽汁湯治通脈四逆湯証而血氣迫于心者此方証關當有乾嘔心煩之証也是血氣迫于心也

白通湯裏病也

治氣不循而水下降者其証曰少陰病脈微者是氣不循也曰下利者是水下降也此病無水血滯故不版痛也

白通加豬膽汁湯

治本方証而氣迫於心者其証曰乾嘔煩者是迫於心也

附子粳米湯裏病也

治水氣逆遂外行不得循環版中寒有留飲者其証曰氣脹是氣外行也曰腸中寒

者。氣不得循環也。曰雷鳴。胸脇逆滿者。是水氣逆也。曰呃吐者。有留飲也。胸脇滿異於柴胡湯者。不痞不硬。無寒熱之變也。雷鳴異於半夏瀉心湯者。不痞不硬。無乾噫心煩等之証。是其別也。

附子湯 外侷病也。外症而在于侷也。

治血氣不循者。其証曰惡寒。曰手足寒。曰身侷痛不疼不熱。是血氣不循也。証也。曰真武湯。病裏也。

治氣不循而水留滯者。其証曰腹脹。曰下

利。曰振々欲擗地。是氣不循也。証也。曰小便不利。曰沉重。曰咳。曰悸。曰瞤動。是水留滯之症也。

大烏頭煎 裏病也。

治腹中血氣不循環者。其証曰遠脘痛。曰手足厥冷者。是血氣不能循環之証也。曰自汗出者。示水滯也。

烏頭湯 表病也。

治表水滯而血氣不循者。其証曰疼痛。曰絞痛。汗不出者。是表水滯也。曰不可屈伸。

曰拘急不得轉側曰手足厥逆者是血氣不循之証也

薏苡附子散 裏病也

治胸中水血俱滯氣不得循者其証胸下胸病當喘息咳唾是水滯而氣不行之証也又當胸痛是血滯証也病有緩急者血氣為主也

薏苡附子敗醬散 同上

治腸中有癰膿皮膚無津液者其証曰身甲錯是無津液也病名曰腸癰則腸中有

膿可以知也

赤丸 病裏也

治心下有水而氣逆者其証曰厥逆是氣逆之証也心下有水之証關當有吐而心下悸或滿之証也

天雄散 裏病也

治氣不循而失精者証關

梔子豉湯 裏病及於心也
治氣迫于心中或外熱者其証曰心中懊憹是氣迫于心也曰煩熱曰身熱是氣急

外推也。曰虛煩。曰心下濡者。是示氣獨迫。而水血凝也。結胸証。而心中懊懣者。水主而氣不為主也。此非梔子証也。結胸者。心下硬痛。而身無推。頭汗不出也。此湯之証。頭汗出。身有推。心下不硬。不痛。是其別也。

梔子甘草豉湯。治本方之証。而血氣逆者。其証曰少氣者。是血氣逆也。

梔子生薑豉湯。治本方之証。而水氣逆者。其証曰吧。是水

更可有心煩之字。

也。氣逆也。此吧非留飲所致者。故不加半夏也。

梔子乾姜湯。裏病而及于外也。

治氣逆迫于心。而外行者。其証曰微煩。是氣逆迫于心也。曰身推不去者。是氣外行也。凡梔子之証。身推則不心煩。則不推也。

此微煩者。乾姜之與所也。

枳實梔子豉湯。裏病而在于心。胸也。

治本方之証。而胸間水結者。証闕當有胸滿之証也。

以于之間當有脫字

梔子厚朴湯

治水氣在腹而上攻于心者其証曰腹滿起臥不安者是水氣在腹之証也曰心煩者是上攻于心之証也以于癉熱不見黃色也

梔子大黃豉湯

治本方証而水結癉熱者其証曰黃疸曰熱痛者是水結癉熱之証也異於茵陳蒿湯者熱痛而不渴慎懷而不眩是示為水結也

茵陳蒿湯 裏病也

治水滯在腹而癉熱者其証曰小便不利曰腹微滿是水滯在腹之証也曰頭眩曰發黃曰頭汗出曰渴而引水漿者是癉熱之証也癉熱者不發熱身無熱也

梔子蘘皮湯 外行病也

治癉熱外發而無裏証者其証曰身黃發熱是癉熱外發也以其未解也汗不出黃不去也

大陷胸湯 裏病也

治水血俱結在胸而熱實者其証曰結胸
曰短氣曰心下硬滿而痛不可近者是水
血結在胸之証也曰熱實曰潮熱曰心中
懊懣者是熱實之証也結胸者熱外不見
頭汗不出也熱在表而或頭汗出者血氣
外榮之狀而非結胸之証也

十棘湯裏病也

治水結在心下而血氣急者其証曰心下
痞硬滿引脇下痛曰短氣曰咳者是水結
在心下之証也曰欬々汗出者曰頭痛曰

脈弦曰胸中痛者是血氣急之証也
瓜蒂散裏病也

治水在胸中而血氣逆者其証曰胸中痞
硬曰脈乍緊者是水在胸中也曰氣上衝
咽喉不得息者曰手足厥冷曰心中滿而
煩者是血氣上逆症也此病異於大陷胸
湯故不結胸不熱實也異於十棗湯者血
氣不急也

小陷胸湯裏病也

治痰飲在胸而氣鬱滯血不結者其証曰

按之則痛脈浮滑者是血不結之症也以
血氣不結水氣不逆知為疼飲也

栝呂薤白白酒湯

治疼飲停滯血氣不能行者其証曰喘息
咳唾者疼飲停滯之証也曰胸背痛者是
血不能行之証也結胸與胸痹何以別之
曰結胸者血氣結實而無急狀故胸背不
痛無喘息咳唾之証也

栝呂薤白半夏湯

治白酒湯劇病而迫于心者其証曰不得

病恐症之誤

臥是示其劇也曰心痛者是迫于心之証
也

枳實薤白桂枝湯 裏病也

治胸中水閉氣逆氣攻心者其証曰胸滿
是水閉氣逆証也曰逆搶心者是逆氣攻
心之証也曰心中痞者示氣獨逆而水不

攻心也

桂支枳實生薑湯 裏病而迫于心也

治氣逆而水迫于心者曰諸逆者示氣逆
也曰心懸痛者水迫于心之症也曰痞攻

此痛在痛當知非於血也

枳實芍藥散 裏病也

治水閉氣而氣急者其証曰煩滿者水閉
氣之証也曰腹痛者是血氣急也証也

排膿散 裏病也

治下部有腫膿而水閉氣者証闕

枳水湯 裏病也

治水在下心下而閉血氣者其証曰心下堅
者水閉血氣之証也異於桂枝姜棗草黃
辛附湯者心下自初堅而無表証也

橘皮枳實生姜湯 裏病而在胸者

治胸中水閉氣而逆者証闕

茯苓飲 裏病也

治胸中有痰飲而血氣急者其証曰心胸
間有停痰宿水自吐出水或滿不能食是
有痰飲之症也吐出水者是血氣急也其
症疑似於茯苓泔瀉湯少異者吐水不渴
心下滿痛腹中不痛也

橘皮湯 裏病也

治水氣逆而血氣不循者其証曰乾嘔噦

是水氣逆之証也。曰手足厥者，此血氣不循也。

橘皮竹茹湯

治水氣逆而血氣急者，其証曰噦逆者是。水氣逆之証也，血氣急之証，關此湯之証。疼飲迫于咽喉而喘息咳唾也。

大羊復湯 裏病也

治血氣急而心下有留飲者，其証曰吧。是有留飲也，曰吐者，思下痞硬者，是血氣急之劇証也。

小羊復湯 上同也

治心下有留飲而氣逆者，其証曰吧。不渴者，有留飲之症也。凡有表証而吧者，氣逆之証也，非羊隻之治也。小羊復湯吧而不吐者，多病毒在心下，故食不得下也。大羊隻湯者，必吐，病毒在腹，故食得下而後吐，是其別也。

小羊隻加茯苓湯

治苓方証而水氣迫於血分者，其証曰眩。特是水氣迫於血分之証也。

生薑羊隻湯 裏病也

治氣逆劇而留飲少者其証曰心煩憤々然無奈者是氣逆劇之証也似喘不喘似吧不是留飲也故也此方生薑主而羊隻為佐小羊隻湯羊隻主而生薑為佐也生薑主治氣逆羊隻主治留飲不可不知也

羊隻苦酒湯 裏病也

治血氣急而咽中有疼飲者其証曰咽中生瘡曰不能語言者血氣急之証也曰声不出者有疼飲也

羊隻厚朴湯 同上

治咽中有疼飲而氣不得循者其証曰咽中如有炙膚是有疼飲也

厚朴生薑甘草羊隻人參湯 同上

治血氣外行腹中有留飲不能消化者曰發汗後者示血氣外行也曰腹脹滿者氣外行留飲不消化也

羊隻乾姜散 同上

治氣逆吐涎沫者其証曰乾吧吐逆是氣逆之証也乾吧而不吧吐涎沫不吐飲食

是氣逆而迫於胸所以用散也

乾姜人參半隻丸

治有留飲血氣急而吐飲食者其証曰呃
是有痰飲也曰妊娠曰呃吐不止者是血
氣急也半隻乾姜散者其病在胸故作散
服之此病在腹故作丸用之是在散之別
也

半隻瀉心湯裏病也

治心下氣鬱滯有留飲者其証曰心下滿
曰心下痞者是氣鬱滯之証也曰呃而腸

鳴者是有留飲之証也此病人心下硬則
必致下利也

甘草瀉心湯同上

治本方証而血氣逆劇者其証曰心下痞
硬是氣逆而血凝也曰下利曰乾呃心煩
不得安者是血氣逆劇之証也心下硬水
與血何以別之水也者或滿痛或短氣腹
中不雷鳴也血也者腹中雷鳴不滿痛不
短氣是其別也

生姜瀉心湯

治本方証而血凝水氣逆劇者其証曰心
下痞硬是血凝之証也曰乾噫食臭曰腹
中雷鳴曰下利是水氣逆之劇証也
以上三方有小柴胡湯之別小柴胡湯者
水氣為主也改作寒熱胸脇作滿不雷鳴
不下利也瀉心者水氣為主故心下痞硬
水下降也作雷鳴作下利胸脇不滿不往
來寒熱是其別
吳茱萸湯自內急胸外也
治血氣俱從腹迫於上者其証曰食穀欲

嘔曰吐利者是血氣俱從腹迫於上証也
曰頭痛曰胸滿曰煩躁是血氣迫於上之
証也

黃連湯裏病也

治胸中氣鬱血氣逆而心下有留飲者其
証曰胸中有熱者是氣鬱結有熱也非外
者熱也黃連治之曰飲吧者是留飲也曰
腹中痛是血氣逆也者小建中湯小柴胡
湯之別疑途小柴胡湯者吧而不吐血氣
逆而有留飲也小建中湯不吧不吐血氣

一急而無留飲也。此湯証。欲嘔吐者。是血氣逆留飲為主。是其別也。

乾姜黃連黃芩湯 內病也。

治血氣逆迫於心者。其証曰。食入口則吐。是血氣逆迫於心之証也。曰自寒下者。示血氣逆也。

黃連阿膠湯 同上。

治心中氣鬱血滯者。其証曰。心中煩。是氣鬱之証也。曰不得臥者。以血滯也。

白頭翁湯 裏病也。

治鬱熱逐水而通利者。其証曰。熱利下重。是熱逐水也。下利與熱利自有別也。熱利者。熱逐水而通利。故下利後。益下重也。其通利者。水自如。熱湯其輕者。不熱。何以知之。欲飲水者。是有熱也。

白頭翁加甘草阿膠湯

治本方証而下血。心中氣逆者。其症關。此方當有下血。心煩。不得眠等之証也。

黃芩湯 裏病也。

治血氣鬱滯而不循環者。曰少陽者。口苦。

一明乾目眩是血氣鬱滯也曰自利者是血
氣不循環之証也

黃芩加半反生薑湯

治本方証而有留飲者其証曰吧是有留
飲也

六物黃芩湯裏病也

治血氣上逆有留飲而不循環者其証曰
乾吧是血氣上逆也曰下利是氣不循環
也其異於黃芩加半反生薑湯者乾吧而
不吧或心下痞硬或外熱是其別也留飲

之証闕當有吧吐

三物黃芩湯裏病也

治血脫氣鬱而熱者其証曰婦人在草蓐
者示血脫也曰四股苦煩熱者氣鬱而熱
也煩熱者所謂虛熱而非實熱故攻於四
股則在手裏足心也若頭痛者邪氣外襲
而所致頭痛主而煩熱為客故以小柴胡
湯逐外襲之邪則煩熱自治也頭不痛煩
熱者氣獨鬱也此方主之

朱防已湯同上

治心下血凝氣不得循有水飲者其証曰
心下痞堅者血凝之証也曰痞者氣不得
循也曰喘滿者有水飲也

木防已去石膏加茯苓芫硝湯

裏病及于內也

治本方証而熱實水急迫者當有熱實之
証口舌乾燥或譫語是其候也水氣急迫
則當有短氣或心下滿或悸等之証

防已茯苓湯 裏病也

治水在皮膚血氣不循者其証曰水氣在

皮膚中身不腫而四肢先腫者水之証也
曰四肢羸々動者水在血分也
治者身先腫而迫四肢其病雖劇無羸々
動之狀是不迫血分也

防已黃耆湯

治氣不循水滯而血氣急者其証曰脈浮
汗出曰頭汗出者是血氣急之証也曰身
重曰下重曰腫及陰者是氣不循而水滯
也其異於防已茯苓湯者水不迫血分故
脈浮汗出也凡黃耆之水在上閉氣故作

熱防已之水在下。氣不循而水滯，故不熱也。產黃主水，防已主氣也。

桂枝茯苓丸 裏病在下部也。

治少腹血凝，氣上逆者，其証曰癥^癥病者，示有凝血也。曰得漏下者，氣不^下接也。當有逆上証，嗣矣。

芎藭膠艾湯 裏病而在中也。

治氣不循，血自下降者，其証曰漏下。曰下血，是血自下降之証也。

旋覆花代赭石湯 裏病在^下也。

治心下血凝滯，氣不循而有留飲者，其証曰心下痞硬，是血凝之証也。曰噫氣者，氣不循有留飲也。

赤石脂禹餘糧湯 裏病在下也。

治膈下血滯，水不行者，其証曰下利不止，是水不行也。當有膈下痛之証，是水血滯也。曰當利其小便，則小便不利，証脫也。明矣。

枳實芍藥湯 裏而在中部也。

治血滯，氣不循，水血自下者，其証曰腹痛。

是血滯也。下利者，氣不循，水自下，降者也。
便膿血者，滯血自下也。

酸棗仁湯 內病也

治血虛氣急者，其証曰：虛煩不得眠，是血
虛氣急之症也。梔子豉湯同，其証候此方
者，血虛氣急也。梔子豉湯者，由汗吐下，津
液脫，氣急也。

葶歷大麥湯 裏病而在上部也

治水在胸間，氣急者，其証曰：喘曰胸滿，脹
是水在胸間之証，曰不得臥，曰迫塞，曰不

得息，是氣急迫之証也。

廣子仁丸 裏病也

治氣盛逐水，而津液竭者，其証曰：小便數
是氣盛逐水也。曰大便硬，是津液竭之症
也。其異於小承氣湯者，不作熱狀也。

已椒歷黃丸 裏而在腹也

治腹有水，而氣不行，作熱者，其証曰：腹滿
是腹有水，而氣不行之候也。曰舌乾燥
者，是有作熱之証也。承氣湯症而腹滿者，
喘而不乾燥，是其別也。

桔萸白散

病在胸也

治咽中血凝結作腫膿或血氣急而有疼
飲者其証曰振寒曰咽乾是血凝結之証
也曰腥臭吐膿是腫膿也曰咳胸滿唾濁
者是疼飲之症也

走馬湯

裏病也

治胸版有水而氣急攻於心者其証曰版
脹大便不通者是胸版有水而氣急也曰
心痛是氣攻於心也
備急圓 內病也

其不脫

消菴散

裏病也

治心版水滯氣急者其曰心版脹滿是水
滯也曰卒痛者氣急甚也較於走馬湯其
病尤深故曰心版也
治有瘀血而熱實者其証曰日晡所發熱
曰發黃色是熱實之症也曰惡寒少腹滿
大便必黑者是瘀血之証也

黃土湯

裏病也

治氣逐血者其証曰下血又曰吐血衄血
是逐血之証也化治吐血衄血之方者不

能治下血治不血之方者不能治吐血衄血此方有兩治之功也

當飯芍藥散 同上


治腹中血滯氣急者其証曰腹中病痛是血滯氣急之証也當飯建中湯雖同其証所在少異當飯建中湯病自下起故有脚掣急或引腰背痛之証此方之病自腹起而迫於胸背故胸背強痛而無掣急腰痛之証是其別也

當飯四逆湯

治四肢血滯氣逆者其証曰厥寒是血滯氣逆之証也

當飯四逆加吳茱萸生姜湯

治本方証而氣逆劇者其証曰當有吐利之証也



[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '大', '小', '湯', '散', '飯', '毒', '心', '胃', '紅', '花', '劉', '奇', '奴']

大寧心湯

知母 石羔 大黃 黃連 茯苓

竹筴 粳米

又方大黃湯

大黃 當飯 細辛 人參 甘草

生薑

救逆湯

桂支 蜀漆 皂角 牡蛎 大棗

耳中 生薑

平胃散加大黃 食毒又加柴

實 桑毒加山 厘子 懷 痛加良姜

方朴 芍藥 木 藤皮 甘草

赤小豆湯

赤小豆 高麗

圭支 麻黃 大黃 反 梟 耳中

或八五 梟宗 加 輕 姜

槐花 解 毒 湯 槐花 大黃

連翹 凍皮 蒼木 枳實 茯苓

劉壽 奴 湯 劉壽 奴 黃 伯

山 梔 子 滑 石 木 通 大 黃

大 解 毒 湯 大 黃 木 通

葱 黃 川 芎 耳 中 奇 良

救 毒 飲 香 附 子 香 附

方 藥 附 子 枳 亦 吳 茱 萸

枚原星山

