

漢書門  
 類號函架冊  
 一三〇八〇八  
 一三〇


內閣文庫  
 漢書  
 類號冊架  
 一三〇八〇八  
 一三〇

|      |            |
|------|------------|
| 內閣文庫 |            |
| 番號   | 漢 12608    |
| 冊數   | 160 ( 81 ) |
| 函號   | 300 211    |





|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 陸奥 | 信濃 | 武蔵 | 上野 | 下野 | 常陸 | 美濃 | 尾張 | 越前 | 加賀 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |
| 陸奥 | 信濃 | 武蔵 | 上野 | 下野 | 常陸 | 美濃 | 尾張 | 越前 | 加賀 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |
| 陸奥 | 信濃 | 武蔵 | 上野 | 下野 | 常陸 | 美濃 | 尾張 | 越前 | 加賀 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |
| 陸奥 | 信濃 | 武蔵 | 上野 | 下野 | 常陸 | 美濃 | 尾張 | 越前 | 加賀 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 | 群馬 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 神奈川 |



重校聖濟總錄卷九十四

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

諸疝門

寒疝

心疝

厥疝

寒疝心腹痛

寒疝積聚

七疝

蠱病

陰疝門

陰疝

卒疝

陰疝腫繡

陰疝腫痛 控舉

諸疝統論

論曰疝者痛也陰氣積於內復為寒氣所加使榮衛不調血氣虛弱故風冷入腹而成疝也或少腹痛而不得大小便或手足厥繞臍痛白汗出或冷氣逆上搶心令腹心痛或裏急腹痛又有五疝七疝其證非一故云諸疝當診其脉弦而急者是謂疝也皆由腑臟虛弱飲食不節血氣不和寒溫不調之所生也

寒疝

論曰寒疝為病陰冷內積衛氣不行結於腹內故遇寒則發其狀惡寒不欲食手足逆冷繞臍白汗出痛

蓬莪茂湯方 治寒疝四肢逆冷氣弱汗出

蓬莪茂一兩 乾薑半兩 附子去皮臍一兩 芎藭三分

桂一兩 白朮三分 檳榔一兩 芍藥一兩

右八味剉如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時

木香湯方 治寒疝攻注脇滿痛汗出

木香 檳榔 細辛 赤茯苓 人參 芍

藥 當歸切 桂去麤皮 前胡 青橘皮湯浸去白

焙各一兩

右十味搗篩每服三錢水煎溫服不拘時

烏頭湯方 治寒疝手足逆冷身體疼痛冷汗出

烏頭去皮臍 桂一分 細辛三分

右三味剉如麻豆每服三錢水

溫服

茱萸湯方 治寒疝來去腰腹攻

吳茱萸湯焙炒 生薑切焙 豉

桂各半兩

右四味搗篩每服三錢酒少許同煎溫服不拘

人參湯方 治寒疝冷痛氣弱汗自出不欲食

人參 白茯苓各一分 蜀椒去目炒 乾薑各半兩 附

子去皮臍 檳榔 青橘皮湯浸去白 白朮各一兩

右八味剉如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時

走馬湯方 治寒疝亦治陰疝

巴豆二枚去皮心膜炒 杏仁二枚去皮尖雙仁炒

右二味取綿裹椎令極碎投熱湯二合絞取白

汁服之未差更一服

牡丹丸方 治寒疝來去疼痛冷汗出

牡丹皮 桂 各一兩 烏頭 去皮臍二枚

右三味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十丸溫酒下空心日午臥時一服

桂心丸方 治寒疝胸脇肢滿食不化飲不消臍

腹疼痛

桂心 去麤皮五分 吳茱萸 湯洗焙乾炒三兩 白薇 一分 乾

薑 一兩 烏頭 去皮臍半兩 芎藭 一兩 蜀椒 去目并閉口者

炒出汗三分 防葵 半兩 白芷 三分

右丸味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十丸溫酒食前下

烏頭湯方 治寒疝滿逆手足不溫徧身疼痛

烏頭 塗大者五枚去皮尖生用 白蜜 一斤 桂心 二兩

右三味先以慢煎蜜及烏頭候蜜減半去烏頭

別就一處以水三盞煮桂候減半濾去桂將桂

汁共和別煎取二盞許服時每用半盞溫服未

知再服其知如醉狀得吐為中病也

木香丸方 治寒疝繞臍痛結硬不消

木香 附子 去皮 飛過各一兩 礞砂 一兩

右三味為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下空心食前服

高良薑湯方 治寒疝卒痛積聚不散上衝心胸與陰相引痛則汗出

高良薑 檳榔 木香 當歸 各一兩半 吳茱萸

炒一兩

右五味搗篩每服三錢水煎溫服

心疝

論曰內經謂診得心脉而急病名心疝小腹當有形也心為牡藏小腸為之使故曰小腹當有形也臟病必傳於腑今心不受邪病傳於腑故小腸受之為疝而痛小腹當有形也世之醫者以疝為寒濕之疾不知心氣之厥亦能為心疝心疝者當兼心氣以治之

木香散方 治心疝心痛悶絕

木香 陳橘皮 炒各一兩 高良薑 乾薑 訶梨 勒皮 枳殼 赤芍藥 赤茯苓 各半兩 草豆

菝 芎藭 牽牛子炒各三兩

右十一味搗羅為散每服二錢水煎溫服不拘時

當歸湯方 治心疝心痛虛冷煩悶

當歸 乾薑 赤芍藥 黃耆 蜀椒去目

人參 半夏為末薑汁作餅子焙乾 附子去皮臍 青橘皮

去甘草炙各一兩 厚朴薑汁炙二兩 桂心半兩

右十二味咬咀如麻豆每服三錢水煎溫服不拘時候

牡丹丸方 治心疝心痛如錐所刺

牡丹皮 桂心 芍藥 烏頭去皮臍 細辛

甘草炙 木香 吳茱萸湯浸焙乾 檳榔各一兩

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下不拘時候

木香散方 治心疝心痛不可忍

木香 羌活 檳榔 牡丹皮 當歸 桂

心煨各一兩 青橘皮 蓬莪茂煨各一兩

右八味為散每服二錢沸湯或溫酒調下不拘



時候

芍藥丸方 治心疝心痛及繞臍痛

芍藥 桔梗 細辛 蜀椒去目 桂心 乾

薑各三分 附子去皮臍半兩

右七味擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或米飲下

蓬莪茂煮散方 治心疝心痛肢體虛冷

蓬莪茂 檳榔 附子 甘草炙 桂心各一

兩胡椒半兩 芎藭 白朮各三分

右八味擣羅爲散每服二錢水煎溫服

橘皮益智湯方 治痼冷在內陰氣交攻心痛如

刺

青橘皮去白 益智去皮 烏頭去皮臍 威靈樞各一

兩去土

右四味剉如麻豆每服三錢生薑三片鹽少許同煎溫服食前日三

紫桂丸方 治陰冷交攻心疝疼痛

桂心半兩 當歸三分 吳茱萸炒一兩

右三味爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十丸炒生薑鹽酒下米飲亦可日三

三溫散方 治心疝冷痛不可忍

附子

蓬莪茂

各一兩 胡椒半兩

右三味爲散每服一錢熱酒調下婦人醋湯下

厥疝

論曰內經謂黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝藏疾隱而難見陰沈而伏也今脾虛風

寒客於腹膜之間不能與胃通行水穀之氣結而成積使氣道厥逆而痛故謂之厥疝也

吳茱萸湯方 治厥疝腹中陰冷痛積氣上逆

吳茱萸

炒二兩 烏頭

去皮 細辛

各三分 高良薑

當歸

乾薑

桂心

各一兩

共七味剉如麻豆大每服五錢水煎溫服日二

藿香丸方 治厥疝上攻腹痛無時

藿香子

吳茱萸

炒

桂心

胡椒

棟實

麩炒

延胡索

各半兩

蜜蟲

去翅足

芫花

醋炒焦

硃砂

研 木香 海蛤 木通 各三分

右十二味擣羅爲末酒煮麩糊丸如梧桐子大  
每服十丸鹽酒下食前服

山茱萸丸方 治厥疝上攻心腹冷痛

山茱萸 吳茱萸 炒 食茱萸 楝實 炒

馬蘭花 懷香子 青橘皮 橘紅 去皮白焙 三

稜 乾薑 各三分 附子 一枚重半兩者去皮臍

右十一味擣羅爲末醋煮麩糊和丸如梧桐子  
大每服二十丸酒或鹽湯下空心服

當歸湯方 治厥疝腹中冷痛

當歸 乾薑 附子 人參 甘草 炙 細

辛 去苗葉 芍藥 各一兩

右七味咬咀如麻豆大每服三錢水煎溫服不  
拘時候

木香湯方 治厥疝逆上攻腹冷痛

木香 檳榔 烏頭 細辛 當歸 吳茱

萸 炒 枳殼 炒 麩 甘草 炙各一兩

右八味咬咀如麻豆大每服三錢水煎溫服

細辛丸方 治厥痲冷逆上攻心腹痛

細辛 芍藥 吳茱萸炒 人參 白朮

桂心 乾薑炮 甘草炙 當歸 附子去皮

臍各一兩

右十味擣羅為末稀麩糊丸如梧桐子大空心米飲下三十九日二

寒痲心腹痛

論曰痲者痛也本緣寒氣內積陽衰陰盛不得散釋寒邪因得攻擊或上搶心或腹內疼刺發即俱

痛故名寒痲心腹痛也

人參湯方 治寒痲心腹痛胸脇支滿不下食汗

出嘔逆

人參 白茯苓 檳榔 木香 芍藥 芎

藟 當歸 桂心 青橘皮去白各一兩

右九味每服三錢水煎溫服不拘時

柴胡湯方 治寒痲心腹痛

柴胡四兩 大棗去核六枚 黃芩 人參 甘草炙

半夏薑汁炙去滑 桂心 芍藥各一兩半

右八味每服三錢生薑一棗大同煎溫服

吳茱萸丸方 治寒疝心腹痛或逆搶心煩滿不  
得臥惡風驚惕不食變發寒熱

吳茱萸炒一兩 細辛 芍藥 柴胡 旋復花

黃芩 紫苑石 人參 白朮 白茯苓

乾薑 桂心 附子去皮 甘草炙 半夏

湯浸七 當歸切焙各

右十六味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服  
二十丸至三十丸溫酒下不拘時

椒胡湯方 治寒疝心腹痛不可忍

蜀椒去目炒 附子一枚去皮 粳米半 乾薑半

半夏湯洗七偏去滑 甘草炙一

右六味咬咀如麻豆每服五錢入生薑半分棗  
二枚同煎溫服

附子丸方 治寒疝心腹痛

附子去皮臍 桃仁去皮尖雙仁 蒺藜子炒去

右三味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸溫酒下不拘時

地黃湯方 治寒疝心腹痛汗出厥冷

生乾地黃

三兩

甘草

炙

白茯苓

人參

當歸

各二兩

羊肉

去脂切三觔

右六味前五味細剉將羊肉用水二斗煮取汁

一斗去羊肉入諸藥煮取七升入葱白一把棗

十四枚再煎取六升絞去滓溫服一盞不拘時

當歸湯方 治寒疝心腹痛裏急

當歸

三兩

生薑

五兩

羊肉

去脂膜切作片一觔

右三味以水一斗煮取五升去滓每溫服一盞不拘時日三夜一

寒疝積聚

論曰氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚蓋積者陰也陰沈而伏發積不離其部聚者陽也陽浮而動上下無所留止其痛無定處令人洒淅惡寒飲食不為肌膚或吐痢脹滿或心下如覆杯腹中如人臂所橫皆寒疝積聚之證也

桔梗湯丸方 治寒疝邪氣往來積聚不散多寒

不得臥苦汗出大小便不利等

桔梗炒半兩 葶藶子紙上炒一兩 杏仁去皮尖雙仁炒五十枚

人參 藜蘆炙半兩 厚朴薑汁炙一兩 附子去皮臍一兩

桂心去麤皮 沙參三分 特生礬石一兩燒半日許

右十味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸或七丸米飲或溫酒下日二

芫花丸方 治寒疝積聚大如鼈形小如杯狀乍來乍去腸胃脹滿寒則腸鳴心下寒氣上搶胸脇支滿

芫花醋炒 蜀椒去目及合口者炒出汗各一分 大黃炒一兩半 細

辛一兩半 桔梗炒一分 烏頭一兩 白茯苓 吳

茱萸湯浸焙乾炒 芍藥各三分 龍膽半兩 半夏湯洗七遍

去滑一分

右十一味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸米飲或溫酒下日三利下毒物為效

續命丸方 治寒疝邪氣往來厥逆心痛羸瘦少氣胸脇滿不嗜食

食茱萸二兩半炒 芍藥 細辛 前胡各一兩一分 乾

薑

烏頭

各二兩  
去皮臍

紫苑

去苗  
上

黃芩

白朮

白薇

芎藭

人參

生乾地黄

各一兩  
一分

蜀椒

去目

桂心

各二兩半

右十五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每

服七丸米飲或溫酒下

木香湯方

治寒疝積聚來去攻擊疼痛不欲飲

食

木香

訶梨勒皮

檳榔

厚朴

薑汁  
炙

青橘

皮

去白各半兩

白朮

人參

桂心

各一分

赤茯苓

三分

右九味搗篩每服三錢生薑三片同煎溫服不

拘時候

檳榔湯方

治寒疝積聚胸腹堅急脹滿不食

檳榔

桃仁

去皮尖  
雙仁

郁李仁

木香

京三

稜

各一兩

桂心

青橘皮

各一兩半

右七味搗篩每服三錢生薑三片同煎溫服不

拘時候

鼈甲湯方

治寒疝積聚心腹結痛飲食不下



鼈甲醋炙 京三稜 大黃炒一兩 當歸 赤芍

藥 桂心 木香 枳殼 訶梨勒皮 檳

榔各半兩

右十味搗篩每服三錢生薑三片同煎溫服不

拘時

白朮湯方 治寒疝凝結積聚不散攻注腹內疼

痛不下飲食

白朮二兩 赤茯苓 枳殼 人參 桔梗

桂心 京三稜 檳榔各一兩

右八味搗篩每服三錢水煎溫服

檳榔湯方 治寒疝積聚結塊攻注心腹脹滿

檳榔 芎藭 桔梗 當歸 桂心 白朮

赤芍藥 木香各半兩 大黃微炒一兩

右九味搗篩每服二錢水煎溫服

桂心湯方 治寒疝積聚心腹疼痛結塊不消

桂去麤皮 大黃 桔梗 附子去皮臍 木香

白朮 當歸 檳榔 赤芍藥各一兩 高良薑

芎藭 枳實各一兩半 麩炒

右十二味咬咀如麻豆每服三錢水煎去滓溫服不拘時

藜香子散方 治寒疝積聚臍腹疼痛兩脇脹滿

藜香子炒 檳榔 京三稜 青橘皮去白鹽炒

黃各一兩半 木香一分

右五味擣羅為散每服二錢入鹽少許沸湯點服不計時候

七疝

論曰疝病有七厥逆心痛足寒飲食則吐者名厥

疝腹中氣滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則腹中脇下盡痛者名寒疝腹中乍滿乍減而痛者名氣疝腹中痛在臍傍者名盤疝腹中痛在臍下有積聚者名附疝小腹與陰相引而痛大便難者名狼疝凡此七疝皆寒氣內積血氣凝澀不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難內經曰任之為病其內苦結男子為七疝女人為瘕聚蓋以此也  
椒薑丸方 治七疝諸寒在臍傍痛上胸中滿少氣



本草綱目卷之九十四 雜考 燕窩

蜀椒 去目并閉口炒 乾薑 厚朴 薑汁炙 烏喙

去皮臍 黃芩 細辛 芍藥 桂心 各一分 桔

一分 梗 炒五分 芫胡 白茯苓 牡丹皮 各一分

右十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或米飲下日三服

桃仁湯方 治諸疝

桃仁 去皮尖雙仁炒 吳茱萸 炒 陳橘皮 去白 海藻

洗去鹹 白茯苓 羌活 蒺藜子 炒去角各三兩

右七味每服三錢生薑一棗大同煎溫服

椒附丸方 治七疝或心腹厥逆不得氣息痛達

肩脊或心下堅痛手不可近或臍下堅痛得寒

冷食輒劇或脇下堅痛大如手或小腹脹滿引

膀胱急痛或女子月事不時

蜀椒 去目 桔梗 芍藥 乾薑 厚朴 薑汁炙

一兩 細辛 附子 各半兩 烏頭 去皮臍一分

右八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲或酒下日三服

蓬莪茂丸方 治七疝臍腹堅痛

重校聖濟總錄 卷九十四 諸疝門 七

蓬莪茂 木香 大黃炒 當歸 芎藭

京三稜 桂心 草豆蔻去皮 桃仁炒各肉

豆蔻三兩 乾漆炒令烟出一兩

右十一味擣羅為末醋煮麩糊為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或生薑湯下不拘時

厚朴丸方 治七疝肢體寒臍腹堅痛滿悶

厚朴薑汁炙 附子去皮臍 藜香子炒 白朮 桂

心 乾薑 枳殼 青橘皮 芎藭 烏頭

去皮臍 木香 當歸各一兩

右十二味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下薑湯亦可

蠱病

論曰經謂脾風傳之腎病名疝瘕小腹冤熱而痛出白一名蠱夫脾受風邪傳於腎經邪熱內爍故其證小腹冤熱而痛其精失守故其證洩出白液病名曰蠱以邪熱內爍其精不守久而弗治適以喪志也水之精為志志喪則精從之左傳謂惑以喪志為蠱者如此

大建中湯方 治蠱病小腹急痛便溺失精

黃耆 遠志 當歸 澤瀉 各三兩 芍藥 人

參 龍骨 甘草 炙各二兩

右八味剉如麻豆每服五錢生薑三片棗二枚

水煎溫服

澤瀉丸方 治蠱病小腹寃熱而痛精氣不守洩

便白出

澤瀉 補骨脂 炒 巴戟天 五味子 石

斛 芍藥 人參 甘草 炙各一兩

右八味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫酒或鹽湯下空心日午臨臥各一服

肉蓯蓉丸方 治蠱病小腹寃熱而痛便溺出白

肉蓯蓉 去皺皮酒浸切焙 白茯苓 黃耆 澤瀉

牡蠣 煨研 五味子 龍骨 當歸 各一兩

右八味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫酒下空心日午臨臥各一

慈石丸方 治蠱病小腹熱痛精液出白

慈石 火煨醋淬七遍 龍骨 各一兩 白茯苓 牡蠣 煨粉各二兩

兩

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下空心日午臨臥各一

乾地黄丸方 治蠱病精氣不守便溺出白小腹  
窕熱而痛

熟乾地黄

二兩

鍾乳粉

半兩

龍骨

菟絲子

酒浸一宿別搗

慈石

火煨醋淬七遍

芍藥

黃芩

各一兩

右七味搗羅爲末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服二十丸酒或鹽湯下

陰疝門

陰疝統論

論曰疝者痛也邪氣聚於陰至陰器腫大而痛者陰疝也一名癰疝其類有四卽腸癰卵脹氣癰水癰是也世俗云疝氣亦云小腸氣或曰膀胱氣原其病本緣腎氣通於陰與膀胱爲表裏胞囊者膀胱之候此二經不足下焦受寒皆能致陰卵腫大或發疝痛故通稱爲陰疝若寒濕之氣有連於小腸者卽小腹控睪而痛陰丸上下謂之腸癰寒氣

客於經筋足厥陰脉受邪脉脹不通邪結於陰卵  
 謂之卵脹腎虛之人因飲食不節喜怒不時津液  
 內溢下流於腎寒氣結聚不散謂之氣癩水氣盛  
 則津液內結謂之水癩水癩氣癩病生於標故鍼  
 灸可治其疾易愈腸癩卵脹病生於本邪氣入深  
 其治難差

陰疝

論曰黃帝鍼經曰足厥陰之脉環陰器抵小腹是  
 動則病丈夫癩疝即陰疝也嗜慾勞傷腎水涸竭  
 無以滋榮肝氣故留滯內結發為陰疝之病世俗  
 論陰疝者為腎餘氣殊不知邪實又本於肝經云  
 治法當瀉邪氣之實補肝經之虛

桃仁湯方 治陰疝牽引小腹痛

桃仁去皮尖 吳茱萸炒 陳橘皮去白 桂去

皮 海藻洗去鹹 白茯苓 蒺藜子炒去 羌

活各一 檳榔十

右九味搗羅為細末每服五錢生薑五片水煎  
 溫服不拘時候

蒺藜子湯方 治陰疝

蒺藜子炒去角 附子去皮臍 山梔子仁各一兩

右三味咬咀如麻豆每服五錢水煎溫服食前

服

沙參散方 治陰疝牽引疼痛

沙參 桂心 桃仁去皮尖雙仁研炒十四枚

右三味為散每服二錢溫酒調下

椒附丸方 治陰疝疼痛或上攻臍腹

蜀椒去目炒一兩 附子去皮臍 桂心 巴戟天 桃

仁去皮尖雙仁炒 芎藭 當歸各半兩

右七味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸空心日午夜臥酒下

昆布丸方 治陰疝腫大偏墜

昆布洗去鹹 海藻洗去鹹 蒺藜子炒去角 蕪荑仁炒

檳榔各一兩半 枳殼去瓢麩炒 大麻仁研各二兩 木香

黃耆剉 訶藜勒去核各三分 陳橘皮去白炒 桃仁

去皮尖雙仁炒 兔絲子酒浸一宿別搗各一兩

右十三味擣研為末和勻鍊蜜丸如梧桐子大



每服三十丸空心食前溫酒或鹽湯下

黃耆丸方 治陰疝氣攻腫痛

黃耆 桃仁去皮尖 雙仁炒 山茱萸 龍骨煨 蒺藜

子炒去角 檳榔各一兩 五味子二兩 海藻去鹹 元

參各一兩 肉苁蓉酒浸切焙 牛膝酒浸 白茯苓 枳

殼 人參 續斷 桂心各三分 遠志 石楠

各半兩

右十八味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心食前溫酒下

沙參丸方 治疝氣

沙參二兩 昆布洗去鹹 藁香子炒各半兩

右三味為末酒煮麩糊丸如梧桐子大每服二十丸空心食前溫酒下

二氣丸方 治陰疝上而不下臍腹疼痛

石硫黃研 黑鉛各一兩

右二味先以鉛於銚內鎔成汁次下硫黃炒煙焰透移下候冷取出研為細末糊和丸如梧桐子大每服三十丸酒下

木香丸方 治陰疝急脹疼痛卵腫

木香 陳橘皮 萊菔子炒 青橘皮去白

桂心各一兩 牽牛子炒二兩

右六味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十丸溫酒下以利為度

巴戟散方 治小腸疝氣

巴戟天 棟實取肉麩炒 木香 藁香子炒 附

子去皮臍各一兩

右五味擣羅為散每服一錢空心溫酒調下

棟實散方 治小腸疝氣

棟實取肉麩炒 藁香子炒 京三稜煨 蓬莪茂

煨

右四味等分為散每服二錢葱酒調下

葫蘆巴煮散方 治陰疝攻痛

葫蘆巴 沉香 馬蘭花 蓬莪茂煨 藁

香子炒各一兩半 棟實取肉麩炒 木香 薑黃 檳榔

劉桂心各一兩 附子去皮臍三分 甘草炙半兩

右十味擣羅為散每服三錢水酒同煎空心食

前溫服

葫蘆巴丸方 治陰疝氣攻疼痛

葫蘆巴 補骨脂炒 白豆蔻去皮 草薺

青橘皮 藜香子 附子去皮 肉蓯蓉酒浸

兔絲子 牛膝酒浸 桂心 防風各一兩

右十二味為細末酒煮麩糊丸如菉豆大每服二十丸空心生薑鹽湯下

藜香子散方 治小腸膀胱疝氣疼痛

藜香子炒 京三稜煨各一兩 薑黃 馬蘭花醋炒

各半 沒藥研 乾薑各一分

右六味擣羅為散每服二錢空心食前熱酒調下

芫花丸方 治小腸氣攻小腹疼痛

芫花醋炒 木通 青橘皮 胡椒 大黃煨

桂心各半兩 棟實四枚 藜香子炒三分

右八味為末酒煮麩糊丸如小豆大丹砂末為衣每服十丸至十五丸空心食前生薑熱酒下

應病丸方 治陰疝撮痛不可忍

韭子炒 芎藭

右二味等分爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

吳茱萸丸方 治寒陰疝腰腹痛不能飲食食

卽嘔吐寒熱往來

吳茱萸三分酒浸 半夏三分湯浸 細辛一兩

前胡一兩 紫苑一兩 乾薑三分 附子一兩

甘草半兩 人參三分 旋復花半兩 熟乾地

黃一兩 赤茯苓一兩 當歸三分 白朮一兩 赤

芍藥三分 桂心一兩 訶梨勒半兩 木香一兩

右十八味擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大食前生薑湯下二十丸

烏頭散方 治陰疝腰腹痛手足厥冷身體疼

川烏頭十枚去皮臍 桂枝二兩

右二味擣羅爲細散每服二錢入生薑半分下

蜜半合同煎食前溫服

烏頭丸方 治陰疝積聚繞臍腹痛

川烏頭一兩去皮臍 吳茱萸半兩湯浸七次焙乾微炒 甘草半兩

炙京三稜一兩 細辛半兩 郁李仁一兩 浸 去皮 桂

心一兩 藁本半兩 木香一兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯下

卒疝

論曰卒疝者謂腎臟虛弱之人形寒飲冷暴受邪氣傳入經脉蓋足少陰腎經與大腸膀胱二經合為表裏卒然感寒熱相薄則筋脉不得流通氣道結澀而脹滿攻牽臍腹引於陰暴發疼痛或白汗

出悶絕不省難可堪恐故曰卒疝也

蜀椒散方 治卒疝心痛如刺繞臍腹中盡痛白

汗出氣欲絕

蜀椒去目 炒 半夏薑汁炙 乾拌勻 附子一枚 去皮 去 乾薑

甘草炙 桂心各半 兩

右六味咬咀如麻豆每服三錢生薑一片大棗二枚同煎溫服不拘時

茱萸湯方 治卒疝攻臍腹痛汗出悶絕

吳茱萸湯浸焙乾 炒半兩 細辛 附子去皮 臍 白茯苓

本草綱目卷之九十四 雜考 三 補遺

人參 半夏薑汁炙 桂心去麤皮 當歸各一兩

右八味咬咀如麻豆每服三錢生薑一片大棗二枚水煎溫服不拘時

四味當歸湯方 治卒疝腹痛裏急

當歸 生薑 芍藥各二兩 羊肉切去筋膜半兩

右四味先三味細剉先以水五升煮羊肉爛熟去肉以汁煮藥候熟去滓澄清每服一盞

乾薑湯方 治卒疝繞臍腹卒暴疼痛

乾薑 白茯苓 蜀椒去目炒 附子去皮臍 桂心

芎藭 當歸 芍藥各一兩

右八味咬咀如麻豆每服二錢水煎溫服不拘時

藿香煮散方 治卒疝攻少腹疼痛

藿香子炒 木香 芍藥 陳麴 厚朴薑汁

炙枳殼 青橘皮去白 桂心 乾薑 人參

白茯苓 京三稜各半兩 生乾地黄三分

右十三味擣羅為細散每服三錢葱白二寸鹽少許同煎熱服

重校聖濟總錄 卷之九十四 陰疝門 疾 補遺

木香丸方 治卒疝腹痛不可忍

木香 桂心 檳榔 藿香子炒 蓬莪茂

煨 桃仁去皮尖雙仁炒 萊菔子炒 青橘

皮湯浸去白 厚朴薑汁炙

右九味將八味為末入桃仁膏和勻酒煮麩糊

丸如梧桐子大每服二十丸空心食前溫酒下

薑朮丸方 治卒疝小腹與陰相引疼痛不可忍

蒼木米泔浸切炒 乾薑炮 馬蘭花 芫花醋炒

五靈脂 烏頭去皮臍各一兩


右六味擣羅為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每

服十丸食前溫酒下

陰疝腫縮

論曰陰疝腫縮者寒邪客於厥陰之經而陽氣不能自溫故令諸筋拘急陰氣緊縮而疼痛也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本脉不營即筋縮急筋縮拘則引卵與舌故舌卷卵縮也皆厥陰為病也

狼毒丸方 治陰疝腫縮疼痛



狼毒

炙二兩

防葵

炒

附子

去皮臍各一兩

右三味為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九溫

酒下空心日午臨臥服

翅灰散方 治陰疝腫縮

雞翅

左右都用不拘多少燒灰

右一味細研為散每服二錢溫酒調下不拘時

黃連丸方 治陰疝腫縮

黃連

熟艾

杏仁

去皮尖別研各半兩

右三味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九鹽湯下空腹服

礞砂丸方 治陰疝腫縮疼痛

礞砂

研

木香

各半兩

棟實

去核炒

藁香子

炒

京三稜

炮各一兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九空心酒下

槐子丸方 治陰疝腫縮

槐子

炒一兩

右一味為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十



丸溫酒下空心服

萵苣熨方 治陰疝腫縮疼痛

萵苣 切半 皂莢 剉碎 蜀椒 去目并閉口者 炒出汗一兩

右三味少用水煮令相得不可大稀乘熱用布

三兩重裹熨處冷即易頻熨自消

雄黃洗方 治陰疝腫縮

雄黃 研 甘草 各一兩 礬石 研二兩

右三味搗研為末每用藥一兩熱湯五升通手

洗腫處良久再煖洗

一方用車前子調塗腫處或用蔓菁子末亦妙

車前子塗方 治陰疝腫縮

車前子 不拘多少

右一味搗羅為末湯調塗腫處

蔓菁子散塗方 治陰疝腫縮

蔓菁子 不拘多少

右一味搗羅為散溫水調塗腫處或絹帛傅之以差為度

陰疝卒腫痛

論曰陰卒腫痛者腎氣虛弱暴受邪氣傳入陰中冷熱相薄故卒然而痛也痛甚則邪勝邪勝則熱勝熱勝則腫皆卒然而作也

雞翎散方 治陰卒腫痛

雞翎一大莖 蛇牀子一兩

右二味搗羅為散每服一錢溫酒調下如左邊腫即取雞右翎右邊取左邊翎

沉香散方 治陰疝腫不消發歇疼痛

沉香三分 檳榔一兩 丹參三分 赤芍藥三分

白蒺藜三分 枳殼三分 炒黃 右七味搗篩為散每服三錢水煎食前溫服

木香散方 治陰卒腫痛攻注腹脹悶

木香半兩 赤茯苓一兩 牡丹皮三分 防風半兩

檳榔一兩 澤瀉三分 郁李仁一兩 酒浸去皮炒

右七味搗羅為散溫酒調下

丹參散方 治陰卒腫脹

丹參一兩 檳榔一兩 青橘皮半兩 藁香子半兩

右四味為散每服二錢溫酒一盞調下食前服

之

桂塗方 治陰卵卒脹痛

桂心 去麤皮一分

右一味為末煮稀粥糊調塗腫處頻易以效為度

雄黃淋洗方 治陰腫

雄黃 白礬 甘草 炙各一兩

右三味為散每用藥一兩以水一斗煎取三升通手淋洗至冷候汗出差

黑豆熨方 治坐久卑濕忽陰囊虛腫氣上築

黑豆 用米醋炒不拘多少

右用青布袋盛熨心腹更以椒葱湯淋熨腰膝厚衣蓋下部然後服諸藥

治陰腫偏著一邊連小腸痛不可忍方

右以 藜香苗葉搗取汁一升服之日三四服其滓貼腫處

控辜

論曰甲乙經曰小腹控辜引腰脊上衝心肺邪在小腸也又曰小腸病者小腹痛腰脊控辜丸而痛

夫小腸者連睪系屬於脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既盛則有厥逆之證其氣上衝肝肺客冷散於胸結於臍控引睪丸上而不下痛引小腹甚則衝於心胸蓋其經絡之所系屬然也

懷香子散方 治小腸受邪控睪痛引小腹

懷香子炒 萆澄茄 棟實一方用巴豆同炒去豆不用

木香各一兩半 葫蘆巴 青橘皮去白各一兩 檳榔

兩半

右七味為散每服一錢溫酒調下空心食前日

二

棟實散方 治小腸受邪控睪上而不下疼痛

棟實四兩十斤 巴豆椎令微破二味用麩一斤同炒麩色黑藥焦去巴豆

并麩取棟實去皮用 懷香子炒一兩 甘草炙一兩 青鹽別研一分

右後三味同前棟實擣羅為散每服一錢熱酒調下空心服病作不拘時

木香散方 治小腸受邪控睪牽痛

木香 馬蘭花各半兩 棟實 巴豆三十枚剝去皮同棟

實炒候黑色去  
巴豆用棟實  
藁香子炒一兩  
硃砂別研半錢

右六味除巴豆不用外擣羅為散每服二錢葱酒調下鹽湯亦可空心食前服

吳茱萸散方 治小腸疝氣牽引臍腹疼痛腰曲不伸

吳茱萸湯洗炒 棟實四十九枚 巴豆半兩椎令微破

棟實黃焦色去巴豆茱萸不用取棟實去核 沉香半兩 木香 馬

藳花 藁香子炒各一分

右七味除巴豆茱萸不用外擣羅為散每服二

錢炒葱酒調下空心夜臥發時服

延胡索丸方 治小腸受寒控睪腹堅硬疼痛不可忍

延胡索 青橘皮去白 葫蘆巴 海藻洗去鹹

昆布酒洗去鹹 馬藳花 藁香子炒 棟實肉酒炒

一兩半 木香兩 巴戟酒浸切焙一分

右十味為末入硃砂阿魏安息香三味各一分以醋二升化開去泥土以重湯煮令成膏和丸菘豆大每服二十九丸燒綿灰酒下空心食前服

木香丸方 治小腸受寒氣控睪牽痛

木香一兩 石楠 肉蓯蓉酒浸切焙 牛膝酒浸

切焙別 菖蒲 藿香子炒 棟實炒各二兩

右七味除蓯蓉牛膝二味別作末外搗羅為末

以酒一升熬蓯蓉牛膝成膏和丸如梧桐子大

每服三十九丸空心食前以紙裹葱白一寸煨熟

細嚼溫酒下

丁香丸方 治控睪上而不下痛引小腸小腸受

寒

丁香 木香 狼毒 蜀椒去目并閉口炒出汗各一兩

附子去皮臍 芍藥 桔梗炒 乾薑各半 細辛一兩半

右九味搗羅為末鍊蜜加丸如梧桐子大每服

三十九丸食前炒藿香子酒下

硃砂丸方 治控睪小腸氣痛

硃砂一兩別研水飛 蓬莪茂 棟實 陳皮 葶澄

茄 木香 丁香 肉蓯蓉 檳榔 附子

去皮臍 巴戟天 藿香子炒各半兩

右十二味除硃砂外擣羅為末以酒一升先取  
硃砂并飛硃砂水一盞同熬及一升入諸藥再  
熬頻攪候得所丸如梧桐子大每服二十九空  
心溫酒下加至三十丸

烏藥散方 治控掣痛引小腹

烏藥 木香 懷香子 青橘皮去白 高良

薑炒各半兩 巴豆七十枚敲破同練實麩炒候 檳

榔二枚 棟實十枚

右八味除炒巴豆不用外擣羅為散每服一錢

溫酒調下空心食前服痛甚炒生薑熱酒調下

乳香丸方 治小腸受邪控掣引上下臍腹痛

丹砂研半兩 硃砂研一分 胡椒半兩 海蛤一分 當

歸半兩 棟實麩炒去核半兩 木通半兩 懷香子一兩

馬蘭子炒半兩

右九味擣研為細末用乳香一分研細以酒煮

糊丸同諸藥末丸如梧桐子大每服二十九溫

酒下鹽湯亦得空心食前服

練實丸方 治小腸受邪控掣引小腹痛

本草綱目卷之四  
三

楝實麩炒去核 懷香子炒

山茱萸 食茱萸

吳茱萸 青橘皮去白 陳橘皮去白 馬蘭花

醋炒各一兩 芫花醋炒半兩

右九味爲細末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服  
二十丸溫酒下空心食前服



