


古今醫鑑

五


五	卷
嘔雜	癩疾
翻胃	霍亂
欬逆	嘔吐
吞酸	惡心
	泄瀉
	痢疾

漢書門	類	號	函	架	冊
一	三	六	一	〇	〇

內閣文庫	
番號	漢 12610
冊數	16 ( 5 )
函號	301 107








王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之五

金谿 龔 信 纂輯

子廷賢 續編

金壇 王肯堂 訂補

瘧疾



瘧疾 瘧脉自弦弦數者多熱宜汗之弦遲者多寒宜溫之弦緊宜下浮大宜吐弦短者傷食弦滑者多痰虛微無力為久病洪數無力為虛代散則死

證 夫瘧有風瘧暑瘧濕瘧食瘧痰瘧瘧母諸瘧之不  
同不過風寒暑濕之外感七情五味之內傷之所



致也然內外失守真邪不分陰陽偏勝寒熱交攻  
 乃成瘧也有一日一發有二日一發有三日一發  
 有間一日連二日發氣血俱受病有夜與日各發  
 有發於午前有發於午後其始發之時欠伸畏寒  
 戰慄頭痛或渴或先寒後熱或先熱後寒或單寒  
 不熱或單熱不寒或寒少熱多或寒多熱少

**治** 治療之法當先發散外邪有汗有無汗無汗者  
 要有汗散邪為主有汗者要無汗扶正為主然散  
 邪扶正病不退者又須分利陰陽以柴苓湯最效  
 甚者或以截藥而除之不二飲勝金丸之類截之

不愈乃氣血大虛要扶胃氣為本露薑養胃湯養  
 胃丹之類又有綿延不休彌禩越歲汗止下過榮  
 衛虧損邪氣伏藏脇間結為癥癖謂之瘧母瘵瘧  
 飲黃甲丸之類蓋瘧有新久淺深治有緩急次序  
 宜以脉症參驗量其虛實而療之機要謂太陽經  
 為寒瘧治多汗之陽明經為熱瘧治多下之少陽  
 經為風瘧治多和之此三陽受病謂之暴瘧在夏  
 至後處暑前乃傷之淺者在三陽經則總之為寒  
 瘧在處暑後冬至前乃傷之重者其三陰經瘧作  
 於子午卯酉日者少陰瘧作於寅申巳亥日者厥



陰瘧作於辰戌丑未日者太陰瘧也  
 一凡瘧方來正發不可服藥服藥在於未發兩時之  
 先不則藥病交爭轉為深害當戒之  
 一平素虛弱兼以勞役內傷挾感外邪以致瘧疾寒  
 熱交作肢體倦怠乏力少氣以補中益氣湯加黃  
 芩芍藥半夏有汗及寒重加桂枝倍黃芪熱盛加  
 柴胡黃芩渴加麥門冬天花粉  
 一久瘧乃屬元氣虛弱蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛  
 則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐  
 涎不食泄瀉腹痛手足逆冷寒慄鼓頷若悞投以

按此方治  
 瘧無汗當  
 發汗散邪  
 為主

清脾截瘧二飲多致不起  
 一瘧後飲食少進四肢無力面色痿黃身體虛弱以  
 四君子湯合二陳湯加薑炒黃連麩炒枳實煎服  
 一凡瘧後大汗出者乃榮血不足之候以人參養榮  
 湯主之

方散邪湯 三山陳氏傳

治三陽經瘧頭痛無汗發熱惡寒當發汗散邪  
 川芎 一錢 白芷 一錢 麻黃 一錢 防風 一錢  
 紫蘇 一錢 羌活 一錢 甘州 五分 白芍藥 一錢  
 右剉一劑生薑三片葱白三莖水煎露一宿次



按此方治  
瘧有汗當  
止汗正氣  
為主

蚤溫服○有痰加陳皮半夏○宿食不消吞酸  
惡食加麩炒枳實薑汁炒厚朴山查萊服子○  
濕加蒼朮○挾氣加青皮蘇梗香附○

○正氣湯 三山陳氏傳

治虛弱人瘧頭疼自汗寒熱往來當扶正散邪  
柴胡 一錢 前胡 一錢 川芎 一錢 白芷 一錢  
半夏 薑製 一錢 麥冬 去心 八分 檳榔 一錢 艸果 一錢  
青皮 炒 一錢 茯苓 八分 桂枝 一錢 甘艸 炙 八分  
白芍 炒 一錢 陳皮 八分  
右剉一劑生薑三片大棗二枚水煎預先熱服

按此方治  
瘧分利陰  
陽和解表  
裏之劑

○柴苓湯 此藥分利陰陽和解表裏之劑

柴胡 八分 黃芩 炒 一錢 人參 去蘆 一錢 半夏 薑製 一錢  
甘艸 六分 猪苓 一錢 澤瀉 一錢 白朮 炒 一錢  
茯苓 八分 肉桂 七分

右剉一劑生薑三片大棗二枚水煎溫服○無  
汗加麻黃○有汗加桂枝○寒多倍肉桂○熱  
多加黃芩○胸膈滿悶加枳殼桔梗

○不二飲 秘方治一切寒熱瘧疾一服即止如神  
常山 二錢 檳榔 雌一錢雄一錢尖銳者為雌  
知母 一錢 貝母 二錢 五分

古今醫監 卷之五



右剉一劑酒一鍾煎至八分不可過熱熱則不效露一宿臨發日五更溫服勿令女人前藥

○勝金丸 治一切寒熱瘧疾胸膈停痰一服立效

常山 四兩好酒浸一宿晒乾 檳榔 二兩

蒼朮 二兩米泔浸一宿晒乾 艸果 二兩

右為細末將前所浸常山餘酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十九未發前一日臨臥時冷酒送下即臥不可言語直至雞鳴時再進七十九忌食生冷熱物及雞魚麩麩之類不則不效矣

○瘧靈丹 秘方 治一切瘧疾服藥不愈以此截之

雄黑豆 揀圓者為雄四十九粒先一日以水泡去皮研爛

人言末 一錢 雄黃 一錢 為衣

右於五月五日午時同搗為丸如芡實大陰乾收貯臨發日早晨面東無根水下九忌熱酒熱物踰時禁生冷魚腥三日此方百發百中

○龍虎湯 治熱瘧火盛舌卷焦黑鼻如煙煤六脉

洪數弦緊此乃陽毒入深所致先以青布摺疊數重新汲水漬之搭於心胸之上須臾再易如此三次熱勢稍退即服此藥無有不效

柴胡 一錢 黃芩 一錢 半夏 七分 石膏 五分

按此方治熱瘧清火之劑



黃連一錢五分 黃蘗二錢五分 知母一錢五分 山梔仁一錢  
粳米一撮

右剉一劑生薑一片大棗二枚水煎溫服

○露薑養胃湯 治久瘧不愈三五日一發

蒼朮米泔浸一宿 一錢 厚朴薑炒 一錢 陳皮一錢  
蘇果一錢 半夏薑製 一錢 人參五分 茯苓一錢  
藿香一錢 甘州分

右剉一劑烏梅一箇黑棗一箇水煎先以生薑四兩搗汁露一宿次蚤合入煎藥通口服

○養胃丹 治久瘧經年累月虛弱之症宜此補之

按此方治  
久瘧補虛  
之劑

人參一兩 蒼朮二兩 白茯苓一兩 半夏二兩  
去蘆一兩 炒二兩 厚朴五錢

陳皮一兩 藿香一兩 蘇果一兩 厚朴五錢  
五錢 一兩 兩 五錢

常山酒蒸 二兩 甘州炙 五錢 烏梅四十九箇  
二兩 錢 去核

右爲末淡薑湯打糊爲丸如梧桐子大每服七

十九仍用淡薑湯送下

○痰瘧飲 治瘧久不能愈名曰痰瘧又曰老瘧

蒼朮泔浸 五錢 蘇果五錢 桔梗五錢 青皮五錢  
五錢 五錢 五錢 五錢

陳皮五錢 良薑五錢 白芷二錢 白茯苓二錢  
五錢 五錢 二錢 二錢

半夏湯泡 二錢 枳殼麩炒 二錢 甘州二錢 桂心二錢  
二錢 二錢 二錢 二錢

乾薑泡 二錢 蘇葉二錢 川芎二錢  
錢 二錢 二錢



按此方治  
瘧母消塊  
之劑

右剉每劑五錢水煎入鹽少許空心溫服

○黃甲丸 治瘧母成塊久不能愈

硃砂 一兩 阿魏 一兩 檳榔 一兩 山甲 一兩 酥 炙炒

雄黃 五錢 木香 五錢

○右為細末泡黑豆去皮搗成泥為丸如梧桐子大每用五十丸淡薑湯送下忌生冷魚腥三日

**痢疾**

**脉**下利之脉宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急宜身涼不宜身熱經所謂身涼脉細者生身熱脉大者死是亦大槩言之耳不可一途而論也叔和云

下痢微小却為生脉大浮洪無瘥日

**證**夫痢乃濕熱食積三者下青黃赤白黑五色也濕

熱傷血分則赤傷氣分則白氣血俱傷則赤白相

兼黃者食積黑者濕勝也其症臍腹疴痛或下鮮

血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或赤白相雜

或下如豆汁或如魚腦髓或如屋漏水裏急後重

頻欲登廁晝夜無度

**治**治法行氣和血開鬱散結瀉脾胃之濕熱消臟腑

之積滯經云熱積氣滯而為痢其初只宜立效散

一服即愈或木香導氣湯以推其邪以徹其毒皆



良法也痢稍久者不可下胃虛故也調中理氣湯  
 加味香連丸之類擇便用之痢多屬熱亦有虛與  
 寒者虛者補之寒者溫之以神效參香散主之蓋  
 痢之初邪毒正盛宜推蕩之不可用粟殼訶子收  
 澀之藥則淹纏不已痢之稍久真氣下陷宜收澀  
 之不可用巴豆牽牛通利之劑用之則必致殺人  
 又有下痢噤口而不食者亦有二也有脾虛有脾  
 熱脾虛者參苓白朮散脾熱參連湯或舍連煎之  
 類大凡下痢純紅者如塵腐色者如屋漏水者太  
 孔開如竹筒者唇如朱紅者俱死症也如魚腦髓

者身熱脉大者俱半死半生

**方** 木香導氣湯

治痢疾初起腹痛紅白相雜裏急後重

○**藥** 王發熱噤口不拘老幼先與一服甚效

- 大黃 一錢五分 檳榔 一錢二分 厚朴 一錢二分 白芍藥 一錢二分
- 黃連 一錢二分 歸尾 八分 茯苓 八分 朴硝 一錢
- 木香 五分 小便赤加滑石 五分 木通 一錢

○**煎** 右剉一劑水二鍾煎至八分濾去渣空心熱服

○**開板丹**

張小菴傳治痢初起以此丹推蕩其邪毒

- 黃丹 一兩 水飛 黃蠟 一兩 乳香 一錢 沒藥 一錢
- 杏仁 八箇 去皮尖 巴豆 八箇 去油

按此方治痢以推其邪而徹其毒也



按此方治  
熱積氣滯  
而為痢者  
以黃連清  
熱枳殼破  
氣清平之  
劑

右將五味為末將黃蠟溶化後將藥末同蠟并  
勻攪冷成塊每服一丸如黃豆大空心服紅痢  
冷井州湯下白痢冷乾薑湯下水瀉冷米湯下

○立效散 雲林製 治痢腹中疔痛赤白相兼即止

黃連 四兩酒洗吳茱萸二兩同炒去茱萸用 枳殼 一兩炒

右為末每服三錢空心酒送下泄瀉米湯下噤

口痢陳倉米湯下

○調中理氣湯 丹溪云調氣則後重自除此也

木香 蒼木 米泔浸炒 片木 炒各一錢 陳皮 八分 厚朴 薑炒七分

枳殼 一錢 白芍 炒一錢 檳榔 一錢 木香 八分

按此方治  
痢調理之  
劑

○濕右剉一劑水二盞煎一盞濾去渣空心溫服○

如赤痢厚朴芍藥俱不必炒再加黃連條苓各

一錢五分白痢只依本方

○加味香連丸 此方治諸痢之總司

黃連 二兩炒 吳茱萸 滾水泡炒二兩 木香 一錢

○六一白豆蔻 帶殼麩裏火炒一錢五分 秘方加乳香沒藥 各一錢

右為細末用烏梅二兩滾水泡去核搗和為丸

如梧桐子大每服三十九白痢乾薑湯下血痢

甘草湯下赤白相兼二味泡湯下白瀉米湯下

○倉廩散 治赤白痢疾發熱不退○凡下痢有積



按此方治  
內外兩感  
及熱痢疾  
及時行疫  
痢之劑

○有暑如用藥不效即是腸胃有風邪熱也此方

甚效○即人參敗毒散加黃連陳倉米薑棗煎

服○噤口痢加石蓮肉七枚○痢後手足痛加

檳榔木瓜不蚤治則成鶴膝風

○六一順氣湯治痢不問赤白相雜肚痛裏急後

重渾身發熱口乾煩渴用此通利即止方見傷寒門

○納臍膏何晴嶽傳治噤口痢危急之症用之立愈

黃瓜藤不拘多少連莖葉經霜者晒乾燒灰存性出火毒

右用香油調納臍中即效

○點眼膏黃賓江傳治一切赤白痢及噤口危急之症

初胎糞炙乾雄黃五分

黃連四分片腦少許

右為極細末水調點兩背神效

○倉連煎劉太府傳治噤口痢不拘赤白

陳倉米赤痢用三錢白痢用七錢赤白相兼用五錢

黃連赤痢用七錢白痢用三錢赤白相兼用五錢

右剉木一鍾半煎至七分露一宵空心溫服

凡下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋因熱毒閉塞心

胸胃白所致用參苓白朮散加石苜蒲一錢木

香少許共為末陳米飲調下再服倉連煎尤妙



噤口痢諸藥不效者糞缸中蛆不拘多少洗淨瓦  
 上焙乾為末每服一二匙米飲調服即能思食  
 噤口痢多是胃口熱甚用黃連一兩人參五錢煎  
 湯終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好  
 一方加石蓮肉三錢水煎服立效外以田螺搗  
 爛入麝香少許合臍上引熱下行故也又方用  
 秤錘燒紅用好醋澆之令病人吸其煙神效○  
 按前諸方皆治噤口不食之劑凡醫者用藥不  
 必拘其赤白飲食即吐諸物不納皆是毒氣薰  
 蒸胃口熱甚切不可認胃寒噤口而用辛熱之

按此方治  
 痢久不愈  
 元氣虛弱  
 滑脫下陷  
 止汝之劑

○加減益氣湯 治痢日久不愈不能起牀虛弱症  
 藥宜以前方選用或木香導氣湯去大黃煎熟  
 入蔗汁陳倉米飲各一盞於內同服即愈  
 黃芪 五分 人參 五分 白朮 一錢 陳皮 一錢  
 當歸 七分 白芍藥 一錢 升麻 三分 甘艸 灸三分  
 澤瀉 五分 砂仁 五分 木香 三分 白豆蔻 三分  
 地榆 五分 御米殼 醋炒 三分  
 右剉一劑水二盞煎至八分濾去渣空心溫服  
 ○神效參香散 治臟氣怯弱冷熱不調積而成痢  
 或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下



紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻數無度

○鴨粟殼 去蒂穰醋炙一兩 陳皮 一兩 白茯苓 去皮四錢

肉豆蔻 麩裏煨四錢 人參 三錢 白扁豆 二錢

木香 二錢 右共七味為末赤痢每九分加製黃連末一分

白痢每九分加製茱萸末一分赤白相雜每服

八分加黃連茱萸末各一分青色黃色無加減

○賦每用一錢俱用米湯調下忌生冷油膩炙煨○

製黃連茱萸法二味等分不到碎以老酒浸一

宿同一處炒燥分出各為極細末另包聽前用

○薑茶湯 治痢疾腹痛不問赤白冷熱蓋薑能助

陽茶能助陰二者皆能消散又且調平陰陽况

於暑毒酒食毒皆能解之也

○老生薑 細切三錢 細茶葉 三錢

右用新汲水煎服○一方加連根荳菜一握三

味同搗汁酒調服

○三白湯 杜守玄傳 治痢不拘赤白

白砂糖 兩 雞子清 一箇 燒酒 半 鍾煎八分溫服

○仙梅丸 桑雙岡傳 治痢疾發熱發渴

細茶 烏梅 水洗剝去核晒乾各一兩



右為末生蜜搗作丸彈子大每十九丸冷水送下  
○椿雞丸 桑環川傳 治久痢不止

雪裏炭一隻吊死去腸毛入黃連一兩椿根白  
皮一兩於肚內好酒煑熟去藥食雞神效

○舒鳧飲 劉桐川傳 治白痢如魚凍色久不愈者  
白鴨一隻殺取血以滾酒和飲之立止

○將軍飲 治痢膿血稠粘裏急後重晝夜無度不  
問新久及愈而又發止而復作名曰休息痢

錦紋大黃 兩到一  
右以好酒二鍾浸半日煎至七分去渣分作

次服以利為度○按前諸方治痢簡易故附方  
末以備選用

泄瀉

脉多沉傷於風則浮而弦傷於寒則沉而細傷於  
暑則沉而微傷於溼則沉而緩洩而腹脹脉弦者  
死又云脉緩時微小者生浮大數者死

夫泄瀉者注下之症也蓋太腸為傳送之官脾胃  
為水穀之海或為飲食生冷之所傷或為暑溼風  
寒之所感脾胃停滯以致闌門清濁不分發注於  
下而為泄瀉也內經又謂濕勝則濡泄又曰春傷



於風夏生飡泄又曰暴注下迫皆屬於熱又曰諸病水液澄澈清冷皆屬於寒叔和曰濕多成五泄腸走若雷奔故分脾泄胃泄大腸小腸大瘕為五泄也又有飡泄腎泄洞泄濡泄驚澹之類名各不同原其致病不過前云所感所傷而已矣丹溪又云泄屬濕屬氣虛有火有痰有食積凡瀉水腹不痛者濕也飲食入胃不消完穀不化者氣虛也腹痛瀉水如熱湯痛一陣瀉一陣者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛甚而泄瀉瀉後痛減者食積也瀉下如抱壞雞子臭者或噦氣作酸者傷

於食也

**治**

治療之法須看時令分寒熱新久補脾消食燥溼利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝溼若久瀉腸胃虛滑不禁者宜收澀之治法之要孰有過於此哉

**方**

胃苓湯 治中暑傷濕停飲夾食脾胃不和腹痛洩瀉作渴小便不利水穀不化陰陽不分

- 蒼朮 一錢 米泔浸
- 厚朴 一錢 薑汁炒
- 陳皮 一錢
- 豬苓 一錢
- 澤瀉 一錢
- 白朮 一錢 炒
- 白茯苓 一錢
- 肉桂 三分
- 白芍 一錢 炒
- 甘草 一分 炙

按此方治四時泄瀉之總司也



按此方治暑瀉之劑

右到一劑生薑棗水煎溫服。一方加防風升麻以勝濕。○食積加神麩麥芽山查。○水瀉加滑石。○有痰加半夏烏梅。○氣虛加人參白朮。○惱怒加木香。○有熱加黃連。○久瀉加肉豆蔻。○暴痢赤白相雜腹痛裏急後重去桂加木香黃連檳榔水煎服。

○蕭苓湯 治暑月泄瀉或欲成痢

黃連香薷飲合五苓散到一劑生薑煎服中暑方見

○藿香正氣散 治感濕泄瀉或兼暑者方見霍亂

依本方加黃連香薷。○食加神麩山查。

按此方治熱瀉之劑

○柴苓湯 治泄瀉發熱口渴裏虛之症

小柴胡湯方見傷寒合五苓散方見中暑到一劑薑棗煎服

按此方治寒瀉之劑

○理中湯方見中寒治脾胃虛冷中寒泄瀉四肢厥逆

○四君子湯方見補益治氣虛脾泄不止者

○依本方加烏藥醋炒七分薑棗煎服

○參苓白朮散方見補益治脾胃虛弱久瀉少食

○瑞蓮丸何春元傳治元氣大虛脾胃怯弱泄瀉不

正不思飲食

山藥炒二兩蓮肉二兩白朮土炒二兩芡實二兩



人參 去蘆 一兩 橘紅 一兩 白茯苓 一兩 白芍藥 一兩 酒炒

甘州 錢 炙 五

○右為末用雄猪肚一箇洗淨煮爛搗和藥末為

丸如梧桐子大每服百丸空心米湯送下

○養元散 治泄瀉飲食少進

○四葉糯米 一升水浸一宿濾乾 炒極熟 乾山藥 少許

○野中胡椒 少許

右各為細末和勻每日侵晨用半盞再入砂糖少許滾湯調服其味極佳且不厭入大有滋補其女人子宮虛冷不能成孕久服之亦能懷孕

按此方治 虛瀉之劑

○一方加蓮肉芡實乾山藥各三兩亦效 ○一方用糯米磨粉不拘多少入百草霜十分之二水和為餅烙熟食之 ○一方單用糯米半生半炒煮粥食之亦效

○安胃和脾散 治脾胃不和中脘痞塞腹痛脹滿不思飲食嗜臥無時嘔吐痰涎逆氣吐酸面黃肌瘦泄瀉不止四肢乏力沉困自汗盜汗等症

○藥 蒼朮 二兩 薑炒 厚朴 五錢 薑炒 藿香 五錢 砂仁 五錢 人參 五錢 去蘆 白朮 五錢 土炒 白茯苓 五錢 木香 五錢 火煨 檳榔 五錢 蓬朮 五錢 火煨 澤瀉 五錢 甘州 錢 炙 五



紅棗 廿四箇去皮核焙乾

右共為細末每服二錢空心淡薑湯送下

○家蓮散 陳都堂傳 治經年久瀉冷泄及休息痢

蓮肉 泡去皮心微火焙乾四兩 厚朴 薑炒一兩 乾薑 炒黑一兩

右三味共為細末每服二三匙米飲下日三次

○理氣健脾丸 方見脾胃 治脾胃虛弱久瀉久痢

依本方去桔梗加酒炒白芍藥其效如神

○寶腸丸 黃賓江傳 治久瀉久痢虛滑不禁及脫肛

臭椿樹根皮不拘多少切碎酒拌炒為細末用真阿膠水化開和為丸如桐子大每服二五十

按此方治滑泄止菰之劑

○九空心米湯下

○升氣實臟丸 雲林製 治久瀉元氣下陷脾胃衰憊

大腸滑脫肛門墜下日夜無度飲食不思米穀不化湯水直過煩渴引飲津液枯竭肌瘦如柴

寒熱互作

黃芪 蜜炙一兩 人參 去蘆一兩 白朮 土炒二兩 白茯苓 去皮五錢

山藥 炒一兩 蓮肉 去心一兩 芡實 一兩 升麻 酒炒五錢

柴胡 酒炒五錢 乾薑 炒黑五錢 肉豆蔻 麩裏煨搥去油淨五錢

粉艸 炙五錢 椿樹根皮 酒炒二次四兩

右為細末阿膠水化開為丸如黍米大每服二



錢用糯米半生半炒煎湯送下

○灸法 治吐瀉日久胃氣大虛死在旦夕

天樞二穴 在臍傍各 氣海 在臍下 百會 在頂用

艾灸五七壯即愈

霍亂

脉代者霍亂代而絕者亦霍亂○又關脉滑為霍亂

吐瀉○氣口脉弦滑膈間有宿食留飲宜順其性

以鹽湯探之○脉結促大皆不可斷以死脉洪大

則易治脉微細氣少不語舌卷囊縮者皆不治也

○滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉大勿訝

證 夫霍亂者揮霍變亂也蓋因內有所積外有所傷

陽不升陰不降乖隔而成故心腹卒痛嘔吐下痢

發熱惡寒頭痛眩暈或瀉而不吐或吐而不瀉先

心痛則先吐先腹痛則先利心腹齊痛吐利並作

甚則轉筋入腹四肢厥冷而斃

治 急用藜湯泡洗艾灸臍中蓋陰陽反疾清濁相干

治之惟宜藿香正氣散加生薑為上不惟可以溫

散風寒抑亦可以調理脾胃如身熱口渴者則以

藳苓湯加減治之霍亂之後不可蚤與飲食恐胃

中邪物吐瀉未盡其新穀入胃不能傳化必致不



救雖候吐瀉過一二時饑甚方與稀粥少食以漸而將息可也其有不吐不瀉者名乾霍亂急以鹽湯多灌引其大吐令宿食殆盡隨症用藥調之既愈之後若煩熱多渴者以麥門湯主之

一霍亂轉筋用太麥一把煎湯盪洗非人以麥糠代之使腠理開泄陽氣散則愈也河間云熱氣燥燥於筋則攣瘃而痛也

一霍亂已死而腹中尚有暖氣者以鹽納臍中以艾灸莫計其數

再以熨斗火熨氣透則蘇續以炒鹽絹包乘熱烙其背則萬無一失也

**方**藿香正氣散 治四時不正之氣寒溫時疫山嵐瘴氣雨溼薰蒸或中寒腹痛吐利中暑冒風中

溼身重泄瀉或不服水土脾胃不和或飲食停滯復感外邪頭疼發熱戰慄惡寒或嘔吐惡心胸膈滿悶一切氣逆不安之症並能調治

- 藿香 二錢
- 紫蘇 一錢五分
- 陳皮 一錢
- 厚朴 一錢
- 半夏 一錢
- 白朮 一錢
- 茯苓 一錢
- 大腹皮 一錢
- 桔梗 一錢
- 白芷 一錢
- 甘草 一錢



右剉一劑生薑三片棗二枚水煎熱服○霍亂  
轉筋加木瓜○腹痛加炒白芍藥寒痛加桂冷  
甚加乾薑○飲食不化加香附砂仁米穀不消  
加神麩麥芽○心下痞滿加桔梗枳殼枳實○  
肉食不化加山楂○濕麩停積加蘿蔔子○中  
者冒風加香薷白扁豆○時氣增寒發熱加柴  
胡乾葛○口乾加麥門冬○小使不利合五苓  
散○濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂合黃連香薷  
飲○心腹絞痛加木香○若頻欲登圜不通利  
者加檳榔枳殼○按霍亂之疾未有不由內傷

按此方治  
霍亂屬熱  
者宜之

生冷外感風寒而致也余用藿香正氣散治之  
百發百中一歲之內常治百人未有不效者但  
有熱者須加薑炒黃連寒甚加乾薑萬無一失  
又腹痛者加桂痛甚者去藿香加吳茱萸小便  
不利加茯苓如乾霍亂加枳殼茯苓肉桂最佳  
○加減藿苓湯 治霍亂身熱口渴此熱暑中也  
猪苓 七分 澤瀉 七分 白朮 五分 赤茯苓 一錢  
黃連 五分 香薷 一錢 乾葛 七分 天花粉 一錢  
甘草 五分 扁豆 十四粒  
右剉一劑生薑煎服○如熱極加石膏知母○



按此方治  
霍亂為虛  
寒者宜之

古今醫鑑 卷五

泄瀉加升麻黃芩滑石○腹痛加炒白芍藥桂  
 ○理中丸 治轉筋霍亂上吐下利心腹疼痛及乾  
 霍亂俗名絞腸沙并真陰症手足厥冷嘉靖甲  
 子年間梁宋之地人多患此自脚心麻至膝死  
 者不計其數時大方伯趙公出示此方患者咸  
 蒙其惠因述以廣其傳  
 又人參一錢 乾薑一錢 茯苓一錢 甘州一錢  
 右為末煉蜜為丸每丸重一錢取一九細嚼淡  
 薑湯送下忌食米湯此即理中湯改為丸取土  
 能塞水之義若仍煎湯則不效矣

按此方治  
霍亂專攻  
之劑

○陰陽湯 治霍亂吐利腹痛服藥即吐無法可施  
 用百沸活河水及冷井泉水各半碗合而服之  
 ○百沸湯 治霍亂吐瀉因飲冷或冒寒或失饑或  
 大怒或乘舟車傷動胃氣令人吐利交作目眩  
 頭旋手足轉筋四肢厥冷用藥遲緩須臾不救  
 吳茱萸 木瓜 食鹽 各五錢  
 右三味同炒焦用百沸湯煎隨病人冷熱服之  
 ○乾霍亂者俗名絞腸沙其症因宿食不消心腹  
 絞痛欲吐不吐欲瀉不瀉揮霍撩亂所傷之物  
 不得出洩故也死在頃刻急宜多灌鹽湯探吐

古今醫鑑 卷五



之冷物出盡却服理中湯更刺十井出血并委  
中出血

○鹽薑湯 治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉垂斃者

鹽一兩 生薑切五錢

右二味同炒色變以童子溺二盞煎一盞溫服

○麥門冬湯 治霍亂愈後煩熱多渴小便不利

大人參一錢 白朮炒一錢 茯苓八分 陳皮八分

○白朮半夏 製八分 小麥粒一百粒 麥冬去心二錢 甘州七分

右烏梅三箇生薑三片水二鍾煎八分食遠服

嘔吐

**脉** 嘔而脉弱小便復利身有微熱厥者難治

**證** 夫嘔吐者飲食入胃而復逆出也有物無聲謂之

吐有聲無物謂之噦嘔吐謂之有聲有物蓋人以

胃氣為主受納五穀榮養百骸者也若胃虛之久

不能攝養或為寒氣所中或為暑氣所干或為飲

食所傷或氣結而痰聚皆能令人嘔吐又有惡血

停積胃口嘔吐之間雜以痰血亦有胃熱火邪衝

上而作嘔吐者有痰隔中焦食不得下者有氣逆

者又內經云諸嘔吐逆衝上皆屬心火河間亦曰

胃膈熱甚則為嘔火氣炎上之象也所感不同



**治** 治法當以脉辨之中寒則脉沉緊四肢厥冷飲食不下當以溫暖之藥調之挾暑則脉弦數而虛煩熱燥渴法當清涼之停食痰積者則當順氣和胃而消導之積血者化其血火逆者瀉其火此其治法之大要也

一 嘔家聖藥是生薑千金之說信矣然氣逆作嘔生薑散之痰與水作嘔半夏逐之嘔有熱有寒生薑干寒症最佳若遇熱嘔不可無烏梅也

一 胃中有熱膈上有痰令人時常嘔吐清水作噯氣吞酸等症用二陳湯加薑炒黃連炒梔子蒼朮木川

一 時常吐清水或口甘不喜食冷涎自下而湧上者此脾熱所致二陳湯加白朮芍藥升麻土炒黃連黃芩梔子神麩麥芽乾薑或煎或丸隨時制宜

一 時常惡心嘔吐清水胃口作痛得食暫止饑則痛甚此胃中有疝也二陳湯加若練根皮史君子煎服即愈或用黑錫炒成灰檳榔等分米飲調服

**方** 煨薑散 西園製 治嘔吐惡心

生薑一大塊直切薄片勿令折斷層層摻鹽於內以水濕苧麻密縛外又用紙包水蘸濕火煨



按此方專治嘔吐之劑

按此方治胃中痰火嘔吐之劑

令熟去紙搗爛和稀米飲服之

○椒茶餅

陳橘斬傳

止嘔吐治翻胃

川椒

去日隔紙焙三兩

芽茶

一兩五錢桑白皮末一兩半

飛羅麩

一兩五錢炒

○保中湯

雲林製

治嘔吐不止飲食不下

許細嚼米湯下

陳皮

八分

半夏

薑製八分

茯苓

八分

白朮

土炒一錢

藿香

一錢

黃連

土炒二錢

山梔子

薑汁炒二錢

砂仁

三分

右剉一劑生薑三片長流水和嬌泥澄清水二

鍾煎至一鍾稍冷頻服○吐逆甚加伏龍肝一塊同煎○因氣加香附枳實○心煩加竹茹

按此方治胃虛嘔吐之劑

○比和飲

治水穀不納聞食氣即嘔

人參

一錢

白朮

一錢

茯苓

八分

陳皮

五分

砂仁

五分

神麩

一錢

右剉作一劑用十年已上陳倉米一合順流水

二鍾煎沸泡伏龍肝研細攪混澄清取一鍾生

薑三片棗二枚同煎七分稍冷服別以陳倉米

飲時啜之日進三服即止

○枇杷散

治胃虛嘔噦不止



枇杷葉去毛 橘紅各一兩 半夏湯泡 赤茯苓去皮

人參各五錢 麥門冬去心 青竹茹各一兩

甘州四錢

右剉生薑三片水二盞煎一盞空心服

○竹茹湯 治飲酒過度嘔吐痰涎酸水飲食不下

乾葛二錢 竹茹一錢五分 半夏製一錢 甘州三分

右剉一劑生薑三片水二鍾煎八分食前溫服

惡心

證惡心者無聲無物但心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖

曰惡心非心經之病其病皆在胃口上有虛有熱

按此方治胃熱嘔吐之劑

有寒有食有痰

治法虛者補之熱者清之寒者溫之食與痰者消

之化之皆用生薑及薑汁隨症佐藥其效最速

方二陳湯見痰 加薑汁炒去 苓連梔子治胃熱惡心

○大半夏湯即二陳湯去甘草加生薑 治胃寒惡心

○小半夏茯苓湯即大半夏湯去陳皮倍加生薑 治心中兀兀欲吐

○導痰湯即二陳湯加南星枳殼 加竹茹砂仁薑炒黃連治痰

熱嘔吐惡心氣盛者

翻胃

脈浮緩者生沉濇者死○脈濇而小血不足脈大而



弱氣不足

證 夫翻胃者朝食而暮吐暮食而朝吐或食已即吐者是也膈噎者謂五膈五噎也五膈憂恚寒熱氣也五噎憂思勞食氣也膈者在心脾之間上下不通若拒格之狀也或結於咽喉時覺有所礙吐之不出嘔之不下由氣鬱痰搏而然久則漸妨飲食而為膈也噎者飲食之際氣卒阻滯飲食不下而為噎也翻胃也膈也噎也二者名雖不同而其所受之病則一而已內經謂三陽結謂之膈三陽者大腸小腸膀胱也結熱結也小腸熱結則血脉燥

大腸熱結則不能固膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉結下既不通則反上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下降而上行也故經曰少陽所至為嘔湧溢食不下此理明矣丹溪曰氣之初病其端甚微或因些小飲食不謹或外冒風雨內傷七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表密無汗或性急易怒相火上炎以致津液不行清濁相干氣之為病或痞或痛或不思食或噎腐吞酸或嘈雜嘔噦醫者不求其本便認為寒遽以辛香燥熱之劑投之時暫得快以為



神方厚味仍前不節七情反覆相侵舊病被劫暫  
 開濁液易於攢聚或半月或一月前症復作如此  
 延蔓自氣成積自積成痰此為痰為飲為吞酸之  
 由也良工未遇燥劑又投痰挾瘀血遂成窠囊此  
 為痞為痛為嘔吐噎膈翻胃之症次第而作也猶  
 謂虛而積寒非尋常艸木可療竟以烏附佐助丹  
 藥專意服餌積而血液俱耗胃腕乾槁其槁在上  
 近咽之下水液可行食物難進間或可入食亦不  
 多名之曰噎其槁在下與胃相近食雖可下難盡  
 入胃良久復出名之曰膈亦曰翻胃

治

治當養血生津清痰降火潤燥補脾振肝開鬱庶  
 使病邪易伏胃氣開通雖然亦在病者之調攝耳  
 吾觀張雞峰曰噎是神思間病惟內觀以自養此  
 言深中病情

- 一 鉤玄云翻胃大約有四血虛氣虛有痰有熱血虛者脉必數而無力以四物湯養血為主氣虛者脉必緩而無力以四君子湯補氣為主有痰者脉必滑數以一陳湯為主有熱者脉必數而有力以解毒湯主之
- 一 凡噎膈翻胃悉用一陳湯加薑汁竹瀝童便韭汁



之類為主治

一若胸中覺有熱悶加土炒黃芩黃連瓜萋仁桔梗

之類

一若血虛瘦弱之人合四物湯少加杏仁泥紅花童

便菲汁之類仍不可缺

一若朝食暮吐暮食朝吐或食下須臾即吐者此胃

可容受而脾不能傳送也或大小腸閉結不通食

返而上奔也加酒蒸大黃以潤之脾不磨者加神

麩麥芽之類以助其衰火也

一若氣虛肥白人膈噎者合四君湯亦加竹瀝薑汁

為要藥也

一若七情鬱結成氣噎者加香附撫芎木香檳榔瓜

萋仁砂仁之類

一若飲酒之人加砂糖驢尿入內服

一若膈噎大便燥結用大黃乃急則治其標之劑也

仍用四物湯加童便薑汁多飲牛羊乳為上策也

但不可用人乳代之蓋人乳內有飲食烹飪之火

也

一若氣血兩虛則口中多出沫但見沫大出者必死

糞加羊屎不治太腸無血故也年過五十者不治



一 中年婦人翻胃以四物湯加帶白陳皮雷尖杏仁  
 生甘草酒紅花濃煎入驢尿以防生蟲數貼而愈  
 一 治翻胃噎膈用螃蟹洗淨入水中高四指以香油  
 一小酒盞入水中以一指捻白麩撒水上涎即出  
 次日去蟹留水曬乾涎為末每服五分淡燒酒下  
**方** 王方 治一切翻胃噎膈為總司要藥也  
 一 葶苈汁二兩 牛乳一盞 生薑半兩 竹瀝半盞  
 童便一盞  
 右五味和勻頓煖服或加入煎劑內尤為至效  
 ○ 順氣和中丸 雲林 治嘔吐翻胃嘈雜吞酸

半夏製六分 白茯苓七分 白朮土八分 麩炒錢 麩炒錢 枳實五分 甘草一分 香附一分 山柰一分 神麩炒六分 砂仁炒三分 黃連一分 右剉一劑生薑三片長流水入嬌泥攪澄清  
 一 鍾煎至七分入竹瀝童便薑汁不拘時細細  
 溫服 ○ 心胃痛加薑汁三匙 ○ 如氣虛加人參  
 黃芪各八分 ○ 如血虛加當歸七分川芎五分  
 ○ 如惱怒或氣不伸舒加烏藥五分木香三分  
 ○ 如胸膈飽悶加蘿蔔子炒六分 ○ 如心下嘈  
 雜吞酸加吳茱萸四分倍黃連白朮 ○ 如嘔吐



不正加藿香七分如大便閉結加蘇子麻仁  
桃仁杏仁俱研如泥一錢再用白蜜時服之

○安中調氣丸雲林製治一切翻胃痰膈之症

廣皮二兩 半夏薑製 白茯苓兩 白朮土炒

枳實麩炒 蘇子炒 六川芎五錢 當歸酒洗

白芍藥鹽酒洗 木香一錢 甘草炙

香附三兩長流水浸 神麩炒

黃連薑汁浸晒乾 白豆蔻五錢 蘿蔔子炒

右為細末竹瀝薑汁打神麩糊為丸如菜豆大  
每服八十九不拘時白湯送下清米湯亦可

○四七調氣湯西園公方治七情四氣以致膈噎翻胃

紫蘇一錢 厚朴薑汁炒 茯苓一錢

半夏一錢 枳實炒 砂仁一錢 蘇子炒

陳皮一錢 甘草五分

右剉生薑三片水煎服後以加味保和丸加入  
參一兩砂仁二兩木香二兩服之收功

○四子調中湯治翻胃或大小便閉及痰氣壅盛

青皮麩炒 陳皮五分 枳實麩炒 香附炒

黃連薑汁炒 半夏製 瓜蒌仁炒

蘇子炒 沉香五分 茯苓五分 桃仁去皮尖

按此方治  
翻胃專因  
氣者



按此方治  
翻胃血虛  
有火者

白芥子炒一錢 木通五分 芒硝五分

右剉一劑生薑五片水煎稍熱服

○神奇散方外傳治噎食翻胃三陽枯竭

○四子當歸一錢 川芎七分 白芍藥酒炒一錢

生地黃二錢 陳皮八分 砂仁七分 半夏薑製八分

白茯苓一錢 白朮土炒一錢 香附醋炒一錢 枳實炒一錢

烏梅三箇 藿香一錢 赤茯苓一錢 檳榔一錢

木通一錢 猪苓一錢 黃芩炒一錢 黃蘗酒沙一錢

知母人乳拌炒一錢 赤芍藥一錢 天竹冬去心一錢

○四子麥門冬去心一錢 甘草八分

右剉一劑水二鍾煎一鍾入童便一盞服

○呂純陽降筆傳治翻胃方

藿香一錢 陳皮一錢 半夏八分 赤茯苓一錢

人參一錢 白豆蔻一錢 蘇子炒一錢 厚朴製八分

檳榔八分 枇杷葉蜜炙一錢 白芥子炒八分

沉香一錢 良薑三分 官桂二分 丁皮二分

杵頭糠一撮

右剉一劑生薑三片棗一枚水二盞煎八分服

○加味六君子湯 治脾胃大虛以致膈噎不食

○六君子湯加炮乾薑白豆蔻黃連製吳茱萸



按此方治  
翻胃氣虛  
有寒者

回生養胃丹 治真元虛損心胃不交精神耗散

脾臟受濕飲食不納五味不成津液反成痰涎聚於中脘不能傳道以致大腸燥澀小便反多而赤或時嘔吐酸水久成翻胃結腸之症

蒼朮 米泔水浸三日洗淨曬  
雄猪肚 一箇壁土揉擦洗淨入蒼朮蓮肉在內搗如泥捻作小餅烘乾加後藥炒去伏龍肝用或用黃土亦可  
南星 四兩細切薑汁浸一宿以伏龍肝同  
半夏 四兩泡曬乾細切好醋浸七日蒸熟  
栗米 四兩薑汁浸蒸焙  
白茯苓 一兩薑汁炒  
厚朴 一兩

按此方治  
翻胃有熱者

蓮木 醋炒 一兩  
萆澄茄 一兩  
砂仁 一兩  
三稜 醋炒 一兩  
白豆蔻 兩 穀芽 兩 炒  
麥芽 兩 炒  
甘草 一兩  
丁香 五錢  
木香 五錢  
沉香 五錢  
右為末稀麩糊為丸如梧子大每服一百丸空心時陳米湯送下

加味保和丸 治實熱翻胃  
保和丸 錢三方見傷食加薑汁浸炒黃連三錢山查肉三錢共為末米糊為丸如麻子大每服六十九煎人參竹瀝湯送下  
九僊奪命丹 秘方 治翻胃痰涎壅盛

古今醫金 卷五



按此方治  
翻胃腹中  
積塊者

○南星

薑製三錢

半夏

薑製五錢

枯明礬

錢五

枳殼

麩炒一兩

厚朴

薑製五錢

人參

三錢

木香

四錢

豆豉

洗一兩

甘草

三錢

加阿魏

錢三

糖毬子

錢五

右為末老米打糊為餅如錢大瓦上焙乾晴夜

露過每服一餅細嚼以薑煎平胃散送下

○沉香降氣丹

長葛李大尹傳方

治翻胃腹中有積塊

黑牽牛

取頭末三兩

大黃

酒蒸一兩

檳榔

一兩

當歸

酒浸一兩

良薑

三錢

蒼朮

一兩

青皮

炒一兩

陳皮

五錢

烏藥

一兩

砂仁

五錢

枳殼

麩炒一兩

枳實

麩炒五錢

香附

炒一兩

沉香

三錢

三稜

三錢

半夏

製五錢

木香

三錢

莪朮

三錢

黃連

汁炒一兩

黃芩

酒炒一兩

右為末酒糊為丸桐子大每服六七十丸淡薑

湯送下

○木香順氣丸

俞九河傳方

治翻胃大便閉結者

沉香

五錢

木香

三錢

當歸

酒浸一兩

白茯苓

一兩

山藥

一兩

郁李仁

二兩

檳榔

二兩

兔絲子

酒製一兩

牛膝

酒浸二兩

枳殼

麩炒一兩

獨活

一兩

防風

一兩

火麻仁

二兩

大黃

酒蒸五錢

右為末煉蜜為丸如梧子大每服二十五丸白

按此方治  
翻胃大便  
閉結者

古今醫鑑

卷五

三



按此方治  
定翻胃之  
生死者

滾湯下

○定生丹秘方治噎膈翻胃

雄黃 三錢 硃砂 三錢 阿魏 五分 礞砂 五分

乳香 三錢 半夏 三錢 木香 三錢 沉香 一錢

肉豆蔻 三錢 菜豆 四十粒 烏梅 四十箇 百草霜 三錢

○木右為末將烏梅以熱湯泡令軟剝去核研極爛

入藥搗為丸如彈子大百草霜為衣陰乾每用

一粒噙化嚥下以薑湯漱口復以陳麥餅火燒

熟細嚼壓之噙藥即燃官香一炷如香盡藥未

化者難治藥先化香未盡者可愈按此方用之

按此方治  
翻胃收功  
保後之劑

以定吉凶生死者

○養血助胃丸雲林製治嘔吐翻胃愈後用此養元氣

健脾胃生血脉調榮衛清鬱氣收功保後

當歸 酒洗 一兩 川芎 一兩 白芍 鹽酒炒 一兩

熟地黃 薑汁浸 八錢 人參 五錢 白朮 土炒 一兩

白茯苓 六錢 甘草 炙 三錢 山藥 炒 一兩

蓮肉 去皮心 一兩 扁豆 薑汁炒 六錢

右為末薑打神麩為丸如梧桐子大每服六

七十九空心白滾水下

效逆



**脉** 浮而緩者易治，弦結而按之不鼓者難治。○或結

或促或微皆可治。代者危，右關脉弦者木乘土位，難治。○肺脉散者是心火刑於肺金也不治。

**病** 夫欬逆者氣逆上衝而作聲也，俗謂之呃逆是也。

其發也或三五聲而止，或七八聲而止，或連續不絕，收氣不回者，然所得之由不同，有因久病胃虛

而得者，有因傷寒失下而得者，有因痰熱內鬱，火氣冲上而得者，有因過服寒劑胃寒而得者，有因

水氣停痰，心下痞悸而得者，大抵欬逆者不順之義。

**治** 治法當以降氣化痰和胃為主，隨其所感而用藥。

其或病久脾胃衰敗而發欬逆，額上出汗，連聲不絕者，最為惡候，不治之證也。

**方** 鮮陳湯 治呃逆欲死

半夏 五錢 生薑 一錢

右剉一劑水煎服

○温中散 治吐瀉及病後胃中虛寒，欬逆至三四

聲或數聲相連，收氣不回者難治。

丁香 一錢 柿蒂 一錢 人參 一錢 茯苓 一錢

橘皮 一錢 良薑 一錢 半夏 一錢 生薑 一錢



甘草 三分

右剉一劑水煎服

○羌活附子湯 治吐利後胃寒發呃

羌活 附子皮泡去 小茴炒各 乾薑泡

木香各一錢 丁香一錢

右剉棗一枚水煎入鹽少許不拘時溫服

○橘參飲 治吐利後胃虛膈熱而欬逆者

橘皮五錢 人參二錢 竹茹二錢 甘草炙一錢

其右剉作一劑生薑五片棗三枚水煎服

○黃荆散 治傷寒發熱而欬逆者

黃荆子不拘多少炒水煎服

○鯁法 治欬逆服藥無效者

好硫黃乳香各等分 以酒煎急冷患人嗅之

○雄黃酒

不明雄黃一錢 酒一盞 煎七分 急冷患人嗅其熱

吞酸

脈弦而滑兩寸或浮而弦或浮而滑或沉而遲或

緊而洪或洪而數或沉而遲胸中寒飲洪數者熱

痰在膈間時吐酸水欲成翻胃之疾也



病丹溪曰吞酸與吐酸不同吐酸素問明以為熱東  
垣又言為寒何也吐酸是吐出酸水如醋平時津  
液隨上升之氣鬱積而成鬱積而久濕中生熱故  
從火化遂作酸水吐出非熱而何其有積之以火  
不能自涌而出伏於肺胃之間略不得上嚥不得  
下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表得  
溫煖則腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得  
暫解非寒而何素問言熱者主其本東垣言寒者  
言其標也

戴氏曰濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏其

食不得傳化故作酸也如穀肉在器濕熱則易為  
酸也

原病式曰吐酸者肝木之謂也由火盛制金不能  
平木則肝木自盛故為酸也如飲食熱則易於酸  
矣必用糲米蔬菜以自養宜節厚味

方清鬱二陳湯 治吞酸刺心及吞酸嘈雜

- 陳皮 一錢
- 半夏 一錢
- 茯苓 一錢
- 蒼朮 八分
- 川芎 八分
- 香附 一錢
- 神麴 炒五分
- 枳實 炒八分
- 黃連 炒一錢
- 梔子 炒一錢
- 白芍 七分
- 甘草 三分

右剉一劑生薑三片水煎服或為丸服尤效



○茱蓮丸

治鬱積吞酸

吳茱萸去梗湯泡 陳皮去白 黃芩陳壁土炒  
黃連陳壁土炒 蒼朮米泔浸炒 各五錢

右為末神麩糊為丸每六七十丸津液嚥下

○蒼連丸

治鬱積吐酸

蒼朮米泔浸 陳皮一兩 半夏一兩薑汁炒  
黃連一兩半夏 白茯苓一兩

吳茱萸炒一兩冬月倍用

右為末蒸餅為丸如菘豆大每服二十丸食後

服

按此方治吞酸吐酸嘔雜噯氣兼治之劑

○麩朮丸

治中脘宿食雷飲酸齧心痛口吐清水

神麩炒三兩 蒼朮米泔浸 陳皮一兩 加砂仁一兩  
右為細末生薑汁煮神麩糊為丸如梧桐子大

每服七十九薑湯送下

○平肝順氣保中丸

治鬱火傷脾中氣不運胃

中伏火鬱積生痰致令嘔吐吞酸嘔雜心腹脹悶常服順氣和中健脾開胃進美飲食化痰消

滯清火抑肝

香附米三兩童便浸三日炒 川芎二兩 陳皮去白  
白朮四兩土炒 厚朴一兩 枳實二兩炒 黃連薑汁炒



神麩炒二兩 麥芽炒七錢 木香三錢 梔子薑汁炒一兩

萊菔子炒兩 半夏薑汁炒二兩半

白茯苓兩 砂仁炒四錢 乾生薑兩 山查取肉二兩

青皮六錢香油炒 甘草炙四錢

右為末竹瀝打神麩糊為丸菘豆大每服百丸

○平食後白滾湯送下日服二次

附噯氣

病胃中有火有痰黃芩 此係食鬱有熱火氣衝上用黃芩

一云噯氣吞酸此係食鬱有熱火氣衝上用黃芩

為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛

方星半湯 治胃中有鬱火膈上有稠痰故作噯氣

南星 半夏 石膏 香附

梔子

右剉生薑煎或作丸亦可

軟石膏丸 治食積痰火并瀉胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菘豆大每服二十九滾湯送下

嘈雜

脉 右寸關緊而滑兩手弦滑胸中有雷飲寸脉橫者

膈上有橫積也右關弦急甚者木乘土位欲作胃



反難治

病夫嘈雜者是痰因火動其證似饑不饑似痛非痛如有懊懷不自寧之狀者是也其證或兼噎氣或兼惡心漸至胃脘作痛痰火之為患也

治治法以南星半夏橘紅之類以消其痰芩連梔子

知母之類以降其火蒼朮白朮芍藥之類以健脾行濕壯其本元又當節慾無有不安者也

一肥人嘈雜二陳湯加撫芩蒼朮白朮炒梔子一濕痰氣滯不喜食用三補丸加蒼朮倍香附

按此方治痰火嘈雜之劑

化痰清火湯

治嘈雜

南星 半夏 陳皮 蒼朮

白朮 白芍 黃連 黃芩

梔子 知母 石膏 甘草

右剉生薑三片煎服

○養血四物湯 治血虛嘈雜

當歸 川芎 白芍 熟地黃

人參 茯苓 半夏 黃連

梔子 甘草

右剉生薑三片煎服去人參加香附貝母甚效

○茯苓補心湯 治婦人心胸嘈雜氣盛血衰者

按此方治血虛嘈雜之劑



○於卽參蘇飲合四物湯

此性主益三三氣血氣夫入冬氣寒物只此其然

蘇子 甘草

參 人參 茯苓 半夏 黃 芩

○養血四物湯 此血氣調攝 養血之聖藥也

白朮 芍藥 當歸 川芎

白朮 芍藥 當歸 川芎

白朮 芍藥 當歸 川芎

王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之五

養木

