

李

臨海葉隱衡編纂

仲 宏

傷寒雜病指南

李家
仲
宏

上海廣益書局發行

於龍

傷寒

社

病

指角備勇

莫鴻達

莫鴻達

鳳

宇

曉

仲

賓

氏

鴻達

仲

賓

氏

通

軍

氏

太陽病主汗脈沉舌僻陽信

古聖多麻桂石黃花甘陳

三時医能掌鄭君廿麻之

莫

敵

誰

辟

莫

適

附

莫

施

辟予

手面热是外感
于心热是內傷

莫仲賓研究于石門學

屬學舍是也

協調中益氣陽

不應是和解二方

傷寒論

加脈

臨海葉隱衡編纂

后序御書舍

孔子曰：「徒墨

楊朱

莫鳴途閱

傷寒指南

相傳

莫

敵

孫

子

陽達在后沙研

上海廣益書局發行

究醫學是尤之，易夏也

多載新詞

醫家理學之必用書

吳

物

指
布

布

對

館

莫
適
通
孝

中立

者改以

中國藥物新字典

精裝一厚冊

(明)

(說)

是醫家必備之新本草
途徑別開之新字源

△欲知藥物性質者……不可不看

△欲知藥物名稱者……不可不看

△欲知藥物功用者……不可不看

△欲知藥物種類者……不可不看

是編為江忍庵先生所輯。採錄古今名人本草
匯合而成。依據字典。按部列入。分為十二
集。合訂一巨冊。其中所載藥物。約得六千
四百餘種。搜羅宏富。鉅細靡遺。與綱目相
類頗。並且每一字下。詳加音註。而於性質
功用二者倍加注重。不獨使醫家用備參攷。
免煩檢查之勞。即粗知文字者。亦不難翻閱。
而得。藉資研究。誠不愧空前絕後之佳本也。

定價大洋二元函購另加郵費每部三
一角三分

中直

僕

僕

僕

僕

僕

僕

叙言

指南傷寒論

莫道

道

我國醫道。三代以降。咸宗於漢張仲景。稱為醫之聖者。而仲景之醫聖。厥在傷寒論。與金匱要畧。雜病論兩篇。立法立方。啟後世之法程。其於傷寒論中。立三百九十七法。一百一十三方。其於金匱要畧。分門別類。包舉該括。示人以規矩準繩。可得觸類旁通。應變化於無窮。大法微言。昭著千古。然遺書千載。謬錯難免。迭經時代名家詮解。類皆依文釋義。未能澈底懸鵠。示人標準。後世醫書雖多。又類皆欲自成一家。鮮將治術聯為一貫。或偏於醫案。或詳於分帙。煩詞駁雜。未足列炬當途。指示迷程。值茲西醫日漸澎漲。中醫幾無昂頭餘地。舉世多以中醫之理由。於摸索。不如西醫之單刀直入。詎知外科剖解之學。中醫失教。原讓西醫。而內科養護之法。不及我中醫遠甚。余深有慨。夫中醫之不振也。爰述醫理一貫之途徑。而示人以指南。特編各科指南。宏茲醫學。俾士子人人手自一編。間窮其法。不特救人還自衛已。諒舉世有同情也。爰弁數言於首。以為序。

莫道

編者識

中一三

傷寒指南

目錄

家雖負學不輟是人之不欲也

入門辨證訣

傷寒總例

太陽病

陽明病

少陽病

太陰病

少陰病

厥陰病

合病併病壞病過經不解等病

春溫暑病秋瘡風溫等病

婦人傷寒

小兒傷寒

思修身

莫仲賓

故凡

緯亭

十

九

子曰五少處也

富貴是人所好也 不以道得

三

七

莫中立 鏡清

卷之二

逸亭

十三

十四

十六

十七

傷寒指南

四庫全書
醫家類

臨海葉衡隱編纂

△入門辨證訣

恒益公司內呈

【發熱外感內傷辨】凡病鮮有不發熱者。而內傷外感其大關鍵也。人迎脈大於氣口。為外感。氣口脉大於人迎。為內傷。外感則寒熱齊作而無間。內傷則寒熱間作而不齊。外感惡寒。雖近烈火不能除。內傷惡寒。得就溫暖而必解。外感惡風。乃不禁一切風寒。內傷惡風。惟惡些少。賊風外感。證顯在鼻。故鼻氣不利。內傷。證顯在口。故口不知味。外感。則邪氣有餘。故發言壯厲。先輕而後重。內傷。則元氣不足。故出言懶怯。先重而後輕。外感頭痛常常。內傷頭痛時作時止。外感手背熱。手心不熱。內傷手心熱。手背不熱。若夫內傷外感兼病而相合者。則其脉證並見而難辨。宜細心求之。若見內證多者。則是內傷重而外感輕。宜以補養為先。若是外證多者。外感重而內傷輕。宜以發散和解為急。

【傷寒類傷寒辨】世傳以瘦飲脚氣虛煩為似傷寒。王叔和又以瘦濕霍亂為似傷

寒實則以形證較之。非止此數者。茲先以冬溫等病與傷寒辨析之於左。

自霜降以後。天令寒沴。感之而病者。傷寒也。脉浮緊無汗。

霜降以後。當寒而不寒。乃更溫暖。因而衣被單薄致感寒而病者。冬溫也。若時氣發班。與傷寒熱未已。再遇溫熱。為溫毒。

春時天道和暖。有人壯熱口渴而不惡寒者。春溫也。若天令尚寒。冰雪未解。感寒而病者。亦曰傷寒。

三月以後。八月以前。天道或有暴寒。感之而病者。時行寒疫也。

夏月有病頭痛。譖語。自汗。身不甚熱。兩脰逆冷。四肢沉重。胸腹滿者。濕溫也。其人常傷於濕。因而中暑。濕熱相搏。故發此病。不可汗下。

頭痛。身熱。自汗。與傷寒同。而脉尺寸俱浮。身重默然。但欲眠。鼻息鼾。語言難出。四肢不收者。風溫也。不可發汗。

病嘔吐而利。頭痛。身痛。惡寒發熱。或吐利止而發熱者。霍亂也。

身熱。足寒。頭項強急。惡寒。時頭熱而赤。目脉赤。頭面搖。口噤。背反張者。瘡也。
頭熱與傷寒相似。而脉不浮緊。頭不疼。身不痛。不惡寒。或煩時頭亦痛。煩止痛亦止。

虛煩也。

發熱。憎寒。頭疼。肢節痛。嘔惡。與傷寒相似。而病起自脚。脚膝腫痛。兩脰或腫滿。或枯細。大便堅者。腳氣也。

憎寒。發熱。惡風。自汗。胸滿。氣上衝。咽不得息。與傷寒相似。而頭不痛。項不強。亦有時頭痛。止作無常。其脉緊而不大者。痰也。痰在上焦。則寸口脉沉滑。或沉伏。痰在中焦。則右手關脉滑大。又目下如灰烟黑者。亦痰之候也。

▲傷寒總例

【傷寒四時不同】春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冷冽。此四時正氣之序也。然傷於四時之氣。皆能為病。惟冬時嚴寒。觸冒之者。乃名傷寒。若中傷寒而不即病。其寒毒藏於肌膚。至春變為溫病。至夏變為暑病。暑病者。熱極重於溫也。是以辛苦之人。春夏多溫熱病者。皆由冬時觸寒所致。非時行之氣也。凡時行者。春時應暖而反大寒。夏時應熱而反大涼。秋時應涼而反大熱。冬時應寒而反大溫。非其時而有其氣。此即時行之氣也。故春分節以後。至秋分節以前。天有暴寒者。皆為時行寒疫。傷寒例曰。冬溫之毒。與傷寒大異。為治不同。又曰。寒疫與溫及暑病相

似。但治有殊。則不可不先審也。世人每以溫病、熱病與寒疫混稱傷寒。是大誤矣。

〔傳變〕凡傷於寒。其病必傳變。初則尺寸俱浮。此太陽受病也。當一二日發。頭項痛。腰脊強。至尺寸俱長者。此陽明受病也。當二三日發。身熱。目疼。鼻乾。不得卧。尺寸俱弦者。少陽受病也。當三四日發。胸脇痛。耳聾。此三經雖受病。而尚未入府。可汗而已。若尺寸俱沉細者。乃太陰受病也。當四五日發。腹滿。嗌乾。尺寸俱沉者。少陰受病也。當五六日發。口燥。舌乾而渴。尺寸俱微緩者。厥陰受病也。當六七日發。少腹煩滿。而囊縮。此三經受病已入於府。可下而已。若傷寒後脉仍靜者。為不傳。又脈縱浮縮。而人身溫和者。此為欲解也。

至於兩感之病。則異是。兩感者。表裏俱病之謂也。彼兩感於寒者。一日太陽受之。即與少陰俱病。則頭痛。口乾。煩滿而渴。二日陽明受之。即與太陰俱病。則腹滿。身熱。不欲食。讖語。三日少陽受之。即與厥陰俱病。則耳聾。囊縮。水漿不入。此三陰三陽五藏六府。皆受病。榮衛不行。府藏不通。死也必矣。

故傷寒病。熟熱雖甚。不死。苟不兩感於寒。更不傳經。至七日後。病自愈也。若再傳至十四日。亦能愈也。若在十四日之内。尺寸陷者。大危。過十四日。更感異氣變為他

病者當依壞証而治之。

【汗下大法】傷寒之病多從風寒得之。其病初在表。故當先解其表。此在汗之一法也。若風寒入裏則不消矣。因其不能消也。必見大滿大實堅有燥屎之狀。此時自可除下之。雖然傷寒要緊處在表裏。須分明白而為汗下。如失血家不可發汗。淋家不可發汗。陽明汗出而多宜急下。少陰下利而渴宜急下。蓋一則不當用表劑。當徐徐解散。一則當下而不下。則熱毒轉深。是亦不可不審也。

【可汗】大法太陽病脉浮而數者可發汗。陽明病脉遲汗出微惡寒者可發汗。凡發汗祇令手足俱周即佳。不必令如水流。若病不解宜重發汗。蓋汗多恐亡陽也。若陽虛不得重發汗。

【不可汗】太陽病發熱惡寒脉微弱者無陽也。不可發汗。少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗。咽喉乾燥不可發汗。亡血不可發汗。衄家不可發汗。下利不可發汗。淋家不可發汗。瘡家不可發汗。總之榮氣不足血氣微少之人未可發汗也。【可下】大法凡可下者中病便止不必盡劑也。少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之。少陰病六七日腹滿不大便者急下之。陽明病發汗熱多者急下之。病人無

表裏證。發熱七八日。雖脈浮數者可下之。太陽病六七日。表證仍在。脉微而沉。其人發狂者。以熱在下焦。少腹鞭滿。蓋淤熱在裏故也。宜下之。

【不可下】非陽明之本病。不可下。蓋陽本病。胃家實故也。故非痞滿燥實。不可下。非潮熱發渴。不可下。非脉沉數。不可下。又脉浮者。不可下。脉虛者。不可下。惡寒者。不可下。嘔吐者。不可下。

【可吐】大法。凡用吐藥。中病即止。亦不必盡劑也。太陽病。頭不痛。項不強。寸脉微浮。胸中痞。氣上衝咽喉。不得息者。此為有寒。當吐之。少陰病。飲食入口。則吐。心中溫溫欲吐。復不能吐者。宜吐之。宿食在上脘者。宜吐之。手足逆冷。客在胸。心下滿而煩。欲食不能食者。病在胸中。當吐之。

【不可吐】少陰病。飲食入口。則吐。手足寒。脈弦遲者。此腸上有寒。不可吐也。餘若四肢厥逆。虛家新產。脉微之人。皆不可吐。

▲太陽病

經曰。太陽之為病。頭項強痛。而惡風寒。不傳經者固有之。然而傳者多矣。即所謂傷寒。一日太陽受之。脉若靜者。為不傳。若欲吐及煩躁。脉數急者。為傳也。太陽經治。

法如頭痛發熱汗出惡風者。桂枝湯主之。此為榮弱衛強與以桂枝湯解散風邪調和榮衛也。若脉浮緊發熱汗不出者不可與之。蓋桂枝湯本為解肌之劑也。如頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者。麻黃湯主之。此為榮強衛弱與用之藥故彼時代以葛根葱白豆豉之類以發之為愈矣。至若發熱惡寒脉浮緊以麻黃湯以發其汗也。然此劑祇用於天氣寒冷之時。若在夏月炎暑之時為禁身疼痛不汗出而煩躁者。大青龍湯主之。項背強几汎汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。項背強几汎汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。病已得八九日發熱脉微惡寒此陰陽俱虛不可發汗。宜桂枝麻黃各半湯。小發其汗以除表邪。發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也。不可發汗。宜桂枝二越婢一湯。因此脉微而加弱則虛象更顯。故小汗不宜。但因病在太陽表證未罷。祇帶用桂枝。不令汗而已。

〔發熱〕發熱者無休止時也。寒熱者寒已而熱熱已而寒相繼而發也。潮熱者有時熱有時止如潮汎之不失其期也。此但云發熱經云傷寒一二日或已發熱或未發熱。凡翕翕發熱而惡風惡寒頭痛脉浮者表熱也。原由風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致。宜汗之。若蒸蒸發熱而兼有譖語大便閉小便赤腹滿惡熱脉滑實者裏

熱也。原由陽氣下陷，入陰中所致。宜下之。此大概而言也。就証以論。如發熱而嘔者。用小柴胡湯。發熱欬嗽表不解者。用小青龍湯。發熱而喘表不解兼胸滿者。用麻黃湯。發熱汗解後復煩躁脉浮數大者。可更發汗。宜桂枝湯。發汗後惡風寒者。虛故也不惡寒。但惡熱者實也。宜調胃承氣湯。發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也。亦宜調胃承氣湯。發熱汗出不解心下痞硬嘔吐而利者。宜大柴胡湯。發汗後仍發熱心悸頭眩身瞞動者。宜真武湯。汗出熱不去內拘急四肢痛下利厥逆惡寒者。宜四逆湯。汗下後仍頭痛發熱心下滿小便不利者。桂枝湯去桂加茯苓白朮湯。大下後身熱不去心中結痛者。梔子豆豉湯主之。大下後身熱不去微煩者。梔子乾姜湯主之。發熱下利脉微遲厥逆者。通脈四逆湯主之。發熱吐利心下痞硬者。大柴胡湯。渴者五苓散。不渴者理中湯。若在婦人其發熱經水適斷。小柴胡湯。發熱脉數消渴不大便者有淤血。宜抵當湯。此於發熱諸證施治如是。然自宋元諸賢對於表證發熱治例。如張潔古云。有汗不得服麻黃。無汗不得服桂枝。並特創黃芪湯。川芎湯。神木散以應證。謂黃芪湯有汗則能發之。神木散治內傷冷飲外感寒邪無汗者。是亦和解之好劑也。並彙錄解表雜方於左。以

備參酌焉。

九味羌活湯。治不問四時。但有頭痛。骨節痛。發熱惡寒。無汗脉浮緊者。皆宜用之。十味芎蘇散。治四時傷寒。發熱頭痛。養胃湯。治外感風寒。內傷生冷。憎寒壯熱。頭目昏疼。人參敗毒散。治傷寒頭痛壯熱。惡寒鼻塞。聲重身腫。參蘇飲。治內外一切發熱主藥。十神湯。治時令不正。感冒發熱。並不問陰陽兩感。風寒咸宜服之。藿香正氣散。治傷寒頭痛憎寒壯熱。並霍亂吐瀉。通聖散。治風熱鬱結。憎寒發熱。口苦舌乾。咽喉不利。涼膈散。治心火上盛。膈熱有餘。前胡湯。解熱。

〔惡寒〕。惡寒者。風寒客於榮衛。非寒熱之寒。又非惡風也。故不待見風而後怯寒。雖身大熱。亦不欲去衣被也。甚則向火增被。不能遏其寒。所以然者。由陰氣上入陽中。或陽微。或風虛。相搏之所致也。惡寒一切屬表。經云。發熱惡寒。發於陽可發汗。無熱惡寒而踰脉沉細。發於陰可溫裏。故傷寒太陽病在表。則惡寒。少陽半在表半在裏。亦微惡寒。陽明在裏。本不惡寒。或惡寒者。必與太陽合病也。

太陽發熱惡寒脉浮。用方已見前。即大青龍湯是。茲更別舉各證治。則如惡寒脉微。而復利利止。亡血也。宜四逆湯加人參湯主之。發汗病不解。反惡寒者。虛故也。芍

藥甘草附子湯主之。下後復發汗心振寒脉微細者此內外俱虛也。宜當歸四逆湯真武湯。下後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之。若微惡寒者去芍藥加附子湯主之。汗下後心下痞而惡寒者表未解也。先用桂枝湯解表再用大黃黃連瀉心湯攻痞。至於舌乾口燥內有熱證口中不仁背惡寒者為三陽合病宜白虎湯。蓋背負陽抱陰背寒者陽弱也。陽氣既陷津液為涸故舌乾口燥祇用白虎湯以濟之。

【惡風】風邪中於衛則必惡風。蓋衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔者也。惡風惡寒俱為表證。但惡風比惡寒為輕耳。故其發散又自不同。若無汗惡風則為傷寒當發其汗故用麻黃湯。若汗出惡風則為中風當解其肌故用桂枝湯。發汗後遂汗漏不止其證似風濕相搏背惡風汗出小便不利四肢難屈伸但心下不滿身不痛宜用桂枝加附子湯。風濕相搏者骨節煩疼掣痛用甘草附子湯。身熱惡風項強脇滿手足溫而渴者用小柴胡湯。

【頭痛】傷寒頭痛雖屬三陽惟太陽經獨多蓋太陽為病屬表而頭痛專為主表。雖有傷寒六七日頭痛不大便有熱而與承氣湯下之故云若小便清者知熱不在

裏仍在表。是知頭痛屬表明矣。太陰少陰二經之脉從足至胸而還。不上循頭。故無頭痛。惟厥陰脉循喉嚨之後。上連目系。與督脈會於顛。亦有頭痛。却無身熱。亦與陽證不同也。然風濕病在少陰。濕溫病在太陰。而亦頭痛。陰毒之證又有頭痛。是不可不知。但內因頭痛作止有時。外因頭痛常常有之。直至傳裏方止。此即可明也。

是之證治。如大便不利六七日。頭痛身熱。小便赤者。宜承氣湯。若小便利者。證仍在表。須發汗。若頭痛者。必衄。宜桂枝湯。服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。心下滿微痛。小便不利者。桂枝湯去桂。加茯苓白朮湯。太陽中風。下利嘔逆。表解者可攻之。其人熱熱汗出。若發作有時。頭痛心下痞。引脇下痛。乾嘔短氣。汗出不惡寒者。表解裏未和也。宜十乘湯。發熱頭痛。脉反沉。復身痛。當用救裏四逆湯。又陽明身熱頭痛。漱水不欲嚥。必發衄。脉數者。犀角地黃湯。茅花湯。陽明病表裏大熱。煩渴引飲。頭痛如破者。宜竹葉石膏湯。陽明頭痛不惡寒。反惡熱。大便實。宜調胃承氣湯。少陽經頭痛。不分有汗無汗。皆以小柴胡湯主之。惟據王海藏所云。太陽頭痛有汗。桂枝湯。無汗。麻黃湯。陽明頭痛。白虎湯。少陽頭痛。小柴胡湯。太陰頭

痛脉浮。桂枝湯少陰頭痛。小柴胡湯。麻黃附子細辛湯。故李東垣亦以為太陰少陰二經雖不至頭。然痰與氣逆壅於膈中。則頭上氣不得暢降而為痛。因之亦有治法也。

【項強】發熱惡風。項強者。屬太陽。太陽病項背強。几反汗出惡風者。桂枝加葛根湯主之。太陽病項背強。凡無汗而惡風者。葛根湯主之。皆發散之劑也。然其中所以為治不同者。蓋發熱汗出惡風為表虛。表虛者可解肌。無汗惡風為表實。表實者可發汗。至於太陽中風加之寒濕而成痙病者。亦必項強。桂枝加栝蒌湯主之。服桂枝湯或下之。仍頭痛項強翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利者。桂枝湯去桂加茯苓白朮湯。傷寒四五日身熱惡風頭項強。脇下滿手足溫而渴者。小柴胡湯。

【體痛】體痛乃六經俱有之證。有表有裏。有寒有熱。有風有濕。如太陽傷寒榮血不利身疼者。宜發汗。若汗後脉遲體痛者。又宜溫之。裏寒外熱身疼者。先當救裏而後攻表。然欲別其狀況。則在拘急與否。如身拘急者。為之太陽身痛。其餘中濕身痛。在一身不可轉側。陰毒身痛。體勢沉重。各有別也。證治之法。發熱惡寒身體痛。

屬太陽病。麻黃湯大清龍湯主之。如兼心下支結。以柴胡加桂枝湯。若兼下利。清穀腹脹。先以四逆溫裏。後以桂枝發表。若尺脉遲者。必血少榮氣不足。先以黃芪建中湯養其血。俟尺脉回。再用柴胡等湯和解之。又發汗後身體痛。脉沉遲。桂枝加芍藥。生姜人参新加湯主之。傷寒八九日。風濕相搏。身體痛。煩不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濇者。桂枝附子湯主之。風濕相搏。骨節煩疼。不能屈伸。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。甘草附子湯主之。李東垣治風濕相搏。一身盡痛。用補中益氣湯。加羌活、防風、升麻、藁本、蒼朮。

▲陽明病

陽明之為病。胃家實是也。故陽明一經之病。治之尤難。蓋胃為水穀之海。五臟六府之大源。多血多氣之衝。乃吉凶死生所攸關。所以凡遇陽明証見八九。而太陽証有一二。未罷即從太陽施治。而不從陽明。祇可汗。而不可下也。凡陽明証。縱見八九。而少陽証畧見一二。即從少陽施治。又不從陽明。汗下雨不可用也。惟風寒之邪。已離太陽。未接少陽。恰在陽明界內。則可用藥亟為攻下。

【胃實不大便】不大便。大便難。大便軟燥屎。悉屬裏證。宜下者多矣。然有表未罷風

濕相搏。尤宜先解表已而下之可也。故曰。胃實有表者。先解表。茲就原證立論。如陽明病。汗出。大便硬而讞語者。宜小承氣湯。不大便。腹滿者。宜下之。若但繞臍痛者。則為燥屎。宜承氣湯。傷寒六七日。目中不了了。睛不和。無表裏證。大便難。身微熱。此為實也。宜用大承氣湯以急下之。胃氣強。小便數。大便難。麻仁丸主之。

〔不得卧〕不得眠之證。陰陽皆有之。正病於不得眠者。陽明也。如病二三日。不得卧。但欲起心下結。脉微弱者。此有寒分也。桂枝加厚朴杏子湯。身熱目痛。鼻乾。不得卧。尺寸脉俱長。小便不利。時有微熱。宜大承氣湯。脉浮緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱身重。煩躁。不得眠。用梔子豉湯。虛煩。奔擾氣在胸中。不得眠者。用酸棗仁湯。太陽病後。虛煩。不得眠。此膽寒也。用加味溫膽湯。大熱乾嘔錯語。呻吟。不得眠。用黃連解毒湯。

〔自汗〕衛氣者。護衛人之皮膚。肥實腠理。禁固津液。不得妄泄。然邪氣干之。則不能衛固於外。由是津液妄泄。濶濶然潤繫然出。即此所謂未由發散而自汗也。在傷風則發熱自汗。風濕甚者。則汗多而濡。但自汗有表裏之別。虛實之異。若汗出惡風及微惡寒者。皆表未解。宜發散。至於漏汗不止而惡風。及發汗後惡寒者。表

虛也。宜溫之。若汗出不惡風寒者。此表解裏病。下之則愈。王海藏云。太陽自汗。桂枝湯。陽明自汗。白虎湯。少陰自汗。四逆湯。此大較也。故云陽明證身熱目痛鼻乾。不得卧。不惡寒。而自汗者。白虎湯主之。餘若盜汗之證。在方睡熟。湊然出。覺則止。此由邪在半表半裏之間。當以和解法治之。宜黃芩湯。桂枝茯苓白朮湯。若僅頭上有汗。此熱蒸於陽。大陷胸湯。柴胡桂枝乾姜湯。宜用之。白虎湯。梔子豉湯亦可。倘僅手足出汗。則是因熱聚於胃。津液因之旁達也。蓋胃主四肢為津液之主。今現熱聚之證。宜大承氣湯。又有無汗之證。若其邪氣行於裏者。宜服桂枝湯或下之。寒邪在表而無汗者。仍宜大青龍湯。至於不得汗者。宜柴胡湯。其脉浮無餘證者。麻黃湯。

〔潮熱〕潮熱者。如潮汎之來。不失其時。一日一發。按時而然。謂之潮熱。若日有三五發。仍謂之發熱。非潮熱也。潮熱本屬陽明。故其病潮熱大便微軟。可與大承氣湯。僅有燥糞。可與小承氣湯。

〔讖語〕原之陽明為病。在於胃家實。胃實則有讖語。讖語者。呢喃而語。妄有所見而言也。因胃中熱盛。上盛於心。心為熱冒。則神識昏亂。而語言謬妄也。治之法。亦以

小承氣湯與大承氣湯為主。若僅在胃氣不和而致讞語。用調胃承氣湯。由於三陽合病。有腹重身渴。手足逆冷。遺尿發汗等狀者。以白虎湯主之。婦人中風發熱。經水適來。因之有讞語者。以柴胡湯主之。

【狂亂】經曰邪入於陽則狂。諸經之狂皆為陽盛也。傷寒熱毒在胃。併於心。至於發狂。為邪熱極矣。狂之發作。少卧不飢。妄言笑。妄起行。棄衣而走。登高而歌。皆獨陽亢極。使非吐下。不能已。治之法。宜以抵當湯或桃仁承氣湯。至於有所謂陽毒者。較狂亂為尤甚。其見證。煩躁狂走。妄言叫罵。面赤咽痛。鼻如烟煤。或身班如錦。下利赤黃。此陽毒也。分表裏治之。表者升麻湯黑奴丸。裏者大黃散。亦有用葶藶苦酒湯。梔子仁湯。三黃湯者。

【循衣摸床】循衣摸床。危候之證也。其證有二。一由太陽中風。以火劫汗。因成壞病者。一由陽明裏熱之極者。治之法。仍祇以承氣湯瀉之而已。

【喝】傷寒邪傳裏。則喝。邪在表。則不喝。喝。首屬陽明。蓋邪初傳。則熱微而喝微。邪傳深。則熱甚而喝甚。治之法。在三陽微喝者。五苓散。大喝者。白虎湯。三陰熱甚而喝者。則順下之。宜猪苓湯。大承氣湯。有以瀉心湯。瓜萎湯而並用之。

【嘔】嘔者聲物兼出也。與吐不同。吐者但吐其物而無聲。嘔有因於熱者。有為寒者。至於吐則悉言虛冷。故嘔家之為病。氣逆者必散之。痰飲者必下之。千金方曰。嘔家多服生姜。是要散其逆氣也。金匱要略曰。嘔家用半夏。以去其水。是要下其痰飲也。然細分之。則又有多種之別。如發熱無汗。嘔不能食。大柴胡湯主之。食穀欲嘔。吳茱萸湯主之。先喝而嘔。亦茯苓湯主之。嘔而下利。有寒熱者。黃芩湯。大柴胡湯主之。無熱者。猪苓湯。真武湯主之。嘔而心煩。梔子生姜豉湯。乾嘔欲吐。桂枝湯。膈上有寒。四逆湯。乾嘔不止。葛根湯。皆證治之要也。

△少陽病

少陽經治法。悉屬和解。惟於誤汗。讞語。屬胃之證。則以調胃下之。蓋少陽在於太陽。陽明之側。有太陽在後以為表。陽明在前以為裏。而少陽夾於表裏之間。故曰半表半裏。治法在表者宜汗。在裏者宜下。既居兩間。非汗下所宜。故治療鮮有正法。經曰。少陽中風。雨耳無聞。目赤。胸中滿而煩者。不可吐下。吐下則悸而驚。又曰。傷寒脉弦細。頭痛發熱。屬少陽。不可發汗。發汗則讞語。似此則汗吐下三法。皆少陽所忌。其劑不過和解而已。所以仲景祇以小柴胡湯而為用。正當也。

口苦咽乾。咽乾口燥舌澀俱為熱證。如云咽喉乾燥者不可發汗。以津液不足故也。治法以黃芩芍藥湯、犀角地黃湯、白虎加人參湯均可用之。若太陽中寒證因誤汗而致咽乾者。以甘草乾姜湯可復其陽。少陰病得之二三日即有口苦咽乾者。可以大承氣湯急下之。因其邪熱已甚恐腎水將乾急下之以全腎也。

眩。眩者俗謂頭旋眼花是也。凡傷寒頭眩多因汗吐下虛其上焦元氣所致。治之法以茯苓桂枝白朮甘草湯主之。蓋以和經益陽也。

往來寒熱。往來寒熱者。寒已而熱作。熱已而寒起。蓋寒為陰。熱為陽。裏為陰。表為陽。邪客於表與陽爭則寒發。邪入於裏與陰爭則熱發。表邪多則寒多而熱少。裏邪多則熱多而寒少。邪在半表半裏之間外與陽爭而為寒。內與陰爭而為熱。表裏之不拘。內外之無定。由是寒熱往來而無常也。治之法即以小柴胡湯用加減法而和解之。如胸中煩不嘔去半夏人參加括蔥實苦渴者去半夏加人參。腹中痛去黃芩加芍藥。腸下痞鞭去大棗加牡蠣。小便不利而心下悸去黃芩加茯苓。若欬逆去人參大棗姜加五味子是也。

脇滿痛。邪氣傳裏必先自胸而脇以次經心腹而入胃。是以胸滿多帶表證。脇

滿多帶半表半裏。腸滿痛治法。但和解而已。即用小柴胡湯是。如傷寒四五日。身熱惡風。頭項強。脇下滿。手足溫而渴者。小柴胡去半夏。加人參。括萎根主之。傳經邪熱。脇滿乾嘔者。以大柴胡湯主之。又有以治脇下痛。就小柴胡湯加枳殼。青皮。桔梗。芍藥。脇下硬。就小柴胡加牡蠣粉。

【胸滿】與脇滿痛相聯接。即所謂胸滿多帶表證。故太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。宜麻黃湯。潮熱大便溏。小便可。胸與脇滿不去者。宜小柴胡湯。然吳綬之治胸滿。多用吐法。以為實者。宜瓜蒂散。虛者。宜人參蘆或香蘇散飲之。以手探喉吐之。活人書之治胸滿。只用枳殼桔梗生姜。名曰枳殼湯。此各可法也。

【胸痛】胸脇滿痛。本多相聯。故胸痛亦宜小柴胡湯。如鬱鬱而痛不能食。按之有涎唾下。寸口脉微滑。則亦可吐之。吐後胸中痛。腹滿煩者。宜調胃承氣湯。

【耳聾】耳聾有二。一由重發汗虛。一由少陽中風。少陽受病也。若由重發汗虛者。用黃芪建中湯。少陽中風。兩耳無聞。又目赤胸滿煩者。不可吐下。祇用小柴胡湯。若少陽與厥陰俱病。耳聾囊縮。而厥者。此兩感證。其人必危。

【陽毒】陽毒之證。在初受病時所加。邪毒深重。加以當汗失汗。當下失下。或吐下後。

邪熱乘虛而入。誤服熱藥。使毒熱散。因之六脉沉實。舌卷焦黑。鼻中如烟煤。身面
錦班狂言直走。皆其見證也。治宜升麻蠶甲湯。陽毒梔子湯。葛根散。陽毒輕者。桔
梗大黃湯。龍膽草一物湯。

▲太陰病

三陰有傳經之邪。有內感之邪。傳經者。自太陽傳入者是也。內感者。直中三陰。非自
陽經次第流傳而來。由形寒飲冷。損動胃傷之所致也。蓋邪之生也。或生於陰。或
生於陽。其生於陽者。得之風寒雨暑。其生於陰者。得之飲食居處陰陽喜怒。故仲
景曰。發熱而惡寒者。發於陽也。無熱而惡寒者。發於陰也。此三陰內感之證。首尾
無熱。如有熱者。所謂反發熱也。於此別乎三陽各證。大宜詳察焉。

經曰。尺寸俱沉細者。太陰受病也。太陰之為病。腹滿而吐食不下。自利益甚。時腹自痛。
蓋太陰為病。陽邪傳裏也。太陰之脉布胃中。邪氣壅而為腹滿。上不得降者。嘔吐
而食不下。下不得升者。自利益甚。時腹自痛。陰寒在內而為腹痛者。則為常痛。此
陽邪干裏。雖痛而亦不常。此不可下。若下之必胸下結。輒治之法。邪氣入裏者。當
以辛溫之劑和之。若陰寒在內者。當以熱劑溫之。又太陰病脉浮者。可發汗。宜桂

枝湯設太陰病脉弱便利當用太黃芍藥者亦宜減之以其人胃氣弱易動故也。
【腹滿】腹滿俗云肚脹有屬熱者有屬寒者陽熱則腹滿嗌乾或大小便秘澀或潮
熱讖語等證陰則腹滿吐食不下自利益甚時腹自痛經曰腹滿不減為實可下
去之若腹滿時減為虛則不可下治之法於汗後腹脹滿者厚朴生姜甘草半夏
人參湯主之於下後心煩腹滿卧起不安梔子厚朴湯主之以其邪氣壅於胸腹
間也吐後邪氣不去加之腹滿脹者胸中之邪下傳入胃壅而為實當須下之調
胃承氣湯可也發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯傷寒七八日身黃如橘
色小便不利腹微滿茵陳蒿湯主之下利腹脹滿身體痛者其裏有虛寒先與四
逆湯溫其裏次與桂枝湯攻其表以解身疼若飲食不節寒中陰經胸膈不快腹
滿者枳實理中丸五積散理中湯桔梗半夏湯均可

【腹痛】邪氣入裏與正氣搏則為腹痛此所以腹痛者正與三陽有異如太陽經腹
不痛少陽有胸脇痛而無腹痛若陽明腹滿痛此為裏實宜下之大柴胡湯小承
氣湯應用而三陰腹痛者裏寒故也然治此證當明了陽氣傳太陰經腹滿而痛
證有二有實痛有虛痛分別治之如腹鳴泄利而痛者虛痛也小建中湯主之腹

滿大便秘。按之而痛。實痛也。桂枝湯加大黃主之。餘如胃有邪氣。腹痛欲嘔。宜用黃連湯。小腹痛屬厥陰。宜當歸四逆湯。大實腹滿。或繞脅刺痛。脉實。以大承氣湯下之。脈弦腹痛。無熱無寒。芍藥甘草湯。脈弦口苦。發熱腹痛。小柴胡去人參加炒白藥。至於腹痛兼頭痛發熱吐利。為霍亂。治法見雜證霍亂內。

〔黃〕濕熱俱甚。則發身黃。傷寒。至於發黃。為病亦已甚矣。其狀色如烟熏。乃濕病也。一身盡痛。色如橘黃。乃黃病也。一身不痛。蓋邪風被火。兩陽相薰。身於是發黃。實由內有熱而被攻發者也。治之法。如發黃小便不利。煩躁而渴。茵陳湯加茯苓。猪苓。滑石。當歸。官桂。發黃煩躁喘嘔不渴。茵陳湯加陳皮。白朮。生姜。半夏。茯苓。發黃四肢偏冷。茵陳湯加附子。甘草。往來寒熱。身盡黃。小柴胡加梔子湯。體痛發熱。一身如熏黃。小便自利者。木附湯。小便不利者。五苓散。

△少陰病

少陰之為病。但欲寐也。又欲吐不吐。心煩。經又曰。尺寸俱沉者。少陰受病也。以其脉貫腎絡於肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴。少陰病始得之。反發熱脉沉者。麻黃附子細辛湯主之。所謂始得者。緣少陰無身熱。而今有熱。故曰反發熱。以不當發熱而

熱也。又故曰始得之。因其初病邪淺。故與發散之藥。少陰病脉細沉數。病為在裏。不可發汗。以亡陽故也。少陰病得之二三日。麻黃附子甘草湯微發汗。蓋以其二三日無裏證。故微發汗也。若少陰病得之二三日。口中和。其背惡寒者。附子湯主之。蓋陽氣不足。陰寒氣盛。故宜此方。倘得之二三日以上。心中煩不得卧。黃連阿膠湯主之。少陰病脉沉者。宜四逆湯。病六七日腹痛不大便者。急下之。用大承氣湯。

〔但欲寐嗜卧〕凡衛氣寤則行陽。寐則行陰。而寐也必從足少陰始。故少陰之為病。脉微細。但欲寐。治法同在口苦吐利。盜汗。各類中。蓋但欲寐均見於各證內也。

〔口燥咽乾〕治法同在少陽病之口苦咽乾內。

〔咽痛〕在太陽陽明。咽痛各有一證。悉屬熱也。太陽治以半夏散。陽明治以四逆散。惟此少陰咽痛有六證。熟證者四。寒證者二。熱者治以猪膚甘草湯。桔梗湯。苦酒湯半夏散。寒者治以桂枝乾姜湯。真武湯。四逆湯。即厥陰咽痛亦治以桔梗湯。總之咽痛皆熱證。惟此少陰獨有二寒證者一。以汗多亡陽。故用乾姜附子以復陽溫經。一以陰盛格陽。用四逆以散陰通陽也。

【吐】若食入口即吐。乾姜黃連黃芩人參湯主之。心中嘔嘔欲吐復不能吐。始得之手足寒脉弦遲者。此胸中實不可下。當吐之。若膈上有寒飲乾嘔者不可吐。急溫之。宜四逆湯。發熱渴欲飲水。水入口則吐者。宜五苓散。寒多不飲水而吐者。理中湯去术加生姜主之。

【吐利】少陰病吐利。手足厥冷。煩躁欲死者。吳茱萸湯主之。既吐利。小便復利而大汗出。下利清穀。內寒外熱。脉微欲絕者。四逆湯主之。吐利止而身痛不休者。當消息和解其外。宜桂枝湯。惡寒脉微利止者。四逆加入參湯。

【下利】下利即自利之謂。不因攻下而自泄瀉也。有表邪傳裏。裏虛協熱而利者。有不因攻下而下之遂利者。是皆協熱也。此不因攻下而自渴利。即俗言漏底傷寒。但亦有協熱協寒之分。原病式曰。瀉白為寒。青黃紅黑皆為熱。大抵瀉利完穀不化。色不變。有如鴛溏或吐利腥臭。小便澄澈。口無燥渴。其脉或沉細或遲微。或身雖熱。手足逆冷。惡寒踰卧。此皆為寒也。凡熱證。則口中燥渴。小便或黃或赤或澀而不利。或所下如垢膩。其脉多數。或浮或滑。或弦或大。治法。凡胃虛內熱。煩渴瀉利。脉弱者。七味人參白朮散。若發熱者。參胡三白湯去黃芩加炒黃連。若腹滿小

便不利者。五苓散合理中湯。若嘔者。加藿香、半夏、生姜、陳皮。如濕多而瀉不止者。加蒼朮、白朮。如腹脹者。加厚朴。腹疼不止。加炒白芍、肉桂、木香。以溫之。凡下汗不可發汗。當先治利。俾利止內實。正氣得復。邪氣得解也。蓋利下由內虛。若加發汗。則內外皆虛。變證為難治矣。經曰。下利不可攻。至於太陽與陽明合病而下利。用葛根湯。太陽與少陽合病而下利。用黃芩湯。一則以汗。一則以和解。倘陽明少陽合病。邪氣入裏。當與承氣湯以下之。又若傷寒下之。續得下利清穀。不止身痛者。急當救裏。宜用四逆湯。俟清便自調。則裏氣已和。再與桂枝湯以救表也。經曰。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。此以寒為本故也。餘如白通湯、真武湯、通脉四逆湯。均為下利要劑。又若濕毒氣盛者。地榆散、黃連阿膠湯在所必用也。

▲ 厥陰病

厥陰。雖兩經交盡之名。然厥者。逆也。腎居極下。逆行而上。以傳於肝。故名曰厥陰也。邪傳厥陰。其熱深矣。故厥陰之為病。消渴氣上撞心。心中疼熱而不欲食。食即吐。衄下之利不止。又內經曰。尺寸俱微緩者。厥陰受病也。其脉循陰器絡於肝。故煩滿而囊縮。惟婦人則乳縮。蓋邪自太陽傳至太陰。則腹滿而溢乾。未成渴也。邪至

少陰則口燥舌乾而渴。未成消也。至厥陰成消渴者。熱甚能消水故也。又未能生火。肝氣通心。厥陰客熱。氣上衝心。心中疼熱矣。又傷寒六七日。為傳經已盡。則當入府。因胃虛客熱。飢不欲食。蛇在胃中。無食則動。聞食臭而出。此熱在厥陰。若便下之。是虛其胃氣。則必下利不止。皆厥陰病狀也。

【氣上衝心】氣上衝者。腹裏氣時時上衝也。如衝咽不得息者。宜瓜蒂散以吐之。奔豚氣上衝胸腹痛。往來寒熱。奔豚湯主之。於陰陽易少。腹裏急。引陰中拘攣。熱上衝胸頭重眼花燒棍散主之。氣衝胸口。噤不得語。欲作剛瘻者。葛根湯主之。

【飢不欲食】飢不能食者。此邪在胸中。其狀手足厥冷。脉乍緊心煩。宜用瓜蒂散吐之。

【吐蛻虫】是證與飢不欲食相聯合。此為藏寒。蛻上入腸。聞食臭出。故其人當自吐蛻。當蛻上時。煩躁昏亂。情狀欲死。謂之蛻厥。然蛻吐出即安靜。蛻厥者。烏梅圓主之。或理中安蛻散亦可。

【厥】厥者。手足冷也。蓋邪在三陽。則手足熱。傳到太陰。則手足溫。至少陰。則逆而不溫。至厥陰。則為之厥。甚於逆也。逆即四逆。亦冷也。手足寒冷之謂。故厥逆二字。每

每互言。總之厥甚於逆而已。治之法。下利清穀。裏寒外熱。汗出而厥者。通脉四逆湯。大汗出。熱不去。內拘急。四肢疼。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯。病人手足厥冷。脉乍緊。邪結在胸。心中滿煩。飢不能食。此病在胸中。宜瓜蒂散以吐之。然。是厥病。當注意陽厥陰厥之別。不可差誤。蓋陽厥者。先自三陽氣分因感寒邪。起於頭痛。發熱惡寒。後傳進三陰血分。變為四肢厥逆。大便燥實。讞語發渴。不惡寒反怕熱。或泄利便赤。脉沉有力。此謂之陽厥。是其陽極發厥。即陽證似陰。外雖有厥冷。內則有熱邪。原因大便失下。使血氣不通。故治之宜白虎湯。或大承氣湯。至於陰厥。乃三陰血分自受寒邪。初病無身熱頭痛。就使惡寒。四肢厥冷。以至踰卧不渴。或腹痛吐瀉。小便清白。身戰慄。面如刀刮。此為陰陽直中。非從陽經傳入。是謂陰厥。輕則用理中湯。重即四逆湯。此治厥病之要也。

【小腹滿】臍下為小腹。彼胸中滿。心下滿。皆氣也。而此小腹滿者。必有物聚也。如腹滿。即有燥屎者然。所謂物者。即溺與血也。邪結下焦。則津液不通。血氣不行。或溺或血。流滯而脹滿也。法宜用抵當湯。或抵當丸。桃仁承氣湯以下畜血也。若血為熱搏而不下。致小腹急者。乃與桃核承氣湯以攻之。

【囊縮】扁鵲曰。舌卷囊縮者死。仲景亦未列治法。但據王海藏各治法。大致以為囊縮有因熱極者。有因冷極者。凡熱極者可下。冷極者宜急溫之。下之用大承氣湯。溫之宜附子四逆加茱萸湯。當可保五生一死。

【陰毒】陰毒之為病。面青身痛。如被杖咽喉痛。復有指甲青黑者。乃是感天地惡毒。異氣入於陰經。或陰寒甚極而發此證。治之法。升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒。或甘草湯退陰散正陽丹還陽散。均可。

傷寒六經之病。盡如上述。是外所宜注意者。為合病。併病。壞病。以及過經不解等證。或有雖畧見於前各篇內。應另詳舉其治法焉。

▲ 合病併病壞病過經不解等病

【合病】合病者。兩經之證。各見一半。界限中分。不偏多偏少之謂也。治之法。如太陽與陽明合病。不下利。但嘔者。葛根加半夏湯主之。此合病必自下利。葛根湯主之。太陽與陽明合病。喘而胸滿者。不可下。麻黃湯主之。太陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生姜湯。太陽陽明合病。裏證為多。太陽少陽合病。下利。半表半裏為多。故用黃芩、甘草、芍藥、大棗。是和法也。至於陽明少陽合病。必

下利。其脉不負者順也。負者失也。互相剋賊。名為負也。脉滑而數者。有宿食也。當下之。宜大承氣湯。土木之邪交動。則水穀不停而急奔。此必下利也。陽明脉大。少陽脉弦。兩無相負。乃為順候。然陽明氣衰。則弦脉獨見。少陰勝。而陽明負矣。下之固是通用之法。然亦必其脉滑而且數。有宿食者。始為當下也。設脉不滑數而遲軟。則恐土敗垂亡。豈敢下乎。若夫三陽合病。脉浮大上關上。但欲眠睡。目合則汗。並腹滿身重。難以轉側。口不仁。面垢。讞語。遺屎。發汗則讞語。下之則額上生汗。手足厥冷。若自汗者。白虎湯主之。蓋三陽合病。五合之表裏俱傷。中州之擾亂可知矣。此時發汗。則偏於陽。陽明之津液倍竭。將成無陽之證也。下之則偏於陰。真陽無偶而益孤。手足厥冷。額上汗出。將成亡陽之證也。惟有白虎一湯。主解熱而不碍表裏也。

〔併病〕併病者。兩經之證。連串為一。即兼併之義也。併則不論多寡。或一經見三五證。一經見一二證。即併病也。治之法。如二陽併病。太陽初得時。汗之不澈。轉屬陽明。續自微汗。不惡寒。大柴胡主之。若太陽證不罷。不可下。可小發汗。設面色正赤。陽氣怫鬱。汗之不澈。其人煩躁短氣。宜更發汗。用葛根湯。二陽併病。太陽證罷。潮

熱手足汗。大便難讞語者。大承氣湯。太陽少陽併病。反下之成結胸。心下鞭下利。不止。水漿不下。心煩。生姜瀉心湯。小陷胸湯均可。

〔壞病〕壞病者。已汗。已下。病猶未解。治法多端。無一定之法可擬。故名之為壞病也。故壞病與過經不解大異。過經不解者。連三陰經俱已傳過。故其治但在表裏差多。差少。宜先宜後之間。若壞病。則病在三陽。未入於陰。故其治但在陽經。其證有結胸。下利。眩冒。振惕。驚悸。譫語。嘔噦。躁煩之不同。其脉有弦。促。細。數。緊。滑。沉。微。澀。弱。結。代。之。不。同。故必辨其脉證。犯何逆。然後得以法而治其逆也。所謂逆者。即不當汗而汗。不當下而下。或汗下過甚。皆不順於理之謂也。各證除下利。眩冒。讞語。嘔噦。已見前篇外。茲復舉結胸。振惕。驚悸。嚦。躁煩。各證而別其治法焉。

心下痞結。按之鞭滿而痛者。結胸也。經曰。病發於陽。反下之。熱入。因作結胸。蓋表當汗。而反下之。裏之正氣為下所損。則表之熱乘虛入裏。結於心下為結胸也。然結胸當下。但脉浮大。又不可下。因其時必表邪尚在。下之甚危。治之法初則急與理中湯。如未解。當用枳實理中丸。

振者。聳動也。惕者。跳突也。振惕。總是身體有跳動之謂。因傷寒。有吐下後。裏虛氣上

逆。陽氣損傷。不能主持諸脉。而身體因有聳動跳突。治之法。茯苓桂枝白朮甘草湯主之。又可用大補氣血之藥。如人參養榮湯亦可。

神不守為驚。心不安為悸。驚悸之證。亦由陽氣內弱。心下空虛故也。蓋如不當汗而汗。心液被竭。或大汗亡陽。致邪內迫。驚悸之證生矣。治之法。以桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主驚證。以炙甘草湯治悸證。

嘔。是乾嘔之重者。因大吐大下之後。胃氣虛極。復極發汗。外邪怫鬱。虛寒相搏。則為嘔也。治之法。以吳茱萸湯。或理中湯。橘皮甘姜湯。

煩躁者。俗謂焦躁是也。煩為煩擾之煩。躁為憤躁之躁。合而言之。煩躁為熱也。析而分之。煩陽也。為熱之輕。躁陰也。為熱之甚。治之法。以茯苓四逆湯主之。

▲春溫暑病秋瘧風溫等病

傷寒四時不同。然冬為傷寒。春為春溫。夏為暑病。秋為瘧疾。除瘧疾已列雜症編內。茲特就暑病、溫病。而詳言其治法焉。

【溫病】內經曰。冬傷於寒。春必病溫。論曰。太陽病發熱。而渴不惡寒者。為溫病。治溫病。與冬月傷寒。夏月熱病。不同。蓋其熱輕故也。以升麻湯解肌。湯柴胡桂枝湯最

良。熱多者，小柴胡湯主之。不渴外有微熱者，小柴胡加桂枝。嗽者，小柴胡加五味子。或煩渴發熱，不惡寒者，竹葉石膏湯亦可。倘前熱未已，又感溫熱，兩熱相合，變為溫毒。治之法，若無汗者，以三黃石膏湯汗之。若自汗者，宜人參白虎湯主之。表熱又盛者，更加柴胡主之。內實大便不通，以三黃瀉心湯下之。

【暑病】冬傷於寒，至夏變為熱病。此過時而發，俗謂之晚發是也。與暴中暑熱新病畧異。蓋新中暑，脉虛，晚發熱病，脉盛。故熱病見證，為發熱惡寒，頭痛身體肢節痛重，其脈洪盛。治之法，與傷寒同。有汗宜桂枝湯，無汗宜麻黃湯。加煩躁者，宜大青龍湯。然夏月藥性須帶涼，不可大溫。桂枝麻黃大青龍宜加減。然梔子升麻湯亦可用。

【風溫】前熱未已，又感於風，故變為風溫。與傷寒證異。傷寒證，發汗已則身涼。若發汗已，身灼熱者，風溫也。其見證，脉陰陽俱浮。自汗身重，多眠睡，鼻息必鼾，語言難出。治之法，忌發汗。宜姜蕤湯。身灼熱者，知母乾葛湯。如渴甚者，桔梗根湯。脉沉身重汗出者，漢防己湯。

金婦人傷寒

婦人傷寒。六經傳變。治例皆與男子同法。惟經水適來適斷。熱入血室。與夫胎前產後崩漏帶下。則治有殊別也。

【熱入血室】婦人傷寒中風寒熱發作。自汗頭痛。項背強。脈浮緩。恐其熱入血室。宜倍加芍藥桂枝湯。中風七八日。續得寒熱發作。有時經水適斷。此為熱入血室。其血必結。故如瘧狀。有時小柴胡湯主之。傷寒經脉方來初斷。寒熱如瘧。宜乾姜柴胡湯。若熱入血室。姪娠傷寒。宜以四物安養胎血治之。如身熱脈長而弦。往來寒熱。夜躁晝甯。經水適斷。熱入血室。不實滿者。小柴胡加牡丹皮主之。大實滿者。桃仁承氣湯下之。

【姪娠傷寒】姪娠傷寒。六經治例皆同。但要安胎為主。凡藥中有犯胎者。則不可用也。如藿香正氣散。十味芎蘇飲。小柴胡湯之類。有半夏能犯胎。宜去之。如必須用之。亦以半夏麴代之。又如川烏。附子。天雄。側子。肉桂。乾姜。大黃。芒硝。芫花。甘遂。大戟。蜀漆。水蛭。桃仁。丹皮。赭石。瞿麥。牛膝。等品。皆動胎之藥。均必須斟酌。故治此姪娠傷寒。服藥例。如發熱惡寒。不離桂枝芍藥。寒熱往來。不離柴胡前胡。若大渴。不離知母。石膏。五味子。麥冬。大便泄。不離桂附。乾姜。白朮。大便結。不離大黃。黃芩。若

月經適來適斷。不離小柴胡。若胎不安。不離人參、阿膠、白朮、黃芩。發汗。不離豆豉、生姜、麻黃、旋覆花。頭痛。不離石膏、山梔、前胡、滿悶。不離枳實、陳皮。發班變黑。不離梔子、黃芩、升麻。均於四物湯黃芪解肌湯六合湯三湯中斟酌加之可也。其中即以四物湯為主劑。如表虛自汗。頭痛項強。身熱惡寒。脉浮弱。宜表虛六合湯。即以四物湯加桂枝、地骨皮。頭痛身熱無汗。脉緊。宜表實六合湯。即以四物湯加麻黃、細辛。如中風濕肢節煩疼。脉浮頭痛。宜風濕六合湯。即四物湯加防風、蒼朮。餘可類推。黃芪解肌湯即人參、黃芪、當歸、川芎、甘草、芍藥。治傷風自汗。

〔產後傷寒〕新產後患傷寒。不可輕易發汗。蓋產傷力去血過多。若汗之必變筋惕、鬱冒、大便秘澀等證。其害非輕。凡有發熱。且與四物湯。以川芎、當歸為君。白芍須炒過。熟地須酒蒸。如發加軟柴胡人參乾姜主之。蓋乾姜之辛熱。能引血藥入血分。氣藥入氣分也。其餘六經各條皆同。但藥中必加四物湯為主。乃養血務本之要也。

▲ 小兒傷寒

小兒傷寒。六經治例亦同。但有胎熱、驚熱、血熱、客熱、寒熱、潮熱、痰熱、食熱、變蒸、發熱。

痘疹發熱、傷風發熱、一皆發作。狀似傷寒。要在明辨之耳。况肌體嫩弱、血氣未定。脉法不同。藥劑輕小之別。均宜留意乎。

大凡治小兒病。以察面色為先。又視虎口脈紋。凡紋見初關者輕。中關者重。末關者危。以紫脉為驚熱。紅脉為傷寒。熱白主煥熱少血。青主驚。主風。主寒。主腹中痛。主搐搦。黃主傷乳食脾虛。黑主冷氣。主中惡。主病沉困。凡紫赤青黑脉紋直透末關者危。

治法除在六經外。茲畧舉各證以參用之。如傷食發熱。必以六君子湯為主。無熱宜保和丸。傷風發熱。宜人參羌活散加減主之。痘疹發熱。如壯熱痘疹。宜升麻葛根湯。胃弱食少。加入參白朮茯苓。餘見小兒痘疹專篇。茲不贅述。小兒之於傷寒也。其形證則有頭痛身痛。鼻塞或流涕。喉內喘息。兩手脉洪數。頰赤眼澀。身上寒毛起。口鼻出水。眼赤黃。口乾澀。咳嗽。山根青色。噴嚏。就各形證參酌之。治法亦有惺惺散。治發熱鼻涕。四君子加細辛。瓜萎。桔梗。治痰壅咳嗽。四君子加川芎。防風。治身熱頭痛。人參羌活散。治體疼。頭痛與咳嗽。即鼻塞噴嚏。亦同此方。至小兒外感風寒。拘急呵欠。因之又有脉洪寒。毛起口乾等現象。在秋冬宜用溫熱藥。春夏用

涼寒藥。均於黃芩甘草湯。黃芩梔子湯。小柴胡湯。八正散。涼膈散等方選用之。頰赤眼澀。洗心散亦可。

大青膏方。為三歲以下小兒未能言而設。主發散貪睡。口氣熱。呵欠。煩悶。之表證。尤宜留意及之。

小兒之於春日溫病也。未滿三日。先用惺惺散。二服後四五日不解。煩渴而嘔。用白朮散。如自汗口燥。用製白虎湯。至六七日。大便燥結。用四順飲子。下心腹大實大滿。牛黃通膈丸。下。初覺之時。疑是瘡疹。只用葛根升麻湯以解肌為愈矣。

臨海葉隱衡編纂

雜病指南

上海廣益書局發行



大良方

中西

新衛生書

女醫者

全書共數十萬言，所載最新疾病諸法，不下數千則，皆根究最新醫理，作問答為體，凡一切疑難症，及男女諸生之必要，莫不切實說明，且均有治療及預防之方法，可以隨時檢查，無不為保健健康之極策也。

全書精裝一冊，價洋一元四角。

【分五角六洋】

本書內容分訂上、中、下三編，上編為內科，下編為外科，分列頭面口齒耳目咽喉心腎喉嚨，腰背二便，男陰女陰，風寒濕氣，傷寒風，瘡瘍，創瘻，癰毒，起死回生，八門下編為婦孺良方，分列經水崩漏，妊娠黃疸，食慾瀉，二十門中編，府疾，瘡瘍，九門各門良方，又復中西並採，一目了然，家旅行備置一編，以便隨時檢用，其利益誠非淺解也。

雜病指南 目錄

中風門	一
類中風門	三
傷風門	五
痙病門	五
瘡病門	六
癰病門	七
瘻病門	八
脚氣門	九
內傷門	三
虛勞門	三
癆療門	三
自汗盜汗門	三
失血門	一

消渴門	古
神志門	古
癲癇門	古
諸氣門	古
遺精門	古
濁帶門	古
痰飲門	古
欬嗽門	古
喘吼門	古
腫脹門	古
瘧疾門	古
霍亂門	古

噎膈翻胃門

嘔吐噦門

泄瀉門

痢疾門

痘證門

積聚門

疝證門

頭痛眩暈門

眼目門

牙齒口舌門

咽喉門

肩背痛門

心腹諸痛門

胸脇痛門

腰痛門

小便閉癃遺尿不禁門

大便燥急門

世三

雜病指南

臨海葉衡隱編纂

△中風門

【中風總括】風為虛邪。從外而中。傷人肢體。謂之中風。若痰火從內而發。病人心主之官。名曰痰火。體傷風邪。輕則頑麻不仁。重則癱瘓不用。心病痰火。重則痰壅。神昏。輕則舌強不能語言。此証或輕或重。當分中絡。中經。中府。中藏。及中經絡。兼中藏府。更審其兼虛。兼實。兼寒。兼熱。兼痰。之不同。與夫五脫之症。撒手。則為脾絕。口開心絕。眼合肝絕。遺尿腎絕。鼾聲肺絕。如閉証。必握固緊其牙關。初起以通關散先取其嘔。有嘔可治。無嘔多死。痰壅不下。吐法為先。

【中風死候】寸關尺脉俱平之人。忽然卒中而死。皆因中邪太甚。閉塞九竅。天真之炁。不能與人生氣相通。獨絕於內。暴時脫之。五藏幾息。呼吸已泯。譬如墮溺水中。豈能預期其死。如脉來一息七八至。不大不小。雖困尚能醫治。大而無倫。小而如線。浮主晝死。沉主夜死。脉絕不至。死是無疑。及五藏脫證並見。皆屬死候。搖頭上

竄氣息長噓。喘汗如油。痰聲似摃鋸。肌肉脫筋骨痛。髮枯直。皆死証也。
通關散。即南星、皂角、細辛、卜荷半夏為末。吹鼻有嚏可治。開關散。即烏梅、冰片、南
星為末。擦牙其噤可開。巴豆油紙捲、皂角末燒烟薰入鼻中。人事自醒。取龜尿點
舌下。治難言法也。

無汗表實。痰涎壅盛。用吐法。宜三聖散。即防風、藜蘆、瓜蒂。有汗裡實。用赤小豆、加
瓜蒂。名瓜蒂散。或加全蝎。名全蝎散。此吐之輕者。甚則用重劑五元散。即藜蘆、赤
小豆、白礬、皂礬、胆礬。痰壅以巴豆、枯礬為丸。名巴礬丸。

【實中絡】烏藥順氣散。治風邪中絡之人。形氣實者。口喝眼斜。肌膚頑麻。風氣攻注。
骨節疼痛。方即麻黃、桔梗、只壳、烏藥、姜蠶、白芷、乾姜、陳皮、甘草、川芎也。

【虛中絡】大秦艽湯。治風邪中絡之人。形氣虛者。口喝眼斜。偏廢半身不遂。用八珍
湯減去人參。加秦艽、生地、石膏、獨活。防風、白芷、細辛、黃芩、川羌活可也。

【實中經】謂風邪中經之人。形氣實者。口喝眼斜。左癱右瘓。用換骨丹。即白芷、川芎、
防風、冰片、射香、珍珠、木香、槐角、苦參、五味、威靈仙、人參、麻黃、首烏、蔓荆、蒼朮、桑皮。
用麻黃熬成膏。和藥煎為丸。珍珠為衣也。

【虛中經】小續命湯治形氣虛者。風邪中入經絡。並八方之風所傷。五痺之証。總能痊愈。方即麻黃、杏仁、桂枝、芍藥、通其榮衛。人參、甘草、當歸、川芎。使氣血宣行。如風淫加防風。濕淫加防己。熱淫加黃芩。寒淫加附子。春夏用石膏與知母。秋冬用肉桂。附子倍加煎服。

【虛中經絡】黃芪五物湯治因虛風邪中入經絡。而病偏廢半身不遂。因虛召風。無力而癱。其人心清。語言塞滯。因舌軟無力難言。乃營衛不足之病。宜用此方。若舌強難言。神昏不清。則是痰火不宜此方。經云。衛虛則不用。營虛則不仁。若補衛。君黃芪以起不用。益營。臣芍藥、桂枝以治不仁。佐大棗、生姜煎服。以和營衛。不仁不用于左者屬血。則加當歸。在右者屬氣。倍加黃芪。在下兩腿兩腳軟者。則加牛膝。筋軟難於屈伸者。加木瓜。骨軟不能久立者。則加虎骨。週身或左或右。經絡不宣通者。則加附子、炮姜。

【氣實中府】三化湯治形氣實。風邪中府之証。其人神昏冒昧。二便閉塞。即小承氣湯加羌活是也。若其人形氣俱虛。及久病風之人。大便多燥急。謂之風燥。或續命湯汗過。或三化湯下過。精液枯乾。以致結燥。凡病不論中經絡藏府。但有二便阻

隔形氣不足。難堪攻下者。均宜搜風順氣丸。以搜六府之風。通腸胃之氣。自然二便自利安康矣。

[實中藏]牛黃清心丸。治形氣俱實。風邪中藏之人。其証痰涎壅塞。神昏不能語言。口眼喎斜。形氣滿盛。兩手握固。緊閉牙關。皆可服之。

[虛中藏]參附湯。治形氣俱虛。風邪中藏之人。其証唇緩不收。痰涎流出。神昏不能語言。不識人事。身體偏廢。或與五臟脫症並見。倍加人參煎服。

[經絡閉証]風邪中經絡之閉証。乃卒中而惡氣粗急促。神昏不識人事。無汗。四肢拘急。身體偏痛。方即肉桂、麻黃、甘草、杏仁。名還魂湯以開之。

[藏府閉證]風邪中藏府之閉証。必腹滿二便閉。兼神昏口噤。痰結在喉間。危急湯藥不能下咽。宜奪命散。即巴豆、白芷、半夏、亭力、生南星。吐下之。

[中風寒證]三生飲治中風。不論經絡藏府風邪中藏寒之人。四肢厥逆。六脉沉伏。涌氣痰涎。方即南星、木香、川烏。生附子。惟寒盛氣實者用之。若氣虛加人參。氣虛將脫者。加倍添入。而無倒戈之害也。

[中風熱證]祛風至寶湯。治中風。不論經絡藏府風邪中府熱之人。六脉浮數。面赤

身熱而心煩。宜防風通聖散。加全蠍、天麻、細辛、白附、羌活、獨活、連召、黃芩、姜桂。是也。

[中風痰證]青州白丸子治中風。不論經絡藏府。風邪中表。有痰飲之人。口喝眼斜。癱瘓。湧盛。痰涎。及小兒驚風痰飲。皆為妙藥。方即生白附、生川烏、生南星、生半夏。法製為丸。

[外中]羌活愈風湯。治風從外中之病。此病之來。必有先兆。如手足無力。語言蹇澁。難出。時有肌肉微動牽掣。大指次指。麻木不仁不用。即大秦艽湯方。再添人參、官桂、黃芪、杜仲、防己、知母。只壳柴胡、卜荷、蔓荆、菊花、前胡、蒼朮、麻黃、半夏、厚朴、杞子、地骨皮。是也。凡中風內邪將除。外邪漸盡。更服此方調理。以行導諸經。久則大風悉去。榮衛自和。症可安矣。

[痰火內發]清熱化痰湯。治痰火內發之病。此病之來。必有先兆。如神短忽忽。言語失常。頭眩脚軟。上盛下虛。宜用此湯。即六君子湯。加麥冬、黃芩、黃連、葛蒲。只壳竹如南星、木香也。

[風痱偏枯瘡癱]三病皆屬外中。而有微甚淺深之別。如四肢不收。身無痛處。為風

痺。若偏枯。則半身不遂。身有疼痛。其言不變。神志不亂。乃邪微淺。病在分腠。榮衛之間。以黃芩五物湯能補榮衛而散風邪也。甚者不能言。志亂神昏。則為瘡癥之病。乃腎虛內奪。少陰不至而厥。其邪已入於藏。故病多凶也。用地黃飲子治腎虛內奪之方。即肉桂、附子、旋覆、巴戟、遠志、萸肉、石斛、麥冬、五味、薄荷、菖蒲、茯苓是也。
【瘻火內發】瘻火內發。迷人心竅。令人精神恍惚。舌強難言也。方即人參、菖蒲、南星合溫胆湯。若熱盛。加黃芩、黃連。神昏二便閉。用礞石滾痰丸攻之。

△類中風門

【總括】類中風証。類乎真中風之證。皆名尸厥。謂形厥而氣不厥。其証有中虛、中氣、中食、中寒、中火、中暑、中濕、中惡不同。雖皆昏厥。然與真中風証。不見口眼喎斜。偏廢、不仁、不用、難行等因也。

【戶厥】戶厥之證。口鼻無氣。而脉自動。或脉微細有無之間。此證有虛有實。虛者緣於病後氣血枯竭。用人參湯。虛兼性寒者。用人參、附子、名參附湯。再加南星、木香。而治虛兼瘻者。名星香飲。實者氣閉。腹滿脹。二便閉。脉動有力。或腹急痛。用備急丹。服後腹內轉鳴。吐下應驗。如實而兼喉間瘻結者。以奪命散為先。

【虛中】補中益氣湯。療虛中之證。即李杲所云。內傷氣虛之人。煩勞過度。清氣不升。忽然昏冒也。如有痰。加茯苓半夏治之。若因房勞過度。昏冒。謂之慾冒。用生麥補精湯。即生脈散。加當歸。熟地。鹿茸。是也。

【氣中】木香調氣飲。治形氣俱實之人。中氣也。因暴怒氣逆。口噤神昏。有痰。與中風之人。脉浮。四肢溫。中氣之人。脉沉。四肢冷。可別也。方即木香。藿香。砂仁。白叩。甘草。丁香。檀香。是也。

【虛氣中】八味順氣散。治形氣俱虛之人。中氣也。用法標本兼施。邪正相安。方即人參。茯苓。白朮。甘草。扶元氣。烏藥。白芷。青皮。陳皮。開利氣痰也。

【食中】食中者。因過飽感受寒風。或因怒惱而食。食塞胸中。忽然昏厥。四肢不舉。如挾痰者。用瓜蒂散。挾寒者。用姜湯。過食者。用益湯。令病人飲一鍾。用指探吐。不吐再飲。以吐通快為平也。

【寒中】附子理中湯。療寒中之證。即腹痛拘急。緊閉牙關是也。如有汗身寒。或吐或濁。方即附子。人參。白朮。甘草。乾姜。若無汗。身寒。加麻黃。細辛。陰毒寒極。加川烏。生用煎服。嘔吐。用丁香。吳萸。加入。脉微欲絕。倍用人參添之。

【火中】涼膈散治火中之證。即劉宗素所云。七情過極。五志之火內發。令人神志昏冒。筋骨不用也。方即山楂連召。黃芩。卜荷。甘草。朴硝。大黃。兼治一切胸膈之熱。及大便燥。譫妄。與發班。發狂之證。

【暑中】暑中之證。須分有陰與陽。謂暑中陰邪似寒傷。頭痛身痛。惡寒而更壯熱心煩。或嘔瀉也。此得之於受暑納涼。寒外暑內之病。宜用香薷飲。合藿香正氣湯治之。若有如上之証。而更兼精神昏憒。蒸蒸自汗。面垢喘渴。則為陽證。此得之赤日長途。中外皆熱。初中昏憒不省者。急以熱物熨臍。調大蒜汁合水灌之。即醒。繼以辰砂益元散。氣實者。蒼朮白虎湯。氣虛者。人參白虎湯。二者選而用之。

【濕內中】滲濕湯治濕從內生。精神昏冒。即朱震亨所云。濕生熱。熱生痰也。得之于厚味醇酒。生冷水物過節。方則胃苓湯加香附。撫芎。砂仁。川連也。

【濕外中】除濕湯治濕因外中。得之天陰淫雨。晴後濕蒸。早晨霧露。久卧濕地。遠行涉水。瘴氣山嵐。其証頭身重痛甚。而昏冒。大便溏瀉。皮膚浮腫。方即羌活。交本升麻。柴胡。防風。蒼朮。煎服。

【惡中】調氣平胃散。療惡中之証。如廟塚忤惡。卒然昏倒。面黑錯忘。以蘇合丸為主。

次以木香調氣散合平胃散匀用。

△傷風門

【總括】傷風寒邪入肺。咳嗽聲重。鼻塞噴嚏。涕流而清。鼻淵屬腦。係邪熱。不噴嚏。有濁涕。或有穢氣。病久必有鼻紅也。

【虛實證治】參蘇飲治氣虛傷風之病。若氣實者。用川芎茶調散。及頭疼亦可用也。即川芎、白芷、卜荷、甘草、羌活、茶葉、細辛、荆芥防風。有痰加半夏。有熱加石膏清熱也。

【鼻淵】蒼耳散治鼻淵之病。屬風熱入腦。故目瞑而頭疼。涕流不止。鼻塞孔熱。痛及其腦。方即蒼耳子、辛夷、白芷、薄荷、葱白也。

【鼻淵久病】鼻淵初起。則風邪盛。用蒼耳散。以散為主。如久病。用黃連防風通聖散之方。熱氣涌涕。傷其鼻孔。成瘡而痛。用猪胆汁調冰硼散敷之。熱蘊於腦。傷及所過榮血。故鼻衄。宜犀角地黃湯治之。

△瘻病門

【總括】瘻病之證。項強。背反張。有汗為柔瘻。無汗為剛瘻。生瘻去血過多。傷寒過汗。

之後。則為內因。潰瘍破傷。犬咬。則為外因。皆風邪乘虛。因口破而風傷。入太陽經。而成此病也。

【死證】痙病脉散。多屬死候。反張離席。一掌之高必亡。眼瞓緊小。目瞪不轉。神昏不語。額汗如珠。命必傷也。

【證治】剛痙用葛根湯。即桂枝湯加麻黃、葛根。以發汗。柔痙用桂枝加葛根湯。即桂枝湯加葛根。若兼風寒濕雜揉為因。用小續命湯。隨風寒濕輕重治之。過汗表虛。汗出不止。因而成痙。用桂枝加附子湯治之。如破傷血多。用桂枝湯合補血湯。即當歸黃芪也。如裡實腹滿便閉。用大承氣湯。產後瘀血不盡。小腹中鞭急。承氣湯加桃仁之方。在所當用。潰瘍膿血過多。為風所入者。用十全大補湯加祛風之藥。

【破傷風】破傷亡血過多。筋失所養。經絡空虛。風邪乘虛而入。用桂枝合當歸補血湯治之。然時有微傷淺損。去血甚少。因風邪入之。以其人熱甚。風搏併於經絡也。乃火之端。為風火邪。宜防風通聖散加蝎尾治之。凡此症不論虛實。風毒內蘊。不發於外。瘡口周圍。燥起白痴。瘡不甚腫。濕流污黑之水。皆破傷風之先兆也。

【證治】破傷火盛者。多陽明證。用通聖散加蝎尾治之。風盛者。多太陽證。用全蝎散。

不解漸深入裡。宜用左龍丸。外用燒酒火罐之法。犬咬風入腹。用班蝥、大黃、同酒煎服。取下毒物。弱者減半。即可。

△ 瘡病門

【總括】三瘡之因。皆是風寒濕三氣雜合為病。風邪勝者。其痛流走。故曰行瘡。寒邪勝者。其痛甚苦。曰痛瘡。濕邪勝者。其痛重着。為濕瘡。又有五瘡者。謂皮瘡、脈瘡、骨瘡、筋瘡、肌瘡。以秋時遇此邪。為皮瘡。則皮頑麻。微覺痛癢也。長夏時遇此邪。為肌瘡。則肌頑木。不知痛癢也。夏時遇此邪。為脈瘡。則脈中血不流行。而色變也。春時遇此邪。為筋瘡。則攣節痛。屈而不伸也。冬時遇此邪。為骨瘡。則骨重痠疼。不能舉也。遇邪之時而發。又有復感於邪。而入藏府者。謂內舍五藏之瘡也。以皮瘡不已。復感於邪。內舍於肺。成肺瘡。脉瘡不已。復感於邪。內舍於心。成心瘡。肌瘡不已。復感於邪。內舍於脾。成脾瘡。筋瘡不已。復感於邪。內舍於肝。成肝瘡。骨瘡不已。復感於邪。內舍於腎。成腎瘡也。此皆以病遇邪之時。及受病之處。而得名曰五瘡。又周瘡在血脉之中。隨脉上下為病。故同脉瘡。但患有定處。不似脉瘡左右相移也。近世曰流火。曰痛風。曰歷節風。皆行瘡之俗名也。

〔周痺〕周痺或腫或痛。或手或足所患有定處。痛無歇止。左右不移。或從上病及於下。或從上病及於上行。而不似衆痺。痛有歇止。左右相移流走也。其病似中風。或隻手。或兩手。或兩足。或隻手足。或偏廢不仁不用。但口眼無斜。身有疼痛也。

〔痺病生死證〕痺在筋骨。則受邪深。故痛久難已。若流連在皮脉。則受邪淺。易為功也。凡痺病日久。內傳入藏。則為五藏之痺。若其人中虛受邪。則難治多死。其人藏實而不受邪。復還於外。則易治多生也。

〔痺入藏府證〕入藏肺痺者。因久病皮痺。復感於邪。見胸滿而煩。喘咳嗽。證是邪內傳於肺。則為肺痺。腎痺者。久病骨痺。復感於邪。而腹脹。尻以代踵。脊以代頭。偃僵不直之證。是邪內傳於腎。則為腎痺。脾痺者。因久病肌痺。復感於邪。而見嘔涎。心下痞。鞭四肢懈惰之證。是邪內傳於脾。則為脾痺。心痺者。因久病脉痺。復感於邪。而見心煩心悸。噫氣驚恐。有時不休之證。是邪內傳於心。則為心痺。肝痺者。因久病筋痺。復感於邪。而見喜飲小便數。夜卧則驚太息之證。是邪內傳於肝。則為肝痺。腸痺者。久痺不已。復感於邪。藏實不受而傳府者。凡見喜飲小便秘。不脹則瀉。不瀉則脹之證。其由是邪內傳於大小腸。則為腸痺。胞痺者。凡見小腹胞中。按之。

如汎湯狀而痛。小便秘滯。鼻流清涕。是邪內傳於膀胱。則為胞痺也。三焦之痺。附於膀胱。從水道也。胃痺附於大小二腸。在傳化也。胆為清淨之府。不受痺邪。故曰無憂也。

【痺病虛實】痺病氣虛之人。宜用加減小續命湯。風勝行痺。倍防風。寒勝痛痺。倍附子。濕勝着痺。倍防己。皮痺加黃芪。或桂枝皮。脈痺加姜黃。或加紅花。肌痺加葛根。或加白芷。筋痺加羚羊。或加續斷。骨痺加虎骨。或加狗脊。有汗減麻黃。便溏減防己。寒勝減黃芩。加乾姜。熱勝減附子。加石膏。加減治之。如痺病氣實之人。用增味五痺湯。方即麻黃、桂枝、紅花、白芷、干葛、附子、虎骨、羚羊、黃芪、甘草。防己、防風、羌活也。行痺以羌活防風為主。痛痺以黃芪桂枝為主。脉痺以紅花桂枝為主。肌痺以葛根白芷為主。筋痺以羚羊為主。骨痺以虎骨為主。增味於五痺湯治之可也。

【三痺證治】行痺、痛痺、着痺三樣之痺。用木通一味。不見水者二兩。以長流水二碗煎。一碗熱服。取汗不愈再服。有濕其痛重着難移。加防己以勝濕邪。若其痛上下左右相移者屬風。加羌活防風以祛風邪。其痛苦甚者為寒。有汗加附子。無汗加麻黃。添入祛寒。如胞痺用五苓散。加附子。腸痺五苓散。加蒼朮。以利寒飲也。

【乘虛入藏】三痺湯。即十全大補湯。無白朮。加牛失。秦艽。續斷。杜仲。細辛。獨活。防風。又獨活寄生湯。依三痺湯方。加桑寄生。除黃芪。續斷。此皆治五痺不已。乘虛入藏。留連日久。調理痺病之方。

【皮痺】皮痺。肢體麻木。不知疼癢。如氣實者。可用小續命湯加麻黃治之。如氣虛麻木。用黃芪益氣湯。即補中益氣湯加紅花。黃藥也。如秋加五味。夏加黃芩。冬加桂枝。桂皮當用之方。

【寒熱痺】蠲痺湯。治冷痺而身寒無熱。四肢厥冷。方即附子。當歸。黃芪。炙草。官桂。羌活。防風。是也。如肌熱如火。名曰熱痺。用羚羊。屑角。入升陽散火湯中服之。

△痺病門

【總括】五痺者。心肝脾肺腎也。蓋痺屬燥病。故皆因肺熱而生。陽明者。五藏六府之海。主潤宗筋。陽明無病。則宗筋潤。能束骨而利機關。雖有肺熱。不能成痺也。肺熱葉焦。陽明虛弱。津液不化。筋骨失養。皮毛痺痠。發為痺。不能行也。因而心氣熱。為脉痺。則痺節縱而不任地。肺兼心病也。因而腎氣熱為骨痺。則腰脊不能共舉。肺兼腎病也。因而肝氣熱為筋痺。則成拘攣不伸。筋失所養。肺兼肝病也。因而脾

氣熱為肉痺。則肌肉不仁。胃燥而渴。肺兼脾病明也。

【痺痺辨似】痺痺之症。今人多為一病。以其相類也。然痺病兩足痺軟不痛。痺病通身肢節疼痛。要在不疼痛裡分辨。但觀古人治此等証。無有用風藥之法。則始曉痺屬虛。痺多實。別有因由也。

【證治】痺屬燥病。因何而用治濕熱之藥。蓋遵內經治法。獨取於陽明胃也。故陽名無故。雖有肺熱。惟病肺而不病痺也。是知病痺者。胃家必有故也。或濕熱。或積熱。或濕痰。不論新久等因。若胃壯能食。當先審証攻之。有濕痰者。用控涎丹攻之。濕熱者。用小胃丹攻之。若陽明積熱者。用三一承氣湯攻之。此治胃壯能食之法也。若胃弱。飲食減少。氣血精液不足。當先補養脾胃為主。其有久病留連。諸虛燥熱。或攻下之後。當按証治之始收完功也。加味二妙湯治濕熱痺證。其證兩足痺軟。足熱難當也。方即防已當歸川草薢。黃芩。龜板。牛失。秦艽。蒼朮也。時令濕熱者。清燥湯再效。陰虛濕熱者。虎潛丸極靈。若久氣血虛。以十全大補湯為主。如筋骨痺軟。以加味金剛丸即川草薢。木瓜。牛失。菟絲子。川杜仲。肉蓯蓉是也。

△ 脚氣門

【總括】脚氣者。因外感風寒內有濕熱相為合病。故往來寒熱狀類傷寒。而脚腿痛腫。熱如火者。為火盛也。不腫不熱而痛者。是寒盛也。名曰乾濕氣。

【死證】脚氣脉急。小腹頑木。不知痛癢。不過三五日內。其邪必入心間。如入心則嘔吐喘滿。是為腳氣冲心之證。目額皆黑。恍惚譟妄。則水來尅火之徵。故命難全也。

【證治】初病脚氣。表實無汗。用攢風散汗之方。即麻黃、桂枝、杏仁、甘草、草薢、炮川烏也。若裡實熱盛。二便不利。用羌活導滯湯下之。即羌活、獨活、防己、當歸、枳實、大黃也。如濕勝重腫。用勝濕餅子。即黑二丑、蕎麥作成餅之方。寒濕者。用五積散加附子。寒虛者。用獨活寄生湯補之。

【脚氣虛證】當歸拈痛湯。治形氣虛而濕熱脚氣者。即茵陳、合四苓湯與羌活、防風、人參、當歸、升麻、黃芩、甘草、苦參、知母、葛根、蒼朮也。

【脚氣實證】加味蒼朮散。治形氣實而濕熱脚氣者。即羌活、獨活、蒼朮、白朮、生地黃、知母、黃藥、白芍、當歸、牛膝、甘草、木通、防己、木瓜、兵部也。

【鶴膝風】兩膝腫大。而又疼痛。膝上至髀。膝下至腰。足枯細。但存皮骨。兩膝狀若鶴。

膝。故名鶴膝風也。宜大防風散即附子、羌活、牛膝、杜仲加十全大補湯減去茯苓是也。病若得之於痢疾後者名曰痢風亦用此方。

全內傷門

〔總括〕內傷之症。勞役傷其脾氣。傷其元氣也。飲食傷其胃府。傷其形也。然傷形宜消。有飲食失節。溫涼過度之不一。傷氣宜補。有濕熱。暑熱。火鬱。寒中。熱中之不同也。

〔內傷外感辨似〕內傷外感脉俱大。但內傷之脉大見於氣口。不似外感之脉大人迎也。內傷外感皆頭痛。而內傷頭痛有時痛。有時不痛。不似外感之頭疼。而常痛不休也。內傷外感皆惡寒。而內傷之惡寒得溫衣就解。不似外感之惡寒雖近烈火而仍惡也。內傷外感皆發熱。而內傷之發熱。熱在肌肉。以手捫之。熱從內泛。不似外感之發熱。熱在皮膚。以手捫之。熱自內輕也。內傷外感皆自汗。內傷自汗。氣短乏。聲怯弱。不似外感之自汗。雖汗出而氣壯。促語高聲也。內傷外感手皆熱。但內傷之熱。手心熱矣。與外感之熱。在手背熱也。內傷外感皆鼻不和。內傷之鼻息氣短而喘。不似外感之鼻息氣促而鳴也。內傷外感皆不食。而內傷之不食。口中

無味。不似外感之不食。聞食則惡也。內傷外感皆渴。而內傷之渴。初病即渴。其飲甚少。不似外感之渴。三日後始渴。其飲甚多。宜辨分明也。

【證治】補中益氣湯。調理內傷。清陽下陷。因勞役過度。熱傷元氣。故脉大虛而洪也。內傷頭痛。時作時止。內傷表熱。常自汗出。心惡煩勞。口渴氣陷。不蒸化也。畏風畏寒。表氣虛失衛也。困倦懶言。中氣乏而不周。無氣可動。動則氣短。喘促聲見。用保元湯以甘溫除去大熱。如和脾血。加當歸。益脾氣。加白朮。皆補脾經也。佐以桔紅降濁。散胸中滯氣。用升麻。柴胡。從胃中引陽上升。陰火時顯躁熱。加生地黃藥。以補水救陰。陽熱晝夜心煩。合硃砂安神丸。瀉火安神則寧也。

調中益氣湯。亦治內傷。清氣下陷。濁氣上乘。清濁相干。而兼濕熱者。故二便不調。殲濁膿血也。此湯與補中益氣湯互相發明。然其脉證不可不別。內傷之病。脾胃元氣一虛。四藏失其調和。所以五藏之脉。交相混見。故肝弦。心洪。脾緩之脉。反見於上。按之沉濇。肺脉而反見於下也。兼濕熱者。身體重倦。氣不周也。骨節痠疼。血不榮也。中氣少乏。血少心煩。火乘土位。上併陽分。則血脉上行。故面赤而忽肥。下併陰分。則血脉下行。故面青而忽瘦。即今虛損之人。早則面青白瘦而惡寒。午後

則面紅赤。肥而發熱者是也。口中沫沫。脾不散精。食入反出。胃虛不納。耳鳴耳聾。陰火上冲。胸膈不快。濁氣壅滯。食而無味。胃氣有傷。二便失調者。大便時濁不濁。小便時利不利。乃脾濕不分也。謂完穀不化。飧濁。脾虛濕不化也。大便後或見血。或見膿。脾濕熱釀成也。方即保元湯加升麻、柴胡、蒼朮、桔皮、黃藥也。如去黃藥。加木香。亦同名調中益氣湯。以熱少氣不和者宜之。升麻益胃湯治內傷氣虛。濕多。熱少。遏抑春生清陽。不得上升脾胃之証。其証倦怠懶食。身重而痛。口苦舌乾。大小便不如平常。或大便不調。小便頻數。洒洒惡寒。衛氣不足。屬肺皮毛之病。慄慄不樂。面色不和。乃陽氣傷而不伸。即六君子湯加白芍、黃連、澤瀉、羌活、獨活、黃芪。柴胡防風也。

補脾胃濁陰火升陽湯。治內傷氣虛。熱多濕少。陰火困脾。陽氣不得上升脾胃之証。宜服此方。此方所治。雖同升陽益胃湯共證。然無大便泄濁。小便頻數。洒洒惡寒肺病。慄慄不樂。陽傷之証。故補脾胃之氣。用人參、黃芪、甘草、升陽。用柴胡、升麻、與羌活、滑石、石膏、黃芩、黃連。以濁陰火。長夏濕令。故加蒼朮也。

冬加乾姜、官桂、豆叩、益智。以助陽氣。如秋加白芍、白叩、縮砂、換榔。以助收也。夏

月或腹中氣上冲逆。屬陰火冲上。加黃芩、黃連、黃蘖。以降陰火。春加風藥。如羌活、獨活、防風。交本能鼓清陽之氣上升。長夏身肢沉困。精神短少。加人參、麥冬、五味。恐傷暑氣。加澤瀉、赤苓、蒼朮。以祛脾濕也。肺中有熱。咳嗽。減人參。去肺熱也。春加金沸草、欵冬花之方。以散肺風。夏加麥冬、五味子。以保肺氣。冬加連根節麻黃。以散肺寒。頭痛加蔓荆。痛甚。川芎加入。上行捷也。巔痛。腦痛。加交本而入督脈。若頭痛。加北細辛。嘗之。以走少陰。沉重倦怠。或嘔逆痰涎。則痰厥頭疼。加半夏生姜。以治痰逆。口乾嗌乾。或表發熱。加葛根生津。以清胃陽。大便燥滯。加元明粉。血虛燥。加當歸。血實燥。加桃仁。熟實燥。大黃用之。心下痞脹。氣不快。加木香。食不消。加砂仁。心下結熱。加黃連。心下結氣。加枳實。胃氣壅塞。加厚朴。如胃中寒。或冬月。減黃連。加炒乾姜。胃痛。加草豆叩。胃寒。或吐沫。加益智。氣滯不快。加青皮白叩。木香。腹痛。加白芍、甘草。有熱。加黃芩。有寒。加官桂。審而用之。臍下痛。加肉桂。熟地黃。腹內身外刺痛。此屬血滯不足。加當歸以和血也。脇下痛。或急縮。加甘草、柴胡。以身重脚軟。加防己、蒼朮、黃蘖。去濕熱在內也。身痛發熱。加交本、防風、羌活。疎風在表也。長夏之令。暑濕炎蒸。交相為病。若暑多濕少。用清暑益氣湯。其功立見。其證則自

汗身熱心煩口渴。困倦少氣惡食。尿溢少大便溏行。方即補中益氣湯去柴胡。加黃芩澤瀉。麥冬、五味、蒼朮、神曲、甘葛、青皮也。若濕多暑少為病。則成痿厥之病。腰下痠軟難於轉動。行走不正。兩足欹側。宜清燥湯。即本方加生地、豬苓、茯苓、柴胡、黃連。減去甘葛、青皮也。

血虛胃弱。遇食涼藥。陽鬱於脾。宜升麻散火湯。肌膚筋骨四肢困倦。身熱。搘之焰手。其熱非常也。方即羌活、獨活、白芍、防風、升麻、柴胡、葛根、人參、生甘草、炙草、大棗、生姜。又有火鬱湯。加葱。減去人參、獨活。治身雖有此焰手之熱。而返惡寒。脉來沉數。則可知火也。

東垣內傷熱中之病。用補中益氣湯。寒中為水來侮土之病。乃寒濕也。用白朮附子湯。其証內則涎涕腹脹。時多溺出。外則足軟無力。時痛為殃。腰背胛眼脊背常痛。丸冷陰陰。其痛不常也。此脾胃虛寒而氣不虛者。宜用此方。即蒼朮、附子、合五苓散。再加陳皮、半夏、厚朴是也。若脾胃有寒濕而氣虛者。宜用加味理中湯。即理中湯加附子、茯苓、蒼朮也。

繆仲醇製資生丸方。治脾胃俱虛之病。不寒不熱。平補之方。其所治之證。如飲食

減少。過時難消。倒飽脹悶。面色痿黃。肌肉漸瘦。困倦難當也。

清胃理脾湯。治傷飲食醇酒。厚味濕熱為病之證。即平胃散酌加三黃是也。黃芩、黃連、大黃三味。如有熱滯而不實者。不可入大黃。如大便黏臭。小便赤澁。飲食變冷。口舌生瘡。更兼痞脹。噦嘔不食。吞酸惡心。噫氣之類。皆傷食証也。

理中湯。治形氣虛。脾胃寒濕所傷之病。其證食少。喜食熱物。面色青黃。腹痛腸鳴。吐冷涎沫。大便腥穢不臭。似鴨糞澄徹清塘也。

人有胃強脾弱之證。乃脾胃中病。胃強所以能食。脾弱不能消化。當用消食健脾丸。方即平胃散加炒鹽、胡椒、麥蘖、山楂、神曲、白蒺藜也。

開胃進食湯。治不思飲食。少食難得行化。胃脾兩虛之證。方即六君子湯。加丁香、木香、藿香、厚朴、蓮子、砂仁、麥芽、神曲是也。

一切傷食脾胃之病。其證痞脹、噦嘔不能進食。吞酸惡心。并噫氣之類。宜用平胃散。即蒼朮、厚朴、甘草、陳皮。若快膈。加白朮。有痰。加茯苓、半夏。傷穀滯者。加穀芽、麥芽、縮砂、神曲。有熱者。加黃芩、黃連、黃蘖。大黃相宜。傷肉滯者。加山楂。傷涎滯者。加萊菔子。

葛花解醒湯。發酒傷人之汗。其證懶食、身熱、倦怠而煩、嘔吐、頭疼。似乎外感而實非外感。皆因酒所致也。方即人參葛花合四苓散。再加白叩、縮砂、神曲、乾姜、陳皮、木香、青皮也。

秘方化滯丸。治不論寒熱。一切氣滯、積痛攻下之方。即巴豆、醋製三稜、莪术、青皮、陳連、半夏、木香、丁香也。諒其老少虛實增損。以意用之。久久自得其效。

▲虛勞門

〔總括〕虛勞者。虛損成勞之謂。陰陽氣血、榮衛精神、骨髓津液不足之謂虛。外而皮脈肉筋骨。內而肺心脾肝腎。消損之謂損。虛損日久。留連不愈。則成勞矣。因而致五勞七傷六極之證。五勞者。曰肺勞。曰心勞。曰脾勞。曰肝勞。曰腎勞。七傷者。曰精傷。神傷。魄傷。魂傷。意傷。志傷。氣傷。六極者。曰筋極。骨極。血極。肉極。精極。氣極。皮聚毛落。惡寒咳嗽。肺勞也。血脉虛少。男子面無血色。女子月經不通。心勞也。飲食減少。肌肉消大。便濁。脾勞也。兩脇引胸而痛。筋緩不能行。肝勞也。骨痿不能久立。午後發熱。骨蒸。腎勞也。若從腎藏損起至皮聚毛落。則死。從肺藏損起至骨痿不能起床。亦死。從脾藏損起至皮聚毛落骨痿不起。又死。若夫七傷。因恐懼不解。則傷

精。精傷陰必虛。陰虛則無氣。思慮則神傷。神傷若自失。必致夭折。喜極則傷魄。魄傷則狂。狂則意不存。悲哀動中則傷魂。魂傷則狂妄不正。脇骨不舉。憂愁不已。則傷意。意傷則恍亂。四肢不舉。盛怒則傷志。志傷腰脊不可以俯仰屈伸。勞倦過度。則傷氣。氣傷則火愈壯。而氣日耗皆必死。至於數數轉筋。指爪甲痛。為筋極。齒動。手足痛不能立。為骨極。面無血色。頭髮墜落。為血極。身上如鼠走。削瘦乾黑。為肉極。氣少無力。眼無精光。立身不定。體癢搔之生瘡。為精極。胸膈逆滿。恒怒不能言。為氣極。其均殆可必也。

〔死證〕陰虛之勞。脉細數則死。陽虛之勞。脉微革則死。五藏之脉無和緩象。顧肩股腰之大骨不能支。及頭項四肢之大肉陷下。則死。五藏內損。痛引肩胸。肉盡之處。枯燥破裂。真藏脉見目眶下陷。視不見人。死更速也。

〔證治〕陰虛火動。用拯陰理勞湯。即人參、麥冬、五味子、當歸、白芍、生地、龜板、薏苡、橘紅、丹皮、蓮子、百合、炙草。汗多不寐。加棗仁。咳嗽加桑皮、貝母。如見濕痰。加茯苓、半夏。咯血加阿膠。骨蒸加地骨皮。陽虛氣弱。用拯陽理勞湯。即人參、黃耆、炙草、白朮、陳皮、肉桂、當歸、五味子。其見證懶於動作。一動則氣張而喘是也。倘午後發熱。水

泛為痰。盜汗遺精。消渴淋濁。口咽生瘡。均可以六味地黃湯用之。若欲引火歸原。以六味地黃湯加肉桂。名為七味地黃湯。如見火妄刑金。則用生脉地黃湯。欲益火消陰翳。則必用知藥地黃湯。火已旺而無制。妄行傷金。肺痿咳嗽。宜與滋陰降火湯。一切氣虛。宜與保元湯。氣虛兼氣滯。以四君子湯加橘紅半夏。名曰六君子湯。氣虛肌熱渴濁。以四君子湯加藿香、木香、葛根。名曰七味白术散。氣虛久癪。留連不愈。以四君子湯加草薢、烏梅、生姜。名曰四獸飲。調肝養血。用四物湯。氣燥血熱。宜六物湯。氣虛血少。用聖愈湯。血虛寒熱往來。宜加味四物湯。血虛發熱不惡寒。可用地骨皮飲也。

至於氣血兩虛。應以八珍湯投之。若有氣乏色毛髮脫落。自汗盜汗。心悸健忘。吐嗽衄血。食少肌瘦。泄濁等證。則宜十全大補湯。或人參養榮湯均可。諸虛勞極。裡急腹痛。宜小建中湯。以溫和脾胃。並治心悸夜夢。手足煩熱。四肢痠痛。血液虧損。若裏不急腹不痛而有是證。可用雙和飲。以溫養氣血。如肝有虛損。筋緩不能自持。目暗無所見。宜補肝湯。肺損嗽血。金被火刑。宜加味救肺飲。心虛損而健忘。神煩不眠。宜天王補心丹。脾損心傷。驚悸恍惚。用歸脾湯。脾肺腎三經均虛。用人參

固本丸。若欲理脾清肝、與婦人經病虛弦。則逍遙散亦為必用之劑矣。

△癆療門

【總括】久病癆疾。名曰療。療者敗之謂也。氣血兩敗之意。有陰虛乾血者。有陰虛積熱者。當以諸補陰藥治之。其狀皮膚乾澀。目黯無光。

【證治】癆療之人。切忌泄濁。一泄濁則必死矣。故須防之。平時要審其熱之微甚。與人之強弱。若熱甚人強。可用柴胡清骨散。熱不甚人弱。宜用黃耆龜甲散。熱微人弱。用十全大補湯。或人參養榮湯。陰虛發熱。宜補陰諸丸湯藥。陽虛惡寒。宜補陽諸丸湯藥。貴在審而慎之。但此病日久。有生惡虫者。身死之後。或有傳染而滅門者。曰傳尸癆。可用傳尸將軍丸解之。柴胡清骨散。即秦艽知母。炙草。胡連。龜甲。青蒿。紫胡。地骨皮。韭白。猪脊髓。猪胆汁。童便。黃耆。鼈甲散。即生地。赤芍。柴胡。秦艽。炙草。知母。黃耆。紫苑。地骨皮。半夏。茯苓。人參。桂枝。桔梗。龜甲。天冬。桑白皮也。

△自汗盜汗門

【總括】無故汗出。謂之自汗。此為陽虛。即表虛也。其證惡寒冷。若不惡寒。而蒸蒸發熱汗出。則為陽實。應屬裡矣。若睡中則汗。覺起則止。謂之盜汗。盜汗為陰虛。此亦

當分心虛不固與心火傷陰二者治之。

【證治】黃芪六益湯玉屏風散皆治表虛自汗。若陽實不惡寒當用小建中湯加黃芪。至於心火傷陰而盜汗用當歸六黃湯心虛不固即用酸棗仁湯治之。

△失血門

【總括】失血有鼻血耳血目血皮膚血齒牙血腦血嗽血唾血咯血效血嘔血吐血、溺血淋血之別或就患處而命名或從所由來而命名統皆名之為衄所謂衄病是也。中所謂腦血者即鼻出血如泉湧曰腦衄是餘若嗽血出於脾、唾血出於腎、咯血出於心、效血出於肺、嘔血出於肝、吐血出於胃此即從所由來而名之也。倘失血之人其脈大疾身涼不能卧血大下如湧泉皆多死證也。

【證治】夫血藏於內行於脉中原不可得而見非有損傷不能為疾而損傷之道不外乎熱傷勞傷弩傷三者故治法即就是而別之於熱傷宜以清熱為主勞傷以理損為主弩傷初宜以破逐為主久亦宜以理損為主也。

凡熱傷一切失血之病皆宜犀角地黃湯若胸膈滿痛加桃仁大黃吐血熱甚加黃芩黃連因怒嘔血加柴胡梔子唾血加元玄知母黃藥咯血加天冬麥冬嗽血

加知母貝母。如勞傷以致吐血。用加味救肺飲。倘氣血虛弱。不見火象。宜用人参養榮湯加麥冬。餘則因飽用力。或因持重努傷脈絡。而致失血湧吐。宜用芎歸飲以引血歸經。即或嘔血跌撲墮打。傷其脉絡而吐血者。亦宜用之。如有瘀血。加大黃或桃仁紅花以破之。或加鬱金黃酒以行之。若因熱吐血不已者。熱隨血減。氣亦隨之以亡。當用參地煎以救之。至於淋血溺血二證。尿與血同出而痛。名曰淋血。尿與血各別出。名曰溺血。溺血為精竅之病。用四物湯加牛膝。淋血為尿竅之病。用八正散加木通。生地。鬱金。倘用溺血之藥而不見效。所溺之血成塊。竅滯不利。莖中急痛欲死者。用珍珠散。用木通煎湯為引調服。如便血日久。服涼藥不應。宜升補治之。用升陽去濕和血湯。有熱稍加吳萸。炒川連。虛加人參。

△消渴門

【總括】消分為三。上消屬肺。飲水多而小便如常。中消屬胃。飲水多而小便短赤。下消屬腎。休信多而小便渾濁。三消皆燥熱病也。三消之證。若不能食。濕多舌紫乾者。病久則發癰疽而死也。

【證治】便軟能食。脈強大者。調胃承氣湯或梔子金花湯斟酌用之。如不能食而渴。

則屬胃虛。若又兼泄濁。胃虛無熱矣。應用七味白朮散。如不食而渴不濁者。是雖虛而猶燥熱。宜竹葉黃芩湯。氣虛胃熱甚者。人參白虎湯。下焦虛寒飲一溲二者。腎氣湯。

△神志門

【總括證治】人之五藏所藏有七。心藏神。脾藏意與智。肺藏魄。肝藏魂。腎藏精與志也。五藏所生七情。心生喜。肝生怒。脾生憂。思。肺生悲。腎生恐。氣和則志達。故生喜笑。氣暴則志憤。故生恚怒。繫心不解散。故生憂思。悽心則哀苦。故生悲哭。內恐外觸非常事物。故生恐懼驚駭。所以驚悸怔忡健忘恍惚失志傷神等病。皆因心虛膽弱。諸邪得以乘之也。治之法。如心氣熱者。先用硃砂安神丸以清之。其餘諸邪。則與虛損癲癇等證共方選用即可。倘恐畏不能獨自卧者。皆因氣怯膽虛。用仁熟散安之。

△癲癇門

【總括證治】癲疾有癲與狂之分。蓋邪入於陽者狂。邪入於陰者癲。癲疾始發。志意不樂。甚則精神呆痴。語言不倫。而睡時如平時。以邪併於陰也。狂疾始發。多怒不

卧甚則兇狂欲殺目直罵詈不識親疎而夜多不卧以邪併於陽也。癇分為五曰鷄馬牛羊猪以病狀偶類也。其實痰火氣驚四者而已。其初發則吐涎神昏卒倒無知口噤牙緊抽搐時之多少不等。省後起居如平人此癲癇所以異也。治之法不論癲狂癇初起多痰者先以三聖散吐之。風盛有痰用青州白丸子熱甚有痰用礞石滾痰丸形氣實者用遂心丹痰而兼氣鬱者用礞鬱丸痰而兼驚者用控涎丹無痰神輕因而驚悸者用鎮心丹抱龍丸皆成方也。

▲諸氣門

【總括】氣之流行不為邪觸何病之有若有所觸即病矣故氣門有短氣少氣氣痛上氣下氣氣鬱濁氣清氣寒氣等別然於壯者得之氣行而自愈弱者得之氣必著之為病也。

【治法】治諸氣證如短氣少氣皆宜補之用四君保元等湯此皆為不足之證氣痛者氣為邪氣所阻致氣道不通或在藏府或在經絡攻衝走注疼痛也用木香流氣飲治之上氣乃濁氣上逆治以蘇子降氣湯下氣為清氣下陷治以補中益氣湯甚者加調子五味子氣鬱或得於名利失志或得於公私怫情治之法以四七

湯為主。濁氣即所謂濁氣上逆。清氣即所謂清氣下陷。其治相同。至於寒氣治法在於解散。故用麻黃理中等湯。若反之熱者。欲使寒之。即用白虎生脉等湯是也。

▲遺精門

【總括】遺精者。不夢而自遺。此為心腎虛弱不固之故也。其或由於過慾之人。日慣精滑。或清氣不足。下陷不固。或久曠之人。精盛溢濁。或醇酒厚味。火強不固。皆為是病。

【治法】如心腎虛弱。不夢而遺。以龍骨遠志丸治之。夢而後遺。用坎離既濟湯。火強久曠。應封髓丹。若乃精出不止。陽強不倒。名曰強中。急先以坎離既濟湯加生龍骨。清而補之。形實熱盛者。用黃連解毒湯加大黃。先攻其熱。而後再與補精丸以調理之。

▲濁帶門

【總括證治】濁帶之為病。因精竭陽虛故也。大致赤色多屬熱。白色多屬寒。然亦有敗精濕熱。釀成腐化。變白而又屬熱者。故不可一概論。治之法。如赤濁帶下屬熱者。宜用清心蓮子飲。白濁帶屬寒者。宜用萆薢分清飲。赤白濁帶下屬濕熱者。宜

用珍珠粉丸。倘赤白濁帶下屬虛寒者。及虛陽上攻。頭痛、喘嗽、痰壅、氣逆。俱宜黑錫丹治之。

▲ 痰飲門

【總括】稠濁為痰。清稀為飲。稠濁是熱痰屬心。沫清是寒痰屬腎。少而粘連。咯不易出。是燥痰屬肺。多而易出。是濕痰屬脾。搐搦眩暈。是風痰屬肝。膈上痰滿。嘔吐痰涎。此飲留於膈間。名曰伏飲。喘咳面腫。不得卧。此飲留於肺。名曰支飲。飲流四肢。曰溢飲。飲流腸下。曰懸飲。飲流腸胃。曰痰飲。是故痰飲之為病。其患甚多。而為害甚烈也。

【治法】一切諸痰。皆宜以二陳湯治之。即橘紅、半夏、茯苓、甘草。是如係風痰。加南星、白附子。熱痰。加黃芩、黃連。寒痰。加乾薑、肉桂。氣痰。加厚朴、蘇葉。又若因鬱生痰。加香附。氣虛有痰。加人參白朮。濕痰。則當加蒼朮。至於燥痰。宜用燥痰湯。即枯芩、旋覆花、海石、天冬、橘紅、風化石、芒硝、枳殼、桔梗、貝母、枯萎霜也。餘如茯苓指迷。凡治一切痰飲平和之劑。亦可適用。至如留飲。實者用控涎丹攻之。虛者。用苓桂术甘湯溫之。伏飲。實者用神佑丸。虛者用半夏、茯苓、丁香、生薑、煎服之。支飲。用葶苈大

棗湯。懸飲十棗湯。溢飲有熱者。用越婢加木湯。即麻黃、石膏、甘草、生薑、大棗、加蒼术也。有寒者。用小青龍湯治之。

△欬嗽門

【總括】有聲無痰曰欬。有痰無聲曰嗽。有痰有聲曰欬嗽。欬嗽大要皆在聚於胃、鬱於肺也。即論其證亦惟外感內傷二證可以盡之矣。外感之欬由邪先入於肺。經久不愈。必自肺而傳於五臟。內傷之欬起於陰分。蓋肺金為水之母。陰損於下。則陽孤於上。水涸金枯。肺燥則癢。癢則欬不已也。總之其病雖多。無非肺病。若久病欬嗽不已。傷肺必成勞。可不懼歟。

【證治】感冒風寒。傷肺欬嗽。嘔吐痰涎。發熱惡寒。以參蘇飲治之。若喘嗽。即依參蘇飲。去人參加杏仁。名杏蘇飲。若頭痛。依參蘇飲。去人參以前胡易柴胡。又加川芎。名曰芎蘇飲。內有熱。加黃芩。有寒加麻黃。乾薑。至若喘嗽面腫。無痰身熱。是為肺經火鬱氣分。以瀉白散治之。若無汗。是為外寒鬱遏肺火。加麻黃杏仁以發之。若無外證。惟面赤。是為肺經火鬱血分。加黃芩。內熱甚者。更加黃連以清之。欬急嘔逆者。加青皮橘紅半夏以降之。喘嗽面浮不得卧者。是兼有停飲。加葶苈以瀉之。

肺燥熱因而欬嗽者。用清肺湯。積熱傷肺。而有痰粘色黃者。以人參鴻肺湯治之。
肺中虛寒。喘嗽有血。而皮毛見焦枯者。以鍾乳補肺湯治之。喘嗽已久。肺氣虛勞。
宜人參養肺湯。此平劑也。不寒不熱。久嗽家大可擇用。如欬嗽痰血。當以清寧膏
治之。

▲喘吼門

【總括證治】喘者。呼吸氣出急促之謂也。吼者。即喘而喉中更有聲響之謂也。若氣粗胸滿。不能布息而喘者。則是實邪。若更痰稠便鞕。謂之熱邪。氣乏息微。不能續息而喘者。則是虛邪。若更瘦飲清冷。謂之寒邪。治之法。如外寒傷肺。喘急用華蓋散。即麻黃、杏仁、蘇子、甘草、橘紅、赤茯苓、桑皮。如面赤浮腫。謂之火鬱之喘。宜瀉白散。痰盛聲急。謂之痰喘。宜蘿皂丸。無痰聲急。謂之氣喘。宜蘇子降氣湯。因喘不得卧。而有停飲者。葶苈大棗湯主之。又若氣虛。宜五味子湯。虛寒。則用黑錫丹。或腎氣湯。

▲腫脹門

【總括】經曰。衛氣之在身也。常然並脈循肉分行。陰陽相隨。何病之有。若其人內傷

七情外感六氣勞役過度飲食失節則邪正相攻榮衛失和衛氣與風寒之邪客於脈中則為脈張衛氣與風寒之邪留於肉分則為膚張也脈張之證腹筋起絡色變久而不已則成單腹張膚張之證。整整然初不堅硬纏綿不愈則成氣鼓。脈滿膨脹急鞭也若風寒之邪不容於脈中分肉而干衛氣深入客於腸外僻而內著日以益大狀如懷子月事仍以時行此名曰腸覃或干衛氣客於胞中惡血留止日以益大狀如懷子月事不以時下此名曰石瘕但此皆生於女子若在男子則即為疝病是也另見專篇然看腫脹之病皮厚色蒼者屬氣皮薄色澤者屬水氣陽也陽性急故為脹也速每從上腫而漸下得以安卧邪在外也水陰也陰性遲故為脹也漸每從下腫而漸上更有欬喘不能安卧也。

死證腹脹身熱陽盛脹也若吐衄瀉血則陰亡矣四肢瘦冷陰盛脹也若數瀉不止則中脫矣先腫脹腹後散四肢者可治先腫四肢後歸入腹者不治腫脹之病多實服下利之藥旋消旋起則為正不勝邪亦不治腹筋青漲高起脹脰蒼黑臍脰突起陰囊腫腐缺盆脊背腫平足心腫平則五臟已傷其不能治更不待言至於脈大而時絕或虛濶細則氣血敗亦死脈也。

【證治】膚脹之證。以木香流氣飲治之。脹脹之證亦用木香流氣飲再加川芎、薑黃。至於單腹脹鼓脹當分氣血而治。以厚朴散治氣病。以下瘀血湯治血病。故宜以厚朴散治單腹脹。以下瘀血湯治鼓脹。至如腸覃亦氣病也。氣實脹者用厚朴散即厚朴、枳榔、木香、枳殼、青皮、陳皮、甘遂、大戟也。石瘕亦血病也。血實脹者用下瘀血湯。即大黃、桃仁、䗪蟲、甘遂也。

然脹有虛實寒熱。如脹而形氣虛少寒者。宜用寒脹中滿分消湯。脹而形氣虛少熱者。宜用熱脹中滿分消湯。

至於水腫治法。如其從上腫者多外感風邪。宜乎汗。從下腫者多內生濕邪。宜乎利水。外散風水。宜用越婢湯加蒼朮。內利水濕。宜用貼臍法。即以巴豆去油和水銀粉硫磺研勻成餅。先用綿布臍上貼餅於外。再以綿縛之。時許即瀉下。倘若通身腫則當用外散內利。宜用疏鑿飲子兩解之。但此方太峻。用和平者。即茯苓導水湯。若水盛上攻。喘急不得卧。則當先以蘇子葶苈丸而定其喘。再看其熱盛者。用大聖濬川散。濕盛者。用舟車神佑丸治之。

【總括】經曰。疫瘧皆生於風。謂四時病瘧。未有不因風寒外束。暑邪內伏者也。又曰。瘧者。風寒之氣不常。此言比時病瘧者也。又曰。夏傷於暑。秋為瘧瘧。又曰。夏暑汗不出者。秋成風瘧。謂夏傷於暑。其邪甚者。即病暑。其邪微者。則舍於營內。至秋復感風寒。并衛而居。則比時與風寒外邪合束。故曰。暑汗無出。始病瘧疾也。其不即病傷寒者。亦以有暑邪預伏於營中也。蓋有風無暑。惟病風。有暑無風。惟病暑。必風暑合邪。始病瘧疾也。

【日作間作】瘧氣之邪。伏藏於營。隨其經絡。循伏脊膂之表。此初病邪淺傳舍之次也。其邪深者。則入脊膂之內。注伏於衝脈。橫連諸經脂膜之原。內及藏府。此邪漸深傳舍之次也。衛風者。一日一夜周於身。每至平旦。則出足太陽。晴明大會於風府。腠理乃開。開則所客營衛之邪入。入之時。正邪交爭。得陰內薄。則生寒慄。得陽外出。則熱蒸蒸。而病乃作也。病初邪淺者。衛行未失常度。其邪日與衛會。故日作也。病久邪深者。衛行遲。失其常度。其邪不能日與衛會。故間日乃作也。時有間二日間三日。或至間數日作者。亦衛氣行愈遲。逢愈遲。故作愈遲也。

【瘧晝夜作】營氣循經而行脈中。衛氣不循經而循脈外。惟日行於三陽。夜行於三

陰故邪在三陽淺會者。則晝發。在三陰之深者。則夜發。病邪將退者。夜發退為晝發。此為去陰歸陽分。病欲已也。病邪漸進者。晝發進為夜發。此為去陽入陰。則病益甚矣。

【瘧早晏作】衛氣流行。每日平旦。會於風府。而邪氣中人。其傳從頭項。歷循背腰之間。日下傳脊之一節。邪與衛會日晚。故作日益晏也。邪傳下極。鬱衝其氣復上行。邪與衛會日蚤。故作日益蚤之緣也。

【治法】瘧初氣實。均宜汗吐下。有表裏證。汗下之。胸滿嘔逆。有飲者。吐之。表裏俱清。宜用和解之方。清解不愈。表裏無證。方可用截藥止之。久瘧形羸氣虛。宜用補劑。自當然也。

瘧病初起。寒熱不多不少。兩平者。宜桂麻各半湯汗之。其方療治。如汗少寒多。熱少者。用麻黃湯倍入汗之。如汗多寒少。熱平者。倍桂枝湯汗之。熱多加石膏。先傷於寒。後傷於風。先寒後熱。寒多熱少。謂之寒瘧。而兼無汗。宜麻黃羌活湯。即麻黃、羌活、甘草、防風為劑。先傷於寒。後傷於風。先寒後熱。熱多寒少。有汗為之風瘧。宜桂枝羌活湯。即麻黃湯方。減去麻黃。添入桂枝是也。二證嘔者。半夏均加。先傷

於風後傷於寒。先熱後寒。名曰濕瘡。宜白虎湯汗多。合桂枝湯為君。又有癰瘡。陽氣盛而陽獨發。則但熱而不寒。宜柴胡白虎湯。又有牝瘡。陰氣盛而陰獨發。則惟寒而不熱。宜柴胡桂枝湯相親也。

因食而病瘡者。則瘡悶噫氣惡食。宜草果加入小柴胡。合平胃散相宜也。凡瘡有裏不清便鞭者。用大柴胡湯下之。又宜再將朴硝、枳榔、草果、厚朴酌量加之。瘡疾已經或汗、或吐、或下之後。表裏無證。法當清解。而清解未盡。仍有寒熱。其方宜清脾飲。即白朮、青皮、厚朴、草果。合小柴胡。人參減去。加入茯苓、生薑也。氣虛者。加人參。痰多者。加橘紅、半夏。飲多宜逐飲。倍生薑。加枳榔。渴熱者。加知母、石膏、天花粉。食滯。加麥芽、神曲。濕盛者。加澤瀉、蒼朮也。

【久瘡虛瘡勞瘡】久患瘡疾。形氣俱虛。脾胃弱。而不思食。宜用四獸飲。補中益氣湯等方斟酌治之。久病勞損。氣血兩虛。而病瘡疾者。名曰勞瘡。宜倍用鱉甲。合十全大補湯治之。熱盛除去黃芪、肉桂。加入黃芩、柴胡也。

諸瘡按法治之。發過三四次。表裏皆清。當以截瘡法截之為先。若表裏未清。截蚤則必復發之不已。表裏已清。不截。則正衰邪盛而難治也。如截虛人之瘡。宜用柴胡

截瘧飲。即小柴胡加烏梅、桃仁、枳榔、常山也。截實人之瘧。宜用不二飲。或密陀僧散。燒酒冷調服。時面必向南也。

瘧瘧。經年久不愈之老瘧也。瘧母。即久瘧腹中成塊。結起癬癥也。形實。宜用控延丹以逐瘧飲。或用化滯丸以攻積滯。攻後之餘法。與前所治瘧法同也。

瘧在夜發。名曰三陰瘧疾。初熱宜用桂枝湯、麻黃湯、小柴胡湯、四物湯方合帖。以杏仁易桃仁。增損汗之。汗解之後。餘同前法。鬼瘧亦多在夜發。由尸氣注之。比三陰瘧疾。則夜多惡夢。時生恐怖。宜用蘇合香丸。其效功高也。

▲霍亂門

【總括】霍亂之證。其揮霍變亂。生於倉卒之間。心腹大痛。吐利兼至者。名濕霍亂。如欲吐不吐。欲瀉不出。名乾霍亂。又名攬腸痧。若舌卷筋縮。則卵陰入腹難治矣。

【證治】霍亂之病。得之於風寒暑食。水邪雜揉為病。亂於腸胃。清濁相干。故心腹大痛。吐瀉兼至也。宜藿香正氣湯方。即藿香、蘇葉、陳皮、半夏、茯苓、甘草、白芷、桔梗、腹皮、厚朴。相當調劑。如轉筋。用木瓜、吳萸。加入暑則吐多。合香薷飲。名二香湯。濕則瀉多。加入蒼朮。暑熱甚者。用辰砂六一散。或五苓散。加石膏、寒水石、滑石。名甘露。

飲寒極肢厥脈伏者。用炮川烏、炮川附、合理中湯治之。

▲噎膈翻胃門

【總括】三陽者。謂胃、大腸、小腸也。三府熱結不散。灼傷津液。使之乾枯。則賁門、幽門、魄門。而水穀出入之道。不得流通矣。胃之上口。為賁門。賁門乾枯。則納入水穀之道路。狹隘。故食不納。而為噎膈之病。小腸之上口。為幽門。幽門乾枯。則放出腐化之道路。狹隘。故食入而不放。反而吐出。翻胃之病成焉。二證留連日久。則大腸傳尊之路。狹隘。故大腸之下口。魄門。應自燥濇。難於行也。若胸痛如刺。胃腕傷也。便鞭如羊糞。精液枯也。吐沫嘔血。血液不行。皆命難望生矣。

【證治】五汁飲、大黃湯。以清乾燥熱結也。丁香、沉香。加入四君子、六君子。理中湯內。治虛寒也。如便秘塞。應用利膈丸。吐逆不已。以汞硫散為先。利膈丸。即小承氣湯。加人參、甘草、木香、當歸、藿香、枳榔、桃仁、麻仁、蜜為丸也。汞硫散。即汞一硫二。同研如墨。老酒薑汁。調服即安矣。

氣少者。宜四君子湯。血枯者。宜四物湯。痰多。宜二陳湯。氣滯。宜二十四味流氣飲。其餘者。亦同嘔吐之治法。此病雖竭心思區畫。亦不過盡人事。以待天休也。

▲ 嘔吐噦門

【總括】有物有聲。而謂之嘔。有物無聲。乃吐之徵。無物有聲。是為噦。乃乾嘔也。如面色青。指甲黑。中痛不止。肢厥不回。其凶可知也。

【證治】嘔吐之證。以半夏。生薑。為聖藥。即小半夏湯也。氣盛。加橘皮。即橘皮半夏湯。如虛加蜜人參。即大半夏湯。熱盛。用生薑。黃連。名黃連半夏湯。如大小二便閉而不行。宜攻下之。初吐且不可下。恐逆病勢也。寒盛。用丁香。吳萸。生薑。合六君治之。名丁萸六君湯。

潤燥止吐。宜五汁飲。方即蘆根。荸薺。甘蔗。竹瀝。薑汁也。嘔吐諸藥湯水。到咽即吐。不下者。宜用硫汞重墜之藥。頓服之。其藥即不能吐出。次日。大便出黑色穢物。諸湯水藥服之。則不吐也。如不大便黑色。再服。以大便利為度。積留成痛作吐者。宜化滯丸為良。

▲ 泄瀉門

【總括】人受濕勝。則成濡瀉。即水瀉也。其瀉必多水。腸鳴。而腹不疼。受寒濕傷。則成洞瀉。即寒瀉也。其瀉必如鴨屎之溏。澄徹清冷。腹痛如雷鳴甚。如完穀不化。而名

飧瀉。乃土衰木盛。清氣在下。不能上升也。脾虛。則腹滿。食後即瀉也。腎瀉。則必寒虛。每至早晨。即瀉數行也。

傷食作瀉。名曰食瀉。即胃瀉也。其瀉必噫氣腹痛。瀉出之物臭穢而黏也。如渴而飲。飲而瀉。瀉而復渴。渴而復飲。為之飲瀉也。時或瀉。時或止。而不瀉。却屬痰濕也。若火瀉。瀉一陣痛一陣。陣陣而痛。喜飲冷物也。暑瀉。面色垢泥。汗出口渴而煩。滑瀉。日久不能禁止。大瘕瀉。即今時作痢疾看也。

【死證】泄瀉之證。形氣衰弱。其脈實大。兼之五虛。謂脈細皮寒氣少。噦逆。手足寒冷。水漿不入。大便不禁。肛門大孔直出。亦無禁止。下瀉上嗽。如此證見。命多難也。

【證治】濕瀉。宜胃苓湯。以分清濁。寒瀉。用理中湯。附子添入。飧瀉。用升陽益胃湯。治之。倍加芍藥。減去黃連。脾瀉。用參苓白朮散。方即扁豆合四君。再將蓮肉攢入。又加薏苡、山藥、縮砂、桔梗也。腎瀉。用二神丸。即補骨脂、肉豆蔻。本方加吳茱萸五味子。名四神丸也。

食瀉。形氣實者。宜大承化滯等藥下之。形氣虛者。宜枳术平胃消導之。飲瀉實者。雖當用神佑丸逐飲。然亦斟酌不可過也。虛者。用春澤湯。甘露飲。痰瀉實者。攻之。虛

者用六君治之。火瀉用芍藥芩連葛根湯。方即甘草、芍藥、黃芩、黃連、葛根也。暑瀉用紅麵加入六一散調勻治之。滑瀉用八柱散理中湯加附子、栗壳、烏梅、訶子、肉蔻。是皆治之法也。

口瘡糜爛泄瀉一證。古經未載以理推之。雖云屬熱。然其上發口糜。下瀉即止。泄瀉方止。口糜即生。觀其上下相移之情狀。亦必有虛。非純實熱之所為也。心之竅。開於舌。脾之竅。開於口。舌者。乃心脾有熱。故上發口舌瘡赤糜爛。胃主消化水穀。小腸主受盛消化心脾之熱。下移小腸。胃府有病。則運化之職失矣。故下注泄瀉也。口糜發時。晚用瀉心導赤散。方即生地、木通、黃連、甘草稍也。

泄瀉下時。早晚用芩參白朮散相宜。若屎甚小。下利不止。則為水走大腸。宜用茯苓車前各等分煎湯。時時代飲。利水導熱。若服寒涼藥。口瘡不效。則為虛火上泛。宜用大倍茯苓。再加肉桂。於理中湯內醫治。則能降陽利水。降陽而口糜自消。利水而泄瀉自止。可並愈也。

△痢疾門

【總括】大瘕瀉者。裏急後重。數至圊而不能便。蓋中痛也。小腸瀉者。溲濁而便膿血。

少腹痛也。大腸瀉者食已窘迫。大便色白。腸鳴切痛也。腸澼者飲食不節。起居不時。陰受之則入五臟。膜脹閉塞。下為飧瀉。久為腸癖。腹痛下血也。滯下者積汁垢膩。與濕熱滯於腸中。因而下也。此皆古痢之名。然痢之為病。裏急後重。下痢膿血。小便赤澁。裏急者腹痛積滯也。後重者下墜氣滯也。小便赤澁者濕熱鬱滯也。此皆外因風暑濕蒸之氣。內因不謹生冷飲食而生。白痢自大腸來。大腸與肺相表裏。肺主氣故屬傷氣也。赤痢自小腸來。小腸與心相表裏。心主血故屬傷血也。寒閉痛甚。寒閉痛微。痢閉病減。故痛微也。虛者小氣氣無壅滯。故亦微痛也。熱者多實。性急不得舒通。故窘痛也。實墜者。後墜下迫肛門。糞出墜止。故為糞前墜。乃滯也。虛墜者。糞出而更墜。為糞後墜。乃虛也。又初痢多屬濕熱。久痢多屬虛寒。故濕熱虛寒。當有初痢久痢之稱也。

痢之名。約分為八。噤口痢。水穀痢。風痢。休息痢。熱痢。寒痢。濕痢。五色痢。噤口痢者。下痢飲食俱不納。或嘔而不食也。水穀痢者。糟粕雜血膿而下也。風痢者。有痛墜重似腸風。至圓必下清血也。休息痢者。有時發作。復有時停止也。熱痢如魚腦稠黏而穢。寒痢如稀澥白清而腥也。濕痢如黑豆汁渾濁也。五色痢者。膿血相雜而下。

也。若有藏腐屍臭之氣則凶矣。

【死證】痢疾水漿不入下痢不止氣少脈微皮膚寒冷者死於陽絕也下痢純血噤口嘔逆而有藏氣身熱脈大者命難保全死於陰絕也

【證治】初痢有表證發熱者不宜攻之法當先解其表宜倉廩湯汗之裏熱盛上衝心作嘔噤口者法當先攻其裏用大黃黃連湯攻之寒痢用理中湯加诃子肉桂縮砂白多加附子赤多加肉桂不須言也

初痢內熱不盛而外無有表之大熱宜用芍藥湯黃芩黃連枳壳廣木香白芍當歸
梔榔肉桂甘草是也如尿澀用滑石倍加下痢次數無度下墜窘痛入大黃治之
痢疾攻下之後病勢大減宜調氣血當用連香和胃湯方即黃芩芍藥木香黃連甘
草陳皮白朮縮砂當歸也赤痢下血多虛者當溫之必更加椿根皮地榆炒用白
朮日久氣虛者加人參茯苓共炒乾薑以補之實而噤口堪下者以大黃黃連湯
下之不堪下者內以人參黃連石蓮子煎湯徐徐服之下咽即好外以貼臍王瓜
藤散即良方也

久痢藏有寒熱不分者宜用烏梅丸調治之寒虛滑脫而痢者用真人養臟湯溫補

之方即人參、白朮、肉蔻、當歸、訶子、肉桂、芍藥、嬰粟壳、甘草、木香也。

水穀痢者。乃脾胃虛腐化不及。宜調中益氣湯治之。濕痢。宜木香、黃連、合平胃散方治之。濕而虛風痢。宜胃風湯治之。方即肉桂、粟米加入八珍湯。內減去地黃。是也。五色休息二痢。據因皆傷臟氣而然者。何也。一因滯之太早。或因濕熱下之未盡。蘊於腸胃之中。用一切補養之藥不應。則可知初病非止滯太早。即下之未盡也。診其脈若有力。雖日久。仍當攻之。其餘治法與諸痢同也。

▲痘證門

【總括】面目身黃。但欲安卧。小便渾黃而溺出。黃疸之病成矣。如已食。如饑食難用。飽飽則心煩頭眩。此得之於胃有濕熱。大饑過食者也。若已見黃色。乃欲作胃疸。胃疸者。即穀疸也。又有酒疸之名者。得之於飲酒無度而發是病也。又女勞疸者。疸而額黑。少腹急。小便自利是也。此得之大勞大熱。與女交接也。當審其或有瘀血生病發黃。亦少腹急。小便自利。但不額黑耳。詳在傷寒門。黃汗者。汗出黃色染衣。面目微腫。得之於素有濕熱。汗出入水浴也。此皆濕熱而成。惟陰黃。則屬濕寒。陰黃者。身重而痛。厥冷如冰也。詳在傷寒門。

【死證】仲景曰。黃疸之病。當以十八日為期治之。過十日以上。宜差而反劇。為難治也。如色若烟薰。目神暗青。陽黃死證也。喘滿渴煩不已。心胸如啖蒜刺痛。黃毒入腹。死證也。面色黧黑。汗冷糲糲。陰黃死證也。及天行疫癘發黃。名曰瘟黃。死人再暴也。

【證治】諸疸表實無汗者。以麻黃茵陳醇酒湯煎服汗之。裏實不便。以茵陳蒿湯、梔子大黃下之。無表裏證。以茵陳梔子蘖皮清之。尿少。以茵陳五苓湯利之。穀疸熱實者。宜乎攻下。不實者。宜用胃疸湯。方即茵陳合胃苓湯減去甘草、厚朴。加黃連、梔子、防己、葛根、秦艽為方是也。

酒疸虛者。用茵陳解醒湯治之。即葛花解醒湯加茵陳也。實者。用梔子大黃湯。即梔子淡豆豉枳實大黃也。黃汗。宜用一味蔓菁子為散治之。小便白則愈。或用加味玉屏風散。即石膏、茵陳、黃芪、白朮、防風也。

女勞疸實者。用石膏散。即石膏滑石用大麥湯調服。女勞虛者。用腎疸湯醫之。方即升陽散火湯。減去芍藥。加入黃芩、黃蘖、神麃。并四苓散俱用是也。

【總括】五積者。肥氣、伏梁、痞氣、息貴、奔豚也。六聚者。積之着於孫絡、緩筋、募原、督筋、腸後、輸脈也。本乎難經。七癥者。蛟、蛇、鱉肉、髮虱、米也。八瘕者。青、黃、燥、脂、狐、蛇、鱉、也。載在千經方中。腸覃者。積在腸外。狀如懷子。月事以時而下。石瘕者。積在胞中。狀如懷子。月事不以時下。二證當辨。月事之有無也。痃癖之名。色痃者。外結募原。肌肉之間。癖者。內結隱僻。脅脊腸胃之後。故當分別其淺深也。然屬臟者為積。陰也。故發時有常處。不離其部位。屬腑者為聚。陽也。故忽聚忽散而無本根也。癥不移而可見。故類積類痃也。瘕能移。有時隱。故類聚類癖也。積聚、瘕瘕、腸覃、石瘕、痃癖之疾。皆得之於喜怒不節。則傷臟。飲食過飽。則傷腑。腸胃填滿。汁液外溢。為外寒所襲。與內因氣血食物凝結相成也。

【難證】積聚牢固。堅硬而不軟。又不能移動。則病深矣。胃弱食少。大便溏瀉。不堪攻也。五積之中。奔豚最為難治。若更發作。正氣虛不能支。其狀欲死。從少腹起氣上衝喉。神色怖驚。皆惡候也。

【證治】積聚宜攻。然胃强能食。則攻法可用也。若攻虛人。雖兼補藥。或一攻三補。或五補一攻。攻邪而不傷正。養正而不助邪。則正邪相安矣。凡攻氣食積癖。宜用秘

方化滯丸。攻積聚癰瘕。宜用溫白丸。攻血積、血瘕。宜用桃仁煎。攻痰積。宜用控涎丹。

▲ 瘡證門

【總括】經云。任脈為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。瘕聚者。即女子之疝也。子和七疝。主於肝者。蓋以肝經過腹裏環陰器也。七疝主任者。以任脈起中極。循腹裏之原也。是以諸疝病。無不由此二經。故主之也。疝病之證。有衝疝。少腹牽引陰丸而痛。氣上衝心。二便難也。有厥疝者。少腹痛引陰丸。肝之逆氣衝胃作吐是也。有瘕疝者。少腹之氣不伸。左右癓塊作痛者是也。有狐疝者。卧則入腹。立則出腹。入囊似狐之晝。則出穴而消。夜則入穴而不消者是也。有滑疝。少腹痛引陰丸。橫骨兩端。約文中狀如黃瓜。內有膿血者是也。有癰疝。少腹痛引陰丸。少便祕者是也。有癰疝。少腹不痛。陰囊腫大硬頑者是也。

【證同名異辨】有謂血疝者。其證即便毒潰魚口也。癰疝者。其證即癰疝也。有氣疝。即偏墜也。筋疝。即下疳也。水疝。小便不通。胞痺。即膀胱氣皆癃疝也。衝疝。證似小腸氣反腰痛相連也。

【證治】治疝病。當以左右分其氣血。凡在左邊陰丸屬血分。凡在右邊陰丸屬氣分。則尤當分別其屬虛屬濕屬熱與寒也。凡寒則收引而痛甚。熱則多縱而痛微。凡濕則腫而重墜。而虛亦重墜。但輕輕而不重也。

中寒冷疝。宜當歸溫疝湯。即當歸、白芍、附子、肉桂、元胡索、小茴香、川棟子、澤瀉、吳萸、白茯苓也。外寒入腹。用烏桂湯。即川烏、蜂蜜、肉桂、白芍、甘草、大棗、生薑也。

外寒內熱。用烏頭梔子湯。即以川烏、梔子各炒水酒加鹽之疝痛。即安癩疝不必問其新與久。只用三層茴香自可痊也。

凡傷醇酒厚味濕熱成疝。又有不謹房勞而受外寒者。宜用十味蒼蘋散。即蒼朮、黃藥、香附、青皮、益智、甘草、小茴、元胡索、山楂、桃仁、附子煎服也。

膀胱水疝尿不利者。宜用茴棟五苓散。即五苓散加茴香、川棟子與葱鹽也。瘕鞭血疝。宜乎攻下。用大黃皂刺湯。即大黃、皂刺酒共煎服也。

血分寒疝。女子產後有臍腹連陰腫脹痛疼者。用羊肉一斤、薑五兩、當歸三兩、水八升煎服。

衝疝、腰疝。痛上攻心脾。悸奔豚氣上行者。用奪命湯。即吳萸一味為君主。餘則肉桂、

澤瀉白茯苓也。

氣疝諸疝走注疼痛。用青木香丸。即青木香、杏附、吳萸、巴豆拌炒。川棟肉、烏藥、畢澄茄、小茴香也。

齒香棟實丸。治狐疝及一切諸疝。即川棟肉、小茴香、馬蘭花、芫花、山茱萸、吳茱萸、食茱萸、青皮、陳皮各一兩。丸服。仍宜急灸大敦穴。即安也。

▲頭痛眩暈門

【總括】頭痛屬痰。屬熱。屬風。屬濕。屬氣。或兼氣虛血虛而疼。在右邊者。屬氣分而多痰。熱在左邊痛者。屬血少。又更屬風。如因風而痛。則必眩暈。謂之頭風痛。因熱而痛暈者。則必煩渴有火上攻也。因氣鬱而痛暈者。則志意不伸。因痰而痛暈者。則必嘔吐痰涎。因濕而痛暈者。則頭重不起。而痛因虛而痛暈者。動則增痛增暈也。

【死證】真頭風。痛連腦內。痛朝發夕死。手足厥逆。至肘膝之節青冷也。凡頭痛。或在鴻多眩暈。時時迷冒。又頭目卒然大痛。目瞀不見。皆凶候也。

【證治】一切頭風兼熱者。宜用華蓋散。噙鼻作嚏。一切頭風兼濕盛者。以瓜蒂入松蘿、茶茗二味為末。噙之出黃水立愈。頭風風盛時。發日久不愈。則多令人目昏。以

三聖散。噙之。內服。芎芷石膏湯最靈。即川芎、白芷、石膏、菊花、羌活、交本也。如苦痛者。加細辛。風盛目昏。加防風、荆芥。熱盛。加梔子、連召。黃芩、薄荷、甘草。大便秘。尿紅。加朴硝、大黃。以攻之。

風熱頭痛便利者。宜茶調散治之。雷頭風痛。頭面疙瘩。耳聞雷聲。宜清震湯。方即薄荷、蒼朮與升麻也。頭風兼痰熱者。用滾痰丸。以川芎作引也。如虛寒真痛。宜人參芎附湯。即附子、人參、川芎也。

偏正頭風。宜芎犀丸為主。血虛者。必面白少血色。用四物湯加薄荷、羌活、天麻、正氣虛用補中益氣湯。加川芎、細辛。氣逆。宜用蘇子降氣湯黑鉛丹治之。

欲吐暈。重風痰頭痛者。用芎麻湯。下青州白丸子。即寧。如風痰兼氣虛者。用半夏白术天麻湯。即六君子湯加黃芪、乾薑、黃藥、天麻、神曲、麥蘖、澤瀉、蒼朮也。

頭暈之虛實寒熱諸證。與頭痛同一治法也。其有因血虛。用四物、加芥穗治之。如氣虛。用補中益氣湯治之。如氣血兩虛。用十全大補湯補之。上盛下虛。用黑錫丹最靈。

▲眼目門

〔總括〕經曰。目者五臟六腑之精氣。皆上注於目。而為之精。精之窠為眼。氣之精為白。眼筋之精為黑。眼骨之精為瞳子。血之精為絡。皆肉之精為約束。即眼胞也。裏擗筋骨血氣之精。而與脈系上屬於腦。後出於項中。因經熱蒸。腠理開。因風邪得以入之。風熱之邪合。上攻於目。故赤腫疼痛。輕者則為外障。或暴生雲翳。重者則積熱之甚。頓然痛傷睛也。

〔外障病證〕火眼者。風熱上攻。目赤腫痛。多淚隱澁難開也。腫而硬者。多熱盛也。宜先下之。腫而軟者。多風盛也。宜先發散。兩臉上下初生如粟。漸大如米。或赤或白。不甚疼痛。謂之臉生風粟。兩臉粘睛。赤爛痒痛。經年不愈。謂之爛弦風。又名赤暗。臉內如鷄冠。覬肉翻出。視物阻礙。痛楚羞明。謂之鷄冠覬肉。此皆脾經風熱為病也。兩眥筋膜努出。謂之努肉攀睛。兩眥赤脈漸漸侵睛。謂之赤脈貫瞳睛。兩眼混赤如珠。痛如針刺。謂之血灌瞳人。兩眼痒痛。忽然突起。謂之睛高突起。目中大痛。忽生翳膜。狀如旋螺。謂之旋螺尖起。目中大痛。忽然瞳睛努如蟹眼。為之蟹睛疼痛。又名損翳。此皆肝心二經積熱也。兩臉燥急。睫毛倒刺。謂之拳毛倒睫。兩目衝風。淚出涓涓。冬月尤甚。謂之迎風流淚。兩目連眥痒極不痛。謂之風痒難任。目中

從上忽生赤膜。垂下遮睛。謂之赤膜下垂。目中從下忽生黃膜。侵睛疼痛。謂之黃膜上衝。此皆心肝脾三經風熱為病也。

〔內障病證〕內障之病。每因頭風五風變成。初病。瞳珠漸漸變色。睛裏隱隱似翳。或白。或黃。或綠。雖與不患之眼相似。然不精彩。光明射人。病頭風者。發則頭痛。引目無淚。或左目。或右目。或先左目。或後右目。相注不定。如坐暗室之中。此頭風傷目之漸也。綠風者。頭旋。兩角痛。連鼻。相牽。引目疼痛時。或見白花紅花起者。此綠風傷目之漸也。證同綠風。時時見起黑花。為之黑風。此黑風傷目之漸也。烏風者。亦同黑風。而見烏花。但不旋暈。漸漸昏暗。此烏風傷目之漸也。有黃風者。雀目病久。如金色之瞳睛。此黃風傷目之漸也。青風者。頭微旋。不痒不痛。但見青花轉轉。日漸昏蒙。此青風傷目之漸也。

〔證治〕暴花火眼。宜菊花通聖散。即防風通聖散加菊花也。凡外障等證。俱可加減之方。風盛加羌活。防風麻黃倍入。熱盛加黃連。倍用朴硝大黃。如痛生起翳膜。恐多傷目。宜洗刀散。更入細辛、獨活、羌活、元參、木賊、白蒺藜草決全退、蔓荆、青葙子等也。

【內外障治】外障無寒。一句了然。子和曰。目不因火不病。所以五輪變赤。火因生也。氣輪白睛。火乘肺也。肉輪目胞。火乘脾也。風輪黑睛。火乘肝也。水輪瞳人。火乘腎也。血輪兩眞。火自甚也。故能治火者。一句便了也。治火之法。在藥則鹹寒。吐之下之。在針則神庭、上星、顙會、前項、百會刺之。翳者可使立退。痛者可使立已。昧者可使立明。腫者可使立消矣。內障目病。雖亦無寒。然有虛也。虛或兼熱。亦屬虛熱。虛乃心腎弱。故不赤腫疼痛。如不病眼人。但損精彩光明也。心虛則神不足。神者火也。火內暗而外明。故不能外鑑。而失其光明也。腎虛則精不足。精者水也。水外暗而內明。故不能內照。而失其光明也。心虛者。則養心神。腎虛者。則壯腎水。自可收功於不明也。其五風內變諸翳障。如圓翳、冰翳、清翳、濁翳、散翳、橫翳、浮翳、沉翳、僵月棗花、黃心黑風等翳。俱列在眼科方書。自有治法能攻之。難以盡述。此特舉其大概耳。

△牙齒口舌門

【總括】牙齒者。骨之餘。屬乎腎也。上牙齦屬足陽明。下牙齦屬手陽明。若無故齒長疎豁而動。則為腎衰憊矣。牙疼者。有胃火。有風邪。有寒濕火熱。有蟲。不一也。如不

怕冷熱。為風邪牙痛。如有火熱牙痛多腫。喜冷食。得寒則更痛者。讐仇之意也。惟寒牙痛。則為客寒犯腦。多頭連齒痛。為寒邪也。故牙齦不腫不蛀。而喜熱飲也。又蟲牙。則一牙作痛。蝕盡一牙。又蝕一牙。而生痛也。

骨槽風者。牙齦連頰脣硬疼痛。牙齦腐爛。出膿血也。牙疳。以骨槽潰後。腫硬不消。潰出血臭。而不岀膿水也。且皆因痘疹癬疾之後而成也。

〔證治〕清胃散。治血分胃火牙痛。赤腫出血者。即生地、當歸、黃連、升麻、牡丹皮也。饒者。倍加升麻、丹皮。若腫痛牙齦不出血者。則為氣分。宜加荆芥、防風、細辛以散其熱。若腸胃積熱。腫痛爛臭。宜用涼膈散。加入升麻、石膏。以下其熱可也。

溫風散。治不甚腫痛。不怕冷熱。為風邪牙痛。方即當歸、川芎、細辛、草荳、交本、白芷、露蜂房也。若不腫痛甚。喜飲熱湯。為寒牙痛。宜本方再加羌活、麻黃、附子、溫而散之。二方俱宜半服。含漱一半服。連吐涎為良也。

凡諸牙痛。均宜一笑丸。即川椒七粒、巴豆一粒去皮研勻。飯為丸。綿裹咬痛處。吐涎及止。又宜玉池散。即交本、白芷、地骨皮、槐花、細辛、當歸、川芎、黑大豆、升麻、防風、甘草煎湯熱漱。冷吐。蟲牙亦以此咬漱。更須用火葱子或薤子。置小爐中燒烟薰之。

也。

牙疳一病。殺人最速。雖有專科而治。然皆未曉。累攻之。神法累攻者。今日攻之。明日又攻之。以腫硬消。黑色變。臭氣止。為度。若不能食。或隔一日。或隔二三日。攻之。攻之後。漸能食。不必戒口。任其所食。雖則大便溏軟。猶當量其輕重。攻下之。自見其神。若竟不思食。難任攻下。則死證也。攻藥宜用蕪蕚消疳湯。即雄黃、蕪荑、生大黃、蘆薈、胡黃二連、黃芩也。

【口舌證治】肩口屬脾。而舌屬心。口舌生瘡糜爛。乃心脾二經蘊熱深也。平人口淡。脾和。口出臭氣。則為胃熱。不因食五味。而口內溢酸味者。乃肝熱淫脾也。苦味者。心熱淫脾也。甘味者。本經熱自淫也。辛味者。肺熱淫脾也。鹹味者。腎熱淫脾也。此皆五臟之熱淫脾也。如木舌。則舌腫硬不痛。重舌。則舌下腫似舌。舌腫。謂舌腫大。脣腫。謂脣腫痛厚。唇瘡。謂唇腫潰裂成瘡。繫繭。唇謂繫小燥裂。以上之證。皆屬心脾。胃經蘊熱。若暴發赤腫痛。多為實熱。宜以涼膈散、梔子金花湯。急下其熱。即愈。若日久色淡瘡白。時痛不痛者。每屬虛熱。宜清心蓮子飲。知藥四物湯。補中兼清可也。若服寒涼久不愈者。以七味地黃湯令服。引火歸原。不效。甚者。加附子。可立。

愈也。

△咽喉門

【總括】胸膈上有風熱。則咽喉腫痛。風熱之邪若盛。則會厭兩傍高腫似乳蛾。故曰單雙乳蛾生焉。熱極則腫閉。名曰喉痺。乃語言難出。口息不通。湯水不下也。若熱極更兼痰盛。則痰涎繞於喉間。聲響咽喉內外腫閉。湯水不下。名曰纏喉風。凡喉痺、纏喉風皆危證也。或服藥。或吹藥。或針刺。潰後出膿血。則愈。若潰後無有膿血。仍然腫閉。湯水不下。則凶矣。

咽喉初起腫痛。宜用消毒涼膈散治之。即單雙乳蛾。則刺少商。出血而痊。喉痺纏喉風初起。病勢未甚。或狀如傷寒。宜急用如意勝全錠。連進三次。若痰涎壅盛。喉間內外腫閉。湯水難下。病勢危急。宜攻其痰熱。用雄黃解毒丸。服之便利。痰吐則愈。若昏冒。牙關噤急。湯不能下。將藥用醋化開。從鼻吹灌。度至咽喉之關。吐下則愈。吐下之後。隨證調治。雖愈。若咽喉潰爛。用珍珠散上之即安。

咽喉腫痛。單雙乳蛾。喉痺。纏喉風。諸症。宜用吹喉七寶散。即火硝、牙皂、全蝎、雄黄、硼砂、白膽二倍。研細如塵。吹一字許。吹中患處。其效如神也。

全肩背痛門

【總括證治】李果羌活勝濕湯。又名通氣防風湯。治太陽經風濕。肩背痛之證。即羌活、獨活、交本、甘草、蔓荆子、防風、川芎也。如兼氣鬱滯痛者。加木香、陳皮、香附。如氣虛鬱痛者。則時止而痛。加升麻、柴胡、人參、黃芪同用。若血虛鬱痛。則夜甚時止。加當歸、白芍藥。若血瘀鬱痛者。則夜痛不止。加薑黃、五靈脂、紅花也。風氣鬱盛者。痛則項肩強。加威靈仙。濕氣鬱甚者。痛則肩背重。加蒼朮、白术。再用本方研送青州白丸子。治痰風凝鬱痛。則嘔眩者可也。

△心腹諸痛門

【總括】心痛者。在歧骨陷處痛。橫連滿胸。名肺心痛。下連胃腕。名胃心痛。當連臍。名脾心痛。連腰。名腎心痛。連少腹。名小腸大腸痛。連脇。名肝心痛。有蟲心痛。則時止而吐清水。有名疰痛。即中惡腹痛。有寒邪外干。名寒心痛。悸而痛。名悸心痛。當分水停。心下屬飲也。與思慮傷心屬傷也。停食痛。即停食。停冷痛。即內寒。停水痛。即停水。停痰痛。即停痰。飲痛。即飲停。熱痛。即熱。有胃火痛。有氣痛。即氣滯。有血瘀痛等緣因。當隨證分門檢方而治。皆不死之證也。惟真心痛。面色黑。四肢厥逆。至節。

難治死證也。

【證治】攻濕積熱。當求化滯丸。攻寒積水。用備急丹。火痛用清震湯。即二陳湯加梔子、黃連、草豆蔻也。蟲痛用烏梅丸。飲痛用控涎丹治之。

七情鬱結。用木香流氣飲。思慮慄痛。用歸脾湯。內寒用理中湯。外寒用五積飲。疰痛用備急丹。血痛用抵當丸。

木來乘土。心腹急痛。宜用緩肝和脾之藥。惟小建中湯。血虛寒痛。用羊肉湯治之。氣虛用理中湯。加陳皮、青皮也。刲諸寒火鬱而痛。用烏頭梔子湯。寒多炮川烏為主。熱多姜炒梔子為主。刲而復痛。加入元明粉。已經吐下。或虛而久急痛欲死者。宜求鴉鳴丹治之。

▲胸脇痛門

【總括證治】括薑、薤白、白酒湯。治胸痺胸背。其痛難當之證。如喘息短氣。時時咳唾難卧。仍加半夏為良方也。

胸痛之證。須分屬氣屬血。屬熱飲屬老痰。宜用顛倒木金散。即木香鬱金也。屬氣鬱痛者。倍木香為君。屬血鬱痛者。倍鬱金為君。服下即安。虛者。加人參更效。有痰飲

熱作痛者。輕則用小陷胸湯。重則用大陷胸湯治之。如吐唾稠黏。頑痰壅盛。須用控涎丹治之。

脇痛在左邊者。屬瘀血留滯。輕者用枳芍散。即鬱金、撫芍、枳壳、甘草。重者宜用攻血之劑也。在右邊痛者。屬痰氣為病。重者用控涎十棗逐痛之飲。輕者用枳桔散。即片子薑黃、枳壳、桔皮、甘草。醫痛之輕也。如肝實作痛。則太息難以轉側。肝虛作痛。牽引肩胸。實者用柴胡疏肝散。即柴胡、白芍、甘草、香附、枳壳、陳皮。與川芎也。如肝虛用逍遙散。加川芎、細辛、陳皮、生薑。以和緩其中。又有肝虛用左金丸。肝實用當歸龍鬚丸。如一條杠起積食者。化積丸。積飲者。以控涎丹攻之。

▲腰痛門

〔總括〕腰痛之證。有腎虛、有風、有寒、有濕、有痰飲、有氣滯、與有瘀血。有濕熱、有閃挫。凡九種也。若腰痛極甚。而面忽紅忽黑。是為心腎交爭。定難診治。

〔證治〕腰痛悠悠。而虛不舉者。獨活寄生湯。青娥丸。安腎丸。方即胡盧巴補骨脂、川棟肉、川續斷、桃仁、杏仁、茴香、茯苓、山藥等為丸。鹽湯為引也。腰痛屬寒者。得熱即減。宜用五積散。加吳萸、桃仁、杜仲。即安寒濕重着。而痛。用羌活

勝濕湯。即防風通氣湯加附子內實用通經丸。即硫黃、麥麵、牽牛也。有風痛無常掣引足腿。如經虛當用獨活寄生湯。即痊如經實非汗不能解散。用小續命湯。加牛膝、杜仲、穿山甲也。

氣滯閃挫而痛。用通氣散。即木香、陳皮、穿山甲、元胡索、甘草、茴香、白牽牛也。血瘀不移。如錐刺痛。日輕夜重者。用活絡丹治之。

濕熱熱注腰足而痛。用蒼蘚散。即二妙丸加牛膝、杜仲、防己、木瓜、川芎也。腰如物覆。乃濕痰畜積。用煨腎散。即豬腰剖開入川椒食鹽甘遂末。濕紙裹煨熟。用酒同食。有功也。

▲ 小便閉癃遺尿不禁門

【總括】膀胱熱結。輕者為癃。重者為閉。膀胱寒虛。輕者為遺尿。重者為不禁。閉者。即尿閉無點滴下出。故少腹脹滿而痛難伸也。癃者。即淋瀝點滴而出。故莖中澀痛而數。一日數十次。或兼勤出無度。有不知而尿出為遺尿。知而不能。固為不禁。又有石淋、血淋、膏淋、勞淋、氣淋、瘦淋之分別焉。

【遺閉死證】上為嘔噦不入。下為尿閉不通。則為陰陽之氣關格。若出頭汗。則為陽

絕命將傾矣。傷寒狂冒屬陽邪盛。遺尿屬陰不守。故主死。若尿閉脈細濇。知陰已竭。亦不能生也。

【瘡閉熨吐汗三法】陰陽熨脈法。用葱白一斤。細剉入麝香五分。拌勻分二包。置脈上。先以炭火熨斗熨之。半炷香時。換一包。以冷水熨斗熨之。冷熱互相遞熨。待尿自行為度。服諸藥不效。或服藥即時吐出。或服攻下藥不利。宜用宣上法。以木通老葱煎湯。服頃時探吐。再服。再吐。以尿通為度。服諸藥不效。或身無汗。宜用達外法。以葱湯入木桶內。令病人坐於杌上。沒腰為度。匝腰繫裙以覆之。待薰少時。汗出。其尿自通。欲尿時。不可出桶。即在桶內溺之。恐出桶氣收。而尿又回也。

【證治】熱實不化大便硬者。瘡閉也。宜用八正散。加木香治之。即痊。陽虛不化。必多厥冷。惡寒。宜金匱腎氣丸。陰虛不化。必發午熱。而口不渴。用知母、黃蘂、肉桂、服之。名通關丸。氣虛不化。而不急滿。倦怠懶言。宜春澤煎。即五苓散。加人參是也。

滑石、山梔、瞿麥、甘草、車前子、大黃也。

血淋乃心移熱於小腸。若實熱。仍宜下之為良。清熱用小薊飲子。即梔子、朴硝、淡竹

葉當歸、鶴膝節、木通、甘草、地黃也。

膏淋則尿濁或如涕。精潤俱出。宜海金沙散。即滑石、甘草也。熱盛宜八正散加蒼朮。虛者用秋石、茯苓、鹿角霜為丸也。

氣淋肺熱難以清肅。宜加味八正散。即八正散加石葦、木香、冬葵子、沉香也。內傷氣虛不能化者。用五苓散合補中益氣湯。自可通神也。

勞淋者。乃內傷勞脾。用補中益氣湯合五苓散治之。勞腎陽虛。宜金匱腎氣湯治之。陰虛用知藥地黃湯治之。此皆因過淫而成也。思慮勞心。用清心蓮子飲。即蓮子地骨皮、黃芪、黃芩、車前子、麥冬、甘草、人參、茯苓是也。

痰淋宜用七氣湯。青州白丸子。熱燥清熱。宜用滋陰通蘭。凡諸淋宜用平劑琥珀散。即琥珀、木香、冬葵子、萹蓄、木通、滑石、當歸、鬱金是也。

遺尿不禁。及諸淋尿色白者。皆屬虛寒。寒者用桂附地黃湯。虛者用補中益氣湯。俱加白果煎服。凡遺尿不禁。有補之不應。或諸淋尿色赤者。亦有虛熱。用坎離既濟丹。即生地、知母、黃藥、萸肉、五味子、攢合服也。

全大便燥結門

總括熱燥。即陽結能食。而脈浮數有力。與三陽熱證同見者也。寒燥。即陰結不能食。而脈沉遲無力。與三陰寒證同見者也。實燥。即食積熱結。鞭燥與腹滿痛同見者也。虛燥。即食少先鞭後溏。脾虛之燥。與少氣腹縮同見者也。氣燥。即氣道阻隔。不能降下之燥。與噎膈反胃同見者也。血燥。即血液乾枯之燥。與久病老虛同見者也。風燥。即久患風家之燥候。從風家治。直腸結。即燥矢鞭結在肛門難出之燥。導法治之。宜也。

證治熱實脾約。宜三一承氣湯。寒實用備急丹。共溫脾湯。即大黃、乾薑、附子、肉桂、甘草、厚朴也。寒虛用硫半丸。即硫黃半夏也。或握醫藥之虛。燥用補中益氣湯。用朴硝、大黃加入血燥用潤腸丸。與更衣丸。氣燥用四磨湯。與人參利膈丸。風燥用搜風順氣丸。宜也。

證治彙方悉附於后

(本編證治各方共三百五十餘則。除已詳載各門醫語內益將所未載明者。備舉於下。以便查照。讀者細玩之為可。)

桂枝湯

(桂枝芍藥炙甘草生姜大棗。再加葛根名桂枝葛根湯。)

麻黃湯

(麻黃桂枝杏仁甘草。)

柴胡桂枝湯

(柴胡黃芩人參桂枝甘草半夏生姜芍藥大棗。)

大青龍湯

(大青龍湯生姜大棗石膏。)

桂枝麻黃各半湯

(桂枝芍藥生姜甘草大棗麻黃杏仁。)

桂枝二越婢一湯

(桂枝芍藥甘草生姜大棗麻黃石膏。)

十味芎蘇散

(川芎紫蘇葉乾葛柴胡茯苓半夏陳皮枳實桔梗甘草。)

柴胡加桂枝湯

(桂枝黃芩人參甘草芍藥生姜柴胡半夏大棗。)

九味羌活湯

(羌活防風蒼朮細辛白芷黃芩甘草川芎生地黃。)

葛根湯

(葛根麻黃桂枝芍藥甘草生姜大棗。又葛根人參麥冬炙甘草半夏黃芪茯苓白朮亦名葛根湯。)

麻黃附子細辛湯

(麻黃細辛附子。)

調胃承氣湯

(大黃甘草芒硝。)

白虎湯

(知母石膏甘草粳米。再加人參名白虎加人參湯。)

麻黃附子細辛湯

養胃湯

半夏、厚朴、蒼术、橘紅、草藥、藿香葉、茯苓、人參、炙甘草。

五積散

白芷、川芎、炙甘草、茯苓、當歸肉桂、芍藥、桔梗、半夏、陳皮、枳壳、黃乾姜、厚朴、蒼术。

人參敗毒散

羌活、獨活、前胡、柴胡、川芎、枳壳、茯苓、桔梗、羌活、獨活、前胡、柴胡、川芎、桔梗、人參、甘草。

參蘇飲

木香、乾葛、半夏、前胡、人參、茯苓、紫蘇葉、枳壳、桔梗、甘草、陳皮。

十神湯

川芎、甘草、麻黃、乾葛、赤芍藥、紫蘇升麻、白芷、陳皮、香附子。

藿香正氣散

大腹皮、白芷、茯苓、紫蘇莖葉、藿香、厚朴、白朮、陳皮、苦梗、半夏、甘草。

通聖散

防風、川芎、白芍、黃芩、甘草、白朮、芒硝、麻黃、當歸、桔梗、荆芥、滑石、連翹、薄荷、大黃、石膏、山梔。

解肌湯

石膏、麻黃、甘草、升麻。

桂枝加芍藥生姜人參新加湯

桂枝、人參、芍藥、生姜、甘草、大棗。

涼膈散

連翹、甘草、山梔、黃芩、大黃、薄荷、桔梗。

三一承氣湯

甘草、大黃、硝石、枳實、厚朴、生薑。

黃芪湯

人參、生姜、黃芩、茯苓、白朮、白芍藥、甘草。

人參湯

人參、柴胡、芍藥、炙甘草、石膏。又人參湯。

前胡湯

前胡、石膏、甘草。

桔梗、枳殼。

細查病人口下藥

甘草附子湯

甘草、白术、桂枝、附子。

黃芪建中湯

黃芪、芍藥、甘草。

桂枝附子湯

桂枝、附子、生姜、甘草、大棗。

麻仁丸

麻子仁、芍藥、枳實、大黃、厚朴、杏仁為末。煉蜜為丸。

黃連阿膠湯

黃連、阿膠、雞子黃。

酸棗仁湯

酸棗仁、人參、茯苓、桂心、石膏、知母、甘草、生姜。

加味溫膽湯

半夏、枳實、陳皮、甘草、人參、酸棗仁、茯神、桔梗、生姜。

黃連解毒湯

黃連、黃芩、黃柏、黃芩、黃柏、大黃、厚朴。

大承氣湯

大黃、厚朴、枳實。

小承氣湯

大黃、厚朴、枳實。

五苓散

猪苓、澤瀉、茯苓、白术、桂枝。

葛根加半夏湯

葛根、半夏、麻黃、生姜、人參、桂枝、大棗。

赤茯苓湯

赤茯苓、人參、半夏、橘紅、川芎、白术。

小柴胡湯

柴胡、半夏、人參、甘草、黃芩、生姜、大棗。

大柴胡湯

柴胡、半夏、黃芩、芍藥、生姜、大棗、枳實。

柴胡桂枝干姜湯

柴胡、桂枝、牡蠣、乾姜、括萎根、黃芩、甘草。

十棗湯

先花甘遂大戟。和棗十枝煎。

升麻龍甲湯

升麻、當歸、蜀椒、甘草、鱉甲、雄黃。

大黃散

大黃桂皮、木通、桃仁。

陽毒梔子湯

升麻、黃芩、杏仁、石膏、赤芍藥、梔子、知母、大青、甘草、柴胡。

葛根散

葛根、黃芩、大黃、甘草、梔子、朴硝。

黑奴丸

麻黃、大黃、黃芩、釜底煤、梁上塵、芒硝、小麥、奴豆、突厥墨、棗蜜為丸。

桂枝加大黃湯

桂枝、芍藥、甘草、大黃、大棗、生姜。

小建中湯

桂枝、生薑、芍藥、甘草、大棗、膠饴。

茵陳蒿湯

茵陳、大黃、肥梔子。

甘草湯

甘草一味。煎湯服。

吳茱萸湯

吳茱萸、生姜、人參、大棗。

厚朴生姜人參甘草半夏湯

厚朴、生姜、人參、甘草。

麻黃附子甘草湯

麻黃、甘草、附子。

附子湯

附子、白朮、茯苓、芍藥、人參。

四逆湯

附子、甘草、枳實、芍藥、人參。

桔梗湯

桔梗、甘草。又桔梗桑皮甘草。

苦酒湯

半夏、雞子去黃用之。

半夏散

半夏、桂枝、甘草。

乾姜黃連黃芩人參湯

乾姜、黃連、黃芩、人參。

理中湯

人參、乾姜、甘草、白朮。

四逆湯

甘草、乾姜、附子。加倍乾姜名曰通脈四逆湯。

真武湯

茯苓、生姜、芍藥、白朮、附子。

白通湯

葱白、乾姜、附子。

地榆散

地榆、蘆根、梔子、黃芩。

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥、茯苓、白朮、甘草、生姜、大棗。

瓜蒂散

瓜蒂炒黃赤小豆煎稀服。

陽都先生

疫散

桔梗湯

桔梗、甘草。貝母、訶黎勒亦名桔梗湯。

苦酒湯

半夏、雞子去黃用之。

乾姜黃連黃芩人參湯

乾姜、黃連、黃芩、人參。

理中湯

人參、乾姜、甘草、白朮。

四逆湯

甘草、乾姜、附子。加倍乾姜名曰通脈四逆湯。

真武湯

茯苓、生姜、芍藥、白朮、附子。

白通湯

葱白、乾姜、附子。

地榆散

地榆、蘆根、梔子、黃芩。

桂枝去桂加茯苓白朮湯

芍藥、茯苓、白朮、甘草、生姜、大棗。

瓜蒂散

瓜蒂炒黃赤小豆煎稀服。

桔梗子茶

桔梗子、茶末。

烏梅圓

烏梅細辛附子桂枝人參黃芩當歸蜀椒乾姜黃連蜜為丸。

黃芩湯

黃芩芍藥甘草大棗○又加半夏生姜湯○

豬膚湯

豬膚加白蜜白松煎服。

理中安蛇散

人參白朮茯苓乾姜川椒烏梅○

甘草乾姜湯

甘草乾姜○

當歸四逆湯

當歸桂枝芍藥細辛甘草通草大棗○

退陰散

川烏乾姜加益一捻煎服○

還陽散

用硫黃末新汲水調和服○

正陽丹

用整葱陳峰房搗和為丸。握大手心內須臾汗出解開○

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝芍藥生姜厚朴○桂枝杏仁大棗○

茯苓桂枝白朮甘草湯

桂枝茯苓白朮甘草○

炙甘草湯

甘草生姜桂枝人參阿膠生地黃麥冬麻仁大棗○

大陷胸湯

甘遂大黃芒硝○

小陷胸湯

半夏黃連括姜實○

羊肉湯當歸、白芍、牡蠣、生姜、桂枝、龍骨、黑附子、

為末和羊肉熬湯服。並加葱白。

枳實理中丸

枳實、枳苓、人參、白朮、甘草、乾姜、煉蜜為丸。

生姜瀉心湯

生姜、半夏、甘草、人參、黃芩、黃連、乾姜、大棗。

大黃黃連瀉心湯

大黃、黃連、以麻沸湯瀉服之。

梔子乾姜湯

梔子、乾姜。

梔子厚朴湯

梔子、厚朴、枳實。

茯苓四逆湯

茯苓、甘草、乾姜、人參、附子。

小青龍湯

麻黃、芍藥、乾姜、五味子、細辛、桂枝、半夏、甘草。

桔梗半夏湯

桔梗、半夏、橘紅。

橘皮乾姜湯

橘皮、通草、乾姜、桂心、甘草、人參。

茅花湯

用茅花尖一撮濃煎服。

犀角地黃湯

芍藥、牡丹皮、生地、犀角。

抵當湯

水蛭、蟲虫、桃仁、大黃。又以四物。梓為末丸。即名抵當丸。

芍藥甘草附子湯

芍藥附子、炙甘草。

桃核承氣湯

甘草、桂枝、芒硝、大黃。

竹葉石膏湯

竹葉、石膏、半夏、人參、甘草、粳米、麥門冬。

六君子湯

人參、白朮、炙草、半夏、陳皮、茯苓、山藥、甘草。

三黃石膏湯

石膏、黃芩、黃連、黃連、黃芩、山梔、香附、麻黃、甘草。

升麻葛根湯

升麻、芍藥、甘草、乾葛、生姜。

梔子升麻湯

梔子、升麻、柴胡、生地黃、石膏。

萎蕤湯

葛根、白芷、麻黃、杏仁、甘草、石膏、羌活、川芎、青木香、姜蕤。

漢防已湯

防己、甘草、黃芪、人參、生姜、白朮。

桔梗根湯

石膏、人參、乾葛、防風、知母、甘草、桔梗根。

黃芪解肌湯

人參、黃芪、當歸、川芎、甘草、芍藥。

六合湯

即以四物湯為本，再加二味為六合。如加麻黃、細辛為表實六合湯。加防風、蒼朮為風濕六合。加柴胡、黃芩為柴胡六合。加大黃、桃仁為大黃六合。諸方。

類推。

表虛六合湯

即四物湯、桂枝、地骨皮。

四物湯

熟地、當歸、川芎、芍藥。

地歸芍芍

草金元。

小兒方多
出沒。

白术散

白术、黃芩、加生姜、大棗。

惺惺散

桔梗細辛、人參白术、甘草、川芎、小兒多由方改出。

大青膏方

天竺、黃烏梢、蛇肉、蜜和成膏。

八正散

扁蓄、大黃、滑石、木通、赤苓、車前、大黃、山梔加灯芯。

四君子湯

人參、炙甘草、茯苓、白术。

補中益氣湯

人參、炒黃芪、炒白术、甘草、陳皮、當歸、升麻、柴胡、加姜棗。

梔子豉湯

梔子、生姜、豉、名曰梔子生姜豉湯。

川芎湯

川芎、蒼朮、羌活。

桂枝去芍藥湯

桂枝、生姜、甘草、大棗、照此方加附子。名桂枝去芍藥加附子湯。

四逆加人參湯

人參、乾姜、甘草、附子。

燒梔散

取婦人根、近陰處、剪燒灰、以水和服。婦人病、用男子根、燒灰。

人參養榮湯

人參、白术、茯苓、甘草、黃芪、陳皮、當歸、熟地、白芍、桂心、遠志、五味子、加姜棗。

桂枝加附子湯

桂枝、附子、甘草、生姜、大棗。

小兒方化

桂枝加桔梗湯

桔梗、桂枝、芍藥、甘草、生姜、大棗、如去桔梗、加葛根、名桂枝加葛根湯。

豬苓湯

豬苓、茯苓、阿膠、滑石、澤泻加阿膠。

桃仁承氣湯

桃仁、桂枝、大黃、芒硝、甘草。

神木散

甘草、蒼术、防風。

木附湯

白术、附子、蒼术、陳皮、厚朴、半夏、茯苓、豬苓、澤泻肉桂。

茱萸湯

吳茱萸、人參、生姜、大棗。

小柴胡加梔子湯

以小柴胡湯加梔子一味。又小柴胡湯內去人參一味。加芍白芍亦為一方。

三黃湯

黃芩、黃連。

升麻湯

升麻、玄参、甘草。

人參羌活散

羌活、獨活、紫朮、人參、川芎、地骨皮、前胡、枳壳、甘草、茯苓、桔梗、天麻。

芍藥甘草湯

芍藥、生地黃、甘草、川芎。

乾姜柴胡湯

柴胡、桔梗根、桂枝、牡蠣、甘草、乾姜。

調氣平胃散

厚朴、陳皮、木香、烏藥砂仁、白豆蔻、白檀香、蒼木、藿香、甘草加姜片。

犀角地黃湯

犀角、生地、丹皮。

礞石滾痰丸

礞石、沉香、黃芩、大黃為末。

此方更妙

華東立近草之甘桔二

溫膽湯 陳皮、法夏、茯苓、枳實、甘草、竹茹。

生脉散 人參、麥冬、五味子。

人參白虎湯

人參、石膏、知母、甘草、粳米。

蒼木白虎湯

蒼木、石膏、粳米、甘草。

八珍湯

人參、茯苓、白术、炙草、熟地、當歸、川芎、芍藥、四君子湯。

大秦艽湯

當歸、芍藥、生地、白术、川芎、甘草、茯苓、防風、白芷、羌活、黃芩、石膏、細辛、秦艽。

小續命湯

麻黃、杏仁、官桂、防風、附子、或加姜棗。

三化湯

大黃、枳實、厚朴、羌活。

牛黃清心丸

牛黃、珍珠、硃砂、麝香、龍骨、犀黃、琥珀、天冬、人參、麥冬、茯苓、水銀、防風、黃芩、知母、龍胆草、石菖蒲、白芍、全蝎、甘草、蜂房、金銀箔、煉蜜為丸。

參附湯

人參、麥冬。

防風通聖散

防風、芒硝、連翹、川芎、麻黃、下荷、白芍、當歸、大黃、黃芩、桔梗、石膏、甘草、荆芥、山梔、白术、滑石、加生姜、葱白。

生脉補精湯

人參、麥冬、五味子。

羌活愈風湯

當歸、白芍、生地、白术、川芎、甘草、茯苓、防風、白芷、羌活、黃芩、秦艽、石膏、細辛、厚朴、杞子、地骨皮。

半夏、厚朴、杞子。

春澤煎即以五苓散加人參。

清熱化痰湯人參、茯苓、白术、災草、半夏、陳皮、麥冬、黃芩、黃連、菖蒲、枳壳、竹茹、南星、木香。

胃苓湯陳皮、厚朴、甘草、蒼朮、白术、茯苓、澤瀉、猪苓肉、桂加生姜乾棗。

五苓散豬苓、茯苓、白术、桂。

澤瀉官桂。

蘇合丸麝香、沉香、丁香、香附、檀香、華苓、白术、訶子、硃砂、犀角、葛根、大黃、白附、羌活、獨活、連呂、黃藥、姜、蜜。

參蘇飲人參、蘇葉、乾葛、前胡、陳皮、枳壳、半夏。

全大補湯人參、白术、茯苓、甘草、當歸、川芎、熟地、芍藥、黃芪、肉桂。

祛風至寶丹羌活、黃芩、災草、菖蒲、蒼朮、防風、白术、澤瀉、歸身。

當歸拈痛湯羌活、黃芩、災草、菖蒲、蒼朮、防風通聖散。再加全蝎、天麻、細辛。

平胃散蒼朮、陳皮、厚朴、甘草。

參芽砂仁加姜。

涼膈散生地、丹皮、黃連、當歸。

升麻石膏加燈芯。

歸脾湯當歸、木香、災草、龍眼肉、加姜棗。

逍遙散當歸、白芍、柴胡、茯苓、白术、甘草、加卜荷。

大黃安神已丸

大黃安神已丸

大黃安神已丸

大黃安神已丸

金匱腎氣丸

熟地、山萸肉、茯苓、丹皮、澤瀉、附子。

五積散

當歸、麻黃、蒼朮、陳皮、厚朴、乾姜、芍藥、枳壳、半夏、白芷、桔梗、炙草、茯苓、肉桂、人參、川芎、加姜葱。

四苓湯

茯苓、白朮、猪苓、澤瀉、加炮芯。

二陳湯

陳皮製半夏、茯苓、杏仁、甘草。

茶調散

木薑汁服。

參苓白朮散

人參、白朮、茯苓、山藥、甘草、蓮肉、苡仁、米仁、砂仁、桔梗、陳皮、加姜棗。

瀉心湯

大黃、黃連、黃芩、又名三黃瀉心湯。

珍珠散

珍珠、青黛、輕粉。又珍珠參冬至黃牛黃、黃連、甘草、羚羊角、大黃、當歸、砂金第、雄黃、茯神屑角為末調服。亦名珍珠散。

珠砂安神丸

硃砂、黃連、生地、當歸、甘草、蒸餅糊為丸。

保元湯

黃芪、人參、甘草、肉桂。

清燥湯

人參、黃芪、甘草、白朮、當歸、陳皮、升麻、黃藥、五味子、澤瀉、麥冬、蒼朮、神曲、生地、豬苓、茯苓、柴胡、黃連。

人參利膈丸

大黃、厚朴、枳實、人參、甘草、木香、當歸、薑香、桃仁、枳榔、麻仁、蜜為丸。

鴉鳴丹

以鴉片少許和飯為丸。

如意勝金錠

硫黃、川芎、臘茶、火硝、下荷、生川烏、生地黃為末。用葱自然汁為錠。

資生丸

入參、茯苓、雲木、山藥、薏苡仁、蓮肉、芡實、甘草、陳皮、麥蘖白、豆蔻、

神曲、桔梗、川黃連、白扁豆、山楂、藿香、砂仁、為細末，煉蜜為丸。

虎潛丸

龜板、黃蘖、知母、熟地、牛膝、芍藥、銷陽、虎骨、當歸、陳皮、為末，搗羊肉為丸。

蜜陀僧散

以蜜陀僧為末，用冷燒酒和調，西南服之。

調中益氣湯

黃芪、人參、甘草、肉桂、升麻、柴胡、蒼朮、橘皮、黃蘖，或去黃蘖加木香。

麻桂各半湯

桂枝、芍藥、生姜、甘草、麻黃、大棗、杏仁。

青蛾丸

核桃仁、杜仲。

辰砂益元散

辰砂、滑石、甘草、姜、炒、恐湯、調下。

倉廩湯

人參、桔梗、獨活、桔梗、前胡、川芎、甘草、枳壳、柴胡、羌活、倉米。

四獸飲

即附子理中湯，再加烏梅、草果、烏梅、生姜。

八柱散

即附子理中湯，再加烏梅、瞿寧、東亮、訶子、肉蔻。

梔子金花湯

梔子、黃芩、黃連。

黑鉛丹

黑鉛、硫黃、補骨脂、小茴香、葫蘆巴、肉蔻、附子、肉桂、木香、金櫻子、沉香、陽起石、巴戟。

瓜蔞湯

石膏、人參、乾葛、防風、知母、甘草、桔梗、蔓根。

華茂散

華茂、良姜。

參胡三白湯

人參、柴胡、白朮、白芍、黃芩、黃苓、大棗、生姜。

龍胆草一物湯

龍胆草。

大黃黃連湯

大黃、黃連。

洗刀散

防風、石膏、滑石、歸尾、赤芍、羌活、荆芥、黃芩、連翹、川芎、桂枝、麻黃、白朮、草決明。

大黃、甘草、芒硝、獨活、元參、木賊、菊花、蒺藜、蟬退薄荷、梔子、蔓荆、細辛、清茶葉。

牛黃通膈丸

黑牽牛、白牽牛、牛膽星、枳實、半夏、牙皂、大黃、煉蜜為丸。

保和丸

南山查、神曲、茯苓、半夏、連翹、陳皮、萊菔子、麵糊為丸。

知蘖地黃湯

乾生地黃、山萸肉、山藥、知母、牡丹皮、澤瀉、茯苓、黃蘖。

香蘇飲

蘇葉、香附、甘草、陳皮、連翹、葱。

蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

蜀漆、甘草、龍骨、牡蠣、桂枝、姜棗。

桂枝乾薑湯

桂枝、附子、甘草、乾姜。

備急丹

大黃、乾姜、巴豆。

柴胡湯

柴胡、黃芩、甘草、芍藥、人參、半夏、生姜、大棗。

茵陳湯加附子甘草

茵陳、大黃、梔子、甘草、附子。

黃芩梔子湯

黃芩、梔子、連翹、芍藥、甘草。

白虎

中若邪
扶安方

梔子湯

梔子、杏仁、黃芩、知母、甘草。

茵陳湯

茵陳、大黃、肥梔子。

香茹飲

香茹、厚朴、白扁豆。

四磨飲

枳實、橘皮、沉香、烏藥。

雄黃丸

雄黃、當歸、蘆薈、麝香、柏榔、麴糊為丸。

柴胡桂枝湯

桂枝、黃芩、人參、甘草、芍藥、柴胡、半夏、生姜、大棗。

黃芩甘草湯

黃芩、芍藥、甘草、連翹、大棗。

桂枝茯苓白朮湯

桂枝、白朮、甘草、茯苓。

保和丸

茯苓、半夏、楂肉、神曲、陳皮、連翹、蘿蔔子為末。粥為丸。

七氣湯

山楂、莪朶、青皮、陳皮、木香、藿香、肉桂、桔梗、甘草。

流氣飲

當歸、白朮、人參、黃芪、川芎、防風、白芷、蘇葉、枳壳、桔梗、甘草、換擣、烏藥、厚朴、官桂、木通、膚木香。

通關散

半夏、皂角、卜半下荷。

二妙丸

蒼朮、黃柏、麴為丸。

桃仁煎

桃仁、大黃、蟲、朴硝。

桂枝

蘇葉

砂仁

二妙丸

桂枝

潤腸丸 當歸、生地、枳壳、桃仁。

當歸龍鬚丸

當歸、黃連、黃芩、大黃、蘆薈、麝香、青黛。

更衣丸

酒少許為丸。

活絡丹

或加五靈脂、麝香、更好。

左金丸

黃連、吳茱萸。

蘇子降氣湯

炒蘇子、當歸、陳皮、製夏、甘草、前胡、厚朴、桂心、沉香、加姜、棗。

七味人參白朮散

人參、白朮、茯苓、甘草、藿香、木香、乾菖。

左龍丸

野鴨、江鱥、殭蚕、雄黃、蜈蚣、天麻、硃砂、巴豆霜為丸。

溫白丸

即萬病紫苑丸方。倍川烏。

六一散

飛滑石、甘草。

神佑丸

黑牽牛、大黃、甘遂、大戟、芫花、青皮、橘紅、木香、枳榔、輕粉為丸。

搜風順氣丸

大黃、草前、山黃肉、山藥、牛膝、菟絲子、獨活、麻仁、枳榔、枳壳、李仁羌活、煉蜜為丸。

冰硼散

冰片、元明粉、硃砂、冰砂。

奔豚湯

甘草、川芎、當歸、半夏、黃芩、主葛。

升麻黃芩湯

升麻、葛根、黃芩、芍藥、生草。

升麻解肌湯

葛根、麻黃、黃芩、芍藥、桂心、甘草加棗。

紫苑散

紫苑、天門冬、貝母、桔梗、生乾地黃、百合、知母。

茯神散

茯神、黃芪、菖蒲、人參、白芍藥遠志加棗。

大羌活湯

防風、羌活、獨活、防己、黃芩、黃連、蒼朮、白术、甘草、細辛、知母、川芎、生地黃。

匀氣散

以川烏為末。用黑豆砂、魏同泡服。

導赤散

生地、木通、甘草梢。

辰砂益元散

滑石、辰砂、甘草。

柴胡石膏湯

柴胡、石膏、葛根、黃芩、桑皮、荆芥穗、乾葛、芍藥、黃芪、秦艽、黃芩、枳壳。

乾薑散

以乾姜一味。沸湯調服。

柴胡湯

柴胡、赤芍、黃芩、甘草、葛根、龍甲、甘草、人參。

枳實梔子豉湯

枳實、梔子、豉。

薏苡附子散

薏苡仁、附子。

竹葉黃芪湯

淡竹葉、生地黃、黃芪、麥冬、當歸、川芎、甘草、芍藥、人參、半夏、石膏。

大附子。

龍胆泻肝丸

水解散

大黃、白芍、甘草、桂心、麻黃。

瓊玉膏

生地、黃芩、白芍、荳蔻、人參。

滋腎丸

黃桂、知母、肉桂。

括薑瞿麥丸

括薑根、瞿麥、茯苓、薯蕷、附子、煉蜜為丸。

清暑益氣湯

入參、黃芪、甘草、白朮、神曲、五味子、青皮、升麻、葛根、冬黃藥、澤瀉、橘皮、蒼朮、當歸加姜棗。

後方略

時方不能解用。是其愚也。

桂枝湯以治陽。著有變化症狀。

鴻達吸時研究。后沙畫舍于巧秋多是也。

陰虛火動

喉嚨癰腫

仲賓先生電鑒

中華民國十七年七月出版

傷寒指南
(全一冊)

▲定價大洋三角五分

板權所有不准翻印

編纂者

臨海葉隱衡

校閱者

廣益書局

印刷者

廣益書局

總發行所

廣益書局

上海棋盤街

分發行所

廣東
北京
永漢北路
楊梅竹斜街
長沙
南昌
府學前
半邊街
開封
書店街

廣益書局

青箱子
44次

毛仲賓著

天外奇書

古鏡照神

照神絕底山

古鏡照神且

欲知心內事

天下無難事 唯怕

天下無難事 唯怕

莫測

书 号 _____

登记号 _____

上纸出品47—45

莫测