



醫 編 卷 六 集 雜

濟世全書

產後	求嗣	虛勞	婦科	健忘	癩疾	眩暈
乳病	妊娠	崩漏	調經	驚悸	狂疾	麻木
婦人雜病	產育	帶下	經閉	不寐	五癩	瘧病

試  
308  
6



新刊醫林狀元濟世全書卷之六

附錄

大醫院吏目金路雲林羅廷賢子才編纂 分守 定國 手書

黃信有同知涪州灼無勝 直 校正

門人德裕用生羅嗣製 臨川黃 卷

南陽指便王貴卿 同邑用廷 卷

人委王有年 傅德奇

信陽吳廷芳 陶本守

陳道萬果秋 劉思誠合校

洪都孔慶

全書書以...



武  
908  
卷  
6

新刊醫林狀元濟世全書卷之六

離集

大醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著 男守國 定國 寧國 安國 手錄

廣信府同知涪州灼無陳 直 校正

門人慈谿庠生羅國望 臨川黃 卷

南陽指揮王貴卿 同邑胡廷訓

大梁王有年 傳鍾奇

信陽吳至善 陶本宇

豫章萬果初 劉思岐全校

洪都龔鼓昇

金陵書坊萬卷樓存義堂如泉周文耀刊行

眩暈

夫眩者言其黑暈者言其轉無痰不能作眩此痰在上火在下火炎上而動其痰經云諸風眩暈皆屬肝木風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也又或七情鬱而生痰痰因火動隨氣上厥此七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此氣虛而眩暈也吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣故使諸血失道妄行此血虛眩暈也左手脉數熱多脉瀦而有力為蛇血右手脉實有痰積脉大是久病為氣血俱虛痰濁不降也  
半夏白朮天麻湯 治眩暈眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中痰厥頭痛身重如山四肢厥冷不得安臥此乃胃氣虛損停痰而致也

陳皮 半夏 姜炒 麥芽 炒各七  
白朮 神麩 炒各五分 黃芪

人參 白茯苓 蒼朮 大麻 澤瀉 各三分

乾姜 炒二分 黃柏 酒炒一分 右剉一劑水煎食前可一服而愈

○按右方治氣虛濕痰眩暈之劑

清暈化痰湯 主方 治眩暈之總劑也

陳皮 錢半 半夏 一錢 南星 姜炒六分 天芩 一錢 枳實 錢炒一分 黃芩 酒炒八分

川芎 八分 白芷 七分 羌活 七分 防風 大分 細辛 六分 甘草 三分

氣虛加入人參 七分 白朮 錢 血虛加當歸 倍 川芎 ○有熱加黃連

六分 右剉散生姜三片水煎服以此方作丸為末稀糊為丸梧桐子大

每七十丸姜湯送下

祛風豁痰湯 治肥人日常頭眩眼昏卒時暈倒者名曰痰暈

天麻 半夏 南星 蒼朮 川芎 陳皮  
 茯苓 桔梗 枳壳 烏藥 酒芩 羌活  
 竹瀝 姜汁

○按右方治風痰眩暈之劑

姜附湯 治一時為寒所中口不能言眩暈欲倒

乾姜 一兩 大附子 生去皮 脂一枚

右為末每到三錢水煎溫服

○按右方治虛寒眩暈之劑

芎歸湯 治一切失血過多眩暈不甦

川芎 當歸 ○虛甚加大附子 剉散水煎服

○按右方治血虛眩暈之劑

清陽除眩湯 治氣一虛痰火炎上以作眩暈

人參 六分 白朮 一錢 茯苓 一錢 陳皮 一錢 半夏 一錢 天麻 八分

旋伏花 八分 枳櫛 八分 甘草 四分 生姜 三片 煎服

○按右方治氣虛眩暈之劑

清火化痰湯 治有痰有火而作眩暈者

法製半夏 一錢 赤茯苓 錢 甘草 五分 黃芩 酒洗 七分 黃柏 酒炒 七分

知母 七分 石羔 一錢 白朮 一錢 薄荷 五分 川芎 五分

黃連 五分 橘紅 一錢 右到一服 生姜 三片 臨臥服

○按右方清火化痰除眩暈之劑

一婦人素頭暈不時而作月經足而少此中氣虛弱不能上升而頭暈

不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞作地月經如湧此等

傷火動用前湯加五味子一劑而愈前症雖云氣無所附實因脾氣

虧損耳

一男婦氣血虛弱而作眩暈者十全大補湯加陳皮半夏天麻

清暈豁痰丸

安節吳大巡方清頭目止眩暈扶元氣健脾胃清火化痰

頑痰能化結痰能開風痰能祛濕痰能除清三焦火邪治一切痰證

嫩黃芪蜜水炒一兩 人參一兩 白朮去蘆米泔二兩 白茯苓去皮二兩 陳皮去白二兩

半夏姜礬牙皂同四兩 膽星四兩 枳實炒一兩 海石火煨二兩

天花粉二兩 枯黃芩去朽酒二兩 川黃柏去皮酒炒一兩

知母酒炒二兩 當歸身酒洗四兩 天麻火煨三兩 防風去蘆二兩

白附子煨二兩 甘草生三兩 錦紋大黃酒拌蒸九次要蒸如墨方可五兩

右為細末神麴二兩打稀糊為丸如梧子大每服七八十九茶小

任下

麻木

夫麻木者風濕熱下陷入血分陰中陽道不行亦有痰在血分者其症

自合則渾身麻木痺者血不榮肌膜手麻木胸中有濕痰死血是也

治當活法庶無誤矣一云麻是氣虛木是濕痰死血

加味八仙湯手方治手足麻木或疼痛

當歸酒浸川芎七分 白芍酒炒熟地黃酒蒸人參六分 白朮去蘆

白茯苓去皮一錢 陳皮八分 半夏麴七分 桂枝三分 柴胡四分

羌活五分 防風五分 秦艽六分 牛膝去蘆酒洗 甘草炙四分

劉作一劑姜棗煎食遠溫服

○按右方治氣血兩虛麻木之劑

參芪益氣湯 治兩手十指麻木四肢困倦怠墮嗜睡乃熱傷元氣也

黃芪蜜炒八錢 人參五錢 白芍酒炒三錢 柴胡二錢 升麻二錢 五味子一百四

炙甘草一錢 生甘草五錢 水煎稍熱空心服

○按右方治氣虛麻木之劑

除濕補氣湯

治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山

語聲不出右寸脉洪大

黃芪蜜炒三錢 當歸二錢 蒼朮泔制四錢 陳皮五錢 藁本二錢 柴胡三錢

升麻酒炒二錢 知母酒炒二錢 五味一錢 生甘草二錢

右剉每一兩水煎空心服待少時以早飯壓之

○按右方除濕補氣治麻木之劑

開結舒經湯 治婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺

紫蘇 陳皮 香附 台烏 川芎 蒼朮

羌活 南星 半夏 當歸各八分 桂枝四分 甘草四分

右剉生姜煎入竹瀝姜汁服

○按右方順氣化痰除麻木之劑

治十指盡麻并面自皆麻此氣虛也以補中益氣湯加木香附子麥門

羌活防風烏藥酒

○按右方治內傷麻木之劑

治感風寒濕氣手膊或痛或木或遍身麻木用五積散主之

○按右方治虛人感寒麻木之劑

止麻消痰飲 治口苦麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩

根花惡心並遍身麻木 黃連 半夏 瓜蒌仁 黃芩 茯苓 桔梗

陳皮 天麻 細辛 南星 甘草

血虛加當歸 氣虛加參 亦有十指麻木胃中濕痰死血加二

木少加熟附子行經中死血者四物湯加桃仁紅花韭汁忌生冷

飲鱈魚腥發風發熱之物

治面上木處用

桂枝為末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分  
治脚底硬木處用

牛皮膠十斤化入生姜汁調和仍入南星末五錢和勻用厚紙攤貼  
二三分乘半熱裹貼脚底上用温火烘之  
驅風豁痰湯 治手足頑麻及口眼喎斜

蒼朮一兩 陳皮三兩 南星一兩 半夏二兩 白茯苓二兩 防風一兩  
羌活六錢 天麻三兩 白姜蚕一兩 大川烏六錢 麩裹煨 粉草六錢

右剉生姜三片水煎臨服入姜汁三匙温服  
治婦人遍身麻痺謂之不仁皆因血氣受風濕所致用祛風散送下五  
補丸

祛風散  
生川烏 白朮 白芷各三錢 甘草二錢 為末調酒吞下五補丸

五補丸

黃芪一兩 人參五錢 大附子一錢 當歸三錢 白芍五錢

為末煉蜜丸梧子大每二十九丸用祛風散送下

不仁者謂不柔和也痛痒不知針火不知是也經曰諸虛乘寒而鬱冒  
不仁蓋其血氣虛弱不能週流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢  
躄頑麻不知痛痒寒過厥如死屍而變且冒也用桂麻各半湯不愈  
者補中益氣湯入姜汁設或身汗如油喘不休喘而直視水漿不入  
者此為命絕也

瘧病

原來瘧病屬脾胃口噤如癰身反張此是傷風感寒濕故分兩証有柔  
剛無汗為剛須易識有汗為柔見的端二証皆宜續命飲剛瘧去桂

用麻黃桑葉去麻當用桂只依此法最為良

小續命湯

麻黃去節 人參 黃芩酒炒 白芍酒炒 川芎酒洗 防已

杏仁去皮 桂枝 甘草各一錢 防風 大附子炮去皮臍

如聖飲 治剛柔二瘧口噤身反張手足掣搐頭面赤項強急與瘧疾

同治法

柴胡 黃芩 半夏 赤芍 川芎 白芷

當歸 羌活 防風 烏藥 甘草

有汗是柔瘧加白朮桂枝○無汗是剛瘧加麻黃蒼朮○口噤咬牙大便實加大黃利之

凡瘧病有出汗多變瘧有因去血過多元氣虧損或外邪相搏以致牙關緊急四肢痠強或陰火內動或腰背反張肢躄搐搦者有汗而不

惡寒者曰柔瘧若無汗而惡寒者曰剛瘧由去血過多筋無所養故傷寒汗下過多潰瘍膿血太泄多傷之乃敗症也急以十全大補湯治之如不應急加附子多有攻麤者

○狂言辨

狂言者大口開與人語語所未常見之事即狂言也

○謔語辨

謔語者合目自言言所用常行常見之事即謔語也

○鄭聲辨

鄭聲者聲戰無力不相接續造次出于喉中也

癩疾

夫癩脈搏大滑者生 沉小緊急不治 癩脈虛可治 實則死

夫癲者喜笑不常而癲倒錯亂之謂也故心熱其則多喜而為癲也癲  
為心血不足多為求望高遠不遂其志者有之治以安神養血兼降  
痰火又曰癲者精神不守言語錯亂妄見妄言登高罵詈是也  
防風通聖散 治一切大風癲狂之疾依本方加生地桃仁牡丹皮  
清心化痰湯 治一切癲疾

牛胆南星 大半夏 泡 陳皮 茯苓 黃連姜炒  
當歸 酒炒 生地黃 川芎 人參 酸棗仁炒  
石菖蒲 錢 甘草 二分 生薑五片水煎服

白金丸 治癲狂失心  
白礬 三兩 鬱金 七兩 為末水糊丸梧子大每五六十九溫湯下  
抱膽丸 治一切癲癘風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚  
氣入心產婦女經脈通皆驚邪纏結並効

水銀 二錢 鉛 一錢 朱砂 一錢 乳香 一錢

右將鉛入銚子內與水銀結成砂子以下朱乳乘熱用柳木棍研勻  
丸如芡實大每一丸空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即  
安再一丸除根一方用薄荷湯化下

黃白丹 治五癲五癘風症 用黃丹白礬各一用礮鑿一窩可容二  
兩許安丹在下礬在上用木炭五升煨令炭盡取為末以不經水猪  
心血為丸如菉豆大每二三十九橘皮湯下

一婦人患癲疾歌唱無時踰垣上屋乃營血迷於心也所致  
逍遙散加杭仁遠智紅花蘇木生芫有熱者加小柴胡湯加生地黃  
辰砂

琥珀定志丸 專補心生血定寃安寃扶肝壯膽管轄所畜驚戰虛弱  
氣乏之疾並皆治之

南星 半斤 先將地作坑用炭十斤在坑內燒紅去灰淨用好酒  
十餘斤傾在坑內即入南星在內上用如坑口大瓦盆蓋覆周圍  
以炭火擁定勿令泄氣以日取出為末

琥珀 一兩 皂角 二兩 公猪心 剖開入內用 乾人乳 二兩 用姜  
水洗去油 朱砂 二兩 懸胎 煮酒 二碗 乾人乳 二兩 用姜

人參 三兩 白茯苓 三兩 石菖蒲 猪胆 汁 遠志 水 泡 去 心 猪  
再用姜 白茯神 去皮木 三兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每夜臥時鹽湯送下

晒乾人乳法 用入乳汁數碗入瓦盤內莫攪動四圍晒乾則再括乳乾以姜汁拌晒用

# 狂疾

狂脈實大生 沉小絕

夫狂者任亂而無正定也故肝熱甚則多怒而為狂也任為痰火實盛  
治內下之及狂之始發少臥少食自賢自貴妄笑妄空而歌棄

衣石勻定也此皆實症宜瀉而不宜補宜大黃湯治之一法痰厥丸

大黃湯 治癲狂熱病  
大黃 四兩 酒 水 三升 煎之 分三服

清心滾痰丸 治癲癩驚狂一切怪症神効  
朱大黃 酒 蒸 四兩 青蒙石 確 碾 五錢 沉香 二錢 牙皂 五錢 犀角 五錢

射香 五分 朱砂 五錢  
右為末水丸朱砂為衣每三四十九滾水下

苦參丸 治發狂無時披頭大目欲殺人避水火  
苦參為末蜜丸梧子大每服二十九薄荷湯送下

治狂言鬼語用蝦蟆一个燒存性為末酒調服

治氣心風即是痰迷心竅發狂亂作用

花蓋石煨酒淬一次為末每一錢黃酒

治心恙狂惑用無灰酒二碗真麻油四兩共和勻楊抄二十條逐一條  
撓二十下換遍楊枝直候油酒相和如膏煎至七分狂者強灌令  
熟睡或吐或不吐覺來即省

雄朱丸 治因驚憂失心或思過多氣結不散積成痰涎留空心色室  
塞心竅以致狂言妄語叫呼奔走不避親疎

朱砂加塊者二錢半 雄黃明淨者 白附子一錢

右和勻以猪心血和丸如梧子大另用朱砂為衣每服三丸用人  
參薑蒲煎湯下常服一粒能安寃定鬼補心益腎

癩病丁月數發者易治周年一發者難治

### 五癩

天癩者發則仆地悶亂無知嚼舌吐沫背反張目上視手足搐搦或作

六畜聲者是也亦因金衰木旺生風外由驚邪入內以致之經曰風  
盛則動正謂此也治法當先以瓜蒂散吐之頑涎既盡以通聖散下  
之再服朱砂安神丸清心鎮墜之劑而後調理之又滾痰丸下之亦

瓜蒂散 治癩狂不止得之驚憂極者

甜瓜蒂不拘多少為末每服一錢井水和一盞投之即大吐如吐  
不止煎葱白湯煎三五口立解吐後熟睡勿令驚起即効

治人病癩神志不寧時發狂燥多言好怒面容不澤

生地黄姜焙 橘紅 貝母 茯苓 黃連 甘草  
遠志甘草水 石菖蒲 酸棗仁炒 枳實 瓜蒌仁 天花粉  
生姜煎服

牛黃化痰丸 祛風清火豁痰理氣開心定志安神鎮驚一切癩癩

仲之疾

牛黃 五分 朱砂 六錢 雄黃 一錢 天竺黃 一錢 膽星 一兩

青蒙石 一兩 火礞 一兩 人傾銀 烏犀角 一錢 沉香 一錢 二

石菖蒲 去毛 一兩 姜蚕 姜汁 蟬退 去足 五錢 天麻 姜汁 炒

黃芩 二兩 大黃 酒浸 九蒸 九曬 猪心血 二斤

右為細末竹瀝打稀糊入猪心血同和為丸如菘豆大每六十九

空心臨臥薄荷湯下忌驚恐怒氣

治驚癇 白礞 一兩 半生半枯 荆芥穗 二兩 為末 麩糊 七 黍米 大朱砂

為衣 每服二十九姜湯送下

寧神丹 祛風化痰寧心定智清熱降火補養氣血不時潮作者可服

久服此藥者拔去病根永不復發

人參 五錢 白朮 去蘆 炒 白茯苓 去皮 水 當歸身 酒洗 一兩 川芎 三錢

懷生地黃 一兩 南星 兩 半夏 兩 陳皮 二錢 遠志 甘草水 泡 去

麥門冬 五錢 黃連 姜汁 炒 黃芩 三錢 石羔 兩 荆芥 五錢

獨活 五錢 天麻 七錢 白附子 三錢 犀角 五錢 辰砂 五錢 另研

湖珍珠 三錢 牛黃 三錢 姜蚕 五錢 甘草 三錢 酸棗仁 炒 五錢

千金金箔 三十片

右為細末酒打稀糊為丸如梧子大每服五十九空心白湯下

追風祛痰丸 治諸風癱暗風

防風 天麻 姜蚕 炒 去 白附子 煨 各 兩 全蝎 去毒 木香 各 半

猪牙皂角 炒 一兩 白礞 兩 半夏 湯 炮 七 次 研 為 末 稱 六 兩 分

麵 一分 用 生 姜 汁 南星 三兩 剉 一 半 白礞 水 浸 一 宿 朱砂 研 為 衣

右為細末姜汁糊為丸如梧子大每七八十九食遠臨臥淡姜湯

下薄荷湯亦可○虛弱加入人參白朮茯苓當歸川芎桔梗枳實各

一兩久服奏効

治遠年近日風癩心志風狂中風涎潮牙關不開破傷風搐者

皂角不蛀肥者一斤半去皮弦切碎以酸漿水一碗浸春秋三四日夏一二日冬七日濾去渣將汁入銀石器慢火熬以槐柳枝攪成膏取出厚紙上陰乾收貯用時取手掌大一片以溫漿化在盞內用竹筒灌入病人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止服溫鹽湯二口便止忌魚生冷濕麵之物

千金保命丹

治諸風癱瘓不能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩暈

腦中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤心氣不足神志不寧驚恐憂悸虛煩以睡或發癲狂小兒驚癇風搐大人暗風羊癲風癩發時如雷

朱砂二錢 珍珠一錢 膽星三錢 甘草 麻黃去根 白附子炮  
雄黃 薄荷各錢五分 防風 琥珀 金箔 牛黃各一錢

姜蚕炒

犀角鎊

麥門冬去心

桔梗

地骨皮

神麩炒

茯神去木

人參

白木

遠志去心

甘草水泡

柴胡三錢

天麻二錢

膽礬一分

水片少許

黃芩七錢

射香少許

柴河車七錢

天竺黃錢

荆芥七錢

蟬退一分

川芎

牙皂各一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯研化服不拘時候忌猪羊肉核桃動風之物此藥丸用蠟包尤好藏久

# 健忘

夫健忘者徒然而忘過也症由憂思過度損其心胞以神宮不職意在不清遇事多忘然過思傷脾亦能令人健忘蓋脾王意與思心亦主思思憂過度使入健忘法當理心脾則神寤意定其症自除丹溪曰健忘者有始無終言談不知首尾此係為病之名非比生成愚頑不

知世事大抵由精神短少亦有痰者

歸脾湯主方治思慮傷脾不能攝血致血妄行或吐或下或健忘怔忡  
驚悸不寐發熱盜汗或心脾傷痛嗜臥少食大便不調或血虛發熱  
或肢體重痛婦人月經不調赤白帶下或晡熱內熱或癰癩流注不  
能消散潰斂或思慮傷脾而作瘡痢加柴胡梔子名加味歸脾湯  
神不寧而健忘倍加酸棗茯苓神當歸加栝子仁

黃芪蜜水 人參 白朮去油 白茯苓 當歸酒洗 龍眼肉  
遠志甘草水泡 酸棗仁炒各二錢 木香 鐵甘草炙五分

右劉安棗煎服

加減補心湯 治諸虛健忘等症

人參 三錢 白朮 三錢 白茯苓 五錢 陳皮 五錢 當歸 五錢 白芍 五錢  
生地黃 酒洗五錢 遠志 甘草水洗去心 石菖蒲 酒洗三五錢 麥門冬 五錢

酸棗仁炒 黃柏酒炒 知母酒炒 甘草 三錢 水煎溫服

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰  
涎祛煩熱療咽乾除驚悸定怔忡育養心神大補元氣讀書記勞神動  
政勞心常宜服之

生地黃酒洗 麥門冬去心 當歸酒洗 栝子仁  
酸棗仁炒 五味子各一 遠志甘草水 人參 白茯苓去皮水  
玄參 丹參 桔梗各五錢

一方加黃連酒炒 二兩 ○木中丞松石劉公加石菖蒲百部杜仲甘草  
一方加枸杞子石菖蒲  
右為細末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服二三十九臨臥燈  
草竹葉煎湯送下燈心棗湯亦可若飲食少思大便不實心不安  
也

安神定志丸 清心肺補脾腎消痰清火。○臺閣勤政勞心燈窓讀書  
刻苦最宜服之屢用奇效。四山王御史傳

人參一兩 白木夫蘆油 白茯苓去皮 白茯神夫皮 遠志甘草水泡  
石菖蒲去毛忌鉄 酸棗仁炒 麥門冬去心 牛黃一錢另研  
辰砂二錢半水煎為末

右為末圓服肉四兩放膏和煉蜜三四兩為丸如梧子六辰砂為  
衣每服三九清米湯下不拘時日三服

聰明狀元丸 治不善記而多忘者此藥開心通竅定智處神

石菖蒲去毛 白茯苓去皮 遠志肉甘草水 麥門冬去心  
當歸身酒洗各 巴戟天泡去 人參三錢 敗龜甲醋炙  
龍骨入三匙腹中煮一宿

右為細末用白茯苓去皮二兩粘米二兩共打粉用石菖蒲三錢

打碎煎湯去渣煮糊為丸每日食後午時睡臥各服三四十九白  
湯下久久服之能月記千言

紫河車 治癩狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不  
定此藥大能安心養血補益虛損

八仙散 服三十日精神倍六十日氣力強志意足少壯素稟虛弱或  
勞傷早衰多忘服之

天門冬 懷生地黃 中桂 白茯苓去皮各 石菖蒲  
五味子 遠志甘草水 石菖蒲各二  
右為細末每服一錢或湯或酒任調食後服勝如天王補心丹

### 怔忡驚悸

夫怔忡者心胸躁動謂之怔忡此心血不足也多因富貴戚戚貧賤不

遂所願而成。○驚悸者即動悸也。動之為病，惕然而驚，悸之為病，心下怯怯，如人所捕，皆心虛胆怯之所致也。又曰：驚者恐怖之謂，悸者怔忡之謂，怔忡健忘，驚悸三症名異而病同。

清火安神湯 主方 治驚悸怔忡心神荒亂

當歸 二錢 川芎 七分 白芍 八分 生地黃 一錢 片苓 八分 黃連 八分

桅子仁 七分 酸棗仁 七錢 遠志 七分 甘草 二分 麥門冬 去心 一錢

右剉一劑生薑煎服

朱砂安神丸 治血虛心煩懊懣驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂 五錢 水 川黃連 酒洗 大錢 當歸身 二錢 懷生地黃 一錢 甘草 二錢

右除朱砂外四味其為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大以朱砂為衣每服二三十九丸津液噉下食後臨卧溫水涼少許下亦可此近

而奇偶制之緩也

寧神定志丸

當歸 酒洗 一兩 川芎 七錢 白芍 酒炒 懷生地黃 酒洗 一兩 白茯神 去皮木 一兩

酸棗仁 炒 五錢 遠志 甘草水泡 去心 一兩 麥門冬 去心 一兩

黃連 姜炒 陳皮 去白 貝母 一兩 甘草 三錢 朱砂 一兩 易天

石為末煉蜜為丸如菉豆大每五七十九丸食遠棗湯下

加味寧志丸 元氣虛薄精神恍惚心患昏憤氣不足健忘怔忡

不 人參 白茯苓 去皮 遠志 甘草水 石菖蒲 度 酸棗仁 炒

香黃連 去毛 當歸 酒洗 生地黃 酒洗 楮子仁 一兩 木香 四錢 不見

朱砂 研水飛一兩二錢半

右為末煉蜜為丸菉豆大半飢時麥門冬去心煎湯下五六十九

參歸腰子 治心氣怔忡而自汗者不過一二服即愈

人參五錢 當歸身五錢 猪腰子一枚

右先以腰子用水三碗煮至一碗半將腰子細切入二味藥同煎藥渣焙乾為細末山藥糊為丸梧子大每三五十九米湯送下

妙香散 治心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒

不常夜多盜汗飲食無味頭目眩暈常服補益氣血安神鎮心

射香 一錢 木香 二錢 山藥 姜製 茯神 茯苓 黃芪 蜜炒

遠志 甘草水泡去 人參 桔梗 去蘆 甘草 各五錢 朱砂 三錢

右為末每三錢酒調下

右方治消渴小便澀數而瀝兼有油濁用燈心茯苓煎湯下

又治飲酒行事酒熱必心經致成黃疸因陳煎湯調下日三服

又治心虛遺精白濁

又治虛勞心氣不平小便膩濁

驚悸健忘怔忡失志不寐心風皆足膽涎沃心以致心氣不足若用京劑太過則心火愈熾痰涎愈盛而病益深宜理痰氣一婦人驚悸怔忡無寐自汗盜汗飲食不甘急脣嗜卧用歸脾湯而愈方見健忘

定志丸 治心氣不足恍惚怔忡驚悸健忘

遠志 甘草水泡 石菖蒲 各二兩 人參 一兩 白茯神 去皮木 三兩

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服二十九米湯下

### 不寐

又視傷血久留傷氣又立傷骨久行傷筋久坐傷肉木抵人之形氣時靜時動其机運而不滯久於動靜未免有傷也睡不厭寐覺不厭寐嗽者曲膝卷腹以左右肋側卧修養家所謂獅子眠是也如此則氣

每深蒲村田常暖腎水易生益人弘多舒身而固則氣直而寧  
散而不落故卧惟覺時可舒身耳凡睡常習閉口而睡為佳口開即  
失真氣且邪從口入凡睡而張口者牙齒無不早落可以驗之  
安神復睡湯 主方

當歸身 酒洗 川芎

白芍 酒炒 懷生地黃 酒洗 益智仁

酸棗仁 炒 山藥

圓眼肉 遠志 甘草水炮 麥門冬 去心

甘草

右劉燈心水煎濕服

養心湯 勤政勞心痰多少睡心神不足

人參 麥門冬 去心 黃連 姜炒 白茯苓 去皮 白茯神 去木

當歸 酒洗 白芍 酒炒 遠志 甘草水炮去心 栝子仁

酸棗仁 炒 陳皮 甘草

右劉蓮肉四個去心水煎溫服

人參湯 治胆虛常多畏恐不能獨卧如入捕狀頭目不清

人參 枳壳 去穢 五味子 桂心 甘菊花 白茯神

拘杞子 各三分

山茱萸 去核 柏子仁 熟地黃 各一分

右為細末每服二錢溫酒調服

酸棗仁湯 治多睡及不睡

酸棗仁 和皮 人參 白茯苓 去皮各等分

右劉水煎服如不要睡即熱服如要睡即冷服

治心下怔忡眠倒即木聲打鼾睡即醒不寐

用羚羊角為犀角各用水磨濃汁入所用湯藥內服之蓋打鼾者心肺之火也

暮卧呪

暮臥以手撫心上呪曰天靈至藥願得長生五龍君侯願得安寧身一  
七遍女二十七遍長生不病

# 婦人科

脈訣

女子尺中須要盛

浮細沉遲是虛症

忽然脈得寸口盛

木部無邪身有孕

女人尺脈常盛而右手脈大皆其常也若腎脈微瀆或浮或滑而斷  
絕不勻或肝脈沉而急皆經閉不調之候也

## 調經

論曰經者常候也謂候其一身之陰陽盛衰伏知其安危故每月一至不  
過不及皆為不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有在

多下少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致蓋先期而至者血  
熱也存因脾經血燥加味逍遙散有因脾經鬱火歸脾湯有因肝經  
怒火加味小柴胡湯有因血分有熱加味四物湯有因勞役水動補  
中益氣湯後期而至者血虛也有因脾經血虛人參養榮湯有因肝  
經血少六味地黃丸有因氣虛血弱八珍湯蓋血生於脾止故云脾  
統血凡血病當用甘苦之劑以助陽氣而生陰血也  
太抵經病趨前為熱退後為虛血滯宜行血枯宜補常時與經前作痛  
為血積經後作痛為血虛時發熱為血虛有積經行發熱為血虛  
有熱此大法也

經水不調或紫或黑論

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色也血為氣之配氣  
熱則熱氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則

濁上應於月其行有常名之曰經為氣之配因氣而行成塊者氣之  
 疑也將行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛  
 也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之  
 甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷乘之而溫  
 熱之劑禍不旋踵矣良由病原論月水之病皆曰風冷乘之宜其相  
 習而成俗也或曰黑者此方水之色也潔者黑之漸也非冷而何予  
 曰經云亢則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也况  
 婦人性執而鄙嗜欲加倍藏腑厥陽之火無日不起非熱而何若曰  
 風冷必須外得說或有之吾恐十百而十一也  
 婦人氣血不足用八珍湯○中氣不足用補中益氣湯○脾氣不足用  
 六君子湯○脾氣鬱結用歸脾湯○手足發熱用六味丸○九臟虛  
 寒手足逆冷用八味丸

四物湯 王方 治血虛或因失血或因劫伐或因瘡毒潰後以致補熱內  
 熱煩燥不安若脾虛不能生血者宜四君加當歸白朮炒以補脾土  
 其血自生若血虛發熱誤服寒涼劫伐之劑以致發熱作渴目紅面  
 赤脈洪大而虛此血脫煩燥急用當歸補血湯 方見補益  
 當歸 酒洗 川芎 酒炒 白芍 酒炒 懷生地黃 酒拌 鐵落 入砂鍋內蒸  
黃俱用 此製法也 ○右剉水煎服病加減于後  
 經水將來作痛者血實氣滯也或心腹連腰作痛用生地黃加黃連  
 香附桃仁紅花玄胡牡丹莪朮青皮  
 經水過期不來作痛者血虛有寒加桃仁紅花香附肉桂蓬木蘇木  
 木通甘草  
 經水先期來者血虛有熱用生地加黃芩香附黃連阿膠艾葉黃芩  
 知母甘草

經水過期而來紫黑成塊者氣鬱血滯也用生地加桃仁紅花牡丹青皮香附玄胡甘草

經水去多不久不止發腫滿者是脾經血虛也加白木茯苓砂仁大伏

皮木香陳皮厚朴蘇子萊苓木通香附玄胡牛膝甘草

經水月久不行發腫者是瘀血滲久脾經也去地黃加桃仁紅花牡

丹乾姜肉桂厚朴枳壳木香香附牛膝玄胡

經水先期而至血紫有塊腰腹痛手足冷痺口乾頭眩用生地加條

芩荆芥香附小茴玄胡續斷杜仲地于甘草

錯經妄行於口鼻者是火載血上氣之亂也用生地加黃芩梔子牡

丹犀角阿膠茯苓麥冬陳皮凡經血逆行或血腥或吐血衄血用韭

汁服自清

經水行後作痛者氣血虛也加四君子湯二方合劑服之加炒乾姜妙

經水過期而來色淡者痰多也加陳皮半夏茯苓甘草生薑煎服

經水適來適斷或有往來寒熱先安服小柴胡湯後以此湯和之

肥白人經水過期者是痰多用二陳湯加南星蒼朮滑石及川芎當

歸香附

經水過多久不止者成血崩用生地加白木條芩阿膠茯苓山枝地

于荆芥香附甘草久不止加茅根磨墨同服○骨蒸勞熱加地骨皮

知母柴胡黃芩○妊娠胎動不安下血不止加艾葉阿膠條芩○血

臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉○血崩加生地蒲黃黃芩一方

阿膠艾葉條芩○風虛眩暈加秦苑羌活○發熱心煩不得眠加黃

連枝子○虛寒脈微自汗氣短自利加乾姜○中濕身重無力身涼

微汗加白木茯苓○筋骨肢節疼及頭疼增寒加羌活防風藁本細

辛○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡川練子○經水過多加黃芩

白朮○經水澁少加葵花紅花○赤白帶下加香附白芷○血痢加  
同膠黃連○產後血痢腹痛加槐花黃連粟壳○血熱相搏舌乾口  
渴加天花粉麥冬○大渴引飲加知母石膏○臍臟秘澁加大黃桃  
仁○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁○目暴赤作翳加羌活防風  
防已酒浸龍膽草○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢○虛熱口  
乾加麥門冬黃芩○產後惡露不通加桃仁蘇木牛膝○加味四物  
湯即四物湯加柴胡牡丹皮枝子

○按右方治諸病屬血虛者宜之

加味道遙散 治肝脾血虛有熱遍身搔痒或口燥咽乾發熱盜汗食

少嗜臥小便澁滯等症又治瘰癧流注虛熱等瘡

當歸 酒洗 白芍 酒炒 白茯苓 去皮 白朮 炒 甘草 炙 各錢柴胡

牡丹皮 山梔 各五錢

○按右方治諸病發熱屬肝脾血虛者宜之  
三分散 治婦人室女月事不調寒熱往來痰嗽虛損狀若勞症遷延  
歲月不成孕育勻經消痰去熱和表裏養陰陽倍飲食小柴胡湯合  
四物湯加白朮白茯苓姜棗煎服

○按右方治心脾虛肝火盛而寒熱痰嗽者宜之

婦人痰咳便毒俗名瘡或肝經濕熱下注或鬱怒傷損脾肝其外症或  
兩拘小腹腫痛或玉門爛腫作痛或寒熱往來憎寒壯熱其內症或  
小便澁滯或腹內急痛或小腹痞悶或上攻兩脇或晡熱重墜若兩  
拘小腹腫痛肝經濕熱壅滯也用龍胆瀉肝湯玉門腫脹肝火血虛  
也用加味道遙散及龍胆瀉肝湯加木香若槩投散血攻毒之劑則  
誤甚矣

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拘腫痛或腹中疼痛或小便澁滯等症

龍胆草酒拌 澤瀉各一錢 車前子炒 木通 生地黃酒拌

當歸酒拌 山梔炒 黃芩炒 甘草各五分

右列水煎服。○煎治玉莖生瘡或便毒懸癰癰腫痛潰爛等症

懸掛

○按右方治肝經濕熱兩拘腫痛安之

小柴胡湯 治肝胆經症寒熱往來哺熱潮熱身熱默默不食或怒火

口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢咳

嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之

柴胡二錢 黃芩一錢 人參半錢 半夏各七分 甘草各五分

右姜棗水煎服依本方加山梔炒 龍胆草炒 當歸芍藥 名丸味柴

胡湯治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脇肋結核凡肝胆經部

分一切瘡瘍或風熱結核瘰癧

加味小柴胡湯 治肝胆經風熱耳前後腫痛或結核瘰癧或寒熱哺

熱或經候不調等症。○即小柴胡湯加山梔牡丹皮

又加味小柴胡湯 治婦女經行感冒發熱熱入血室寒熱如瘧晝則

安靜夜則發熱妄語或素血虛大勞大怒火動熱入血室亦能致此

即前小柴胡湯加生地黃。一室女寒熱肝脉弦長而出寸口用小

柴胡湯加生地烏梅治之而愈既嫁而諸症悉痊

○按右方治肝胆經諸病寒熱潮熱哺熱口苦耳聾脇痛痰嗽宜照各

病選用

加味調經湯 治經水不及期有熱經行色紫黑或淋漓妄行夏月尤

宜服之

當歸身酒洗 川芎中 白芍中 生地黃上 黃連上 黃芩上

梔子上 香附上 青皮中

右用荆芥穗七個水煎空心服忌油膩葱蒜

○按右方治經水不及期而來屬血虛有熱者安之  
加味八珍湯 治經水過期者用此方即能調正

當歸半錢 川芎七分 白芍一錢 熟地黃一錢 人參一錢 白朮一錢  
白茯苓去皮一錢 香附八分 陳皮八分 甘草五分

右劉水煎服○腹痛加艾葉小茴玄胡各四分或為末煉蜜為丸亦可

○按右方治經水過期屬氣血兩虛者宜之  
加減益氣湯 治婦人多怒經行旬餘方止淋瀝無期肌體倦瘦口乾  
內熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣

黃芪一錢 人參一錢 當歸一錢 白朮一錢 茯苓去皮遠志甘草水  
麥門冬一錢 五味子一錢 牡丹皮一錢 龍眼肉一錢 柴胡一錢 升麻一錢

酸棗 炙甘草 ○劉作劑東二枚水煎服

○按右方治怒傷元氣淋瀝血期肝脾虧損安之  
濟陰至寶丹 常服順氣養血健脾調經脈益子宮止腹痛除白帶久服生子殊効

南香附米四兩 醋一兩 醋一兩 酒一兩 米一兩 益母草二兩 當歸身酒洗  
川芎一兩 白芍一兩 熟地黃自製用生薑 石棗酒蒸去核 陳皮去白  
白茯苓去皮一兩 熟地黃自製用生薑 半夏湯泡切片姜汁浸  
白朮去油盧土 阿膠蛤粉炒二兩 山藥二兩 艾葉醋浸炒  
條芩酒炒一兩 麥門冬去心一兩 牡丹皮一兩 川續斷酒浸  
吳茱萸湯泡炒 小茴香鹽酒炒五錢 玄胡索四錢 沒藥五錢  
木香五錢 甘草炙三錢 人參一兩

右為細末酒糊為丸如梧子大每服百丸空心米湯下

○按右方治婦人諸病可服

百補保真丸 治婦女陰虛血弱脾弱食少

當歸 酒洗 四兩 川芎 四兩 白芍 酒炒 四兩 熟地黃 酒蒸 四兩 麥門冬 去心 二兩

天門冬 去心 二兩 知母 鹽水炒 二兩 白木 去蘆 炒 四兩

陳皮 去白 二兩 白茯苓 去皮 二兩 香附 童便炒 四兩

右忌鐵器為細末酒糊為丸如梧子大每服百丸空心淡鹽湯下

抑氣養榮丸 治女人服之有孕且無小產之患

當歸 酒浸 二兩 川芎 一兩 白芍 酒炒 二兩 熟地黃 酒蒸 二兩 陳皮 一兩 白木 二兩

茯苓 一兩 黃芩 炒 一兩 貝母 一兩 麥門冬 去心 一兩 阿膠 錢七 香附 炒 一兩

甘草 錢五 黑豆 大者 炒 去皮 十九個 右為細末煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心鹽湯溫酒任下忌食諸血

加減五積散 治婦人經脈來沿身疼痛手足麻痺或生寒熱頭疼目眩此乃觸經感冒○依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜葱煎服○

咳嗽加杏仁五味○泄瀉去枳殼加白朮肉豆蔻○治婦人筋骨肢節痛及遍身頭疼兩手脈弦增寒如瘧每以散風止痛之劑因効以

四物湯加羌活防風秦艽官桂立已○治婦人腹中常常作痛上下不定經年絕血也

青皮 去穢 陳皮 三稜 煨 莪朮 煨 香附 炒 烏藥

乾姜 各等分 右用醋煮焙乾為末每服二錢空心陳皮湯調下

流經散 治婦人脚疼腰痛皆因氣血凝滯多因經行之際水濕所觸

住而不行流入脚經故此疾甚不能轉側日夜呻吟不止或有發熱

當歸 三錢 川芎 三錢 京芎 四錢 地黃 二錢 黑丑 三錢 威靈 三錢

烏藥 半錢 肉桂 三錢 牡丹皮 二錢 黑豆 半錢 ○半水半酒煎服

治婦人每經行臍腹痛甚以桃仁桂枝湯一劑而瘥方見後經開  
治婦人性燥患手足搐搦

當歸 川芎 赤芍 生地黃 防風 羌活

柴胡 黃芩 牡丹 枝子 甘草 ○水煎服

散瘀消滯湯 一治婦人因氣惱起患遍身前後胸腹脇皆作痛手足  
肢節筋骨腫痛注流左右上下痛不可忍口乾胸滿腹脹悶痛月經  
忽至用此消瘀血散滯氣一服而瘥

當歸 川芎 赤芍 生地黃 青皮 木香

檳榔 桃仁 紅花 大黃

右各等分剉一劑水煎溫服

一婦人臍腹疼痛不省人事只一服立止人不知者云是心氣痛誤矣

白芍藥 酒炒 五靈脂 木通 去皮各等分

右剉六錢酒水各半鍾煎七分去渣溫服  
治婦人胸背脇走痛

蒼朮 川芎 白芷 赤芍 香附 黃柏

威靈仙 桂枝 甘草

右剉一劑生姜三片水煎溫服

○按右諸方治諸病宜對症選用

調經六補湯 治婦人血海虛冷經脈不調或時心腹疼痛或下白帶  
如魚腦髓或似米泔不分信期每月淋漓不止肌肉消瘦面色萎黃  
四肢無力頭目昏眩此乃氣血大虛宜服此方

黃芪 四分 人參 三分 白朮 四分 當歸 六分 川芎 五分 白芍 酒炒 六分

熟地黃 五分 陳皮 四分 砂仁 三分 香附 六分 阿膠 炒 三分 白茯苓 四分

沉香 另研 小茴 三分 玄胡索 四分 吳茱萸 三分 貝母 酒炒 四分 粉草 二分

右作一劑水煎溫服  
八味丸 治婦人陰冷下元虛寒心火上炎渴飲水或腎水不能攝  
養多吐痰唾

○按右方治女人虛損百病宜之  
歸脾湯 補中益氣湯 八珍湯 六味丸 八味丸 四君子湯  
六君子湯 人參養榮湯 二上俱見補益 二陳湯 見痰飲

### 經閉

丹溪曰經候有結閉不通者有不及期與過期者有妄行者有色紫黑  
及淡者有成塊者有作疼者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因  
久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不  
生血或因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨症用之或因

七情傷心 心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經  
自行矣

神效通經散 治經閉如神

當歸 川芎 白芍 生地黄 黃芩 大黃  
官桂 厚朴 枳殼 枳實 紅花 蘇木

烏梅 每劑一劑姜棗煎服

○按右方治經閉不通一服立應

一醉千金散 治婦女經閉如神 用托盤科一大帖好酒二碗煎至

一碗空心熱服汗出至足立通

神應丹 治經脈不行五心煩熱口燥咽乾額心忪潮熱胸膈不利咳

嗽稠痰

大黃 半兩醋二碗 血竭 桃仁 紅花 各五錢 爲末和勻酒糊爲丸如

梧子大辰砂為衣每服七十九空心酒下

治婦人室女經脈不通服之如神

大黃性燒存 生地黄 三錢 為末作一服空心好酒調下

治婦人經閉不通咳嗽發熱面紅虛勞盜汗痰喘用滋補藥不効危者

大黃酒拌九蒸 沒藥 五錢 血竭 五錢

右為末滴水為丸每服五七十九用四物湯加紅花煎湯送下先

服逍遙散加黃芪陳皮川芎麥芽

治婦人經血閉并乾血氣

斑蝥二十一个 大黃 五錢 桃仁 四十九个

右為末酒糊丸梧子大每五七九甚者十五九空心酒下如血枯

經閉四物湯送下

治室女經脈不通

金頭蜈蚣五个紅花三錢滑石三兩黑牽牛三錢甘草一兩

右為末每服二錢黃酒調服日三次忌生冷

通經丸 治婦人室女月信不通兼治胎衣不下

大黃酒浸乾一斤為末以醋一碗慢火熬成膏丸如彈子大每服

一丸空心熱酒化下又治產後內熱惡露作痛俗名兒枕痛者及

大便不利閉結者並煎四物湯化一丸服如發寒熱如瘧內熱者

煎小柴胡湯化服並不損入大能活血蕩穢潤燥清神開胃消食

兼男女長幼大小血疾除傷寒大病表未解者一切服之如神

神効通經丸 治婦女經閉不通腹內有積瘀血塊或痛或脹

歸尾 桃仁去皮 大黃煨 牡丹皮 乾漆炒盡 肉桂

三稜 莪朮 杜牛膝 各一兩 射香 八分

右為細末皂角五錢荒花二錢半煎水煮糊為丸如梧子大每五

十九空心米湯下

○按右諸方皆治經閉不通屬壯盛者宜之若屬虛弱者宜後諸方者因何所致而用何方以治之經云損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精皆常審而治之

若因脾胃虛弱不能生血而月經不通者六君子湯加當歸

若因脾胃鬱火內耗其血而月經不通者歸脾湯

若因肝脾鬱怒氣血傷而月經不通者加味歸脾湯

若因肝脾虛熱血傷而月經不通者加味道遙散

若因肝腎虛損陰虛發熱月經不調或崩漏帶下或吐衄便血小便淋瀝或肺熱內熱寒熱往來或盜汗自汗不時倏熱宜六味丸若兼脾氣不足飲食少思者佐以六君子湯

若因脾經虛熱肝經怒火宜四君子佐以加味道遙散  
若因脾經氣虛血弱兼補熱內熱宜八珍湯加柴胡丹皮若因元氣下陷而致諸症宜補中益氣湯

養血通經湯 治經閉不通發熱咳嗽

當歸 酒洗 川芎 白芍 酒炒 生地黃 酒洗 香附 童便炒

牡丹皮 三錢 柴胡 六錢 生黃芩 六錢 黃柏 炒六錢 知母 童便

牛膝 八錢 去蘆酒洗 桃仁 紅花 二味量

右剉十劑水煎空心一服食遠一服○不思飲食加白朮陳皮○有塊加三稜莪朮

養血調經丸 治婦女經閉或二三年不通者臍下一塊如碗大或吐血下血等症與後消積通經丸早晚相間服之

當歸 酒洗 二兩 川芎 一兩 白芍 酒炒 兩 熟地 自製 四兩 石棗 酒洗 去核 扶苓 去皮

山藥二兩 牡丹皮半兩 澤瀉半兩 梔子仁兩半 益母草二兩  
 生地黃 酒炒二兩 香附 醋炒二兩 陳皮半兩  
 右為細末煉蜜為丸 梧子大每服三錢 空心淡鹽湯送下  
 消積通經丸

南香附 醋炒二兩 艾葉 醋炒二兩 當歸 酒洗二兩 川芎 一兩 赤芍 一兩 生地 一兩  
 桃仁 去皮一兩 紅花 酒洗一兩 三稜 醋炒一兩 莪朮 醋炒一兩 乾膝 兩  
 右為細末醋糊為丸 如梧子大每八十九丸 臨臥淡醋湯下  
 桃仁桂枝湯 治經脈壅然不行 腹中作痛 或上攻心脇 欲死或因經  
 脈不行 漸成積塊 臍下如覆杯

桂枝 白芍 生地黃 各二兩 桃仁 去皮尖 七枚 甘草 一錢  
 右剉姜水煎服  
 ○按石芳安隨症選用

四物湯 小柴胡湯 加味逍遙散 俱見調經 六君子湯 歸脾湯 加味  
 歸脾湯 六味丸 補中益氣湯 八珍湯 以上俱見補益

**虛勞**

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者若室女童男積  
 想在心思慮過度多致勞損男子則神色消散女子則月水先閉蓋  
 憂愁思慮則傷心而血逆竭神色先散月水先閉且心病則不能養  
 脾故嗜食脾虛則金虧故發嗽腎水絕則木氣不榮而四肢乾枯故  
 多怒而髮焦筋骨痠弱若五臟傳遍則死自能改易心志用藥扶持  
 庶可保生切不可用青蒿虫虫流血行血後損真元宜補養氣血調  
 理脾胃久則血生而虛勞之症愈矣  
 茯苓補心湯 治婦女經水不調吐血咳嗽發熱口乾喘急胸膈痞悶

嘔吐痰水

四物湯方見調經參蘇飲方見咳合成一劑姜棗煎服

○按右方養血調氣治痰嗽喘熱宜之

逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心悸顛赤口燥

咽干發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如

瘡室女血弱陰虛勞瘵不和咳嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸○一方

治虛勞加陳皮知母貝母地骨皮香附童便炒各八分

當歸酒洗一錢白芍酒炒八分白朮去蘆炒一錢白茯苓八分柴胡三分

薄荷三分甘草炙三分

右劉作劑煨生姜三片水煎溫服○五心煩熱加麥門冬地骨皮

○經閉加桃仁紅花○腹痛加玄胡索

○按右方治血虛脾弱肝火咳嗽潮熱者宜之

六味丸 治肝脾腎精血燥熱血虛發熱內熱瞞熱盜汗作渴躄倦筋

骨疼痛筋脉拘挛血虛發燥虛熱生痰咳嗽喘急等症

○按右方治陰虛火動痰嗽喘熱盜汗諸病宜之

雙補寧嗽湯杜鳳圃方治婦人血虛脾弱痰嗽喘熱

當歸酒洗白芍酒炒白朮去蘆炒白茯苓去皮各二錢陳皮前胡

桑白皮各錢知母貝母各二錢梔子二錢蘇子一錢半

杏仁十四分桔梗七分甘草五分

右劉生姜三片水煎溫服

人參五味湯 治諸虛百損氣血勞傷涎喘欬膿或嗽咯血寒熱往來

盜汗羸瘦困乏一切虛損

黃芪蜜水炒人參 白朮去蘆炒白茯苓去皮陳皮 當歸

熟地黃 五味子 柴胡 前胡 地骨皮 桑白皮

桔梗 枳壳 甘草

右劉生薑煎服。○煩渴加烏梅青蒿。○咳膿加知母阿膠。

清火化痰寧嗽湯

天門冬去心三分 麥門冬去心三分 熟地黃五分 黃柏酒炒五分 知母酒炒五分

陳皮五分 半夏姜炒五分 白茯苓去皮五分 貝母三分 紫苑酒洗五分

款冬花 黃芩酒炒 桔梗各三分 甘草二分

右劉一劑生薑三片水煎服。

劫勞散 治勞嗽發熱盜汗身瘦睡中有紅或成肺痿。

黃芪炒 人參 白茯苓 半夏姜製 當歸 白芍酒炒

熟地黃自製 阿膠炒 五味子 甘草炒

右劉劑生薑煎服。

○按右方治虛勞咳嗽喘熱半攻半補之劑宜對症選用。

十全大補湯 治胃氣虛弱吐血劫血便血不止以致外症惡寒發熱

自汗盜汗食少身倦或寒熱作渴頭眩眩暈而似中風或氣血俱虛

胸腹脇痛或骨節作痛經候不調或寒熱往來發熱肺熱或五心發

熱咽乾舌燥或痰嗽喘促胸膈虛痞或嘔吐泄瀉手足冷熱等症。

即四君子湯合四物湯加黃芪肉桂。

○按右方治虛勞大補之劑。

一婦人虛勞熱如火之燎發滑自汗咳嗽等症以黃芪一兩當歸二錢

水煎服熱退即止。

一婦人為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此悲傷肺思傷脾朝服

補中益氣湯加桔梗貝母知母夕用歸脾湯送下六味丸而愈。

柔脾湯 治虛熱吐血衄血汗出用諸止血藥而血愈盛者立止。

甘草炒 白芍炒 黃芪各半兩 熟地黃自製一兩五錢

右每服一兩水酒煎服。

河車丸 治一切勞瘵虛損骨蒸等疾。

紫河車 一具初生男胎者尤良洗淨梓爛本草云肉白茯苓五錢

人參 一兩 乾山藥 二兩

右為細末麵糊和人河車加三末丸梧子大每服三五丸空心米飲下咳甚五味子湯下。

六味丸 補中益氣湯 歸脾湯 四君子湯 四物湯以上俱見補

### 崩漏

崩漏皆由傷損衝任二脉血氣俱虛不能約制其經血故忽然暴下然崩漏之症亦有陰陽若婦人年五十之後經止數年矣忽經又行兼腹痛或身熱口渴者曰崩陰症也若婦人年三十四十後經行三十

日湧暴不止者曰漏屬陽症也若崩漏初不問虛實先用四物加荆芥穗燒上防風升麻煎服如不止加炒蒲黃白木升麻并諸止

### 治血崩驗方

懷生黃 <small>用砂仁時皮水拌蒸六分</small>	牡丹皮 <small>六分</small>	石棗 <small>五分</small>	山藥 <small>五分</small>
條芩 <small>酒炒八分</small>	蒲黃 <small>炒六分</small>	阿膠 <small>炒八分</small>	香附 <small>醋炒六分</small>
白朮 <small>六分</small>	黃連 <small>姜炒八分</small>	陳皮 <small>五分</small>	甘草 <small>一分</small>

右剉一劑姜棗煎服

### 陳白堊經驗血崩方

益母草 <small>一錢半</small>	沙參 <small>八分</small>	川芎 <small>一錢</small>	白芍 <small>一錢</small>	熟地黃 <small>八分</small>
香附 <small>醋炒一錢</small>	阿膠 <small>蛤粉炒一錢</small>	蒲黃 <small>炒八分</small>	陳皮 <small>三分</small>	白朮 <small>一錢半</small>

右剉一劑水煎空心服

### 奇効血崩方

當歸 川芎 白芍 懷熟地 阿膠炒 艾葉醋炒

蒲黃炒 懷生地 山枝炒 地于 白朮 黃連

黃芩 甘草各等分 ○劉劑水煎空服

和經湯 凡婦人四十五六經水斷絕五下二三復來或淋瀝或成片

條漏下不止此乃陰陽相返氣血妄行調理最難先服此藥三劑繼

進調經大補湯方見調經

當歸 川芎 白芍炒 熟地黃 白朮 白茯苓

白芷 香附 條芩 酸棗仁炒 阿膠炒 蒲黃炒

右劉生薑煎服

○按右方治血崩漏下任意選用

固經丸 治婦人經水行過多不止

樗根皮七錢 白芍炒 黃芩炒 龜板炙 黃柏炒 香附二錢

白鳳膏 治血崩神方

白毛烏肉雄鷄一隻吊死水泡去毛腸雜將金櫻子之根先淨 坩

斤裝入肚內用酒煮令熟去渣將鷄酒食之立効

神龍丸賈蘭降方 治血崩如神及經水過多不止尤効

黑驢糞燒灰存性為末麵糊為丸每服五七十丸空心黃酒送下

劉嵩皇屢試治血崩神方

又古何首烏切一兩甘草些須黃酒一碗煎八分入刺刺芽汁一盞同

服立止

天靈散 治血崩不止如神

天靈蓋燒存性為末每服二錢空心溫酒調服立止

治血崩 猪精肉煮熟四兩百草霜二兩篩過蘸肉吃

治血崩

陳槐花 一兩 百草霜 五錢

右為末每服三四錢溫酒調若甚昏憤不省人事燒紅秤槌淬酒下

治血崩 棕燒灰一撮好酒調服

又方

韭菜根搗汁一小鍾黃酒一大鍾和服

凡血崩乃經脈錯亂不循故道滲溢妄行一二日不止便有積瘀之血凝成窠肉更以藥澁任轉見增劇宜先以五積散加防風荆芥再少加醋煎投一二服次進獨行散以霹靂酒下二三服即止如不止再以諸止血藥治之

獨行散 治血崩五靈骨炒盡烟為末每服一錢溫酒調下又一方半

生半炒

按右諸方宜對症選用

治婦人五十以上經脈暴行內經曰火主速不可以冷病治之如下峻藥即死也川芎黃連解毒湯以清其上加棕灰連壳灰以滲其下然後用四物湯涼血即經可也

一婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用烏賊魚骨炒為末醋湯調下收斂之若瘀血不散用失笑散行散之若心血虛弱用芎歸湯補養之若鬱結傷血用歸脾湯調補之

一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛症悉具面色痿黃余曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛空用十全大補湯參木倍之三十餘劑稍愈百餘劑全安益胃升陽湯 治婦人經候凝結黑血成塊左廂有血癥水泄不止食有時不化後血塊暴下并水泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下

既久經候猶不調水泄日三四行食罷煩心飲食減少人形瘦弱血  
脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸  
藥為之先務也甘能生血陽生陰長之理人身以穀氣為寶故先以  
理胃氣為要

黃芪蜜炙一錢 人參二錢 甘草一錢 陳皮一錢 白朮去蘆二錢 當歸一錢

柴胡五分 升麻五分 神麩一分 生黃芪二分

右切作一服水煎服○腹中痛加白芍三分 中桂少許 如渴或口

乾加葛根○按右方治血崩日久真氣下陷宜升提之劑止之

失笑散方見產後 四物湯 芎歸湯 歸脾湯 十全大補湯俱見補

黃連解毒湯見傷寒 五積散見中寒

### 帶下

帶下脉左遲滑忌浮虛

婦人帶下赤屬血白屬氣濕熱為病燥濕為先漏與帶俱是胃中痰積

流下滲入膀胱法當升之甚者用吐以提其氣須斷厚味亦有屬虛

寒者臨症審察之

升陽除濕湯 治婦人諸虛百損經水不調赤白帶下

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 懷生地黃酒蒸 白朮去蘆

白茯苓皮 蒼朮炒 陳皮 半夏姜汁炒 香附米酒炒

砂仁 乾姜 黃柏酒炒 知母酒炒 柴胡酒炒

升麻酒炒 甘草炙 右生薑棗水煎空心服

○按右方治赤白帶下屬血虛脾弱濕痰滲下升提之劑

治婦人赤白帶下以五積散加乳香沒藥各二錢半入米糖一斤酒煎

五積散 治赤白帶下加香附吳萸小茴 一方加米糖塊煎服減麻黃

○按右方治白帶屬虛寒者安之

治婦人赤白帶下屬壯盛而有寒熱者更連解毒湯倍黃連降心火益腎水加四物湯在內尤效

○按右方治赤白帶下屬熱者安之

治婦人久患白帶瘦削無力倦怠欲睡腰酸腿痛飲食無味面黃日晡煩熱小便淋瀝十全大補湯去桂加車前子地骨皮鹿角膠大獲全效

○按右方治下元虧損赤白帶下久不止安之

加味益氣湯 治婦人赤白帶下

依本方加黃柏酒炒知母香附半夏川甲薛川練子肉姜煎服後服歸附地黃丸收功方見後

治婦人白帶如神方上異人傳

豆腐一塊如碗大置空中一窩入流黃二兩半在中仍將豆腐蓋合入瓦罐內下用稗穢豆腐藥在罐中上加稗蓋上入水放一日乾則煩煩添水煮至豆腐黑為度取出為末又白芍煨為末二末等分用水糊為丸如梧子大每服五分燒酒送下

秘方 治婦人白帶

用白鷄冠花為末每三錢空心酒調下立已如赤帶用赤鷄冠花二白丸 治白帶如神

石灰一兩白茯苓去皮二兩為末水丸每三十九空心白水下

治婦人白帶方  
金櫻子三兩糯米半合白扁豆花炒黃荆子炒蓮子二兩

白麵二兩  
右為末每服五七錢入蜜三匙沸湯調下半月即愈

治赤白帶下  
槐皮一大塊中穿七眼先用麵圈圍肚臍關上槐皮艾灸肚內熱響去受即効

治婦人赤白帶下

黃荆子炒為末每服二錢空心温酒調下

治赤白帶下經年不好者用蛇床子末一两枯礬二錢煉蜜為丸如彈子大用絲綿包裹放入陰戶內不過二三丸神効兼安胎暖子宮

○按右單方對症選用

治婦人赤白帶下

甘松 川椒 朝腦

石等分為末煉蜜為丸櫻桃大送入陰戶內立効

治婦人帶下腸有敗膿淋漓不巳腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋

為敗膿所致卒無已期須以敗膿乃愈

白花 兩 單葉紅蜀葵根 二兩 白芍藥 枯白礬 各半兩

右為末同以蠟丸梧子大空心及飯前水飲下十丸或十五丸候

膿盡仍服十全大補湯補之

玉仙散 治赤白帶下簡而易効而捷

乾姜 兩 白芍 兩 香附 兩 甘草 五錢 生用

右為末每服三錢空心温酒送下

歸附地黃丸 治白帶先服前加味益氣湯數劑後服此丸

當歸 三兩 川芎 一兩 白芍 兩 熟地黃 兩 香附子 兩 童便浸

知母 兩 黃柏 兩 童便浸 三日 白朮 兩 陳皮 兩 蒼朮 兩

五味子 兩 牡蠣 兩 椿根白皮 兩 無花不實者

右為末酒糊丸如梧子大每五十丸空心淡鹽湯下後草物壓之

忌葱白蘿蔔胡椒煎燻發熱之物。一方有白葵花。一方無三味有山茱萸。人虛加入參白朮。

香砂益氣丸 治白帶如神

香附米 八兩酒醋盪湯童便 蒼朮 米泔水浸 椿根白皮 鹽水炒

砂仁 兩 炒 牡蠣 兩 炒

白朮 兩 小黃芩 兩 煎飯為丸 梧子 大每服五七十九空心酒下

四仙散 治婦人白帶下

蒼朮 一兩酒浸 白芷 五錢 川芎 五錢 大附子 麩裹炒

右為末每服五分空心好酒調下

○按右方治赤白帶下屬寒濕者宜之

補中益氣湯 十全大補湯 四物湯 俱見補益 黃連解毒湯 見傷寒

五積散 見中寒

### 求嗣

人之夫婦猶天地也天地之道陰陽和而萬物育夫婦之道陰陽和而後男人生是以有夫婦而後有父子而後有兄弟也然不有夫婦同無以為嗣續之本有夫婦而不先和其陰陽亦何以收其嗣續之功哉是故欲求嗣者先須調其婦之經經調則氣和氣和則百病不生而始可成經既調須按其候訣云三十時中兩日半云云蓋女人月經方絕金水纔生此時子宮正開乃受精結胎之候妙合而疑之時過此佳期則子宮閉而不受胎矣然男女之分亦皆有說月候方任一日二日五日交會者成男雙由者成女若陰血先至陽精後坤繼而來乘血開裹精陰外陽內則成坎卦而為男若陽精先入陰血後來兩旁橫氣來助精開裹血陰內陽外則象離卦而為女

故脉訣云夫乘妻兮縱氣露妻乘夫兮橫氣助子乘母兮逆氣參母  
乘子兮順氣護胎婦遺面南而行忽從後呼之左回首者為男右  
回首者為女或於廁所呼之亦同又胎婦其失左乳有核者生男右  
乳有核者生女

啓扁湯 治婦人百病調經種子之仙方也

人參八錢 白朮去蘆麩 兩 白茯苓去皮 兩 國老四錢 川歸酒洗 一兩  
腦芎一兩 懷生芎酒洗 兩 白芍酒炒 八錢 砂仁微炒 七錢 菝草七錢  
橘紅六錢 川牛漆去蘆酒洗 八錢 杜丹皮七錢 半夏湯泡 七錢  
右十四味均作十劑水二鍾姜三片煎八分空心服渣水一鍾半  
煎七分臨卧時服經未行前服五劑行後服五劑服此藥盡即服  
後丸藥如無他病只照本方如有他病宜照後加減服之經調脉  
和即當妊娠

加減之法于後

婦人子宮久冷不孕加乾姜肉桂各五錢何以知其冷丈夫會合之際  
當自覺之也如以甚灸丹田七壯極効在臍下三寸

婦人子宮太熱則傷胎加黃柏知母柴胡各六錢何以知其熱亦丈夫  
自當覺之也

白帶白濁時下俗云下寒非寒也乃是婦人素虛濁氣下陷故也  
有痰者亦然當加白芷一兩赤麻五錢或倍半夏如不能服藥灸中  
極七壯極効在臍下四寸○氣不流通者加水香三錢

平素虛勞自汗或惡寒加黃芪肉桂咳嗽加阿膠貝母各四錢勞熱血  
枯加柴胡鱉甲勞其甚腰痛者灸膏肓二穴各七壯在背脊四柱下

飲食減少倍白朮陳皮加厚朴姜汁炒神曲炒各五錢○肥白人痰感迷

塞子宮加南星三稜各六錢

經水將行小腹作疼有瘀血也加桃仁紅花各四錢蓬朮五錢玄胡索四錢如應効去入參加五靈首六錢半生半炒用乳香三錢

腰腿酸疼者加杜仲酒炒一兩一錢恙活三錢桃仁四錢○經行後作疼者虛也加熟苳六錢當歸八錢五味子三錢○腹脇有痞塊者去

牛漆加三稜莪朮各六錢桃仁枳實各五錢前五劑加換柳五錢後五劑不加換柳○腹有鬼胎者狀如懷胎非真胎因氣裹精而結無

血者也用桃仁乾漆肉桂射香水銀之類凡服以去之然後再服啓漏湯以俟經調仍然有子

經水前期而至者加黃芩五錢炒真蒲黃五錢○經水過期而至者加乾姜五錢牡丹皮五錢

經血崩漏不止者加蓮蓬殼灰五錢白芷八錢猪頭骨灰六錢熟艾三

錢黃芩五錢

平日有風氣寒濕腰痛者加秦艽三錢羌活七錢乳香沒藥各五錢或

加蒼朮有熱疼痛加酒炒黃柏○心腹膨脹者加大伏皮三錢木香

三錢枳朮五錢○小便澀少不通加猪苓澤瀉亦不宜多服恐泄腎

氣○室女經脈澀滯不通者謂之衝任不調也前方內加劉寄奴六

錢不應加衛矛三錢神効即鬼箭羽

○按此方先聖按卦推移製造不可妄意加減只可隨症依此加減之

法用之其効如鼓應桴如猫捕鼠

魯國主遇仙傳種子藥酒方

白茯苓去皮淨大紅棗煮法去皮核胡桃肉去壳泡去黃芪蜜炙

白蜂蜜一斤入鍋熬滾入前三味攪勻再用微火熬滾傾入磁壺

人參去蘆當歸去蘆川芎炒白芍炒生地

熟地 小茴 枸杞子 覆盆子 陳皮 沉香  
 木香 官桂 砂仁 甘草 乳香 沒藥  
 五味子 各三錢

右為細末共入蜜罈內和勻箬葉封口麵外圍入鍋內大柴火煮  
 二炷香取出埋於土中三日去火氣每日早午晚三時男女各飲  
 數盃勿令大醉安寃定寃改易容顏添髓駐精補虛益氣滋陰降  
 火保元調經壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒落更生目視有光心力  
 無倦行步如飛寒暑不侵能除百病交媾而後生子也神祕不可  
 輕傳與非人寶之寶之  
 定胎丸 黃呆仙傳種子如神

詩曰 抽將坎內中心火 送與离宮去補陰  
 十月圓蒲生貴子 此方端的若黃金

魚鮓八兩切一指長用麵炒炒炮  
 何首烏 米泔浸一宿以竹  
 大附子 麵熟為度去皮疥  
 右為細末煉蜜為丸如彈子大每一丸空心細嚼好酒送下以乾  
 物一口壓之男女同服忌房事

為鷄丸 魯府經驗方 治婦人無子又治百病生血養血服百白有功  
 香附米 一斤分四製酒醋童便  
 當歸 酒洗 川芎 一兩 白芍 酒炒 一兩 陳皮 一兩 白木 去蘆生 一兩 山藥 一兩  
 小茴 鹽酒 吳茱萸 五錢 水浸 蓮肉 去心 酸棗仁 兩 一知母 酒炒 一兩  
 大附子 一個 泡製 黃芪 五錢 真阿膠 五錢 黃柏 去皮酒炒 一兩  
 右用烏骨白毛雄鷄一隻吊死去毛食淨蒸熟連骨搗爛同煎為  
 朱煉蜜為丸如梧子大每服二錢臨經之日每日三服七半月見効

世金書 卷之六 四十一

男子陰痿者多致無子不可不慮也惟其求嗣之急易為庸醫之惑或以附子蛇床石脂為內補或以膽酥唾芙蓉為外助陽事未與內熱已作玉莖雖取頑木無用以致終身無子或有天札者言見此輩無辜而受醫藥之害遍訪諸方無越此者出以示人命曰

壯陽丹

懷生地黃酒拌蒸 巴戟去心破故紙 仙靈脾酒炒各四兩  
真陽起石煨方研 桑礪硝焙各五錢

右六味合陰之數研末煉蜜為丸如梧子大每三十九空心溫酒下不可恃此自恣也戒之

一男子服治精冷遺精舉而不堅

金蓮種子仙方

仙茅四兩用米泔水浸一宿去水再 何首烏赤白各四兩用黑土水浸蒸如此三四次

當歸酒洗 熟地黃 山藥 甘枸杞子 白茯苓去皮  
肉苁蓉 蓮菴各二兩 人參一兩半 若遺精加白龍骨煨半兩  
右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五六十丸空心鹽酒送下其精固而堅

一女人服治赤白帶下子宮久冷不結胎服之一七子宮壯熱如火立孕

仙茅種子方

仙茅 何首烏二分兩製法如前 當歸酒洗 白芍酒炒 玄胡索  
藁本 赤石脂 人參 條芩酒炒 陳皮  
川芎 熟地黃入血 白朮去蘆 白茯苓去蘆 白薇大者  
沉香 牛蒡去蘆酒炒 肉桂 甘草各五錢 香附四兩米泔蒸便各  
右為末煉蜜為丸如梧子大每服五六十丸空心溫酒送下凡修

合藥要靜室勿令雞犬及婦人見之每料許一人服不許二人服  
秘之秘之

一少年斷喪中年無子婦人血虛不能孕育此方一料夫婦同服七晝  
即孕屢試屢驗

延齡育子丸

人參 白朮去蘆陳 白茯苓去皮牛乳 白茯神去皮米人乳

天門冬去心 麥門冬去心 生地黃酒洗 熟地黃酒蒸 兔絲子酒炒

巴戟心 牛膝酒洗 甘枸杞子 鹿角膠 鹿角霜二味製

栝子仁 山藥 石棗酒蒸去肉 茯苓酒洗 蓮蕊

沙苑蒺藜各五兩 酸棗仁兩 遠志甘草水 五味子

石斛各二兩

右二十四味合二十四氣一百單八兩合一斤氣候之成數為生

生不息之妙各製為末將鹿角膠以酒化開和煉蜜為丸如或丸  
大每男服九十九女服八十九空心滾白湯送下忌煎炙葱蒜

仙露酒 治男子元陽虛損不能直射子宮

山公羊尾連腰子及骨肉砍下具約有斤用酒薑薑五兩共

入好燒酒一金花罈文武火煮化埋土中丁旦夕出火毒去渣

每晨服一二鍾興陽生子丁旦夕三服即生

生子秘方 治婦女子宮寒先生後久不生

湯陰艾好花椒先將艾揉碎花椒研末鋪艾撒椒艾三層椒一層

用細布一層段子一層做兜肚晝夜常穿汗出為度二三日內

聞椒艾香妙

溫腎散 治陰痿不起精薄而冷

鍾乳粉 肉蓯蓉酒洗 遠志甘草水 蛇床子去壳 山藥蒸

烟塵續斷有橫紋 鹿茸酥炙

右為細末每服二三七空心好酒調服

養金蓮種子方

夜交藤三斤竹刀切米泔浸五次即何首烏 淫羊藿一斤切碎羊油炒即仙靈脾

肉苁蓉一斤細切碎懷生地黃半斤酒浸晒乾懷熟地黃即懷生黃生斤酒拌砂鍋內蒸黑

右共合一處裝入絹袋內懸吊罈中入酒五十壺用筭葉扎口細

泥糊入水鍋煮五炷香放一七後日進三服通神

醫府多斯九 夫婦同服妙不可言

巴戟去心二兩半 兔絲子酒制二兩 鹿茸酥炙一兩 吳茱萸

白茯苓去皮各兩 大附子童便浸三日 牛蒡去蘆酒洗 細辛各五錢

石菖蒲 厚朴姜炒 桂心 人參 白朮

沒藥各四錢 當歸三錢 乳香二錢

右為細末鹿髓為丸梧子大每五六十九空心温酒送下益湯亦可 可壬子日修合男女每日服之無男子婦人勿服亦不過服心成 雙胎此傳秘方不可輕視予親見

魯國主珍重每製此藥以銀盆封固饋送緡紳無嗣者有得嗣而謝 書盈几足徵其効如此之多也

去妬方 治婦人妬妾悞夫無子

天明冬去皮 赤黍米去赤 薏苡仁去壳炒

右為細末煉蜜為丸每七八十九食遠白湯送下○婦人常服不

妬正士入朝小人忌之美色入室少婦妬之咸服此可免妬忌之

病也

姪娘

世金書

卷之六

日一

紫蘇和氣飲王方治胎前諸病  
紫蘇 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 陳皮 大伏皮黑豆水洗  
香附炒 甘草

右剉作劑生姜葱白水煎溫服。一方加入參氣虛者亦可。

一 妊娠胎氣不和嘔上心腹脹痛依本方加木香

一 妊娠嘔吐不止乃惡阻也加白朮茯苓半夏砂仁藿香神麩丁香

一 妊娠胎漏下血加熟地黃阿膠炒白朮條芩砂仁艾葉糯米如胎

一 漏下血心腹脹痛者或先以當歸尾川芎各五錢酒煎入童便下服立止

一 妊娠胎氣不固常慣小產預服此以固胎元加熟地黃阿膠條芩砂仁桑寄生白朮糯米

一 妊娠因事動胎致胎不安動撞不已及下血欲墜者加熟地黃人參白朮白茯苓條芩阿膠砂仁

一 妊娠咳嗽吐痰加桑白皮杏仁貝母或用茯苓補心湯亦效

一 妊娠瘧疾加檳榔草果青皮良姜半夏茯苓乾葛

一 妊娠胎痛加阿膠玄胡索條芩

一 妊娠七八個月前後面自四肢浮腫加熟地黃茯苓澤瀉白朮條芩枝子麥門冬厚朴

一 妊娠口噤不省人事言語錯亂加生地黃半夏茯苓麥門冬遠志石菖蒲竹茹

一 娠心痛加女胡索乳香 各五分

一 娠腰痛狀不可忍加破故紙小茴杜仲

一 娠白濁白帶加熟地半夏茯苓蒼朮牡蠣龍骨

一 娠小便淋漓不通加水通車前滑石

一 娠太便閉澀艱難加生地黃黃連枳壳

一 娠至九個月加枳壳白木條苓砂仁 名達生散服數劑以保胎產無虞如胎肥加黃揚湯七全

一 娠臨產驚恐氣結連日不下加枳壳

一 娠孕成之後覺氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食不羨或胎動下血及五六個月內常服數劑甚妙加熟地黃條苓白木砂仁人參阿膠炒

一 按石方治娠百病宜對病選用

一 娠腹痛須驗其面赤舌青者此胎已死用平胃散加朴硝三錢化

一 下後隨用八珍大補等湯調補之皆展山俱青吐出痰沫者子母俱

一 死也若面舌俱青者母死子活產下亦死

○按石方驗娠生死訣  
芎歸補中湯 治婦人血熱性急常慣小產服此保全  
當歸 一錢 川芎 半錢 白茯苓 八分 黃芪 一錢 條苓 一錢 陳皮 五分  
白木 陳壁 七炒 續斷 酒浸 桑寄生 酒浸 阿膠 炒  
香附 童便 砂仁 炒二分按片 甘草 五分

右劉生薑三片水煎空心服  
連砂散 治婦人常慣小產常服此以保胎孕十月完足

湖蓮肉 去心 砂仁 炒二兩

右為末每服二三匕米飲調下日服三四次  
千金保孕丹 專治屢慣墮胎久而不育者過七個月不必服

當歸酒洗 懷生地黃酒蒸 人參半兩 白朮去蘆炒 條芩酒炒

陳皮一兩 香附童便浸 川續斷酒浸 柱仲蓋酒炒

右為末糯米飯為丸每服七十丸白湯下○一方去人參加砂仁

川芎阿膠艾葉益母草

治孕婦作淋者乃三焦胞絡元氣虛而胎墜壓迫溺道不能通利宜

四君子湯加當歸芍藥甘草稍五六個月加升麻白藥八九個月

加木通大伏皮

一孕婦八個月胎下墜或動面黃身倦飲食少思此脾氣虛弱用補中

益氣湯倍白朮再加蘇梗三十餘劑而安

金匱當歸丸 胎成後理肝健脾胎安子穩

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 白朮去蘆 條芩去朽

右為末煉蜜為丸梧子大每五十丸空心鹽湯酒任下

又方 黃芩三錢 白朮二錢 水煎服能益胎氣

○按右方預防妊娠墮胎之劑

治孕婦嗽則便自出此肺氣不中腎氣虧損不能司攝用補中益氣湯

以培土金六味丸加五味以生腎氣而愈

治孕婦咳嗽

用貝母去心麩炒黃色去麩為末研砂糖拌勻為丸如鷄頭實大

每一丸含化

茯苓補心湯 治孕婦血虛發熱咳嗽燥上壅喘急胸膈痞悶五心

煩熱咳唾吐血懷妊惡阻嘔吐惡安服之

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地黃 陳皮 白茯苓

半夏姜炒 枳殼 桔梗 前胡去蕊 乾葛 紫蘇

人參 甘草 姜黃煎服

醫世全書

卷之六

婦科

○按右方治妊娠咳嗽痰涎發熱喘急之劑

治孕婦心痛不可忍，用銀朱鷄糞炒焦為末二味等分和一處每一錢熱酒調服即出冷汗而愈。

治孕婦心寒

玄胡索 五分 當歸 一錢 乳香 五分 枳實 一錢

右水一鐘煎至半鐘溫服靜臥少頃即愈。

○按右方治孕婦心寒之劑

治妊娠腰痛

破故紙不拘多少瓦上炒令香熟為末燭胡桃肉半個每服二錢空心溫酒調下。

治孕婦下痢赤白腹中疝痛

當歸 五分 白芍 一錢 白朮 五分 白茯苓 五分 澤瀉 五分 木香 三分

按柳 三分 黃連 五分 黃芩 五分 甘草 三分

右水煎溫服○白痢腹痛甚恐有寒也去苓連加乾姜三分

妊娠轉胞不得小便者此湯服之探吐救日愈○胞非轉也由孕婦中

氣怯弱不能舉胎胎壓其胞胞繫了矣而小便不通耳故用二陳四

物四君子三合煎湯而探吐之所以探提其氣上竅通而下竅自利

也一方治小便不通小腹腫脹用八味丸料加車前子一服即通治瘦胎散 治胎肥壅隘動止艱難臨月服之縮胎易產

枳殼 五錢 香附子 三錢 甘草 半

右為末每服二錢百沸湯調服

治胎孕九個月將產消息用猪肚一個依法煮熟五味薑熟食之不

盡再食不可與別人食

一孕婦不語非病也不須服藥臨產日但服四物湯之類產後便語

治婦人懷鬼胎及血氣痛不可忍

班猫去頭翅 延胡索炒各等分

右為末每服半錢溫酒調下以下穢物為度

治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附四兩 桃仁去皮尖 海石二兩 白朮去蘆炒

右為細末神曲打糊為丸梧子大每服四五十九丸白湯下

治孕死得効方 ○鹿角屑二三方寸匕煮葱豉湯和服之立出

治兒在腹中哭 ○用多年空房下鼠穴中土一塊冷孕婦嚼之立止

四君子湯 四物湯 大味丸 八味丸 補中益氣湯俱見補益

二陳湯見痰飲

產六月

凡婦人臨月腰腹痛時未可便服催生符藥亦不可便坐草當宜行立不可荒忙如菓在壳中氣足自脫苟日月未足用藥一催即有橫生逆產之患如此死者乃自殺耳

凡婦人難產者皆因燥澁緊飲故產戶不得開通宜於降誕之月自月之日用長流水調益元散日三服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾未入月則不宜服之以滑右滑胎故也然此藥惟宜婦人壯感胎肥者可服若胎怯者可服保生無憂散

保生無憂散 主方治妊娠身居富貴口厭甘肥憂樂不常食物不節既飽便臥致令胞胎肥厚根蒂堅牢行動艱難因致臨產必是難生入月可服此藥日進二服補其血而順其氣使子易生而胎易落也

當歸 川芎 白芍酒炒各一錢 木香五分 枳壳一錢 乳香一錢 血餘燒存 甘草五合

右刺十刺水煎日二服○凡欲斷臍帶先以繫物墜下後可斷之  
否則胞衣上即冲心而死○若胞衣既破其血已涸或元氣困憊  
用八珍湯斤許加益母草半斤水數碗煎熟時飲救之飲盡再  
製亦有得生者○孕婦臨月預服此藥日進二服則子易生而胞  
易落也○一姓娠子死或未死胎動甚歸湯加紫蘇酒水各半煎  
服死者即下未死者即安

烏金丹

治臨產艱難橫生逆產死胎不下及產後諸病

真阿膠

兩八錢

蘇木

一兩

熟艾

端午日收

去梗二兩

穀麥芽

龍衣

要蛇頭下山的好

右為細末煉蜜為丸如芡實大每用一丸童便和酒化下○凡修  
合此藥揀天月二德天醫生氣吉日疑神安慮洒掃淨室畫大極  
而生兩儀九宮而分八卦所忌婦人雞犬聲喊音要至夜間寂靜

齊戒至誠先念坤口淨心淨身淨天地神呪又念呪曰天精精地  
灵也精也灵也左朝北斗右朝杜辰人逢此藥各保安寧急急如

律令

治臨產其子逆下用縮針刺兒脚心三七刺用鹽少許擦刺處即時順生

治橫生逆產或胎死不下血海乾涸死在須臾百發百中戴雷明

皮硝二錢壯者三錢虛者加大附子三片用酒半鐘童便半鐘入

一婦人胎死腹中服皮硝下穢水肢躄倦怠氣息奄奄用八珍湯倍參

木加桂姜調補而愈

治難產及橫生逆產

蛇退皮焙乾一條為末每服五分黃酒調下立效

治橫生逆產三五日不下死在須臾

用往下蛇退一條長尺餘者燒灰石性鴨鵝糞等分為末黃蠟為

凡一个皮硝化水吞下

治婦人臨產心慌驚恐怕死致令難產用金箔大者五片小者七片將金入鍾內水少許用指研勻再添溫水至大半鍾下面先令一人扶產婦虛坐又令一婦人用兩手將大指按定產婦兩肩上方將前藥溫服其胎立下如產月未起又能安之

治橫生逆產死胎不下其効如神  
柞木刺枝一握淨洗剉碎要一葉一刺者處也。有之甘草一錢長流水煎熱服二三次立下

治逆產須更不救母子俱亡 華陀方

蛇退一條 蟬蛻十四個 頭髮一握並燒灰

右為末分作二服酒調下須更又進一服

難產破水三五日不下將死未絕者神効 江月池傳

魚鱗用大者三十香油浸過燈上燒之滴下油入酒內其灰為細末酒調服之立下

催生湯 治胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澀

五積散去麻黃加川烏附子南星阿膠炒杏仁木香

治姙娠產五七日不下垂死者及產婦交骨不開

當歸 川芎各一兩 自死乾龜壳一個 酥炙 婦人頭髮一握 燒存性

右剉細每服三錢水一盞半煎服約人行五里不問生死胎立下

其油髮用生男女者交骨不開陰氣虛也芎歸湯主之

一治死胎不下兼難產及橫倒生桂心為末每二錢痛陣家時溫薑便調下

治難產滯漿胞乾胎不得下  
香油蜂蜜各一碗和勻用銅鈹內慢火煎一二沸掠去沫調滑石

末五錢頓服外以油蜜抹母腹中下  
灸難產 先露手足灸婦人右脚小指頭尖三壯立產

治胞衣不下 用伏龍肝研末每三錢溫水調服

治胞衣不下秘方  
用草麻子十四粒去壳研塗兩脚心衣即下可即洗去如不去則  
腸頭出如此時就以此藥貼頂心縮回其腸多用此藥不妨如腸  
入則洗去神效

盤腸產 每臨產則子腸先出然後產子其腸不收名曰盤腸穩婆以  
醋水各半煮熱噴產婦面背才收不可不知古方以草麻子仁四  
十九粒研塗產母頭頂腸收上急洗云其腸若乾以磨力水少許溫  
潤之再用磁石煎湯服之即收止磁石須陰陽家用有驗者若以水  
噴母面背恐驚則氣散○方以半夏為末搐鼻中腸自止

治盤腸生產花腸俱出用大薊搗汁和醋在盆內將生腸放汁上須臾  
即止今產婦睡一日將芭蕉莖塞陰戶即已

臨產腰腹作痛取好乳香一塊如小指頭大濃磨水一合盪溫服後破  
水却進催生藥在前用柞木枝者是

治產難瘵心不下者 蛇退燒灰用射香少許研細溫酒調下立產

一胞衣不下 用雞子清三個去黃以酸醋一合和之啜入口中即下  
婦人胞衣不出胸腹脹疼手不可近用失笑散滾酒調下惡露盡則下

一胞衣不下 令產婦啣自己髮尾於口中令嘔噦衣即下  
治倒生手足冷口禁 以葵子炒令黃搗為末每二錢酒調服則順  
八珍湯 芎歸湯俱見補益 五積散見中寒 失笑散見產後

產後

產後脈洪數○產前脈細小瀆弱多死○懷孕者脈主洪數已產而洪數不改者多死○產後諸疾以藥治之大補氣血為主○大凡產前不可用熱藥產後不可服涼藥

產後傷寒不可輕易汗下恐產時傷力其發熱有去血過多有惡露不盡有三日蒸乳發熱或早起勞動或飲食停滯俱有發熱惡寒狀類傷寒不可便用發表攻裏之劑凡有傷力發熱或早起勞動發熱或去血過多發熱脈必虛大無力內無痛者此熱非有餘之熱也乃陰虛不足生熱用芎歸調血飲加減治之治產後諸病無不奏效如太熱不退必加炒黑乾姜神效乾姜性熱能引血藥入血分生新血引氣藥入氣分補氣

芎歸調血飲 主方治產後諸病

當歸身 酒洗 川芎 白芍 火煨切片懷生地黃 酒蒸黑

白木 去油 薑 白茯苓 皮陳皮

草 炒初產臨服加童便一匙好酒半鐘同服是法行瘀血退熱

右劉作劑生薑一片棗一枚水煎溫服看病加減于後

- 一產後昏憤不語加荆芥
- 一產後看氣惱加木香烏藥
- 一產後生腸不收加黃芪人參
- 一產後兩脇痛加青皮肉桂
- 一產後嘔吐不止加砂仁半夏地黃
- 一產後泄瀉不止加黃芪乾姜炒去地黃
- 一產後瘀血不行心腹兒枕作痛加官桂五靈脂蒲黃玄胡冊皮去熟薑
- 一產後去血過多頭暈眼暗口禁 荆芥人參乾姜炒黑
- 一產後胸膈脹悶加砂仁枳實山查厚朴
- 一產後口苦咽乾加麥門冬
- 一產後發熱不止加炒黑乾姜
- 一產後咳嗽加五味杏仁
- 一產後吐痰加半夏貝母

一產後惡露不行加益母草牡丹皮加童便和酒服

一產後血大下不止別用加蒲黃炒黑入前湯藥調服

一小產後心腹痛去白木茯苓加玄胡牡丹皮桃仁紅花青皮澤蘭

一產後驚悸怔忡加遠志麥門冬酸棗仁

一產後驚悸亂語精神不定用好朱砂為末每服錢許酒調服

○按右方治產後諸虛百病宜加減用之

家傳黑神散 治婦人胎死腹中胞衣不下敗血攻心眩暈欲絕并產

後十八症

當歸一兩 赤芍一兩 白芍一兩 生地黃一兩 熟地黃一兩

香附兩炒一兩 五靈旨一兩 蒲黃兩炒一兩 乾姜兩炒一兩 玄胡索一兩

棕灰一兩 乳香五錢 沉香五錢

右為細末每服二錢童便和酒調下產後十八症俱童便酒下

尖突散 右產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不知人事及尋常瘀血

積血作痛并小腸氣痛加玄胡索

五靈旨炒蒲黃炒各等分 酒煎熱服或半水半酒煎○產後小腸

作痛成塊俗名兒枕痛○以手按之腹愈痛此是瘀血安服此○

若按之不痛是血虛空四物湯加參木茯苓○若痛而作嘔是此

虛空六君子湯○若痛而作泄是脾虛空六君子湯加肉豆蔻○

一產後惡露不行攻冲心腹疼痛或眩暈寒熱交攻益母草到一

大劑水煎去渣入童便黃酒各一盞溫服立効

按右方治產後惡露不行敗血為病對症選用

五積散 新產之後以此藥祛除敗血補生新血調和榮衛滋養臟腑

使陰陽不相勝負邪氣不能相干則無寒熱之患又治新產氣虛或

外感寒邪頭痛身痛發熱惡寒或但發熱者並加米醋少許同煎服

○按古方治新產諸病及外感寒邪之劑

當歸羊肉湯 產後虛勞有因生理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢麻倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺

當歸酒洗七人參七錢黃芪一兩生姜五錢

右剉用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎至四盞去渣作六服早晚頻進

參歸湯 治產後諸虛不足發熱盜汗內熱補熱等症

當歸身 人參 各等分

右剉散用猪腰子一個去膜切片子以水三升糯米半合煮百二十根煮未熟散清汁一盞入藥三錢煎至八分不拘時服

三分散 治產後日久虛勞發熱

四物湯 四君子湯 小柴胡湯 加黃芪

按右方治產後虛勞諸虛發熱宜之治

腰子粥 治產後虛勞發熱

猪腰子一對去白膜切作柳葉片同鹽酒拌先用粳米一撮入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作會生狀空心服

治產後嘔吐不止

薑汁 童便 調血竭末服

治產後惡露過多不止

百草霜一兩 井花水一鍾炒過鹽一捻水調服

治產後血暈不省人事眼黑耳鳴用

當歸 川芎 荆芥 各等分 ○剉散水煎入童便服

治產後不語

人參 石菖蒲 石蓮肉 去壳留心 水煎溫服

又方治產後目閉不語

白礬生研末每服一錢熱水調下

獨參湯 治產後血暈下血過多不省人事者氣血大脫而神不用也

兼治一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴自汗盜汗或氣虛

脈脫手足逆冷蓋血生于氣故血脫補氣陽生陰長之理也

人參二兩水一碗煎半碗溫服故用人參甘溫益元氣之品可以

固氣可以生血身熱氣急者加童便一鍾身寒氣弱者加大附子

三錢外以炭火以醃醋沃之使醋氣薰蒸入鼻則能收斂神氣

治產後血痢小便不通臍腹痛

生馬齒莧搗取汁三合煎一沸下蜜一合調頓服

治產後赤白痢疾

黃芪 人參 白朮去蘆 白茯苓 粟壳 甘草

右各等分水煎服

治產後世瀉

黃芪 白朮 茯苓 白芍酒炒 川芎 乾姜炒

滑石 甘草 右各等分水煎空心服

治產後瘡疾

紫蘇 陳皮 半夏 赤苓 川芎 白芷

青皮 良姜 草果 乾葛 甘草

右棗姜煎當發日侵早連進二服

一婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去

用大酒麴炒為末每二錢溫酒調服能間腹鳴良久仍下際而愈

一產婦大便不通

火麻仁 人參 枳壳 杏仁各等分水煎服即通

一產婦大便七日不通飲食如常腹中如故此腹未滿也用

八珍湯加桃仁杏仁至廿一日服滿欲去用猪胆汁瀉去而安

一治產婦大小便閉結諸治不應令飲人乳而通一用牛乳亦通

治產後咳逆方

用乾柿一个切碎水一盞煎至六分熱呷之即止

治產後陰門不閉發熱惡寒用十全大補加五味子散劑而寒熱退又

用補中益氣加五味散劑而飲若初產腫脹或嫩痛而不閉者用加

味道遙散若腫既濟而不閉者補中益氣湯切忌寒涼之劑

治產後生腸不收

草麻子去壳研成膏貼頭頂心即收再服補中益氣湯倍升麻去

柴胡加益母草

治產後陰門痛不可忍

桃仁泡去皮研如泥用一兩塗即愈  
治陰門癢極不可忍用食鹽塗入即止

○按右方治產後諸疾宜對症選用

十全大補湯 治產後諸虛百損五勞七傷自汗盜汗或內熱晡熱潮

熱發熱或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨脹脇肋腰痛或臍腹陰冷

二便不調或頭頸時痛眩暈目花或心神不寧恍惚不寐或形容不

充肢體作痛或鼻吸氣冷急趨氣促或因飲食勞役起居失宜或更

有一切虛熱之症但服此藥補其根本諸症悉退即四君子湯合四

物湯加黃芪肉桂

○按右方治產後諸虛百病神效

一治產後因子死經斷不行經半載下日小腹忽痛陰戶內有物如百

硬塞之而痛不禁此有瘕也

四物湯加桃仁大黃三稜枳榔玄胡香附澤瀉血竭水煎服  
八珍湯 四君子湯 四物湯 六君子湯 神中益氣湯 俱見補益  
加味道遙散 見調經 小柴胡湯 見調經 五積散 理中湯 俱見中寒

### 乳病

夫婦人者以乳為重性命之根也坐草以後風冷襲虛榮衛凝滯乳為  
小兒所吹或飲而不泄或斷乳之時捨出乳盡出汁停蓄之間為氣  
血搏而腫痛內結硬塊至於手不能近則乳癰之患成矣凡婦人四  
十以下血氣週流此則易療年壽既高血氣耗溢患此則難療矣  
觀音救苦散 主方 治吹乳乳癰腫不可忍

- 金銀花 皂角刺 穿山甲 當歸尾 白芷稍
- 天花粉 瓜蒌仁 貝母 甘草節

右判酒煎服。一方治吹乳用葶藶苦甘湯入無嘴錫壺執即傾出  
用壺口合乳穗上立効

治吹乳神方 凡有兒者名為外吹乳有孕者名為內吹乳可以急治  
葱一大把搗爛作餅一指厚攤乳上以確貯灰火覆葱上須更汗  
出腫立消

治吹乳乳癰海上仙方 朱賓湖傳  
蜘蛛 三個 紅棗 三枚 每棗一枚入蜘蛛一不夾於內炒熟口嚼  
吃用燒酒送下未成者立消已成者立潰

治吹乳腫痛未成膿者用生半夏下不為末將葱白半寸搗和為丸  
裹塞鼻一夜即愈左乳塞右乳塞左鼻神効。一用韭菜地中蛆  
糞研細末醋調厚敷於上乾則再易三次即愈

治吹乳用皂角火燒黃色蛤蚧一不火燒成灰共為細末每服三錢滾  
齊世金書 卷之六 五十一

黃酒調服汗出愈

衝脉飲子 治婦人乳癰初起而又致穿破不得收功

黃芪 每斤兩用桂一錢煎湯拌芪 人參半一錢 白朮一錢 茯苓七分

當歸身二錢 白芍一錢 酒炒 生地黃一錢 酒浸 川芎一錢 柴胡五分

青皮五分 宣木瓜四分 皂角子一錢 甘草三分

右水一鍾半煎至七分食後少間溫服渣再煎服若大便不通加

火蘇仁炒黃連二錢 酒炒

婦人乳汁乃氣血所化在上為乳在下為經若氣血虛弱而不能化生

則乳汁短少治宜壯脾胃養氣血又有怒動肝胆而乳腫汁出宜

清肝火若累產無乳或大便澀滯當滋化源

當歸補血湯 治氣血虛無乳

當歸二錢 黃芪一兩 葱白十根水煎服

三母散 治產後無乳

貝母 知母 牡蠣 使 為末猪蹄湯下

治產婦少乳 用穿山甲燒存性為末空心熱酒調服

又方 用穿山甲 天花粉 各五入猪蹄同煮爛去渣吃蹄食湯愈

治乳汁不行 用核桃仁十個去皮淨搗爛入川山甲末一錢溫酒

調服

乳岩

婦人奶岩始有核腫如蟹螯子大不痛不痒五七年方成瘡初便安多  
服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹  
或如人口有唇赤汁膿水浸滲胸脇氣攻疼痛用五灰膏去其毒血  
生新肉漸已收斂此疾多生於憂鬱積念中年婦人未破者尚可治

成瘡者終不可治宜服十六味流氣飲加青皮  
十六味流氣飲 治乳岩

- 當歸 川芎 白芍 黃芪 人參 官桂
  - 厚朴 桔梗 枳殼 烏藥 木香 檳榔
  - 白芷 防風 紫蘇 甘草
- 右剉劑水煎頻服溫服○乳癰加青皮

治婦人欲斷乳方

- 歸尾 赤芍 紅花 酒洗 牛蒡 酒洗 水煎服

治婦人血氣方盛乳房作脹或無兒食乳脹痛懷寒發熱

- 大麥芽 炒一二兩 水煎服立消

產後乳汁自出乃胃氣虛宜服補藥少之若乳多滿痛用溫氣藥之未  
產而乳自出謂之乳泣生子多不育此症氣血俱虛用十全大補湯

### 婦人雜病

交腸病 婦人有此病者糞從小便出尿從大便出混濁不分必是夏

月伏暑而致須用五苓散加牛蒡海金沙木通通草但令大小便各

歸本臟即安○西園公治臨賴徐少川毋服此藥而愈加車前子

治婦人陰中生瘡如虫咬疼痛

桃葉搗爛綿裹納陰中三四易瘥

凡婦人嬉亂思色久之必有猫鬼相侵以睡不睡情意相通交接昏迷

淫精世痛病人隱而不說不肯言鬼宜用

鹿角屑搗散以水調方寸匕與服即言實也

千金斷產方 婦人有臨產艱難或生育不已而欲斷之

用油煎水銀一白方息空心服棗大一丸永斷其孕且不損人

千金去胎方

用天麴五升清酒一斗煮二沸去渣分五服隔夜勿食旦再服其胎如糜母無所苦千金不傳

流陰痒脫方

燒白礬一味研為末每日空心酒調方寸匕日服三次

婦人陰中寒冷小便澄清腹中亦冷飲食少思大便不實下元虛寒治以八味丸一月飲食漸加木便漸實又月餘諸症悉愈

婦人陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澀滯夕與龍胆瀉

肝湯利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加

山梔茯苓川芎黃柏間服調理而愈後因勞役或怒氣下部濕痒小

水不利仍用前藥開愈

婦人接出血作痛此肝火動脾不能攝血用補中益氣湯歸脾

湯二方而愈若出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

神祕萬靈丹

方上異人傳

專治婦人一切胎前產後諸般病症三十六

種冷血風八十二種風疝氣乳中風淋血聚婦人胎孕不安死胎不

下不過二九胎衣不下只一丸產後腹內攪痛臍下如刀刺者只

服一丸胎前產後赤白帶下嘔逆噎塞心氣煩滿懷胎近產一日一丸

臨產不覺若經脈不通或來頻併或赤白帶下飲食無味面赤唇黑

手足頑麻遍身生黑點血斑者一切諸疾但服一丸細嚼溫酒送下

又治產後傷寒中風躄如板者用麻黃湯下

何首烏

去皮用黑豆拌九蒸九晒忌鐵器

川當歸

酒浸

兩頭尖

各五錢

川烏

去尖用

草烏

去尖用

大茴香

川芎

人參

去蘆

防風

去苦小尾

白芷

荆芥穗

桔梗

米泔浸

麻黃

用水

煮三四沸

去節

甘草

天麻

已上十二味各二兩

白朮

未泔浸

水香

不見火

遼細辛

血竭另研以蒼木半斤米泔水洗過入

右共二十味俱為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼黃酒

送下

五苓散方見中暑八味丸方見補益龍胆為肝湯方見便毒

補中益氣湯方見內傷歸脾湯方見健忘

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, mostly illegible.]*

