

方輿輓

四

疴癖五十八

馬脾風十急慢驚十八

夜啼一客忤一

武 0
589
3

門下
號 589
卷 3



方輿輓卷之四目次

夜啼 客忤

甘連大黃湯

生地黄湯

甘麥大棗湯

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡竜骨牡蛎湯

竜膽湯

馬脾風

麻黃杏仁甘草石羔湯

越婢加半夏湯

參連湯

三黃浮心湯

滾痰散

紫丸

急慢驚

參連湯

桂枝加桂湯

葛根湯

還魂湯

走馬湯

大承氣湯

瓜蒂散

風引湯

龍膽湯

小柴胡湯

大柴胡湯

四逆散

柴胡竜骨牡蛎湯

烏蝎散

理中湯

當歸四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

白通加猪胆汁湯

通閔散

紫丸

雄黃解毒丸

滾痰散

鍼灸法

疔癰

小柴胡湯

大柴胡湯

八神湯

柴胡桂枝乾姜湯

小建中湯

一方

鷓鴣菜湯

錢氏白朮散

平胃散

紫丸

毓嬰丸

灸

方輿輓卷之四

有持二名先生口授

○夜啼 ○客忤

○夜啼ハ夜ナキシ此外ニ驚啼ハ名目モ一ツアリ方
 書ニ夜啼ト驚啼トシ分テ二門ニメアレ凡是ハ差別
 スルニ不及既ニ千金ニハ混メ一処ニ云テアリテ方
 モ治夜啼及驚啼方ナト、云テアリナルホト夜啼驚
 啼治法ニモ別ナキモノシ扱夜啼驚啼、未ル処ハ夜
 分驚テ啼キ癖カツキテ未ルアリ昼モ驚テ啼テソレ
 ヨリ成ルアリ又痼即胎毒ヨリ未ルモアリ夜啼ハ夜分

限テ啼クハ如何云ニ是其クセノツキタルニヨルノ
コ今小兒ノコレヲ患ルヲ見ルニ必竟驚癇ノ屬也又
夜啼トテ別ナルモノニアラス啼呼モ同シ莫シ但シ
発スルニ昼夜ノ異ナルノニ是大人ノ咳嗽ノ夜分ニ
ノニ発スル者アルト同シ大人ノ咳嗽夜分ノニ発ル
モ其因一也異ナル者ニアラス云華人ノ論アリツレ
ト此夜啼啼呼ト同理シ大人ノ咳嗽ニ夜分セツ時夜
アケ前ニ咳スルアリ然レ疝治法ハ一シシカレ小兒
ノ啼ハ多クハ昼ナカスメ夜啼ク故夜啼云テ捨シモ
ノシ若夜不啼メ昼啼ク者ハ驚啼云ヘキシ客ハ生人

異物也云註アリ生人ハ常ニ見馴レス人ヲ云異物ハ
ミナレヌモノヲ云忤ハサカフト訓ス客忤メオト口
キテ啼シ発スルモノシ故ニ夜啼モ客忤モ治法別ナ
レコレニテ夜啼客忤ノ義ハスムシシカレ疝小兒ノ
啼クニイロクアリテ療治ニ臨テ心得テオカ子ハナ
ラヌフアリ一種母ノ乳ノ不足ニヨリテナクアリ故
ニ啼ク者ニアツハ其乳ノフシタツ子テ見ルヘシ乳
ノ乏クメ飢テナクモノ得テアルモノシワルクスル
ト心得違テ治シナスモノシコレハ方書ニトント云
テナキフニテ今日大ニ心得子ハナラヌフシ乳ノ不

足ニクハ者ハ乳サヘ足レハヨキシ而ルヲ反テ甘連
ヤ紫丸ヲ用レハ人ヲ傷シマタ一種腹痛ニヨリテ啼
者アリ其候法ハ子ヲ握リツメルト身ヲ反ラストシ
コレアリテナクモノハ腹痛ニヨル者ト知ルヘシ此
中ハ腹痛ノ治シナセハ啼ハ自ラヤム者也其外小兒
ノ啼ノヤマヌハ多ハ疳癖ニヨルモノシ吾僂スルノ
オフチヤクテ啼クノト云モ多ク疳癖ノナス処シ
○医説曰小兒夜啼有四証一曰寒二曰熱三曰重舌口
瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲
腰而啼此冷証也熱則心躁而啼面赤便赤口中熱腹暖

便一作使

啼時或有汗仰身而啼此熱証也若重舌口瘡則要乳喫
口則乳上便啼身額皆微熱急取燈照口若無瘡舌必腫
也客忤者見生人氣忤犯而啼也

甘連方具初生
雜治条大黃湯

○凡夜啼客忤ハ其原ハ何カラ未テモ多ク胸腹ニ指
ツカヘテアル者シ故ニ先此方ヲ用ヌハコレニテ夜
啼客忤ハ治スルモノシ重キハ此方ニ紫丸ヲ兼用ス
ルシ甘連大黃湯ハ大人ニモ假用ルナキ藥ニモア
ラサレ凡先小兒ニ三歳迄ノ主藥シ故ニ小兒ニ三歳
迄ノ者ハ先初メ甘連大黃湯シヤルシ

生地黄湯 千金方 卷十一 治小兒寒熱進退啼呼腹痛方

生地黄 桂心 各七 右二味以水一合煮取五勺常加甘

草

○此ノ千金ノ主治ニ寒熱進退ノ字カアレ凡コレニ不拘也此方ハ腹痛カ目的シ此方ノユク啼呼ハ腹痛ニヨルモノシ此方僅ニ味ノ藥ニテキ、ソモナキ藥ナレ凡ヨクキクモノシ大藥一貼ニメヨクキク者シ此ヨリ以下ノ啼呼ハミナ疳癖ニヨル者シ此生地黄湯モ昼夜シ分々ス啼クニ用ルシ此方大凡ハ甘草シ加用ルカ良服シヨカルモノシ幸千金方ニ加テアリ

一初生生下右三日
目ノ夜ヨリ四日メ
迄昼夜啼而不止
甘草煎用ナト用
テモ不止是余
生地黄湯ヲ用ニ忽
止レテアリ

千金ニハ加味ノ藥多クアリテ芍藥ナトモ入テアリ而レ凡它ノ加味藥ハイラ又シ千金ニハ加味ノ藥凡ニ七味ニナリテアリ又此主治ニ寒熱進退トアレ凡啼呼ニハ格別制スル程ノ熱ハナキモノシシカシ脈數ナルモノシ

○此方啼呼ニ用ユ啼呼ハ俗ニナキ入ル伝者是也其ナキ入テ不止者何故ナラン腹痛ナルヘシ果メ腹痛ト決シタラハ此方ヲ用ヘシ其腹痛ヲ辨スルノ法小兒ナキ入ル内一時ツ、反張スルモノシ或チヲ握リツメテ啼クモノシ右ノ候アラハ腹痛ノ啼呼ト知ル

へし啼呼中ニツリカエルモノヲ腹痛ト判断メ失ス
 ルヲナキモノシ此方千金小兒傷寒門ニ載テアリ而
 此方今用ルニハ小兒傷寒ニ用ルハ少ナク啼呼
 ニ用ルヲ多シ扱此方ニハ生地黃ヲ用テアレ凡乾地
 黃ヲ用テ良千金ナトニハ生乾熟ト三ツ地黃ヲ用ツ
 ケテアレハ此ノ生地黃モ真ノ生地黃ナルヘケレ凡
 乾地黃ニテヨキモノシ今医ヤ后世ノ方ナトニテ云
 生地黃ハ乾地黃ニテ即千金ナトニ乾地黃トアルモ
 ノシ生地黃云シ是熟ニ対メ乾生地黃ト云シモノシ
 ○又生地黃湯ノ啼呼腹痛ニ混スルモノアリ前医ア

初生兒ノ腹痛ニ
 紫丸ヲ用テアリ
 初メ日連ナト用
 テクシモユルニシ
 一ナキモノハ紫丸
 シ用ヘシカニ初
 メ大黃ナト用テ
 モ痛モ不減モノニ
 紫丸ヲヤリテハ
 益激メ痛ムヲアリ
 其ハ反テ生地
 黃ナト用テヨキ
 一アリ

マリニ紫丸ナトヲ用過メ紫毒ニテ腹痛シナス者ア
 リ混シアヤマルヘカラス○京師金弓長野氏ノ兒年
 未タ期月ニ不盈メ反張メナキイル故生地黃湯ヲ與
 ルヲ二日寸効ナシ其大便ヲ問ヘハ難ニモアラス云
 而レ凡生地黃湯ヲ用テモ効ナキハ紫丸ヲ用テ毒ヲ
 逐シニハシカスト思ヒケル故乃紫丸ヲ與フルヲ小
 粒ノ丸ナニ丸シ一日ノ内ニ与シニ其反張ノナキ入
 ルモノ即愈ユ大便ハ別ニ下利セスメ愈タリ凡テ紫
 丸ニテ毒解スレハ下利セスメ其証ユルムモノシ
 腹痛ニヨル啼呼ニ紫丸ノユク処アルモノシ故ニ生

地黄湯ヲ用テモ不己者ハ紫丸ヲ用ヘシ紫丸ニテ毒
解メ腹痛愈ルモノアルシ

甘麥大麥湯 方具
痛条

○此方ハ啼呼ニ用ルウチニ啼哭伝テキツフモノカ
ナシソウニナク者ニ益ヨシ大人ニナリテハ痲証ニ
テ花逆ノフモナキニモノカナシゲニナク者アリヤ
ハリ其類也

○此方客忤ニモ夜啼啼呼ニモヤルシ初メ甘連大黃
ナトヲ用テモ不愈メ腹ニ拘孛アル者ニ用ユ右ニア
ル拘孛ナレハ益良而レ疝必シモ右斗リニアラスメ

又兒ナクモ丹毒ヲ
登メナクアリ速ニ裸
ニメシルヘシ凡ソ兒ノ
啼ニイロクアリシカレ
ハ意ヲ止ムヘキヲシ

一面ニヒツハリノアル者ニモ用ルシ而レ疝先其際
別シ云ハ、右ニ引ハル者ハ甘麥大麥也左ニ引張者
ハ柴胡ノユク処シ○夜啼客忤ハ總一ニ歳ノ小兒ニ
アルモノシ三歳已上ニ至レハ大抵ハナキモノシ○
一、小兒昼夜啼クアリ初メ毒トメ甘連加大黃ニ紫丸
ヲ兼用シナトメ効ナシ余フト心付テ甘麥大麥ヲ用
テ即効シ見シフアリ胎毒ノ候アル者ハ紫丸ヲ兼用
スルシ此方本方ハ小麦ナレ疝小麦芽ヲ用セカ良シ
夜啼モ先初ハ甘連紫丸ヲ用テヨキモノシ○凡小兒
啼不止者藥方ヨリハ第一衣裳ヤ身内ニ意ヲ注ヘシ

思ノ外ニ刺^{トテ}ヤ針ニサ、レテ啼モノアル^{トシ}○初生
 七夜、中ニ大ニ啼者アリ其片早ク気ヲ付テ脐ノフ
 シ間ヘシ此片ニハ脐帶オチントスル故ニ啼モノア
 リ落テ后ニテモ一日ホトハ痛者トシユ○小兒夜中
 ニフト起キテ家内ヲ廻リアルキ又フト寢処ニ入テ
 寐入り翌日其寔ヲ知ラヌモノアルシ是ラハ昼ノ内
 ハヨク啼モノマ、アルモノシ是ラノ証男女凡ニ廿
 麦大麥、所之也左右ノ凝リニ不拘メ用ユ小兒ハ其
 候不具者シ若心胸ニカ、ル者ハ柴胡ヲ用ユトカク
 廿麦大麥ハ截躁悲傷カ目的シ○又小兒夜啼不止者

ニ遼東丸伝アリ術尽キシ片用ヘシ
遼東丸方選中秘
録嬰孺雜病ニシユ

○凡ソ小兒ノ啼キ入ルニ涙出テ時啼時止者驚ニヨ
 ル者シ涙不出メ啼ツメル者ハ腹痛ト知ルヘシト景
 岳全書ニアリナルホト此通りノ者シ又驚ニテ啼者
 ハ啼声ツヨク腹痛ニヨル啼声ハ其声微ナル者シ又
 驚怖ニヨル者ハ目サメテ居ル内ハ怖カリ眠ル片ハ
 ヒクツキ甚片ハ振動メヤスカラスメ急ニ目覚メテ
 ナクモノシ又驚風ノ驚ト驚啼ノ驚ト異シ驚風ノ驚
 ハ驚ニヨリテ発スルニアラス只コレハ驚悸ニヨリ
 テナル者ノ如クナルヲ以テ云レ者トシユナル程驚

風モ驚啼ノ驚モ其状大ニ似タルモノシ驚啼ノ驚ハ
真ニ驚恐ニヨリテ得ルモノシ又驚啼伝者アリテ小
兒ノ啼ヲ驚啼伝テアレバコレモ驚ニヨリテ啼クト
驚ニヨラスメ腹痛ニヨリテナクト二道アリ

小柴胡湯

大柴胡湯 以上二方並
其癥症条

柴胡竜骨牡蠣湯 方具
痢条

○此三方ハ夜啼ニテモ驚啼ニテモ啼哭ニテモ胸腹
ヘコバム者ニアラシ用ルシ其内柴胡竜骨ハ物ハリ
ニナリテ煩驚トヒクツキノアル者ニ用ルシコレハ

客忤ニアルモノシカシ夜啼ニモヒクツキヲ魚ル
モノアリ何レ煩驚ノモヤウアレハ柴胡竜骨ノ方ヲ
用ルナリ

竜膽湯 方具急
驚条

●此方中ニ柴胡モ入テアリテ柴胡湯ト近キ藥ナレ
凡此方ハ予足搖擲メビククスル処ヘ用ルシ扱此餘
波ニ云ヘキヲアリ入門ナトニ兒哭ノ証伝テ小兒ノ
胎内ニアリテナクアリ伝怪ムヘシ余カ一知己ノ医
人ノ話ニナルホト児哭トモ云ヘキ者アリテアヤシ
ク腹内ニテ鳴ルアリテ一味ノ黄連濃煎ヲ用シニ治

こたり伝入門ニ兒哭ニ一味黄連ヲ用テアリ 医学入門卷十

四胎前子瘕云腹中作鐘鳴或哭者多羊空房下崩亢中
去為未酒下或乾嘔即止又云腹中兒啼者黄連煎濃汁

呻之或青
黛亦好 彼人云古人兒哭ト名ケシハアシラノ類ナ

ルヘシナルホト異ル音腹内ニテスルモノシト云テ

余ニ語リタリ○此方夜啼ニモ客忤驚啼ニモ通メ用

ル此方柴胡劑ト見合セ用ヘシ柴胡ノ如ク此方モ

心胸ニカ、ル者シ云ハ、柴胡ノ証アリテ四支ニカ

、リ微搐シ或ヒキツケナトアル者ニ用ユ柴胡ニテ

モ四支ニカ、ル者ニモ用シ凡四支ニカ、ル者ナラ

ハ竜胆湯ヲ用ルカ効マサルシ○旧本此条ニ紫丸ヲ

載タリ今本ニハ削去タル用ヘキヲアリ凡小兒宿

食ニヨリテ心下ニフサカリテシユツナカリテ夜啼

スルモノアリ紫丸主之シ又夜啼驚啼ニ紫丸ヲ用モ

不大便ノ処ニ用ルシ又大便秘利メモ内ニ毒ハケシ

キトカ或腹滿アルトカスレハ紫丸ヲ用ルシ

○有欲飲乳到口便啼身額皆熱者者其口若無瘡必喉

舌腫痛 云云 毓春園小冊

○治小兒夜啼方 生々編 青黛量大小水研服之藻曰甘連

湯如此物佳 同エコレヲ用ルナラハ青丸ヨシ而シテ

マリ効ナキモノシ

○當歲夜啼多在實兒也此証大便便秘是胎毒或乳癖所致也紅花湯走急丸宜之又有一種之乳故啼者是非真夜啼可慎下劑同上

釣藤飲

真ノ夜啼ニ用ルシ是ノ方ハ何カナシニ夜啼ニヨクキク藥シ諸類方モ有シ凡此ノ方ニマサル者ナシ

○馬脾風

○馬脾風ハ源如何ナル義ヲ以テ命セシマラ其義ヲ解セシ者ナシ先其病ハ小兒ノ暴喘シ何ヤラノ方書ニ馬脾ハ小兒之暴喘ト註セリ是ヨキ解シ其病ハ大人ノ喘息ト同シ華語ニ云哮喘ト一ナル者シ平生ノ痰喘トハ異シ馬脾ノ状大人ノ喘息ト同ノ但其異同ハ緩急大ニ異シ大人ノ喘息ハ持病ニナリテ発作進退アリテ急変ナク一旦治メモ復発シ其発スル中不愈メモ死ニ至ラス馬脾ハ急変ノアル者ニテ其処ニテ治スレハ再ヒ発セズ不治中ハ其処

沉香散紅花散
俱三胎毒ヲ治スル
ノ藥

ニテ死スル者ハ是其大人ノ喘息ト異ナル処ニ扱方
書ニテハ大人ノ喘息ト小兒ノ馬脾ト一也云テアル
ハ通例ナレトモ今按スルニ大人ノ病ト能ク相称フ者
アリ小兒ノ馬脾ハ大人ノ肺脹ト同状成者也肺脹ハ
目如脱状擡肩鼻扇俗云小鼻ノ動アリテツ子ノ大人ノ喘息トナカ
フモノトシ馬脾ハ甚難証ニメテ人ニ九人ハ死ル者シ
其因ハ原ハ胎毒ヨリ来ル者ニテ外邪ニサツハレテ
来ル者トモ云何レ毒ニハ相違ナキハ是ヲ以テ近世
馬脾ハ毒ヲ去ルカヨシ云テ沉香散紅花散沉香散ハ
金花散ノ
一類ノ方ニテ藥味少々異同アリ紅花散ハ五物紅花
湯之類方ニテ是モ少々藥味異同アリ紅花散多味ノ

藥ハ本邦医家ノ傳書ナトシ用ル人アリ是一説ニ似
ナトニ引テ有方トシ
タレトモ而レトモ馬脾ノ癸々ハ并毒ヲ除カントスルハ
遅キトシ急則治其標ニテ此処ニテハ毒ヲ棄テ標ヲ
治セナハナラヌモノトシ若毒ツヨキ并ハ麻杏甘草石ナ
トニ紫丸ヲ用ルニハ不若トシ

麻黄杏仁甘草石膏湯 方具喘条

○此ヲ馬脾風ニ用ルハ金匱ノ肺脹ニ小青竜加石ヲ
用ル例ニテ用ル金匱歎嗽上気篇云肺脹歎而上気
煩躁而喘脈浮者心下水小青竜
加石膏湯主之小青龙ニテハ此処ハ遅キ様ニ麻杏甘草石ハ單
行ノ方故効マサル様ニ覺ユ

○凡馬脾麻杏甘石ヤ越婢加半夏ヲ用ルハ大カク
 滾痰散子紫丸ヲ兼用スルハ麻杏甘石ヤ越婢加半夏
 ノミニテユク云フハ少ナシ馬脾ニ麻杏甘石ニ滾痰
 散ヲカキタテ、用ユ其具合ヨキモノシ是ハ小兒家ノ
 傳ニテ一秘訣ナリシ余受得タリ滾痰ノ重キハ紫
 丸ニ紫丸ナキハ雄黃解毒ヲ用ルハ紫丸雄黃解毒
 何レニテモヨシ同場ニ麻杏甘石ハ無汗メ用シ馬
 脾ノ場ハ小青竜ニモアラヌ勿論桂枝加厚朴杏仁ノ
 場ニモアラヌメ麻杏甘石ノ場成者ハ是陽明ニアリ
 テ太陽ニアル者ニアラヌ此ニ熱モアル者ハ麻杏甘

石ヤ越婢加半夏ハ痰ヲ制スル劑也滾痰紫圓三黃湯
 心ノ類ハ毒ヲ逐フ方シ又一種心下ニ痞塞スル者ア
 リソレハ痰ト毒トヲ不問メ參連ヲ用ルハ是ニテハ
 復越婢加半夏ヤ麻杏甘石ノ類効ナシ葛氏湯モ亦參
 連ノ處ヘ近キ主治ナレ此ホハ不用也痞塞ヲ開
 ヲハ參連ノカタツヨシ

○馬脾ハ即小兒喘息シ此証面色青鼻煤頭垢顛顛邊
 汗出如油頭髮如撫者必死假令痰喘暫止亦發驚而死
 雖然能飲乳者得治十中二三毓春園ナルホト小兒ノ
 馬脾ノ類ニ髮ノ撫テタル様ニベタリトナリテアル

ハ必死し違ハヌモノシ

越婢加半夏湯 方見喘哮条

○此方麻杏甘石ヲ用テモ勢ノ少チケヌ処ヘユクシ

麻杏甘石ノアトヘツク薬シ此半夏ハ嘔吐ニモヨル

ニアラス金匱ニ越婢加半夏ヲ用テアル故彼ヲ守テ

用ル脱批脈浮大者越婢加半夏湯主之金匱效嗽而上気此為肺脹其人喘目如

ハ馬脾ヲハナレテ小兒ノ久效不止ニ効アリ又用竟

ヘニテ小兒ノ麻疹痘瘡後ノ效嗽ニ別メヨクキク者

シ麻疹痘ノ後ニ此方ヲ限リテ用ルヲシカシキ様ナ

レ氏是ハ必竟用竟し即真邱子ノ仕覺シ

○是ハ麻杏甘石ヲ一段越シテ目如脱状トテ死入ノ

目ヲ見ル如ク且此ニテ鼻翁ナトモアルハ麻杏甘石

ノ処ニテハ鼻翁弱ナレ假令アリテモ其キサレハ

此ニテ喘ノ勢ハ反テ劇シカラヌ麻杏甘石ノ処ニテ

ハ外見ニテハ喘ハ劇シキモノシ越婢ハ煩躁ハ劇シ

ケレ氏喘ハ反テ外見ニテハ麻杏甘石程ニハ無者シ

参連湯 方見痢条

三黄泻心湯 方見失血条

○ニ方一類シ心下へ痞塞シタル者ハ前方ヲ用ル痰

喘ヲハナレテ心下ヲサハク作ハ痰喘モ自ラ治ル者

し効ノハヤキ者し心下痞塞重キハ参連軽ハ三黄し
 此参連ニモ呉茱萸ヲ加用ルし越婢麻杏甘石ノ証ハ
 治メモ又ルキ者ナルカ此ニ方ノユク証ハ此方ニテ
 ハヤクヤム者し手際ニ効シニセルモノし其証ニ動
 悸ナト心下ニ至テツヨク升ルヲナトアリテモ此方
 ニテ能止ム者し参連湯ハ少シ勢ハケシキ者ハ呉
 茱萸ヲ加ルカヨキし呉茱萸ノ加味ハ龜井道載ニ出ツ
 呉茱萸ハ参連ノニ味ヨリハ少シ減メ加ルし参連湯ハ
 華方ニモアル所主治異し参連湯丹下利噤口不食者
入参上黄連一两水煎終
日時叩之如吐再強飲但得一叩下咽喉又入参ト吳
即好如蓮肉三匙在妙右方彙痢病門

茱ト伍合セシ方モアルし入門ナトニ参萸湯伝方ア
倉卒問檢入門
未見此方有 即入参呉茱ノニ味し主治ハ格別ナ
 レ凡右ノクニ合ノ方昔ヨリアルし既ニ呉茱萸湯ナ
 トニモ入参呉茱トクニ合メアリ何ニモセヨ右ノ参
 連湯ニ加呉茱ヨキモノし
 ○麻杏甘石ノ処ニテモ越婢加半夏ノ処ニテモ心下
 ニ衝テ来ル乎若衝テ来共心下痞硬メアル者ハ参
 連ヲ用ヘシ麻杏甘石ヤ越婢ノ証悉ク具テモ心下ニ
 云分有者ニハ其方ハヤラレヌし写心ハ参連ノ痞硬
 ホトニハ不至其勢モ参連ニ比スレハ緩ナルモノし

浮心ノ処ニテモ麻杏甘石ヤ越婢ノ証アリテモ心下
 ニ云分アレハ其它ノ証ヲ弃テ浮心ヲ用ルシ若心下
 痞メ腹滿スル并ハ紫丸ヲ兼用シシカシ腹滿アレハ
 心下ニ云分ナク心下ニ云分アレハ腹滿ハナキ者シ
 故ニ馬脾ニハ浮心ヤ參連ニ紫丸ノ兼用スルナト、
 云フハ大氏ハナキモノシ又參連ノハケシキハ熊參
 湯ノユクフモアレ氏太氏ハ參連ニテスム者シ又三
 黄浮心ノ処ヘ大黃黃連浮心ニテユキテモヨキシイ
 ツレ右ノ方ハ心下痞硬ニ不至メ濡シ目當ニ用シ若
 此ニメ心下ニ痞塞者ハ前ニモ云通り參連湯之所之也

滾痰散

紫丸

以上二方
並在別集

○上ノ麻杏甘石ヤ越婢ノ処ニテ二方ヲ兼用スルシ
 滾痰散ハ痰喘ノツヨキ者ニ用ユ紫丸ハ毒氣ノツヨ
 クメ上ヘツ、カケテ来ルト思者ニ用ユ此ニ用ル滾
 痰散ニハ甘遂ヲ三分一程加用レハ益ヨシ華方ニ馬
 脾ノ藥ニ甘遂ヲ用テアリ余ハ滾痰散ニ加用ユコレ
 ニハ不若モノ青礞石ナトニテ益ヨキトシユ又馬脾
 ニ用ル紫圓ハ双紫圓ナレハ益ヨシ叔滾痰散ヲ馬脾
 ニ用ユ一奇術アリ甘遂ヲ不加メ輕粉ヲ加用ヘシ甘

腹滿ヲ目當ニ紫丸ヲ用ユ

遂ヨリハ効大ニマサルシ輕粉ハ滾痰散ノ三分一ヨ
 リハ少ナク用ルシ是ニ輕粉ヲ用テモアトニテ咽ノ
 腫ル、ナト、云フハナキシ此処ニテハ輕粉ハヨク
 痰喘シサハク者也若滾痰散ニテモアリ合サス片ハ
 麻杏甘石ヤ越婢ノ類ニテモ何レ煎湯ノ内ヘカキタ
 テ、用テモヨキ者シ輕粉ヲ滾痰ニ加ルハ散藥一匙
 目ナレハ輕粉ヲ二分斗モ入ル、シ馬脾ニハ滾痰散
 ノユク処ハ紫丸ヨリハ多クアル者シ又消鎔丸ヲ馬
 脾ニ用ルフアリ而レ片急劇ノ処ヲ開ハ滾痰散ニ輕
 粉ヲ加ルニハ不如シ消鎔ハ緩ナル処ニテ其カハリ

衡一作衡

ニハ根逆除ク趣向シ故ニ緩ナル処ヘハ消鎔丸ニテ
 エクカヨキシ急ナル処ニハ滾痰散ニ加輕粉ヨキシ
 又無價散云テ馬脾ニ用ル方アリ余ハ不用シ無價散
 ハ寸遂ト輕粉ト一処ニシテ用テアレ片余カ用ル処
 ハ滾痰散ニ甘遂ヲ加用ル子不尔ハ輕粉ヲ加用シ寸
 遂ト輕粉ト一処ニ加用ル云フハナキシ本草卷之十
 引冠衡全切心鑑云小兒風熱喘促悶乱不安謂之馬脾
 風日遂麩包煮一匙羊辰砂水飛二匙羊輕粉一角為末
 每服一字漿水少許滴油一小匙抄藥在上沉下去漿灌
 之名無價散 医学入門卷十五馬脾風條馬脾風散辰
 砂二匙羊輕粉五分甘遂一分羊為末每去漿水灌之神
 許上滴香油一點抄藥在油花上沉下却去漿水灌之神

本草卷之十

○馬脾風ハ紫丸ノ類ニテ逐テモナカク届カ又者紫丸ヲ用テモ胸ニ逆スル処カサハケ又者馬脾ニハ消鎔丸ヨク効アルモノシ童キ者伝ヘモ三五丸用テエルムモノシ其アトニテ腹滿不大便ノ証ニテモアラハ紫丸ニテ下セハ全愈ルモノシ一歳許ノ小兒ノ輕キ馬脾ハ一丸用テモ効アルモノシ

○馬脾全躰ニ汗出ルウチニ額ニ玉ノ如キ汗出テ其汗不流ノ常ノ如クサラクトシタル熱ノ汗ニ非ス是后世ニテ云絶汗脱汗伝是也又頭髮ノ撫タル様ニヘツタリトナルアリ右ノ髮ノ撫タル様ナルモ汗ニヨルトミユ上ノ二候ヲ見ハス者ハ死踵ヲ施サスト知ルヘシ

○凡馬脾ハ風邪ニモヨルニ非ス又水飲ニヨル者ニモ非ス皆是毒ヨリ成者シ是多年苦心ノ治ヲ施シ見テ毒ニヨルヲ悟リタリ○馬脾ノ治法前ニ挙タル所此症ハ甚危急ノ者ニテ馬脾ノ名ヲツケル様ニナリテハ一日モ持タヌ程ノ者シ早ク其初起ノ機ヲ知テ藥ヲ施ハ治スル者シ危篤ノ場ニ至リテハ前ノ方法ニテモ不治者多シ其内腹滿ノツヨキ馬脾ハ紫丸ヤ走馬ニテ萬一トリトメルヲアルモノシ又馬脾鼻

扇ナトアル様ニナリテハムツカシキ又前ニ初起
ノ機ヲ知テ治ル伝ヘ所微喘ガライノ処ニテハ馬脾
トハ云レヌシ此ニ奉シ麻杏甘石マ滾痰シ初メトメ
皆馬脾ト命セラレ、処ニテノ治法ヲ奉シ

○段々試ムルニ小兒ノ痰喘咳嗽ハ悉ク胎毒ニヨ
ル者シコレヨク試タルトシ其痰喘咳嗽ヲ登ニ當
リテハ其痰咳ヲ制メ痰咳治マリタラハ胎毒ヲ治ス
ル丸薬ヲ湯薬ノ類ニテ用ヘシ

○回春ニ一挺金伝アリ回春卷七此方馬脾伝迄ニ不
至メモ小兒ノ喘咳不止者ニ用テヨク効アリ余往年

阿列ヘ下リシ片小兒久嗽喘ヲ帯ヒ百薬効ナキ者マ
、アリ此方ヲ用テ効ヲ得シト多アリ小兒ノ久嗽痰
喘ノ不止モノ多クハ胎毒ニヨルモノ故此方ヲ用テ
毒ヲ驅ル片ハ或痰水ヲ下利メ愈ル者モアル且此
方ハ甘クメノミヨキ薬故小兒モヨクノムモノシ

○一捻金ハ牛黄奪命丸トモ云シ

○右世ノ小兒家杯ニハ小青竜麻杏甘石越婢加半夏
ノ所ヲ五虎ニ陳湯ニテオシテ仕マウシ

○真良湯紫丸其餘ノ丸散ニテモ愈難キモノニ用ル
シ此ハ阿品上郡ノ方也先年石川道全ニ傳ハリ玉ヒ

シナリ

○急慢驚

○急慢驚ハ即所謂驚風也。扱驚風ハ前ノ夜啼客忤馬脾風ナト、チカフテ脈証ノ多端ナル病ニテ治法モマチク実ニ小兒ノ大病劇疾也。馬脾ナトハ劇ニキ病ナレ。凡脈証モ少ナク治法モ多端ナラヌ。其故ニ諸方書ニハ驚風ノ夏ハ丁寧詳悉ニ論メ方薬モ多ク具テアル。而レ凡古来ノ論皆分配ノ説ニテ其説ハ一

入門卷十五諸驚門
云急驚屬府易治
慢驚屬藏難治

景岳全書云微而緩者謂之發々搐暴而甚者謂之驚風發搐不治則成驚凡風トアリナルホト發搐ハ驚風中ノ一曲症
山根ヤ白水田中ナト、凡マテハ小兒ノ驚風ノ治法ニテテ古法ヲ用トイハル但症ニヨリテ葛根ナト用ル位ノフニテアリシカ段マヒラケテ今ハ驚風ヲ傷寒ノ治ト同クニ直武四逆白通逆モ用ルマウニナリシ是又山根時分ヨリハ大ニテケタルニヨル
凡驚風ハ先直視上竄モノレヨリ煩躁ヲナスモノナリ至テ

ナラ子凡先其大畧ハ急驚慢驚脾風ト三道ニ分テ其ワリ附カ急驚ヲ肝ニアテ慢驚ヲ脾ニ屬シ慢脾風ヲ脾ヲ敗ルノ極ト立タル者也此配當ハ諸方書ニナ然リ又書ニヨリテハ急驚屬腑慢驚屬臟ト立テ藏府ニ分ケタルモアリ是ハ前ノ肝脾ニアテルヨリハ少シサツハリシタル様ナレ凡何レ藏府ヲ以テ立タルヲ故簡要ナラス中華ノ説ハ悉ク右ノ説ヲハナレヌメ小異同アレ凡此ナ如此近来吾邦古医ノ道興リテ其古方家ニテノ發揮ニ瘞病ニ依テ驚風ヲ療スルヲ始マレリ是中華ニハ一向ナキヲ是見識ナルヲテ

ハケレキモノハ初
ノ直視上竄ル処
テスツト死スル者
リソレハ煩躁ニモ不
至モノシ又急驚風
ヨリ慢脾風ニ至ル
ハ一日半ヨリ中ニモ
ルモノシ或始ヨリ慢
脾ヲナス者アリ右
直視上竄ルモノハ
リニア死スルモノハ
急驚風ハモアマリ
ニハナキモノナリコレ
シハルニ紫筋ナト
モナケレバコレハ赤
ノ羨ナルハキ子慢
驚ハ目モ半開半合
ニテテモ微ナクテ
手足モ温カナル者
シ慢脾ニ至ルハ目
モサツハリ開キテ
微チクモナクテ足
モ冷ルモノシ煩ハ
イツテモソフモノシ
理中杯ノ場ニテモ
煩ハソフモノシカ
理中ノ場ノ煩ハカ
キモノシ又慢驚ニ
内熱ハケレキアリ
急驚ニ内熱ナル
モアリ急驚ニ内寒
アリトハ外形ノ急驚

ハアレバ而レバ瘧ニヨリテ療治スル云テハ未驚風
ノフハ尽サヌシツレヨリハマダヨキ主方アリ其主
方云ハ何テモベツタリト傷寒論ニヨルカ的実シ必
竟驚風ヲ傷寒ニメ療スルシツフスレハ先慢脾風ナ
ト云名目モ拂ヒ捨テ位ヲ陰陽ノ二ツニ分テ名目ハ
急ト慢トノ二ツニテスマスシ極意シ云ト此急慢モ
假リ名ニテ療治ニ臨テハ無テモヨキナレバ何ツ
名目ナケレハ無キ名ハ呼レヌ故幸方書ニアル名ニ
テ乖キシ目ニモアラサル故コレシ假リ用テヨキシ
急慢ヲ陰陽ニ分ツハ急即陽位也上太陽ヨリ下陽明

ノ形ヲ見ハレテア
リテモ右ナトモ潤
ヒ渴ナトモナキノ
類又慢驚ニメ熱
アリトハ分ノ形ハ
慢驚ニメ右カハ
テ熱ナトアルノ類
凡テ錯綜メ知ルハ
シ右ノ慢中ノ急驚
急中ノ慢驚ハ傷
寒論ノ表熱裏寒
外寒裡熱之治法
ト同シ

逆三陽ノ脈証ヲ皆此急ノ内ヘスベルシ慢ハ陰位ニ
テ三陰ノ脈証ヲ皆スベルシ其三陽ニ取ヘキ急驚ノ
脈症ハ先一番ニ上竄直視云テソラメシ即エニツメ
即直テ眼中ガスワルシ是驚風ノ第一ノ候シツレカ
ラ角弓反張トテソリ返リテ彼瘧病状ニナリ或搐搦
トテテサキ足サキシ引ツケタリ即或ナヤシタル様
搦即ニナルシ其甚キハ握拳トテテテ握リタル様ニナ
ルアリ即搐ノ劇キ者シ又顛動云テ身体カ振ヒ動キ
テ不止甚キハ牙関緊急メ声モ一向發セヌ者シ形ハ
勿論右ノ通ニテ此時ハ遍身壯熱テ身熱凡惡熱凡云

此露晴ハ目ヲ
 オカシクメ目ノス
 ワルニテモナク脱
 シタモノアリテ上
 ヘモ見アケス下ハ
 クレル気味シクワ
 ク云ハ羊関羊合伝
 ト云ハアタル此
 証ハ附子ノユク
 病位ヨリソコ
 目出テ来ル者
 陽突ニアルモノ
 故ニ承気ヲ用テ
 アリ

ヘキ程ノ者ニテナカニハ口中ノ気ナトモ熱シ面色
 縁々トメ唇モアカク不大便メ腹シ候フニ満メ心下
 最硬満メ脈多ハ浮緊洪數シ兼見ハスモノシ或喘ノ
 ソフモアリ又大渴引飲ノ者モアリ小便ハモトヨリ
 赤淡シコレタケハ急驚ノ陽症也而シ此症ニナク兼
 見ユル者ニ非レ凡兼具ヘサル者ハ輕症シ重症ニ至
 テハミナ此ホノ証ヲ兼具ユルモノシ故ニ先コレタ
 ケシ急驚ノ定脈定症トナシオキテ間違ワヌシ扱慢
 驚ハ三陰ニ位スル故其諸証ハ皆急驚ト相反メ表裏
 シナスモノシ先慢驚ノ脈証ノ第一ハ露晴トテ目シ

羊関羊合メコレシ臨ニ睡テ居ル凡ナク醒メテオハ
 凡ナク分ラヌモノニテ気味ノワロキモノシ其露晴
 ノ間ハ昏睡メ居ルモノニテ真ニ睡テ居ルニアラス
 目シアキテアル故モノシ云テモ忘ナクメ人莫ヲ省
 セヌモノシ急驚ノ上竄直視トハ大ニ勢ノ違フタ者
 シ露晴ハ即少陰ノ但欲寐也是也手足モ十指ヲ或開
 タリ或合タリシテ似搐不搐ソウメ見テ居ル内ニ時
 タハ手足口眼ヘビククト牽掣メ来ルモノシ大便ハ
 多ハ下利マレニ吐ヲ兼ルモアルシ又四肢微厥シ甚
 キハ厥冷ニモ及シ又裏寒外熱ノ者アリテ厥逆ニモ

不及ノ裏寒ナル者アリ面ヤ唇ノ色モ青ト子淡白ト
カテ脈ハ多ハ沉遲微細メ四ツヲ互ニ見ハスナカニ
ハ細數ヲ見ワス者モタマクアルハ先是タケハ慢驚
ノ定脈定症トスルシカフシテ見シハ急慢ノ二症モ
三陰三陽ニ不出シ如此陰陽ニ位ニツ、メテエケハ
治法モ別ニ驚風ノ藥シ不立メ傷寒論カラ推出テ波
方劑活用メユカルシ古来ノ方書ニハミナ驚風藥ヲ
別ニメアリ非シ而レ斤ナカニハ假用テ効ノアル方
モアル故此門ニ載タレ斤何モ是ニ限ルヲハナキシ
コレタケハ屢用テ屢効ヲ得タル者ノミヲ挙タルシ

○千金ニハ急驚ヲ陽癇ト云慢驚ヲ陰癇ト云アリ而
斤コレモアマリ正シカラサル名目シ急驚慢驚ノ字
ニテ足ルシ癇字ヲ附ルト挾フナリテ来ルハ扱驚風
ノ来ル三道アリテ外邪ト飲食ト癇トノ三ニ其外
邪ニ癇ヲ兼テ来ル者アリ飲食ニ癇ヲ兼テ来ル者ア
リテ但癇ノミニテ驚風ヲ発ル者少シ千金ノ陽癇陰
癇ノ外ノ扱ニテ名ケシ者ニテ常ノ癇ト異シ扱慢驚
ノ来ルハ急驚ヨリツ、キテ慢驚ニナルアリ又吐瀉
ノ后続キテ慢驚ニナル者アリ直チニ少陰厥ヲ見ハ
ス者ナキト見エ未タ初ヨリ慢驚ヲナス者ヲ不見シ

シカシ吐浮カラ直ニ暴ニ慢驚ニナル者ハアルト扱
驚風胎毒ヨリ来ル者多クアルト又胎毒ニヨラスメ
登ルモアルト故ニ一藥ニ云レ又シ痲ヨリ来ル云モ
ハ其来ハ胎毒ナルト外邪ノミニテ驚風ヲ登ル
者アリ飲食ノミニテ登ルモアルト痲ノミニテ登ル
モアルトシカレ左右ノ三ツノ内外邪ヨリ来ル者尤
多シ其外邪ヨリ来ルニ備ヘニ外邪ノミニテ登ル
アリ外邪ニ痲ヲ兼テ来モアルト何レ外邪ニヨリテ
来者多者ト驚風ハ胎毒ト片付ラレ又云ハ其人胎毒
モ痲モナクメ但外邪ニ襲レテ来者アルト其証ハ葛

根湯ヤ還魂湯ヲトシ用テ登汗ノベツニ胎毒ヲ治ル
藥ヲ不用メモ合愈ルモノシ是ラシ以テ見レハ胎毒
ト片付ラレ又知ヘシ又京師ニテ驚風ヲ中暑ト云
ナルホト急慢驚ハ多ク夏日ニアルモノシナ食麦
ニヨリテ登スルト外邪ニヨリテ登ルトシ右ノ如ク
夏日ニ多クアルトナレハ京俗ノ中暑云モイワレナ
キトニアラサルニ似タリ又京師ニテ急慢驚ヲ直中
云是中暑云ト異名同病ト按ニ直中云ハ源ト吐浮ナ
トヨリ暴ニ来ル慢驚ヲ云シ者予不尔ハ何ニヨリテ
直中ト云レヤ分ラヌシ又驚風ヲ中暑ト云京限

ノ方言ニテ他国ニテハ云フ又フシ京ニテ中暑云モ
此病夏時ニ多者ナルハシ京師ニテモ春冬ナトノ驚
風ハ中暑トハ云フ又シ京ニテ春冬ノ驚風ニ逢テ俗
ニサトスニハ中暑タチノ病シヤ云ハ俗人ノ耳ニ
ハヤク分ルシ

○凡驚風工竈直視スル者云ハ疳咬牙ハナキ者ナル
ニ今度小橋屋本族ノ女子ニ歳ニテ急驚ヲ発シ工竈
直視メ咬牙シタリ珍シキモノシ痘ノ序熱ノコツメ
ニハ咬牙ハアルモノシ小橋屋ノ小兒ハ発シタル翼
日死タリ后按ニ驚風ニ咬牙スル者方書ニモ今近見

當ラス又病者ニモ見及ハザリシカ今度小橋ヤノ小
兒ニ咬呀アリシヲ以テ始テ驚風ニモ咬牙アルヲシ
知タリ方書ニモ驚風ニ咬牙ノヲシ云シ者アマリナ
キモノナルカ小兒直訣ニテ見當リタリ又直訣ノ抑
肝散ノ方后ニ母子俱服ノ語アリシカレハ西土ニテ
モ小兒ノ湯藥ヲ服セヌハ其母ニノマストニユ今世
乳母ヤ母ニ小兒ノ服スヘキ藥ヲノマスモ微ノアル
トシ是ホノヲモ知テオカ子ハ人ニ問レシ片難義ス
ルモノシ余モ藥ヲノマス小兒ニハ其乳母ヤ母ニノ
マスシ今直訣ノ文ヲ左ニ掲示スヘキナレ疳其抑肝

散ノ方ハ不取故此ニ畧ス其方其主治方彙急驚門ニ
 モ載テアリ就テ考ヘシ○弄舌ハ小兒驚風及痘疹ナ
 トニアル者シ惡症ク古シベロクト出ス者シ又痘瘡
 ノ口燥テ唇シ潤シタメニ古シ出スモノアリ是弄舌
 ト混シ易キモノシ審ニスヘシ驚風ノ弄舌ハ其紛レ
 ナキモノシ驚風痘瘡ノ類ニ弄舌スル者多ハ死症シ
 妊娘子痛ノ弄舌モ惡症シ○急驚休作ノアルハ治ス
 ルモノシ休作半時一時ニアルモアリ又二時三時ニ
 アルモアリ風引湯ニ云教十發伝程ノモアル者シ而
 レ休作ノアルハ治ル者シ但驚ヲ發ル休作ナク昏

睡メ直視ニテモナク眼ニ努ナク露睛伝ニ至ハ難治也

參連湯 方具 痢条

○是ハ彼急驚ニテ上竄直視メコレヲ診ニ心下へ硬
 満メ居ル片ニ用ルシ此片ハ它ノ証ヲ不問メ先心下
 シ掬キテアトニテ對証ノ方ヲ用ルシ此片ハ急ナル
 者故藥ヨリハ先術アルシ其術トハ此片ハ先病者ノ
 面へ水ヲ吹カヨキモノシ手指ニテ水ヲハダクモヨ
 シコレヲ施セハ直視上竄モユルシ又一向動カス居
 者尾ヲゴツキ出ス者シ而後參連ヲヤルカヨキ者シ
 若此ニテキツフ閉キリテアル者ハ參連ヲ用テモヒ

鎮驚ハ陰陽トモ
ミツメル者ニ用シ
危胆湯ノ処ニモ凡
引烏鴉ナトノ処ニモ
兼用スルノズルノト
寐入ヤウニ引カヘシ
難キヤウナリニテ
モ此方ヲ用ユレハ
一旦ハツキリトナル
者ニカシモハヤ
少陰ニ入りテハ座
キナリ

ラカス水ヲ噴キカケテモ忘セサル者アリソレハ先
鼻へ吹藥ヲスルカヨシ即通関散ヨシ而右參連ニテ
モ用ルカ良此參連ヤ還魂湯処テハ予足ノ冷ル者モ
アルし葛根湯ノ場ニテハ最早予足ノ冷モトリテ
オルモノシ若此參連湯ニテモヒラカヌハ熊參湯
ヲ用ルし熊參湯ニ入ル熊胆ハ一貼ニ二分程ニテモ
ヨキシソレニテモ服シニクカル者也

○鎮驚散方 寇中秘錄急慢 驚ノ茶ニ出 先卓吾ヲ莖葉根 凡米ヲ洗

ニ淨クシ酒ニテ蒸シ晒乾カス卓吾ヲムスニハ酒ヲ
鍋内ニ入シ其中ノ中央ニイカキ様ナ者ニ卓吾ヲ収

入テ下ヨリ火ヲタキ蒸スシ常ノ蒸物ノ仕様ト同シ
以上三味為細末用ルシ用ルハ片白湯ニテ末藥ヲトキ
煉藥ノ柔ナル様ニナシドロウトトカシ無理ヤリニ
小兒ノ口へ流シコムシ若飲カヌハ片ハ鼻ヲツマミ
テノマスルシ上竅直視ハケシクメ湯藥モ不通片ハ
匠小兒ヲ膝ノ上ヘアケ匙ニテトロクシタルシナカ
シコシ無理無躰ニ飲スヘシ此中ハ素人ノ予ニカケ
オキテハナカクヨフノマサヌモノシ匠自ラ其定シ
可行此藥多ノマスヘシ三五匙或六七匙何レ直視上
竅ノサムル 逆用シ此方和俗ニテツナキ舟伝小兒家

ニテ秘スル^{ヒタスラ}驚風只管直視工竄スル者ニ兼用シ予
 際ニ効アル方也又外ニ煇砂散云アリ其煇砂散ト鎮
 驚散トノ別ハ先云テミヤウナラハ煇砂ハ葛根ナト
 シ用シアトヘツク薬ニ鎮驚ハ参連ナトノアトヘツ
 ク薬ニ煇砂ハ熱ツヨク煩悶スルカ目的ニ鎮驚ハ搗
 搗上竄ナトノ劇キヒキツケノ強者ニ用シ煇砂ニモ
 全ク上竄ヤヒキツケノツヨキ気味ナキニモアラ子
 氏鎮驚ホトニハ剝カラサル^シ故ニ煇砂ハ陰ガ、リ
 シ処ヘモヤル也鎮驚ハ完子タル陽症^シ云テミ様ナ
 ラハ鎮驚ハ参連ナトノ処ニテ参連ナトヲ用テモ最

一息アトノユルミノツキカ又ル処ナトヘユク^シ
 カシニ方氏ニ畢竟奇方ニテ何レ紫丸ヤ葛根ナトシ
 用テ汗下シ経テ后ニ用ル薬ニ先初発ヨリ用ル薬ニ
 アラス鎮驚散ハモト俗人ノ傳方故ヒキツケニテモ
 アレハ它ヲ不顧メ初ヨリ此方ヲ用ル^ル伝ナレ氏薬
 ハアマリ初発ヨリハ不用也何レニ方氏ニ汗下ナト
 シ経テ后用ヘシ不尔則ハ効シミル^ル難シ又直視上
 竄ハケシクメ湯薬モ不通^中ハ此鎮驚ヲ少々ツ、シ
 氏用テ旁ラ灸ヲ行フヘシ薬ト灸ノ効ニヨリテ漸次
 ニユルム者^シ余此鎮驚ヲ不傳サキハ煇砂ヲ此処ヘ

焰砂散ハ白焰硝
 辰砂ニ味ヲ桃花
 色ニテルヲ度トメ
 新汲水ニテ頻ニ
 用シテツマヤル
 コシカシ中ヘツヨ
 ク来リテ直視上
 竈スルハ參連
 ヲ用シ又鎮驚散
 モ焰砂散モ陽病
 ニユクハ瘡疔ニハ
 不用ナリ

用タリ既ニ此方ヲ傳ヘテ右ハ焰砂ハアマリ不用シ
 ニ方其ユク処大ニ相近メ焰砂ハ熱ツヨクメ直視ス
 ル者ニ用鎮驚ハヒタスラ直視上竈スルヲ目的トメ
 用シ又鎮驚ハ乳癰ノ附藥ニモ用シ 卓吾生汁ヨク
 急驚ヲ治ス余ハ今ハ別ニ鎮驚散ヲ不用メ卓吾一味
 ノ生汁ヲ用ルシ參連ノアトヤ或參連ニ加用テモ良
 又一味單行メモヨシ何レモ生汁ヲ用ルシコレモ慢
 驚ニナリ来ハ効ナケレ凡急驚ニハ能効アルシ又焰
 砂ハ大人ノ狂ニモ一旦緩メルヲアレ凡小兒程ニハ
 効ナシ焰砂ノ方痘瘡ニテモ煩躁メ甚者ニ用テ効ア

リ焰砂ノ処ハ世間ニテ參連白虎ヤ或辰砂益元散ナ
 トヲ用処シソレラノ処ニ兼用メ良焰砂散モ和方ニ
 方箋中秘録急
 慢驚ニユ

○藍澱湯小兒驚癇多是胎毒 積雪草 藍各ホ

右水不拘多少將積雪草濃煎去滓内藍澱等分再煎用
 若上逆甚多加蕞菜汁毓春園 此方毒ニヨルミツメニ
 用ユ又胎毒ニヨリテ吐乳シソレヨリ見ツメノ来者
 ニモ用ユ是証ハドウモ外ニシカタノナキ者ニ時々
 見ツメル者ニハ見ツメノナキ中ニテモ用ユ若見ツ
 メ劇發メアル中ハ蕞菜ノ絞リ汁ヲ法ノ如ク加ルシ

若叢菜ナキ片ハ卓吾ノ葉シ如煎用カ或卓吾ノ絞リ
 汁ニテモ加ルシ藍ハ青黛シ用テモ良扱右ノ方シ今
 調劑スルニハ連錢草 三六 靛花 七粒 石先連錢草一
 味ニ水一合入六分ニ煎シツレヨリ靛花ヲ入レ一
 減シ五勺ニ煎シツマリタル片用ユ 凡小兒驚風ニ
 熊參湯ナトツ用テモトント見ツメノユルマ又者ア
 リツレニハ叢菜ノ生汁ト積雪草ノ生汁ト等分ニナ
 シ青黛ヲ其生汁ニテ煎用ヘシ若生汁ナキ片ハ乾物
 シ水煎シ用モ佳シ又生物アリテモ生汁ヲクトレス
 少ナキ片ハ水ヲ少加テ絞テ汁ヲ取モ可也此方山脇

三角ナトニテ用シ余モ它人ノ用テ効アリシシニ三
 入見タリ余ハ只一人右ノ方ヲ用シニ効ナカリケリ
 而斤熊參ナトヲ用テモ愈又直視ハ右ノ方ナトヲ用
 テニルヘシ

○小兒ノ直視ノ後ハ眸子眼ノ中央ニアリテ目ツキ
 常ナラヌ者シチカ目ヤヤブニラミノ如ニ成者シソ
 レカ生涯ナラヌニスム者モアリ大人ニチカ目ヤ
 ブニラミノアルハ多ク小兒ノ片驚風ヤ疳癆ナトニ
 テ直視セシモノカ其終ニ不治メ成リシ者シ○小兒
 脐風撮口トテ別ニ脐ヨリ風引タルニ非ヌヤハリ胎

毒ニテ其症上ニ攻メ牙関緊急スル者シシカシ緊急
伝逆ニハ大氏ハ不至者ニテ口噤ハ者シ治法常ノ驚
風ト同シ參連湯甘連加大黃湯紫九熊胆ノ類ヲ用シ

桂枝加桂湯

方具薇病条

○是ハ又一証アリテテウト奔豚気ノ様ナル者ニテ
其症ハ何カ腹カラ一物升リテ来ル様子ニテ胸動ナ
ト至テ劇キモノシ其処ヘ此方ヲ用シ

○此方ノユク急驚ハ緩症ニテ角弓反張ニハ不至者
シ此方ノユク証ハ至テ稀ナルモノシ

葛根湯

方具肩背痛条

金匱要略曰太陽病無汗而小便反少氣上衝

胸口噤不得語欲作剛瘕葛根湯主之傷寒論曰太陽與
陽明合病者必自下利葛根湯主之

○此ニモ挙げテアル通り金匱ノ瘕ニヨリテ療スル伝

ハ是也瘕ノ形状ハヨク驚風ニ合フシ又傷寒論ノ葛

根湯及其次ノ葛根加半夏ノ条モ亦参考ニスヘシ而

シ此葛根湯ハ先參連ニテモ用テ后ノ療治シ是ハ先

一通リノ療治ニテ先參連ヲ用テ葛根ヲ用シヨリハ

其処ヲ還魂湯ヲ用ルシ還魂ハ參連ト葛根ノ二方ノ

処ヲ一方ニテスマス方シ還魂ハ云テミヤウナラハ

熱厥シカニス藥シ而シ還魂モ汗不出ハ効ナキシ故

還魂ノ証見タル
 必ハ頭死メシルト
 云程ノ体ニテ手足
 モ厥冷メ脈モ殆ト
 絶メアリシナレバ
 コレヲ見ニ陽候ア
 ソ其候唇口モトナ
 テアリ面色モ青メ
 クメ赤クキモ極リ
 ツメテガクナトス
 ル陽候アリ是熱
 厥シ此場又ハヤク
 葛根湯ニテ厚者
 シ此藥面白者シ
 世間ニテハアマリ不
 用藥ナリ

漫遊雜記云有兒
 五六歳病天行痢
 二日而發驚癇直
 視急身冷麻
 絕匠將用三黃湯
 余止之曰痢以痢
 初頭發其腹氣堅
 突雖危不至死今
 外症未散而用三
 黃湯則恐痢毒
 鬱城而延數十日
 數十日右腹氣虛

竭痢再發則不
 可救今日之政唯
 須發散乃以葛
 根湯發之愈少
 用熊胆經五日而
 痢愈癇不再發

此方ヲ用ルルハ被覆メ隨分汗ヲ取カヨシ不尔則効
 ナレ還魂湯ハ本邦ニテハ一閑齋ノ用始シ方シ一閑
 齋ハ此方ヲ即死ノ証ニ用シヨリ世匠此方ヲ暴厥ノ
 者ニ用ユ今驚風ニ此方ヲ用ルモ全躰ハヤハリ參連
 ニテ心下シサハキテ而後葛根ヲ用ルカヨキトウ
 モ子足厥冷メキツクトメ居ル処ノ參連ノ場ヲ還魂
 ヲ用テ置モ足り苦キ者シ而後還魂ハ勉近ノ方ニモ
 アラス一子段ノ治法故挙テハオケ居實ハイラヌフ
 シヤハリ參連ヤ葛根ヲ用ルカヨキシ此処へ還魂ヲ
 用ルハ實ハ奇方妙藥ノ様ナルモノシ

○驚風ニ葛根湯ヲ用ルフハ三四十年以來シ此モ論
 中ニテハ驚風ノ初發下利アル処ニ用フハ少シクシ
 エルヤウナレ居ト驚風ニ用ルルハ傷寒論ニテ
 ハミエヌシ金匱ヲ看レハ急度驚風ニ用ルフニユル
 シ又千金賦風ノ論ノ末ニ瘧ヲ論メ羊枚ホトアリ其
 論甚ヨキシ小兒驚風ヲ瘧ニ取テ治スヘキ義自見ヘ
 テアリ先輩己ニ前カタヨリ彼処へ目ヲツケザリシ
 ハ如何ソヤ此論參考スヘシ扱瘧ニトリテ急驚ヲ治
 シナス伝ヘ居驚風ハ瘧病ノ如ク角弓反張ハケシキ
 者ニ非ス又驚風外邪ヲ兼發ル者アリソレラハ葛根

湯益良葛根ノ証ハ熱モハケシク壯熱スル者シ此処
ニテハ惡寒アテニナラス者シ又外邪ニ傷食ヲ兼テ
発ル急驚モアルシ即太陽陽明ノ合病ニトリテ葛根
ヲ用テヨシ若不大便ハ紫丸ニコレヲ兼施ヘシ下利
者ハ始終葛根湯ニテヨシ叔葛根湯ノ証ニマ重者ハ
葛根加石羔ヲ用シ是千金小兒驚癇門増損續命湯ニ
本キテ用シシカシ今按ニ葛根加石ヲ用処ハ金匱ノ
續命湯ヲ用レハ益ヨカルヘシト思ル葛根加石羔ハ
傷寒ノ片ニテモ用フアリ世間ニテ柴葛解肌ヲ用ル
処ヘ用シシカシ傷寒ニハ大氏大青竜ニテヨキ者シ

葛根加石ハ熱ノツヨキ処ヘユクシ叔驚風ノ葛根湯
ヲ用処ヘ通例ノ古方家ニテハ三黄泻心ヲ用シ是ハ
見ツメテ胸サキテツキカケテ未故ニ用ユ而此証
外熱ニテスル者故是ニテハ下ハアシ、而此キツク
胸サキヘツキ其勢劇者ハ參連或熊參ナトヲ兼用ス
ルヲモアルシ后世家ニテハ前ノ葛根湯ヲ用処ヘ敗
毒ニ天麻姜蚕鈞藤ノ類ヲ撰ミ加テ用ルシ此敗毒モ
汗ヲ発ル劑故三黄ヲ用ルニ比スレハヨキシ又葛根
湯ニ鎮驚ヤ煇砂ノ類ヲ兼用スルヲモアルシ

還魂湯 方具卒
死余

○既ニ前条ニテ辨セリ

走馬湯 方具
疾余

○是ハ腹滿ノ強シ目的ニ用シ急驚ニ勿論多キ者ナ
ルカ其内ニ食厥トテ傷食ニヨリテ驚風ヲ發者ニハ
此方尤ヨキシ大人ノ中風ニモ傷食ニヨリテ未者ア
リソレモヤハリ走馬ニテヨシ丹臺玉案ニ大人ノ中
風ト小兒ノ驚風ト同シ但大人ノ病ハ驚ナク小兒ハ
驚アリ其風ニ於テハ一シ伝テアリ是大ニ非フシ中
風ト驚風トハ同シカルヘキニ非ス次予ニ云ヘキ
アリ全体驚風ト風ノ字ヲ付タル者アコキ名シ風字

ハ中華人ノ癖ニテニテ附シ此ヲ按ニ全外未ノ風邪
シ云ニ非皆配當ニテ云シ者シ華人肝ニアツカル病
テハ皆風字ヲ附テアリ徵瘡ニ風字ヲツケ 楊梅風
ノ類 又
驚掌風癰風ナトノ如モ皆后世ニテハ肝経ノ濕熱ト
取ル故風ノ字ヲ附シ者シ配當トシレハ何フモナケ
レ凡ソルメ風字ヲ外未ノ風ト見ハ大ニ治ニ害ア
リ后世中風ノ風ヲ外未ノ風ト見テ疎散ノ劑ヲシタ
リニ用ハ大ニ誤レルシ后世ニテハ發熱惡寒ヲ不待
メ但理窟ニテ疎散ノ劑ヲ用ハ皆是風ノ字ニ泥故シ
○走馬ノユクヘキ驚ニハ必胸ニ腹滿アルシ胸腹滿

ナケレハ無効シ紫丸ハ腹滿ナクメモ用ユ走馬ノ緩
ナルハ紫丸ナリ

大承氣湯 方具腹滿茶 剛瘕腹滿口噤臥不着席脚攣急必齧齒

○此方ハ金匱ノ瘕病ノ論ノ通ニテ用シコレヲ離テ
傷寒論陽明死候ノ証ニアル直視喘滿ノ証ヘマルト
傷寒ニテハ直視喘滿ハ死証ナレバ驚風ニテハ隨分
右ノ証ニテモ救ワル、者シシカレ腹滿直視喘滿ス
ルハ驚風ニテモ難症ナレバ救ワル、者シ慢驚ニ此
症アリテハ救レヌシ其代リニハクシタル者ニテ大
承氣ハ慢驚ニハ其証ハナキ者シ右ノ証ハカワツタ者

ニテ走馬ヨリハ大承氣カヨキナリ

○一ハ小兒急驚ニテ直視搐搦ス初ヨリ紫丸ヲ用居リ
シニ腹滿ツヨクナリテ諸症モソレニツレテハケシ
クナリタリ於是大承氣ヲ作りテ與ヘシニ頻リニ去
屎メ大便通スコレニテ腹滿モ減シ諸症モユルニタ
リコレハ午際ニキ、夕リコ、ラノ腹滿ハ紫丸ナト
ニテハ遲キシ妙ナルモノシ

瓜蒂散 方具傷食茶

○此症ハ大承氣ト同症ニメ腹滿ナキ者ニ用ユ其症
ハ角弓反張ノ齒シカキナラス程ノ勢ノ劇者シ大承

急驚瀉吐スル
ハ但ヒラキツケル
タメナレハ獨聖
ヨキシ此場ハ痲
症ノ熱癰瘡ニテ
痲癩スルモノニ吐
シ行ト同一ミシ
ルヘシ其内ハ兒ノ
驚風ハ緩症ハ緩
急ノ異ハアレハ吐
スル処ハ同シ

気モ瓜蒂モ其証ハ同シ但其別ハ承氣ハオモニ腹へ
カ、リ瓜蒂ハ心胸ニカ、ルシ此ニハ瓜蒂散ト出メ
アレハ大食ハ獨聖散ニテスム者シ獨聖シ白湯ニテ
用ヘシ豆豉汁モ薑汁モイラヌモ者シ或ツレシ劇ク
急ニ吐サ、ント思申ハ熊胆汁ヲ以テ瓜蒂ヲト口カ
シ熊胆汁ヲ飲ミ汁ニメ用ルシコレハ急ナル処危篤ノ
処へ用ルシ熊胆汁ニテ飲スレハ野劇キモノシ吐方
ニ熊胆汁ヲ用ルフハ華人ニハナキフシ是適所翁ノ傳
シ又瓜蒂末ヲ熊胆汁ニテ丸シ用モ佳シ適所翁ハ初
生兒ニ用ル瓜蒂ハ皆右ノ如メ用ラレタリ
小兒ニ粟粒ノ
如ニ丸メ用シ

風引湯 方具
補条

○前方逆汗吐下ノ劑し扱此方ハ義ハ真ノ痲証門ニ
テ委ク云ワシ此方ヲ小兒ニ用ルハ痲癩シ目的ニメ
用シ予足ノ痲癩ニハ風引ヨリ外ニ方ナキ者シ是程
ヨク効シ養ル者ナキシ近年逆ハ此痲癩ノ証へ用ル
藥ナクメ古方家ニテハ參連白虎 山服 或石膏黃連甘
草湯 吉益 ナトニテスマシ右世家ニテハ抑肝散ノミ
用未リテツレニテスマセシ者シカレハ緩ナル処
ハ右ノ方ナトニテモキクヘキナレハナカク風引ノ
ユク処ノ痲癩へハキカヌ者シカレニ此方ヲ田中

翁京師ニ来リテ始テ此地ニテ用テ効驗アルニツキ
 瓦家モ傳受メ用フヲ知シリソレ迄ハ古方家ニテモ
 風引ノ方ハゴタクシタル方ノ如クニユルニヨリテ
 是レ右方ニ非ス晋唐ノ方ニヤナト、乍メ治驗ヲ不
 經ニアリシ此方瘦癎カ目的ニ瘦癎ナケレハ何程
 熱アリテモ此方ハ不用シ瘦癎ナケレハ反テ參連白
 虎湯ナトカ効アル者ニ參連白虎ハ山脇東洋ノ時分
 喜ツカヒシ方ニ山脇家ノ方トシユ扱風引ハ最初ヨ
 リ来ル者ニ非ス葛根湯ノ場シ一トクヂケ挫ケテ此
 へ轉メ重クナリシ者子又ハ葛根ノ場シクヂケスメ

此処ヘス、ミテ来者ニ何レ初ヨリ来者ニ非スコレ
 皆急驚ナル者ニ陰位ニアリテ瘦癎スル者ニハ不用
 ニ十分ノ陽位ニアル処ニ用シ金匱ノ風引湯ノ方后
 ニ主治シヨク尽メアリ就テ看ヘシ扱瘦癎ノ症初此
 方ヲ用テ不已者ハ瓜蒂ヲ用フアリ又初瓜蒂ヲ用テ
 モ尚全ク不愈ハニモ用ルニ

龍膽湯 自千金方来 治嬰孩四肢驚掣發熱吐衄客忤諸癩方

龍膽 一分 鈞藤鈞 四分 柴胡 八分 芍藥 三分 甘草 一分 大黃 二分
 右六味以水一合半煮取一合

○是ハ千金ノ小兒門ノ竜胆湯ヲ増損セシ方ニ千金

竜胆湯ハ柴胡ノ
 症ト芍藥甘草湯
 ノ症ト合併セシヤ
 シナモノニ

ノ方ハ十二三味ノ方ニテ多味ノ方ニ扱此方ハ博ク
痼ニ用レ凡今云驚痼驚風ニ用ル目的ハ凡ソ大勢ハ
挫ケテ后瘦癯スル者ニ用ルシ其症ハ直視ナトモ大
昏マシ只予足ビクニスル者ニ用ユ此ニシテ下利ア
ル者ハ大黃ヲ去用ユ此方ハ抑肝散ナトヨリハ大分
カノ有方シ又此方主治ニモアル通り吐衄ニモ用シ
心胸下ニ云分アリテ吐乳ナス者ニ用ユ柴胡ノ類ト
同シ但其内微搐ナトノ証アレハ竜胆湯ニテユクカ
大ニヨキシ或搐搦ナトナクメモ吐乳ノ心胸下ニ云
分アリテ直視ナト、云ホトニテナク凡少シ目ノ気

色常トカハリタルナトノ類アレハ竜胆湯ニテユク
カヨキ者シ此方但足ノヒツハル者ニモ用シ又但予
ノ引ハル者ニモ用シ又此方主治ニ治諸驚痼方トア
ル如ク大人ノ痼ニモ用シ大人ノ痼ニテモ心胸下ニ
痞結ナトノ搐搦拘攣ヲナス者ニ用ユ而シ此方ハ何
レ風引湯ナトヨリハ掣癎ノ勢モ大ニヌルキ者シ竜
胆湯方予足ヘ引ハリ強ハ薏苡仁ヲ加ルヲモアリ或
薏苡木瓜ト加ルヲモアリ

○是ハ大勢己ニ挫ケテ四肢微搐スルニ用是ニテハ
又寒熱ナトモアルシ后世家ニテ抑肝散ヲ用ハ即此

三十七
自注
場レ又此處ヲシイテ按メユケハ小柴胡ニテモヨキ
處ニナレ凡是ハ柴胡劑ヨリハ竜胆湯ノ方効有又竜
胆湯ナトノ處ノ驚風ノ勢大抵挫ケテ膿血痢トナリ
痢疾ノ様ニ放アリテ四逆散ヤナトノユク處有驚風
ノ大羊挫テ痢ニナル者ヤ、アリ驚風ノ痢ニ成ハヨ
キ者ニコレニテトリトメル者ニ其痢ニナルハ皆外
邪ニテ食毒ヲ兼タル驚風ニアル者ニ是レ按ニ初メ
葛根湯ノ場テ発汗シ紫丸ヲ用レハ痢シナスニ不至
メ驚風限リテ愈者此ヲシ以モ初葛根ニテ発汗シ紫
丸ヲ用テ下スノ理ヲ可知但シ驚風ノ痢ニ成ハ急症

中ニテハヨキク急証ノ劇ハ痢ヲナスニ不至メ驚
風ノ處ニテ死者シ又前ニ云シ四逆散ヲ用ル處ニテ
膿血痢片ハ黄芩湯ヲ用ル或黄連阿膠湯白頭翁湯ナ
トモ用ル此ニ至テハ搐搦ノ類モ何モナク驚風ノ状
ハ無メ偏ニ痢ニ成者ニ叔痢ニ成ハヨシトハ云ヘ凡
コレモト医ノ誤治ニヨリテ痢トナルシ初発ニ発汗
ナトヲヨクスレハ痢シナスニ不至者ニ庸医ハ其誤
治ニヨリテ未クハ不知メ居者ニ此竜胆湯ノユク場
ハ何レ前ノ葛根ヤ承気ナトノ如キ汗吐下ノ治ヲ施
メ其証ニ七七八モ愈テ但微搐残りテ何カ最一息驚

状アル伝程ノ処用シ微搗ニ至リテハ它ニ用ル方ナ
キシ竜胆湯ハアシライ薬ノ様ナレ氏柔能制剛ノ道
理アル者ニテ大ニ具合ヨキ者シ但シ此方ノ副症モ
風引湯ノ場ヲスキテカラ用シ又此竜胆湯ヲ驚風ノ
搗搗ニ用ニ胸腹ニカ、ル子或左腹下ニ凝ル者ナレ
ハ益良ナレ氏此等ノ症ヲクメモ掣搗ノミシ目的ニ
用フアリ竜胆湯ヲ眼目ナトニ用片ハ胸腹ニカ、ラ
子ハ不用シ○前ニモ云シ如ク小兒驚癇ニ痢ヲ兼者
頃日多アリ而メ其變附子ノ場ニ行ク者多シ今逆陽
位ニアリシ者急ニ陰位ニユキ死ニ及ヒ色々心ヲ用

テ見レ氏免角子際ナル治療モナラス只ムツチヤリ
トメ置タリ然ニ豎田絨藏所著有回春藥
名考行于世ナル者云小
兒驚癇ニ痢疾ヲ兼ト不兼トシ不問メ陽位ヨリ陰位
ニユク者ニ和劑ノ青刻白圓子ヲ用テヨク効アルト
テ余ニ傳フ白圓子ハ本草方ニモ出テ製法委シク挙
テアリ豎田生ハ右ノ丸ヲ散ニメ用ユ製別ニアリ伝
余是ニ依テ考ルニ金匱ノ赤丸主治モ面白ク方モ細
辛ナト入テヨサソウナル者シ故ニ白圓子ノ場ヲ赤
丸ヲ用テ見タキ者シ一ハ小兒驚癇ニ痢疾ヲ兼子絶陽
症ニテ陰位ノ疑少シモナシ初メ表証アリシ故余葛

根湯ヲ用テ發汗ス因テ表証去リ蒸々發熱ニ変シ脈
 促ニテアリシ故葛根黃芩黃連湯ヲ与タリ然ニ脈微
 細ニナリテ来リ此中茯苓四逆ニテモ用タラハヨカ
 ルヘキニ病家余ヲ辞メ他医ニ治セシム他医此ヲ宿
 食ナト云テ何子方ヲヤリシ后又大田碩安ニ見セ
 シム碩安茯苓四逆ヲ与ントメ余ニ譚ス余云モハヤ
 茯苓四逆ノ場ニテモアルマジトテ通脈四逆加猪胆
 湯ヲ相謀リテ投スルルニ無効メ其兒死ス是初メ葛
 根芩連ヲ用テ脈微細ニナリシ中茯苓四逆湯ニ右ノ
 赤丸ヲ兼用セシナラハヨカルヘキナレ凡驚癇ニ

氏一作氏

痢ヲ煎テ陰ニアルモノハ甚ムツカシキモノト扱右
 ノ赤丸モヤハリ散ニメ本方ニ兼用メヨカルヘシ
 太平惠民和劑弓方卷之一諸風門青剉白圓子治男子
 婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及壹切風
 他藥所不能療者小兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風
 並宜服之方与本方所載同故今畧之普濟本草方卷十小兒病方
 治小兒有陽癇陰癇慢脾風三証皆搐搦上視陽癇者俗
 所謂急驚也陰癇者俗所謂慢驚也皆可隨証治之惟慢
 脾風因吐瀉脾胃受風為難治難得藥近世多用生附子
 及青剉白圓子金液丹令用之如脾圓皆要藥也青剉白

圓子 天南星

三兩

半夏

七兩

白附子

二兩

川烏

羊兩生
去皮臍

右四味生搗為末生絹袋盛井花水擺如有未出者更以
 手揉令出盡放磁盆中以清水浸日曬夜露逐日換水攪
 春五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾再研勻煎粳米
 粉作清粥圓如菘豆大癰瘋風溫酒下三十圓日三服服
 至三日後入浴當有汗使能舒展服經三五日呵欠是應
 常服十粒水無風痰膈壅之患小兒薄荷湯化下三兩圓
 段々試ルニ吐乳后ノ癆瘵ハトウモ仕様ノナキ者シ
 紫丸參連吳茱萸附子ノ類イロク午ヲ尽メモトウメ
 モ治セヌ者シ是余カ術ノ拙ナキ故子ト専門ノ医太

田碩安ナトニモ此ヲ問テ見ニ吐乳后ノ癆瘵ハトウ
 モ仕様ナシト居ルニ是吐乳ニツイテ胃氣ヲ傷リ
 テ内虚ニヨリテ癆瘵スルニテ邪氣ノシカラシムル
 ニ非メナス故藥モ効ナキ者子吐乳后ノ癆瘵ハ輕症
 伝ヘ斤難治シ容易ニ意得ヘカラス吐乳后ノ癆瘵治
 ル者ハ十一モアルカナキ子伝程ノ者シ吐乳后癆
 瘵ノ脈ハ數ナレ斤微數ニメ浮數ヤ洪數ニハ非ル者
 シ是微ヲ見ハス伝ヘ斤此症ハ微カ至脈トシユ又此
 ハニメ渴ナト癆スルアリテコレニ石羔ナトヲ用テ
 見テモトント挫ケヌ昔シ宅医ノ話シヲキクニモ皆

ルリ而レハ此渴モヤハリ内虚已津液ノ渴ニテ熱渴
ニテハナキトミユ叔今吐乳后ノ発搐ニ世医モ竜胆
湯ヲ用ハハヤリ藥ナレトナカクキカ又者ノ竜胆湯
ノ主治ヲ審ニ可見彼ニ云テアルハ発搐ニ吐乳ヲ煎
タル者ニテ発搐カ主シ然ニ今吐乳后ノ発搐ニ此方
ヲ用ハ既ニ千金ノ主治ト違テアルシ効ノナキモ宜
ナル哉又千金ニ驚癇門 總論吐乳後発搐ニ四味紫丸ヲ用
テアレト今此ヲ実夏ニ試ルニ紫丸ニテ下メモ愈ヘ
又者ノ○小兒ニ限ラヌ大人ニテモ柴胡ノ証ニメ午
ヤ足ニカ、リ引ツリイタムナトノ類ノ者ハ竜胆湯

ヲ用ルシ何レ柴胡ノ証ニメ午足ヘカ、ル者ハ柴胡
シマルヨリハ此方ヲ用レハ効ハヤキシ殊ニ下部ノ
ヒツハルハ柴胡ヨリハ竜胆湯ノ方ヨシ上部午ノヒ
ツハルハ柴胡ノ方ヨシ又下部ノヒツハリツヨキハ
芍藥甘草湯ヲ用テ大勢ヲ挫キテアトニテ竜胆湯シ
用ルヲアリ芍藥甘草湯ハ竜膽湯ヨリハ下部ノヒツ
ハリツヨキシ又大黃ヲ用ニクキハ平痲ニ釣藤釣ヲ
加用ルヲモナキニモアラ子在下部ナラハ竜胆湯ニ
テユクカヨキシ又竜胆湯ノ本方ニ茯苓桔苓無他未分蛭入
テアリ善虫ニトハ非シ竜胆湯ノ証ニメ若咽喉ヘカ、リナトスルハ

此等ノ方アコラ
イ藥此アタリ
ハ太氏驚ノ候ハ
解メ居ルホトノ
モノ

茯苓ヲ本方ノ通りニ從テ入ルモヨシ又熱アル者ハ

芩ヲ入ルヲモアル也又太田碩安此方ニ入テアル蟻

蝮ナキ故姜蚕ニ代用ユ是ハ近カルヘシ扱此方ヲ用

ルニ其人アマリニ藥嫌ヒニテ苦味ニ堪ヌ伝者ニハ

竜胆ヲ去リテ用ルヲモアル也竜胆ヲ去テモ隨分効

アルモノ也此方ノ釣藤鈎ハ大ニ入ルカヨキ也鈎

藤少ナキ片ハ効ナシ

小柴胡湯

大柴胡湯 以上ニ方並
具癥病条

○是モ場処ハ竜胆湯ト同シ位ニテヤハリ大勢カク

チケテ右今一段了了タラスメ只心胸ヘカ、リアル

処ニ用シ小柴胡ナトノ証ニメ四肢ノヒキツケカア

ルトヤハリ竜胆湯ヲ用ルシ大柴胡ノニ方ハ緩急

シハカリテヤルナリ

四逆散 方具痢条

○此方ヲ用ルニ二道有其一道ハ四逆スル熱厥ノ処

ニ用又一道ハ驚風ノ變メ下利ニナリ熱利下重シナ

ス者アリ其片此藥ヲ用テヨキ者也凡驚風ハイツメ

カユルンテ下利ニナリ痢疾ニナル者吉兆也其片ハ

葛根湯ノ場モアリ甘草泻心ノ類生姜泻心ナト三泻

四逆散 方具痢条

小兒生下后驚
怖ノ形ヲナスニ
日甘連加天黃ヲ
用テ居ル内ニ俄
ニ胸カクナリ
動悸奔馬ノ如シ
因テ柴胡竜蠣

心ノ証モアレ凡其処ニ四逆散ノ証カ大分アル者ニ
其処ハ此四逆散ヨキ驚風后ノ痢疾カタチニナル
ハ真ノ痢疾伝ニアラサレ凡膿血痢ニナル者ニ驚風
右痢疾カタチニナル者大分アル者ニシカレ前ニモ
云レ通り此ニテ右ノ証ヲサハマアケウレシヤ驚
風ハユルニシト安堵スヘシ四逆散ノ証此ニテモ
ク花ヘカ、ルモノナリ

柴胡龍骨牡蠣湯 方具補条

○是モ勿論心胸ヘカ、リテ但ゴクト煩驚スル者
ノ旁ヨリ見レハ精神恍惚トメ夢中ニシユツナカリ

シテコレミテ
動悸シツマリ胸
ノカタキモ低クナ
リタリコレヲ
以テモ大人小兒
ノ治法異フナキ
シ知ルヘシ右世
如ク大人ト小兒ト
一漿ニ方カユルハ
方カシキ者シ右ノ
小兒ハ毒ニヨル者ニ
非ス其母ツチニ狂
癩ノ如ク能モノ
ニシトロキヤスキ
人シツレユニ妊娠
中子癩ニテモ癩
スヘキヤトツレシ
リシカ産婦ハナニ
フモナクメ其子右
ノ如クナリシ

テ居ル者ニ柴胡劑ヲ驚風ニ多ク用ハ竜胆湯ト柴胡
竜蠣ト証カ多者ニ驚風ノアトハ多ハ右ノ二方ノ証
ニナリテ来ル者ニ竜胆湯ハ風引ト近クメ子足瘕瘕
カ主シ柴胡竜蠣ハ煩驚カ主ニメ此証ハ胸動カオモ
ニアリテ奔馬ノ如ナル者シ下ニハ格別動悸カナク
メ胸動オモニアル者ニ竜胆湯ハ脈モ柴胡竜蠣ニ比
スレハ静ナル者ニ柴胡竜蠣ハ脈モ至テ数急ナル者
シ又柴胡竜蠣ニテハ其効一二貼ニメシユル者ニ風
引ヤ竜胆ノ場ハソレホトハヤク効シナレ難者ニ竜
胆湯ハツマンテ云ヘハ小柴胡ノ証ニメ子足ノヒキ

ツケル者也○竜蠅モ前ノ汗吐下ノ方ニテ大抵挫ケ
テ其腹ヲ候ニ心胸ニ云分アリテ煩驚止又者ニ用ユ
若此ニモモ掣癡不止片ハ竜胆湯ノユク処也

烏蝎散

医学
入門

既為慢驚外無ハ候

ハ候詳見
門急驚条

但吐泻不止者

人參

白朮

茯苓

甘草

川烏頭

全蝎

南星

各等分

姜棗煎服

○前方迄ハ驚癇ノ陽症也此方ヨリ以下ハ陰症也凡
病ハ陰陽寒熱ヲ分子ハナラヌヲナレ凡クテ驚風
ナトハ急症ノ者故最陰陽寒熱ヲ分子ハナラヌ也先
最初ニ陰陽寒熱ヲ分テソレヨリ治法ニ取カ、ルハ

シ其陰陽寒熱ヲ分ルニウチムイタル陽症ウチムイ
タル陰症ハ分リヨキ者ナレ凡陰陽ノ間ニアル者ア
リ此ハ分リ難者也即太陰ノ場也此場ハ古方家ニテ
ハ乾姜黃連黃芩人參湯或ハ桂枝人參湯ノユク処也
右世家ハ錢氏白朮ヲ用ル処也其処へ此烏蝎散ヲ用
ル右ノ三方ヨリハ此方ヨク効有様ニ覺ユ其中ノ証
ハ此条ニアル通シハ候ハミナ陽症也此症初メ陽症
急驚ニテ吐泻不止メ此証ニナル者也即慢驚也又初
発ヨリ慢ヲナスモアレ凡クハ初急驚ヨリメ此慢驚
ニ来ル者也此場モコ、ニ書タル通ナレハ分リヨキ

者ナレ症病人ヲ見テハ陽症ノ様ニテミユル者故ム
ツカシキ者シ此ヲ古方家ナトニ見セテハ陽症ト誤
認メテ其治ヲナス故人ヲ誤者シ又右世家ハ少シノ
陰症ヲシキ者ヲ見テハハヤ附子ナト、サワキテ附
子理中真武四逆ノ類シマリテ餘リコエスギタル治
シナスし而シ此処ニテハ右世家ノ誤リハマダツレ
ニテ取トメルヲモアレ症此処ニテ吐下ノ劑ヤ參連
ナトヲマリテハ人ヲ斃者シ此処ハ陽症全ク去シニ
モアラヌメ表ニ陽候モアリテ内陰ニオモムキテ有
故處シ難者シ此方ハ小兒家ノ書全幼心鑑ニ烏蝎四

君子湯伝名アリテ南星一味ナレ伝全幼心鑑ハ宋ノ
代ノ書シ余ハ未省ス叔吉益ナトニテハ烏頭モ附子
モ混メ用レ症此方ナトハ附子ヨリハ烏頭ヲ用カオ
モシロキシ此処ニテハ未タヒキツケアリ陰囊ナト
ヘカ、ルヲモアル者シ 八候 醫學入門卷十五諸
驚門云驚風痰熱四証輕者四肢搐搦而已重者牙關緊
急搖頭竄視張口出舌角弓反張身體掣顛手足搐搦四
肢踈攣弓方謂之八候 按活幼心法卷下急驚風條云急
驚有八候不可不知搐搦掣顛反
引竄視是也而其下有共解宜
就者與弓方所言有異同
○烏蝎散ハ少々ノ痰喘アリテモ它ヲ不顧ノ此方ヲ

用テヨキシ若痰涎ハケシキ片ハ滾痰散ヲ兼用スル
ヲモアルクね急驚葛根ノ場ヨリ直ニ陰位ニユク者
アリ陰ニアルモイツノ附子ノ場ニユケハヨケレ凡
尤ニモアラスメ太陰ニアルアリ是モ療治ノシニク
キ者シ何トナレハ附子モ用ラレス亦石羔ナトノ場
ニモ非スウカト午ハ出サレ又者シ后世家ニハコ、
ハ七朮ヲ用古方家ハ桂枝人參湯ヲ用ル余其場ヲ
此烏蝎ニテ推テユクニ扱蝎ハ驚風タケノ証ニヨク
効アル者トシユテ本草ニ多ク蝎ノ入ル驚風ノ方ヲ
挙テアリ又驚風ニ用ルハ烏頭ニ蝎ノクミ合セハ芎

黄ノクミ合セナト、同ク微妙ノ処アル者トシユテ
百一選方ニモ烏頭蝎ニ味ノ方アリヨキクミ合セノ
者トシユ百一選方ノ方左ニ載ス
百一選方治小兒慢驚百藥不効者葛根亟相方
大川烏頭去皮脐 生用 全蝎等分 右咬咀每服羊兩大益生姜
五十片煎至三四分去渣逐旋以藥注灌之 此方簡ニ
メヨシ烏蝎散ノ処へ用テヨカルヘシ它日試用ント
思シ○急モ慢モ古千金方ノ時代ナトハ別ニ分ナナ
キトシユ彼書ニハ只驚癇トノミ云テアリシカシ陽
癇陰癇ノ名ハアルシ又后世ニ至テ慢驚ノ一脱脱シ

タハシ慢脾風云之而レ斥急慢ヲ分テミレハ陰陽ノ
二道ニ不出之急驚ハ太陽ヨリ陽明ニ逆位スル之慢
驚ハ其一段脱メ陰ニアル者之復慢驚ト慢脾トノ別
シ云ハ、慢驚ハ太陰ニアリテ理中ヲトノユク処ヲ
云之慢脾ハ少陰厥陰ニアリテ通脈四逆ヲトノ類何
レ附子ノユク処ヲ云之○小兒中暑京師ノ方言下利日ニ
三五十行上竄ノキミアリ搐搦ノ様子アリテ不食大
熱煩渴半昏睡スルモノ多ク不治也

理中湯 方具唱条

當歸四逆湯 方具薇
茹条

○此ノ理中ノ場ハ大抵ハ烏蝎ニテオス之而斥下利
ハケシキ片ナトハ理中ヲ用子ハナラヌヲアリ當飯
四逆ハ午足微冷ナトアル片用子ハナラヌヲアル之
又此門ニ煩之ク挙ルモアシキト思フ故ニ不挙斥傷
寒論少陰ノ猪苓湯ノ証及少陰ノ口乾咽燥ノ承氣ノ
証アル者之猪苓用ル処ハ白虎ノ証ニメ下利ヤ小便
不利ナトノアル処へ用之又煩渴ニ白虎ノユクヲモ
アルナリ
通脈四逆加猪膽汁湯 吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解
脈微欲絶者 於通脈四逆湯方中加入猪胆汁半合餘依

前法服如無猪胆汁以羊膽代之通脈四逆湯方具傷食茶今以熊胆代

之亦可

○此ハ証ハ條下ニアル通ク此処へ通脈四逆ニテモヨケレ凡驚癇ノ中ハ常ニ大氏猪胆汁ヲ入テヤル此ハ后世家ニテハ附子理中ヲ用ル処ニ此ニテハ通脈四逆湯ガムマキ効アル者クイツニテモ大氏取トメラル、者ク此片ハ灸ヲ兼用スルク灸ト藥ノハリ合メ用ルク灸ハトコト云フナケレ凡神闕章門ヲオモニスルニ此証ノ処ニ至ルト反テ位ガカタツク故療治シヨキモノク

白通加猪胆汁湯 利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽

汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

葱白四莖 乾姜一兩 附子一枚 人尿五合 猪胆汁一合 已上

三味以水三升煮取一升去渣内胆汁人尿和令相得分温再服若無胆亦可用

○是ハ通脈四逆ト大氏同クメ乾嘔ト煩ト第一ハ此証ハ下利カ主ク煩熱ニテモアルハ人尿ナトアレハ益ヨキ者ク乾嘔ハ必シモ不問ク人尿ハヨク煩ヲ止ム者ク故ニ此ホニテハ人尿ヨキ者ク人尿ハヤハリ童便ヨシ猪胆ハ野猪ニテヨシ此白通ノ処モ灸ヲス

ルニ九テ通脈四逆ト白通ノ処ニテハ灸ハハナサヌ
ク鳥蝎ノ処ニハ灸ハセヌク前ノ當飯四逆ハ手足冷
テ或ハ脈ナトタエクニナリシカシ四逆ノユク処ニ
モアラサル処ヘ用ク通脈四逆ヤ白通ノ処ノ灸ハ章
門神闕ニ艾ヲツカシテスユル位ニ多クスルク

○陰証ハ山科家ナトニテハ一通リ附子理中ヲ奥ノ
子トスルク其処ヲ一段越テ通脈四逆若下利劇者ハ
白通加猪胆湯ヲ用テ並ニ神闕ナトニ多灸スルク通
脈四逆ノ場ハ下利ナトモ格別ツヨカラスメ次第ク
ニ陰ニ進ム者アリ其処ニ用ク猪胆ハ熊胆ニ代用テ

一本燃字ナシ

通関散以紙燃少許入鼻中候得噴嚏口開隨進湯藥

○是ヨリ本ヘ立返リテ初發ノ療治ニナルク凡急驚
急ニミツメノ末者ハ面ニ水ヲ吹カ或隱白足太陰脾
經在足大

モヨキ者ク○凡人尿ヲ用ルハ五歳迄ノ無病ノ男兒
ノ便ヲ用テ良トスルク医方集解ハ五歳迄ノ小便ヲ
用テアリ它書ハ大抵三歳迄用テアリ而レ凡ヤハリ
五歳迄ニテヨキク又人尿男子ノ病ニハ女兒ノ尿ヲ
用テ婦人ノ病ニハ男子ノ便ヲ用テアレ凡不取ク男
婦ノ病ヲ不論メ何レ男兒ノ尿ヲ用ルヲ良トス本草
卷五
十二人尿主治引別錄云童男者モ良又發明引吳球十
二歳以下童子便云云燃

指内側端去九
甲用一分許

涌泉

足少陰腎經在足心陷中屈足捲指宛々中掘玄厚曰涌泉之穴者足之

裏ノ真中ヨリ少シ
上ケテ付ルナリ

ノ邊へ灸スル乎或鍼治家ナラ

ハ心下章門ノ辺へ鍼スル又小兒ヒキツケノ片針

ニテ一旦ユルメルニハ上腕天杞微腹ノ類モヨキモ

ノ心コレニテ急驚ナレハ大氏ヒラク者又タマク

イツ迄モ灸メモ針メモヒラカス口ノアカヌ者アリ

其ハ直ニ死スル者其片ハ生死ハ格別此散ヲ吹ク

片ハ一旦口ヲ開ク其片藥ヲ用ヘシ若通閉散ヲ用テ

モ口ヲモ不開ハ必死不治ノ者ト知ヘシ此方フルキ

法ニハコヨリヲボンボリノ如ニナシソレニテ鼻へ

入レテアレ氏管ニテ吹カ捷經ニ此急ナル処ニテコ

ヨリシ捲ヘナトメ居テハマトロシキ者又此急ナ

処ニテ右ノワザヲナシテ居ルモ病家ノ見直モマト

ロシクメアシ、通閉散ハ此方ニテ此病ヲ治スル法

ニ非ス但一旦ノ急シユルメル斗リク通閉ノ処ニテ

ハ刺絡メシルモヨシタマク効アルナリ通閉ヲ吹

ハ一度カキリ又青筋ナトアル者ナラハ刺絡メモ

越ユル者ナキニ通閉ヲ用ル右ハ隨症方ヲ用レ氏通

閉ノアトハ多ク參連ヤ浮心湯ナトニユク者又通

閉ニテ一旦開テ藥汁モ通リテモ終ニ不治者モアル

凡テ小兒ノ病ハ
攻メヨキ者シ而テ
攻撃ヨク効ラ
得ル者ハ驚風ナ
トニ紫丸ヲ用ハ
不下メモ心下ス
キテクツトサカ
ル者ハ小兒ハ脾
骨嗽弱伝ヘ凡
反テ大人ヨリハ攻
撃ニタユル者ハ
小兒諸疾ノ治法
ハ下ヲ子ハナラヌ
伝ホトノ者ハ雄黄
解毒ハ紫圓ノ
ナキニ代用スヘシ
但シ痰ノ咽喉ヘ
セマリテ喘鳴塞
迫スル者ハ紫丸
ヨリハ雄黄解毒ヨ

通関ニテ挽キモカリテ日シ延ク者ハ治シヤスシ
死ル者ハ大抵ニ三日一二日ノ間ニカタツク者ハ
紫丸兒有熱不欲哺乳卧不安又數驚此痢之初也服紫丸便
愈不愈復與之兒眠時小驚者一月輒一以紫丸凡下之減其
盛氣令兒不病痛也 千金方

○此ニ千金ノ文ヲ挙タルハ急ノ場処ニテ用ル伝フ
ニ非ス凡痢ニハ紫丸ヲ用ヨ伝フシ此シハナレテ急
ナル処ニテ紫丸ヲ用ルハタトヘハ一小兒アリ急驚
ノ発シ直視メ參連ナトシ用テ一旦甦リテモ後見ツ
メノ来ル勢アリテ腹滿アルトカ又ハ腹滿ナクモ

キモノ
乳母ナト其子ヲ
抱キテ誤テ地エ
ニオトシナトス譬
ニ怪我ナクトモ
ソレヨリミツメシ
発シ或ハ夜啼
驚風タテニナ
ル者マアルモノ
故ニ慎テ意ヲ注
ヘキフシタトモ其
當坐ニミツメシ
不發メモ得テア
トニテハ夜啼ヤ
驚風ナトノ如キ
者ヲナスニ至ル者
ハ故ニソレヲノキ
ハ早ク其機ヲ察
メ紫丸ノ類ヲ以
テ下メオクハキ
シ小兒急驚ハ
ケシキハ紫丸ヲ
五斗丸モ用ルヲモ
アル

病家ニタツヌルニ不便スルヲ久シ伝処ニテ大承氣
ニテモ最一息遲キ処ノ急ナル処ヘ紫丸ヲ用テ一
下得レハ大ニ緩ハ者ハ下利ヲ止ヌサキニモハヤ其
勢緩ハ者ハコレヲハ紫圓ノ結構ナル徳ハ此次ニ雄
黄解毒ヲ挙テアレ凡此ハ紫丸ニテモヨシ何レ成凡
用ヘシ其内雄黄解毒ハ痰涎ノアル者ニハ紫丸ヨリ
ハ効マサルハ雄黄解毒ノ方ヲ見ニ別ニ痰涎ヲ制ル
薬モナケレ凡カワツタ者ニテ痰涎ノアル処ハ紫丸
ヨリハヨキ者ハ是余ノ用ヒ竟ヘシ痧病ナト下ス
ニハ紫丸ヨリハ雄黄解毒カヨキハ其方中ニ雄黄

金ノ類痧ヲ治スル藥具リテアル此ニ舉シ紫丸ノ
主治ニ兒眠時小驚者一月輒一以紫丸下之トアリテ
ルホト此証小兒ニマ、アル者ニシカレ一月ニ一度
ニテハナリ毎日一二丸ツ、用テ驚止テ后モ半年モ
一年モ久ク用ヘシ右ノ如スレハ終ニ癩モ愈不發者
シ又小兒胎毒ナトツヨキ者ハ別ニ煩ヒナク凡一二
丸ツ、毎日一年モ半年モ多年ニ用ヘシ右ノ如スレ
ハ違者ニ生長スル者シ右ノ処ナトニテ多ク用テ大
ニ下リテモ毒ハトレヌ者シ故ニ緩々ニ一二丸ツ、
長ク用ヘシ是ニテ大便ユルム位ノ者ニテナワトヨ

キク若至テ不大便ノ者ナレハ三四丸或四五丸モ用
シ下リヤスキ者ハ一丸ツ、モ用シ凡テ小兒ハ日ニ
四五度ノ大便ヲヨシトス是カ遠サカルトアシキ者
シ大人ヨリハ大便シケキ者シ日ニ四五度ノ大便カ
遠サカルト心腹滿スルトカ乳ヲノマヌト子ヒクツ
キカ来ルトカ身中ニフキ出カスルトカ何カ云分出
来ルモノシ俗ニタレ子ト云俚諺アリナルホト小兒
ハ飲テ糞ヲタレテ居ルハ云分ナキ者シ扱紫丸ハ世
医ハ急証ニ用ル藥ト意得テ居レ不尔シ千金ナト
ノ主治ヲミルヘシ緩症ニ用テアルシ紫丸ハ緩急凡

二用ル藥ト知ルヘシ又紫丸ノ処ニテ急劇ナル者ハ
 備急丸走馬湯ノ類ヲ用シ予カ小兒ノ治ヲ學ビシ医
 人紫丸ノ赤石脂ヲ去テ辰砂ニ換テ走急丸ト名ケテ
 急ナル名ヲツケレ凡紫丸ノ本トシシラ又仕方ト思
 ハル又赤石脂ヲ辰砂ニカユルト云モ不穩ニ叔前ニ
 一二丸ツ、毎日用ル紫丸ヲ云タリ右ノ紫丸エテ大
 便格別下利セス或瘵物ヲタマク下スヲモアル格
 別ニ下利セスモ毒解スル者也余家ニテ制ル紫丸
 ハ小粒ナレハ一丸ノ処正三丸ホト用テヨシ上ニ一
 丸ト云シハ絳蓉丸ヤ脾勞丸位ノ大サノ処ニテ云シ

雄黃解毒ハ一度
 ニ七ホト用テヨシ

雄黃解毒丸
 余家ニテスル紫丸ハ黃米ノ大サナリ

雄黃解毒丸
 雄黃解毒丸
 雄黃解毒丸

滾痰散以上四方
並在別集

○雄黃解毒ハ前ノ紫丸ノ処ニテ辨セシ通シ扱滾痰
散ハ驚風ニメ痰涎壅塞スル者ニ用ユ此方ノ主治ハ
長々敷アル者ナレバ墜痰削癩伝カ主意シ此方痰涎
ナクメモ癩斗リニモ用ルシ青礞石ハ癩ヲ削ル藥ニ
テ且方中黃芩大黃沉香ノ類入テアリシナ是癩ヲ削
ル藥ノ癩ニテ浮心湯ヤ白虎ヲトノマル処ハ此方ヲ
兼用シ滾痰丸ノ主治ハ回春ニ出テアルハ尤クワシ
シカシ此方ノ癩ニ用ハ大人ノ癩ニテ今云癩症ニ用
シ小兒ノ驚癩ニハアラス小兒ノ驚癩ニハ痰涎アル

者ニアラサレハ不用シ○扱吉益家ニテ滾痰丸ノ沉

香シ甘遂ニ換用シ斥不可從也甘遂ヲ入レルナラハ

控涎丹ニテヨキシ此方ハ墜痰トアル主治ノ通り控

涎ノユク処トハ異ルモノシ又本草ニ青礞石ヲ小兒

ノ驚癩ニ用ルヲ以テ証スヘシ本草卷之十礞石附方
引衛生方云小兒急驚

青礞石磨水服又引湯氏嬰孩室鑑云奪命散治急慢驚
風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜下風痰乃治驚刺痰

之聖藥也真礞石一兩煅硝一兩同煨
為末每服半錢或一錢云云

鍼灸法千金卷之十驚癩條云唯陰癩噤瘖可鍼灸凡之又云

目及上視眸子動當灸云云次灸兩耳後完骨上青脈亦可以

針刺令血出又云若風病大動手足掣癡者灸手足十指端

○按今世称驚風者詳診之若有青紫筋者乃為痧病可放而
乙

○ナルホト此ニ云テアル通リ陽症ニハ灸ハセヌシ
陰証ニハ灸スルニ陽証ノ急ナル処ニハ一旦灸モ一
ニ壯ハスレ氏治病ノタメニアラス針ハ陰症ニハ反
テアシカルヘシ陽症ニハヨキニ刺絡ノ用ル処モ針
ト同シ陰症ニ針ヨキ伝者疑シキトシ凡ノ法ハ余ア
ル医ヨリ傳ハリシ術シ其法通脈四逆ヤ白通加猪胆
ノ場ニテ兒ノ章門ノアタリヲ其父母ヤ旁人ニモ知
サス診察ノ片ヒソカニ凡ヲ立テ、此ルニ兒声ヲ發

シ啼者ハ未タ内ニ守リアル者トス治ヲ施メ可シ若
右ノ法ヲ將フテモ不啼者ハ守氣既ニ盡ルトス療治
メモ行キ届カヌ者ト知ルヘシ目反上視眸子動當灸
ハ目反シ眸子ノ動ハ守リアル者シ陰寒ノ証ニメ眸
子ノ不動者ハ必死陽症ニテハ目ノ動ト不動トニ不
拘シ陽症ニテハ目不動又モ治ル者シ次灸兩耳後完
骨上云云令血出ナルホト兩耳后完骨ノ辺ニ青紫筋
アラハ針メヨシ伝フヲ予傳聞タリ幸ニ千金ニ其法
アル故此ニ出シタリ千金ニハ灸モ針モ用テアリ予
ノキ、此ハ針斗リ此ハ灸ニテモ針ニテモヨカルヘ

偷一作偷

口作カ

〇完骨ハ玉枕骨ノ偷鍼服ナトニモ右ノ完骨ノ辺ヲ
 シテ青筋アラハ出血ナリ凡灸ナリ凡ナスヘシ是眼
 斜ノ傳ノ偷鍼眼ハ京俗目ガサレ阿波ナトニテハマ
 ロフト云南部ニテ目ホシ伝是ノ京俗ニテ目イホ伝ハ目ノ
 フチニ出ル者ヲ指メ云ノ若風病云云ノ風病ハ即驚
 風ヲ云ク此ヘ十指頭ニ灸ストアレ凡灸ヨリハ十指
 頭ヲ刺メ血ヲトルカ良ク是モ陽症ノ者ノ是ラニ至
 テハ藥方ハ異ナレ凡驚風モ痧病モ同キク紛ラレキ
 モノシ能ク審ニスヘシ凡テ急驚ニ痧ヲ煎ル者大分
 アル者ノ意ツツクヘシ慢驚ニハ痧ヲ煎ル者ハ無シ

〇灸ハ陰症ニ行フハ勿論シ又急驚ノ危急ノ処ニモ
 用ユ急驚ノ通関ヲ用ル処ニテモ右ノ方ナキ片ハ灸
 ノミニテモヨキク手足モ冷ヘ或見ツメナトアリテ
 藥モ不通片ハ通関ヲ用灸ヲ行フヨリ外ニ為方ナキ
 モノシソレニハ前ニ云通り隱白涌泉ヲ灼ヘシ千金
 ノ完骨上ニ灸スルヲ不用メモヨケレ凡青脈ニ針メ
 血ヲ出スヲ用ル故此ニ挙メリ慢驚ノ灸ハ寔ニマ
 キヌクヤウニスルノ筈ナトニテ扇クホトニ灸ク
 〇慢驚為凡候啼声隨發者知内有所守也灸神闕章門
 與四逆加熊參湯此証啼声少發乳食知其味者得治十

五十二、自注卷

中二三若有下利者不治 疏春園小冊

○小兒驚一日二三度發半年不發偶因停食外感驚怖等發者云云此証屬大人癩癩也 不急治之過十歲則為癩癩驚止后每日灸章門 疏春園小冊

○鵲石脂湯治急驚大熱煩躁譫語大渴如狂癩者

石膏 黃連 菝葜 甘草 右水煎服

鵲石脂湯余ハ今ハ不用今ハ參連白虎ヲ用ル処即此場ナリ

○疳癖

○疳ノ字ハ疒ニ从匕甘ニ从フテアル字故ニ小兒カ甘キ物ヲ過食メ此病シナスト古来ノ方書ニ説キ来リマアスナオニスマセハソレニテモスムケレ氏今此小兒ノ疳ヲ病シ見ニ甘キ物ヲ過食メ来ルニ限リ此者ニアラス今疳ノ病因ヲ見ルニ多ハ胎毒ニ次ニハ蛇虫ヨリ来ルモアリ又舊説ノ如ク甘キ物ヲ過食メソレヨリ来ルモアリテ其来ル処一道ニアラサル也右ノ如ク病因多端ナレ氏飲食ヨリ来者多ナラハ舊説ノ如クニテモヨケレ氏飲食ヨリ来者至テ少ク

胎毒ヨリ来ル者尤多し而レハ舊説ニ从フテヲルモ
 如何ナル者シ○扱疔ノ字ハ疔蝕ノ義ニテ虫ノ物ヲ
 食ヒ滅ラス義ニ取カ尤ヨキ如牙疔下疔之疔亦皆為疔蝕潰蝕之義其説
詳于行余医言卷之六下疔字辨全体小兒ノ疔伝者ハ大人ニ取テハ
 虚勞ト同シ莫ニテ虚損ノ病ニテ有餘ノ病ニ非ス血
 ニテモ乾クカ氣ニテモ乾損スル乎何レ不足ノ病ク
 勿論形体モヤセルレソレナラハ大人モ疔伝ヲモヨ
 カルヘキナレ氏其処ハ大人ト小兒ト異ナル処少シ
 アレハシ故ニ姑ク小兒ノ病ニ疔伝者ヲ設ケシトシ
 工既ニ古人ノ説ニモ大人ニアリテハ勞伝小兒ニア

傷之下僻一本作

リテハ疔伝説アリ入門卷十五五疔門云五疔由積虚而成疔者乾也瘦瘁少血也五疔病
関五藏二十歳以下曰疔二十歳以上曰瘡云云ナルホト小兒ノ疔ハ大人ノ
 勞ト等シキ者シ疔ノ字ハ瘡積塊瘡ト、連續メ腹
 中ニ結ハウレタル物ヲサシテ云其塊結スル者カ多
 左右ニアリテ中央ニタク僻在メアル故僻ニ从ヒシ
 ト古来ノ説ナルホトシカ香川太仲以偏僻々在之解為不是而其説云
瘡古書混書僻疔書住為僻積如傷僻是也憶僻即發積之發通故今斷為積義後世謂小兒積專為瘡者亦非也
 其瘡胎毒ニテナルアリ又蛇虫ノ結シタル者ニテモ
 瘡ニ故ニ瘡モ一途ナラス凡疔ヲヤム者ハ先瘡積ア
 リテ而右疔ヲ煩フ者シ又瘡積キリニテ治メ仕舞モ

アルレカ不治片ハ右ニハ遂ニ疳疾ニナル故
 ニ疳ト斗リニテモ尽サス癖ト斗リニテモ尽サスニ
 字相依而后疳ノ病状尽ク後世ノ方書ニ疳疾癖疾ト
 ニ門ニ分テアリ非レ扱疳ヲ治スルハ異同アレ疳大
 人ノ勞病ヲ治ルト同ク後世家ニテハ一々別々ニ
 方ヲ立テアルハ非レ其大人ト小兒ト少異同云ハ大
 柴胡小柴胡ナトノ如キ方ヲ用ル処ニテハ同レケレ
 疳毒ヲ逐ノ処ニ至テハ異レ大人ハ夕トヘ毒ヨリ未
 ル勞ニテモ既ニ勞状ヲナシテハ毒ノ療治ハナラヌ
 小兒ハヤセコケテ居テモ毒ヲ逐ニ紫丸ナトヲ用

ノ類是大人ト異ナル処ニ癖モ大人ノ癖疾ヲ治ルト
 同レ后世ニテハ淨府湯回春之方又見方ナト云テ小
 兒ノ癖疾ヲ治ル方ヲ立テアレ疳別ニ立ルニ不及ク
 扱其大人ト小兒ト治法ハ大法ハ同ケレ疳脈症治方
 並ニ小異ナルヲアル故ニ別ニ名ヲ設子ハナラヌレ

小柴胡湯

大柴胡湯以上二方並
具痢症条

○ニ方疳癖疾ニテ疳トナラントスル者ニ用ユマア
 此ニ方ノ証多者レソレカラ次ニ柴胡姜桂ノ証多者
 ナレ疳亦大柴胡ノ間ニハ神湯ノ証アルレ

○疳癖ハ胎毒ト過食ト蛇虫トノ三因アリ其内毒ヨ
 リ未者尤多ク次ニ蛇虫ニ后世ニテハ甘味ヲ過食メ
 ナルト云ヘ凡過食メ胃氣ノ鬱滯ニヨリテ癆ハ疳ハ
 三因ノ中ニテ尤スクナキ者シ又五疳ノ目ハ千金ニ
 ハナシ外臺ニモナカリシト覺ユ病源候論ニハアッレ
 ト覺ユ勿論后世ノ書ニハミナ五疳ノ名アリ千金ニ
 癖結脹滿千金卷之十二ノ篇アリ是即疳ニ當ルシ后世五疳
 ノ目アレ凡正シカラヌメ分ラヌモノシ其五疳ノ内
 ニテモ今アル者ハ脾疳五疳食疳驚疳風疳氣疳急疳
 是七八門卷十五五疳門云食
疳痞脹多滯泄云云食疳即脾疳由乳食傷而後傷脾氣
 孤弱或乳母恣食生冷肥膩或酒肉飯後即与乳兒久則

變為乳癖腹股結塊名曰乳疳外証黃伝者シ又前ニ云
 瘦腹脹氣促浮臭合睡食減吃混云云
 シ三因モ蛇虫モコレシ總ルキハ胎毒ノ一ニ歸ス胎
 毒ニヨリテ虫モ出シ虫生スル様ニナルト過食モス
 ルシ后世家ニテハ疳癖ノ藥トテ淨府湯或清疳湯或
 錢氏白朮散ナトハ別ニ方ヲ立テアレ凡別ニ方ヲ立
 ルニ不及者シ大小柴及建中ノ類証方ニ丸藥ヲ兼用
 メ大柴治ハ足ル者シ又一種蛇虫ニテ柴胡ヤ建中ニ
 テモナキ者アリソレハ鷓鴣菜湯ヲ用シカシ柴胡
 建中モ虫ニテモ毒ニテモ証候ニ隨テ用シ虫モ毒ニ
 ヨラ子ハ不生クタトヘハ麩糠ノ地ニ虫ノ生ルト同

理之何夏モナキニヒトリ生ルノ理ナシ香川ハ熱ノ

微甚ノ間ニ生ル云ヘリ 行余言其条云蟲者熱之微亦不生熱之甚亦不生其熱之

蒸々而爵而不通暢則元氣壅過貴於烏生云云 アマリ鑿ナタル説ク疳ニ生

漆ノ功有シ見レハ偏ニ毒ヨリナルトミユ癩癩ニモ

虫ニヨル者アリ是モ生漆ノ入ル藥ヲ用テ効アリ生

漆ノ方ハ起瘰丸ヲ云ク扱疳ノ胃ノ爵塞ニヨル者ハ

小承気湯或厚朴生姜甘草半夏人参湯加大黄ナトシ

用ユ若一段ツヨキ者ハ厚朴七物湯ヲ與フヘシカ

シ疳ヲ治ルニハ大小柴胡及建中ノ証ヲキモノク右

世家ニテハ此場へ淨府湯ヤ七疳ナトシ用レ所ナカ

く不及者シ○小兒疳勞毒ヨリ未者多シ大柴胡加當

皈ヲ用テ挫キテオキテ右ハ小柴胡カ小建中ノ類ニ

テ調理スルシ疳ノ藥トテ方數多クアレ所方ハ數多

クハイラヌ者シ胎毒ヨリ未者ハ疳ノ右旁ニ凝リア

ル者シ又疳ノ辺ニコリアルハ毒ト見テ治シナスヘ

シ心シモ疳ノ右ニ限ラヌク疳勞始ヨリ大柴胡加

當皈シヤリテヨキ云ハ前ニモ云如ク毒ニヨル者ナ

レハシ故ニ腹ニ満氣アル者シ是ヲ目當トス小兒ハ

始ニハ下メヨキモノクシカシ大人ノ勞ナトハ一向

ニ下スフハナラヌ者シ大柴胡加當皈ハ子和ノ喜ク

六十二
三三

用タル方ニテ四順湯ナト、云ヤフナル血熱ノ場ヘ
用しシカシ當飯ハ必しモ加ヘス

八神湯 治心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿痺繚戾方

芍藥 柴胡 各三分 大黃 人參 各一分 乾姜 甘草 各一分

鼈甲 茯苓 各三分 右八味水煎服 此方自十金未

○是ハ太陰大柴胡ノ証ニ近キ者ニテ此、ニテモ大

柴胡ニテオシテモヨケレ最一息届キカヌル者ニ

此症ハ大柴胡ヲ用テモ腹滿不減メ益脹リ總身反テ

瘦セ先此逆ハ坐敷シモ步行セシニ此比ニテハ腰カ

ヌケテ步行モ出来ヌ辰ナトノ片用藥ニ大柴胡ニテ

無効ノ八神湯ノ場ニテ効ヲ得フ多クアル者ニ効ノ

アル藥ニ此処ニ后世家ニテハヨク方ヲ用ルハ淨

府湯庸医ノ徒ハ錢氏白朮散ニ大腹皮ヲ加用ルニ大

腹皮ハ腹滿ヲ目的ニ加ルニシカレ何レモキカヌ

モノニ此証ニメ下利カアリ或ハ盜汗ヲトアル片ハ

外臺ノ方ニ從テ大黃ヲ去テ黃芪ヲ加用ルニ八神湯

ノ各ハ千金ニモ外臺ニモナシ余假リニ命シタリ此

方千金ニ八九トナシテアレ辰予ハ湯ニテ用ユ又十

金ニハ細注ニ乾姜一代枳實トアリ余ハ常ニ其細注

ニ從テ枳實ヲ加ヘ乾姜ヲ去ルニ又此症ニメ下利ア

レハ外臺ニ从テ大黃ヲ去ク此時ハ枳實ナシニ乾姜
ヲ加ルル外臺ノ方ハ大黃ヲ去テ黃芪ヲ加ヘタル方
ニ故ニ外臺ニ從ヘハ下利ニテモ黃芪モ入レテヨケ
レ凡黄芪ハ盜汗ニ用ユ如此下利ト盜汗トニテ去加
メユクニ此方繚戾シ目的ニスルニアラサレ凡多ハ
此場ニテハ繚戾スルモノク又此ノハ神湯ノ場ニテ
本方ニハヤハリ大柴胡ヲ用テオキテ三味ノ乾漆丸
ヲ用ルル是ハ一等毒ノ深キ者ニ用ユコ、ニテハ右
ノ仕方ハハ神湯ヨリハスルトキ者ク盜汗アリテモ
カマワスメ右ノ大柴胡及乾漆丸ヲ用ルル小兒ハ大

人ト違ヒ此段ハ仕ヨキ者クヤハリ労状トニ正テモ
毒ヲ逐フテヨキ者ク大人ニテハカウメハ居ラレヌ
シ又或ハ神湯ナキ片ハ大柴胡加鼈甲湯ヲ用テアリ
○此方腹候ニテハ痞滿ク外証ニテハ萎黃云云此
ニ痿躄トアレ凡疝癖ニハ痿躄ハ少し大凡繚戾ナル
モノシ足ノカナハ又伝ホトノフク足ノフミシメノ
甲斐ナクメシド口モト口ニナル者ク或腰ノヌケシ
様ニ思ヒ或足カヌケシ様ニナルアリ此方ハ繚戾モ
一ノ目的ナレ凡腹滿ナケレハ用ラレヌ又此方ヤ
柴胡建中ノ類ヲ用ルル処ニハ紫丸ハ兼用セヌシ它ノ

疳ヲ治ル丸ヲ兼用メヨキク紫丸ヲ兼用スル処ハ鷓

胡菜湯及ヒ食疳ノ症ノコシ

柴胡桂枝乾姜湯

方具微
病余

○是ハ大人ニ用ト同シ然レ此方ナトハ世間ニテハ
一向疳疾ニ用ヒ又方ク而レ疳疾ニテ胸腹滿微結
スル者ハ此方大ニヨキ者ク此症ハ多ク小便ナトハ
不利スル者クシカレコレヲ目的ニハセヌク或渴モ
ソウモノシ凡小兒ノ疳ハ多ク小便ニ云分アリテ白
濁ニテ米泔水ノ如ク或赤濁ナルモノアルハ后世ニ
黄連消澤泻ノ入ル方アリテ消疳湯ト名ケテアリ

湯方出テ回春又方彙疳疾門載之小兒ノ疳ニテ白濁者ニ用ユ右世家

ニテハヨクキク薬ク云テモテハヤシ評判ノヨキ薬
ナレ疳疳ノ白濁ハ別ニ不制メヨキ者ク疳ノ旁証ニ
メヨキク別ニ其于當ノ方ヲ立ルニ不及モノク

小建中湯 方具旁
病余

○此方疳旁ニテ腹中拘急ノ或痛者ニ用ユ叔方書及
今ノ俗人モ医者モ癖疾ノ処ヲ疳云テ疳ニナリタル
ヲ疳旁云ク是誤ク癖疾ノ処ハ疳トハ云レヌク疳旁
云処ハ即疳ク小建中ヲ用処ハ所謂疳旁ニナリテア
ル処ク

此方大人ノ旁ニ
用ルト同シ其内
小兒ニハ心中悸
而煩ノ証ハナキ
モノク

此方柴胡ノ証ニ
又藥汁モノニ
又モノニ用シ此方
三五度モ振出し
用ユ小兒ニハ大分
一貼ヲ一日ニ用テ
ヨキモノナリ

平疴丸ハモト阿勿
北方ノ賣藥ニテ
感心丸伝シ此丸
年ノ數ホト用テ
此丸藥ノ方ニ右ノ
振出しノ方ヲ附テ
出ス其主治ニ治小
兒疴疾下利不止

一方 柴胡 黄連 黄芩 甘草 丁子 霍香 木香

縮砂 桂枝 沉香 右十味擺用

○是ハ俗方ニテ実ハナクメモスル藥シカレ凡如
何トメモ藥シノマヌ小兒アリ其片ハ此方シアシラ
イ藥ニメ大分キクモノ故此ニ舉シク此方振出し藥
ハ是ヲ調劑スルニハ柴胡ヲ大ニメ餘藥ハ中ト小ト
見ハカラヒニ合スヘシモ振出藥ノフ故小服ニナス
ヘシモト此方ニ平疴丸伝九方附テアリ実ハ此湯方
ハ只ツキ者ニテ丸藥ニテ効アルシ此方ヲ用処ハ大
小柴胡ヤハ神湯迄ノ場ニテ用シ勞ニナリキリテハ

麻沸湯方當テ
感心丸傳用トア
リ是ハ彼店ヨリ
カキテシコス者
トミエシカシ此ハ
但治疴トメヨキ
シ証ヲ不問メ用シ
此丸モヨク効アル
凡余ハ育嬰丸
ニテ太食ハ推ス

マア不用シ扱此湯方ニ附シ丸別記アリ
感心丸 其方ニハモノ胆ヲヌタイノ胆入テアリ右ノ
ニ胆ヲ味曾ツケニナシオキ用ル片ニアタリテ味曾
シヨク取出シ洗淨メズメ味曾ノツキテ有シ其俵ニ
石決明貝ナトニテ焚クニテウトヨキ者シ若硬ハ水
ヲ加テ焚キヨキ加減ニナシスリ潰ブメ餘藥五味ヲ
末トシ右ノ焚タル胆ニ入レ煉合スシ而メ濡硬ノ處
ヲ得テ丸トナスシ右ノニ胆ヲ味曾ニツケオクハ味
曾ニ効アルニモアラサレ凡只ニ物ヲ乾涸セシメス
メ生ニテ用シタメ味曾ニツケ貯ルヲ法ト致セシ者

慈中秘録疴
癖門抄平疴

小兒疴疾

凡疔之變麗臭
胆ヲ用ハ過食膏
梁ニヨル者ニハ
マリ効ナキコトナ
キノ肉モヨケレド
胆ガ最ヨキコトウ
ナキ殺虫ニ効ア
ルヲ往年キケ
リ本草ニ虫生コ
タル中ウナキ骨
ノ黒焼ヲ用ハ虫
死ス云

トニユ目ニ星ノ入リタルニハ真珠シ一廻分ニ五厘
入ル、此一回ハ十日ヲ云ク叔原方ハ右ノニ胆シ
味曾ツケニシテオキテ割スレドソレニテハ安排ヨ
ク出末スメ大ニムツカシクシニクキ故ニ今ハニ
胆ヲ黒焼ニナシ余藥ヲ末シ一通リノ丸藥ノ如糊丸
ニスル如此スレハ大ニ丸シヨシ又黒焼ニテモ隨
分ト効有者又胆モ別ニ肝胆ヲ不分メ腹中ノ諸腸
シ黒焼ニスヘシ凡テ臭胆ハ何ニヨラス疔ニハヨキ
モノ云故ニ俗間ニハイロクノ胆ヲ食用ニサス又
家々ノ秘方ノ疔ノ藥ニイロクノ胆ノ入タル方アリ

コレヲ以テミルニ臭鳥ノ胆ハヨクキク者云必シ
モ一物ニ不限ク又凡臭鳥ノ胆ヲ用ハ腹中ノ腸ニナ
俱ニ黒焼ニメ藥劑ニ入レテヨシ必シモ肝胆不限
シ右ノ丸ハ日ニ二分許ツ、用ハ傳ク又小兒丸藥シ
ノマ又者ハ但上ノニ胆ノ黒焼ノ末ヲ味曾汁ナトニ
入レカキマゼ用ク是ニテハ誰テモノムク効モ隨分
アリテ五味ノ末藥ナクメモ効ヲ奏スル者クナ又々
イハ漫遊雜記ニ緋知字トアル者即是也 奥道逸子云
ナシ黒鯛ノ一種クナハ小ニメ一尺斗リニシタス
者シ黒鯛ハソレヨリハ大ナル者シ黒鯛ハ皮厚メウ
ロコナイサシク又ハ皮ウスクメ鱗大シ色ハ何レモ
黒シアル者ク味ハ黒鯛ノ方ヨシ黒鯛漢名毛魚又

六十二
小南庄藏

舊説ニチ又シ海鯽魚ニ充レ非
シ海鯽ハ海タナコト云ニ充ル
又蟾蜍ハ疔ニヨク

キク者ク此ハ臭胆ト少シユキ場異クコレニモ色々

類方アル所予カ傳タル方ハ蟾蜍一足ニ黄連シ蟾蜍

ノ七分三入レテ蟾蜍ハ黒焼ニテシ黄連ハ其俵末シ

右味糊丸ニスルシ蟾蜍ハ乾蚶蚶ニテヨシ此蟾蜍黄

連ノ方モト一本堂ノ方シ若蟾蜍シ生ニテ用ル片ハ

蟾蜍ノ腸ヲ去リ腹内へ黄連シツメ黒焼ニテスル生

ナラハ益ヨカルヘシ然レ乾物ニテモ随分キク者ク

サレハコソ本草ニモ乾蚶蚶ノ入りテアル方多アリ

又田中翁ノ家方ニ蟾蜍沉香ニ味ノ丸方アリ用処ハ

上ノ丸ト同シ沉香ハ上ノ黄連ノ量ホト入ル、シ其

制法是モ亦生蟾蜍ノ腸ヲ去リ沉香ヲ腹ニ入レ黒焼

ニテ末トシ糊丸ニスルシ此方ハ余ハ不用ク上ノ

蟾蜍黄連ノ方ニテスマス臣説約小兒門疔阿癖
條所載蟾連丸皮黄肌瘦

髮直尿白肚大青筋好食泥炭茶米之或便秘有時泻腹

内積塊諸蟲作痛 蟾蜍 黄連 各等分

本草蟾蜍ノ附方ニ治小兒疔積腹大黃瘦骨立云云ト

アリナルホト此蟾蜍ノユク処ハ腹大黃瘦骨立云カ

目的シ本草ノ右ノ方ノ右ニ其功效ヲ称メアリ蟾蜍

ノ入ル方イロクアレ凡畢竟ハ蟾蜍一味ニテモヨキ

故ニ本草ニモ一味用タル方シ舉タリ 本草卷四十
ニ蟾蜍附方

六十七
本草

云治小兒疳積腹大黃瘦骨立頭生瘡結如麥穗用立批
后大蝦蟇去首足腸以清油塗之陰陽瓦灸熟食之積
自下連服五六枚一月之後形容改變妙不可言又引子
母秘錄云小兒疳泄下痢用蝦蟇燒存性研飲服方寸匕
此它所載之方不右ノ蟾蜍黃連ノ方ハ疳ニナリタル
暇具舉且就着焉
処ニテモ癖ノ処ニテモ大小柴胡ヤハ神ノ場ニ兼用
スルノ此方ハ腹滿ナケレハキカヌモノノ世間ニテ
ハ蚶蚶ハ疳ノ藥トテ一概ニ用レ凡腹滿ナケレハ頓
トキカヌモノノ腹滿アル処ハヨクキクモノノ又
育嬰丸ニ入ル河カラスモ疳ニヨクキク者ノ是ハ又
奠胆ヤ蟾蜍ノキカヌ処ヘキク者ノ予カ用竟ヘハ
疳ノ藥ニテハ奠胆ト蚶蚶ト河カラストノ三ツノ扱

河カラスノユク疳ハ凡シカミタリ或道逸ノ如ク口
シトガラシ丸ノナクマ子ナトスル奇ナル形ヲナス
疳ヲ治ルノ方書ニハ奇癖伝語アリ其処ヘユクノ河
カラスヲ用ル処ハ育嬰丸ヲ用ク又育嬰ハ疳勞ニナ
リタル処ニ用ユタト口証ハ尽ク勞状シナレテアリ
テモ其モトハ胎毒ヨリ来者トミタラハ此方ヲ用ヘ
シ小建中柴胡姜桂或七朮ヲトシ用ル処ニモ此丸ヲ
兼用ク其処ハモハヤ大小柴胡ハ神湯ノ場ハ一段打
越テアルノ上ノ蟾蜍ノ方モ大小柴胡ノ場ヲ打越テ
有ク大小柴胡ノ場ニテハ蟾蜍ナトシカラス凡治セ

ル者く其場ヲ越テハ蟾蜍ナトシ假子ハナラヌ者く
○河カラス一味黒燒小兒疳勞疳癖俗ニ云疳ノ虫ニ
右一味末トシ白湯ニテ送下或為丸用モ亦可育嬰丸
モ亦良河鳥ノ入ル方モ彼是アル者ナレ凡疳嬰丸最
効アリ凡テ鳥ハヨクキク者く小兒羸瘦往來寒熱或
咳嗽或氣ミテカニメ善怒ク或大便秘或下利或凡シ
カミ米ヲ喫フコト好ミ或壁炭ノ如キ者ヲ喫スルコ
ト嗜ミ或盜汗或鼻ヲイライナトスルノ類ミナ此シ
俗ニ疳伝く右ノ証河鳥効アリ育嬰丸ハ小兒ノ疳ノ
藥ノ疳勞ニ及ントスル処ニモ用ク凡疳ヲ治ルノ方

麥クアリ伝ヘ凡此方第一純粹ニメヨキク若此丸シ
ノマヌ小兒ニハ黃栢薑陸ノ二味ヲ去リ黒燒ノ二味
斗リ味曾汁ニ相和シ用ス是余カ漫遊雜記鬼好菴ノ
味曾藥ヨリ取来リシ趣向シ此ハ丸シノマヌ片ノコ
ク黃檗薑陸ハ苦メ飲服シニクシカシ丸ニスル片
ハ二味テモ入ヘシ薑陸ハ胎毒ナトニヨキ者ク汁ノ
子ハ何ニテモヨキク○小兒ノ疳ニ雞肝ノ入ル方麥
クアリテ用テアリ而レ凡ドウ云者カ余ハ雞肝ノ丸
ヲ疳ニ用テミルニ未タハキクト効アル者ヲ不見ク
○疳ニ用ル藥ニ阿列ノ賣藥ニ藤右衛門藥伝アリ此

丸脾胃疔ニ用ニ脾胃疔ハ所謂疔ニテ腹ノフクレル者
 シ云々○所謂小兒ノ疔ノ虫ヤ疔旁ナトニ臭梧相蟲
 ヤヤナギノ虫ヤモツル莫莫ノ虫ナトシツケ焼ニメ薬タヒ
 ニ世俗專ラ用ルハ目ウナキアカ蛤ナトモ食ワス
 シ余モクサギノ虫其它ノ類病家ノ需メニ忘メ用シ
医彙說約疔門云食療
山蛤朮肉蟲臭梧相蟲
 倉通御池上ル処東側ニ取次賣弘処アリテ招牌出テ
 アリ此物近來東都ニテ疔癖疔旁ノ類ニ薬クヒニキ
 ツフハヤル由此物虫ノ名ハアレ氏平生ノ虫ニ非ス
 箱根ヨリ出ル山柝臭ノ類ニテ是ハ海中ヨリ出者ト

ミユ○粳米丸粳米一味為末糊丸 此方疔ニテ小兒
 大人ニヨラス米シカムヲ好ムニハ此丸ヲ用ハ効
 アリ以百草霜為衣○黄土丸 竈中黄土 一味極細
 末トナシ糊ニテ丸シ用ユ大人小兒土シカムヲ好
 ムモノニ用ユ

鷓鴣菜湯 方具
貴余

○是ハ蛇虫ニヨル者ノ所謂蛇癖ノ此モ用場ハ二道
 有テ癖疾ノ疔用ハ一道ノ其証腹ヲ候ニ蛇虫アリテ
 気分ムツカシガリイロク煩ヒシナスニ用ニ是ハツ
 カヒヨキ者ノ其場ヲ二段スギテ段々羸瘦モツヨ

疝旁ニテ百治効
ナク死ト決シタル
者ニテ一身羸瘦
ノモ腹滿ナラハ
紫丸ナトシ用テ
鷓鴣菜湯ニテ
生シアルヲアリ
紫丸ニ牡蠣ヲ加
用テ良伝傳モ
アレ氏ソレニ不
及モノシカシ牡
蠣モヨキモノト
ミユテ双紫丸
ニ入テアリ

クナリ往來寒熱咳嗽盜汗大氏勞狀具ル時用シコ、
ハ鷓鴣菜ノ用ニクキ者ク其目的ハ腹滿ノ片ニ痛ミ
厥ハ洪大子若ハチリツキ子アル者クコレタケカ先
鷓鴣菜ノ目的ノ外証ヲミテハナカク鷓鴣菜ノ用ニ
クキ者クコ、ニテハ多紫丸ヲモ兼用スルノ最初
ノ癖疾ノ片ハ鷓鴣菜ノミニテモ大氏ハヨキ者ナレ
氏コ、ニテハ斃レルニ近キ處故緩々ニメ居ラレヌ
ク故ニ斃レルヲ待ンヨリハ紫丸ヲ兼用メ撃テミル
シ此ホハ踏込ミシ療治シカシ是、ラノ處ハ段々
医ノ予ヲ經テ未テ不治上ニテノヲ故療治ノ出来ル

俗ニ疝ノ虫云フ
和ノ俗言ナリト思
ヒシニ丹臺玉按
卷四門ニ括虫
丹治小兒疝蟲
面黃肌瘦肚腹
膨下アリテ其方
大蝦蟇 人參
白朮 枳實 使
君子 針砂 胡
黃連 山查子
麥芽
右九味

モノノ扱次ニ紫丸ノヲシ云ニ凡疝癖ニ紫丸ヲ用ハ
虫癖ト食積ト反テ胎毒ニハアマリ不用ク虫ニ用
ルニハ上ニ云レ鷓鴣菜湯ノ片ハイツテモ兼用スル
ク又疝癖ニ一種平胃散ノ証アル者ク是通食ヨリ未
ル疝ク其平胃ヲ用處ニ紫丸ヲ兼用ク輕ハ平胃加
黄ニテスムクソノ飲食過度ヨリ未ル疝云ヲ判断ス
ルニハマハリ腹滿アリテ中脘ハリテ硬者ク蟾蜍ノ
腹滿ハ腹一面ニ大滿スル者ク飲食ヨリ未ハ中脘ノ
微滿メ硬者ク且外症ニテハ飲食ヲ減多ニ引キテ
食ヒタガハル者ク又紫丸ノ条ニ引タル千金ノ大便醋

臭モ参考ニナルル凡疴ニハ大小柴胡ト平胃ト紫丸
ノユリ処多クアル者ク平胃散ハ后世ノ方ナレバナ
ケレハナラヌ者ニテヨクキク薬ク大小承気ヤ厚朴
セ物ナトニモテモ足ラヌモノク東洋ナトモ平胃散
ヲヨク用タリ東洋ノ説ニ疴癖ニ平胃加大黄ノ証ア
リ伝テアリ是東洋ノ試効ク即紫丸ノ輕処ク飲食過
度ハ乳癖ヨリスル者ニテモ平胃ヤ紫丸ヲ用ク食更
ト乳味トニテ治方別アルニアラス此平胃加大黄ノ
処ヘ大小承気ナトノユクヲモアルヘキナレバコ、
テハ平胃散ハトウモ云ヘヌヨキ者ク疴ノ入故ニ大

ニ安排ヨキ者ク平胃ハ彼是用テ竟ヘアリ大人小兒
ヲ論セス飲食過度ヨリ来ル眼疾ニ用ユ其証ノ目的
ハ中焦不和メ中脘ニコリアル者ニモチユルク其眼
ヲ患ル症ハ赤眼痛若クハ目ニヤニナトコミテ煩ヒ
シナス者ニ用ク是用竟ヘク内障タチニテ中脘ニコ
リタル者ニモ此方ヲ用テ益効アルヘシト竟ユシカ
レバ平胃ノ内障タチノ者ニハ未タ試効セヌク右ノ
赤眼痛ト目ニヤニナトコミテ患ヲナス者ニハ試効
セリ又平胃散一身ノフキ出モノニ用テ効アリ其効
候ハ大人ニテモ小兒ニテモフキ出者クサナト登メ

右服下ニ凝ノアル者ニ用テヨク効アル者ニ中脘ニ
コリテツキ出ル者アルハ尚ヨカルヘシ因テ思ニ平
胃ハ常飲食ヨリ来ルノミノ者ニ用ニ非ス蒼朮ハヨ
ク瘡毒ヲ治スル者ニ予往年平胃散ノ一身ノフキ出
ナトノ瘡毒ニ効アルヲシキ、タリシカ其右ニ先斗
町ニ一婦人アリテ一身風ホロセノ如クフキ出ル者
大ニカユガリ煩躁ナトモアリタリ因テ初メ浮萍散
ヲ用シニ効ナクソレヨリ桂麻各半湯ヤ連克湯ヲ用
シニ効ナキ折フシ其婦風邪ニカカサレ熱ナトアリ
レ故ニ換金ヲ用タリシニ風邪除キタルハ勿論ノ

ニテ彼風ホロセノ如ク出テ大ニ癖モ悉ク愈タリ予
於是意ラクサキニ平胃ノ療毒ニ効アルヲシキケリ
此婦諸証愈タルハ不換金ハ平胃散ニ藿香半夏ノニ
味ヲ加タル方ナレハ此愈タルハ偏ニ平胃ノ合伍ニ
ヨルナルヘシト思シ故其右フキ出或ハ兒ノ頭瘡ナ
トニ用テミルニヨク効アルニ右服下ニツク者ニ用
ハ余カ用竟ク但目的ナシニフキ出ヤクサニ用テハ
ハツトメツマラヌ

○是蟲疔ニ用ク虫疔ノ候ハ凡シカニ鼻ヲイラヒ頭
痛乾嘔不愈往來寒熱腹痛下利ノ類アリテ果ノ蛇虫

ノ候ト見タラハ疳ニ不拘メ虫ヲ刷スレハ午際ニナ
ラルヲアル者ノ○小兒疳或蛇虫ニヨル者ニテモ熱
ノサメ難キ者熱ノモツレテ退キカヌル者ニ青黛蛤
粉ノ方ヨク効アル者ノ痰咳ナトアルハ益ヨシ無メ
モヨシ此方熱シ挫クタメニ用ク或又柴胡ノ症ナト
ノ場ニテ熱ノモツレテ不退者ハ其方ニ青黛一味ヲ
加用ク虫ニヨル熱ニテモ常ノ疳ニテモ何レ熱シ目
的ニメ用ク青黛ハヨク熱シクチクモノノ尚痰飲門
鷓鴣菜湯茶下ニ辨ス參者スヘシ

錢氏白朮散

方具泄
溼茶

○是ハ小兒ノ疳ニ廣ク用レ凡予カ用竟ヘハ平胃ノ
筋ニテ攻下スヘキ証モナク其片ノ外証ハ發熱咽喉
カハキ下利スル者ニ用ユ此ヘハヨクキク者ノ何レ
下利ハ主也上ノ平胃ノ処ニテ不治片ハ下利ツキテ
白朮散ノ証ニナリテ未ル者ノ此ヘ猪苓湯ナトシ用
テモトント間ニアフ又者ノ白朮散証ニテ不治片ハ
理中加附子ヤ真武湯ノ証ニナルモハヤ白朮散ノ
処ニテハ水気少ニアリテ足ノ甲ナトモハレル者ノ
扱平胃ノ次午ニ云ヘキナリ凡一通リ疳伝テ居ル
証ニ疳ニテナキ者アリ其症ハ黃胖ニ屬者ノ其候面

色青白動気タカフリナトスル者く是其目的く此ハ
 医者多ク白朮散ヲ用テ黄胖ノ処ヘハ思寄ラスメ居
 者く此証ハヤハリ本方ハ平胃散ニメ脾勞丸ヲ兼用
 メ黄胖ノ治ヲナスヘシツレニ附テ合点シタルア
 リ回春ニ快活丸トテ緑礬ノ入タル方アリテ疴ニ用
 テアリ
回春卷七疴門快活丸治小兒糞疴証及層瘦劑
 骨露如柴肚大青筋小便濁睡臥躁乱神氣昏沉
 常服健脾化積進食肥
肥是マハリ平胃ニ脾勞丸ヲ用ル
 肌其効如神方畧
 処ク龔廷賢モヤハリ疴トシテ黄胖ニハ気カツカサ
 リシトシユシカシ術ハ尽セシ者く又趙子昂ノ法帖
 シ者ニ快活丸ヲクレヨト云テ人ニ與フルニ書牘ア

小兒腹滿色青
 身軀懶墮ニ身
 如浮腫丸青或
 裂缺屬大人黃
 胖者柴平湯ヲ用
 用錢砂丸毓春
 圓小丹
 右世家ニテハ白朮
 散ヲ弘ク用柴胡
 処ヘモ用ク蛇虫ニ
 ヲルトシハ白朮
 散ニ海人草丁子
 シ加咳嗽アハ地
 骨皮桑白ヲ加
 宿食ヲ思トシレ
 ハ山查麥牙ノ美ヲ
 加ナトメ右世家ニ
 テハ白朮散一方
 ミテ疴ノ療治ヲ
 スマスホトノク

リ漢土ニテモ大分ヒロマリシ方トシユ
 ○此方或時ニ食ヲ吐スルヲモアリシカシ何レ下利
 ナケレハ不用ク右世家ニテハ吐利ニ不限メヒロク
 寒証ニ用レ斤余ハ其様ニヒロクハ不用ク此方下利
 カ目的ノ症ク下利アレハ多ク渴カツ者ク往來寒
 熱咳嗽腹痛ナトモアル者ク大棗主治ハ猪苓湯ニ近
 シ此症下利メ渴ナクシハ或古カワクトカ或古赤ク
 アレル者ク此方ハ右世ノ方ナレ斤再ラレヌ者ク且
 此方ハ服シヨキ者ニテハ柴胡マ小建中ノ類シノミ
 ニクカル者アルニ獨リ此方ノミハ服シヨク味ヨキ

二二六
 小兒腹滿色青

啓脾湯、処ヲ
理中湯、真武
湯ヲ用ル、ア
リ啓脾湯、ア
マリ多ハ不用

トテ飲ム小兒モアル

○方彙小兒泄瀉門回春ヲ引テ啓脾湯云アリ其方回春卷七

小兒泄瀉門出之而回春則察為丸名啓脾丸方彙則加姜枣為湯此湯方余モ用ク小兒

ノ疳疾ニテ下利スル者ニ用ク腹滿ノ有無ニハ不拘

〇脾疳湯方 人参 白朮 陳皮 訶子 茯苓

使君子 丁子 右七味水煎服 此方惠美ノ方ニテ

余モカリ用ル小兒疳ニテ腹滿ノ氣味アリテ下利

スル者ニ用ク

平胃散 方具傷食余

○前ノ鷓鴣菜湯ノ條下ニテ辨シタリ

紫九千金云腹中乳食不消不消則大便皆醋臭此欲為癖之漸也便将紫丸以微消之

○前ノ鷓鴣菜湯ノ條下ニ辨ス此ノ千金ノ主治驚癇

門ノ首條ニ論メアリ

毓嬰丸 以上二方並在別集

○既ニ前ノ一方ノ條下ニ於テ辨シタリ此丸疳一切

輕重凡ニ用ユ疳勞ニハ尚更用ク只癖斗リノ処ニテ

ハ不用ク此方小兒ニノミ用ユ大人ノ勞ニハ不用ク

此方胎毒ヨリ来ル者ニハ尚ヨキク柴胡ノ場ニテモ

建中ノ処ニテモ博ク用ク食癖ニヨリテ来ル疳ニハ

アマリ効ナキレシカレ疔毒アリテ食ヲ魚テ発ル者
アリナトスルハヤハリ食癖ノ処ヘモ用ク

灸章門

○灸ハ大小柴胡ハ神柴胡姜桂建中之湯ノ処ヘユク
レ鶴鳩菜平胃白朮散ノユク処ヘハ灸ハセヌ灸ハ
疔ニモ癖ニモスユルレ凡疔癖ニハ灸治至テヨキ者
レワケテ章門ヨキ者レ外ニモイロク疔ノ灸アレ疔
章門丸ヨシ章門ニ灸スレハ外ノ処ヘハスズレヨ
キホトノ者レ是ハ大人ノ積氣ヤ勞ナトニ灸フトナ
カフテ疔癖ノ灸ハ至テヨクキク者レ又疔ノ灸ハ九

灸點圖解云
章門一名畏平
又名駘膠又名
李昉在正殿神
闕之正橫李昉
下端

十一脾胃膽命ナ穴ナトニモ灸ク右ノ穴ヲ章門ニ添
テ灸レハ益ヨシ而疔章門ヲヨク灸スレハ一以敵萬
伝ホトノ者レ疔ノ灸妙伝モノイロクアレ疔章門ニ
コユル者ナキレ 播列北在家ニ疔医者トテ近國ヨ
リ兒ノ疔ヲヤム者ノ治ヲ請ニユクテ甚盛ニメ方今
名高ノ家レ其医ノ名ヲ松野一覺ト云其先祖ハ松野
與治右衛門伝百姓レ伝其一覺ノ疔ノ治ヲキクニ丸
藥ハ黄蘗楊梅皮胡黃連ナト入りテアリテ一通リノ
虫ノ丸藥レ其灸ハ即章門ニテ艾炷ヲ大ニメ五厘灸
ナト、云テスユルレ按ルニ五厘灸ナト、云テ灸ヲ

大ニスルハ全体ハヨカラヌヲナレズベテ小兒ハ
灸ハ大ニイヤカリヌ又サセヌモノ故艾炷ヲ大ニメ
壯數ヲ減メ僅ニ數壯ニメヌム様ニセシ者トミユ右
ノ松野ノ疝ノ治ヲナスモ必竟ハ章門ノ灸カ効アル
者ニ別ニ服藥ニ効アルニ非ト覺其松野ノ章門法ハ
ツ子ノ章門ノ穴ト違フテ腹ノ方ニヨリテアリ此大
小兒ノ疝癰ニ灸ス常ノ章門ヨリハヨク腹ニコタヘ
テ最ヨキ様ニ覺ユ某穴処ヲ予或人ヨリ傳ヲ得タリ
其法病人ヲ仰臥サセテ脇骨ヲ探リ沿テ下リ初メノ
肋骨ノ尖リタル骨ノ真下ニ点スルニ右ノ如スレハ

章門ヨリハ肋骨ノ三ツ程アカル処ニアタルニ又一
法ニ右ノ処ニ点シスルニハ花足ヲ折テ右ノ足ヲノ
ハシ右ノ方ノ身ヲ少シ舉ケ斜メニメオル片ハ腹ノ
下ニ大筋アラワル、者ニ其大筋ノ直上肋骨ノ直下
ニ点ス是即其穴也此法ニテモ前ノ法ニテモ点処大
小同シ処ナルモノニ

○凡疝癰ニハ章門ヲ主トス其它背部十穴ノ間ニ灸
ル何レ章門ヲ主トメ其它灸スヘシ而シ灸ハ形氣既
ニ脱メハ不可行ニ柴胡建中八神ノ処ナトニ灸ニ下
利ナトアリテ羸瘦ニ精氣ノ甲斐ナキ処ニ至テハ反

テ害アルク勞病條ニ崔氏ノ灸ノ説ヲ挙オキタリ參
考スヘシ小兒ノ疳ハ大人ノ勞ト同キ者ニテ勞病モ
形氣既脱メハ灸アリ、其場ハ大抵真武或桂枝人參
ノユク処シ

○小兒痿痺ニテ勞トナリ肌膚甲錯シ肉脱シツレヨ
リイロクノ証ヲナス者アリ俗ニ疳勞ト云者是ク是
ハ章門ニ灸メ最良ク只ブラクトメサシタル煩ヒモ
ナキ者ハ月ニ三次ホトツ、灸ク如此一年ホトモス
レハ壯健ニナル者ク當病ノ者ナラハ毎日一廻モニ
廻モスルク何レ能効アル者ク是ラハ藥ヨリ灸カ効

アル者ク大人ニハ章門ニテハ餘リ効ナシ大人ハ脊
際ニ灸スルヨシ今ノ匠勞症トシレハ熱ノ劇キニモ
灸ハ大ニ非ク可慎クシカシ前ニ云疳勞ナトノ症ニ
ハ往來寒熱ナトアリテモ灸シテヨシ灸ニテ寒熱モ
治ル者ク而レ疝下利アレハ灸ハアリ、凡テ勞タチ
ノ者下利アルニ灸スルハ安排ノアリキ者ク

○諸疳ノ内ニテ治シニクキ者ハ渴疳ク渴疳ハ治法
ノナキ者ニテ難治多ハ死ニ至ル者ク予往年此証ヲ
一人ニタリ此症ハ白虎ノ類モ効ナキ者ニテ其病者
ハ終ニ死シタリ其右渴疳ノ一方ヲ傳フコレニテハ

効アル由其方麦門浮石ニ味散服ス篋中秘録瘡瘰之条ニ出此方

右ノ病人死后オクレテ傳ハリシ故親シクハ試ミサ

レ此効有リシキケリ渴瘠ハ痢疾ニテ渴ルト同クド

ウモ仕極ノナキ者ハ痢疾ノ渴ナトモ白虎ナトハト

ントキカ又者ハセイク白頭翁湯ノアルノミクナレ

凡渴ツヨキハ白頭翁ナトモナカク届カ又者ハ又渴

瘠ノ方トテハ古来別ニ方ナキ

○小兒ニ白睛ノ青ミタル者アリ是瘠ノ候ク此ヲ打

奪テオク片ハ瘠瘵瘠勞癩癩ナトニナル者ハ是ニハ

隨証方柴胡ニテモ五物紅花ニテモ青黛ヲ其内ヘ加

用ヘシ何レ青黛ヲ用レハ治ル者ハ小兒ノ白睛ノ青

ミタルト山根ノ青ミタルトハ他ニ瘠ノ候ナク凡瘠

トシテ治スヘシ山藟湯ヨリ青黛ヨク効アリナレ凡

山根ノ青ミタルニハ青黛ヲ加ルヲナキハ山根ノ青

ミタルモ瘠ノ候トシ且テ山藟湯効アリ山藟一味ニ

テモ良クシカレハ虫ノ候ニテハナキトシユ

○小兒ニ目ノ珠兩方ヨリ内眥ノ方ヘヨル者アリ俗

ニ是ヲ目ノツル云是多クハ胎毒ニヨル者ハ胎毒ヲ

サハク藥方ヲ用ハ大抵ハ平服スル者ハ一年ホト経

タル者ハ治ルハ二年位迄ハマダナシルハモハヤ久

ク年ヲ経タルハ不治者ハ是ハ疳眼トハ異ク疳眼ハ
目ニ皺紋ヲ見ハス者ハ今此ニ云目ノツル症ハ皺紋
ナキ者ハ疳眼ハ治方臭胆ノ入ル丸ヲトシ用ク右ノ
目ノツル者ハ胎毒ヲ解スル手段一筋ハ一女子アリ
十餘歳去年二月ヨリ目ツリ其症予足レキツル余竜
胆湯ニ兼テ青丸ヲ用タリ右ノ目ノツルハ大抵内皆
ニヨル者ニテ外皆ヘモヨラス上ヘモツラヌ者ハ
○治疳眼方 雞肝一具 右以酒一中盞薄味噌汁ニ中盞
三盞煮雞肝為膏七日服盡夏日易腐敗不終七日而服
尽 毓春園一冊
ナルホト疳眼ニハ雞肝ヨキモノハ

○小兒撫鼻或鼻下爛或時々腹痛或喜啞或面黃或飲
食進或否或大便不調或心氣不輕等証多為疳初候當
此時早施其治佳也毓春園
小冊

○疳勞初候一日二三度腹痛或頭痛或目下黑飲食如
常漸瘦如灯油滅脉未微細數者可急施治同上

○疳勞脉微細數切之恰如木葉散肌熱如撫火桶肌膚
甲錯腸肉脱落五心煩熱頤骨赤口中乾燥動悸高腹脹
小腹塊声嘔啞血耳聾骨痛下利脱肛等症一無可治是
真疳勞同上

