

王氏增補醫學正傳目錄卷之三

痢門

論

脉法



丹溪方法

芍藥湯

黃芩芍藥湯

黃連湯

芍藥黃連湯

大黃湯

香連丸

益元散

神効參香散

丹溪活套

和中飲

三根飲

二防飲

禁口痢法

嘔吐門

論

脉法

丹溪方法

藿香安胃散

和中桔梗湯

木香散

荆黃湯

檳榔散

清鎮丸

白朮湯

金花丸

紫沉丸

小半夏湯

薑汁半夏湯

藿香平胃散

胃苓湯

黃連六一湯

丁附治中湯

加味二陳湯

丁香安胃湯

茯苓半夏湯

丹溪活套

噎膈門

論

脉法

丹溪方法

瓜蒌實丸

寬中進食丸

人參利膈丸

丹溪活套

潤腸膏

大力奪命丸

飢逆門

論

脉法

丹溪方法

陳皮竹茹湯

橘皮半夏生姜湯

六君子湯

丹溪活套

飢逆法

吞酸門

脉法

丹溪方法

萊菔丸

加味平胃散

參茸丸

藿香安胃散

加減二陳湯

三因麴朮丸

吞酸方

雜愛門

論

脈法

丹溪方法

三聖丸

木連丸

軟石膏丸

麴朮丸

痞滿門

論

脈法

丹溪方法

厚朴溫中湯

木香順氣湯

痞挾瘀血方法

五印補醫學正傳 卷之三目錄 七氣湯

大消痞丸

失笑丸

消痞湯

黃連消痞丸

黃芩利膈丸

丹溪活套

腫脹門

論

脉法

丹溪方法

禹餘糧丸

潔矩三和湯

紫蘇子

木香順氣湯

中滿分消丸

廣木清聖湯

半夏厚朴湯

破滯氣湯

草豆蔻湯

葶藶木香

白朮木香散

二氣散

牽牛丸

三花神祐丸

鷄屎醴飲

丹溪活套

又鷄屎飲

經驗桃奴丸

又經驗方

積聚門

論

脉法

丹溪方法

三聖膏

琥珀膏

阿魏丸

大溫中丸

小溫中丸

婦人腹中有塊說

婦人血塊

婦人血塊如盤

塊在皮裏膜外方

倒倉法

廣木潰堅湯

半夏厚朴湯

三因散聚湯

大七氣湯

千金補石丸

局方妙香丸

道氣枳壳丸

木香三稜丸

草豆蔻丸

肥氣丸

伏梁丸

痞氣丸

息奔丸

奔豚丸

虛損門

論

脉法

丹溪方法

老人調養方

四君子湯

四物湯

八物湯

六君子湯

十全大補湯

大補陰丸

補陰丸

加味虎潛丸

滋陰大補丸

補腎丸

補天丸

六味地黃丸

人參固本丸

人參膏

補中益氣湯

益胃升陽湯

芪附湯

參附湯

茯神湯

補氣湯

千金延壽丹

班龍丸

桂枝龍骨牡蠣湯

秘方

王氏補醫學正傳三卷目錄終

勞極門

論

脉法

方法

二十四味連心飲

青蒿飲子

白蠟塵治虫

鬼哭飲子

附散方

天靈蓋散

麝香散

取屍虫方

神授散

無比丸

取勞虫方

紫河車丸

紫胡散

驚甲散

貫衆丸

輕骨散

蛤蚧散

蛤蚧飲子

五蒸湯

丹溪活套

灸四花穴法

并附圖

王氏補醫學正傳三卷目錄終

痢症

論

內經曰洩而便膿血知氣行而血止也

愚按經文洩字下必缺一澁字洩卽尿也洩澁而便膿血者言病因也蓋血因氣滯而大小二便俱不利耳氣行而血止者言治法也故河間闡明其說所謂和氣則後重自除而用木香枳榔枳殼等藥以和之卽此意也

河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰後

痢症

論

內經曰溲而便膿血知氣行而血止也

愚按經文溲字下必缺一澁字溲即尿也溲澁而便膿血者言病因也蓋血因氣滯而大小二便俱不利耳氣行而血止者言治法也故河間闡明其說所謂和氣則後重自除而用水香檳榔枳殼等藥以和之即此意也

河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰後

重則宜下。腹痛則宜和。身重則除濕。脉弦則去風。膿血稠粘。以重藥竭之。身冷自汗。以熱藥溫之。風邪外束。宜汗之。驚澹爲痢。宜溫之。又曰。在表者發之。在裏者下之。在上者湧之。在下者竭之。身表熱者。內踈之。小便澁者。分利之。又曰。盛者和之。去者送之。過者止之。兵法云。避其來銳。擊其惰歸。此之謂也。夫古方以瀉痢混同論治。朱紫混淆。殊不知瀉屬脾而痢屬腎也。丹溪曰。先水瀉而後膿血者。此脾傳腎。賊邪難愈。先膿血而後水瀉者。此腎傳脾。微邪易愈。是皆先哲之格言。以爲後學之繩墨。醫者其可不詳究乎。

脉法

脉經云。腸澼下膿血。脉沉小流連者生。洪大數身熱者死。又曰。腸澼筋攣。脉小細安靜者生。浮大而緊者死。

方法

丹溪曰。痢赤屬血。自小腸來。白屬氣。自大腸來。原病式曰。痢爲濕熱甚于腸胃。怫鬱而成。其病皆熱。

證也。俗以痢白爲寒，誤矣。如熱生瘡癰而出白膿，可以白爲寒乎？陰陽水火一高則一下，一盛則一衰。若以白爲寒，赤爲熱，則兼赤白者，乃寒熱俱甚於腸胃之間而爲病乎？况下迫窘痛，小便赤澀而痢白者，必多有之，爲熱明矣。世有用辛熱藥而愈者，蓋辛甘發散，熱主出行，故病微者則鬱結開通，氣和而愈。若病甚者鬱結不開，其病轉加而死。故治痢者必用寒以勝熱，苦以燥濕，微加辛熱佐之，以爲發散開通之用。如此則固無不効者。

仲景治痢可下者，悉用承氣等湯，加減下之大黃之寒，其性善走，佐以厚朴之溫善以行滯，氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃，滋潤輕快，積行卽止。局方用砒丹巴硃類聚成丸，其氣悍暴，其體重滯，積氣已行而毒氣未消，猶暴賊手持兵刃使之徘徊瞻顧于堂奧之間，縱有愈病之功而腸胃清純之氣寧無損傷之患乎？可溫者乃用姜附溫之，局方例用熱藥爲主，澁藥爲佐，用之于下利清白者，猶可其裏急後重，經所謂

下迫者皆屬火熱所為加以澀熱之劑非殺而何。初得一二日間元氣未虛必推蕩之。此通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯下後看氣血調理氣用參朮血用四物五日後不可下。此亦大槩言之氣血弱者雖一二日亦不可下。實者十餘日後亦有下之而安者。

腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱者加黃柏。

腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間以苦梗發之。

用痢藥一云實則可下虛則以苦梗發之。

初下痢腹痛者用溫藥薑桂之屬切不可驟用參

朮縱氣虛胃虛皆不可用。

後重者積與氣墜下之故蕪升蕪消尤當和氣木

香檳榔丸保和丸之類。

身熱挾外感者不惡寒用小柴胡去人參發熱惡

寒身首俱痛此為表證宜微汗和解又蒼朮川

芎陳皮芍藥甘草生姜煎服。愚每以上二方

并治痢之挾外感者亦多獲奇效也。

發熱不止者屬陰虛用寒涼藥必蕪溫藥升藥

大孔痛

即肛門也

因熱流于下也木香檳榔芩連加炒

乾姜

仲景法治大孔痛一日溫之一日清之若久病身

冷自汗脉沉小宜溫之暴病身熱脉洪大宜清之

下血者宜涼血活血當歸黃芩桃仁之類或用朴
稍有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主血故
也有濕傷血宜行濕清熱

濕熱下痢小便澀少煩渴能食脉洪大而緩腹痛

後重桂苓甘露飲送下保和丸二三十粒

濕多熱少脾胃不和食少腹痛後重夜多利下胃

苓湯送下保和丸二三十粒

氣虛面色痿黃枯白色人困倦痢頻并重而痛不

食脉細弱或微汗時出黃芪建中湯送下保和

丸二三十粒

濕熱為痢不渴者建中湯加蒼朮茯苓下保和丸
脾胃不和食少腹脹痛後重藤弦宜平胃散加芍

藥官桂葛根白朮茯苓下保和丸

下痢血氣大虛腹痛頻後重不食或產後得此證
可用四君子湯外加當歸陳皮下保和丸二三
十粒

下痢白積者用芍藥湯加白朮陳皮甘草滑石桃
仁

下痢赤積身熱益元散加水通炒芍藥炒陳皮白
朮煎湯送下保和丸加黃芩丸

久下痢已數日不能起床不食疲弱之甚者

人參 五分 白朮 一錢 黃芪 五分

當歸 七分 芍藥 一錢 炙甘草 三分

御米壳 三分 醋炒 地榆 五分 木香 三分

硝砂 五分 陳皮 一錢 升麻 三分

白豆蔻仁 三分 澤瀉 五分

每服水一盞半煎去粗溫服

如下墜異常積中有紫黑血而又痛甚者此為死

血證用桃仁細研及滑石行之

血痢久不愈者屬陰虛四物為主

下痢如荳汁者濕也蓋脾胃爲水穀之海無物不受常蒸四臟故有如五色之相染當先通利此迎而奪之之義如虛宜審之

古方用厚朴專爲行凝滯之氣滯氣稍行則去之枳壳雖少緩亦不宜久服只宜以陳皮和藥亦可也

古方多用粟壳治嗽與痢但要先出病根乃收功後藥也

如力倦氣少惡食此爲挾虛證宜用白朮當歸身尾甚者加人參陳皮補之虛回而痢自止

如久痢體虛氣弱滑泄不止亦當以澁藥止之訶子肉豆蔻白礬半夏牡蠣之類擇而用之然須以陳皮爲佐恐大澁亦能作疼又甚者須灸天樞氣海穴法見前霍亂門

如痢已減十之七八穢積已盡糟粕未實用炒芍藥炒白朮灸甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸二十粒此丸性多澁滯有去濕實腸之功若滯氣未盡除者不可遽用

如痢後糟粕未實或食粥稍多或饑甚方食腹中作疼以白米陳皮二味煎湯和之自安

如氣行血和積少但虛坐努積此爲無血證倍用歸身尾芍藥生地黃而以桃仁泥佐之陳皮和之血生自安

如痢後腸弱漸細小用蒼朮二兩白芍藥龜板各二兩半黃柏五兩粥糊爲丸以四物湯加陳皮甘草煎湯送下

如口熱甚故也用黃連人參煎湯終日呷之如此則再強飲但得一呷下咽便好又用田螺搗盪臍中以引下其熱胃中熱結當開以降之人不知此多用溫藥甘味以火濟火以滯益滯也亦有誤服熱毒之藥犯胃者當推明而祛其毒用糞蛆焙乾爲末清米飲調下一錢七甚效

多有昔疫作痢傳染相似宜推明運氣之勝復以治之

小兒痢疾用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃

仁紅花白痢加滑石末同煎

一小兒八歲下痢純血作食積治蒼朮白朮黃芩
白芍藥滑石茯苓甘草陳皮神麩煎湯下保和
丸

凡下痢純血如塵腐色者如屋漏水者大孔開如
竹筒者唇如朱紅者俱死 如魚腦髓者身熱
脉大者半死半生經所謂身涼脉細生身熱脉
大死是亦大槩言之耳不可一途而論也

一方治熱痢下痢用大黃黃連黃芩黃栢枳壳白

芍藥川歸滑石甘草桃仁白朮等分神麩糊丸
如梧桐子大每用白湯下五六十丸

青六九治血痢神効

溫六九治痢及水泄俱効 二方並見泄瀉門

固腸丸治濕熱下痢大便下血去腸胃陳積之後用
此以燥下濕而實大腸

樗根白皮 不拘多少
細切畧炒

右一味研為末米糊為丸如梧桐子大每服三
五十丸陳米飲送下或用炒芍藥炒白朮灸甘

草陳皮茯苓煎湯下

芍藥湯 行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥是也

白芍藥

二錢

當歸尾

黃連

黃芩

各一錢

大黃

七分

甘草

枳榔

木香

桂心

各五分

每服水一盞半煎空心服 如初重窘迫甚者倍大黃加芒硝一錢 如痞滿氣不宣通加枳實一錢 如膿毒下血加黃柏一錢

黃芩芍藥湯

治瀉痢腹痛或後重身熱久而不愈

脉洪數者及膿血稠粘者

黃芩

芍藥

甘草

每服水一盞半煎溫服腹痛甚加桂二分稍熱服之

黃連湯

治大便秘下血在後腹中不痛謂之濕毒

黃連

當歸

各二錢

每服水一盞半煎去粗溫服

芍藥黃連湯

治大便秘後下血腹中痛者謂之熱毒

芍藥

川歸

黃連 各一錢五分

大黃 三分

桂心 一錢五分

甘草 三分

每服水一大盞煎七分溫服

大黃湯

治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度脉沉實人不甚困倦者或初得腹痛甚者窘迫不安者

不安者

大黃 一兩

右一味作一服用好酒二大盞浸半

盞半去粗分作二服頓飲之如痢未止再

服後以芍藥湯和之又再服黃芩芍藥湯以徹

其邪此乃蕩滌邪熱之劑用酒煎者蓋欲其上

至頂巔外徹皮毛也

香連丸

治下痢膿血赤白相雜裏急後重

黃連

二十兩

吳茱萸

十兩各以好酒拌濕同把去炒去茱萸

木香

四兩八錢不見火

右為細末醋調麩糊為丸如梧桐子大每服三

五十九丸清米飲送下 一方加石蓮肉半斤治

噤口痢尤佳

益元散 此為治痢之聖藥也其功不能盡述

桂府膩白滑石 六兩 粉甘草 一兩炙

右為細末每服三錢用白水無時調服

神効參香散 治痢日久穢積已少腹中不痛或痛

亦微不後重窘迫但滑瀉不止乃收功之後藥也

粟殼 去稂蒂蜜炙一兩二錢 陳皮 一兩三錢 肉豆蔻 麩裹煨四錢

茯苓 去皮 白扁豆 炒各四錢 木香

人參 各二錢

右為細末每服一錢七清米飲食遠調下

一方治久泄痢及久嗽神効

用瞿粟種時或重陽日中秋夜其花大而子多

種訖以竹掃帚掃之花即干瓣如兩手重疊撒

種則重疊開花其子與壳作散湯煎服立止

白龍丸 治泄痢并瘡毒大小便閉喉痺咽痛皆有

神効

巴豆肉 五錢 白滑石 一兩

共為末麩糊為丸如菜豆大看人大小厚薄或

十五六丸或二三十丸食積氣結有餘腹痛

泄痢淡薑湯下瘡毒冷酒下大小便閉冷水下
咽痛冷茶酒俱可下

溪活套云痢疾乃外感兼內傷之候也須分表裏
治之在表者必惡寒發熱身首俱痛宜以小柴胡
湯去人參棗子加蒼朮川芎陳皮生芍藥微汗以
散之在裡者必後重窘迫腹痛下積早宜以大小
承氣河間酒煎大黃湯之類下之餘邪未盡更以
芍藥湯香連丸之類以徹其邪穢積已盡而更衣
未息者此大腸不行收令故也宜以固腸丸參香
散之類以止澁之噤口者須詳證按法調治切不可
輕用粟殼肉豆蔻訶子之類以遏之殺人於反

掌之間也但凡痢證不問輕重若邪氣正盛而以粟殼之類止遏之雖不死亦成休息痢二三年不能愈也又不可輕用巴豆牽牛等熱毒之藥攻之蓋病因熱毒又得熱毒之劑以火濟火不死何待祖傳經驗秘方和中飲 治痢疾不分赤白久近服之無有不安者但發熱噤口不食者不可服

陳皮

白朮

茯苓

芍藥

草菓仁

甘草

陳倉米

砂糖

粟殼

烏梅 一箇

每服加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞去粗溫服

經驗三根飲

治休息痢年久不愈者其効如神

五倍木根

蒼耳草根

臭樗木根

刮取白皮

右各等分細切每服七錢重加生姜三片大棗一枚大黑豆三十六粒糯米四十九粒水二盞煎去粗溫服

經驗二防飲

治痢後不謹感冒寒濕或涉水履霜

以致兩足疼痛如刀剝虎咬之狀膝臍腫大不能行動名鶴膝風此藥神効

人參

白朮

黃芪

各一錢

甘草

炙五分

川歸

川芎

芍藥

熟地黃

各一錢

防風

防己

羌活

牛膝

各七分

杜仲

姜汁拌炒

草薢

各一錢

附子

童便浸三日去皮臍七分冬月一錢

每服加生姜三片大棗二枚水二盞煎去粗空

心溫服

仁齋云下痢噤口不食

虛蓋亦熱氣閉膈

心胸間所致也俗用木香則失之溫用山藥則失

之閉惟真料參苓白朮散加石菖蒲末以道地粳

米飲多年陳倉米尤佳溫調下或人參茯苓石蓮

子肉入些少菖蒲為末與之胸次一開自然思食

其參苓白朮散本方該有確砂或少入木香見

內傷門

一方治痢月餘服藥少愈穢積已盡但糟粕不食晝

夜五六次入廁蕪脫肛不安又半月諸藥不効
用池塘中鱉一箇如法修事多用生姜米糲作
羹入沙糖一小塊不用鹽醬熟煮吃一二碗三
日不登廁大腸自此而實肛門亦收而不脫

嘔吐

論

內經曰諸嘔吐酸暴注下泄皆屬于火東垣曰夫嘔
吐噦三者俱屬于胃胃者總司也以其氣血多少爲
異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血
俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲血
病也噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物氣病
也河間曰胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也吐證
有二氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通于

天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣
主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是
故上焦吐者皆從于氣氣者天之陽也其脉浮而洪
其證食已卽吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸而發
痛其治當降氣和中中焦吐者皆從于積有陰有陽
食與氣相假爲積而痛其脉浮而長其証或先痛而
後吐或先吐而後痛治法當以毒藥去其積枳榔木
香行其氣下焦吐者皆從于寒地道也其脉沉而遲
其証朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通

法治當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便漸通復以
中焦藥和之不令大便秘結而自愈也外有傷寒陽
明實熱大甚而吐逆者有內傷飲食填塞太陰以致
胃氣不得宣通而吐逆者有胃熱而吐者有胃寒而
吐者有久病氣虛胃氣衰甚聞穀氣則嘔噦者有脾
濕大甚不能運化精微致清痰留飲鬱滯上中二焦
時時惡心吐清水者宜各以類推而治之不可執一
見也

脉法

脉經曰嘔而脉弱小便復利身有微熱厥者難治
跌陽脉浮者胃氣虛寒氣在上暖氣在下二氣相
爭但出而不入其人卽嘔而不得食恐怖卽死
寬緩卽瘥

脉陽緊陰數其人食已則吐陽浮而數亦爲吐
寸口脉緊而芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏脉
爲陰結而遲其人則噎關上脉數其人則吐
脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變
爲反胃寒在于上鑿及下之令脉反弦故名曰
虛

寸口脉微而數微則無氣
則榮虛榮虛則血
不足血不足則胸中冷故吐

方法

丹溪曰胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子姜炒
黃連生薑煎服

凡嘔吐者切不可下逆之故也

有久病吐者胃氣虛不納穀也生薑人參黃芪白
朮香附治之凡痞滿短氣而嘔宜補中氣止可

用調中益氣湯

肝火出胃逆上嘔吐抑青丸

方見火門

夏月嘔吐不止五苓散加姜汁入湯調服

吐重而嘔用黑錫炒成灰楨榔末米飲調服

惡心吐清水者有熱有痰有虛皆用生姜隨證佐

藥治之

胃中有熱者二陳湯加姜汁制炒黃連黃芩枳虛

者加人參白朮又云胃虛弱嘔者二陳湯加砂

仁藿香白朮

痰飲爲患或因多食生冷脾胃不和以致嘔吐惡

心或頭眩或胃脘懊懣不快或發寒熱二陳湯

加丁香烏梅生姜煎服心下痞而痛者加草豆

蔻仁

痰熱惡心嘔吐氣盛者道痰湯加縮砂姜炒黃連

竹茹

藿香安胃散

治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐惡

心者

藿香

人參

陳皮

各一錢

丁香 五分

每服水一盞煎至七分溫服

和中桔梗湯 治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而

洪宜先和中

桔梗 一錢五分

半夏麴 二錢

陳皮 去白一錢

枳實 炒黃一錢

白茯苓 一錢

白朮 一錢五分

厚朴 姜汁拌炒一錢

每服水一盞半煎至一盞去渣取清汁調木香

散二錢空脾胃服三服後氣漸下吐漸止然後去

木香散加芍藥二錢黃芪一錢半煎服病愈則

已如大便燥結食不盡下以大承氣湯去其積

微下之再服前藥補之如大便復結又依前微

下之

木香散

木香 檳榔

右各等分爲細末前藥調之服

荆黃湯 治暴吐上焦熱氣所衝脉浮而洪者

荆芥穗 五錢 人參 二錢五分 甘草 一錢

大黃 一錢五分

每服水二鍾煎去粗調棋柳散二錢空心服

棋柳散

棋柳 二錢

木香 一錢五分

輕粉 少許

右為細末用前藥調服為丸亦可用水浸蒸餅

丸如小豆大每服二十九食後服

潘銀丸

治上焦吐頭痛發熱有汗脉弦

柴胡 二兩 去芦

黃芩 七錢五分

甘草 五錢

半夏 五錢

青黛 二錢五分

人參 五錢

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服

五十九丸生姜湯食後送下

白木湯

治胃中虛損及有痰而吐者

半夏麩 五錢

白木 二錢

棋柳 二錢五分

木香 一錢

甘草 一錢

茯苓 二錢

右為細末每二錢生姜湯食前調下

金花丸

治吐食脉弦者肝乘于脾而吐乃由脾胃

之虛宜治風安脾

半夏 湯泡七次一錢

棋柳 二錢

雄黃 一錢五分

右爲細末姜汁和蒸餅爲丸如梧桐子大小兒
丸如黍米大生姜湯送下從少至多漸加服之
以吐止爲度無羈絆于脾故飲食自下

紫沉丸 治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而
有痛宜服此藥

半夏麩 二錢

烏梅肉 二錢

代赭石 三錢

杏仁

去皮尖另研一錢

砂仁 三錢

丁香 二錢

沉香

一錢

檳榔 二錢

木香 一錢

陳皮

五錢

白豆仁 五分

白朮 一錢

巴豆霜

另研五分

右爲細末入巴豆霜和勻醋麩糊爲丸如黍米
大每服五十九食後生姜湯下吐愈則止小兒
另丸如芝麻大治小兒食積吐食亦大妙

小半夏湯

治陽明傷寒之嘔穀而嘔吐不已者

半夏

湯泡七次一兩

生姜

二錢

每服水三盞煎去粗分作三服服之

生薑汁半夏湯

治胸中似噎不喘似嘔不嘔似噦

不噦徹心憤憤然無柰者

王氏增補醫書卷之三
半夏 湯泡洗七次一兩

每服水一盞半生薑自然汁半盞同煎至一盞

溫服 仲景曰嘔多雖有陽明證慎不可下

孫思邈曰嘔家多服生薑乃嘔家之聖藥也氣逆者以辛散之故以生薑爲主治之

藿香平胃散 治內傷飲食填塞太陰嘔吐不已

藿香 一錢

厚朴 薑制 一錢

蒼朮 一錢

陳皮 一錢

甘草 炙三分

砂仁 五分研

神麴 五分炒

每服加生薑五片大棗一枚水一盞半煎去粗

溫服

胃苓湯 治證同前

平胃散加五苓散加薑棗水煎服之

黃連六一湯 治因多食煎燻燒餅熱麴之類以致

胃脘當心而痛或嘔吐不已漸成反胃

黃連 六錢

甘草 炙一錢

每服水一大盞煎至七分去粗溫服

丁附治中湯 治胃傷寒冷之物致心腹疴痛而嘔

噦不止

人參 五分

白朮 一錢

乾薑 一錢

甘草 炙三分

陳皮

青皮

丁香 各一錢

附子 二錢

右細切每服加生薑五片大棗二枚水一盞半

煎去粗溫服

加味二陳湯 治胃中有伏火膈上有稠痰時常胃

口作痛及惡心吐清水不快

陳皮 去白 一錢

半夏 泡一錢 五分

茯苓 一錢

甘草 炙三分

梔子 炒一錢

黃連 姜汁拌炒 一錢五分

川芎 一錢

白朮 一錢

乾姜 炒五分

蒼朮 一錢

香附 一錢

牡荊子 炒另研 一錢半

挾虛者加人參 一錢

每服水二盞加生薑三片煎至一盞稍熱服如

胃口痛甚入生薑自然汁一合和勻服

丁香安胃湯 治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香 五分

吳茱萸 一錢

草豆蔻 一錢

黃芪 二錢

人參 一錢

甘草 炙五分

柴胡 五分

升麻

當歸身

陳皮 各五分

黃栢 二分

蒼朮 一錢

每服水一大盞煎七分食前溫服

茯苓半夏湯 治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐風

邪羈絆于脾胃之間當先實其脾土

白朮 一錢

茯苓 一錢

半夏 一錢

神麩 炒一錢

橘紅 七分

天麻 七分

麥蘖麩 炒黃色一錢二分

每服水一盞半生薑五片煎熱服

丹溪活套云胃中有熱膈中有痰令人時常嘔吐清

水作噎氣吞酸等證用二陳湯加薑炒黃連梔子

蒼朮川芎香附砂仁神麩山查少加木香以行滯

氣加姜水煎服 久病虛者加人參白朮 胃寒

者加益智草豆蔻乾姜桂心之類去黃連梔子又

甚者加丁香附子 如脇痛或脾痛關脉弦嘔吐

不已此木來土之分也本方加人參白朮升麻柴

胡青皮芍藥川芎砂仁神麩之類 如時常吐清

水或口甘不喜食冷涎自下而湧上者此脾熱所

致也本方加白朮芍藥升麻土炒苓連梔子神麩
麥芽乾生薑或丸或煎皆可 如時常惡心吐清
水心胃作痛得食則漸止飢則甚者此胃中有虵
也本方加苦練根使君子煎服即愈或用黑錫灰
楨榔末等分米飲調下

一方治婦人年將三十產後因食傷致胃虛不納穀
四十餘日矣聞穀氣則惡心而嘔聞藥氣亦嘔用
人參 白朮 茯苓各一錢 甘草二分 陳
皮藿香 砂仁各五分 炒神麩一錢十年以

上陳倉米一合順流米二大白盞煎沸泡伏龍
肝研細攪渾放澄清取一盞加薑棗同煎前藥
至七分稍冷服此藥遂納而不吐別以陳倉米
煎湯時時與之日進前藥二三服即日食如常
自此安矣

一方治咳逆以乾柿燒灰酒調服

噎膈

論

內經曰三陽結謂之膈子和云三陽者大小腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脉燥大腸熱結則不能圍膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉塞下既不通則反而上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下降而上行也故經又曰少陽所至爲嘔湧噎食不下此理明矣又先哲論膈噎反胃大率以血液乾槁其或咽喉窒塞食不能下其槁在吸門或

噎膈

食下則胃脘當心而痛須臾吐出食出痛止其槁在
賁門此皆上焦之膈噎也其或食物可下良久復出
其槁在幽門此中焦之膈噎也其或朝食暮吐暮食
朝吐其槁在闌門大小腸之間此下焦之膈噎也雖
然亦有斯須輕病而爲鑿所誤者丹溪論之詳矣謂
夫氣之初病其端甚微或因些少飲食不謹或外冒
風雨內傷七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或
資稟充實表密無汗或性急易怒相火上炎以致津
液不行清濁相干惟氣之爲病或痞或痛或不思
或噫腐吞酸或嘈雜痞悶醫者不求其本便認爲寒
遽以辛香燥熱之劑投之時暫得快以爲神方厚味
仍前不節七情反覆相侵舊病被劫暫門濁液易於
攢聚或半月或一月前證復作如此延蔓自氣成積
自積成痰此爲痰爲飲爲吞酸之由也良工未遇謬
藥又行痰挾瘀血遂成窠囊此爲痞爲痛爲嘔吐膈
噎反胃之次第也鑿者尤謂虛而積寒非尋常草木
可療竟以烏附助佐丹劑專意服餌積而久也血液
俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物

難入間或可入食亦不多名之曰噎其槁在下與胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便秘小若羊屎然名雖不同病出一體又曰噎生於血乾血陰也陰主靜內外兩靜則臟腑之火不起而金水二臟有養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噎之有醫者當知此意不可妄以燥熱之劑以火濟火則何以異刺人而殺之也慎之慎之

脉法

脉經曰寸緊尺澁其人胸滿不能食而吐吐止者爲下之故不能食誤言未止者此爲反胃故尺爲微澁也

寸口脉緊而芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏脉爲陰結而遲其人則噎閉上脉數其人則吐脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變爲胃反寒在於上醫反下之令脉反弦故名曰虛跌陽脉浮而澁浮則虛澁則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而澁其病難治

王以培補醫學正傳 卷之三
脈瀆而小血不足 脈大而弱氣不足

方法

丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰

戴氏曰氣虛者脈必緩而無力血虛者脈必數而無力痰者寸關脈必沉或伏而大有氣滯結者寸關沉而瀆

張鷟峰曰噎當是神思間病惟內觀以自養可安此言深中病情

晨如年尿者不治大腸無血故也年高者不治年

五十餘則不可治 戴氏曰氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死不治

治法用童便韭汁竹瀝姜汁牛羊乳一本有氣

虛入四君子湯血虛入四物湯切不可用香燥

藥宜薄滋味

一法用黃連三錢薑汁炒 山查肉二錢保和丸二錢

同為末糊丸麻子大胭脂胚子為衣人參湯入

竹瀝下五十九

一方用馬兜兒燒存性陳米湯調服即野田瓜地 方多有原木

書馬劄
兒誤也

一云馬鮑兒燒存性一錢好棗肉四枚平胃散二錢溫酒調服食即可下然後隨病源調理

一方用吳茱萸黃連貝母瓜蒌子牛轉草丸服

一方用韭汁二兩牛乳一盞生薑半兩搗汁和勻
頓服効

有氣結者用開道之劑有陰火上炎者作陰虛治
有積血者當消息去之韭汁能下膈上瘀血
古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾

薑以養血粟米以實胃蜜以潤燥薑以去穢有
治寒者必為當時有實因于寒者用之也挾寒
者間或有之今人悉因痰氣久誤于醫傳變而
成其無寒也明矣

瓜蒌實丸 治膈噎胸膈痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蒌實

去壳
別研

枳殼

去穢
麩炒

半夏

湯泡
七次

桔梗

各
一兩

右為細末薑汁米糊為丸如梧桐子大每服五
十九丸生薑湯送下

寬中進食丸 滋形氣喜飲食方見內傷門

人參利膈丸 治膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘

滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香

檳榔 各七錢五分

人參

當歸

藿香

甘草

枳實

麸炒黃各一兩

大黃

酒濕蒸熟

厚朴

薑制一兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九

溫水下