

外科理例卷之三上

頭面赤腫一百

時毒發于面
鼻耳項者是

新安祁門朴里汪機省之編輯
同邑石墅門生陳楠惟宜較正

裏實而不利者下之

表實而不解者散之

表裏俱實而不解者解表攻裏

表裏俱解而不消者和之

腫甚焮痛者砭去惡血更用消毒之劑

不作膿或不潰者托之

飢年普患者不宜用峻利當審而治之

時毒者為四時疔毒之氣感之于人也其候發於鼻面耳

項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱頭痛或肢
躄痛恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將為傷寒便服解毒
一二日腫氣益增方悟始求瘡鑿原夫此疾古無方論世
俗通為丹瘤病家惡言時毒切恐傳染考之經曰人身忽
經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為與時毒特
不同耳蓋時毒初狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜
精辨之先論其脈滑數浮洪沉緊弦澗皆其候蓋浮數者
邪在表也沉澗者邪氣深也氣實之人急服化毒丹以攻
之熱實不利大黃湯下之有表証者解毒升麻湯以發之
年高氣軟者五香連翹湯主之又于鼻內搐通氣散取十
餘嚏作効若搐藥不嚏者不可治如嚏出膿者治之必愈
左右之人每日用嚏藥搐之必不傳染其病人亦每日用

藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解
者不可大下猶宜和解之犀角連翹散之類至七八日大
小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃芪散宜針鑱
出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日已前精
神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死
治之無功矣然而此疾有臥有汗有可下粗工但
熱毒就用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審
一人頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脈浮數邪在表
尚未解用劑防敗毒散二劑勢退大半更以葛根牛旁子
湯四劑而痊

此惡脈表

經云身半已上腫天之氣也身半已下腫地之氣也乃邪客
心肺之間上攻頭目而為腫此感四時不正之氣也與膏

梁積熱之症不同硝黃之劑非大便秘實不可用若不審其因及辨其虛實表裡藥用攻之必致有悞常見飢饉之際藹藹之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之不可不察予常治邪在表者用葛根牛旁子湯人參敗毒散或普濟消毒飲子邪在裡者五利大黃湯梔子仁湯表裡俱不解者防風通聖散表裡俱解而腫不退者犀角升麻湯腫甚者砭患處出惡血以泄其毒十日外自愈若嘔出膿血即愈欲其作膿者用托裏消毒散欲其收斂者用托裡散此法最為穩當五七日咽喉不閉言語不出頭面不腫食不知味者不治

一 人患此腫痛發熱作渴脈實便閉以五利大黃湯下之諸症悉退以葛根牛旁子湯四劑而痊此憑脈

一 人表裡俱腫痛尚不退以葛根升麻湯二劑而消此憑脈

一 人腫痛發熱脈浮數以荆防敗毒散二劑少愈再入參

敗毒散二劑此憑脈減半又二劑而痊此憑脈

一 人耳面赤腫作痛咽乾發熱脈浮數先以荆防敗毒散二

劑勢退大半又以葛根牛旁子湯四劑而痊此憑脈

一 婦表邪已解腫尚不消診之脈滑而數乃瘀血作膿也以

托裡消毒散潰之而愈此憑用也

一 人癰腫脹痛作渴煩熱便秘脈數按之尤實用防風通聖

散一劑諸症頓退以荆防敗毒散加玄參牛旁黃芩二劑

而差此憑脈表裏攻裏

一 老冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脈實此表裏俱實也飲防風通聖散不應遂砭患處出黑血仍投前藥即應又以

荆防敗毒散而疹蓋前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力難達故也惡血既去其藥自効或拘用寒遠寒及年高畏用硝黃而用托裏與夫尋常消毒之劑或不破泄其毒專假藥力鮮不危矣此語時

一人表裏俱解惟腫不消以托裏消毒散四劑膿成針之而愈此惡症

一婦腫痛用硝黃之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退此瘀血欲作膿也也用托裏消毒散潰之而愈此惡症

一人表散藥愈熾發熱便秘診脈沉實此邪在裡也以大黃湯下之裡症悉退以葛根牛旁子湯浮腫亦消惟赤腫尚存更以托裡藥潰之而愈此惡症

一人冬月病頭面赤腫耳前後尤甚痛不可忍發熱惡寒下

關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安卧鑿破腫上四五

針腫赤不減痛益甚予診其脈浮緊按之洪緩知為寒濕

皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫且夫天令寒凜之時

腠理閉汗不出血氣強肉堅滴善用針者不得取四厥必

待天溫又云冬月閉藏用藥多少針石也宜以苦溫之劑

溫經散寒所謂寒絨腠理以苦發之以辛散之方名

托裏溫經湯

麻黃若根溫發之為君

防風辛溫散之

升麻苦辛

葛根甘平解肌出汗專治

白芷歸身

犀角辛溫行則痛白芷

蒼木溫熱則腫蒼木其溫體輕浮力

白芍藥酸微寒調中益氣使

人參去芦

甘草甘溫

白芍藥

其裡為佐各錢半

右剉每服一兩水二盞先煎麻黃令沸去沫再下餘藥同煎

至一盞去粗大温服訖以薄衣覆首厚被覆身卧煖處使經
血温腠理開寒乃散吹氣升大汗出腫減七八分再服去麻
黃防風加連翹鼠粘子腫痛悉愈經言汗之則瘡已信哉
或曰仲景言瘡家雖身痛不可汗何也予曰此言營氣不
從逆于肉理乃主癰腫而作身痛非外感寒邪作痛故戒
不可汗汗之則成瘡又問仲景言鼻衄者不可汗復言脉
浮緊者以麻黃湯發之衄血自止何也予曰血與汗異各
同類奪汗者無血奪血者無汗今衄血妄行為熱所逼更
發其汗反助邪熱重竭津液必變凶症故不可汗若脉浮
為在表緊則為寒亡邪鬱遏陽不得伸熱伏榮中迫血妄
行上出于鼻故用麻黃湯散其寒邪吹氣得舒其衄自止
緊古之學可謂知其要矣

泰和二年四月民多疫癘初竟增寒体重次傳頭目腫盛目
不能開上喘咽喉不利舌乾口躁俗云大頭天行親戚不通
染之多殆

一人病此五六月醫以承氣加藍根下之稍緩翌日其病如
故下之又緩終莫能愈漸至困篤予曰身半已上天之氣
也身半已下地之氣也比邪熱客于心肺之間上攻頭目
腫盛以承氣瀉胃中之實熱是誅罰無過不知適其至所
為故遂用

黃連

黃芩

味苦寒各半兩泄

橘紅苦平

玄參

生甘草

其寒各

人參

三錢泄火

連翹

鼠粘子

薄荷葉

平苦辛

板藍根

苦寒

馬勃

一

白僵蚕

炒七

升麻

平苦辛

柴胡

平各二錢行少

枳梗

辛温

為每楫

下行

其為細末半用湯調時上服之半用蜜丸噙化服尽良愈
凡他處有病此者書方貼之名曰

普濟消毒飲 或加川芎歸身咬咀如麻豆每服五錢水

二鍾煎至一鍾去滓食後稍熱時上服如大便硬加大黃

酒煨一錢以利之腫勢甚宜砭刺之

按時行疫疾雖由熱毒所染有氣實人下之可愈氣虛

者槩下之鮮不危矣故東垣製此方救斯人其惠博哉

一人年踰三十肩患毒服人參敗毒散一劑更服十宣散去

參桂加金銀花天花粉四劑而潰因怒動肝火風熱上壅

頭面赤腫焮痛飲冷以荆防敗毒散加芩連薄荷二劑不

應急砭患處出黑血觥許仍以一劑勢退大半再服人參

敗毒散四劑而愈

夫病有表裏上下之殊治有緩急攻補之異若不砭刺

氣血結為肉理藥不能及腫焮日盛使峻利之藥則上

熱未除中寒已作必傷命矣

升麻牛旁子散 治時毒瘡發頭面胸膈脉浮洪在表者

升麻 牛旁 甘草 桔梗 葛根 玄參 麻黃

連翹略一 剉作一服姜三片水二盞煎

一黃門腮赤腫痛此胃經風熱上攻以犀角升麻湯六二

劑而平又一大理患此用前湯為人所惑謂湯內白附子

性溫故也另用荆防敗毒散愈盛後用此湯尚去白附子

不應再用全方三劑而愈

本草云白附子味辛氣溫多毒主面上百病及一切風

瘡乃風熱之主藥經曰有是病用是藥苟不用主病之藥

安得而愈

一人腮頰腫焮至于牙齦右關脉数此胃經風熱上攻也
治以犀角升麻湯六而消

瘰癧百一

腫痛脉浮数者祛風清熱

脉滴者補血為主

脉弱者補氣為主

腫硬不潰者補血氣為主

鬱抑所致者解鬱結調氣血

潰後不斂者屬氣血俱虛宜大補

虛勞所致者補之

因有核而不斂者腐而補之

脉實而不斂或不消者下之

瘰癧者結核是也或在耳後耳前或在耳下連及頤頰或

在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在胸及腋之側或在兩脇

皆謂之馬刀手足少陽主之

瘰癧必起于少阴一經不守禁忌延及少阴大抵食物之厚

鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此三端拓引變換須分虛實

實者易治虛者可慮以其屬膽經主決斷有相火且氣多

血少婦人見此若月經不調寒熱變生稍久轉為潮熱危

矣自非斷欲神仙不治也

救苦化堅湯 瘰癧馬刀挾瘦從耳下或耳後下頸至肩或

入缺盆乃手足少阴經分其在頰下或頰車乃足少阴經

分受心脾之邪而作宜將二症合而治之

升麻一錢 葛根半錢 真漏蘆 三味俱足 以明本經藥

連翹一錢 神藥十散 諸血結聚 瘡之歸身 三分 熟苧二分

牡丹皮 諸經分去 腸胃中 血滯血 三味 黃耆一錢 補理補表

生血亦反 活家聖藥 白芍藥 而三分 收味酸 氣寒補中 益散肺氣 散

痛寒故也 夏月倍之 冬寒下用 肉桂 三分 屬陽 熱必能散 結積

因熱用也 又寒覆其 瘡以去之 辛麥芽 一錢 治腹中 縮急 蕪

柴胡 八分 連翹 氣或躁 煩者去之 刀狹瘦 羸活 一錢

獨活 半錢 防風 半錢 可回 產股 似大 伏經 葉青 痛項 強不

為散亦可 瘡在 膈已 上 雖急 手足 太 諸瘡 見此 症亦 用之

麩末 為消 化食 昆布 堅瘡 堅硬 耆用 之 黃連 治 煩 悶 三分

廣茂 煨 三分 三 稜 硬 甚 者 用 之 不 甚 勿 用 堅 人 參 三 分 補 肺 氣

加 之 不 調 厚 朴 變 時 見 根 加 之 益 智 仁 也 或 吐 沫 者 胃 不 和

寒者黃柏 燥三分 有熱或脚膝無力 加之 或煩 其草 分或

宜分調中 益胃泄火 和諸藥 助瘡 和故也

右為細末 湯浸 蒸餅和作餅子 日乾 搗如米粒 每服二錢

或三錢 白湯下 量病入虛實 無令藥多 妨其飲食 此治之

大法也

如在少 以經分為馬刀 挾瘦者去 獨活 漏蘆 升麻 葛根 加瞿

麥 三分 氣不順 加橘皮 甚者加木香 必許人 素氣弱 若病

來氣盛 不短促者 不可拘其平素 只作氣盛 治之 而從病

變之權 邪在上焦 加黃芩 一 半 酒 肺 在中焦 加黃連 半

酒制 用 在下焦 加黃柏 知母 防已 皆酒制 選用之 大通

不通 滋其邪 盛急加酒 大黃 以利之 如風結 燥不行 加麻仁 大

黃 風濕不行加煨皂角仁秦艽大黃 如麻瀉竟身氣
滯不行加郁李仁大黃以除氣燥 如冰寒秘結不行以
局方半硫丸或加附子乾姜冰冷與之
大抵諸病素氣弱者當去苦寒之藥多加參耆甘草之類泄
火而補元氣以佐寒涼可也

散腫潰堅湯 治馬刀堅硬如石在耳下至缺盆或肩上或
脇下皆手足少隄經分或頰或頰車堅硬如石在足隄明
經分或二經瘡已破流膿並皆治之

柴胡四錢升麻三錢甘草炙 歸尾 葛根

白芍錢二黃連一錢三稜酒制連翹錢三昆布去土

知母酒制黃柏酒制土瓜根酒制草龍膽酒制炒

桔梗各半黃芩八錢廣茂酒制

右剉每服五錢或七錢水二盞八分浸大半日煎至一盞
熱服時宜去枕頭低脚高每噉一口作十次嚥雷一口送
下後項丸藥服畢時如常取藥在膈上停畜故也若能食
糞硬者旋加作七八錢止可秤半料作末煉蜜丸如京豆
大每服百丸或二百丸此制之緩也 一方 海藻

昆布 二味洗淨焙乾為末何首烏木臼搗末皂角刺炒
黃色 公蛇退一條樹上墻上者是

右五味為末用猪項下刀口肉燒熟醮藥末吃食後向患
處一邊側卧一伏時每核上灸七壯煙從口中出為度膿
尽即安

連翹散堅湯 治耳下或肩上及缺盆瘡硬如石動之為根
或生兩脇或已膿流作瘡未破此手足少隄經分也

柴胡二錢 歸尾 酒制 黃芩 生 廣茂 酒炒 三稜 酒炒

連翹 均藥酪 半 黃連 酒炒 蒼木 錢 二 土瓜根 酒炒

草龍膽 制 四 次 酒 黃芩 酒炒 七 錢 甘草 三 錢

右秤一半蜜丸一半剉煎如前法服

柴胡連翹湯 治男婦馬刀瘡

黃芩 炒 知母 制 酒 連翹 柴胡 酪 半 中 桂 三 甘草 炙

黃柏 制 生 芥 錢 各 三 歸尾 錢 半 瞿麥 穗 六 錢 鼠粘子 二 錢

剉如麻豆每服五錢或三錢水二盞煎一盞食後稍熱時

服之

柴胡通經湯 治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀

柴胡 歸尾 桔梗 甘草 生 連翹 三稜 鼠粘子

黃芩 烙 二 紅花 少 許 黃連 五 分 剉作一服水二六

盞煎一盞食後稍熱服忌苦寒泄大便

項上瘰癧馬刀將初生者用四稜鐵環按定作口子以由紙

撚維之勿令合了以絕其瘡之源其効至速如瘰不破或

畏破以龍泉粉塗

龍泉粉 炒 半 潤 瓦粉 各 半 昆布 去 土 三 錢 廣茂 酒 制

三稜 酒 制 右 網 末 熟 水 調 塗 之 用 此 去 疾 尤 速 一 二

日一易龍泉粉即磨刀水濃汁青石者佳

瘰癧馬刀血少吐泄

四物湯加芍藥 炒 牡蠣 研 細 陳皮 柴胡 甘草 黃連 玄參 神麩

炒及桑椹膏

桑椹膏取極熟黑色者二斗以布濾取自然汁砂器內文武

火慢熬成薄膏每日白湯點一匙食後日三服

夏枯草本草言大治瘰癧散結氣有補養厥脈血脈之功而
經不言觀其能退寒熱瘧者可仗實者以行散之藥佐之
外以艾灸亦漸取效

一婦患瘰癧延至胸腋膿水淋漓日久五心煩熱肢體疼痛
頭目昏重心忪頰赤口乾咽燥發熱盜汗食少嗜卧月水
不調臍腹作痛予謂血虛而然非瘰故也服逍遙散三月
餘少可更服八珍湯叶加牡丹皮香附子又月餘而經通
再加黃耆白斂兩月餘而愈此憑症也

一婦久患瘰癧不消自汗惡寒此血氣俱虛服十全大補湯
三月餘而潰然堅核雖取瘡口不斂灸以豆豉餅一仍與
前藥加香附烏藥兩月而愈此憑症也
一人勞倦耳下焮腫惡寒發熱頭疼作渴右脈大而軟當

補中益氣湯彼自用藥發表遂致嘔吐始信予用六月

湯二更服補中益氣湯六而愈此憑症也

大抵內傷榮衛失守皮膚間氣滋養則不任風寒胃氣

下陷則火上升氣喘發熱頭痛脈大此不足證也誤作

外感表實而反瀉之寧免虛亡之禍東垣云內傷右脈大

外感左脈大當以此別之

機按左脈大屬外感此亦難憑必須察形觀色審症參之

以脈乃得不誤丹溪治一老人飢寒作勞患頭疼發熱惡

寒骨節疼無汗妄語脈洪數而左甚治以參耆歸木陳皮

甘草每貼加附一片五貼而愈

又一少年九月間發熱頭痛妄語大渴形肥脈數大左甚

以參朮君茯苓臣耆佐附一片使蓋人肥而脈左大于右

事急矣非附則參者多捷効五十貼大汗而愈此皆左脉
大丹溪悉以內傷治若依東垣認作外感寧不殺人

一婦年二十耳下結核經每過期午後頭痛服頭痛藥愈甚
治以八珍湯叶加柴胡地骨皮二十餘貼愈此憑症也

一婦瘰癧後發熱煩燥作渴脉大無力此血虛也以當歸補
血湯六劑頓退又以聖愈湯數劑少健加以八珍湯加具

毋遠志三十餘劑而斂此憑脉也
一瘰婦四肢倦怠類痿症以養氣血健脾胃而愈此憑症也

一入素弱潰後核將不腐此氣血皆虛用托裡養榮湯氣血
復核尚在以簪挺撥去又服前藥月餘而痊此憑症也

一入患之痰盛胸膈痞悶脾胃脉弦此脾土虛肝木乘之也
當實脾土伐肝木為主彼以治痰為先乃服苦寒化痰藥

不應又加破氣藥病愈甚始用六君子湯加芎歸數劑飲
食少思以補中益氣湯倍加白朮月餘中氣少健又以益

氣養榮湯四月腫消而血氣亦復矣夫右関脉弦亡屬木
乃木盛而剋脾土為賊邪也虛而用苦寒之劑是虛亡也

况痰之為病其因不一主治之法不同凡治痰利藥過多
則脾氣愈虛亡則痰愈易生如中氣不足必用參朮之類

為主佐以痰藥此憑症
一人久而不斂神思困倦脉虛予欲投以托裡彼以為迂乃

服散腫潰堅湯半月餘果發熱飲食愈少復求治投益氣
養榮湯三月喜其謹守得以收效此憑症脉也

齊氏曰結核瘰癧初竟宜內消之如經久不除氣血漸衰
肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤結

核為膿外症不明者並宜托裡膿未成者使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裡補之臥臥不和托裡調之大抵托裡之法使瘡無變壞之症所以宜用也

一人久而不斂膿出更清面黃羸瘦每侵晨作瀉與二神丸數服泄止更以六君子加芎歸月餘肌體漸復灸以豆豉餅及用補劑作膏藥貼之三月餘而愈此憑症也

一婦潰後核不腐以益氣養榮湯三十餘劑更敷針頭散腐之再與前湯三十餘劑而斂此憑症也

一人患而腫硬久而不消亦不作膿服散堅毒藥不應令灸肘尖看尖二穴更服益氣養榮湯月餘而消此憑症也

一人尚硬亦灸前穴飲前藥膿成針之而斂
一婦久潰發熱月經過期且少用逍遙散煎前湯兩月餘氣

血復而瘡亦愈但一口不收敷針頭散更灸前穴而痊常治二三年不愈者連灸三次兼用托裡藥即愈前二條憑症

一人患此腫痛發寒熱大便秘以射干連翹散六劑熱退大半以仙方活命飲四劑而消此憑症也

一婦肝經積熱患而作痛脉沉數以射干連翹湯四劑少愈更用散腫潰堅丸月餘而消此憑症也

一婦耳下腫痛發寒熱與荆防敗毒散四劑表症悉退以散腫潰堅湯數劑腫消大半丹以神效瓜菱散五四劑而平

此憑症也
一入肝經風熱耳下腫痛發熱脉浮數以薄荷丹治之而消

此憑脉也

一人年二十耳下患癰焮痛左關脉數此肝經風熱所致以

荆防敗毒散七 三貼表症悉退再與散腫潰堅丸四月餘
平復此憑脉也

一婦因怒耳下腫痛以荆防敗毒散七加連翹黃芩四劑而
愈此無脉症而用發表必有所見也

嘗治此旬日不消者以益氣血藥及飲遠志酒 並效無
膿自消有膿自潰

一婦因怒耳下焮痛頭痛寒熱以荆防敗毒七加黃芩表証
悉退但飲食少思日脯發熱東垣云雖有虛熱不可大攻

熱去則寒起遂以小柴胡加地骨皮苧 婦芩木陳皮十餘
貼而愈次年春復腫堅不潰用八珍湯 叶加香附柴胡地

骨皮桔梗服至六七貼以為延緩仍服 人參敗毒散勢愈
盛又服流氣飲則盜汗發熱口乾食小 至秋復求診視

血虛極辭之果沒此憑症也

一人每怒耳下腫或脇作痛以小柴胡湯加青皮紅花桃仁
四劑而愈此憑症也

一人腫硬不作膿脉弦而數以小柴胡湯兼神効瓜萎散五
各數劑及隔蒜灸數次月餘而消此憑脉與症也

一婦頸痛不消與神効瓜萎散五六劑以退更以小柴胡加
青皮枳殼具母數劑痛腫減大半再以四物對小柴胡數

劑而平此憑症也

羅宗伯耳後髮際患毒焮痛脉數以小柴胡五加桔梗牛旁
子金銀花四劑而愈此憑脉症也

一人氣血已復核尚不腐用針頭散及必効散各三次不旬
日而愈此憑症也

一婦瘰癧與養氣順血藥不應服神効瓜菱散二劑五頓退
又六劑而消却與托裡藥氣血平復而愈此憑症也

一婦年踰三十瘰癧已潰不愈與八珍湯叶加小柴胡地骨
皮夏枯草香附貝母五十餘劑形氣漸轉更與必効散四

二服瘡口遂合惟氣血未平再用前藥三十餘劑而平此憑症也

治瘰癧用必効散與瓜菱散相間服神効

後有不問虛實驟用必効散殊不知斑猶性猛大毒利水

破血大損元氣若氣血實者用此劫之而投補劑或可愈
若虛而用此或用追蝕之藥瘡肉雖去而瘡口不合反至

不救

一婦因怒結核腫痛察其氣血俱實先以神効散下之更以

益氣養榮湯三十餘劑而消此憑症也

常治此症虛者先用益氣養榮湯待其氣血完克乃取神
効散去其毒仍進前藥無不効者

一人耳下患五枚如貫珠年許尚硬面色痿黃飲食不甘勞
而發熱脉數軟而瀉以益氣養榮湯六十餘劑元氣已復

患處已消一核尚存以必効散二服而平此憑症脉也

婦瘰癧不消膿清不斂用八珍湯叶少愈忽肩背痛不能
回顧此膀胱經氣鬱所致當服防風通氣湯彼云瘰癧膽

經病也是經火動而然自服涼肝降火之藥反致不食痛

盛予診其脉胃氣愈弱先以四君子六加陳皮炒芍藥半

夏羌活蔓荊子四劑食進痛止繼以防風通氣叶二劑而

愈此憑脉與症也

一人神勞多怒頸腫一塊久而不消諸藥不應予以八珍湯
叶加柴胡香附每日更隔蒜灸數壯及日飲遠志酒二三盞漸消此憑症也

一婦月水不行漸熱欬嗽肌身漸瘦胸膈不利頸腫一塊日
久不消令服逍遙散月餘更服八珍湯叶加牡丹皮香

附又月餘加黃耆白欵兩月餘熱退腫消經行而愈此憑症也

一人年踰三十每勞心過度頸腫發熱服敗毒散愈盛用補
中益氣湯數貼而消此憑症也

張通府耳後髮際患腫一塊多頭肉色不變按之微痛彼謂

痰結脉軟而時見數經曰脉數不時見瘡也非痰也仲景
云微弱之脉主血氣俱虛形精不足又曰沉遲軟弱皆宜
托裡遂用參耆歸木川芎炙甘草以托裡少加金銀花白

芷桔梗以消毒彼謂不然內飲降火消痰外貼涼藥

徹腦患更火熱頭愈重食愈少復請治以四君子加藿香

炮乾姜數劑食漸進膿成刺之更以十全大補湯三去桂
灸以豆豉餅又月餘而愈此憑脉症也

一人耳內出膿或痛或痒服聰耳益氣湯不應服防風通聖
散愈甚予用補腎丸而愈

機按前條療法虛者補之而補有先後溫涼之殊實者
寫之而寫有輕重表裡之異或行消劑或開鬱滯或合
時從症或變法用權或針或灸或敷其法亦粗備矣
醫者能如是則而擣克之疾幾亦可應變矣

一兒宿痰失道癰腫見于頸項或臂膊胸背是為冷症宜四
生散五敷貼內服附子八物湯及隔蒜灸此症可憑而
治當時必有所

一因暴怒項下腫痛胸膈痞悶兼發熱用方脉流氣二劑
也

胸膈利以荆防敗毒散二劑而熱退肝脈尚弦滿以小柴胡加芎歸芍藥四劑脈症頓退以散腫潰堅丸一料將平惟一核不消服遇神仙多比丸二兩而瘰癧瘰癧症

一兒甫周歲項患胎毒予俟有膿刺之膿出梳許乳食如常用繼藥月餘而愈又一兒患此待膿自出幾至不救此憑也大抵瘡淺宜砭深宜刺使瘀血去于毒聚之始則易消也况小兒氣血又弱膿成不針不砭鮮不斃矣

一人項下患毒膿已成因畏針焮延至胸赤如霞其脈滑數飲食不進月餘不寐甚倦予密針之膿出即睡寤而思食用托裡散 兩月餘而愈又一人患此及時針刺數日而愈一人素虛患此不針潰透頰頰血氣愈虛而死此憑也

一人耳後患毒脉症俱實宜用內疎黃連湯彼以嚴冬不服

寒劑竟至不起

羅謙甫曰用寒遠寒用熱遠熱假者反之雖違其時以從其症又云凡治病必察其下謂察時下之宜而權治之故曰經者常也法者用也醫者意也隨其所宜而治之則萬全一婦因怒項腫後月水不通四肢浮腫小便如淋此血分症也先以椒仁丸數服經行腫消更以六君子湯加柴胡枳殼數劑頸腫亦消矣亦有先因小便不利後身發腫致經水不通名曰水分宜葶蘆丸治之良方云婦人腫滿若先因經水斷絕後致四肢浮腫小便不通名曰血分水化為血亡不通則復化為水矣宜服椒仁丸此憑症也

一瘰婦咽間如一核所鯁嘔吐不出倦怠發熱先以四七湯而咽利更以逍遙散此憑症也

一婦所患同前兼胸膈不利肚腹膨脹飲食少思卧睡不安
用分心氣飲並効此憑症也

一女年十七項下時或作痛乍寒乍熱如瘡狀肝脉弦長此
血盛之症也先以小柴胡湯二劑少愈更以生地黄丸而
痊此憑脉症也

一貴人女適夫夫早逝患十指攣拳掌垂莫卒膚舛瘡瘍粟
栗然湯劑雜進飲食頓減幾于半載診之非風也乃憂愁
悲哀以致耳病屬內因宜用內因藥仍以鹿角膠輩多用
射香熬膏貼瘻處卒能伸病漸安此因情而治也

一女性急好怒耳下常腫痛發寒熱肝脉弦急投小柴胡加
青皮牛旁子荆芥防風而寒熱退更以小柴胡對四物數
劑而腫消其父欲除病根予謂肝內主藏血外主榮筋若

志怒氣逆則傷肝肝主筋故筋蓄結而腫須要自加調
庶可免患否則肝逆受傷不能藏血上壅則難差矣後不
戒果結三核屢用追蝕不斂而歿此因情

一人先于耳前耳下患之將愈延及項側缺盆三年遂延胸
腋診之肝脉弦數以龍會散堅二丸治之將愈肝脉尚數
四年後小腹陰囊內脹皆患毒年餘不斂脉診如前以清
肝養血及前丸而愈此憑脉也

一人因怒耳下及缺盆患瘰癧延腋下形氣頗實瘡口不合
治以散腫潰堅丸四而愈此憑形症也

一兒七歲項結二核時發寒熱日久不愈治以連翹丸
而消若患在面臂等處尤宜此丸若潰而不斂兼以托裏
之藥此憑症也

一兒項結一核堅硬如癩面色痿黃飲食不甘服托裡藥不
應此為毒瘰癧也以蟾蜍丸治之而愈若數服不消按之
轉動軟而不痛者內有虫如粉急針出之若不速去則虫
隨氣走內蝕藏府不治按此因治不
應而變法也

蟾蜍夏月溝渠中腹大不跳不鳴者先取糞蛆一物置
中以尿浸之桶近上令乾使蛆不鳴得出將蟾蜍撲死投
中任蛆食晝夜以新布袋包繫置水急處浸一宿取出
瓦上焙為末入射香一字軟飯丸如麻子大每服二三
飲九逆心米

一人眼赤痒痛時或羞明下淚耳內作痒服諸藥氣血日虛
飲食日減而痒愈盛此肝腎風熱上攻也以四生散酒調
四服而愈此憑症也

一婦久鬱患而不潰既潰不斂發熱口乾月水短少飲食
味日脯尤倦益氣養榮湯二

庶保危危彼欲速效反服斑蝥之劑及數用追蝕毒藥去
而復結以致不能收斂出水不止遂致不救此憑症也

一婦久不作膿脉浮而瀉此氣血俱虛欲補之使自潰彼欲
內消專服斑蝥及散堅之藥血氣愈虛而死此憑症也

一人因勞而患急情發熱脉洪大按之有力宜用補中益氣

湯六升彼不信輒服攻伐之劑吐泄不止亦死訛憑癩癩補

大抵此症原屬虛損若不審虛實而犯病禁經禁鮮有不

誤常治先以調經鮮鬱更以隔蒜灸之多自消如不消即

以琥珀膏貼之候有膿則針之否則變生他症設若蕪瘰

蕪冰瘰等症只宜加蕪症之劑不可干擾餘經或氣血已

復而核不消却服散堅之劑至月許不應氣血亦不斂損

方進必効散或遇神仙無比丸其毒一下即止二藥更服

益氣養榮湯。數劑以調理瘡口不斂豆豉餅琥珀膏貼
氣血俱虛或不慎飲食起居七情者俱不治然此症以氣
血為主氣血壯實不用追蝕之劑彼亦能自腐但取去使
易于收斂若氣血虛不先用補劑而數用追蝕之藥適足
以敗矣若發寒熱眼內有赤脈貫瞳人者亦不治一脈者
一年死二脈者二年死

一 女年十九頸腫一塊硬而色不變肌肉日削筋牽急痛此
七情所傷氣血所損之症當先滋養血氣不信乃服風藥
後不起此憑症也

一 人耳後漫腫
一 少婦耳下患腫素勤苦發熱口乾月水過期且少嫗以為
經閉用水蛭之類通之以致愈虛而斃

一 女年十七患瘰癧久不愈月水尚未通發熱欬飲食少
思老媪欲用巴豆肉桂之類先通其經予謂此症潮熱經
候不調者不治但喜脈不瀉且不潮熱尚可治須養氣血
益津液其經自行彼欲効仍用巴桂此慄悍之劑大助陽
火臥血得之則妄行脾胃得之則愈虛果通而不止飲食
愈少更加潮熱遂致不救

一 人遠途勞倦發熱脈大無力耳下患腫此勞損也宜補中
益氣養榮湯六自然熱退腫消彼不聽服降火藥及必效
散果吐瀉不食而死

夫勞倦損氣亡衰則火旺火乘脾土故倦怠而熱此元氣
傷也丹溪曰宜補形氣調經脈其瘡自消不可汗下若不
詳脈症經絡受病之異而輒用峻利之劑鮮不危矣

一婦因怒不思食發熱倦怠骨肉痠疼身瘦面黃經漸不通
頸間結核以逍遙散三八珍湯治之少可彼自誤服水
蛭等藥血氣愈虛遂致不救此憑症也

一人耳後寸餘發一毒名曰銳疽焮痛寒熱煩燥喜冷此膽
經蘊熱而然先用神合活命飲一劑勢減二三時值仲冬
彼惑于用寒遠寒之禁自用十宣托裏之藥勢漸熾耳內
膿潰喉腫開藥不能下而歿

一放出宮女年踰三十兩胯作痛不腫色不変大小道作痛
如淋登廁尤痛此瘀血漬入隧道為患乃男女失合之症
也難治後潰不斂又患瘰癧而歿此久鬱也

此婦為人之妾夫為商常在外可見此婦久懷憂鬱及放
出又不能如願是以致生此疾其流注瘰癧乃七情氣血

皆已損傷不可用攻伐之劑較然矣

流注百二

暴怒所致胸膈不利者調氣為主

抑鬱所致而不痛者宜調經脉補氣血

腫硬作痛者行氣和血

潰而不斂者益氣血為主

傷寒餘邪未盡者和而解之

脾氣虛濕熱疑滯肉理而然健脾除濕為主

閃肭瘀血凝滯為患者和氣血調經絡

寒邪所襲筋挛骨痛或遍身痛宜溫經絡養血氣

大抵流注之症多因鬱結或暴怒或脾虛濕氣逆于肉理

或腠理不密寒邪客于經絡或閃撲或產後瘀血流注關

即或傷寒餘邪未盡為患皆因真氣不足邪得乘之常治
鬱者開之怒者平之閃撲及產後瘀血者散之脾虛及腠
理不密者除而補之傷寒餘邪者調而解之六要以固元
氣為主佐以見症之藥如久而瘡口寒者更用豆豉餅或
附子餅灸之有膿管或瘀肉者用針頭散腐及錠子尤效
若不補血氣及不慎飲食起居七情俱不治

一人因怒脇下作痛以小柴胡對四物加青皮桔梗枳壳而
愈因情處治

一人臂腫一塊微痛脉弦緊以瘡料流氣飲四劑而消因情

一人因怒脇下腫痛胸膈不利脉沉遲以方脉流氣飲數劑

少愈以小柴胡對二陳加青皮桔梗具母數劑頓退更以

小柴胡二十餘劑而痊因七情處治

婦因因肺肩患腫遍身作痛以黑丸子二服而痛止以方

脉流氣飲二劑而腫消更以二陳對四物加香附枳壳桔

梗而愈憑症處治

婦腿患筋牽骨痛諸藥不應脉遲緊用大防風湯一劑頓

退又二劑而安 又一婦患之亦然先用前湯二劑更服

黑丸子而痊此二患若失治潰作敗症憑症憑脉處治

一婦稟弱性躁脇臂腫痛胸膈痞滿服流氣敗毒反發熱少

食用四七湯數劑胸寬氣利以小柴胡對四物加香附陳

皮腫痛亦退此因治方不對

一人腿患潰而不斂用人參養榮湯及附子餅灸更以補劑

煎膏貼之兩月餘愈憑症處治

一人脾氣素弱臂腫一塊不痛肉色不變飲食少思半載不

潰先以六君子加芎歸芍藥二十餘劑飲食漸進更以豆豉餅日灸數壯于前藥再加黃耆肉桂三十餘劑膿熟針去以十全大補湯及附子餅灸之月餘而斂此憑症灸治

一人腿腫肉色不變不痛脉浮而滑以補中益氣湯加半夏茯苓枳壳木香飲之以香附餅灸之彼謂氣無補法乃服方脉流氣飲愈虛始用六君子湯加芎歸數劑飲食少進再用補劑月餘而消憑脉憑症灸治

夫氣無補法世俗論也以其為病痞滿壅塞似難為補殊不知正氣虛不能運行則邪氣滯而為病不用補法氣何由行乎

一人臂腫筋牽骨痛年餘方潰不斂診脉更虛以內寒散一料少愈以十全大補湯及附子餅灸而愈憑症憑脉

精要云留積經久極冰生臥寒為熱以此潰多成瘻早服內塞散排之

一人腿腫一塊經年不消且不作膿飲食少思強食則脹或作瀉日漸消瘦診脉微細此乃命門火衰不能生土以致脾虛而然也遂以八味丸飲食漸進腫患亦消憑症憑脉

一人背髀患之微腫形勞氣弱以益氣養榮湯間服黑丸子及木香生地黃作餅覆患處灸之月餘膿成針之仍服前藥而愈此憑所因而治

一人腿患久而不斂飲大補藥及附子餅及針頭散繼之而愈憑症處治

一人臂患年餘尚硬飲食少思朝寒暮熱八珍湯加柴胡地骨牡丹皮月餘寒熱少止再用益氣養榮湯附子餅灸兩

月餘膿成針之更服人參養榮湯半載而愈憑症而治
一婦膿潰清稀脉弱惡寒久而不愈服內塞散灸附子餅而
瘳憑脉憑症而治

一入臂患出腐骨三塊尚不斂發熱作渴脉浮大而滿乃氣
血俱損須多服生氣血之劑庶可保全彼謂火尚未盡乃
用涼藥內服外敷幾危求治其形甚悴脉愈虛先以六君
子加芎歸月餘飲食漸進以八珍湯加肉桂三十餘劑瘡
色乃赤更以十全大補湯以附子餅僅年而差憑症
一老傷寒表邪未盡服內患腫發熱以人參敗毒散二劑熱
止灸香附餅又小柴胡加二陳羌活川芎歸木枳殼數劑
而消憑症處治

一婦腰間患一小塊肉色如常不潰發熱予欲治以益氣養

榮解鬱之劑彼却別服流氣飲後針破出水年餘而瘳
一婦久不斂忽發寒熱予訣其氣血俱虛彼反服表散之

劑果發大熱亦死憑症處治

一入元氣素弱將患此胸膈不利飲食少思予欲健脾胃解鬱
養氣血彼反服辛香流氣之劑致腹脹又服三稜蓬朮厚
朴之類飲食少四肢微腫兼腰腫一塊不潰而歿

一婦經不調兩月或三月一至四肢腫飲食少日晡發熱予
曰此脾土氣血虛也用養脾滋氣血藥飲食進則浮腫自
消血氣克則經水自調彼以為緩用峻劑先通月經果腹

疼泄不止遍身浮腫飲食少浸于木旺之月

一入年踰三十小腹腫硬逾年成瘡頭破時出血水此七情
所傷營氣逆于肉理也名曰流注胗之肝脉滿蓋肝病脉

不宜滿小腹正屬肝經須瀉屬金脉退乃可予飲以甘温
之藥補其氣血令自消潰彼不信乃服攻伐之藥氣血愈
虛果没于金旺之月此憑脉也

丹溪曰諸經惟少厥二經宜預防之以其多氣
少血也少血則肌肉難長瘡久不斂必成癩症若不知此
其用峻利之藥以攻伐
其用峻利之血補不旋踵

懸壘百三

焮腫或發熱者清肝解毒制甘草

腫痛者解毒為主制甘草不作膿或不潰者氣血虛也湯八珍

腫痛小便赤滯者肝經濕熱也宜分利清肝龍膽泄肝湯

一人谷道前患毒焮痛寒熱此肝經濕熱所致名曰懸壘屬

冰虛先以製甘草百二二服頓退再以四物加車前青皮

甘草即酒製黃柏知母數服而消此憑症也

一人年逾五十患懸壘膿清脉弱此不慎酒色濕熱壅滯而

然膿清脉弱老年值此何以收斂况谷道前為任脉發原

之地肝經宗筋之所予辭果歿治此壘惟澗水製甘草

有効已破者蕪十全大補湯三為要

一人患此焮痛發熱寒以小柴胡湯加製甘草頭二二劑少

退又製甘草四劑而消按小柴胡清肝

大抵此症屬冰虛故不足之人多患之寒涼之劑不可過

用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟腑其功甚

捷

一人腫痛小便赤澁以加減龍胆瀉肝湯加製甘草二劑少

愈以參耆歸木黃柏知母製甘草四劑百二而潰更以四

物加黃柏知母參耆製甘草而痊按此洗滌後補當時以

一人腫痛未作膿以加減龍膽瀉肝湯二劑少愈再以四物加黃柏知母木通四劑消按此先治濕熱後養血

一人膿熟不潰脹痛小便不利急針之尿管皆利以小柴胡加黃柏白芷金銀花四劑痛止以托裡消毒散數劑而愈常見患者多不肯針待其自破殊不知緊要之地有膿宜急針之使毒外發不致內潰故曰宜開戶以逐之凡瘡若不針烙毒氣多從而解膿瘡多從而泄今之患者反謂緊要之處不宜用針何相違之遠耶

一人膿清不斂內有一核以十全大補湯加青皮柴胡製甘草更以豆豉餅灸核消而斂此憑症也

一人久而不斂脉大宜力以十全大補加五味麥門灸以豆豉餅月餘而愈此憑症憑脉也

一老年餘而不斂診脉尚有濕熱以龍膽瀉肝湯五二劑濕退以托裡藥及豆豉餅灸而愈此憑症憑脉也

一人腫痛發熱以小柴胡加黃連青皮五四劑少愈更以龍膽瀉肝湯五而消此憑症也

一人膿熟不潰脉數宜力此氣血俱虛也宜滋陰益氣血之藥更針之使膿毒外泄彼反用敗毒藥致元氣愈虛瘡勢愈盛後潰不斂竟致不救按此不憑脉症而誤治也

懸癰原係肝腎二經陰虛瀉一于補尤恐不治况膿成而又尅伐不死何待常治初起腫痛或小便赤澀先以製甘草

一二劑及蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱腫痛者以小柴胡加車前黃柏芍歸膿已成即針之已潰用八珍湯叶加製甘草柴胡稍酒炒黃柏知母小便澀而脉有力者仍用

龍膽瀉肝湯加製甘草小便澀而脉無力者用清心蓮子
飲加製甘草膿清不斂者用大補劑間以豆豉餅灸或久
而不斂者亦用附子餅灸並効

囊癰百四

腫痛未作膿者疎肝導濕

腫硬發熱清肝降火

膿清不斂者大補氣血

已潰者滋冰托裡

膿成脹痛者急針之更飲消毒之劑

囊癰濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因冰
道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善于調攝
耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開羣丸懸掛水出

以麩炭

杉木炭也

末傳外以紫蘇葉包裹仰卧養之

精要謂癰入囊者死將以為屬腎即予治數人悉以濕熱

入肝經施治而以補冰佐之雖膿清皮脫羣丸懸掛亦不

死但未知下虛年老者如何耳

大抵此症屬冰道虧濕熱不利所致故滋冰降濕藥不可

缺常治腫痛小便秘滯者用除濕為主整佐之腫痛已退

便利已和者除濕滋冰藥相兼治之欲其成膿用托裡為

主滋冰佐之候膿成即針之仍用托裏滋冰若濕毒已尽

者專用托裡如膿清或多或少或斂遲者用大補之劑或附子

餅灸之

一人囊癰未作膿而腫痛以加減龍膽瀉肝湯二劑少愈更

以四物加木通知毋黃柏而消此憑症也

一人膿熟作脹致小便不利急針以小柴胡加黃柏白芷金銀花四劑少愈更托裡消毒散數劑而消此憑症也

一弱人膿熟脹痛大小便秘急針之膿出三碗許即斂睡神思少健但針遲須服解毒藥亦潰矣故用托裡藥至三十餘劑始差此憑症也

一人年踰四十陰囊腫痛以熱手熨之少緩服五苓散不應尺脉遲軟此下虛寒邪所襲而然名曰疝疝非瘡毒也治以蟠葱散五少可更服胡芦巴丸而平

一人年踰三十疝囊濕癢莖出白物如膿牽則急痛此疝疝也

也用龍膽瀉肝湯此因症而愈陰莖或腫或縮或挺或癢皆宜此藥治之

一人年踰五十患此瘡口不斂診之微有濕熱治以龍膽瀉

肝湯濕熱悉退乃以托裡藥及豆豉鮮豨而愈次年復患

濕熱頗盛仍用前湯四劑而退又以滋陰藥而消若潰後

虛而不補少壯者成漏老弱者不治膿清作渴脉大者亦

不治此憑脉也

一人年踰五十陰囊腫痛得熱愈盛服蟠葱散不應肝脉數

此囊腫也乃肝經濕熱所致膿已成急針之進龍膽瀉肝

湯五脉症悉退更服托裡滋陰藥外敷杉木炭紫蘇末月餘而愈此因脉處治

一人年踰六十陰囊潰痛不可忍罨丸露出服龍膽瀉肝湯敷麩炭紫蘇末不應予意此濕氣熾盛先飲槐花酒一椀次服前湯少愈更服托裡加滋陰藥而平設以前藥不應加之峻劑未有不損中氣以致敗也此因濕盛

一少年玉莖捷長腫而痿皮塌常潤磨股難行兩脇氣衝上
手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕熱少加黃柏
降其逆氣腫漸收莖中有堅塊未消以青皮為君少佐散
風之藥末服之外以絲瓜子汁調五倍子付愈此憑症也

一人囊腫狀如水晶時痛時癢出水小腹按之作水聲小便
頻數脉遲緩此醉後飲水入房汗出遇風寒濕毒聚于
囊各水疝也先以導水丸二服腹水已去小便如常再以
胃苓散倍白朮茯苓更用氣針引去聚水而差此憑症脉
一弱人莖根結核如大豆許勞則腫痛先以十全大補湯去
桂加車前麥門酒制黃柏知母少愈更加製甘草四劑仍
以四物車前之類而消 又有患此焮痛發熱服龍膽泄
肝湯二劑製甘草四劑而潰再用滋陰之劑而愈或膿未

成以葱炒熱敷上冷易之隔蒜灸亦可數日不消或不消
或潰歛以十全大補加柴胡稍為主間服製甘草並愈若不
保守必成漏矣已上二條此憑症也

一弱人拗中作痛小便淋瀝此因火躁下焦血氣不能降
而滲泄之令不行用四物加黃柏知母茯苓牛膝木通十
餘劑痛止便利此憑症也

一人氣短拗中若瘡小便不通用四物加參耆煎吞滋腎丸
而愈此憑症也

前症以虛為本以病為末益其本則末自去設若不固元
氣專攻其病寧無害耶

一人遺精勞苦愈盛拗中結核眼清心連子飲連翹消毒散
不應予以八珍湯叶加山藥山茱萸遠志十餘劑漸愈更

服茯苓丸遂不復作又有患此諸藥不應服八味丸而愈

批因於治不應故推求別為之治

一人尿血尿空作痛服清心蓮子飲不應服八正散愈盛予

以髮灰醋湯調服少愈更服班龍丸百而平此因處治不

一人患而久不斂以十全大補加五味麥門灸以豆豉餅月

餘而平此憑症也

一弱人腫痛未成膿小便赤澀以製甘草青皮木通黃柏當

歸麥門四劑少愈以清心蓮子飲四劑而消此憑症也

一人焮腫痛甚小便澀發熱脈數以龍膽瀉肝湯倍車前木

通澤泄茯苓勢去半仍以前湯加黃柏金銀花四劑又減

二三便利如常惟一處不消此欲成膿再用前湯加金銀

花皂角針白芷六劑微腫痛脈滑數乃膿已成針之腫痛

悉退投滋陰托裡藥及紫蘇末敷之而愈

一人病勢已甚脈洪大可畏用前湯二劑腫少退以仙方活

命飲二劑痛少止脈洪數膿已成須針之否則陰囊皆潰

彼不信更他醫果大潰羣丸掛復求治脈將靜以八珍湯

加黃耆黃柏知母山枝更敷紫蘇末數日而痊

一人患此腫痛發熱以小柴胡加黃連青皮四劑少愈更以

龍膽泄肝湯而消故腫屬濕痛屬熱

一兒生三月病熱左右脇下節次生瘡用四物湯敗毒散倍

人參香附為佐犀角為使大料飲乳母兩月而愈踰三月

腹脹生丹痧又半月稜脹入囊為腫黃瑩裂開兩丸顯露

水出以紫蘇葉盛麩炭末托之旬餘而合此因父病瘡遺

熱于胎也此憑症也

一人玉莖腫痛服五苓散等藥不應其脉左關弦數此肝經積熱而成以小柴胡五送盧薈丸一服勢去三四再服頓愈此憑脉憑症也

一人連日飲酒水挺并囊濕癢服滋水等藥不應予謂前水肝脉絡也水氣從挺而出素有濕繼以酒為濕熱合于下焦而然經曰下焦如瀆又云在下者引而竭之遂以龍膽瀉肝湯及清震湯而愈此或不應宜補肝湯及四生散治之此憑症也

一婦隱內膿水淋漓或癢或痛狀如虫行少水脉活數此陰中有瘡也名曰蠹由心神煩鬱胃氣虛弱氣血凝滯所致與升麻白芷黃連木通當歸川芎白木茯苓柴胡煎服以搗腫湯熏洗更搽蒲黃水銀兩月餘而愈此條因脉而

知瘡其曰胃氣虛者當時必有見也 或有包絡虛風邪乘陰血氣相搏令氣痞澁致陰腫痛治以葛蒲散必更以枳實炒熱帛包熨之冷則再炒 或有子藏虛冷氣下衝致水脫出謂之下脫或因產努力而脫者宜當歸散久不愈者補中益氣湯倍加升麻柴胡舉之

下疳百五

腫痛或發熱者肝經濕熱也清肝除濕

腫痛發寒熱者邪氣傷表也發散之

腫痛小便赤澀者肝經濕熱壅滯也疎肝導濕

一人患此腫硬焮痛寒熱先以人參敗毒散二劑而止更以

小柴胡加黃連青皮而愈此因症因經也

一入潰而腫痛小便赤澀以加減龍膽瀉肝湯加青皮黃連
二劑少愈以小柴胡加黃栢知母當歸茯苓數劑而愈此

經因也
一入莖腫不消 一人潰而腫痛發熱小便秘澀日晡或熱
一小兒腫痛諸藥不應 各以小柴胡吞盧薈丸數劑並
愈

一入陰莖或腫或作痛或挺縱不收 一人莖中作痛筋
急縮或作癢白物如精隨溺而下此筋疝也並用龍膽瀉
肝湯皆愈此因症也

張子和曰遺精癆閉尿痿痺精滑白淫皆男子之疝不可
妄歸之腎冷 若月涸不月月罷腰膝上熱足熱噉乾癢
閉少腹有塊或定或移前尿突出後尿痔核皆女子之疝

也但女子不謂之疝而謂之瘕
一人潰而腫痛發熱日晡尤甚以小柴胡加黃栢知母當歸
而愈此因症也

一人已愈惟莖中一塊不散以小柴胡加青皮荆防治之更
以荆防牛膝何首烏活石甘草各五錢煎湯熏洗各數劑
而消此因症也

一人年踰四十素有淋患疝瘡焮痛倦急用小柴胡五加連
栢青皮當歸而愈此因症而治

一人因勞莖竅作癢時出白物發熱口乾以清心蓮子飲而
安此因勞處治

一人玉莖腫痛小便如淋自汗甚苦時或尿血少許尺脉洪
滑按之則瀉先用清心蓮子飲加牛膝山枝黃栢知母數

劑少愈更以滋腎丸一劑而痊此因症也

前賢云如自汗小便少不可以藥利之既已有汗則津液外亡小便自少若利之則榮衛涸竭宜以製火煩熱愈甚當俟熱退汗止小便自行也兼此乃陽明經大忌利小便也

一老患痔瘡小便淋瀝脉細躄倦此氣虛兼濕熱也用清心連子飲及補中益氣湯六劑而愈下痔瘡丹溪用青黛蛤粉密陀僧黃連為末付又以鷄脫皮燒存性為末付下痔瘡并腫瘡蛤粉蠟茶苦參密陀僧為末河水洗淨臘猪油調付

又方米泔水洗瘡淨用頭髮鹽水洗去油淨再用清湯洗晒乾燒灰傳瘡即生靨

又方治下注痔瘡蝕臭腐爛疼痛難忍兼治小兒痔瘡

黃栢蜜炙黃丹三分輕粉錢半乳香三分密陀僧

高末茶各三寸射香少許

右末用葱湯洗瘡次貼此藥


洗藥黃連黃栢當歸白芷獨活防風槲

朴硝等分水煎入錢五十文烏梅五个鹽一匙同煎溫洗日五七次敷下項藥

敷藥木香枳榔黃連銅青輕粉枯礬

海螺硝射香

等分為末洗後至夜付上



文
香
到
印
光
二
三
三

