

414.0  
0305  
:2



丹臺玉案卷之二

明新安休邑後學

孫文胤

對徽父

參著

當湖孝廉友弟屠壽徵山靜父較正

平湖縣庠盟弟俞允昌爾迪父

古潤內弟江國春如一父

全閱

傷寒門

夫傷寒者。冬月天氣嚴寒。水冰地凍。而成殺厲之氣。體弱之人。觸犯之者。中則卽病。各曰正傷寒。不卽病者。乃寒邪藏于肌膚之間。伏于榮衛之內。至春因溫。丹臺玉案 二卷 一

暖之氣而發者。各曰溫病。至夏因暑熱而發者。各曰熱病。雖曰傷寒。實爲熱病。凡治傷寒。必先辨明六經。而後可以用藥。如初發于一二日之間。便覺頭頂痛。腰脊強。而發熱惡寒者。乃足太陽膀胱之受病也。而脰之則尺寸俱浮。浮緊有力爲傷寒。浮緩無力爲傷風。而太陽經症可辨矣。太陽病已。以次而傳經。必傳于胃。發于一三日之間。便覺目疼。鼻乾。不得眠。日晡潮熱。不惡寒而反惡熱者。乃太陽陽明胃經受病也。而脰之則尺寸俱長。長而微洪者。臑病。長而沉數者。

腑病而陽明瘳可辨矣。陽明病已。以次而傳經必傳于膽。發于三四日之間。便覺胃脇痛而耳聾。寒熱嘔而口爲之苦。乃足少陽膽經受病也。而脘之則尺寸俱弦。弦而滑數者病發厥。弦而和者病欲散。而少陽經病可辨矣。少陽病已。以次而傳經必傳于脾。發四五日間。便覺腹滿或痛。而咽喉乾燥。大便不通。小便如常。或自利。手足溫而渴者爲傳經。腑熱起無頭疼發熱。但惡寒自利不渴。手足冷者爲直中陰經。乃是太陰脾經受病也。而脘之則尺寸俱沉。沉實有力爲裏實熱。沉遲無力爲裏虛寒。而太陰經症可辨矣。太陰病已。以次而傳經必傳于腎。發于五六日間。便覺口燥舌乾而渴。手足乍溫乍冷。便秘讖語者爲熱。或泄瀉清穀不渴。手指甲而青者爲寒。乃足少陰腎經受病也。而脘之則尺寸俱沉。沉實有力知其熱。沉遲無力別其寒。而少陰經症可辨矣。少陰病已。以次而傳經必傳于肝。發于六七日間。便覺煩懣而囊縮。讖語而渴者爲熱。口吐涎沫。小腹痛不渴。身冷如水者爲寒。乃足厥陰肝經受病也。而脘之則尺寸俱沉。沉

實有力是其熱。沉遲無力定知寒。浮緩者病自愈。厥陰經症可辨矣。又有兩感傷寒者何也。假如一日太陽與少陰俱病。頭疼爲太陽邪盛于表。口乾煩滿爲少陰邪盛于裏。二日陽明與太陰俱病。身熱譫語爲陽明邪盛于表。不欲食腹滿爲太陰邪盛于裏。三日少陽與厥陰俱病。耳聾爲少陽邪盛于表。囊縮而厥爲厥陰邪盛于裏。若水漿不入。又不知人者。六日。或以其一臟一腑同受其邪。此兩感之所以不救也。然其間亦有輕重之不同。表重于裏者。宜先救其表。而後及于裏。裏重于表者。宜先救其裏。而後及于表。此又求于一生于萬。死之中。不得已而施治也。其不兩感于寒。更不傳經者。至七八日間。其本經之邪漸退。至十二日則精神清爽而自愈。然傷寒傳經種種不同。未可執爲一定之序。有始于太陽。以次而傳入陰經。而不傳少陰者。或太陽不傳陽明。少陽而卽傳少陰者。或不由陽經而直入陰經者。或始終卽在一經。而不傳者。或二陽三陽同受而爲合病者。或太陽陽明先後受而爲併病者。種種不一。詳審而治可也。

又有中寒一症。或卒中天地之寒氣。或口得寒物。直中陰經。六脉沉弱無力。身倦手足厥冷。口禁不語。非若傷寒之邪。循經漸深也。然真正傷寒。與感冒傷寒。及似傷寒。而非傷寒者。何以辨之。蓋寒者。冬月嚴凝。肅殺之氣也。自霜降以後。春分以前。皆屬冬。此時感冒而即發者。乃爲真正傷寒也。若冬傷于寒。不即病。至春分後而發者。名曰溫病。其症發熱咳嗽。身痛口渴。不惡寒。其脉弦數不緊。右手反盛于左手。蓋佛然在內故也。冬傷于寒。春亦不病。到夏至後而發者。名

曰熱病。其脉洪數。其症熱渴。比春更甚。溫熱二症俱不惡寒。而渴不惡寒。則病非外來。渴則熱自內達于表間。有惡寒者。乃冒非時暴寒。非若冬月之甚也。其有不因冬傷于寒。而春自傷于風。夏自傷于暑者。則自有傷風傷暑之別。而又不可以溫熱並論矣。或有感于天行時氣。而病相同者。謂之溫疫。其症頭疼身痛。發寒發熱。一家一方。長幼傳染者是也。或足膝等處。忽然紅腫。或軟弱發熱。頭疼。謂之脚氣傷寒。或心腹飽悶。嘔逆頭疼。發熱惡寒。右手關脉緊盛。左手三

奇和平。而身不痛者。是傷食也。若頭痛而身亦痛。或右手俱緊盛。謂之夾食傷寒。左手脉來緊盛。右手洪滑。或寸脉沉伏。身熱惡寒。隱隱頭痛。喘咳煩悶。胃脘體痛。是夾痰傷寒。頭痛發熱惡寒。但右手脉來空虛。左手脉來緊盛。是勞力傷寒。左手脉來緊澹。右手脉沉芤。心胃脇下小腹有痛處。汗至脛而回。是蓄血傷寒。太陽症則如狂。陽明症則善忘。少陽症則寒熱似瘧。此皆類傷寒。而非傷寒也。其餘傷寒中雜症頗多。不能枚舉。皆諸病門中所有者。但雜症一兼傷寒。卽所謂傷寒雜症。醫者以意求之。則不言而自喻矣。

丹臺玉案

二卷

五

立方

神仙粥 治身熱作飽。不思飲食。頭疼。冒雨受寒。一時無覓醫處。此法取汗。

用帶皮老薑三兩搗爛。將熱酒泡飲。出汗。輕者卽愈。重者可解一時之急。

麻黃湯 太陽症。頭頂痛。腰脊強。發熱無汗。宜此湯

主治而汗之。

麻黃 一兩  
桂枝 一兩  
甘草 五錢  
杏仁 五十一枚

作一劑。每服用五錢。水煎溫服。汗出爲度。無汗再服。春分後忌之。用此藥發汗不出。脉弱者無陽。及不至足者爲難治。身熱不退。脉愈燥者難治。

葛根湯 陽明症。目痛鼻乾不得眠。身熱無汗者。以此湯治之。

葛根 三錢 芍藥 錢半 桂枝 一錢 薑三棗二加黃

芩 各葛根解肌湯。

白虎湯 治渴而有汗不解者。

知母 二錢 石膏 五錢 甘草 六錢 粳米 小半 加人

丹臺玉案

二卷

六

參。各人參白虎湯。無汗大忌。

小柴胡湯 少陽症。胃肋痛而耳聾。往來寒熱。病在

半表半裏。此湯爲主治。

柴胡 二兩 半夏 八錢 黃芩 甘草

人參 各七錢 半 作五服。每服加薑三棗二。但人參一

味亦宜斟酌。若邪氣未退。不可輕用。

大柴胡湯 治身熱讞語。不大便。惡寒。

柴胡 二兩 黃芩 七錢 芍藥 三錢 半夏 六錢

枳實 五錢 大黃 五錢 作三服。加薑棗。

桂枝大黃湯

太陰症。肚腹硬滿。燥渴咽乾。或腹痛。

大便實者為裏熱。以此湯主之。

桂枝

大黃

甘草

枳實

厚朴

人參

芍藥

檳榔

甚者加

芒硝

附子理中湯

腹滿自利。不渴者屬裏寒。

人參

白朮

乾薑

甘草

大承附子

四逆湯 治四肢厥冷。脉微欲絕者。

丹臺玉案

二卷

七

乾薑

五錢

附子

二錢

甘草

一兩

水煎。熟冷服。

大承氣湯

少陰症。口燥咽乾。譫語五六日不大便。

手足心并腋下。澀澀痞滿。燥實俱全者。用此湯主

之。

大黃

厚朴

枳實

芒硝

各二錢半

小承氣湯

治傷寒。傳裏有痞滿。實而無燥。堅者以

此湯主之。

大黃

五錢

厚朴

枳實

各二錢

調胃承氣湯

無痞滿。而有燥實堅者。



大黃 四錢 芒硝 三錢 甘草 二錢 枳實 二錢

厚朴 二錢 若初起手指甲青兼之腹痛嘔吐身

如彼杖脉細沉無力謂之陰毒急用四逆湯温之

外灸關元氣海復其陽氣不効即死

麻附細辛湯 本經身發熱四肢冷指甲青腹痛脉

雖沉亦有可汗者此湯主治

麻黃 二錢 附子 三錢 細辛 一錢 甘草 五分

人參 二錢 黃連 一錢 芍藥 一錢 以其無頭疼故

名少陰似太陽假若身不發熱豈敢輕汗之

丹臺玉案 二卷 八

桂附湯 厥陰症煩滿囊拳譏語而渴者當下之三

承氣湯選用日吐涎沫小腹痛不渴者當此湯主

之

桂枝 一兩 附子 三錢 青皮 甘草

柴胡 各四錢 作三服每服加姜三片

陶氏冲和湯 兩感傷寒雖不治之症然所稟有虛

實所感有淺深若胎元稟得厚者而所感得淺間

亦可生如兩感陰陽未分或陽先受病者以此湯

服之

柴胡

乾葛

石膏

黑豆

生地

防風

白芷

川芎

細辛

羌活

甘草

黃芩

羌活湯

治兩感陰陽已分

羌活

一錢五分

獨活

防風

防已

黃芩

黃連

蒼朮

各八分

白朮

甘草

細辛

各三分

知母

川芎

生地

各一錢

煎服未解再服三四劑病愈則止

又方

陰陽兩感表裏未分用後方主治

丹臺玉案

二卷

九

麻黃

升麻

乾葛

芍藥

各二錢

甘草

五分

蘇葉

青皮

香附

白芷

川芎

陳皮

各等分

每服三錢加姜葱煎服痞滿加枳殼大抵兩感脉

從陽可治從陰難治

九味羌活湯

春分後感冒傷寒宜此湯主之

羌活

蒼朮

防風

各一錢半

甘草

白芷

川芎

生地

黃芩

各一錢

細辛 四分

姜三錢二水煎加葱白搗汁五匙入

藥再煎熱服。覆取汗。原有汗去蒼朮加白朮。濕

服汗不止去細辛加黃芪。再不止加桂枝芍藥。

不作汗加蘇葉。渴加知母石膏。嘔逆加薑

汁。有痰去生地加半夏。肌熱加柴胡葛根。

喘加杏仁。虛煩加知母麥門冬竹茹。胸膈飽

悶去生地加枳殼桔梗。便秘加大黃。中寒于

經絡加附子。濕土司天倍蒼朮。久雨加木瓜。

蒼朮。太陽症倍羌活加藁朮。陽明症加升麻。

葛根。少陽症加柴胡半夏。太陰症加厚朴枳

丹臺玉案

二卷

十

實。少陰症加桔梗知母黃柏。厥陰症加柴胡。

倍川芎。此方通治六經傷寒。無有不驗。乃四時

傷寒之聖藥也。

回陽急救湯。治直中陰經無熱惡寒面慘手足厥

冷。脣紫舌卷。瓜甲青黑身重難于轉側。不渴臥多

踈足。大便泄利。小便青白。脉細沉微。

附子 乾薑 人參 甘草

白朮 肉桂 陳皮

嘔吐加半夏。薑汁。腹痛甚加芍藥。木香老薑汁。

利不止。加陳壁土炒升麻少許。口吐涎沫。加吳  
茱萸鹽炒。無脉。加五味子。猪膽汁。戰慄。加附  
子。麻黃。小腹絞痛。加青皮。吳茱萸水。一鍾半。棗  
二生薑自然汁半盞煎。臨服入泥漿水澄清。一匙  
温服。

合病

或二陽同病。或三陽同病。不傳者。太陽合陽明。  
升麻葛根湯。陽明合少陽。小柴胡合升麻葛  
根湯。或通用九味羌活湯。

丹臺玉案

二卷

十

併病

始初二陽合病。後二陽氣盛。一陽氣衰。併歸一經。獨  
重者。陽明併太陽。麻黃湯合升麻葛根湯。少  
陽併太陽。麻黃湯合小柴胡湯。少陽併陽明。  
為木尅土難治。小柴胡合升麻葛根湯。或通  
用九味羌活湯。

加味理中湯。治中寒。即冬時直中真寒。一身受邪。  
難分經絡。手足厥冷。或腹痛嘔吐。甚則卒倒昏迷。  
不省人事。脉遲無力。

乾薑

人參

白朮

肉桂

甘草

半夏

陳皮

細辛

茯苓

煨薑五片煎熟。再入薑汁半盞服。其腹內外仍用薑炒熱時熨之。輕則依本方。

重則加熟附子。身甚寒者加麻黃。挾氣加木香。

嘔吐涎沫加丁香。腹痛加木香砂仁。挾食加草菓枳殼。

瀉不止加升麻蒼朮。外灸關元氣海。再用蔥熨法。

元氣海。再用蔥熨法。

溫病

丹臺玉案

二卷

三

此病發于春間。經曰。發熱不惡寒。反渴者。溫病也。分

表裏治之。表症如天溫。升麻葛根湯。如天寒。

柴胡桂枝湯。太陽合少陽。敗毒散合小柴胡湯。

太陽合陽明。敗毒散合升麻葛根湯。陽明合

少陽。升麻葛根湯。合小柴胡湯。半表半裏。小柴

胡湯。裏症大柴胡湯。重者一時表裏俱發。防風

通聖散。表裏俱熱。大便自利者。柴胡黃芩湯。加

木通山梔。

竹葉石膏湯。治虛煩變雜症。表症已解。邪毒未除。

熱結在內。心胃煩滿。渴甚。飲水無度。

石膏 五分 人參 二錢 甘草 七分 麥門冬 一錢

淡竹葉 十四片 糯米 一撮 水煎入薑汁二匙

升麻葛根湯

葛根 升麻 芍藥 甘草

表熱加柴胡。內熱加黃芩。有吐衄血加生薑。

牡丹皮 熱甚加山梔黃連。或加連翹天花粉。

大便秘加枳實大黃。頭痛加川芎。身痛加羌

活。痞悶加枳殼桔梗。咳嗽加棗仁痰加半夏

丹臺玉案 二卷 士

發斑加玄參。如老人去芍藥加柴胡人參。

人參敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡

枳殼 桔梗 川芎 赤茯苓

人參 甘草

皮膚癢癢加蟬蛻。口乾舌燥加黃芩。去人參加

防風荆芥。名荆防敗毒散。

小柴胡湯

柴胡 黃芩 人參 半夏

甘草

加薑棗

陶氏加陳皮芍藥

頭疼加川芎

胃中煩而不

嘔去參夏加瓜蒌仁

渴去半夏加知母天花粉

腹痛去黃芩加芍藥

脇下痞悶加牡蠣枳實

去棗

脇痛加青皮

心胃悶加枳殼桔梗不

効加枳實黃連瓜蒌仁去甘草茯苓

心下悸小

便不利去黃芩加茯苓

咳嗽去參棗生薑加五

味子炮乾薑

嘔加薑汁竹茹

虛煩加竹葉梗

米 暈加生地茅花

痰盛加瓜蒌仁桔梗枳

丹臺玉案

二卷

十

實 喘加桑白皮烏梅

熱盛錯語不眠加山梔

黃連黃栢

少陽陽明合病口燥目疼加芍藥乾

葛 壞症加鱉甲

自汗惡熱讖語煩渴去半夏

合白虎湯

自汗惡風腹痛或寒多熱少脉弱去

黃芩合桂枝湯

血虛發夜熱合四物湯去川芎

加麥門冬知母黃栢 脉弦虛無力或浮散發熱

煩燥口渴不飲水此爲虛熱去半夏黃芩合生脉

散 熱入血室小腹痛晝明夜昏妄見或寒熱不

定似瘧合四物湯加牡丹皮

男子加生地

婦

人加當歸。紅花。瘥後發熱。本方和之。脉浮。加蒼朮。蘇葉。脉實。加大黃。枳實。寒熱似瘧。而裏未實者。加桂。以溫血。表熱而裏又燥渴。糞硬者。加大黃。以清血。如無耳聾。脇痛。只則身熱發渴。讖語。大便實者。加大黃。

大柴胡湯

柴胡

黃芩

芍藥

枳殼

半夏

大黃

薑棗

昏亂讖語。加黃連。山梔。

痞滿。加枳殼。桔梗。厚朴。

丹臺玉朮

二卷

五

口燥渴。舌胎黃。加瓜蘆仁。

夏月熱病煩燥。脉洪。

大加知母。麥門冬。石膏。

發斑。加生地。玄參。牡丹。

皮。發黃。加茵陳。黃柏。

鼻衄。加犀角。大便不。

通加芒硝

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

麻黃

薄荷

連翹

芒硝

石膏

黃芩

桔梗

滑石

甘草

荆芥

白朮



山梔

加薑三片

凡雜症。耳目口鼻。唇舌咽喉。風熱風痰等疾。外科癰疽瘡癤。小兒驚疳積熱諸風。無所不治。如自

利去芒硝。

自汗去麻黃。

清熱解毒湯

熱病發于夏。脈細小無力。足冷。如

得汗而燥盛者。如下痢腹痛者。亦不治。

黃芩

知母

升麻

葛根 各二錢

石膏

人參

白芍

各一錢半 羌活 二錢

黃連

酒製

生地

酒製

五分 甘草

七分

薑三片

丹臺玉案

二卷

六

胃痞悶加枳實。半夏各一錢。薑汁四五匙。去生地。

脾胃不實加白朮。

表症在太陽。九味羌活

湯。汗後煩渴。脈洪大。背惡寒者。白虎加參湯。

益元散。

益裏症。

大柴胡湯。重者。一時盛發。

雙解散。

或防風通聖散。

白虎加參湯

卽化斑湯

石膏

知母

粳米

甘草

山梔

麥門冬

人參

五味子

天花粉

黃連

薑棗

烏梅

心煩。加竹葉。竹茹。小便短少。加滑石。背惡寒。渴。加茯苓。去山梔。嘔。加薑汁炒半夏。頭微疼。

眼眶疼。加葛根。去山梔。

益元散 一名六一散 一名天水散

滑石 六兩 甘草 一兩

爲末。每服三錢。入蜜少許。沸湯調服。熱者冷水調服。傷寒熱不解。加蒼朮末三錢。蔥豉湯連進數服。汗出爲度。汗吐下後餘熱。以此解之。虛煩不眠。加辰砂少許。一切風熱上壅。咽喉不利。

丹臺玉案

二卷

十七

加青黛。薄荷少許。蜜丸噙化。產後腹痛。自痢。用補脾。補血藥。下。或加五靈脂。能行血。止痢。瀉甚。加肉豆蔻少許。一切痰熱吐逆。及胃熱驚癇。顛狂。加黃連少許。薑汁蒸餅爲丸。

瘟疫

有瘟疫寒疫。此天地不正之氣。多感于房勞辛苦之人。從口鼻而入。當隨時令。察運氣而施治。不可大汗大下。當從乎中。而用陽明少陽二經藥。初看未見端的。先以其敗毒散。加薄荷治之。看歸何經。

再隨經施治。見陽明經者。用升麻葛根湯。見少陽症者。用小柴胡加防風羌活。少陽陽明兼見者。柴葛二湯合服。寒熱往來而大便泄者。小柴胡合五苓。寒多去芩。雷桂。大便秘。小柴胡加大黃。小便秘。小柴胡合四苓。發黃再加茵陳。作渴。小柴加石膏。知母。發狂不識人。大柴胡。加當歸。如大便泄者。三黃石膏湯。若入太陰經。無熱症見者。用理中湯。此症必腹痛而瀉。痛止。仍用小柴胡。若入少陰厥陰經。用陰症傷寒

傳經治之。如春夏染者。參看溫熱病二條。秋時染者。多身熱咳嗽。金沸草散。若渴。白虎湯加蒼朮。若熱畜發痘。茵陳五苓散。若痢疾。人參敗毒散。加陳倉米炒。倘燥太過。用潤燥散。入冬時染者。多身熱頭疼咽乾。人參敗毒散。或甘桔湯。加玄參。發斑者。陽毒升麻湯。通用。加減調中湯。預防四時疫氣。用藿香正氣散。四時外感發熱。惡寒。用香蘇散。四時感冒風寒。鼻塞頭疼。痰涎。嘔逆。用參蘇飲。又有大頭傷寒。天行時病。初覺

寒熱身痛。次則頭面紅腫。疙疹。甚則咽喉堵塞。立  
 人最速。多發于冬溫之後。脉浮在表。用普濟消毒  
 散。或荆防敗毒散。脉沉在裏。羌活黃連黃芩  
 俱酒炒。大黃酒蒸。鼠粘爲主。連兩目鼻面腫者。  
 陽明也。加乾葛升麻石膏赤芍藥。發耳前併頭  
 角少陽也。加柴胡瓜蒌仁。發腦後項下腫起。太  
 陽也。加防風荆芥水煎時呷。邪氣甚者。通大  
 便。加芒硝。遇凶荒勞役。宜普濟消毒散。卽普濟  
 普濟消毒散 耑治大頭傷寒

丹臺玉案

二卷

七九

黃芩

黃連

各一錢

鼠相子

藍板根

連翹

馬尾勃

各一錢

陳皮

生甘草

桔梗

玄參

柴胡

各一錢

升麻

僵蠶

各五分

人參

三錢

爲末。白湯調服。時時呷之。雷一半蜜丸。噙化。或加  
 防風薄荷當歸川芎水煎服。大便硬。加大黃。若  
 非便秘。忌用降下之劑。腫不消者。咬去血可用。  
 通關散。倍羊躑躅。及藜蘆少許。搗鼻以洩其毒。  
 久不愈。欲作膿者。內服托裏消毒散。

疎風清熱飲 治蝦蟆瘰癧遍身如蝦蟆之皮皆屬于

風熱。

羌活 防風 荆芥 黃芩

甘草 各二錢 煎服

又方 側柏葉自然汁調蚯蚓泥敷之。

又方 丁香尖南星醋磨傅之。

三黃石膏湯

黃芩 黃連 黃柏 山梔 各二錢

麻黃 錢半自汗者去之 石膏 五錢 香豉 三錢

丹臺玉案 二卷 二十

水煎加辰砂服。

又方 治時疫寒熱將黑豆二合炒香甘草二寸炙

黃切碎用水煎時時呷之。

理中湯

人參 白朮 乾薑 甘草

大便溏者用散利者用丸。寒甚腹痛四肢冷加

附子。臍下動氣欲作奔豚去朮加肉桂。吐多

去朮加半夏薑汁製。下多還用朮。悸加茯苓。

渴倍白朮。腹痛裏虛倍人參。寒倍乾薑。

吐不止。去甘草。加薑汁。吐蛔。去甘草。加烏梅。  
饑逆。加丁香柿蒂。噦逆。加木香。霍亂轉筋。加  
石膏。寒濕發黃。加茵陳。脾弱瀉不止。溺不利。  
倍參朮。合五苓散。內虛腹痛。合小建中湯。陶  
氏加肉桂。陳皮。茯苓。薑棗。臨服入陳壁土炒一匙。  
自利肚腹痛。加木香磨薑汁。腹痛甚。去白朮。  
或陰結症。本方加大黃利之。

金沸草散

金沸草 荆芥 麻黃 甘草

丹臺玉案

二卷 三

赤芍 半夏 前胡 薑棗

潤燥湯

生地 山梔 升麻 柴胡

石膏 生薑

自汗加桂枝。無汗加蘇葉乾葛。虛煩加麥門  
冬。渴加天花粉。咳嗽加杏仁。

陽毒升麻湯

升麻 犀角 射干 黃芩

人參 甘草

加減調中湯

芍藥

茯苓

白朮

麥門冬

生地

陳皮

桔梗

烏梅

痰加貝母

熱甚加黃芩

藿香正氣散

此方治內傷脾胃外感風寒若病在

太陽頭疼發熱骨節痛不可用

藿香

紫蘇

白芷

大腹皮

茯苓

厚朴

白朮

陳皮

桔梗

半夏麩

甘草

薑棗

丹臺玉案

二卷

三

一方去白朮加香附米

香蘇散

香附

紫蘇

陳皮

甘草

蔥薑

頭目痛加川芎白芷

熱甚加柴胡

參蘇飲

人參

半夏

茯苓

陳皮

枳殼

桔梗

前胡

乾葛

甘草

紫蘇

後人去人參以川芎代人參柴胡代前胡名芎蘇

飲。若寒天氣促。咳嗽。加麻黃杏仁。金沸草。若  
温天咳嗽。加桑白皮杏仁。如有熱痰。加黃芩瓜  
蘆仁。周身骨節疼。加羌活。婦人胎前產後。加  
川芎。當歸芍藥。

又秘方。人中黃五錢。蒼朮羌活各三錢。煎服立愈。  
小陷胃湯。胃膈迷悶。乃邪熱結于上焦。而生痰也。

半夏 六錢 黃連 三錢 瓜蘆 一箇

連皮肉取四分之一。作一服水二鍾。先煮瓜蘆至  
一鍾半。下餘藥煎至一鍾。温服。如未效再服。口出

丹臺玉案 二卷 二十三

黃涎卽愈。

大陷胃湯。胃前脹悶煩滿。不進飲食。及渴多飲水。  
有停飲在上。行早之故。名曰結胃。

大黃 五錢 芒硝 一兩八錢五分 甘遂 二錢五分

爲末。作二服水二鍾。煎大黃至一鍾。去渣入硝煎  
一沸。入甘遂末。温服。得快利止。

脚氣

惡寒發熱。全類傷寒。但新起脚膝軟弱赤腫爲異耳。  
此濕熱之所聚在肌膚。流注于脚膝。



祛濕湯 治熱氣留于肌肉之中。宜急治之。少緩其

氣上行。至心即死。

蒼朮

黃柏

赤茯苓

牛膝

木瓜

木通

檳榔

甘草

黃連

烏藥

防已

各三錢

量輕重治之。水煎空心服。

又方 敷紅腫處。朴硝大黃寒水石牙皂為末。以鷄

子清調敷。甚効。

又方 人中黃為末。芭蕉水調。傳甚妙。

丹臺玉案

二卷

二五

### 食積

外症頭疼發熱惡寒。全類傷寒。惟身不痛心腹飽悶。

噎噎嘔逆為異耳。甚者用滾鹽湯調。阜萊末五

分探吐。復用加味平胃散。頭痛身亦痛者。謂之

夾食傷寒。加味治中湯。如表症多。藿香正氣散。

裏症多。小承氣湯。

加味平胃散

蒼朮

厚朴

陳皮

各二錢

白木

錢

甘草

八分

乾薑

一錢

山楂

神麩

草菓 各三錢 黃連 二錢 枳實 一錢 薑 半錢

臨服入木香磨汁調下。如腹痛加桃仁。

便實去查麩菓薑加大黃。

### 加味治中湯

陳皮 枳實 青皮 厚朴 各一錢

白朮 八分 甘草 五分 蒼朮 一錢 乾薑 五分

草菓 砂仁 各一錢

熱甚去白朮加柴胡 嘔吐加薑汁炒半夏 胃

中飽悶去甘草白朮加枳實 腹痛甚者加芍藥

丹臺玉案 一卷 二五

大黃去乾薑白朮

夾痰症

憎寒壯熱惡風自汗胃膈滿悶氣上攻冲頭不昏疼

項不強者是也 自熱者芎蘇飲金沸草散柴胡

半夏湯 無熱者二陳湯温膽湯通用加味導痰

湯 有痰結胃者鶴頂丹枳桔二陳湯 有痰上

隱隱頭疼者瓜蒂散吐之

### 加味二陳湯

甘草 八分 半夏 一錢 扶苓 一錢 陳皮 一錢 五分

南星 枳實 黃芩 白朮

黃連 瓜蒌仁 桔梗 杏仁

山查 柴胡少佐 貝母 金沸草

薑汁 竹瀝 年力壯盛者先吐去痰後

服此藥

瓜蒂散

瓜蒂 赤小豆各五錢

為末鹽湯調服。服後宜臥片時欲吐且耐之良久

用指探之。

丹臺玉案

二卷

三

虛煩

外亦發熱有類傷寒初症但頭身不痛不惡寒脉不

緊數但浮而無力慎不可攻熱去則寒生

人參竹葉湯

石膏五錢 人參二錢 甘草七分 麥門冬一錢五分

淡竹葉片 粳米一撮 水煎入薑汁二匙服

如氣弱大渴加倍人參。汗多加黃芪。痰加貝

母。泄加白朮澤瀉。陰虛夜煩加知母黃栢生

地芍藥。嘔吐去石膏加陳皮茯苓

加減補中益氣湯 勞力傷寒。頭疼發熱惡寒。但覺渴自汗。身腿酸軟無力。此內傷氣血。外感風寒。故也。

人參

黃芪

當歸

生地

川芎

柴胡

陳皮

甘草

細辛

羌活

防風

白木

薑棗蔥水煎溫服。

如元氣不足。加升麻少許。咳嗽加杏仁。汗不止。去細辛。加芍藥。胃中煩熱。加山梔。竹茹。乾

丹臺玉案

二卷

三七

嘔。加薑汁炒半夏。

胃中飽悶。去生地。甘草。黃芪。

白朮。加枳殼。桔梗。

痰盛。去防風。細辛。加瓜蒌仁。

貝母。腹痛。去芪朮。加芍藥。乾薑。

蓄血症

外症寒熱往來。但脉孔濇。日輕夜重。蓄于上焦。則衄血。善忘。嗽水不嚥。胃脇腹皆滿痛。讞語昏憤。謂之血結。胃中用犀角。地黃湯。蓄于中焦。則頭汗發。渴發黃。用桃仁承氣湯。蓄于下焦。則如狂。便黑。小腹急脹。按之則痛。用抵當湯丸。或用犀角地

黃丸。加青皮。大黃通用。小柴胡。加桃仁。生地。兼  
子茵陳。一切血症藥。此皆治法。不易傷寒。有用  
承氣。大下不解。反更兼善食者。瘀血也。所以打  
撲傷損症。亦類傷寒。

犀角地黃湯

犀角

牡丹皮

各一錢五分 白芍

一錢三分 生地

三錢

一方有當歸錢半

如表熱加柴胡黃芩

鼻衄

加山梔

內熱甚加黃連

腹脹或通瘀血未下

加桃仁紅花大黃

小腹急痛加青皮 陶氏加

丹臺玉案

二卷

三十八

甘草。桔梗。陳皮。紅花。當歸。薑三片。臨服入藕節汁

三匙調下

紫雪

治發斑。譫語。蓄血。三陽症。煩燥。作在氣喘

赤金

十兩

升麻

六錢

寒水石

石膏

各四兩

犀角

羚羊角

各二兩

玄參

一兩

沉香

木香

丁香

各五錢

甘草

八錢

右以水五升。以赤金同升麻先煮。至三升。去金。入

諸藥。再煎。至一升。濾去滓。投朴硝三兩。二錢。微火

煎熬。卽成紫雪。

桃仁承氣湯

大黃 四錢

桃仁 三錢

桂枝

芒硝 各二錢

甘草 一錢

右水煎溫服。血盡爲度。未盡再服。陶氏加枳殼。青皮當歸芍藥柴胡薑三片。臨服入蘇木一錢煎。二沸熱服。

如傷寒犯內傷。食積蓄血。大便硬脹。不能言語。神思盡脫。兩目直視。手足僵仆。難以下藥者。將紫蘇煎湯。用手巾泡熱。絞乾。攤肚腹及小腹上。輕輕揉運。手巾丹室玉案。二卷。二十九。

漸冷卽換熱者。速連揉運。待宿糞硬塊。或積血下。纔可用藥。如糞門結用蜜導法。

江南溪毒

江東江西諸源澗有蟲。名曰短狐。溪毒。又各射公。其蟲有翅能飛。有一長角橫在口前。如弩檐。臨其角端如上弓。以氣爲矢。無目有耳能聽。在山源水中聞人聲。使以氣毒射人。故謂之射公。此蟲畏鷺鷥能食之。此症似乎傷寒。寒熱往來。身不喜冷。筋急體強。目疼。頭痛。張口呻吟。咳嗽。呼吸悶亂。始終更不能言。朝輕

暮重。非其土人中之便。謂之傷寒。今說其狀。以明其  
症。與傷寒別矣。

螺螄疔

惡寒發熱。胃膈作悶。身發紅點。如蚊跡者。類乎傷寒。  
此點起之于手。沿至于心前。其人發狂。悶亂而斃。不  
知者。但以傷寒發斑治之。百無一生也。

治法

以三角針刺其紅點之首尾處。出血。外用鑪鐵釘磨  
水敷之。內服犀角地黃湯立愈。方見前一

丹臺玉案

二卷

三十

水漬法

陽毒漸深。六脈洪大。內外結熱。舌卷焦黑。鼻如烟煤。

登布數重。新水漬之。稍換去水。搭於患人。胃上。須臾  
蒸熱。又以別浸冷布易之。頻換。熱稍退。再進陽毒藥。  
驗舌形瘳三十六種。



舌見紅色。內有乾硬黑色。形如小長舌。有刺者。此熱  
毒熾盛。堅結大腸。金受火制。不能平木。故也。急用調  
胃承氣湯下之。


調胃承氣湯 方見前



舌見白胎滑者和初入裏也。丹田有熱，胃中有寒，乃少陽半表半裏之瘥。宜小柴胡湯。梔子豆豉湯治之。

小柴胡湯 方見前

梔子豆豉湯 方見後



丹臺玉案 二卷

舌見紅色，熱蓄於內也。宜用透頂清神散。

透頂清神散

當歸 白芷 北細辛 猪牙皂角

右為末，等分和勻。令病人先噙水一口，以藥少許吹入鼻內，吐去水，取嚏為度。如未嚏，仍用藥再吹。



舌見純紅，內有黑形如小舌者，乃邪熱結於裏也。君

火熾盛，反兼水化，宜服涼隔散。大柴胡湯。



大柴胡湯

方見前

涼隔散

方見後




舌見紅色而有小黑色者熱毒乘虛入胃蓄熱則發癰矣宜用升麻葛根湯加玄參化癰湯解之。

升麻葛根湯

方見前

化癰湯

方見前



丹臺玉案

二卷

三十二

舌見淡紅中有大紅星者乃少陰君火熱之盛也。所不勝者假火熱以侮脾土將欲發黃之候宜茵陳五苓散治之。

茵陳五苓散


方見後



舌見紅色尖見青黑者水虛火實腎熱所致宜竹葉石膏湯治之。


竹葉石膏湯

方見前



舌見淡紅色而中有一紅暈沿皆純黑乃餘毒遺於心胞絡之間與邪火鬱結二火亢極故有是症以承氣湯下之。

承氣湯 方見前



舌見紅色更有裂紋如人字形者乃君火燔灼熱毒


丹臺玉案

二卷

三十三

炎上故發裂也宜服涼隔散。

涼隔散 方見後



舌見紅色更有深紅色癰點如蟲蝕之狀者乃熱毒熾盛火在上水在下不能相濟故也宜小承氣湯下之。

小承氣湯 方見前



舌 紅 純


舌見紅色。內有黑紋者。乃陰毒厥於肝經。肝主筋。故

理中湯

四逆湯 方俱見前



舌見黑色。水尅火明矣。患此者百無一生。治者審之。



丹臺玉案

二卷

三四

舌見尖白根黃。其表症未罷也。宜解表。然後方可攻之。如大便秘。用涼隔散。加硝黃泡服。小便澀者。用五苓散。加木通。合益元散。加薑汁少許。白滾湯調服。

涼隔散

五苓散 方俱見前



舌見弦白。心黑而脉沉微者。難治。脉浮滑者。可汗沉實者。可下。始病即發此色。乃危殆之芒也。速進調胃。

承氣湯

調胃承氣湯

方見前



舌尖白胎二分根黑一分必有身痛惡寒如飲水不至甚者五苓散自汗渴者白虎湯下痢者解毒湯此亦危症也。

白虎湯

方見前

解毒湯

方見後

丹臺玉案

一卷

三十五



舌見白胎中有黑小點亂生者尚有表症其病來之雖惡宜涼隔散微表之即退速當下之下用調胃承

氣湯

調胃承氣湯

方見前



舌見如灰色中間更有黑暈兩條此熱乘腎與命門

也。宜急下之。服解毒湯。下三五次。遲則難治。如初服量加大黃。

解毒湯 方見後

舌 八 十 微黃色

舌見微黃色者。初病即得之。發譫語者。由於失汗。表邪入裏也。必用汗下兼行之。以雙解散加解毒湯兩

停主之。

雙解散

丹臺玉案

二卷

三六

解毒湯

方俱見後

舌 九 十 白胎 微黃

舌中見白胎外則微黃者。必作瀉。宜服解毒湯。惡寒者五苓散。

解毒湯

五苓散 方俱見後

舌 十 二 微黃

舌見微黃色者。乃表症未罷。宜用小柴胡湯。合天  
散主之。可下者。大柴胡湯下之。表裏雙除。臨證時當  
審用之。

大柴胡湯

方見前

十二  
舌 一 黃色  
色 本

舌見黃色者。必初白胎而變黃色也。皆表而傳裏熱  
已入胃。宜急下之。若下遲。必變黑色。為惡症。為九害。  
鬼邪氣深也。宜調胃承氣湯。

丹臺玉案

二卷

三七

調胃承氣湯

方見前

十二  
舌 二 白胎  
本色

舌左白胎而自汗者。不可下。宜白虎湯。加人參二錢  
服之。

白虎湯

方見前


十二  
舌 三 白胎  
本色

舌右白胎滑者。病在肌肉。為邪在半表半裏。必往來


寒熱宜小柴胡湯和解之。

小柴胡湯

方見前



舌左見白胎滑。此臟結之症。邪併入臟難治。



舌見四圍白而中黃者。必作煩渴嘔吐之症。兼有表

者。五苓散益元散兼服。須待黃盡方可下。

丹臺玉案

二卷


三六

益元散

方見前

五苓散

方見後



舌見黃色。而有小黑點者。邪遍六腑。將入五臟。急服

調胃承氣湯下之。次進和解散。

調胃承氣湯 方見前

和解散

藜蘆

桔梗

甘草

炙各五錢

蒼朮

三錢

陳皮

厚朴

薑製各一錢

右水二鍾。薑三片。棗二枚。煎七分。去渣。不拘時服。

解毒湯

黃連

一兩

黃栢

五錢

黃芩

五錢

山梔

六錢

右每服五錢。水一鍾。半煎至一鍾。熱服。

五苓散

加茵陳卽茵陳五苓散

澤瀉

二錢五分

茯苓

猪苓

白朮

各一兩

肉桂

五錢

右每服六錢。水二鍾。煎至一鍾。溫服。

丹臺玉案

二卷

三十九

涼隔散

生甘草

二錢

連翹

四錢

山梔仁

八錢

大黃

二錢

黃芩

薄荷

朴硝

各一錢

右作一劑。水二鍾。加淡竹葉二十片。煎一鍾。不拘

時服。以利爲度。

梔子豆豉湯

梔子

二錢

淡豆豉

五錢

右水二鍾。煎七分。去渣服。

雙解散

加解毒湯



防風 川芎 當歸 白芍藥

大黃 麻黃 連翹 芒硝 各五錢

石膏 黃芩 桔梗 各一兩 滑石 三兩

甘草 二兩 荊芥 白朮 山梔 各五錢

右每服一兩水一鍾半薑三片煎八分去渣服。

茵陳湯

茵陳 五錢 大黃 三錢 山梔仁 二錢

右水一鍾半煎至一鍾去渣服。

抵當湯

丹臺玉案 二卷 四十一

大黃 三錢 水蛭 糯米炒七枚 蠱蟲 炒去翅足七枚


右作一服水一鍾半煎一鍾去渣服。

十棗湯

芫花 醋浸炒 大戟 甘遂 煨各等分

右每服二錢弱人減半水二鍾棗十枚煎八分去渣服。

渣服。



舌見黃而尖白者表少裏多宜天水散一服涼隔散

二服合進之脉弦者宜防風通聖散

防風通聖散

方見前

十二入舌 純黃

舌見黃而色有膈瓣者熱已入胃邪毒深矣心火煩渴急宜大承氣湯下若身發黃者用茵陳湯下血用抵當湯水在脇內十棗湯結胃甚者人陷胃湯

大承氣湯

茵陳湯

抵當湯

十棗湯

大陷胃湯

五方俱見前

丹室玉案

二卷

四十一

十二九古 微紅 黑灰色

舌見四邊微紅中央灰黑色者此由失下而致用大

承氣湯下之熱退可愈必下三四次方退五次下之

而不退者不治

大承氣湯

方見前

十三舌 黃色

舌見黃而黑點亂生者其症必渴譫語脉實者生脉

瀦者效。循衣摸床者不治。若下之見黑糞亦不治。

大承氣湯

大承氣湯

方見前



舌見黃中黑至尖者。熱氣已深。兩感見之。十人九效。

惡寒甚者亦效。不惡寒而下利者可治。宜調胃承氣

湯主之。

調胃承氣湯

方見前

丹臺玉案

二卷

四十二




舌見外淡紅。心淡黑者。如惡風表未盡。用雙解散加

解毒湯。相半微汗之。汗罷急下。如結胃煩躁。目直視

者不治。

雙解散加解毒湯


方見前



舌見灰色。尖黃而不惡寒者。脉浮可下之。若惡風惡

寒者用雙解散加解毒湯主之三四下之見糞黑不治。

雙解散加解毒湯 方見前



舌見灰黑色而有黑紋者脉實急以大承氣湯下之脉浮渴飲水者用涼隔散。

大承氣湯

涼隔散 方俱見前

丹臺玉案

二卷

四十三



舌根微黑尖黃脉滑者可下之脉浮者當養陰退陽若惡風寒者微汗之用雙解散若下利用解毒湯十救七八也。

雙解散

解毒湯 方俱見前



舌根灰黑。尖黃。隱見或有一紋者。脉實。急用大承氣湯下之。脉浮。渴飲水者。以涼隔散解之。十可救一二。大承氣湯

涼隔散 方俱見前

已上三十六舌。乃傷寒驗證之捷要。臨症時當細心治之。百無一失耳。

灸少陰 少陰吐痢。手反不冷。反食飲水。脉不至者。

少陰即太谿穴也。太谿二穴在足內踝後跟骨上動

脉陷中灸七壯。

丹臺玉案

二卷

四十四

灸關元穴 臟結外症不可攻宜此

關元穴在臍下一寸是也。乃少陰任脉之會。

灸期門穴 婦人熱入血室 咳逆 打呃

婦人屈乳頭向下盡處骨間。丈夫及乳小者。以指為率。陷中有動脉是穴。艾炷如小豆大。灸五七壯。婦人熱入血室。刺之下針。令病人吸五吸。停針良久起

針。

附傷風

傷風之症。乃風邪客于腠裏。灑淅惡寒。噴嚏呵欠。頭

疹發熱類千傷寒。但見風寒卽怕。亦不太甚者。是也。

脉云

陽浮陰弱。大蓋肺部見浮者。多以此為辨。

立方

加味香蘇飲

川芎

紫蘇

羌活

防風

蒼朮

香附

甘草

荆芥

白芷

各三錢

葛根

前胡

各一錢

右加蔥頭十枚。生薑三片。煎服。以被覆取汗為度。

丹臺玉案

二卷

四十五

若以為小疾而不治。日久則風入於肺。必成咳嗽。卽費調理矣。凡感風邪。初起忌服茯苓。以其味淡。善于滲泄。有表症服之。則引邪入于陰經也。如當用補。或消痰。或消食。以香蘇飲為主方。隨症加減。不得一一細贅矣。

中風門

附癰症

夫人似乎無恙。而卒然中風者。豈一朝一夕之故哉。蓋內必先腐也。而後蟲生之。土必先潰也。而後水決之。木必先枯也。而後風摧之。夫物且然而況於人乎。

經曰邪之所轉其氣必虛。風豈能以自中乎。人亦人之自受乎風耳。使其內氣充足。精神完固。則榮衛調和。腠理緘密。雖有風將安入乎。惟其不戒暴怒。不節淫慾。或飢不暇於食。或寒不暇於衣。或嗜酒而好色。或勤勞而忘身。或當風而沐浴。或大汗而行房。或畏熱而露臥。或冒雨而奔馳。以致真元耗亡。氣血消盡。大經細絡。積虛彌年。平時無甚痛苦。而不知榮衛皆空。徒存軀殼。正猶無心之木。將折未折。無基之牆。欲頹未頹。其勢已不可支。而方且自謂無恙。遂迷而不和戒。一旦爲賊風所襲。如劇寇操刃直入無人之境。勢若破竹。不移時而皆潰。則杯酒談笑之間。舉步轉移之頃。卒然顛仆。頓爲廢人。不亦重可駭哉。由是觀之。雖由外風之中。實因內氣之虛也。然人之一身。表裏上下。未必皆虛。惟積虛之處。氣多不貫。而勢有偏里。故一爲風所入。而肢體是乎廢矣。若以臟腑言之。則又各有形症焉。中臟者多滯。九竅故有脣緩失音。真塞耳聾。目瞽便秘之症。中腑者多着四肢。故有半身不遂。手足不隨。左癱右瘓之形。又有中血脉者。則

外無六經之形症。內無便溺之阻澀。惟口眼歪斜。左或右而已。而手足動靜起居。食息故無恙也。其或肢不能舉。口不能言。更無別症。乃中經也。比中臟腑則爲輕。比之中血脉猶爲重耳。然因其病而藥之。則中臟者宜下。中腑者宜汗。中經者宜補血以養筋。中血脉者宜養血以通氣。此皆可治之症也。而又有難易于其間。中臟爲難。而中腑次之。中經又次之。其或初中于血脉。藥之而愈。苟不守禁忌。必復中。而中必在于臟。中一次則虛。一次虛一次則重。一次故中腑。

丹臺玉案

二卷

四十七

雖可治也。由先中血脉與經。而後及于腑。則難治矣。中臟本難治也。由先中腑而後及于臟。則不治矣。若中腑而兼中臟。與傷寒兩感者何異。其又可生耶。凡中風口開者爲心絕。手撒者爲脾絕。眼合者爲肝絕。遺尿者爲腎絕。聲如鼾睡者爲肺絕。汗出如油者爲元氣內絕。筋痛者爲無血。髮直指而爲頭上竄。面赤如粧。而汗綴如珠。皆所不治之症也。其有一中卽死。者何爲。而如此之急耶。蓋人之五臟。以心爲君心也。者所以主宰乎一身者也。五臟之中。惟心最難死。故



人死氣絕。一身盡冷。而心頭獨熱者。以其難死。故中臟之人。不卽死者。以四臟之氣。雖絕。而心猶未絕也。一中其心。則格酒未乾。片言未盡。而竟鬼先亾矣。縱有起死回生之藥。亦何所施乎。大法中風諸症。總屬風痰。初中之時。不論在表在裏。必先以攻痰祛風爲主。待其甦醒。然後審其經絡。分其氣血而治之。不可因其內氣之虛。而驟用補劑。蓋一中之間。道路以爲痰阻絕。雖欲補之。孰從而補之。若其病的係太虛。口眼不喎斜。手足不偏廢。便溺不阻澀。但汗出不休。眩運不定。四肢軟弱。氣息短促。方可用獨參湯。而猶必佐之以橘紅。加以薑汁。竹瀝。始可服也。若無監制。一時或可全愈。而痰邪不泄。當爲患他日。或發癰疽。必無救藥者矣。

脉云

風之中人。六脉沉伏者多。但以人迎爲主。訣云中風。口噤遲浮。吉急實大數三菟。孤舉要云。中風脉浮滑。兼痰氣。其或沉滑。勿以風治。浮大者帶虛。浮緩者帶濕。浮緊者帶寒。其有微而數者。虛弱熱極也。

通開利竅散 治中風不省人事牙關緊閉湯水難

進

麝香 一錢 半夏 三錢 青黛 八分 猪牙皂角 五錢

右為細末用少許吹鼻有嚏者生無嚏不治

仙授立刺回生丹

牛黃 真西 膽星 製過九次者 鉛霜 二錢

橘紅 廣皮去白 蛇含石 醋煨七次五錢

麝香 三錢 枳實 用小者麩炒一兩 沉香 一兩 忌火

丹臺玉案 二卷 四十九

真金箔 三十 朱砂 研極細 三錢

取鉛霜法 用出山鉛十觔打寸許方牌以線穿懸

之于大磁砵內下以燒酒六觔好醋二觔上另以

一砵覆之外用鹽泥封固裝在鍋內熱水中五日

取開掃下即成鉛霜矣

右各為極細末以竹瀝加老薑汁為丸分作七十

二九朱砂金箔為衣外加蠟封之每服一九去蠟

薑湯調下此丹乃異人秘授効驗通神真萬金不

易之方予以濟衆心切不敢自私故爾錄之廣傳

治一切中風不拘臟腑中痰中氣不省人事垂  
等症灌下一丸立醒并治一切急慢驚風辛未年  
秋橋李姚叔祥先生七旬有二忽然中倒不省人  
事便遺出痰壅上聲如鼾睡手措眼合先賢有言  
遺便者必不能治投下一丸少頃即醒至今甚健  
功效廣大救人甚溥不能一一槩錄

小續命湯 治卒暴中風不省人事痰涎壅盛半身  
不遂口眼歪斜手足顫搖言語蹇澀身體麻痺神  
昏目眩筋脉拘攣四肢不能屈伸者并療之

升臺玉案 二卷 五十

川芎 附子 重便製過 各八分 防風

官桂 黃芩 杏仁 去皮 尖 甘草

防已 各一錢 二分 人參 白芍 麻黃 去節各 一錢

水二鍾煎八分臨服加薑汁五茶匙

烏藥順氣散 治一切風攻四肢骨節疼痛脚膝軟  
弱婦人血風老人冷氣上攻胃腹脹痛吐瀉腸鳴

烏藥 陳皮 川芎 各二錢 僵蠶

白芷 麻黃 去節 枳殼 桔梗 各一錢

甘草 乾薑 炒黑各五分

水二鍾。加薑三片。棗二枚。煎八分。熱服。

排風湯 治風邪中入于臟。狂言妄語。精神錯亂。手足不仁。痰氣上逆。

扶苓

獨活

川芎

當歸

杏仁

防風

甘草 各八分

肉桂 四分

白朮

麻黃 白鮮皮 各七分

水二鍾。薑三片。臨服加竹瀝半酒鍾。熱服。

愈風湯 治言語難。肝腎虛。筋骨弱。及風熱體重。四肢偏枯。半身不遂。一切中風等症。

丹臺玉案 二卷 至

獨活

羌活

蟬殼

半夏 薑製

川芎

黃芩 酒炒 各一錢二分

黃連 薑汁炒

白芍 酒炒

當歸

陳皮

荆芥

防風 各八分

生地

葳靈仙

金沸草

僵蠶

貝母

茯苓 各一錢五分

膽星 八分

水二鍾。薑五片。棗二枚。煎八分。溫服。

稀涎散 治中風痰涎隔壅。服此下痰。

明礬 一兩 肥皂角 四條

右共爲細末。每服五分。溫水調下。

清神解語湯 治中風痰迷心竅。不省人事。舌強不能言語。四肢不能舉動。口眼喎斜。半身不遂。

石菖蒲 南星 薑汁炒 黃連 薑汁炒 茯苓

麥門冬 去心 防風 陳皮 當歸 各一錢

白芍 生地 川芎 遠志 去骨

半夏 薑礬製 烏藥 枳實 羌活

甘草 各六分

水二鍾。生薑三片。竹茹三分。煎熟。加童便。竹瀝。同

丹臺玉案 二卷 五

服。

保命金丹 治中風口眼喎斜。手足躄拽。言語謇澀。

四肢不舉。晨昏痰多。

賈仲 七錢 生地 大黃 各五錢 青黛

板藍根 各三錢 朱砂 蒲黃

薄荷 各二錢 珍珠 龍腦 各一錢五分

麝香 一錢 牛黃 三錢

右爲細末。煉蜜丸。如雞豆大。每日晨昏。以清茶調

化一九。

解語丸 治中風語言不正。

白附子 石菖蒲 遠志 各一兩 全蝎 三錢

羌活 明天麻 僵蠶 各五錢

右為細末蜜丸棗豆大每服三十九空心薑湯下。

正舌湯 治中風舌強難言。

大明雄黃 荆芥 各等分

右為極細末每服二錢以豆酒調下。

稀蒼丸 中風或初中或中過者并體胖之人宜久服甚妙。

服甚妙。

丹臺玉案

二卷

五三

稀蒼草又名火坎草五月五日或六月六九月九

採者其効去其花實只留葉剉去葉上毛以酒蜜

拌入甑蒸晒九次焙乾為細末煉蜜為丸如梧子

大空心以温酒或米湯下六十九服過千服鬚髮

變黑筋骨強健飲食倍進步履如飛。

類中風證

忽卒倒不語但風必有斜歪搐搦之症為異有因受

氣而中者脉沉身冷無痰故也用薑湯調蘇合香丸

灌之至醒隨其寒熱虛實調之輕者用烏藥順氣散

或曰。此氣暴逆而然。氣復即已。雖不藥而愈。然閉口  
脉絕者。亦不治。

有因停食而厥者。必胃中滿悶。

有夏月卒倒。為暑風。此類中風。而實中暑者。

有因火者。內火外火合而炎鑠。劉守真作將息失宜。

一水不勝二火也。

有因痰者。火氣激搏。痰塞碍心竅也。以上四者皆

用鹽湯吐之。

防風至寶湯

丹臺玉案

二卷

五岳

南星

防風

天麻

陳皮

當歸

半夏

各一錢

僵蠶

二分

白芍

川芎

甘草

青皮

梔仁

烏藥

羌活

黃芩

黃連

麻黃

白芷

牛膝

各八分

水

二鍾

加薑五片煎服。忌食蒜。

附癇症

癇症一發。即顛仆。眼直口吐痰沫。其聲類畜。不省人

事。少頃即甦。此因驚風食而得之。其症有五。而似五

畜以應五臟。原因或七情之鬱結。六淫之所感。或  
大驚神不守舍。亦有幼小受驚。以至痰迷于心竅故  
也。

脉云

虛弦為驚。浮洪為陽癇。沉為陰癇。浮散為風癇。

立方

育神鎮心丸 秘傳 治五種癇症并顛狂驚恐痰迷心

竅等證。

羚羊角

犀角

各四錢

膽星

製過九次者

丹臺玉案

二卷

五五

遠志

去心

茯神

去木

百子仁

去油

石菖蒲

橘紅 各八錢

礞石 煨過

大黃 五錢

天麻 煨過

牛黃 二錢

瓜蒌麩 五錢

麝香 一分

未砂 二錢

真金箔

三十張

右為細末。竹瀝同膽星打糊為丸。朱砂金箔為水。

每服空心薑湯送下一錢。

清心豁痰湯

石菖蒲

去毛

麥門冬

心茯苓

去皮

枳實

炒各一錢二分

遠志 去心

天花粉

貝母 去心

酸棗仁

去油



玄參

黃連

薑汁炒

橘紅

各一錢

甘草稍

四分

水二鍾加薑五片竹茹八分煎一鍾溫服。

### 癘風門

夫癘風者即大瘧風也。又名曰癘。蓋緣感受天地肅殺之氣。古人謂之癘風。以其酷烈暴悍可畏。爾人得之。須分上下治之。看其疙瘩先見上體多者。病在上也。先見下體多者。病在下也。人之一身總不外乎氣血。血隨氣以為之運化。氣所傷則為凝滯。氣滯則血必聚矣。血聚不行則肉爛生蟲。鼻崩眉墮。此固理之

升臺玉案

二卷

五六

必然者。然風之入人。又有氣血之分。氣受之上身多。血受之下身多。上下俱多。氣血俱病也。凡治此症。必當審其從上從下治之。然所主不外乎陽明一經。蓋陽明主胃。無物不受。病之所感如此。非醫者神手病者鐵心。罕有免于死焉。按法治之。惟宜絕厚味。斷酒色。戒勞碌。若不守此。雖或少愈。必至再舉。則無救藥矣。

脉云

浮洪者屬風熱。浮滑者屬風痰。沉遲無力。氣血俱虛。

難治。

立方

換肌散 治大痲風年深不愈眉毛墮落鼻梁坍塌。

額顛腫破。此方神効。

白花蛇三兩稍蛇三兩酒製酒製北細辛一兩白芷各一兩天麻各一兩地龍去土三兩

蔓荊子兩葳靈仙兩荆芥穗兩甘草兩木賊兩沙苑蒺藜兩

苦參兩紫參兩沙參兩木賊兩沙苑蒺藜兩

不灰木兩川芎兩甘草兩沙苑蒺藜兩

天門冬兩赤芍兩何首烏兩石菖蒲九節

胡麻炒草烏頭兩蒼木米泔木鱉子去殼

定風草各三兩右同為細末。每服五錢。食後酒調服。

通天再造散 治大痲風初起。

鬱金一錢大黃一兩白牽牛六錢五分五分皂角刺一兩黑大一兩半生半炒

右為末。每服五錢。日初出面東以無灰酒調下。

祛癘神效九

丹臺玉案 二卷 五七

天門冬 赤芍 何首烏 石菖蒲 九節 胡麻 炒 草烏頭 蒼木 米泔 木鱉子 去殼 定風草 各三兩

右同為細末。每服五錢。食後酒調服。

通天再造散 治大痲風初起。

鬱金 一錢 大黃 一兩 白牽牛 六錢 五分 皂角刺 一兩 黑大 一兩 半生 半炒

右為末。每服五錢。日初出面東以無灰酒調下。

祛癘神效九

丟子肉 十五觔

防風 二觔半 去蘆

白蒺藜 二觔半

荊芥 二觔半 銀柴胡 六兩

胡黃連 六兩 草胡麻 二觔半

當歸 二觔半 酒浸

蕪荑 二觔半 木鱉子 十五兩 去殼

薄荷 一觔

諸品藥味切要精製為末以酒為丸每服五錢日服三次輕者五六升重者一斗即愈

若脾經受病加白朮五兩 肺經受病加黃芩五兩

胃經受病加厚朴五兩 肝經受病加連翹五兩

心經受病加山梔仁胡黃連各八兩 腎經受病

丹臺玉案 二卷

五八

加破故布五兩 五臟受病加蒼朮四兩甘草二

兩 六腑受病加葳靈仙四兩續斷四兩何首烏

八兩 春則氣暖融和加連翹一觔 夏則大旺

煩燥加胡黃連八兩薄荷八兩 秋則乍寒乍暖

多生霧露加蒼朮八兩白朮八兩 冬則嚴寒水

凍加烏藥一觔 面生浮腫加白芷五兩續斷八

兩 遍身浮腫加蒼朮八兩 脚底腫加牛膝八

兩 手蹠攣加葳靈仙八兩 骨節疼痛加虎骨

一觔 凡遇是病依前法加減其驗如神

消腫瀉毒湯 治面腫痛十日可瀉一次。

苦參 三錢 白蒺藜 草胡麻 連翹

大黃 芒硝 各二錢 防風 瓜子肉

羌活 各五分 獨活 各五分 牛膝 三錢 白芷

蒼朮 木瓜 各一錢

水二鍾煎八分空心服瀉三次以溫粥補之午後

再服瘡藥。

搽藥方 治遍身發斑。

川椒 一兩五錢炒黑 枯礬 一兩五錢 水銀 三錢

丹臺玉案 二卷 堯

松香 一兩 蛇床子 一兩五錢 大楓子肉 一兩

苦參 一兩五錢 硫黃 一兩 防風 三錢

右爲細末菜油調搽

水熊散 治脚底心爛。

辰砂 一兩 冰片 二錢 熊膽 二錢

右爲細末鷄子白調搽每日洗三次搽三次百日

全愈。

癩門 附症

癩者逆也陰陽氣不相接則厥手足逆冷是也其症

不一散之方書者甚多。今姑撮大槩。有陽厥煩渴。妄身熱。而其脉洪數也。有陰厥身冷。脉沉足踈臥。唇口青。或自利不渴。小便色白也。然陽厥伏熱深而振慄。及見身冷。脉微欲絕而歿者。陽極似陰。服熱藥卽歿。陰厥虛寒甚而發燥。欲坐于泥水之中。此陰極似陽。服寒藥卽歿。不可不辨。外此又有暑厥。中暑耗氣發厥。脉虛自汗。有氣厥。因暴怒而得。卽氣中也。與中風相似。風中身熱。氣中身冷。有痰厥。其脉洪滑。或咽中如拽鋸聲。有虵厥。胃中冷。吐出長蟲者。是有氣虛。

丹臺玉案

二卷

六

厥。脉細者是。有血虛厥。脉大如蔥管者是。有驚厥。因勞後後飲水被驚而發者是。有尸厥。凡吊歿問疾。或入廟登塚。卒中外邪與臟氣相忤。氣遏不行。忽手足冷。頭面青黑。牙關緊急。昏暈卒倒。或錯言妄語。決不可作風治。

脉云

厥逆之脉。多於沉伏者。但沉遲散爲之寒。沉伏而數爲之熱。浮而無力者是氣虛。洪滑有力屬頑痰。沉滑

身冷者難治。

立方

蘇合丸 凡厥瘧先以薑汁調服灌醒然後議脉辨

瘧用藥

白木 土炒 青木香 朱砂 研水 犀角

沉香 麝香 訶梨勒皮 煨取

安息香 酒熬 丁香 白檀香

葷撥 香附 以上各二兩 龍腦 五錢

薰陸香 酥合油 各一兩

右為細末研勻和安息香膏加煉蜜丸如龍眼椀

丹臺玉案

二卷

主

大每服一九

大承氣湯 治陽厥與陽極似陰 方見傷寒門

四君子湯 治氣虛厥

白木 土炒 白茯苓 去皮各一錢 人參 二錢

甘草 五分

水二鍾加黑棗二枚熱服

四物湯 治血虛厥

當歸 白芍 川芎 懷生地 各二錢

水二鍾加龍眼肉七枚不拘時服

加味理中湯 治虺厥。

大附子 童便製 一錢

乾薑 炒黑 甘草

檳榔

白朮 土炒 各入 八分

肉桂

川椒 各六分

水二鍾。烏梅三箇煎服。

逐痰湯 治寒痰發厥。

廣橘紅 二錢 半夏

甘草 各一錢 二分

大附子 川貝母 各一錢

水二鍾。加竹瀝薑汁煎服。

四逆湯 治陰厥。與陰極似陽。方見傷寒門。

丹臺玉案

二卷

空

祛暑湯 治暑厥。氣升不省人事。

香薷 厚朴 薑汁 炒 白扁豆 各一錢 炒

沉香 二錢 川黃連 酒 炒 陳皮 桔梗 各一錢 二分

水二鍾。加燈心三十莖。煎七分服。

烏藥順氣散 治氣逆厥。方見中風門。

鎮邪飲 治尸厥如神。先以酥合丸。灌醒再服此方。

紫朴 膽星 蒼朮 廣木香

橘紅 各一錢 甘草 辰砂 各三分

水二鍾。加薑汁半盞。酒一盞。同煎服。

活人云。太陽中風。因作剛柔二瘧。大抵瘧之爲病。因風濕二氣襲于太陽之經。亦有輕重之分。其風勝氣者爲剛瘧。風性剛急故也。濕氣勝者爲柔瘧。濕性柔和故也。外有諸虛之候。表虛不能任風寒。亦能成瘧。是以或產後。或金瘡。或跌仆撲傷。癰疽潰膿之後。一切去血過多之証。皆能成此疾也。是乃虛爲本。而風爲標耳。亦有絕無風邪。而亦能使人筋脉攣急。而爲角弓反張之候者。血脫無以養筋故也。丹溪云。此瘧甚不可作風治。而用風藥。恐反燥其餘血。而致不可救也。宜補藥兼降痰火。如參耆芎歸竹瀝之類。然而剛柔之瘧。不可不辨也。如太陽發熱無汗惡寒。脉弦長。頭急胸滿。口噤手足攣急咬牙。甚則搐搦筋頭強直。角弓反張。此爲剛瘧。太陽微熱多汗。不惡寒。脉遲澹弦紉。四肢不收。時之搐搦。開目含口。此爲柔瘧也。

脉云

太陽病發其脉沉而細者爲瘧

立方



葛根湯 治剛症。

乾葛

四錢

麻黃

三錢

桂枝

甘草

羌活

各二錢

薑三片棗二枚煎服。

桂附湯 治柔症。

官桂

大附子

防風

黃芩

川芎

防已

甘草

玄參

各一錢

生薑三片煎熟熱服。

八味順氣散

治七情症。

丹臺玉案

二卷

卒四

陳皮

青皮

炒

白茯苓

去皮

烏藥

各一錢五分

人參

白朮

土炒

白芷

各一錢

甘草

三分

水二鍾加黑棗二枚煎熟熱服。

益元湯 治去血過多症。

當歸

生地

人參

黃耆

各二錢

川芎

白朮

丹皮

各一錢五分

水二鍾棗二枚煎服。

祛風逐痰湯

治痰症挾風

半夏

枳實

炒

橘紅

各一錢五分

桔梗炒

膽南星

明天麻濕紙包煨

防風

薄荷各一錢

全蝎七枚洗淨

水二鍾加竹瀝半酒椀薑汁十茶匙

抑火湯 治火症

川黃連酒炒

當歸酒洗

白芍酒炒

黃芩酒炒

黃栢炒各一錢五分

玄明粉各一錢

知母鹽水炒

枳殼麩炒

甘草

水二鍾加燈心三十莖童便半酒椀

麻木門 附脫陽

人皆以麻木為一病而不知麻與木固自有不同也

所謂麻者非癢非痛肌肉之內如千萬小蟲亂行雜沸按之不止搔之愈甚者是也所謂木者非癢非痛自已之肌肉如他人之肌肉按之不知搔之不覺者是也麻如木之亂故名曰麻木如木之厚故各曰木麻猶知痛癢而木則全無覺矣然求其病之所屬將何以斷之蓋麻有久暫木有久暫暫時之麻者或因坐臥不得其所四體相壓阻節榮衛血行既遲而氣亦未至故也然麻或太甚亦有似于木焉暫時之木

者亦因坐臥不得其所。四體重壓。又着寒氣。一時不曾護持。而榮衛不相聯屬。血已不行。而氣久不至。故也。然木或還醒。亦有似于麻焉。此其暫時之麻木。雖因氣血不足。而有未足爲病。惟久麻久木者。斯爲病耳。蓋經年累月。無一日而不麻者。麻之久者也。麻之久者。非坐臥不穩所致。必其內氣虛甚。風痰轉爲患。不能作麻。以其挾于風邪。痰爲風之所噓。如風吹波浪。自騰沸而去。肌肉之中。已爲風痰所據。陰陽二氣失其運行之柄。安得而不麻乎。經年累月。無一日而

不木者。木之久者也。亦非坐臥不穩所致。乃是瘀血凝滯于內外。挾風寒。又因陽氣虛敗。不能運動。而肉已死。若與我不相干。此其所以木也。人之一身。皆氣血所養。氣血行遲。卽能成病。况其不行乎。此久麻久木。所以可畏也。然麻木之處。小猶可治之。若半體一肢。甚難救療。醫者知此。則人之死生。病之輕重。了然于胸中。而用藥之妙。尤在善處。其可以執法乎。使暫麻暫木。而用重劑。則損其真元。久麻久木。而用輕劑。則不能取效。審而治之可也。

脉云

脉浮而濡屬氣血虛。脉浮而緩屬濕。脉浮而緊屬寒。脉澇而芤屬歛血。脉緊而滑屬濕痰。

立方

人參調元湯 治一身麻木四肢倦怠

人參

沙參

黃耆

甘草

五分

肉蓯蓉

白芍

川芎

北五味

七粒

水煎温服

舒氣活絡丸

治男婦七情所感氣血不行手足頑

丹臺王案

二卷

六七

麻

當歸

酒洗

白芍

酒炒

沉香

忌見火

香附

醋製各二兩

桂枝

八錢

川芎

牛膝

烏藥

蒼朮

炒

薏苡仁

炒

生地

忌鐵器

柴胡

丹皮

炒

桑寄生

各二兩

甘草

防已

茯神

各一兩

大附子

一箇童便

黃連製

右爲末老薑四兩搗汁加水法爲丸每服空心服

三錢白滾湯下

大法麻木之屬雖有風痰歛血之分然治療之藥皆

當以執藥爲引導。如生薑、附子、官桂、川烏之類。以引經藥引至各經。如手臂用桑條、股足用牛膝、葳靈仙之類。以行氣藥通其氣。如烏藥、木香、枳殼、青皮之類。以通竅藥開其經絡。如木通、穿山甲、牙皂之類。有痰則去痰。有風則去風。有血則行血。此其總綱也。

久麻者皆氣虛爲風痰所轉也。然係氣虛亦不暇補其氣。先補其氣則風無能而自散。痰無能而自去矣。宜以生薑爲引導。枳殼以開氣。半夏、南星以逐痰。防風、羌活、荆芥以散風。牙皂、木通以通經絡。手臂用桑條。股足用牛膝。以引經。待其病減。然後用參、耆、白朮、茯苓、甘草之類可也。

久木者皆陽氣不運。成血滯凝。外挾風寒所致也。宜以附子、官桂之類。以爲引導。木香之類。以開其氣。川山甲、木通、牙皂之類。以通經絡。當歸、桃仁、蓬朮、紅花、阿魏之類。以消其血。因其病之所在。以引經藥引之。加桑條、牛膝之類。待其病減。以入物湯補其血可也。背主麻木。以羌活爲引經。臂前麻木。以桔梗爲引經。風用風藥。痰用痰藥。皆以開氣爲主。而此三處惟以

生薑爲引導。而附子之類不必用也。

遍身肌膚大麻癢。淫淫然如蟲行者。風也。宜以殭蠶爲君。羌活防風爲佐。烏藥以勻氣。木通以開經。生薑爲引導。蓋木通能行十二經絡。烏藥能勻一身之氣。生薑能開一身之轉理。羌活防風能去一身之風。而殭蠶一味專治如蟲行者之聖藥也。至於加減輕重之間。則存乎其人耳。而豈吾之所能備述者乎。

### 附脫陽

天吐大瀉。或房慾過度。大耗真元。陽氣既去。陰血不丹臺玉案 二卷 五九

能固守。亦隨而脫去也。如丈夫交媾過度。脫在婦人身上。須婦人緊緊抱住。用氣嚙入口內。少頃自省。若就放開必效。

### 回陽湯

大附子 三錢  
人參 二錢  
白朮 各一錢  
乾薑 各一錢

廣木香 一錢  
五分

### 水煎熱服

### 蒸臍法

蔥葉一大把。以線紮緊。兩面切平。半寸厚。內用麝

香三分。摻入蔥內。外加艾圓灸之。以蒸熱氣入臍。  
神妙。

熨氣海穴

在臍下

食鹽一觔炒熱。先熨氣海。再服回陽湯。

中暑門

附注夏

暑者夏月炎蒸之氣也。丙丁當權。祝融用事。炎威酷烈。鑠石流金。柔脆之軀。不堪燔炙。而中暑之病。有不免矣。病之初起。身熱自汗。口渴面垢而已。其餘雜症。皆後傳變。然昔人有中暑中暑之分。豈暑之外別有

丹臺玉案

二卷

七十一

所謂熱耶。蓋暑與熱本無所異。而人感之則有異耳。富貴之人。避暑於涼亭水閣之中。脩竹遶欄。而成蔭。清泉漱玉。而生寒。偃篔以取涼。揮羽扇以祛熱。浮瓜沉李。以消渴。鮮菱脆藕。以解煩。自謂可以無暑矣。不知富貴必生驕奢。驕奢必生淫慾。元氣日消。肌裏必疎。坐談之頃。卒然爲暑風所傷。邪氣直入。霎時昏聩。迷不知人。此所謂靜而得之爲中暑是也。貧窮勞苦之人。竭力於畝畝。而汗血成漿。驅馳於道途。而咽埃似炙。赤日方爲魁。而清風不來。熱地已成爐。而寒泉

難覓精神疲而欲絕筋力困而不知卒然傾仆不省人事此所謂動而得之爲中熱是也然暑初入自口鼻牙頰達於心胞絡以火從火故古法當暑取冷水灌溉勿嚥入肝則眩暈頑麻入脾則昏睡不覺入肺則喘咳痿躄入腎則消渴中暑歸心神昏卒倒此症之重者緩則爲傷淺急則爲胃深又爲伏暑又何以辨之蓋傷暑在肉分周身煩燥或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌表也冒暑或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也伏暑卽冒暑久而藏伏三焦腸胃之間熱傷氣而不傷形旬月莫覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿癩痢煩渴腹痛下血等症但暑氣病多不身痛間有痛者或爲熱浴水濕相搏耳又有暑風厥手足搐搦爲風手足逆冷爲厥治此病者當視其所處貧富所爲勞逸所稟虛實所感輕重而斟酌用藥斯得之矣

脉云

經曰脉虛身熱得之傷暑舉要曰熱傷於氣所以脉虛弦洪芤遲體狀無餘



立方

祛暑神祕丹

治夏月中暑率倒不省人事。一九立

愈。

青蒿

淨末 一觔

白梅

烏梅

生薑

各四兩

生薑皮

一兩

沙糖

十兩

右為末。共搗為丸。如龍眼肉大。每服一九井水調

下。

解急方法

中熱在路昏迷不知人事。湯藥不便。恐

氣脫難治。急扶陰涼處。不可臥濕冷地。搦道上熱

丹臺玉案

二卷

三

上於臍上撥開作竅。令人尿於其中。急求生薑。或

蒜嚼爛。以熱湯或童便灌下。外用布蘸熱湯慰氣

海立醒。醒後切勿飲冷水。飲之即成。

香薷飲。治臟腑冷熱不調。飲食不節。元氣久虧。好

食生冷。或臥濕地。當風取涼。中暑等症。

香薷

五錢

厚朴

二錢 薑汁炒

白扁豆

一錢 五分炒

右為一劑。水煎候冷。不拘時服。中暑復傷風。搗

搗不省人事。加黃連。羌活。伏暑頭痛。小便澀濁。

加茵陳。車前子。霍亂吐利。加藿香。木瓜。生薑。

臟腑積熱便血。加枳殼黃連赤芍烏梅。小便有血。加藿麥小蘗車前子。壯熱大渴。或五心煩熱。加麥門冬淡竹葉茅根燈草。腳氣作痛。行步艱難。加木瓜羌活陳皮蒼朮枳殼半夏。中風加防風羌活手足搖擗。加羌活白芷。挾痰加南星半夏。腹痛小便赤。加枳殼木通甘草。單只腹痛。加黃連枳殼赤芍莪朮。

清暑益氣湯

治夏月暑熱蒸人。不思飲食。四肢乏力。神思困倦。小便赤澀。大便作瀉。時時作渴。胃膈

丹臺玉案

二卷

七

飽悶。

人參

白朮

土炒

黃耆

各一錢 蜜炙

北五味

二十粒

當歸

麥門冬 去心

甘草

乾葛

青皮

炒

神麴

炒

澤瀉

各一錢 二分

黃栢

酒炒

陳皮

蒼朮

升麻

各八分

水二鍾。煎七分。溫服。

生脉散。夏月以此代茶。能生津液。益氣和中。

人參 一錢

麥門冬 二錢 去心

北五味 二十粒

水煎當茶飲之。

清暑十全湯 治傷暑頭目昏重潮熱煩悶多渴嘔

吐身體倦怠并一切伏暑暑瘧神効。

香薷 木瓜 蘇葉 厚朴 各一錢二分

人參 甘草 白茯苓 白木

白扁豆 半夏 白芍 各一錢

水二鍾煎七分不拘時服。

清暑六和湯 治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔

吐泄瀉寒熱往來痰喘咳嗽肢體浮腫嗜臥昏倦

丹臺玉案

二卷

古

小便赤色并冒暑中酒。

人參 杏仁 去皮 厚朴 薑汁炒 白茯苓 去皮各一錢

香薷 白扁豆 炒 砂仁 炒 半夏 薑礬製

藿香 各一錢五分 甘草 木瓜 各八分

加薑三片棗二枚煎七分熱服。

桂苓甘露飲 治伏暑飲水過多肚腹膨脹霍亂吐

瀉。

澤瀉 猪苓 各一錢二分 寒水石 二錢

桂枝 八分 蒼朮 滑石 甘草 各一錢

水煎溫服。

消毒飲。治暑毒入內心中煩燥。睡臥不寧精神恍惚。

惚。

香薷 川黃連 遠志肉 各二錢

石膏 麥門冬 各一錢二分 北五味 二十粒

生甘草 茯神 各八分

水二鍾。加燈心三十莖煎服。

辰砂益元散。治中暑身熱小便不利。睡不安穩。此

藥清心火除胃脘熱。

丹臺玉案 二卷 壹

滑石 六兩 飛淨 甘草 一兩 去皮

辰砂 一兩 研極細

右共為細末。每二錢。燈心湯調下。

冷香飲子。治虛人中暑煩渴身倦燥甚。服涼藥不

効者。

大附子 二錢 橘紅 一錢五分 甘草 草果 各一錢

水三鍾。加薑五片煎八分。熱服。

辰砂五苓散。治中暑煩渴身熱頭疼霍亂吐瀉。小

便短少。心神恍惚。

白茯苓 去澤瀉 去毛 猪苓 各二錢 白朮 一錢 二分 炒

官桂 一錢 辰砂 八分

極細

水二鍾。加燈心三十莖。煎服。

附注夏

每遇春末夏初。便覺頭疼脚酸。神思困倦。飲食減少。

四肢消瘦。軟弱乏力。

補中固元湯。治注夏一切等症。

人參 黃耆 白朮 甘草 各一錢

生地 二錢 當歸 陳皮 各八分

棗二枚。煎八分。臨臥服。

丹臺玉案

二卷

共

又方。治汗不時出。發熱惡寒。四肢無力作渴。

石膏 二錢 煨熟 知母 鹽水炒 人參 甘草

陳皮 玄參 各一錢 五分

加浮小麥八分。煎服。

中濕門 附痿症

濕者。天地鬱蒸之氣也。方其升騰於上。氣猶籠結而未開。雖寒天值之。亦覺其溫煖。此濕氣之熱者也。及其布護於下。氣將流演而舒散。雖暑月值之。亦覺其清涼。此濕氣之寒者也。濕氣之熱者。多申於氣虛之

人則發而爲濕熱之症。頭面如裹。而四肢浮腫。身體沉重。而轉側不便者是也。濕氣之寒者多。中於血虛之人。則發而爲寒濕之症。四肢酸疼。而關節不利。筋脉拘攣。而行履重滯者是也。其有不因鬱蒸之氣而得者。必其冒雨而行。涉水而走。或露臥以取涼。或汗衣而不解。漸漬於肌肉之中。滲入於骨髓之內。流溢於脾胃之間。牢纏於腰腎之處。則肌內冷。而骨髓痛。脾胃薄。而腰腎疼。挾於風痰。則麻而不仁。兼乎瘀血。則木而不覺。動乎火邪。則腫痛而難忍。隨其所感。而病斯痼焉。其有不因冒雨涉水等而得者。必其內傷。生於酒麪之類。多肚腹腫脹。醫者審其濕之。或寒或熱。或虛或壯。病之在上。在下。感之在外。在內。因其病而藥之。庶乎其得之矣。

脈云

中濕之脉。沉緩微細。兼風者浮。兼寒者澁。兼熱者滑。數兼痛者洪。而浮緩。濕在表。浮而緩。濕在裏。沉而微。

立方

溼湯 治濕傷脾胃。下部虛腫。大便泄瀉。小便不

利

丁香

蒼朮

白朮

薑黃

茯苓

甘草

陳皮

各等分

棗二枚。薑三片。煎八分服。

清燥湯

治六七月之間濕令大行。子能令母實。致

寒涼以救之。燥金受濕熱之邪。絕寒水生化之源。

源絕則腎虧。腰下痿軟。癱瘓不能舉動。行步不正。

此方主之。

茯苓

去皮

蒼朮

未泮浸炒

澤瀉

猪苓

丹臺玉案

二卷

七六

人參

各一錢

神麴

炒

當歸

黃耆

蜜炙

橘紅

各八分

升麻

黃柏

酒炒

柴胡

白朮

土炒

甘草

生地

麥門冬

各七分去心

北五味

九粒

棗二枚。煎八分服。

腎著湯

治腎傷濕。身重腰冷。如坐水中。不渴小便

自利。

雲朮

茯苓

各二錢

乾薑

一錢五分

甘草

五分

棗二枚。煎七分熱服。

防已黃耆湯 治風濕相搏。客在皮膚。四肢少力。

防已 二錢五分 白朮 各二錢 黃耆 各二錢 甘草 八分

薑三片。棗二枚。煎七分服。一

獨活寄生湯 治腎氣虛弱。坐臥濕地。或當風取涼。

風邪流入脚膝。為偏枯冷痺。緩弱疼痛。行步艱難。

并治白虎歷節風。

白芍 酒炒 獨活 當歸 各一兩 桑寄生 二兩

熟地 酒煮 人參 川芎 茯苓 去皮

杜仲 鹽水炒 秦艽 各五錢 防風 牛膝

丹臺玉案 二卷 五九

細辛 桂心 各四錢 甘草 一錢

右剉一劑。加生薑煎熟。作數次服。

栝木四製丸 滋陰抑火。開胃進食。能除周身之濕。

川黃栝 去皮四觔 酥炙一觔 人乳浸一觔

茅山蒼朮 括去皮二觔 川椒炒八兩 破故紙炒八兩 五味子炒八兩 當歸

棟去同炒之藥。只用蒼朮。黃栝為末。煉蜜為丸。如

梧子大。每服五十九。空心酒下。

生附湯 治濕濡下部。兩足無力。步履艱難。腰膝疼

生附湯 治濕濡下部。兩足無力。步履艱難。腰膝疼



痛等症。

大附子 蒼木

香附

白木

各一錢

甘草 三分

乾薑 五分

杜仲

牛膝

茯苓

厚朴

各八分

薑三片。棗二枚。煎八分服。

當歸拈痛散

治濕熱為病。肢節煩疼。肩背沉重。流

注足脛。痛不可忍者。口乾壯熱。兩足濕毒瘡痛癢。

當歸

防風

黃耆

各一錢

甘草

五分

黃栢

玄參

人參

茯苓

丹臺玉案

二卷

分

白朮

蒼朮

各八分

乾葛

升麻

知母

茵陳

羌活

各六分

水二鍾。煎八分服。

清熱瀉濕湯

治濕攻注。四肢周身發腫。面色痿黃。

小便不利。

茯苓

黃連

車前子

各一錢

木通

猪苓

滑石

蒼朮

各一錢

石葦

山藥

黃栢

各八分

燈心三十莖。煎八分。空心服。

附痿症

四肢軟弱。身體重滯。經年不能起床。而飲食如故。不痛不酸。有似乎濕。而實非濕。乃肺經受熱。其葉焦垂。不能統攝一身之氣。故成痿疾。

脉云

舉要曰。尺脉虛弱。緩澹而緊。洪大者不治。

立方

閩肺扶氣湯

治痿症肺枯氣弱。

茯苓

人參

白朮

甘草

丹臺玉案

二卷

全

麥門冬

黃芩

桔梗

百合

薏苡仁

各入一分

北五味

九粒

當歸

生地

各一錢二分

水煎加藕汁半鍾。食後服。

又方

治火灸肺枯不能統攝。

山梔仁

炒黑

瓜蒌仁

去油

當歸

酒洗

生地

百部

各一錢五分

紫河車

二錢

天門冬

去心

陳皮

桔梗

蜜炒

人參

沙參

各一錢

棗二枚。燈心三十莖。食後服。

丹臺玉案二卷終

