

卯5

9

增補單方大全

廣註古文觀止

全書十二冊 價洋一元二角

廣註秋水軒尺牘

全書二冊 價洋六角

廣註小倉山房尺牘

全書四冊 價洋一元

本局為發揮國學裨益青年起見特聘名流寬以時日將家弦戶誦之古文尺牘精心校訂詳加註釋去秋迄今先成三種曰秋水軒曰小倉山房曰古文觀止三書價值久有定評但舊註簡略非博致羣籍不能盡通其訓非詢問師友不易識其妙處且舊版往往漫爛而新印者又皆齒齲滅裂錯謬多本局有鑒於斯特將三書增加註釋凡奇字僻典為舊註所未詳者無不窮搜博探攷其出處釋其意義定其音訓閱者不必參攷他書而能盡通其訓不必問諸師友而能盡識其妙古文尺牘善本無以逾是誠效授與自修者不可不備之書也

三版 游戲大觀

全書六冊 價洋二元

▲內容共二千四百餘種 ▲插圖共六百四十八幅

游戲愈盛消耗愈多當此生計艱難之時欲求節省金錢而能快樂身心者莫如自尋消遣之法本局有鑒於此故特搜集吾國向有種種游戲之事為人人所愛者編成此書內容如文字游戲笑話游戲益智游戲體育游戲曲調游戲音樂游戲幻術游戲象物游戲宴會游戲等共二千四百餘種書中插圖共六百四十八幅文字秀潔莊諧並錄文人閨之可以佐詩酒之興會婦女閱之可以作閨房之伴侶老年人閱之可以康健其身體少年人閱之可以舒暢其胸襟疾病時閱之可以消一切之煩惱旅行時閱之可以解百端之寂寞種種裨益難以備舉豈僅節省金錢而已哉

鷄冠痔

痔瘡腫痛

痔瘡作痒 (三方)

痔瘡出血 (三方)

●五 瘡毒單方

眉瘡

腺瘡 (五十二方)

對口瘡 (四方)

髮毛瘡

猫眼瘡 (三方)

纏蛇瘡 (四方)

魚脊瘡

魚臍瘡

蜂窩瘡

蜘蛛瘡

瓜藤瘡

天泡瘡 (二方)

黃水瘡 (三方)

人面瘡 (二方)

寒毛瘡

翻花瘡 (七方)

天蛇頭瘡 (三方)

●六 瘦癩單方

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

瘦

鼠瘻 (三方)

蛇瘻

蠅螂瘻

蝦蟆瘻

髮瘻

肉瘻

血瘻

粉瘤 (三方)

漏瘤

腋下瘦瘤

疣瘤 (二方)

瘰癧 (八方)

枯瘤法

消瘤法 (二方)

擊瘤法

瘰癧疔贅 (二方)

瘦氣 (十二方)

石癬 (二方)

軟癬 (六方)

瘡癩癬 (二方)

第三編 婦科門

●一 經脈諸證單

經行不定 (三方)

經來色紫

經來色淡

經來色黃

經來嘔吐

行經腹痛 (二方)

經後腹痛

月經不通 (九方)

室女經閉 (三方)

月經不調 (五方)

月經久閉 (四方)

月經逆行 (三方)

經水不止 (十六方)

痛經不孕

老年經行不止

撞紅

乾血氣痛

●二 崩漏諸證單方

崩漏諸證單方

婦人血崩 (三十三方)

老年血崩

崩漏五色

婦人血漏

赤白帶下 (十二方)

赤帶

婦女白帶 (十三方)

室女白帶

五色帶下

帶下有膿

婦人白淫 (二方)

婦人白沃

婦人白濁

●四 諸乳疾單方

婦人乳巖 (十二方)

婦人乳癰 (二十三方)

乳毒

乳癖 (五方)

乳瘡 (二方)

婦人乳癰 (三方)

婦人乳吹 (十四方)

乳頭破裂 (七方)

妬乳 (三方)

乳汁不下 (九方)

乳汁患少 (四方)

婦人無乳 (七方)

乳汁患多

婦人回乳

二

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

四

四

四

四

四

四

五

五

五

五

五

五

五

⑤ 婦人邪病單方

夢與鬼交(四方)

⑥ 前陰諸證單方

婦女陰吹

婦人陰脫(六方)

婦人陰挺(九方)

婦人陰痛(二方)

房後陰痛

小戶嫁痛(二方)

婦人陰癢(四方)

婦人陰腫(六方)

婦人陰瘡(七方)

婦人陰蝕(三方)

婦人陰蟲(四方)

婦人陰爛(二方)

婦人陰冷(四方)

婦人陰寬

婦人陰傷出血(五方)

女童陰傷出血(二方)

婦人陰出肉線

婦人陰癩

婦人交腸(二方)

女子初生無陰(二方)

五

第四編 產科門

① 胎前諸證單方

孕婦安胎(八方)

安胎清熱

孕婦鼻血(三方)

孕婦吞酸

孕婦惡阻(三方)

孕婦口渴

孕婦吐衄

胎上衝心(四方)

孕婦心痛(六方)

孕婦腹痛(八方)

孕婦腰痛(四方)

孕婦病熱

孕婦病寒

孕婦瘧疾(二方)

孕婦痢疾(二方)

孕婦血痢

孕婦霍亂(二方)

孕婦咳嗽

孕婦穢燥

孕婦子嗽

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

第八編 急救門

血淋(方)

救繼死(六方)

救溺死(六方)

救凍死(三方)

救跌死

救驚死

救打死

救自刎

救觸電(三方)

救吞金(六方)

救吞鴉片(三方)

救吞火藥(三方)

救瘵厥

救氣厥

救暴厥(二方)

救魔(三方)

中惡睡死

睡中行走

砒霜毒(十方)

強水毒

水銀毒

鉛粉毒(三方)

輕粉毒
硫黃毒
鹽漬毒(二方)

煤氣毒

蒙汗藥酒

烏頭毒

巴豆毒(二方)

木小毒

木耳毒

木斃毒

杏仁毒

野菌毒(三方)

蟹毒(二方)

甲魚毒

河豚毒(四方)

蜘蛛毒

蚯蚓毒(三方)

蜈蚣毒(四方)

誤吞鐵針(二方)

誤吞銅錢(三方)

誤吞金箔

誤吞桐油

誤吞玻璃

誤吞昇汞

誤吞竹木(二方)

誤吞稻芒

誤吞鐵屑

誤吞鐵釘

誤吞耳垢

誤吞螞蝗(三方)

酒醉傷

香烟醉傷

鴉片醉傷

水烟醉傷

湯火傷(六方)

人咬傷(二方)

虎咬傷

瘋狗咬傷(四方)

馬咬傷

貓咬傷

鼠咬傷

黃蜂咬傷

黃梢蛇咬

灰朴蛇咬

蟾蜍咬傷

壁虎咬傷

蜈蚣咬傷(二方)
蠍咬傷
蚊咬傷
蠶咬傷

第九編 耳鼻喉科門

◎一 耳科單方

耳聾(六方)

耳暴聾(五方)

腎虛耳聾(三方)

老人耳聾

病後耳聾

耳閉不通

耳鳴(二方)

耳中盯腫

耳痒

耳痛(三方)

耳忽作痛(二方)

耳卒腫痛(二方)

耳定(二方)

耳中有核

聾耳(十一方)

聾耳有蟲

三版
增補

單方大全

第一編 內科門

廣文書局編集

●一 頭病單方

【頭風】頭風頭痛大豆三升。炒熟。至煙
出。入瓶。以酒五升沃之。密封七日。溫
服。(千金方)

②光明硫黃硝石各一兩。細研。水丸。芫
子大。空心嚼一丸。茶下。(普濟方)

③川芎洗切。曬乾為末。煉蜜丸如小彈
子大。不拘時。嚼一丸。茶清下。化痰效。
(經驗方)

④香白芷切。蘿蔔汁浸透。曬乾為末。每
服二錢。白湯下。或以噀鼻。(直指方)

⑤服荆瀝不限多少。以瘥為度。外以甘
菊花裝枕枕之良。

⑥葶藶子為末。以湯淋汁。沐頭三四度。
即愈。(肘後方)

⑦法明子炒研。茶調敷兩太陽穴。乾則

易之。一夜即愈。頭風熱痛者良。(醫
方摘元)

⑧風氣頭痛不可忍者。乳香。蓖麻仁等
分搗餅。隨左右貼太陽穴。解髮出氣
甚驗。(丹溪纂要)

⑨蓖麻油紙剪花。貼太陽。亦效。(丹溪
纂要)

⑩諸風頭痛。藜蘆一莖研末。入麝香少
許。吹鼻。(袖珍方)

⑪蒴藋根二升。以酒二升煮。服。汗出止。
(千金方)

⑫藜蘆半兩。黃連三分。噀鼻。即愈。(聖
會方)

⑬附子一枚。生去皮臍。豉豆一合。同入
銚子內。煮豆熟為度。去附子。食豉豆。
立瘥。每枚可煮五次。後為末服之。

⑭草烏頭共生用一分。赤小豆三十五
粒。麝香一字。為末。每服半錢。薄荷湯
冷服。更隨左右噀鼻。(指南方)

⑮半夏末入百草霜少許。作紙攤燒煙。
就鼻內噀之。口中含水。有涎。吐去。再
合。八般頭風。二次見效。(衛生寶鑑)

⑯頭風熱痛。山豆根末。油調塗兩太陽
(聖濟總錄)

⑰八般頭風。黃魚鱗燒成性為末。臨臥
以蔥酒調服二錢。(衛生易簡方)

⑱苦丁香。川芎。藜蘆各等分。為細末。噀
水鼻內。噀之。頭風神方也。(儒門事親)

⑲頭風頭痛。百藥不效者。食茱萸葉。細
剉。灑酒拌勻。絹袋盛之。入甌中蒸熟。
乘熱分作兩包。更換枕頭。以效為度。
(千金方)

第一編 內科門

頭病單方

①白蔞三錢。薄荷五分。蔓荊子二錢。川芎五分。水煎服。羌活一錢。桑葉二錢。取綿被蓋頭。汗出即愈。

②頭痛初發時。用手按頭上。有一處按者更酸痛者。以硃筆記之。用斑登一個。去頭翅足。研末。按所記痛處。以小規殼或核桃殼蓋上。用布紮好。過夜起小泡。銀針刺出黃水。其痛若失。愈後永不復發。

③頭風畏冷。首裹重綿。三十年不愈者。以蒼麥粉二升。水調作二餅。更互合頭上。微汗即愈。

④八月後。取荊芥穗作枕。及鋪牀下。立春日去之。則愈。(千金方)

⑤頭風睛痛。香附子一兩。藿香葉。甘草各二錢。為末。每服二錢。沸湯入鹽調下。(聖惠方)

⑥頭痛連睛。牛蒡子。石膏等分為末。茶清調服。(醫方摘要)

⑦偏正頭風。防風。白芷等分為末。煉蜜

丸。彈子大。每嚼一丸。茶調下。不論偏正頭風均治。(普濟方)

⑧偏正頭風。痛不可忍者。延胡索七枚。青黛二錢。牙皂兩個。去皮子為末。水和丸如杏仁大。每以水化一丸。灌入病人鼻內。隨左右。口咬銅錢一枚。當有涎出而愈。(永類鈴方)

⑨香白芷炒。二兩。五錢。川芎炒。甘草炒。川烏頭半生。半熟。各一兩。為末。每服一錢。細茶薄荷湯調下。百藥不治者。服此一劑便愈。(談楚翁試效方)

⑩草烏。頭四兩。川芎四兩。蒼朮半斤。生薑四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶封固。埋土中。春五。夏三。秋五。冬七日。取出曬乾。揀去葱薑。為末。醋麵糊和丸。梧子大。每服九丸。臨臥。溫酒下。立效。(經驗方)

⑪生蘿蔔汁一規殼。仰臥。隨左右注鼻中。神效。(如宜方)

⑫不拘遠近。諸藥不效者。如神。用白芷

川芎各三錢。為細末。以黃牛腦子調二末入瓷器內。加酒燉熟。乘熱食之。盡量一醉。醒則其病如失。甚驗。(保壽堂方)

⑬偏正頭風。并夾頭風。連兩太陽穴痛者。用白蠟蠶為末。蔥茶調服一錢。(聖惠方)

⑭穀精草一兩。為末。以白麵糊調攤紙花上。貼痛處。乾即換。(集驗方)

⑮穀精草末。銅綠各一錢。硝石半分。隨左右嚙鼻。(聖濟方)

⑯香附子炒一斤。烏頭炒一兩。甘草二兩。為末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。葱茶嚙下。(本事方)

⑰萬年青根。削去。蘸砂塞鼻孔內。左痛塞右。右痛塞左。兩邊痛者齊塞。神效。取清水鼻涕。下一週時即愈。

⑱大香附子。杵去毛。水煮一時。搗曬焙乾。研為末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。水一盞。煎八分服。女人醋湯煎之。此

一品丸也。(奇效良方)

①大附子一枚炮去皮臍研末葱汁糊丸菘豆大每服十丸茶清下。(集簡方)

②白附子白芷猪牙皂角去皮等分

末食後茶清服仰卧少頃。(本事方)

③偏正頭風陰雨即發桂心末一兩酒調塗額上及頂上。(聖惠方)

④清明時將髮分開用麝香五分皂角末一錢薄紙裹置患處以布包炒鹽

於上熨之冷則易如此數次更不再發。(簡便單方)

⑤偏頭風礪砂末一分水潤鼓心一分搗丸皂子大綿包露出一頭隨左右納鼻中立效。(聖惠方)

⑥京芎細挫浸酒日飲之。(斗門方)

⑦華茛為末令患者口含溫水隨左右痛以左右鼻吸一字有效。(經驗良方)

⑧黃蠟三兩鎔化以紙瀾二寸長五寸在蠟上拖勻斬艾薄鋪於上捲為筒

左痛插右耳中右痛插左耳中火燃之烟氣透腦痛即止至重不過二次

(急救方)

⑨雄黃細辛等分為末左邊痛嗅入右鼻右邊痛嗅入左鼻立效。(斗門方)

⑩南星半夏白芷三味等分研末搗爛生薑葱頭為餅貼太陽上一夕良已

(筆記)

⑪蓖麻子同乳香食鹽搗貼一夜痛止治標妙法也

(筆記)

⑫大黃末三分黃芩末一錢二味和生白酒一碗燉熱調勻服之即愈。(廣筆記)

⑬取生蘿蔔一個搗爛絞汁冰片少許和勻灌入鼻孔左痛灌左右痛灌右

少頃即愈

⑭鬱金一個苦胡盧子一合為細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水內浸過滴向患側鼻中得黃水出即瘥

(奇效良方)

①川棟子加燒酒少許炒之入包袱內熨之左則熨左右則熨右不數次便已除根神效

②蕎麥麵和水煎餅於恰好時取起趁熱貼在患處外用布紮好大約二三日換一次即可漸愈

③雷頭風地膚子同生薑研爛衝酒熱服取汗即愈。(聖濟總錄)

④頭痛元精石末入羊膽中陰乾水調一字吹鼻中立止。(千金方)

⑤頭痛欲死者以硝石末吹鼻內即愈

(雷公炮炙論)

⑥遠志末不拘多少噓鼻中雖痛不可忍者亦止。(宣明方)

⑦當歸二兩酒一升煎取六合飲之日再服。(外臺秘要)

⑧高良薑生研頻噓鼻中即止普濟方

⑨斬艾揉為丸時時嗅之以黃水出為度。(青囊雜纂)

⑩頭痛連睛牛蒡子石膏等分為末茶

清調服。(醫方摘要)

①牛蒡葉搗取汁二升。無灰酒一升。鹽花一匙。頭慢火煎稠成膏。以摩痛處。風毒自散。摩時須極力令熱。乃效。冬月用根。(篋中方)

②法明子炒研。茶調敷兩太陽穴。乾則易之。一夜即愈。(醫方摘要)

③蓖麻仁半兩。棗肉十五枚。去核。搗塗紙上。捲筒。插入鼻中。下清涕即止。(德生堂方)

④用臘月烏頭一升。炒令黃。末之。絹袋盛。浸三斗酒中。逐日溫服。(聖惠方)

⑤附子炮石膏煨。等分為末。入腦麝少許。每服五分。茶酒任下。(聖惠方)

⑥川烏頭。天南星。等分為末。蔥汁調塗太陽穴。即年久頭痛亦止。(經驗方)

⑦川烏頭末。燒煙薰枕內。溫茶泡服。(集簡方)

⑧草烏頭炮去皮。共半兩。川烏頭生去皮。共一兩。藿香乳香三皂子大。為末。

每服二錢。薄荷薑湯下。食後服。(三因方)

⑨草烏頭。梔子等分為末。自然蔥汁。隨左右調塗太陽及額上。勿近眼。避風。(三因方)

⑩天南星一兩。荊芥葉一兩。為末。薑汁糊丸。梧子大。每食後。薑湯下二十九。(濟生方)

⑪天南星。茴香。等分。生研末。鹽醋煮麵糊丸。如上法服。(經效濟世方)

⑫頭風熱痛。山豆根末。油調塗兩太陽。政湯洗頭。避風取汗。瘥。

⑬用大蒜七個。去皮。先燒紅地。以蒜逐個。就地上磨成膏子。却以蠶蠶一兩。去頭足。安蒜上。梳覆一夜。勿令透氣。只取蠶研末。嚙入鼻內。口中含水。甚效。(普濟方)

⑭薑壹子一分。大黃三分。為末。嚙鼻。

⑮萊菔子生薑等分。搗取汁。入麝香少許。嚙入鼻中。立止。(普濟方)

⑯頭痛不止。楊梅為末。以少許嚙鼻。取嚏妙。(千金方)

⑰楊梅為末。每食後。薄荷茶服二錢。或以滑風散同煎服。或同搗末。以白梅肉和丸。彈子大。每食後。蔥茶嚙下一丸。(朱氏集驗方)

⑱吳茱萸煎濃湯。以新棉染。頻拭髮根。良。(千金翼方)

⑲片腦一錢。紙捲作撚。燒煙薰鼻。吐出痰涎。即愈。(壽域方)

⑳卒患頭痛。皂角末吹鼻。取嚏。斗門方

㉑白棘倒鈎四十九個。燒存性。丁香一個。麝香一皂子大。為末。隨左右嚙鼻。(聖惠方)

㉒蚱蟬二枚。生研。入乳香。硃砂細末。各半分。丸小豆大。每用一丸。隨左右納鼻中。出黃水為效。(聖濟總錄)

㉓白蠟蠶高良薑等分為末。每服一錢。臨卧時茶服。日二服。(聖惠方)

㉔卒然頭痛。白蠟蠶為末。用熱水調下。

二錢。立瘥。(斗門方)

⑤大蒜一個。去皮。研取自然汁。令病人仰臥垂頭。以銅筋點少許。滴入鼻中。急令嚙入腦。眼中淚出。瘥。(奇效良方)

⑥丁香一錢。白芷半兩。瓜蒂一兩。為細末。每用半字。吹入鼻中。即瘥。(儒門事親)

⑦患風頭痛。雖重綿厚帛。不能禦風寒者。用艾葉揉如綿。以帛夾住。包頭上。用熨斗熨艾。使熱氣入內。良久即愈。(千金方)

⑧蒼耳。川芎。當歸。等分為末。每服三錢。臨臥茶清調下。

⑨生烏頭去皮搗。以大醋和。塗放布上。薄痛處。須臾痛止。日夜五六薄。逐痛處薄之。此方治卒中惡風頭痛屢驗。(千金方)

⑩芥子為末。醋和。傅頭一周時。(千金方)

⑪蜀椒二升。以水煎取汁。沐髮良。(千金方)

⑫鹽半升為末。以麻油一升。合煎一宿。令消盡。塗頭。石鹽尤良。(千金方)

⑬生烏頭一錢。白芷四錢為末。茶服一字。仍以末嚙鼻效。(聖惠方)

⑭頭項強痛。用宣木瓜兩個。取蓋去瓤。沒藥二兩。乳香二錢半。二味入木瓜內。縛定。飯上蒸三四次。爛研成膏。每用三錢。又入生地黃汁半盞。無灰酒兩盞。暖化溫服。

⑮陽明頭痛。石膏川芎白芷等分為末。每服三錢。茶清調下。名石膏散。(本草)

⑯香白芷一味。洗曬為末。煉密丸彈子大。每嚼一丸。茶清。或荆芥湯化下。(百一選方)

⑰少陽頭痛。片黃芩曬乾為末。每服二錢。茶酒任下。(東垣十書)

⑱太陽頭痛。羌活防風紅豆等分為末。

嚙鼻。(玉機微義)

⑲風寒頭痛。當歸。木通各等分。酒浸三晝夜。重湯煮熟。乘熱飲之。去枕臥。立愈。(證治準繩)

⑳川芎。當歸。熟地。連翹。薄荷各二錢。放枕內。將滾湯沖下。鼻吸其氣。候溫即服。立愈。(證治準繩)

㉑大附子。或大川烏頭二枚。去皮蒸過。川芎。生薑各一兩。焙研。茶湯調服一錢。或剉片。每用五錢。水煎服。(聖惠方)

㉒大附子一個。生切四片。以薑汁一盞。浸炙。再浸再炙。汁盡乃止。高良薑等分為末。每服一錢。臘茶清調下。忌熱物少時。(三因必效方)

㉓風熱頭痛。川芎一錢。茶葉二錢。水一鍾。煎五分。食前熱服。(簡便方)

㉔荆芥穗。石膏。等分為末。每服二錢。茶調下。(永類鈐方)

㉕菊花。石膏。川芎各三錢。為末。每服一

錢半。茶調下。(簡便方)

④地龍炒研。薑汁半夏餅。赤茯苓等分。為末。一字至半錢。生薑荊芥湯下。(普濟方)

普濟方)

【風虛頭痛】杏仁去皮尖。曬乾研末。以水九升。研濾汁。煎如麻腐狀。取和糞粥食之。七日後。大汗出。諸風漸減。但須慎風冷。忌食豬雞魚蒜醋。(千金方)

【風毒頭痛】大附子一枚。炮去皮為末。以生薑一兩。大黑豆一合炒熟。用酒一盞。煎七分。調附末一錢溫服。(聖惠方)

②大川烏頭生去皮四兩。天南星炮一兩。為末。每服二錢。細茶三錢。薄荷七片。鹽梅一個。水一盞。煎七分。臨卧溫服。(聖惠方)

【氣虛頭痛】川芎為末。臘茶調服二錢。甚效。(集簡方)

②大附子一枚。剉心令空。入全蝎去毒

五枚在內。以餘附末同鍾乳粉二錢半。白麵少許。水和作劑。包附煨熟。去皮研末。葱涎和丸。梧子大。每椒鹽湯下五十九。(集簡方)

③用上春茶末調成膏。置瓦盞內覆轉。以巴豆四十粒。作二次燒煙熏之。曬乾乳細。每服一字。別入好茶末。食後煎服。立效。(醫方大成)

【氣攻頭痛】胡盧巴炒。三枝酒浸焙各半兩。乾薑炮二錢半。為末。每服二錢。薑湯或溫酒下。(濟生方)

【氣鬱頭痛】香附子炒四兩。川芎二兩。為末。每服二錢。臘茶清調下。常服除根。(濟察方)

【氣厥頭痛】天台烏藥。川芎等分為末。每服二錢。臘茶清調下。(濟生方)

【痰厥頭痛】水蘇葉五兩。皂莢炙去皮子三兩。羌花醋炒焦一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每食後服二十九。荊芥湯下。(聖惠方)

②牛蒡子炒。旋覆花等分為末。臘茶清服一錢。日二服。(聖惠方)

③附子炮三分。釜墨四錢。冷水調服一錢。當吐即愈。忌豬油冷水。(集簡方)

④白附子。天南星。半夏等分。生研為末。生薑自然汁浸。蒸餅丸。菘豆大。每服四十九。食後薑湯下。(濟生方)

⑤痰厥頭痛如破者。烏梅肉三十個。鹽三撮。酒三升。煮一升。頓服。取吐即愈。(肘後方)

⑥半夏五錢。巴霜一分。麵糊為丸。每服三十九。生薑湯下。(續名醫類案)

⑦飲茶一二升。須臾吐。吐畢又飲。如此數過。須吐涎痰盡乃止。不損人。待渴即瘥。(本草)

【風痰頭痛】草烏頭炮去皮共半兩。川烏頭生去皮共半兩。薑香。乳香。三皂子大。為末。每服二錢。薄荷薑湯下。食後服。(三因方)

②天南星一兩。荊芥葉一兩。為末。薑汁

糊丸。梧子大。每食後薑湯下二十九。

(濟生方)

③ 天南星、茴香等分。生研末。鹽醋煮麵糊丸。如上述法服。(經濟效世方)

④ 苦瓠膜取汁。以葦管灌入鼻中。其氣上衝腦門。須臾惡涎流下。其病立愈。除根勿以昏運為疑。乾者浸汁亦效。其子為末吹入亦效。(普濟方)

⑤ 梔子末和蜜。濃傳舌上吐。即止。(兵部手集)

⑥ 白附子炮去皮。臍半斤。石膏煨紅半斤。朱砂二兩二錢半。龍膽一錢。為末。粟米飯丸。小豆大。每服三十九。食後茶酒任下。(御藥院方)

痰熱頭痛。壯實人氣實有痰。頭痛眩運。大黃酒浸三次。為末。茶調服。(丹溪心法)

腎厥頭痛。大附子一個。炮熟去皮。生薑半兩。水一升半煎。分三服。(集簡方)

腎虛頭痛。硫黃一兩。胡粉為末。飯丸。

梧子大。痛時冷水服五丸。即止。(普濟方)

① 硫黃末。食鹽等分。水生調麵糊丸。梧子大。每服薄荷茶下五丸。

② 硫黃六錢。烏藥四錢。為末。蒸餅丸。梧子大。每服三五丸。食後茶清下。(普濟方)

溫熱頭痛。黑牽牛七粒。砂仁一粒。研末。井水調汁。仰灌鼻中。待涎出即愈。(聖濟總錄)

熱病頭痛。大括萸一枚。去瓢。細剉。置磁碗中。用熱湯一盞泡之。蓋定。良久去滓服。(聖惠方)

溫家頭痛。瓜蒂末一字。嚥入鼻中。口含冷水。取出黃水。愈。(活人書)

血風頭痛。女人患此者。至為困苦。用草烏頭。梔子等分為末。自然蔥汁。隨左右調塗太陽及額上。勿近眼。避風。(三因方)

頭眩。風熱上衝。頭目運眩。或胃中不

利。川芎、槐角子各一兩為末。每服三錢。用茶清調下。(保命集)

① 首風旋運。多汗惡風。胃膈痰飲。川芎一斤。天麻四兩。為末。煉蜜丸。如彈子大。每嚼一丸。茶清下。(宣明方)

② 頭風旋運。痰逆。惡心懶食。真寒。陵香。藿香葉。沙草根。炒等分為末。每服二錢。茶下。日三服。(本事方)

③ 蒼耳葉。曬乾。為末。每服一錢。酒調下。日三服。若吐。則以蜜丸。梧子大。每服二十九。十日全好。(經驗方)

④ 頭風旋運。起倒無定。葫蘆。獨活。白芷。石膏各一兩。枳實。炒七錢半。每服三錢。酒一盞。煎六分服。(聖惠方)

⑤ 濕熱眩運。不可當者。酒炒大黃為末。茶清服二錢。效。(丹溪纂要)

⑥ 目赤頭旋。眼花面腫。風熱上攻。用排風子焙。甘草炙。菊花焙。各一兩。為末。每服二錢。卧時。溫水下。

⑦ 頭運吐逆。胃冷生痰。用川乾薑炮二

錢半。甘草炒一錢二分。水一鍾半煎減半服。累用有效。(傳信適用方)

⑨頭風旋運。蟬殼一兩。微炒。為末。非時酒下一錢。白湯亦可。(聖惠方)

⑩頭目眩運。大黃。荆芥穗。防風。各等分。水煎服。以利為度。(奇效良方)

⑪失血過多。眩運不醒。芎藭。當歸。酒浸等分。每服四錢。水煎溫服。(奇效良方)

⑫頭運目眩。當初夏新絲上市時。用雞蛋七個。置蒼蘆鍋中。煮至七日七夜之久。然後取出。分數次食之。第一年食七個。第二年食七個。後即永不復發。

⑬風眩頭痛。白菊花為末。酒調服一錢。日再。或浸酒。或取嫩莖葉作羹。亦良。

⑭蒼耳葉曬乾為末。每服一錢。酒調服。日三服。

⑮生白菓肉二枚。杵爛。開水沖服。至重者。五次必愈。

⑯頭鳴。狀如蟲蛀。名天白蟻。用茶子為末。吹入鼻中。取效。(醫方摘要)

⑰甘菊花濃煎。頻服取效。

⑱女貞子。旱蓮草。等分為末。椒欖汁為丸。桑葉湯下。

⑲桑葉黑脂麻。丹皮。梔子。等分。研末。蜜丸。陳細茶煎湯服。

●二 口病單方

①人中腫大。生蒲黃二錢。川連及頂上梅片各一錢。共研細末。麻油調敷。(千金翼方)

②人中黃水瘡。口之上唇。起泡出黃水者。是用經霜後絲瓜根。炙乾。用麻油調敷。即愈。

③唇疔。取野薔薇花根。上。皮。搥。絨。酌加黃柏末。和勻。做小餅。貼患處。須更換。將疔拔出為度。

④繭唇。又名瀝唇。初起口緊。不能飲食。若不急治。難效。須用新白布作捲。如酒杯大。燒燃。放刀口上。俟刀口汁出。取汁搽之。日搽十餘次。並以青布燒

灰沖酒服。極效。(活人書)

⑤用鼈甲及頭燒研敷之。(類要)

⑥蛇蛻燒為末。先拭後敷。

⑦唇急作痛。五倍子。訶子肉。等分為末。傳之。(得效方)

⑧青皮燒灰。豬脂調塗。仍將青皮灰末。每一錢。酒調服。(醫學入門)

⑨硫黃。白礬。枯木。砂。水銀。麝香。黃藥。為末。和水銀磁器中。臘月。豬脂。和如泥。先淨拭唇。却以膏塗之。(得效方)

⑩黃連一分。乾薑半分。炮為細末。傳之。(得效方)

⑪皂角末少許。水調塗之。(得效方)

⑫唇腫。腫脹色黑。痛癢難忍。大錢四文。石上磨豬脂汁塗之。不過數次。愈。(活幼新書)

⑬唇瘡。即連年不瘥者。以八月藍葉一斤。搗汁洗之。不過三度瘥。(丹溪心法)

⑭痛癢難堪者。黃藥為末。薔薇根汁調塗。立效。(聖濟總錄)

【唇裂】因裂生瘡者。瓦花生薑。入鹽少許搗塗。(醫方摘要)

② 冬月唇裂香油頻頻抹之。(物類相感志)

③ 白荷花瓣。貼之神效。雖開裂出血者。貼之亦立止。(丹溪纂要)

④ 桃仁搗泥和豬脂傳之。(海上集驗方)

⑤ 青皮燒灰。研豬脂調塗之。(海上集驗方)

⑥ 橄欖炒研。豬脂和塗之。(海上集驗方)

⑦ 煉過豬脂。日日塗之。(十便良方)

⑧ 豬脰酒浸搽之。(葉氏醫方摘元)

【唇菌】嘴唇陡然翻突。形如猪嘴。對時不救。急灸兩手少商穴。并用蚯蚓十條。吳茱萸二錢。研末。加灰麪少許。熱醋調敷兩足心。用布紮住。半日一換。以愈為止。(兵部子集)

【口瘡】硃砂。焰硝。含口中。以天南星為末。用醋調貼足心。神效。(醫學正傳)

② 熱水半碗。入白礬一撮。待溫。漱口數次。愈。(種杏)

③ 生白礬為末。傳之亦效。(丹溪心法)

④ 膽礬火煨為末。傳瘡上。吐涎便瘥。(本草綱目)

⑤ 膽礬一塊。百沸湯泡開。含漱。即瘥。(本草綱目)

⑥ 密陀僧煨研。搽之。(聖濟總錄)

⑦ 用青錢二十文。炭火燒赤。投酒中服之。立瘥。(本草綱目)

⑧ 水銀一分。黃連六分。水二升。煮五合。含之。日十次。(普濟總錄)

⑨ 生甘草二寸。白礬一粟。大常噙之。嚙津。(活法機要)

⑩ 不拘大人小兒。以角蒿塗之。有汁吐去。一宿效。(簡易方)

⑪ 濃煎升麻湯。入鹽。頻頻含漱。(本草綱目)

⑫ 久患口瘡不愈者。生附子為末。醋麵調貼足心。男左女右。日再換之。(經驗良方)

⑬ 以好酒煮黃連。取汁呷下。立愈。(丹

漢心法)

⑭ 草烏頭。吳茱萸。等分為末。蜜調塗足心。(本事方)

⑮ 口中生瘡。天行熱甚者。吃海自然汁半升。稍稍嚙之。即瘥。(傷寒類要)

⑯ 經絡中有火邪。致使口瘡咽噪者。龍腦三錢。黃檗三兩。為末。蜜丸。梧子大。每服麥門冬湯下十九。(醫方摘元)

⑰ 棟根細剉。水煮濃汁。日日含漱。吐去勿嚙。(肘後方)

⑱ 沒石子炮三分。甘草一分。研末。搽之。月內小兒生口瘡者。則以少許置乳上吮之。入口即啼。不過三次。(聖惠方)

⑲ 猪背白蜜一斤。黃連末一兩。合煎。取汁熬稠。每服棗許。日五服。(千金方)

⑳ 大椒去閉口者。水洗。麪拌。煮作粥。空腹吞之。以飯壓下。重者可再服。以瘥為度。(食療本草)

㉑ 雞內金燒灰。傳之立效。(活幼心書)

㉒ 口瘡赤者。宜乳香散及天花粉搽之。

白者宜沒藥散青金散及黃蘗華炭為末摻之良久以水漱口(醫學入門)
⑤ 蠶繭五個包礪砂瓦上焙焦為末摻之(本草)

⑥ 薔薇根濃煎汁稍稍含漱溫含冷吐即效冬取根夏取莖葉(本草)

⑦ 白楊樹枝取漿水煎和鹽含漱(本草)
⑧ 五倍子一兩蜜炙黃蘗滑石各五錢銅綠二錢麝香三分半為末摻之極效(醫學正傳)

⑨ 西瓜漿水徐徐飲之冬月無此用西瓜皮燒灰傅之(丹溪心法)

⑩ 遠志醋研鵝毛掃患處出涎(丹溪心法)

⑪ 黃蘗醋浸含之亦愈(本草)

⑫ 五倍子末搽之或煎湯漱或煎湯泡白礬或膽礬漱效(本草綱目)

⑬ 茶樹根煎湯代茶不時飲味最苦飲之極效(救生苦海)

⑭ 五倍子為末摻之便可飲食(本草)

⑮ 口瘡無論新舊每夜卧時以手握緊兩掌丸左右揉之約三五十遍每夜睡覺輒行之愈於服藥(蘇談)
⑯ 苦竹葉煎湯漱口或取瀝塗之俱良(本草)

【**嘴角生瘡**】取新鮮杉木細枝一條煨火燒其上端末端即有白色之漿流出取塗嘴角數次可愈

⑰ 小兒燕口兩角生瘡髮灰三錢飲汁可瘥

⑱ 縮砂殼煨研摻之即愈(簡易方)

⑲ 用經年葵根燒灰傅之(外臺秘要)

⑳ 白楊嫩枝鐵上燒灰和脂傅之(外臺秘要)

㉑ 檳榔燒灰入輕粉少許同研細乾摻之(得效方)

㉒ 松白皮趁濕貼之三四度瘥(千金方)

㉓ 經年葵根欲腐者佳燒灰趁熱傅之

良(千金方)

⑳ 消蠟和水數之善(千金方)

【**口乾**】元參二三片含口中便生津液大佳(斗門方)

㉑ 虛勞口乾者用麥冬一兩為末大棗肉三十個以蜜一升和令熟用米五升蒸之任性服(千金方)

㉒ 羊脂或豬脂雞子大劈之納半升醋中漬一宿絞取汁含之便能發生津液(千金方)

㉓ 石膏五合碎蜜二升先以水三升煮石膏取二升納蜜煮取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含之(千金方)

㉔ 蒸飯甑蓋上汽水搽數次便瘥(醫方摘要)

㉕ 羊脂如雞子大醇酒半升棗七枚劈合漬七日取棗食之立愈(千金方)

【**口臭**】用細辛煮取濃汁熱含冷吐之即瘥(本草)

㉖ 香薷煮取汁或飲或漱之甚妙(丹

...

煖心法

③取茵香苗莖。煮作羹。頻飲之。及生食。並得。(本草)

④胎麻炒研。入鹽少許食。

⑤口噙雞舌香。便可解臭。雞舌香。即沉香花也。如無用沈香可代。(本草)

⑥口中如膠而臭。知母。地骨皮。山梔。麥門冬。甘草。鹽湯燻。早起汲井中第一汲水含之。吐棄。則下即瘥。(本草)

⑦蜜陀僧一錢。醋調漱口。(普濟方)

⑧明礬入麝香為末。擦牙上。(生生編)

⑨水者。考窮含之。(普濟方)

⑩香白芷七錢為末。食後井水服一錢。(普濟方)

⑪豆蔻。細辛。為末含之。(肘後方)

⑫藿香洗淨。煎湯。時時噙漱。(醫方摘元)

⑬白梅善治口臭。常含之。可以香口。(本草)

⑭食韭口臭。嚼砂糖即解。(醫方摘要)

⑮食蒜口臭。呷好醋一口。齒頰轉能生芳。

⑯食大蒜時。先食黑棗數枚。則臭氣自減。累驗。

⑰飲酒口臭。咬柚子即解。亦可煎湯飲。(本草)

⑱尋常口臭。每夜於臨卧時。口含荔枝肉一二枚。次早吐去。七日後即見小效。(集簡方)

⑲心氣不足。致口臭者。益智去殼。加甘草為末。乾嚥下。或沸湯點服。(得效方)

⑳鹹。用知母。烏賊骨煎服。

㉑吐清水。用艾葉汁煎飲。

㉒舌苔。薄倚。黃檗。硼砂等分。冰片減半。煉蜜丸。彈子大。含化。兼治口舌糜瘡。

㉓舌苔白。舌苔白而滑澤者。生薑。蘆。蜜擦之。或以生薑蜜水洗之。良。(醫學入門)

㉔舌苔黃赤。黃赤而帶燥濕者。取新青

布裹指蘸冷水。頻頻擦之。輕者自易脫去。(醫學入門)

㉕舌瘡。舌上生瘡。或白苔乾澀如雪。語話不真。薄倚自然汁。與白蜜等分。調勻傅之。良。先以生薑厚片。蘸蜜水揩洗後傅藥。(三因方)

㉖生薑蜜水楷洗後。再用硃砂雄黃。硼砂。腦。麝。各少許。為末。傅亦良。(得效方)

㉗黃檗時時含之。良。(救急良方)

㉘雞舌香末。綿裹含之。兼治唇瘡。(外臺秘要)

㉙以好酒煮黃連。取汁呷下。立愈。(丹溪心法)

㉚蠶。兩五個。包硼砂。瓦上焙焦。為末。摻之。(本草)

㉛蜜炙黃檗。與青黛為末。摻之。差。(本草)

㉜草烏頭。吳茱萸。等分為末。蜜調塗足心。(本事方)

① 焦鼓末。含一宿。即瘥。(聖惠方)

② 朴稍含之。良。(千金方)

③ 口舌生瘡。下虛上壅。白礬泡湯濯足。良。(千金方)

④ 白礬末。黃丹。水飛。硃砂等分。研擦之。(千金方)

⑤ 升麻一兩。黃連三分。為末。綿裹含嚥。(本事方)

⑥ 膽礬半兩。入銀鍋內。火煨赤。出毒一夜。細研。每以少許敷之。吐去酸涎水。二三次。瘥。(勝金方)

⑦ 舌瘡爛久不瘥者。用蕃薇根。濃煎汁。稍稍含漱。溫含冷吐。即效。冬取根。夏取葉。葉用。(本草綱目)

⑧ 蒲黃微炒。摻之。即瘥。

⑨ 牛膝浸酒含漱。亦可煎飲。(肘後方)

⑩ 羊脛骨中髓。和胡粉塗之。妙。(聖惠方)

⑪ 舌瘡痛爛。飲食難進者。宜用吳茱萸。三四錢。研末。好熱醋調敷。兩足心。用

布紮住。對時一換。神效。(證類本草)

【舌腫】舌腫脹出口。蓖麻子取油。蘸紙。熬燒烟熏之。(本草綱目)

① 硼砂為末。生薑片蘸藥。搯腫處。即退。(本草綱目)

② 傷寒舌出過寸。梅花片臘半分。為細末。摻之。隨手即愈。(夷堅志)

③ 真蒲黃。頻摻舌上。且呷黃連湯。瀉心火。即差。(醫學正傳)

④ 用甘草煎濃湯。熱漱。頻吐。(聖濟總錄)

⑤ 紅芍藥。甘草。兩味煎水。熱漱。(聖濟總錄)

⑥ 舌卒腫大。如猪脰狀。不治殺人。取釜下墨。和酒塗之。(千金方)

⑦ 真蒲黃一味。頻刮舌上。其腫自退。若能噉藥。即以黃連一味煎濃汁。細細呷之。即愈。(醫學正傳)

⑧ 梅花冰片。研為細末。傳之。即消。(醫統)

⑨ 舌腫脹出口外。用硼砂為末。生薑片蘸藥。搯腫處。即退。(本草綱目)

⑩ 舌長口外。用雄雞血一小盞。以舌浸之。便即縮入。(醫方摘元)

⑪ 蓖麻子仁四十粒。去殼。研油。塗紙上。作熬燒烟熏之。未退。再熏。以愈為度。(經驗良方)

⑫ 皂礬於新瓦上煨紅色。為度。放地上。候冷。研細。搥開牙關。以細竹吹舌上。極效。(經驗良方)

【木舌】川椒以生麩包。丸。每服十粒。醋湯下。(救急良方)

① 蒲黃。乾薑等分。乾摻。即愈。(本草綱目)

② 取鐵銹。鎖燒紅。打下銹。研末。水調一錢。噉嚥。(生生編)

③ 種蠶為末。吹之。吐痰。甚妙。(生生編)

④ 種蠶一錢。黃連蜜炒。二錢。為末。摻之。涎出。為愈。(積德堂方)

⑤ 川烏。六。巴豆。細研。醋調塗刷。(集簡方)

⑥ 半夏。醋煎。含漱之。(集簡方)

① 半夏二十枚。水煮過。再泡片時。乘熱以酒一升浸之。密封良久。熱漱含吐之。(集簡方)

② 糖醋時時含漱良。(普濟方)

③ 皂礬二錢。鐵上燒紅。研搽之。(積德堂方)

④ 用蛇膽一枚。焙乾為末。傅舌上。有涎吐去。(勝金方)

⑤ 蚯蚓一條。以鹽化水塗之。良久漸消。(聖惠方)

⑥ 秤錘燒赤。淬醋一盞。飲之。

⑦ 以辰砂一錢。伏龍肝二錢。鴨子清調服。

⑧ 芫荽菜根煎湯飲。

⑨ 重舌 舌下又生一舌是也。急用新真蒲黃。羅細末敷之。五七次即愈。但須吐去再敷。(百一選方)

⑩ 取馬牙硝為末。傅舌下。日三。(本草綱目)

⑪ 半夏二十枚。水煮過。再泡片時。乘熱以酒一升浸之。密封良久。熱漱含吐之。(集簡方)

⑫ 重舌 舌下又生一舌是也。急用新真蒲黃。羅細末敷之。五七次即愈。但須吐去再敷。(百一選方)

⑬ 取馬牙硝為末。傅舌下。日三。(本草綱目)

⑭ 半夏二十枚。水煮過。再泡片時。乘熱以酒一升浸之。密封良久。熱漱含吐之。(集簡方)

⑮ 重舌 舌下又生一舌是也。急用新真蒲黃。羅細末敷之。五七次即愈。但須吐去再敷。(百一選方)

⑯ 取馬牙硝為末。傅舌下。日三。(本草綱目)

⑰ 半夏二十枚。水煮過。再泡片時。乘熱以酒一升浸之。密封良久。熱漱含吐之。(集簡方)

⑱ 重舌 舌下又生一舌是也。急用新真蒲黃。羅細末敷之。五七次即愈。但須吐去再敷。(百一選方)

⑲ 取馬牙硝為末。傅舌下。日三。(本草綱目)

⑳ 赤小豆末。醋和塗之。(普濟方)

㉑ 皂礬二錢。鐵上燒紅。研搽之。(積德堂方)

㉒ 白芨末。乳汁調塗足心。(聖惠方)

㉓ 九重舌腫痛。蜂房炙研。酒和傅之。日三四次。(勝金方)

㉔ 皂角刺煨。朴硝少許研勻。先以手蘸水。擦口內。并舌上下。將藥搽之。涎出自消。(勝金方)

㉕ 五靈脂一兩。去砂石研末。米醋一大椀煎。逐漸噙漱口。(勝金方)

㉖ 選不蛀皂角四五挺。去皮弦。炙令乾。荆芥穗少許。研細末。以米醋調塗腫處。(勝金方)

㉗ 蛇脫燒灰。研極細。少許傅之。(勝金方)

㉘ 用大黑棗一枚。去核裏入青礬一錢。紙包煨熟。去棗留礬。以一二分調水塗之。無不立愈。兼治舌腫。犬舌。

㉙ 舌忽縮入。生艾搗傅之。乾艾浸濕亦可。(聖濟總錄)

㉚ 芥菜子研末。醋調敷頸項下。立即回復原狀。且能言。

㉛ 舌皮碎裂。須將雞蛋煮熟。取其硬殼與蛋白間之薄皮。套於舌上。易三四次。舌即脫皮全愈。(丹溪心法)

㉜ 舌血 舌硬出血不止者。取刺薊搗汁和酒服。乾者為末。冷水服。(普濟方)

㉝ 木賊煎湯漱之。即止。(聖惠方)

㉞ 舌腫血出如泉。烏賊骨蒲黃各等分。炒為細末。每次塗之。(簡易方)

㉟ 舌共出血者。蒲黃末擦舌上。內煎服。生黃連一錢。連翹三錢。竹心二十根。累效。

五 舌上出血。有孔如簪如針者。赤小豆一升。杵碎。水三升和絞汁服。

六 舌共出血。兼渾身虱出者。服鹽醋湯十數碗。即愈。

七 茅柴根生。車前子。亂髮各為末。吹擦立止。(林屋山人秘方)

八 香薷煎汁服一盃。日三服。(肘後方)

九 槐花研細末。敷上。即止。(應驗良方)

【舌斷】用鮮蟹燒灰。每二錢。同乳香。末藥各二錢半。塗之。即生肉。如多去舌。用川烏。草烏。同為細末。攤紙一條。以涼水調合貼之。即不覺痛。可用刀取如流血。以陳石灰塗之。即止。愈後舌硬。用白雞冠血點之。便軟。(醫鑑)

二 舌頭割而未斷者。用雞子白軟皮。套住舌頭。用破血丹。蜜調塗舌根斷處。再以蜜調蠟稀稠得所。敷在雞子皮上。勤敷三日。候舌接住。方去雞子皮。只用蜜蠟勤敷。七日全安。(醫林)

三 自行跌仆。穿斷舌心。血出不止。以藕

細蘸米醋頻刷斷處。其血即止。仍用蒲黃。杏仁。硼砂少許。為末。蜜調成膏。噙化而安。(醫學入門)

四 先以乳香。沒藥煎水。噙口中止痛。後以黑鉛。水銀。寒水石。輕粉。硼砂。五味等分。乳極細。抹上。即長全。有效。(回春)

五 急用敗龜板。燒灰。帶黑色一兩。血竭一錢。冰片三分。共為末。搽上。血痛俱止。

● 三 諸般咳嗽單方

【咳嗽】猪脰一具。薄切煮食。神效。

一 甘梨恣啖。老人無齒者。加白蜜蒸服。

二 蘿蔔子炒。杏仁去皮共炒。等分。蒸餅丸。麻子大。每服三五丸。

四 用生西瓜子肉。與冰糖研末極細。服之甚驗。

五 夜間咳嗽者。以甘草六七片。臨卧時即含口內。勿令咽下。便可終夜不咳。但日間尚須兼用他藥。

六 芫荽冰糖沖服。三服即愈。

七 雪梨一個。挖去心核。納入貝母。杏仁末少許。再加冰糖。連蓋用篋。或線封固。置於豆腐漿鍋內。煮熟。清晨全食。二梨即痊。

八 取向南嫩桑條。不拘多少。每條約寸許。用二十一枝。納於砂石鍋內。用水五椀煎至一椀。渴則飲之。一月必愈。(仇遠神史)

九 香櫟去核。薄切片。以酒煮熟。用蜜拌勻。睡起服。甚驗。(香祖筆記)

十 生薑切薄片。焙乾為末。糯米糊丸。芥子大。空心米飲下。三十九。數服便止。(癸志)

十一 落花生半斤。生剝去衣。白中搗碎。放瓦罐內。加清水煮之。沸後。面有浮油一層。用瓢舀除。酌加冰糖少許。再煮至汗同人乳形。分一半。於臨卧時服。餘一半。明晨溫熱服之。連服五六次。即愈。

① 重黃一兩。以蠟紙調捲。作筒十個。燒烟吸。取吐止。一日一熏。惟食白粥七日後。以羊肉羹補之。(千金方)

② 重黃一兩。款冬花二分。熟艾一分。以蠟紙鋪艾。灑二末於上。葦管捲成筒。燒煨吸。三十日自瘥。三日盡一劑。百日斷鹽醋。(外臺秘要)

③ 梓得欬嗽。芫花一升。水三升。煮汁一升。以棗十四枚。煮汁乾。日食五枚愈。(肘後方)

④ 百部根漬酒。每溫服一升。日三服。(集簡方)

⑤ 百部生薑各搗汁。等分煎服二合。(集簡方)

⑥ 用百部藤根搗自然汁。和蜜等分。沸湯煎膏。噲噲。(集簡方)

⑦ 百部根懸火上炙乾。每含噉汁。(集簡方)

⑧ 桃仁三升。去皮杵。著器中。密封。蒸熟。曬乾。絹袋浸盛。二斗酒中。七日可飲。

日飲四五合。(心鏡)

① 用好梨去核。搗汁一椀。入椒四十粒。煎一沸。去滓。納黑錫一大兩。消訖。細含噉。立定。(海上方)

② 用梨一個。刺五十孔。每孔納椒一粒。麵裹。炭火煨熟。停冷。去椒食之。(海上方)

③ 梨一個。去核。納酥蜜。麵裹燒熟。冷食。佳。(海上方)

④ 梨一個。切片。酥煎食之。(海上方)

⑤ 梨搗汁一升。入酥蜜各一兩。地黃汁一升。煎膏含噉。(海上方)

⑥ 猪腎二枚。乾薑三兩。水七升。煮二升。稍服。取汗。(張文仲方)

⑦ 用白蛻殼。搗為細末。以熟米飲調。每服二錢。日三服。甚效。(急救良方)

⑧ 雄白雞一隻。苦酒一斗。煮取三升。分三服。并淡食雞。(肘後方)

⑨ 爛青布廣四寸。布上鋪艾。艾上鋪青礬末。礬上鋪少熏黃末。又鋪少鹽。又

鋪少豆豉。捲筒燃之。少令著。急內燥

罐中。以紙蒙頭。使作一小孔。口吸取烟。細細噉之。以吐為度。若心曾悶時

畧歇。烟盡止。日一二度。用三捲。無不盡瘥。三七日。慎油膩。(千金方)

① 浮石末湯服。或蜜丸服。(肘後方)

② 杏仁二三兩。去皮尖。搗爛絞汁。煮服。加冰糖少許。數次即愈。(生生編)

③ 元胡索一兩。枯礬二錢半。為末。每服二錢。和錫糖一塊含之。此方老小皆治。(仁存堂方)

④ 用川貝母。茶葉各一錢。冰糖三錢。共為末。滾湯下。

⑤ 甜杏仁一兩。去皮尖。搗如泥。分三服。每服加冰糖三錢。開水沖。連末服下。早晚各一次。三服愈。煎服則不驗。(續名醫類案)

⑥ 烏雄雞一隻。治如食法。酒清半日。食之。(肘後方)

⑦ 石灰一兩。蛤粉四錢。為末。蒸餅丸。晚

巨大。焙乾。每服三十九。溫薑汁下。(晉濟方)

【寒咳嗽】煨薑一塊含嚙之。(本草衍義)

②寒咳痰喘者。白菓七個。煨熟。以熟艾作七丸。每果入艾一丸。紙包再煨香。

去艾食。(秘韞方)

③皂莢燒研。豉湯服二錢。(千金方)

④乾薑末半錢。熱酒調服。或錫糖丸。(姚僧坦方)

⑤核桃連皮。加冰糖少許搗爛。開水沖服數次。極有效驗。蒸服亦得。(普濟方)

⑥蘇葉。向藥店購買十文。加冰糖一匙。煎濃服之。一服即愈。(心鏡)

【熱咳嗽】用濃茶一杯。蜜一杯。大熟括

萹一個。去皮。將瓤入茶蜜湯。洗去子。梳盛。飯上蒸之。候飯熟。取出。時時挑

三四匙嚙之。(醫方摘元)

②虛熱咳嗽。天花粉一兩。人參三錢。為末。每服一錢。米湯下。(集簡方)

③用甘蔗汁一升半。青梁米四合。煮粥。日食二次。極潤心肺。(董氏方)

④熱盛而咳嗽者。用石膏二兩。甘草炙半兩。為末。每服三錢。生薑蜜調下。(普濟方)

【咳嗽有痰】熟括萹十個。明礬二兩。搗和餅。陰乾。研末。糊丸。梧子大。每薑湯下五七十九。(醫方摘元)

②芫花一兩。炒。水一升。煮四五沸。去滓。白糖入半斤。每服棗許。勿食酸鹹物。(肘後方)

③痰嗽兼喘者。五味子。白礬。等分為末。每服三錢。以生豬肺炙。蘸末。細嚼。白湯下。(普濟方)

【久咳不已】三十年呬嗽。熏黃。木香。良

若子。等分為末。羊脂塗青紙上。以末鋪之。作筒燒烟吸。輒效。(崔氏方)

②浮石末湯服。或蜜丸服。(肘後方)

③取白前焙搗為末。每溫酒服二錢。(深師方)

④紫莞。欵冬。花各一兩。百部半兩。搗羅為末。每服三錢。薑三片。烏梅一個。煎湯調下。日二次。甚佳。(圖經)

⑤每旦取欵冬。花如雞子許。少蜜拌。花使潤。納一升鐵鍋中。又用一瓦盆。鑄一孔。孔內安一小筆管。以麵泥封。勿令漏氣。鍋下著炭火。少時烟從筒出。以口含吸嚙之。如胃中少悶。須舉頭。即將指頭按住筒口。勿使漏。至烟盡。乃止。如是五日。一為之。待至六日。飽食羊肉。轉飽一頓。永瘥。(易簡方)

⑥五味子一兩。真茶四錢。曬研為末。以甘草五錢煎膏。丸。菴豆大。每二十九。沸湯下。數日即愈。

⑦三十年老嗽。百部根二十斤。搗取汁。煎如飴。服一錢。日三服。(千金方)

⑧馬勃為末。密丸。梧子大。每服二十丸。白湯下。即愈。(普濟方)

⑨生薑五兩。錫半升。火煎熟。食盡愈。(必效方)

①生薑汁半合。蜜一匙。煎溫呷服。三服愈。(外臺秘要)

②經年氣嗽者。用橘皮神麴生薑焙乾。等分為末。蒸餅和丸。梧子大。每服三五十丸。食後夜卧各一服。(寇氏衍義)

③核桃仁五十個。煮熟去皮。人參五兩。杏仁三百五十個。麩炒。湯浸去皮。研勻。入煉蜜丸。梧子大。每空心細嚼一丸。人參湯臨卧再服。(金居士方)

④生訶黎勒一枚。含之。嚥汁。痰後口爽。不和食味。却無檳榔湯一椀服之。便立有味。(千金方)

⑤久嗽欲死。用厚榆皮削如脂大。長尺餘。納喉中。頻出入。當吐膿血而愈。(千金方)

⑥十年效嗽。或二十年醫不效者。生龜三枚。治如食法。去腸。以水五升。煮取三升。浸麴釀秫米四升。如常飲之。令盡。永不發。

⑦二十年老嗽。猪脬三具。大棗百枚。酒五升。漬之。秋冬七日。春夏五日。絞去渣。七日服盡。忘鹽。(心鏡)

⑧羊脬三具。大棗百枚。酒五升。漬七日。飲之。(肘後方)

⑨雞子白皮炒十四枚。麻黃三兩。焙為末。每服一錢。開水下。日二次。(必效方)

⑩黃明膠炙研一錢。人參末二錢。薄荷政湯二盞。葱白少許煎服。嗽時溫呷三五口。即止。(食療本草)

⑪久嗽漸成癆瘵。鳳尾草為末。用魚鮓蘸食之。(聖惠方)

⑫久嗽羸弱者。以九共拒霜葉為末。魚鮓蘸食。屢效。(得效方)

⑬積年咳嗽。呷呷作聲。用鱈魚殼半兩。貝母煨一兩。桔梗一分。牙皂一分。去皮。酥炙為末。煉蜜丸。彈子大。每含一丸。嚥汁。服三丸。即吐去惡涎而瘥。(聖惠方)

⑭三十年嗽。紫苑二兩。款冬花三兩。二

味治下篩。先食飲。服一錢。日三服。七日瘥。(集驗方)

⑮貫眾。蘇方木等分。水一盞。生薑三片。煎服三錢。早晚各一次。(聖惠方)

⑯五味子五錢。甘草半兩。五倍子。風化硝各二錢。為末。乾噙口中。咳嗽自止。(丹溪纂要)

⑰扁柏葉陰乾。加紅棗七枚。煎濃湯代茶。時時飲之。(直指方)

⑱粟殼去筋。蜜炙為丸。每服五分。蜜湯下。

⑲瓜子一味。濃煎常服。

⑳久嗽氣急者。如母去毛切五錢。隔紙炒。杏仁薑水泡去皮尖。焙五錢。水一盞。半煎一盞。食遠溫服。次以蘿蔔子杏仁等分為末。米糊丸。每服五十丸。薑湯下。絕病根。(筆峯雜興)

㉑百部根切炒。袋盛浸酒。頻頻飲之。(宣明方)

㉒猪腎兩個。入椒四七粒。水煮啖之。

張文仲方

主 駕粟殼新者去頂切焙乾陳者泡去筋膜炒各一兩蜜丸彈子大臨睡嚼

一丸名生熟鴛栗丸(古今醫鏡)

【老年咳嗽】杏仁胡桃仁等分搗爛蜜丸彈子大薑湯嚼下(萬病回春)

二 老人喘嗽不得卧者杏仁去皮共核桃肉各等分蜜丸彈子大每一丸細嚼薑湯下

三 生薑汁五兩黑砂糖四兩水煎二十沸每半匙漸漸嚥之

【肺熱咳嗽】沙參半兩水煎服之(易簡方)

二 肺熱痰咳膈塞滿用括萸仁半夏湯泡七次焙研各一兩薑汁打麵糊丸梧子大每服五十丸食後薑湯下(濟生方)

三 半夏括萸仁丸服亦效

【肺熱痰嗽】製半夏括萸仁各一兩為末薑汁打糊丸梧子大每服二三十

丸白湯下或以括萸煎煮熟丸之(濟生方)

二 蘿蔔子半斤淘盡焙乾炒黃為末以糖和丸芡子大綿裹含之嚥汁甚妙(勝金方)

三 肺燥咳嗽者用松子仁一兩胡桃仁二兩研膏和熟蜜半兩收之每服二錢食後沸湯點服(外臺秘要)

【肺勞咳嗽】雌黃一兩入瓦盆內不固濟坐地上以火焙之厚二寸以炭一斤築定頂火鍛三分去一退火去毒為末糖酥和丸粟米大每日空心杏仁湯下三丸(斗門方)

二 肺虛久嗽人參末二兩鹿角膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞葱少許入銚子煎一二沸傾入盞內遇欬時溫呷三五口甚妙(食療本草)

三 肺傷咳嗽者紫苑五錢水一盞煎七分溫服日三(易簡方)

四 肺虛久欬者尚有良方用木鼈子欬

冬花各一兩為末每用三錢焚之吸煙良久吐涎以茶潤喉如此五六次後服補肺藥(聖濟方)

五 虛勞咳嗽用大藕一段去一頭節灌蜜全滿仍合好紙封煮極熟食之

六 木鼈子一個雄黃一錢(聖濟方)

【陰虛久咳】用欬冬百部末服或用欬冬百合蜜丸服

【熱痰咳嗽】白礬建茶等分為末糊服善化痰止咳

二 絲瓜煨研末棗肉丸彈子大每一丸酒下功用同上

三 半夏同南星黃芩丸服

【風痰咳嗽】大天南星一枚炮製研末每服一錢水一盞薑三片煎五分溫服每早午晚各一方(博濟方)

二 明礬二兩生參末一兩苦酒二升熬為膏子油紙包收旋丸豌豆大每用一丸放舌下其嗽立止痰即消(肘後方)

三 明礬末酒糊丸梧子大每睡時茶下

二 三十九

四 久近痰嗽自胃膈下塞停飲至於臟腑用知母貝母各一兩為末每服一字用薑三片二面蘸藥細嚼嚥下便睡其嗽立止(醫學集成)

寒痰咳嗽 燒酒四兩猪脂蜜香油茶末各四兩同浸酒內煮成一處每日挑食以茶下之取效(宣明方)

痰哮喘嗽 芋根煨存性為末生豆腐蘸三五錢食即效如未痊以肥猪油二三片蘸食甚妙(醫學正傳)

痰飲咳嗽 用草蓆子紙糊炒令黑知母貝母各一兩為末棗肉半兩沙糖一兩半和丸彈子大每以新棉裹一丸含之嚥津甚者不過三丸(篋中方)

真蚌粉新瓦炒紅入青黛少許淡薑水滴麻油數點調服二錢

痰咳不止 括萋仁一兩文蛤七分為末以薑汁澄濃脚丸彈子大噲之

聖惠方

二 蛤粉一味新瓦炒令通赤拌青黛少許每服用淡薑水滴麻油數點調服神效

痰喘咳嗽 多年陳白蛻殼燒存性為極細末米飲調服一錢日三服

溫痰嗽 半夏同南星白朮木九服

老痰咳嗽 浮水石丸服

痰嗽難卧 用胡桃三個薑三片卧時嚼服少用開水吞下即卧

氣痰咳嗽 貝母去心一兩薑製厚朴半兩蜜丸梧子大每白湯下五十九

筆峯雜興

二 藍葉水浸搗汁一升空腹頻服須臾以杏仁研汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方瘥(梅師方)

三 上氣痰嗽喘促唾膿血以蘿蔔子一合研細煎湯食上服之(食醫心鏡)

四 半夏製生薑切各半兩煎服即效(易老方)

五 取括萋實肥大者割開取子淨洗槌

破切細焙乾半夏四十九粒湯洗十遍切焙為末用洗括萋水并子蒜同熬成膏研細為丸梧子大薑湯下二十九(本草)

六 百藥煎片黃芩橘紅甘草各等分共為細末蒸餅丸茶豆大時時乾嚥數丸佳(瀕湖醫案)

七 南星麴半夏麴陳橘皮各一兩為末自然薑汁和丸如梧子大每服四十丸薑湯下(蘭室秘藏)

八 白前一味搗為末溫酒調服二錢(梅師方)

氣實痰嗽 用荆瀝加薑汁

氣虛痰嗽 用竹瀝加薑汁

氣熱痰嗽 石韋檳榔等分為末薑湯服二錢(聖濟總錄)

痰氣咳嗽 香櫟去核切砂瓶內酒浸封固一夜煮爛蜜拌勻含食之(寇氏衍義)

諸虛痰嗽 藕汁梨汁蘿蔔汁人乳薑

汁白糖沙糖童便各四兩磁瓶內炭火熬一斤每日空心白滾湯送四錢

驗。

②大括薑去蕪取子炒熟和殼研末麩糊丸梧子大每米飲下二三十丸日

二服(杜壬方)

③用肥大括薑洗去子切焙半夏四十丸粒湯洗十次搥焙等分為末用洗括薑水升籐同熬成膏和丸梧子大每薑湯下三五十丸良(楊文蔚方)

【上氣效嗽】紫蘇二錢人參一錢水一盞煎服(晉濟方)

②紫蘇子入水研濾汁同粳米煮粥食(簡便方)

③嗽上氣不得卧者葶藶子三升微火熬研以絹袋盛浸清酒五升中冬

七日夏三日初服如桃許大日三次夜一次冬月日二次夜二次量氣力取微利一次為度如患急者不待日滿亦可絞服(崔知悌方)

滿亦可絞服(崔知悌方)

④蕎麥粉四兩茶末二錢生蜜二兩水一椀順手攪千下飲之良久下氣不止即愈(儒門事親)

⑤不拘大人小兒杏仁三升去皮尖炒黃研膏入蜜一升杵熟每食前含之嚙汁(千金方)

⑥上氣效嗽兼胸滿氣喘者桃仁三兩去皮尖水一大升研汁合粳米二合煮粥食之(食醫心鏡)

⑦用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中以酥盡取收之常含一枚微微嚙之取瘥(聖惠方)

⑧上氣咳嗽腹滿羸瘦者楸葉三斗水三升煮三十沸去渣煎至可丸丸如棗大以筒納下部中立愈(海上方)

⑨上氣喘嗽煩熱食即吐逆用沙糖薑汁等分相和慢煎二十沸每嚙半匙取效(董氏方)

⑩猪肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之(食醫心鏡)

⑪猪肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之(食醫心鏡)

①菴若子炒熟羊肺洗曝等分為末醋拌每夜服錢半粥飲下隔日一服(千金方)

②橘紅四兩甘草炙一兩為末每二錢白湯點服日三次(本草)

③鮮鯉魚一尾不論大小去鱗血洗淨切作膾鮮去血水以薑醋製而食之加蒜齏亦得此名鯉魚煎

④上氣效嗽及喘急哮喘者杏仁一兩去皮尖童便浸半月每日一換尿取出研每服一棗子大薄荷葉蜜水少許煎服二劑永瘥(本草綱目)

⑤上氣效嗽唾濁坐不得卧皂莢酥炙為末蜜丸梧子大薑湯吞下三九日三次(本草綱目)

⑥兜鈴二兩去殼取子童便拌炒甘草炙一兩為末每一錢水煎温呷或含末嚙汁亦得(本草綱目)

⑦用合州乾薑炮皂莢泡去皮子及蛀者桂心紫色者去皮並搗篩等分煉

者桂心紫色者去皮並搗篩等分煉

白蜜和搗三千杵。丸梧子大。每服三丸。嗽發即服。禁食葱麵油膩。其效如神。(傳信方)

【痰熱喘咳】痰涌如泉者。石膏寒水石各五錢。為末。每人參湯服三錢。(保命集)

【二】痰喘咳嗽。不能睡卧者。好茶。白殭蠶各一兩。為末。放碗內。蓋定。傾沸湯一

小盞。臨卧再添湯。點服。(瑞竹堂方)

【三】長皂莢三條。去皮子。一莢入巴豆十粒。一莢入半夏十粒。一莢入杏仁十粒。薑汁製杏仁。麻油製巴豆。蜜製半夏。一處火炙。黃色為度。每用一字。安手心。臨卧。以薑汁調之。服下。神效。(選奇方)

【四】胡桃肉三個。生薑三片。卧時嚼服。(千金方)

【久嗽痰喘】蘿蔔子炒。杏仁去皮去尖。炒。等分。蒸餅丸。麻子大。每服三五丸。時時嚥津。(醫學集成)

【肺痿咳嗽】甘草三兩。炙搗為末。每日取童便三合。調甘草末一錢服之。(廣利方)

【肺癰咳嗽】用陳年苦酒。煮薏苡仁令濃。微溫頓服。俟有血出。自愈。(范法方)

第一編 內科門

【二】紫菜儘量乾食。兩月肺癰可愈。效嗽亦止。此小菜南貨店多有之。(潘蔚林筆記)

【三】白芨切成薄片。枕盛隔湯蒸透。再以飯湯沖服。立效。(摘元方)

【酒後咳嗽】白殭蠶焙研末。每茶服一錢。(怪證奇方)

【酒痰咳嗽】括萎仁。青黛。等分研末。薑汁蜜丸。芡子大。每噲一丸。(丹溪心法)

【款嗽肺脹】五靈脂二兩。胡桃仁八個。柏子仁半兩。研勻。滴水和丸。小豆大。每服二十九。甘草湯下。(普濟方)

【五】味子二兩。粟殼。白錫炒過。半兩。為末。白錫丸。彈子大。每服一丸。水煎服。(衛生家寶方)

【三】桑白皮四兩。泔浸三宿。剉細。糯米一兩。焙乾。同為末。米飲調下一二錢。(本草綱目)

【四】蘇子水取汁。和粳米煮粥食之。和杏仁汁。尤佳。(本草綱目)

【款嗽吐血】白前。桔梗。桑白皮。三兩。炒。甘草一兩。炙。水六升。煮一升。分三服。忌猪肉。菘菜。(外臺秘要)

諸般咳嗽單方

【二】痰嗽帶血者。用款冬花。百合。蒸焙。等分為末。蜜丸。龍眼大。每卧時嚼一丸。薑湯下。(濟生方)

【三】芫荽子五錢。淘去浮者。煮令芽出。炒研。真酥一雞子大。大棗七枚。同煎。令酥盡。取棗。日食三枚。(梅師方)

【四】芫荽子三撮。吞之。日五六度。(必效方)

【五】小兒胎髮灰。入麝香少許。乳汁下。每一兒胎髮作一服。男用女。女用男。(集驗方)

【六】年深咳嗽。作膿血者。貫眾。蘇方木。等分。每服三錢。水一盞。生薑三片煎服。

一

日二服。(席廷賞方)

⑦ 嗽膿血。咽乾。乃虛中有熱。不可服涼藥。以好黃芪四兩。甘草一兩。為末。每二錢。點湯服。(席廷賞方)

⑧ 人參黃芪。飛羅麵各一兩。百合五錢。共研為末。水丸。梧子大。每服五十丸。食前。茅根湯下。(萬病回春)

⑨ 熟地黃末。酒服一錢。日三次。(聖惠方)

⑩ 龍腦薄荷焙研末。米飲湯服一錢。取效。(婆羅門僧方)

⑪ 肺痿咳血者。蘿蔔和鯽魚煮熟。頓食。

⑫ 嗽吐血。勞瘦骨蒸。日晚寒熱。煮白粥。臨熟。入生地汁三合。攪勻。空心食之。

⑬ 虛勞咳血。及肺癰吐膿血者。垂危。茨白細根約三四兩。搗碎。陳酒煮絞汁。每日服三次。

⑭ 海螵蛸研末。驢皮膠丸。菘豆大。藕節湯下三錢。

⑮ 槐花炒研。每服一錢。糯米飲下。仰臥。

一時效。

① 錫底墨炒過。研細。井華水服二錢。連進三服。

② 嗽唾血。蒲黃二兩。炒黑。每日溫服。或冷水服三錢。

③ 杏仁。牡蠣粉。拌炒青黛各一兩。研勻。黃蠟化。和作三十餅。每服一餅。以乾柿半個。夾濕紙。包煨香。嘗去火氣。粥飯下。日三服。

④ 紅棗肉一斤。沙糖一斤。麻油四兩。共搗爛。每晚服一兩。

⑤ 蘿蔔和羊肉。或和鯽魚煮熟食。

⑥ 勞瘵失血。用龜肉和蔥椒醬油煮食。補陰降火。累驗。

⑦ 肺痿吐血者。黃明膠炙乾。桑葉陰乾。各二兩。研末。每服三錢。生地黃汁調下。

⑧ 肺病吐血。百合搗絞汁。和水飲。或者煮熟食。(衛生易簡方)

⑨ 防己葶藶等分為末。米飲湯下一錢。

靈驗非常。(古今錄驗方)

【喘嗽失音】白果仁四兩。白茯苓。桑白皮各二兩。烏豆半升。沙蜜半斤。煮熱。日乾為末。以乳汁半碗。拌濕。九蒸九曬。丸如菘豆大。每服三五丸。白湯下。神效。(金居士方)

【暴喘】有痰梗塞者。細剉厚朴七八錢。薑七片。水二碗。煎七分服。滓再煎服。不過數服愈。(資生經)

【肺虛喘急】光明生鍾乳粉五錢。糯米飯團和飯。飯內蒸過。研丸。梧子大。每溫水下。一丸。(聖濟總錄)

① 人參末。湯服一錢。日五六服。效。(肘後方)

【肺熱氣喘】生茅根一握。剉碎。水二盞。煎一盞。食後溫服。甚者三服止。(聖惠方)

② 用絲茅根煎服。

③ 肺熱喘急。寒熱往來。不堪服藥者。用桃皮。芫花各一升。以水四升。煮取一

并。以故布納汁中。取薄曾口。溫四肢。盈數刻即止。(圖經)

【氣喘】胡桃肉連衣。杏仁去皮尖。生薑各二兩研膏。八蜜煉丸。彈子大。卧時服。

二 人參末三錢。雞子清調。五更初服。便可卧。卧年久者再服愈。

三 括萋一個。明礬棗大一塊。同燒存性。研末。以熟蘿蔔蘆食。藥盡病除。

四 生山藥搗汁半碗。入甘蔗汁半碗。和勻。燉汁飲之。立止。

五 猪爪甲二枚。燒灰研細。入麝香當門子一枚。同研細。用蠟茶清調下。(奇效良方)

六 杏仁。桃仁。各半兩。去皮尖。炒妍。水調生麵和丸。梧子大。每服十九。薑蜜湯下。微利為度。(聖濟總錄)

七 韭汁飲一升。效。(集簡方)

八 蘿蔔搗汁飲之。(聖惠方)

九 故錦一寸。燒灰。茶服神效。(普濟方)

十 上氣喘氣。時有嗽。效。茶子。百合。等分為末。蜜丸。梧子大。每服七丸。新汲水下。(聖惠方)

十一 馬兜鈴二兩。去殼及膜。酥半兩。入碗內。拌勻。慢火炒乾。甘草炙一兩。為末。每服一錢。水一盞。煎六分。溫呷。或噙之。(簡要集眾方)

十二 氣喘難卧者。用鳧角炙研。蜜丸。每服一丸。

十三 白果三十二個。杵碎。米泔煎湯飲。

十四 青橘皮一片。入巴豆一粒。麻線繫定。火上燒煙盡。存性。為末。生薑汁酒一杯。呷服之。到口便定。真神方也。

【痰喘】痰氣哮喘。用馬蹄香焙研。每服二三錢。正發時。淡醋調下。少頃吐出痰涎。為驗。(普濟方)

二 肺濕痰喘。甜葶藶炒為末。棗肉丸服。(摘元方)

三 用九尖蓖麻葉三錢。飛過白礬二錢。以猪肉四兩薄批。搽藥在內。荷葉裏

之文武火煨熟。細嚼。白湯送下。名九仙散。(子和方)

四 款嗽痰喘。不問年深日近。用經霜蓖麻葉。經霜桑葉。御米殼蜜炒。各一兩。為末。蜜丸。彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。(普濟方)

五 猪蹄甲四十九個。淨洗陰乾。每甲納半夏白礬各一字。入罐封閉。勿令煙出。火煨赤。去火。細研。入麝香。用糯米飲下一錢。小兒服半錢。(奇效良方)

六 蘿蔔子炒。杏仁去皮尖炒。等分。蒸餅丸。麻子大。每服三五丸。時時津嚥。(醫學集成)

七 梨一個。剝空。納小黑豆令滿。留蓋合住。繫定。糖火煨熟。搗作餅。每日食之。效。(醫方摘元)

八 齶喘痰氣。苦丁香三個。為末。水調服。吐痰即止。(集驗方)

九 柏樹皮。去粗搗汁。和飛麵作餅。烙熟。清晨食三四個。吐下鹽涎。乃佳。如不

行熱茶催之(摘元方)

⑩多年陳白規殼燒過存性為極細末以米飲調服一錢日三服(急效方)

⑪桔梗一兩童便半升煎四合去滓溫服(聖惠方)

⑫海浮石滑石甜杏仁薄荷各淨末四錢每服二錢百部煎湯下

⑬半夏二錢炙甘草皂角炙黃各錢半生薑一錢水煎服

⑭寒痰喘喘者用野芫荽汁和酒服即住(集簡方)

⑮胡桃肉三個生薑三片臨卧服後飲湯三兩呷又嚼桃薑如前數又飲湯勿行動即就枕旦則喘效止痰亦不復作(洪邁筆記)

⑯老年氣喘蘿蔔子炒研末蜜丸梧子大每服五十九白湯下(濟生秘覽)

⑰生薑汁五兩黑沙糖四兩水煎二十沸時服半匙漸漸嚥之

⑱遠年哮喘雞子略敲損浸童便中三

四日煮食良(醫學集成)

⑲不蛀皂角三大莖刮去黑皮刀切開去子每子食內入巴豆肉一粒合就麻皮縛定用生薑自然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃為度劈開去巴豆不用又以好明礬一兩粘過蓖麻子七粒生薑汁和蜜再塗炙前皂角三味同為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏却與前藥和勻每服一錢用柿子乾炙過候冷點入藥內細嚼臨睡服忌熱毒魚鮓鮭魚油麵酒米醋煎炒熱物(奇效良方)

⑳體質者用蘿蔔子一合研碎水煎服效

㉑腹脹喘滿用山豆根為末一錢滾湯調服(聖惠方)

㉒冷飲成喘用竹葉三斤橘皮三兩水一斗煮取三升去滓三日服畢愈

㉓大錢七文洗淨白梅七個水一盞同浸三宿空心一呷良久得吐效(仁

存堂方)

㉔喘嗽蒲葍葉焙碾為細末米飲調服二錢取差(中藏經)

㉕上氣喘嗽煩熱食即吐逆用沙糖薑汁等分相和慢煎二十沸每嚥半匙效(集驗方)

㉖虛寒喘熱者用胡桃生薑嚼服

㉗大鬱喘效用知母杏仁煎服

㉘用殭蠶細茶為末等分臨卧調服

㉙喘促浮腫兼小便淋漓者杏仁一兩去皮尖熬研和米煮粥空心食二合(食醫心鏡)

㉚冷哮扁老南瓜一個挖蓋去子入大麥糖二斤候冬至蒸一時為度每晨取二調羹滾水沖服

㉛哮喘每晨飲豆腐漿以愈為度

㉜白前研末溫酒調服二錢

㉝蘿蔔子一合煎湯服

㉞海螵蛸焙末大人五錢小兒二錢紅沙糖調服

⑤夏秋間清晨。收取荷葉上露水。和飴糖常食之。一切哮喘。無不斷根。靈驗異常。(聖濟總錄)

【痰哮】浸濕海帶四兩。煎湯。調飴糖服。

②淡豆腐每晨飲之。

③漂淡陳海蜃皮。煎湯。生蘿蔔搗汁和服。

【醋哮】用粉甘草二兩。去皮。破開。以豬膽六七枚取汁。浸三日。炙乾為末。蜜丸。清茶下三四十九。漸愈。(聖濟總錄)

【鹽哮】用白麵二錢。沙糖搜和。以糖餅灰汁捏作餅子。放爐內煨乾。剗出。切作四塊。以輕粉四錢另炒。揅入餅內食之。吐痰即愈。(證治準繩)

【哮喘】白鳳仙花全料。冷開水洗淨。泥汚。連根帶葉。搗爛絞汁。須稱準分量。加上好高粱。如汁有一兩。加高粱一兩。向日曬之。候溫。以手蘸汁。輕拍膏肓穴。隨蘸隨拍。初覺微冷。旋熱。旋辣。

繼而微痛乃止。用巾揩乾。勿使受風。連行數日。輕者即愈。(圖經)

④ 心胃病單方

【心痛】雞子一個。打破。醋兩合。調服。

②香樟樹皮。刮去面上黑黃。用第二層皮搗碎。煎湯服。即止。永不再發。(本草綱目)

③菜豆二十一粒。胡椒十四粒。同研。白湯調服。即止。

④烏梅一個。棗二枚。杏仁七粒。一同搗爛。男用酒。女用醋。(海上仙方)

⑤硃砂。枯礬。等分為末。沸湯服。

⑥春耳燒存性。熱酒服二錢。(瀕湖集簡方)

⑦大馬兜鈴一個。燈上燒研末。溫酒服。效。

⑧陳倉米燒灰。和蜜服之。即止。(不藥良方)

⑨晚蠶沙一兩。滾湯泡過。濾取清水服之。即止。

⑩伏龍肝末一匙。熱則用溫水。冷則

用酒調服。(外臺秘要)

①良薑。厚朴。薑汁炒。靈脂。各等分為末。每一錢。醋湯下。

②心痛不止者。敗筆頭三個。燒灰。天落水服。效。

【心痺痛】用良薑。檳榔等分。俱炒為末。米湯調服。

②服藥已止。而後痛者。用元明粉一服。立止。

③心痺氣痛。氣實有痰者。蝦牡蠣粉。酒服二錢。

【急心氣痛】釜底墨二錢。熱童便調下。

②古錢一個。打碎。大核桃三個。同炒。熱入醋一椀。沖服。(楊誠經驗方)

③生麻油一合服。

④猪心一枚。每歲入胡椒一粒。如二十歲。入二十粒。同鹽酒煮食。(食醫心鏡)

⑤五靈脂錢半。炮乾薑三分。為末。熱酒服。

⑥ 辛心氣痛。牙關緊閉欲絕者。老葱白五莖。去皮鬚。搗膏。以匙送入咽中。再灌麻油四兩。效。

【蝟蟲心痛】用六畜心。生切作四瓣。縱橫割路。夾硃砂。或雄黃於中吞之。

【蝟蟲心痛】作痛如刺。口吐清水者。白熟艾一升。水三升。煮服。或生艾搗汁。五更食香脯一片。乃飲汁。

【心腹諸痛】元胡索。五靈脂。草豆蔻仁。飯色煨。沒藥等分。為細末。每用二三錢。熱酒調下。效。

【積年心痛】濃煮小蒜。飽勿著鹽。效。

【心氣怔忡】人參。當歸各五錢。用猪腰子一對。以水二椀。煮至一椀半。取腰子切細。與人參。當歸同煎至八分。空心食。腰子以汁送下。其滓焙乾。為末。

以山藥末和丸。如菜豆大。每服五十丸。粟湯下。不過二三服。即愈。(百一選方)

② 龍眼核一斤。去黑皮。長流水煮極爛。

加大烏棗一斤。去核。搗爛如泥。和丸。每晨淡鹽湯下三錢。即愈。(楊氏家藏方)

【結氣心痛】人參一兩。橘皮去白一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每米飲下五六十九丸。

② 刺蝟心。刮取帶血。掛簷下。風乾。研末。用陳酒。或開水冲服。甚效。(千金方)

【心痛吐水】飲食不下。發止不定。用雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾蒸餅和丸。梧子大。每服七丸。薑湯下。(聖惠方)

【心痛徹背】赤石脂。乾薑。蜀椒各四分。附子炮二分。烏頭炮一分。為末。蜜丸。梧子大。先服一丸。不止。再服。(金匱玉函)

【心中嘈雜】此症似餓非餓。似痛非痛。得食暫止。可用猪護心油。蒸糯米食。即愈。(活法機要)

② 水仙花子。同荷葉芍藥為末服。(本草拾遺)

【惡心吞酸】蘿蔔生嚼數片。或嚼生菜。亦佳。(瀕湖集簡方)

② 核桃嚼爛。薑汁送下。(明醫雜著)

③ 凡食入即欲吐者。係胃冷也。用白豆蔻子三粒。搗細。好酒一盞。溫服。併飲數服。甚佳。(張文仲備集方)

【消渴】白芍藥。甘草等分為末。每用一錢。水煎服。日三服。(陳日華經驗方)

② 生芭蕉根搗汁。時飲一二合。(聖惠方)

③ 取稻糠中心。燒灰。每以水浸一小杯。澄清飲之。(危亦林得效方)

④ 晚蠶沙焙乾為末。每用冷水下二錢。不過數服。即愈。(斗門方)

⑤ 黃雌雞一隻。治淨。煮汁冷飲。並作羹食肉。(食醫心鏡)

⑥ 白茅根洗淨。搗汁。恣飲。必愈。

⑦ 冬瓜瓢或留葉。不論鮮乾。並煮汁飲。

⑧ 黃連煎服。甚效。

⑨ 頰食生梨亦佳。

⑩ 菜豆煮汁煎作粥食。

⑪ 好梨汁蜜湯熬稠不時服。

⑫ 鯽魚去腸留鱗茶葉填滿紙包煨熟食數尾。

⑬ 消渴引飲白浮石蛤粉蟬蛻等分為末鯽魚膽汁七個調服三錢效。

⑭ 雄雞湯澄清飲神效白者尤佳。

⑮ 菟絲子煎汁任意飲。

⑯ 冬瓜一個燒熟絞汁飲。

⑰ 生蘿蔔汁瓦器熬稠入熟蜜少許同收點湯。

⑱ 小麥作飯及粥食。

⑲ 冬瓜瓤乾者一兩水煎飲。

⑳ 消渴引飲兼小便利者葵根五兩煮汁平旦日一服。

㉑ 炙括萋根煮飲之亦佳。

㉒ 消渴飲水日夜不止小便數者田螺五升水一斗浸一夜渴即飲每日一換水及螺或煮飲汁亦可。

〔下虛消渴〕心脾中熱下焦虛冷用牛

羊乳每飲三四合廣利方

① 生地熟地俱用竹刀切麥冬先酒浸一日次鹽湯浸二日冬天酒浸三日

各一斤西洋參八兩去皮蒸熟用甘

泉水入沙鍋煎去滓熬膏和入薯蕷

粉丸梧子大每晨鹽湯下五七十九

〔胃虛消渴〕羊肚煮爛空心食之〔古

今錄驗方〕

〔胃熱消渴〕以陳粟米炊飯乾食之良

效〔食醫心鏡〕

〔積熱消渴〕白瓜去皮每食後食二三

兩數次便止〔食療本草〕

② 常食菘菜亦殊有效〔食醫心鏡〕

〔消渴尿多〕黃連末蜜丸梧子大每服

三十九白湯下

③ 薈薇根一握煎服

④ 竹瀝恣飲數日即愈

〔腎消〕時時飲水小便如膏油茴香炒

苦楝子各等分為末每食前酒服二

錢

⑤ 黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下

〔消渴有蟲〕苦楝根白皮一握切焙入

麝香少許煎空心飲雖困頓不妨

〔消渴變水腫〕真蘇子蘿蔔子等分微

炒研末桑白皮湯煎調末三錢服

〔老人消渴〕寒食大麵一升水煎五升

入飴糖二合渴即飲之大效〔奉親

養老書〕

〔消食〕綠豆小麥糯米各二升炒熟磨

粉每白湯服三五杯

⑥ 雄猪肚一具洗淨入黃連五兩花粉

麥冬知母各四兩線縫口蒸爛搗細

蜜丸梧子大每米飲下百丸

〔食積〕蓖麻油牛乳等分煮沸入糖少

許冷服〔本草綱目〕

⑦ 飯搓成團加鹽少許燒枯煎水飲下

即消〔千金方〕

⑧ 牽牛末一兩巴豆霜三個研末水丸

梧子大。每服二三十丸。食後隨所傷湯下。(子和方)

糯米成積 神麴炒為末。加木香。鹽開水下。數日。口中必聞酒香。其積即消。

(奇效良方)

食麴成積 生蘿蔔取汁。燉服。極效。凡食麴加醋少許。斷不致積滯。(肘後方)

索粉成積 索粉俗稱線粉。用杏仁五十粒去皮共蒸熟搗爛。滾開水冲服。

(箇中秘寶方)

米穀成積 大麥芽煎服。即消。

雞蛋成積 飲好醋或豆豉水。即消。(簡要濟眾方)

用冰水化鹽。令吞之。蛋自立消。(千金方)

魚肉成積 山查炭研末為丸。每服四錢。數次即愈。(濟生方)

牛肉成積 乾稻草一握。煎濃湯熱飲。自消。(延年秘錄)

羊肉成積 栗子殼煎湯。服之即愈。(延年秘錄)

稻草切斷。冲湯服之。效。肘後方

食菱成積 取生薑汁飲下。立消。(乾坤秘韞)

食苳成積 生蘿蔔煎飲之。即消。(名醫別錄)

食麥成積 粟子殼煎湯服之。良。(楊春經驗方)

生棗成積 生棗。俗名白葡萄。可用大麥炒熟。研為細屑。加糖與之混合。乾食之一瀉即愈。(陶華六書)

諸果成積 桂心五錢。麝香五分。細研。飯丸。菜豆大。每服十五丸。

食桃成積 桃梟燒灰二錢。水服。取吐即愈。(張文仲備急方)

飲茶成積 蒼朮一兩。製南星。青皮。橘皮各三錢。醋煮。蒸餅丸。如梧子大。淡薑湯下。二三十丸。

白朮一斤。乾薑炮。桂心各半斤。為末。

蜜丸。梧子大。每溫水服二三十丸。(局方)

川椒炒。碾末。糊丸。梧子大。每服十丸。茶湯下。簡便方。

飲酒成積 雞內金。乾葛等分為末。蒸餅丸。梧子大。每酒下五十丸。(袖珍方)

五靈脂末一兩。入麝香少許。飯丸。小豆大。每米飲下一丸。(普濟方)

腎積 奔豚。上氣疼痛。茯苓四兩。小茴香四兩。研末。水為丸。開水下三錢。驗。

脾積 黃半牛腦子一個。去皮筋。搗爛。皮硝末一斤。蒸餅六個。曬研和勻。糊丸。梧子大。每服二十九丸。酒下。日三服。百日有驗。

奔豚氣痛 搗蘆汁服。

猪脬一具。切塊。炙熟。蘸延胡索末。頻食。

枳實末。每服一匙。日三次。夜一次。

氣癖 在小腹上。攻衝心痛。穿山甲片。

土炒脆為末。砂糖調陳酒送下。每服三錢。止痛如神。如不能飲糖酒。調亦可。

【癖塊】在腹中攻痛。面黃肌瘦。真陳阿膠一兩。蛤蚧炒鬆研細。丸製陳膽星五錢。入乳浸。微火烘研。貝母一兩。去心。麝香四分。忌見火。斃甲三枚。必須九骨七骨者。真麻油炙脆黃研。共為細末。真柏油二兩。火鎔開。入前藥末。在內攪和。每服用腐衣包藥。約一分半。茶酒送下。清養三色飯後三色。

【二】每日空心將散花三四匙。沖熱陳酒內服。至十日不動。服一二月。可消盡矣。外用敷之。

【三】生芋為敲爛。燒酒浸漬半月。飲之。【痞積】雄黃一兩。白礬一兩。麵糊調膏貼之。即見功效。未效再貼。無有不愈。

【集驗方】

【二】水花紅子一椀。清水三椀。用桑柴文武火煎成膏。量痞大小攤貼。仍以酒

調膏服。忌葷腥油膩之物。（劉松石保壽堂方）

【三】桔梗枳殼等分。水二杯。煎成一杯。溫服。（朱眩活人書）

【食生米癖】蒼朮末泔水浸一宿。對焙為末。蒸餅丸。梧子大。每服五十丸。食前米飲下。日三服。（經驗方）

【食髮成癖】心腹作痛。咽間如有蟲上下者。用豬脂二升。酒三升。煮服。

【食茶成癖】每日食榧子七枚。以愈為度。（簡便方）

【食飽煩脹】大麥麵炒微香。每白湯服一錢。佳。（肘後方）

【二】酒肉過多。脹滿不快。用鹽花擦牙。溫水漱下二三次。便如湯沃雪也。（簡便方）

【三】用不著鹽水。猪血澆去。曬乾為末。酒服取泄甚效。（李樓奇方）

【痰癖癥積】鼈甲醋炙黃研末。牛乳一合。每調一匙。日日服之。

【二】水紅花半老。穗頭連葉帶子曬乾。不拘多少。蒜頭去皮膜。同入石臼打爛。捏成餅。曬為末。每斤入蚶子殼煨粉四兩。再將老蒜打膏為丸。梧子大。每服百丸。空心食後白湯下。一日三服。效。

【痰飲】頑痰不化。石青一兩。石綠半兩。並水飛麵糊丸。菘豆大。每服十丸。溫水下。吐去痰一二椀。不損人。（瑞竹堂方）

【二】痰結胸中不散。蜜陀僧一兩。醋水各一盞。煎乾為末。每服二錢。以酒水各一小盞。煎一盞。溫服。少頃當吐出痰涎為妙。（聖惠方）

【三】痰飲頭痛。兼往來寒熱者。雲母粉二兩。鍊過恆山一兩。為末。每服一錢。湯服。取吐。忌生葱生菜。（深師方）

【四】礬石一兩。水二升。煮一升。納蜜半合。頻服。須臾大吐。未吐飲稍熱湯引之。（外臺秘要）

(五) 砂仁搗碎。以蘿蔔汁浸透。焙乾為末。每服一二錢。食遠。沸湯服。(簡便方)

(六) 冷痰惡心。葦荻一兩為末。食前。用米湯服半錢。(聖惠方)

(七) 停痰宿飲。風氣上攻。胃膈不利。香附。皂莢水浸。半夏各一兩。白礬末半兩。薑汁麩糊。丸梧子大。每服三四十丸。薑湯隨時下。(仁存堂方)

(八) 薄荷末煉蜜。丸芡子大。每噙一丸。白沙糖和之。亦可。(簡便方)

(九) 恆山甘草各一兩。水五升。煎取一升。去滓入蜜二合。溫服七合。取吐。不吐更服。(千金方)

(十) 半夏洗泡焙乾為末。自然薑汁和作餅。濕紙裏煨香。以熟水二盞。同餅二錢。入鹽五分。煎一盞服之。治痰毒及酒食傷。極驗。(斗門方)

(十一) 半夏泡七次。四兩。枯礬一兩為末。薑汁打糊。或煮棗肉和。丸梧子大。每薑湯下十五丸。(和劑局方)

(十二) 風氣隔上。痰飲不開口。苦瓠湯煮三五沸。物裏。熨心膈上。(袖珍方)

(十三) 飲酒痰癆。兩脅脹滿。時復嘔吐。腹中如水聲者。括萆實去殼焙一兩。神麩炒半兩為末。每服二錢。葱白湯下。(聖惠方)

(十四) 白芥子五錢。白朮一兩為末。棗肉和搗。丸梧子大。每白湯服五十丸。(摘元方)

(十五) 痰飲宿水。收桃花陰乾為末。溫酒服一合。取利。覺虛。食少粥。(纂要方)

(十六) 橘皮半兩。微熬為末。水煎代茶。細呷。(食醫心鏡)

(十七) 厚朴一兩。薑汁炙黃。為末。非時。米飲調下二錢。(聖惠方)

(十八) 瓦楞子殼。不拘多少。炭火煨研末。候括萆黃熟。時搗和。凡粉作餅。子曬乾。為末。用蜜湯調一錢。或入諸藥為丸。甚效。(經驗方)

(十九) 皂角三十挺。去皮切。水五升。浸一夜。

按取汁。慢熬至可丸。丸梧子大。每食後。鹽漿水下十九丸。(簡便方)

(二十) 生南星。刮去皮。半夏湯泡七次。各五兩為末。以薑汁和為餅。以楮葉蓋之。令發黃色。曬乾。須五六月內。做合時。用香附子一兩。製如常法。以陳麩二錢。共為末。水糊。丸梧子大。每服四十丸。食後薑湯下。(經驗方)

(二十一) 百藥煎。細茶各一兩。荊芥穗五錢。海螵蛸一錢。蜜丸。芡子大。每服噙一丸。妙。(筆峯雜興)

(二十二) 絲瓜一條。燒研細末。棗肉為丸。彈子大。每服一丸。好酒化下。(經驗方)

(二十三) 茯苓。吳茱萸。等分。蜜丸。效。

(二十四) 交九前一日。用布攤陽和膏藥。貼脊背第三骨節。膏藥磨破。再換貼九。盡方已。老人用此最靈。

肝胃氣痛 木瓜一錢。吳茱萸五分。鹽一錢。為末。白滾湯下。

(二十五) 胡桃肉一個。以大棗肉一枚夾之。濕

紙裏煨熟。細嚼生薑湯下。

三 鯪鮓淡煮飽。啖殊效。

四 手指甲剪下。洗淨。新瓦上炙脆。為末。約四五分。入砂糖少許。酒調食。遠服。男痛用女右。女痛用男左。

五 香附子略炒五兩。烏藥略泡二兩。共研細末。水醋煮蒸餅。和丸。梧子大。每服二三錢。白湯下。

六 香附倍用。黃連減半。擇淨料製為極細末。水糊丸。梧子大。陳皮湯下一二錢。火盛者。薑汁炒。梔子煎湯下。

七 胃脘劇痛。諸藥不效者。牙皂燒存性。研末。以燒酒調服。錢許。效。

八 烏梅二箇。鮮橘葉三錢。青鹽二分。真川椒二錢。空心服。

九 福建荔枝樹根四兩。猪肉一斤。同入鍋煮爛。淡食之。便永不復發。累驗。

十 野豬胃煨灰。沖紹酒服之。亦效。

十一 豬膽一個。香附子三錢。共焙。研細。分兩次。開水沖服。即愈。

十二 夏枯草一斤。精猪肉去皮膜四兩。煎成兩大椀。代茶飲之。連服數次。深者痛即漸瘥。淺者即永止。不發。屢試屢驗。

十三 延胡索一錢。高良薑一錢五分。草果仁一錢。製乳香一錢五分。煎湯服。(陳日華經驗方)

十四 海參腸子一條。用瓦焙烤。研成末。開水服下。即愈。神效。

十五 鮮香椿數個。連皮搗極爛。稍加冰糖。置瓷器中。每晨取一調羹。開水一杯。空心沖服之。連服百日。不可間斷。其病自愈。永不復發。

十六 雞蛋糕不拘多少。瓦上焙焦。研末。以鮮佛手泡茶送下。味既香甜可口。服後痛可立止。若再於痛止後連服一次。竟能斷根。屢驗。

十七 生雞蛋殼置瓦上焙焦。研末。以鮮佛手片泡茶送下。最多服二次。即可斷根。

十八 噎膈用北庭砂二錢。水和蕎麥麵包之。煨焦待冷。取中間濕者。焙乾。一宿。入檳榔二錢。丁香二個。研勻。每服七釐。燒酒送下。日三服。愈。即止。後進白粥半月。仍服助胃丸藥。(千金方)

十九 馬蹄香四兩。為末。好酒三升。熬膏。每服二匙。好酒調下。日三服。(金匱玉函)

二十 端午採頭次紅花。無灰酒拌焙乾。血竭瓜子樣者。等分為末。無灰酒二盞。隔湯煨熟。徐嚥。初服三分。次日四分。三日五分。(簡便方)

二十一 甘遂麵煨五錢。南木香一錢。為末。壯者一錢。弱者五分。水酒調下。(怪證奇方)

二十二 威靈仙一握。醋蜜各半盞。煎五分。服之。吐出宿痰。愈。(經驗方)

二十三 隔山消二兩。雞肫皮一兩。牛膝。南星。硃砂各一兩。急性子二錢。為末。煉蜜丸。小豆大。每服一錢。淡薑湯下。(經

驗方)

七 蕎麥稍燒灰淋汁入鍋內煎取白霜一錢入蓬砂一錢研末每酒服五分

(海上方)

八 赤稻細稍燒灰滾湯隔絹淋汁三次

取汁入丁香一枚白豆蔻半枚米一盞煮粥食神效(摘元方)

九 陳倉米炊飯焙研每五兩入沈香末半兩和勻每米飲服二三錢(普濟方)

方)

十 蘿蔔蜜煎浸油細嚼嚙良(普濟方)

十一 菓澄茄白豆蔻等分為末乾舂之(壽域神方)

壽域神方)

十二 用大鯽魚去腸留鱗切大蒜片填滿紙包十重泥封曬半乾炭火煨熟去皮取肉和平胃散末一兩杵丸梧子

大蜜收每服三十九米飲下(經驗方)

十三 卒噎捻取飯盆零飯一粒食之即下(千金方)

十四 皮屑研極細末蜜丸彈子大小少嚙

即下

十五 昆布一兩洗去鹹水小麥二合水三盞煎至小麥爛去渣不拘時每服一小盞仍取淨昆布頻含二三片津嚙

下有効(千金方)

十六 以手巾包杵頭糠時時拭齒刮舂米杵頭細糠煎湯呷之亦可(千金方)

十七 用雞嗉子兩個帶宿食用紙裹外用黃泥固濟炭火燒煙盡為度取出去泥嗉子內宿食不可動入木香丁香

沈香各一錢共為細末用大棗煮熟去皮核研和丸梧子大每服三十九米飲下(千金方)

十八 蘆根五兩對水三盞煎二盞不拘時溫服時時服之尤効(千金方)

十九 白猪肚連食烘乾為末每服二三錢酒調下(千金方)

二十 千葉槿花陰乾為末老米湯調送一錢三五口不轉再將飲調藥送下(千金方)

二十一 揀蒲公英高尺許者掘下數尺擇根大如拳者搗汁和酒服如神

二十二 燕窩脚色紅紫名血燕者煎服効

二十三 老蘇梗泡水和麵粉預於日食時在日中搓成丸如梧子大須即日曬乾其丸皆中空白湯送下神効

二十四 人乳牛乳蔗漿梨汁蘆根汁龍眼肉濃汁人參濃汁俱等分加薑汁少許隔湯熬成膏下煉蜜徐徐頻服効

二十五 糖坊內上好糖糟一斤打爛加水薑四兩搗作小餅曬乾放瓷瓶內置竈煙櫃上每晨取餅一枚泡滾水內少停飲湯驗

二十六 常食粳米飯即不噎(千金方)

二十七 噎隔能飲不能食雞十餘隻煮汁飲如覺直達於下漸可以雞煮粥食効

二十八 糯米裝翻毛雞腹內煮爛食効

二十九 荔枝一個去核蜒蚰一條放在內冰片三四釐搽蜒蚰上將荔枝肉裏好仍放殼內紮好令病人含口內有冷涎

水滲出徐徐咽下一時許。蛇蚰化完亦無水滲出連殼吐去可進飲食。

④生藕汁生薑汁雪梨汁蘿蔔汁甘蔗汁蜂蜜白果汁竹瀝各一盞和勻飯上蒸熟任意食。

⑤黑砂糖一斤連皮老生薑一斤共搗如泥入瓷罐內封固埋乾燥淨黃土地內七日取出每日和滾水服。

⑥蜜炙蘿蔔細嚼任意食之。

⑦老桑梢柚即多年老桑數被剪伐嫩條其枝頭長成如拳者是燒紅存性為末好酒送下即愈(集驗方)

⑧柿蒂六枚丁香一錢水兩碗煎煮滾逐口徐飲之再用艾葉一團同高粱酒週身擦之即愈(朱肱活人書)

⑨淨牛乳以當面取者為佳少加白糖時時燉熱飲之凡患此者多大便秘結服此必效(經驗濟世方)

⑩姜薺數個揀大者貯旱煙筒中歷一二年煮湯服下其病立愈。

⑪柿蒂三錢入飯碗水約半碗置鍋中煮至汁出為度服下即止。

⑫表信紙捲紙煤發時搥之熄火留煙於他端吸之如吸煙然登時即愈。

⑬取新鮮麻葉搗汁服之無青葉則取其子每日吞十粒不可間斷自然漸愈。

⑭紙摺採鼻取嚏即愈(醫方摘要)

⑮「呃逆」蘆根煮濃汁飲佳。

⑯以枇杷葉濃煎飲殊效。

⑰橘皮竹茹等分煎服。

⑱呃逆不止荔枝十個連殼燒灰為末白湯下效。

⑲刀豆子燒灰並白湯調服效。

⑳半夏五錢生薑二錢半水煎服。

㉑即剪自己指甲少許塞在煙捲內燒而吸其煙遂即自止(本事方)

㉒目視日光或燈光取嚏數個呃逆即止(累驗)

㉓噉冰塊一小片立止。

⑩依的兒製額草酒薄荷油一分混和一次服二十滴並於心窩塗樟腦精或火酒少許(日本藥局方)

⑪干槌花即槌柄木燒灰研細酒服大效。

⑫黃連一錢紫蘇葉八分煎湯服之神效。

⑬黃蠟燒煙熏二三次即止(醫方摘要)

⑭用燈草一小束燒灰熱水沖服立即止呃。

⑮「陰寒呃逆」乳香硫黃陳艾各二錢為細末用好酒一杯煎數滾乘熱用鼻嗅之外用生薑擦胸前最效(景岳全書)

⑯「噫氣」久患效噫者生薑汁合蜜一匙煎溫呷三服愈(外臺秘要)

⑰橘皮二兩去穢水一升煎五合頓服或加枳殼尤良(孫氏方)

⑱川椒四兩炒研麵糊丸梧子大。

十九 醋湯下神效。(經驗方)

四 取崖蜜含微微嚥下。(廣利方)

五 花椒芝麻等分為末蒸餅為丸梧子大每服十九丸茶湯下

六 傷寒呃噎日夜不定者用薑澄茄高良薑各等分為末每服二錢水六分煎十沸入醋少許服之。(圖經)

七 枳殼半兩木香一錢為末每白湯服一錢未知再服(本事方)

嘔氣旋覆花三錢蘇葉三分煎湯溫呷必效

嘔吐麻仁杵爛水研取汁著鹽少許噉食立效(外臺秘要)

陳梅醬煎濃湯有火加竹茹有寒加豆寇或砂仁或煨薑如無梅醬則以烏梅代之

三 真火酒一杯新汲井水一杯和服妙

(集靈簡方)

四 蘆根煎濃汁頻飲

五 半夏三錢糯米一錢生薑一片紅棗

三枚煎服

六 竹瀝拌米煮爛飯服下

七 頓服生熟湯三升即止

八 用北黃丹四兩米醋半斤煎乾炭火三秤就鈔內煨紅冷定為末粟米飯丸梧子大每服七丸醋湯下(集驗方)

嘔吐清水乾蘆艾煎湯噉之(怪證奇方)

嘔吐酸水黑山梔三錢煎濃汁入生薑汁少許和服

黃連六分吳茱萸一分煎湯飲

氣逆嘔吐川連三四分蘇葉二三分煎服

饑餓嘔吐凡人饑餓每作欲吐之狀宜用川椒煎湯服即安(集驗方)

胃熱嘔吐蘇葉一分黃連二分徐呷下

胃寒嘔吐大黑棗七個去核入丁香煮爛去丁香將棗連湯空心服七服

自愈

濕熱嘔吐川連三分蘇葉二分煎湯呷

上氣嘔吐芥子蜜丸梧子大寅時井水空心服七丸以酒浸服亦得

蘿蔔蜜餞細嚼嚥

虛逆嘔吐好醬油開水調服

乾紅蓮子細嚼嚥

中酒嘔吐赤小豆煮汁徐服

嘔吐綠水韭汁入薑汁少許和服

暴得嘔吐生滑石末二錢溫水服壓以細麵半盞

見食即嘔生薑二兩打碎陳皮五六錢切碎泡湯一椀漸漸服下自安甚者竹瀝薑汁和勻逐匙挑在古上咽下若咽急并藥吐出矣

乾嘔頻嚼生薑即止生薑乃嘔家聖藥也

用甘蔗汁加生薑汁和勻溫熱服(應驗良方)

【翻胃嘔吐】以豆蔻仁和冰糖塊含入口中。數分鐘即止奇效。

二白堊土煨赤。以米醋一升淬之。再煨再淬。醋乾為度。取一兩研。乾薑二錢半。炮為末。每服一錢。調下。服至一升以上為妙。(千金方)

三多年老病。以紫背鉛二兩。燒鉛。以鹽鹵汁五兩。焯盡。與石葶脂二兩同炒。焰起。挑水於上。焰止。研勻。蒸餅丸。梧子大。每服二十九。煎石蓮乾柿湯下。(聖濟總錄)

四靈砂一兩。蚌粉一兩。同炒。赤丁香胡椒各四十九粒。為末。自然薑汁煮。半夏粉糊。丸梧子大。每薑湯下二十九。(普濟方)

五白礬硫黃各二兩。銚內燒過。入硃砂一分。為末。麵糊丸。小豆大。梅薑湯下十五丸。(千金方)

六粘礬三兩。蒸餅丸。梧子大。每空心米飲十五丸。(普濟方)

七黨參三大兩。拍破水一大升。煮取四合。熱服。日二服。兼以人參汁入粟米雞子白。蘆白。煮粥。與啾。當時便定。(兵部手集)

八京三稜炮一兩半。丁香三分。為末。每服一錢。沸湯點服。(聖濟總錄)

九鷲粟米三合。人參末三大錢。山芋五寸。細切。研。三物以水二升三合。煮取六合。入生薑汁及鹽花少許。和勻。分服。不計早晚。亦不妨末服湯丸。(圖經)

十棠梨葉油炒。去刺為末。每旦酒服一錢。(山居四要)

十一乾柿三枚。連蒂搗爛。酒服甚效。切勿以他藥雜之。(山居四要)

十二用大鯽魚一尾。去腸留鱗。入綠礬末。令滿。泥固。煨存性。研末。每末飲服一錢。日二服。(本事方)

十三石蓮肉為末。入少肉豆蔻末。米湯調服之。(直指方)

十四母丁香一兩。為末。以鹽梅入搗。和丸。芡子大。每嚙一丸。(直指方)

十五母丁香。神麴炒。等分為末。米飲服一錢。(直指方)

十六蠶繭十個。煮汁。烹雞子三枚。食之。以無灰酒下。日二服。神效。或以繅絲湯煮粟米粥食之。(惠濟方)

十七陳年窰土。為末。米飲湯服三錢。甚驗。(百一選方)

十八雞內金一個。燒存性。酒調服。男用雌。女用雄。(千金方)

十九白芥子末。酒服一二錢。(普濟方)

二十純酒釀。去米粒。以半酒杯好醬油。與半酒杯甜酒。和勻。溫服。

【吐血】用伏龍肝末半升。新汲水一升。淘汁。和蜜服。(廣利方)

二十一吐血不止者。用京墨磨汁。同蘿蔔汁飲。或生地黃汁亦可。(集簡方)

二十二鍋底墨炒過。研細。井水服二錢。連進三服。(濟急方)

④黃芪二錢半。紫背浮萍五錢為末。每服一錢。薑蜜水下。(聖濟總錄)

⑤地榆三兩。米醋一升。煮十餘沸。去滓。食前。稍熱服一合。(聖惠方)

⑥三七一錢。自嚼。米湯送下。(集簡方)

⑦黃連一兩。搗散。每服一盞水七分。入豉二十粒。煎至五分。去滓溫服。(濟東方)

⑧白茅根一握。水煎服之。將根洗淨。搗汁。日飲一合。亦得。(聖惠方)

⑨荊芥連根搗汁半盞。服乾穗為末。生地黃汁調服二錢。亦可。(直指方)

⑩白雞冠花醋浸。蒸七次為末。每服二錢。熱酒下。(經驗方)

⑪生地黃汁一升二合。白膠香二兩。以瓷器盛入甑。蒸令膠消。服之。(梅師方)

⑫吐血諸方不效者。麥門冬去心一斤。搗取自然汁。入蜜二合。分作二服。即止。(活人心統)

⑬天南星一兩。剉如豆大。以爐灰汁浸一宿。洗焙研末。每服一錢。以自然銅磨酒調下。(勝金方)

⑭括婁泥固。煨存性。研三錢。糯米飲服。日二服。(聖惠方)

⑮黃藥子。蒲黃等分為末。掌中舂之。或用生芝麻油調二味。舂之一方。用黃藥子。漢防己各一兩為末。每服一錢。小麥湯。食後調服。一日二服。(聖惠方)

⑯槐花燒存性。入麝香少許。研勻。糯米飲下三錢。(普濟方)

⑰乾荷葉。生蒲黃。等分為末。每服三錢。桑白皮煎湯調下。或用麥冬湯下。亦得。(聖濟總錄)

⑱鱧膠長八寸。廣二寸。炙黃。刮二錢。以甘蔗節三十五個。取汁調下。(經驗方)

⑲蠶退紙燒存性。蜜和。丸如芡子大。含化嚙津。(集驗方)

⑳紅錦三寸。燒灰水服。(聖惠方)

㉑白薄紙五張。燒灰水服。效不可言。(普濟方)

㉒白藥燒存性。糯米飲服三錢。(聖惠方)

㉓枸杞根子皮為散。水煎。日日飲之。(聖濟總錄)

㉔用藕節。荷蒂各七個。以蜜少許搗爛。用水兩杯。煎八分。去滓溫服。或為丸亦可。(聖惠方)

㉕雞子白三個。好香墨二兩為末。和丸如梧子大。每服十丸。不拘時。生地黃汁送下。(瑞竹堂方)

㉖晚桑葉焙研末。茶服三錢。

㉗紅皮蓮子同猪肚煮極爛。但不可放鹽。每日五更恣啖。

㉘雞子一個。打開。和三七末一錢。藕汁一小杯。陳酒半小杯。隔湯燉熱。食之。兩三枚。血自止。

㉙藕節為末。入炒蒲黃。亂髮灰等。分調。

服效。

①烏賊骨末。米飲服二錢。

②就用吐血塊炒黑為末。每服三分。

③麥冬湯調服。善能導血歸元。

④手指甲頭髮燒灰。酒調服。效。

⑤田螺十個。水漂去泥。搗爛。露一宿。五

更。取清者服二三次。雖吐血成盆。諸

藥不效者。服此亦止。神效。

⑥黃藥塗灸為末。麥冬湯下二錢。

⑦蠶豆葉煎湯服之。血即能止。如無新

鮮者。用乾者代之。亦佳。〔直指方〕

⑧鼈甲。蛤粉各一兩。同炒色黃。熟地黃

一兩五錢。曬乾為末。每服二錢。食後

茶下。〔聖濟總錄〕

⑨鮮藕切片一斤。白茅根去心一兩。梨

去柄一個。柿餅去蒂一個。鮮荷葉去

蒂三錢。紅棗去核十枚。右六味。凡遇

節氣前後數日。濃煎服之。平時亦可

代茶。頻頻飲之。永不復發。忌飲酒。

⑩白茅根。馬蘭頭。湘蓮。紅棗。各四兩。同

煎服。兩旬即愈。

⑪棕樹子煎湯飲之。不過三次。必愈。

⑫常取蘆粟啖之。自不復發。

⑬仙鶴草二錢。紅棗七枚。同煮去草。連

湯服之。無不立效。

⑭猪肺一具。男用牝猪。女用牡猪。不見

水。先用童便三大碗。灌入肺內。控乾。

竹刀割去肺心。入銅鍋內。燒炭。用文

火煎。先入好陳酒兩大碗。煎至將乾。

用生梨汁。青皮。甘蔗汁。人乳。各一大

碗。以次一一加入。再煎。待其酥爛。即

將肺管去之。再加藕汁一大碗。即轉

成膏。預備湘蓮粉一斤。淨簸箕一只。

將肺倒入箕內。蓮粉拌乾。即可製成

極小之丸。藥曬乾。貯石灰甕內。每日

早晨。空心用開水下五分。至多一二

錢。不可間斷。服完斷根。不可輕視。但

此始終忌鐵器。故凡切菜。斷甘蔗。均

須用銅刀。或竹刀。〔子母秘錄〕

⑮桑樹根皮。去粗皮。用裏白皮。燉精猪

肉。淡食數次。奇效。〔摘元方〕

⑯五 肝病單方

【黃疸】茵陳蒿一握。白鮮皮等分。水二

鍾煎服。每日二次。漸愈。〔三十六黃

方〕

⑰薏苡根煎湯。頻服。甚效。〔本草綱目〕

⑱黃疸如金。睛黃。小便赤。生蔓菁子末。

熱水調服一匙。日三。

⑲猪脂一斤。溫熱服。日三服。當利。乃愈。

⑳青殼鴨蛋。敲小孔。納朴硝。紙封。燉熟。

日三服。效。

㉑黃病。內外皆黃。小便赤。心煩口乾。秦

朮三兩。牛乳一大升。煮取七合。分溫

再服。或加芒硝六錢。

㉒生白酒煮螺螄。勿放鹽。將螺與酒儘

量食。隨即安睡。黃發出效。

㉓去殼槐黃四兩。綠蓉五錢。去核黑棗

半斤。三味同炒。漬入米醋四兩。為丸。

飯前吞服。每服三錢。

㉔雄鯽魚去頭骨。胡椒十粒。研細。麝香

三分。同春爛。將蛤蚧殼填滿。合病人臍上。用絹縛緊。

⑩茵陳蒿一握。生薑一塊。搗爛。胸前四肢。日日擦之。

⑪甜瓜蒂一兩。炙為末。男左女右。每日搗鼻數次。黃水流出色。

【穀疸】即食積黃疸也。亦名食疸。用絲瓜子燒末。每服二錢。因麵得病者。麵湯下。

⑫石膏。蒼耳。黃連各等分。粥飲湯和丸。小豆大。每服四十丸。以痊為度。(墨城小錄)

⑬龍膽一兩。苦參三兩。為末。牛膽汁和丸。梧子大。麥飲湯下。五丸。日三服。(刪繁方)

⑭豬脂一小升。溫服。日三。燥矢下。即愈。

⑮食黃鮒魚。作膾。和五味食之。

⑯梔子水煎飲。

【酒疸】茵陳。乾葛。梔子等分為末。取田螺一二個。搗爛。酒服。

⑰小麥苗。水和絞汁。每服六七合。日三服。

⑱青括。薑焙研。每服一錢。水半盞。煎七分。即時服。五更瀉下。黃物立愈。(普濟方)

⑲飲酒大醉。當風入水所致。用黃芪二兩。木蘭一兩。為末。酒服一小匙。(肘後方)

⑳田螺將水養數日。去泥。取出。生搗爛。入好酒內。用布濾過。飲汁。晨午晚各一服。效。(壽域神方)

㉑小螺。蚶。養去泥土。日日煮食。飲汁。效。

【女疸】此因經水不調。房事觸犯所致。礬石燒。消石。蒸黃。等分為末。以大麥粥汁和服。一小匙。日三服。病從大小便出。即愈。(金匱玉函)

㉒用亂髮如雞子大一團。豬脂半斤。煎令消。分二服。愈。

【勞疸】此症身面俱黃。因勞而得。用青礬。鍋內安炭。煨赤。米醋拌為末。臬肉

和丸。梧子大。每服二三十九丸。食後薑湯下。(救急良方)

⑳絲瓜連子。燒存性。為末。每服二錢。何物食積。即用何物煎湯。將藥送下。(衛生易簡方)

【黑疸】黃疸變黑。危疾也。括。薑根一斤。搗汁六合。頓服。隨有黃水。從小便出。如不出。再服。(簡便方)

【濕熱成疸】甘草一尺。梔子十五枚。黃藥三錢。水四升。煮取一升。分二次服。

㉓真青黛一分。潔白明礬五分。六釐。研細末。分七服。色開。每早空心。用雞蛋一個。去黃。瀝清。調送一服。

【陰黃】半夏四錢。生薑六錢。水煎。分三服。甚者。理中湯加茵陳。

○六 腸病單方

【蟲積】苦棟根。取東向。不露出土者。去皮。及骨四兩。史君子。去殼。二兩。生薑三兩。水五碗。煎至三碗。去渣。再煎至一碗。加白蜜四兩。又熬至一碗。露一

宿。次早隔水燉熱。空心服。一日服完。不吐不瀉。蟲從大便成團而出。少則一服。多則兩服。除根。(應驗良方)

①腹內蟲痛者。烏梅一個。老薑二片。榧子十粒。花椒十四粒。加黑糖少許。煎服。

②酸石榴東引根。濃煎。五更服。

③馬齒莧水。煮。加鹽醋。空心食之。

④生薑。生檳榔等分為末。蒸餅丸。梧子大。每白湯下二十九。

⑤雄黃水。飛半斤。熬酒數斤。朔後望前。時取雄黃與酒和。飲令常微醺。瀉盡蟲。立愈。(肘後方)

⑥【蛇蟲】攻心腹痛者。薑法根二斤。剉。水七升。煮取三升。食前服。

⑦使君子肉。火煨熟。五更食。以殼煎湯送下。

⑧縹絲蠶蛹兩合。研爛。絞取汁。頓服。非縹絲時。蠶蛹曬研細末。和粥食。

⑨蛇蟲上行者。烏梅煎湯飲。

⑩漏蘆為末。以餅攪和勻。服之。(外臺秘要)

⑪【寸白蟲】馬齒莧水。煮一椀。和鹽醋空心食之。少頃。蟲盡出。(食療本草)

⑫榧子四十九枚。去皮。於月上旬。平旦空心服七枚。七日服盡。蟲消成水。

⑬桑根白皮。切三升。以水七升。煮二升。平旦空心頓服。

⑭雷丸。水浸去皮。切焙為末。五更初。食炙肉少許。以稀粥飲。服錢許。頓上半月。蟲乃下。(經驗良方)

⑮先食猪肉一片。以沙糖調黑鉛灰四錢。五更服之。蟲盡下。食白粥一日。(醫宗必讀)

⑯棟實。醇苦酒中浸再宿。用棉裹納穀道中。頻易。

⑰【疝氣】諸疝初起。新鮮地骨皮。生薑各四兩。搗如泥。絹包囊上。其瘻異常。忍之。

⑱連蒂老絲瓜。燒存性。研末。每服三錢。

⑲熬酒調下。甚者亦不過二三服。(資生集)

⑳大茴香。炒。青皮。炒。烏藥。良薑。各等分。共為末。空心溫酒下。(星城小錄)

㉑臨臥時。在牀。以兩膝盤坐。兩手在腰際前後上下擦之。如左手在前。擦右手在後。擦。每擦七次。更換兩手。以四十九次為度。須閉目靜坐不動。口須運氣。氣不可急。手擦七下。運氣一口。照法連行三日。可勿藥自愈。(醫學綱目)

㉒鮑魚十尾。同茴香煮食。久久自愈。(生生編)

㉓鮮荔枝殼。及核。盛入盆中。文火燃之。患者以臀部承其上。徐徐薰之。三四次即愈。(儒門事親)

㉔青木香四兩。酒三大椀。煮過。每日飲三次。盡量為度。(孫氏集效方)

㉕茴香。炒。作兩色。更換熨。(簡便單方)

㉖薄荷油二分半。火酒二錢。每次十滴。

和糖水服之。(新內科全書)

⑩ 乾荷葉蒂二十一個。炒焦。海金沙三分。好酒一椀。煎一滾。乘熱服。以醉為度。即愈。

⑪ 雞子殼燒灰為末。空心溫酒下二服。即愈。

⑫ 牛蒡子根葉搗爛。絞汁。和好酒服之。覆被出汗。永不再發。

⑬ 火燒秤錘。淬入醋中。以熏雞蛋。食之。功能速治疝氣。(壽親養老書)

⑭ 黑豆二錢。煎酒服之。效。(集驗方)

【疝氣偏腫】甘遂。茴香。等分為末。酒服二錢。(備門事親)

⑮ 芙蓉葉。黃蘗各三錢。為末。木鼈子仁一個。磨醋調塗陰囊上。自止。

⑯ 牡蠣灰。良薑末等分。米泔水少許調塗患處。

⑰ 用穿山甲。茴香二味。為末。酒調服。乾物壓之。

⑱ 大茴香。蘿蔔子。炒各五錢。共為末。加

硃砂一錢。八分。作九服。每早鹽湯下。一服。九日即愈。

⑲ 丹皮。防風。等分為末。酒服二錢。

⑳ 腎氣偏墜。牽引及心腹痛。茴香浸酒煮飲之。

【熱疝】痛處如火。溲赤便艱。口乾畏熱。芙蓉葉。黃蘗各三錢。為末。以木鼈子仁一個。磨醋調塗囊上。

㉑ 如服小茴香。荔枝核等藥不效者。此熱症也。取芙蓉花根。去心用皮。搗極爛。加大黃末。敷患處。二三日必愈。(資生集)

【寒疝】痛連小腹。及睪丸偏縮者。以胡椒十餘粒。研細。搽膏藥上。烘熱。貼陰囊上。痛即已。偏縮者。貼小半邊。蓋縮者即寒也。

㉒ 吳茱萸炒。布包熨小腹上。

㉓ 桂末。搽貼臍內。

㉔ 丹麥一兩。為末。每服二錢。熱酒調下。(聖惠方)

① 附子去皮。臍。延胡索炒各一兩。生木香五錢。每服四錢。水二盞。薑七片。煎八分。溫服。(濟生方)

② 大荔枝核十三個。煨灰。火酒調如糊服。

③ 鮮荔枝核。橋核。小茴香各一兩。焙乾。研末。和紅糖。高粱適宜。每服一錢。效。惟陰虛體熱者忌服。(家藏方)

【濕疝】陰丸作痛。斬艾。紫蘇葉烘。川椒炒熟各三兩。拌勻。乘熱。絹袋盛。夾囊下。勿泄氣。

【心疝】腎氣衝心。故名。用韭菜汁。和猪苓。茯苓。白朮各一錢。澤瀉。錢半。肉桂三分。研末。兌入水煎服。(丹溪心法)

【癩疝】香附末二錢。以海藻一錢。煎酒。空心調下。並食海藻。(集簡方)

④ 癩疝疾重。墜大如杯。蔥蒜仁同東方壁土炒黃色。去土。入水煮爛。放沙盆內。研成膏。每日無灰酒調服二錢。(衛生寶鑑)

③絲瓜葉燒存性三錢。雞子殼燒灰二錢。溫酒調服。

【小腸疝】莖縮囊腫者。浮水石為末。每服二錢。木通、赤茯苓、麥冬煎湯調下。

②小腹引暈丸。連腰脊而痛者。用四製香附、鹽水炒、茴香等分為末。空心酒下三錢。

③絲瓜燒灰。調酒服。

④大茴香、荔枝核炒黑。各等分。研末。每服一錢。溫酒調服。

⑤以陳壁土炙熱。布包熨腎囊。冷即換。一日數次。連熨數日。便愈。千金方

⑥生雞子攪碎。入銅器中。一面將秤錘燒紅。先淬以醋。再入銅器中。將雞蛋收上。候冷刺下。臨臥食之。疝可立愈。

(肘後方)

【狐疝】超越舉重。卒得狐疝。用地膚子五錢。白朮二錢。半桂心五分。為末。酒服三錢。忌用生葱。(必效方)

【響疝】木通、川棟各一錢。大茴香五分。

飛鹽三分半。為末。水酒空心調服。

【橫梁疝】小腹有塊。直衝心胸。此症最難醫治。婦人患此居多。用補骨脂一斤。黑芝麻二兩。拌炒。去芝麻不用。只將補骨脂。瓦器中磨末。以酒為丸。每服三錢。開水送下。(古今醫鑑)

⑦ 臞脹病單方

【水臞】大蒜、田螺車前子等分。熬膏。攤貼臍中。效。(香祖筆記)

②輕粉二錢。巴豆四錢。去油。生硫黃一錢。研末。做成餅。以新棉一片。鋪臍上。次以藥餅當臍。按之外。以帛縛之。自然瀉下。候五六次。去餅。以溫粥補之。效。愈後忌涼水。

③一切臞脹。肚飽發虛。大田螺一個。雄黃一錢。甘遂末一錢。麝香一分。兩味藥為末。螺搗如泥。先以麝香置臍上。然後覆之外。更用物束好。俟小便小通去之。

④大麥拌硃砂。喂雄雞。取其矢。澄清。熬

膏貼。

⑤手按之下。陷不起者。是用活黑魚一尾。重七八兩。去鱗甲。將肚破開。去腸入好黑蓉五分。松蘿茶三錢。男用蒜八瓣。女七瓣。共入魚腹內。盛瓷器中。蒸熟。令病人食魚。能令茶蒜食。更妙。藥從頭上食起。病即從頭上消起。從尾食起。即從脚上消起。立效。兼治氣臞。(醫學綱目)

⑥惡膏微炒一兩。為末。麵和丸。梧子大。每米飲下十九丸。

⑦皮黑鬼扇根搗汁服。水即下。

⑧山豆根末。酒服二錢。

⑨蘿蔔子四兩。用巴豆十六粒。同炒。去豆。牙皂一兩半。煨去弦。沈香五錢。枳殼四兩。燒酒煮。切片炒。大黃一兩。酒焙。琥珀一兩。為末。每服一錢。雞鳴時。熱酒送下。薑皮湯亦可。此方兼治五臞。

⑩陳芭蕉扇。燒灰五分。滑石二分。為末。

腐皮色。滾水送下。

(十) 數年陳蠶豆三四兩。加紅糖二三兩。蠶豆連殼熬服。新病一次即愈。重者亦不過二三次。神效無比。(醫林集要)

【水腫】白商陸根去皮。切如豆大。一杯水煮一盞。更以米一盞同煮成粥。每日空心啜食。(外臺秘要)

服。

(二) 敗荷葉燒研。每服二錢。米飲下。日三服。

(三) 燈草一握。水四椀。煎至二椀。蘿蔔子一兩。微炒。砂仁二錢。微炒。研末。傾入湯內。略滾。盛入茶壺。緩緩飲下。

(四) 黑豆水煮。再加酒煮服。

(五) 砂仁。土狗一個。等分研和。酒服。(直指方)

(六) 蘿蔔子。浮麥等分。泡湯飲。

(七) 氣虛水腫。用大蒜煮半熟。入蛤粉。搗為丸。食前。白湯下二十九丸。小便下數桶。而愈。隨服補脾藥。

(八) 甘遂細末一兩。水調塗腹及臍。令滿。內服甘草湯。其腫便消。如神。

(九) 山東紅穀酒。馮了性酒。合飲。能口流水。涎身發汗效。

(十) 牽牛研末。入豬腎煨熟。溫酒下。

(十一) 水腫。腳滿氣急。鯉魚一斤。上一尾。煮汁。和冬瓜。葱白。作羹食。用烏魚亦可。

(十二) 赤小豆。桑白皮。通草煮服。

(十三) 水病初得。危急。冬瓜不限多少。任食。或取汁服。久病忌。

(十四) 腹大喘急者。馬兜鈴煎湯日服。

(十五) 椒目炒搗如膏。每酒服一匙。

(十六) 大鯉魚一尾。赤小豆一升。水二斗。煮食。飲汁。頓服。

(十七) 白茅根一握。赤豆三升。水三升。煮乾食。豆效。

(十八) 熱水腫疾。山梔子仁炒研。米飲服三錢。若上焦熱者。連殼用。

(十九) 赤尾鯉魚一斤。破開。不見水。及鹽。以生礬五錢。研末入腹。紙裹。再包黃泥。

竈內煨熟。送粥。食頭上消。食身尾下消。一日用盡效。

(二十) 白朮澤瀉各一兩。為末。每服三錢。茯苓湯下。

(二十一) 大豆黃卷服。

(二十二) 陳胡蘆一個。三五年陳糯米一斗。作酒。待熟。用胡蘆瓢。於炭火上炙熟。入酒浸之。如此五六次。將瓢燒灰。為末。每服三錢。酒下效。

(二十三) 雄豬肚一具。入大蒜頭四兩。小檳榔砂仁末三錢。木香二錢。砂鍋內河水煮熟。空心服。豬肚效。

(二十四) 水腫尿少。醋炒針砂。入豬脂。生地龍各三錢。甘遂末一錢。葱汁和敷。臍中約一寸厚。以尿多為度。

(二十五) 商陸入麝香三分。貼臍。小便利。則腫自消。

(二十六) 水腫自足起。入腹則殺。人赤小豆一斗。煮極爛。取汁五升。溫漬足膝。若已入腹。但食小豆。勿雜食。

⑤水腫自足起者。削桐木楠木煮汁漬足。併飲少許。

氣臖按之隨手即起者。用雄猪肚一具。去藏內裝大癩蝦蟇一隻。大砂仁一兩。研老絲瓜筋半條。破爛敗鼓皮手大一塊。紫背浮萍一兩。炙焦。以麻線縫好。入新砂鍋內。加水。用桑柴火煮爛。去淨浮油。煮好去藥。將肚洗淨。竹刀切片。仍入原湯中。再加真紫油厚朴。台烏各五錢。雞心檳榔。大腹皮。沈香。枳殼。醋炒各三錢。芫花。醋炒。綿大戟。麵包煨。上梅片。研細。甘遂。麵包煨。各二錢。用文武火。再煎數滾。候原汁約有一大茶碗。將藥去淨。猪肚與湯。分作二三服。沈香。梅片。二味。不宜見火。臨服時。和肚內食之。服後。以大便下白沫為驗。其臖即消。嚴禁鹽醫一百二十天。(古今醫統)

②蘿蔔子。研。以水濾汁。浸。縮砂一兩。過夜。炒乾。又浸。又炒。凡七次為末。米飲

服一錢。效。

③香附子一斤。童便浸三日。焙為末。丸梧子大。旋覆花湯下。四五十丸。日二。

④大蝦蟇一隻。破開。大砂仁填滿腹中。黃泥封固。炭火煨紅。冷定。去泥。研末。陳皮湯調服。放屁即愈。

⑤大麥拌硃砂。喂雄雞。取其矢。澄清。熬膏貼。

病後浮腫老鴨三隻。加真川厚朴二錢。蒸熟。食之。連食三隻。即愈。惟體虛者勿服。(古今錄驗方)

卒腫皂莢去皮。炙黃。剉三升。酒一斗。漬透。煮沸。每服一升。日三服。

②榆皮搗末。同米作粥食。

浮腫虛肥面腫。積年氣上。如水病。但脚不腫。穀猪葉八兩。納米煮粥常食。

黃腫青礬四兩。煨赤。蓮子當歸四兩。燒酒浸七日。焙。百草霜三兩。為末。以浸藥酒打糊。丸梧子大。每服五七丸。效。

②肚腹脹大。四肢極瘦。肉從卷。三兩。紅

棗青礬各一斤。入罐內。煨。煙盡。為末。再將香附童便製。參牙半炒。各一斤。為末。和前末糊。丸。每酒下二十丸。

③亞腰胡盧。連子燒末。食前溫酒下。或白湯下。連服十數個。效。(簡便方)

④掘新鮮百部根。洗。搗。卷。臍。上。以糯米飯半升。拌水酒半合。揉軟。蓋在藥上。以帛包住。一二日後。口作酒氣。自愈。

臖脹鄉農春末夏初。受盡濕熱。漸成胸悶。腹大如鼓。名曰臖脹。大麥稈二兩。烏豇豆二合。蒙齋四兩。煮食。七日愈。

血臖週身老黑色。皮內有紫黑斑點者。是用雄猪肚一具。去藏。薑草一兩。雄雞矢四兩。炒焦。紫背浮萍一兩。老絲瓜筋半條。各藥共裝肚內。用麻線縫好。煮熟。去藥。將肚切片。仍入原湯。再加媽蝗一條。燒枯。存性。乾漆三錢。煨令煙盡。炒。真花蕊石。研。真血竭。各三錢。紅花。降香。各五錢。甘遂。綿

胸脇病單方

大戟各麵包煨。羌花醋炒各二錢。文武火煮透。去藥。食肚與湯。分作二三次服。服後。以大便下黑水數次為驗。其腹自消。嚴禁鹽醬一百二十天。日滿開鹽。方內螞蝗。必不可少。俟病愈後。照解螞蝗毒法治之。(萬病回春)

八 胸脇病單方

【結胸】大蒜搗爛攤貼。必愈。

【二】凡心胸脇下。有邪氣結實。硬痛脹滿者。生薑一斤。搗渣留汁。慢炒待潤。以絹包於患處。欵欵熨之。冷再以汁炒再熨。良久。遂豁然寬快。(陶華傷寒六書)

【三】杏仁。桂枝。橘皮。訶黎勒皮等。分為丸。每服三十九。白湯下。無忌。(食療本草)

【四】皂莢三十挺。去皮切。水五升。浸一夜。按取汁。慢熬至可丸。丸如梧子大。每食後。鹽漿水下十九。(千金方)

【五】人參一兩。橘皮去白四兩。為末。煉蜜

丸。梧子大。每米飲下五六十九。(聖惠方)

【六】桔梗。枳殼各等分。水二盞。煎一盞。溫服。(活人書)

【七】枳實二錢。麩炒微黃為末。非時。以清粥飲調下二錢。(聖惠方)

【寒結胸】巴豆飛麵研。調餅數。熱結胸。大黃。芒硝。葱白搗散。

【胸脇氣逆】白茯苓一兩。人參五錢。每服三錢。水煎服。日三服。(聖濟總錄)

【胸痛】胸脅痺痛如刺。不得俯仰。汗出。或微背生韭菜。或根五斤。搗汁服。

【二】胸痛。瘥而復發。薤根五升。搗汁飲。

【脅痛】兩脇脹痛。旋覆花水煎服。

【二】胸脅卒痛。大豆炒二升。酒三升。煮二升。頓服。

【三】腎氣衝脇。如刀刺痛。喘息不得生。茴香搗汁一合。投熱酒一合。和服。(食療本草)

【四】連胸欲死者。香薷搗汁一二升服。

肘後方

【五】脅下刺痛。小茴香一兩。炒。枳殼五錢。麩炒。為末。每服二錢。鹽酒調下。神效。(袖珍方)

【六】風脅痛。防風水煎服之。(本草綱目)

【七】枳殼煎服。末服並佳。(本草綱目)

【八】薤白根剉。煮濃汁服三升。乃定。(肘後方)

【九】脅骨疼痛。因驚傷肝者。枳殼一兩。麩炒。桂枝生半兩。為細末。每服二錢。薑棗湯下。(本事方)

【十】羚羊角燒末。水服一錢。子母秘錄

【胸脅氣逆】茯苓一兩。人參半兩。每服三錢。水煎服。日三服。(聖濟總錄)

【九】腰脊病單方

【腰痛】香附子五兩。生薑二兩。取自然汁。浸一宿。炒黃為末。入青鹽二錢。擦牙數次。其痛即止。(乾坤生意)

【二】大豆六升。水拌濕。炒熱。布裏熨之。冷即易去。(延年秘錄)

③白朮土炒三兩。芡實一兩。薏苡仁二兩。水煎。分數次服下。(應驗良方)

④鼈甲炙研末。酒服一匙。每日二次。(肘後方)

【腎虛腰痛】仲杜為末。每旦以溫酒服二錢。(三因方)

②用猪腰子一枚。切片。以椒鹽醃去腥氣。入杜仲末三錢在內。荷葉包煨食之。酒下。(本草權度)

③破故紙一兩。炒為末。溫酒服三錢。神效。(經驗良方)

④羊腎去膜。陰乾為末。酒服二錢。日二。(千金方)

⑤杜仲去皮炙黃一大斤。分作十劑。每夜取一劑。以水一大升。浸至五更。煎三分。減一取汁。以羊腎三四枚。切下。再煮三五沸。如作羹法。和以椒鹽。空心頓服。(海上方)

⑥用羊脊骨一具。搥碎。煮和蒜薤食。飲少酒。妙。(食醫心鏡)

⑦用羊脊骨一具。搥碎。肉從容一兩。單果五枚。水煮汁。下葱醬作羹食。(正要)

【虛寒腰痛】糯米二升。炒熟。袋盛。拴靠痛處。內以八角茴香研酒服。(談楚翁試驗方)

②用羊頭蹄一具。草果四枚。桂一兩。薑半斤。唔昔泥一豆許。胡椒煮食。(正要)

【腰脚風痛】不能履地。皂角子一十二百個。洗淨。以少酥熬香為末。蜜丸。梧子大。每空心。以蒺藜子酸棗仁湯下。三十九。(千金方)

②白龍鬚研末。每服一錢。氣弱者七分。無灰酒下。密室隨左右貼牀。臥待汗出。自乾。勿多蓋被。三日勿下牀。見風。

③得疾淺者。用白龍鬚末三錢。瓷瓶煮酒一壺。每日先服桔梗湯。少頃。飲酒二盞。早一服。晚一服。(保壽堂方)

④石花浸酒飲之。(聖惠方)

⑤新胡麻一升。熬香。杵末。日服一小升。

服至一斗。永瘥。溫酒。蜜湯。薑汁。皆可下。(千金方)

⑥杜仲一斤。切炒。酒二斤。漬十日。日服三合。(陶隱居得效方)

⑦茄子五十斤。洗。以水五十。煮取濃汁。濾去滓。更入小鑪中。煎至一升。內外。即入生粟粉同煎。令稀稠得所。取出。搜和。更入麝香砂硃末。同丸。梧子大。每日用秫米酒送下。三十九。近暮再服。三月乃瘥。男子。女人。通用。皆驗。(圖經本草)

【卒然腰痛】大豆六升。水拌濕。炒熟。布裏熨之。冷即易。(延年秘錄)

②大豆炒二升。酒三升。煮二升。頓服。(肘後方)

③芥子末。酒調貼之。立效。(摘元方)

④羊腎一對。洎夫蘭一錢。水一盞。浸汁入鹽少許。塗抹腎上。徐徐炙熟。空腹食之。(正要)

【腎症腰痛】用青皮炒研。每服溫酒一

錢或酒煎服(大明醫方)

【老人腰痛】兼兩腿痠痛者。用棠棣子鹿茸灸等分為末。蜜丸梧子大。每服百丸。日二服(千金方)

【閃挫腰痛】蒔蘿研末。酒服二錢。甚良(永類鈔方)

【背熱如火】此虛火也。生附子研末。水調敷兩足心(嘉祐方)

●十 二便諸證單方

【關格】大小便閉。脹悶欲死。二三日則殺人。急取鹽和苦酒數臍中。乾即易去。仍以鹽汁灌肛門內。並用紙裏鹽投水中飲之(楊氏家藏方)

①膩粉一錢。生麻油一合。相和。空心服。

②芒硝三兩。泡湯一升。服取吐。

③葵子二升。水四升。納猪脂一雞子大。頓服。

④用葵子為末。猪脂和丸梧子大。每服五十丸。

⑤蜀葵花一兩。搗爛。麝香半錢。水一盞。

煎服。根亦可用。

⑦蔓菁子油一合。空腹服。即通汗出無害。

⑧皂莢燒研。粥飲下三錢。

⑨生冬葵根二斤。生薑四兩。並取汁和勻。分二服連用。

⑩陰陽關格。前後不通。乃轉胞證。諸藥不效。則脹滿悶亂而死。用甘遂末。水調敷臍下。內以甘草節湯飲之。藥汁至臍。二藥相反。胞自正。小便如湧泉。此急救良法也。

⑪皂莢燒煙於桶內。坐上熏之。

⑫獨頭蒜燒熟。去皮。綿裏納下部。氣即通。

⑬大小便閉。白礬末填滿臍中。以新汲水滴之。覺冷透腹內。自通。臍平者以紙圍之(經驗良方)

⑭皂角末。葱白連鬚。加麝香二分。蜜少許。粘臍下。至毛際。再以韭地蚯蚓泥搗和水。澄清飲之。尤妙。

⑮紫蝴蝶花根。生水邊者佳。研汁一盞。

服即通(普濟方)

【小便淋結】臍中妨悶兼痛者。滑石粉一兩。水調服。

【小便不通】壹草根煎水頻飲。(杏林摘要)

①猪膽連汁。籠住陰頭一二時。汁入自通。

②葱白連葉搗爛。入蜜合外腎。

③蚯蚓泥。朴硝各等分。水和敷臍下。

④皂角半夏麝香末。填臍內。再用田螺葱白搗餅蓋之。

⑤生白礬末五釐。入臍。以水滴之。

⑥葱白細切炒熱。包熨小腹。冷即易。仍以手擦掌心足心。

⑦小便不通。腹脹如鼓。大田螺加鹽半匙。生搗。敷臍下一寸三分。即通。

⑧括萹焙研。每服二錢。熱酒下。頻服。
⑨乾芫葉一兩。燒灰。滑石半兩。為末。每未飲服三錢。
⑩綿黃芪二錢。水二盞。煎一盞。溫服。兒

童減半(總微論)

①玉簪花、蛇蛻各二錢。丁香一錢。共為末。每服一錢。酒調送下。(醫學指南)

②麝香一錢。蜈蚣一個。葱白連鬚一握。共搗封臍中。即下。(墨娥小錄)

③馬蘭花炒。茴香炒。葶藶炒。為末。每酒調服二錢。(十便良方)

④蠹魚、滑石、亂髮等分為末。飲服五分。日三服。(金匱要略)

⑤紅豆搗碎。與江茶和勻。開水調服。立效。(墨娥小錄)

⑥髮灰二錢。淡米醋湯調服。

⑦小便不禁。薔薇根煮汁飲。或為末酒服。野生白花者更良。(聖惠方)

⑧雄雞翎燒研。酒服一小匙。(外臺秘要)

⑨小便頻數。色清不渴者。鹽炒茴香研末。炙糯米糕蘆食。

⑩蘆根去鬚節煎服。

⑪茴香不拘多少。淘淨。入鹽少許。炒研

為末。炙糯米糕蘆食。(醫學準繩六要)

⑫羊肺一具。切作羹。入少羊肉和鹽豉。食三四具。

⑬白果十四枚。半生半煨食之。效。或煨熟去火氣。細嚼米飲下。

⑭胡桃肉。卧時嚼數個。溫酒下。

⑮雄雞腸二具。切破洗。炙令熟黃。益智二兩。牡蠣煨三兩。共為末。以豬猪水將二個洗淨蒸熟。搗為丸。空心鹽湯下。

⑯小便過多。牡蠣煨。赤石脂煨。等分。酒糊丸。鹽湯下。

⑰益智仁二十四粒。鹽水炒。煎服。有效。(千金翼)

⑱破故紙十兩。酒蒸。茴香十兩。鹽炒。為末。酒糊丸。梧子大。每服百丸。鹽酒下。

⑲下元虛寒。小便不固。韭子一合。白龍骨煨一兩。為細末。空心酒調服。

⑳虛寒尿多者。糯米飯拌為糞。卧時煮

熱細嚼食。

①消渴尿多。薔薇根一握。水煎。日服。

②老人尿多。晚食糯米糞。即效。若渴時。玉莖痛而仍頻數不赤者。生芪一兩。甘草二錢。煎服。甚者日二服。即愈。

③老人尿閉。白頭蚯蚓。茴香等分。杵汁飲之。立愈。(朱氏集驗方)

④黃芪蜜炒二錢。陳皮去白一錢。甘草八分。煎服。

⑤小便虛閉。桃枝、柳枝、木通、川椒各一兩。枯白礬三錢。葱白七個。燈心一握。水三十椀。煎至十五椀。用磁缸盛之。乘熱熏外腎小腹。以被圍之。不令風入。冷即易之。再燒再熏。良久便通。如赤小豆汁下效。

⑥附子炮去皮一兩。鹽水浸一刻。澤瀉三錢。煎服效。

⑦寒症尿閉。葱一握。麝香三釐。搗餅貼臍。

⑧壯年遺尿。枯白礬、牡蠣粉等分為末。

每服一匙。溫酒下。(余居士選奇方)

②雞腔脰一具并腸。燒末酒服。男用雌。女用雄。

③鹿角霜研末。溫酒下三錢。

④老人遺尿。草烏頭一兩童便浸七日。去皮同鹽炒為末。酒糊丸。菜豆大。每服二十九。鹽湯下。(普濟方)

⑤夢中遺尿。桑螵蛸十個。燒研末。沙糖湯調服愈。

⑥白紙一張鋪席下。待遺於上。取紙曬乾。燒末酒服。老小遺尿咸宜。

⑦尿白如注。小腹氣痛者。茶葉內箬葉。燒灰入麝香少許。米飲下。

⑧小便血尿。用甘草粉升麻煎。調辰砂益元散。極效。(三因方)

⑨當歸白芷為末。二錢。淡豆豉煎湯調服。(三因方)

⑩黃連黃蘗為末。濃煎車前子湯。空心調服二錢。少加蜜汁。(三因方)

⑪側柏葉為末。空心酒調服二錢。(三因方)

(因方)

⑫五倍子炒為末。烏梅肉搗膏。丸如梧子大。空心酒下五十九。(三因方)

⑬當歸四兩細剉。酒三升。煮取一升。空心頓服。(本草綱目)

⑭延胡索一兩。朴硝七錢。半為末。每服四錢。水煎服。(朱肱活人書)

⑮香附子。新地榆等分。各煎湯。先服香附湯三五呷。後服地榆湯。至盡。未效再服。(指迷方)

⑯早蓮草。車前草。各等分。杵取自然汁。每空心服三杯。愈乃止。(醫學正傳)

⑰金粟狼牙草。焙乾。入蚌粉炒。槐花百藥煎等分為末。每服三錢。米泔空心調服。(易簡方)

⑱烏梅燒存性。研末。醋糊丸。梧子大。每服四十九。酒下。(易簡方)

⑲酸草搗汁。煎五苓散服之。(百一選方)

⑳淡豆豉二撮。煎湯。空腹飲。或入酒服。

(得效方)

⑳萬首菜搗傳臍上。即愈。(易簡方)

㉑新地骨皮洗淨。搗自然汁。無汁則以水煎汁。每服一盞。入酒少許。食溫服。(簡便方)

㉒籬下竹根入土多年者。不拘多少。洗淨煎湯。併服數椀。立止。(救急良方)

㉓琥珀為末。每服二錢。燈心湯下。(直指方)

㉔五倍子末。鹽湯搗和。丸梧子大。每空心。酒服五十九。(集簡方)

㉕野苧麻根煎水。頻飲服。七日必愈。(石室秘錄)

㉖將新蠶豆莢摘下。先食其豆。外殼剝下。以線串之。懸掛吹乾。愈陳久愈佳。不論何種淋症。均治。用時祇須燒灰。輕者一錢。重者二錢。開水沖服。日二次。數日即愈。累驗。(醫林集要)

㉗大便不通。枳實皂莢等分為末。飯丸米飲下。

②大便不通。十日。至一月者。冬葵子末。人乳汁等分。和服。即通。

③當歸。白芷。等分。為末。每服二錢。米飲湯下。(聖濟總錄)

④葱一莖。去根。將葱頭。蘸草烏頭末。納肛門內。

⑤巴豆仁。乾薑。韭子。良薑。硫黃。甘遂。檳榔。等分。研末。飯丸。雞子大。早晨。先以椒湯洗手。麻油塗手掌。男左女右。握藥一丸。移時便通。欲止。則開握去藥。以冷水洗手。

⑥烏梅十個。浸去核。丸如棗大。納下部。

⑦大便無故閉塞不通者。蘆薈一錢。硃砂五分。研細。飯丸。梧子大。開水送。

⑧大棗一枚。去核。入輕粉五分。縛定。煨熟食之。仍以東湯送下。(百一選方)

【大便風秘】香白芷炒。研末。每服二錢。米飲湯入蜜少許。連進二服。(十便良方)

②蒺藜子炒一兩。猪牙皂。英去皮。酥炙。

五錢。為末。每服一錢。鹽茶湯下。(普濟方)

【大腸虛秘】連翹葱一根。薑一塊。鹽一小撮。淡豆豉三七粒。搗作餅。烘掩臍中。繫定。冷再易。

【大腸冷秘】附子一枚。炮去皮。取中心如棗大。為末二錢。蜜水空心服。

【久病便澀】宜服葵菜。自利滑。用以養竅。

【血燥便澀】桃仁去皮尖。炒研。麻仁。當歸各三錢。煎服效。

①常飲牛乳最佳。

【老人便澀】熟地三錢。山藥四分。山茱萸肉一錢。茯苓一錢。丹皮一錢。煎湯去渣。後入人乳半杯。蜜五錢。煎一沸。空心溫服。

②火麻油。紫蘇子。松子肉。杏仁。炒去皮尖。芝麻炒。研如泥。磁器收貯。每服一丸。彈子大。蜜水化下。

③防風。枳殼。麩炒。各二兩。甘草半兩。為

末。每食前。白湯服。

【老人虛秘】阿膠炒二錢。葱白三根。水煎化。入蜜二匙。溫服。

②肉苁蓉。浸酒焙二兩。研。沈香末一兩。為末。麻子仁汁打糊。丸。梧子大。每服七八丸。白湯下。

【大便下血】名曰腸風。又名腸紅。用西洋參。蒸桂圓。頻食。神效。(類聚方)

②土硫一兩。火煨。米醋淬盡。醋一升。搗羅如麵。每服一錢。白湯下之。(斗門方)

③蒼朮不拘多少。以皂角按濃汁。浸一宿。煮乾。焙研為末。麵糊丸。如梧子大。每服五十丸。空心米飲下。日三服。(婦人良方)

④三七研末。同淡白酒調一二錢。服三服可愈。或以五分入四物湯亦可。(集簡方)

⑤香白芷為末。每服二錢。米飲下。神效。(選奇方)

⑥木香、黃連等分為末。入肥猪大腸內。兩頭紮定。煮極爛。去藥食腸。或連藥搗為丸服。(保壽堂方)

⑦香附、醋酒各半。煮熱。焙研為末。黃秫米糊丸。梧子大。每服四十九丸。米飲下。日二服。(秘寶方)

⑧香附子末二錢。入百草霜、麝香各少許。同服。效尤速。

⑨荆芥炒為末。每米飲服二錢。婦人用酒下。亦可拌麵作餛飩食之。(經驗方)

⑩荆芥二兩。槐花一兩。同炒紫為末。每服三錢。清茶送下。(簡便方)

⑪旱蓮子草。瓦上焙。研末。每服二錢。米飲下。(經驗方)

⑫蒼岩貫一升。炮乾。搗篩。生薑半斤。取汁。銀鍋中。更以無灰酒二升。搜之。上火煎如稀餳。即旋投酒。度用酒可及五升。即止。慢火煎。令可丸。大如梧子。每旦酒下三丸。增至五七丸止。若丸

時粘手。則以菟絲粉襯隔之。火俟忌緊。藥焦。則失力也。初服微熱。勿怪。疾甚者。服過三日。當下利。疾去。利亦止。殊有效。(篋中方)

⑬用楮膝子三枚。厚重者。濕紙七重。包煨熟。去殼。取肉為末。每服一錢。食前黃芪湯下。日一服。(聖惠方)

⑭括萆一個。燒灰。赤小豆半兩。為末。每空心酒服一錢。(普濟方)

⑮王瓜一兩。燒存性。地黃二兩。黃連半兩。為末。蜜丸。梧子大。米飲下三十九丸。(指南方)

⑯天南星。石灰炒焦。黃色為末。酒糊丸。梧子大。每酒下二十九丸。(普濟方)

⑰木饅頭。燒。枳殼炒。等分為末。每服二錢。槐花酒下。(家藏方)

⑱敗毒菜根。洗切。用連皮老薑各半盞。同炒赤。以無灰酒淬之。搗。蓋少頃。去滓。任意飲。(永類方)

⑲卷柏。側柏。棕櫚。等分。燒存性。為末。每

服三錢酒下。亦可飯丸服。(仁存堂方)

⑳蜜炙蘿蔔。任意食之。(百一選方)

㉑胡荽子。和生菜。以熱餅裹食之。(普濟方)

㉒柏子十四個。搥碎。囊貯。浸好酒三盞。煎八分服。立止。(普濟方)

㉓松木皮。去粗皮。取裏白者。切曬。焙研為末。每服一錢許。茶湯下。(家藏方)

㉔經霜茄連蒂。燒存性。為末。每日空心酒服二錢。(靈苑方)

㉕茄葉。黃乾為末。每服二錢。溫酒。或鹽湯下。隔年者尤佳。(經驗良方)

㉖敗瓢。燒存性。黃連等分。研末。每空心溫酒服二錢。(簡便方)

㉗霜後乾絲瓜。燒存性。為末。空心酒服二錢。(本事方)

㉘槐耳。燒二兩。乾漆。燒一兩。為末。每服一錢。溫酒下。(聖濟總錄)

㉙銀杏四十九枚。去殼。生研。入百藥煎

末和丸彈子大。每服二三丸。空心細嚼。米飲送下。(證治要訣)

手 椽斗子殼用白梅肉填滿。兩個合定。鐵絲紮住。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。(證治要訣)

三 橄欖核。燈上燒存性。研末。每服二錢。陳米飲調下。(直指方)

三 藕節曬乾。研末。人參、白蜜煎湯。調服二錢。日二服。(全幼心鑑)

三 葶藶搗汁大半鐘。好酒半鐘。空心溫服。三日見效。(神秘方)

三 臭椿根刮去粗皮。焙乾四兩。蒼朮米泔浸焙。枳殼麩炒各一兩。為末。醋糊丸。如梧子大。每服五十九丸。米飲下。日三服。(本事方)

三 苦楝子炒黃為末。蜜丸。梧子大。米飲下。每吞十九至二十九。(經驗方)

三 用槐花、荆芥穗等分為末。酒服一錢。空心食猪血炒。(經驗良方)

三 用拍葉三錢。槐花六錢。煎湯日服。(集簡方)

集簡方

三 槐花、枳殼等分炒。存性為末。新汲水服二錢。(袖珍方)

三 用長尺皂角五挺。去皮子。酥炙三次。研末。精羊肉十兩。細切搗爛。和丸。梧子大。每溫水下二十九。(聖惠方)

三 皂莢子。槐實一兩。用粘殼糖炒香。去糖為末。陳粟米飲下一錢。(聖惠方)

三 皂角刺灰二兩。胡桃仁。破故紙炒。槐花炒各一兩。為末。每服一錢。米飲下。(普濟方)

三 獨子肥皂一挺。燒存性。為末。糊丸。用米飲下。(普濟方)

三 椶櫚半斤。括萋一個。燒灰。每服二錢。米飲調下。(百一選方)

三 枳殼燒黑。存性五錢。羊脛皮為末。三錢。五更。空心米飲服。如人行五里許。時再一服。當日見效。(博濟方)

三 枳殼一兩。黃連五錢。水一鐘。煎半鐘。空心服。(簡便方)

三 活鯽魚一大尾。去腸留鱗。入五倍子末。填滿。泥固。煨存性。為末。酒服一錢。或飯丸。日三服。(百一選方)

三 南棗十個。槐米一兩。同煎。去米食。棗日三次。自愈。(不藥良方)

三 括萋一個。燒灰。赤小豆五錢。為末。每空心酒下一錢。(普濟方)

三 大蘿蔔皮。荷葉。俱燒存性。蒲黃生用。等分為末。每服一錢。米飲湯下。(普濟方)

三 生黑豆煮熟。連湯淡食便愈。即多年便血亦效。(普濟方)

三 水芹菜絞汁。日服二次。立止。(聖濟總錄)

三 便前有血。石葦為末。茄子枝煎湯。下二錢。(普濟方)

三 便後有血。桑樹上白蘚花。水煎服。或末服。亦止吐血。(聖惠方)

三 凌霄花浸酒頻飲之。(普濟方)

三 艾葉不拘多少。以生薑汁三合和服。

(丹溪纂要)

四 王不留行末。水服一錢。(聖濟總錄)

五 白雞冠花并子炒煎服。(聖惠方)

六 不見水豆腐渣炒黃。清茶調服。即愈。

(古今良方)

泄瀉 鷲粟殼一枚。去蒂膜。烏梅肉。大棗肉各十枚。水一杯煎七分。溫服。(經驗良方)

生薑連皮切如粟大。細茶等分煎服。

泄瀉不止。諸藥無效者。梧桐葉煎湯沐足。

泄瀉日夜無度。針砂。地龍。猪苓。共研末。生葱汁調貼臍上。小便長而瀉止。

泄瀉暴利者。大蒜搗貼兩足心。并貼臍中。

白龍骨。白石脂。等分為丸。紫蘇。木瓜湯下。

乾飯鍋巴二兩。松花二兩炒。臘肉骨頭五錢。烘脆為末。砂糖調。不拘時服。

車前子。不拘多少。為細末。每服二錢。米飲調服。

白麵一斤。炒焦黃。每日空心。溫水服一二匙。

寒瀉 胡椒末和飯作餅。敷貼臍上。甚佳。(三因方)

陳艾一握。生薑一塊。水煎。熱服。(生編)

飲頭燒酒。殊效。

母丁香。橘紅等分。研。蜜丸。豆大。米湯下一丸。

熱泄 萊豆湯溫服。甚妙。(寇氏衍義)

山藥。蒼朮等分。飯丸。米飲服。

黃芩。白芍各二錢。甘草一錢。腹痛者加桂二分。有膿血者加黃連。
脾虛泄瀉 針砂七錢半。官桂一錢。枯礬一錢。為末。以冷水調。攤臍上下。縛之。當覺大熱。以水潤之。可用三四次。(仁存堂方)

常食蕎麥麵。便能止。
白木車前子等分。炒為末。白湯下二錢。
糯米炒黃磨粉。加白沙糖調服。
吳茱萸開水泡焙乾。每用三錢。水煎入鹽少許服之。立效。
陳火腿骨煨研末。紅麴。松花各等分。砂糖調。陳酒送下。
白木土炒。白芍各一兩。冬月加炒肉豆蔻五錢。共為末。飯丸。梧子大。每服五七十丸。米飲湯下。極效。(直指方)

久泄 生薑四兩。黃連一兩。剉豆大。慢火炒。待薑乾脆。深赤色。去薑取黃連為末。每一錢。空心臘茶清下。
肉豆蔻煨一兩。木香二錢半。為末。東肉和丸。米飲下四五十丸。
陳火腿煨研。錫心飯焦。各三錢。炒。松花一錢。米和丸。參湯下。
黃米炒為粉。每用數匙。砂糖拌食。
白木炒。茯苓各一兩。糯米炒二兩。為末。東肉拌食。

〔六〕白石脂、乾薑等分研。白沸湯和麵。為丸。梧子大。每米飲下三十丸。

〔七〕酸石榴皮研末。米湯下。每服三錢。

〔暑泄〕白朮、車前子等分。炒為末。開水下。二三錢。（楊起簡便方）

〔二〕五倍子末。飯丸。黃豆大。每服二十丸。荷葉煎水下。效。（余居士選奇方）

〔水泄〕風化石灰二兩。白茯苓三兩。為末。糊丸。梧子大。每空心米飲下。二三十丸。妙。

〔暴泄〕秦艽二兩。炙甘草半兩。每服三錢。水煎服。

〔老人泄瀉〕枯白朮一兩。煨訶黎勒七錢半。為末。米飲服二錢。取愈。（聖惠方）

〔二〕黃土炒白朮半斤。炒山藥四兩。為末。飯丸。米湯下。

〔五更溲瀉〕用五味子去梗二兩。吳茱萸、萸湯泡七次。五錢。同炒香為末。每早陳米湯服二錢。服完一料。即愈。（本方）

事方

十一 前陰諸證單方

〔遺精〕俗呼走陽。荷葉研末。酒服三錢。驗。

〔二〕北五味曝乾。研末。每一錢。酒調服。日二次。

〔三〕雄雞腎皮。煎湯熱飲。效。

〔四〕石蓮肉、白茯苓各二兩。蒸。兔絲子五兩。酒浸。研為細末。山藥糊丸。梧子大。每服五十九丸。溫酒。或鹽湯下。如脚膝無力。木瓜湯下。效。

〔五〕兩膝宜曲。身體宜側。曲右手之肱。而枕於左手之掌。或曲一膝。一足伸直。加於所曲之足上。兩手置於兩肋之旁。面向上卧。此法可免遺精之患。（瑞竹堂方）

〔六〕熟地六兩。山萸肉、真山藥各四兩。芡實、丹皮、雲苓各二兩。蓮鬚二兩。龍骨生研。水飛淨三錢。魚鱗四兩。蛤粉炒成珠。共為末。煉蜜為丸。如梧子大。每

日早晚服三四錢。一月即止。屢試神驗。（林屋山人秘方）

〔七〕文蛤研細末。以女兒津調貼臍內。立止。

〔八〕白龍骨研細一兩。韭菜子炒一合。為末。空心陳酒調服二錢。

〔九〕用壺轉白牛法最妙。其法不拘布帛。做一小兜。將外腎兜起。拴在腰後。袴帶之上。此病自免。

〔十〕服六味地黃丸。即止。（集驗方）

〔十一〕貓耳草三兩。和大棗煎濃。日三服。每服一椀。三日後。病必愈。兼治白濁。貓耳草一名綿絮草。處處有之。（集驗方）

〔十二〕雞子一個。用銀簪鑽一小孔。實胡椒少許。紙封其孔。候飯將熟。將雞子揷入。熟後取食。每日一個。連服七個。便可斷根。（易簡方）

〔丙熱遺精〕鐵鑪末。冷水服一錢。三服止。（活人心統）

【心虛遺精】猪心一個。批片相連。以飛過硃砂末。摻入。用線縛好。煮熟食之。

(唐瑤經驗方)

【心動遺精】蓮心一錢。研末。入辰砂一分。淡鹽湯下。

【腎虛遺精】熟地。煨牡蠣。等分為丸服。

【猪腰子】一個。切開去膜。入附子末一錢。濕紙裹煨熟。空心食之。飲酒一杯。不過三五服。效驗非常。(經驗方)

【虛滑遺精】白茯苓二兩。縮砂仁一兩。為末。入鹽二錢。精羊肉批片。搽藥炙食。以酒送下。(晉濟方)

【猪肚】一枚。入帶心連衣紅蓮子。煮糜。杵丸。梧子大。每淡鹽湯下。

【龍骨蓮鬚】芡實。烏梅肉。各等分為末。山藥丸如小豆大。每服三十九丸。空心米飲下。

【小便遺精】龍骨。遠志。等分丸服。或加韭子。

【夢遺】大黃三分。生雞子一個。頂上敲

損一孔。入末在內。紙糊煮熟。空心食四五朝愈。

【酸梅草】二錢。孩兒菊。搗取汁。加元酒釀空心量服。(救世青囊)

【臨睡】以朴硝少許。放手心內。用少水和。將龜頭一擦。效。

【韭子】一合。炒。白龍骨一兩。煨為末。每服二錢。酒調下。

【蘇子】一升。熬。杵研末。酒服一錢。日再服愈。(外臺秘要)

【脚頭覆被勿過暖】亦自不復發。(家庭醫學)

【砂仁】二兩。黃蘗二兩。炙甘草七錢。煉蜜為丸。每服三錢。淡鹽湯送下。輕者一二料。重者三四料。必愈。(易簡方)

【心虛夢遺】白茯苓末二錢。米飲調下。日二服。(蘇東坡方)

【木饅頭】炒。白牽牛等分為末。每服二錢。用米飲湯調下。(乾坤秘鑑)

【勞心夢遺】龍骨。遠志。等分為末。煉蜜

丸。梧子大。硃砂為衣。每服三十九。蓮子湯下。

【菟絲子】五兩。茯苓四兩。石蓮子肉一兩半。山藥糊丸服。

【陰虛夢遺】蓮鬚十兩。石蓮肉十兩。去內青鬚并外皮。芡實十兩。去殼為末。金櫻子三斤。去毛子。水淘淨。入大鍋內。水煎。濾過。再煎。加飴糖和勻。煎藥丸如梧子大。每服七八十丸。

【鼈甲】燒研一分。以酒半盞。童便半盞。葱白七寸。同煎。去葱。日晡時服之。出臭汗。即愈。(醫豐元戒)

【虛損夢遺】韭子二兩。微炒為末。食前溫酒服二錢。

【白朮】五兩。土炒。苦參肥白者三兩。牡蠣四兩。為末。以雄猪肚一具。洗煮極爛。搗丸。梧子大。每日早晚。以米湯送下。三錢。忌食猪肝羊血蕃薯。

【夢遺便溏】牡蠣粉。醋糊。丸。梧子大。每服三十九。米飲下。日二服。

一沙石淋小便急脹痛如刀割尿如沙

石者即是用瞿麥子搗為末酒服一
小是日三服三日當下石出(外臺
秘要)

二以胡椒三錢朴硝一兩為末每服二
錢開水調下

三九肋鱉甲散炙研末服效

四浮海石研水三升醋一升煮半澄清
服三服效

五石首魚鮓即頭中石腦十四個當歸
等分為末水煮一椀頓服立愈(外
臺秘要)

六薏苡仁或子葉根皆可水煎熱飲夏
月冷飲

七牛膝一兩水二盞煎半溫服杜牛膝
亦可入麝香乳香更良

八黑豆一百二十粒生粉草一升以水
煎乘熱入滑石末一錢空心服(丹
溪心法)

九萱草根一握搗取汁服或嫩菌煮食

之亦可(丹溪心法)

十沙石淋重者用去根菝葜二兩為末
每米飲服二錢後以地椒煎湯浴腰
膀須臾即通(聖濟總錄)

十一屋上瓦松煎濃湯乘熱熏洗小腹約
兩時即通(經驗良方)

十二石淋破血牛角燒灰酒服一錢日五
服(聖濟總錄)

十三石淋作痛桃木膠如棗大夏以冷水
三合冬以湯三合和服日三服當下
石石盡即止(千金方)

十四胡桃肉一升細米煮漿粥一升相和
頓服即瘥(海上方)

十五鯉魚齒一斤研末以三年醋和分三
服一日服盡(聖惠方)

十六九肋鱉甲醋炙研末酒服一錢日三
服石出瘥(肘後方)

十七胡椒朴硝等分為末每服用二錢白
湯下日二服(普濟方)

十八沙石諸淋疼不可忍用蘿蔔切片蜜

浸少時炙乾數次不可過焦細嚼鹽
湯下日三服(普濟方)

十九人參焙黃芪鹽水炙等分為末用紅
皮大蘿蔔一枚切作四片以蜜二兩
將蘿蔔逐片蘸炙令乾再炙勿令焦
以蜜盡為度每用一片蘸藥食之仍
以鹽湯送下以瘥為度(三因方)

二十黃爛浮石為末每服二錢生甘草煎
湯調服(直指方)

二十一螻蛄七個鹽二兩新瓦上鋪蓋焙乾
研末每溫酒服一錢自愈(古今錄
驗方)

二十二胡桃肉煮粥多食神效(張畧齋說)

二十三卒淋不通上好墨燒一兩為末每服
一分溫水服之(普濟方)

二十四歲蕤一兩芭蕉根四兩水二大椀煎
一椀半入滑石二錢分三服(聖惠
方)

二十五紫草一兩為散每食前用第一汲井
水服二錢(千金翼)

二十六

二十七

【氣淋】小便急滿。欲解不出。點滴者是。食鹽和醋調服。良效。(廣利方)

①白芷醋浸。焙乾。二兩為末。煎木通甘草調下一錢。連進二服。(普濟方)

②雞腸草三兩。石韋去毛一兩。每用三錢。水一盞煎服。(東陽方)

③好綿四兩。燒灰。麝香半分。每服二錢。溫葱酒。連進三服。(扶壽精方)

④水三升。煮豉一升。一沸。去滓。納鹽一合。頓服。亦可單煮豉汁服之。

⑤熬鹽熱熨。小腹冷復易。

⑥甘蔗上青梢一兩。酒煮服。三日全愈。極效。(醫學集成)

【熱淋】小便熱而赤。短而澀者。是煎馬齒莧汁服之。(聖惠方)

⑦白茅根四斤。水一斗五升。煮五升。服一升。日三夜二。

⑧馬薊根搗汁服。

⑨生藕汁。生地黃汁。生葡萄汁。各等分。每服一盞。入蜜和服。(乾坤秘蘊)

⑤白薇為藥。各一兩為末。酒服一匙。日三服。

⑥黃芩一兩。水煎。熱服。(千金方)

⑦乾柿燈心等分。水煎。日服。(朱氏方)

⑧野葡萄根七錢。葛根七錢。水一鐘。煎七分。空心溫服。(乾坤秘蘊)

⑨蠶種燒灰。入麝香少許。水服二錢。極效。(衛生家寶方)

⑩麻皮一兩。炙甘草三分。水二盞。煎一盞。服。日二。取效。(聖惠方)

⑪海金沙草。陰乾為末。煎生甘草調服。二錢。(夷堅志)

⑫大棗二十七枚。葵根切一升。冬用子。夏用苗。二味以水三升。煮取一升。二分。分二服。熱加黃芩一兩。(仁存堂方)

【勞傷溺血】茅根乾薑等分。入蜜一匙。水二盞。煎一盞。一服即可全愈。(筆峯雜興)

①乾膠三兩。炙。搗末。酒二升。和溫服。(

本草綱目)

【心熱尿赤】木通。生地黃。炙甘草等分。入水葉七片。水煎服。(錢氏家藏方)

【腎囊風】用猪尿泡。火炙。以鹽酒食之。(救急方)

①川椒杏仁。研膏塗掌心。合陰囊。

②以稻草燒皂角。薰十餘次。即止。(濟急仙方)

③地骨皮二兩。吳茱萸一兩。煎湯熏洗。即效。(應驗良方)

④新荷葉一張。連鬚。葱頭七個。煎湯。先熏後洗。良佳。(濟眾方)

⑤雞蛋煮熟。去白留黃。炒出油。老杉木燒灰。調油擦之。

【陰囊濕癢】甘草煎湯。頻洗。日三五度。(古今錄驗方)

①爐甘石一分。真蚌粉半分。研粉撲之。(直指方)

②烏賊骨。蒲黃。研末撲之。(醫宗三法)

③綿黃芪酒炒為末。以熟猪心點喫。妙。

(濟急仙方)

五滑石一兩。石膏半兩。白礬少許。研搗之。(集簡方)

(直指方)

六爐甘石一分。真蚌粉半兩。細研粉。搗之。(直指方)

(古今錄驗)

七甘草煎湯。日洗三五度。(古今錄驗方)

(簡便方)

八石菖蒲。蛇牀子。等分為末。日擦二三次。(濟急仙方)

(簡便方)

九松毛煎湯。頻洗。(簡便方)

(聖惠方)

十五倍子。臘茶各五錢。膩粉少許。研末。先以葱椒湯洗拭過。香油調擦。以瘡為度。(聖惠方)

(丹溪心法)

十一密陀僧。乾薑。滑石。為末。擦上。(丹溪心法)

(醫宗三法)

十二槐花枝。煎水。洗三五遍。冷再煖之。(必效方)

(醫宗三法)

十三龍骨。牡蠣粉。撲之。(醫宗三法)

(衛生家寶方)

十四濕癢至欲潰者。用板兒松香。為末。紙捲作筒。每根入花椒三粒。浸油燈盞

內。三宿。取出。點燒。淋下油。擦之。先以米汁洗過。(簡便方)

五先以葱椒煎湯洗。再以五倍子。臘茶研末。少加鉛粉。擦

六葱三十根。胡椒。花椒。各一兩。蛇牀子末。一兩。均作三服。煎湯洗

七川椒。杏仁。研膏塗

子癰。腎子作痛。外現紅色。遲則成膿。潰爛致命。急用枸橈全個。川棟。秦艽。陳皮。赤芍。甘草。防風。澤瀉。各一錢。五分。一服即愈。(林屋山人秘方)

二老杉木。燒灰。蘇葉。為末。等分。敷。仍以蘇葉包之

三石蟹。熱水磨服

囊癰。又名囊脫。陰囊潰爛。腎子落出。用紫蘇湯洗之。並用紫蘇葉根搗敷。取新荷葉包好。內服黃連六分。歸尾連翹。雲苓各一錢五分。甘草。木通各一錢。煎服。(衛生家寶方)

五倍子。同石灰。炒黃色。去灰。攤地出

火毒。砂盆內研細末。不犯銅鐵。乾捺瘡上。五七次。可

三抱出雞卵殼。黃連。輕粉。等分為細末。用鍊過香油調塗。(醫林正宗)

四獨核肥皂數個。用乳香。四兩。裝入。外將濕草紙包煨。火須先文後武。以煙盡為度。出火氣。研末。每服一錢五分。三服即愈

五鳳仙花子。生甘草各二錢。研末。麻油調敷。即生肌肉。(永類鈐方)

腎滿。玉莖。強硬不痿。精流不住。時時如針刺。捏之則痛。其病又名強中。乃腎滿漏精也。用韭子。破故紙。各一兩。為末。每服三錢。水一盞。煎至六分。服日三次。即愈。(陳氏經驗方)

二甘草。黑豆煎湯。頻飲

勞復。交接勞復。卵腫或縮入。腹痛欲絕者。礬石一分。硝三分。大麥粥調服一錢。日三服。熱毒即從二便出。(肘後方)

後方)

【陽痿】蛇牀子、五味子、菟絲子等分為末。蜜丸。梧子大。每服三十九丸。溫酒下。日三服。(千金方)

【覆盆子作丸】久服能令堅長。(本草綱目)

【雀卵和天雄、菟絲子丸】服令陰強盛。(本草綱目)

【壯狗陰莖焙乾為末】和酒服。令強熱。大能生子。(本草綱目)

【腥膈膈酥炙為末】空心酒下一錢。或丸服之。(本草綱目)

【紫梢花生龍骨各二錢】麝香少許。為末。蜜丸。梧子大。每服二十九丸。燒酒下。欲解。飲生薑甘草湯。(集簡方)

【購泥鰍煮食之】(集簡方)

【腎虛陽痿】猪腰子一對。切片。枸杞葉八兩。以豉汁一盞。同椒鹽煮食。(經驗方)

【原蠶蛾焙為末】酒服一錢。

【鰻鮓起陽】和五味。煮熟。空心服。

【四鹿角霜、茯苓等分為末】酒糊丸。梧子大。每鹽湯下三十九丸。

【精脫慾絕】男女交感。樂極。精脫而死。切不可驚。走下牀。男脫則女以口哺。送其熱氣。女脫則男以口哺。送其熱氣。一連數十口呵之。則必悠悠然。陽氣重回矣。再以人參附子湯灌之。送氣之法。先須閉口。提丹田之氣上來。盡力哺於口中。送下喉去。可救氣絕於俄頃。若貧者不能得參。急用黃芪四兩。當歸二兩。附子五錢。水煎服。(宣明方)

【脫陽】男子精瀉不止者。女急咬其人中。痛極自止。累效。(驗方)

【縮陽】火藥二錢。研碎。滾水沖服。用熱酒更妙。如得吐瀉。即回生。若不用此猛烈之藥。決無生理。勿以危險忽之。但火藥研時。須輕且遲。以免爆發。(董氏集驗方)

【陰冷】醋和熟灰。頻熨之。(千金方)

【車前子末】飲服一錢。日二服。(千金方)

【食茱萸納牛膽中】百日。令乾。每取二七枚。嚼納陰內。良久。如火。(千金方)

【搗菟菜根傳之】

【囊腫】葱白汁調飛麵塗。

【水調牡蠣粉塗】

【陰腫如斗者】雞翅毛一孔。兩莖者。燒灰服。左腫用右翅。右腫用左翅。全腫並用。

【腎子腫】竈心土三升。研碎。炒極熱。加川椒、小茴香。將陰囊放在土面。冷即再炒。

【脫囊】陰囊潰爛。署名脫露。名為脫囊。真紫蘇莖葉為細末。乾敷。如未破。香油調塗。青荷葉包上。

【脫肛】慈石末。麵糊調塗。顛上。入後洗去。(張文仲備急方)

【後陰諸證單方】

(二) 貼水荷葉。焙研。酒服三錢。併以荷葉盛末坐之。

(三) 慈石半兩。煨醋淬。七次為末。空心未飲服一錢。仍以鐵屑煎湯洗。

(四) 苦參五倍子。陳壁土等分。煎湯洗之。以木賊末敷之。(醫方摘要)

(五) 紫背浮萍為末。乾點之。奇效。(得效方)

(六) 茜根。石榴皮各一握。酒一盞。煎七分。溫服。

(七) 萬年青連根煎湯洗。以五倍子末敷之。

(八) 先以麻油潤之。再用風菱殼煎湯洗之。即刻縮上不脫矣。(張氏經驗方)

(九) 枳殼防風各一兩。枯礬二錢。煎水乘熱熏洗。隨以赤石脂末搽上。托入。

(十) 五倍子三錢。白礬少許為末。水一椀煎湯洗。

(十一) 貫衆朴硝橘皮等分為末。每五錢煎湯淋洗。後以木賊草燒研搽。

(十二) 大田螺。井水養三四日。去泥。以雞爪黃連研細末。入殼內。待化成水。以茶洗淨。將雞翎蘸掃之。以軟帛托上。

(十三) 蝸牛一兩。燒灰。豬脂和敷。立縮。(聖惠方)

(十四) 豆板寬煎湯。倒入脚桶內。放白礬三四粒。乘熱熏之。稍冷即洗。洗至湯冷為度。其肛欲手撮之。自然收進。(怪證奇方)

(十五) 木賊草燒灰搽之。按入。或加龍骨。

(十六) 蒲黃和豬脂敷。日三五度。

(十七) 白雞冠花。防風等分為末。每服一匙。空心米飲下。

(十八) 豆板寬煎湯。入脚盆內。放白礬三四枚。乘熱熏之。稍冷即洗。洗至湯冷為度。隨以手指按住肛門。自然收進。(醫林集要)

(十九) 虛冷脫肛。石灰炒熟。故帛裹坐。冷即易。

(二十) 痔瘡脫肛。冷水調黃連末塗。

【瀉痢脫肛】石榴皮陳壁土少加明礬煎洗。再用五倍子炒研末。敷托而上。

【久痢脫肛】用訶子赤石脂龍骨各二錢。研細末。以茶少許和藥。搽肛上。絹帛搽入。

(二十一) 芋麻根煎湯。外以木賊研末敷。

【肛門腫痛】馬齒莧葉三葉酸草等分。煎湯熏洗。一日二次。頗有效驗。(集簡方)

(二十二) 生芋麻根搗爛。坐之。甚良。(集簡方)

(二十三) 急取屠刀磨水服。效。

【肛門痛癢】杏仁不拘多少。取膏頻頻敷之。(肘後方)

【肛門蟲蝕】蒸木粟取膏。以水銀和捻長三寸。以綿裹。夜納下部。明日蟲皆出。(心效方)

(二十四) 鶴虱草為末。水調五錢服。愈。

(二十五) 骨蒸。芒硝末。水服一小匙。日二服。甚良。(千金方)

①石膏十兩研。加乳粉。水和服一匙。日再。

②地骨皮二兩。防風一兩。甘草炙五錢。每用五錢。生薑五片。以水煎服。(濟生方)

【虛勞】地黃汁和酒煎膏服。

①白朮一斤。人參四兩。切片。以流水十五碗。浸一夜。桑柴文武火煎取濃汁。熬膏。入煉蜜收之。每晨用白湯點服。

③生薑汁半斤。蜜十兩。人參末四兩。煎膏。米飲調服。

④大黃四分。以童便煎取四合。去滓。空心分二次。服下頗驗。(廣利方)

⑤活鮒魚三尾。浸童便中。死後取出。不去鱗雜。用泥塗之。燒灰為末。臨睡時。用黃酒分數次送下。(席延賞方)

【驗癆】乳香燒煙。熏其手背。男左女右。以絲巾蓋手掌心。良久。有毛自掌中出。視毛色白者易治。紅者難治。黑者不治。無毛者非癆病也。屢試俱驗。(成)

醫林集要

【盜汗】五倍子去蛀末。炙乾研末。稍用稀米漿調和。填臍中。外用舊膏藥貼之。勿令洩氣。兩次即愈。(席延賞方)

②白芷一兩。辰砂五錢。為末。每服二錢。溫酒下。屢驗。(集驗方)

③熟艾二錢。白茯苓三錢。烏梅三枚。水一杯。煎八分。臨卧溫服。(真人方)

④經霜桑葉。研極細末。米飲湯下。汗立止。(丹溪心法)

⑤臨卧前。塗酸醋於胸背腋窩間。極效。(家庭醫學)

⑥小麥炒熟。泡湯飲之。約一大碗。即止。(易簡方)

【自汗】鬱金末。卧時。調塗乳上。有效。(集簡方)

②梗米碾粉。盛絹包內。時時撲之。(保命集)

③身上常擦燒酒。便能止汗。(西藥大成)

【失眠】睡前。以麵包兩片。牛乳一杯。調鹽食之。便能安眠。即最重之症。亦可以此法治之。(急救良方)

②燈草煎湯代茶飲。即得安睡。(集簡方)

③睡後默數一、二、三、四等數目。不久便沈沈入眠。良方也。(日本藥局方)

【勞傷】精敗面黑。肉從容。四兩。煮爛。研同精羊肉。分四度下五味煮粥。空心食。

②虛勞寒熱。肢體倦疼。不拘男婦。八九月。青蒿成實時。米之。去枝梗。以童便浸三日。曬乾為末。每服二錢。烏梅一個煎湯服。

③麥冬一兩。炙甘草二兩。粳米半合。棗二枚。竹葉十五片。水煎服。

【脚氣】鹽三斤。炒熱。包裏痛處。另以一包。以脚踏之。冷則隨換。夜夜用之。以脚熱透為度。加槐白皮同炒更妙。(食療本草)

③麥冬一兩。炙甘草二兩。粳米半合。棗二枚。竹葉十五片。水煎服。

(二) 甘遂末。水調敷。內服甘草湯。常以杉木或蘿蔔煎湯洗。可除根。

(三) 桑條二兩。炒香。以水一升。煎二合。每日空心服。(聖濟總錄)

(四) 杉木。飽花煎濃湯。入朴硝一兩。頻洗。又以藍布浸鹽酒束。

(五) 草烏頭一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。蒼朮一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各焙乾。為末。酒糊丸。梧子大。每服五十九。酒下。(如宜方)

(六) 小麥麩。醋蒸。斂手足。互易。至汗出。並良。(本草綱目)

(七) 白楊皮。切片。浸酒。頻飲。(本草綱目)

(八) 牽牛子。搗末。蜜丸。小豆大。每服五丸。生薑湯下。取小便利。乃止。亦可吞之。(肘後方)

(九) 拔英。洗剉一斛。以水三斛。煮取九斗。漬麴去渣。取一斛。漬飲。如常釀酒法。任意日飲之。(肘後方)

(十) 葱。莖葉煮湯。漬之。日三五次。妙。(獨

行方)

(十一) 馬齒莧。和少粳米醬汁。煮食之。(外臺秘要)

(十二) 木瓜。切片。囊盛。踏之。或煎湯飲之。(外臺秘要)

(十三) 檳榔。仁為末。以檳榔殼煎汁。或茶飲。或紫蘇湯。或豉汁調服。二錢。甚效。(外臺秘要)

(十四) 枳殼。炒二兩。四錢。甘草六錢。為末。用木瓜湯服。二錢。(直指方)

(十五) 赤小豆。和鯉魚煮食。甚治脚氣。(食療本草)

(十六) 大麻。仁熬香。以水研取一升。再入水三升。煮一升。入赤小豆一升。煮熟。食豆飲汁。(外臺秘要)

(十七) 牛乳。五升。硫黃三兩。煎取三升。每服三合。羊乳亦可。或以牛乳五合。煎調硫黃末一兩。服。取汗。尤良。(肘後方)

(十八) 桐葉。煮汁。漬之。并飲少許。或加小豆。尤妙。(聖惠方)

(十九) 鱸。一個。重約一斤者。清燉。但入大蒜頭五六個。不另加作料。熟時淡食。即愈。不能食者。但飲其湯亦可。(芝隱方)

(二十) 取豬蹄膀之大骨一根。切陳香櫟數片。加水。煎至骨髓出。香櫟爛。將水傾入盆中。浸脚入。上覆以布。連日如法而行。即愈。(壽域神方)

(二十一) 杉木。節三寸。橘葉三錢。煎服。七服自愈。最忌洗脚。(芝隱方)

(二十二) 陳扁豆。一升。愈陳愈佳。新者忌用。通草一兩。同煮爛。將豆與水頻頻飲食。之二三日便愈。(必效方)

(二十三) 陳胡盧。生薑麥稻各適量。入水煎。滾盛桶中。先熏後洗。五六次即消。(外臺秘要)

(二十四) 每日於早起夜睡時。一手握脚趾。一手以掌心用力擦足心中。數日後。濕氣即發為脚汗。由湧泉穴而出。病自去矣。(必用方)

⑤不食米飯。改用赤豆與薏苡仁煮熟代飯。臨時略加砂糖。數日便愈。薏苡米不可多。只可視赤豆十分之二（芝隱方）

【寒濕脚氣】白芷、芥子等分為末。薑汁和塗之（醫方摘要）

②蓖麻子七粒。去殼研爛。同蘇合香丸貼足心。痛即止（外臺秘要）

③古甌燒紅。以陳臭米泔水淬之。乘熱布包三塊。用膝夾住。綿被覆之。三五次愈（扶壽方）

④胡盧巴酒浸一宿。焙破。故紙炒香。各四兩為末。以木瓜切頂去瓢。安藥在內。令滿。用頂合住。籤定。爛蒸。搗丸。梧子大。每服七十九。空心温酒下（家藏方）

⑤商陸根切小豆大。煮熟。更以萊豆同煮為飯。每日食之。以瘥為度。最效（斗門方）

⑥穿山甲前兩足。燒存性。研細。入麝香。

當門子少許。多少隨人斟酌。要服此藥。須去他事。至晚不可進飲食。候至夜深腹空時調服。坐卧隨意。及雞鳴。又服。痛立止。過一二日。便能步履如常。極妙如神（千金方）

⑦牛皮膠一塊。細切。以麪炒成珠。研末。每服一錢。酒下。其痛立止（萬氏方）

⑧團魚兩個。水二斗。煮一斗。去魚。取汁。加蒼耳、蒼朮、尋風藤各半斤。煎至七升。去渣。以盆盛。熏蒸。待温浸洗。神效（乾坤生意）

【風濕脚氣】石亭脂生用一兩。川烏頭生一兩。無名異二兩。為末。葱白自然汁。和丸。梧子大。每服一錢。空心淡茶生葱吞下。日一服（瑞竹堂方）

②猪肝作生膾食之。取利

③紫蘇子、高良薑、橘皮等分。蜜丸。梧子大。每服十九。空心酒下（藥性論）

④針砂、川烏頭為末。和勻炒熱。綿包熨之（摘元方）

【脚氣衝心】白礬三兩。水一斗五升。煎沸浸洗（千金方）

②威靈仙末。每服二錢。酒下。痛減一分。則藥亦減一分（簡便方）

③秦檉一石。煮汁。入椒目一升。更煎十沸。漬脚三四度愈

④陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少。加蜜搗和。丸如梧子大。每日食前米飲下三十丸（食療本草）

⑤吳茱萸生薑搗汁。服甚良（食療本草）

⑥大豆一升。水五升。煮令極熟。去豆。適寒温浸脚。冷重暖之（易簡方）

⑦白檳榔十二個。為末。分二次。熱童便下。外用附子末。鹽酒調塗湧泉穴

⑧杉木節四兩。橘葉三兩。大腹皮三個。水煎。加童便一杯。合服

⑨田螺煮食之。蜆肉亦佳

⑩木瓜、檳榔各二錢五分。吳茱萸一錢五分。水煎服。神效（聖惠方）

【預防脚氣】搗生蘿蔔汁。自膝下至足底。輕輕遍塗之。四五次為度。即能預防。兼覺清爽。(集驗方)

【脚轉筋】俗名勝囊筋。偶然轉筋者。可用大蒜擦脚心。令熱。復以冷水吞大蒜一瓣。有特效。(姚僧坦集驗方)

②炒茱萸二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。得下即安。(聖濟總錄)

③蜈蚣燒研存性。猪脂和傅。(肘後方)

④松節二兩。剉如米大。乳香一錢。銀石器慢火炒焦。存一二分性。出火毒。研末。每服一二錢。熱木瓜酒調下。一應筋病皆治之。(孫用和秘寶方)

⑤楠木煎湯洗之。枝葉同功。(大明醫方)

⑥以故綿醋中甑蒸熱裹之。冷即易。勿停。取差止。(外臺秘要)

⑦作極鹹鹽湯。於槽中暖浸之。(丹溪心法)

⑧赤藜蘆水酒煎服。外以大蒜厚脚心。

桃柳楮桑槐五枝煎湯洗亦佳。(治法彙要)

⑨樟木煎湯。先熏後洗。(治法彙要)

⑩隨將大足趾向上一扳。左足轉筋。扳左足大趾。右足轉筋。扳右足大趾。累驗。(隱方)

【脚麻】凡坐與如廁。尚時久。兩足輒麻木不仁。只須於初覺時。探手膝彎間。頻頻抓之。即愈。(姚僧坦集驗方)

【老人脚氣】用猪腎一對。以醋蒜五味治食之。日作一服。或以葱白粳米同煮粥食之。(奉親養老書)

②猪肚一具。洗淨。細切。以水洗布絞乾。和蒜椒醬醋五味。常食。亦治熱勞。(奉親養老書)

【預防脚氣】每寅日割手足甲。少侵肉。去脚氣。(外臺秘要)

②用生川烏為末。香熟白米作粥。半碗藥末四錢。同米煮熟。稀薄不要稠。下薑汁一茶匙。脚許。蜜三大匙。攪勻。空

心吸之。溫為佳。若中濕。更入薏苡仁末二錢。增米作一中碗服。凡曾患脚氣者。須預服防之。(奇效良方)

●十四 風痺癩狂單方

【中風】凡中風。忽然昏倒。不省人事。須先順氣。然後治風。用竹瀝薑汁。調蘇合丸。如口噤。搥開灌之。如搥不開。急用牙皂。生半夏。細辛。為末吹之。鼻內有嚏。可治。無嚏。則死。(聖惠方)

②生薑嚼碎。不拘多少。向患者面上天庭等處。頻搥。又以生薑汁。滴男左女右。眼角內。即醒。(醫門法律)

【三年中風】松葉一斤。細切。酒一斗。煮取三升。頻服。汗出差。(聖惠方)

【中風口噤】伏龍肝末五升。水八升。攪澄清。灌之。(本草綱目)

②白木四兩。酒三斤。煮取一升。頓服。(千金方)

③獨活四兩。好酒一升。煎半升服。(千金方)

④羌活三兩。牛蒡子二兩。水煎一鐘。入白礬少許。灌之。取效。(聖濟總錄)

⑤荊芥穗為末。酒服二錢。立愈。前後用之甚驗。

⑥附子末吹入喉中。即瘥。(千金方)

⑦豉二斤。吳茱萸一升。二味以水七升。煮取三升。漸飲之。(食療本草)

⑧中風不省。涎潮口噤。語言不出。手足解曳。得病之日。便進此藥。可使風退氣和。不成廢人。柏葉一握。去枝。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一升。煎一二十沸。溫服。如不進酒。分作四五分服。方進他藥。(家藏方)

⑨蘿蔔子。牙皂。各二錢。以水煎服。取吐。(丹溪心法)

⑩大皂角一挺。去皮。猪脂塗炙。黃色為末。每服一錢。湯酒調下。氣壯者二錢。以吐出風涎為度。(濟東方)

⑪竹瀝一升。飲之。連飲佳。(本草綱目)

⑫細研乳香末一錢。以酒煎蘇方木調

服。立吐惡物。瘥。(海藏)

⑬白梅肉。南星末。擦

⑭皂莢末吹入鼻中。

⑮藜蘆一兩。去苗頭。濃煎防風湯。浴過焙乾。切炒。微褐色為末。每服半錢。溫水調灌。以吐風涎為效。未吐再服。(簡要濟衆)

⑯先以烏梅擦齒令開。有痰聲者。研白礬末一錢。生薑汁調灌。無痰聲者。黑大豆三升。炒焦。清酒三升。淋取汁灌。

中風不語。用生銅綠二兩。乳細水化去石。慢火熬乾。再研入麝香一分。糯米粉糊和。丸彈子大。陰乾。卒中者。每丸作二服。薄荷酒研下。餘風硃砂酒化下。吐出青碧涎。瀉下惡物。大效。(經驗方)

⑰獨活一兩。酒二升。煎一升。大豆五合。炒有聲。以藥酒熱投蓋之。良久。溫服三合。未瘥。再服。(小品方)

⑱高雉雞一隻。治淨。以酒五升。煮取二

升。去渣。分作三次。連服之。食葱薑粥。暖卧。取小汗。(飲膳正要)

⑲藜蘆一分。南星一個。去浮皮。於臍上剝一坑。納入陳醋二椀。斗四面火逼黃色。研為末。生麵丸。小豆大。每三丸溫酒下。(經驗方)

⑳酒五合。和入乳汁。鐘半。分為二服。即能言。(食療本草)

㉑細牛蒡根。取時避風。以竹刀或荊刀刮去土。用布拭淨。搗爛。絞汁一大椀。和好蜜四合。溫分兩服。得汗出。便瘥。(博濟方)

㉒黑大豆煮汁。煎稠如飴。含之。並嚥汁。(肘後方)

㉓陳醬五合。人乳五合。相和研勻。以布絞汁。隨時與服。良久。當語。(聖惠方)

中風口喎。荊芥煮汁飲之。(本草綱目)

㉔新石灰一合。醋炒。調如泥塗之。左塗右。右塗左。立便牽正。(寇氏行義)

③ 生烏頭、青礬各等分。每用少許，噉入鼻內，取涕吐涎，立效。（篋中方）

④ 括蕒絞汁，和大麥麵作餅，炙熟，熨之。正便止。（聖惠方）

⑤ 以五寸長之葦管一枚，刺入耳內，四面以麵密封，不透風。一面以艾炙七壯，患右灸左，患左灸右。（勝金方）

⑥ 取大鯉魚，以鐵刺頭上出血，左斜塗右，右斜塗左，正即洗去。

⑦ 皂莢去皮為末，醋和，右歪塗左，左歪塗右。

⑧ 南星末、皂莢末，加醋、雞冠血調和，貼取烏鴉，全者鹽泥固濟，火煨為末，和酒服之。（本草綱目）

⑨ 取鹿肉和生椒，同搗敷之，正則去之。（本草綱目）

⑩ 青荊芥一斤，青薄荷一斤，同入砂盆內研爛，生絹絞汁，於磁器中煎成膏，濾去渣三分之一，將二分曬乾為末，以膏和丸，梧子大，每服三十丸，白湯

下。早暮各一服，忌動風物。（經驗方）

① 蓖麻子仁搗膏，左貼右，右貼左，即正。（外臺秘要）

② 用蓖麻子仁七七粒，研作餅，右喝安在左手心，左喝安在右手心，却以銅盃盛熱水，坐藥上，冷即換，五六次即正。（婦人良方）

③ 用蓖麻子仁七七粒，已豆十九粒，麝香五分作餅，如上用。

④ 天南星生研末，自然薑汁調之，左貼右，右貼左。（仁存堂方）

⑤ 豉二升，吳茱萸一升，二味以水七升，煮取三升，漸飲之。（食療本草）

⑥ 取空青末如豆大一枚，口內含之，即愈。（食療本草）

⑦ 青松葉一斤，搗汁，清酒二升，浸二宿，近火一宿，初服半升，漸至一升，頭面汗出，即止。（千金方）

⑧ 枳殼刮茹，浸酒飲之。

⑨ 桂心酒煮取汁，故布蘸搗病上，正即

止。左喝搗右，右喝搗左，常用大效。千金方）

⑩ 乳香煙熏之，順其血脈，自愈。（證治要訣）

⑪ 皂莢五兩，去皮為末，三年米醋和之，左喝塗右，右喝塗左，乾更上之。（外臺秘要）

⑫ 已豆七枚，去皮研，左喝塗右手心，右喝塗左手心，仍以暖水一盞安藥上，須臾即正，洗去。（聖惠方）

⑬ 活鮫魚切尾尖朝吻貼之，即正。（時珍本草）

【中風舌強】雄黃、荊芥穗等分為末，豆淋酒服二錢。（衛生寶鑑）

⑭ 烏雄雞一隻，切葱白一握，煮汁，空心食之。（奉親養老書）

【中風瘦厥】白礬一兩，牙皂莢五錢，為末，每服一錢，溫水調下，吐痰為度。（陳師古方）

⑮ 生川烏頭、生附子，並去皮臍，各半兩。

生南星一兩。生木香二錢半。每服五錢。生薑十片。水煎一盞。溫服。(和劑局方)

中風痰壅 旋覆花洗淨。焙研。煉蜜丸。梧子大。夜卧時。茶下五丸至七丸十丸。(陳氏經驗方)

② 砒如茱豆大。研。新汲水調下。少頃。以熱水投之。大吐即愈。未吐再服。(聖惠方)

中風氣厥 昏迷不醒。六脈沈伏者是。生附子。生南星各去皮。生木香五錢。每服四錢。薑九片。水二盞。煎七分。溫下。(濟生方)

中風發熱 大戰。苦參四兩。白朮漿一斗。煮熱洗之。(千金方)

中風煩熱 醜醐四兩。每服半匙。溫酒和服。日一次。(集驗方)

中風腹痛 鹽半斤。熬水乾。著口中。飲熱湯二升。得吐自愈。(肘後方)

中風掣痛 不仁不遂。掣痛甚劇。以乾

艾揉團。結瓦甌中。並下塞諸孔。獨留一孔。以痛處著甌孔。燒艾熏之。一時即止。(肘後方)

中風虛弱 羊肚一具。粳米兩合。和椒薑豉。蔥作羹食之。(飲膳正要)

中風偏廢 生附子一枚。去皮臍。羌活烏藥各一兩。每服四錢。生薑三片。水一盞。煎取七分。服之。(王氏易簡方)

② 生吞杏仁七枚。不去皮。火逐日加至七。七四十九枚。周而復始。食後仍飲竹瀝。以瘥為度。(外臺秘要)

中風癱瘓 卒然手足不舉。用穿山甲炮熟。大川烏頭。炮熟。紅海蛤。如棋子大者。各二兩。為末。每用半兩。搗葱白汁。和成厚餅。徑寸許。隨左右貼脚心。縛定。密室安坐。以脚浸熱湯盆中。待身麻汗出。急去藥。宜避風。自然手足可舉。半月再行一次。除根。忌口遠色為要。(衛生寶鑑)

② 五靈脂研末。以水飛去上面黑濁。下

面沙石。研末。每服二錢。熱酒調下。日一服。(奇效良方)

風濕癱瘓 頑痺不仁。筋骨攣縮。六月內。取河沙。烈日暴令極熱。伏坐其中。冷即易之。取熱徹通汗之意。頗有效也。(陳藏器方本草)

② 鳳仙花。柏子仁。朴硝。木瓜。煎湯洗浴。每日二三次。神效無匹。(扶壽精方)

熱風癱瘓 四肢不能動彈。可用羌活二斤。構子一升。為末。每酒服一匙。日三服。(廣濟方)

暑濕癱瘓 自然銅燒紅。酒浸一夜。川烏頭炮。五靈脂。蒼朮。酒浸各一兩。當歸二錢。酒浸為末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木即止。(陸氏積德堂方)

半身不遂 蠶沙蒸熟。裝三袋。以一袋炒熱。著患處。冷即輪流易之。

② 仙靈脾一斤。細剉。生絹袋盛。於不津

器中用無灰酒二斗浸之。垂封。春夏三日。秋冬五日。後每日暖飲。常令醺然。不得大醉。酒盡再合。無不效驗。(聖惠方)

〔聖惠方〕

〔三〕蓖麻子油一升。銅鍋盛油。着酒中一日。煮之。令熟。細細服之。(外臺秘要)

〔四〕附子一兩。以無灰酒一升。浸一七日。隔日飲一合。(延年秘錄)

〔五〕桃仁二千七百粒。去皮尖雙仁。以好酒一斗三升。浸二十一日。取出。曬乾。杵細。丸如梧子大。每服二十九。以原酒吞之。(外臺秘要)

〔六〕麻黃湯熬成糊。攤紙上貼。不病一邊。上下令遍。但除七孔。其病處不糊。以竹蠶焙為末三錢。老人加麝香一錢。研勻。熱酒調服。就卧。須臾藥行。如風聲。口吐出惡水。身出臭汗。如膠。乃急去糊紙。別溫麻黃湯浴之。暖卧將息。淡食十日。手足如故。(岫巖神書)

〔老人中風〕牛蒡根一升。去皮曬乾。杵

為麵。白米四合。淘淨。和作餅。餽。豉汁中煮。加葱椒五味。空心食之。極效。(壽親養老書)

〔中風強直〕

用橘樹皮。細切一升。酒二升。浸一宿。每日溫服半斤。酒盡再作。(時珍本草)

〔二〕大豆三升。淘淨蒸濕。以醋二升。傾入瓶中。地上鋪席。撒豆令遍。令病人卧之。仍重蓋五六層衣。豆冷。漸漸却衣。仍令一人於被內引挽。寧急處。更蒸豆。再作。並飲荆瀝湯。如此三日。三夜即休。(崔氏纂要)

〔三〕夜合枝。柏枝。槐枝。桑枝。石榴枝。各五兩。並生剉。糯米五升。黑豆五升。羌活二兩。防風五錢。紅麴七斤半。先以水五斗。煎五枝。取二斗五升。浸米豆。蒸熟。入麴。與防風羌活。如常釀酒法。封三七日。壓汁。每飲五合。勿過醉。致吐。常令有酒氣。(奇效良方)

〔諸風眩運〕取乾菊花煮湯飲之。或浸

酒。或釀酒服。皆妙。(千金方)

〔預防風病〕

久食炒胡麻。則步履端正。言語不蹇。常人常食。不生風病。(李廷飛方)

〔手足風痺〕

六月取河砂。烈日曝令極熱。伏坐其中。冷則易之。取熱徹通汗。隨病用藥。切忌風冷勞役。(陳藏器方本草)

〔二〕川芎一兩。生薑一兩。葱一握。水煎。熏洗。

〔三〕燒酒糟出甑時。乘熱將髻骨挿入。熏洗數次。效。

〔四〕皂莢一斤。不蛀者。食鹽五升。細剉皂莢。和鹽炒熱。以青布裏。熨病處。瘡。白飯二分。熟附子一分。為末。每酒服半匙。日二服。以身中熱行為候。十日便覺。忌猪肉冷水。(千金方)

〔六〕威靈仙炒五兩。生川烏頭五靈脂各四兩。為末。醋糊。丸。梧子大。每服七丸。鹽湯下。忌茶。(普濟方)

〔六〕威靈仙炒五兩。生川烏頭五靈脂各四兩。為末。醋糊。丸。梧子大。每服七丸。鹽湯下。忌茶。(普濟方)

【風濕】蒼耳子三兩。炒為末。以水一升半煎取七合。去滓呷之。(食醫心鏡)

【黑雌雞肉作羹食佳。(別錄)】

【風寒溫痺】通身麻木或疼痛。生川烏末四錢。薤苳仁末二錢。入米粥內。再熬下薑汁一匙。蜜三匙。日三服。

②紫蘇二兩。杵碎。以水三升。研取汁。煮粳米二合。作粥。和葱椒薑豉食之。

【風緩頑痺】諸節不隨。腹內宿痛者。用原蠶砂炒黃。袋盛。浸酒飲。(本草綱目)

【風痺緩急】薤苳仁十五兩。大附子十枚。炮為末。每服一錢。日三服。(金匱要略)

【歷節痛風】由下而上。逐節疼痛。先自兩踝骨痛起。次日流上於膝。三日流於兩股。上至於肩。肩流於肘。肘流於後灣。每至一骨節。疼痛難熬。且日輕夜重。諸藥不效。壁虎三枚。生研。蟬螿三枚。研紙包煨研。地龍五條。生研。木香

五錢。乳香末二錢半。麝香一錢。龍腦五分。研成膏。入酒。糊搗為丸。如梧子大。每日空心。乳香酒服三十丸。取效。(聖濟總錄)

①用獨活。羌活。松節等分。用酒煮過。每日空心飲一盃。(外臺秘要)

②蒲黃八兩。熟附子一兩。為末。每服一錢。涼水下。(肘後方)

③虎脛骨。酒炙三兩。沒藥七兩。為末。每次溫酒送下二錢。頗驗。(聖濟總錄)

④炭灰五升。蚯蚓泥一升。紅花三錢。和醋炒熱。布包作兩。起輪流熨之。甚效。(纂岳全書)

⑤取東向側柏葉煮汁。同麴米釀酒飲。(別錄)

⑥三年陳醋五升。煎五沸。切葱白三升。煎一沸。漉出。以布染。乘熱裹之。痛止乃已。(外臺秘要)

⑦水牛肉脯一兩。炙黃。燕窠土。伏龍肝。飛羅麵各二兩。硫黃一錢。為末。每以少許

新汲水和作彈丸。大於痛處摩之。痛止。即取藥拋於熱油鑪中。(聖惠方)

⑧牛芎子三兩。新豆豉炒。羌活各一兩。為末。每服二錢。白湯下。(本事方)

⑨牛皮膠一兩。水鎔成膏。芸薹子。安息香。川椒。附子各半兩。為細末。入膠中。和成膏。塗紙上。隨痛處貼之。

⑩生薑搗汁。和黃明膠。熬貼。甚妙。(時珍本草)

⑪鋪飯患處。令紅雄雞食之。良久取熟糞封之。將雞伏患人牀下。(陳藏器本草方)

⑫地龍一兩。去土炒。麝香二錢半。另研共為細末。每服一錢。溫酒調下。不拘時。(集驗方)

⑬虎骨。木通。煎湯。頻飲。

⑭松葉十斤。酒五斗。漬三七日。服一合。日服五六度。

⑮沒藥末五錢。虎脛骨酥炙。為末。三兩。每服二錢。溫酒調下。

【痿證】俗名軟癱是也。蒼朮、黃柏煎服。
③羊腎一枚，煮熟和米粉六兩，煉成乳粉，空腹食以愈為度。

④杜仲一兩，切碎，酒水各半，煎服，三日能行，又三日愈。

⑤葶藶十二兩，杜仲四兩，搗末，每旦酒下三錢，忌牛肉。

⑥痿躄，脚弱者，五茄皮釀酒服，或水煎代茶飲。

⑦牛膝煎服，丸服，或浸酒服。

【鶴膝風】風勝則走注作痛，寒勝則如錐刺痛，濕勝則腫屈無力，病在筋則伸不能屈，在骨則移動維艱，久則日腫日粗，大腿日細，痛而無膿，顏色不變，即成敗症，亟宜速治，可用酒糟四兩，皂莢去子一個，芒硝一兩，五味子一兩，砂糖一兩，薑汁半盞，研勻，日日塗之，加入燒酒尤妙。（通妙方）
⑧初起時膝下酸痛，漸至膝蓋膨腫，股筋憔悴，以腎虛虧之故，用尖嘴鱧鰻

魚數尾，和白糖搗爛，敷於患處，三四次，立可保愈。（本事方）

⑨新鮮白芷，酒煮成膏，收貯磁瓶，每日取膏二錢，陳酒送服，再取二三塗患處，至消乃止。（魏氏驗方）

【羊癩風】卒然栽倒，不省人事，口吐白沫，取菜葉或青草，放口中，立時蘇醒，再以青橄欖一斤，打破，砂鍋內熬十數沸，去核，入石臼內，搗爛，再熬，熬至無味，去渣，熬成膏，用白礬八錢，研末，加入攪勻，每日早晚取膏三錢，開水送下，服完自愈。（成無己明理論）

⑩兩前茶，白礬各一斤，為末，茶汁米飲湯為丸，每服四十九丸，發日前二服，茶送下。（陳氏筆記）

⑪好松蘿茶末八兩，生礬末四兩，米飲搗為丸，臨發日清晨，及常日，各服三錢，米飲湯下。（集效方）

⑫伏龍肝末，水服一小匙，日三度。（千金方）

⑬橄欖熬膏服

⑭鉀溴一錢，溶水二合，一日服二次，至四次。（西藥大成）

⑮鈉溴一錢，甘松酒二十滴，水二兩，一日分三次服，服時再加水，或茶和之。（日本藥局方）

⑯上好松蘿茶一斤，晉礬一斤，為末，煉蜜丸，桐子大，每服四十九丸，滾湯下。（身經通考）

⑰用尖嘴鱧鰻魚數尾，和白糖搗爛，敷患處，三四次即可速愈。（應驗良方）

⑱經霜老茶葉一兩，明礬五錢，為細末，水法丸，辰砂為衣，每服三錢，開水下三服，全愈。

⑳二陳湯，加青皮、丹皮、石菖蒲、辰砂煎服，效。
【風痰癩疾】金燈花根似蒜者一個，以茶清研如漿，正午時以茶調下，即臥，日中良久吐物，如不吐，再以熱茶投之。（奇效良方）

② 生白礬一兩。細茶五錢。為末。煉蜜丸。如梧子大。每服五十九。久服自然斷根。(得效方)

③ 大皂角半斤。去皮子。以蜜四兩。塗上。慢火炙透。搥碎。以熱水浸一時。按汁。慢火熬成膏。入麝香少許。攤在火綿紙上。曬乾。剪作紙花。每用三四片。入淡漿水一小盞中。洗淋下。以筒吹汁入鼻內。待痰涎流盡。食芝麻餅一個。涎盡即愈。立效。(普濟方)

④ 九節菖蒲。去毛。木白搗末。以黑豬豬心一個。批開。沙罐煮湯。調服三錢。一日一服。(醫學正傳)

⑤ 鮮椒攪切細屑。去實。蘸明礬末服之。愈多服愈妙。至痰自湧出為度。靈效異常。(醫林集要)

【暗風癩疾】忽然仆地。不知人事。良久方醒者。是蛇黃火燉。醋淬七次。為末。每服酒調二錢。數服愈。年深者亦效。

(得效方)

② 用臘月烏鴉一隻。鹽泥固濟。於瓶中煨過。放冷。取出為末。入硃砂末半兩。每服一錢。酒下。日三服。不過十日愈。(得效方)

③ 高頭附子尖為末。茶服半錢。吐風痰效。(時珍本草)

【卒得癩疾】鈎藤。甘草炙各二錢。水五合。煎一合。每用棗許日三五度。(聖惠方)

【失心風癩】天南星。九蒸九曬為末。生薑汁打糊。丸如梧子大。每服二十九。煎人參。麥冬。菖蒲湯下亦可。(醫學正傳)

⑩ 鬱金一枚。甘草二錢半。水半杯。煮乾。去甘草。切片。焙研為末。入真腦砂子炒五分。每用一錢。以生豬血五七滴。新汲水調下。不過兩劑愈。(本草綱目)

【癩狂】甜瓜蒂細末二分。早晨第一汲井水下。一食頃。含沙糖一塊。良久涎

如水出。涎盡食粥。

② 伏龍肝末。水服一匙。每日三服。

③ 苦參五斤。蜜和丸。如酸棗大。每服十九。薄荷湯化下。

④ 蠶紙燒灰。酒下一匙。或於手拇指甲下針之。血出。便效。

⑤ 硃砂一兩。細研。水飛。青靛淨化二錢。以豬心血糊為丸。每用茶下二十九。甚者不過三服愈。

⑥ 苦參為末。蜜丸。茶清下。

⑦ 川鬱金一錢。天竺黃一兩。雄黃五錢。白礬三錢。為末。以不落水豬心血搗為丸。硃砂為衣。如桂圓大。每日以石菖蒲五分煎湯。送一九。

⑧ 蘿蔔子為末。溫水調服。探吐痰涎。

⑨ 鬱金一兩。明礬三兩。共為細末。糯米糊為丸。如梧子大。每服五十九。白滾湯送下。

⑩ 犀黃三分。水飛神砂一分。巴豆霜三分。白礬三分。研細末。加米粉作二十

丸硃砂為衣。每服一丸。溫水下。必吐瀉。不愈。再服效。

③猪肚一具。內放起碼金箔十張。仍用綫縫好。煮熟。水不須多。約兩湯碗為度。連肚帶湯。設法令其服盡。瘋病自愈。誠奇方也。(經驗良方)

病笑不休 滄鹽煨赤。研。入河水煎沸。噉探吐。

●十五 傷寒單方

陰症傷寒 即夾色傷寒。俗名夾陰傷寒。男子腎囊。女子乳頭內縮。或手足彎曲紫黑。甚則牙緊氣絕。用紋銀一塊。槌扁燒紅。如病人未絕氣。止燒滾熱。放在臍上。再用活雞一隻。連毛破開。不去腸雜。包於銀上。用布縛住。以手按緊。即愈。(證治秘要)

②先因慾事。後感寒邪。陽表陰盛。六脈沈伏。小腹絞痛。四肢逆冷。嘔吐清水。不假此藥。無以回陽。用人參乾薑炮各一兩。生附子一枚。破作八片。水四

椀半。煎成一椀。頓服。自然脉出身溫矣。(傷寒蘊要)

③胡椒四十九粒。連鬚葱頭四十九個。加百草霜一撮。共搗成泥。分二處布攤。一貼臍上。一貼龜頭。用線捆住。少頃。奏效如神。(醫貫)

④黑大豆炒乾。投酒熱飲。或灌之。使吐復飲。取汗為度。(居家必用方)

⑤百合煮濃汁。服一椀。良效。(千金方)

⑥肚痛面青者。滾水沖鴿糞一升。熏被蓋睡。

⑦露蜂房燒研末。葱九包於陰口。但熱症肝熱。亦能縮陰。此方須審用。

⑧芥菜子研末。調貼臍上。
四時傷寒 用水香薷末。熱酒調服一錢。取汗。(衛生易簡方)

⑨用葱白連鬚五根。生搗。沖熱酒服。

傷寒無汗 凡初覺頭痛。身熱脈洪者。用葱湯煮米粥。入鹽豉食之。取汗。極驗。(肘後方)

②真丹砂一兩。水一斗。煮一升。頓服。覆被取汗而愈。(外臺秘要)

③芝麻炒焦。乘熱搗酒飲之。煖卧取微汗出。良。(肘後方)

④以水七椀。燒鍋令赤。投水於內。取起再燒。再投。如此七次。名沸湯。乘熱飲一椀。衣被覆頭。取汗。神效。(傷寒蘊要)

⑤代赭石。乾薑等分為末。熱醋塗兩手心。合掌握定。夾於大腿內側。溫覆。汗出。乃愈。(傷寒蘊要)

⑥水調芥子末。填臍內。以熱物隔衣熨之。取汗出。妙。(簡便方)

⑦大梨一枚。生薑一小塊。同搗取汁。入童便一椀。重湯煮熟服。

⑧胡椒丁香。葱白搗塗兩手心。夾兩腿內。側卧勿動。取汗。有效。

傷寒瀛語 川大黃五兩。剉。炒微赤。為末。用臘雪水煎成膏。每服半匙。冷水送下。(聖惠方)

③ 蚯蚓泥。涼水調服。(簡便方)

【傷寒發狂】目不識人。驚怖恍惚。甚致踰垣上屋。用玄明粉二錢。朱砂一錢。末之。冷水服。(傷寒蘊要)

② 石膏二錢。黃連一錢。為末。煎甘草水。冷服。名曰鵲石散。(本事方)

③ 龍膽草為末。入雞子清。蜜化涼水服二錢。(傷寒蘊要)

④ 俟發狂時。吞生雞子一枚。神效。(食醫心鏡)

⑤ 用新抱出雞雞蛋壳。煎湯服。即安。真奇方也。(保生秘要)

⑥ 鐵粉二兩。龍膽草一兩。為末。磨刀水調服一錢。小兒五分。(心鑑)

⑦ 寒水石二錢。黃連一錢。為末。煎甘草湯。冷服。(本事方)

⑧ 吞生雞子一枚。效。(食鑑)

⑨ 陽毒大熱發狂。不能制服。用青布五六尺。疊摺。新水浸之。搭病人背上。須史蒸熱。又浸水中。又搭。日數十易。為

佳。(得效方)

⑩ 菜豆煮湯一鍋。稍溫。用青布數重。蘸湯搭於胃膈。冷則再蘸湯搭之。日數十易。被蓋覆。得汗愈。(丹溪纂要)

⑪ 番紅花二分。水一盞。浸一夕。服之。(醫方集要)

⑫ 生薑荷根葉合搗絞汁服三四升。(肘後方)

⑬ 炭火一盆。置病人之前。將醋一椀急沃火內。使煙氣衝入鼻內。須臾自定。又將涼水噴面。亦可。(醫學入門)

【傷寒盜汗】以韭根四十九枚。水二升。煮一升。頓服之。以上為度。汗無時亦治。(千金方)

① 豉一升。酒二升。漬三日。服。不瘥。更合服。不過三劑。即止。(千金方)

② 傷寒得汗不止者。以溫酒服牛羊脂愈。(千金方)

③ 傷寒後汗不止。地黃三斤。切。水一斗。煮取三升。分作三服。(千金方)

【傷寒頭痛】連鬚葱白半斤。生薑二兩。水煮溫服。(活人書)

① 烏梅十四枚。鹽五合。水一升。煎半升。溫服。取吐。吐後。避風甚良。(梅師方)

② 馬蹄香為末。每服一錢。熱酒調下。少頃。飲熱茶一椀。催之。出汗。即愈。(醫方摘要)

③ 連鬚葱白半斤。生薑二兩。水煮溫服。(活人書)

④ 荊芥穗一兩。濃煎服之。(本草綱目)

⑤ 乾艾葉三升。水一斗。煮一升。頓服。取汗。(肘後方)

【傷寒自翳】燒豆豉二七枚。研末吹之。(肘後方)

【傷寒衄血】乃當汗不汗所致。其血紫黑。時出不止。用滑石末。飯丸。梧子大。每服十九丸。微嚼破。新汲水嚥下。立止。(本事方)

【傷寒舌出】巴豆霜少許。紙燃卷納鼻中。舌即收上。(醫學集成)

②梅花片腦。以牙色者為上。半分為末。搽之即收。(仁存堂方)

【傷寒咽痛】甘草二兩。蜜水。炙水。二大碗。煮一椀。服半椀。日二服。(張仲景傷寒論)

②生射干。猪脂各四兩。合煎去滓。熬膏。每噲棗許。自痊。(龐安堂傷寒論)

③真蘭茹。瓜甲大。納口中嚼汁。嚙之。(備急方)

④大棗二十枚。烏梅十枚。搗入蜜丸。含一杏仁。大嚙。汁甚效。(千金方)

【傷寒煩渴】用秦芫一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。(聖惠方)

②括蕒根三兩。水五升。煮一升。分二服。先以淡竹瀝一斗。水二升。煮好銀二兩半。冷飲汁。然後服此。(外臺秘要)

③棗豆煮粥。常服。

④猪苓。茯苓。澤瀉。滑石。附膠各一兩。以水四升。煮取二升。每服七合。日三度。(張仲景傷寒論)

【傷寒動氣】防葵一兩。木香。黃芩。柴胡各五錢。每服五錢。水一杯半。煎八分。溫服。(雲岐子保命集)

【傷寒氣喘】紫蘇一把。水煮。稍稍飲之。其喘立止。(肘後方)

②防己人參。等分為末。桑白皮煎水。服二錢。(醫林集要)

【傷寒乾嘔】半夏熟洗研末。生薑湯服一錢。(梅師方)

【傷寒呃逆】枳殼半兩。木香一錢。為末。每次白開水下一錢。未止再服。(本草方)

②雄黃二錢。酒一盞。煎七分。乘熱嗅其氣。即止。(朱肱活人書)

③華澄茄。高良薑。各等分為末。每服二錢。水六分。煎十沸。入醋少許。服之。(圖經)

【傷寒厥逆】身有微熱。煩躁。六脉沉細。宜用人參五錢。水一鍾。煎七分。調牛膽。南星末二錢。熱服。立愈。(三因方)

②面青。四肢厥逆。腹痛身冷。一切冷氣。大附子二枚。炮製去皮臍。為末。每服三錢。薑汁半盞調服。良久臍下如火。暖為度。(濟生方)

③陰證極冷。煩躁腹痛。無脈危甚者。舶上硫黃為末。艾湯服三錢。就得睡。汗出而愈。(本事方)

【傷寒心悸】甘草二兩。水三升。煮一半。服七合。日一服。甚良。(傷寒類要)

【傷寒煩躁】晝夜煩躁。不得安眠。用乾薑一兩。生附子一枚。去皮。水煮。頓服。(張仲景傷寒論)

②寒水石半斤。燒半日。淨地坑內盆合。四面溫土壅起。經宿取出。入甘草末。天竺黃各二兩。龍腦二分。糯米糕丸。彈子大。蜜水磨下。(集驗方)

③藍龍一匙。新汲水調下。

④半兩附子一個。生破作四片。生薑一大塊。作三片。糯米一撮。以水一升。煎六合。溫服。暖臥。或汗出。或不出。候心

定。則以水解之。解之不得。與冷水。如渴。更煎滓服。屢用多效。(續傳信方)

【傷寒懊憹】梔子十四枚。水二盞。煮一盞。入豉五錢。同煮至七分。去滓服。得吐止。後再服。(張仲景傷寒論)

【傷寒痞滿】大黃二兩。黃連一兩。以麻沸湯二升漬之。須臾絞汁。分作二服。溫服。(張仲景傷寒論)

【橫痃枳實】等分為末。每服二錢。黃連煎湯下。(宣明方)

【傷寒脇痛】心下痞滿。痛引兩脇。用芫花。甘遂。大戟。等分為末。以大棗十枚。水一碗。半煮取八分。去渣。身強者服一錢。弱者服五分。平旦服之。(張仲景傷寒論)

【傷寒結胸】半夏四錢。生薑七片。酒一盞煎服。(胡洽居士百病方)

【用牽牛子末一錢。白糖化湯調下。(鄭氏家傳方)

【苦參一兩以醋三升。煮取一升二合。

飲之。取吐即愈。(外臺秘要)

【四】蚯蚓十五條。活者。搗爛。和蜜半盞。冷水半碗。灌服。無蜜。砂糖亦可。(奇效良方)

【五】醞醋拌麩皮炒。製納布袋中。蒸熱。熨之。尤速效。(陳海藏本草)

【傷寒熱結】大白頭蚯蚓半斤。去泥。用童便煮汁飲。或生絞汁亦可。(肘后方)

【傷寒血結】胸膈脹滿。痛不可近。用海蛤。滑石。甘草各一兩。芒硝五錢。為末。每服二錢。雞子清調下。則小腸通。血亦流行。胸膈自利矣。(朱肱活人書)

【傷寒腹脹】桔梗。半夏。陳皮各三錢。薑五片。水二鍾煎服。(朱肱活人書)

【傷寒肢痛】四肢煩疼。羊桃十斤。搗熟。浸熱湯三斗。正午時。入坐一炊久。不過三次。愈。(千金方)

【二】羊桃煮汁。入少鹽。漬之。(肘后方)

【三】濃煮虎杖根。適寒溫。以漬手足。令至

踝上一尺止。(千金方)

【傷寒搐搦】汗後。覆蓋不密。以致腰背手足。攣攣。牛蒡根十條。麻黃。牛膝。天南星各六錢。剉於盆內。研細。入好酒一椀。同研。以新布絞汁。將藥用炭火燒至黑色。取出研細。每服一錢。溫酒下。日三服。(朱肱活人書)

【傷寒發斑】斑赤者。用猪膽汁。苦酒各三合。雞子一個。合煎三沸。分服。汗出即愈。(張文仲備急方)

【二】青黛二錢。水研服。(朱肱活人方)

【傷寒發黃】大黃一兩。水漬一宿。平旦煎汁。入芒硝一兩。緩服。須臾。當然利下。(傷寒類要)

【二】生烏麻油一盞。水半盞。雞子白一枚。攪和服盡。(外臺秘要)

【三】麻黃一握。去節。綿裏好酒五升。煮取半升。頓服。取小汗。春月用水煎。

【傷寒下痢】以豉一升。薤白一握。水煮。薤熟。納豉更煮。色黑。去豉。分為二服。

(藥性論)

二 蔥草當歸各二兩黃連四兩水六升煮四升日三服(范汪方)

傷寒尿瀆小便脹滿石燕搗末葱白湯調五分服脹通為度(聖惠方)

傷寒餘熱柴胡四兩甘草一兩每用二錢水一盞煎服(本事方)

二 大棗二十個烏梅十個搗和蜜丸口含噉汁甚效(千金方)

傷寒腹痛用牽牛末一錢白糖化湯調下(鄭氏家傳方)

二 川烏頭去皮臍冷水浸七日切曬紙裹收之遇有患者取為末一錢入鹽八分水一盞煎八分服(本事方)

傷寒昏迷不省人事者先用皂莢末以紙燃燒煙入鼻有嚏可治無則不治可治者隨用皂莢半夏生白礬共一錢半為末薑汁調服探吐痰去即甦(萬病回春)

夾驚傷寒紫背浮萍一錢犀角屑半

錢鈎藤鈎三七個為末每服半錢蜜水調下連進三服出汗為度(聖濟總錄)

傷寒脫陽小便不通者以茴香末以生薑自然汁調傳腹上外用茴香末入益元散服之(摘元方)

陰毒傷寒雞血衝熱酒飲(風俗通)

二 生草烏頭為末以葱頭蘸納穀道中(陳海藏本草)

三 百合煮濃汁服一升良(食忌方)

四 吳茱萸一升酒拌濕絹袋二個包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累有效(聖惠方)

五 外接法名迴生神膏牡蠣煨粉乾薑炮各一錢為細末男病用女唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出愈卵與乳男女之根蒂坎離之分也陰證大小便不通及諸雜證陰候大小便不通者並宜此外治法數

傷寒單方

日不通為急非急者勿用(活人書)

六 中寒身冷脈微面青黑葱白連根切小麥麩各三升鹽二升以水和勻分二包炮令極熱絹包之互熨臍上冷則用水拌濕更炒熨之(醫鑑)

七 煮百合濃汁服一升良(本草綱目)

八 剖雞一隻燒酒噴之覆胸口

九 心結按之極痛大小便閉但出氣稍暖者急取巴豆十粒研入麵一錢捻作餅安臍內以小艾炷灸五壯氣達即通(直指方)

十 陰毒腹痛者油松木七塊炒焦沖酒二鍾熱服(集方)

十一 男女陰毒寒水石不拘多少為末用西餚飯搗丸栗子大曬乾每用一丸炭火煨紅燒研以滾酒調服飲葱醋湯投之得汗愈(必用方)

陰陽二毒用船上硫黃一兩柳木槌研二三日巴豆一兩和殼記個數用三升鍋將硫黃鋪底安豆於上以臘

傷寒單方

米醋半斤。澆之。蓋子緊合。定。醋紙圓縫。頻以醋潤之。文武火熬。候作聲。定。可一半為度。急將鍋離火。即便入臼中擣細。再以醋兩茶匙洗鍋。入臼。旋下蒸餅。擣丸。雞頭大。若是陰毒。用椒四十九粒。葱白二莖。水一盞。煎六分。熟吞下一丸。陽毒。用豆豉四十九粒。葱白一莖。水一盞。煎。同前吞下。不得嚼破。經五六日。方可服之。若未傳入。或未及日數。不可服。有孕婦人吐瀉。亦不可服。(博濟方)

②取薄荷葉煮汁。溫服。取汗。良。(本草綱目)

【男女陰易】黍米二兩。煮薄粥。和酒飲發汗。即愈。(傷寒類要)

【陰陽易】手足指甲二十片。燒研末。米飲調下。效。(醫學入門)

【勞復】水調胡粉少許服之。效。(肘后方)

③胡黃連一兩。山梔子二兩。去殼入蜜目)

半兩。拌和。炒令微焦。為末。用豬膽汁和。九梧子大。每服十九。用生薑二片。烏梅一個。童便三合。浸半日。去滓。食後。暖童便。令溫吞之。卧時。再服。甚效。(本草綱目)

④蘇葉煮汁二升。飲之。亦可入生薑豆豉同煮。飲。(肘后方)

⑤葵子二升。梁米一升。煮粥食。取汗。立安。(聖惠方)

⑥葵子一握。水按汁。飲一升。(肘后方)

⑦葱白搗爛。苦酒一盞。和服之。(千金方)

⑧燒鼈甲末。飲服一錢。(千金方)

⑨杏仁五十粒。以醋二升。煎取一升服之。取汗。(千金方)

⑩交接勞復。陰卵腫縮。腹中絞痛。欲死者。取所交婦人衣服。以覆男子。立愈。(千金方)

⑪竹瀝水煎。數數飲之。取汗。(本草綱目)

⑫熱病勞復。梔子十個。碎。水煎服。微汗。(本草綱目)

⑬蘆根煮濃汁飲。亦治食復欲死。(肘后方)

【預防勞復】傷寒初起。欲令其不勞復。祇須用女子褲帶一尺。火煨研末。未飲湯調服。(肘后方)

【試驗傷寒】野芋頭切片。磨擦背上第三節骨。如覺痛癢者。即非傷寒。若不知痛癢。即是仍用野芋片。周身骨節用力擦勻。並用芋片炒熟。煎濃汁服二三次。即愈。忌食葷飯。(中藏經)

【百合病】傷寒後。行住坐卧不定。如有鬼神。然已發汗者。用百合七個。泉水泡一夜。次日另用泉水煮汁一升。加知母二兩。泉水二升。煮汁一升。同百合汁。再煮。取汁一升。半分服。(張仲景傷寒論)

⑭已經吐後者。用百合七個。照前泡煮。入雞蛋黃一個。分服。(張仲景傷寒

論

③已經下後者。用百合七個。照前泡煮。再用赭石一兩。滑石二兩。水二升。煮汁一升。同百合汁再煮。取汁一升半。分服。(張仲景傷寒論)

④未經吐下者。用百合七個。照前泡煮。加入生地黃汁一升。同煮。取汁一升半。分服。(張仲景傷寒論)

【百合病腹痛】百合炒末。每飲服一匙。日三。滿消痛止。(摘元方)

【百合病渴】括萸根。牡蠣熬。等分為散。飲服一錢。(永類鈐方)

【感冒風寒】初起時。即用葱白一握。淡豆豉半合。泡湯服之。取汗。即愈。(瀕湖集簡方)

②臨睡時。以熱水洗腿足。再用葱頭湯。乘熱服下。身上多蓋衣被等物。汗出自愈。(醫學綱目)

③黃糖加老薑葱頭煎湯。或加豆豉並酒煎服。甚妙。(萬病回春)

④加密列花四錢。洋產接骨木花二錢。煎湯。分二日。乘溫服。(臨牀醫典)

【中寒】核桃壳打碎。連鬚葱頭各七個。細茶葉三錢。共入大碗中。用滾開水沖入。向頭面重之。連口飲盡。蓋被睡臥。汗出即愈。加生薑煎服。亦可。(古今醫鑑)

【體虛中寒】生附子一兩。去皮臍。乾薑炮一兩。每服三錢。水二鍾。煎一鍾。溫服。(和劑局方)

●十六 疫證單方
【中暑】急取蒜頭兩個。研爛。再取街心熱土。去面層不用。污泥亦不可用。攪新汲水調勻。服一椀。甚效。(應驗良方)

②熱湯徐徐灌之。小舉其頭。令湯入腹。即甦。(千金方)

③小青葉。井水浸去泥。控乾。入沙糖搗汁。急灌之。(壽域方)

④濃煮麥汁二盞服之。(外臺秘要)

⑤新胡麻一升。微炒令黑。攤冷為末。新汲水調服三錢。或丸彈子大。水下。(經驗後方)

⑥井水和麵一大抄服之。(千金方)

⑦皂莢一兩。燒存性。甘草一兩。微炒為末。溫水調一錢灌之。(澹寮方)

⑧地黃汁一盞服之。(全匱要略)

⑨瓜蒂二七個。水一升。煮五合。頓服即吐。(全匱要略)

⑩新汲水滴入鼻孔。以扇扇之。重者地漿水灌。則醒。若與冷水飲。即死。(古今醫統)

⑪暑日行路。受陽光所逼。最易受暈。速用蕎麥麵一撮炒黃。水煎服。立甦。(楊起簡便方)

⑫大蒜一握。同新黃土研爛。新汲水和之。濾去渣。灌入即活。凡中暑不可與冷物。
⑬菜豆殼濃煎汁。隨量飲。
⑭急以大蒜汁灌鼻孔。喉響。即甦。再以

涼水調蒜汁服之全愈。

⑤沈香檀香燒熏令氣滿室達竅即醒。

【預防中暑】暑月解毒用桂苓散肉桂去粗皮不見火茯苓等分為細末煉蜜丸龍眼大每新汲水化服一九（和劑局方）

②桂末一大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗入新瓷瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一重覆上加二重封之每日去紙一重七日開之氣香味美格韻絕高今人多作之（圖經本草）

③出門或歸家時將烏梅兩個搥碎放一椀內加白糖一匙開水沖服便可預防（芝隱方）

【盛暑熱症】頭大如斗身熱如火者是用黃芩一兩煎汁一茶杯微溫一氣服下立愈。

【夏月畏冷】硫黃硝石等分研末石器內炒成沙再研糯米糊丸梧子大每

服四十丸新汲井水下（濟生方）

【伏暑水泄】滑石大煨過一兩硫黃四錢為末麵糊丸菜豆大每用淡薑湯大小服（普濟方）

【暑月吐瀉】滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一二錢浙米泔調服（經驗方）

【霍亂】上吐下瀉者是無論冬夏皆有又有吐而不瀉瀉而不吐者凡遇此症斷不可與飯食即米湯亦不可飲並忌食薑一入口即不救須俟愈後方可進食用枯礬末一錢百沸湯調下（華佗方）

②藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫下服之回生（百一選方）

③食鹽一撮放刀口上燒紅以陰陽水即半滾水半冷水一鍾沖服服後腹痛漸止（濟生秘覽）

④粳米二合研粉入水二盞研汁和淡竹瀝一合頓服（普濟方）

⑤菜豆粉白糖各二兩新汲水調服即愈（生生編）

⑥防己白芷等分為末水服二錢（聖惠方）

⑦芥子搗細水和敷臍上（聖濟總錄）

⑧鹽醋煎服甚良（如宜方）

⑨新汲水百沸湯和勻飲數口即定

⑩梅葉煮濃汁飲

⑪絲瓜葉一片白雪梅肉一個并核中仁同研極爛新汲水調服不可即飲熱湯

⑫砂仁一兩炒鹽研一撮沸湯調冷服傷冷物者加吳茱萸

⑬海桐皮煮汁服

【乾霍亂】上不得吐下不得利腹痛欲死用鹽一大匙熬令色黃和童便一盞溫服少頃吐下即愈（柳州方）

⑭亂髮一團燒灰鹽湯二椀和服取吐（十便良方）

⑮千年石灰沙糖水調服二錢或淡醋

湯調亦可。

④土坎黃泥新汲水攪濁候清飲之探吐。

⑤炒紅鹽一兩猪牙皂莢一錢煎服吐。治腹痛出汗吐瀉不出者效。

⑥食鹽一兩薑五錢切片同炒變色水一大碗涼服愈後切不可遽食飯。餓極方可食稀粥。

⑦飲地漿即愈。大忌米湯。

⑧鹽湯一椀入皂角末少許調服探吐效。

⑨芳香礪砂一兩薄荷油十滴炭酸錳五分振蕩之每二十分鐘服十五滴。
(近世內科全書)

⑩未得吐下者用蒜搗敷足心。

霍亂轉筋患此者氣絕欲死服有暖氣用青銅錢四十九枚木瓜一兩烏梅炒五枚水二盞煎分溫服。(聖濟總錄)

⑪木香末一錢木瓜汁一盞入熱酒調

服(聖濟總錄)

③白扁豆為末陳醋和服(普濟方)

④生薑三兩搗酒煮三兩沸服仍以薑搗貼痛處甚驗(外臺秘要)

⑤桑葉一握煎飲一二服立定(聖惠方)

⑥以苦酒煮上好棉絮最好用絲棉裹於患處立能止痛神效(聖惠方)

⑦燒酒厚搗患處效。

⑧急用糟燒一大椀燙入斑蝥末攪乘熱熨四肢數人用手連拍之冷則易至小便通然後服藥不然無及。

⑨大蒜搗塗足心愈。

⑩皂角末吹豆許入鼻取嚏。

⑪以醋煮青布捺之冷即易。

⑫小蒜鹽各一兩搗敷臍中灸七壯。
⑬氣雖絕而腹尚有暖氣者鹽填臍中灸七壯。
⑭轉筋身冷心下微溫者硃砂研二兩蠟三兩和丸著火籠中薰之周圍厚

覆勿令煙洩兼牀下著火令腹煖當汗出而甦。

①生白扁葉一握生搗入少醋絞汁服。

②藤葉搗汁服。

③木瓜一兩煎服仍煎湯浸青布裹足。

④木香末一錢木瓜汁一盞熱酒調服。

⑤梔子二七枚燒研熱酒服愈。

⑥薏苡仁生為末每服二錢水調服頻進。

⑦吳茱萸二兩炒酒二盞煎一盞溫服得下立安(急效方)。

霍亂腹痛炒食鹽二包一熨其心腹一熨其背氣通自愈(救急方)。

⑧高良薑一兩對以水三大盞煎二盞半去滓入粳米一合煮粥食之便止。(聖惠方)

⑨桑葉搗汁服冬月乾者煎服。
⑩胸腹脹痛大豆生研水服一匙。
⑪桃葉煎汁服一升止冬用桃樹皮。

【霍亂煩悶】人參五錢。桂心五分。水二盞煎服。(聖惠方)

② 蘆根三錢。麥冬一錢。水煎服。(千金方)

【霍亂煩渴】豆蔻、黃連各一錢半。烏豆五十粒。生薑三片。水煎服。(聖濟總錄)

② 糯米三合。水五升。蜜一合。研汁。分服。或煮汁服。(楊氏家藏方)

【霍亂危急】用鹽斤許。炒熱。包兩包。更替熨肚。一時即愈。

【霍亂吐瀉】高良薑。火炙令焦香。每用五兩。以酒一升。煮三四沸。頓服。

② 山豆根末。橘皮湯下一錢。

③ 杉木煎湯服。

④ 桃葉煎汁。服一升。止。冬用桃樹皮。

⑤ 廣陳皮去白五錢。真藿香五錢。水二盞煎一盞。時時溫服。

蛇藤煎水。兌酒服之。立愈。最為神驗。(中藏經)

② 頂上高梁酒半斤。真樟腦一錢五分。共浸於瓶。患者灌飲一杯。即解。改用白蘭地。其效尤神。(經驗良方)

③ 急用生芋頭食之。如非痧。則生溫難食。若是痧。食之味美。連食二個。便愈。(醫學正傳)

④ 生白礬為末。每服一錢。陰陽水調下。(資生集)

⑤ 生薑一片。貼臍中間。上加艾絨。炷香。燃灼。艾絨團如櫻桃大者。凡灸七八。忍痛灸之。無不立愈。(肘后方)

【試驗痧症】令嚼生黃豆。不腥氣者是痧症。覺有生腥氣者非痧症。極驗。(集簡方)

【陰痧】用山查、連翹、枳殼、延胡索各一錢。薄荷七分。藿香、香附各四分。冷服。

【陽痧】用荊芥、防風各一錢。連翹、陳皮。

(石室秘錄)

青皮各八分。川芎三分。稍冷服。(景岳全書)

【斑痧】頭眩眼花。惡心嘔吐。身有紫斑。痧在肉內。急用刮痧法。遲則入裏。生變。花粉、丹皮、薄荷、地骨皮、山梔、元參、細辛等分服。(萬病回春)

【癘痧】滿身脹痛。面色塵黑。身有黑斑。毒在臟腑。氣滯血凝。以致疼痛難忍。用蘇木、延胡、五靈脂、天仙子、蘿蔔子、各一兩。三稜、莪朮、薑黃、陳皮、檳榔、枳實、厚朴、各七錢。烏藥五錢。香附四錢。沈香、降香各三錢。阿魏二錢。水泛為丸。如萊豆大。每服十五丸。砂仁湯稍冷下。(衛生寶鑑)

【絞腸痧】心腹絞腸大痛。先用刮痧法治之。後用細辛一兩。荊芥五錢。降香三錢。鬱金二錢。共為末。每服三錢。清茶稍冷服。(和劑局方)

② 絞腸痧痛。手足冷。身有紅點。以燈草蘸油點火。焯於點上。

③ 藿香、陳皮各四錢。水煎服。

④ 生明礬末。一半涼水。一半開水。愈。

⑤ 早烟筒中油。如豆大一丸。放病人舌下。掬水灌之。垂死可活。

⑥ 飲鹽湯探吐。蕎麥炒焦。開水調服。

⑦ 陳馬糞不拘多少。瓦上焙乾為末。用陳酒沖服二三錢。不足再服。無不立愈。(扶壽方)

【噤口痧】默默不語。語亦無聲。用刮痧法放痧。再服烏藥、青皮、陳皮、山查、紫朴等分溫服。(集元方)

【羊毛痧】腹脹連背心。或腰膀。如芒刺然。用燒酒澆頭。泥研細。篩過。和燒酒作輟。擦痛處。即有細白毛粘團上。(本草權度)

【痧氣】細嚼生黃豆。不腥者痧。既可試病。亦解痧毒。生乎亦可。

② 晚蠶末。冷開水調服。若兼停食者。須加明礬末四分吐之。

③ 黃豆咀嚼。下數口。反覺甘甜。不知

腥氣。此方既可瘡病。且可辨症。

【痧氣腹痛】沈香、木香、鬱金各一錢。烏藥三錢。生研為細末。每服三分。砂仁湯稍冷送下。

【痧氣內攻】用元胡索、蘿蔔子、白芥三稜、蓬蘽各一錢。青皮、烏藥、枳殼各八分。紅花七分。香附四分。水煎溫服。(存仁堂方)

【痧氣食積】青皮、烏藥、檳榔、蘿蔔子、蓬蘽、三稜、枳實各一錢。水煎服。(斗門方)

【痧氣乾結】桃仁去皮尖。麻仁、大黃、枳實、青皮、細辛、厚朴等分。水泛丸。燈心湯冷服。(海上名方)

【痧氣壅盛】青皮、陳皮、山查、紫朴、蓬蘽、三稜、枳實、細辛、蘿蔔子、連翹等分。水煎稍冷服。(資生集)

【刮痧法】擇一光滑細石磁碗。或用磁匙。另用熱水一鍾。入香油一二匙。將背心上輕輕向下順刮。以漸加重。碗

乾則再醮。再刮良久。刮至痧點起塊為止。(蘇東坡方)

【番痧】狀如蚊蟲。粒如痞癩。看頭額及胸前兩邊。或腹上與肩膊處。照定紅點。以紙燃條。或粗燈草。微蘸香油。點着焯之。

【刺血痧】於兩臂彎、兩腿彎。蘸溫水拍打。露出紫紅。然後以針刺出毒血。

【時痧】柏樹葉搗爛。沖酒服。

【預防時痧】新石灰、皂礬等分。拌勻。遍撒各處。可免傳染。(芝隱方)

【瘡疾】用草從左手中指頂處。量至中指根處為止。將草摘斷。即用此草。從根量至掌。再從掌量至腕為度。以墨點記。用獨頭蒜研爛。敷於墨點處。用核桃壳蓋上。以布紮上。一個時辰。即去之有效。(德生堂方)

② 將老薑搗爛。裹於兩膝蓋上。週夜始行取去。則可保永久不發。(簡便方)

③ 蔥仁一兩。好酒半壺。同煮。露一宿。次

晨熟透去薏仁飲酒神效（聖濟總錄）

④明雄黃製附子真潮腦各等分為細末於瘧未發前一小時以棉花少許包裹藥末三分塞鼻孔中男左女右塞藥後勿食湯水睡過此時即愈（應驗良方）

⑤胡椒硫黃各三釐研末摻膏藥上貼背脊之正對肚臍眼處過期即愈（應驗良方）

⑥柴胡一錢和清水兩碗蒸成一碗於發病之前六小時服之無不效（養生主論）

⑦金錢草搽碎於發瘧之前五六時以之塞鼻如氣味淡再搽再塞數次後必效（時後方）

⑧用硃砂一錢斑蝥十四個雄黃二錢四分麻黃二錢四分共研細末每用少許放入膏藥貼項後第三骨節無論間日每日三日均效但須於發作

之前三四時貼用（易簡方）

⑨金雞納霜一錢為丸作一百八十粒每服十粒至十五粒未發前六時至八時服（臨牀醫典）

⑩青蒿一握水二升搗汁服（肘後方）

⑪青皮一兩燒存性研末發前溫酒服一錢臨時再服

祛瘧蛇蛻研末塞兩耳內效
熱瘧穿山甲一兩乾棗十個同燒存性為末每服二錢發日五更第一汲井水服（楊氏家藏方）

⑫知母煎湯服之
⑬烏梅煮湯飲

脾瘧不吐草烏頭削去皮沸湯泡二十度蓋蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三十丸薑十片棗十枚葱三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一服絕好飲酒便不發也兼治寒瘧厥瘧（蘇東坡方）

⑭石胡荽一服杵汁半碗入酒半碗和

服甚效（集簡方）

⑮乾薑高良薑等分為末每服一錢水一盞煎至七分服（摘要）

⑯乾薑炒黑為末臨發時溫酒服三錢（醫方摘要）

溫瘧但熱不寒而痰甚者用當歸一兩水煎日一服頗佳（聖濟總錄）

⑰青蒿二兩童便浸焙黃丹五錢為末每服二錢白開水調下（仁存堂方）

⑱常山一錢小麥三錢淡竹葉二錢水煎五更服甚良（藥性論）

⑲松蘿茶煎湯服可以吐痰
鬼瘧畫鍾馗紙燒灰二錢阿魏信石丹砂各一粒如黃豆大寒食麵和丸棗豆大每服一丸發時冷水下（聖濟總錄）

⑳鬼箭羽鯪鯉甲燒灰二錢半為末每以一字發時搗鼻（陳藏器方本草）
㉑鬼箭羽末一分砒霜一分五靈脂一兩為末發時冷水服一錢（聖濟總

錄)

【勞瘧】柴胡、人參等分。每服薑棗同水煎服。(滄寮方)

煎服。(滄寮方)

②長半膝一握。生切。水六升。煮二升。分三服。清早一服。未發前一服。臨發時一服。(外臺秘要)

【牝瘧】雲母燒兩日夜。龍骨蜀漆燒去腥。等分為末。未發時漿水服五分。(金匱玉函)

【牡瘧】蜀漆錢半。甘草一錢。麻黃。牡蠣粉各二錢。水二鍾。先煎麻黃。蜀漆去沫入藥。再煎至一鍾。未發前溫服。得吐即止。(外臺秘要)

【隔日瘧】早蓮草研碎。如黃豆大。以紫蘇葉裹之。男左女右。塞鼻孔內半日。即出涕淚。輕者立愈。重者漸次而愈。(醫宗必讀)

【三日瘧】獨蒜一枚。黃丹一錢。搗和。分作三次。於發日早起。向東。以井花水送下。一丸。連服三日。效。(應驗良方)

方)

②陳香櫞一個。去頂皮。加透明雄黃研細。摻入灰炭中。煨研極細。每服七分。軟腐皮分作六七包。乾咽下。不可飲湯水。任其嘔去痰。

【三陰瘧】過正午而發者。謂之三陰瘧。用兩前茶三錢。胡桃肉五錢。川芎五分。寒多加胡椒三分。未發前入茶壺內。以滾水沖泡。乘熱頻頻服之。吃到臨發時。不可間斷。(圖經本草)

③南天竹隔年陳子。取來蒸熟。每歲一粒。每晨起。白開水下。(集驗方)

④麝香一分。冰片一分。硃砂一錢二分。五厘。花椒二錢五分。共研細末。分摻兩膏藥。一貼背脊第三椎肺俞穴。一貼當胸效。

【瘴瘧】茵陳煎湯服之。又煮薑作釐。並可食之。(本草綱目)

【瘵瘧】取白葵花陰乾。搗為末。酒調服一錢。(本草綱目)

②冬葵子陰乾。為末。酒服二錢。午日取花授手。亦去瘧。(聖惠方)

【久瘧不止】龍甲醋炙。研末。每用二錢。酒服。隔夜一服。清晨一服。臨時一服。無不斷者。(壽域神方)

②桃花陰乾。為末。酒服一小匙。良效。(梅師方)

③雞子黃和常山末。為丸。竹葉湯服。

④蒼耳子或根莖。亦可焙研末。酒糊丸。梧子大。每酒服三十丸。日二服。生者搗汁服亦可。

⑤硫黃。硃砂等分為末。每服二錢。臘茶清下。發日五更服。當日或大作。或不作。皆其效也。寒多倍硫。熱多倍砂。(摘元方)

⑥硫黃。臘茶等分為末。發日早。冷水服二錢。二服效。寒多倍硫。熱多倍茶。(摘元方)

⑦葫蘆一大握。炙令赤色。以水濃煎一盞。欲發前服。(斗門方)

⑧ 葶若根燒灰水服一合。量人強弱用。

(千金方)

⑨ 常山二兩。研末。雞子白和。丸梧子大。

瓦器煮熟。曬乾。收之。名常山丸。每服

二十九。竹葉湯下。五更一服。天明一

服。發前一服。或吐或不吐。即止。數年

不瘥者。兩劑瘥。一月以來者。一劑瘥。

(千金方)

⑩ 大麻葉。不問榮枯。鍋內文武火慢炒

香。取起。以紙蓋之。令出研盡。為末。臨

發前。用茶或酒下。移病人原睡處。其

狀如醉。醒即愈。(集簡方)

⑪ 大麻葉如上法。為末一兩。加縮砂丁

香。陳皮各半兩。酒糊丸。梧子大。每用

酒茶。任下五七丸。(普濟方)

⑫ 龍骨末一錢。先發一時。酒一升半。煮

三沸。乘熱服盡。溫覆取汗。即效。(肘

後方)

⑬ 檳榔。紅花。常山各四錢。水煎。連服三

劑。效。此方須發至三四十次者方可

服。

久瘧極虛。於滑白米。米泔水泡透。土

炒一兩。生老薑通皮五錢。水煎。露一

夜。五更時。隔水燉熱服。夜發者。加當

歸三錢。輕者三服。重者五服。(醫壘

元戎)

瘧疾寒熱。黃丹百草霜。等分為末。發

日。空心米飲下三錢。不過二服。愈。或

糊丸。或蒜丸。皆效。

⑭ 黃丹飛炒一兩。常山末三兩。蜜丸。梧

子大。每服五十九。溫酒下。平旦及未

發將發時。一服即效。(肘後方)

⑮ 黃丹炒。建茶。等分為末。溫酒服二錢

(三因方)

⑯ 黃丹飛焙。麩糊。丸芡子大。每棗子一

枚。去核。包一丸。紙裹。煨熟。食之。(三

因方)

⑰ 砒一錢。麩二兩。和勻。香油一斤。煎黃

色。以草紙壓去油。入茶三兩。為末。每

服一錢。發日早。冷茶下。(本草權度)

⑰ 赤脚馬蘭搗汁。入水少許。發日早服。

或入少糖亦可。(聖濟總錄)

⑱ 齊頭蒿根。滴金根。各一握。搗生酒

一杯。未發便服。渣傳寸口。男左女右。

二日便止。(海上名方)

⑲ 馬鞭草搗汁五合。酒二合。分二服。(

千金方)

⑳ 獨頭蒜炭上燒之。酒服一錢。(肘後

方)

㉑ 青皮一兩。燒存性。研末。發前。溫酒服

一錢。臨時再服。(聖惠方)

㉒ 阿魏。胭脂。各一豆大。研勻。以蒜膏和

覆虎口上。男左女右。(聖濟總錄)

㉓ 牡蠣粉。杜仲。等分為末。蜜丸。梧子大。

每服五十九。溫水下。(普濟方)

㉔ 半邊蓮。同雄黃。各二錢。搗泥。碗內覆

之。待色青。以飯丸。梧子大。每服九丸。

空心鹽湯下。(壽域神方)

㉕ 截瘧。生鼈甲。不見湯煮者。醋炙黃。為

末。烏梅肉為丸。每服三錢。效。(醫宗

必讀

二常山草果川烏陳皮甘草各一錢。絹袋盛貯。煎於鼻間。只聞香氣。

三胡椒雄黃各五釐。和飯研為丸。放臍內膏藥蓋之。

四常山一兩。漿水三升。浸一宿。煎取一升。欲發前頓服。取吐。或浸酒飲之。外臺秘要。

五常山一兩。秫米一百粒。水六升。煮三分。分三服。先夜未發。臨發時服盡。肘後方。

六何首烏。忌鐵為末。酒調下三錢。臨發先服。或煎湯服。醫宗必讀。

七常山末二錢。酒浸炒透。即不發。吐烏梅肉四個。研爛。為丸。此截瘧必效之方。醫宗必讀。

赤痢。粳米半升。水研取汁。入磁瓶中。蠟紙封口。沈井底一夜。平旦服之。有效。普濟方。

二黑豆。米。莢子。二味。搓摩吞嚥之。良。

經驗方

三血痢不止者。用豉大蒜等分。杵丸。梧子大。每服三十丸。鹽湯下。博濟方。

四豉一升。水漬相淹。煎兩沸。絞汁。頓服。不瘥。再作。博濟方。

五地榆曬研為末。每服二錢。摻在羊血上。炙熟食之。以餛子煎湯送下。或以地榆煮汁。熬如飴狀。一服三合。亦用前湯化下。普濟方。

六地錦草曬研。每服二錢。空心米飲下。乾坤生意。

七薤同黃藥煮汁服之。陳藏器本草。

八地膚子五兩。地榆黃芩各一兩。為末。每服一錢。溫水調下。普濟方。

九薑薑搗汁一合。入蜜一合。溫服。聖惠方。

十胡荽子一合。炒搗末。每服二錢。沙糖水。下。日二服。普濟方。

十一木耳炒研五錢。酒服。亦可用井水服。或以水煮。鹽醋食之。以汁送下。普濟方。

濟方

十一陳白梅。同真茶。蜜水各半。煎飲之。直指方。

十二烏梅肉炒。黃連各四兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每米飲服二十九。日三服。直指方。

十三烏梅一兩。去核。燒過。為末。每服二錢。米飲下。立止。直指方。

十四烏藥燒存性研。陳米飯丸。梧子大。每米飲下三十丸。普濟方。

十五苦參炒焦為末。水丸。梧子大。每服十五丸。米飲下。仁存堂方。

十六沒石子一兩。為末。飯丸。小豆大。每食前米飲下三十九。普濟方。

十七黃連一兩。雞子白和為餅。炙紫為末。以漿水三升。慢火煎成膏。每服半合。溫米飲下。一方只以雞子白和丸服。勝金方。

十八白紙三張。裏鹽一匙。燒赤。研末。分三服。米飲下。聖惠方。

① 山漆三錢。研末。米泔水調服。即愈。
(本事方)

② 貫眾五錢。煎酒服。(集簡方)

③ 文蛤炒研末。水浸烏梅肉。和丸。梧子大。每服七十丸。烏梅湯下。(聖惠方)

④ 乳腐一兩。漿水一鍾。煎服。(普濟方)

⑤ 冬葵子為末。每服二錢。入臘茶三錢。沸湯調服。日三次。

⑥ 白椹花五六朵。置瓦上炙研。調白糖湯服。效。曬乾次年用。亦效。

⑦ 木耳。灰槐米。灰紅麴。灰砂糖。空心服。

⑧ 烏梅。胡黃連。竈下土。等分為末。茶調服。

⑨ 延胡索為末。米飲調服。三錢。

⑩ 金銀花一兩。煎湯。送香連丸三錢。

⑪ 大黃酒煮為丸。白水服。二錢。效。

⑫ **白痢**。如魚凍者。白鴨殺取血。滾酒泡服。

⑬ 訶子二個。一煨。一生為末。沸湯調服。

⑭ 水痢。加甘草末一錢。(普濟方)

⑮ 宜好麴末五升。微熬令香。溫清醇酒。令熟。和麴末一升。空心頓服之。日三服。若至食時。搗蒜一升。令至熟。下薑椒末調和。如常食之法。惟須稠。勿加鹽。以水和麴二升。作餅。餅極爛。煮之。乾漉。熱納蒜蘆。白中相和。一頓食之。少與餘食。至饑時。仍準前食麴末酒。比至瘥。來少食餘食。以此治法。不過兩日。無有不瘥。(聖惠方)

⑯ **赤白痢**。鴛粟子炒。鴛粟殼炙。等分為末。煉蜜丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。(百一選方)

⑰ 金剛根。臘茶。等分為末。白梅肉。搗丸。芡子大。每服五七丸。小兒三九丸。白痢。甘草湯下。赤痢。烏梅湯下。(易簡方)

⑱ 鴉片。木香。黃連。白朮。各一分。研末。飯丸。小豆大。壯者一分。老幼半分。空心米飲下。忌酸物。生冷油膩。茶酒。麩口渴。畧飲米湯。

⑲ 山豆根。末。蜜丸。梧子大。每服二十九丸。

⑳ 空腹白湯下。三服自止。(必效方)

㉑ 豆豉熬少焦。搗服。一合。日三。或炒焦。以水浸汁服。亦驗。(博濟方)

㉒ 豉心炒為末。一升。分四服。酒下。入口即斷。

㉓ 麴熬粟米粥服。匙許。日四五服。(肘後方)

㉔ 大黃煨半兩。芫荽子炒黑。一抄為末。每服一錢。米飲下。(普濟方)

㉕ 酸石榴皮。皮黃為末。棗肉。或粟米飯。和丸。梧子大。每空腹米飲服。三十丸。日三服。以止為度。如寒滑。加附子。赤石脂。各一倍。(千金方)

㉖ 用榴皮。燒存性為末。每米飲服一錢。日三服。效乃止。(千金方)

㉗ 荔枝殼。橡斗殼。炒。石榴皮。炒。甘草。炙。各等分。每半兩。水一盞。半煎七分。溫服。日二服。(聖濟總錄)

㉘ 胡椒。菜豆。各一歲。一粒為末。糊丸。梧子大。紅用生薑。白用米湯下。(集簡方)

⑤龍牙草五錢。陳茶一撮。水煎服。神效。
(醫方摘要)

④蒼耳草不拘多少。洗淨。用水煮爛。去滓入蜜。用武火熬成膏。每服一二匙。白湯下。(醫方摘要)

③訶子十二個。煨六生。去核。焙為末。赤痢。生甘草湯下。白痢。炙甘草湯下。不過再服。(濟急方)

②劉寄奴烏梅白薑等分。水煎服。赤加梅。白加薑。(如宜方)

①生雞子一個。取白攤綿連紙上。曬乾。摺作四重。包肥烏梅一個。安熨斗中。以白炭燒存性。取出。梳覆。冷定。研末。入水銀粉少許。大人分二服。小兒分三服。空心井水調下。如覺微利。不須再服。(活人書)

①雞卵一枚。取黃去白。入糊粉滿殼。燒存性。酒服一錢。(葛氏方)

①赤白暴痢。如鵝鴨肝。痛不可忍者。用黃連黃芩各一兩。水二升。煎一升。分

三次熱服。(經驗方)

①黃連一斤。酒五升。煮取一升半。分再服。當止絞痛。(肘後方)

①甘草一尺。炙劈破。以淡漿水煎水一升半。煎取八合。服之。立效。(肘後方)

①地榆一斤。水三斤。煮一升半。去滓。再煎。如稠。錫絞。濾空。腹服三合。日再服。(海上名方)

①白礬飛過為末。好醋飛羅。麵為丸。梧子大。赤痢。甘草湯。白痢。乾薑湯下。(生生編)

①乾薑好墨。各五兩。為末。醋漿和丸。梧子大。每服三四十九。米飲下。日夜六七服。愈。(肘後方)

①黃丹炒紫。黃連炒。等分為末。糊丸。麻子大。每服五十九。生薑甘草湯下。(摘元方)

①蜜陀僧三兩。燒黃色。研粉。每服一錢。醋茶下。日三服。(聖惠方)

①荷葉焙研。每二錢。糖湯下。

①葱白一握。細切。和米煮粥。日日食之。

①臘猪骨燒灰。溫酒調服三錢。

①山查末。滾湯調沙糖服。

①陳細茶葉。山查炭。紅沙糖。白沙糖。各三錢。老薑一錢。煎服。一日服盡。即愈。(保生秘要)

①金銀花蕊。焙焦。研極細末。大人每服一錢。小兒每服三分。日三服。俱用蜜糖沖下。(本草綱目)

①益母草曬乾。陳鹽梅。燒存性。等分為末。每服三錢。白痢。乾薑湯下。赤痢。甘草湯下。(丹溪心法)

①雞冠花煎酒服。赤用紅。白用白。(集簡方)

①白雄雞一隻。治淨。去皮。將肉切細。作餛飩食之。(食醫心鏡)

①鹹魚一尾。麻油煎作飯菜食。即愈。(集驗方)

①米泔水浸蒼朮。陳壁土炒焦。三兩。杏仁去皮尖。二兩。羌活炒。二兩。甘草炒

一兩五錢。川烏生皮麩包煨透。一兩五錢。生炒大黃一兩。熟炒大黃一兩。共研細末。每服四分。孕婦忌服。小兒減半。赤痢。用燈草三十寸。煎濃湯送下。白痢。用薑湯三片。煎湯送下。赤白痢兼用。(經驗方)

⑤ 金銀花蕊。焙焦研極細末。大人每服一錢。日三服。小兒每服三分。日三服。俱用蜜糖沖服。

【久痢】阿芙蓉小豆許。空心溫水代下。日一服。忌葱蒜漿水。若瀉。飲蜜水解之。(易簡方)

② 茄根燒灰。石榴皮等分為末。以沙糖水服之。(簡便單方)

③ 烏梅肉二十個。水一盞。煎六分。食前分二服。(直指方)

④ 陳石榴皮。醋煮。焙研陳末。每服二錢。米飲下。患二三年。或兩三月。百方不效者。用之便止。不可輕忽。

⑤ 新柎皮一斤。去黑皮切。水一斗。煎取

五升。去滓。煎膏。和酒服。(直指方)

⑥ 柎白皮。薑汁炙。五度。一兩。乾薑泡半兩。為末。每服二錢。米飲調下。(聖濟總錄)

⑦ 艾葉。陳皮。等分。煎湯服之。亦可為末。酒煮。爛飯和丸。每鹽湯下。二三十丸。(聖濟總錄)

⑧ 黃連四十九個。鹽梅七個。入新瓶內。燒煙盡。熱研。每服二錢。鹽米湯下。(護命方)

⑨ 荆瀝。每日服五合。(外臺秘要)

⑩ 十年血痢。石灰三升。熬黃水一斗。投之澄清。一服一升。日三服。(崔知悌方)

⑪ 久下白痢。取古輒燒熱。布裏坐之。令熱氣入腹。良。(崔知悌方)

⑫ 山上自掘白頭翁根。煨猪大腸服之。立愈。(千金方)

⑬ 端午日取鯉魚骨燒灰。治久痢如神。(易簡方)

⑭ 久痢虛滑不禁。與椿樹皮根。切碎酒拌炒。為細末。真阿膠水化開。和為丸。如梧子大。每服三五十九丸。空心米湯下。裏急後重。腹痛者不可服。

⑮ 腎虛久痢。骨碎補末。入猪腎中。煨熟食之。效。

⑯ 陳火腿骨煨四錢。黃連薑汁炒一錢。砂糖炒乾四錢。為末。烏梅肉五分。煮爛搗丸。每服三四十九丸。空心黃米湯下。

⑰ 松花三錢。地榆二錢。乾荷葉二錢。臭椿樹根皮一兩。取向東南枝。去粗皮。為細末。白痢。紅糖調。紅痢。蜜調。紅白相兼。蜜與糖調。加溫水少許。每服二錢。忌麪食。葷腥。油膩等物。初起者不可服。

⑱ 刀豆。蒸飯上蒸熟。洋糖蘸食。

【噤口痢】蕎麥麩。每服二錢。砂糖水調下。

⑲ 蘿蔔搗汁一小盞。蜜一盞。水一盞。同

煎。早一服。午一服。日晡。米飲吞阿膠丸百粒。如無蘿蔔。以子搗汁亦可。

三 蘿蔔片。不拘新舊。染蜜嚙之。嚙汁味淡。再換。覺思食。以肉煮粥與食。不可過多。(聖惠方)

四 山藥。半生半炒為末。每服二錢。米飲調下。(易簡方)

五 木鼈子六個。去殼。取淨仁研泥。分作二分。用麩燒餅一個。切作兩半。只用半餅作一窠。納藥在內。乘熱覆在病人臍上一時。再換半個熱餅。痢止思食。(經驗方)

六 獨將軍草根。有珠如豆者。取珠搗汁。三匙。以白酒半杯和服。(集簡方)

七 冰糖五錢。烏梅一個。水二椀。煎一椀。時時飲之。(摘元方)

八 石蓮肉炒為末。每服二錢。陳倉米調下。便覺思食。甚妙。仍以東壁土炒真橘皮為末。薑棗略煎佐之。加入香連丸尤妙。(丹溪心法)

九 肥皂莢一枚。以鹽實其內。燒存性。為末。以少許入白米粥內。食之即效。(乾坤生意)

十 人參。蓮肉各三錢。以第一汲井水二盞。煎一盞。細細呷之。或加薑汁炒黃連三錢。(良選方)

十一 雞內金焙研。乳汁服之。(護命方)

十二 金絲鯉魚一尾。重一二斤者。如常治淨。用鹽醬蔥。並胡椒末三四錢煮熟。置病人前嗅之。如欲食者。隨意連湯食一飽。病即除根。屢治有效。(醫方摘要)

十三 紅木槿花去蒂。陰乾為末。先煎麵餅二個。蘸末食之。(濟急方)

十四 活鯽魚。鱗側穿孔。去腸留鱗。入白礬末二錢。以紙包紙裹。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。日二服。(直指方)

十五 大田螺二枚。搗爛。入麝香三分。作餅烘熱。貼臍間。半日熱氣下行。即思食矣。甚效。(丹溪心法)

十六 大古錢一個。火煨醋淬。以錢化為度。研細末。拌粥內食之。如十分沈重。併粥不能食者。以溫開水調下。一小時。即思飲食矣。然後用薄粥漸漸開導。甚良。(張氏必效方)

十七 糯殼一升。炒出白花。去殼。用薑汁拌濕。再炒為末。每服一匙。開水下。三服即止。(經驗良方)

十八 大蒜搗貼兩足心。亦可貼臍中。(千金方)

十九 蒼朮甘草。陳皮厚朴等分。為粗末。布包在肚上熨之。逼藥氣入腹。

二十 水蛙一隻。並腸肚搗碎。瓦烘熱。入麝香五分。作餅貼臍上。(肘後方)

二十一 醃肉脯煨爛食。

二十二 人參三錢。石蓮肉炒二錢。黃連一錢。鮮荷葉一片。老黃米一撮。水二鍾。煎六分。入木香末三分。和勻服。積未淨者。加山查二錢。枳殼檳榔各七分。
【休息痢】白豆腐醋煎食之。即愈。(普)

濟方

- ① 熟附子半兩。研末。雞子白兩枚。搗和丸。梧子大。傾入沸湯。煮數沸。漉出。作兩服。米飲。(聖濟總錄)
- ② 椿根白皮。訶黎勒各半兩。母丁香三十個。為末。醋糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。(仁存堂方)
- ③ 椿根白皮。長流水漂三日。去黃皮。焙為末。每一兩。加木香二錢。粳米飯為丸。每服一錢二分。空心米飲下。(仁存堂方)
- ④ 鼠尾草花搗末。飲服一錢。(聖惠方)
- ⑤ 杏仁去皮。麩炒研。以豬肝一具切片。水洗血淨。置淨鍋中。一重肝。一重杏仁。鋪盡。以童便二升同煎乾。放冷。任意食之。(聖惠方)
- ⑥ 休息下痢。經一二年不瘳。羸瘦衰弱。砒霜成塊者。為末。黃丹各半兩。化蠟入砒。以柳條攪。俟則換。至七條。取起收之。旋丸。梧子大。冷水送下。小兒黍

未大(局方)

- ① 活鱔魚。去腸雜。切段。瓦上焙枯成炭。研粉。每服三錢。黃糖拌熱陳送下。數服全愈。須忌一切生冷。海參。海黃等物。(林屋山人秘方)
- ② 烏梅肉。武彝茶。乾薑。為丸服。(救生苦海)
- ③ 常食蒼麥麵。效。
- ④ 苦參子仁三十粒。包龍眼肉作丸。每晨服二三服。
- ⑤ 五色痢。大熟括萁一個。煨存性。出火毒。為末。作一服。溫酒服之。有效。(必效方)
- ⑥ 酸石榴五個。蓮子搗汁二升。每服五合。神妙。(千金方)
- ⑦ 刺蝟皮燒灰。酒服二錢。
- ⑧ 陳年年糕。陳雨前茶。冰糖。茉莉花。共煎湯一杯服之。立愈。(慈惠編)
- ⑨ 零陵香草去根。以鹽酒浸半月。炒乾。每兩入廣木香一錢五分。為末。用米

飲湯服一錢五分有效(集簡方)

- ① 乾絲瓜一枚。連皮燒研。空心酒服二錢。(經驗方)
- ② 下痢脫肛。橡斗子燒存性。研末。豬脂和傳。(直指方)
- ③ 巴豆殼燒灰。芭蕉自然汁。煮入朴硝少許。將脫出。堅硬之肛頭洗軟。用真麻油點火滴上。以枯礬龍骨少許為末。搽肛頭上。以芭蕉葉托入之。(聖惠方)
- ④ 白龍骨粉撲之。(姚和眾方)
- ⑤ 百藥煎一塊。陳白梅三個。木瓜一握。以水一椀。煎半椀。日二服。(聖濟總錄)
- ⑥ 延胡索末三錢。溫酒調下。即納入少頃。大便秘。痛亦止。
- ⑦ 赤石脂伏龍肝為丸。傳之。加白礬亦可。(錢氏小兒方)
- ⑧ 預防瘟疫。四時瘟疫。概用黃沙糖一杯。生薑自然汁一杯。用白開水一大

杯調勻。乘熱急服。蓋被出汗即愈。
(身經通考)

② 蒼朮良薑枳殼各等分為末。每用一錢。以葱白一大個搗勻。塗手心。將手掩肚臍。手須窩起。勿使藥著臍。又以一手兜住外腎前陰。女子亦如之。煎萊菔湯一椀飲之。點線香半炷。久可得汗。如無汗。再飲萊菔湯催之。汗出即愈。(吳都堂傳)

③ 松葉末酒服一匙。日三服。一切溫病便不相染。(肘後方)

④ 新布袋盛大豆一升。納井中一宿。出服七枚。效。(肘後方)

⑤ 入人疫家。以雄黃末調燒酒飲一二盞。既出。以紙撚探鼻。令噴嚏。即不染。(千金方)

⑥ 預取南向社中柏東南枝。曬乾搗末。酒服一匙。良。(千金方)

⑦ 用白藥子二枚。為末。水服之。(千金方)

⑧ 松葉細切。酒服一錢。日三服。能辟五年瘟。(傷寒類要)

⑨ 鮑魚頭燒灰一錢。合小豆末七枚。米飲服之。溫疫自不相染。

⑩ 取初病人衣。於甑上蒸過。則一家不染。(時珍本草)

⑪ 凡人欲近病者。明雄黃或蒼朮口中細嚼。塗擦鼻內。常有藥氣。自然不染。

⑫ 瘴厲氣。青竹茹二升。水四升。煮取三升。分三服。(千金方)

⑬ 溫病伏熱。茅根切。枇杷葉拭去毛。炙香各半斤。水四升。煎二升。去滓。稍稍飲之。(龐安常傷寒卒病論)

⑭ 茅根切。葛根切。各半斤。水三升。煎一升半。每溫飲一盞。良。

⑮ 蘿蔔子搗碎。溫湯和。攪取淡湯。徐徐飲之。少頃當吐。或為末。溫水調服。一匙。(景岳全書)

⑯ 天行熱病。麻黃一大兩。去節。水四升。煮。去沫。取二升。去滓。著米一匙。及豉

為稀粥。先以湯浴。後乃食粥。厚覆取汗。即愈。初起一二日用之。(必用方)

⑰ 生梓木削去黑皮。取裏白者。切一升。水二升。五合。煎汁。每服八合。取瘧。(肘後方)

⑱ 乾艾葉三升。水一斗。煮一升。頓服。取汗。(肘後方)

⑲ 生牛蒡根搗汁五合。空心分二服。服訖。取桑葉一握。炙黃。水一升。煮取五合。頓服。取汗。無葉用枝。(千金方)

⑳ 天行毒病。七八月熱積。胸中煩亂。欲死。用芫花一斤。水三升。煮取一升半。漬故布薄胸上。不過再三薄。熱則除。仍當溫四肢。護厥逆。(千金方)

㉑ 生葛根洗淨。搗汁一大盞。豉一合。煎六分。去滓。分服。汗出。即瘥。未汗。再服。若心熱。加梔子仁十枚。(聖惠方)

㉒ 連根葱白二十根。和米煮粥。入醋少許。熟食。取汗。即解。(濟生秘覽)

㉓ 小蒜一升。杵汁三合。頓服。不過再作。

便愈。(肘後方)

(九)芭蕉根搗汁飲之。(日華)

(十)不問已發未發。用梨木皮大甘草各

一兩。黃秫穀一合為末。鍋底煑一錢。

每服三錢。白湯下。日二服。即愈。(簡

易方)

(十一)生藕汁一盞。生蜜一合。和勻細服。(

聖惠方)

(十二)已汗不解者。新生雞子五枚。傾蓋中。

先入水約一雞子許。攪渾。乃以水一

升煮沸投入。納少醬。暖之。令汗出。愈。

(許仁則方)

(十三)天行嘔逆。食入即吐者。雞子一枚。水

煮三五沸。冷水浸少頃。吞之。(外臺

秘要)

(十四)天行疫病狂躁者。苦參研末。薄荷湯

下二錢。半日三服。

【時行發黃】狂悶煩熱。不識人者。大括

葉實黃耆一枚。以新汲水九合。浸淘

便瘥。(圖經)

(一)竹葉五升切。小麥七升。石膏三兩。水

一斗半。煮取七升。細服。盡劑。愈。(肘

後方)

(二)用金色脚黃雌雞。治如食法。煮熟食

之。並飲汁令盡。不過再作。亦可少下

鹽豉。(肘後方)

(三)醋酒浸雞子一宿。吞其白數枚。(肘

後方)

【鼠疫】生石膏一兩至八兩。元參四錢

至八錢。野菊花四錢。至一兩。金銀花

四錢。至一兩。連翹四錢。甘草一錢。薄

荷二錢。丹皮四錢。射干二錢。川貝母

二錢。右藥十味。用清水煮。服不拘劑

數。全愈為止。惟南方水土淺薄。石膏

元參野菊花三味。似宜少用。仍視病

人體氣如何。務宜詳慎審之。(醫方

正宗)

(二)鼠疫生核。用病人牀上臭蟲十餘枚

上。刮出紅色。敷上。即消。他牀上臭蟲

亦可用。

(三)山慈姑三錢。青黛一錢。生黃柏錢半。

浙貝錢半。赤小豆二錢。共研細末。調

麻油塗。

(四)劈舊早烟桿內烟油塗核。

(五)蓮鬚葱頭搗爛。加雄黃冰片調塗。

【肺炎疫】初起發熱。咳嗽吐血。病不過

三日。即斃。一時傳染相同者。是得病

兩周時內。急用犀黃一分。鮮薑蒲

打三錢。當門子吞二釐。老梅片吞一

分。生錦紋大黃五錢。芒硝後下五錢。

千金霜一錢。山慈姑一錢。犀角尖沖

磨一錢。生石膏五錢。車前子三錢。木

通二錢。冬蘿葡汁沖八兩。(醫方正

宗)

(二)麻黃二錢。連翹三錢。桑皮三錢。金銀

花八錢。雄黃三錢。甘草二錢。黃土水

煎服。先取開水將黃土澆化。和勻。候

常神方也（戴子先方）

【預防鼠疫】生蘿蔔不拘多少切碎食

鹽拌浸約兩點鐘再用真生麻油拌和每日早晚食之便可不發生矣（經驗方）

（經驗方）

【蝦蟆瘟】時行面赤項腫故名即用青

蛙搗汁水調空心頓飲極效（嘉佑方）

② 礮酒一錢火酒三錢沖淡塗之（日本醫局方）

【大頭瘟】此症頭面腫大咽喉閉塞急

用延胡索錢半皂角川芎各一錢藜蘆五分躑躅花二分半共為末用紙

撚蘸藥推入鼻中取嚏出膿血者更妙無嚏者難治左右看護者用此取

嚏亦不傳染（濟生方）

② 蚯蚓十餘條以白糖拌入碗內蓋好

半日即化為水至遲一日必化用鴨毛蘸水敷之即消若無白糖用井水亦可（永類鈴方）

③ 羌活酒黃芩酒蒸大黃水煎服（東垣）

（東垣）

【瘴氣】凡有瘴氣之處飲食不可過飽

每日須飲酒數杯不飲酒亦勉強飲之可辟瘴氣若已中者可用磁瓦有

鋒者或刺額上或刺眉際或刺兩手膊出血少許即解血紅而多者輕血

紫而少者重（類要方）

【山嵐瘴氣】犀角磨水服之可保無恙

（集簡方）

② 水服麝香三分即解（集簡方）

【預防瘴氣】桃仁一斤吳茱萸青鹽各

四兩同炒熟盛瓶密封七日取出揀去茱萸將桃仁去皮尖每罇一二十

枚山居用此甚宜（余居士選奇方）

增補單方大全第一編終

醫 學 南 鍼

全 書 編 目

- ◎ 第一編 臟腑南針
- ◎ 第二編 切脈南針
- ◎ 第三編 望色南針
- ◎ 第四編 聞聲南針
- ◎ 第五編 問證南針
- ◎ 第六編 病機南針
- ◎ 第七編 論藥南針
- ◎ 第八編 釋方南針
- ◎ 第九編 運氣南針
- ◎ 第十編 讀法南針

習醫初學苦無善本醫學入門必讀心悟等書不失之陋即失之晦本書乃醫學名家窗下課徒之作凡全身臟腑經絡等詳示細釋圖說分明運氣病機等推原勾要極明極透望色聞聲問證切脈等舉綱挈領要言不煩說藥釋方等注重性靈專事開悟蓋萃黃帝岐伯扁鵲仲景華陀孫思邈河間潔古東垣子和丹溪及明清張柯葉薛徐王各大家之精髓治一爐而鎔鑄者也實吾國醫學界破天荒之健著名曰南針可云無愧學者研究一年即能了解為人治病

神州醫學編輯社出版

上海廣文書局發行

第二編 外科門

一 癰疽單方

【癰疽】皂角針。春取一半新採。一半黑者。一味不拘多少。曬乾為末。食後酒調二三錢服。(肘後方)

二 貝母一味。去心切細。一半生曬。一半微炒。和勻為末。病在上。食後服。病在下。食前服。酒調一二錢。名消毒散。兼治一切無名腫毒。(肘後方)

三 用甘草一兩。微炙切。以酒一斗。同浸瓶中。用黑鉛一片。鎔成汁。投酒中。取出。如此九度。令病者飲酒至醉。寢後即愈。(衛生寶鑑)

四 甘草一大兩。火炙搗碎。水一大升。浸之。器上橫一小刀子。露一宿。平明以物攪令沫出。去沫服之。但是癰疽。皆效。(衛生寶鑑)

五 慈姑連根。同蒼耳草等分。搗爛。以好酒一杯。濾汁溫服。或乾之為末。每酒

服三錢。(乾坤生意)

六 野菊花連莖搗爛。酒煎熱服。取汗。以渣敷之。即效。(集效方)

七 黃蜀葵花。用鹽摻收。瓷器中密封。經年不壞。每用敷之。自平自潰。無花用根葉亦可。(直指方)

八 龍葵一兩。為末。麝香一分。研勻塗之。善。(經驗方)

九 爛蝦蟆一隻。同老鴉眼睛草莖葉搗爛。敷之。即散。神效。(經驗方)

十 連翹草及根各一升。水一斗六升。煮汁三升。服。取汗。(外臺秘要)

十一 紫花地丁連根。同蒼耳葉等分。搗爛。酒一杯。攪汁服。(經驗方)

十二 紫花地丁草。三伏時收。白麩和成。鹽醋浸一夜。貼之。(集效方)

十三 新掘天門冬三五兩。洗淨。沙盆搗細。以好酒濾汁。頭服。未效。再服。必愈。(

醫學正傳)

十四 白欬二分。藜蘆一分。為末。酒和貼之。日三上。(肘後方)

十五 生薑浦搗貼之。瘡乾者為末。水調塗之。(經驗方)

十六 馬蹄草。即萼菜。夏用莖。冬用子。就於根側尋取。搗爛敷之。未成即消。已成即散。用菜亦可。(保生餘錄)

十七 蒼參麩。硫黃各二兩。為末。第一汲井水和作餅。曬收。每用一餅。磨水敷之。痛則令不痛。不痛令痛。即愈。(直指方)

十八 核桃十個。煨熟。去殼。槐花一兩。研末。杵勻。熱酒調服。(古今錄驗)

十九 番降末。楓乳香等分為末。熏之。去惡氣甚妙。(集簡方)

二十 黃蘗皮。炒。川烏頭炮。等分為末。水適宜。調塗之。留頭。頻以米泔水潤濕。(集簡方)

①米醋和蚌蛤灰塗之。待乾即易之。

(千金方)

②鹽白梅燒存性為末。入輕粉少許。香油調塗四圍。(易簡方)

油調塗四圍(易簡方)

③伏龍肝以蒜和作泥貼之。乾再易。或雞子黃亦可。(外臺秘要)

雞子黃亦可(外臺秘要)

④稷米粉熬黑。以雞子白和塗絹上。剪孔貼之。乾則易。神效。(葛氏方)

孔貼之。乾則易。神效(葛氏方)

⑤十日內宜服護心散。使毒氣出。外萊豆粉二兩。乳香一兩。燈心末三錢。先漿焙。研末。再洗去漿。生甘草一錢。濃

漿焙。研末。再洗去漿。生甘草一錢。濃

汁調服。(肘後方)

汁調服(肘後方)

⑥生地當歸各一兩。麻油二兩。煎至枯黑。去滓。白蠟化鎔攪勻。貼。

生地當歸各一兩。麻油二兩。煎至枯黑。去滓。白蠟化鎔攪勻。貼。

【癰疽初起】以熱湯頻沃之。即散。(肘後方)

後方)

⑦芋根熟搗敷上。日夜數易。腫消即瘥。

(圖經本草)

⑧大黃五倍子黃蘗等分為末。新汲水調塗。日四五次。(簡便方)

大黃五倍子黃蘗等分為末。新汲水調塗。日四五次(簡便方)

④芫花末和膠塗之。(千金方)

⑤括葉根苦酒熬燥。搗篩。苦酒和塗。紙上貼之。(千金方)

上貼之(千金方)

⑥不問發於何處。用木逆四十九個。指去毛。研細解開。溫服。功與忍冬草不相上下。(外科錦要)

相上下(外科錦要)

⑦透骨草漏蘆防風地榆等分。煎湯綿蘸。不住盪之。二三日即消。(本草權度)

蘸。不住盪之。二三日即消(本草權度)

⑧麻油一斤。銀器煎二十沸。加純醋三碗。分五次。一日服盡。(直指方)

碗分五次。一日服盡(直指方)

⑨麻油煎葱黑。色乘熱通手旋消。自消。(百一選方)

(百一選方)

⑩赤小豆五合。納苦酒中五宿。炒研。以苦酒和塗。即消。加括葉根等分。(范汪方)

苦酒和塗。即消。加括葉根等分(范汪方)

⑪乾薑一兩。炒紫。研末。醋調。敷四圍。留頭自愈。奇方也。(諸證辨疑)

頭自愈。奇方也(諸證辨疑)

⑫帶泥山藥。蓖麻子。糯米。等分為末。研敷。即散。(普濟方)

敷。即散(普濟方)

⑬敗龜板一枚。燒研。酒服四錢。

敗龜板一枚。燒研。酒服四錢。

⑭外貼洞天嫩膏。內服醒消丸。熱陳酒送下三錢。其痛即止。夜間得睡。次日皮即起。皺。再服全消。(林屋山人秘方)

皮即起。皺。再服全消(林屋山人秘方)

⑮米醋和蚌蛤灰塗乾。即易。(葛氏方)

米醋和蚌蛤灰塗乾。即易(葛氏方)

⑯赤小豆末。水和塗之。毒即消散。頻用有效。(小品方)

有效(小品方)

【癰疽潰爛】石硫黃。以箸蘸。挿入孔中。以瘥為度。(外臺秘要)

以瘥為度(外臺秘要)

⑰秦艽為末。搽之。(直指方)

秦艽為末。搽之(直指方)

⑱北艾煎湯。洗後。以白膠香熏之。(直指方)

北艾煎湯。洗後。以白膠香熏之(直指方)

⑲烏麻炒黑。搗敷之。(千金方)

烏麻炒黑。搗敷之(千金方)

⑳絲瓜搗汁。頻抹之。(直指方)

絲瓜搗汁。頻抹之(直指方)

㉑絲瓜根。熬水。掃之。大涼。即愈。(應驗方)

絲瓜根。熬水。掃之。大涼。即愈(應驗方)

㉒棗膏三斤。煎水。噴洗。取愈。(孫真人方)

棗膏三斤。煎水。噴洗。取愈(孫真人方)

㉓桐葉醋蒸。貼上。退熱止痛。漸漸生肉。收口。極驗秘方也。(醫林正宗)

收口。極驗秘方也(醫林正宗)

㉔九經霜黃桑葉為末。敷之。(直指方)

九經霜黃桑葉為末。敷之(直指方)

㉕鼈甲燒存性。研搽。甚妙。(怪證奇方)

鼈甲燒存性。研搽。甚妙(怪證奇方)

㉖木香黃連。搗碎。等分為末。油調。頻塗。

木香黃連。搗碎。等分為末。油調。頻塗。

之取效(和劑局方)

(一) 善梳皮突熨之(千金方)

【癰疽作痛】鉛白霜一分。甘草半生半熟為末。綿裹含嚙(聖惠方)

(二) 龍牙草即馬鞭草。搗汁飲之。渣擦患處愈(崔氏方)

(三) 杏仁去皮。研濾取膏。入輕粉麻油調搽。神效(鮑氏方)

(四) 倚葉中心蒂如錢者。不拘多少。煎湯淋洗。拭乾。以飛過寒水石。同臘猪脂塗之(聖惠方)

(五) 葵花根去黑皮。搗爛。入井水調稠貼之(普濟方)

(六) 撫芎煨研。入輕粉麻油調塗。普濟方

【癰疽不潰】來勢腫惡。堅硬不潰。以利刀劃成十字路。用麩水調稠。厚敷週圍。瘡口外高起五分許。如塘池樣。將梧桐淚填半滿。用好米醋滴淚上。須臾自沸。勿令滾出。麩外。次日用金銀花煎湯洗淨。再如前用一次。只用醋

洗。不痛。爛肉自去(養疔漫筆)

(二) 蠶繭已出蛾者。燒灰酒服。一枚出一頭。二枚出二頭。累效(經驗方)

(三) 皂角刺燒灰酒服。三錢。嚼葵子三五粒。其處如針處為效(局方)

(四) 白芷紫荆皮等分。為末。酒調服。外用紫荆皮木蠟赤芍藥等分。為末。酒調塗數四週。神效無比(仙傳外科)

(五) 龍葵莖葉搗敷之(經驗良方)

(六) 蛇蛻灰猪脂和塗(肘後方)

(七) 黃葵花子研末。酒冲服。一粒則一頭破。兩粒則兩頭破。神效異常(圖經本草)

(八) 慈苡仁一枚。吞之。即破。姚僧坦方

【癰疽寒顛】乳香半兩。熱水研服。效(直指方)

【癰疽便閉】紫草括蕒實等分。新水煎服(直指方)

【癰疽惡肉】丁香末敷之。外以膏藥護之(怪證奇方)

(二) 烏頭五枚。濃醋三升。浸五日。洗之日夜三四度(古今錄驗)

(三) 朔翳灰石灰各淋取汁。合煎如膏。敷之。能蝕惡肉。亦去瘰癧。此藥過十日。即不中用(千金方)

(四) 地黃三斤。水一斗。煮取三升。搗敷之。或去渣煎稠。塗紙上。貼之日三易(肘後方)

(五) 白炭皮白狄灰等分。煎膏塗之。蝕盡惡肉。以生肉膏貼之。亦去黑子。此藥只可留十日。久則不效(肘後方)

(六) 石灰半斤。蒼麥稽灰半斤。淋汁煎成。霜密封。每以針劃破。搽之。自愈(近效方)

(七) 烏梅肉燒研。敷惡肉上。一夜可消大半(千金方)

(八) 硫黃研細末。敷上即退。再用泡過茶葉五兩。烏梅三個。燒存性。共研敷之。即收口(葛氏方)

(九) 巴豆仁炒黑。研膏。點痛處。則解毒。塗

瘀肉上則自化。加乳香少許亦可。若毒深不能收斂者宜作燃給之。不致成痛。(外科精義)

【預防癰疽】遠志不拘多少。米泔浸。搗去心曬乾為末。酒一盞調末三錢。澄清飲之。渣敷患處。(肘後方)

② 忍冬藤鮮者五兩。乾者一兩。大甘草節一兩。作一劑。用水三杯。煎至二杯。入無灰好酒一杯。再煎十餘沸。去渣。分三次服。能飲酒者一次服。另取藤搗爛。酒調塗患處。中留頭出毒。乾再搽。(肘後方)

③ 大甘草二斤。搥碎。河水浸一宿。搽令漿汁濃。去盡筋渣。再用絹濾。銀石器內慢火熬成膏。用器收之。每服一二匙。無灰酒或白湯亦可。是名國老膏。治一切癰疽。能消腫逐毒。

【腸癰】此症有生於腸內者。腹內脹急。大小便牽痛如淋。轉側搖之如水聲。潰後則膿從大便出。有生腸外者。肚

臍腫痛作脹。或一足彎曲。口有臭氣。或膿自臍出。甚則腸穿。有蟲自臍中出。勢難為計。初起時宜用丹皮五錢。薏仁一兩。瓜蒌仁去肉二錢。桃仁去皮。尖研二十粒。水煎服。(千金方)

② 薏仁一錢。附子二分。敗醬草五分。搗末。每用一匙。水煎一碗。頓服。小便當下。即愈。(金匱玉函)

③ 皂角刺一兩。至少用八錢。酒煎至七分。溫服。膿血從大小便出而愈。不飲酒者。水煎亦好。(發明證治)

④ 鼈甲燒存性。研水服一錢。日三服。(傳信方)

⑤ 腸癰已成。小腹腫痛。小便似淋。或大便難澀。下膿。用甜瓜子一合。當歸炒一兩。蛇退皮一條。剉切。每服四錢。水一盞半。煎一盞。食前服。利下惡物妙。(聖惠方)

⑥ 大棗連核煨百藥煎等分為末。每一錢。溫酒下。(傳信方)

⑦ 馬蹄灰。以雞子白和塗腹上。拔氣。(肘後方)

【臍癰】臍臍腫大如小。臍眼高突者是。紅赤者。照癰毒治法治之。不紅不熱者。照陰疽治法治之。甚驗。(選奇方)

【懸癰】生於穀道前後。初發如松子。大漸如蓮子。數日後。赤腫如桃李。或腫即破。破則難愈。用橫文甘草一兩。四寸截斷。以溪澗長流水一盃。河水并水不用。以文武火慢慢煎水。炙之。自早至午。令水盡為度。劈開視之。中心水潤乃止。細剉。用無灰好酒二小盃。煎至一盃。溫服。次日再服。便可保無虞。但此藥不能急消。須過二十日。方得消盡也。(李迅癰疽方論)

② 又名騎馬癰。俗呼偷糞老鼠。潰爛之後。一經房事。走漏。即成漏生管。體弱者患之。更危。諸漏易治。獨此難治。治則漏管愈大。難救。未成膿時。用生甘草熟大黃各三錢。酒煎。空心服一劑。

如已成膿。服醒消丸。倘患色白者。服小金丹。無有不愈。(林屋山人秘方)

【牛頭癰】膝上生癰腫而紅者是。用連鬚葱頭切碎。以糯米飯乘熱拌敷。重者五六次必消。或照癰毒治法治之亦效。(崔氏方)

【發背】是症乃癰疽中之大患。緣其對心對肺對膈故也。若誤服涼劑。誤貼涼膏。定然毒攻內腑。不救宜用瓜萋五枚。取子去殼。真乳香五塊。如棗大者。共研細末。以白蜜一斤。同熬成膏。每服三錢。溫黃酒化服。靈效。(林屋山人秘方)

【潰爛不堪者】用陳蘆葉為末。以蔥椒湯洗淨後敷之。效驗如神。(乾坤秘韞)

【初起時用黃明膠四兩。酒一盞。重湯頓化。隨意飲盡。不能飲者。滾白湯飲之。服此毒不內攻。不傳惡症。(阮氏經驗方)

【用白川椒末塗之。應驗如響。(永類

鈴方)

【搭手】因手可搭而名。可照發背初起治法治之。無有不驗。(袖珍方)

【石癰】堅硬不作膿者是。良岩子為末。醋和敷瘡頭。根即拔出。(千金方)

【赤小豆五合。納苦酒中五宿。炒研。以苦酒和塗。即消。加括蕞根等分。(范汪方)

【椽子一個。以醋於青石上磨汁塗之。乾則易。不過十度。即平。千金方

【蜀黍白皮。陰乾為末。煨膠和酒調敷。以軟為度。(千金方)

【生商陸根搗搽之。乾即易。取軟為度。亦治濕漏諸癩瘡傷。(千金方)

【便癰】初起時。用皂角子七個研末敷之。(儒門事親)

【黃葵子七七粒。皂角半挺為末。以石灰同醋調塗之。(永類鈴方)

【石疽】初起一核。漸大如拳。堅硬如石。急以陽和湯犀黃丸。每日早晚輪服。

如遲至大如升斗者。仍如石硬不痛。日久漸見紅根。則不能治。若生斑片。潰爛在即。潰後即放血三日而死。若現青筋。可治。內服陽和湯。外用活商陸根搗爛。加食鹽少許敷之。數日作瘻。半月皺皮。日敷日軟。有膿袋下垂。以銀針穿破。用千金脫裏散。加熟地生薑各一兩。煎服十劑。後用陽和解凝膏。貼上空出穿針之眼。膏外用布捆緊。務使皮膜相連。內服臺臺災著熟地各四錢。白朮酒炒。焦朮。茯苓。桂研末。冲服當歸各二錢。川芎一錢。五分。災草一錢。水煎服。(集效方)

【蛇蛻災灰研細。貼之。經宿便愈。(聖濟總錄)

【甲疽】凡指甲邊生一赤肉突出。時常舉發者。是用狼毒一兩。黃芪二兩。醋浸一宿。入豬油五兩。微火上煎。取二兩。絞去渣。退火氣敷之。日換三次。神效。(林屋山人秘方)

②乳香膽蓉研細時時敷之此病須剔去甲不藥亦愈若已成瘡久不愈者此方甚效(直指方)

③綠礬石五兩燒研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用藥末厚敷之再以軟帛煖裏當日即膿斷瘡乾每日一遍用鹽湯洗濯有膿處務使洗淨敷藥其結如處不須近但有急痛者塗酥少許令潤五日即覺加起依前洗敷十日加漸剝盡軟處或更生白膿泡即擦破敷之自瘥神效(邵真人方)

④重黃蛇皮等分為末以水洗淨割去甲入肉處敷之一頃痛定神效(近效方)

⑤石膽一兩燒煙盡研末敷之不過四五度瘥(梅師方)

【癰疽】生手足肩背累累如赤豆狀將加剝淨以大麻子炒研末塗之(千金方)

②拘杞根葵根葉煮汁煎如飴隨意服

之(千金方)

③大鯽魚長三四寸者亂髮一團如雞子大猪脂一碗同煎膏塗之(錦囊秘覽)

④飲葵根汁即可解(肘後方)

⑤剝去加後以溫醋米泔洗淨用燕窠土和百日男兒尿敷之(千金方)

【落頭疽】此疽生在腦後由小而大條屬陰症斷不可服寒涼等藥倘醫不得法即腐爛落頭而死宜用上好麝香一錢胡椒一兩以上共研細末用熟蜜和為兩丸病在左放左手病在右放右手病在中男左女右緊緊握住用布帶將手指捆攏不緊不鬆免使藥丸移動捆至六個時長再換如前日夜不斷不論如何潰爛用至數丸自能收口生肌(衛生易簡方)

【脫骨疽】此症生手足各指或云生手足第四指者是或生指頭上或生指縫間初生或白色痛極或如粟米起

一黃泡其皮或如煮熟紅棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至手足背腐爛黑陷痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜以頂大甘草研極細末香麻油調敷要敷極厚一日一換不可間斷忌食發物不出十日必愈再用金銀花元參各三兩當歸二兩甘草一兩水煎服一連十劑永無後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要(林屋山人秘方)

②有發於脚趾漸上至膝色黑痛不可忍逐節脫落而死者用上蜂窠研細陳醋調擦應手而愈(乾坤生意)

③初起時覓天竹枝上胡蜂窩一個用陰陽瓦爇灰研末和冰片二分滴醋少許調勻敷患處奏效如神(瑞竹堂方)

【附骨疽】蛻螂七枚同大麥搗敷(劉涓子方)

【多骨疽】瘡內不時出細骨乃母受胎

未及一月。與六親骨肉交合。感其精氣。故有此病。以密陀僧末和桐油調勻攤貼之。即愈。(壽域神方)

②愈而復發。骨從孔中出者。蕪菁子搗數之用帛裹定。日一易之。(千金方)

③大蝦蟇一個。乳頭髮一雞子大。猪油四兩。煎枯去滓。待凝如膏。先以桑白皮烏頭煎湯洗拭乾。煨龍骨末糝四邊。以膏敷之。(錦囊秘覽)

④鯽魚一尾。去腸入鹽令滿。紮定。以水一杯。磁器中煮至乾焦。為末。猪油調搽。少痛勿疑。(危亦林得效方)

⑤螭螂炙研極細末。每一錢入乾薑末五分。要細如灰。麵入瘡孔內。次日自有骨出。骨盡自愈。(古今錄驗方)

⑥黃連狂蠟等分研末。先以鹽湯洗過數。(肘後方)

⑦少腹疽。生臍下一寸五分氣海穴。或生二寸關元穴。或生三寸丹田穴。皆由七情六鬱而生也。分別紅白。照癰

毒陰疽治法。治之能愈。(聖惠方)

【小腸疽】生小腹內。按之如掌。堅硬而熱。微痛。小便多。出汗畏寒。皮色如常。或現微腫。脈緊實而有力者也。服犀黃丸以愈為度。(林屋山人秘方)

【井泉疽】又名慢心銳毒。初起時。心口內有塊。漸大。心口發高。毒陷不救。治法。以本人兩手十指。以線量其長短。共有若干。於一線放候管正中處。雙環至背脊之中。看兩線合攏盡頭處。為中穴。又以本人中指之中一節。用竹片量准。作一寸。放在中穴之左右。各遠一寸。各以墨記。分立三穴。如小之形。每穴用艾三團。一齊火灸。灸畢全愈。(外科精要)

【縮脚疽】生大腿外側。一名附骨疽。又名貼骨疽。初起不熱不紅。甚則錐痛。難以屈伸。轉動不便。久則寒鬱為熱。熱甚作膿。而無頭。皮色不變。漸透紅亮一點。則為內膿已成。潰則收功甚

難。用白芥子末。炕油調敷。或以大戟甘遂研末。白蜜調敷。內服熟地一兩。真鹿角膠三錢。上肉桂甘草各一錢。麻黃炮薑各五分。水煎服。即陽和湯。每日一劑。四五服可消。消後再服子龍丸。或小金丹。以杜患根。切忌開刀。開則定成縮脚損疾。(經驗良方)

【陰疽】艾葉一斤。硫黃雄黃各五錢。煮半沸。搗爛。候溫。敷冷再易。知痛可生。(集驗方)

●二 療癰單方 附流注遮腮

【療癰】小者為癰。大者為癰。色樣甚多。項前為疫癰。項後為濕癰。左右兩側形較遇怒即腫為氣癰。堅硬筋縮為筋癰。若連綿如貫珠者為膠癰。又有馬力長形者。是子母。重臺。蛇盤。鎖項。蜂窠。患袋。燕窩。瓜藤。癰瘍。流注。單窩。連子。門閃。及風石。鼠癰。即俗云鼠瘡。形名各異。受病固不外疫濕風熱風毒而成。然必兼志怒鬱憂。諒慮不遂

而致者也。初起者用煙桿中黑煙油，或鳳仙膏塗敷。三日即消。屢試神效。

(林屋山人秘方)

②土貝母八兩，牛皮膠四兩，敲碎牡蠣粉炒成珠，去粉為細末，水泛丸。豆大，每日早晚用紫背天葵根三錢煎湯吞丸三錢，不論已破未破皆治。(瑞竹堂經驗方)

③每日取略帶白色之老鼠屎七粒，須揀兩頭尖者，加真化州橘紅一錢，和水在飯鍋上蒸之，取其湯分三次服之。如是七日自消。(范汪方)

④於初起時用新鮮金絲荷葉搗碎取汁，用雞毛蘸汁敷患處，乾即再敷，不令間斷。二三天即愈。(梅師方)

⑤雄豬膽數十個，在銅鍋內熬煎，攤在油紙上，煎成膏藥樣，貼在患處。如有膿，旋貼旋換，遂得治愈。奇效。(應驗良方)

⑥野菊花搗爛，煎酒服，以渣敷之，自消。

不消，亦自破也。(瑞竹堂經驗方)

⑦連翹脂麻為末，時時食之。(簡便單方)

⑧青代單寫齒兒同搗，日日塗敷，取效。(楊起簡便方)

⑨蓖麻炒去皮，每晚時服二三枚，取效。惟一生忌食炒豆為要。(沈氏經驗方)

⑩月季花頭二錢，沉香五錢，羌花炒三錢，碎到大，大鯽魚腹中，就以魚腸封固，酒水各一盞，煮熟食之，即愈。但魚須放糞水內遊死者方效。(談楚翁方)

⑪顏下結核，大蜘蛛不計多少，好酒浸過，同研爛，渣去渣，卽時服之，最效。(醫林集要)

⑫黑牛皮膠溶化，攤膏貼之。已潰者將膏搓作線，長寸許，緝入孔中，頻換拭之，取效。(經驗方)

⑬用牽藤蛇蓇草并根蒂葉紅子四兩，夏枯草五錢，頭生酒量意用，入砂罐煮一炷香，取起，埋土穴中，退火一宿，當煮藥時罐內空懸紋銀以煮，不變

黑色，則其草無毒可服。如黑去之，另用草者，則無礙矣。初服藥酒一杯，隨服常酒數杯，取汗後，不時常服一杯，一日以五次為度，不可多服。未形者由瀉而內消，已形者毒水出於小便，一月全效。(保生秘要)

⑭瘰癧已破，汁出不止者，鴨脂調半夏末，日日敷之。(永類鈴方)

⑮瘰癧潰爛，用黑色蠟蟻一枚，去腸焙研，油調敷之，忌鐵器。(千金方)

⑯潰爛流串者，用荊芥根下段煎湯洗，良久著瘡，破紫黑處，以針刺去血，再洗三四次，用韭菜地上蚯蚓一把，五更時收，取炭火上燒紅為末，每一匙入乳香，沒藥，輕粉各五分，穿山甲九片，尖為末，油調敷之，如神。(保命集)

⑰嫩松香一兩，葱湯煮化，冷水拔淨，火麻仁一兩，上好松蘿茶葉五錢，共搗如泥，油紙攤為膏貼之，未潰即消，已潰即斂。此秘方也。(保命集)

(大)羊脰脰燒灰香油調敷愈。(壽域方)
(尤)穿山甲土炒斑蝥熟艾等分為末敷
之外以烏桕葉貼上灸四壯效。(壽

域方)

【鼠瘻】此症瘡口已合。旁邊有眼。出膿
不止。即是。又有頸項生之。不已。復從
脚底而生。俗名鼠子打洞。其症最惡。
用老鼠一個。去毛搗爛。亂髮一團。另
用大腿肥肉煎出油。入鼠髮二物。煎
至消盡為度。以一半敷瘡眼。一半酒
冲服。神效之至。(本草權度)

(二)貓頭骨燒灰存性。油調敷之。以瘻為
度。(趙氏經驗方)

(三)用蜘蛛二七枚。燒研數之。已破者自
能收口生肌。(千金方)

(四)雞卵一枚。米下蒸半日。取黃。熬令黑。
先拭瘡令乾。以藥納孔中。三度即愈。

(千金方)

【九子癩】生頸上。一連九個者。是用雞
卵一個。淨水煮熟。破為兩邊。去黃。以

真麝香一分。冰片五分。搽在瘡子上。
從初生第一癩子起。將雞蛋一邊蓋
上。外以乾艾一大團燒蛋外。總以癩
子大痛為度。如痛不可忍。則將艾暫
除。痛止。又燒。蛋乾。又換。每日夜約燒
五六度。次日。又換新冰麝。仍用新蛋
照前法燒之。再用蒲公英。夏枯草。金
銀花。各二錢。甘草節一錢五分。水煎
服數劑。效驗非常。(百一選方)

【流註】

發無定處。如塊如核。漫腫無頭。

皮色不變。或痛或不痛。久則破而流
者是也。此症一曰寒瘻。一曰氣毒。初
起用二陳湯加陽和丸同煎。數服全
消。消後即服小金丹七丸。以免復發。
如皮色稍變。極痛難忍者。須服陽和
湯。以止其痛。已成膿者。不痛而破。此
乃以大疽變小之法。如患處稍軟。可
用針刺破。膿多白色。以湯和膏貼之。
但此症破後。毒度走盡。患生不一。故
初破之後。五日內。仍服小金丹十丸。

以免後患。接服犀黃丸。湯和湯。每日
早晚輪服。使毒度消盡。不補必可收
功。屢試屢驗。(林屋山人秘方)

(二)

於春夏之交。多取奶奶草。洗淨。懸掛
簷際。風乾。愈陳愈佳。陳則毒性退盡。

初起時。取乾草二三莖。與針刺七孔
之雞蛋一枚。和水煮之。俟蛋煮熟。透
時。去渣與湯。只吃蛋一二次。即愈。或
用露蜂房一個。愈大愈好。大者力更
大。和雞蛋一枚。以水煮之。煮至濃厚
時。去蜂窠。取蛋和湯飲之。此方無論
初起已潰。有膿無膿。多則兩次。即可
止痛收口。立有起色。無須再用別種
膏藥及敷藥。極效。(諸證辨疑)

(三)

用大石榴數枚。陰乾。收藏數年。每個
石榴內入蜈蚣兩三條。將甜酒一二

斤。同石榴煮透。候酒汁浸乾。石榴內
取出。將石榴放瓦上培枯。存性。故地
上。冷透。研末。收貯。候用。每服一錢。溫
開水下。每日一服。數日即愈。神效。但

未經生育之婦。不宜多服。瑞竹堂方

④ 奶草多採洗淨。懸掛簷前風乾。愈陳愈妙。初起時。取乾草兩三莖。與針刺七孔之雞蛋一枚。和水煮之。俟蛋煮熟透時。去渣與湯。但食雞子。一二次即愈。海上方

⑤ 大露蜂房一個。和雞蛋一個。水煮濃。去蜂房。只取蛋和湯飲之。不問初起已成。有膿無膿。至多連服兩次。便能止痛收功。驗甚。崔氏方

⑥ 痰核。大者稱惡核。小者痰核。結蓋根最深。却不易潰。未潰之前。忌貼涼膏。忌服涼藥。內服陽和湯。犀黃丸。可消。亦有以大田螺搗敷塗消之者。大忌開刀。小品方

⑦ 整五倍子。入砂鍋炒黃為末。以好醋調膏。攤貼患處。易六七次。即愈。產乳集驗方

⑧ 大南星磨酸醋調敷。數次。自消。頗驗。普濟方

④ 於三四月間。收取蝌蚪。搗爛。加以冰片。封存瓦罐內。初起時敷治。即愈。怪證奇方

⑤ 已舊根搗爛敷之。立奏奇效。海上方

⑥ 捉取不斷尾壁虎。置磚瓦上。炙灰和熬熟。菜油塗核上。累驗。經驗良方

⑦ 桑樹上蝸牛七八個。青銅錢一二文。用石塊一同搗爛。銅錢融化為水。取數患處。乾即換。如此數日。便消。集驗方

⑧ 捉活蝙蝠。炙成灰。和菜油塗患處。二三次即愈。葛氏方

⑨ 拍子和雞蛋白中搗爛。塗數塊上。即消。已穿則不能用。經驗方

⑩ 冬天未落桃葉。浸滴醋內。令透。取出貼患處。乾則更換。約十餘次。定能消退。易簡方

⑪ 貓一頭。擒殺之。沙鍋內淡煮。熟後。食其肉。不能食。則食少許。留取全身之骨。集存一處。另捕鹹婆婆三四條。壁

虎三四條。須連尾。連同貓骨焙枯。研成細末。麻油敷調患處。隨敷隨愈。海上方

① 奶草即乳丁草。熬膏搽核上。此膏愈淡愈妙。頻搽。自消。邵真人方

② 雄豬膽數十個。銅銚內熬煎。攤油紙上。前作膏藥狀。貼在潰串之處。如有膿水。隨貼隨換。不久自然收功。奇驗。外科精義

③ 壁虎一條。藥材鋪可購。置新瓦上。炭火炙成灰。存性。研成細末。再用紫衣胡桃三枚。去其殼。炙研如前。續加頂上冰片五分。水磨麻油一兩。拌和塗敷患處。累效。經驗方

④ 熱瘰。青條煙筒內之煙辣水敷之。立效。濃者尤驗。芝隱方

⑤ 遮腮。又名疔瘰。用燈火燈心一根。點油燒之。在大指二指之下。手背微窩處。燒一下。左腮燒右手。右腮燒左手。即效如神。醫林正宗

(二) 赤小豆和蜜塗之一夜即消。或加芙蓉葉末尤妙。(專域神方)

(三) 腮間突然腫起亦風熱也。用野菊花葉搗爛四圍敷之。其腫自消。(應急良方)

(四) 絲瓜燒存性研末水調搽之。(嚴月軒方)

(五) 柏葉末調蚯蚓糞塗之。(丹溪方)

(六) 柏葉車前草柏子仁杵碎熱傳患處或用雞子清調赤小豆末。(丹溪心法)

(七) 赤小豆為末雞子清調貼之。醋調貼之亦效。(本草綱目)

(八) 石灰炒熱地下窖冷如此七次為末醋調敷立消。(醫鑑)

(九) 細辛草烏等分為末入蚌粉豬脂調敷腫處口含白梅置腮邊良久腫退。出涎患消矣。(丹溪心法)

(十) 大黃二兩同蠶蠶一兩為末薑汁和丸彈子大服。(本草綱目)

(十一) 蝸牛同麩研敷之。(千金方)

(十二) 醋酸鉛三分冷水九十七分溶化攪勻裝瓶每以新綿花飽蘸微乾貼上患處乾則再蘸再貼神效。但用時須將藥瓶搖動不爾藥盡沉瓶底所蘸取者皆清水也。(近世外科全書)

●三 疔毒單方

〔疔〕初起如粟米大或大小不一如發寒熱及麻癢嘔吐即於遍身留心尋認凡鬚髮眼耳口鼻下肩兩腋手足

甲縫囊門陰戶等處更宜細看一日須看數次如尋得疔瘡所在急宜刺出惡血以見好血為止惟刀鑷疔忌

用刀用菜子油真麻油服或用白菊

花葉連根用鉗取自然汁一茶鐘滾酒兌服酒煮服亦可不如生汁為妙

毒重者宜多服渣數患處留頭不敷

蓋被睡卧出汗其毒自散無論生在何處雖欲氣絕亦可起死回生無新

鮮者即用甘白菊花四兩少則不效

(醫方摘要)

(十三) 於陰濕地方如門角牆壁等處捕駝

背蟲一隻俗名灰駝駝狀類蚱蟬而

身短背駝前段四足後段有兩長腿

略與蟋蟀相似而無翅色帶淡黃跳

躍甚速將蟲剖開肚皮貼合患處立

愈。(張三半仙傳方)

(十四) 糞坑底泥蟬蛻全蠟等分搗作餅如

錢大香油煎滾溫服以渣敷瘡四圍

疔自出。(聖濟總錄)

(十五) 多年鐵鋪釘火煨醋淬刮下鋪末不

論遍次煨取收之每用少許入乳和

勻挑破敷之仍炒研二錢以盞水煎

滾待冷調服。(普濟方)

(十六) 白芨末五分以水澄之去水攤厚紙

上貼之良效。(袖珍方)

(十七) 稀食草五葉草(即五爪龍)野紅花

(即小蘇)大蒜等分搗爛入熱酒一盞

絞汁服得汗立效。(乾坤生意)

(十八) 將疔刺破以老蔥生蜜杵貼兩時疔

出以醋湯洗之神效。(聖濟總錄)

⑧鐵渣一兩。輕粉一錢。麝香少許。為末。針畫十字。以點藥入內。醋調麪糊敷之。根即拔出。神效。(普濟方)

⑨佛掌花根。同生薑蜜研汁服之。外以天茄葉貼之。(本草權度)

⑩胡麻燒灰。針砂等分為末。醋和敷之。日三。(普濟方)

⑪麪和鵝豬脂封之。良。(梅師方)

⑫疔瘡初起。不拘已成未成。用翻白草十料。酒煎服。出汗即愈。(諸證辨疑)

⑬野灰。覆菜葉。燒灰。撥破瘡皮。漿水調少許點之。血出為度。(諸證辨疑)

⑭馬齒菜二分。石灰三分為末。雞子白和塗之。(諸證辨疑)

⑮核桃一個。平破。取仁嚼爛。安殼內。合在瘡上。頻換其效。(普濟方)

⑯荔枝肉。白梅各三個。搗作餅子。貼於瘡上。根即出。(千金方)

⑰槐花微炒。核桃仁二兩。無灰酒一杯。煎十餘沸。熱服。未成者二三服。已成者一二服。效。

⑱蒼耳草梗中蟲一條。白梅肉三四分。同搗如泥。貼之。立效。(經驗方)

⑲蒼耳草內蟲。炒黃色。白殭蠶。江茶各等分。為末。蜜調塗之。(聖濟總錄)

⑳四螺入冰片。化水。點瘡上。(普濟方)

㉑十二月豬膽。風乾。和生蔥搗敷。(普濟方)

㉒嚼生黃豆塗。良。(肘後方)

㉓煙管中煙油。厚敷四圍。頭留出。少刻疔破出水而愈。(外科精義)

㉔紫花地丁。搗汁服。神效。(集驗方)

㉕刺疔四邊。及中心。以雄黃末敷。驗。

㉖菊花連莖搗汁。和酒熱服。取汗。以渣敷。即效。冬月採根。垂死可救。(聖濟總錄)

㉗白芨末半錢。以水澄之。去水。攤厚紙上貼之。(袖珍方)

㉘千針草四兩。乳香一兩。明礬五錢。為末。酒服二錢。出汗為度。(千金方)

㉙益母草搗爛敷之。仍絞汁五合。服即消。(千金方)

㉚金絲草。忍冬藤。五葉藤。蒼麥等分。煎湯溫洗。黑者加醋。(千金方)

㉛面上生疔。大活蝦蟇一隻。梳鋒割開。胸前。割取肝黃豆大一片。預將銀簪撥破疔頭少許。用肝貼上。外以膏藥一個。貼住。免其墜落。蝦蟇被割處。用線縫好。放之。仍能活也。但須從速。稍遲恐死。此肝貼疔頭上。一日即腫消。痛止。效驗不可思議。(葛氏方)

㉜生大黃。雄黃各一兩。共研細末。飯糊丸三十二粒。如年十二歲者。開水吞服十二粒。餘可類推。但至多以三十二粒為度。(集驗方)

㉝白菊花根。和水煎之。服之。將菊葉食鹽搗爛。貼疔上。即愈。(雀氏方)

㉞初發時。用梳鋒割開。急取生煤敷在患處。頃刻立消。切忌油膩。衛生寶鑑

㉟吸鐵石擦良久。二三日即愈。(近效方)

刮鐵屑塗之即消退。(普濟方)

取雄雞冠血點之神效無比。(壽域方)

初起時用煙桿內煙油濃塗即消。(

易簡方)

螺疔生於手指之間受害無窮小則

多延時日大則手腕麻木不仁用大

葉柳雞即甬地野柴之根與馬齒

莧之莖加酒釀搗爛敷之立見奇效

凡遇患處起紅點者則用紅莖馬齒

莧起白點者則用白莖馬齒莧是為

至當。(多能鄙事)

馬蹄草大青葉真紫草各等分搗爛

以酒一椀浸之去渣溫服三服立愈

(經驗良方)

紅絲疔以白菊花葉無白者別菊亦

可。冬月無葉取根加雄黃錢許蜈蚰

二條共搗極爛從疔頭敷至緣盡處

為止用絹條裹緊隔宿即消。(立效

驗方)

此疔多生臂肘間先將針挑斷其絲

尋取多年糞坑上碎木椽子一塊碾

灰研細用飴糖拌塗留頭疔即拔出

(敬信錄)

白粉熬黑和蜜敷之。(千金方)

馬牙齒搗末臘猪脂和敷根即出燒

反敷之亦愈。(千金方)

急用針於紅絲所到處刺之擠出惡

血再細嚼浮萍草根敷之。(易簡方)

煙桿中煙油雜絲三分敷絲即不走

(敬信錄)

刀鎌疔疔頭如韭菜寬長一二寸肉

色紫黑者是忌用針刺用明礬三錢

研細蔥白七個二味研爛分作七份

每份以熱酒一鐘送下服完即睡蓋

被取汗如無汗再以蔥頭湯催之少

頃汗出便佳外用瀝雞糞塗之即愈

避則毒歸心臟不救。(宛原方)

羊毛疔初起頭痛身發寒熱前心坎

後背心有紅點如疹子形先用針挑

破取出羊毛再用明雄黃末三錢青

布包緊蘸熱酒於前心坎磨上一二

寸外四圍團團擦之漸漸擦出瘡眼

其毛即奔至後背心亦照前法擦之

其羊毛俱拔於布上即埋入土中內

用紫花地丁一兩白菴甘草各三錢

銀花三兩煎服或照疔第一治法治

之。(傳信方)

水疔此疔色黃麻木不痛瘡凸色紅

使人昏狂並以金或銀三稜針忌鐵

針刺患處四畔後用銀杏去殼浸油

中年久者杵爛卷。(易簡方)

面疔飯蠅七個去翅足加入頂上冰

片二釐同搗爛敷疔上一日夜便腫

消止屢試屢驗但仍須服藥以清其

毒。(聖惠方)

唇疔須看大腿灣有紫筋起者可用

銀針刺出血即愈或鹽擦之亦消。(

集元方)

魚臍疔四面赤中央黑凹銀硃水和

丸每服一丸溫酒下名走馬丹。(普

濟方)

②臘猪頭燒灰雞子清調敷日數易(肘後方)

③葱白蜂蜜拌塗四圍(易簡方)

④覆麥燒灰以油和敷之甚佳(崔氏方)

⑤寒食錫塗之良乾者燒灰(千金方)

⑥先以針刺破頭及四畔以白芫汁滴孔中即愈(諸證辨疑)

無膿(崔氏方)

魚睛疔 枯礬末寒食麵糊調貼消腫

疔瘡出血 飲真麻油一大碗即止或飲米子油更妙(應驗良方)

疔瘡走黃 患疔瘡者忌食猪肉偶一不慎必致走黃不治宜急取芭蕉根搗汁服即解(寇氏行義)

②蟾酥以麩丸梧子大每用一丸安舌下黃即去(青囊雜要)

蛇頭疔 捕活蛇螂搗爛敷之不數日結疤自落(梅師方)

疔瘡不破 蟬蛻殭蠶等分為末醋調塗四圍候根出拔去再塗醫方大成

②白薑石末和雞子清敷之乾即易疔自出神驗(崔氏方)

③紅花子紫草茸各半兩蟬蛻二錢半水一杯半煎減半量大小加減服(傷寒論)

④蟬蛻炒為末蜜水調服一錢外以漿水和塗之(醫學雜纂)

疔根不出 鐵粉一兩輕粉一錢麝香少許為末針畫十字以點藥入內醋調麵糊敷之神效(普濟方)

②蒼耳根葉搗和童便絞汁冷服一升日三服拔根甚驗(千金方)

③蒼耳根苗燒灰和醋塗之乾再上不十次即拔根出(千金方)

④蒼耳根三兩半烏梅肉五個連鬚急三根酒二鍾煎一鍾熱服取汗(邵真人方)

⑤黑牯牛拋糞在地待生菌子焙乾研發草等分為末以竹筒去兩頭緊縛合疔疔上用水和末一錢入筒內少頃沸起則根拔出未出再作二三次(醫學正傳)

⑥先用大針刺作孔削蔓菁根如針大染鐵生衣刺入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分搗塗於上有膿出即易須臾根出立瘡忌油膩生冷五辛粘滑陳臭(肘後方)

⑦取戶邊蜘蛛杵爛醋和先挑四畔血出根稍露敷之乾即易一日夜根拔出大有神效(千金方)

⑧蟾酥以白麵黃丹搜作劑每丸麥粒大以指爬動麩上挿入重者挑破納之仍以水澄膏貼之(危氏方)

④疔瘡單方

疔 南棗一枚去核鱉魚骨一個搗碎銅青裝滿囊內紫緊火燉煙盡伏土存性研細用秋海棠煎洗然後用藥和水敷之三日即消(救生苦海)

②孩兒茶麝香為末唾津調敷(孫氏)

集效方

③先以皂角煙薰之後以鵝膽汁調白芷末塗之即消神效(醫方摘要)

④用盆盛沸湯以器蓋之留一孔用洗淨韭菜一把泡湯中乘熱坐孔上先薰後洗數次自然全愈(袖珍方)

⑤蟾蜍一隻泥裹火煨存性為末以肥豬腸一截扎定兩頭煮熟切碎蘸蟾末食之如此三四次其痔自落(滄寮方)

⑥赤足蜈蚣焙為末入龍腦少許唾調敷之(五指方)

⑦蠶繭內入男子指甲令滿外用童子頂髮纏裹燒存性研末蜜調敷之(萬表積善堂方)

⑧臭梧桐葉煎湯洗數次即愈(黃氏醫抄)

⑨胡葱二三斤煮熟臧覺內使病人坐上不通時即收復如覺腹中膨脹即服利濕藥可保無虞(養疴漫筆)

⑩癩蝦蟆草(俗名臭花娘子)劉寄奴荆芥蟬衣各三錢白鳳仙梗二錢防風甘草節瓦松各三錢右藥八味濃煎至沸入醋半杯鹽一撮將藥傾於磁器中身坐其上薰之俟藥稍溫即以此水洗之不過二三次脫根永不發矣(千金方)

⑪雞鴨鵝牛膽不拘何種頻擦有效(肘後方)

⑫五倍子三四個皮硝一撮水二碗煎濃先熏後洗(肘後方)

⑬蜈蚣一條冰片五釐膽礬二釐和化蜈蚣水點之即縮上(普濟方)

⑭槐根或桃根或蘿蔔或冬瓜皆可煎湯頻洗

⑮每登園後取冷水沃頻沃愈(易簡方)

⑯蜈蚣杵爛擦之良(經驗良方)

⑰皂礬礬紅等分為末對肛門痔口將藥貼着坐片刻如痛即去痛止再生數次(集驗方)

①馬齒莧不拘鮮乾煮熟食初起者用此即愈(醫林集要)

②胡葱二三斤煮熟臧覺內令患人坐上不通時即收復如覺腹中膨脹即將利濕藥可保無虞(海上方)

③豬膽汁調蕎麥麵為丸開水送下成漏有管者改用牛膽汁極效(肘後方)

④經霜扁豆葉地骨皮各少許同研細末搽患處俱極效(梅師方)

⑤痔雖縮進恐其復出皂莢六挺燒成灰水調成餅布包肛門正坐其上約一刻鐘為度以後更不落出(隱方)

⑥石膏五錢雲母五錢朴硝一兩硫黃二錢白礬一兩胡麻五錢蟬蛻二錢柴胡二錢荆芥三錢白茅根三錢一同煎湯先熏後洗(崔氏方)

⑦食鹽二兩炒焦至如黑炭水兩大碗燒滾傾鹽水中盛瓦盆內患人坐上熏之約十分鐘仍以此水洗候冷為止日洗二次數日盡愈(扶壽方)

【五痔】槐實剉末。米飲下一錢。效。(葛氏方)

②桑耳二兩。粳米三合。煮粥空心食。(肘後方)

③水研山豆根服。(易簡方)

④槐耳為末。米飲下。(易簡方)

【痔核】老牌花露水。新棉蘸少許。擦核上。痛癢自止。極驗。(芝隱方)

【血痔】益母草葉搗汁飲。(外科精義)

②蒲黃末。每服一匙。日三服。(鮮已醫按)

③槐樹上木耳為末。每服一匙。日三服。(簡便方)

④龜肉煮爛食一椀。效。(壽域方)

⑤綿花子炒黃黑色。去殼為末。陳米濃汁。加黑沙糖。丸如梧子大。每晨開水

送三錢。服三斤斷根。(扶壽方)

⑥生豆腐渣。鍋內炒乾為末。每服三錢。白沙糖湯下。日三次。遠年垂危者亦

效。(危氏方)

⑦苦參取肉。圍仁每七粒。以龍眼肉包

之。每服三色。白湯下。重者日服。忌葷酒。戒鴨肉。(瑞竹堂方)

⑧柿餅殿研。再以煮爛柿餅杵和。丸如梧子大。仍以柿餅湯下。久服效。(斗門方)

⑨貫眾去皮毛。剉焙為末。每服二錢。空心米飲下。或醋糊丸。梧子大。每米飲下三四十丸。或燒存性。出火毒為末。入麝香少許。米飲服二錢。(普濟方)

⑩白雞冠花炒。梭欄灰。羌活一兩為末。每服二錢。米飲下。(永類鈴方)

⑪馬蘭子一斤。研破。酒浸。夏三日。冬七日。曬乾。何首烏半斤。雄黃雌黃各四兩為末。以浸藥酒打糊。丸梧子大。每服三十九。溫酒下。日三服。見效。(普濟方)

⑫馬兜鈴。穀精草。京三棱。川烏頭炒過。三味各等分。煎水。先重後洗。普濟方

⑬桑黃一兩。熟附子一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每米飲下二十九。(聖惠方)

⑭歸身二錢。地榆炭一錢。水煎服。(聖濟總錄)

⑮新槐花炒研。酒服三錢。日三並洗之。(瑞竹堂方)

⑯雞冠花不拘多少。濃煎。空心服。(集驗方)

【痔漏】鯽魚一條。去腸。入白礬令滿。瓦上燒末。以雞羽掃藥。數效。(聖濟總錄)

①活鯽魚鱗三五片。綿裹如棗形。納入肛門。坐片時。痛自止。(葛氏方)

②刺蝟皮兩大張。新瓦上炙脆為末。象牙屑一兩。菘豆粉一兩。青黛三錢。槐花末一兩半。陳細茶五錢為末。用陳糙米煮爛。飯和丸。每服三錢。金銀花湯送下。(葛氏方)

③桑樹上寄生為末。米飲下。(聖濟總錄)

④金銀藤并花為末。每酒下三錢。(聖惠方)

⑤生當歸子。艾草為末。每服二錢。水煎服。

⑦多年頑漏。大脚魚一個。好冰片三錢。鍾乳石五錢。研細末。入脚魚口內。倒掛三四日。待頭腫大。快刀殺下頭。陰陽瓦炭火上。炙鹽泥封固。留一小孔。出煙。煙盡。小孔封固。俟冷。打開。研細。用四五分。好酒送下。(千金方)

⑧象牙末二兩。人脚趾甲炙五錢。牛骨腮炙一兩。猪脚爪炙一兩。刺蝟皮。鍋內蜜滾。炙乾為末。將地榆槐角二味。入猪臟內煮熟。搗爛。共搗蜜丸。每服三錢。空心滾湯送下。痔漏自然退管。(古今錄驗方)

⑨忍冬。草浸酒常飲。佳。(易簡方)

⑩白蓮花蕊一兩五錢。焙黑。丑一兩五錢。取頭末。當歸五錢。炒為末。每服二錢。空心酒下。三服除根。忌發火等物。(傳信方)

⑪故布裏鹽。燒赤為末。每服一錢。(敬信錄)

⑫蠶紙曬乾。小刀刮下蠶空殼。陰陽瓦

煨黃。好酒送下。連服十張。除根。(醫方大全)

⑬欵冬花嚼爛。敷上。一二次即愈。(集驗方)

【酒痔】青蒿葉為末。糞前血。冷水調服。糞後血。酒調服。神效。(外科精義)

⑭絲瓜燒末。酒服二錢。

【內痔】落出肛外者。大團魚頭一個。火煨為末。擦痔上。即刻收。(葛氏方)

⑮冬青樹葉煎湯。熏洗。效。(葛氏方)

【外痔】疼痛異常。坐卧不得。大田螺八。九個。將針挑開。壓蓋。入冰片。白礬末。少許在內。以田螺尖埋土中。令其蓋仰上。經一宿。螺化水。以雞毛掃痔上。便自縮入。(肘後方)

⑯槐花煎湯。頻洗。并服之。極妙。(本草綱目)

⑰鼈甲五倍子煎湯。熏洗。甚效。(崔氏方)

【翻花痔】木瓜為末。以鱧魚身上涎調貼。以紙護住。(梅師方)

⑱先以槐柳煎水洗過。以艾炙上七壯。取效。(經驗良方)

【雞冠痔】黃連末敷之。加赤小豆末。尤良。(斗門方)

【痔瘡腫痛】大蝸蝓(即壁上背包蛭蚰)一個。研泥。入龍腦少許。燕脂。瓜子五分。同敷。(醫方大全)

【痔瘡作痒】水銀。棗膏各二兩。同研。綿裹納下部。明日蟲出。(梅師方)

⑳古石灰。川烏頭炮。等分為末。飯和丸。梧子大。每服二三十丸。白開水下。(活法機要)

㉑猪大腸六兩。蚯蚓十餘條。煮融。去蚓食腸。極效。(瑞竹堂方)

【痔瘡出血】酸漿草一握。水煮一碗。服日三次。見效。(外臺秘要)

㉒桑木耳作羹。改心飽食。三日一次。待孔卒痛如鳥啄狀。取大小豆各一升。合搗作兩囊。蒸熟。輪流坐之。即瘥。(聖惠方)

●五 瘡毒單方

【眉瘡】大皂莢燒存性。枯礬要燒透。各等分為末。麻油調塗。先用白礬水洗淨為妙。(簡便方)

【膝瘡】此瘡多因濕熱而起。又被手甲風毒抓傷。破爛淋漓。纏綿不已。用佛前多年舊供花。取來用香油浸敷。即愈。(雲谷醫抄)

②臭蟲同水龍骨。搗和麻油調敷。出盡黃水即愈。(西亭藥鏡)

③白蘿蔔打爛。貼瘡口上。一日一換。毒血去盡。再用松香一兩。杏仁三十粒。去皮共油。黃丹八錢。輕粉五分。舊玻璃三錢。火焙為末。研細。麻油調搽。一日一換。數次即愈。(周氏家寶方)

④蘆甘石。童便製八九次。豬油調搽。效(古今錄驗方)

⑤用小蝦三十隻。去頭足殼。同糯米飯研爛。隔紗貼瘡上。別以紗單。一夜解下細看。皆出小蟲。即以蔥椒湯洗

瘡毒單方

淨。用茶籠內白菊葉。隨大小剪貼。一日二換。待汁出盡。逐日煎苦棟根湯洗之。以好膏藥貼之。將生肉勿換。忌食發物。(直指方)

⑥乾馬齒莧研末。蜜調敷上。一宿。其蟲自出。神效。(海上仙方)

⑦膝瘡久不愈。用川烏頭。黃蘗各等分。為末。用漿水調塗紙上。貼之。大有效。(儒門事親)

⑧砂糖水煎冬青葉。三五沸。撈起。石壓平。將葉貼瘡上。日換二次。(丹溪心法)

⑨頭垢燒灰。和棗肉。搗作膏。先以蔥椒葉煎湯洗淨。用輕粉搽上。却以前膏油紙攤貼之。(丹溪心法)

⑩地骨皮一兩。白蠟。甘草節各半兩。以香油入。地骨皮。甘草節。文武火熬熟。去渣。入黃丹一兩半。緊火熬黑。下蠟攪勻。提起。白紙攤貼之。次用冬青葉醋煎過。以藥貼之。(丹溪心法)

①黃丹一兩。黃蠟一兩。香油五錢。熬膏。先以薑椒湯洗。貼之。(積德堂方)

②黃丹飛砂。黃蘗酒浸七日。焙。各一兩。輕粉半兩。細研。以苦茶洗淨。輕粉填滿。次用黃丹護之。外以藥末攤膏貼之。勿揭動。一七見效。(集效方)

③蜜陀僧。香油入粗稅內。磨化。油紙攤膏。反覆貼之。(集效方)

④膝瘡不合。以薑汁溫洗。拭乾。用葱汁調輕粉傅之。(集效方)

⑤膝瘡不乾。用白堊土。煨研末。生油調搽。(集元方)

⑥韭地蚯蚓泥。乾研。入輕粉。清油調傅。(集元方)

⑦膝瘡久爛。用竈內黃土。年久者。研細。入黃蘗。黃丹。赤石脂。輕粉。末等分。清油調入。絹中貼之。勿動。數日愈。縱癢恐之良。(濟急方)

⑧銅綠七分。研。黃蠟一兩。化熬。以厚紙拖過表裏。別以紙隔貼之。出水妙。

筆峰雜興

①宮粉四兩。水調入椀內。以蘄州艾葉燒烟熏乾。入乳香少許同研。香油調作隔紙膏。反覆貼之。(集驗方)

②官粉炒過。桐油調隔紙貼之。(簡便方)

③黃蠟一兩。鎔化。入銀珠一兩。攪攤紙上。刺孔貼之。(簡便方)

④雄黃二錢。陳艾五錢。青布捲作大摺。燒烟熏之。熱水流出。數次愈。(筆峰雜興)

⑤廉瘡潰爛。無名異號丹。細研。油調塗濕則乾。摻。(濟急方)

⑥船上舊油灰。將泥作盆。火煨過。研末入輕粉少許。苦茶洗淨。傅之。忌食發物。(經驗方)

⑦廉瘡經年。鹽中黑泥。曬研。搽之。(永類鈴方)

⑧覆盆葉為末。酸漿水洗。後摻之。(永類鈴方)

⑨慈鹽湯洗淨。拭乾。以馬屁勃為末。傅之。即愈。(仇遠稗方)

⑩端午日午時。采翻白草洗收。每用一握。煎湯。盆盛。圍住熏洗。極效。(海上方)

⑪柿霜。柿蒂等分。燒研。傅之。甚效。(筆峰雜興)

⑫血竭末。傅之。以乾為度。瘡口自合。(濟急仙方)

⑬黃蘗末一兩。輕粉三錢。猪膽汁調。搽或用蜜調。亦可。(濟急仙方)

⑭胡粉煨過。研。桐油調。作隔紙膏貼之。(濟急仙方)

⑮船上陳桐油石。灰煨過。又以人髮拌桐油。炙乾為末。仍以桐油調。作膏。塗紙上。刺孔貼之。(濟急仙方)

⑯桃柳槐椿。各五枝。同荆芥煎湯。洗拭淨。以生黃蠟攤油紙上。隨瘡大小。貼十層。以帛拴定。三日一洗。除去一層。不用。一月全愈。(醫林集要)

⑰頭垢。枯礬研勻。猪膽調敷。(壽域神方)

⑱生龜一枚。取殼。醋炙黃。更煨存性。出火氣。入輕粉。麝香。蔥湯洗淨。搽傅之。(急救方)

⑲枯竹蛀屑。黃蘗末等分。先以蔥椒茶湯洗淨。搽之。日一上。(急救方)

⑳雄雞肫內皮。洗淨貼之。一日一易。十日愈。(小仙奇方)

㉑中鯽魚三尾。洗淨。穿山甲二錢。以長皂荚一挺。劈開兩片。夾住紫之。煨存性。研末。先以井水洗淨。腫水。用白竹葉刺孔貼之。候水出淨。以麻油輕粉調藥。傅之。日一次。(直指方)

㉒牛蹄甲。燒灰。桐油和敷。(海上方)

㉓生蝦黃丹。搗和貼之。日一換。(集簡方)

㉔地骨皮一斤。黃蘗二兩。剉為粗末。用香油一斤。半煎。濾過。藥油六七兩。入淨松香十兩。黃丹二兩。同煎。候黃丹

微黑色。却入輕粉七角。光粉二角。煎法。皆如煎膏法。用長條紙拖過。掛乾。用。若瘡紫黑。先用三稜針去惡血。以冷水洗淨。隨瘡大小。剪膏藥掩上。用絹帛紮緊。俟一周時。再換膏藥。換時。須用冷水洗瘡。不過數換。不問新久。即愈。須忌日氣。火氣。陽氣。儻換膏藥。再看。如有黑腫未盡。可再出血。以紫黑血盡為度。(本草綱目)

糯米泔嗽口過。洗瘡。拭淨。却以地骨皮為細末。蜜調敷瘡上。又以油紙縛之。(本草綱目)

先以葱白漿水熬湯。洗淨瘡口。拭乾。徐以輕粉。搽上瘡口。却用五靈脂。黃蘗各等分。研細末。涼水調傅瘡上。紙蓋定三五次。即平復。(蘭氏方)

棘葉搗傅之。亦可曬研麻油調傅。(時珍本草)

棉子炒脆。取末。填滿瘡內。紮好。不可開看。自然痂愈。(葛氏方)

生豆腐渣捏成餅。如瘡之大小。先用清茶洗淨。絹帛拭乾。然後貼上。以帛束之一日。一換。瘡漸小。肉漸平。而愈。但勿落水。(濟急方)

龜板炙。蘆甘石。煨各三錢。輕粉二錢。冰片一二分。共研細末。麻油半杯。銅鈿內熬滾。入白蠟黃蠟各二錢。融化。離火。將凝。入前藥末。攪勻。攤油紙貼患處。以葱椒甘草湯洗。一日一換。(奇效良方)

香油一兩。鐵杓煎。入黃蠟五錢。化開。用銅線三錢。研細末。徐徐入杓內。作五十餘次。入將銅錢剉末。另放枕內。將藥傾入。冷定。將瘡洗淨。用氈一塊。如瘡大。攤藥於上。紮患處。一日一換。換時須洗淨。(青囊雜要)

紅棗焙枯。存性。除枯。加葱白猪板油。搗爛。敷上。一日一換。二三日即愈。(葛氏方)

馬尾松樹枝。取下刮去外皮。取用第

二層白皮。刮下。生板猪油搗如泥。敷患處。三日即愈。(易簡方)

鮮桑白皮。韶腦。脂子油。三物。搗極爛。作成餅狀。貼瘡上。絹帛縛之。少時瘡必奇癢。此時務極力忍耐。勿搔動之。候癢止。再換一塊。又如前法。至瘡口內紅肉突起。便愈矣。(乾坤生意)

對口瘡。生後頸正中處。偏生者。名偏對口。用新鮮茄子蒂十四個。生紅何首烏二兩。煎服二三次。未破即消。已破。拔膿生肌。雖根盤八九寸寬大者。亦效。(應驗良方)

象貝母研末。敷之。神效。(楊春涯驗方)

尋取非地蚯蚓。搗爛。涼水調敷。日換三四次。(扶壽方)

貓頭骨燒存性。研。每服三五錢。酒服。(便民食療方)

髮毛瘡。生頭上。如葡萄狀。用黃柏一兩。乳香二錢五分。共為末。槐花煎濃

汁調作餅貼瘡口并用吳茱萸研末醋調敷兩足心即愈（東陽方）

【貓眼瘡】瘡似貓兒眼有光彩無膿血瘡痛不常飲食減少名曰寒瘡用生

草烏三兩生薑二兩煨白芷炒南星各一兩肉桂五錢不見火共為末用頂好燒酒調敷名曰回陽玉龍膏（如宜方）

②多食雞魚葱韭四物自愈（夏子益奇疾方）

【纏蛇瘡】又名纏腰龍此丹毒也生腰下長一二寸或碎如飯或紅腫堅硬雄黃末醋調敷之（普濟方）

糯米粉和鹽嚼塗（濟急方）馬蘭丹草搗醋搽之漸消（濟急方）

④水缸底蚯蚓一條連泥搗爛即愈（本草綱目）

【蛇形瘡】其形似蛇故名外用雄黃麻油調敷內用雄黃沖酒飲良驗（乾坤秘蘊）

【魚脊瘡】多生筋骨間堅凝作痛初起白泡漸長狀如魚脊破流黃水初起時用老蒜切片如三文錢厚安放瘡

頭上艾一團如豆大於蒜上燒之蒜壞另換燒至不痛為止名曰隔蒜灸法再照貓眼瘡第一治法回陽玉龍膏治之（阮氏經驗方）

【魚臍瘡】穿而長腫而黑者是用臘豬頭骨燒反研末生雞蛋白調搽數日即愈（筆峰雜興）

【蜂窩瘡】不拘何處形如蜂窩者是胡粉硃砂等分為末和白蜜塗敷甚效（聖濟總錄）

【蛛蜘蛛瘡】形如蛛網癢不能忍豆腐衣又名豆腐皮燒枯存性香油調搽（慈惠編）

【瓜藤瘡】一生十餘個即是用尖尾芋茄子葉五月艾葱薑共搗爛醋煮敷搽（外科集驗方）

【天泡瘡】生錦紋大黃磨水時時搽之

頗能見效（應驗良方）

②蓮蓬燒枯研末并泥調敷神效或用鮮荷花瓣貼之亦佳（科外通玄論）

【黃水瘡】初如米粟癢而兼痛破流黃水浸淫成片流處即生發於心下者若不早治難救用胡燕窠中土研末水和敷（葛氏驗方）

②紅棗燒炭八錢飛黃丹松香枯礬各四錢右共為末麻油調搽（外科集驗方）

③鯽魚切片和鹽搗貼頻頻更易以瘥為度（聖惠方）

【人面瘡】此瘡生在兩膝亦有生在兩手灣者眼口能動能食用雷丸三錢輕粉真白茯苓各一錢共為細末敷上即愈（岐伯方）

②貝母末敷之亦效（本草綱目）

【寒毛瘡】用做過豆腐之渣炒熱敷以布包緊冷則隨換包過一夜即愈神效（孫真人方）

翻花瘡

內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出於外用鼠尾草根切同猪脂搗敷(聖濟總錄)

脂搗敷(聖濟總錄)

二蒼耳葉搗汁日塗數次有效(應驗良方)

三雞腸草研汁搽之或為末和猪脂調敷(醫林正宗)

四鷓鴣糞三兩炒黃末溫漿水洗後敷之(聖惠方)

五馬齒莧一斤燒研猪脂和敷(經驗方)

六柳枝葉三斤水五升煎半煎如錫日塗三次(易簡方)

七牛蒡根搗和臘月猪脂日日封之(千金方)

天蛇頭瘡天蛇乃草間花蜘蛛用金絲草金銀花藤五葉紫葛天蒼麥等分切碎用絕好醋煎濃先熏後洗(救急方)

二蜈蚣一條為末和猪膽汁調塗之(

奇效方

三風菱角燈火上燒灰存性研末香油調敷未潰者即散已潰者止痛而愈(醫宗彙編)

一切腫毒野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以渣敷之即效(集效方)

二野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一椀絞汁服以渣敷之取汗即愈(易簡方)

三牛蒡根五莖洗煮爛搗汁入米搗服食一椀甚良(普濟方)

四端午采菰發草一兩乳香一兩白礬燒半兩為末每服二錢熱酒調下毒重者連服三服得汗妙(乾坤秘韞)

五紫花地丁草三伏時收以白麵和成鹽醋浸一夜貼之愈(集效方)

六紫花地丁根曬乾搗成燒煙封瘡熏之出黃水取盡愈(易簡方)

七初起時用透骨草漏蘆防風地榆等分煎湯綿蘸乘熱不住盪之二三日

即消(本草權度)

八葱汁潰之日四五度

九松香八兩銅青二錢蓖麻切五錢同搗作膏攤貼(諸證辨疑)

十野葡萄根曬研為末水調塗之即消(聖惠方)

十一不問生熟軟硬取椒葉十重傅腫上舊綿裹之日三易當重重有毒氣為水流在葉上冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛傅之皆效止痛消腫化膿血勝於眾藥(東陽方)

十二吸鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香油一斤如常熱膏貼(救急方)

十三五倍子炒紫黑色蜜調塗之(普濟方)

十四一切腫毒已成未成者用水膠一片水漬軟當頭開孔貼之未百日者自消已潰者令濃自出(外臺秘要)

十五急於初起時以冰一二塊乾毛巾數層包而貼之數次即退(家庭醫學)

〔六〕醋酸鉛三分。水九十七分。溶化。新棉花一片。飽蘸。貼患上。乾即易。數次即愈。但藥時須將瓶搖動。(外科摘要)

六 癭瘤單方

〔癭〕冬瓜藤濃煎湯。重洗愈。(聖惠方)
〔鼠瘻〕鼠粘子葉為末。和雞子白封之。(外臺秘要)

〔雞子〕一枚。末下蒸半日。取黃熬令黑。先拭瘡令乾。以藥納孔中。三度即愈。(千金方)

〔玄參漬酒〕日日飲之。(開寶本草)
〔蛇瘻〕覓取蛇腹中蛙。燒灰封之。(千金方)

〔蜚螂瘻〕熱牛屎封之。日數易。當有蜚螂出。(千金方)

〔蝦蟆瘻〕五月五日。尋取蛇頭。及野豬脂封之。極佳。(千金方)

〔髮癩〕多生耳後髮。下寸許。按之不痛。用針刺破。刮盡粉髮。用生肌藥敷之。

自愈(肘後方)

〔肉瘤〕每夜將睡時。用熱飯敷上。冷則另換。每晚連敷三次。久而自愈。凡新起肉瘤如小彈子者。治之屢見功效。切勿輕視。(青囊雜要)

〔血瘤〕甘草熬膏。用筆蘸圈瘤。四圍又用芫花。大戟。甘遂。等分為末。醋調。另用新筆蘸塗於甘草圈內。務須離甘草一圍。不可太近。蓋藥性相反。切勿誤相攙和。塗後次日。瘤當縮小。再如前法塗三四次。即愈。(王氏手集)

〔粉瘤〕舊牛皮鞣底洗淨。煮熟極爛。成凍子。常食之。瘤自破。如豆腐。極臭。(直指方)

〔蜘蛛網〕纏住瘤根。次日另換蜘蛛網。再纏。約換四五次。則瘤自消。內有結實小白粉。用手取。不腫不痛。(兵部手集)

〔石灰〕一塊。如錢大。糯米十四粒。同鹹水化開。一夜。加辰砂少許。挑破點之。

(瘡瘍全書)

〔漏瘻〕浸淫日廣。痒不可忍。愈後復發。時流黃水。用羊蹄草根搗爛。將醋洗淨。塗上一小時。以冷水洗之。日一次。(應驗良方)

〔腋下癭瘤〕長柄壺盧。燒存性研末。搽之。以消為度。或加麻油調敷尤妙。(瀕湖集簡方)

〔疣瘻〕初起時。用柳樹上花蜘蛛絲纏之。久則自消。(簡便方)

〔稻上花蜘蛛〕十餘。安桃枝上。待絲垂下。取東邊者。捫為線繫之。七日一換。自消落也。(總微論)

〔癭瘤〕用豬鬃七枚。酒熬三錢。入水瓶中。露一夜。取出。炙食。二服妙。(醫方摘要)

〔鹿麝〕以佳酒浸令沒。炙乾。納酒中。更夾令香。含嚼。汁味盡。更易。盡十具。愈。(千金方)

〔豬鬃〕焙四十九枚。沉香二錢。真硃砂。

罐煨四十九粒。橘紅四錢為末。臨卧

冷酒徐徐服二錢。五服見效。重者一

料愈。以除日合之。忌酸鹹油膩濕氣

之物。(醫林集要)

④羊膈一具。去脂。酒浸。炙熟。含之。嚙汁。

日一具。七日瘥。(外臺秘要)

⑤羊膈七枚。陰乾。海藻乾薑各二兩。桂

心。昆布。逆流水邊柳鬚各一兩。為末。

蜜丸。艾子大。每含一丸。嚙津。(千金

方)

⑥羊膈。豬膈各二枚。昆布。海藻。海帶各

二錢。洗焙。牛蒡子炒四錢。為末。搗二

膈。和丸。彈子大。每服一丸。含化。嚙汁。

(雜病治例)

⑦水涯露出柳根三十斤。水一斛。煮取

五升。以糯米三斗。如常釀酒。日飲。(

范汪方)

⑧秫米三斗。炊熟。取圓葉白楊皮十兩。

勿令見風。切。水五升。煮取二升。漬麴

【枯癩法】以銅綠為末。草刺瘡破。搽上。

以膏藥塗之。(肘後方)

【消癩法】蒼麥灰半碗。反條菜半碗。風

化石灰一椀。同和一處。淋灰三碗。熬

膏。以木髓一二枚。已豆五六粒。二

件。去殼并油。胡椒四十九粒。各研細

爛。入灰汁內。再熬成膏。入罐內。蠟紙

封之。用時。不分大小。用藥點於癩上。

其藥自至根。再上。候茶褐色。須臾。其

癩皆黑色。不須再搽。二三日。自乾。枯

如有瘡口。用紫金散敷之。(瘡瘍全

書)

②黃丹一錢五分。輕粉二錢五分。共為

細末。乾搽瘡口。此即紫金散也。(瘡

瘍全書)

【繫瘡法】先用芫花根洗淨。帶濕。不犯

鐵器。搗取汁。用生絲線浸汁中。一宿

陰乾。以線繫瘡上。一夜即落。不過二

次。將龍骨細茶。訶子末。三味。敷瘡口。

如無根。以芫花煎濃汁浸之。亦妙。(瘡瘍全書)

【痣癩死贅】用花鹹及礬灰。以小麥桿

灰汁煎二味。令乾。等分為末。醋調。別

破水調點之。三日三上。即去。須新合

乃效。(聖濟總錄)

②甘草煎膏。筆粧瘡之四圍。上三次。乃

用芫花大戟。甘遂。等分為末。醋調。別

以筆粧其中。勿近甘草。次日縮小。又

以甘草膏。粧小瘡。三次如前。仍上此

藥。自然焦縮。(得效方)

【瘦氣】即生於項下之氣。瘦也。用自然

銅貯水甕中。逐日飲食。皆用此水。其

瘦自消。或火燒煙氣。久久吸之。亦可

(直指方)

②鐵砂。入水缸中浸之。飲食皆用此水。

十日一換砂。半年自消散。(直指方)

③鼠黏子根一升。水三升。煮一升半。分

三服。或為末。蜜丸。常服之。(急救方)

④黃藥子一升。洗剉。酒一斗。浸之。每日

早晚常服一盞。忌一切毒物。及戒怒。仍以線逐日度之。乃知其效也。(斗門方)

五 海藻一斤。絹袋盛之。以清酒二升浸之。春夏二日。冬秋三日。每服二合。日三。酒盡再作。其鹽曝乾為末。每服一錢。日三服。不過兩劑。即瘰。范汪方)

六 瘰氣初起。海藻黃連各一兩。為末。時時噉。先斷一切厚味。(丹溪心法)

七 五癭結核。壘壘腫硬。以昆布一兩。洗去鹹。曬乾。為散。每以一錢。綿裹好酢中。浸過。含之。噉汁。味盡。再易之。(聖惠方)

八 癭瘤結氣。海帶。頻食之。自愈。(聖惠方)

九 小麥一升。醋一升。漬之。曬乾。為末。以海藻洗研末三兩。和勻。每以酒服一錢。日三。(小品方)

十 蜘蛛網纏贅疣。疣日消爛。屢有驗。(續博物志)

十一 生天南星。大者一枚。研爛。滴好醋五七點。如無生者。以乾者為末。醋調。先用針刺。令氣透。乃貼之。覺癢。則頻貼。取效。(濟生方)

十二 生天南星一枚。好醋少許。瓦盆底上磨汁。起瘰。處用生薑數兩。煎濃汁。乘熱重之。拭乾。搽天南星汁。約十餘次。即愈。(千金方)

十三 石瘡。紫薇花半茶鍾。煮精肉食之。可保一年不生。(應驗良方)

十四 菊花葉搗汁。調白蜜敷之。用渣敷四圍。留頭不敷。俟毒水流盡。即消。(小品方)

十五 軟瘡。代赭石。號丹。牛皮膠。等分為末。好酒一盞。沖之。澄清服。以渣敷。乾則易之。(朱氏集驗方)

十六 葛蔓。燒灰。水調敷之。即消。(千金方)

十七 露蜂房二枚。燒存性。以巴豆二十一粒。煎清油二三沸。去豆。用油調敷。(增補單方)

十八 唐氏得效方。五倍子七個。研末。香油四兩。熬至一半。布絞去渣。搽三四遍。勿以水洗。(普濟方)

十九 抱出雞卵殼。燒存性。研末。入輕粉少許。清油調塗。(危亦林得效方)

二十 貓頭上毛。猪頭上毛。各一把。鼠屎一粒。燒研。油調敷之。極效。(壽域神方)

二十一 瘡疔。古舊瓦片。火煨醋淬七次。為末。菜油和搽。(同壽錄)

二十二 初起時。服小金丹三服。而消。已潰爛者。服七丸而愈。外貼陽和解凝膏。(薛己外科秘傳)

二十三 增補單方大全第二編終

神州醫學編輯社出版

增註

徐洄溪古方新解

全六冊

價洋一元

古方不難求也古方之合用者難求本書乃清代名醫徐洄溪所選錄自漢魏六朝唐宋以及近代集方共九百餘先生自序謂均試多獲效者則此九百餘方均經屢試屢驗極合醫界所用者也分門別類編次極清每方下均有洄溪極新之註解奉旨收入四庫全書極可寶也本社復聘名醫將明清兩代各家之方論增入各方之下無方不解無義不明洵為醫界最有用之書

上海廣文書局發行

第三編 婦科門

一 經脈諸證單方

【經行不定】竹紙三十張。燒灰。淡酒半斤和勻。頓清溫服。(婦人良方)

二 丹參曬研。每二錢。溫酒下。(醫學正傳)

三 竹紙燒灰。溫酒調服。(乾坤秘韞)

【經來色紫】用歸尾。川芎。赤芍。香附。製生地。黃連。甘草。丹皮。各一錢。水煎服。(婦人千金家藏方)

【經來色淡】台黨。白朮。茯苓。歸身。川芎。白芍。熟地。艾葉。香附。製各一錢。炙草五分。薑棗引。水煎服。(婦人良方)

【經來色黃】此症忌用涼藥。須煖其經。以和其血。次月血勝而愈。宜用當歸。烏藥。川芎。元胡。小茴。白芍。各八錢。熟地一錢。薑棗引。空心服。(婦人明理論)

【經來嘔吐】丁香。乾薑。各五分。白朮一錢。為末。每清晨米湯下。(熊氏補遺)

【行經腹痛】歸尾。川芎。赤芍。丹皮。製香附。元胡。索各一錢。生地。紅花。各五分。桃仁。二十五粒。水煎服。(醫方捷徑)

二 香附。炒四兩。橘紅。二兩。茯苓。炙草。各一兩。為末。每二錢。沸湯下。(婦人良方)

【經後腹痛】台黨。白朮。香附。醋炒。茯苓。當歸。川芎。白芍。生地。各一錢。炙草。木香。各五分。青皮。七分。薑棗引。水煎服。(外臺秘要)

【月經不通】或兩三月。或半年一載者。用麻子仁。二升。桃仁。二兩。研勻。熱酒一升。浸一夜。服一升。便通。(普濟方)

二 蔥。次根。一兩。水煎服。不過數服。甚妙。(海上方)

三 凌霄花。為末。每服二錢。食前。溫酒送下。(徐氏胎產方)

四 芥子。二兩。為末。每服二錢。熱酒食前服。(仁存方)

五 益母草膏。常服。輒有神效。(海上方)

六 葶藶。一升。為末。蜜丸。彈子大。綿裹。納陰中。入三寸。每丸一宿。易之。有汗出止。(千金方)

七 厚朴。不拘多少。薑汁炙香。細切。濃煎。去渣。空心服。不過三四劑。即痊。屢驗。但惟形實氣盛者宜之。(本草綱目)

八 月經不通。腹大如壘。氣短欲死者。虎杖一斤。去頭。曬乾切。上瓜根汁。牛膝汁。各二斗。水一斛。浸虎杖一宿。煎取二斗。入二汁同煎。如錫。每酒服一合。日再。夜一宿。血當下。(聖惠方)

九 菴蘭子。一升。桃仁。二升。酒浸。去皮。尖。研勻。入瓶內。以酒三斗。浸封。五日。後。每飲三合。日三服。量小者不拘。凡婦人宿有風冷。留血積聚。因而不通者。

第三編 婦科門 經脈諸證單方

服此效。(聖惠方)

【室女經閉】當歸尾沒藥各一錢。為末。紅花浸酒。而北飲之。一日一服。(普濟方)

濟方)

③茜草三錢。陳酒一鍾。水煎服三劑。如經仍未通。再服三劑必效。(肘後方)

③室女經閉。恍惚煩熱。鉛粉半兩。生地黃汁一合。調服。日三次。(聖惠方)

【月經不調】熟地黃八兩。當歸二兩。黃連一兩。並酒浸一夜。焙研為末。煉蜜丸。梧子大。每服七十九。米飲溫酒下。

(禹講師經驗方)

②阿膠一錢。蛤粉炒成珠。研末。熱酒沖服。即效。(乾坤秘韞)

③月經不調。氣血乖和。不能受孕。或生過一胎。停隔多年者。全當歸五兩。切片。遠志肉五兩。甘草湯洗用稀夏布袋。盛甜三白酒十斤。浸之。蓋好。浸七日。後晚溫服。隨量飲之。勿間斷。(千金方)

④香附一味。末。醋吸服。效。(崔氏方)

⑤熟附子去皮。當歸等分。每服三錢。水煎服。(普濟方)

【月經交閉】因病或身體虧弱。久久斷經者。是用紅棗。紅糖。生薑。馬豆。蘭根。各四兩。合煎。日三服。勿間斷。至經水復來為止。極效。(婦人明經論)

②蠶砂四兩。砂鍋炒半黃色。入無灰酒一壺。煮沸澄清。溫服一盞。(千金方)

③絲瓜絡煨研。每三錢。酒服。(仁存堂方)

④生地汁八兩。熬乾一半。大黃末一兩。同蒸。為丸。梧子大。熱水下五粒。(醫鑑)

【月經逆行】先以京墨磨汁服。次用當歸尾。紅花各二錢。水一鍾。半煎。八分。溫服。其經即順。(聖濟總錄)

②韭菜搗汁一盞。入童便半盞。蒸熱服。極效。若無童便。其功稍緩。(唐仲舉方)

③魚膠切炒。新綿燒灰。每服二錢。米飲調下。(本草綱目)

【經水不止】白芍藥。香附子。熟艾葉。各一錢。半。水煎服。(熊氏補遺)

②赤石脂。破故紙。一兩。為末。每服二錢。米湯調下。(普濟良方)

③船芎一斤。淨洗。河水四升。半。煮取二升。分二服。(本草綱目)

④羊前左腳。脛骨一條。紙裹。泥封。令乾。煨赤。入椀。欄灰各等分。每服一錢。溫酒送下。(本草綱目)

⑤箬葉。灰。蠶紙。灰。等分為末。每服二錢。米飲下。(聖濟總錄)

⑥木賊炒三錢。水一盞。煎七分。溫服。日一服。(本草綱目)

⑦敗蒲扇。燒灰。酒服一錢。(本草綱目)

⑧桑耳。焙研。每服二錢。食前。熱酒下。日三服。久疾。失治者。皆可服之。(普濟方)

⑨槐耳炒黃。赤石子各一兩。為末。食前

熱酒服一錢。(聖惠方)

⑩梅葉焙。椶櫚皮灰各等分。為末。每服二錢。酒調下。(聖濟總錄)

⑪側柏葉炙。芍藥各等分。每二錢。水酒各半煎服。(本草綱目)

⑫側柏葉。木賊。炒微焦。各等分為末。每服二錢。米飲下。(聖濟總錄)

⑬紅鷄冠花一味。曬乾為末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥猪肉。(集效方)

⑭牡蠣煨研。米醋捏成團。再煨。研末。以米醋調艾葉末熬膏。凡梧子大。每醋湯下四五十九。(本草綱目)

⑮青竹茹。夫為末。每服三錢。水一盞。煎服。(普濟方)

⑯五靈脂炒。煙盡研。每服二錢。當歸兩片。酒一盞。煎六分。熱服。三五度。取效。(經效方)

⑰痛經不孕。玉蘭花將開未足。每歲一朵。(如二十歲用二十朵)每日清晨空心水煎服。有效。(良方集要)

老年經行不止。黃芩心二兩。醋浸七日。炙乾。又浸炙七次。醋糊為丸。陳酒送下。極驗。(婦人良方)

撞紅。明雄黃水飛淨三錢。好酒冲服一次。即愈。(婦人秘科)

乾血氣痛。絲瓜一枚。燒存性。空心溫酒服。(壽域神方)

崩漏諸症單方

婦人血崩。凡血崩諸藥不效者。用多年舊煙袋桿紫色油透者。截一寸。燒灰。黃酒調服。下喉即止。屢試屢效。(局方發揮)

⑱舊棕墊灰。置瓦上。收火氣。清晨溫湯冲服三四錢。神效無匹。(活人書)

⑲當歸一兩。荆芥一兩。酒一鍾。水一鍾。煎服立止。(香祖筆記)

⑳生豆腐漿一碗。生韭菜汁半碗。入漿內。空心服一二次。(不藥良方)

㉑貫眾半兩。煎酒服立止。(集簡方)

㉒懸鈎子根四兩。一碗煎七分。空心溫服。(乾坤生意)

㉓代赭石。火煨醋淬七次。為末。白湯服二錢。(普濟方)

㉔草血竭。嫩者蒸熟。以油鹽薑淹食之。飲酒一二杯。送下。(危亦林得效方)

㉕陳年蒸餅。燒存性。飲服二錢。(平治會粹)

㉖陳槐花一兩。百草霜五錢。為末。每服二錢。燒紅秤錘。滓酒調服。(陳藏器方)

㉗蠶砂為末。酒服。(集效方)

㉘蠶繭煮汁飲之。亦效。(斗門方)

㉙荆芥穗。麻油澄上炒黑。為末。每服一二錢。童便調服。風濕血崩者宜之。(聖惠方)

㉚蓮房。荆芥炒黑。研末服。效。(外臺秘要)

㉛烏梅燒研。末。飲下二錢。

㉜陳椶灰。百草霜。頭髮灰。各一兩。共為末。每服三錢。陳酒下。(集驗方)

①夏枯草末。每服一匙。米飲調下。(乾坤生意)

②大剉根絞汁。服半升。瘕。產實方。

③白扁豆花。焙乾為末。每服二錢。空心炒末煮飲。入鹽少許調下。效。(瑣碎錄)

④老絲瓜。按攪。等分燒灰。鹽酒。或鹽湯下。(易簡方)

⑤葶藶一歲一箇。燒研末。酒服。(青囊秘要)

⑥凌霄花為末。每酒服二錢。(永類鈴方)

⑦鐵秤錘燒紅。淬酒中。取酒調黃芩三錢服。(經驗良方)

⑧核桃燒末。米飲服。日三次。

⑨崩中下血。不問年月遠近。槐末(即槐耳)燒末。每服一匙。溫酒下。(必效方)

⑩崩中卒下。好京墨。醋磨服。(婦人良方)

⑪香附去毛炒焦。研末。溫酒或米飲下二錢。極重者三錢。必止。(肘後方)

⑫石葦為末。每服三錢。溫酒服。效。(海上方)

⑬雞蘇煮汁一升。溫服。(集驗方)

⑭甜杏仁去仁用皮。煨研。每三錢。溫酒下。(兵部手集)

⑮老年血崩。婦人老年。血海大崩不止。名曰倒經。陳阿膠一兩。米粉拌炒成珠。全當歸一兩。西紅花一兩。冬瓜子五錢。天泉水煎服。血崩猶發熱。再以六安茶葉三錢煎服。(醫學正傳)

⑯崩漏五色。蜂巢焙枯。研末五分。溫酒下。神效。(張文仲備急方)

⑰婦人血漏。伏龍肝半兩。阿膠蠶沙炒各一兩。為末。每空心酒服二三錢。以上為度。(寇氏衍義)

⑱赤白帶下。石菖蒲破故紙等分。炒為末。每服二錢。以菖蒲浸酒調服。每日

一次。(婦人良方)

①白果去皮。煮熟蜜錢。每日清晨吃七枚。再食炒馬料豆一兩。白滾水送下。數日愈。(明醫雜著)

②白芍二兩。乾薑半兩。共研末。每服三錢。米飲湯下。二錢。一日忌食生冷之物。(墨娥小錄)

③白扁豆炒為末。用米飲湯下二錢。(石室秘錄)

④豆蔻仁一枚。乳香一小塊。麩裏煨黃。同麩研細。每米飲湯服二錢。日二次。(衛生易簡方)

⑤苦參二兩。牡蠣粉一兩五錢。為末。以雄豬胆一具。水三椀。煮爛。搗泥和丸。梧子大。每服百丸。溫酒下。(墨娥小錄)

⑥槐枝燒灰。食前酒下一匙。日二服。(肘後方)

⑦蕎麥炒焦為末。雞子白和丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯下。日三服。(斗門

方

(九) 夏枯草。花開時采。陰乾為末。每服二錢。米飲下。食前服。(備急方)

(十) 白果煨熟。去火氣。細嚼。米飲下。(千金方)

(十一) 貫眾狀如刺蝟者。一個。全用。不剉。只搽去毛。及花萼。以好醋蘸濕。慢火炙令香熟。候冷為末。米飲。空心。每服二錢。效。(集效方)

(十二) 蜀葵花。陰乾為末。空心。溫酒服。二錢。赤用。赤。白用。白者。(婦人良方)

赤帶 紅雞冠花。曬乾為末。每日空心酒服。(易簡方)

婦女白帶 用酒及艾葉。煮雞蛋。日日食之。(袖珍方)

(一) 沙參為末。每服二錢。米飲湯下。(證治要訣)

(二) 白雞冠花。曬乾為末。每晨空心酒服三錢。(孫氏集效方)

(三) 土人參切片。三兩。陳酒。飯上蒸熟。分

作三服。愈。(葛氏方)

(四) 選青色。無沙眼之牡蠣。火煨紅。冷定。又煨七次。研細。腐漿調下。二錢。(必效方)

(五) 艾葉煮雞子食。效。(小品方)

(六) 陳冬瓜仁炒末。空心。米飲服。五錢。(席延賞方)

(七) 苦楝炒。大茴香。當歸等分。酒和。丸酒下。(南行方)

(八) 糯米。花椒等分。研。醋糊。丸。梧子大。每三四十丸。醋湯下。(楊起簡便方)

(九) 槐花炒。牡蠣煨等分。為末。每服酒三錢。效。(皆效方)

(十) 風化石。灰一兩。白茯苓三兩。為末。糊丸。梧子大。每服二三十丸。空心。米飲下。(楊氏家藏方)

(十一) 蓮蓬殼。炙。研細。未。用熟雞子去黃。取白。裏末。而服。頗效。(應驗良方)

(十二) 土炒冬木五錢。雲苓三錢。車前子一錢五分。再加紅雞冠花三錢。如赤帶。

則用白雞冠花。(仁存堂方)

室女白帶 金毛狗脊。煨去毛。白。飲各一兩。鹿茸。酒蒸。焙。二兩。為末。用艾煎醋汁。打糯米。糊。丸。梧子大。每服五十丸。空心。溫酒下。(濟生方)

五色帶下 久年古磚一塊。燒極紅。以油煎麵餅七個。安放磚上。再用黃瓜根。研末。鋪麵餅上。加布兩層。令患者坐上。使藥氣熏入腹中。三五次。即愈。(梅師方)

帶下有膿 白芷一兩。單葉紅蜀葵根二兩。白芍藥。白枯礬。各半兩。為末。以蠟化丸。梧子大。每空心及食前服十丸。俟膿盡。自愈。(藥性論)

婦人白淫 糙糯米。花椒等分。炒為末。醋糊。丸。梧子大。每服三四丸。食前醋湯下。(楊起簡便方)

(一) 風化石。灰一兩。白茯苓三兩。為末。糊丸。梧子大。每服二三十丸。空心。米飲下。(楊氏家藏方)

【婦人白沃】經水不利。子臟堅僻。中有乾血。即下白物如漿。用礬石燒杏仁各一分。研勻。煉蜜丸。棗核大。納入子臟中。日一易之。(金匱玉函方)

【婦人白濁】鹿角屑炒黃為末。酒服二錢。(婦人良方)

【四】諸乳疾單方

【婦人乳巖】此證乳內生一小粒。初如豆大。漸大如塊。不痛不癢。至一年後。或二三年。漸漸腫痛。臭爛孔深。亦有初起色白。堅硬一塊。作痛異常。此係陰疽。最為險惡。急宜早治。初生者服犀黃丸三錢。酒下十服。全愈。倘候貼膏藥。必漸腫大。內作一抽之痛。已覺遲治。假如皮色變異。難以挽回。(勝金方)

【三】乳巖初起之時。用夏枯草。蒲公英。漏蘆。菖蒲。雄鼠。鼠。真。甘。菊。貝。母。紫。花。地。丁。山。慈。菇。連。翹。白。芷。瓜。蒞。仁。艾。草。廣。皮。茜。根。乳。香。沒。藥。銀。花。各。二。錢。研。末。另

用夏枯草熬膏和勻。丸梧子大。每服五錢。滾水送下。至重二服全消。屢試神驗。且價廉易治。貧寒之家最宜。(王晉三經驗方)

【三】乳巖已潰爛者。急覓熟蟹殼煨灰存性。研細末。小磨麻油調敷患處。甚效。(衛生家寶方)

【四】新鮮黃魚脊翅。撕下。隨黏石灰牆上。勿任見水。愈久愈好。爰為灰。研細末。每日用陳酒服下。約二三次。連服數月。極效。(皆效方)

【五】山慈菇一錢。胡桃肉三個。共搗。黃酒送服。以散為度。(崔氏方)

【六】乳巖初起。冬至日收買小鯽魚。腸雜鱗甲。一概不去。但將背部剖開。中實川椒七粒。每尾如是。懸掛簷際。風乾滿九日。取下。收藏。始終忌經婦女手。遇一切乳證初起。取此魚一尾。瓦上焙存性。研末。陳酒沖服。蓋被出汗即效。(萬全方)

【七】蒲公英搗爛。盒患處。妙。(袖珍方)

【八】乳巖既破。則不可治。急用生蟹殼數十枚。砂鍋內焙焦為末。每服二錢。好酒調服。勿間斷。(名醫別錄)

【九】雄鼠。真。露。蜂。房。經。霜。土。棟。子。各。三。錢。俱。煨。存。性。各。取。淨。末。和。勻。每。服。三。錢。酒。下。間。二。日。一。服。即。止。痛。收。口。(崔氏方)

【十】陳年老南瓜蒂。燒炭。無灰酒送服。外再用麻油調炭塗效。(保命集)

【十一】土貝母五錢。胡桃隔金銀花連翹各三錢。酒水煎服。(如宜方)

【十二】百藥煎研末。每三錢。酒一盞煎服。(百一選方)

【婦人乳癰】紅腫疼痛者是。用生蒲公英。英。搗。爛。沖。酒。調。服。渣。敷。乳。上。略。睡。片。刻。數。次。即。愈。此。為。乳。癰。聖。藥。切。勿。輕。忽。(皆殷產寶)

【十二】丹參。白。芷。芍。藥。各。二。兩。剉。碎。醋。淹。一。夜。猪。脂。半。斤。微。火。煎。成。膏。去。滓。敷。之。

(孟說必效方)

③石膏煨紅。出火毒。研細。每服三錢。溫酒下。盡醉為度。睡覺再進一服。其名曰一醉消。(千金髓)

④紫河車土貝各三錢。用黃糖拌勻。好酒和服。盡醉。蓋被取汗。即消。(癰疽論方)

⑤貝母末。酒服二錢。仍令人吮之。即通。(直指方)

⑥紫蘇煎湯。頻服。並搗封之。(海上名方)

⑦新鮮黃魚背棘。扯下。黏貼牆上。陰乾。用時。取下三數條。瓦上炙灰存性。研末。另用陳酒半碗。水半碗。青皮錢半。煎濃。送下黃魚棘。三服立愈。誠神方也。癰已潰者。服此亦收。但須另用外敷之藥。(萬全獲命)

⑧白花地丁。全當歸。細生地。金銀花。甘草各一兩。用水一椀煎透。至七八分。加黃酒一斤。再煎。又加黃酒半斤。不

飲酒者。一杯亦可。初起時服之。靈驗無比。(鄭氏家傳方)

⑨旁山甲炮研末。酒服一錢。日二服。外以油梳梳乳。即通。(單驗方)

⑩蒲公英連根葉二兩。搗爛。取汁。忍冬藤煎濃湯。入少酒。和汁服。(勝金方)

⑪活小鯽魚一尾。去腸雜。生山藥。或羊寸許。同搗爛。塗發癢。即愈。(醫鑑)

⑫胡桃隔。瓦上焙枯。研末。紅糖調勻。溫酒每送三錢。(醫壘元戒)

⑬芋麻根搗爛。敷上。即消。(梅師方)

⑭金針菜射干。見英子各三錢。同炙研細末。分三服。砂仁湯下。(備急方)

⑮柳根刮去皮。搗爛。燉溫。盛煉囊中。熨孔上。冷則易。極驗。(普濟方)

⑯炒蔥白搗敷。瓦器盛炭火逼之。佳。(續傳信方)

⑰大熟括萸一枚。搗白酒一斗。煮取四升。溫服一升。日三服。(濟急方)

⑱貝母仁錢。研末。酒調服。令兒吮之。

子母秘銘

①白梅煨研。入青粉少許。麻油和圓。初起已潰。皆可用。(名醫別錄)

②葱白杵敷。並絞汁服。(袖珍方)

③槐花五七朵。酒煎服。即以花瓣摘散。貼患處。(千金方)

④此小蘇湯。頻飲。渣滓封患處。(子母秘錄)

⑤乳癰串爛。洞見內腑。年久不愈者。搗船槽上首手捏處。舊籐篔剪下。陰陽瓦焙。研末。日日搽之。乾則以香油調搽。(活人書)

⑥乳毒。敗龜板一枚。燒研。酒服四錢。(小品方)

⑦乳癖。蒲公英一兩。金銀花二兩。酒水各一椀。煎半。加酒一小杯服。(圖經本草)

⑧豬油切貼。冷水浸貼。熱即易。散盡為度。(諸證辨疑)

⑨陳皮炒末。黑糖調服三錢。七日必愈。

(活人心統)

④活鯽魚一尾。鮮山藥如魚長者一段。共搗爛敷患處。以紙蓋之。立愈。(生

生編)

⑤白芷。雄鼠糞。等分。曬乾為末。好酒調服。必多飲。取一醺睡而愈。(纂要奇方)

【乳瘡】生芝麻不拘多少。嚼爛敷效。(梅師方)

②男女乳上濕癢。膿血淋漓。成片。飛紅無。醫。病。瘵。不。休。者。此。名。火。革。癢。蚌。殼。殿。末。五。錢。加。輕。粉。五。分。冰。片。一。分。研。勻。金。銀。花。湯。調。搽。(錦囊秘覽)

【婦人乳癰】天仙子(廣東藥店購之)

一味二十文。用冷開水拌成餅大小。將餅貼在患處。不可使乾。稍乾即用冷開水潤潮。如是一夜。無不愈者。(救急易方)

②瓦楞子醋煨三錢。青黛五分。收丸飲之。即消。(袖珍方)

③收集已開謝之水仙花。懸簷下風乾。過婦人患乳癰者。取以搗爛敷之。極驗。(保命集)

【婦人乳吹】遠志焙研。酒服二錢。以滓敷乳上。腫痛自消。(袖珍方)

②小豆荳草。等分為末。苦酒和敷。極佳。(梅師方)

③貝母末吹鼻中。大效。(危亦林得效方)

④甘菊花根葉杵爛。汁。酒冲服。渣敷患處。立效。(奇效良方)

⑤貝母末吹鼻。效。(萬病回春)

⑥乳吹成癰者。猪板油一斤。冷水浸貼。熱即易。(集效方)

⑦括蕒一個。乳香二錢。酒煎服。外用南星為末。溫水調敷。(深師方)

⑧鮮蟹一隻。搗爛。燒酒燙熱。冲服。(活法機要)

⑨橘皮一兩。甘草一錢。煎服。(聖惠方)

⑩甘菊花根葉。杵爛。酒釀冲服。渣敷患處。效。(陳氏經驗方)

①橘紅麵炒令黃。研末二錢。加麝香二釐。酒下。(席延賞方)

②砂仁五分。冬葵子八分。研末。以蒲公英五錢。括蕒仁三錢。煎湯調服。(肘

後方)

③端午粽箬。燒灰。酒服二錢。效。(葛氏方)

④穿山甲三片。橘紅二錢。水煎。和酒服。(篋中方)

【乳頭破裂】秋月冷露。茄子裂開者。陰乾。燒成性。研末。水調塗之。即愈。(補遺方)

②胭脂蛤粉。為末敷之。(危亦林得效方)

③雞子白炒研。每服一錢。酒送下。三服即愈。(攝生妙用方)

④老黃茄子。燒灰敷。(簡便方)

⑤室珠茶花。焙。研末。麻油調敷。內服治諸血證藥。(萬氏方)

⑥龜板炙研末。加冰片研勻。麻油調搽。

(普濟方)

七白茄子燒灰敷之。(集效方)

【妬乳】丁香末水服一錢。(梅師方)

三生薑著根搗和鹽醋漿水煮汁洗之。

五六度。良和雞子白封之亦效。(食

療本草)

三黃白研細雞子清和厚敷。

【乳汁不下】瓜萋子淘洗控乾炒香。瓦

上翕令白色酒服一錢合面卧一夜。

乳汁自下。(姚生坦集驗方)

二絲瓜連子燒存性研末酒服一二錢。

被覆取汗即通。(簡便單方)

三赤小豆煮汁飲之。(督股產寶)

四荆三稜三個水二椀煎汁一椀洗奶

俟汁出為度極神妙。(外臺秘要)

五貝母知母牡蠣各等分為細末每用

猪蹄羹湯調服二錢。(王好古湯液

方) 六乾胡荽煎湯飲之。乳汁自來。(經驗

方) 七瞿麥麥冬王不留行龍骨穿山甲各

等分。為末。每一錢。熱湯下。先食懸猪蹄羹。後服此藥。服後以梳刮左右乳房。乳汁必下。是藥名湧泉散。(證治要訣)

八漏蘆二兩半。蛇退十條。炙焦。括萋十

個。燒存性為末。每服二錢。溫酒調下。

良久。以熱羹湯投之。以通為度。(和

劑局方)

九兒角刺。萋荊子。各燒存性。等分為末。

每溫酒服二錢。(袖珍方)

十鯉魚頭。燒為末。酒服三指撮。(千金

方)

十一母猪蹄一具。粗切。以水二斗。熟煮。得

五六升汁。飲之。不出。更作一方。入酒

煮之。(千金方)

十二猪蹄二具。熟炙。槌碎。通草八兩。細切。

以清酒一斗。浸之。稍稍飲盡。不出。更

作。(千金方)

十三內服通乳藥。外用木梳梳乳周圍約

百餘遍。即下。(濟眾方)

十四雄猪前脚爪一個。鬼饅首二個。并煮食。一日即通。雖無子。女人食之。亦有乳。(楊氏家藏方)

十五雄鼠糞二十一粒。豆腐皮包。酒吞下。

日三服。(筆峰雜錄)

十六鯉魚作羹食之。效。(普救方)

十七萋荊子。糯米各一合。研細。水一椀。入

甘草末三分。攪勻。煎。頻呷。(奇效良

方)

十八赤小豆煮汁飲。或者粥食。俱效。(經

驗後方)

十九豌豆煮食。能多乳汁。(食療本草)

【乳汁患少】芝麻炒研入鹽。少許食之。

(唐氏方)

二十通草燉猪蹄食之。勿用鹽醬。乳汁自

多。(龔氏經驗方)

二十一穿山甲研末。末泔調服。(百一選方)

二十二因偶食鹹而減少者。速改用淡食。一

面將熱熟猪油。開水冲服。乳汁便多。累驗。(保慶集)

【婦人無乳】母猪蹄一對。通草同煮食。

併飲汁。便有乳。(產寶)

二用羊肉六兩。獐肉八兩。鼠肉五兩。作

臠食之。(崔氏方)

三鯉魚同冬瓜皮並煮。食魚飲湯。乳汁

當如泉湧。(普濟方)

四黃芪五錢。七星猪蹄一隻。煮爛食。效

(永類鈴方)

五赤沙糖煮豆腐。以醇酒下。(陽春渥

驗方)

六羊肉二斤。黃芪八兩。乾地黃。歸身。川

斷各四兩。牛膝二兩。同煮。絞濃汁。入

蜜四兩。熬如飴。每溫酒服一匙。(集

驗方)

七萬莖三枝。研成泥。調服。(本草綱目)

【乳汁患多】炒麥芽三錢。煎濃湯飲之。

日飲一次。自能減少。至乳汁適量為

止。多服必止乳。須慎之。(惠濟方)

【婦人回乳】用男子包脚布勒住。經宿

即止。(本草綱目)

●五 婦人邪病單方

【夢與鬼交】女人獨自言笑。悲思恍惚。

自稱與鬼魅邪物交相合。是用雄黃

末一兩。以松脂二兩。鎔和。虎爪攪令

如彈丸。夜納火籠中燒之。令女人踞

坐其上。以被自蒙。唯出頭目。未瘥。再

作。不過三劑。自斷也。(醫學準繩)

二以安息香和臭黃合為丸。燒熏丹田

穴。永斷。(醫學準繩)

三鹿角為末。三指撮。和清酒服。即出鬼

精。兼治漏下不斷。(醫學準繩)

四婦人為妖所魅。迷惑不肯言狀。以水

服鹿角屑一錢。即言實也。(醫學準繩)

●六 前陰諸證單方 附交腸

【婦女陰吹】陰吹。放如撒屁之聲也。猪

板油八兩。亂髮三團。雞蛋三個。以肥

皂水洗淨。同煎髮烱。分二次服。病從

小便出。即愈。(婦人良方)

【婦人陰脫】白芨川烏頭等分為末。

絹裹一錢。納陰中。入三寸。腹內熱。即

止。日用一次。(廣濟方)

二礬石燒研。空心酒服一小匙。日三次。

(千金翼方)

三鐵精羊脂。布裹炙熱。熨推之。(聖惠

方)

四桂心。吳茱萸。各一兩。戎鹽二兩。並熬

令色變。研末。綿裹如指大。納陰中。日

再易。(簡易方)

五蛇牀子五兩。烏梅十四個。煎湯。日洗

五六次。(瑞竹堂方)

六婦人陰下脫。若腸。先以淡竹根煎湯

洗。再用五倍子。白礬末。搽。效。(千金

方)

【婦人陰挺】水仙花瓣。紅糖搗極融爛。

敷之。神效無比。(子母秘錄)

二鯽魚生煎。煉油。搽之。極效。(婦人良

方)

三茄根。燒存性。為末。油調。在紙上。捲筒

安入內。一日一上。甚效。(乾坤生意)

四冰片五錢。鐵粉一錢。水調塗。(集元

方)

五 飛卷六兩。桃仁一兩。五味子。雄黃各五錢。銅絲四錢。共研細末。煉蜜為丸。每重四錢。即以方內雄黃為衣。坐入玉門內。即愈。甚者不過二次。(聖惠方)

六 蕪蘆為末。猪油調塗。日易。(普濟方)

七 生枳殼為散。煎湯熏洗。仍用綿包枳殼渣。納陰中。(普濟方)

八 陰戶下物如泡。有尖。重斤餘。急與黃芪。白朮各五分。升麻二分。人參。當歸各一錢。水煎。連服三五劑。即收。(本事方)

九 蛇牀子五兩。烏梅十四個。煎湯熏洗。效。(瑞竹堂方)

婦人陰腫 青布裹鹽。熨之。(華性論)

二 枯礬甘草等分。為末。綿裹納陰中。(王氏奇方)

房後陰痛 地榆煮酒服。(易簡方)

小戶嫁痛 牛膝五合。切。酒三升。煮二

升。分三服。(范汪方)

二 冬青葉。小麥。甘草等分。水煎洗。(香祖筆記)

婦人陰癢 蛇牀子一兩。白礬二錢。煎湯頻洗。(集簡方)

二 杏仁燒灰。乘熱。綿裹納陰中。日再易。

三 雞肝。或猪肝。炙熟。切一長條。插入陰戶內。過一夜。次早取出。數次。愈。(食療本草)

四 小蘗煮湯。日洗三次。見效。(圖經本草)

婦人陰腫 甘菊苗搗爛。煎湯。先熏後洗。(應驗良方)

三 陰門腫滿。且作奇癢。可以蒜湯洗之。能消腫止癢。(永類鈴方)

三 羌活。防風。煎湯熏洗。炒。(百一選方)

四 枸杞根煎湯頻洗。(養疴漫筆)

五 生地。當歸。川芎。白芍。乳香等分。搗成餅。納陰中。(物類相感志)

六 葱白。研膏。入乳香末。拌勻。敷患處。

集效方)

婦人陰瘡 硫黃末。敷之。其瘡漸瘳。(肘後方)

二 紫葳為末。用鯉魚膽調搽。(摘立方)

三 陰戶內生瘡。作癢。活蚌一個。剖開。將有肉半個。手拿對陰戶。一夜。次日。又換一個。(養生主論)

四 陰瘡爛痛。杏仁燒黑。研膏敷。(醫學綱目)

五 陳蚌殼。煨。兒茶。輕粉。飛滑石。人中白。煨三錢。枯礬。龍骨。煨各一錢。冰片三分。共研。麻油調搽。(王海藏方)

六 婦人陰戶內生瘡。癢痛難堪。鮮猪肝切成條。於香油中微燙過。抹樟腦。川椒末。插入引蛆蟲。候一時辰。取出。再換。(嘉祐方)

七 桃葉。柀。爛。綿裹納陰中。(聖濟總錄)

婦人陰蝕 狼牙草三兩。水四升。以著纏綿浸湯。滌汁洗之。一日四五次。見效。(金匱玉函)

②肥猪肉煮汁頻洗。(易簡方)

③猪肝煮熟削如挺鑽孔數十納陰中。良久取出內有蟲另易一挺蟲出盡愈。(龔姓醫鑑)

【婦人陰蠱】桃仁一錢雄黃苦參青柏子黃連各二錢半研末生艾汁丸小指大納陰中。(廣利方)

②杏仁燒存性研爛綿裹納入。(本事方)

③鼈甲炙五錢甘草乾漆各三錢生地川芎黃芩當歸各二錢煎湯頻洗極驗。(聖濟總錄)

④婦人陰中有蟲癢且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少氣思美食用一尺長鯉魚去頭肉取骨搗末熬黃黑以猪脂和絹袋盛納陰中抵痛處。(袖珍方)

【婦人陰爛】婦人陰戶臭爛熟乳香冰片珍珠末象牙兒茶各三分搽面粉一兩服鵝黃色牆上白蝶螭殼煨淨

末一兩共研細末先用米泔水煎入雄黃三錢淋洗患處然後上藥效。(永類鈴方)

②牡蠣煨滑石飛各三錢陳蚌殼煨二錢人中白煨一錢龍骨煨錢半冰片二分共研末搽之。(奇效良方)

【婦人陰冷】五味子四兩為末漿水丸如豆大頻納陰中取效。(近效方)

②乾薑牡蠣各一兩為末火酒調稠搽兩手上抹兩乳。(鬼遺方)

③川椒吳茱萸為末煉蜜丸彈子大綿裹納陰中。(醫餘錄)

④母丁香末紗囊盛如指大納陰中。(普濟方)

【婦人陰寬】肥兒子浸去黑皮用其白肉加白芨五倍子蛇牀子石榴皮甘松山茶龍骨煎濃湯日日熏洗寬而冷者加石硫黃煎。(聖濟總錄)

②蛇牀子研末綿裹納陰中立效。(醫鑑)

③青布燒灰血餘等分研敷之愈。(本草綱目)

④女人交接陽物違理及他物所傷致血流滿釜底墨斷胡盧塗藥納之。(時珍本草)

⑤桂心伏龍膽各二分為末酒服一匙。(近效方)

【女童陰傷出血】女童交接陽道違理血出不止燒髮並青布末為粉塗。(三因方)

②赤石脂末搽之。(昏效方)

【婦人陰出肉線】陰道出肉綫尺許動之痛欲絕先服失笑散數服次以帶皮薑三斤研爛入清油二斤煎乾為度用絹兜起肉線於水道邊煎薑熏之冷則斂自縮入綫斷不治。(便民圖纂)

【婦人陰癩】須隨證之左右取穿山甲

之左右邊者炒為末酒下二錢（體仁彙編）

【婦人交腸】大便由前陰而出證名交腸得之大怒大飽氣火錯亂升降失常清濁混淆水滓不按常道而行明礬七分。敲小塊。腐衣五層包。紫淡鹽湯送下（吳都堂傳）

②服五苓散即效（永類鈴方）

【女子初生無陰】女子初生前陰膜乾如鼓雖有小孔通溺礙於人道名曰鼓女又名實女幼時用鉛作錠日經之久久自開無異常人（本草綱目）

②以金刀或銀刀割開外膜即愈（本事方）

葉天士醫書傑作

◀ 神州醫藥編輯社出版 ▶

重編 葉天士醫案

全四冊
價洋六角

葉天士之治溫熱症大半得力於河間其治勞怯症則得力於葛可久之十藥神書故論證處方如庖丁解牛無不中窾神乎技矣而臨證指南等書無微不堪卒讀此非葉之過編者之過也本書乃名醫編以自課者無案不精無方不當誠葉氏之功臣也

葉天士女科醫案

全二冊
價洋四角

女科首重衝任葉先生女科各案其論奇經八脈可為既詳且盡而其處方治症靈機活潑見手打手與世之以四物一湯為治婦女不祧之祖者相去吳甯霄壤世之以王海藏娠妊六合湯為鴻中秘寶者正苦不讀葉天士書耳

葉天士幼科醫案

全二冊
價洋四角

葉天士為清初名家人盡知之葉天士為幼科聖手人不知之蓋其名為大方所掩也茲編皆先生幼科得意之作議論透闢處方精確洵活幼之金針醫師之秘笈也

葉天士手集秘方

全一冊
價洋六角

秘方禁方也用藥不多著效神異然不經名醫手集其方雖秘效驗與否尚在得半之道本書為初清名醫葉天士所手集書中各方均係葉氏屢用屢驗者為秘方書中最善之本

◀ 上海廣文書局發行 ▶

第四編 產科門

一 胎前諸證單方

【孕婦安胎】木賊去節。川芎各等分。為末。每服三錢。水一盞。入金銀花一錢煎服。(聖濟總錄)

【安胎視月數連殼桂圓】一月一枚。兩月二枚。以至十枚。加紫蘇少許煎服。每月服七次。(普濟方)

【阿膠炒熟艾葉各二兩。葱白一升。水四升。煮一升。分服。(本草綱目)】

【頭二鬢繭黃。陰陽瓦煨微焦。研細。每月用龍眼湯下三錢。(本事方)】

【南瓜蒂煨研。糯米湯下。(嬰寧心要)】

【香附子炒為末。濃煎紫蘇湯服一二錢。或加砂仁。(良方集要)】

【井底泥和入竈心土。數臍下。或加青黛。(三因方)】

【硃砂末一錢。和雞子白三枚。攪勻頓服。死即出。未死即安。(資生集)】

【安胎清熱】條芩。白朮等分。炒為末。米飲和。丸梧子大。每服五十九丸。白湯下。或加神麩亦佳。(丹溪纂要)

【孕婦鼻血】用白茅花濃煎汁服。(醫學入門)

【孕婦嘔吐】台黨。砂仁炒研。甘草各一錢。白朮。香附。童便炒。真高梅。陳皮各錢半。薑引。水煎。食後服。(本草拾遺)

【香附。藿香。甘草各一錢。為末。每服二錢。入鹽少許。沸湯服之。(聖惠方)】

【竹茹三錢。陳皮一錢。煎服。(青囊雜要)】

【孕婦吞酸】台黨。白朮。半夏。陳皮。茯苓。炙草。枳實。炒神麩。炒砂仁。炒各五分。薑引。水煎。食後服。(寇氏衍義)

【孕婦惡阻】香附子二兩。藿香。葉。甘草各二錢。為末。每服二錢。沸湯入鹽調下。(聖惠方)

【川連三分。蘇葉二分。煎湯呷。(聖惠方)】

【孕婦口渴】用歸身。白芍。川芎。生地。熟地。川柏各一錢。水煎服。(熊氏補遺)

【孕婦吐衄】馬勃研細末。米飲下一錢。(三因方)

【胎上衝心】蘿蔔或根。煮濃汁飲。即下而安。(食療本草)

【吳茱萸敷脚心。胎安。即洗去為要。(婦人明理論)】

【取蒲筍或根亦可。濃煮汁飲之。即下其胎亦安。(本草綱目)】

【好醬油開水調服。立效。(食療本草)】

【孕婦心痛】麻子仁一合。水二盞。煎六分。去滓服。(聖惠方)

【大紅棗十四個。燒焦為末。以童便服之。(梅師方)】

第四編 產科門 胎前諸證單方

③鹽燒赤酒服一撮。(晉殷產寶)

④用熟艾如拳大煮汁頻服。(醫學入門)

⑤人參乾薑炮等分為末以生地黃汁和丸梧子大每服五十九米飲下。(和劑局方)

⑥青竹茹一升酒二升煮取一升去渣溫服。(本事方)

⑦孕婦腹痛月分未足孕婦腹痛如欲產之狀用知母二兩為末蜜丸梧子大每次粥飲湯下二十九。(陳延之小品方)

⑧大紅棗十四枚燒焦為末以小便調服。(梅師方)

⑨胎動腹痛或下黃汁如漆如豆汁者野苧根金銀花根各五錢水酒相半煎服。(醫學入門)

⑩鹿角膠炒成珠作末米飲調下二錢。(醫學入門)

⑪好銀者取水著葱油食之佳。(醫學)

入門)

⑥用苧根如足指大者一尺剉碎以水五升煮取三升去渣服或加生薑五片亦可。(醫學入門)

⑦苧根二兩剉銀石器酒水相半煎服效。(聖惠方)

⑧乾荷葉一張炙研糯米泔一杯調服。(經驗方)

⑨孕婦腰痛黑料豆二合炒焦熟白酒一大碗煎至七分空心服。(達生編)

⑩鹿角長六寸燒令赤酒中淬再燒再淬以角碎為度取所淬酒飲之。(醫學入門)

⑪當歸川芎各三錢切如米銀器中煎三四沸入青茹竹一錢再煎三四沸去渣入阿膠錢半烱服。(醫鑑)

⑫厚杜仲四兩切片白糯米炒斷絲川續斷肉二兩酒拌炒為末山藥糊丸梧子大每服八九十九米湯空心下戒惱怒忌酒醋猪肝發火等物。(時珍本草)

珍本草)

⑬孕婦病熱未放荷葉焙乾五錢蚌粉二錢半新汲水入蜜調塗腹上佳。(勝金方)

⑭孕婦病寒伏龍肝研水調塗臍方寸乾再上可不損胎。(婦人良方)

⑮孕婦瘡疾先因傷寒而變成者用高良薑三錢剉以猪膽汁浸一夜東壁土炒黑去土以肥棗肉十五枚同焙為末每用三錢水一盞煎熟將發時服之神效。(永類鈔方)

⑯夜明砂末三錢空心溫酒服。(經驗秘方)

⑰孕婦痢疾雞蛋一個破孔如指頂大以銀簪攪勻加入黃丹五分用紙封口在飯上蒸熟食之即愈神效非常。(儒門事親)

⑱梔子燒研空心熱酒服一匙甚者不過五服。(勝金方)

⑲孕婦血痢阿膠二兩酒一升半煮一

升頓服。(本草綱目)

孕婦霍亂紫蘇條芩白朮各錢半。霍

香葉陳皮甘草各一錢砂仁炒五分

薑棗引水煎服。(薛己醫按)

②井底泥傅心下及丹田良。(集驗方)

孕婦咳嗽貝母去心麩炒黃為末沙

糖和丸芡實大每含嚥二十九神效

(梅師方)

孕婦臍燥此即自悲自哭自笑之症也

紅棗燒末米飲調下良。(奇效良方)

孕婦子嗽台黨白朮茯苓蘇葉阿膠

桔梗各等分水煎食後服。(集元方)

孕婦子懸孕婦五六月後胎氣不和

上凌心腹脹滿疼痛謂之子懸用紫

蘇陳皮腹皮川芎白芍歸身各一錢

路黨炙草各五分薑五片葱白七寸

水煎空心服。(必效方)

②香附炒研紫蘇湯下一二錢。(本事

方)

孕婦子煩孕婦心驚膽怯終日煩悶

不安者謂之子煩用黨參茯苓麥冬

黃芩知母生地炙草各一錢竹茹一

大團水煎空心服。(即真人方)

②竹瀝飲一升立愈。(產寶)

③黃連末每服一錢粥飲下或酒蒸黃

連丸亦妙。(本草綱目)

孕婦子癰孕婦忽然眩暈卒倒口噤

不能言狀若中風須臾即醒醒而復

發謂之子癰用縮砂和皮炒黑熟酒

調下二錢不飲酒者用米飲湯送下

(梅師方)

孕婦子腫孕婦面目身體四肢浮腫

者此胎泛濫謂之子腫用大腹皮生

薑皮桑白皮白茯苓皮白朮紫蘇各

味等分棗引去核煎水另用木香磨

濃汁三匙沖服。(產寶)

②葵子茯苓各三兩為糝飲食一匙日

三服小便利順則愈。(金匱要略)

③冬瓜湯恣飲或用冬瓜皮煎湯服(

普濟方)

孕婦子滿孕婦至七八個月胎已長

成肚大腹滿逼迫子戶坐卧不安謂

之子滿用白朮黃芩蘇葉枳殼大腹

皮各錢半砂仁五分連殼略研炙草

三分薑引水煎空心服。(斗門方)

孕婦子淋一用桑螵蛸為末每服二

錢空心米飲湯下。(生生編)

②不得小便滑石末水和泥臍下二寸

(外臺秘要)

③地膚子三兩細切水四升煮取二升

半去滓分三服日三次食盡(醫藥

入門)

④蕪菁子末水服一錢日二服(勝金

方)

孕婦熱淋車前子五兩葵根切一升

以水五升煎取一升半分三服以利

為度(梅師方)

孕婦子鳴令孕婦作男子拜狀或以

豆撒地令孕婦檢之則止(胡氏濟

陰方)

孕婦感寒。鯉魚一尾。燒末。酒服一匙。

令汗出即愈。(子母秘錄)

孕婦行經。亦小豆末。酒服一匙。日二度。(千金方)

度(千金方)

孕婦尿閉。杏仁一味。去皮尖。搗丸。如菜豆大。燈心湯吞七丸。立利。(醫學入門)

葱白細切。和鹽炒熱。熨臍下。立通。(醫學入門)

急令產婆香油塗手。自產門入。托起其胞。則尿出如注。脹急即解。(丹溪纂要)

孕婦遺尿。益智仁為末。米飲下。亦效。(醫學入門)

孕婦尿血。豆醬一大碗。熬乾。生地黃二兩。為末。每服一錢。米湯飲下。(普濟方)

阿膠炒黃為末。食前粥飲下。二錢。(時珍本草)

孕婦胎動。朱砂末一錢。和雞子白三枚。攪勻。頓服。胎死即出。未死即安。(普濟方)

生地黃搗汁。煎沸。入雞子白一枚。攪服。(聖惠方)

胎痛欲產。萹蒲根搗汁一二升。服之。(千金方)

蒲黃二錢。并華水調服。(集一方)

以全蛇蛻一條。絹袋盛。遠腰繫之。(千金方)

上等銀一斤。茅根二兩。去黑皮。以水九升。煮銀五升。入清酒一升。同煎。茅根取三升。分三服。立安。(醫學入門)

冬麻子一升。杵熬香。水二升。煮汁分服。(心鏡)

胎動下血。百草霜二錢。椶灰一錢。伏龍肝五錢。為末。每服一二錢。白湯入酒及童便調下。其胎雖死亦效。(葦峯雜興)

葱白煮濃汁飲之。胎未死即安。已死即出。未效再服。(深師方)

萹蒲根搗汁一二升。服之。(千金方)

大蔥白二十莖。濃煮汁飲之。胎未死即安。已死即出。神效。(千金方)

妊娠無故下血不止。阿膠三兩。炙搗末。酒一升半。煎令消。一服愈。(醫學入門)

阿膠二兩。搗末。生地半斤。搗取汁。以清酒三升。絞汁。分三服。(醫學入門)

桃樹上乾不落。桃子燒灰。和水服。瘥。(醫學入門)

蓮房燒研。麩糊。丸梧子大。每服百丸。湯酒任下。日二服。(集驗方)

黃門膠二兩。酒煮化。頓服之。(肘后方)

雞子二枚。打散。粥湯攪熟。服。(時珍本草)

生地汁一升。酒四合。煮三合。五沸。服。不治再服。(胎產須知)

家雞翎燒灰。細研。溫酒調下。二錢。

孕婦多愁。以致衝任奇經脈絡損傷。

至於下血。別無病狀者。生鹿角屑。當歸各五錢。水煎服。(身經通考)

⑤胎動已見黃水。乾荷蒂一枚。炙研。糯米泔汁一盞。調下。(三因方)

【毒藥傷胎】腹痛口噤。手強頭低。自汗。似乎中風者。生白扁豆末。米飲服一匙。或濃煎汁亦可。(食療本草)

【漏胎】炒熟蠶殼磨末。每服三四錢。加沙糖少許調服。(生生編)

②五倍子末。酒服二錢。效。(易簡方)

【臨月滑胎】牽牛子一兩。赤土少許。研末。覺胎轉痛時。白榆皮煎湯下一錢。(集簡方)

【墮胎血溢】墨三兩。火燒醋淬三次。出火毒。沒藥一兩。為末。每服二錢。醋湯下。(普濟方)

【腹中兒哭】黃連煎濃汁。母常呷之。妙。(熊氏補遺)

【因驚胎動】黃連末。酒服一小匙。日三服。(子母秘錄)

【跌撲胎動】砂仁不拘多少。放熨斗內。慢火炒熱透。去筋膜為末。每服二錢。熱酒下。最為神效。(胎產須知)

②砂仁皮炒令熱透。為末一錢。或酒或鹽湯下。(醫學入門)

【房事胎動】因絕者。竹瀝頻頻飲一升。愈。並治子煩。(心鏡)

【滑胎易產】車前子為末。酒服一匙。不飲酒者水調服。(婦人良方)

②弓弩弦燒末。酒服二錢。(續十全方)

【孕癰】用洪州烏藥。軟白香辣者。五錢。水一盞。牛皮膠一片。同煎至七分。溫服。(醫學準繩)

②薏苡仁。煮汁飲之。(醫學準繩)

【婦人鬼胎】婦人虛羸。有鬼胎癥瘕。經候不通。芫花根三兩。剉炒黃為末。每服一錢。桃仁煎湯調下。當利出惡物而愈。(聖惠方)

●二 臨產諸證單方

【漏胎難產】用清麻油半兩。好蜜一兩。

同煎數十沸。溫服。胎滿即下。他藥無益。以此助血為效。(胎產須知)

③五倍子末。酒服二錢。神效。(朱氏集驗方)

③黃葵花焙。研末。熱湯調服二錢。(陳日華經驗方)

【婦人難產】數日不出。產婦欲死。桃仁一個。劈開。一片書可字。一片書出字。吞下。即生。(刪繁方)

②以其夫之袴帶。剪寸許。剪湯飲。即下。(墨娥小錄)

③芒硝末二錢。童便溫服。效驗如神。(信效方)

④墨一寸。末之。水服。立瘥。(肘後方)

⑤蒲黃。地龍。洗焙。陳橘皮。等分為末。另收。臨時各炒一錢。新汲水調服。立產。(唐慎微方)

⑥車缸膏。畫兒脚底。即生。(開寶本草)

⑦香油。白蜜。小便和勻。各半盞。調益母草末服。即下。(本草綱目)

八難產五六日不得分娩。疲困虛乏。用光明水膠二兩。微火焙。好酒一斤半煎滾。入膠。候烱。再入新雞子一枚。鹽一錢。攪勻。放溫。令產母坐椅上。伸腰大口作二次服。覺小腹重。即生。(醫學準繩)

九取本夫棍帶五寸。燒存性。酒調服下。(醫學準繩)

十雞子三枚。破。入醋攪服。立產。此方治難產。兼治包衣不下。(醫學準繩)

十一魚膠五寸。燒存性。為末。溫酒服。(聖惠方)

十二麝香一錢。水研服。立下。(本草綱目)

十三鼈甲燒存性。研末。酒服一錢。立出。(梅師方)

十四蜂蜜。真麻油各半碗。煎減半。服。立下。(海上方)

十五用鐵杵。或鐵秤錘。或鐵斧。燒赤。淬酒服之。自下。(本草綱目)

十六蛇蛻泡水。浴產門。自易。(寶鑑)

取土蜂巢水。泡湯飲之。取時。逢單是男胎。逢雙是女胎。神效不可思議。(婦人良方)

大牛糞中大豆一粒。劈作兩片。一書父字。一書子字。仍合住。水吞之。立產。(產寶)

尤蒺藜子。貝母各四兩。為末。米湯服三錢。少頃不下。再服。(梅師方)

手雙頭蓮一名催生草。左手把之。即生。(集驗方)

至白芷五錢。水煎服之。(經驗方)

至臘月兔血。以蒸餅染之。紙裹。陰乾。為末。每服二錢。乳香湯下。(指迷方)

至用乳香。以五月五日午時。令一人在壁內。捧乳鉢。一童子。在壁外。以筆管自壁縫中。逐粒遞過。入鉢內。研細。水丸。芡子大。每服一丸。無灰酒下。(經驗方)

至用明乳香一豆大。為末。新汲水一盞。入醋少許。令產婦兩手捉石燕。念慮

藥三遍。乃飲之。略行數步。即下。(聖惠方)

至赤小豆生吞七粒。佳。(本草別說)

至天累日氣乏。不能生。兼惡露出盡。胞乾。終不產者。用赤小豆一升。以水九升。煮取汁。入炙過黃阿膠一兩。同煎。少時。一服五合。不過三四服。即生。(本草別說)

至取槐樹東引枝。令孕婦手抱之。即易生。(子母秘錄)

至兔角子二枚。吞之。(千金方)

至龜甲燒末。酒服一錢。(本草綱目)

至桂末加麝香少許。酒下。比之水銀等藥。不損人。(何氏方)

至素心蘭花。陰乾。湯泡服。(醫學正傳)

至蟬蛻燒灰。水調服一錢。即下。(三因方)

至薺菜子研末。酒調下十五粒。

至兔毫敗筆頭一個。燒灰。生藕汁一盞。調服。立產。(本事方)

陳麥稈一兩。露天者尤妙。洗淨。剪寸段。煎湯服。極效。(本草綱目)

魚鱗五錢。煨研酒下。(岷樓神書)

血虛難產者。用當歸一兩半。川芎五錢。為末。以黑豆炒焦。入流水。童便各一盞。煎減半。調服。(三因方)

難產日久。漿水下多。胞乾。兒不得下。香油白蜜各一椀。火上煎微沸。調滑石末一兩。攪服之外。以油蜜塗母臍腹上。(普濟方)

過月難產。用舊絹篩羅底一個。捲筒燒碗內。白湯下。即產。(勝金方)

經日不生者。雲母粉半兩。溫酒調服。入口即產。不順者即順。萬不失。此方已救三十五人。(積德堂方)

胎澀不下。用鮮猪肉三斤。煎清湯。吹去浮油。恣飲即產。(三因方)

生牛膝一兩。酒浸。杵爛。龍眼肉六兩。煎濃汁。沖入酒內服之。即產。(本事方)

春日採取蘭花。密貯。勿見風。遇難產時。煎湯服之。胎立下。(聖濟總錄)

蓖麻子七粒。去殼。搗為泥。勻分二餅。貼產婦左右足心。不一時。胎即下。神效。(葛氏方)

陳蓮花一瓣。書一人字。再取桃仁一枚。書可出二字。即用蓮花瓣包之。令產婦吞下。須臾即出。(勝金方)

橫生逆產。婦人舊頭繩一條。燒灰。加入參一兩。服。自然順流而下。實有不可思議之妙。(經驗廣集)

鹽摩產婦腹。並塗兒足底。仍急爪搔之。立順。(千金方)

兔絲子末。酒服二錢。(聖惠方)

芒硝末二錢。童便溫服。無不效者。(信效方)

黑豆一大合。炒熟。水與童便合煎服。神效。(本草綱目)

兒脚先出者。取其父名書兒足下。即順生。(本草綱目)

蛇蛻炒焦為末。向東酒服一錢。即順。(本草拾遺)

用鹽泥將蛇蛻固煨。研二錢。榆白湯服。(博救方)

伏龍肝末三錢。水調下。(博救方)

用竈中心對鍋底土。研細。每服一錢。酒調下。仍搭母臍中。(本草綱目)

真丹塗兒足下。即順。(本草綱目)

用雜草燒鑊鋪。白芷等分為末。每服三錢。童便米醋各半。和服。見效。(救急方)

取布鍼二七枚。燒赤。淬酒七遍。服之。(本草綱目)

人參末。乳香末。各一錢。丹砂末五分。研勻。和雞子白一枚。入生薑自然汁三匙。和勻。冷服。即母子俱安。神效。(本草綱目)

當歸末。酒服一錢。或紫蘇湯調服。亦可。(子母秘錄)

當歸三兩。芎藭一兩。為末。先以大黑

豆炒焦。入流水一盞。童便一盞。同煎至一盞。分為二服。未效。再服。(本草綱目)

以手中指取釜下墨。交畫兒足下。即順。(千金方)

車前子為末。酒服三錢。橫產便順。(子母秘錄)

重陽日取高粱根。名五爪龍。陰乾。燒存性。研末。酒服二錢。即下。(本草綱目)

臨時細嚼滇南馬櫛榔數枚。第一汲井水送下。須臾立產。再以四枚去殼。兩手各握二枚。惡水自下。(本草綱目)

手足先出者。以鹽半分。多則恐上衝心。塗兒手心或足心。仍抹油輕輕送入。推上扶正。待兒身轉。即順矣。(勝金方)

葵花為末。酒服一匙。(醫學正傳)

小麥赤豆。煮濃汁飲。(千金方)

益母草一兩。酒煎濃汁。和童便一大盞服。(本草萬方鍼線)

用黃標紙。硃書北斗紫英夫人在此。貼產婦帳上。即生。如移時不生。可將黃標紙揭下。貼產婦背。無不產者。候胎兒及胞衣下後。須速將該紙焚化。并另備香燭謝神。不可遲緩。(楊氏家藏方)

盤腸生產。婦人娩時腸出。乾不收上。俗名盤腸生。以磨刀水潤腸。煎好磁石湯一杯。溫服。自然收上。(扁鵲方)

半夏末。頻搗鼻中。即上。(婦人良方)

麻油潤火紙。點火吹滅。以煙熏鼻。立效。(醫學準繩)

濃煎黃蘗湯。浸其腸。(勝金方)

死胎不下。清麻油和蜜等分。入湯。頓服。(普濟方)

硝砂當歸各半兩。為末。分作二服。溫酒調下。(瑞竹堂方)

艾葉一雞子大。酒四升。煮二升。分二服。(肘後方)

苦蘆。燒存性。研末。每服一錢。空心熱酒下。(海上方)

子死腹中。月數未足。母欲昏絕者。用大黑豆三升。以醋煮濃汁。頓服。立出。(本草綱目)

百草霜二錢。椀灰一錢。伏龍肝五錢。為末。每服一二錢。白湯入酒及童便調下。(雜興方)

猪脂。白蜜各一升。醇酒二升。合煎。取二升。分溫兩服。即下。(奇效良方)

真珠末二兩。研末。苦酒服。(千金方)

取蟻封土炒三升。囊盛。榻心下。自出。(陳藏器方)

朴硝細末半兩。童便調服。即效。煇硝亦可。臨產兩手各把石燕一枚。立驗。(本草綱目)

芫蔚搗汁一小盞。和酒一合。溫服。(本草綱目)

刺羊血熱飲一小盞。極效。(聖惠方)

①黃葵花焙研末。紅花酒下二錢。(陳日華經驗方)

②蓖麻子二枚。巴豆一粒。麝香一分。研貼臍中。并足心。但勿用之過早。(集簡方)

③朱砂一兩。水煮數沸。為末。酒服。立出。(傳救方)

④雞子黃一個。薑汁一合。和服。當下。(本草綱目)

⑤榆白皮煮汁。服二升。(子母秘錄)

⑥瞿麥煮濃汁服之。(千金方)

⑦新汲水磨京墨服之。(普濟方)

⑧孕婦因患熱病。致胎死腹中者。紅花酒煮汁。飲二三盞。(熊氏補遺)

⑨烏雞一隻。去毛。以水三升。煮二升。去雞用帛蘸汁摩臍下。自出。(婦人良方)

⑩三家雞卵各一枚。三家鹽各二撮。三家水各一升。同煮。令婦飲之。仍探口令嘔。即下。(千金方)

⑪生半夏白欬等分為末。水丸梧子大。榆白皮煎湯。下五十九。(本草綱目)

⑫伏龍肝一兩。研細。甘草湯調服。(集成方)

⑬胞衣不下。用荷葉一全張。煎湯服。立刻即下。若煎時荷葉扯成幾塊。則胞衣亦成幾塊。下務使產婦切勿驚慌。此方極有奇驗。(婦人經驗方)

⑭以本婦視覆井上。或所着衣服籠於窻上。自然而下。(千金方)

⑮腹滿則殺人。速以水入醋少許。噴面神效。(聖惠方)

⑯窻下土一寸。醋調納臍中。續服甘草湯三四合。(答殷產寶)

⑰括蕪實一個。取子細研。以酒與童便各半盞。煎七分。溫服。無實用。根亦可。(婦人良方)

⑱真珠一兩。研末。苦酒服。(千金方)

⑲取本婦手足爪甲燒灰。酒服。即令有力。婦人抱起。將竹筒於胃前趕下。(

聖惠方)

⑳蛇蛻炒焦。為末。向東酒服一錢。即下。(本草綱目)

㉑莞蔚搗汁一小盞。和酒一合。溫服。(本草綱目)

㉒水煮弓弩弦。飲汁五合。或燒灰。酒服。(千金方)

㉓刺羊血熱飲一小盞。極效。(聖惠方)

㉔蒺藜子。貝母各四兩。為末。米湯服三錢。少頃。不再服。(梅師方)

㉕蒲黃二錢。井水調服之。(集驗方)

㉖胞衣不下。惡血衝心。用五靈脂半生半炒。研末。每服二錢。溫酒下。(產寶方)

㉗用三家雞卵各一枚。三家鹽各二撮。三家水各一升。同煮。令婦飲之。仍探口令嘔。即下。(千金方)

㉘好墨。溫酒服二錢。(肘後方)

㉙荷葉。炒香為末。每服一錢。沸湯。或童便調下。或燒灰。或煎汁。皆可。(肘後

方)

① 生地黃汁一升。苦酒三合。相和。煖服。

(必效方)

② 鹿角屑三分。為末。薑湯調下。(產乳)

③ 豬脂一兩。水一盞。煎五七沸。服之。當下。(聖惠方)

④ 葱白煎濃湯。熏洗下部。(三因方)

⑤ 用赤小豆。男七枚。女二七枚。東流水吞之。(救急方)

⑥ 草紙燒煙熏母鼻。效。(本事方)

⑦ 胡麻生搗。榨取油。飲之。即下。(醫學正傳)

⑧ 大豆半升。醇酒三升。煮一升半。分三服。(產書)

⑨ 螻蛄一枚。水煮二十沸。灌入喉。即出。(延年方)

⑩ 牛膝八兩。葵子一合。水九升。煎三升。分三服。(延年方)

⑪ 雞子一枚。取清吞之。(集元方)

⑫ 以本婦褲覆井上。或以所著衣籠竈

上。俱勿令產母知之。立下。(千金方)

⑬ 團圓雞頭葉一張。煎湯服。(勝金方)

⑭ 童便一升。生薑葱白各三錢。煎數沸。熱服。(集元方)

⑮ 病欲下胎。牛膝一握。搗。以無灰酒一盞。煎七分。空心服。仍以獨根土牛膝塗麝香。插入牝戶中。胎即去。(婦人良方)

⑯ 生附子為末。醇酒和塗右足心。胎下。即去之。(集元方)

⑰ 蓖麻兩枚。巴豆一枚。麝香一分。研貼臍中。并足心。胎下速去之。(集簡方)

⑱ 榆白皮煮汁服二升。(子母秘錄)

⑲ 催生易產。催生落胞。并產後惡血不下。兔頭骨和毛髓。燒為灰。作末。酒下一錢。妙。(食療本草)

⑳ 取赤馬皮鋪之。令產母坐其上。則催生易產。(得效方)

㉑ 海馬兩手各把一枚。即驗。(本草綱目)

㉒ 鳳仙子二錢。研末。水服。勿近牙。外以

蓖麻子。隨年數搗塗足心下。(集簡方)

㉓ 益母草搗汁七合。煎減半。頓服。立產。無新者。以乾者一大握。水七合煎服。(獨行方)

㉔ 蒲黃。地龍。洗焙。陳橘皮。等分為末。另收。臨時各炒一錢。新汲水調服。立產。此方常用。甚妙。(唐慎微方)

㉕ 芫花根剝皮。以綿裹。點麝香。套入陰穴三寸。即下。(攝生妙用方)

㉖ 馬錢子研膏。納入牝戶三四寸。(集簡方)

㉗ 大麻根。以水濃煎取汁。頓服。立產。胞衣不下。亦妙。(經驗方)

㉘ 取麥蘖一兩。水煎服。即下。(經驗方)

㉙ 黃蜀葵子四十九粒。研爛。溫酒服之。良久。即產。(陳日華經驗方)

㉚ 黃蜀葵子焙三錢。第一汲井水服。無子。用根煎汁服。(經驗方)

㉛ 臘月兔腦髓一個。攤紙上。夾勻陰乾。

剪作符字。於面上書生字一個。候母痛極時。用釵股夾定。燈上燒灰。煎丁香酒調下。(博濟方)

④ 羚羊角一枚。刮夫末。酒服一錢。(產寶)

⑤ 榆皮焙為末。臨月日三服一錢。令產極易。(本草別說)

⑥ 車前子四錢。冬葵子三錢。炒枳殼二錢。白芷一錢。多日不下者。可煎服之。

(子母秘錄)

【臨產不運】第一汲井水。服半升。臨產即不作運。(千金方)

【下鬼胎】取神麴末二錢。和水服。或濃煎取汁服。(千金方)

③ 產後諸證單方

【產後血運】紅藥子一兩。頭紅花一錢。

水二盞。婦人油釵二隻。同煎一盞。服大小便俱利。血自下。(經驗方)

② 以丈夫小便。研濃墨一升。服下。可保無恙。(子母秘錄)

③ 人參一兩。紫蘇半兩。以童便酒水三合煎方。(醫方摘要)

④ 夏枯草搗絞汁。服一錢。大妙。(徐氏家傳方)

⑤ 韭菜切斷。置於瓶內。沃以熱醋。令氣入鼻。即醒。(丹溪心法)

⑥ 產後血運。全不省人事。極危殆者。用半夏為末。丸如大豆。納鼻中。即甦。(醫學準繩)

⑦ 用松煙墨二錢。燒通紅。窖滅為末。醋湯或溫酒調服半錢。(醫學準繩)

⑧ 產後血運。狂言失志。用紫緋一兩。為末。酒服二錢。(家傳方)

⑨ 蘇木一兩。剉。酒水煎服。(本草綱目)

⑩ 緋衣煮汁飲之。亦效。(本草綱目)

⑪ 產後狂言血運。煩渴不止者。生薑香附子。去毛為末。每服二錢。薑棗水煎服。(集驗方)

⑫ 產後血運。心氣欲絕。益母草研汁。服一盞。絕妙。(子母秘錄)

⑬ 產後血運。築心眼倒。風縮欲死者。取乾荊芥穗。搗篩末。每用二錢。和童便一盞。調勻。熱服。立效。口噤者。挑齒灌口。閉者。灌鼻中。皆效。(本草綱目)

⑭ 接骨草一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之。亦瘥。(易簡方)

⑮ 黃蘗子。生地黃。等分為末。每服三錢。薑七片。酒水各半盞。童便半盞。煎七分。溫服。即甦。(聖惠方)

⑯ 鹿角一段。燒存性。出火毒。為末。酒調灌下。即甦。(摘要)

⑰ 產後血運。不知人。及狂語。用血竭一兩。研末。每服二錢。溫酒調下。(本草綱目)

⑱ 神麴炒為末。水服一錢。(千金方)

⑲ 產後諸疾。血運心悶。煩熱厭厭。氣欲絕。心頭硬。乍寒乍熱。續斷皮一握。水三升。煎二升。分三服。如人行三里。再服。無所忌。此藥救產後垂死。(子母秘錄)

①產後血運熱重便澀 (本事方)

②鯨膠燒灰酒和童便調服 (急救方)

③紫紙三十張燒灰清酒半升和服效 (熊氏補遺)

(熊氏補遺)

④鐵器燒紅更迭淬醋中就病人之鼻

熏之 (聖惠方)

⑤兒出即暈迷不語急用銀針刺眉心

得血即生再行服藥 (急救方)

⑥產後血滯速用生薑五兩水煮服 (本草別說)

(婦人良方)

⑦生薑五兩水八升煮取三升分三服

(婦人良方)

⑧產後血衝心胃喘滿命在須臾用血

竭沒藥各一錢研細末童便和酒調

服 (集要)

⑨產後血悶清酒一升和生地黃汁煎

服 (集驗方)

⑩赤小豆生研東流水服一錢不瘥更

服 (肘後方)

⑪生藕汁三升飲之 (熊氏補遺)

⑫藕汁生地黃汁童便等分煎服 (熊氏補遺)

⑬桂心為末狗膽汁九艾子大每熱酒

服一丸 (聖惠方)

⑭慈姑搗汁服一升此方亦下石淋 (婦人良方)

⑮產後餘血衝心煩悶腹痛用蒲黃不

拘多少隔紙炒每服一錢東流水煎

湯調下 (醫學準繩)

⑯陳白梅槌碎煎湯飲 (醫學準繩)

⑰產後血閉桃仁二十粒去皮尖藕一

塊水煎服 (經驗方)

⑱產後血結腹痛或因產瘦痛血氣積

聚可煮淡菜久食之 (婦人良方)

⑲益母草汁一小盞入酒一合煎服 (聖惠方)

⑳前方攪勻溫服 (聖惠方)

㉑產後血渴速服黃芩麥冬等分水煎

溫服 (楊氏家藏方)

㉒新石灰一兩黃丹半錢渴時漿水調

一錢名桃花散 (活法機要)

㉓產後血滲滲入大小腸車前草汁一

升入蜜一合和前一沸分二服 (崔氏方)

㉔產後瀉血乾艾葉半兩炙熟老生薑

半兩濃煎湯一服立愈 (食療本草)

㉕薑黃為末酒服一錢日三四服 (醫學準繩)

㉖產後血痛山查二兩濃煎汁入沙糖

少許再煎熱服 (醫學準繩)

㉗白雞冠花酒煎服之 (怪證奇方)

㉘取鯉魚鱗燒灰研酒服一錢

㉙竈中心土研末酒服二錢瀉出惡物

立效 (急救方)

㉚槐耳半兩為末酒濃煎飲之立愈 (婦人良方)

㉛產後血病菴蘭子一兩水一升童便

二盞煎飲 (集簡方)

㉜惡露不下鍋底墨煙熱酒服二錢即

下 (生生編)

②用好墨醋泮水以童便酒下炒。(醫學準繩)

③紅麴浸酒煮服。(本草綱目)

④蘇木一兩剉酒水煎服。(醫學正傳)

⑤山查煎湯調沙糖服。(三因方)

⑥生藕搗汁燉溫服。(奇效良方)

【惡露不盡】用亂髮如雞子大灰水洗垢淨燒存性末之酒調服二錢。(醫學準繩)

②鐵秤錘燒赤投五升酒中用此酒煮當歸三兩取二升去渣分溫再服。(醫學準繩)

③益母草煎湯和熱童便服。(袖珍方)

④產後穢污不盡腹滿心頭硬或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒研酒服二錢甚效。(聖惠方)

⑤續骨木二十兩剉水一斗煮三升分三服即下。(集簡方)

⑥升麻三兩清酒五升煮取二升分半再服當吐下惡物極良。(千金翼方)

⑦用竈中心土研末酒服二錢瀉出惡物立效。(急救方)

【惡露不絕】鋸截桑根取屑五指撮以醇酒服之日三服(肘後方)

②萑蒲一兩半酒二盞煎取一盞去渣分三服食前溫服之。(熊氏補遺)

③產後血攻或下血不止心悶面青身冷欲絕者新羊血一盞飲之三兩服炒。(梅師方)

【產後亡血】即崩中也貫眾狀如刺蝟者一個全用不剉只搽去毛及花莖以好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為末空心米飲湯服三錢甚效。(婦人良方)

②蓮蓬殼五個香附二兩各煨研每服二錢米飲下日二服。(陶華六書)

③醋磨松煙古墨服之。(本草綱目)

④取木耳一斤或半斤燒灰存性為末入麝香一錢煨枳殼末二錢和勻每服一錢烏梅煎湯調下即止。(丹溪纂要)

⑤蒲黃二兩水二升煎八合頓服效。(勝金方)

⑥產後血多不止烏雞子三枚醋半盞酒二盞和攪煮取汁一盞分四服(婦人良方)

⑦百草霜三錢研酒下。(三因方)

【惡血衝心】產後惡血衝心腹中成塊大黃一兩為末醋半升同熬成膏丸如梧子大以溫醋化五丸服之良久血下即愈。(千金方)

②蒲黃不拘多少隔紙炒每服一錢東流水煎湯調下。(醫學準繩)

③乾地黃末每食前熱酒服一錢連進三服。(瑞竹堂方)

④下胎或產後血氣上冲心痛欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一呷調灌即甦。(袖珍方)

⑤產後心腹脹悶或單心痛惡血不盡

荷葉炒香為末。每服一錢。沸湯或童便調下。或燒灰。或煎汁。皆可。(救急方)

方)

⑥山查一兩。炒枯。童便煎服。(產寶方)

⑦惡血入肺。發喘至欲死者。蘇木一兩。水三鍾。煎至一鍾。調人參細末五錢。服。(小品方)

⑧產後血脹。搗芭蕉根絞汁。溫服二三合。(本草綱目)

⑨產後血瘕。四物湯加桃仁。延胡索煎服。(儒門事親)

⑩產後鼻血。荆芥穗炒黑研末。用童便調服三錢。即愈。(十全博救方)

⑪取木耳一斤。或半斤。燒灰。存性。為末。入麝香末一錢。煨枳殼末二錢。和勻。每取一錢。烏梅煎湯調下。立止。(丹溪要)

⑫急取緋線一條。並產母頂心髮兩莖。緊繫產母手中指節。即止。(奇效良方)

⑬產後舌出。吐舌不收。丹砂敷之。暗擲盆盪。作墮地聲。驚之。即自收上。(朱氏集簡方)

方)

⑭產後口渴。用煉過蜜。不計多少。熱水調服。即止。(產書)

⑮紫葛三兩。水二升。煎一升。去渣。呷之。(本草綱目)

⑯雞子一枚。打破。水一盞。攪服。(陳氏經驗方)

⑰產後嘔水。韭菜一斤。取汁。入薑汁少許。和飲。遂愈。(葉氏摘玄方)

⑱產後呃逆。白荳蔻。丁香各半兩。研細。桃仁湯服一錢。少頃。再服。(乾坤生意)

⑲白朮一兩二錢。生薑一兩五錢。酒水各二升。煎一升。分三服。(本草綱目)

⑳產後氣喘。人參末一兩。蘇木二兩。水二盞。煮汁一盞。調參末服。神效。(聖惠方)

㉑胡桃肉。人參各二錢。水一盞。煎七分。

⑳頓服。(本草綱目)

㉑產後氣逆。青橘皮為末。葱白童便煎二錢服。(經驗後方)

方)

㉒產後心痛。鬱金燒存性。為末二錢。米醋一呷。調灌。即愈。(袖珍方)

㉓雞子煮酒服。即安。(備急方)

㉔桂心為末。狗膽汁丸。芡子。大每熱酒服一丸。(聖惠方)

㉕產後腹痛。因感寒起者。陳蘆艾二斤。焙乾。搗鋪臍上。以絹覆住。熨斗熨之。待口中文氣出。則寒氣亦出。腹痛自止。(楊氏經驗方)

㉖枳實錢炒。芍藥酒炒。各二錢。水一盞。煎服。亦可為末服。(聖惠方)

㉗產後腹痛。兒枕痛也。用真蒲黃研細。酒調服二錢。如燥渴者。新汲水調下。

(醫學準繩)

㉘隔年蟹殼燒灰。酒調下。(醫學準繩)

㉙產後血痲痛。取鯉魚鱗燒灰。研。酒服一錢。能破滯血。(婦人良方)

⑥產後腹痛如絞。當歸末五錢。白蜜一合。水一盞。煎一盞。分為二服。未效。再服。(肘後方)

⑦桂末服一錢。取效。(肘後方)

⑧羌活二兩。煎酒服。(必效方)

⑨兒枕痛。百藥不效者。用螃蟹一隻。燒存性。研為末。空心溫酒一盞調服。立止。生男用火臍蟹。生女用團臍蟹。(本草綱目)

⑩螃蟹搗爛。和酒服。(本草綱目)

⑪天仙藤五兩。炒焦為末。每服生薑汁。童便和細酒服。(經驗方)

⑫蒲黃三錢。米飲服。或白湯下。(梅師方)

⑬五靈脂末。神麴糊丸。白朮。陳皮湯下。(丹溪方)

⑭兒枕作痛。五靈脂慢炒研末。酒服二錢。(產寶方)

⑮產後空腹痛。蓮蓬殼三個。煎湯服。立止。(濟生方)

⑯產後腹癢。取鐵箭頭。用舊針線袋亦可。安臥席下。勿令婦知。及使他人見。(開寶本草)

⑰產後腹脹。麥芽一合。為末。和酒服。良久自通。(千金翼方)

⑱產後腰痛。敗醬當歸各八分。川芎。白芍。桂心各六分。煎。分二服。切忌食葱。(廣濟方)

⑲產後便秘。五六日不通。宜用大麥芽炒黃為末。每服三錢。沸湯調下。與粥間食。(婦人良方)

⑳產後汗多。則大便秘。難於用藥。惟麻子粥最穩。以大麻子仁。紫蘇子仁各二合。洗淨研細。再以此水研。濾取汁一盞。分二次煮粥啜之。(本事方)

㉑人參麻子仁。枳殼。麩炒為末。煉蜜丸。梧子大。每服五十九。米飲湯送下。(濟生方)

㉒葱涎調臘茶末。丸百粒。茶服。自通。不可用大黃利藥。用之必死。(本草綱目)

目)

⑳產後下痢。不拘赤白。用紫莧菜一握。切煮汁。入粳米三合。煮粥食之。立瘥。(壽親養老書)

㉑小龍牙根一握。濃煎服之。甚效。即蛇含草是也。(斗門方)

㉒蒼耳搗絞汁。溫服。半酒盞。日三四服。(聖惠方)

㉓多煮薤白食。仍以羊腎脂。同炒食之。(范汪方)

㉔產後下痢。日五六十行。用桑木裏蠶蟲糞。炒黃。急以水沃之。稀稠得所。服之。以瘥為度。(必效方)

㉕產後下痢。赤白。裏急後重。用桃膠焙乾。沈香。蒲黃炒。各等分。為末。每服二錢。食前米飲下。(婦人良方)

㉖產後下痢。赤白者。用紫莧菜一握。切煮汁。入粳米三合。煮粥食之。瘥。(本草綱目)

㉗產後痢渴久病。津液枯竭。四肢浮腫。

口古乾燥者。用冬瓜一個。外以黃土泥厚五寸。煨熟。絞汁飲。效。(古今錄驗方)

【產後遺尿】桑螵蛸炙半兩。龍骨一兩。為末。每米飲湯服二錢。(徐氏胎產方)

②猪脬猪肚各一個。糯米半升。入脬內。更以脬入肚內。同五味煮食。(醫林集要)

③白薇芍藥各一兩。為末。酒服一錢。日三服。(千金方)

④雞矢燒灰。酒服一匙。(千金方)

⑤雞窠草燒末。酒服一錢。(聖惠方)

【產後尿閉】鼠婦七枚。熬研末。酒服(千金方)

②陳皮一兩。為末。溫酒下二錢。(古今錄驗方)

③橘紅二錢。為末。空心溫酒下。(勝金方)

【產後尿不禁】桑螵蛸蒸焙四錢。龍骨

煨牡蠣煨各六錢。為末。水調三錢服。(子母秘錄)

②白薇白芍。等分為末。溫酒調下二錢。(聖惠方)

③雄雞脬脰一具。并腸洗淨。燒灰。溫酒調服二錢。(產書)

④雄尾毛燒灰。酒下一錢。日三服。(肘後方)

【產後尿血】川牛膝。水煎。頻服。(熊氏補遺)

【產後淋瀝】紫草一兩。為末。每食前。用井華水服一錢。(千金翼)

②紫荆皮五錢。半酒半水煎。溫服。(熊氏補遺)

【產後浮損】產後傷脬。終日不小便。只淋瀝不斷。用生絲黃絹一尺。白牡丹根皮末。白芨末各一錢。水二碗。煮至絹爛如錫。服之。不宜作聲。作聲無效。(婦人良方)

②黃連。狗脊。五倍子。澤蘭。枯礬。各一兩

為末。煎湯洗。乘熱輕托入。(產乳)

【產後帶下】產後帶下赤白。用羊肉二斤。香豉大蒜三兩。加酥一盞。水煮服。(千金方)

【產後乳懸】產後兩乳忽然伸長。細小如腸。直過小腸。痛不可忍。名曰乳懸。此乃瘀血上攻。危證也。用川芎當歸各一斤。水煎濃湯。不時溫服。再用二斤。逐旋燒煙。故病人面前。桌子下。令病人曲身低頭。將口鼻及病乳。常吸煙氣。未甚縮。再用一料。則瘀血消。而乳頭自復矣。若不復舊。用蓖麻子搗爛。貼頂上片時。收即洗去。(醫學入門)

【產後腸癢】以鐵線袋安所卧褥下。勿令人知。(肘後方)

【產後腸出】以大紙摺蘸香油點燈。吹滅。以煙熏產母鼻中。腸即上矣。(婦人良方)

②腸出。盛以潔淨漆器。濃煎黃芪湯浸

之腸即上。產腸不收。用油五斤。煉熟。盆盛。令婦坐盆中。約一食時。先用皂角。免去皮。研末。吹少許入鼻。作嚏立上。(斗門方)

③五靈脂。燒烟熏之。先以鹽湯洗淨。(危氏得效方)

④枳殼煎湯浸之。良久即入。(袖珍方)

⑤羌活二兩。煎酒服。(子母秘錄)

⑥檗枝取皮焙乾。一握。水五升。連根葱五根。漢椒一撮。同煎至三升。去渣。傾盆內。乘熱熏洗。冷則再熱。一服可作五次用。洗後。睡少時。忌鹽酢醬麵。發風毒物。及用心勞力等事。年深者亦治之。(婦人良方)

⑦用石蒜(即酸頭草)一把。以水三椀。煎一椀半。去渣。熏洗神效。(得效方)

⑧皂角樹皮半斤。皂角核一合。川棟樹皮半斤。石蓮子炒。去心。一合。為粗末。以水煎湯。乘熱以物圍之。坐。熏洗之。挹乾。便服。補氣丸藥。一服。仰睡。(本

草綱目

⑨五倍子末。摻之。或以五倍子白礬煎湯熏洗。(婦人良方)

⑩全蠍炒研末。口噙水。鼻中啗之。立效。(衛生寶鑑)

⑪磨刀水潤腸。煎好磁石湯一杯。溫服。(扁鵲方)

⑫酸頭草一把。以水三椀。煎一椀半。去渣熏洗神效。(得效方)

⑬半夏末。啗鼻中。取嚏。即收。(勝金方)

⑭產後陰腫。鐵爐中紫煙。羊脂。二味和勻。布裏炙。熱熨推納之。(胎產方)

⑮溫水洗軟。雄鼠糞。燒煙熏之。即入。(熊氏補遺)

⑯蠶頭五個。燒研。第一汲井水服一錢。日三服。(千金方)

⑰絹盛蛇床子。蒸熟熨之。或用蛇牀子五兩。烏梅十四個。煎水。日洗五六次。(千金方)

⑱硫黃海螵蛸各五錢。五倍子二錢半。

研敷(必效方)

①產後陰腫。桃仁燒研塗敷。其腫漸消。(延年方)

②葱白杵爛入乳香末。烘熟貼。勿洗去。(肘後方)

③蘿蔔煎湯洗效。(必效方)

④蓮蓬殼煎洗。(傳信方)

⑤產後陰翻。產後燥熱。遂成翻花。澤蘭四兩。煎湯。熏洗二三次。再入枯礬煎洗之。即安。(集簡方)

⑥產門不閉。產後陰道不閉。或陰脫出。石灰一斗。熬黃。以水二斗投之。澄清後熏洗。(肘後方)

⑦風入產戶。用尺許長鯉魚一尾。浸重便內一夜。平旦。以艾火炙熟。去皮。空心頓服。勿用鹽醋。(外臺秘要)

⑧產後之宮墮。先用淡竹根煎湯洗淨。次用五倍子。青礬為末。摻之。(集驗方)

⑨產門受傷。由兒大。或收生不妥。或天

時暑熱以致產下即腫而疼。蚌肉濕草紙包煨研末搽。(集驗方)

【產後葶勞】豬腎一對。切細片。以鹽酒拌之。先用粳米一合。葱椒煮粥。鹽醋調和。鋪於盆底。以熱粥傾於上。蓋之。煮粥食之。(濟生方)

【產後葱豉和成作臠食之】(食療本草)

【產後虛汗】小麥麩。牡蠣。等分為末。以猪肉汁調服二錢。日二服。(胡氏婦人方)

【淡竹瀝三合。煖服。須臾再服。】(晉殷產寶)

【三馬齒莧研汁三合。服。如無。以乾者煮汁。】(婦人良方)

【四猪膏薑汁白蜜各一升。酒五合煎五上五下。每服一錢。】(千金翼方)

【產後盜汗】牡蠣粉。麥麩。炒黃等分。每服一錢。用鮮肉湯下。(經驗方)

【產後自汗】當歸三錢。黃芪。白芍。藥酒

炒各二錢。生薑五片。水一盞半。煎七分。溫服。(和劑局方)

【二】人參。當歸。等分為末。用猪腰子一個。去膜。切小片。以水三升。糯米半合。葱白二莖。煮米熟。取汁一盞。入藥煎至八分。食前溫服。即愈。(永類鈴方)

【產後中風】當歸。荆芥穗。等分為末。每服二錢。水一盞。酒少許。童便少許。煎七分。灌之下咽。即有生意。神效。(聖惠方)

【二】用生地黃五兩。研汁。生薑五兩。取汁。互相浸一夕。次日各炒黃。浸汁。乾乃焙為末。每服一匙。(濟生方)

【三】用大蒜三十瓣。以水三碗。煮一碗。灌之。即甦。(子母秘錄)

【四】蓮心生為細末。未飲調下二錢。效。(醫學準繩)

【五】產後中風。血熱煩渴。以紅藍子五合。熬搗。旦日取半大匙。以水一升。煎取七合。去渣。細細嚥之。(廣利方)

【六】產後中風。口噤身直。面青。手足反張。竹瀝飲一二升。即甦。(梅師方)

【產後發熱】台黨。歸身。熟地。肉桂。酒芍。各錢半。麥冬一錢。水二盞。先以粳米一合。淡竹葉十片。煎至一鍾。去米。入藥。並棗三枚。煎七分。溫服。熱甚。加炒乾薑一錢。(本草萬方針錄)

【二】生藕汁一升。合生地汁服。(本草綱目)

【三】竹瀝飲一杯。甚妙。(丹溪纂要)

【四】松花。蒲黃。川芎。當歸。石膏。等分為末。每服二錢。水二合。紅花二捻。同煎七分。細呷。(寇氏衍義)

【五】黑豆一茶鍾。炒至煙起。再入連根葱頭五個。同炒。隨入好酒一鍾。水鍾半。煎至一鍾。溫服出汗。驗。(必效方)

【產後虛熱】用大豆三升。熬熟。至微煙出。入瓶中。以酒五升。沃口。經一日。以上服酒一升。溫覆。令少汗出。身潤。即愈。(千金方)

(二) 豆五升。酒一斗。焯之。(千金方)

【產後煩悶】生地黃汁清酒各一椀。和煎沸。分二服。(朱氏集驗方)

(三) 禹餘糧一枚。狀如酸棗者。入地埋一半。緊築。用炭一斤。煨之。濕土。卷一宿。打破。去外面石。取裏面細者。研。水淘。五七度。曬乾。再研。萬遍。用甘草湯服。二錢。一服立效。(經驗方)

(三) 羚羊角燒為末。水服一錢。(肘後方)

(四) 生藕汁三升。飲之。(熊氏補遺)

(五) 藕汁。生地黃汁。童便。等分。煎服。(熊氏補遺)

(六) 產後悶滿不能食。用赤小豆二七枚。燒研。冷水頓服。佳。(本草綱目)

(七) 產後煩悶。汗出不識人。羚羊角燒末。東流水服一錢。未愈再服。(千金翼方)

(八) 羚羊角燒末。加芍藥。枳實。等分炒研末湯服。(千金翼方)

(九) 生地黃汁。清酒各一升。相和。煎沸。分

二服。(集驗方)

【產後風虛】獨活。白鮮皮。各三兩。水三椀。煮一椀。分三服。耐酒者。入酒同煮。(小品方)

【產後血虛】產後血氣暴虛。汗出。淡竹葉煎湯服之一服。三合。須臾再服。(醫學準繩)

【產後暴虛】產後忽昏悶。不省人事。生雞卵三枚。吞之。若未醒。童便一升。飲之。又不醒。竹瀝五合。日三五次。即甦。因以半夏末。或皂角末。吹鼻中。令嚏。(婦人良方)

(二) 荊芥穗焙研。熱童便調下二錢。(必效方)

【產後浮腫】柑皮酒煎服。

【產後風癱】用大紅野薔薇子一兩。酒煎服。初起者一料即愈。如日久兩手不能提舉。以薔薇花四兩。當歸二兩。紅花一兩。酒浸五斤。不論何酒。每日酒隨量飲。兩料全愈。(指迷方)

【產後驚風】產後角弓反張是也。荊芥穗焙研。每二錢。以黑豆炒焦。乘熱入醇酒中。取酒調下。口噤者。撬開齒。灌甚。則灌鼻中。(崔氏方)

(二) 產後驚風。遍身發腫。惡露不行。糞坑內陳年磚一塊。活水洗淨。真陳酒五斤。放鉢內。炭火將磚燒透。浸酒內。提出復燒。如此三遍。其酒不過二斤。候溫。令產母服一二杯。不飲酒。用天泉亦可。(子母秘錄)

(三) 產後風痙。身強直。口目喎斜。不知人。雞子清三個。調荊芥末三錢。日二服。或一枚亦可。(千金方)

【產後搐搦】產後搐搦強直。乃風入子臟。與破傷風同。不可便作中風治。鱉膠一兩。以螺粉炒焦。去粉為末。分三服。煎蟬蛻湯下。(產寶方)

【產後冒風】乾蚱蜢數十個。瓦上焙存性。好酒調服。(救急方)

【產後風邪】心虛驚悸。用猪心一枚。豆

豉汁煮食之。(心鏡)

【產後頭痛】川芎當歸各五錢。俱不洗炒。連鬚葱頭五個。生薑五片。焙乾。水煎。食後服。(產寶)

【產後中寒】遍身冷直。口噤。不識人。白朮一兩。澤瀉一兩。生薑五錢。水一升。煎服。(本草綱目)

【川烏頭五兩】剉塊。黑豆半升。同炒半黑。以酒三升。傾鍋內。急攪。以絹濾取酒。微溫服一小盞。取汗。若口不開。拗開灌之。未效。加烏雞矢一合炒。納酒中服。以瘥為度。(小品方)

【產後不語】人參石菖蒲石蓮肉等分。每服五錢。水煎服。(婦人良方)

【生白礬末一錢】熟水下。(必效方)

【產後狂語】薑附子去毛為末。每服五錢。薑棗水煎服。(朱氏集驗方)

【紫緋一兩】為末。酒服二錢。(家傳方)

【產後顛狂】用大辰砂一二錢。研細飛過。乳汁三四茶匙。調溫。以紫頂地龍

一條。入藥滾之。刮淨。去地龍不用。入無灰酒一盞。分作三四次服。有效。(何氏方)

【產後虛弱】白羊肉一斤。切治。如常調和食之。(心鏡)

【羊脂二斤】生地黃汁一斗。薑汁五升。白蜜三升。煎如飴。溫酒服一杯。日三能令人肥白壯健。(小品方)

【羊腎一對】炮熟。細切。和五味作羹。或作粥食。良。(食療本草)

【黃母雞一隻】去毛。背上開破。入生百合三枚。白粳米半升。縫合。入五味汁中煮熟。開腹。取百合并飯和汁作羹食之。并食肉。(聖惠方)

【豆腐漿一椀】沖生雞子一枚。再加豆腐皮一張。龍眼肉十四枚。白沙糖一兩。同滾透。五更空心服。極妙。(千金方)

【墮胎下血不止】代赭石末一錢。生地黃汁半盞。調服。日三五次。以瘥為度。

(本草綱目)

【烏賊魚腹內墨】炒為末。醋湯調下。(婦人良方)

【羚羊角燒灰三錢】豆淋酒下。(普濟方)

【鹿角燒研】豉汁服一錢。日二服。(子母秘錄)

【烏雞子三枚】醋半升。酒二升。和攪。煮取一升。分四服。(本草拾遺)

【墨三兩】火燒。醋淬三次。出火毒。沒藥一兩。為末。每服二錢。醋湯下。(普濟方)

【小薊根葉】益母草各五兩。水三大椀。煮一椀。再煎至一盞。分二服。立止。(聖濟總錄)

【墮胎血下煩悶】用豉一椀。水一椀。煮三沸。調服。鹿角末一錢。(子母秘錄)

【墮胎血瘀不下】更兼狂悶寒熱者。用鹿角屑一兩。為末。豉湯服一錢。日三須。更血下。(聖惠方)

②蒲黃三兩。水三椀。煎一椀。頓服。(梅師方)

〔下胎惡血衝心〕因絕欲死。鬱金燒存性。為末。二錢。米醋一呷。調灌。即甦。(勝金方)

第四編 產科門 產後諸證單方

增補單方大全第四編終

十一

薛生白醫案

全書二冊
價洋四角

薛生白為初清名醫其名與葉天士相抗當時有葉薛之稱而薛之善治濕溫竟超出葉天士之上本書各案皆薛氏赴診得意之作麟角鳳毛彌見珍貴分門別類眉目清楚復於薛案後附列葉天士馬元儀兩名家案以資借鏡誠業醫者不可不讀之書也

▲神州醫學編輯社出版

▲上海廣文書局發行

第五編 小兒科門

一 初生諸證單方

【初生不啼】小兒初生不能發聲謂之

夢生庸俗不知此理遂棄而不救極

為可憫今凡有此切不可斷臍帶將

胞衣用火燒炙令火氣入兒腹內兒

身已煖却取貓一隻用青衣包裹其

頭足令一乖覺婦人拿住用貓頭在

兒耳邊却以手捉住貓頭婦人以口

齒著力咬破貓耳貓遂大叫一聲孩

兒即醒開口發聲眼開遂得長生矣

(體仁彙編)

二 取冷水灌之外以葱白莖鞭之即啼

(全幼心鑑)

【初生胎毒】急用花椒三錢黃柏三錢

鉛粉二錢枯礬二錢共研成末麻油

調搽自愈(應驗良方)

二 浮水石煨存性研為末放碗內童便

調勻用文紙燒煙熏透以裡面均帶

黃色為止俟冷用麻油調敷雖數年

不愈亦有效驗(應驗良方)

三 淡豉煎濃汁與三五口其毒自下

能助脾氣消乳食(聖惠方)

四 小兒落地時用橄欖一個燒研硃砂

末五分和勻嚼生芝麻一口吐唾和

藥縮包如棗核大安兒口中待啞一

個時頃方可與乳此藥取下腸胃穢

毒令兒少疾及出痘稀少(孫氏集

效方)

五 初生時以韭汁少許灌之即吐出惡

水惡血永無諸疾(四聲本草)

【預解胎毒】七八月或三伏日或中秋

日剪胡盧鬚如環子腳者陰乾於除

夕夜煎湯浴小兒則可免出痘(經

驗方)

二 小兒初生未可便與硃砂蜜只以甘

草一指節長炙碎以水二合煮取一

合以綿染點兒口中可與一蜆殼當

吐出胸中惡汁此後待兒飢渴更與

之令兒智慧無病出痘稀少(王瑒

選方)

三 小兒初生六日解胎毒溫腸胃壯氣

血硃砂豆大細研蜜丸一棗大調與

吮之一日令盡(至寶方)

【初生胎熱】初生小兒胎熱或身體黃

者以真牛黃一豆大入蜜調膏乳汁

化開時時滴兒口中形色不實者勿

多服(錢氏小兒方)

二 初生小兒五七日有熱證不得已只

以益元散時時灌之(傷寒心鏡)

三 黑豆二錢甘草一錢入燈心七寸淡

竹葉一片水煎(全幼心鑑)

【初生胎寒】腹痛汗出用衣中白魚二

七枚絹兒於兒腹上回轉摩之以愈

為度(聖惠方)

①小兒初生。面青身冷口噤。乃胎寒也。用白殭蠶木香肉桂陳皮檳榔甘草炙各五分。水煎取汁。以綿蘸入兒口中。(醫學入門)

②當歸為末。每用一小豆許。乳汁調下。日二夜一。兒大添之。(衛生隱微)

③柏子仁為末。每服一錢半。溫水調下。(衛生總微)

④小兒忽患腹痛。天矯汗出。名曰胎寒。煮梨葉濃汁七合。可三四度飲之。(千金方)

⑤白礬煨半日。研末。裹肉丸黍米大。每乳下一丸。愈。乃止。

⑥小兒鱗體。用白殭蠶去嘴為末。煎浴之。如蛇蛻脫去。便愈。(全幼心鑑)

⑦小兒無皮。初生時偏體無皮。即以米粉用絹袋包好。撲小兒週身。數日生膚。(全幼心鑑)

⑧小兒初生無皮色赤。但有紅筋。乃受胎未足也。掘土坑卧之。即長皮。(聖濟總錄)

濟總錄

①用早白米粉撲之。肌膚自生。(聖濟總錄)

②伏龍肝雞子清調塗。(三因方)

③小兒流水。小兒初生。遍身如魚脰。又如水晶。破則流水。以蜜陀僧生研搗之。仍服蘇合香丸。(救急方)

④小兒貼顛。頭熱而鼻塞者。天南星炮為末。水調貼顛上。炙手熨之。(危氏得效方)

⑤小兒顛陷。水調半夏末。塗足心。妙。(救急方)

⑥烏頭附子並生用。去皮臍各二錢。雄黃八分為末。葱白搗汁。和貼陷處。(勝金方)

⑦小兒顛腫。黃柏末。水調貼兩足心。(譚氏小兒方)

⑧小兒顛軟。青黛冷水調敷。(儒門事親)

⑨小兒頂軟。此乃肝腎虛。風邪襲入。附

子去皮臍。天南星各二錢。為末。薑汁調攤貼天柱骨。(全幼心鑑)

①小兒解顛。生蟹足白。飲各半兩。搗末。乳汁和敷。(保幼大全)

②小兒解顛鼻塞者。天南星炮去皮為末。淡醋調緋帛上。貼顛門。熱物熨之。(聖惠方)

③小兒解顛。顛開不合者。防風柏子仁白芨各一兩。為末。乳和敷二十餘日。(墨娥小錄)

④小兒腦縫開裂。頭大熱者。用黑虱三百枚。搗碎敷。(得效方)

⑤小兒腦熱。兼太陽痛者。川芎薄荷。朴硝各二錢。為末。以少許吹鼻。

⑥小兒髮遲。陳香需二兩。水一盞。煎汁三分。入猪脂半兩。和勻。日日塗之。(永類鈴方)

⑦小兒頭皮虛腫。如蒸餅裏水狀。以口嚼麩傳之。(衛生總微論)

⑧小兒髮禿。先以醋泔清洗禿處。以生

布指令大熱臘月猪脂并細研生鐵煎三沸塗之日三遍(千金翼方)

②醋汁煎大豆爛去豆煎令稠塗髮即生(證治準繩)

③貫眾燒灰細研油調敷(證治準繩)

④麻子一升熬黑壓取脂傅頭上良(證治準繩)

⑤氈氣水最長毛髮以物於炊飯時承取沐頭令其髮長密黑潤(本草綱目)

【小兒髮薄】以桃柳煎湯入猪肝汁和抹頭髮自生(衛生總微)

【小兒緊唇】以松脂炙化貼之(聖惠方)

①赤苧搗汁洗之良(聖惠方)

②烏蛇皮燒灰酥和敷之(聖惠方)

③葵根燒灰酥調塗之(聖惠方)

④馬芥子搗汁曝濃搗破頻破之(崔氏纂要方)

【小兒撮口】小兒初生忽患撮口不飲

名曰馬牙不治則百無一生便看兒齒齦上有小泡子如粟米狀急以針挑出血用墨磨薄荷汁斷母髮少許裏手指塗搽(證治準繩)

②急視口中上下斷間若有白色如豆大許便以指甲於當中搗之於指破處以蜈蚣末傅之良(衛生總微)

③蛇蛻硃砂麝香各一分每用半字津調塗口中日五七次(衛生總微)

④硃砂末小瓶內捕活蠍虎一個入瓶中食砂末月餘待體赤陰乾為末每次薄荷湯服三四分(方廣附餘)

⑤初生豆牙研爛絞汁和乳灌少許良(普濟方)

⑥生甘草一分細剉水一盞煎至六分去渣放溫分數次灌兒口中令吐出痰涎穢物後取猪乳汁點兒口中差(普濟方)

⑦真牛黃少許研細淡竹瀝調一字灌之次以猪乳滴口中(普濟方)

⑧赤足蜈蚣去頭足炙黃為末以猪乳調半錢分三四次溫灌之(普濟方)

⑨前方同雀雙不開口者五枚燒灰研細末未飲調服一字(普濟方)

⑩白僵蠶二枚為末蜜和傅兒口內如無以原蠶二枚炙黃代之亦治撮口(普濟方)

⑪雀矢白水和圓麻子大乳服二圓雞矢亦佳一方鷄矢白棗大綿裹水五合煮二沸分服(普濟方)

⑫食鹽搗細貼臍上灸之(子母秘錄)

⑬以熟針挑去白點須有血出為妙用白綿拭去血薄荷煎湯磨上好京墨頻塗之即愈(窮鄉便方)

⑭蛇蛻燒灰拭淨傅之(千金方)

【小兒口噤】中風不能乳用雀屎水丸麻子大飲下二丸即愈或用雀矢四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚(千金方)

②小兒口噤。面青赤者。用雞矢白如棗大綿裹。以水一合煮。分二服。一方酒研服之。(千金方)

③小兒百日內風噤。口中有物如蝸牛。或如黃頭白蟲者。薄猪肪擦之。即消。(聖惠方)

④小兒口噤。病在咽中。如麻豆許。令兒吐沫。不能乳食。葛蔓燒灰一字。和乳汁點之。即瘥。(聖惠方)

⑤白棘燒末。水服一錢。(聖惠方)

⑥小兒口噤體熱。以青竹茹三兩。醋一椀。煎取三分之一。溫分數服。(衛生總微)

⑦小兒口噤。牙關不開。天南星一個。煨熟。急用紙封角。莫令透氣。却以紙裹近上尖處。剪一窠子雞頭大。令熱氣出鼻孔中。熏之。牙關立開。(衛生總微)

⑧天南星去皮臍。研為細末。龍腦少許。和勻。將藥於牙根上搽之。即好。(衛生總微)

生總微

⑨蟬蛻十四個。去頭足。全蠍十四個。去頭足。同為細末。入輕粉少許。和勻。用乳汁調服。

⑩以鹿角粉。大豆等分。研細。乳和。塗乳上。與兒吮之。(衛生總微)

【小兒臍風】用全蠍二十個。頭尾俱全者。要去毒。用好酒塗炙。為末。麝香一字。另研。共為細末。用半字。金銀煎湯調服。即效。(證治準繩)

①取東壁上土。傳之。大佳。(千金方)

②乾蟬蟻末。粉之。不過四五度。瘥。(斗門方)

③艾葉燒灰。填臍中。以帛縛定。效甚。(保嬰金鏡錄)

④小兒臍風濕腫。久不瘥者。蜂房燒末。傳之。效。(保幼大全)

⑤小兒臍風。用壁虎後半截。焙為末。男用女乳。女用男乳。調勻。入稀雞矢少許。搽舌根。或牙關。仍以手蘸摩兒。取

汗出甚妙。(筆峰雜興方)

⑥小兒臍爛成風。杏仁去皮研敷。(育嬰家秘)

⑦小兒臍風撮口。蝸牛五枚。去殼。研汁塗之。(萬病回春)

⑧小兒臍風撮口。生地。生薑。葱。白。蘿蔔。子。田螺肉。共搗爛。塗臍四圍一指厚。抱住。泄矢氣而愈。(活幼口議)

⑨臍風將死。搗蒜安臍。以熱艾炙蒜上。至口中有蒜氣。方正。仍以蒜汁滴鼻中。(全幼心鑑)

⑩艾燒灰厚敷臍上。綢絹裹之。(保嬰金鏡錄)

【小兒臍腫】荆芥煎湯洗煨葱貼之。須常留意。勿為尿濕。(得效方)

【小兒臍突】小兒臍突。多因啼哭所致。須先設法使之不哭。外用赤小豆。淡豆豉。天南星。白薇。各一錢。為末。搗芭蕉自然汁。調塗四圍。小便下愈。(千金方)

②小兒臍突囊腫。大黃牡蠣各五錢。朴硝二錢。研末。每一二錢。以田螺一枚洗淨。浸一宿。取水調塗。(蘭氏經驗方)

③兒臍突出。原斷臍帶并艾葉同燒。灰油胭脂調搽。(證治準繩)

【小兒臍濕】車前子炒焦。為細末。敷。(姚和眾至寶方)

②臍間出水。附子二錢。甘遂錢半。蛇床子一錢。麝香五釐。各研細末。和勻填臍中。外加膏藥封之。(聖惠方)

【臍瘡變癩】黃連二錢半。鉛粉龍骨煨。各一錢。研細和勻。頻以少許敷臍中。(全幼心鑑)

【臍瘡濕爛】胭脂海螵蛸研末。油調搽。(筆峰雜興方)

②哆囉呢羽毛。緞嘩織氈氈子。皆可燒灰研末。厚摻包好。勿見風。如濕再摻。(集效方)

③黃蘗。或龍骨末。敷。(全幼心鑑)

④枯礬。龍骨為末。麝香少許。拭臍。乾敷

之避風。(小兒直訣)

⑤當歸末。敷之。可免。(聖惠方)

⑥伏龍肝。研末。敷之。其效神速。(聖惠方)

【小兒赤眼】兒生艱難。血瘀眦眶。致睛不見。腫人。輕則外泡赤腫。上下弦爛。用杏仁二枚。去皮尖。嚼。和乳汁三五匙。入輕粉少許。蒸熟。絹包頻點。重者加黃連。朴硝最良。(全幼心鑑)

②蚯蚓泥。搗塗顛門。乾則再換。三次。即愈。(救急方)

③生南星。生大黃。等分為末。用醋調塗兩足心。效。(衛生總微)

④水調黃連末。貼足心。(全幼心鑑)

⑤羊肝切薄片。井水浸貼。(普濟方)

⑥淡竹瀝。點之。或入人乳亦可。(古今錄驗方)

【小兒目翳】或來或去。漸大侵睛。雪白鹽少許。燈心蘸點。日三五次。不痛不得。效。倘眼目亦爛。緊閉。以熱湯或薄

荷荊芥。防風煎湯。沃之。(完素六書)

【小兒腦熱閉目】大黃一分。水三合。浸一夜。一歲兒服半合。餘者塗頂上。乾即再上。

②小兒腦熱好閉目。或太陽痛。或目赤腫。川芎。薄荷。朴硝各二錢。為末。以少許吹鼻中。

③甘草一截。以猪膽汁炙。為末。每用米泔水。調少許灌服。(幼幼新書)

④小兒初生目閉。熊膽少許。煎洗七八次。愈。(幼幼近編)

【小兒吐乳】小兒百晷內吐乳。或黃青色。用年少婦人乳汁一盞。入丁香十枚。陳皮去白一錢。砂鍋煎一二十沸。細細與服。(陳文中小兒方)

②小兒吐乳胃寒者。白豆蔻仁十四個。砂仁十四個。生甘草二錢。炙甘草二錢。為末。常摻入兒口中。(危氏得效方)

③小兒初生吐不止者。用蘆條少許。同

人乳二合。鹽二粟許。煎沸。入牛黃粟許與服。(外臺秘要)

④小兒呢乳不止。服此立效。用膩粉一錢。鹽豉七粒。去皮研勻。丸麻子大。每服三丸。養香湯下。(活幼口議)

⑤襁褓吐乳。石燕子末。以蜜調少許。塗唇上。日三五次。(衛生寶鑑)

⑥小兒穢惡入腹。令兒嘔吐。不乳。木香。乾薑。茯苓。甘草。木瓜。丁香。各等分。水煎。綿蘸滴與之。(證治準繩)

⑦以乳汁一杯。葱白兩個。於飯鍋上煨熟。即與小兒服之。自愈。(鄭氏小兒方)

⑧米七粒。燒黑。水半酒杯。煎至五分。服極有效驗。(活幼全書)

⑨取田中蚯蚓泥一兩。研末。空心以米湯服半錢。不過二三服。效。(聖惠方)

【小兒二便不通】初生小兒患此者。用皂角燒存性。研為細末。煉蜜作丸。如棗核樣。納穀道中。即通。(育嬰家秘)

②用真香油一兩。皮硝少許。同煎滾。冷定。徐徐灌入口中。服下。即通。(蘭氏經驗方)

【小兒小便不通】鹽安臍中熨之。效。(千金方)

③小兒初生。小便不通。葱白搗爛。麝香三釐。搽上臍臍。(衛生總微)

④初生小便不通。用孩兒茶。研極細末。分許。煎扁蓄湯調下。立通。(萬病回春)

【小兒大便不通】此證一名鎖肚。由胎熱毒結於肛門。兒生之後。閉而不通。三日者。急令婦人以溫水漱口。啞兒前後心。手足心。并臍七處四五次。以輕粉半錢。蜜少許。溫水化開。時時與少許。以通為度。(全幼心鑑)

②小兒初生便閉。甘草。枳殼。煨各一錢。水半盞。煎服。(全幼心鑑)

【小兒傷乳】腹脹煩悶欲睡者。大麥麵生用。水調一錢。服。白麵微炒亦可。

(保幼大全)

【小兒斷乳】法用鮮鯽魚臍。於炊飯時。飼乳前塗乳佳。(袖珍小兒書)

②頭面耳目鼻諸證單方

【小兒鬼頭】取蔓菁子搗為末。以豬脂調塗禿處佳。(聖惠方)

【小兒禿瘡】大鯽魚一尾。去腸。入亂髮填滿。燒研入雄黃末二錢。先以齋水洗患處。然後用生油調勻搽之。(得效方)

③白頭翁根。搗敷一宿。作瘡半月。全愈。(肘後方)

③紫草煎汁塗敷。(聖惠方)

【小兒頭瘡】煮飯將沸。取鍋蓋上之米沫擦之。尤為神速。(幼科發揮)

②松香。碾二錢。黃丹。飛一錢。枯礬一錢。共為末。調敷。(墨娥小錄)

③以黃泥。裹大豆。豉煨熟。取研。以葶菜油調塗。(勝金方)

④黑豆炒存性。研水調敷。(子母秘錄)

(五) 燒雞蛋殼和猪脂數 (千金方)

(六) 因傷濕入水成毒膿汁不止紅麩嚼卷之效 (活幼口議)

(七) 小兒頭瘡晝開出膿夜即復合四寸長鯽魚一條去腸大附子一枚去皮研末填入炙焦研數搗蒜封之效 (聖惠方)

(八) 綠豆松香為末麻油調敷 (談楚翁方)

(九) 益元散加枯礬少許麻油調敷 (證治準繩)

小兒面瘡 焮赤腫痛地榆八兩水一斗煎五升溫洗之 (衛生總微)

(二) 亦辟荔葉杵末生油調敷 (衛生總微)

(三) 黃梁米一升杵末蜜水和敷以瘥為度 (衛生總微)

(四) 面瘡出黃水以鯽魚頭燒灰研末和醬青汁傅上一日易 (衛生總微)

(五) 以大麥燒存性為末生油膩粉調塗

神效 (衛生總微)

(六) 小兒面湮瘡百藥煎五錢生白礬二錢為細末小油調旋搽之神效 (外科精義)

(七) 治面上生瘡出膿汁以蛇蛻皮炙焦為末和猪脂傅上 (衛生總微)

小兒眉瘡 猪頭骨髓六七枚白膠香二錢同入銅器熬稠待冷為末麻油調塗 (本草綱目)

(二) 小麥麩炒黑研末酒調傅之 (本草綱目)

小兒眉癬 用旋覆花天麻苗防風等分為末洗淨以油調塗之 (衛生總微)

小兒耳瘡 用胡粉和土塗之 (子母秘錄)

(二) 蕃薇根四兩地榆二錢為末先以鹽湯洗過傅之 (全幼心鑑)

(三) 以雞子白傅之 (本草綱目)

(四) 輕粉棗子灰等分研油調傅 (摘元)

(四) 輕粉棗子灰等分研油調傅 (摘元)

方)

(五) 地骨皮一味為末粗者熬湯洗細者香油調搽 (香祖筆記)

小兒耳疳 即月蝕也地骨皮一味煎湯洗之仍以香油調末搽之 (蓼洲聞錄)

(二) 黃連末傅之甚效 (子母秘錄)

(三) 用天鵝油調草烏末入龍腦少許和傅立效無則以雁油代之 (通元論)

小兒聾耳 以桑木上露蜂房炙黃杵末溫酒調下半錢 (本草綱目)

(二) 硫黃以粉吹耳中日一夜一 (千金方)

(三) 硫黃和蠟作挺插之日二易 (千金方)

(四) 桃仁炒研綿裹日日塞之 (千金方)

(五) 小兒聾耳膿汁出以硫黃細研每用少許摻入耳中日一次夜二次 (衛生總微)

(六) 以白礬麝香研勻少少摻入耳 (衛生總微)

生總微)

【小兒耳鳴】以生烏頭。纔撮得。乘濕削如棗核。塞耳中。旦用夜易。夜用旦易。不過三日愈。(衛生總微)

②以乾百合為末。溫水調下一錢。乳後服。(衛生總微)

③以鹽二三升。蒸熟包裏。以耳枕之。冷即易。亦治耳洪洪聲。(衛生總微)

④以生地黃截塞病耳。數數易之。或以紙裹微煨用。(衛生總微)

【小兒耳聾】以米醋一椀。用彈子大鐵一塊。燒赤。投醋中。將耳就上。使氣熏入耳中。即效。二三日可治。(衛生總微)

②以葱白於灰火中。煨令熟。將葱白頭納耳中。一日三易。(衛生總微)

③芥菜子杵爛。入人乳汁和。綿裏納耳中。一日一易。(衛生總微)

④小兒久聾。以醇醋。微火煎附子至軟。削令尖塞耳中。(衛生總微)

【小兒酣瘡】甜瘡生於耳輪前後。連引流水。蛇牀子一兩。輕粉三錢。為末。麻油調搽。(小品方)

②胎火盛者。用白螺殼研細。和冰片。麻油調搽。(袖珍小兒書)

【小兒疣目】雞肫黃皮擦之。自落。(集要方)

【小兒雀目】小兒雀盲。至晚忽不見物。用羯羊肝一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一握。瓦罐煮熟。日食之。屢效。但忌鐵器。如不肯食。炙熟。搗作丸。如綠豆大。每服三十九。茶下。(衛生家寶方)

②牽牛子末。每以一錢。用羊肝一片。同麵作角子二個。炙熟食。米飲下。(普濟方)

③仙靈脾根。晚蠶蛾各半兩。炙甘草。射干各二錢。半為末。用羊肝一枚。切開。搽藥二錢。紮定。以黑豆一合。米泔一盞。煮熟。分二次食。以汁送之。(普濟方)

④以蒼朮二錢。米泔浸。切片。焙為末。豬肝二兩。批開。搽藥在內。用麻繫定。粟米一合。水一椀。砂鍋內煮熟。重眼。候溫。臨卧。每服三錢。大效。(世傳方)

⑤蒼朮一兩。不計時。每服一錢。效。(聖惠方)

⑥夜明砂炒研。豬膽汁和丸。綠豆大。每米飲下五丸。一方。加黃芩等。分為末。米泔煮豬肝。取汗。調服半錢。(本草綱目)

【小兒目翳】宜以珊瑚研如粉。日少少點之。三日愈。(篋中方)

②楸葉三兩。搗爛。紙包。泥裹。燒乾。去泥。入水少許。絞汁。銅器慢熬。如稀餈。瓷盒收之。每旦點。

【小兒鼻塞】鼻塞兼生息肉者。通草細辛各一兩。二味搗末。取藥如豆大。著綿纏頭。納鼻中。日二。(千金方)

②小兒鼻塞不通。濁涕流出。杏仁半兩。蜀椒。附子。細辛各六錢。剉碎。以醋五

方)

合。漬藥一宿。明日以猪脂五合煮。令附子色黃。膏成。去滓。更以新綿蘸導鼻孔中。日再。兼摩頂。千金方

③小兒鼻塞不通不能食。乳用醍醐二合。木香零陵香各四分。湯煎成膏。塗頭上。兼塞鼻中。(外臺秘要)

④以槐葉為末。人乳調。厚塗額門上。(莊氏家傳)

⑤大天南星一個。微炮為末。以淡醋調塗紅帛上。以貼額上。炙熱手頻熨之。(張雞峯方)

【小兒鼻疳】膽礬燒至煙盡。研末。搽之。一二日愈。(集簡方)

②鼻疳赤爛。蘭香葉燒灰二錢。銅青五分。輕粉二字。日傳三次。(錢乙小兒方)

【小兒鼻腫】鼻下兩道赤色。有疳。先以米泔洗淨。用黃連末傳之。日三四次。(子母秘錄)

③用熊膽半分。湯化抹之。(聖惠方)

【小兒衄血】麥門冬。生地各五錢。水煎服立止。幼幼近編

③車前葉搗汁飲之。甚效。(幼幼近編)

③唇口齒舌喉諸證單方

【小兒唇緊】松脂炙化貼之。(聖惠方)

③亦覓搗汁洗之。良。(聖惠方)

③葵根燒灰。酥調塗之。(聖惠方)

④馬芥子搗汁。膠濃搗破。頻塗之。(崔氏纂要方)

【小兒唇腫】桑木汁塗之。即消。(聖惠方)

【小兒口瘡】燒髮灰和猪脂傳之。(千金方)

③亂髮灰。胡絮灰。黃連。乾薑四味。等分為散。以粉瘡上。不過三遍。(千金方)

③胡粉炒一分。黃連半分。為末傳之。(普濟方)

【小兒鵝口】患此者不能吮乳。可用密陀僧末。醋調塗足心。瘡愈。洗去。(黎居士簡易方)

③枯礬一錢。硃砂二分。為末。每以少許敷之。日三次。神驗。普濟方

③白礬。硃砂各二錢。半。馬牙硝五錢。研細。先拭淨兒口。水調塗。活幼口議

④朴硝。兒茶各二分。礬砂一分。研細。蠟搗自然汁調搽。(小品方)

⑤馬蘭頭汁擦之。甚妙。(本草拾遺)

【小兒齒遲】取路旁遺却稻粒。於齒路點三七下。其齒自生。神效。(聖惠方)

【兒不生齒】用雄鼠屎兩頭圓者。三七枚。每日一枚。其齒勿食鹹酸。或入麝香少許。尤妙。(小品方)

【小兒牙疳】出血者。大鯽魚一尾。去腸留鱗。入當歸末。泥固。燒存性。入煨過鹽和勻。日用。(聖惠方)

③雄黃一錢。銅綠二錢。為末。貼之。(陳氏小兒方)

③鴨嘴膽礬一錢。匙上煨紅。麝香少許。研勻。傳齒上。立效。(活幼口議)

【走馬牙疳】小兒口内生瘡。牙齦潰爛。

齒黑欲脫。或出血臭氣。白芷五錢。馬

牙硝。銅青各一錢。麝香一字。末之。敷

口角。擦齒上。仍服蟾酥丸。

② 燒蚶蚶黃連青黛各等分。入麝香少許。為末。敷之。(身經通考)

③ 鯽魚一尾。去腸。入硃一分。生地黃一兩。紙包。燒存性。入枯白礬麝香少許。為末。摻之。(本草綱目)

④ 鉛白霜銅綠各二錢。白礬豆許。為末。掃之。(宣明方)

⑤ 黃蘗青黛各一錢。冰片一分。研細擦之。(子母秘錄)

⑥ 五倍子青黛枯礬黃蘗等分為末。先以鹽湯漱淨。摻之。(陳氏小兒方)

⑦ 真青黛一錢。硼砂一錢。龍腦薄荷末五分。人中白一錢。粉口兒茶一錢。元明粉五分。馬尾勃五分。梅花冰片二分。研細擦之。病甚者。加犀黃三分。珍珠三分。效尤捷。

⑧ 人中白入甕瓶內。鹽泥固封。煨紅研末。入麝香少許。貼。

末。入麝香少許。貼。

【小兒舌瘡】飲乳不得。白礬和雞子置醋中。塗兒足底。自愈。(千金方)

② 硃砂雄黃黃柏薄荷硼砂冰片末。摻之。(千金方)

③ 羊腰骨中髓。和鉛粉塗。(錢乙小兒直訣)

【小兒重舌】取釜下土。和苦酒塗舌上。(千金方)

② 燒灰敷舌上。效。(靈苑方)

【小兒雀舌】巴豆半粒。飯粘四五粒。共搗為餅。如黃豆大。貼眉心中間。待四圍起泡。去之。即愈。(活幼口議)

【小兒舌膜】初生小兒。有白膜皮。裹舌尖。或漏舌根。急以指甲刮破。令出血。以燒礬末。如綠豆大。敷之。若不刮去。白膜必啞。(應驗良方)

【小兒舌筍】小兒不吃乳。啼哭者。即看舌上起白泡一粒。名舌筍。如不治。即死。鮮生地取汁。如無生者。以乾生地

涼井水浸開。搗爛取汁。塗患處。數次即愈。(育嬰家秘)

【小兒咽腫】升麻射干大黃各一兩。剉碎。以水一升五合。煮取八合。一歲兒分三服。以滓敷腫上。冷更暖以敷。大兒以意加之。(千金方)

② 牛蒡根搗汁。細細嚙之。(普濟方)

③ 杏仁炒黑。研爛。含嚙。(普濟方)

【小兒喉痺】桂心杏仁各半兩。為末。以綿裹如棗大。含咽汁。(千金方)

② 鯉魚膽二七枚。和竈底土。以塗咽外立效。(千金方)

③ 棘鍼燒灰。水服半錢。(聖惠方)

④ 小兒喉痺腫悶。以露蜂房燒灰。研細末。每一錢。乳汁調服。(保幼大全)

⑤ 鼠粘子二兩。炒焦。甘草半兩。炙黃。同為細末。每服一錢。用新汲水調下。更入蜜少許。(保幼大全)

⑥ 先呷好麻油少許。後以茶葉燒灰。細末。水調下半錢。立效。大者增之。(保

幼大全

④ 寒熱嗽喘諸證單方

【小兒胃寒】白豆蔻仁縮砂仁各十四個。生甘草炙甘草各二錢為末常摻入兒口中。(得效方)

【小兒風寒】煩熱有疾。不省人事。荊芥穗半兩焙。麝香片腦各一字。為末常摻入兒口中。(得效方)

② 春月外感風寒。用防風陳皮各三分。羌活蘇葉各二分。蟬殼三個。甘草一分。葱白一寸。生薑一片。煎熱服。取汗。(窮鄉便方)

③ 蘿蔔子生研末一錢。溫葱酒服之。取微汗。大效。(衛生易簡方)

【小兒咳嗽】蜂房二兩。洗淨。燒研。每服一字。米飲下。(勝金方)

② 括萋皮不拘多少。用蜜塗。慢火上炙。焦赤色為末。每服一錢。蜜調成膏。時時抹兒口內。(證治準繩)

③ 生薑四兩。煎湯浴之。(千金方)

④ 咳嗽聲不出者。紫苑末杏仁等分。入蜜同研。丸芡子大。每服一丸。五味湯化下。(全幼心鑑)

⑤ 小兒猝嗽。百日内咳嗽痰壅。貝母五錢。甘草半生半炙二錢。為末。沙糖丸芡子大。每米飲化下一丸。(全幼心鑑)

⑥ 皂莢燒灰。研細末。每服半錢或一錢。豉湯調下無時。(衛生總微)

【小兒痰喘】巴豆一粒。杵爛。綿裏塞鼻。男左女右。痰即自下。(龔氏醫鑑)

② 小兒痰喘咳嗽。膈熱久不瘥。括萋實一枚。去子為末。以寒食麵和作餅子。炙黃。再研末。每服一錢。溫水化下。日三服。效乃止。(宣明方)

【小兒寒嗽】或作壅喘。用松子仁五粒。百部炒。麻黃各三分。杏仁四十粒。去皮尖。以少水略煮三五沸。化白沙糖丸芡子大。每食後含化十九丸。大妙。(錢乙小兒直訣)

③ 寒熱咳嗽諸證單方

【小兒鹽哮】脂麻稻瓦內燒存性。出火毒。研末。以淡豆腐蘸食之。(摘元方)

⑤ 卒中驚癇諸證單方

【小兒卒中】竈心黃土及蚯蚓泥等分。搗合水和如雞子黃大。塗兒頭上及五心。良。用雞子清和如泥。亦佳。(千金方)

② 吞麝香如大豆許。立愈。(千金方)

【小兒卒死】取女青末半錢。用牛乳汁調服之。(聖惠方)

③ 以苦參醋煮汁少許。納口中。即蘇。水煮亦得。(聖惠方)

③ 煎鹽湯令極鹹。以物拗開口灌之。令入腹。即活。(聖惠方)

【小兒慢驚】小兒慢驚。虛風。用平正附子去皮臍。生研為末。以白頸蚯蚓於末內滾之。候定。刮蚓上附末。丸黃米大。每服十九丸。米飲下。(百一選方)

② 烏藥磨水灌之。(濟急方)

③ 慢驚發搐。帶有陽證者。蚤休末一錢。

括蕪根末一錢。同於慢火上炒焦黃研勻。每服一字。煎麝香薄荷調下。
小兒直訣

小兒急驚 遠年白田螺殼燒灰入麝香少許。水調灌之。**（普濟方）**

急驚兼搐搦者。丹砂半兩。天南星一兩。重者一個。炮製酒浸大蠟三枚。為末。每服一字。薄荷湯下。**（聖濟總錄）**

急驚昏迷不醒人事者。石綠四兩。輕粉一錢。為末。薄荷汁入酒調一字服取吐。**（全嬰方）**

急驚涎潮壯熱悶亂者。鐵粉一錢。硃砂一錢。為末。每服一字。薄荷湯調下。**（本草綱目）**

小兒急慢驚風 吊眼撮口。搐搦不定者。代赭石。火燒醋淬十次。細研水飛日乾。每服一錢。或半錢。煎真金湯調下。連進三服。候兒脚脛上有赤斑。即是驚氣已出。病當安也。無斑點者不可治。**（直指方）**

口眼喎斜。搐搦痰盛。用天漿子房去皮。生用三枚。乾蠟生用七枚。硃砂一錢。研勻。飯丸粟大。每服二丸。荊芥湯送下。**（聖惠方）**

六 心腹諸證單方
小兒嘔噦 用生薑汁牛乳各五合。煎取五合。分為二服。**（千金方）**

鹿角粉。大豆末等分。和乳調塗乳上飲之。**（古今醫驗方）**

小兒嘔吐不定。用五倍子兩個。生一熟。甘草一握。濕紙煨過。同研為末。每服半錢。米泔調下。立瘥。**（經驗方）**

小兒吐逆不定。虛風喘急。白附藿香等分為末。每米飲下半錢。**（保幼大全）**

小兒泄瀉 紅棗二十個。去核。將官粉入內。以陰陽瓦焙乾。去棗研粉。每服三分。米湯下。**（千金方）**
小兒疳瀉。用赤石脂末。米飲調服半錢。立瘥。加京芎等分更妙。**（本草綱目）**

目

小兒熱瀉。黃蘗削皮。焙為末。米湯和丸。粟米大。每服一二十丸。米湯下。**（十全博救方）**

小兒四季患泄瀉。製白朮。陳皮。川厚朴。薑汁炒各三分。甘草二分。煎服效。**（窮鄉便方）**

小兒泄瀉。用木鼈子一個。煨熟。去殼。小丁香三粒。共為末。米飲丸。入小兒臍。以舊膏藥封之。**（身經通考）**

小兒痢疾 香白芷一錢。乾薑一錢。共研細末。以蜜調膏。先用酒洗臍。溫後貼此膏。以布束住。再將氈布烘熱。在膏上熨之。氣通即愈。**（嬰童百問）**

不拘赤白。用麻油一合。搗和蜜湯服之。**（外臺秘要）**

痢下類似魚凍者。白鴨殺取血。滾酒冲服。即止。**（葉氏摘元方）**
枳實磨汁。飲服一二錢。**（廣利方）**

雲母粉半兩。煮白粥調食之。**（食醫**

心鏡

【小兒心痛】白烏骨雞糞五錢。曬研。松脂五錢。為末。葱頭汁和。丸桐子大。黃丹為衣。每醋湯服五丸。忌生冷硬物。三四日立效。(嬰童百問)

【小兒氣痛】蓬莪茂炮熟。為末。熟酒服一錢。(十全博救方)

【小兒腹脹】腹大如瓢。且黃瘦異常。用乾雞矢一兩。丁香一錢。為末。蒸餅九菜豆火。每次米飲湯下十九日。三服。(活幼全書)

【胡粉鹽熬色變】以此摩腹。大效。(子母秘錄)

【用蘿蔔子紫蘇梗陳皮乾薑各等分。甘草減半。食減者加白朮煎服。(平治會萃)

【半夏末少許。酒和。丸粟米大。每服二丸。薑湯下。不瘥。加之。或以火炮研末。薑汁調貼臍。亦佳。(子母秘錄)

【小兒腹痛】小兒胎寒。腹痛汗出。用衣

中白魚二七枚。絹包。於兒腹上回轉摩之。以愈為度。(聖惠方)

【小兒煩滿】煩滿欲死者。雞子殼燒灰。酒服一錢。(子母秘錄)

【小兒脾疳】使君子霍薈等分為末。米飲湯下。每服一錢。(儒門事親)

【小兒痞塊】使君子仁三錢。木鼈仁五錢。為末。水丸。龍眼大。每以一九。用鷄子一箇。破頂入藥在內。蒸熟。空心食之。其痞即解。(楊起簡便方)

【小兒乳癖】胃腹高。喘急。吐乳。以不入倉黑豆七粒。去皮。研極細。滴水七遍。和成。作七丸。以青黛末滾之。令適。用白麵和作皮。裏藥。慢火煨熟。去麵。再研細。別入膩粉生腦子麝香各少許。再滴水丸作七丸。每服一丸。臨卧。溫水送下。極效。(中藏經)

白芥子不拘多少。研成膏。攤紙上。貼痛硬處。稍時揭去。效。(中藏經)

【小兒痞積】急性子水紅花大黃各一

兩。俱生研末。每味取五錢。外用皮硝一兩。拌勻。將白鴿一隻。或白鴨亦可。去毛糞。剖腹。勿犯水。以布拭淨。將末裝入內。用線紮定。沙鍋內用水三椀。重重紙封。以小火煮乾。將鴿鴨翻調。培黃色。冷定。早晨食之。日西時疾軟。三日。大便下血。病去矣。忌冷物百日。(集效方)

【小兒遺尿】用瞿麥石韋龍膽皂莢桂心各半兩。雞腸草人參各一兩。車前子一兩。六錢。八味為末。蜜丸。每食後服如小豆大。五九。日三。加至六七丸。(幼幼近編)

【破故紙炒為末。每夜熟湯服五分。(嬰童百問)

【大甘草頭煎湯。夜夜服之。(得效方)

【小兒不尿】大蔥白切四片。水半盞。同煎片時。分作四服。即通。此宜早治。遲則不救。(全幼心鑑)

【安鹽臍中。以艾絨灸之。便通。(藥性

論

③以生雞卵一枚和牛乳一匙攪拌於熱湯中食之。(育嬰家秘)

【小兒血尿】甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日服盡。(桃和眾至寶方)

【小兒血淋】雞矢尖白如粉者炒研為丸菜豆大每服三五丸酒下四五服愈。(醫林集要)

【小兒沙淋】黑豆一百二十粒生甘草一寸新水煮熟入滑石末乘熱飲之良佳。(全幼心鑑)

【小兒淋痛】水芹菜白根者去葉搗汁并水調服。(聖惠方)

【小兒疝氣】以葛袋盛鹽於戶口懸之父母用手撚料盡即愈。(日華子本草)

【小兒卵腫】桃仁數枚去皮不去尖搗爛如泥塗敷。(墨娥小錄)

林得效方

③礬砂一分水研塗之大有效驗。(集元方)

【小兒卵癩】桃仁炒香為末酒服一小匙每日二次復搗敷之。(外臺秘要)

【小兒脫肛】以魚腥草插如泥先以朴硝水洗過用芭蕉葉托上並坐之白入也。(永類方)

③黃括萋一個入白礬五錢在內固濟煨存性為末糊丸桐子大每米飲下二十九丸。(摘元方)

③先以五倍子艾絨捲成筒放便桶內以瓦盛之令小兒坐桶上以火點著使煙熏入肛門其肛自上隨將白礬研末搽之其肛自緊更不復發。(活人書)

④用五倍子為末量多少摻患處以物襯手揉入切忌食發物毒物。(醫學綱目)

⑤蒲黃一兩猪脂二兩煉猪脂蒲黃成

膏塗腸頭上即縮入(醫學綱目)

⑥荆芥皂角等分煎湯洗之(經驗方)

⑦香附子荆芥穗等分為末每服一匙水一大碗煎十數沸淋洗(三因方)

【小兒下血】五倍子末煉蜜丸小豆大每米飲二十九丸(鄭氏方)

③黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻子大每服一二十九食前米飲下(閻孝忠集效方)

③荆芥槐花各三兩炒黑為末每二錢清茶調下(證治準繩)

⑦小兒五疳川棟子川芎等分為末猪膽汁丸米飲下(摘元方)

③熊膽使君子末等分研勻磁器蒸溶蒸餅丸麻子大每米飲下二十九丸(保幼大全)

【小兒吞錢】用炭燒紅急搗為末煎湯呷立效(古今醫統)

②小兒誤吞銅錢即與胡桃任意食之

其錢自消。(墨娥小錄)

③炭末搗細篩過湯調服。日三四服。瀉下物如鳥梅肉狀者。蓋炭末圍裹其錢而出也。(墨娥小錄)

●八 小兒瘡瘍單方

【小兒丹毒】伏龍肝為末以雞子白和傳乾易之。(千金方)

②用蜜和乾薑末傳之。(肘後方)

③綠豆五錢。大黃二錢為末用生薄荷汁入蜜調塗。(全幼心鑑)

④小兒丹毒。猪油切片貼之。(本草綱目)

⑤柳葉一斤。水一斗。煮取汁三升。溫洗赤處。日七八度。(廣利方)

⑥寒水石末一兩塗之。(集元方)

⑦赤小豆為粉粉之。如未成瘡。以雞子白調傳之。(證治準繩)

⑧醋和蕎麥麵塗之。(證治準繩)

【小兒瘰癧】一名火灼瘡。亦稱火爛瘡。茱萸煎酒拭之。良。(兵部手集)

【小兒風疹】隱皮膚內不出者。慎火黃

苗葉五大兩。和鹽三大兩。同研絞汁。以熱手摩塗。日再上之。(本草綱目)

②風疹癢不止者。酪五合。鹽一兩。二味相和煎過。摩病處。立瘥。(證治準繩)

【小兒軟癩】油麻炒焦。乘熱嚼爛傳之。(譚氏小兒方)

②桑螵蛸燒存性。研末。油調傳之。(危氏得效方)

【預免瘡癩】凡小兒每年六月六日。照年歲吞兒莢子。可免瘡癩之患。林靜齋所傳方也。(吳吳扶壽方)

【小兒楊梅瘡】起於口內。延及遍身。以土草解末。乳汁調服。月餘自愈。(外科發揮)

●九 小兒痘疹單方

【痘疹】綠萼梅蕊。未放採藏。逢四時八節。節前一日。用雞蛋一箇。打孔入蕊。紙糊好。飯上蒸熟。吃數次。永不出痘。即出亦不過數粒而已。(楊春涯驗方)

②銀花(去毒不用)一兩。陰乾。錫巴一升。共研末。用洋白糖做成糕餅。或開水調和。令小兒食之。(不藥良方)

【出痘不快】貫眾赤芍藥各一錢。升麻甘草各五分。入淡竹葉三片。水一盞。半煎七分。溫服。(王海藏方)

②蘿蔔子生研末。米飲湯服二錢。甚良。(衛生易簡方)

③真珠七粒為末。新汲水調服。(儒門事親)

④芝麻五合。以滾水泡之。乘熱薰頭面。即發。(體仁彙編)

⑤韭根煎湯服之。立即快發。(海上名方)

【出痘作痒】用上等白蜜。不拘多少。水和。時時以鵝翎刷之。其痂易落。且無癩痕。(世醫通變要法)

③蟬蛻三七枚。甘草炙各一錢。水煎服之。(全幼心鑑)

【出痘聲啞】甜櫻桃核二十枚。砂鍋內

第五編 小兒科門 小兒痘疹單方

培黃色煎湯服。核酸者無效。(鄭氏家傳方)

【痘症】加密列花二錢。接骨木花一錢。杏仁二分。分作二包。入麻袋煎之一日。一包分三次服。患者口渴時。用橙汁一兩。糖漿二兩四錢。溶化水中飲之。(新內科全書)

【預防出痘】用雄黃和麻油塗鼻孔。甚效。(全嬰方)

【痘瘡煩喘】燈心一把。鼈甲二兩。水碗半。煎六合。分二服。龐安常傷寒論

痘瘡煩渴。甘草。炙括萋等分。水煎服之。(直指方)

【痘瘡脹痛】白芍藥為末。酒服五分。(痘疹便覽)

痘疹便覽)

【痘瘡狂亂】滑石水飛過六兩。粉甘草一兩。為末。硃砂二錢。冰片三分。麝香一分。蜜少許。每服三錢。燈草湯下。二三服。(王氏痘疹方)

【痘瘡便秘】肥猪臙一塊。水煮熟。切如

豆大。與食。自然臟腑滋潤。痂死易落。無損於兒。(陳文仲小兒方)

【痘瘡疳蝕】濃水不絕。用已出蠶蛾。以生白礬末填滿。煨枯為末。擦之。甚效。(陳文仲小兒方)

【痘瘡稠密】生犀角。水磨濃汁飲之。甚驗。(錢乙小兒方直訣)

【痘瘡成疔】雄黃一錢。紫草三錢。為末。胭脂汁調。先以銀簪挑破。搽之。極妙。(痘疹證治)

【痘瘡變黑】穿山甲。蛤粉炒為末。每服五分。入麝香少許。溫酒服。即發紅色。效驗如神。(直指方)

【痘瘡變黑】穿山甲。蛤粉炒為末。每服五分。入麝香少許。溫酒服。即發紅色。效驗如神。(直指方)

【痘瘡黑陷】玳瑁。生犀角。同磨汁一合。入猪心血少許。紫草湯五匙。和勻。溫

【痘瘡黑陷】玳瑁。生犀角。同磨汁一合。入猪心血少許。紫草湯五匙。和勻。溫

服。(聞人規痘疹論)

【鐵脚威靈仙炒研一錢。冰片一分。溫水調服。(儒門事親)

【鼠李子一兩。炒研。桃膠五錢。每服一錢。水七分。煎四分。溫下。(本草綱目)

【痘瘡倒陷】乾胭脂三錢。胡桃壳燒存性一箇。研末。用胡荽煎酒服一錢。再服取效。(救急方)

【痘瘡倒陷】箬葉灰一錢。麝香少許。酒服。(痘疹便覽)

【麻黃去節。以蜜一匙同炒。良久。以水半盞煎數沸。去沫。再煎去三分之一。去滓。乘熱服。避風。其痘復出。(幼幼新書)

【痘瘡潰爛】用蕎麥粉頻頻敷之。有效。(王氏痘疹方)

【痘瘡不收】牆上白螺螄殼洗淨。煨研搽之。(醫方摘要)

②象牙屑。銅銚內炒黃紅色為末。每服七八分或一錢。白開水下。(王氏痘疹方)

【痘瘡不起】葶藶搗汁。和酒釀。傾溫服之。但不可太熱。慎之。(良方集要)

【痘毒入心】始有白泡。忽搗入腹。漸作紫黑色。無膿。日夜叫亂者。鬱金一枚。甘草二錢。半水半盞。煮乾。去甘草切片。焙研為末。入真龍腦炒五分。每用一錢。以生豬血五七滴。新汲水調下。不過二服愈。(麗安常傷寒論)

【痘後生瘡】黃豆燒黑。研末。香油調塗。極有效驗。(鮑氏小兒方)

【痘後癰毒】綠豆亦豆。黑豆等分為末。醋調。時時掃塗。即消。(醫學正傳)

②亦小豆末。和雞子白調勻敷之。初起者即瘥。(痘疹要訣)

【痘後目翳】天花粉。蛇蛻洗焙。等分為末。另將羊肝批開。入藥在內。米泔水煮熟。切食。(齊東野語)

②殺精草為末。以豬肝片蘸食之。(邵真人濟急方)

【痘後風眼】初生小兒。臍帶血。乘熱點之。立愈。(海上名方)

【痘後癩痕】雞子一箇。酒醋浸七日。白殭蠶二七枚。和勻塗之。甚效。(聖惠方)

②黃明膠炒研末。溫酒調服一錢。痘已出者。服之無癩。未出者。服之瀉下。(普濟方)

③羊脂二具。羊乳一碗。甘草末二兩。和勻塗之。明旦以猪蹄湯洗去。(千金方)

④密陀僧二兩。細研。入乳汁調和。夜塗旦洗。(聖惠方)

【痘入目中】猪血點之。即不生翳。或以鱈魚尾血點之。即移開。頗驗。(幼科發揮)

③浮萍陰乾為末。以羊肝半箇。同水半盞。煮熟。搗爛絞汁。調末服。甚者不過

一服。已傷者。十服見效。(危亦林得效方)

【避豆入目】凡痘初起時。將獨女胭脂搗眼。則痘不入目。一見痘時。牛蒡子不拘多少。其母嚼碎。貼兒顛門。不入目。效驗特甚。(保幼大全)

【稀痘法】七八月或三伏日。或中秋。煎蘆鬚如環子脚者。陰乾。於除夕夜煎湯浴小兒。則可免出痘。(唐瑤經驗方)

②除夕黃昏時。用大黑魚一尾。煮湯。浴兒過身。七竅俱到。不可嫌腥。以清水洗去可也。(醫方摘要)

③橄欖核搗碎。研磨如粉。雜入粉麩中。糕餅。隨意與小兒食之。服至斤許。永不出痘。(歧天師傳)

④紫草一錢。陳皮五分。葱白三寸。新汲水煎服。(直指方)

增補單方大全第五編終

新體
廣註素靈類纂

全書三冊價洋一元

素問靈樞為習醫必讀之書第原書浩繁則汪詛庵之類纂尚矣惜註釋不明初學苦難索解本書廣集十餘家之名註衍為最淺顯之文字無義弗明無奧弗透即稍通文理之人開卷即能了解誠初學之津梁也

◎神州醫學編輯社出版

批葉
溫熱經緯

全書四冊定價六角

王潛齋溫熱經緯近代醫家奉為金科玉律者也第劃分伏氣外感則猶未免乎一家之言揚州名醫葉子雨力攻其謬逐條評摘再易寒暑稿經四易而成此書凡讀王氏書不可不讀此書讀一書而得兩書之益讀一書而不為一書所囿也

◎上海廣文書局發行

第六編 皮膚病門

【美容】括樓瓢三兩。杏仁一兩。猪胰一具。同研如膏。每夜塗之。令面光潤。冬月不皴。(聖濟總錄)

②以牛乳二分。與蘋菓液汁一分相和。晨夕洗滌。必能容光煥發。(楊堯輔方)

③將番薯切開。取其滲出之白汁。塗於面。必日益嬌嫩。(保慶集)

④雞子三枚。酒浸。密封七日。每夜以白敷面。雖黑亦可使白。(普濟方)

⑤每晨洗臉。取豆腐少許。以之擦面。能使白嫩清潔。(醫宗金鑑)

【雀斑】茄子切成小片。擦面部。效如神。(十便良方)

②安息香酒一分。薔薇花露四十分。和勻。用以洗面。可去斑點。神效非常。(臨牀醫典)

③白茯苓研末。加白蜜調和。每夜敷之。

七日見效。(醫宗金鑑)

④山柰子。鷹糞。密陀僧。蓖麻子等分。研勻。以乳汁調之。臨卧時塗。平旦洗去。(衛生易簡方)

⑤蓖麻子仁。密陀僧。硫黃各一錢。為末。用羊骨髓和勻。夜夜敷之。(葉氏摘玄方)

⑥黑牽牛末。雞子清調和。夜敷旦洗。(葉氏摘玄方)

【粉刺】雲母粉杏仁。等分為末。牛乳調和。略蒸敷之。(聖濟總錄)

②白薇二分。杏仁半分。雞矢白一分。為末。雜水拭面。良效。(肘後方)

③山慈姑根。夜塗旦洗。(普濟方)

④益母草燒灰。嬰條石各等分。和勻。調敷。(墨娥小錄)

【酒皴】杏仁去皮。搗和雞子清夜塗之。清晨以煖酒洗去。(孟詵食療本草)

②白薇。白石脂。杏仁各半兩。為末。雞子清調塗。(御藥院方)

③浮萍。日貼之。並搗汁飲少許。(外臺秘要)

④馬齒莧煎湯。日洗。極效。(聖惠方)

⑤鷓鴣骨燒研。入白芷末。猪脂和塗。(葉氏摘玄方)

⑥生硫黃半兩。杏仁二錢。輕粉一錢。夜夜搽之。(瑞竹堂方)

⑦馬蘭子花。杵塗敷佳。(肘後方)

【面上黑氣】半夏焙。米醋調敷。不可見風。不計次數。從早至晚。如是三日。皂角湯洗下。面瑩如玉。(葉氏摘元方)

②白石脂六兩。白薇十二兩。為末。雞子白和。夜塗旦洗。(聖濟總錄)

③白殭蠶末。水和搽之。(聖惠方)

④天門冬和蜜搗爛。日日洗面。即白。(纂要奇方)

五 雞子一枚。去黃。以硃砂末一兩。入雞子內封固。伏雌雞下抱。至雞出。取塗面。即去。不過五度。面白如玉。(外臺秘要)

面上癩痕。真玉。日日磨之。久則自滅。(聖濟總錄)

二 馬蘭子自落葉並子。煎湯頻洗。數次自消。(壽域神方)

三 蒺藜子。山梔子各一兩。為末。入醋調和。夜塗旦洗。(救急方)

四 禹餘糧。半夏等分為末。雞子黃和敷。先以布拭乾。勿見風。日三十日。雖十年者亦滅。(聖濟總錄)

千層瘡。破口時。用新鮮橄欖核。無鮮者。用鹽橄欖核。以水煎去鹽味。亦可。燒灰。和雞蛋油。以鴨毛調敷。(醫宗金鑑)

剃髮。以煙袋中之煙油。加水十分之一。煎之。成膏。搽極效。(十藥神書)

二 百草霜。和豬脂和之。(楊起簡便方)

三 雄黃豬膽汁。和敷甚效。(聖濟總錄)

四 白麩豆豉和研。陳醋調敷。(普濟方)

五 羊肉如作脯法。炙香。熱搗頭上。不過數次。自瘥。(肘後方)

六 海蝶蛸。白膠各三錢。輕粉五分。為末。先以油潤淨。乃將末搽之。二三次即愈。(衛生易簡方)

七 石炭酸五分。蒸餾水九十五分。抹之一星期內。即愈。(萬金方)

八 雄雞頭三個。燒灰研。和水敷之。約數次愈。(養生立論)

髮落重生。苜麻子汁。煮粥頻食之。自能生髮。(聖濟總錄)

髮槁不澤。桑根白皮。煮汁洗髮。或為末。羊膏和塗。(千金方)

令髮長黑。生麻油桑葉煎過。去滓。沐髮。(普濟方)

三 棗樹根三尺。向東者佳。橫安甑上。蒸之。兩頭汁出。收取敷髮。易長又黑。(聖惠方)

年輕白髮。將白蜜塗其拔去之毛孔。即生黑髮。如不生。取梧桐子搗汁塗之。無不生者。(醫學指南)

二 土馬駿。五倍子。半夏各一兩。生薑二兩。胡桃十個。膽礬五錢。為末。搗作一塊。每以絹袋盛少許。入熱酒浸汁。洗髮一月。神效。(聖濟總錄)

沐髮令香。雞蘇煮汁。或燒灰淋汁。沐之。(普濟方)

二 以佩蘭葉煎水洗之。可除髮臭。(十全博救方)

頭皮屑。牛蒡葉搗汁。熬膏塗之。至明。皂莢水洗去。(聖惠方)

三 瓦松曝乾。燒灰淋汁。熱洗。不過六七次愈。(聖惠方)

三 山奈。甘松。香零。陵香各一錢。樟腦二分。滑石五錢。共為末。夜搽頭上。清晨篋去。(水雲錄)

頭虱。水銀和蠟油搽之。一夜皆死。(葉氏摘元方)

① 藜蘆末搽之。(直指方)

② 美眉 晨起以五十倍之硼酸水反覆洗其眉毛更以刷浸於綠茶煎汁之中竭力摩擦之如是日久眉際自現出非常之美態惟斯時苟覺發癢不可手搔須以軟刷徐徐擦之。(醫方選要)

③ 口臭 常含白梅令口生香。(本草綱目)

④ 口中如膠而臭知母地骨皮桑白皮山梔麥門冬甘草鹽湯喻早中汲井中第一汲水含之吐棄廁下即瘥(本草綱目)

⑤ 明礬入麝香為末擦牙上效。(生生編)

⑥ 口中氣臭用香白芷七錢為末食後井水服一錢。(普濟方)

⑦ 霍香洗淨煎湯時時含漱。(摘元方)

⑧ 唇裂 白梅花瓣貼之神效開裂出血者即止。(集效方)

① 香油頻頻抹之。(物類相感志)

② 桃仁搗和豬脂敷。(海上名方)

③ 煉過豬脂日日塗之即效。(十便良方)

④ 橄欖炒研豬脂和塗之。(海上方)

⑤ 嚼角瘡 以湯罐底水或篋蓋上汽水塗之即愈。(衛生家寶方)

⑥ 取新鮮杉木細枝一條用猛火燒其上端末端有白色之漿流出即取塗之。(醫林正宗)

⑦ 美髯 五倍子一兩銅綠三錢炒紅用醋淬之醋不宜多再炒再淬如此三次研碎青礬二錢炒研生鹽五分炒

先將五倍子研碎同銅綠炒至出油或團放地上攤冷再將各藥研碎用好燒酒調成麩糊樣蒸至鏡面為度不宜久蒸先用皂角水洗鬚一次將藥乘熱濃濃塗之俟乾用熱水洗去其鬚光潤如漆可保兩月不白。(醫方摘要)

① 腋臭 礬末二分小粉八分撒布於棉縛於腋下時用香皂水洗滌之其臭自除。(醫方大成)

② 龍腦一分明礬二分混和研作細末撒布腋下頗驗。(醫經小學)

③ 田螺入密陀僧麝香同搗爛捻成餅掩腋下縛定其效甚良。(墨娥小錄)

④ 用水楊酸三分小粉三分研和撒腋窩。(日本藥局方)

⑤ 汗斑 密陀僧末以黃瓜蒂蘸擦數次即愈惟須先用水洗淨汗垢然後擦之。(梁氏總要)

⑥ 以硼砂研極細末用黃瓜頭蘸而擦之數次即愈永不復發。(活人心鏡)

⑦ 汗臭 洗浴水中加安母尼亞水二三滴和水中肌肉潤滑是患可免。(臨牀醫典)

⑧ 龜裂 以酒酵豬脰洗并傳之。(肘後方)

⑨ 五倍子末同牛骨髓填納縫中即安。

(醫方大成)

三 白芨末水調塞之勿犯水(濟急方)

四 川椒四合以水煮之去滓清半食頃取出令燥須臾再浸候乾塗猪羊腦髓極妙(勝金方)

五 以酸化亞鉛和凡士林羊毛脂三種混合為膏擦凍處即愈(日本藥局方)

六 用樟腦油與安母尼亞水擦之亦有大效(西藥大成)

七 入水後即以乾手中擦之使無濕氣更以兩手之背及掌互擦至數十次可免龜裂(衛生學粹)

瘦手使肥 乾癢之手浸沸水內以可乳油或他種乳油摩擦之五分鐘後置冰冷水內急伸出以毛巾拭乾熱手忽為冷水所激乳酪之屬悉閉毛孔內能使新肌肥發(生理學粹)

指上肉刺 往往拔去復生觸者甚痛殊覺不便可於入廁時順手在糞桶

邊上磨之越一宿即萎自落(衛生家寶方)

雞眼 軟竹布塗松節油貼患處日換二次早晚行之其效極速閱數日雞眼自能消去(生理衛生學大意)

二 以生石灰一塊如鈕大小再以糯米與礆研末同冷水少許調和於小盆中經二三時即成糊每晚臨睡搽少許數日即愈惟初搽時須將雞眼用刀剝開少許方有效力(玉機微義)

三 取萬年青葉搗爛敷患處可以斷根且極效驗(嬰寧心要)

四 搗荸薺一個和蕎麥麵少許貼患處不過一晝夜便落甚妙(錄驗方)

足上生繭 切忌用刀用荸薺半箇貼患處過夜次晚再貼五六次其繭連根脫出(蘭室秘藏)

二 用糯稻根泡在沸水中將老繭浸入其中連洗數日漸漸薄自能脫出(醫錄錄)

足上臭汗 蘿蔔煎水頻洗數次即愈(儒醫集要)

足冷如冰 生附子二錢好酒麴一錢共為末燒酒調敷足心(圖經本草)

嵌甲作痛 以橘皮煎水浸洗輕輕剪甲再以虎骨末敷之其痛即止(便民圖纂)

足小奇癢 癢則用硫磺擦之擦後再用硫磺厚敷布包穿襪一日一換數次斷根切不可用手抓擦(生養必用方)

二 蚌蛤粉乾擦之亦妙(壽域神方)

遠行足趼 行路過多足上起泡水調半夏末塗之一宿即消(永類鈔方)

二 水和生麩塗泡上即愈(海上名方)

遠行健步 細草防風白芷草烏各等分共為細末凡人將行遠路者先將鞋底內用水微噴濕將此藥搽勻於內雖日行數百里足不腫痛(袖珍方)

【瘰癧】糯米一粒。浸濃鹹水中。俟柔軟後。挑取少許點瘰。但不可太多。恐傷好肉。(醫學啟源)

【斑蝥】三箇。苛性鉀一分。糯米一匙。鹼少許。共研細末。再加生石灰少許。盛磁瓶內。入清水化爛。約一日夜。點瘰。上忌亂塗。因性烈之故。(西藥大成)

【藜蘆末】五兩。水一大碗。淋汁銅器內。煮成膏。以針微刺破點之。不過三次。即效。(聖惠方)

【可用稻柴心】一條。向火焚之。即捲作團形。再用針挑破瘰。將此灰塗上。略作痛。痂落後。泯然無跡。(醫學綱目)

【時用檸檬之皮擦之】即去。(衛生學粹)

【堅頭肉】良好之肌膚。每有多肉突起。既不雅觀。又為贅疣。祇須用紅菱柄擦之。即永不復生。(王氏易簡方)

【一名千日瘡】以洋油塗之。數日即可脫根。(丹溪纂要)

【白癩風】硫磺密陀僧為末。搽之。(應驗良方)

【杏仁連皮尖】每早嚼數粒。搽癩令赤。夜卧再用。(聖濟總錄)

【白痰黎子】六兩。生搗為末。每開水下二錢。日二服。一月絕根。(孫真人方)

【用水楊酸二分。甘草五分。酒精三分。混和塗之】(日本藥局方)

【紫癩風】雄黃硃砂為末。以茄蒂蘸擦。其風可活。(應驗良方)

【醋磨知母擦之】日三次。(衛生易簡方)

【用硫磺白礬等分為末。每以黃丹津液和塗之】一月見效。(宣明方)

【癩疥】用胡桃肉數枚。搗爛。再以紅燭油與水銀三分。混和搽敷。奏效。(龔信醫鑑)

【硫磺末以雞子煎香油調搽極效】(救急良方)

【蘭茹末入輕粉香油調敷之】(多能)

【郵事】

【川烏頭生切】以水煎洗甚佳。(聖惠方)

【凡士林入硫磺末調和敷之】屢試屢驗。(臨牀醫典)

【猪脂煎羌花熬膏敷之】(肘後方)

【癬】每用胡粉盛絹袋中。撲之。能絕根。(張文仲備急方)

【狼毒末塗之良】(聖惠方)

【皂角和醋熬煎成膏塗敷患處數次便愈】殊驗。(法生堂經驗方)

【石炭酸五錢。橄欖油一兩。薄荷油一滴。混和分蘸毛巾貼患處】(臨牀醫典)

【羊蹄根杵絞汁入輕粉少許和如膏塗之三五次愈】(簡要濟眾方)

【牛皮癬】石榴皮蘸明礬末抹之。自愈。(直指方)

【用黃牛皮一塊燒存性加麻油調和以鵝翎拭患處百發百中】(經心錄)

【荷葉癬】荷葉蒂晒乾研末香油調敷數日脫去厚皮一層癬亦不復發矣。

(楊氏頤真堂經驗方)

② 槿樹皮為末醋調重湯煮如膠敷之。

(王仲勉經效方)

【鱗屑癬】撒雨沙根一兩。茴香五分。薄荷葉一分。湯煎。作三日服。數星期愈。

(西藥大成)

【梅花癬】用清油一碗。以小竹子燒火入內煎沸。滌猪膽汁一箇。和勻。剃頭擦之。二三日即愈。勿令日晒。(普濟方)

方)

【咬髮癬】以生薑浸高粱酒內。取出。擦諸患處。其效如神。(醫方選要)

【風疹】赤土研末。空心溫服一錢。(御藥院方)

② 白朮為末。酒服一匙。日二服。(千金方)

③ 牛蒡子炒浮萍等分。以薄荷湯服二錢。早晚各一服。(古今錄驗)

④ 赤小豆荊芥穗。等分為末。雞子調塗之。(石室秘錄)

⑤ 枳實醋浸。火炙熨之。即消。(外臺秘要)

⑥ 蠶沙一升。煮水去滓。洗浴避風。其疹即退。(聖惠方)

【痱子】綠豆粉二兩。滑石一兩。和勻撲之。或加蛤粉二兩。亦佳。(簡易方)

② 升麻煮服。並洗。(千金方)

③ 乾東壁土末敷之。隨手而愈。(普濟方)

【漆咬】急取羊乳塗之。(墨娥小錄)

② 速用芥菜煎湯洗之。即愈。(嶺南衛生方)

【坐板瘡】黎明摘桑葉。即有白汁。以磁器承之。搽患處二次。即愈。(蕭靜觀方)

③ 蠶豆莢殼燒灰。菜油調搽。即愈。(纂要奇方)

③ 絲瓜皮。焙乾為末。燒酒調搽。(攝生

眾妙方)

【凍瘡】鴿子糞煎水洗。但不可入口。(應驗良方)

② 用生南瓜切片。擦患處。覺熱。即換。早晚二次。行之數日。必愈。(醫林集要)

③ 用隔年冬瓜皮。及辣椒。伏日燒水洗之。即不復發。(醫學集成)

④ 柿子皮。煨灰。存性。熱菜油調敷。七日必愈。甚驗。(小品方)

⑤ 蘿蔔菜。橘皮。煎湯先洗。用蟹殼燒灰研末。麻油調敷。神效。(經驗方)

⑥ 三伏日。以青辣椒數個。用剪刀開。將剪處向凍處。皮上頻擦之。使辣汁擦透。少頃即灼痛難當。須忍耐之。必無可如何時。方許入冷水洗去。以後交冬。無論如何。永不生凍瘡也。累驗。(顧介盒秘方)

⑦ 橄欖核。燒灰。存性。研末。加輕粉少許。香油調搽。神效。(古今錄驗方)

⑧ 暑伏時。搗大蒜為泥。敷在上年生過

凍瘡之處。過一日一夜。洗去。三四日後。又敷一次。以後雖極寒。亦斷不發生凍瘡。(龔氏手記)

⑨老絲瓜燒存性。和臘豬脂塗之。(海上方)

⑩白薇黃蘗。等分為末。生油調搽。(談楚翁方)

⑪生薑自然汁。熬膏塗。(暇日記)

⑫瓦楞子。煨研極細。以麻油調搽。濕則乾搽。數日全愈。此秘方也。(桃和眾至寶方)

⑬皂莢寸許。入火爐。燒煙熏患處。未破者。日熏三五次。已潰者。多至十數次。無不立愈。屢試屢驗。奇妙無匹。(壽域神方)

⑭櫻桃搗汁。擦患處數次。冬日永不復發。惟以後慎勿再食。(濟急方)

⑮臨卧時。用綿花浸洋油。包患處。數次即愈。皮破潰爛者。取大黃末。用水調敷。即可止痛。(鄭氏方)

第七編 花柳病門

【梅毒】輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗肉

各二錢搗丸分作三服第一日雞湯

下第二日陳酒下第三日茶下五日

瘡乾七日痂落神效(楊誠經驗方)

②雞蛋一枚去黃留白入輕粉一錢攪

勻紙糊飯上蒸熟食之(楊誠經驗

方)

③紹興酒及小磨麻油二味每日清晨

隔湯燉熱飲時須要調和蓋酒在下

油在上麻油十分酒七分如餘毒未

消者再用荷葉濃煎作茶飲連服七

日即愈(居家必用方)

④黃土一升澄清作水蚯蚓糞二兩生

大黃一兩生甘草五錢萱草根五錢

水煮連前黃土水兌服食後便瀉隔

一日再服如是數劑其毒自消(方

外奇方)

⑤初起時即治即愈羊角核桃殼俱燒

存性等分研細末每用錢半好酒調

早晚各一服四日毒從大便出如血

如膿漸減作每日一服半月毒盡後

再服熟地白芍當歸人參白朮白茯

苓炙甘草以補之虛則多服數劑(

濟生秘覽)

⑥雄黃兩前茶生芝麻各四兩共為細

末黃米磨細粉糊為丸桐子大每晨

開水下三錢(張三半仙傳方)

⑦土茯苓一兩生薏苡仁銀花防風木

瓜木通白蘚皮各五分皂角子四分

煎飲日三忌飲茶及牛羊雞鵝魚肉

燒酒法麩房事(聖濟總錄)

⑧槐花四兩畧炒入酒二盞煎十餘沸

熱服(醫學集成)

⑨紅棗三斤杉木作薪吹棗逐次鉗出

悶炭棗爛為度剝去皮核將悶炭磨

末和棗肉搗勻丸如彈子大每日任

意土茯苓湯下(集簡方)

⑩木瓜一味研末水丸每日土茯苓湯

下三錢(普濟方)

⑪楊梅瘡爛古牆上螺螄殼辰砂等分

片許少許為末擦之(聖惠方)

⑫楊梅穿鼻者龜板酒炙三次取末二

兩石決明童便淬煨末二錢硃砂水

飛研二錢黃米飯搗丸桐子大每服

一錢土茯苓湯好酒下服過硃黃者

水芹菜煎服(雜興方)

【下疳】兩前茶麻黃各一錢五分用連

史紙方七寸許鉛粉錢半擦紙上鋪

前二藥捲成筒子火灼存性研末加

冰片各一分研勻用之(外科全書)

⑬杏仁燒黑研成膏時時敷之(永類

鈐方)

⑭蠶繭盛頭垢再以一繭合定煨紅出

火毒研搽(楊氏家藏方)

④ 爐甘石、火煨醋淬五次一兩。孩兒茶三錢。為末。麻油調敷。立愈。(即真人方)

⑤ 輕粉末乾摻之。即收口而愈。(積善堂方)

⑥ 白鵝一隻。以白米養三四日。後取鵝糞。置新瓦上焙乾為末。每糞一錢。和丹砂。冰片各一分。研極細。另用米泔水洗淨。患處將藥敷上。二三次。即有效驗。(褚氏遺書)

⑦ 採新鮮繡針草根一大握。煎湯洗之。雖潰爛不堪者。治之亦無不效。(本草權度)

⑧ 雄黃礬石各二分。麝香半分。三味治下節。為粉。傅瘡上。即愈。(千金方)

⑨ 苦參、防風、露蜂房、炙甘草各等分。剉碎。水煎。濃汁洗瘡。(醫學入門)

⑩ 內外疔疔。冰片二分。輕粉六分。麝香五分。為細末。摻孔內。(瘡瘍全書)

⑪ 青橄欖燒灰。孩兒茶各一錢。冰片三

分。為細末。先用杏仁四分。去皮尖另研。又加輕粉四分。和研如泥。先傳患上一日。米泔洗之。後用前摻藥。(瘡瘍全書)

⑬ 密陀僧、黃藥各一分半。膩粉一錢。麝香少許。先洗瘡拭乾。傅之。甚者三四次。即痊。(必效方)

⑭ 陰頭生瘡。人不能治者。鼈甲一枚。燒研雞子白和傅。(千金翼)

⑮ 先以大小蘆地骨皮煎湯洗淨。再用黃柏、黃芩、宮粉、珍珠、冰片研細敷之。效。(簡便單方)

⑯ 雞卵殼炒研。油調敷之。(外臺秘要)

【橫痃】雞子一個。開孔入紅娘子六個。紙包煨熟。去紅娘子。食雞子以酒下。若小便淋瀝。出血。即愈。(陸氏積德堂方)

⑰ 黃明膠。水溶化塗之。即消。(直指方)

⑱ 黃拈萐一個。黃連五錢。水煎。連服即效。(雞峯備急方)

⑲ 芫根搗水服。以渣敷之。得下即散。(瀕湖集簡方)

⑳ 冬葵子。酒服二錢。(儒門事親)

㉑ 鯽魚一枚。山藥五錢。同搗塗敷。(醫林集要)

㉒ 貫眾。酒服二錢。甚良。

㉓ 雄香、乳香各二錢。黃柏一錢。共研。新汲水調塗。(本事方)

㉔ 胡桃兩個。連殼杵碎。澤蘭、白芨、松蘿茶各三錢。井水河水各一碗。煎取四分。和酒服。一劑。知。二三劑。愈。(三因方)

㉕ 地榆四兩。土炒穿山甲二片。白酒三碗。煎一碗。空心服。即有膿者亦愈。(醫林正宗)

㉖ 穿山甲半兩。猪苓二錢。並以醋炙研末。酒服二錢。外以穿山甲末和麻油輕粉塗之。(直指方)

㉗ 地榆四兩。生甘草、銀花各一兩。白芷三錢。皂角刺二錢。五分。水二碗。煎減

半空心服（杏林摘要）

【魚口】隔年陳水仙花兜和水在粗鉢口上磨成濃汁用杯盛貯搽於患處未潰者搽之即散已潰者膿即提出再用野菊花煮水洗之（潔古家珍）

③夏枯草五錢蒼耳子三錢煎水常洗後用生荔枝仁青果核仁桃仁各三錢共浸醋內一宿取搽然後用黃柏燒灰同松花粉撲之如是數劑無有不愈（濟生拔萃方）

④五倍子炒黃研末入百草霜等分以陳醋塗於患處一日一夜即消（杏林摘要）

⑤瓦松焙乾為末雞蛋白敷不出膿愈（應驗良方）

⑥帶粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙水盡為末入皂角炭少許作四服湯調頓服效（丹溪心法）

⑦雄黃乳香各二兩黃蘗一兩為細末用新汲水調敷腫處自消（奇效良方）

方）

①生薑蒲根搗敷之（證治要訣）

②葱根和蜜搗敷以紙密護之外服通氣藥即愈（證治要訣）

③雞子清調臘肉油塗（醫林集要）

④鯽魚一尾山藥五錢同搗敷之（醫林集要）

【赤白濁】石菖蒲草薢益智仁烏藥各一兩水煎不拘分服（墨娥小錄）

②雞蛋一個頂上敲損一孔入生大黃末三分在內紙糊煮熟空心服四五朝即愈（經驗良方）

【赤濁】遠志甘草水煮八兩茯神益智仁各二兩為末酒糊丸梧子大空心裏湯下五十九（普濟方）

②芫絲子麥門冬等分為末蜜丸梧子大鹽湯下每服七十九神效（醫學入門）

③乾紅蓮子連心衣六兩炙甘草一兩共研末每一錢燈心湯下（衛生家

寶方）

【白濁】婦女戴過夜之茉莉花不拘多少代茶飲之良效（本草萬方鍼線）

②野芝麻炒黑研末以陳酒沖服奇驗（余居士選奇方）

③蕎麥炒焦為末雞子白和丸每服五十九鹽湯下日三服（濟生方）

④糯稻草煎濃汁露一夜服之（葉氏摘元方）

⑤陳冬瓜仁炒為末每空心米飲湯服五錢（救急良方）

⑥清明所掃簷上之柳條煎服治白濁神效（並園臆草）

⑦桑螵蛸炙白龍骨等分為細末每服二錢空心用鹽湯送下（外臺秘要）

⑧頭生雞蛋五個各開小孔每入白果肉二枚飯上蒸熟每日服一個可愈（聖惠方）

⑨新鮮薏苡仁根搗爛絞汁一碗或滾酒或滾水沖空心服效（博濟方）

⑩生蘿蔔剉空。留蓋。入吳茱萸填滿。蓋定。籤住。糯米飯上蒸熟。取去茱萸。以蘿蔔焙研末。糊丸。桐子大。每服五十丸。鹽湯下。日三服。(普濟方)

【腎虛白濁】肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓。等分為末。米飲湯糊丸。梧子大。每次乘湯下三十九丸。即愈。(聖濟總錄)

②五味子一兩。炒赤為末。醋糊丸。梧子大。每次醋湯下三十九丸。(經驗良方)

【氣虛白濁】黃芪鹽炒五錢。茯苓一兩。為末。每服一錢。白開水送下。(經驗良方)

【虛勞白濁】羊骨為末。酒服一小匙。日三度。(千金方)

【脾虛白濁】羊脰骨灰一兩。薑製厚朴末二兩。麴糊丸。梧子大。米飲湯下百丸。早晚各一次。(集簡方)

【小便如膏】茴香炒。苦楝子炒。等分為末。每食前酒服二錢。(保命集)

【小便如泔】王瓜根一兩。白石脂二兩。

菟絲子酒浸二兩。桂心一兩。牡蠣粉一兩。為末。每服二錢。粥飲湯調服。(衛生寶鑑)

【小便尿血】元胡索一兩。朴硝七錢半。為末。每服四錢。水煎服。(活人書)

②車前草搗汁一杯。空心服。或用車前子五錢。濃煎。(外臺秘要)

③葱白一握。鬱金一兩。水一椀。煎二合。溫服。一日三次。(普濟方)

④琥珀為末。每服二錢。燈心湯下。(直指方)

⑤茅根煎湯。頻飲為佳。(談堊翁方)

【小便血條】淡豆豉一撮。煎湯。空心飲。或入酒服。(危亦林得效方)

【勞淋】勞傷虛損。小便不出。小腹急痛。尿出白汁。一點一滴者。是用連壳核桃。黃泥塗裏。文火將黃泥燒至黑色。取淨肉。有油者不用。研為細末。早晚用鹽開水。空心送下三錢。三日即愈。甚效驗。(普救方)

②船底青葉苔一團。約如雞子大。水煎服。(奇效良方)

【血淋】黃芩一兩。水煎熱服。(千金方)

②苧根煎湯。煎服大妙。(聖惠方)

③葵花根。車前子一錢。水煮。日服之。(簡便單方)

④茄葉重乾為末。每服二錢。溫酒或鹽湯下。隔年者尤為佳妙。(經驗良方)

⑤桃膠炒木通。石膏各一錢。水一盞。煎七分。食後服。(楊氏家藏方)

⑥晚蠶蛾為末。熱酒服二錢。(聖惠方)

⑦海螵蛸末一錢。生地黃汁調服。(經驗良方)

增補單方大全第七編終

第八編 急救門

救縊死

凡男女縊死。身雖僵冷。尚可救活。不可割斷繩索。抱起解下。安放平坦處。仰面朝上。頭要扶正。先將手足慢慢曲彎。然後將大小便用綿軟之物塞住。不令泄氣。一人坐於頭前。兩腳踏其肩。揪住頭髮。將縊者之手拉直。令喉項通順。再用二人將筆管入耳內。不住口吹之。不住手摸撫其胸前。用雞冠血滴入喉鼻之中。男左女右。男用雄雞。女用雌雞。片刻即能甦活。如氣絕時久。照此救法。務要多吹多摸。勿謂已冷。忽略不救。醒後用陳皮八分。厚朴一錢。肉桂五分。製半夏一錢。乾薑五分。甘草三分。煎服。應驗良方。

急將縊者解下。輕扶仰臥。將活雄雞一隻倒懸。流出口涎。入人口內。自活。救急方。

炒熟生鹽

兩大包。從頸喉使至臍下。冷則隨換。不可住手。並用人對口。以氣灌之。其活更快。聖濟總錄。

以半夏為末

灑冷水作丸。如豆大。納入鼻中。即甦。心溫者一日可治。此法兼治五絕。直指方。

五慈心刺鼻

出血。男左女右。儒門事親。

六自縊者

勿斷繩。放下。用皂角末細半末吹鼻。本草綱目。

救溺死

初救起時。尚有微氣。或胸前尚暖。速令生人脫貼身衣更換。抱攬身上。將溺人微倒側之。令其腹內水流。出若水往外流。即有生機。一面用粗紙燒。燃取煙薰其鼻竅。稍薰片時。即用皂角研細末。吹入鼻竅。但微有噴嚏。即可得生。應驗良方。

以酒罈一個

燒紙片一把。放罈內。急

以罈口覆臍上

冷即再燒。紙片入罈。覆臍。去水。即活。證治要訣。

三先打壁泥

一塔。置地上。以溺人仰臥其上。更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣喻入泥間。其人遂甦。雖身僵氣絕。亦可救活。三因方。

四急用甕中灰

不拘多少埋之。惟露七孔。良久自甦。蓋灰性暖。而能拔水也。本草綱目。

五以溺者仰卧枕上

從足放高。用鹽擦臍中。待水自流出。切勿倒提出水。救急方。

六溺死一宿者

尚可救。搗皂莢。綿裏納下部。須臾出水。即活。窮鄉便方。

救凍死

用氈或草薦捲之。以索繫定。放平坦處。令二人相對推踏。令滾轉往來。如扞毘法。候四肢溫。即活。應驗良方。

②炒竈灰布包敷心上。可以急救。(墨城小錄)

③凍死及落水凍死者。但胸有微熱。即可救活。急須脫去濕衣。換他人貼身暖衣包之。不可令其近火。須用布袋盛炒熟爐灰。放在心口。如冷。即換熱者。待開眼。以溫酒薑湯灌之。即活。(寇氏衍義)

④救跌死。急扶起。盤脚坐地。以手提其髮。將生半夏末。約豆大。吹入鼻中。以生薑汁灌之。祇要心頭微溫。雖至一日亦活。再用白糖調水與服。散其瘀血。或加童便灌之。(指迷方)

⑤救驚死。速以醇酒一二杯。溫熱灌之。自活。(錢氏篋中方)

⑥救打死。松節搥碎。一二升。入鐵鍋內。炒起青煙為度。以老黃酒二三升。四圍冲入。即濾淨。候半熟。開牙灌入。即活。(應驗良方)

⑦救自刎。須救在早。遲則額冷氣絕。乘

初刎時。氣未絕。身未冷。一面將頭墊曲。合攏刀口。拭去血。一面急用大雄雞一隻。快手輕去其毛。生剝其皮。乘熱包貼。患處完好。安穩枕卧。自然漸漸甦醒。善為調理。不久如常。(應驗良方)

⑧救觸電。速卧地上。以泥屑蓋其身。則電化去。不致身受大傷。(急救須知)

⑨雖已昏迷氣閉。祇須潮潤沙土鋪地。令卧於上。再將潮沙滿鋪於身。僅留口鼻。使其呼吸。即醒。(臨牀醫典)

⑩救吞金。用生韭菜。團團搓作一團。吞下。接續連吞。約四小時。韭菜裹金。從大便中瀉下。(乾坤生意)

⑪雞蛋清二三枚。用新棉花搥極碎。攪入蛋清內灌下。則金從大便而出。(醫宗金鑑)

⑫其法甚易。取黃泥一塊。作小丸。用開水服下。吞下之。金即出。屢試屢驗。(六科準繩)

⑬誤吞金環及釵股等物。白糖二斤。一頓漸漸食之。多食亦佳。(千金方)

⑭曝韭令萎。蒸熟。勿切。食一束。即出。(丹溪心法)

⑮飲生鵝血。一二日內。自可與大便同出。(本事方)

⑯救吞鴉片。吞煙輕生者極多。或將死而未死。只要灌得下藥。急用明雄黃二錢。雞蛋清二枚。生桐油一兩。若和燒酒吞下者。加葛花三錢。炒黃為末。各味均用河水調和。服下。即吐。如未和燒酒吞食者。不用葛花。或所吐之煙末。盡或不肯速吐。可用硬鴨毛。或硬雞毛。蘸桐油掃咽喉。必令其煙毒吐盡。然後進以稀粥。則胃氣未安。食之又必作吐。再吐煙之後。即用生甘草五錢。食鹽五分。明白礬五分。金銀花五錢。土茯苓五錢。煎湯服之。以追餘毒。愈後即多食柿餅。以解桐油之毒。(急救須知)

(二)若於急迫之際。用活鴨子血多多灌之。神效。或用巴牆草搗爛。煎湯冷服亦佳。(名醫錄)

(三)用銅綠、膽礬各五錢。黃連四分。研為極細末。每用一分許。男左女右。用筆管吹入鼻中。即嘔。迨嘔清後。再以甘草四兩煎湯服之。生命可救矣。(古今錄驗方)

救吞火柴 皮絲煙四兩。清水一面盆。燒至將滾而不沸。遂將皮絲如下麩然。拌入鍋內。勿令過性。在夏布上濾之。趕將皮絲湯。騰至溫和適口。用管灌入。勿容其人穩睡。多人攙扶圍行。不久定即嘔出。用脚盆盛之。再灌再嘔。嘔至盆內無紅頭而後已。(經驗後方)

(二)膽礬五釐。溶化於清水一茶杯中。每五分鐘服一次。連服四五次。必將火柴頭吐出。乃再用陳松節油二錢半。蛋黃一枚。溫水二兩半。加白糖兩調羹。

調羹。每隔半時服一調羹。因膽礬含有一部份之銅質。與火柴中磷質相遇。即擁護磷之表面。使不易消化。誠第一妙藥也。(家庭衛生論)

(三)從速用生雞蛋白。儘多傾入。服毒人口。蛋白涼滑糝膩。火柴頭經裹。不能發展炎毒。再助以嘔吐之法。使之盡情傾吐。實可起死回生。(日本治療新報)

救痰厥 巴豆搗爛。綿紙包壓。取油作燃。燒煙薰鼻中。片刻吐出痰血。即愈。(普濟方)

救氣厥 用生半夏末。如豈大。吹兩鼻中。神驗。(救急方)

救暴厥 凡人卒然倒卧。急扶入暖室。扶住正坐。用火炭沃醋。使醋氣沖入鼻中。良久自醒。(醫林正宗)

(二)韭汁灌鼻孔中。劇者并灌兩耳。(千金方)

救魔 不得用燈火照。并不得近前急

喚。但痛咬其足跟及足大姆指。頻頻呼其名。及唾其面。再灌以薑湯。必活。(應驗良方)

(二)用筆管吹兩耳。以皂角末如豆大許。吹兩鼻。得噴嚏。則氣通。(應驗良方)

(三)伏龍肝研末。水調灌二錢。更吹入鼻取嚏。(千金方)

中惡睡死 速用麝香一錢。研和醋二合。灌之。即甦。(古今醫統)

睡中行走 床前釘白鐵一方。則其人起立時。足踏白鐵。遇冷而醒。(物類相感志)

砒礬毒 先用食鹽兩調羹。沖水一大碗。服下。使其嘔吐。及毒物大半吐出。乃用生雞子清四五枚吞下。則與腹中餘剩之砒毒化合。成為腸胃所不能消化之質。徐由大便而出。於是不致傷生。(東觀秘記)

(二)白扁豆生研。水絞汁飲。(永類鈴方)

(三)鬱金末二錢。入蜜少許。冷水調服。

事林廣記

④用南天竹子四兩。搗碎服之。立解。

楊億設苑

⑤防風一兩。研末。冷水調服。立愈。(本事方)

事方

⑥礪砂一兩。研末。雞子清七枚。調灌。愈。

(三因方)

⑦中砒毒。渾身紫瘰者。急作地漿頻灌。待瘰散盡。一吐而醒。冬月亦須此法。

⑧防風一兩。研末。水調服。(直指方)

⑨稻草燒灰。淋汁。調青黛三錢服。效。

(千金方)

⑩砒霜毒。煩躁如狂。心腹疼痛。四肢厥冷。命在須臾。黑鉛四兩。或錫器亦可。磨水一碗灌之。(斗門方)

⑪鎔水毒。速服肥皂水。或蘇打水。均可。解救如無此二物。即用刀將壁上石。反刮下一二酒杯。沖水一大碗。服之。亦起死回生之良方也。(急救須知)

⑫水銀毒。灰末煎濃汁飲。即解。(應驗)

良方

⑬鉛粉毒。麻油調蜂蜜如錫糖。與食。自然解毒。(應驗良方)

⑭搗蘿蔔汁飲。(急救良方)

⑮面青腹腫。墜痛將死者。生芋薺恣食。(飲膳正要)

⑯輕粉毒。凡中是毒。齒縫出血而臭。腫速用貫眾黃連各半兩。煎水。入冰片少許。時時漱之。(陸氏積德堂方)

⑰服輕粉口破者。以三年陳醬化水頻漱。可保無恙。(瀕湖集簡方)

⑱生扁豆浸透。搗地和地漿飲。(本草拾遺)

⑲紫草。金銀花。山慈姑各一兩。乳香沒藥各五錢。新鹽水六碗。陳酒五碗。煎六七碗。空心溫服。取汗避風。(醫通)

⑳輕粉結毒。膿水淋漓。臭爛不可近者。楓子肉四兩。輕粉一錢。蓖麻仁二兩。燻甘石二錢。杭粉二兩。花椒五錢。為細末。搗。加麻油。搗成膏。油紙攤貼瘡。

上先用椒甘草煎湯洗淨。三日一換。(萬病回春)

⑳硫黃毒。烏梅肉焙一兩。沙糖半兩。漿水一大碗。煎七分呷之。(聖濟總錄)

㉑鹽滴毒。熟猪油服之。立愈。(鶴頂新書)

㉒急用生薑腐漿一碗。灌下。再用鵝翎攪喉管令吐。即愈。甚驗。(西溪叢話)

㉓煤氣毒。火爐中投炭數枚。可解煤毒。若已中毒者。速擡出室外。令仰臥地上。用涼水洗頭部。並用人對口呼吸。可救。(衛生學粹)

㉔蒙汗藥毒。速飲冷水即解。(應驗良方)

㉕烏頭毒。食飴糖數匙。即解。(聖濟總錄)

㉖巴豆毒。芭蕉葉搗自然汁服之。即效。(應驗良方)

㉗口渴面赤。五心煩熱。泄痢不止。黃連煎湯服。(本草綱目)

木瓜毒舌大滿口者是。好醋調黃糖紅糖亦可。含口中。吐出涎水。數次即愈。(隴仙神隱書)

木耳毒冬瓜藤搗汁飲之。(本草綱目)

木鼈毒身發抖戰者是。急用上料肉桂二錢煎服立愈。(嘉話錄)

杏仁毒杏樹皮煎湯飲之。可救。(本草綱目)

野菌毒菌類味殊鮮美。嗜食者多。然類皆有毒。若誤中其毒。可將新鮮金銀花嚼之。自解。(產乳集驗方)

芫花毒研新汲水服一錢。以愈為度。(危亦林得效方)

鴛鴦藤咬之。即令忍冬草也。(洪邁夷堅志)

解毒蘇葉煮濃汁飲。可解。(金匱要略)

蘆根不拘多少。水煎服。亦佳。(千金方)

甲魚毒飲藍散汁。即解。(張杲醫說)

河豚毒大紅降香為細末。以萊豆煎湯。調飲錢許。吐出毒物。即愈。(萬全方)

一、一時倉卒無藥。急以清麻油儘多灌下。(衛生易簡方)

二、五倍子白礬末等分。以水調下。(事林廣記)

三、槐花微炒。與乾胭脂等分。同搗成粉。冷水調服。極效。(臨海水土記)

蜘蛛毒芋麻葉連根洗淨。搗汁。調青黛。鴨翎蘸。敷。日數次。(應驗良方)

蚯蚓毒急以鹽湯。或石灰湯。時時洗之。(應驗良方)

二、用白鴨血搽之。或用白鴨糞。和雞蛋清調塗。更妙。(應驗良方)

蜈蚣毒速用雄雞冠血浸舌。并咽之。(青囊雜纂)

二、十指甲磨涼水。多飲之。其效無比。(救園雜記)

三、速以紅燭燃着。取其燭煤。敷患處。片刻後。即能止痛。並免潰爛。(墨客揮犀)

四、桑樹奶汁。抹上痛止。(墨娥小錄)

誤吞鐵針蠶豆煮韭菜同食。針與菜從大便而出。(陸氏積善堂方)

二、以磁石置肛門外。引下。(香祖筆記)

誤吞銅錢古文錢十個。白梅肉十個。淹過。即搗爛。和丸如萊豆大。每服一丸。流水吞下。即吐出。(聖濟總錄)

二、多食荸薺。自然消化。其效無比。(李元獨異志)

三、用砂仁二兩。煎服亦化。(避暑錄)

誤吞金箔此物吞下。或閉喉管。或閉肺管。遲則難救。急用羊血灌之。最效。(養疴漫筆)

誤吞桐油蓮蓬壳煎水服。甚效。(白獺髓)

誤吞玻璃可用赤豆湯煮熟。儘量而

飲服後再用瀉藥不逾時亦且裏玻璃而出。(瑣碎錄)

【誤吞昇汞】甘汞為西藥常用之瀉劑。但一觸日光則立變為昇汞而昇汞則為極毒之藥服之能斃人。速將生雞蛋清服下數枚則蛋白裹之為不能消化之物。夾大便排洩而出。遲則不能救矣。(急救須知)

【誤吞竹木】以鐵杵錘燒紅。淬酒飲之。(集玄方)

② 飴糖一斤。漸漸食盡。便出。(外臺秘要)

【誤吞稻芒】白錫類食甚效。(楊起簡便方)

【誤吞鐵屑】木炭皮研末。調入稀薄之粥內。食一碗少頃。再食一碗。炭屑必裹鐵屑。由大便洩出。良效。(山居錄)

【誤吞鐵釘】猪脂多食令飽。自然裹出。(普濟方)

【誤吞頭髮】頭髮誤吞入腹。足以牽掣

腸腑。若在喉間。尤為危險。可用日常梳髮之舊木梳一個。燒枯。研為細末。用黃酒沖服。極有效驗。(西樵雜記)

【誤吞耳垢】以黃連三錢。人中黃五分。煎服。可免啞。(北堂書抄)

【誤吞螞蝗】蜂蜜調水飲。蝗即化為水。無害。(玉燭寶典)

② 田中泥和水飲數碗。蝗必盡下。(本草綱目)

③ 以牛羊血同猪油飲之。即下。(坦仙皆效方)

【酒醉傷】使醉者側睡。首微昂。勿仰睡。亦勿俯睡。解其胸前衣扣。飲水一杯。加安母尼亞二三滴。立醒。(王氏奇方)

【香烟醉傷】吸香烟過量必醉。醉後昏眩。實過於酒。可將鹹橄欖以沸水泡湯飲之。即醒。或靜卧數小時。亦可解醉。(衛生學粹)

【鴉片醉傷】服鹽水即愈。或飲醬油糖

水均效。(牧豎閒談)

【水烟醉傷】胡黃連一錢。煎水。兑茶飲。即解。兼治旱煙醉傷。(牧豎閒談)

【湯火傷】凡火傷無論輕重。急用童便灌之。以免火毒攻心。或用白沙糖熱水沖服。或用蜂蜜調熱水灌下。均妙。切不可用冷水。及井泥。溝泥等物。即使痛極難受。亦必忍住。倘誤用冷水淋之。則熱氣內逼。輕則爛入筋骨。手足彎縮。纏綿難愈。重則直攻人心。則難救矣。先用真麻油敷之。再用糯米淘去米取汁。加真麻油一茶鐘。多加更妙。用箸子順攪一二千下。切莫倒攪。可以挑起成絲。用舊筆蘸油搽上。立刻止痛。愈後並無疤痕。神效。(龐元英談藪)

② 薄荷腦五錢。胡麻油五錢。石灰水五錢。混和塗傷處。(醫事新聞)

③ 先用鹼水洗燙處。後用上好燒酒頻頻拭之。約一小時。能止痛。(中央醫

事新報

④猪脂熬為油。入小鼠數隻。熬枯為度。去鼠不用。傾猪油瓦器中。下輕粉攪勻。安放備用。(墨娥小錄)

⑤火傷之輕者。可用亞麻仁油。和等分之石灰水塗之。即愈。(日本治療新報)

⑥即以上等花露水。抹擦患處。重則三四次。輕則一二次。無不頓然釋痛。誠既簡且便之方。(育軒筆談)

⑦人咬傷。以溏雞糞塗之。止痛且不作膿。(事林廣記)

⑧生栗子嚼爛敷之。極效。(退齋閒覽)

⑨虎咬傷。被虎咬傷。立時潰爛。痛不可當。急用猪肉貼之。隨化隨易。再用地榆十六兩。三七三兩。苦參四兩。共為末。和勻搽之。隨溫隨搽。血止痛亦止矣。(大業拾遺錄)

⑩瘋狗咬傷。被咬後。其毒上攻。頭上生有紅髮。須扯去。此方男子十一日。女

子十四日可治。過期不救。方用斑蝥七個。去頭足翅。同米炒黃。米去不用。如人虛弱者。只用三四個。生大黃五錢。金銀花三錢。殭蠶七個。酒水各一碗。煎至碗半。飽時服。服後小便解下血塊。候至小便清白。方始毒盡。然後食溫粥一碗。則止而不解矣。但百日內忌聞鑼鼓聲。須避處幽僻之所。又忌食猪羊雞魚酒葱。又發氣動風之物。犯之復發。不可活。(應驗良方)

⑪咬傷不治。每致害命。急於無風處。以冷水洗淨。即服韭汁一椀。隔七日。又一椀。四十九日。共服七益。百日內。忌食酸鹹。一年內。忌食魚腥。方得保全。否則十有九死。(水雲錄)

⑫一經被噬。急須治療。否則毒入不救。速取蠶豆數粒。去殼。置口內嚼之。然後敷於患處。毒盡即愈。(朱真人靈驗篇)

⑬真紋黨 羌活 獨活 紅柴胡

甘草 前胡 生薑 茯苓各三錢

枳殼 桂梗 撫芎各二錢 生地榆一錢 紫竹根一兩。煮透濃汁。服下。最重者三劑而愈。一星期後。如患者仍覺不醒。可試嚼生黃豆。如無生豆氣者。可再服一劑。再過一星期。仍照前嚼豆。必待有生豆氣。心惡欲嘔。則受毒已盡。不必服藥矣。(沈氏秘方)

⑭馬咬傷。白猪煮肉一片。同飯。本人自嚼。貼患處。立時止痛。(洞天保生錄)

⑮貓咬傷。用薄荷葉煎水洗之。(洞天保生錄)

⑯鼠咬傷。荔枝嚼融。敷上。即愈。(避暑錄)

⑰黃蟒蛇咬。用十大功勞葉搽之。(游宦紀聞)

⑱烏梢蛇咬。以西湖柳葉。搗汁。搽洗。(嶺南方)

⑲灰扑蛇咬。明礬一塊。另以煤頭紙蘸

菜油燃著燒之。礬料滴傷處。即愈。兼治赤凍蛇咬。(嶺南方)

【黃蜂咬傷】蚯蚓糞并水調敷。其痛立止。(飛鴻集)

② 暖酒淋洗傷處。自愈。(廣利方)

③ 急搔頭垢塗之。能止痛。(集簡方)

④ 用安母尼亞擦之。極效。(急救須知)

⑤ 即用泡過茶葉。不計多少。痛處擦之。立時止痛。(王氏醫方捷徑)

【蟻咬傷】咬人最毒。不治必死。用桑樹皮燒枯煎濃汁。調白礬末敷之。極效。(澹寮方)

【壁虎咬傷】即覓活蜘蛛一隻。大者最好。將蜘蛛放於傷處。蜘蛛即在傷口伏而不動。其痛隨止。(指迷方)

【蜈蚣咬傷】以白胡椒口嚼塗之。良已。(醫宗金鑑)

② 嚼鹽塗之。甚妙。(梅師方)

【蠅咬傷】一名多足蟲。藏壁間。以尿射人。若中其毒。皮膚上即起燎漿泡。

痛極難熬。急用棉蘸鹽水頻敷。或用大黃末敷之。亦妙。(楊氏家藏方)

【蚊咬傷】絲瓜葉一把搗汁。以紫金錠磨水和之。敷於傷處。立刻見效。(湖

泗集)

【蠶咬傷】家字麻葉搗汁塗之。神效。(衛生家寶方)

第九編 耳鼻咽喉科門

●一 耳科單方

【耳聾】乾百合為末。溫水服二錢。每日二次。(千金方)

二 蝸牛一兩。石膽鍾乳粉各二錢半。為末。瓷盆盛之。大椒赤末。入冰片一分。滴入耳中。無不愈。(聖惠方)

三 以陳醋微火炙附子。削尖塞之。(千金方)

四 蜈蚣五錢。穿山甲炮五錢。麝香少許。為末。葱汁和丸。塞入耳內。即通。(普濟方)

五 蠶蛻紙作捲。入麝香二錢。入筆筒燒煙薰耳。連作三次。即開。(胡洽居士百病方)

六 用鷄油半匙。磁石一小豆大。麝香少許。和勻。以綿裹成錠子。塞耳中。口含生鐵少許。用三五枚。即有效。(青囊)

【耳暴聾】香附子瓦砂研末。蘿蔔子煎

湯。早夜各服二錢。忌用鐵器。(衛生易簡方)

二 竹筒盛鯉生魚腦。於飯上蒸之。令烊。注入耳中。(千金方)

三 以鯉魚腦髓二兩。粳米三合。和鹽醬煮粥食。(醫學入門)

四 甘蔗半寸。綿裹插入兩耳。口中嚼甘草少許。耳自然通。(永類鈴方)

五 蚯蚓入鹽。安葱內。化水點之。立效。(勝金方)

【腎虛耳聾】烏雄雞一隻。洗淨。以無灰酒四斤。煮熟。乘熱食三五隻。極效。(醫林集要)

二 真磁石一塊。如豆大。穿山甲燒研二分。用棉包裹塞耳。口含生鐵一塊。覺耳內有風雨之聲。須臾自通。(濟生方)

三 鹿腎一對。去脂膜。切以豉汁入粳米

二合。煮粥食。亦可作羹。(聖惠方)

【老人耳聾】豬腎一對。去膜切片。以粳米二合。葱白二根。薤白七枚。人參二分。防風一分。為末。同煮粥食。(奉親養老書)

【病後耳聾】生薑蒲汁滴之。有效。(聖惠方)

【耳閉不通】大田螺一個。撥開其蓋。入麝香五分。自化成水。滴入耳內。(褚氏遺書)

【耳鳴】生地黃截塞耳中。日易數次。或煨熟尤妙。(肘後方)

二 用生地黄灰火煨。綿裹塞耳。數易之。以瘥為度。(本草綱目)

【耳中疔障】白頭蚯蚓。入葱葉中。化為水滴耳。令滿。不過數度。有驗。(乾坤秘鑑)

【耳痒】生烏頭一個。乘濕削如棗核大。

塞入耳內。日換數次。過三五日便愈。
兼治耳鳴。(楊炎南行方)

【耳痛】用北細辛末。以醋為丸。塞耳。
有奇效。(阮氏經驗方)

②木香末。以葱黃染鵝脂。煎末。深納入
耳中。(聖濟總錄)

③水楊酸二分半。乳糖二分半。分兩包。
朝夕兩回。(日本治療新報)

【耳忽作痛】將經霜青箬。露在外。將朽
者。燒存性。為末。數入耳中。其痛即止。
(楊起簡便方)

②鹽五斤。蒸熟。以耳枕之。次復更換。痛
能漸止。(肘後方)

【耳卒腫痛】牛蒡根切細。絞汁二升。砂
鍋內熬膏。塗之。(聖濟總錄)

②木鼈子仁一兩。亦小豆。大黃各半兩。
為末。每以少許。生油調塗。(聖惠方)

【耳定】耳內生粒。如棉花子大小。其痛
難熬。以人指甲。瓦煨存性。研細。入冰
片少許。吹入耳中。痛自止。(應驗良

方)

②老鼠刺葉。(即十大功勞草)剪取
葉尖。瓦上煨。及研細。加冰片吹耳。自
愈。(如宜方)

【耳中有核】如棗核大。痛不可動。以火
酒滴入。仰頭半時。即可箱出。(怪證
奇方)

【聾耳】流出膿水不絕。輕粉一錢。麝香
一分。為末。搽之。(楊起簡便方)

②桑螵蛸一個。燒存性。麝香一分。研末。
每日以五釐。搽入。神效。有膿。先捲淨
為要。(陳經驗方)

③穿山甲。燒存性。入麝香少許。吹之。三
日。水乾。即愈。(鮑氏小兒方)

④油胭脂水粉拌勻。手捻成末。吹之。神
效。(經驗良方)

⑥五倍子焙乾一兩。全蠍煨灰三錢。共
研末。搽耳中。(陳氏經驗方)

⑦紅花三錢半。桔礬五錢。為末。以棉杖
捲淨膿水。吹之。(聖惠方)

⑧硼酸一錢。溶水十兩。洗耳。(臨牀醫
典)

⑨蜘蛛一個。臙脂環子五分。麝香一分。
用鵝翎吹入。(急救良方)

⑩速以蒲黃末。搽入。神效。(聖惠方)

⑪石首魚頭中石鈿。研末。或燒存性。研
搽耳中。(集周方)

【聾耳出液】夜明沙二錢。麝香一字。為
末。拭淨。搽之。(聖惠方)

【聾耳有蟲】鯉魚腦和桂末。搗勻。棉裹
塞之。(千金方)

【瘡耳】出黑色鼻膿者。是可用醫茄自
然油滴之。不宜過多。俟膿浮出。再用
核桃仁研細。搗油去渣。每油一分。加
冰片二分。用少許滴耳內。自愈。此方
兼治震耳。纏耳。聾耳。(青囊雜纂)

②青黛黃藥末。乾搽妙。(鄭氏家傳方)

【震耳】所出之膿。係為青色。用青魚膽
和冰片滴之。即愈。(海上仙方)

【纏耳】時流白膿。用蟲蛙竹屑。加麝香

少許吹之效驗如神。(小品方)

耳出膿水青蒿末棉裹納耳。(聖惠方)

方)

杏仁末黑搗膏棉裹納入日三易即瘥。(梅師方)

耳中出血龍骨末吹之立止。(三因方)

耳痔形如櫻桃觸之狂痛用礪砂一錢輕粉雄黃各三錢冰片五釐研細末水調濃用穀草細梗咬細如毛蘸點患處並用梔子川芎熟石膏當歸牛蒡子柴胡酒芍丹皮甘草各二錢黃芩黃連各五分水煮食後服下自愈。(瀕湖集簡方)

耳聾形類初生蘆菇治法同耳痔。(瀕湖集簡方)

耳內濕瘡蛇牀子黃連各一錢輕粉一分共為末吹之。(全幼心鑑)

耳爛流膿陳皮一錢燈草燒灰一錢冰片一分為末吹耳效。(外科正宗)

寺院大香爐內煙膏一錢冰片五釐

研末吹入。(羣書日抄)

耳後月蝕燒蚯蚓泥猪脂和敷。(子母秘錄)

方)

旋覆花燒研羊脂和塗之。(集簡方)

五倍子末冷水調塗濕則乾摻之。(海上名方)

耳疔鮮紅菱柄煨灰加礪砂上冰片少許研極細末吹入炒。(趙氏經驗方)

凍耳成瘡生薑自然汁熬膏塗耳上神效。(暇日記)

白薇黃蘗等分為末生油調搽。(談楚翁方)

用柏葉三兩微炙為末杏仁四十九粒湯浸去皮研成膏亂髮兩雞子大食鹽乳香各半兩細研黃蠟一兩五錢清油一斤先煎油令沸即下亂髮以消盡為度次下諸藥煎令焦黃濾去滓更以綿重濾過再以慢火煎之後下乳香黃蠟等攪令稀稠得所磁

器收盛每用鵝翎旋取塗之。(多能鄙事)

方)

椒欖燒灰清油調敷。(多能鄙事)

耳被挖傷冰片胭脂燒灰牡蠣煨粉為末用骨簪點香油蘸藥末入耳內即愈。(吳崑醫方考)

水銀入耳以黃金或金飾器枕耳自出。(張仲景方)

流水入耳薄荷汁滴入立效。(外臺秘要)

壁虎入耳雞冠血滴入即出。(奇效良方)

蜈蚣入耳炒肉放耳邊聞香自出。煮雞更妙。(堅瓠集)

蜈蚣入耳用白糖熟水調濃汁滴耳內。蜈蚣即化為水。(明醫雜著)

蚯蚓為末入葱肉化水點入則蜈蚣亦化為水奇效。(聖惠方)

黃丹酥蜜杏仁等分熬膏綿裹包塞之聞香即出。(聖惠方)

【螞蝗入耳】用手將耳扯動即出。或用穿山甲燒灰研末調水灌入。(十藥神書)

②取田中泥一盆枕於耳邊。螞蝗聞氣即出。(本草綱目)

【飛蛾入耳】銅器向耳邊敲打自出。(格致餘論)

【飛蠅入耳】急尋取皂莢中蠹蟲研爛。同鯉魚血灌之。極驗。(危亦林得效方)

【螞蟻入耳】穿山甲燒研。水調灌之。即出。(肘後方)

【蚤虱入耳】葛蒲末炒熱。袋盛枕之。效。(聖濟總錄)

【臭蟲入耳】緊閉口目。以一手掩鼻孔。一手掩其餘一耳。力屏其氣。蟲自出。否則用香油滴耳。(衛生寶鑑)

【蛆蟲入耳】杏仁搗如泥。取油滴入耳中。非出即死。(溯洄集)

② 鼻科單方

【鼻塞】蓖麻子仁三百粒。大棗去皮一枚。搗勻。棉裹塞之。一日一易。三十日可聞香臭。(聖濟總錄)

②通草細辛附子共為末。蜜調。綿裹納鼻中。即通。(資生集)

③乾薑末。蜜調塞鼻中。自通。(廣利方)

④大天南星一枚。微泡為末。淡醋調塗紅網上。貼額門。外熨之。(本事方)

⑤鼻塞久不聞香臭者。用生葱分作三段。早用葱白。午用中段。晚用末。搽塞鼻中。氣透自效。(救急良方)

⑥乾柿粳米。煮汁常服。(孟詵食療本草)

【鼻血】用線紫中指第二骨節彎屈之處。即止。左流紫右。右流紫左。雙流雙紫。極效。(應驗良方)

②定州白瓷。(俗稱定粉)研細末。吹少許入鼻立止。(經驗良方)

③上好京墨研濃汁。滴入鼻中。用棉絮塞之。(梅師方)

④人乳治之。亦效。惟須將乳頭對準鼻管。擤之。使射入管中。其血立止。(酉陽雜俎)

⑤麥門冬去心。生地黃各五錢。水煎服。(保命集)

⑥蘿蔔搗汁半杯。入酒少許。熱服。並以汁注鼻中。甚良。(衛生易簡方)

⑦蝸牛焙乾一枚。高賊骨五分。研末吹之。(聖濟總錄)

⑧亂髮燒灰吹之。立止。男用母髮。女用父髮。永不再發。(應驗良方)

⑨茅根一掣。去心。藕節炭三錢。煎服。三四次。即止。試之極驗。(惠濟方)

⑩馬蘭頭搗爛。漚汁飲之。立愈。乾者無效。婦人不可飲。因其性甚涼。(孫一松試效方)

【鼻流清涕】蒺藜苗一握。黃連二兩。水煮一碗。灌鼻中。少許。取嚏不通。再試。(聖惠方)

②華茛末吹之。有效。(衛生易簡方)

【鼻淵】鼻流臭水也。孩兒茶研末吹。

（兵部手集）

①絲瓜藤近根三五尺。燒存性。每服一錢。溫酒下。（衛生家寶方）

②石首魚腦骨二三十枚。煨末。每服五分。酒下。先用二分吹鼻中。（身經通考）

③白養脊骨。燒煙熏洗之。（暇日記）

④老刀豆。文火焙乾為末。酒服三錢。（仁存堂方）

⑤鼻淵流涕者。蒼耳子炒末。每白湯點服一二錢。（永類鈴方）

⑥百草霜細末。冷水調服。（直指方）

⑦風熱鼻淵。絲瓜藤近根三五寸數株。曬乾。燒存性為末。每一錢。陳酒下。（龔信醫鑑）

⑧風寒鼻淵。蒼耳子辛夷花各三錢。煎服。（活人書）

⑨鼻中息肉。白礬燒末。與豬脂調和綿

裹塞之。數日。息肉隨藥而出。（千金方）

①蚯蚓炒一分。牙皂一挺。為末。蜜調塗之。清水滴盡。其肉即除。（聖惠方）

②青蒿。灰石灰等分。淋熬膏。點之。（聖濟總錄）

③生藕節。連鬚瓦上焙枯。研末。吹入其肉。漸漸自落。屢試如神。（保生餘錄）

④三咽喉科單方

【喉蛾】蝦蟆衣。鳳尾草。播爛。入霜梅肉。煮酒各少許。再研。絞汁。以鷓鴣刷患處。隨手吐痰。即消。（養疴漫筆）

①不論雙單蛾。於初起時。將翦斷苧麻數根。約寸許長。折為細絲。裝入旱煙筒內。如吸煙之法。連吸三次。即愈。此法奇而有效。（杏林摘要）

②金銀花連莖葉。搗自然汁。半椀。煎八分。服之。（陸氏積善堂方）

③青魚膽汁。入膽礬。陰乾。每用少許點喉。取吐。（萬氏方）

⑤凡喉中生毒。須看頭上有紅疙瘩。即用針挑破。或生紅頭髮。即扯去。其毒自解。（生生編）

⑥米醋調皂角末。塗頸與下頰。乾即換塗。乳蛾自破。（應驗良方）

⑦不論雙單蛾。祇以燈草灰。吹入喉間。神效。（應驗良方）

⑧老鴉蒜搗汁。生白酒調服。嘔吐自愈。（神醫十全鏡）

【喉痺】蓖麻子研爛。紙捲作筒。燒煙熏吸。即通。或取油作搽。尤妙。名聖煙筒。喉痺緊急。用此即破。（纂要奇方）

①菖蒲根嚼汁。燒紅鐵秤錘。淬酒一杯。飲之。（聖濟總錄）

②生麻油一合。灌之。立愈。（聖濟總錄）

③稻草燒取墨煙。醋調吹鼻中。或灌入喉中。滾出痰沫。立愈。（普濟方）

④蘿蔔汁。和皂莢漿服下。取吐。即效。（普濟方）

⑤馬蘭根葉二兩。水一大碗。煎成一小

蓋細味飲之。大為有效。(外臺秘要)

七 朴硝一兩。細細含咽。立效。或加丹砂一錢。(外臺秘要)

八 芥菜子末。水和敷喉下。乾即易去。數次即愈。(聖惠方)

九 麻黃一味。以青布裹之。燒煙筒中熏之。(聖惠方)

十 遠志肉為末。吹之。涎出為度。(直指方)

十一 升麻片含嚙。或以半兩煎服。取吐。(直指方)

十二 牛蒡子六分。馬蘭子六分。為末。每空心。溫水服一小匙。復以牛蒡子三兩。鹽二兩。研勻炒熟。包熨喉外。(廣利方)

十三 紅花搗爛。絞汁一小碗。服之。以瘥為度。冬月以乾者浸濕。絞汁服。極有靈驗。(廣利方)

十四 燈草一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。吹喉。甚佳。(瑞竹堂方)

十五 紫蝴蝶根一錢。黃芩。生甘草。桔梗各五分。為末。水調頓服。立愈。(便民圖纂)

十六 大蒜塞耳鼻中。日二易之。(肘後方)

十七 荆瀝細細嚙之。或以荆一握。水煎服之。(千金翼方)

十八 生半夏末。嚙鼻內。涎出即愈。(集簡方)

十九 蝸牛七枚。白梅肉三枚。研爛。綿裹含嚙。立效。(應驗良方)

二十 用蜂房燒灰。每以一錢。吹入喉內。(食醫心鏡)

二十一 喉痺口緊。馬蘭根或葉。搗汁。入米醋少許。滴鼻孔。或灌喉中。取痰自開。(孫一松試效方)

二十二 地龍一條。研爛。以雞子清攪和。灌入即通。(聖惠方)

二十三 不開欲死者。草烏頭。皂莢等分為末。入麝香少許。入牙。並嚙鼻內。牙關自開。(攝生妙用方)

二十四 走馬喉痺。生白礬末。塗於綿針上。按於喉中。立破。綿針用榆條。以綿包之。(儒門事親)

二十五 瘰癧喉痺。生商陸根。搗作餅。置瘰癧上。以艾炷於上。灸三四壯。良效。(外臺秘要)

二十六 風熱喉痺。焰硝一兩五錢。白殭蠶一錢。硼砂半兩。冰片一分。為末。吹之。(三因方)

二十七 冬月喉痺。蛇牀子燒煙瓶中。口含瓶嘴。吸煙。其痰自出。(聖惠方)

二十八 喉風。木鼈一枚。用碗片刮去皮。毛。取仁切薄片。浸冷水內。三時許。攪開。病人。口連水滴下。潤至喉間。立時見效。(芝隱方)

二十九 皂礬一斤。米醋三斤。拌曬乾。末。吹之。痰涎出盡。用良薑末少許。入茶內。漱口。即愈。(孫氏集效方)

三十 人指甲。白蟻窠。各等分。以藥每錢。加麝香一分。吹之。並治雙單蛾。(包會)

應驗方)

④紫莞草根一莖。洗淨。納入喉中。待惡痰涎出。即癢。更以馬牙硝津嚥之。即絕。(斗門方)

⑤鴨嘴膽蓉二錢半。白殭蠶炒五錢。研末。每以少許吹喉。立吐痰涎。(濟生方)

⑥蛇蛻。當歸等分為末。溫酒服一錢。取吐。(蘭氏經驗方)

⑦絲瓜根。以瓦瓶盛水。浸數小時。乃取水飲之。其痛可立減。(海上名方)

⑧雄黃磨新汲水一盞服。取吐下愈。(續千金方)

⑨玄參。鼠粘子半生半炒。各一兩。為末。新水服一盞。立有效驗。(聖惠方)

⑩天南星一個。剝心。入白殭蠶七枚。紙包煨熟。研末。薑汁調服一錢。甚者灌之。吐痰涎自愈。(千金博濟方)

⑪燈籠草炒焦。研末。酒調呷之。(醫學正傳)

①天名精細研。以生蜜和丸。彈子大。每噙一二丸。即愈。乾者為末。(經效濟世丸方)

②蒼耳根一把。老薑一塊。研汁入酒服。(聖濟總錄)

③煨食鹽。頻點之。即消。(聖惠方)

④萬年青根頭。切碎打爛。絞汁灌下。吐出痰涎。即好。倘口閉。用牙刷挖開灌下。如再不吐。可用潔淨鷄毛。進喉間探之。(經驗單方)

⑤白喉風。以獨頭老蒜瓣。搗泥如豌豆大。敷經渠穴。(近手腕寸脈有窩處。即是)男左女右。用瓦楞子或相類之物。蓋上紮住。閱五六時。起一水泡。將銀針挑破。搯去毒水。即愈。(過氏醫案)

⑥蒼耳煎水服之。神效無比。(經驗良方)

⑦鎖喉風。用鷄毛一根。粘真桐油一分。入喉捲攪。痰隨油吐。服甘草水。可解

油氣(莫囊備急方)

【喉痛】取鹹猪肉一薄片。塗紅胡椒。須極濃厚。臨睡時。縛喉間。可止痛。(救急易方)

①自落之梅子。置鹽酒中。急喉痛時。含之口內。即有涎出。痛能即減。(續傳信方)

②喉頭覺痒或痛。用明礬一兩。薄荷腦五釐。分作二十份。每份以水二合。至三合。溶解數百回。含漱。臨牀醫典

③龍膽草。搗水服之。(集簡方)

④銀朱海螵蛸末等分。吹之。取效。(急救方)

⑤冰片三分。殭蠶五釐。硼砂二錢半。牙硝七錢半。共研細末。吹患處。(丹溪心法)

⑥咽喉腫痛紅腐。真膏黛一錢。龍腦薄荷末五分。人中白一錢。粉口兒茶一錢。元明粉五分。馬屁勃五分。梅花冰片二分。研細。搽之。病甚者。加厚黃三

⑦咽喉腫痛紅腐。真膏黛一錢。龍腦薄荷末五分。人中白一錢。粉口兒茶一錢。元明粉五分。馬屁勃五分。梅花冰片二分。研細。搽之。病甚者。加厚黃三

分。珍珠五分。效尤捷。(喉科秘傳)

① 硼砂含化咽津。初起便治。即免喉痺。
(本草萬方鍼線)

【肺熱喉痛】甘草炒二兩。桔梗米泔水
侵一夜。一兩。每服五錢。水一杯。半。入

阿膠半片。煎服。(錢乙小兒直訣)

【發斑喉痛】玄參升麻甘草各半兩。水
三杯。煎一杯。半。溫服。(活人書)

【老癆喉痛】生雞蛋一個。去黃用白。糯
稻根鬚五錢。洗淨。甜白沙參。石斛各

一錢五分。麥冬三錢。炒生甘草三分。
水煎服。效驗如神。(醫餘錄)

【喉腫】用括萋皮白殭蠶炒甘草炒各
二錢半。為末。每服三錢半。薑湯下。或

以棉裹五分含嚙。一日二次。(御藥
院方)

② 射干花根。山豆根。陰乾為末。吹之。如
神。(袖珍方)

③ 青艾和萹葉一握。同醋搗爛。敷於喉
上。冬月取乾艾亦可。(陳氏經驗方)

④ 蚯蚓十四條。搗塗頭間。又以一條着
鹽化水。入蜜少許服之。(聖惠方)

⑤ 用蓬砂。白梅等分。搗丸。莢子大。每喻
化一粒。(陳氏經驗方)

⑥ 高陸切根。炙熱。隔布熨之。冷即易去。
即愈。(圖經本草)

⑦ 薤根。熱醋搗。敷腫處。冷即易之。(聖
惠方)

⑧ 老黃瓜一枚。去子。入硝填滿。陰乾為
末。每以少許吹喉。靈驗無匹。(醫林
集要)

⑨ 鶴虱草。連根葉搗汁。鶴翎掃入。去痰
最妙。(傷寒繙要)

⑩ 雄瓦雀屎末。溫水灌下半錢。即開
外臺秘要

【喉閉】鵝血。山豆根煎湯服之。良效。如
腫痛者。用巴豆一粒。不拘何物。包裹

鼻中。男左女右。(王氏易簡方)

② 以鴨嘴磨研細。以醋調灌。藥下
咽後。即吐涎膠痰。其後方瘥。(嬰甯

心要)

③ 箬葉燈心草燒灰。等分吹之。甚妙。
(集簡方)

④ 絲瓜研汁。灌之。(普濟方)

【喉癰】礬三錢。銅鈔內溶化。入劈開巴
豆三粒煎乾。去豆。研礬。吹一二次。立

愈。甚者以醋調灌之。(濟生方)

② 吞薏苡仁二枚。良效。(外臺秘要)

【喉瘡】瘡已破爛。疼痛難食。用猪腦髓
蒸熟。醋和食之。(萬全護命方)

② 用蓖麻子仁一枚。朴硝一錢。同研。新
汲水服之。連進二三服。效。(普濟方)

③ 杏仁去皮。熬黃三分。和桂末一分。研
細。裹含之。咽汁。(陳藏器本草)

④ 酒漬蘘荷根半日。將汁含漱。其瘥自
却。(外臺秘要)

【喉痧】又名爛喉痧。喉間作痛。爛不收
口。服櫻桃數十粒。即愈。如無新鮮者。
服蜜餞者亦可。(本草行義)

② 象牙屑。廉珠各三分。飛青黛六分。梅

花冰片三釐。壁錢二十個。犀黃。人指
甲各五釐。共研極細粉。吹患處。雖瀕
死者可救。(醫學入門)

【風火喉癰】射干二兩。洗淨搗爛。甜酒
煎汁。含漱數次。吐出。便可除根。(醫
方選要)

【喉中生肉】綿裹筋頭。點鹽楷肉。上日
五六次。(孫真人方)

【喉中結塊】膽礬含口內。惡涎吐盡。自
愈。(經心錄)

【喉中作癢】不可吃茶酒湯水。用薄荷
二分。麝香五釐。研極細末。吹入喉中。
吐出涎水碗許。再用陳米二合。煎湯
飲之。若先服茶酒等物。則難治矣。(

吳崑醫方考)

【咽喉聲啞】真硼砂一兩。元明粉。膽星
各一錢。訶子肉二錢。冰片三分。為末。
外加大烏梅一兩。搗為丸。如龍眼核
大。每用一丸。含化。數粒即愈。(局方
發揮)

②通草水煎服。或用橘皮煎濃汁。候冷
飲亦效。(靈苑方)

【針刺入喉】以蜈蚣梓汁。滴被刺處。三
五次。自出。(千金方)

【魚骨鯁喉】椒攪研爛。水沖連渣服。或
以椒攪核磨水飲亦效。(直指方)

①獨頭蒜塞鼻中。骨自出。(應驗良方)

②用碗水。虛空以手指寫天上金雞叫。
地下草雞叫。兩雞並一雞。九龍下海。
喉曬化如滄海。二十五字。口誦七遍。
飲此水愈。(袁滋雲南記)

【雞骨鯁喉】威靈仙沙糖酒煎服。(異
物志)

【諸骨鯁喉】白鳳仙子。研水一大杯。以
竹筒灌入咽喉。其骨即軟。但不可經
牙。恐牙受傷。故用竹筒灌之。神效無
匹。(松窗雜記)

【預防喉症】大凡喉症不可不防。宜用
結晶石炭酸二十分。鹽酸鉀四十分。
甘油二百分。開水八百分。混和。每用

一二調羹。沖水半茶杯。漱口。一日二
次。可免傳染之虞。(中央醫事新報)

增補單方大全第九編終

傳家寶庫

● 全書二册 ● 價洋二元 ● 特價一元二角 ● 附贈精便

本 書 之 需 要

人生在世無不欲成家立業，裕後光前，孰不欲得愛好之夫，得育賢智之兒女，故高尚之望，望諸賢貴之輩，財財通曉之家庭，求正當之快樂，保健康之身體，享希世之天年，然求有法，法得子有方，成名有道，故富有出治家有本行樂者，別強身有技，延年有術，人世間一切富貴，富貴決非徒託空談所能立致者，本局特編此書，以公同好名曰富貴傳家寶庫，全書凡十編，一百另四章，中分十目，羅雜難計，書中所述，言金玉字字珠璣，男女讀之，閉房水無面，羞之，處父母讀之，兒女自無，醜態之患，庸愚者讀之，致令開廣，學賢者讀之，不勝赤手起家，有家庭者，讀之，可以不以家聲為快，樂者，讀之，可以不以家聲為憂，患福人讀之，得轉禍為福，之極，貧人讀之，有返老為童之妙，童自立身處世，興家強國，諸大端，以及消閑排悶，諸細故，無不包羅，萬象萃集，長詢不倦，人生之玉律，度世之金鏡也。

本 書 之 內 容

- 第一編 命運研究法
 - (一) 命運研究法
 - (二) 命運研究法
 - (三) 命運研究法
 - (四) 命運研究法
 - (五) 命運研究法
 - (六) 命運研究法
 - (七) 命運研究法
 - (八) 命運研究法
 - (九) 命運研究法
 - (十) 命運研究法
- 第二編 治生擇業法
 - (一) 治生擇業法
 - (二) 治生擇業法
 - (三) 治生擇業法
 - (四) 治生擇業法
 - (五) 治生擇業法
 - (六) 治生擇業法
 - (七) 治生擇業法
 - (八) 治生擇業法
 - (九) 治生擇業法
 - (十) 治生擇業法
- 第三編 致高興樂法
 - (一) 致高興樂法
 - (二) 致高興樂法
 - (三) 致高興樂法
 - (四) 致高興樂法
 - (五) 致高興樂法
 - (六) 致高興樂法
 - (七) 致高興樂法
 - (八) 致高興樂法
 - (九) 致高興樂法
 - (十) 致高興樂法
- 第四編 家產保存法
 - (一) 家產保存法
 - (二) 家產保存法
 - (三) 家產保存法
 - (四) 家產保存法
 - (五) 家產保存法
 - (六) 家產保存法
 - (七) 家產保存法
 - (八) 家產保存法
 - (九) 家產保存法
 - (十) 家產保存法
- 第五編 兩世交際法
 - (一) 兩世交際法
 - (二) 兩世交際法
 - (三) 兩世交際法
 - (四) 兩世交際法
 - (五) 兩世交際法
 - (六) 兩世交際法
 - (七) 兩世交際法
 - (八) 兩世交際法
 - (九) 兩世交際法
 - (十) 兩世交際法
- 第六編 男女結婚法
 - (一) 男女結婚法
 - (二) 男女結婚法
 - (三) 男女結婚法
 - (四) 男女結婚法
 - (五) 男女結婚法
 - (六) 男女結婚法
 - (七) 男女結婚法
 - (八) 男女結婚法
 - (九) 男女結婚法
 - (十) 男女結婚法
- 第七編 婦女保嬰法
 - (一) 婦女保嬰法
 - (二) 婦女保嬰法
 - (三) 婦女保嬰法
 - (四) 婦女保嬰法
 - (五) 婦女保嬰法
 - (六) 婦女保嬰法
 - (七) 婦女保嬰法
 - (八) 婦女保嬰法
 - (九) 婦女保嬰法
 - (十) 婦女保嬰法
- 第八編 小兒養育法
 - (一) 小兒養育法
 - (二) 小兒養育法
 - (三) 小兒養育法
 - (四) 小兒養育法
 - (五) 小兒養育法
 - (六) 小兒養育法
 - (七) 小兒養育法
 - (八) 小兒養育法
 - (九) 小兒養育法
 - (十) 小兒養育法
- 第九編 房中醫治法
 - (一) 房中醫治法
 - (二) 房中醫治法
 - (三) 房中醫治法
 - (四) 房中醫治法
 - (五) 房中醫治法
 - (六) 房中醫治法
 - (七) 房中醫治法
 - (八) 房中醫治法
 - (九) 房中醫治法
 - (十) 房中醫治法
- 第十編 不老長壽法
 - (一) 不老長壽法
 - (二) 不老長壽法
 - (三) 不老長壽法
 - (四) 不老長壽法
 - (五) 不老長壽法
 - (六) 不老長壽法
 - (七) 不老長壽法
 - (八) 不老長壽法
 - (九) 不老長壽法
 - (十) 不老長壽法

第十編 眼科門

【紅眼】明礬一小塊入水洗之使光滑

無稜濕口涎少許日於眼角上輕輕

磨擦數次有效（慈溪日鈔）

②瓦松搗爛用紙攤放眼胞皮上乾則

換貼自愈（應驗良方）

③黃連三分黃柏一錢白礬一錢銅青

一錢以上藥用水煎濃晴天露一夜

蘸抹眼睛極效（應驗良方）

④宣黃連剉以雞子清浸置一夜次早

濾過雞羽蘸滴目內（後靈機要）

⑤冬桑葉野菊花等分煎水俯首盆口

上覆布祇使熱氣入眼俟溫將水洗

之有效（古今醫統）

⑥水洗生地黃黑豆各二兩搗膏貼時

以鹽湯洗目閉目以藥膏厚塗目上

至曉水潤取下（聖濟總錄）

⑦決明子炒研茶調敷兩太陽穴乾則

易之一夜即愈（醫方摘元）

⑧穿山甲一片為末鋪白紙上捲作筒

燒煙熏之（善域神方）

⑨目赤癢痛黃連少加明礬人乳浸蒸

點角（集效方）

⑩暴赤眼痛黃連一分研細末入雞子

白碗中久攪白沫自上浮連點之（

易簡方）

⑪亦目皆痛龍膽草熬膏點之（梅師

方）

⑫火眼紅痛五月取老瓜一條上開小

孔去瓢入芒硝令滿懸陰處待硝透

出刮下留點眼效（肘後方）

⑬決明子炒研茶調敷（集驗方）

⑭亦眼澀痛白薑末水調貼足心妙（

聖濟總錄）

⑮目熱赤痛以田螺取汁入鹽少許點

之（摘元方）

⑯朴硝置豆腐上蒸化取汁收點（聖

惠方）

【風熱目赤】車前子川連各一兩為末

食後溫酒服一錢每日二次（聖惠

方）

②甘草水磨明礬敷眼胞上效（集簡

方）

【肝熱目赤】大田螺七枚洗淨新汲水

養去泥穢換水浸洗起於淨器中着

少鹽花於甲內承取自然汁點目（

藥性論）

③猪肝一個薄切水洗淨以五味食之

（食醫心鏡）

④夜用鹽收豆腐片貼之愈（證治要訣）

【肝虛目赤】青羊肝薄切水浸吞之極

效（眼科龍木論）

【睡起目赤】生地黃汁浸糯米半升曬

乾三浸三曬以米煮粥日食一盞數

日即愈（醫餘錄）

病後目赤 用青布炙熟時時熨之且

蒸大豆作枕 (千金方)

萁內目赤 生地黃切薄溫水浸貼 (

張三丰仙方)

赤絲亂目 青魚膽汁和蜜敷目皆 (

博濟方)

目生赤脈 玄精石一兩甘草半兩為

末每服一錢竹葉煎湯調下 (保幼

大全)

元參為末以米泔水煮猪肝日日蘸

食之 (濟急仙方)

赤目失明 玄精石火煨石決明各一

兩。麩仁黃連各二兩羊肝七個用竹

刀切晒為末粟米飯九梧子大卧時

茶服二十九一月見效 (朱氏集驗

方)

積熱眼澀 三月三日或五月五日採

青蒿花或子陰乾為末每次升華水

空心服二錢久服明目 (十便良方)

羞明怕日 用石決明黃菊花甘草各

一錢水煎冷服 (明目集驗方)

目難遠視 猪肝一具細切去皮膜葱

白一握用豉汁作羹待熟下雞子三

個食之 (普濟方)

睛上生暈 不問久新鯉魚一尺二十

者取膽瀉銅鏡上陰乾竹刀刮下每

點少許去暈 (聖濟總錄)

黑子遮目 用雞蛋二枚煮熟去殼同

桑寄生四五錢清水三碗煎至一碗

加冰糖適可連食數次功效甚速 (

愛竹叢藪)

目痛累年 生螺取汁洗之或入黃連

末在內取汁點之 (陳藏器本草)

努肉攀睛 杏仁去皮尖研膏人乳化

開日點三次 (得效方)

海螵蛸一錢辰砂五分乳細水飛澄

取以黃蠟和收臨卧火上旋丸黍米

大揉入皆中天明溫水洗下亦治外

障極厚者 (百一選方)

努肉瘵突者砂礪少入冰片點之 (

衛生家寶方)

努肉急起遮目 鐵銹磨水時時滴之

(得效方)

努肉菌毒 川連杏仁各一錢歸尾赤

芍地膚子菖蒲各二錢羌活五分白

礬三分煎洗 (醫學正傳)

鮮鯽魚一片中央開竅貼眶上日三

五易 (明目方)

蛇退一條麻油三錢炒黃色不可焦

黑綠豆三合炒沙糖一碗水一碗共

煎七分食遠服 (經驗方)

目中起星 上丁香二分研末黑棗一

枚去皮核同搗爛為丸如蠶豆大星

在左目塞右鼻孔在右目塞左鼻孔

(陶隱居雜錄)

白痰藜三錢水煎服三日即無星 (

六科準繩)

以人乳磨山茨菇汁滴入目中日三

四次即退 (嘉話錄)

等薺汁灑紙上既燥刮之點目極效

(高氏夢花洲開錄)

⑤胡椒、韭菜、薺菜根、橘葉、菊葉、鵝不食草、廣皮、木薑、白豆蔻、川芎、不拘何味，綿裹塞鼻皆可。(銀海精微)

⑥黃柏縛足心，即去。甚驗。(瑣碎錄)

⑦丁香、黑裏塞，塞不患一邊鼻，星斗上時去之。(圖經本草)

【白翳】不落水猪苦膽一個，以小刀刮開，取出苦水，棄去膽囊，將苦水置於銅杓內，向炭爐上煎令乾，即為小丸，如菜子大，候冷，納入目中，遇熱仍化為水，能去翳障，朝夕各納二九，丸盡即愈，神效無比。(銀海精微)

②前馬骨去根葉，燈火上燒成白灰，以燈蕊含於口內，蘸唾點之，其翳自退。(宛委錄)

③礬石置銅器中，水煎成半杯，入蜜少許調之，以綿濾過，每日點三四度，延齡至寶方

【赤翳】田螺一枚，去掩，以黃連末搽之

置中一夜，晚取肉已化為水滴，目則障自消。(香祖筆記)

②熊膽少許，以淨水略調，去盡筋膜，塵土，用冰腦一二片，覆則加生薑粉少許，時以紙捲點眼，奇驗。(齊東野語)

③海蝶蛸一錢，辰砂五分，乳細，水飛澄取，以黃蠟少許，化和成劑，收之，臨卧時，火上旋丸如黍米大，揉入眇中，睡至天明，溫水洗下，未退，更用一次，即效。(海上仙方)

④枸杞子搗汁，日點眼內三五次。(肘後方)

【赤白翳】用烏賊魚骨一兩，去皮為末，入龍腦少許，點目，一日二次。(聖惠方)

【花翳】刀刮指甲細末，和乳點之，其翳自消。(瀕湖集簡方)

【星翳】沃度仿誤一分，華攝林一錢，為軟膏，一日點眼一次。(臨牀醫典)

②白鹽少許，燈心蘸點三五次，不痛不礙，屢用有效。(宣明眼科)

【卒生翳膜】蛇蛻皮一條，洗曬細剪，以白麵和作餅，炙焦黑色，為末，食後溫水服一錢，每日二次。(聖惠方)

②指甲磨人乳點，或象牙和人乳點。(海上方)

③麻雀糞，男用尖而立者，女用圓而倒者，甘草水泡一夜焙乾，研末，調入人乳滴目。(雜興方)

④芒硝一兩，銅器中急火煉冷後，每夜點兩眼角。(聖濟總錄)

【遠年目障】鵝兒不食草、川芎、青黛各等分，為末，搗鼻取嚏。(崔知悌方)

②人指甲炮一分，穿山甲、蟬蛻各五釐，蛇蛻半分，哺退雞蛋殼白皮二分，人乳炒研，每用三釐，含水吹不患一邊鼻。(集效方)

③鹽研細末，以燈心點患上。(龍木論)

【內外障翳】麻黃根一兩，當歸身一錢，同炒黑色，入麝香為末，時時嚙鼻。

普濟方

【**眯目生翳**】物入目中。久而不出。即生翳障。用瞿麥乾薑炮為末。并華水調服二錢。日二服。即愈。(聖惠方)

【**病後生翳**】白菊花蟬蛻等分為散。每用二三錢。入蜜少許。水煎服。驗。(龍木論)

【**眼弦赤爛**】又名爛弦。風雄猪油煉淨一兩。川椒去核開口者三錢。入油內蒸枯。去淨渣滓。以銅綠五錢。研細末。入油。和成膏。臨睡時。敷眼邊周圍。次早洗去。數次愈。(應驗良方)

【**晚蠶砂五錢**。入麻油內浸透。研爛。塗敷二三次。亦效。(陳氏經驗方)

【**硼酸一分**。凡士林一錢。塗敷眼緣。數次之後。奏驗。(西藥大成)

【**白礬煨過一兩**。銅青三錢。研末。開水泡。澄清。點洗。(永類鈴方)

【**火眼赤爛**】以艾葉燒煙。用盆覆之。候煙盡。盆上刮煤下。溫水調化。洗眼。即

瘥。更入黃連。尤佳。(斗門方)

【**風眼赤爛**】明淨皮硝一錢。水三碗。煎濃。露一宿。濾淨。澄清。朝夕洗目。三日即消。雖年久者亦愈。(楊誠經驗方)

【**真麻油浸蠶砂二三日**。研細塗患處。效。(外臺秘要)

【**青黛黃連**。泡湯日洗。殊良。(醫林正宗)

【**黃連浸汁**。爐甘石收敷。(普濟方)

【**風眼下淚**】用臘月不落桑葉煎湯。日溫洗之。或加芒硝少許。(集簡方)

【**木耳一兩**。燒存性。木賊一兩。為末。每服二錢。以清米泔水煎服。(惠濟方)

【**鹽點目中**。冷水洗數次。瘥。(范汪方)

【**青魚膽**。和人乳蒸三次。露三次。點眼角。再用桑葉煎洗。(經驗方)

【**冷淚**】香附蒼朮。椒目末。吹鼻中。眼中膿水。龍膽草。當歸等分為末。每

服二錢。溫開水調下。(鴻飛集)

【**眼生珠管**】生蜜塗於目內。仰卧六小時。乃可洗下。每日一次。良效。(肘後方)

【**手爪甲燒灰**。貝齒燒灰。龍骨各五錢。為末。日點數回。(聖惠方)

【**食鹽三錢**。明礬二錢。泡湯洗。(肘後方)

【**牛膝并葉搗汁**。日點數次。(選奇方)

【**目中息肉**】馬齒莧一大握。洗淨和芒硝末少許。綿裹按上。頻易之。有效。(眼科龍木論)

【**眼皮生瘡**】俗名櫻桃核。即以櫻桃核磨加搽之。其瘤漸消。(明目經驗方)

【**眼生偷針**】眼背上膏盲穴處。第三節骨兩傍。俱有紅點。用針挑破。脂愈。如不用針挑。用燈蕊燒一下。亦可。若不

見點。將大梳在背頻頻刮之。紅點自現。(眼科龍木論)

【**眼皮緣上生紅色小顆粒**。痛癢兼施。

且妨視綫。患者苦之。用白綿線纏手。之無名指盡處。男左女右。週繞七圈。作結牢之。兩三日即消。(銀海精微)

③ 凡眼皮之近鼻處上下。各有白色小孔。一如孔塞。則眼皮必致紅腫。治法以馬鬃或猪鬃之軟柔者通之。覺有微癢。淚液落。則愈矣。(吾學編)

④ 取生南星生地黃各等分。同研成膏。貼二太陽穴。腫能自消。(劉義慶世說)

⑤ 布針一個。對井脫視。已而折為兩斷。投入井中。勿令人見。(物類相感志)

⑥ 切瘦猪肉一薄片。敷於眼胞皮上。隔宿即效。(均樓神書)

【雞盲眼】黃蠟不拘多少。溶汁取出。入蛤粉相和得宜。每用二錢。以猪肝二兩。用羊肝更妙。批開。摻藥在內。麻繩紮定。水一碗。同入銅器內煮熟。取出乘熱薰眼。以愈為度。(應驗良方)

② 明雄黃研細。水飛候乾。每用五釐。以

活雞刺取熟肝。搗和溫酒調服。靈驗異常。(應驗良方)

③ 石膏末一錢。猪肝一片。批薄。摻藥在上。縛定。砂鍋煮熟。切食之。(明目方)

【青盲眼】用烏鴉膽一個。以綫陰乾點之。即愈。(奇效良方)

② 夜明砂糯米炒。黃柏葉各一兩。為末。羊膽汁九桐子大。每卧時。竹葉湯下二十九。瘳乃止。(東觀秘記)

③ 白羊肝一具。黃連一兩。熟地黃二兩。同搗丸。桐子大。食遠。茶服七十九。日三服。(衛生易簡方)

④ 二釐砂三斗。曬乾。每晨服三四錢。淡鹽湯下。(海上名方)

【久患内障】車前子。乾地黃。麥門冬等。分為末。蜜丸。如桐子大。服之。(普濟方)

病後青盲。日近者可治。仙靈脾一兩。淡豆豉百粒。水一椀半。煎一椀。服愈。(明目方)

② 青羊肝切薄片。水浸吞之。(外臺秘要)

【目忽不見】令人嚼母蓋。以舌日舐六七次。以明為度。(聖濟總錄)

② 黃土攪水中。澄清洗之。即明。(肘后方)

【眼珠縮入】老薑燒熟。敷眉心。可治。(芽亭客話)

【眼珠暴出】淫羊霍。威靈仙。各一。痰水煎服。(東觀秘記)

【腫人反背】蜜蒙花。蟬蛻。白菊。郁李仁。生石膏。生草。決明。石決明。甘草。穀精。草。白礬。各四錢。百部二錢。珍珠四分。共為末。分量不可加減。搗爛。煮服。即發冷者。其光必轉。若光未盡轉。再服一劑。必愈。(漁隱叢話)

【倒睫拳毛】石斛。川芎。等分為末。口內含水。隨左右嚙鼻內。日二次。(袖珍方)

② 無名異。末。紙捲作摺。點燈吹而薰之。

睫自起。(愛竹談藪)

③青礬火煨出毒細研。泡湯。澄清。點洗。

(永類鈐方)

④五倍末。蜜調敷眼胞。自起。忌摘。摘之復生。更硬。(壽域神方)

【飛絲入目】以蜂蜜灌入。葱內。將葱之尖頭。略為摘破。復將葱內之蜜。滴於眼內。連滴數次。可保無恙。(悅生隨抄)

②好墨磨濃。用新筆蘸墨。點眼角內。閉目片時。其絲自然成塊。用手輕抹。即出。(琅瑯漫抄)

③細刮人指甲末。和以唾沫點入。其絲即出。不拘三五日。紅腫如桃者。俱效。

(應驗良方)

④石菖蒲搗爛塞鼻。左目塞左鼻。右目塞右鼻。(危亦林得效方)

⑤以諸葛菜葉搗爛。取布包之。滴汁二三點入眼。能出。(寶退錄)

⑥荷花缸內細泥汁。點之。即刻消愈。(

事林廣記)

⑦以筆管吹礬水。泡起。灑絲。自出。(經驗方)

⑧雄雞冠血滴入。看有紅絲。捲去。甚效。

(易簡方)

【蛛絲入目】用明礬末。和入滾水。貯於盆內。將首俯於盆上。頭上罩以布。以水氣薰之。其絲即落於水內。屢試屢效。(居家必用方)

【飛塵入目】切不可用手指亂搓。恐睛擦傷生翳。宜閉目靜坐。撮起上脣。待淚流出。則塵埃隨淚而出。如不去。可令人翻轉胞皮細看。見塵埃。即用新棉花纏火柴桿拭去。惟須注意為要。

(宣明眼科)

②將目緊閉。鼻孔用力呼吸。再將下眼皮翻下。用絹拭之。若眼紅。可點以蓖麻油。須忌光亮。(百一選方)

③急下視。一吐即愈。屢試皆驗。(三元延壽書)

④刮左手指甲末。燈草蘸點之。自出。(直指方)

【麥芒入目】麥芒入目。疼痛非凡。用大麥汁洗之。芒自出。(應驗良方)

②以新布覆目上。持蠅蟻從布上磨之。芒着布而上。出。(千金方)

③蠶砂揀淨。空心。以新汲水吞下十枚。勿嚼破。(普濟方)

【石灰入目】以極細之白糖。化為水。取其濃而清者。將眼皮展開。以糖水滴入。即無害。(李杲十書)

②用生菜油洗滌之。更滴入糖水數滴。不久自愈。(濟生秘覽)

③五穀蟲淘淨。搗油紙上。用布紫好。七日不可動。藥自落。目無恙。(三因方)

④生梔子煎濃汁。頻洗。(普濟方)

【泥沙入目】嚼牛膝搓丸。塞眼角。左眼右嚼。右眼左嚼。(必效方)

【硫酸入目】急用炭酸曹達水洗之。可

滅其毒。如一時不易得。速以大盆清水洗之。亦佳。(急救須知)

【碱水入目】連點牛乳可解。如一時不易得。可用大量清水洗之。有效。(日本治療新報)

【蟾酥入目】紫草。取汁點之。可消。(龔氏經驗方)

【煙夫入目】如將他物洗之。愈洗愈疼。甚至損睛。須用亂髮緩緩揉之。自愈。(宣明方)

【竹木入目】蟻蟪搗爛。塗於目上。立止。(肘後方)

【白頭頭蛆】蛆搗斷。滴血入眼。刺即出。(錦囊秘覽)

【雜物入目】一切物眯目。以指甲抓下。頭髮中垢膩。點入目內。其物即出。(物類相感志)

【新桑根皮】洗淨。搗爛。入眼。攢之。(聖惠方)

【沙石草木入目】中不出。雞肝汁注之。

效。(千金方)

【眼睛打傷】生猪肉一片。以當歸。赤石脂。二味研末。摻肉上。貼之。拔出瘀血。眼即無恙。(通妙真人方)

【物傷睛突】如目系未斷者。即納入。急搥生地黃棉裏縛之。切要避風。(聖濟總錄)

【眼疾預防】眼疾初起時。見白睛現紅色。以綠礬三分之一。紅沙糖三分之一。泡濃汁。用棉花時時蘸塗。眼皮四週。塗時緊閉雙目。勿使汁入目中。(張三丰仙傳方)

【開水泡白菊花】薰之。薰時以中蓋頭。勿使氣散。薰後即以水洗目。眼之紅色自漸退。(王氏奇方)

【不拘左右】其眼略紅。將有糝糊。欲害紅眼之狀。速用藍色棉紗線三寸長。將中指之根。圍箍三道。紫好。紅氣即退。可保無害。(應驗良方)

【洗眼藥水】用頂上西月石一錢。溶解

於五兩之沸水中。即以此水少許。入於茶杯中。取新棉蘸洗。二眼。日三次。每次洗五分鐘。能治各種目疾。(試效錄驗方)

增補單方大全第十編終

第十一編 齒科門

【牙痛】毛薑三錢。西洋參一錢五分。焦

山梔二錢。清水煎服。永無牙痛之患。

(永明軒雜說)

二樟腦三錢。取梔一隻。口上用白紙糊

沒紙面。以針戳極細之孔。乃取樟腦

撒。上燃之。預備較大之梔一隻。俟紙

燃。亟取梔覆其上。樟腦立化成白屑。

候涼。敷於患處。神驗。(牧豎閒談)

三卧時。以新棉花浸人乳。置牙之中間。

輕輕啣住。痛可立減。(嘉祐方)

四以向日葵莖中之髓。燒灰。和梅片。蘸

齒縫上。數次。立有效驗。(醫宗必讀)

五熱石膏研末。與白胡椒調和。擦於牙

痛處。即愈。(薛己醫按)

六龍腦一錢。松節油十二滴。加耶布底

油十滴。浸棉球。填入齒窩。(臨牀醫

典)

七硃硝末二錢。溶水四合。含漱。亦效。(

假日記)

八秋天茄花陰乾。旋燒研末。塗痛處。即

止。(海上名方)

九蘿蔔子十四粒。生研。以人乳和之。左

痛滴右鼻。右疼滴左鼻。(吳囊雜纂)

十青木香末。入麝香少許。搽牙。鹽湯漱

之。(聖濟總錄)

十一火硝一錢。冰片一分。明雄黃一分。元

明粉五分。為細末。擦患處。(得效方)

十二枳殼浸酒含漱。效。(本草綱目)

十三兒茶貼患處。流出風涎。自愈。不可照

下。(局方)

十四青鹽。蓮砂。火硝。樟腦。各一錢。研末。擦

之。(李樓奇方)

十五經宿西瓜皮。燒灰。敷患處。及牙縫內。

立愈。(聖惠方)

十六華搗一錢。川椒五分。石膏三錢。青鹽

四分。共研細點患處。立愈。(集元方)

十七石膏火煨熟。入兩。白蔘去刺。四兩。

為極細末。頻擦之。立愈。每日用之。可

免此患。(本草綱目)

十八黑山梔。桑葉。泡濃湯熱漱。不痛乃止。

(集驗方)

【風火牙痛】南瓜蒂。浸入鹽內。取出風

乾。痛時。取一小塊。嵌齒間。試無不驗。

(刪繁方)

十九端午午時。採雞腸草。曬乾。研之。為末。

患者擦之。有效。(直指方)

二十絲瓜一條。鹽擦過。煨研。頻擦。效。(得

效方)

二十一黃燒存性。為末。早晨搽牙。漱口。良

效。(和劑局方)

二十二青粉十文。大蒜頭一文。和碎。用蜆子

壳。或蛤蜊壳。均可。將和碎青粉。大蒜

放入壳中。牙痛左邊。放入左邊。大指

食指。手背之中。牙痛右邊。放入右邊。

至二時泡出即愈。(芝隱方)

六 蘿蔔子十四粒。生研。人乳和。左痛點右。右痛點左鼻。(宣明方)

七 荔枝殼燒存性研末。頻搽之。(百一選方)

八 白芷焙末。蜜丸。以硃砂為衣。每服一粒。荊芥湯下。(本草萬方鍼錄)

濕熱牙痛 用羊脛骨炙灰二錢。白芷當歸。牙兒青。鹽各一錢。共為末。擦之。(李杲十書)

二 孩兒茶。礪砂等分為末。頻擦。涼水漱吐。勿嚥。(外科秘要)

三 槐樹枝濃煎。入鹽煮乾。炒研。日搽。效。(濟眾方)

四 生絲瓜一條。擦鹽。火燒存性。研末。頻擦。涎盡即愈。(會療本草)

風寒牙痛 高良薑二寸。全蠍焙一枚。為末。擦之。吐涎。以鹽湯漱口。(百一選方)

陰虛牙痛 枸杞一兩。並瘦猪肉。食一

二次。神效之至。(范汪方)

二 生附子研末。口水調敷。兩足心。極效。(產乳集驗方)

三 時用陳呂宋煙灰。代牙粉擦牙。亦有奇效。(萬國治療年報)

四 西洋參切片貼。龍眼肉亦可。(直指方)

五 元氣不足。牙齒浮痛。骨碎補。銅刀細切。慢火炒黑。為末。搽之。良久吐去。坦仙皆效方)

腎虛牙痛 甘松。香硫黃。等分為末。泡湯漱之。(經驗濟世方)

二 補骨脂二兩。青鹽五錢。炒研。擦之。(百一選方)

蟲蛀牙痛 可以芥子泥敷於頰部及耳後。再用生薑二片。貼於太陽上。時取上好老酒。含於口中。若有蛀孔。則先以棉花團成小團。然後浸於石灰酸水內。填入孔中。(梁氏總要)

二 用蒸木油一英兩。用棉花作一丸形。

浸此藥水。塞入蛀牙孔內。上再用薄棉蓋之。(醫林集要)

三 剪取桃樹之枝。以綿皮條裹其一端。蘸菜油於燈上熏熱。置痛齒上炙其一端。如是數次。蟲覺痛止。屢試屢驗。(東醫寶鑑)

四 韭菜子燒煙熏之。牙蟲即出。其法以筆管。用紙糊刺以樣。可以收煙。(應驗良方)

五 白直隴蠶炒。蠶紙燒。等分為末。擦良久。鹽湯漱口。效。(元山遺方)

六 芭蕉自然汁一椀。煎熱。含漱。(經驗方)

七 霜殺老絲瓜。燒存性。白湯服。並擦痛處。(雀知悌方)

打動牙痛 蒺藜子或根為末。日日搽之。(瑞竹堂方)

牙根腫痛 瓦花白礬等分。水煎漱之。立效。(葉氏摘元方)

二 芥菜桿。燒存性。研末。頻敷之。即愈。

衛生寶鑑

③紅燈籠(即山慈姑)枝根煎湯漱口。

(孫氏集效方)

④隔年糟茄燒灰頻頻乾擦即效。(海上名方)

上名方)

牙痛頰腫桃白皮柳白皮槐白皮等分煎酒乘熱漱口冷則吐之。(聖惠方)

齒腐齧爛上好鹵鹼熱湯淋取其汁用石器熬乾刮下入麝香少許研勻

搽上(宣明方)

②絲瓜藤一握川椒一撮燈芯一把水煎濃汁漱口。(醫學正傳)

③芥菜乾燒存性研末頻敷愈。(食療本草)

④生地一斤鹽二合倒和成團以濕麪包煨令煙盡去麪入麝香一分研勻

日夜貼(肘後方)

齒齧黑臭苦參煎湯漱口數日有效(本草綱目)

牙癰刺出毒血用珍珠散吹之內服酒炒龍膽草歸尾各錢半酒炒黃芩木通澤瀉車前子酒炒生地生甘草各一錢水煎服即愈。(褚氏遺書)

牙疳又名骨槽風未潰爛者用橘紅五錢半夏白芥子研各二錢雲苓錢半甘草一錢加陽和丸煎服已潰爛者用熟地一兩真鹿角膠三錢上肉桂甘草各一錢麻黃炮薑各五分加犀黃丸煎服每日早晚各一次如有多骨在內用推車散吹之其骨即不痛自出神效(萬全方)

走馬牙疳真青黛一錢硼砂一錢龍腦薄荷末五分人中白一錢外口兒茶一錢元明粉五分馬屁勒五分梅花冰片二分研細擦之病甚者加犀黃三分珍珠五分效尤捷(本事方)

②人中白入甕瓶內鹽泥固封煨紅研末入麝香少許貼之(文潞公方)

③用瓦壺子連肉火煨存性置冷地用

蓋蓋覆候冷取出報為末搽患處(本草綱目)

④馬蹄燒灰入鹽少許搽患處可愈(陳日華經驗方)

⑤用少許桐油敷患處三五次即效若入口覺有桐油氣即非是症宜止之(蘇悅亭方)

⑥銅青滑石杏仁等分為末搽之立愈(卯真人經驗方)

⑦蜘蛛一枚銅綠五分麝香少許杵勻搽之(直指方)

⑧取楓樹球扯去毛塞滿食鹽瓦上炙存性加梅片少許研為細末搽之神效(醫學指南)

⑨蛔蟲瓦上焙乾研細末和青黛冰片少許研勻吹入(集驗方)

⑩黃蘗青黛各一錢冰片一分研細擦(三因方)

⑪五倍子青黛枯礬黃蘗等分為末先以鹽湯漱淨擦之(集簡方)

青腿牙疳

此症兩腿形如雲或紅或青大小不一痛而腫硬步履艱難其毒上攻以致牙根腐爛甚致穿腮破唇急將腿上腫處用磁鋒刺破出血以牛肉片貼之日換數次甚驗(宣明方)

牙宣

用胎髮團煨存性敷之血自止(兵部手集)

① 參冬三錢煎湯漱口立效(應驗良方)

方)

② 川芎煎水或飲或漱靈驗(應驗良方)

③ 用黃豆渣敷之或用生黃豆嚼融亦可(醫家大法)

可(醫家大法)

④ 五倍子燒存性研敷(十便良方)

⑤ 苦參一兩枯礬一錢為末日搽三次並常以鹽湯漱之(和劑局方)

並常以鹽湯漱之(和劑局方)

⑥ 馬蘭頭杵爛塞患處立止(普濟方)

⑦ 麥冬煎湯頻漱口以止為度(完業六書)

六書)

⑧ 地龍末枯礬各一錢麝香少許研勻

擦(直指方)

① 枸杞根為末煎湯先漱後服

② 絲瓜藤灰擦之立止(至寶方)

③ 烏梅煮去核取肉搗成丸敷患處數丸即愈(會療本草)

④ 草決明煎湯含之即止(本事方)

⑤ 松針熱汁入飛麵少許搗勻登飲(濟眾方)

濟眾方)

牙縫出膿明雄末二兩真小磨麻油四兩調勻含漱片時吐出再漱數次即愈(丹溪纂要)

即愈(丹溪纂要)

齒齦宣露每晨噙鹽熱水含百遍五日後齒即牢(千金方)

日後齒即牢(千金方)

日後齒即牢(千金方)

齒疎陷物爐甘石煨寒水石等分為末每用少許擦牙忌用牙刷久之自密(集玄方)

末每用少許擦牙忌用牙刷久之自密(集玄方)

密(集玄方)

① 蚯蚓泥水和成團服赤研末臘猪脂調敷之日三次(千金方)

調敷之日三次(千金方)

② 絲瓜藤陰乾臨時火煨存性研擦最妙(海上名方)

妙(海上名方)

睡中磨齒臨睡時含糖一小塊可免(三輔故事)

(三輔故事)

蟲齧齒動鹽半兩皂莢兩枚同燒赤研細夜夜搽齒一月後並瘻其齒牢固(食療本草)

研細夜夜搽齒一月後並瘻其齒牢固(食療本草)

固(食療本草)

① 爐府石煨寒水石等分為末每日齒齧擦久自密(宣明方)

齧擦久自密(宣明方)

② 乾地黃羌活去蘆等分為末每服二錢水一盞酒少許煎十餘沸去渣溫漱冷吐(經驗方)

錢水一盞酒少許煎十餘沸去渣溫漱冷吐(經驗方)

漱冷吐(經驗方)

固齒用火煨羊脰骨為末入飛鹽二錢同研勻日日擦牙固齒妙法(食醫心鏡)

錢同研勻日日擦牙固齒妙法(食醫心鏡)

醫心鏡)

① 平日小便時緊閉牙關永行此法至老齒牙不落且免牙痛(醫宗金鑑)

老齒牙不落且免牙痛(醫宗金鑑)

② 用旱蓮根一斤酒洗淨青鹽四兩醃三宿同汁炒乾研末日用擦牙連汁漱之自能固齒(本草綱目)

三宿同汁炒乾研末日用擦牙連汁漱之自能固齒(本草綱目)

③ 青鹽二兩白鹽四兩以川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用擦牙永無齒疾

汁拌鹽炒乾日用擦牙永無齒疾

④ 青鹽二兩白鹽四兩以川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用擦牙永無齒疾

(集效方)

【取除痛牙】鳳仙花子研末入砒少許。點痛牙根上。取除極易。(葉氏摘玄方)

方)

(三) 礪砂入鯽魚內。煨過。瓶收。待有霜。刮下。以針披開牙根。點少許於內。自落。

(醫學集成)

【薑黃擦白】取糯米糠。燒成白灰。時時擦之。立白。(本草綱目)

擦之。立白。(本草綱目)

【食梅齒齲】食梅子而齒齲者。嚼胡桃肉。立愈。(應驗良方)

【食榴損齒】即用石榴皮。燒存性。研末搽之。(應驗良方)

【食蟹齲腫】朴硝數齲上。其腫即消。(普濟方)

普濟方)

【預防牙症】用頂上白礪砂二錢。薄荷油二滴。溶化於六兩之淨開水中。作漱口料。每日漱口數次。可免一切牙症。(日本藥局方)

第十二編 傷科門

【跌打損傷】十一月採野菊花連枝葉

陰乾用時取一兩加童便無灰酒各一椀同煎熱服灌下立甦。(王阮亭居易錄)

居易錄

②大鯽魚一尾獨核兒莢一個胡椒七粒黃梔子九個老薑一片蔥頭三個野苧麻根一段乾麵一撮香糟一團紹酒隨意用同藥搗如泥炒熱敷患處外用布包紮緊次日青出即愈神效。(醫方選要)

③金雀花根搗汁和酒服其渣敷於傷處。(濟世良方)

④白礬末一匙泡湯一杯以布蘸水乘熱熨傷處少時痛止。(靈苑方)

⑤取骨碎補根搗細篩過煮黃米粥和裏傷處有效。(本草綱目)

⑥寒食蒸餅為末每服二錢酒下甚驗。(肘後方)

⑦生地黃糟各一斤生薑四兩共炒熱布裏裹傷處冷即易之。(本事方)

⑧碘酒五錢酒精一兩調和塗傷處(急救須知)

⑨接骨木五錢乳香五分芍藥當歸芍藥自然銅各一兩為末化黃蠟四兩投藥攪勻為丸如芡子大傷損時酒化一丸若折斷筋骨先用此數貼後服。(衛生易簡方)

⑩先用熱童便灌後以麻油好酒各一椀煎服暖臥一夜即愈。(三因方)

⑪酒糟卷之甚佳。(活人書)

⑫冬瓜子炒研細末溫酒沖服三錢日二次垂危者蚓蚯煎酒服(醫林正宗)

⑬乾冬瓜皮牛皮膠各一兩剉碎研末每五錢熱酒下能飲者酒宜多酒後蓋取微汗痛即止

⑭黃葵子二錢研酒服(本草萬方針線)

⑮過身打傷大生蟹搗極爛大熱酒沖服極醉為度(直指方)

⑯綠豆粉炒紫色新汲水調敷以杉木皮縛定(本事方)

⑰老蠶豆磨粉同白蠟調和成膏貼(醫學入門)

⑱樟腦酒遍擦傷處止痛去瘀屢試屢效(新內科全書)

【破口傷】龍眼核剝去光皮將核研細擦瘡口即定痛止血(殷仁社傳方)

⑲蔥白砂糖等分研封之其痛即止更無癰痕用蔥葉亦可(百一選方)

⑳薄荷油十滴羊毛脂五錢華蟲林一兩塗之(日用寶鑑)

㉑石炭酸一錢亞麻仁油四錢以沈降炭酸石灰適宜拌和挾於布片之間

貼於創上。(日本治療新報)

⑤白芍藥一兩。熬黃為末。酒或米飲湯服二錢。漸加之。仍以末敷創上。血即止。良驗。(廣利方)

⑥月季花葉搗爛。敷之。立能止血消腫。雖斷筋。亦能速愈。(陶華六書)

⑦何首烏末。敷之。即止。神效。(筆峯雜興)

⑧出血不止者。五倍子末貼之。若氣閉者。以五倍子末二錢。入龍骨末少許。開水服。立效。(談楚翁方)

【破傷風】霜降後。稻田內尋取灰色之蚱蟻。同殼裝入布袋內。曬乾。勿令受濕。常曬為要。遇此症。用十數個。瓦上煨存性。酒下。立愈。(救生苦海)

⑨摘七樹。刮去外面粗皮。取內白皮。搗爛。酒煎服。渣和白麵敷患處。自愈。(百草鏡)

⑩黃連五錢。酒一盞。煎七分。入黃蠟三錢。溶化。後乘熱服下。(高氏蓼花洲)

閱錄

④草烏尖白芷生研末。每服五分。冷酒一杯。入葱白一根。搗爛服。少頃。再以葱白煮粥投之。汗出即愈。(儒門事親)

⑤威靈仙五錢。獨頭蒜一個。香油一錢。同搗爛。熱酒沖服。汗出即愈。(衛生易簡方)

⑥乾蟻麝香各一分。為末。敷患處。避風速愈。(普濟方)

⑦黃明膠。燒存性。研末。酒服二錢。取汗。(普濟方)

⑧亂鬚一團。如雞子大。無油器中。熬焦。黑研。以好酒一盞。沃之。入何首烏末二錢。灌之。俄頃。再服。(本草衍義)

⑨人手足指甲。燒存性。六錢。薑製。南星。獨法。丹砂各二錢。為末。分作二服。酒下。立效。(普濟方)

⑩黑豆四十枚。硃砂二十文。同研末。以酒半盞調服之。甚佳。(經驗良方)

①破傷風咬指縮舌。腰背反張。勢在垂危者。天南星薑汁炒。防風白芷。天竺沙斷絲。研細末。每服三錢。童便和好酒調服。效。(外方秘要)

②蟬蛻五錢。去頭足。為末。好酒煎服。(談楚翁方)

③荆芥五錢。炒黃魚鱗五錢。黃蠟五錢。艾葉三斤。入無灰酒一椀。重湯煮熟。飲之。汗出即愈。百日內忌雞。(經效濟世方)

④破傷風作白痴無血者。殺人最急。以黃雀糞直者研末。熱酒服半錢。(完素六書)

【下頷脫落】須平身正坐。今人以兩手托住下頷。向腦後送上。關竅。隨用布條繫住。務須避風。外用天南星研末。薑汁調敷兩頰。一夜即上。另服調理藥自愈。(龔信醫鑑)

【舌頭咬斷】先以乳香沒藥煎水含口中。止痛。後即將寒水石黑鉛輕粉。研

砂研細粉。頻抹。以長全為度。(十使良方)

舌頭割傷 垂落而未斷者。雞子白軟皮袋上。以花粉三兩。赤芍二兩。薑黃白芷各一兩。研細。蜜調塗舌根斷處。再以蜜調蠟稀稠得所。敷難于皮上。三四日。舌接去皮。只用蜜蠟。(應驗良方)

舌斷血出 鵝翎蘸米醋。頻刷斷處。其血即止。仍用蒲黃。杏仁。研砂少許。為末。蜜調成膏。噙化。(博濟方)

閃頸 以舊油木梳。火上烘熱。梳背於疼處。極力刮之。自愈。(海上名方)

②真礪砂研以燈心蘸點眼內四角。淚出即凝。連三次立效。(小品方)

接骨法 折傷接骨。以開元古錢一枚。火煨醋淬。以錢化為度。研為細末。以酒沖服。則銅末自結而為圈。周束折處。(槐西雜志)

②地蘇木接骨。仙桃各五錢。臭梧桐花

三錢。八角金盤根一錢。煎酒服。(救生苦海)

③雲臺子一兩。小黃米炒二合。龍骨少許。為末。醋調成膏。攤紙上貼之。(乾坤秘韞)

④杉木炭。研極細末。用白沙糖蒸極融化。將炭末和勻。攤紙上。熱乘貼之。數日即愈。屢試屢驗。(使民圖纂)

⑤市上乞兒破鞋底。一隻。燒灰。白麵等分。好醋調成糊。敷傷處。以絹束之。杉片夾定。須臾痛止。骨節有聲。為效。(楊誠經驗方)

⑥大蠟。麝生研如泥。劈竹裹縛其骨。自愈。(吳彙備急方)

腦破骨折 透明龍齒。人參各三錢。生

地三錢。象皮三錢。冰片三分。地虱二十個。蜈蚣三個。去頭翅。先將人參各項研末。用蜈蚣地虱搗爛。入前藥搗之。佩身上。三日。乾為末。瓶貯。遇有此等險症。服一錢。即愈。神效之至。本

草拾遺

②蜂蜜和葱白搗勻。厚塗立效。(肘后方)

跌破頭額 五倍子末。白礬末各半。研和。置於玻璃。臨時取少許。敷於傷處。此二藥能使破壞之微血管收縮。血即止而不流。(瑞竹堂方)

③生半夏研末。醋調敷。累效。(仁存堂方)

跌打傷筋 韭菜搗爛。敷過一次。即愈。(應驗良方)

②生旋覆花根。搗汁滴入。並敷。日換三次。敷至半月。雖筋斷亦續。其效非常。(衛生易簡方)

③葛根搗汁飲。乾者煎服。仍蒸屑敷之。(外臺秘方)

④蟹去殼同黃。搗爛微炒。敷傷處。筋能連續。(陳藏器草本)

⑤跌打筋斷者。絲瓜開花時。清晨採肥厚之葉。陰乾。搽之。大妙。(壽域神方)

【跌打傷骨】糯米一升。皂角切碎半升。青錢百枚。同炒焦。去錢。研末。酒調貼。

(普濟方)

③南星木鼈各四兩。乳香沒藥官桂各一兩。研末。生薑一斤。去皮搗汁。入醋少許。加白麵調糊。攤紙上貼。外用帛纏杉木夾縛。自能痊愈。(扶壽方)

【跌打青腫】白木耳四兩。如無白者。黑者亦可。用焙乾為細末。每服一兩。麻油拌勻。好酒送服。藥完。其患若失。百發百中。(證治要訣)

②無名異為木酒服。趕下四肢。瘀血皆散。(朱氏集驗方)

③鳳仙花葉。搗如泥。塗腫處。乾則又換。一夜血散。即愈。冬月收取乾者。研末。水和塗之。(世醫通變要法)

④生梔子末。白麵同搗塗之。拔出青毒。即消。(窮鄉便方)

⑤跌打損傷。遍身青腫。瘀停作痛。墜仆。內傷。木耳四兩。遍研細末。每服一兩。

麻油三匙。好酒調送。日服二次。(證治準繩)

⑥手足肩背被打傷。青腫紫赤。血痕疼痛。蘇木煎汁。磨真降香塗。勿落水。(必效方)

【損傷不食】生豬肉二錢。打爛。溫水洗淨。再搗爛。以陰陽水打和。取五分。用雞毛送入咽內。仍以陰陽水灌下。自然開解。(邵氏良方)

②白糖用酒沖服。水沖服亦可。以多為妙。(救急易方)

【墜損嘔血】乾荷花為末。每酒服一匙。效。(三因方)

【閃跌手足】生薑葱白。搗融。和灰麵炒熱敷之。或用生大黃和生薑汁磨敷。為妙。(衛生易簡方)

③當歸葱白。荆芥煎洗。(乾坤生意) 閃跌傷腰。續斷。大黃骨碎補。沒藥。歸尾。虎骨。赤芍。各二錢。紅花。自然銅。煎醋淬。穿山甲。劉寄奴。各一錢。絲瓜絡。

半個。共煎水。酒服。(指南方)

②真橙子核一錢五分。製香附一錢。炒研為末。酒服三錢。極效。(十便良方)

③白葡萄乾一兩。用好酒煎服。至重者。兩服全愈。(應驗良方)

④時華作末。酒服二錢。甚良。(永類鈴方) 【打撲囊破】打撲或墜損。致囊破。辜丸墜出者。宜緩緩托入。多取壁錢。厚貼傷處。(直指方)

【損傷腸出】急以麻油潤瘡口。輕手納入。搗鼻取嚏。或以冷水噴面。腸自收上。隨以桑白皮縫合。外搽血竭末。或百草霜末。(醫學正傳)

②大麥粥汁。洗腸推入。飲米磨百日乃可。(中藏經)

【騎馬傷股】抱過雞蛋壳。新瓦上焙枯。研末。麻油調搽。即愈。或照破口傷治法治之。(醫餘錄)

【墜馬拘傷】用桑白皮五斤。為末。水一升。煮膏敷之。即愈。後無宿血。亦不更。

發。(外科精義)

【鐵針入肉】薔薇花根研末。搽之。服龍
撲十日。其針自出。(外臺秘要)

② 括蕤根搗敷之。日三易。頗驗。(崔元
亮海上集驗方)

③ 陳火腿皮。搥爛塗敷。即出。極效。(應
驗良方)

④ 雙杏仁搗爛。以車脂調貼。針即出。(瑞
竹堂方)

【槍子入肉】南瓜瓢敷之。即出。晚收南
瓜。浸鹽滴中。備用亦良。(芝隱方)

【磁片入肉】三角形白果。去殼與心。不
拘多少。浸菜油內。取出。搥融。貼之日
換一次。雖入肉多年。爛而不出者。三
次即愈。(經驗良方)

【骨刺入肉】象牙刮末。以水煮白梅肉。
調塗。骨刺自軟。(簡要濟眾方)

② 山查研末。調敷。(應驗良方)

【竹木入肉】木刺等。隔入皮膚內。可用
蒸汽拔出之。用小口燒料。餅中儲沸

水。及半。將被刺之處。與餅口緊接。須
不洩汽。餅內之水。漸冷。蒸汽凝結。為
水。則餅內之空氣。壓力較瓶外為低。
自能將膚中之刺。吸出。(暇日記)

② 白茅根燒末。豬脂和塗之。甚效。(肘
後方)

③ 竹木入肉。不出者。鹿角燒灰研末。水
和塗。不過一夜。即出。(類聚方)

④ 白梅搗爛。層之。自出。(墨娥小錄)

【水銀入肉】真川椒研末。生蛋白調敷。
用布包緊。過夜。即出。(退齋閒覽)

② 以金物熨之。水銀當出。蝕金候金白
色。便愈。(丹砂秘訣)

中華民國八年七月初版
中華民國八年八月再版
中華民國十年十月補增四版

版權
所有
不准
翻印

三版
增補
單方大全(全一冊)

定價大洋六角

外埠函購酌加滙費郵費

編輯者
廣文書局編輯所

重訂者
無錫顧鳴盛

印刷者
上海廣文書局

代售處
北京廣州
漢口杭州
世界書局

總發行所
(上海四馬路)
世界書局