

醫燈續焰目錄

卷之九

疝氣脉證第六十四

桂附二陳湯

東垣川苦楝散

金匱烏頭煎

見第十七

和劑葫蘆巴丸

蘇合香丸

見第十八

桂枝湯

見第十九

東垣丁香楝實丸

茴香散

木香散

天台烏藥散

見第六十三

腰子散

五苓散

見第十七

仲景牡蠣澤瀉散

正氣天香散

見第十七

金匱蜘蛛散

荔枝散

三層茴香丸

濟生橘核丸

香附散

龍膽瀉肝湯

加味道遙散

見第五十一

腰痛脉證第六十五

調肝散

加味道遙散

見第五十一

逍遙散 見第五十一

東垣羌活勝濕湯

川芎肉桂湯

九味羌活湯 見第十六

金匱腎氣丸 見第十六

六味地黃丸 見第十六

直指青娥圓

東垣蒼朮湯

統旨清濕散

四物湯 見第二十一

平胃散 見第四十四

導痰湯 見第四十一

保命煨腎丸

黑地黃丸 見第五十一

知藥地黃丸 見第五十四

局方普賢正氣散

二至丸

子和無比山藥丸

金匱腎着湯

見第二十一

子和禹功散

良方人參順氣散

烏藥順氣散

見第六十三

調榮活絡飲

仲景桃仁承氣湯

見第二十二

滾痰丸

見第十七

脚氣脉證第六十六

麻黃湯

見第十六

桂枝湯

見第十九

九味羌活湯

見第十六

敗毒散

見第三十七

集驗麻黃左經湯

得効芩芷香蘇散

大黃左經湯

小柴胡湯

見第四十三

半夏左經湯

大料神秘左經湯

加味敗毒散

胃苓湯

見第十七

六物附子湯

仲景麻黃附子細辛湯

金匱八味丸

見第十六

茱萸木瓜湯

神應養真丹

追毒湯

卷之十

痿病脉證第六十七

丹溪虎潛丸

補陰丸

四物湯 見第二十一

三因加減四斤丸

東垣神效黃耆湯

錢氏瀉黃散 見第四十九

仲景炙甘草湯 見第三十三

黑地黃丸 見第五十一

知藥八味丸 見第五十四

加味道遙散 見第五十一

胃苓湯 見第十七

金匱防己黃耆湯

東垣參朮湯

六味地黄丸

見第十六

痺病脉證第六十八

當歸湯

紫蘇子湯

茯苓神湯

革薺丸

奇効人參散

加味五痺湯

温中法麴丸

黃耆丸

茯苓川芎湯

腎瀝湯

仙靈脾散

三因控涎丹

見第二十

烏藥順氣散

見第六十五

丹溪二妙散

東垣神効黃耆湯

見第六十七

東垣溫經除濕湯

史國公浸酒方

五疸脈證第六十九

金匱茵陳湯

金匱消石礬石散

金匱梔子大黃湯

金匱黃耆芍桂酒湯

金匱桂枝加黃耆湯

金匱猪膏髮煎

金匱茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

小柴胡湯

見第四十三

小建中湯

卷之十一

水病脉證第七十

金匱防已黃耆湯

見第六十七

仲景越婢湯

金匱防已茯苓湯

金匱蒲灰散

越婢加朮湯

即前越婢湯

甘艸麻黃湯

當歸散

分氣補心湯

分氣香蘇飲

導水茯苓湯

胃苓湯

見第十七

元戎調胃白朮澤瀉散

金匱腎氣丸

見第十六

濟生腎氣丸

調榮飲

四製香附丸

濟生實脾飲

復元丹

見第六十四

金匱桂枝去芍藥加麻辛附子湯

金匱枳朮湯

麻黃附子湯

葶藶丸

和劑五皮飲

除濕湯

見第二十一

四磨湯

疏鑿飲子

五苓散

見第十七

和劑木香流氣飲

和劑黑錫丹

和劑蘇子降氣湯

寶鑑導滯通經湯

和劑木瓜圓

消導寬中湯

加味五皮湯

消風敗毒散

和劑升麻和氣散

補中益氣湯

見第三

六味地黃丸

見第十六

東垣人參平肺散

八正散

見第四十九

仲景梔子豉湯

醫燈續焰卷九

錢塘後學潘楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

門人

余正巳君求

校

李國璋彥卿

疝氣脉證第六十四

疝氣弦急積聚在裏。牢急者生。弱急者死。

疝氣者。氣聚而大。外仍斂束。故脉則見弦急而症

則多脹痛也。字下從山。亦是聚而大之之義。皆從寒濕積鬱于裏得之。間有曰風。曰熱者。亦不過寒風濕熱耳。其發也。多惡寒寒熱。嘔逆不食。狀類傷寒。但兼腹痛。或小腹痛脹。或只遶臍痛。或上衝心胸痛。或傍引脇肋痛。或臍下鞮急。硬同或氣走腸鳴。或控引羣丸。痛脹急墜。或氣歸囊袋。收縱不時。甚或囊外或冷。或濕。或熱。或紅。亦有出水。及久久成癰者。此皆裏有故積。復感風寒水濕。或加奔走焦勞。

以致觸動積邪。氣聚而發。或一二日。或延多日。得  
溫煖及出汗。俱能氣散而解也。其脈弦急者。弦急  
乃厥陰肝脈。疝多發于肝故也。又弦歛急直。氣不  
鼓暢。主諸痛脹。疝則未有不痛不脹者。若弦急而  
牢。見積聚之有根。亦徵元本之壯實。脈證兩宜。故  
曰生。若但急而弱。急則邪盛。弱則正衰。更非積聚  
在裏者之所宜。故曰死。所云多發于肝者。素問五  
藏生成論。平人氣象論。長刺節論。謬刺論。及靈樞

經脉篇之言也。而素問骨空論又云。有發于任脉  
督脉者。素問陰陽別論。五藏生成論。脉要精微論。  
玉機真藏論。大奇論。四時刺逆從論。及靈樞邪氣  
藏府病形篇。經筋篇。又皆云有發于別藏別府者。  
骨空論言任脉有內結七疝之名。而未有七疝之  
狀。巢氏因敘七疝曰厥疝。曰癥疝。曰寒疝。曰氣疝。  
曰盤疝。曰胙疝。曰狼疝。而張子和復立七疝之名  
曰寒疝。曰水疝。曰筋疝。曰血疝。曰氣疝。曰狐疝。曰

此論詳盡無遺

癩疝。外復有小兒瘻疝。及膀胱小腸等氣。亦指稱爲疝者。聚訟紛紛。迄無定論。近惟張景岳一辯。最爲詳悉得理。茲錄于左。不敢再贅。景岳曰。愚按本經諸篇。所言疝證不一。有云狐疝者。以其出入不常也。有癩疝者。以其頑腫不仁也。有衝疝者。以其自少腹上衝心而痛也。有厥疝者。以積氣在腹中而氣逆爲疝也。有瘕疝者。以少腹窵然而痛也。白一名蠱也。有六經風疝者。如四時刺從論之所

云也。有小腸疝者。如邪氣藏府病形篇曰。小腸病者。小腹痛。腰脊控睪而痛。時窘之後者。亦疝之屬也。是皆諸疝之義。按骨空論曰。任脉爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。蓋任脉者。起于中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。總諸陰之會。故諸疝之在小腹者。無不由任脉爲之原。而諸經爲之派耳。云七疝者。乃總諸疝爲言。如四時刺逆從論所言者六也。邪氣藏府病形篇所言者一也。蓋以諸經

之疝。所屬有七。故云七疝。若狐癩衝厥之類。亦不  
過爲七疝之別名耳。後世如巢氏所敘七疝。則曰  
厥。癥。寒。氣。盤。疝。狼。至張子和非之曰。此俗工所立  
謬名也。蓋環陰器上抵少腹者。乃屬足厥陰肝經  
之部分。是受疝之處也。又曰。凡疝者。非肝木受邪。  
則肝木自甚。皆屬肝經。於是亦立七疝之名。曰寒。  
水。筋。血。氣。狐。癩。治多用下。繼自丹溪以來。皆宗其  
說。然以愚觀之。亦未爲得。夫前陰小腹之間。乃足

如此分治直  
能挈要提綱  
又何愁多證  
耶

三陰。陽明任。衝。督脉之所聚。豈得獨以厥陰經爲  
言。但如四時刺逆從論所云。六疝皆兼風言者。本  
非外入之風。蓋風屬肝。肝主筋。故凡病各經之疝  
者。謂其病多在筋而皆挾肝邪。則可若謂必在厥  
陰。則不可也。後世議論徒多。又安能出內經之圍  
範哉。學者當以經旨爲正。至于治之之法。大都此  
證寒則多痛。熱則多縱。濕則多腫墜。虛者亦然。若  
重在血分者不移。在氣分者多動。分察六者於諸

經。各因其多少虛實兼治之。自無不効也。

### 巢氏七疝狀

厥逆心痛。足寒諸飲食吐不下。名曰厥疝。宜桂附二陳湯

之類

腹中氣滿。心下痛。氣積如臂。名曰癥疝。宜東垣川苦棟散

寒飲食。即脇下腹中盡痛。名曰寒疝。宜仲景烏頭煎和劑葫蘆

巴丸之類

腹中乍滿乍減而痛。名曰氣疝。宜蘇合香丸東垣川苦棟散之類

腹中痛在臍傍。名曰盤疝。

宜桂枝湯東垣丁香棟實丸之類

腹中臍下有積聚。名曰胛疝。

宜茴香散之類

小腹與陰相引而痛。大便難。名曰狼疝。

宜木香散丁香棟實

丸之類

張子和七疝狀

寒疝。其狀囊冷結硬如石。陰莖不舉。或控舉丸而

痛。得於坐卧濕地。或寒月涉水。或冒雨雪。或坐卧

磚石。或風冷處。使內過勞。宜以溫劑下之。久而無

幸丸外腎陰  
疝也

子。宜東垣天台  
烏藥散之類

水疝。其狀腎囊腫痛。陰汗時出。或囊腫而狀如水  
晶。或囊癢而搔出黃水。或少腹中。按之作水聲。得  
于飲水醉酒。使內過勞汗出。而遇風寒濕之氣。聚  
於囊中。故水多。令人為卒疝。宜以逐水之劑下之。  
有漏針去水者。人多不得其法。宜腰子散五苓散  
仲景牡蠣澤瀉散

之類

筋疝。其狀陰莖腫脹。或潰或膿。或痛而裏急筋縮。

醫  
登  
續  
百  
卷  
九  
六  
陸  
也  
舟

或莖中痛。痛極則痒。或挺縱不收。或白物如精。隨  
溲而下。久而得于房室勞傷。及邪術所使。宜以降

心之劑下之。

宜白芍 茯苓 當歸 小茴香  
青皮 黃蘗 蒼朮 川楝之類

血。疝其狀如黃瓜。在少腹兩傍。橫骨兩端約中。俗  
云便癰。得于重感。春夏大燠。勞於使內。氣血流溢。  
滲入脬囊。留而不去。結成癰腫。膿少血多。宜以和

血之劑下之。

宜歸芍 牛膝 靈脂 青皮 木  
香 丹皮 沒藥 玄胡 索之類

氣疝。其狀上連腎區。下及陰囊。或因號哭忿怒。則

氣鬱而脹。怒哭號罷。則氣散者是也。有一治法。以針出氣而愈者。然針有得失。宜以散氣之藥下之。或小兒亦有此疾。俗曰偏氣。得於父已年老。或年少多病。陰痿精怯。強力入房。因而有子。胎中病也。此證不治。惟築賓一穴灸之。

宜正氣天香散之類

狐疝。其狀如瓦。卧則入小腹。行立則出小腹。入囊中。狐則晝出穴而溺。夜則入穴而不溺。此疝出入上下往來。正與狐相類也。亦與氣疝大同小異。今

諸蒙另立諸疝之名各隨

其病形狀而設分言有寒熱筋水氣血之殊總不出腹中厥氣爲患耳

人帶鈞鈴是也。宜以逐氣流經之藥下之。宜金匱蜘蛛散

之類

癩疝。其狀陰囊腫縋。如升如斗。不痒不痛者是也。

得之地氣卑濕所生。故江淮之間。湫澹之處。多感

此疾。宜以去濕之藥下之。女子陰戶突出。雖亦此

類。乃熱則不禁固也。不可便謂虛寒而澁之。燥之。

補之。本名曰瘕。宜以苦下之。以苦堅之。宜荔枝散三層茴香

丸。濟生橘核丸。香附散之類。女子陰突。肝火居多。宜龍膽瀉肝湯加味逍遙散。或少加升提之類。

已上子和論疝七條。形證可謂詳悉。但七疝七名。形證亦異。治之當各有方。而俱云下者。恐出偏見。今擬對證方藥于下。在診之者。合宜則用。亦不敢槩云不可下也。

附方

桂附二陳湯

卽二陳加肉桂附子

東垣川苦楝散

木香

川楝子

劉細用巴豆十粒打破一處炒黃去巴豆

茴香 鹽一匙炒  
去鹽各一兩

右爲細末。每服二錢。空心食前。溫酒調下。

金匱烏頭煎 見第十七

和劑葫蘆巴丸 治小腸疝氣。偏墜陰腫。小腹有

形如卵。上下來去。痛不可忍。或絞結繞臍攻刺。

嘔吐悶亂。

葫蘆巴 炒一斤  
茴香 鹽炒十兩

吳茱萸 洗炒十兩

川棟子 去核炒一斤二兩

巴戟 去心炒

川烏

炮去皮  
各六兩

右爲末。酒糊丸如桐子大。每服十五丸。至二十丸。空心溫酒下。小兒五丸。茴香湯下。食前。一方有黑牽牛。

蘇合香丸

見第十八

桂枝湯

見第十九

東垣丁香楝實丸

治男子七疝。痛不可忍。婦人

瘕聚帶下。

當歸

去蘆

附子

川棟子

茴香

炒各一兩

右四味剉碎。以好酒三升。同煮酒盡。焙乾。作細末一兩。再入下項藥。

丁香

木香

各五分一作二錢

全蝎

十三個

玄胡索

五錢一作一兩

右四味。同為細末。入前項當歸等末拌勻。酒糊丸如桐子大。每服三十丸。至百丸。空心食前温

酒送下。一方無當歸木香。名苦棟丸。

茴香散 治膀胱氣痛。

茴香

蓬朮

京三稜

金鈴子肉

各一兩

炙甘草

半兩

右為細末。每服二錢。熱酒調服。每發痛甚連日。只二三服立定。

木香散 治心疝。小腹痛悶不已。

木香

陳皮

良薑

乾薑

訶子

去核

枳實

各一錢半

草豆蔻

黑牽牛

川芎

各一錢

水二鍾。煎一鍾。食前服。或為細末。每服二錢。白

湯調服。

東垣天台烏藥散

見第六十三

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛

炒熟

白牽牛

炒熟

為細末。每用三錢。猪腰子一對。薄切開縫。入川

椒五十粒。茴香一百粒。以牽牛末。徧摻入腰子中。線紮濕紙數重裹。煨香熟。出火氣。燈後空心嚼喫。好酒送下。少頃就枕。天明取下惡物卽愈。

五苓散 見第十七

金匱牡蠣澤瀉散

牡蠣

澤瀉

蜀漆

洗去腥

括蕒根

葶藶子

商陸根

熬

海藻

洗去鹹已上各等分

右七味。異搗下篩爲散。更入臼中治之。白飲和服。方寸匕。小便利止後服。

正氣天香散

見第十七

金匱蜘蛛散

蜘蛛

十四枚  
炒焦

桂

半錢要入厥陰  
取其肉厚者

右爲散。每服一錢。蜜丸亦可。雷公云。凡使勿用五色者。兼大身上有刺毛者。并薄小者。須用屋西南有網。身小尻大。腹內有蒼黃膿者真也。凡

用去頭足了。研如膏。投藥中。此余之法。仲景炒

焦用。全無功矣。

荔枝散 治疝氣陰核腫大。痛不可忍。

荔枝核 十四枚燒灰存性用新者 八角蘘香 炒

沉香 木香 青鹽

食鹽 各一錢 川棟肉 小蘘香 各二錢

右為細末。每服三錢。空心熱酒調服。

三層茴香丸 治腎與膀胱俱虛。為邪氣搏結。遂

佑賢曰此方治偏墜神効用荔枝為君取其象形而二鹽潤下諸藥溫散也

成寒疝。伏留不散。臍腹疼痛。陰核偏大。膚囊腫。重墜滋長。有妨行步。瘙痒不止。時出黃水。浸成瘡瘍。或長怪肉。屢治不痊。以致腎經閉結。陰陽不通。外腎腫脹。冷硬如石。漸大。皆由頻服熱藥內攻。或因撻取。以致如此。用藥溫導陽氣。漸退寒邪。補虛消疝。暖養腎經。能使復元。一應小腸氣寒疝之疾。久新不過三料。

第一料

舶上茴香

用鹽半兩同炒  
焦黃和鹽秤

川棟子

炮去核

沙參

洗剉

木香

各一兩

右爲細末。煮米糊爲丸。如桐子大。每服二十九。空心用溫酒。或鹽湯下。日三服。小病一料可安。纔盡。便可用第二料。

第二料藥加

葦撥

一兩

檳榔

半兩

右共前藥六味。重五兩半。爲末。依前糊丸。丸數

湯使亦如前。若病未愈。服第三料。

第三料藥加

白茯苓

四兩緊實者去黑皮

黑附子

炮去皮臍秤半

兩或加  
作一兩

右通前八味。重十兩。並依前糊丸湯使。丸數加至三十丸。小腸氣發頻。及三十年者。寒疝氣如栲栳大者。皆可消散。神効。

濟生橘核丸 治四種癩病。卵核腫脹。偏有小大。

或堅硬如石。痛引臍腹。甚則膚囊腫脹成瘡。將出黃水。或成癰潰爛。

橘核

海藻

昆布

海帶

各洗

川棟肉

炒

桃仁

各炒一兩

製厚朴

木通

枳實

炒

延胡索

炒

桂心

木香

各半兩

為細末。酒糊丸如梧子大。每服七十九。空心鹽酒鹽湯下。虛寒甚者。加炮川烏一兩。堅脹久不

消者。加礪砂二錢醋煮旋入。

香附散 治癩疔脹。及小腸氣。

右用香附不拘多少。爲末。每用酒一盞。入海藻一錢。煎至半盞。先撈海藻細嚼。調香附末二錢服。一方以海藻爲末。用熱酒調尤効。甚者灌之。一方熱酒下荊芥末。

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱。兩物腫痛。或腹中疼痛。或小便澀滯等證。

龍膽草

酒拌炒黃

澤瀉

各一錢

車前子

炒

木通

生地黄

酒拌

山梔

炒

當歸

酒拌

黃芩

炒

甘草

各五分

右水煎服

加味逍遙散

見第五十一

腰痛脉證第六十五

腰痛之脉。多沉而弦。兼浮者風。兼緊者寒。弦滑痰飲。濡細腎着。大乃腎虛。沉實閃肭。

腰痛者。足之六經病也。足三陽從頭走足。足三陰從足入腹。各經受邪。則隨各經之所過者爲痛。與頭心爲痛之義畧同。而手之六經不與焉。以手經不至于腰也。其因有三。曰外因。內因。曰不內外因。外因者。風熱寒濕也。木化風。火化熱。水化寒。土化濕。風多傷厥陰。火多傷少陽。寒多傷太陽。少陰。濕多傷太陰陽明。此言邪傷足三陰三陽之經也。亦各從其類也。厥陰腰痛。腰中如張弓弩弦。宜調肝散加味

外因兼見經  
論症

內因兼見情  
志症

逍遙散 之類 少陽腰痛。如以針刺其皮中。循循然不可

以俛仰。不可以顧。宜逍遙散倍白芍加枳殼木香之類 太陽腰痛。則

引項脊尻背如重狀。宜東垣羌活勝濕湯川芎肉桂湯九味羌活湯之類 足

少陰腰痛。痛引脊內廉。宜金匱八味丸六味丸青娥圓之類 太陰散

脉腰痛。腰下如有橫木居其中。甚則遺洩。宜東垣蒼木湯

統旨清濕 散之類 陽明腰痛。不可以顧。顧如有見者。善悲。

宜四物湯平胃 散導痰湯之類 內因者。恐懼失志。恚怒忿恨。抑鬱

憂思也。恐懼失志則傷腎。恚怒忿恨則傷肝。抑鬱

醫  
卷  
九  
十六  
也

憂思則傷脾。此言情志不得其所。三陰藏氣自傷

也。亦各從其類也。腎傷腰痛。虛羸不足。面目黧黑。

遠行久立。力不能盡。宜六味丸煨腎丸  
黑地黃丸之類肝傷腰痛。

腹急脇脹。目視眈眈。所祈不得。意淫于外。宗筋弛

縱。及為白淫。宜六味丸加  
知藥之類脾傷腰痛。肌肉濡漬。痺

而不仁。飲食不化。腸胃脹滿。閉墜腰脇。宜平胃散  
局方普賢

正氣散不內外因者。房室過度。煩勞不節。以致精

力耗竭。腰脊空虛。發為腰痛。蓋精藏于腎。而腰者

不內外因兼  
見形體症

腎之府。力出于脊。而腰者脊所系。其痛轉側屈伸

不得。膝酸脛冷。腰中冷。面黑。偃僂不能久立。宜二至丸

子和無比山藥丸六味丸之類一種腰痛。因作勞多汗。衣裏冷濕。

久久得之。其證身重不渴。小便自利。食飲如常。腰

以下冷重如帶五千錢者。名曰腎着。着者因勞極。腎脊之氣張散。汗濕

乘之。乘其已所勝也。濕因注。滲腰脊之間。着而不行。猶邪有着落無礙他處。故但腰痛而重。更無他證。如上所云。宜仲景腎着湯。子和禹功散。統旨清濕散。滲濕湯之類。一種因搏擊墮

墜。閃胸。氣血凝滯。或只氣滯而血未至于瘀。或血

此種亦屬不內外因

痰結而氣久方行。令人偃僂腫痛而重。牽引脇脊。

氣滯者。呼吸亦痛。不能轉側。鼻塞。身不動。則痛亦

定。宜良方人參順氣散血瘀者。亦轉側不能。腰下

重痛。若錐刀之刺。大便黑。面目黃。日輕夜重。宜調榮活

絡飲仲景桃仁承氣湯之類一種積痰停飲。阻滯于腰脇之間。

有礙氣道。亦能作痛。其痛或作或止。或移易不定。

或不仁。或麻木。或痛處如冰。腰脊重墜。宜導痰湯

痰丸以上諸證。大抵外因寒濕多而風熱少。內因

之類

腎多。肝次之。而脾藏少。不內外因。感亦明顯。若謹  
慎善攝之人。自不多懼。并可終身不一遇也。諸腰  
痛。脉多沉弦者。沉爲在裏。在下。弦則爲痛。故多沉  
弦也。兼浮者。沉弦中有泛泛欲浮之勢。所謂如水  
漂木。舉之有餘。是狀風邪虛浮之性。非言在表之  
浮也。兼緊者寒。寒緊歛也。兼滑者痰飲。痰飲滑利  
也。兼濡細者腎着。腎着者濕。濡細滲着也。兼大者  
腎虛。腎虛不斂藏。而反空鬆虛大也。兼實者閃肭。

閃胸非血瘀。則氣滯。皆成凝滯。故沉實也。

附方

調肝散 治鬱怒傷肝。發為腰痛。

半夏 製三分

辣桂

宣木瓜

當歸

川芎

牛膝

細辛 各二分

石菖蒲

酸棗仁 盪去皮 微炒

甘草 灸各一分

每三錢薑五片。棗二枚煎服。

加味道遙散

見第五十一

東垣羌活勝濕湯 治脊痛項強。腰似折。項似拔。衝頭痛。乃足太陽經不行也。

羌活

獨活

藁本

防風

各一錢

蔓荊子

三分

川芎

二分

甘草

炙五分

右咬咀。作一服。水二盞。煎一盞。去滓。食後溫服。

東垣川芎肉桂湯 丁未年冬。曹通甫自河東來。

醫登讀

卷九

十九

陸地舟

有役人小翟。宿於寒濕之地。腰痛不能轉側。兩  
脇痛急作痛。月餘不愈。腰痛論中所說。皆爲足  
太陽。足少陰血絡中。有凝血作痛。間有一二證。  
屬少陽膽經。外絡脉病。皆宜去血絡之凝乃愈。  
其內經有云。冬三月。禁不得針。只宜服藥通其  
經絡。破其血絡中敗血。此方主之。

羌活

一錢半

柴胡

一錢

獨活

五分

肉桂

蒼朮

各一錢

防風

漢防已

各三分

桃仁

五枚去皮另研如泥

歸稍

甘草

炙

川芎

各一錢

炒麴

右咬咀。水酒煎。去滓。食遠熱服。

九味羌活湯

見第十六

六味丸

見第十六

八味丸

見第十六

直指青娥圓 治腎虛腰痛。益精助陽。烏鬚壯脚。

用安胎飲吞。神効。

佑腎曰此方能補右腎命

門元氣虛寒者為宜故又能安胎以女子系胞處也

破故紙

四兩炒香

杜仲

去麁皮剉四兩用生薑二兩半搗淹炒乾

右為末。用胡桃肉三十個研膏。入少熟蜜圓桐

子大。每服五十圓。食前下。

東垣蒼朮湯 治濕熱脚腿疼痛。

蒼朮

五錢去濕止痛

柴胡

三錢行經

防風

一錢半去風勝濕

黃蘗

一錢半始得之時寒也久不愈寒化為熱除熱止痛

水二鍾。煎至一鍾。空心食前服。

統旨清濕散

黃蘗

鹽水拌炒  
一錢五分

澤瀉

一錢

蒼朮

一錢半  
米泔浸炒

杜仲

白芍藥

煨

牛膝

酒浸

木瓜

葳靈仙

陳皮

各一錢

甘艸

三分

痛甚者加乳香沒藥末五分臨服調入。

四物湯

見第二十一

平胃散

見第四十四

導痰湯

見第四十一

保命煨腎丸 治腎肝損及脾損穀不化宜益精

緩中消穀。

牛膝

草薺

杜仲

炒去絲

白蒺藜

防風

兔絲子

酒浸

肉蓯蓉

酒浸

葫蘆巴

破故紙

酒炒各等分

官桂

減半

右為細末，將猪腰子製如食法，搗爛，煉蜜和杵。丸如桐子大，每服五七十九，空心用溫酒送下。

治腰痛不起。甚効。

黑地黄丸

見第五十一

知藥八味丸

見第五十四

和劑普賢正氣散

陳皮

半夏

蒼朮

厚朴

藿香

甘草

生薑

各等分

每服五錢。水二盞。葱二段。黑豆百粒。煎八分。不

佑賢曰鹿乃

山獸屬陽夏

至得陰氣而

角解麋乃澤

獸屬陰冬至

得陽氣而角

解方中以此

二品爲君故

名二至

拘時熱服。

二至丸 治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可屈伸。

附子

炮去皮臍

桂心

不見火

杜仲

去皮剉炒去絲

補骨脂

炒各一兩

鹿角

鎊

麋角

鎊各二兩

鹿茸

酒炙

青鹽

另研各半兩

右細末。酒煮糊和丸。如桐子大。每服七十丸。空心同胡桃肉細嚼。用鹽湯。或鹽酒送下。如惡熱藥者。去附子。加肉蓯蓉一兩。

子和無比山藥丸 治諸虛百損。五勞七傷。肌體

消瘦。目暗耳鳴。

赤石脂 煨

茯神 去皮

山茱萸 去核

熟乾地黄 酒浸

巴戟 去心

牛膝 去根

澤瀉 已上各一兩

杜仲 去皮切薑汁炒

兔絲子 酒浸

五味子 揀六兩

肉蓯蓉 酒浸四兩

右為細末。煉蜜為丸。如桐子大。每服三十丸。空

心溫酒。或鹽湯送下。

腎着湯

見第二十一

子和禹功散

黑牽牛

兩四

茴香

兩炒一

右爲末。薑汁調一二錢服。

良方人參順氣散 治氣滯腰痛。

人參

川芎

桔梗

白朮

白芷

陳皮

枳殼

麻黃

節去

烏藥

白薑 炮

甘草 灸各一錢

水二鍾。煎一鍾。或為細末。食前用甘草湯調服。

一方加五加皮一錢。

烏藥順氣散

見第六十三

調榮活絡飲 治失力腰閃。或跌撲瘀血。及大便

不通而腰痛。

川大黃

當歸條

川牛膝

去蘆酒洗

杏仁

去皮研如泥各二錢

赤芍藥

紅花

羌活

懷生地黃

酒洗各一錢

川芎

一錢半

桂枝

三分

水一鍾半。煎八分。食前溫服。

桃仁承氣湯

見第二十一

滾痰丸

見第十七

脚氣脉證第六十六

脚氣有四。遲寒數熱。浮滑者風。濡細者濕。

脚氣一證。經名厥。漢名緩風。宋齊後始名脚氣。陳

脚氣之疾治同痺症以其偏發于脚故後人以脚氣立門總不外于風寒濕三氣雜至爲患故有風行流注者寒凝痛極者濕着重滯者痛壅腫發鬱熱自生此指外邪爲患者而言若內傷濕熱下溜三陰亦能

無擇謂風寒暑濕四邪皆能成。今歷診是證。成于寒濕者。十常八九。經曰。清濕襲邪。病起于下。信然哉。其始發也甚微。發亦易解。故人常忽而不覺。覺亦不速治。及其深久。愈發愈重。甚至痿痺不仁者有之。入腹衝心者有之。身命從此而殞。可哀也。足三陰三陽六經。皆有此證。而發于三陽者輕。三陰者重。以三陰屬藏。經絡居裏。若非藏氣大虛。邪不易及。其證不論陰陽。初發時。大類傷寒。頭痛發熱。

爲患此當用  
子和蕩滌之  
法爲妙也  
能別三陰三  
陽經絡清楚  
則取効自捷  
即使通腿紅  
腫亦自發有  
起處形有盛  
衰非可泛然  
爲治觀此論  
可謂詳且盡  
矣

惡寒嘔吐。但足屈伸不能。或痛或紅爲異耳。在陽。  
多惡寒壯熱頭痛。或骨節痛。或嘔吐渴煩。或叫號  
譫語。或腿脚紅紫極熱。大腫大痛。手不可按。或頑  
痺麻木。患多在腿外廉陽分。三陽經所過之處。面  
光澤。脉多浮。在陰。多惡寒。甚或厥逆。不發熱。或微  
熱。頭不痛。或骨痛筋攣。或嘔逆。或神昏沉默。或腹  
痛下利。或畏見光明。或大小便閉。或心煩動悸。或  
小腹不仁。或衝胸悶亂。患處腫痛。或不腫。或微赤

而熱。或反極冷。患多在腿內廉陰分。三陰經所過之處。面青慘。脉多沉。此言陰陽之大槩。若細別之。

太陽則發熱頭痛惡寒。目眩項強。腰脊身體。及外

踝後。至小指外側皆痛。

宜仲景麻黃湯桂枝湯九味羌活湯敗毒散集驗麻

黃左經湯之類

陽明則翕翕發熱。口鼻乾。善欠。腹脹。自髀

膝臏胛外廉。以下足跗中指內俱痛。

宜得効芎芷香蘇散大黃

左經湯之類

少陽則往來寒熱。口苦。脇痛。面垢。頭目眩

痛。腋下馬刀腫痛。髀膝外至胛。及外踝諸指節皆

痛。宜小柴胡湯半夏左經湯之類三陽并合為病。則憎寒壯熱。自

汗惡風。或無汗惡寒。眩暈重着。關節掣痛。手足拘

攣。疼痛冷痺。腰腿緩縱不隨。心躁氣上。嘔吐下利。

其脉浮弦緊數。宜大料神秘左經湯加味敗毒散之類太陰。則腹滿

胸膈痞。舌系急。循肝骨下股膝內前廉。內踝過核

骨後廉。足大指之端內側皆痛。宜胃苓湯六物附子湯之類少

陰。則腰脊痛。上衝胸咽。饑不能食。面黑。大小淋悶。

善恐。小趾。足心。內踝跟中。脰內廉皆痛。宜麻黃附子細辛湯

金匱八味丸之類

厥陰。則腰脇偏痛。脚攣急。嗌乾嘔逆。洞

泄。足大趾連足趺上廉。上臑至內廉。循股環陰。小

腹夾臍諸處脹痛。

宜茱萸木瓜湯神應養真丹之類

三陰并合為

病。則四肢拘攣。上氣喘滿。小便閉澁。心熱煩悶。偏

身浮腫。脚弱。緩縱不能行步。

宜加味敗毒散追毒湯之類

已上

六經受病。流注自汗為風勝。

脉多浮滑宜多羌活獨活防風桂枝

無

汗疼痛為寒勝。

脉多遲宜多桂附薑辛

熱煩為暑勝。

脉多數宜多黃

芩黃藥木

重着腫滿為濕勝。

脉多濡細宜多蒼朮澤瀉薏苡防已茯苓

瓜香薷

登賣百 卷九 二七 產也舟

至如防已。木瓜。米仁。檳榔。蒼朮。黃蘗。肉桂。桂枝。巴戟。萎蕤。木通。羌活。枳殼。澤瀉。桑枝之類。各隨其氣所勝者而偏調之。證相宜者而倍用之。又不可拘于一方也。東垣謂此疾南方卑下。乃清濕之邪。外襲經絡而成。如北方地高。外鮮水濕。發此者。皆內傷酒乳。濕熱之邪下注也。故南則宜作寒濕治。北則宜作濕熱治。此雖發前人之未發。恐未必盡然也。南方固下。豈乏膏粱嗜酒之人。北方固高。豈無

踐涉洗濯之事。是在圓機者。謹察證脈而分別之。斯善矣。

附方

仲景麻黃湯 見第十六

仲景桂枝湯 見第十九

九味羌活湯 見第十六

敗毒散 見第三十七

集驗麻黃左經湯 治風寒暑濕。流注足太陽經。

佑賢曰經脉者行血氣通陰陽以營於身者也為邪所着便致留碍此湯能佑經逐邪以復常道故名

腰足攣痺關節重痛。行履艱難。憎寒發熱。無汗而寒。或自汗惡風。頭痛眩暈。并一切癱瘓麻木等證。

麻黃

去節

乾葛

細辛

去苗

白朮

去蘆

茯苓

去皮

防己

去皮

桂心

羌活

去蘆

防風

去蘆

甘草

炙各等分

右咬咀。每服七錢。水二盞。薑五片。棗一枚。煎一

盞空心服。自汗去麻黃。加肉桂。芍藥。重着加朮。  
陳皮。無汗。減桂。加杏仁。澤瀉。

得効芎芷香蘇散

川芎 七錢

甘艸 二錢

紫蘇葉

乾葛

白茯苓

柴胡 各半兩

半夏 六錢

枳殼 炒三錢

桔梗 生二錢半

陳皮 三錢半

每服三錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎八分。不拘

時溫服。

大黃左經湯 治風寒暑濕。流注足陽明經。腰脚  
痺痛。行步艱難。涎潮昏塞。大小便秘澁。腹痛嘔  
吐。或復下利。惡聞食氣。喘滿肩息。自汗譫妄。並  
宜服之。

大黃 煨

細辛 苗去

茯苓 皮去

防己 皮去

羌活 蘆去

黃芩

前胡 蘆去

枳殼 去瓢 碎炒

厚朴 薑製

甘草 炙

杏仁 去皮尖  
燻炒

右各等分。每服七錢。水一盞半。薑五片。棗一枚。

煎八分。空心熱服。腹痛加芍藥。秘結加阿

膠。喘急加桑白皮。紫蘇。小便秘加澤瀉。

四肢瘡痒浸淫。加升麻。各等分

仲景小柴胡湯 見第四十三

半夏左經湯 治足少陽經受風寒濕暑。流注發

熱。腰脚俱痛。頭疼眩暈。嘔吐酸水。耳聾驚悸。熱

悶心煩。氣促喘滿。肩背麻痺。腰腿不隨。

半夏

湯洗七次切片

乾葛

細辛

去苗

白朮

去蘆

茯苓

去皮

桂心

防風

去蘆

乾薑

炮

黃芩

甘草

炙

柴胡

去蘆

麥門冬

去心各七錢半

右咬咀。每服七錢。水一盞半。薑五片。棗二枚。煎

一盞。去滓。空腹服。熱悶。加竹瀝。每服半合。喘滿。

加杏仁。桑白皮。

大料神秘左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經  
手足拘攣疼痛行履艱難憎寒發熱自汗惡風  
或無汗惡寒頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞  
大小便秘澁或腹痛嘔吐下利惡聞食臭髀腿  
頑痺緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺  
喘滿氣麤。

麻黃

節去

乾葛

細辛

苗去

厚朴

薑製

茯苓

皮去

防已

皮去

枳殼 去瓢 淨炒

桂心

羌活 去蘆

防風 去蘆

柴胡 去蘆

黃芩

半夏 酒洗 七次

乾薑 炮

麥門冬 去心

甘草 炙各 等分

右咬咀。每服七錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。

煎一盞。去滓。空心服。自汗。加牡蠣。白朮。去麻

黃。腫滿。加澤瀉。木通。熱甚無汗。減桂。加橘

皮。前胡。升麻。腹痛吐利。去黃芩。加芍藥。附子。

炮

大便秘。加大黃。竹瀝。喘滿。加杏仁。桑白

皮。紫蘇等分。凡有此病。備細詳證。逐一加減。無

不愈者。

加味敗毒散 治三陽經脚氣流注。脚踝焮熱赤

腫。寒熱如瘧。自汗惡風。或無汗惡寒。

佑賢曰脚氣  
焮腫乃濕熱  
為邪而病經  
之下其流注  
如瘧風寒所

人參

去蘆

赤茯苓

去皮

甘艸

炙

芎藭

前胡

去蘆

羌活

去蘆

獨活

去蘆

枳殼

去瓢炒

桔梗

去蘆

大黃 煨

蒼朮 米泔浸 各等分

右每服五七錢。水一盞半。薑五片。薄荷五葉。煎

一盞。去滓熱服。皮膚赤疹。加蟬蛻。

胃苓湯 見第十七

六味附子湯 治四肢流注于足太陰。骨節煩疼。

四肢拘急。自汗短氣。小便不利。惡風怯寒。頭面

手足腫痛。

附子 炮去 皮臍

桂心

防已 去皮各 四兩

白朮去蘆

茯苓去皮各三兩

炙甘草二兩

右咬咀。每服五錢。水二盞。生薑七片。煎一盞。去滓。空心溫服。

仲景麻黃附子細辛湯

麻黃去節

細辛各二兩

附子一枚炮

右三味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。內藥。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

八味丸見第十六

茱萸木瓜湯 治脚氣衝心。悶亂不識人。手足脉

欲絕。

吳茱萸

兩半

乾木瓜

兩一

檳榔

兩一

右咬咀。每服八錢。以水一盞半。生薑五片。煎一盞。去滓溫服。不拘時候。

神應養真丹

治厥陰肝經受邪。四氣所傷。肝藏。

或左癱右瘓。涎潮昏塞。半身不遂。手足頑麻。言語蹇澁。頭旋目眩。牙關緊急。氣喘自汗。心神恍

惚。肢體緩弱。上攻頭目。下注脚膝。榮氣凝滯。遍身疼痛。兼治婦人產後中風。角弓反張。墮車落馬。打撲傷損。瘀血在內等證。

當歸 酒浸去蘆

天麻

川芎

羌活 去蘆

白芍藥

熟地黃 各等分

右爲細末。煉蜜和丸如彈子大。每服一丸。木瓜兔絲子煎酒下。脚痺。薏苡仁煎酒下。中風。

溫酒米湯下。一方無羌活。入木瓜。熟阿膠等

分。

追毒湯 治肝腎脾三經。為風濕寒熱毒上攻。陰

陽不和。四肢拘攣。上氣喘滿。小便秘結。心熱煩

悶。徧身浮腫。脚弱緩縱。不能行步。

半夏 湯洗七次

黃耆 去蘆

甘草 炙

當歸 去蘆

人參 去蘆

厚朴 薑製

獨活 去蘆

橘皮 去白各一兩

熟地黄

芍藥

枳實 去穢

麻黃 去節各二兩

桂心

三兩

右咬咀。每服八錢。水一大盞半。薑七片。棗三枚。  
煎一大盞。去滓。空心溫服。日三夜一。

醫燈續焰卷九

終