

片華藥廠特准掛號註冊商標

L A X A D O N

藥新下緩腸八

通塞療

療塞通係化學合成之緩下新藥具左記之特色願各大醫師提倡使用

- 一、無臭無味極易服用
- 一、用量極少奏效確實
- 一、無習慣性及其他腹痛裏急後重等弊
- 一、有藥粉藥片調劑投藥極為便利

樣品說明書函索即寄



行發廠藥亞新號五十九零千一處開新海上

醫 林 新 誌

● 臨 證 實 用 ● 發 揚 醫 學 提 倡 衛 生 ●

編主師醫侯建汪

期七第卷四第

版出月七年三十二國民華中

毒質輕微之安息香砒劑
四大特點

SULFARSENOL

INTRAVENOUSLY
SUBCUTANOUSLY
INTRAMUSCULARLY

可 供
皮 下
肌 肉
靜 脈
及
注 射

無反應！
無痛苦！
無危險！
詳細說明
函索即寄

- 一·本劑含砒素百分之一九故其毒性極微
- 二·本劑可供皮下及肌肉注射毫無痛苦亦無發炎反應
- 三·本劑分量完備自0.005gr.起至1gr.止有十九種不同分量故老人小兒均可施用
- 四·本劑兼治白濁之合併症有特殊效力為他種砒劑所不及

中國總經理上海法商永興洋行

杭 州

同濟藥房

經理雷錠
華廠出品
泰西名藥
化裝香品
注射新藥
家用良藥
醫療器具
接方送藥
日夜應配

杭州薦橋路寶善巷
電話三四三號

本誌主筆

(以姓氏筆劃多少為序)

江秉甫 沈康白 汪建侯 汪鶴盒 邵象伊 夏慎初 徐祖毅 郭人驥 章松筠 鄒躍如 厲綏之 盧良銘

外界惠稿
無任歡迎

簡章刊于
文字後面

本期目錄

醫德論.....汪國樹

癲瘋之名稱.....彭玉書

臨床上白喉血清治療之應用(續四卷四期).....

.....金澤忠

撒利沃碘治癩麻質斯之切效.....董志剛

肺結核早期診斷法(五續)續四卷三期.....汪建侯

藝林

海棠香館吟草.....汪建侯

補白

本誌三卷合刊

廣告索引

CLASSIFIED LIST OF ADVERTISEMENTS

新亞藥廠.....痛必靈.....	TONBELIN	封面
新亞藥廠.....肺結核早期診斷法.....		1
美狄根洋行.....奧頗靈.....	Opolen	Cover
永興洋行.....改良新六〇六.....	SULFARSENOL	Cover
同濟藥房.....營業要旨.....		Cover
謙信洋行.....奧拍泰片.....	Optarson	Cover
興華公司.....沃度拏.....	Jodipin	2
先靈洋行.....亞陀方.....	Atophan	7
禮和洋行.....梅乃落.....	Milanol	3
安定洋行.....蘇柏喜本.....	Suplahypon	6
福康西藥店.....撲咳他勁與法可爾.....		5

Star Brand


Transpain

樟腦
奎寧
水溶液
注射劑

本品不用油質溶化
易於吸收迅速發揮
專治腦及奎寧之功
管枝肺炎急慢性氣
管及其他氣管枝疾
症有強心解熱消炎
殺菌等功應用範圍
甚廣

說明書樣品承索即奉
各大藥房均有出售

雙 柏 樹 精



筋肉
注射
絕無
疼痛
製法
精良
功效
神速

上海新亞藥廠
總發行所

E. MERCK CHEMICAL WORKS DARMSTADT
 SCIENTIFIC DEPARTMENT - 1 NANKING RD. SHANGHAI

TRADE **'IODIPIN'** MARK

沃度拼

有幾種中藥房防礙結
 合之藥一諸藥劑中
 含量最富一魚肝油
 而最利消化一可內服

亦可注射 專用于一

般藥適應症

▼ 第三期梅毒 ▼ 神經衰弱
 ▼ 急性傳染病 ▼ 肺病
 ▼ 各種慢性炎 ▼ 肺膜炎
 ▼ 中狀腺腫 ▼ 瘰癧
 ▼ 淋病 ▼ 氣喘
 ▼ 婦女經閉 ▼ 氣喘
 ▼ 各病之衰弱及苦
 愛克司光線診斷
 上唯一現影劑



TRADE MARK

司公藥商德

AGENTS FOR CHINA - SCHMIDT & CO.
 GENERAL PEKING - TIEN TSIN - MUKDEN - HARBIN - CANTON - HONGKONG

梅毒之最新療法

應採用鉍劑

效力最大

毒性最小

首推 梅乃落

"MILANOL"

梅乃落為 Bismuth Salt of

Trichlor-tertiary Butylmal-

nic acidester 之油溶液

專供肌肉注射無痛

無反應一全劑之治

療注射十次已足

梅乃落每匣十二

管每管一西西五

山德士鈣

止血 強心 營養 解毒
注射劑 藥粉 藥片

用山德士鈣之功效

肺癆：使肺部壞處恢復健全

病後：調理清補勝於病前

孕婦：使母子營養佳良


產後：防止血虧體虛

小孩：發育健碩成長迅速

成人：強胃納補體力長精神

總經理 德商禮和洋行

本外埠各大藥房均有分售



沙眼

鍾志和

沙眼一症。誠視官之勁敵也。常人每忽視之。而不加注意。殊不知其危險所播。可致失明。沙眼之害。豈非大矣哉。

沙眼係特種之傳染症。蔓延甚速。患者之結合膜。呈粗糙不平。兼顯肥厚。并起沙粒形成。故名沙眼。據哈偉華氏之調查。則謂饑饉洪水。以及其他疾患。蔓延猖獗於中國。其中尤推疾病為獨多。而疾病中。最普遍且極易傳染。當推沙眼云。

夫患眼病。十九皆由沙眼而起。歐美人士。視此為眼部惡疾。如投考或出洋。以及謀職求生者。一經驗出。害有此症。則受拒絕。沙眼影響於人類生活有如是。沙眼普遍於中國。幾每一家庭中。及社會之各階級中。無處不有矣。據哈氏之統計所得。我國人之患沙眼者。約一萬萬人。其每歲新增者。約五百萬人。內中患者強半為兒童。且哈氏之統計。我國人至少一百萬人雙目均瞽。三四百萬人一目失明而瞽。兩千萬人其目力每因曾患沙眼。而發生眼炎。及癍痕組織形成。此種驚人之統計。破世界各國最高之紀錄。要亦為我國人不講衛生之恥也。茲分論之如次。仰吾同胞加以注意。則幸甚焉。

原因

(一)其原發之惹因。尙未確知。但據一般人之公認。謂此症必有某種形體之病毒在焉。一八八三年閣氏在埃及經多方研究。認此症有一種特殊之細菌。據 NOGU

CHI 氏研究之結果。於沙眼受累之組織中。有極微細之粒狀桿菌。附麗於大小單核細胞中。而組成小泡。倘用分離培養。則可見一單純之鞭毛極體 POLARIFLACELLUM (一) 沙眼多見於生活卑下。不講衛生之下等社會階級中。其他如學校、教養院、軍營、工廠、僧廟、人衆薈萃之處。不求清潔亦易染此症也。(二) 沙眼因患者分泌物傳佈所致者。如茶館酒肆戲院劇場理髮店中公用之手巾面盆。理髮匠常用之骨類摩眼器。醫院中醫師護士之手觸及患者之眼。均易受染。(四) 灰沙入眼。以不潔之手擦之。或以污穢之布拭眼。(五) 家庭中有患者。而面盆面巾等不分。

症狀

沙眼爲慢性疾患。普通自六月至兩年。或有爲期極長者。患者每有下列之症狀。

- (一) 結合膜有粘液膿性分泌物排出。令上下臉起粘着。新起者尤甚。
- (二) 因刺激之故。常起流淚及羞明。
- (三) 作癢或灼熱之感。
- (四) 眼中覺有異物刺激。或有疼痛。
- (五) 倘呈血管翳則疼痛更劇。
- (六) 畏光及眼瞼變厚之故。上瞼眼裂變窄。而張開不全。
- (七) 眼瞼腫脹上瞼下垂或呈水腫。
- (八) 瞼板及穹窿之結合膜肥厚有粒。故紅厚不平。
- (九) 眼之球結合膜時微現充血。
- (十) 角膜因恆久之刺激。其表面常發生網狀血管。先起於周圍。漸達於角膜中部。而生血管翳。
- (十一) 有時發生角膜潰瘍。紅膜炎。
- (十二) 眼覺乾燥。目光糊塗。甚或常有頭痛等狀。結果發生目瞽者甚多。

治療法

(甲)預防法(一)警告患者及其家屬。凡患者眼中之分泌物。有傳染性。務當妥為注意。(二)患者所用之手面盆等。當與他人分置。切弗共用。(三)凡公眾團體當預先檢查眼部有無沙眼。有者當嚴為隔離。英國凡學校中學生之患有沙眼者。即須實行嚴厲之隔離。施行該項法則以來。成效大著。美國政府對於沙眼之戒備。亦極周密精縝。其鑒於沙眼之傳染。多自僑民。故特頒禁令。凡外人之入境。在港口等處。必受醫生之檢查。倘發見沙眼者。一律不准登陸。又輪船失於檢點。而載有是項旅客者。每名處罰金百元。此令厲行後。沙眼大減。足見歐美各國對於此症之重視也。願我政府當局。嗣後亦加以相當之注意是幸。(乙)療治法。(一)以食鹽水硼酸溶液。或萬分之一的昇汞溶液洗眼。(二)所用之手帕面巾。當十分清潔。切忌多揩眼部。(三)講求衛生。(四)延請醫師診治。遵醫者之命。施用百分之五至二十五的弱蛋白銀溶液 *Argyrol* 或百分之〇·五至一的硫酸鋅溶液 *Zinc Sulphate* 或百分之一的汞鉻溶液 *Merurochrome-220S* 滴眼。每日三次。(五)以藥物擦眼。如硼酸粉。或大楓子油。汞鉻溶液等擦眼。每日一次。(擦前先用麻醉劑滴眼)。(六)重者請醫師施用壓出術。

花柳病的預防法

繁華的世界。滿佈着各種的花柳病菌。專待青年們。意志薄弱。性慾充動時而侵襲。毒如蛇蝎的娼妓。至今尙未能完全禁絕。而花柳病的製造。尙源源不絕的出來。不知遺害了多少青年。使他們受性病的痛苦。鄙人懸壺數年。目擊社會青年。潔身自好者果然很多。但意志薄弱。一失足成千古恨的。也是不少。不但損害個人的身體。和遺傳於子孫。並且影響於民族的強弱。國家的盛衰。其害之烈。能不使人寒心麼。故我把牠的危險和預防的方法。介紹在下面。以告我可愛之青年。無論已爲未爲。知所警惕。那末鄙人的心願已足了。

花柳病有下列的幾種。(一)梅毒(二)淋病(即白濁)(三)軟性下疳以上三種都是由於不潔的性交所感染。所以第一的預防法。便是守身節慾。不到花柳之地爲是。雖則家常便飯。有時感覺到乏味。但是要知道異味雖好。却有惡魔在內呢。

(一)梅毒的病源。是一九〇五年。德國學者洗亞伍底和賀弗曼二氏發見之螺旋體。在感染後約二三星期。於陰部龜頭包皮大小陰唇等處。發生如軟骨樣之硬結。(初期硬結)但不化膿。經水銀軟之塗擦。九一四之注射等驅梅毒法。遂見消失。但病毒尙潛

伏于體內。并增長其毒力。以至發生第二期梅毒。及第三期梅毒症狀。

(二)淋病的病源。在一八七九年。爲那依塞爾氏所發見。係一種淋毒雙球菌。于感染後約二三日。尿道口潮紅。腫脹。疼痛。並流出膿汁。倘因循不治。或處置失當。卽蔓延于後尿道。成爲慢性淋症。有併發其他症候。如侵及副睪丸。則副睪丸發炎。血管破裂則後尿道出血等。終身淋漓。痛苦不堪。

(三)軟性下疳。其病源菌爲杜克來氏發見之連鎖狀菌。于感染後。在陰部生粟粒大小之結節。在二三日之間變爲膿疱。再二三日則成潰瘍。倘陷于壞疽。則名壞疽性下疳。連陰莖亦可爛去。他的合併症。有鼠蹊腺炎。(中國舊名魚口便毒)甚爲痛苦。

豫防法

(一)自然以不與有病毒之人性交爲主要原則。

(二)行性交時先套衛生袋。

(三)性交前滴入千倍硝酸銀液。或百分之四蛋白銀于尿道內。性交復排尿一次。再滴二三滴前藥液。

(四)在性交前。行內服之預防。可用 Stovarsol 斯多乏兒沙爾二粒有效。

(五)性交前用藥膏塗佈陰部及尿道口。亦可預防。

處方一 甘汞〇，四六甘油八〇，〇澱粉五〇，〇石鹼末一一，〇水三三三，〇香料

適宜

處方二 昇汞〇，一一含蛋一，〇樹膠末二，〇澱粉四，〇膠〇，七酒精一五，〇
甘油二七，〇水五〇，〇

(六)不可與有梅毒病人接吻。及授有梅毒之乳于小兒。

(七)酒醉後不宜性交。因抵抗力減退。易為病毒所侵犯。

(八)檢查娼妓有無梅毒。如發見有梅毒者。停止其營業。

上述種種的預防法。雖有相當效果。然仍屬不甚確實。所以花柳病毒。仍舊猖獗于社會。欲免此種病毒傳染。第一妙法。不履花柳場所。否則難免傳染。倘于性交後數日。發現病狀。須立即請醫治療。不可諱而不宣。以免貽誤治療機會。因一成慢性。即難醫治矣。

論人工氣胸術不適當之處置

夫人工氣胸術已有無數研究及實驗故於手術及其功效上已極有頭緒據昔日學理人工氣胸止能用於單面肺結核今則漸採用於雙面肺結核

然醫院內及個人診所內時常能發見在進行期中之結核症得以自然痊癒反之有時既用人工氣胸及種種合理治療而病者亦不久即死則一見肺結核病而即施以人工氣胸術或有所不當且無論如何在治療學上終不可採用機械式之法術則人工氣胸當採用於何種情境此題實非易事茲將實驗所得述之於後祈閱者有以教之

若觀種種情形人工氣胸不能得所期之效果者不採用之或繼續之

(甲)對於病痕太嚴久或太人之病症人工氣胸不能收效是不言可知至於急性肺結核二面肺氣支管炎式之肺結核或肺部病痕方面雖不甚嚴重而身體全部太劣或在肺部之外另有別種病痕如腸腎等結核而少有希望之情形中是不必施行人工氣胸

蓋人工氣胸術是一種局部治療法苟若採用得當固能使人體全部改善然若人體全部之不佳不由於肺部之病症而由於別部之來源則人工氣胸不能收效無益於事不若用別種兼顧之方法為妙

余非否認雙面人工氣胸術之用途惟謂苟欲施行之者必須預先診斷其病痕有限而非二面皆過於散漫者對於雙面患病者余不願多述而思對於單面肺結核之各種病態上吾人當如何決斷

(乙)若遇單面纖維素性而地位有限之肺結核則人工氣胸術是否無益

此處所謂無益問題並非謂人工氣胸術有使病症蔓延之危險或傷害人體全部或因不能收效及不能達到目的之義蓋纖維素性之肺結核往往呈收縮性而肺膜極難分開然當記憶 Arne-
E. 所謂此種情狀往往於事實不同而有時在觀察方面以謂二頁肺膜已完全膠合者而在手術時竟能使於全部分開爲是則不得不一試爲妙若觀事實上所不能者則不當固執以繼續之凡遇種種對於人工氣胸術實有利益可期之病狀亦當觀情境以酌量之

茲因診斷法術之進步吾人得從早診斷結核症於起初之時而人工氣胸術之當吾從早實行又成一種問題譬如有患單面肺結核者其身體全部方面尙未受任何嚴重影響則醫者當否速即施行人工氣胸術或置之不用而期待其自然之痊癒按作者意見以謂苟若病痕有成空洞或蔓延之現象或吐血過多或身體全部方面受影響太大或用各種治療而不見任何效驗者則人工氣胸法當推爲最佳之方

蓋在此問題中有四種特點須格外注意

(一) 社會問題

苟欲期待自然痊癒即如於醫學預後上認爲可能者亦當酌量病人之社會環境能吾達到下述之種種須要的攝生要求即完全休養不能工作居住於空氣清鮮之處心無煩悶之事飲食須豐厚而富資養料者否則難得自然之痊癒不如施行人工氣胸術之希望大而易於達的也

(二) 病症之進行性如何

蓋人工氣胸雖爲局部之手術然若人體因病而全部方面應響過速或過大者即當從速施行之然若人體全部得自然的改善體熱正常體力恢復面色及胃納漸增則當如何是擇當知人體全部之暫時改善爲結核症中常見之事不可因之而置人工氣胸術於不顧首須注意者即局部病痕之觀察蓋有時身體外表雖覺漸次改善而病痕反正在蔓延變重之中爲足必須根據於痰液之檢驗及愛克斯光透視之結果爲目標

苟若病痕方面有逐漸自然痊癒之希望者則可免用人工氣胸術

(三) 病人之年齡又病痕之年齡亦有關係

孩童及青年時代病症易於變遷(請閱下面)而病痕之新發而發覺早者則易於自痊

(四) 觀察時期之期限

觀察時期不當過於移長蓋人工氣胸術對於病症過久之病人手術既難效驗亦缺故按理切不可過於苟且最多不過三月然若病症有改善之真現象者則可告知病人須有恆心珍攝以達自然痊癒之目的

有幾種進行性肺結核實有自然痊癒之希望可免用人工氣胸

茲觀有自然痊癒之完全希望而足以免行人工氣胸術之幾種肺結核在解剖學及愛克斯光學

上之特別情形

先將有與空洞無空洞二種分別論之雖經二種病症合併並有然爲明瞭計先分別而論之

(甲)有時雖有空洞之肺結核能不用人工氣胸而得速自然痊癒

當愛克斯光及人工氣胸術未發明之前 *Yamuc* 氏已嘗發表肺結核症之有空洞者得自然痊癒而我人有愛克斯光及其攝影術之進步後得發現肺內空洞可於極短時期內生成可於極短時期內消退

奈已消退之空洞是否不再復生此問題實有研究之價實蓋若已退之空洞不久即復再發則不如從早施行人工氣胸以免多廢時日以吾儕之經驗嘗見多數病人之空洞消退者於六年至八年後亦不復發此乃一種可靠之事實然而如此幸事是否屬於多數而根據何種情形足以決良好之預後按 *Fornes* 所云即咳嗽減少痰液漸減而不含結核菌體重增加體熱正常

至於局部情形即有直接之關係者凡能自然痊癒之空洞大概面積不大起初呈肺炎性而潰瘍甚速在愛克斯光下呈純淨的圓空一若打洞器在紙上所打之空洞然而旁邊則呈模糊不規則的陰影甚多周圍不齊整而不易區別在咳嗽時空洞略縮小而不易自痊之空洞則其周圍硬化整齊

然此周圍硬化而整齊之空洞亦不足謂全無自然痊癒之鐵證惟雖能希望其自然痊癒然日期

必較長耳

故爲決斷能否自然痊癒尤須注意病人之年齡及其各部重要器官之完好與否蓋除病症真整嚴重及嬰孩外凡年齡愈輕者則其希望愈大苟若年老體弱者則雖在診察上若病痕輕微可治而在預後上終當特別注意

(乙)若小兒及年輕人患急性不蔓延而無潰瘍易成空洞性的肺結核則不必施行人工氣胸術夫若陰影甚厚而無空洞之非蔓延性肺結核其預後甚佳而以小兒及年輕人之初次傳得者爲更有希望而無人工氣胸術之必要

吾儕在醫院內及診所內常遇此種情形每於流行性感胃或別種熱症復發現而於不久時期內卽能自然改善逐漸痊癒 *Mr. Arneull Lesne et Debre* 與吾儕同意以謂現今風行之人工氣胸術每有施行於不必需要情形中且對於小兒及年輕人之病症更不當一見有肺結核卽行用人工氣胸治療之習慣余不謂人工氣胸對於小兒及年輕人有莫大之危險及損害然因小兒及年輕人之患上述種種結核症之特殊情形者既有自然痊癒之希望且於事實上觀之其自然痊癒之成份較之用人工氣胸而痊癒之成份其數既不相上下則無必多此一舉且無論何種手術必有手術上不測之危機此乃學理生理及病理上之觀察卽以論理觀之凡於手術施行前不見有任何較好之希望者亦何必多此一舉總之是文之意義卽吾儕醫家切不可於治療學各種方法上

有機械式的思想既不可過於行施手術亦不可過於怠動手術以期自然痊癒施行手術有施行之必要者不可畏首畏尾遷移時日以至於不治而無從動手凡有自然痊癒之可靠希望者切不可本件所喜或別種關係而置別種事實於不顧必當用科學之能事以觀察實情

凡見有自然痊癒之希望者則須用種種藥物治療法在相當時期內觀察之而察觀時期亦不可過於移長如若藥物無效而無自然痊癒之希望者則必須借助於人工氣胸如是則人工氣胸實為有益之手術矣

淋病後的攝護腺神經症或叫做情慾性神經衰弱症 (謝筠壽)

一個人患了淋病以後。往往發生遺精。腰酸。容易舉陽等種種的症狀。在舊醫講起來。不說是腎虧體虛。便說是相火旺盛。或是精關不固。在新醫上講起來。大多是淋病後的攝護腺神經症。也叫做情慾性神經衰弱症。原來後尿道攝護腺部陰阜的地方。便是神經最多的地方，倘是發生了淋病。淋病不知不覺地從前尿道蔓延到後尿道。並且蔓延到攝護腺。等到急性症狀經過後。就會遺留著情慾性神經衰弱症。他的症狀是很多。吾現在把他分做二種講起來。一種是局部的症狀。一種是全身的症狀。

(甲)局部的症狀。講到局部的症狀。譬如患者往往覺到會陰部 (就是肛門和陰莖的中間

。吾國叫做海底的（）有重感或是鈍性的壓迫感。或是尿道。睪丸、直腸內有痒感。此等的異常感覺。或永久存在。或有時發作。患者頗爲苦惱。有時不但有這樣異常的感覺。而且有劇烈的疼痛。此疼痛不但僅僅發生在後尿道和攝護腺。而且放散到肛門，鼠蹊部（就是下腹和大腿的交界部）睪丸。大腿。荐骨等部位。發作性的出現。常常因運動。坐椅不適。或是放尿。射精時而發生。或使疼痛加甚。病人竟有坐立不安的狀態。還有一種重要的症狀。就是攝護腺漏。在大便之後。或是放尿完結。在尿道口有精液樣物的流出。患者因此頗爲恐懼。誤以爲流出的是精。惶恐的去就醫。真實何嘗是精液。不過是一種攝護腺的液體。但是也有一種真正的精液漏。這是因爲淋疾侵犯到精囊的時候發生。這樣兩者的區別。是要醫師用顯微鏡去檢查。就可以明白知道了。

放尿障礙也是常見的現象。大多是尿意瀕數或是放尿疼痛。這樣的尿意瀕數。有在夜間劇烈。也有在一日中一定的時候劇烈。譬如早起或黃昏的時候。排尿時候的尿線。因括約筋的攣攣。忽然半途而絕。或尿線時大時小。或是放尿終了尿道裏面還有若干的尿未曾排盡。滴瀝而來。濕潤衣服。因之患者當排尿終了後。往往故意振動陰莖或是壓迫尿道。想排除這尿殘餘的尿。利害的往往因這樣的尿淋漓引起了包皮和陰囊的濕疹關於生殖方面。也有着種種的障礙。患者陰莖往往容易勃起或遺精。射精後後尿道內常有灼熱

的感覺。劇烈時則永久持續。他的疼痛。放散到直腸。此外交接時缺乏快感和勃起方的衰弱。成功了早泄和陰萎。

幾種普通急救法

(姚傑醫師)

(一)耳道異物

小孩子大多喜歡將豆類或小石塊拿在手中玩弄。有時偶不小心。塞入聽道中去就不能出來了。這時候小孩子就要哭起來。大人也要着急起來。取出的方法。是不可用鉗子鉗去取。因為用鉗子。往往愈鉗愈進。祇須用注射器吸滿溫水後。注入耳道內。當水碰到鼓膜回出來的時候。就可將異物冲出。倘使蚊蠅臭蟲或其他蟲類爬進外聽道的時候。也不可用鉗子鉗取。因為在鉗的時候。蟲類要向裏面鑽進去。只要滴入幾滴油類。蟲碰油類。就要死的。等到死了以後。再行鉗取就容易了。

(二)鼻腔異物

鼻腔內的異物。時常遇到的。也是黃豆和石屑鈕扣等為最多。取出的方法。也不要自己濫用鉗子。可用紙捲或用火柴梗捲些棉花伸入他側鼻腔內。引起噴嚏。大多可以將異物噴出。倘使無效。只能請教鼻科醫師了。但是自己總不可亂挖。

(三) 咽喉異物

咽喉內異物最多的。是魚骨銅錢假牙果核等異物。能夠看見的時候。可以用鉗子或取出之。倘異物已入食道。可吞嚥山薯棉花粉糕等使異物裹在裏面。就容易通過胃腸。手指隨大便排出。倘此法仍然無效。那末祇能請醫師。施用手術。或器械取出之。咽喉異物之較大者。時常引起窒息之危險。倘是小孩。可以執住兩足。使之倒挂。再在背部拍之。有時可以嘔出。

(四) 酸鹼類腐蝕傷

酸性和鹼性藥品。碰到皮膚或粘膜的時候。就起腐蝕作用。輕則紅腫。重則潰爛。有人利用他自殺的也很多。急救的方法。倘使皮膚受了酸性藥品的腐蝕時。可用酸性溶液沖洗之。倘是嚥到胃裏去。可用鹼性溶液洗胃(洗胃需用特別器械。故家庭中不便施行)。或使之吞下。在定庭中最易覓到的鹼溶液就是肥皂水。蛋白水。牛奶。石灰水。蘇打水等。倘使腐蝕的是鹼性藥品。那末可用酸性溶液洗濯之。家庭中最易覓到的酸性溶液。像醋檸檬水等。

(五) 蟲類咬傷

蚊蟲壁蝨的咬傷雖無大痛苦。但是在奇癢的時候。也很難當。治療的方法。只要塗

上阿摩爾亞水。在平時祇能掛蚊帳。勤捕捉。注意清潔而已。其他蟲類。像蜜蜂蜘蛛蜈蚣等之咬傷。往往紅腫。疼痛非常劇烈。除塗佈阿摩爾亞水外。更可用鉛糖水。或醋酸攀土水包罨之。

(六)毒蛇咬傷

毒蛇咬傷。大多在足部。傷口處紅腫劇痛。並且在很短時間內。可以向上蔓延。最後成爲全身中毒。神智昏迷。呼吸短促而死亡。急救的方法。將傷口上部用繩紮緊。阻其血運。在傷口上。可用硝酸銀、氯化鐵、石灰酸等腐蝕之或竟用烙鐵燒灼之。或切除之。最好除局部治療外。再要請醫師注射毒蛇血清。

藝林

海棠香館吟草（十八續）

汪建侯

饒秋曲

山棱瘦聳樹頭禿雁背霜花白於玉如此荒寒畫不成魂銷古渡涼波綠莫向西風折柳枝紅
闌斜照昏殘絲一年歸信梧桐記滿地離情蟀蟋知惟有幽人耐孤寂吟缸坐背茆齋壁別夢
迢迢祇獨尋前塵杳杳空相憶贏得相思逐水流方知一日抵三秋明朝試啓柴門看落葉蕭
蕭無限愁

秋夜憶內書以代柬

曹騰夢轉曉鐘撞香炷寒篝燼炷缸憶爾此時眠未着蟲聲和雨入秋牕時內子病不得寐來詩云多病生涯綿雨裏不眠心

事亂登邊書成鄭重託微波為勸加餐體自和人比秋花還較瘦如何禁得病消磨

寄懷箬溪

卅里勞相望思君秋月圓才名高枕上身世冷吟邊漸覺髮髭改依然談咲顧客懷休論我愁
緒正絲絲

遺愁

百事思量總不宜遺愁無計欲何之數椽容我栖塵草一局鑿人打劫棋鈍已成根休問慧俗
非入骨儻能醫夜來隣壁荒鷄叫正是空齋夢醒時
迂疏雅與俗情違舊雨寥寥過客稀種菜生涯名士近惜花心事少年非青山深入能藏拙流
水澄觀漸息機慚愧娛親無一策虛將歲月招春暉

自關疎林拓短籬柴門春光日遲遲垂簾茶熟留香靜溜壁苔肥帶雨滋詩爲嬾酬聊負債書
能借讀不妨痴山花一樹紅憔悴錯把朱顏對酒卮
布襪青鞋舊絮袍當年意氣惜粗毫人如野酒眞能澹門對山松不敢高快續史篇思劍舞偶
耽靜趣學禪逃寸心我已成枯井不及東畚舊桔槔

小樓

曉夢惺忪燈影斜小樓寒氣入窗紗心情今夜如春雨點點隨風到落花

子夜歌

刻意要郎憐爲郎宛轉多欲識儂心曲鬢髮如旋螺 見郎生喜色緩步就郎殷不是凌波細
裙下圍彩雲 帳中有明燈照見儂色媚吹氣如芳蘭教郎並頭睡 郎來求妾容急把雲鬢
整喚郎携手坐遣取照雙影

讀王次回疑雨集

作詩如作樂微羽妙于宮看詩如看花愛淡尤愛濃我讀疑雨集使我特情鍾閨兒女態一
一盡形容或描紅粉粧或寫淡眉峯或聞笑語聲或訴別離衷佳人殊悲歡名士喻窮通可惜
濃豔才竟以貢士終拘矣腐儒輩謂汝不可宗不見三百篇不刪鄭衛風

晚步

淡烟滿地月當頭寂寞山城易得秋燈火一星蘆葦岸是誰今夜泊孤舟

秋夜怨

憶郎登程時明月猶在樹今夕見明月不見郎何處月不照郎回月祇照郎去

擬古樂府

昨夜燈花開郎身隔千里今夜又燈花所報是何喜不怨征人歸來遲祇怨燈花不知時

投稿簡章

- (一) 本誌各欄如蒙醫藥諸彥龍賜鴻文自撰或譯述均所歡迎
- (二) 譯文請註明原著者姓名出版日期及發行處能將原本附寄更佳
- (三) 惠稿字跡務望繕寫清晰若模糊不辨者惟有割愛
- (四) 惠稿揭載與否本社不能預先聲明而原稿亦概不寄還其欲寄還者請附郵費
- (五) 稿末請註明真姓名住址以便通訊
- (六) 惠稿本社得酌量刪改若惠稿者不願刪改須先聲明
- (七) 本誌宣傳公衆衛生介紹世界醫學爲宗旨編者皆盡義務故對惠稿諸君僅以本誌爲酬
- (八) 惠稿者請寄杭州東街路一二三號際林新誌社編輯部收

廣告價目表 ADVERTISING RATES

位置 Position	面積 Space	每期刊目 Rate for each issue
封面 Front cover (outer)		Mex. \$ 30.00
底面 Back cover (outer)	全半面 Full Half page	Mex. \$ 30.00 \$ 17.00
封面之內面 Front cover (inner)	全半面 Full Half page	Mex. \$ 25.00 \$ 14.00
底面之內面 Back cover (inner)	全半面 Full Half page	Mex. \$ 20.00 \$ 11.00
普通文字前後排 Ordinary pages	全半面 Full Half page	Mex. \$ 12.00 \$ 7.00

廣告簡章

- (一) 以上價目以杭州銀元計算當于廣告第一次登出後付清
- (二) 如用銅鋅版或彩紙彩印價目另議
- (三) 于合同有效期間本誌每次出版均贈送一冊
- (四) 如欲換登廣告須于出版前十日將稿寄下不另收費
- (五) 如訂全年合同者八折計算

定報價目

每月一冊零售大洋一角全年十二期大洋一元半年五角五分(郵費在內)
 蒙古新疆及日本均照國內
 歐美各國及香港澳門照定價另加郵費五角
 票郵九折以一分四五分爲限

中華民國二十三年七月出版

總編輯主任 汪建侯 醫師
 總發行所 汪鶴龔 醫師
 分理處及 醫林新誌社
 代售處 杭州東街路一二三號
 上海北京路九十六號五定公司
 上海河南路中英大藥房
 杭州湖濱路西湖小說林
 杭州保佑坊古今圖書館店

便 瀉 秘 新 藥

PANKONIN & TONOPHEN

[F, KOONG]

澎可甯與通乃分

欲達腸腑之藥，經胃每生變化，嘗苦奏效未確。但腸消化止瀉劑「澎可甯 PANKONIN」，係與收斂之屬相結合，其抵抗胃液之作用甚強。不但至腸對於脂肪化分有異常之良效。即於蛋白質類之消化力亦增強。且有消炎殺菌，制酸酵，止出血之功。新用於脂肪過泄，慢性腹瀉，小兒腹瀉，神經性腹瀉，慢性鹽酸缺乏之胃炎，年久腸炎等，均甚效。輕瀉劑「通乃分 TONOPHEN」，亦因與緩和安靜之藥，有機化合，過胃不為所動。且可藉此抑制其種種副作用。故服後不害胃，便時無腹痛，連用無習慣，減服亦仍效，實為輕瀉藥中之佳者。用於常習性便秘尤宜。此二藥功皆賴於合作，遠非單純原藥可及。如須說明書，及「通乃分」簡易試驗法，函索即呈。

以上二藥俱分 藥粉 片劑兩種

上海福康西藥店製 各大藥房均代售

總經理處 上海肇嘉路三百九十七號 福康藥行

新 鎮 痛 劑

NEO-VETOLIN & VETOLIN

〔F, KOONG〕

萬痛靈與凡痛靈


此係有機化合物、初名「凡痛靈 VETOLIN」止痛之功尚迅速。惟藥為淡黃色、於化學上猶覺未滿。因又再四研究、另以最新化學方法、製成一種白色「最新萬痛靈 NEO-VETOLIN」功效更妥更速、吸收亦更容易、服後立刻痛止。並無種種不快、及催眠等副作用。凡各種神經痛 歸女片經痛 外科創痕痛等均甚效。而尤以三叉神經痛為最。舟車暈車、及動脈硬化之頭頸脹痛、亦有效。定價甚廉（醫界用黃色藥片、五百片瓶裝、僅定價七元五角。白色五百片、僅定價一十元）如須說明書、及新藥價目表、函索即呈。由郵購、亦即寄。

「裝盛」 藥粉每兩一瓶

藥片分五百片 一百片 一十片

上海南福康西藥店製 各大藥房均代售


總經理處 上海肇嘉路三百九十七號 復康藥行



SUPRAHYPON

本藥極為

藥聖喘氣



行藥西定安號八五七路德斐辣海上理經總華駐


行藥定五號六十九路京北所行發總

Atophan Atophan-Balsam Atophanyl

亞陀方藥片
亞陀方軟膏
亞陀方耐而

亞陀方製劑乃由杜尔姆氏及尼可拉氏在先靈藥廠最大實驗室內苦心研究而製成至一千九百一十一年始引用於藥物學之為治療痛風症之第一專劑本品除具有偉大消炎作用與止痛性質外對於普林之新陳代謝影響尤巨故全世界著名醫師凡遇痛風及痛麻質斯性疾

德國柏林先靈藥廠製藥廠
駐華總經理 上海國明路
十九號 先靈洋行



OPTARSON

奧拍泰純	<p>奧拍泰純</p> <p>新發明砒素土的年化合劑專治諸虛百損以及患瘧後及患他種傳染病後虛弱諸症</p> <p>包裝 每盒十二管 每管一立粉</p>
------	--

SOLARSON

所拉純	<p>所拉純</p> <p>功效準確可供皮下注射用之砒素強壯劑注射後病人皆能忍受毫無副作用專治諸虛百損萎黃病及貧血等症</p> <p>包裝 每盒十二管 一立粉</p>
-----	--

TONOPHOSPHAN

託拿福賜芬	<p>託拿福賜芬</p> <p>無毒有機性磷化合物能振足貧血患者之新陳代謝功能並能補益骨組織之機能不全毫無副作用</p> <p>包裝 一或溶液每盒二十管每管一立粉 加料每盒十管 每管一立粉</p>
-------	---

行洋信業路西江海上海經家獨國中造製[脫斯赫耳拜]廠藥大德天國德

THE MODERN MEDICAL JOURNAL

123 Tung Chieh Road, Hangchow China.

Vol. III JULY 1934 No. 7.

奧顏靈

各大藥房
均有出售

上海美狄根洋行
德國海芬勃廠製



能溶解尿酸止痛
消炎故為痛風性
其他急慢性關節
筋肉使麻質斯各
神經痛等之聖藥

OPOLEN