

武
87
卷

傷寒論手引草引

田隴齋




傷所載乎醫瘵多引之繼衡良方二十
有六等者享保癸卯藤漁齋之編輯也既
是書以傷寒門為子弟講述焉即括要
之而為六經辨治指南也茲依弟等之需
改名傷寒手引字授諸剞劂氏云

傷寒手引中

傷寒論手引草

安永甲午子孟冬

三河烏巢道人講述



三河

澤喬緒書



傷寒論手引草

三河烏巢道人講述



平安男 加藤玄順 録

遠江門人 佐藤宗哲 校

縦衡良方アラカタモ荒方出来テ此書ノ傷寒門ハ今日療治ニ尤所ガカリヲ
抜テヌヒ挙ル令目匙サシヘカケ時オモヒ心ヲ講述スルナリ傷寒論ハイテイハ
ハ大分ノナカク五坐ヤ六坐コトテツキルヲデナヒ其餘ハ今日ノ療治ニ遠
キコトフモアル盡ク挙タホドノナケレバ傷寒論カ全部ス上云モ

傷寒論手引草

先ツ此分テ傷寒ノ療治ハアラスムナリ此書ノ傷寒門ハ本論ト醫通ノ
説ト合シテ何デアラフト今日療治ノ働キテルヤウニテ括要スルモナリ
ノ内ニ要論ノ文義ヲ講述スル文議カスニ子ハ匙ハカクルオモイハレヌ
故要論ガカリ吞込メバ傷寒論全体ハ預失リ 案ズルニ近來儒

書醫書任ニ唯本文ヲ熟讀玩味メ自然ト知覺セヨトイフトイハレソレハ
力量アル人上ノ今日初學ノ輩ノ不及処ナリ何分今日療治ノ働キ
爲ニテルヤウニ傷寒論ヲ取扱フガ肝要ナリ近頃ハ首ヲ上ルト醫
傷寒論ト口癖ニモイヘトサラバ傷寒時氣ノ療治カ功者ナカトイハ
ハ動スレハ牛カ割雞長刀川齋弊アリテ却テ後世流ノ衆方規矩回

春壽世ノ治法ヲミテ傷寒論ヲ遍モ不閱ノ醫人ハ此弊ナレ實ニ傷寒
論クルヒスル醫人能々思惟シタニハカシ

○傷寒論ハ後漢ノ長沙ノ太守張仲景アラハサレタル処仲景ハ長沙
ノ大名ニテ傷寒論金匱要畧ノ外ニ仲景ノ醫術トテユツタリハナケ
レ氏昔カラ明醫ト称シテ奇妙アル神備ツタ醫人ナリ故ニ黃帝ノ岐
伯ノ越人ノ仲景ト云ハ醫聖ト称ス此レ後漢ノ人ニシテ是ニテニ勿論
藥方ナヒテモナヒ内經ニモ藥方ガ上ニ方ニアルアル計テモナレ後漢
ニテ藥方ノ名モアルベケレ氏スクナレ多クハタゞ今日ノ一味配劑様ナリ
テ改メテ藥ト云モカ有ツタテモナササウナレヲ仲景ノ傷寒論金

價要畧ヲ著シサニ桂枝湯ノ麻黃湯ノナド、藥名ヲ立テ萬世ノ藥
方ノ祖トナルニ仲景ヲ方祖トイフ其後漢魏ヲ歷テ晉ニ至リ晉ノ太医
院王叔和ト云明醫傷寒論ニ註ヲセラレタ其書物ノ數ハトホド有ゾト云
近代和版ニモ行ハル仲景全書ノ序ニ仲景ノ本書十卷王叔和ガ註三
十六卷トアルソレ見レバ餘程大部ノ書物ト見ヘル今テ見タ成ニ全體
七八卷ナラテハナヒ其七八卷ト云カ一冊ヲ二冊ニトジワケテ七八卷トシタ
モノ王叔和ガ時ニ註シタ本書十卷註三十六卷ノ書物デハナヒ王叔和ガ
時成程全部ニタ書ト見ヘルレガ紛失シテ只今ノ宋版傷寒論見
ルニ王叔和撰ト有ルニ王叔和註セラレタ書ト云フガ此間カ久

レイユトソレカラシテ宋ノ太祖ノ時開寶年中ニ節度使高繼沖ト云モ
ノガ傷寒論ヲ田舎ヲトリ出シテキテ何ヤラキレクノ古本ノヤウナモノヲ
アツメアルソレヲ宋ノ哲宗元祐八年ニ天下ノ古キ醫書ヲ皆校合シテ秘
書閣林億ニ仰セ付ラレ古書ノコラス校合アリニツニ番ニ傷寒論ノ校
合ガアル傷寒論ノキレバガノコリテ有テ林億カトリアツメテ書物ニシタ
ルガ和版ニモ有ル宋版傷寒論ナリソレカラ後ハ首ヲアクル醫人ノ分ガ
傷寒論ニロツナリ凡仔細ヲイワヌ者ハナドクモ皆傷寒論ガ此
ヤウニ合点ガユカヌヤウニツタハ王叔和ガ註シマウカワルイ註ヲスル成
仲景ノ本文ト自カノ註ト一ツニハダテナレ書タヌニ米ニ砂ニセタヤウニ

トウモ二度ワケニクイト王叔和ヲドレモ誤リ者ノマウニ云ヘトモ是ハ先輩
無理ナ評判ト云モノ王叔和ガ註レタ全書ナラハソウシタ評判モアラフナレ
任チリクニナリタヲ見テトコヲ目アテニ云タモノゾ一圓合点ガイカヌ是ハ
トウ云所ノヨリ所ガ證文ト云ニヒヨツト誰レヅガカウシタフ云出テ有テ
夫ヲ吟味セズニ歷々ノ醫人ガソレニナリキツテ其後吟味シテモ無カワ
タガ近代張璐玉傷寒大成内其詮議ヲ云ハシタメツタニ王叔和ガ
無調法ト云ハレイカトテ有後條辨ナドニ至極王叔和ヲ誤リ者ニシ
テアレガ晉ノ太醫院ト云ハ虚言レマ賣藥屋ト見ユルトワルクキタナ
ク云夫傷寒論ノ傷寒論タル大綱ハ序例ナリ此序例ハ大學子テタト

ヘテ云ハウナレハ經一章ト云モノハ傷寒論ノ序例ノマウナモノハ六經ノ篇傳
十章ノマウナモノ大學ノ程朱ノ二度校正ナサレテ二度聖人ノ教ガ承ハラル
様ニナリタリ傷寒論序例ハ其ノ後校正ガナイ乱シタナリノ序例ヲ三
テアレハ兎角仲景ノ書デハナイ王叔和ガ偽例ジマホトニテ有執
カ條辨ニ初メテ序例ヲ削リタハ大學子テ經一章ヲ偽書トメ傳十章
ハカリヲ本書ト云マウナモノアレヨリ前ノ醫人ハ合点イカヌナリニ序例
ヲ仲景ノ書ト云ナリニ合点ソライタヌヘ苦シフナカワタガ方有執ガ削
ステ、カライカニモコレガ尤トテ皆ケツリサルワカラ俞嘉言ガ尚論篇モ
同ク偽書トシテ有執ガ條辨ニタカウ程應旌ガ條辨ニナツテ惡

ロライヒハルナリ然ルニ張石頑ノ醫通ノ醫通タルトコロハ一ツ今ノ傷寒
 論ノ序例ヲ見ルニ錯簡重複ノ類多クア生ヘ仲景ノ説テ有ニイト方
 有執カ思ヒ付タハ此ノ然レ成無也ヲ始メ王安道張公賓テモ皆仲景
 ノ序例トスルニ異論ハナイコトヲ張石頑ガ發明シラレテ序例ノ重複ノ道
 理ガ備ラヌトコロヲ抜テステ仲景ノ本文トシボレキトコロノ序例ニ篇書
 キヌイテヲカレタコトヲ傷寒論ハ再ヒ世ニ明テルト云モノ張璐王先生ノ
 醫通ガ出子ハ仲景ノ書無モ同前今般此書ニ載タ分モ仲景ノ本
 文ト醫通ノ註ヲ交ヘ書テ大綱ヲスル其旨ヲ如斯發端ニ講述スルナリ
 享保癸卯孟冬
 藤謙齋識

六經證治括要

○太陽中風頭痛項強漚々惡寒淅々惡風翁々發熱汗出脉浮緩鼻
 鳴乾嘔者

桂枝湯

傷寒ノ證治ヲ語ルニ内經ニ三陰三陽テ語ルレカレテ仲景ニモ此
 ニ本ツヒテマヨリ三陰三陽ハ六經テコトハラレタ三陽ハ太陽經陽明經
 少陽經此レヲ三陽經ト云三陰ハ太陰經少陰經厥陰經此レヲ合テ六
 經ト云ナリ傷寒論テ傷寒ヲ語ラルニ六經ノ症ト治トヲ根本ニ立
 テ、フレカラハ其ウチノ龜々ナ證モアリサニクナ治法モアルナリ或合

病併病ビョウヘイビョウ或傳經オシヤケイ直中チウチュウナド、テ入クシダフモアリ又ハ誤治ゴゲニヨツテ病
カイロクカイロク變ヒメクルフモアリ結胸ケツキョウ痞滿ヒミ其外シノサマクアレヒ凡ヒツル異ヒツル竟ヒツルズル
所六經ノ證治ニ不遇フヘブレユ此書ニ六經ノ證治ノ要領ヤウレイヲアゲテ外
ノハ舉フヘヌナリ先ツ六經ノ證治ヲアラミ合点スベシレユ此書ヲ傷寒
六經證治指南ト名ケニ今傷寒手引サシト改メテ備サシ太陽ノ中風ト云ハツキ
合ヒタバヒイヨク詳シニナル

太陽傷寒脉浮緩身不疼但重レ有輕時キ此風傷衛之候キ而身重乃
為寒傷營風多寒少反以傷寒二字括其寒證キハ有傷飲ヒ發熱
而效或乾嘔或渴或利或噎ヒ或小便不利小腹滿或喘者小青龍湯

コト又今ノ症キマウナ風ニ傷ルガ多ク寒ニ傷ルガ少ナリ脉浮緩ト云
風ノ脉身不疼キコレモ中風ニ身不疼然レバ脉モ中風ノ脉ニ比重ト云
ガ傷寒身ガオモク覺ルキ感冒カンバウテ身ガ重ク思ルキソ濕シニアタリテモ勿
論身ガ重キモノレ比重ヒナリニトコヤラ營ルキマウナフガアル又作輕ヲ
覺ルキフガアルニ風傷衛ノ候キテ乃クコガ寒營ヲ傷トス風多寒少レシ
レニ反テ傷寒ノ二字ヲ以テ其寒症ヲ括スルナリ○心下有停飲キコレ
今テ云痰飲キ飲キナリ痰ニモヒカキキレカ又ルヲ痰ト云心下鳩尾キアタ
リニ水氣スイキアルヲ飲ト云或乾嘔カンナクト云心下水氣アル故ニカラエツキガアル
然レ比或ト云比ハ心下水氣ガ盛サカニテレバカラエツキガクルサウナケレバ

カラエツキガコヌ丁モアル或渴^{カウ}ト云心下ニ水氣が無ケレバ咽カハクモ
又水氣多ケレバカキハセズ或痢^リト云大便ガ利スル丁モアリ不利^{ザル}丁
モアル或噎^{イフ}ト云ハヤクリガ出ル丁モアリ出ヌ丁モアル小便ガ通ズルコトモ
アリ不通^{セウツク}丁モアル小腹痛^{セウツク}ト云コレモ水氣ガ多ケレバ満ル又満ヌ丁モ
アル或喘^{ゼン}ト云ハセリツキカクルハ水氣多シ又水氣ナケレバ喘セヌ丁モア
ルイツレモセヨ目^メ當^{アテ}ハ脉浮緩身不疲ト云症ナレバ今イフ病症或
ナヒフモアリ有ル無キカハズ小青龍湯ヲ用ヨ此ニテ風寒ノ次第ヲ
キケト説テキタモノ桂枝湯ノ症ハ中風ノ症麻黄湯ノ症ハ傷寒ノ症
大青龍湯ノ症ハ寒多風少ノ症小青龍湯ノ症ハ風多寒少ノ症コレヲ

太陽經ノ本ヲ侵^カ表裏^{ヒヤリ}ニ傷ラル^フヲ云

太陽中風發熱ホ七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入即吐者名水
逆^{トモト}此原傷風有汗不行解肌之法則汗出雖多徒傷津液表^ヲ終不解
邪入於府爲風傷衛犯本五苓散○太陽中風ト云ハヤツリ桂枝湯
症ナリ桂枝湯ヲ用レバヨヒニ麻黄湯ヲ用生^ニ六七日ニテモ不解^ズ煩^ス
内外^ニ煩熱^{スル}スレテ發熱^モハ表症モヤニス内ガ熱スル故裏症モ
アルフ表裏ノ症ハ表ハ發熱裏ハ咽^ノ渴^キガアル欲飲水^ヲコトテ水ヲ
ニスレバ水ガトヘルヤイナマ吐キカヘスツレテ水逆^トナルタニクキコト
ガ水入即吐ト云其ワケハコニ云テ右ノ語ニ云テアル此原ト云水逆

ノクハ後ニ云テ先^ガ此表裏^ノ症ト云テ云々モノ傷風モ中風モ
同じ^ク始メカラ療治^シテモセイデモ汗^ノ足^レ症是^レニ桂枝湯ヲ用テ肌
ヲ解^シタガヨヒニ反^テ麻黃湯ヲ用^スル^ニ却^テ汗^ノ大^ク分^ク出^ル原^モコレ傷風^ノ
症^ニハ桂枝湯ナル^ニ麻黃湯ヲ用^スル^ニ身^ノ津液^ヲ傷^ルハカリ^ニ邪^ヲ
去^ラ又表^ハ不解^邪ガ存^ス入^ラ表裏^ノ症ト云本^モ膀胱^ノ府^ニコレ風傷^ノ
衛^ノ之本^ヲ犯^トス五苓散^ノ方考^テ手引續編^ニ詳^{ナリ}○發汗^後水^ヲ茶^ヲ
不得^入口^者水^ヲ逆^也此^レ原^有積^畜痰^飲發汗^則徒^ニ傷^胃中^清陽^之
氣^必致^中滿^若更^與發汗^則水^飲上^蒸而^為吐^逆下^滲而^為泄^利
コ一段^ガ水^入レ^バ即^吐シ^テ水^逆ノ症トナル訣^ヲ云^今マウ^ニ桂枝湯

症^ニ麻黃湯ヲ用^テ湯水^ヲハ^キカ^スハ水^逆ノ症ナリ表裏^ノ症ハナセ^水
逆^スル^ナレ^バコレ^ハ平^生畜^積ノ痰^氣ハ水^氣ノナリ積^畜水^氣ア^ツテ^フ
コ^テ誤^テ桂枝湯ヲ用^スル^ハツ^ノ症^ニ麻黃湯ヲ用^レハ徒^ニ胃^中清^陽
之^氣ト云^ハ津液^{ナリ}傷^寒論^テハ津液^ト云^ハ陽氣^ノト大^ハ子^ノ
意^得ベ^シ津液^ノヲ陽氣^ト云^キハ^ツタ^フ分^ヒト^ツ兼^テ意^得ベ^シ
シ^今ノ清^陽ノ陽氣^傷ル^ニ陽^虛シ^テ陰^寒ニ^{ナル}ソ^コデ陰^寒ニ^テ
ハ水^氣カ^滿テ^キテ中^滿ヲ^イタ^ス若^更上^ニ誤^シテ上^ノ誤^シテ上^ノ誤^シテ上^ノ誤^シ
其^上ニ重^子テ麻黃湯^ノヤ^ウナ^テ發汗^ヲ與^レバ^イヨ^ク水^氣カ^盛ニ^テテ^テ
吐^逆ス^ル上^ニコ^ニア^ゲル^ガ下^部ヘ^サガ^レハ下^ニ滲^シテ泄^利ヲ^ナス^コレ^テ

水逆ノ症ト知レシ○太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲
得飲水者少與飲之胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴
者府熱全具或發汗已脈浮數煩渴者並此散主之コ一段ハモト
水氣痰飲チヒモガアルレニ今ノ通りナ誤々瘵治ヲシテ水氣有モ
用レバ水逆トナル此レハ水氣ナヒモノユ一胃中乾煩躁ト熱ガアリテ子ム
ラズ不得眠ト云ハ胃ガ和セヌカラナリ水ヲ飲ニトセバ少レバカリ與ヘテ
飲セヨ氣ガ和スルトキハソレテ愈スナリ愈ト云テスキト本復スルモノニナケ
レドチツクリトヨチル是レニテ、胃中ニ水氣アルモノハ水ヲタケツケズ水
氣ナヒモノハ咽ガ乾テ水ヲタケツケルヨリテ少々與之脈浮ト云カラハ

五苓散ヲ用ル自當ノ證脈ガ浮デ小便モ不利太陽ノ府ニ熱アツテ
膀胱ガ不利故小便不利後熱ト云瘵治違ナリニモ發汗スルニ少
解スルノモアルカキソヨヒハ内膀胱ノ裏證府熱全具ト云ハ膀胱
ノ府熱ガ全ク具テアル又小便ノ利不利ニカヒナレニ發汗レハリ
テ後脈ガイヨク浮數アリ煩渴ト咽ガカラナラハ並此散主之
並ト云ハ府熱全具ニツ小便ニカヒナレニ脈數煩渴スル此レニツ並此
散主之○得病無熱惟狂言煩躁不寧顏色不常此熱結膀胱
宜此散コ一段ハ始カラスクニ得病トモハヤ發熱ヲニタスレテ又
ニテ乱リカニヒフヲ云煩躁トモタハ顏色不常カホツキナドモキヨ

トシテ常ノ顔色ヲヒ此レ熱膀胱ニ結スルエナリコレハ澤山ニナヒ
ナリ古ハアツタ太陽ノモトヘテ膀胱ニ結スル故宜此散○古根赤
尖白不惡寒セ身熱煩渴邪犯太陽之本用此散兩解ス一條又
病狀ニカハズ舌色ヲ見テ通り療治スルカアルレヤト云テモ外
病證ニカハズ脈ヲモトラスニ療治セヨト云フハナヒ舌根カ赤レテ
舌尖カ白クテサムケモナク身熱煩渴スルモノ邪犯太陽之本此散
用テ兩ナガラ解セヨ○吳氏云小便不利而渴者此散主之謙云下
言得要已
ハ吳昆方考ニ云フナリ備五苓散ノ證ガノニコミニタヒモノナレバ傷
寒論ニモキコヘル様ニハ云テナヒトフテモ古書ニハアトサキ出次第ニ云

タモノト見ユル然レバ其内ニ妙々ガアル醫通ナドガ註ヲスルト云トモ本
文ガコトテ一ロアソコテ一ロツ、イフテアル註ニヤト云テモ本文次第ノモノニ
醫通テモノニコミニクヒ此書ハ本論モ醫通ノ註モ書キ交セテ講述
キコヘル様ニスレバレデモ常ノ醫書ヲ見ル様ニイカズ医通ナドモキコ
ルケレバ何邊モくヨミテ見子バキコエ又此書ノ様ニ仕立テ見タトキハ
キコル吳曰比カ時分モタシモ五苓散ノ香ハカナヒモト五苓散ト云モノ
小便不利太陽ノ本ヲカス症ノ藥ナレバ五苓散ト云ハイツデモ小
便不利ヤ淋病ノマウチモノニ用ルロクニ手ニ又エナリ吳昆云
小便不利ニ咽乾クモノニ五苓散テキコウ的候ナリ傷寒ニモセヨ雜病ニ

モロヨ小便不利シテ渴スルト云ガ五苓散ノ候ナリ言得要トハ肝
要ノヨ云ハタヌ一言得要ト云ノ誤汗虚陽擾乱或眠或吐心煩
惡寒者此散去白朮多加酸棗仁カノ汗ヲ發スニイ症發スルニ虚
陽ガ擾乱トミダレミタル或眠リ或吐シ心煩ト云ハ心カワクトシテ
了コレモ虚陽ナリ惡寒ハ陽氣虚スルニ白朮ハナセ去ルナレバ誤津
液ヲ乾スルニ白朮ノカカスモ多ク去リ酸棗仁ノウルホスモノヲ加フ○身
體發熱頭面汗出頸以下無汗咽乾小便不利身燥無汗此熱不
越干外畜於内而為黃疸茵陳煎湯飲此散コレカハ黃疸ノ
ヲ云身體發熱ト云ハ傷寒ノ了デナヒ身體發熱ハ濕熱ナリ頭面汗

出ト云ハ頭面ハ汗出テ頸以下ニナヒ不越ト云ハ熱カタク又今ニモ感冒
トニアルコトコレハナセナレバ濕熱ガ内ニ畜テ必ス黃疸トナルヲタニ雜病
黃疸トハ違テフマツナハ茵陳ヲ飲汁ニシテ此五苓散ヲ吞ム○小便堅
而黃赤此陰血不足陽盛也此散加滑石コレ小便ガ堅ク通ジカ子
テ小便ノ色ガ黃赤ナリ是熱症ニ陰血不足テ陽ガ盛ナ陰血不
足ト云テ血虚テハヒ畢竟熱盛ナ生ヘナリ此散加滑石滑石ハ寒
藥テ能ク小便ヲ通ズル藥ナリ

太陽病不解邪熱搏結於膀胱必沸騰而侮心火其人如狂此
為寒傷營犯本血自下者愈小腹急結者血畜於膀胱外不

解者、尚未可攻、當先解外、外解已乃可攻之、挑核、養氣湯、コレモ太陽ノ病、本ヲ犯ス、症ナリ、五苓散ノ症ハ中風ノ療治ヲ誤テ、太陽本ヲ犯シ、表裏ノ症トナルナセ、ナレハ風傷衛、犯本ノ症、ジヤヨリ中風ニ若シ、傷寒ノ療治ヲ仕損テモ、或療治セイデモ、傷寒ノ邪熱ガ裏ヘヨチ、リ太陽ノ府膀胱ヲ犯ス、凡ハ中風ハ傷衛病ニ氣分ノ病、傷寒ハ傷營病ニ血分ノ病、コレニ邪ガ膀胱ニ結スル、凡ハ其結スル処ノ血熱ガ沸騰トシ、ワキアカユヘ上ヘワキアガリテ、心火ヲ侮ル、火ハ心ノ主トコロナレ、凡テ膀胱ノ太陽寒水、火ガ心火ヲ侮リテ、凡ク氣違デ、ハナヒ狂人ノヤウキヨトノ、レクシテ、クルコシ寒傷營、本ヲ犯ストス、寒ハ寒ニ邪ナリ、營、血カヲ

傷ル、寒邪ノ血カヲスベテ傷レ、根本ノ營ヲ傷ルニヨリ、寒傷營トス、自下者ト云ハ、自ラ下血スルモノ、愈フソレガ下ラスニ、膀胱ニ邪熱ガト、コレヲリテ、瘀血ニナルモノ、小腹急結シテ痛キリ、膀胱ノ府ニ血ニナリテ、凡ク其畜血ヲ下サズ、ナラヌ然レ、凡ク外邪解セ、又内ハ下サレ、又コレニ、一ツ、麻黃湯ノ類ヲ用テ、發汗セヨ、ニ、夕頭痛、惡寒ト云ガ、凡クコレニハ、外邪カアル内ハ、ヨリ、ハナラヌ、コレガサリテ、攻タガヨヒ、挑核承氣湯ヲ用ヨ、方意ハ、手引續編ニ詳ナリ

傷寒始病微惡寒發熱坐臥不安胸中煩欲嘔善饑脈弱陰陽未詳者先與甘草乾姜湯加葱白然後陽證與表藥陰證用溫

藥コレハ又傷寒ノ證ニ見ワケ難トガアルモノ先麻黃湯ノ證テ脈浮
緊^キ外^{ホカ}頭痛發熱惡寒ガ先始ノ病ニ付トキ惡寒ガアリヨ
ウハナヒ發熱モアリヨウナイ無汗身疼ト云ヤウナハ傷寒ニギレナ
ケレ氏坐臥不安トテ子テニタリオキテニタリメ子テモオキテモトツ
クリトオチツカヌナリ胸中煩ス外ニモ熱アレ氏胸ノ中カワクト熱
シテ欲嘔ト云ハトウヤラ吐逆ヲラウナ氣味合ガアルカト思ヘバガテ
ヒタルウナル此レモカハリタフハ嘔セシト欲スル症ナレバ食ゴロナヒモノ
コガ常ノ證トハ見ニクヒ備又脈ガ浮緊ナナリニ弱ヒトコヤラ陰證
ノ様ナトコロガアル陰陽未々見ワケニクヒ三陰經ニモ表證アリ三陽

經ニモ表證ガアル此トヲウルウ意得テ陰證ノ傷寒ト云ハ今ノ大虚ノ太
陽虚傷寒ヲ陰證ノ傷寒ト世間デカウ覺ヘテラルハ傷寒論
云分デナヒトコトモナフ虚寒ノ方大切^キナ症ヲ陰證ノ傷寒ト云ンダ
ナヒ三陰經ニ發スル傷寒ヲ陰證ト云三陽經ニ發スル傷寒ヲ陽證
ノ傷寒ト云其分チヨロクニ見分ケズハ先ツ甘艸乾姜湯ヲ與テ葱白
ヲ加ヨコレヲ用テ陰ニ發シテモ先ツトヒ藥ト云モノ陽症カ陰症カト云
ヲ見分テオイト三陽經ノ表症ナラバ表藥ヲ用テ陰症ナラハ温
藥ヲ用タガヨイ是ガ今ノ感冒ノヤウナフナレハ少シコトモリソコ
ナフテモ苦レカラ子トモ傷寒ト云モノハコトヲ違ヘテハナラヌ若シ三

陽經ノ表症ナラバ理中湯ノ四逆湯ト云フ用レバ不相應ナリ一旦病
ガ重クナル若シ三陰經ノ表症ニ麻黃湯ナドヲ用ルト以外アリソコ
コ甘草乾姜湯ノ温藥ヲ用レバ仕フコナヒナリ

陽明者有經府之別身熱自疼鼻乾不得臥脈尺寸俱長者
在經屬表證中風能食傷寒不能食自汗脈緩者可用桂枝湯無
汗脈浮者可用麻黃湯少陽證漸見潮熱脈弦浮大而短氣
腹滿者可用大小柴胡分提表裏之邪頭項強凡々脈長而大者
葛根湯前段ニテ太陽經ニスム陽明經ニ太陽經ヨリ一重クナラス
ル經ナリコレモヤリ太陽陽明ト云テ皆外ガハメグル經ナリ然レ陽

明ニ陽明ノ經證一色アリ二色ハ陽明ノ府ノ證ナリ即チ胃ノ府ヲ病ナリ
經證ト府證トイカヒ違ヒアルコトニコノ間ガ吞ハミアレケレバヤリ
發散スレバヨヒニ下劑ヲ用ヒ下スベキヲ發散セタリ療治ノ相違アツ
テ病ニ應セヌコトニハ陽明ノ療治キマテニタヒ傷寒論ニ陽明
經ノ療治ハ太陽經ノ様ニ精シキコトナヒシユニ先輩云モ陽明ノ
證治ハトフデモ余ハ不殘トナリ情此治法ハ發散スル療治ト下ス療
治トウラハラナリ此ヲ見ヌナハ忽人命ヲ斷ツ經ハ經證府ハ府證
ナリ先ツ始ニ陽明ノ經證ヲ云テアル陽明ノ經證ハ身熱トサムケハ
ナフテ熱ハガリナリ目赤鼻乾ト云ハ鼻孔カカク不得臥ト云ハ不寐

ナリ脈が尺寸トモ長ナルト云ハ長ナ脈寸脈モ上ノ方ヘアル様ニアリ
尺脈モ下ノ方ヘアルマウニアリテ長ヒ脈ヲ長ト云フ之レタ脈ハ邪ガ
經絡中ニアルレヲ陽明ノ經證ト云○屬表證ニモ三陽經ノ中ノ表證
ナリ其表證ノ中ニモ太陽經ニモ中風ト傷寒ト違ヒアリ陽明經ニモ
陽明ノ中風ト陽明ノ傷寒トノ違ヒアリ其違ハ中風ハ能ク物ヲ食フ
傷寒ハ不食スル食ノナルトナラヌガ中風ト傷寒ノ目當ナリ中風ハ自
汗スル藥ハ桂枝湯ヲ用ベシ藥ノ用カタハツテ太陽經ヨリハ二皮
ウチナレ氏陽明ノ中風ニモ桂枝湯ヲ用ナリ傷寒ハ太陽經
傷寒ニモ汗ガナレ陽明經傷寒モ同ク汗ガナレト同ジテ脈浮ニ是

レモ太陽經ノ傷寒ト同ジテ浮ニ浮ナリ長ナリ藥ハヤハリ太
陽經ト同シ麻黃湯ヲ用テ發汗セヨ是ニテ陽明經ノ表證ニ中風傷
寒ノ別ヲ云○少陽證漸コレカラ又陽明經ノ證ノコトヲコトソコニテ
語リタモノ少陽經ノコトヨリラクニ精ニクアルガ漸々ニ見潮熱登スギ
ニ時トリ定テ熱アルヲ潮熱トスル陽明經ノ證ハ脈カ浮ナリ長ソレニ
弦脈ガニシル弦ハ弓弦ヘサルマウチ少陽ノ脈ナリ邪カ次身ニ内ヘ
イル短氣ト息セハレクナリ腹モ滿ル大柴胡カ小柴胡ヲ用テ表
裏ノ邪ヲ分ケ提トヒツサグルマウニセヨ頭項強凡々コハ又陽明經
ノ表證バカリノコトヲ云此前一句ハ少陽經ノコト又コトハ陽明經

證ハバカリヲ云々モノ先ツ陽明ノ經證ハ身熱目痛鼻乾ヲ
陽明表症^シヤカクニ十分ナリキレバ頭項^カ凡々ト云ハ頸^カモ^カトスル^カ白^カヲ
形容^カシタモノ頸項^カカコバリテツツテユ^カハソウ^カトスル^カ白^カヲ^カ凡々ト云
ソレニ桂枝湯^カ加葛根^カ麻黃^カモ加ヘタモノ葛根^カハ陽明經^カ發表^カ
主藥^カソレニ葛根^カヲ大ニ用ルサレバ頸項^カモ強ルユニ麻黃^カヲ用子^カハ
ラズ桂枝湯^カハ太陽中風^カノ藥^カソレニ麻黃^カ葛根^カヲ加ヘテ陽明經^カ症
ノ藥^カトスコレニテ陽明^カノ經症^カハスムコトカ^カハ陽明^カノ府症^カヲ云イカ
シムツカレ^カイ是レカラサキヲトツクリト吞込^カ子^カハ傷寒^カノ療治^カハナラヌ
是レ惡^カク吞込^カト手^カノウラカ^カハスヤウニナル傷寒^カノ中^カテ大事^カト云ハ陽明

ノ府症ナリ先輩ガダシク詮議スルモイカウムツカレキユヘナリ

其府證有太陽陽明正陽陽明少陽陽明之辨而所重在能食為胃
強不能食^カ為胃^カ衰^カ頭^カ能^カ食^カ者^カ皆^カ可^カ致^カ下^カ但有^カ緩^カ急^カ之^カ殊^カ潮^カ熱^カ自^カ汗
謔^カ語^カ發^カ渴^カ拘^カ去^カ衣^カ被^カ揚^カ手^カ擲^カ足^カ班^カ黃^カ狂^カ乱^カ不^カ惡^カ寒^カ反^カ怕^カ熱^カ大^カ便^カ實^カ
脉^カ見^カ沈^カ數^カ者^カ為^カ陽明^カ府^カ病^カ三^カ焦^カ俱^カ傷^カ者^カ則^カ痞^カ滿^カ燥^カ實^カ賢^カ全^カ真^カ者^カ大
養氣湯^カ前^カ段^カ迄^カハ陽明^カノ經^カ症^カ分^カハ云^カ足^カシ^カテ此^カ段^カハ陽明^カノ府^カ症^カヲ云
リ陽明^カノ經^カ症^カトハヤリ^カ發^カ散^カスル^カテ^カフ^カテ^カト^カト^カハ療^カ治^カ力^カ的^カ中^カセ^カイ^カテ
モ命^カニ^カタ^カル^カハナ^カヒ又^カア^カト^カカ^カラ^カシ^カナ^カヨ^カシ^カモ^カナ^カレ^カ此^カ府^カ症^カノ療^カ治^カハ下^カ利^カ
用^カテ下^カス^カカ^カ下^カサ^カカ^カト^カ云^カニ^カツ^カセ^カル^カ下^カヘ^カキ^カモ^カヲ^カ下^カサ^カ子^カハ病^カ力^カ不^カ愈^カイ^カハ

フニハ苦レカチ子任終ニハソレテ死ヌル又下スニジキ病ヲ下スト忽チ大ナ
フガ出来スルツレユヘ仲景モダシノ念ガ入テアルサレバ古代ノ文章ニ
サツクキユニクシ能クキトツケサヘスレバサリトテハ明白ナリテ書中ニ
大道ヲ通ルヤウニギレトヒ○太陽陽明正陽陽明少陽陽明トニ有
ル大陽陽明ト云ハ邪氣カ太陽經ニタリテフレカラ陽明經ヘ傳ル
フエニタズレテ太陽カラスグニ陽明ノ府ヘヲチテタルヲ太陽陽明ト云
太陽經カラ陽明ノ經ヘ傳レレカラ陽明ノ府ヘ傳ルユヘ正陽陽明
ト云ハモト少陽經ニアル邪ガ發汗過多ヒルナカ或小便通
ルフ過多ユヘ胃中ノ津液ガカキ陽明ノ府ヘ傳ルヲ少陽陽明ト云

其府症チリタ上テ大切ナ意得ガアル府症レヤカ下劑ヲ用テ下
ウカ下スニイカト云ツニツル其吟味トユテスルレハ能食胃強熱盛為胃強熱盛
ニテ食ガ充ヲ胃強ト云モノ不能食ハ在胃衰食ナラヌハ胃弱ト決
断ハコナリ此府症チリテ能クモノヲ食フハ大小兼氣ノ下劑ヲ用テ
攻下スベシ然レハ食ノチラヌモハ下サヌト云ハ明白知レタリ食ナルハ兎角
下セ凡緩急ノ異アリ急ニ下スナレハ大兼氣湯緩下スナレハ小兼氣
湯調胃兼氣湯或大柴胡ナドヲ用コレヨ明白ナリ今日テ見タ
キニ大便ニイカヌツレバカリテナレニ讒語スルマラ手足ヲ擲アキクマラ危
ヒ症ガアル今テ世間ニ傷寒ノ時疫ノト云ニ此ノヤウナ症カ四季

任ニ多ヒモノ此ノヤウナ烈シキ病人テ食ノナルト云ハナヒモノ傷寒
ニ食ノナルトナラヌガアル時疫ナレバコレホドツヨクナツテ食ハナラヌ
モノ今日本テ云傷寒ハ皆時疫ナリ傷寒デナヒ若シ真ノ傷
寒ハ食ガナレバ下ス食ガナラ子バ不下コレ明白ナコトナリ。潮熱自
汗云コレ陽明府病府病ハ潮熱自汗譫語發渴メツタニ水ヲミタ
カレ拘衣云云キモノツトツテステ發斑ナドカ出タリ黃疸ナドノヤウチ
リタリ狂乱シテ不惡寒タ熱ヲ恐ル陽明ノ府病ニ焦俱ニ上中
下三焦俱ニ傷レタモノハ痞滿燥實堅全具大兼氣ヲ説ハ陶節
菴ガ六書ニ三焦俱傷ルモノテモ痞滿燥實堅全具ル者ハ大

兼氣湯ヲ用ヨ中焦傷レシウケテ燥實堅ノニツアルモノハ調胃
兼氣湯ヲ用ヨ上焦傷ラケテ痞實ノニツハ小兼氣湯ヲ用ヨ此ノ三
色テ以テ三兼氣湯ノソカヒワケガイフテアルサテ此ハ痞滿燥實堅ノ
證ヲクハシクイハ玉昂カワツカサイイ方集解ニ辨シテアル痞ト云ハ胸モタヘ不食
スルヲ云滿胸腹膨脹ルヲ云燥大便カカキカレテ少ヒヲ云實腹カ
痛テ大便不通ヲ云堅コレヲ按ヒテ硬ヒヲ云コレガ玉昂カワツカサイイ方集解ヨ
リ外ニ出テナヒ。邪在中焦則有燥實堅三證者調胃兼氣湯
痞滿ニツナフテ大便カカト腹痛スルト腹ガカタヒコハ調胃兼氣
湯。上焦受傷則痞實小兼氣湯胸ガモタヘテ腹滿脹ルコレハ兼

氣湯○石頭先生曰仲景本意太熱太實用大承氣湯小熱小實用
小承氣湯實熱尚在胃中用調胃承氣湯以甘草緩其下行而去
胃熱謙曰此說仲景之本意也 醫通三承氣湯ノツカヒ分ト云モハ此様ナリホカ
ナフデナヒ大熱ノツヨヒ症ニハ大承氣湯熱強クナヒニハ小承氣湯
畢竟病同ジテ病ノ重ヒニハ大承氣湯ヲ用ヒ輕ヒニハ小承氣湯ヲ
用ヨト云フナリ調胃承氣湯ノ甘草ヲ用ルハ惣別甘草ト云モ熱
藥ニ入ルハ熱カ緩フナル下劑ノ内テユルクト中焦ニアル胃熱ヲア
セテ熱ヲツレダチテ下スナリ仲景ノ本意ハカウテ陶節菴ガ説ナ
ラ役ニ立ヌ丁王昂ガ醫方集解ニ骨ヲリニ云テアレ任役ニ立ヌコト

ナリ○紫短舌一舌色紫ナラバ急ニ下之極熱ノ症ナリ大承氣湯カ
ヨヒ○太陽中風可用桂枝湯又與麻黃湯汗出過多傷胃中津液熱
不解乘虛內陷為裏熱證熱勢蒸々沸騰調胃承氣湯主之コカラハ
誤治ナリ發端桂枝湯ノ症ニ反テ麻黃湯ヲ用テ汗カ出過キテ胃中
ノウルホヒガ傷レテクルヨリ熱ノ解セヌニテラスカイテキテ外邪ガ内陷
リ裏熱ノ症ナリ熱勢蒸々ムツレトクルヲ蒸々ト云沸騰トワキアカリ
テスレ調胃承氣湯主之レ調胃承氣湯ヲ用ル主意ハ胃熱ヲ去ルト云
ガ主意ナリ○頭汗多者裏實症也頭汗出脇下滿大便硬大柴胡湯主之頭
汗モ又陽明ノ府症ナリテ頭汗ノ多イモノガアル此モ裏實ノ症ナリ脇ノ

下が満チハツキテ少陽經ニカハル大柴胡湯ヲ用ヨ此目アテイトモ脇
下満ヲ目當トセヨ。傷寒六七日不大便頭痛有欬小便清者病不在裏
不可用羨氣湯不能食者是胃弱乃有按虛寒挾熱結之不同虛寒
則自利發黃嘔噦而脈遲當用理中四逆熱結則腹滿譫語不大便而
脈瀼當用蜜煎膽導コカラ又下劑ヲ可用カ用ヒヒカト云吟味亦
六七日不大便セイテ頭痛熱アルモノハコレニヤリ下劑ヲ用ル症ナレ小
便少色清者病不在裏ホトニ羨氣湯ノ類ヲ用ベカラスコレハ桂枝湯
下ニテモ云テアルコレハ小便カスカスニ又カト云ガ目當ナリ病ガ裏ニテ
カラハ發表ノ劑ヲ用ヨト云フナリ情又モコレ食ナルモノハ下劑ヲ用ヨ

コレ食ナラヌモノニツツ違アリコガ大事食ナラヌハ皆胃弱ニ此病
人ニ虛寒ノ症ト熱結ノ症異アリコレヲ見テカハルト又人ヲ殺スナリ虚
寒自利發黃嘔噦ニテ脈遲ナリ此ニハ理中湯四逆湯ヲ用ヨ熱結則
腹滿コレハ下劑ヲ用ルハツナレト食ナラヌハ下劑カ用イラヌツレモ
熱結ニハ腹滿譫語不大便而脈瀼コレハ蜜煎膽導猪膽導ヲ用ヨ
ツウチ蜜導ハヨワヒモノ角ヒ猪膽導ハツヨヒモノニ用ル不食ニモ熱結
不食アリ虚不食アレト此段ハ熱結ノヲ論シタト思フベリ理中四逆ヲ
用ヨト云クテモノハ出合ヲ云テモ畢竟此段ハ下レト藥ハ食ナレモノ角ヒ
不食モノハ不用熱結不食ニ蜜煎膽導ヲ用ヨト云カ主意ナリ

少陽者頭痛目眩耳聾口苦脉弦脇痛寒熱往來小柴胡湯
前ノ段ニテ、大陽陽明カスム是カラ少陽經ノ症ニナル事ル所ノ
大意、脉皆少陽ノ段ナリ頭痛ハ少陽ノ頭痛ナリ目眩ハ肝膽
ノ熱、目ガグルクスル耳聾ハ少陽經ハヒ、口苦ハ膽ノ熱ナリ
脉弦ハ少陽ノ脉ナリ脇痛物ニテ少陽經ハ左右ノ脇ヲ行ル頭
痛モ目ノ前後テスル左右ノ口キヲメグル經ナレバ脇痛胸滿ノ
ト云ハ皆少陽ノ症ナリ寒熱往來ハ半表半裏ノ熱ニハアツケ
サムケガアル。主方ハ小柴胡湯ナリ方意手引續編ニ詳ナリ
○本、太陽病不解轉而入少陽經、脇下鞅滿乾嘔不能食、往來

寒、熱、脉沈、緊者此湯主之、太陽カラ陽明ヘ傳ヘ陽明カラ少陽
ニ傳ヘ順ニ傳ル、了モアリ又太陽カラ直ニ少陽經ニ轉ジテ入ル
了モアリ此ハ太陽ノ病ガ不解シテ直ニ少陽ニ傳ルナリ脇下
鞅滿カラ往來寒熱ニテ右ニ云少陽ノ症ナリ脉沈緊ト云、邪ガ
フカシサレ、臣、茶、マ、ハリ、小、柴、胡、湯、ニ、ヨ、リ、テ、此、湯、主、之、○、太、陽、病、
脇滿脇痛者此湯的證也若脉浮者宜麻黃湯太陽ノ病ハ麻
黃桂枝ノ症ナレ、臣、胸滿脇痛カ少陽ノ的症ナレ、小、柴、胡、湯、ヲ、用
ルナリ、サ、レ、臣、脉、ガ、浮、ナ、レ、バ、太、陽、ノ、カ、タ、ガ、主、ナ、ル、ホ、ト、ニ、麻、黃、湯、ヲ、用
ルナリ。○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足温而渴者

此湯主之コレモヤハリ太陽ノ傷寒ナレ肝要ノ脇下端ト云ハ少陽ノ
目當ナリ手足温而渴スルハ熱ガ裏ニ入リトスル勢ヒナレ小柴胡湯
ノ症ナリ○傷寒愈後又發熱者此湯主之脈浮者汗以解之脈
沈實者下以解之コレハ傷寒本復ノ後又發熱スルハ病カヘナリ
是ニハ通用小柴胡湯主之サレ肝脈ガ浮ナレハ病カヘナレ邪ガ
表ナルホトニ汗ヲ發シテ是ヲ解スベシ脈浮實ナレハ病カヘシト
云凡熱ガ裏ニアルホトニ下劑ヲ用テ下スベシ○傷寒胃實症脇
下與手足心兩處無汗者未結定猶宜用此湯胃實ト云ハ陽
明ノ府症熱結ノ症ナレハ大小承氣ヲ用テ下スハツナレ肝熱ガ未

結ニ定ラ子バ下シタハワルシヤハリ小柴胡ヲ用テ和解スレハ府熱
解スルナリ其目當ハ手足ノ内兩處ニ汗ガナケレハ結定セスト
知ルベシツレナレバヤハリ此湯ヲ用ヘシ○結胸未為汗解者此湯加
枳實桔梗或更加桂枝結胸ニ大結胸小結胸ト云アリ胸ガカ
タクツルヤウニヒツハル大結胸ハイタミツメテ手モツケラレヌナリ
小結胸ハ手がサハレバ痛ムサハラ子バイタニス是ハ小結胸ノ症ニ
表邪ガアレバツ發汗シテ表ヲ解スルニ未發汗シテ解セザルモ
ノハ小柴胡ニ枳實桔梗ヲ加或更桂枝ヲ加フモアリ○舌上
黒燥烈神昏譫妄者此湯加知母石膏コレヨリ舌ニツイテノ

療治アナカチ傷寒ニカギラズ温熱病時疫ナドニ此症此舌アラ
ハ小柴胡ニ加知母石膏コレ柴白合方ノヤウナモノナリ。往來寒
熱呃者宜此湯若不應則加肉桂乾姜黃連コレハ少陽經ノ症ニ
呃逆アル者ノ療治ナリ呃逆モ寒熱アレハ是ハ熱ニ屬スル呃逆ナ
リコレテ小柴胡ヲ與ヘシコレモ不應モノハサテハ寒熱ニシハリ
タル邪ト意得テ肉桂乾姜ノ熱藥黃連ノ寒藥ヲ加テ寒
熱合劑ニシテ用ルナリ是呃逆ノ療治ナリ。少陽陽明合病
效而嘔腹滿者此湯加葛根少陽ノ表症ト陽明ノ表症ト合
セ病ニテ效ガアリ呃逆アリ腹カ滿ルナレハ此湯ニ陽明ノ本藥

葛根ヲ加ナリ是ハ效カ有ラフト有ニイト少陽陽明ノ合病ニ
ハ用ルハツノ藥ナリ。傷寒厥而心下悸者先與茯苓甘草湯治
厥次與此湯心下悸スルハ水氣ヲ去レハ厥ハ治スルホトニ先茯苓
甘草ヲ與テ水ヲ利シ次ニ此湯ヲ與テ邪ヲ解スルナリ。食復
脈弦大此湯加葛根黃連烏梅コレ一條食ニヨリテ又病ノ復スル
モノハ脈弦大ト云ガ目當ナリ是ニハ此小柴胡ニ加葛根黃連烏
梅。滿舌白滑尖反而鮮紅者少陽經證也此湯加減コレカラ
舌ニツイテ療治ナリ滿舌トハ舌中残ラズ白滑トハ白イナリニ
ルヲフテ舌ノサキガ反テ鮮紅トホシリトアカキモノハ少陽經ノ

舌ナルニハ此湯ニ加減ニ用ル。舌白胎中紅者少陽經證也此湯加減コレモ前ノ舌ト同ジテ其内前ノ舌ハ舌サキガ紅ナリ此舌ハ舌ノ中カ紅ナリ是モヤハリ少陽經ノ症ニハ療治ハ同シ。舌尖白其症寒熱耳聾口苦脇痛者宜此湯。舌ハ又外ニカ一イナレニ舌サキガ白イハカリテサテ病マウハヤハリ寒熱往來耳聾口苦脇痛是少陽經ノ本症ニメ藥ハ同ジ此白イ舌カ四色云テアルカ四色ノ内デ其症寒熱耳聾ト云テアルハ是一ツ前ノ二ツモ後一ツモ皆如此症ヲ云テハナケレ定テ舌ハカリテハ有ルニイ寒熱耳聾ノ少陽經ノ症モ有テ舌色カ右ノ如ク舌ト

見ユル。舌根白尖黃者宜此湯。舌ノ根カ白テ舌サキガ黃色ナモノハ此湯ニ宜シ是モ定テ舌ハカリテハ有二イ少陽經ノ症カ云テ有レシ。藍紋舌者即胃生氣衰也宜此湯去黃芩加乾姜或附子理中湯。コノ舌ハ症ニカ一ハズ胃ヲキヨ虛ノ舌ナリ藍紋舌ハ舌カアサ藍ノ色ニアラミカ、リテ紋ト云ハ舌ニ筋ノヤウナモノガ有ル如此舌ハ胃土ノ氣衰イロ胃虛舌虛寒ノ舌ナリ前ニ云々四色ノ舌ハ皆熱症此舌ハカリハ虛寒ノ舌故ニ此湯ニ去黃芩加乾姜或附子理中湯大建中湯皆温補ノ藥ナリ此レハトレナリトモ見ハカラヒニ用ナリ。外感咽喉乾燥者宜此湯或小建中湯。

か子是ガロカカハイテ湯水ヲ好フデハナヒ咽ノ内ガカハキカラ
くヒツツクフデフレカ外邪ソウイシヤデツウ有ルニオイテハ此湯ニ宜シ
或小建中湯ニ宜シ是カ邪ニヨリテ咽ノ内ガ乾燥スレバ此療治
テヨイ外邪デナクテ咽ノ内ガカハケハ外ノ療治ガヨヒ少陽經
症ナレバ此湯ナリ大陰經ノ症ニモ咽カククスルンナレバ小建中
湯ガヨヒ其フハサキニ云ナリ○陽明病脈浮發熱者表未盡
宜此湯今ニテ本ノ少陽經ノフ此カヲハ陽明ノ症ノセシサクナリ
陽明ノ病カ脈浮デ發熱スレバヤハリ陽明ノ經症テ表邪ガ未
タ尽ヌニヨリテヤハリ此湯ヲ與ルガヨイ陽明ノ症ナレバ此湯ヲ與

ルニデ、ナニニ陽明ノ表症ノ藥桂枝湯ニ加葛根ト云マウナヲ
用ヘキニ此湯ハ少陽經ニ用ル小柴胡湯ヲ用ルハナセナレハ陽
明ノ症ナレバ邪ガ深クニテスニ少陽ノ症トナラントスル所ニハ此
湯力相應スル○陽明中風證脈弦浮大短氣腹滿及心痛鼻
乾不得眠嗜臥及面目盡黃色小便難潮熱時々乾嘔耳前後
腫病雖及十餘日脈續浮者宜此湯コノ症ハ全躰ハ陽明中風
デアレバモハヤ半分ハ少陽經傳テアルヨリ脈弦浮大ハ少陽
經ノ脈短氣腹滿モ少陽ノ症ナリ心痛モ同ニ心痛スレバ重ヒツラカ
ト思ヘバ又ヤハリ陽明經ノ症ニハ鼻ノ内ガ乾キ眠ルノモナラヌカ

ト思ハバ子ムルコハナライテヒタモノヨコニ臥タガル及面目コレモ陽明
經ノ症小便難シ是モ陽明少陽經モ小便カタキモノ潮熱ハ此六
陽明ヘモカリタニヨリテ潮熱ハ陽明ノ府症時々乾嘔ハ少陽
經ノ症耳ノ前後モ少陽ノ症ナリ病カ十餘日ニ及ヒ脈ガ浮ク
ハ何ニモセヨ表症ナリ陽明經少陽經ト合病ト云モノサルヨリテ
マハリ此湯ニ宜ナリ。陽明證脇下鞭滿不大便而嘔舌上有白
胎者宜與此湯得上焦津液下通胃和身濺然汗出病解
レ陽明ノ病ヲアラハシナカラ脇下鞭滿トハヤハリ少陽經ノ症大
便セズメ嘔アルモ少陽經ノ症ナリ舌上有白胎モ少陽經ノ症ナリ

惣体ハ陽明ノ症ナレト又其内ニ少陽經ノ症カ交リテアルレバ大
便セズトイヘ下劑ヲ用ラレヌヤハリ此湯ヲ與カヨイ此湯ヲ與
テメグラスル此ハ上焦ノ津液ガ下ヘモ通ズルユヘ身ノウルヲイ和シテ
身濺然ト汗ガ出テ病解シ大便モ自ラ通ズルナリ。陽明病發
潮熱大便澹小便如常胸脇滿者此湯主之。陽明ノ症ニ
潮熱ヲ發スルハ是モギレモノヒ陽明ノ府病ナレト大便ハ秘結
セズ反テ泄瀉スル小便如常ナレバ色不赤バシイテ裏熱ハナイホ
トニヤハリ此湯ヲ與テオクハ是カ相應ノ療治ナリ。雜病盜汗
者責在陰虛有半表半裏者宜此湯若脈浮緊潮熱盜汗

者宜^ニ柴胡桂枝湯コレカラハ盜汗^ヲノセシサク惣^{シテ}雜病^ニ盜汗ノ
出ルハ責^ニ在陰虛トウテモ陰虛火動ニ有タガル然ルニ傷寒ヲ
病テ盜汗アルハ全ク陰虛ニアラズ故ニ此湯ヲ與ルニ宜シ若
脈浮緊コレモヤリ傷寒ノ盜汗ナリ傷寒ノ盜汗ニハ小柴胡湯
ヲ用レ任其内ニ脈ガ浮緊ナレバ太陽ノ表邪故ヤリ桂枝湯
カヨイ小柴胡湯ニ桂枝湯ヲ合シ柴胡桂枝湯ト云コトヤリ太
陽ノ表邪ヲ兼ルニヨリ桂枝湯ニ宜シ。若太陽陽明合病裏
實者必盜汗出也コレモ盜汗ノセシサクテ太陽ノ表症ト陽明ノ
府症ト合シ病ニテ裏實ノ症ハ必盜汗出ルコトハ大實症ノ盜

汗ナリ雜病ノ盜汗ハ陰虛傷寒太陽陽明ノ盜汗ハ裏實ト合
点スヘシノ婦人外感經水適來其儘断七八日而胸脇滿鞅痛
如結胸狀譏語者瘀血結於裏也此熱入血室之實症也此湯
去入參加桃仁牡丹皮當歸尾穿山甲コレカラ打續テ熱入血室
ヲ云是ハ自然今テモアルコトサイクハナイ經水ノ時分ニ外邪ヲマケ
テ其外邪ノ熱ガ婦人ノ血室ニ入ルヲ云其時ニサセクノ症ガアル
ンニ虛實ガアリ其コトヲ段々精ク云タモノ婦人カ外感傷寒
病ニタ時分ニオリフニ來ル常ナレハ七日カ相應ノ日數テアルニ
傷寒ノ熱ニサヘラレテ經水ガ來テ少間ニタヘルコト故下ルベキ

經水が間モナク多ヘルニ内ニ滯リテ瘀血ニルレユニ胸脇滿
鞭痛結胸ノ状ノ如クハ胸ノ痞カ結胸ノヤウニハリヒツハリテ痛ム其
上ニ讖語トキビシクハコトヲ云ナゼ如此ナレハ瘀血が裏ニ結スル
ニナリ執入血室ノ内テモ實症ナリシユニ人參ヲ去テ加桃仁
牡丹皮當歸尾穿山甲ニテ瘀血ヲ去破血ノ劑ヲ加フ是ハソコ
藥ナリ○前證時々經來不下蓋而斷血結如瘧狀也此之前証
則不為實血下多而瘀血少也此湯如當歸牡丹生地涼之コレ
父前ノ症ヨリ輕シナレハ始ノ症ハ經水ガカルト直ニトテリテ瘀血
ニナル此症ハ直ニトテリハセ又時々經水ガ下ル症ナレハ常ノヤウニ

ナヒユヘコトクク下リツキヌヨイホトニ經水ガタヘル是モ下リツキ
ヌユヘニ結シテ瘀血ニナル其病ニヤウハ瘧ノヤウニヤム然レハ瘧症ト
サダメラレヌ前症ニクラブレハシホトニ瘀血ガ甚シフナヒヨリ實ト
セズ血下ルフガ多シテ瘀血ガ少ト前症ノヤウニアリ實症テナヒ
ニヨリヤハリ人參ヲ去加ナリ此藥ハ前ノ當歸尾穿山甲ヲ
加ル症ニクラブレハ藥ガ輕イ牡丹皮生地黃ト云ハ血熱ヲ涼スルニ
テフノ血熱ヲ涼スレハ自ラ愈ル是カラアトモ婦人ノ經水ノ症ガ三
條男子ノ熱入血室ノ症モダシク云テアリサテ此少陽經ノ症ハス
イブシヨク精シクスニシテオカ子バナラヌ今感冒テモチトムツカシ

クテトイツテモ小柴胡湯ノ症ガ多シ。婦人經水來期患傷寒
晝如常夜譫語如見鬼狀者與此湯經水下盡則病自愈矣
前二條ハ一條ハ經水來ルトキニ一度ニ傷寒ヲ病合テ傷寒ノ病
ニニ經水ガ直ニトルノ故ニ瘀血ニテ熱入血室ノ實証ニ尤
其次ノ條ハ是モ同シ經水ノ時分ニ傷寒ヲ病ニ合スルハ合ス
レバ經水ガ直ニトリハセ又常ノヤウニハナケレバ時々血モ下ルニ
瘀血ガスシテヒシテ病ガ輕シ此條ハ經水ノ來ル時分ニ傷寒ヲ
病ニ合スレバ其為ニ經水ガ少シモトニラヌシユハ熱ノ為ニ經水ガ
損ジハセ又サレバ婦人ノ經水ト云ハ常トチガフテ大事ノモノユヘ其

時分傷寒ヲ病ニ合スル故ニ血分ニ邪熱ガ有テ晝ハ何ノフモナ
ケレバ夜ハ譫語トキビシクモノイフテ何ゾアヤシイモノデモ目ニ見
ルヤナリ是傷寒ノ邪熱ガ血分ニ入ルニナリシ故ニ此湯ヲ與ヘ
テ經水ガモハマニイニナレバ病ハ自ラ愈ルナリ血分ノ病ナレドモ
此湯デ其邪熱ガ去レバ病ユヘニ血ガクルフニヨツテ譫語シタリ
鬼狀ヲ見レバ經水ガレニイニナレバ病ト相手ニナルモノガナイ故ニ
病自ラ愈ルナリ。血弱氣盡外邪相搏結于腸下默々不欲食
邪高痛下嘔者本方主之始ノ條ハ血室ニ入ルタレバ結シハセ又
血室ニ入ル故ニ譫語シ鬼狀ヲ見ルハ見レバ結シヌニヨリ經水トミ

コヲリナクシニハ病モイニ此段ハ根カラ血室ニ邪ガ入ラヌツレテ
セナレハ血モヨハク氣モツキテ邪ノ下ト相手ニナル勢ガナヒ然レ
氏外邪ト相搏ニヨリテ血室ニ入子氏脇ノ下テ結スルツレユヘ
ニ黙々トシテ食ヲ欲セス血室ニ入ラヌ故邪ノ有所ハ高ト脇
下故痛所ハヒキレサレ氏下部ガ痛ムテハナイ邪ヨリハ痛所ガヒ
クシツレテ邪ノ結シ所ガ脇下ノ上ナレハ嘔逆スルナリ是ニ本方
主之。婦人經行之期外感宜與此湯和解之加當歸川芎
牡丹皮不然則熱入血室也又此條ハ熱ガ血室ニ入ラス脇下テ
モ結レハセヌ經水ノ時分外邪ニ傷ルナラバ外ノ療治

モ有ベケレ氏經水ノ時分ノ傷寒ニハ平生トハ療治ガチガフ此
トキニハ平生ノ傷寒ノ療治ヲサレヲイテ此小柴胡湯ヲ與ヘテ
和解シタガヨイ此湯ヲ用テ此加味テ療治ヲセヌト熱ガ血室ニ
テサキニ云通りノ病ニナルホトニ婦人ノ經行ノ時分ノ傷寒ナラバ
如此療治ヲセヨサマヲナヒト熱血室ニ入ト云フ。右件四症婦
人熱入血室之證也四症ト云ハ是テ五條アレ氏後ノ一條ハカツテ
熱入血室ノ症ニアツカラヌ故ニ本方五條アレ氏終一條ハ熱入血
室トハ云レズ。陽明症病下血讞語此男子熱入血室也多頭
汗者此湯合犀角地黃湯若熱甚神昏者生地黃連湯加酒大

黄是カラハ男子ノ上ニモ熱入血室ト云フガ有ル此ヲ人カ知ラヌナ
リ陽明ノ症トハ陽明ノ熱症ナリ陽明ノ經症ヲ病ミテ下血シテ
讖語スルハ男子ノ熱入血室ト云此陽明ノ症ト云ハ陽明經ノ自痛
鼻乾不眠ノ其外陽明ノ經症或潮熱ノ汗穢然ト出ルナド云
ハ府症カ、レ凡經症府症ニモセヨ經症ニモ下血シテ讖語スル
男子ノ熱入血室ナリ多頭汗者此症ニハ必頭汗多キモノ此湯
ニ合犀角地黄湯ヲ合方ニシタバカリテハ藥ガトバカ又ユヘニ生地黃黃
犀角地黄湯ヲ合方ニシタバカリテハ藥ガトバカ又ユヘニ生地黃黃
連湯ニ酒大黃ヲ加ナリ此ニテ、男子婦人熱入血室ノ症ヲ云ナリ

○右件男子婦人熱入血室之證其脉血滯不行脉乍瀦乍數或
沉或伏故血熱交則脉洪盛也血虛則芤也若虛中兼瘀血
則芤脉中帶弦此一定法也コレカラ熱入血室ノ脉ノ躰ヲ云フ熱
入血室スレバ血ガトコホリテメクラヌ故ニ脉ニムラ有リ皆是脉ニム
ラアルユヘニ血熱交則脉洪盛ナリ血分ト邪熱ト交ハ脉ガ大ニ
カニナル若其内ニ血虛スレバ脉ガ芤トヒトモジヲオスヤウナ若虛
中兼瘀血一血虛脉大ハ芤ナカ若又血虛ナリニ瘀血カアルナレ
ハ芤ノ中ニ弦ヲ帶フ此一定ノ法トハイツテモ子カハ又法ナリ法ハ
脉法ヲサス○産後傷寒遠不可用此湯方中有黃芩也産後

傷寒時疫宜柴胡四物湯加減產後傷寒アテ小柴胡湯ヲ用ルナ
セナレバ産後ト云モノハ物ツク体氣血ヲ任衰ルホトニ黄芩ノ苦寒ノ品
ハチト用ヒガタシ然レ症ニヨリ一概ニ用ルナト云フテハナヒヨク思案
シテ用ヨト云フレ産後ノ傷寒時疫ニトカク血ヲ補フ故柴
胡四物湯ニ加減シテ用タガヨイ。積聚動氣兼傷寒者不出
和方此湯モトコレハ經水時分デモナク産後産前デモナイガフダシ
持病ニ積有モノヤ動氣ノ有モノカ傷寒ヲ病ムナレハ常ノ傷寒
ノヤウニ持病ノ手當ナレニナラヌ和解スルガヨイ其方ハ此小柴
胡湯ノ加減ニ出ヌト外ノ方ハ用ルナ此湯ニ加減シテ用ヨ其加減

ハ醫者ノ見計ニヨリテ用ベシ。食復者此湯加大黃食滯テ病ガ再
發スルナラバ此湯加大黃下シタガヨイ是ハツヨイヤウチ療治ナレバ
常ニ感冒ガ食滯テ再發シタト云テハナイ傷寒ト云モノハツヨイ病
ニニ常ノトキ滯テ再發スルヨリハツヨイモノクシユハ加大黃下サ子バ
ナラヌ

○傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默々不欲飲食心煩喜
嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小
便不利或不渴身有微熱或欬者此湯主之凡中風有柴胡證但
見一證便是不必悉具

前二書之所ハ少陽經ノ大概ヲ云此條ニハ委多述之中風往來寒
熱少陽本症ナリ胸脇苦滿スル本症胸中煩而不嘔モ本症腹
中痛モ本症脇下痞鞭モ本症心下悸モ本症小便不利モ本症或
不渴モ本症心下有水氣有レバカキカナヒ有微熱モ本症或欬モ
本症此等ノ所皆本症ヲ詳ニ云ナリ皆小柴胡湯ノ至ル所ナリ此
種々ノ本症ガ不殘有ルデハナヒ此内ニ三色モ三色モ有ナレハ即チ
是少陽ノ症ト云モノナリ此分コトク具テアラハルデハナヒ。若
胸中煩而不嘔去半夏人参加枳實一枚コレヨリ加減ヲ云胸
中ハ陽分ナリ煩スルハ陽邪ナリ不嘔トハ嘔逆スルコト有リセヌモ有

嘔逆セヌナレバ半夏ヲ用テ氣ヲ下スフモイラヌ人参加陽ヲタスク
ルモノユヘ陽邪ナレバ人参加用ルニ及バズコレ半夏人参加去レ枳實
仁ハ痰飲ヲアヲロスギ煩熱ヲ除モノ故コレヲ加ルナリ。若渴者去
半夏加人参加前成四兩半枳實根四兩コレ渴スルハ津液ガカハク
ホトニ半夏カハクモヲ去リ人参加津液ヲニスモノナレバ前ニ加倍
テ四兩半トスル枳實根ハ熱ヲ清ニ潤ヲ生スルユニ此ヲ加ルナリ
○若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩コレ去黃芩ハ腹痛ニハヨロシ
カラサル藥ナリ加芍藥ハ熱邪カ陰ヲ攻テ腹痛スルニハ芍藥
ガ主藥ナリ。若脇下痞鞭去大棗加牡蛎四兩コレ大棗ハ味甘

ク壅ルモノユ^ハ是ヲ去ル牡蠣ハカタキヲヤハラカニスルモノユ^ハコレヲ加フ
ナゼナレハ脇下ニ痰飲カ結聚ニテカタクナルグ。若心下悸小便
不利者去黄芩加茯苓四両コレ心下ニ痰飲ノ水氣カ有テ心下カ
タククスル小便不利ハコレモメグラスカラナレハ黄芩ノ苦寒ヲ去ル
茯苓ハ水ヲ利スルモノ故コレヲ加ルナリ。若不渴外有微熱者去
人参加桂二両温覆取微汗愈コレ不渴ハ内熱カナレ外ニ微熱ハ熱
邪カ^ハ外ニアリテ裏^ハ入ラヌ故ナリ邪カ表ニアルニ桂枝ヲ加ヘテ
邪ヲ去リ温^ハ覆^ハテ汗ヲナス表邪カアル故ニ人参ヲ去リ時ニヨリ
表邪ニ人参ヲ去ヌ^フモ有レ^ル氏^ノコレハ去タカヨイ。若効者去入

參大棗生姜加五味子半升乾姜二両コレ人参ヲ去ハ肺ニ邪有^ル大
棗モ氣ヲニスナレバコレヲ去ル生姜モ氣ヲ外セルモノナレハコレヲ去
乾姜ハ辛散ノモノナレバ五味子ノ酸收ノモノトモメアイデ肺邪カ
去テ効カ治スルホドニ乾姜五味子ヲ加ルナリ

○太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與
小柴胡湯嘔不止心下急鬱々微煩者為未解大柴胡湯

太陽ノ病トハ太陽ノ傷寒ナリ凡過經トハ傷寒ト云モノハ十二日
メニ經ヲメグリ盡シテ愈ル其内ヲ醫者カ待カ子テ下劑ヲ用
テ後四五日ニ至テハ下劑ノ療治ス^ハニ變症ガ出ルサレ^ル氏^ノヨリ

テ変症モ不出ヤハリ小柴胡湯ノ症テズグリテラルフガアルシ
ナレバ小柴胡湯ヲ與タカヨイ嘔逆ガ不止心下カ急ニヒツル氣
味カアツテツコガ鬱々ト微煩スルモノハ病ガ解セズ裏ニ有テ半表
半裏ノ症ト云ハレ小柴胡湯ハ藥カトカヌソコテ大黃ヲ用ヒ大
柴胡湯ヲ用テ下シタカヨイサテ此方後ノ細註ニ陶節庵ガ六
書ノ語ヲ奉タルハナセナレバ傷寒論ノ本文ニ太陽病ノ過經不
解ヲ奉タモノナレバ大柴胡湯ヲ用ル真正面ノ症トモ云レヌ又其
次ニ傷寒後脈沉々ト有ルハ傷寒後ノ症故ニ是モ大柴胡湯
ノ真正面ノ症トハ云レヌ又大柴胡湯ノ正面ノ症ハ陶節庵ガ説カ

ヨソキコユルニヨリ奉タリ傷寒論ノ本文ニ真正面ノ症カ有ベケレ
氏全書テナイ故ニ紛失シテ載ラヌト見ユルツシ故陶節庵カ説
ヲ載スル陶節庵曰表邪尚未除而裏又急不得不下又曰外證罷謂無頭
痛惡寒也脈見沉實不浮識語惡熱口燥咽乾輕則此湯重則三承氣撰
用此陶氏ガ説ハ下劑ヲ用エケレ氏半表半裏ノ證ナルニ表邪
ガ未除ニ下劑バカリモ用カタシサレ氏裏證ガ急ナルニ下サ
子バナラヌソコテ此大柴胡湯ヲ用ルナリ又曰外證罷能ト表證
未除ト云ハ頭痛惡寒ナリソレガ罷ハ除クトイフモノサテ裏證
又急トハ脈沉實一脈證ヲ云ナリ。傷寒後脈沉々者内實也

下解之宜此湯コノ一條ハ傷寒後ノコトナリ

○太陰者有中風無傷寒腹滿噤乾下利而脉沉細小建中湯
太陰ノ證ハ三陽經終リテ三陰經ノ證ニナル三陰經ノ初ヲ太陰經ト
云然ルニ此經ノ邪ハ中風アリ傷寒ハナイツレナゼナレバジタイ此經
ハ三陽經ノ裏ニアル所ノ經故ムサト風寒ニアタリハセヌ然レバ中風
者ハ名テハ食後ニ腹^{ヤウ}理^リカ開^カケテ風ニアタルコト有レバ太陰ノ傷
寒ト云モノハナイナゼナレバ三陽經ノ内ニ有リテ少陰厥陰ノ外ナ
レバ三陽三陰ノ間ニ有所ノ經ナレバ寒ニ傷ラルト云フハナイ腹滿
噤乾ハ太陰經ノ本症ノ腹滿ルモ噤乾モ風邪ナリ下利スルモ風邪

テ下利スル脉ノ沉細ナハ裏症故ニ脉ガ沉細ナリ是桂枝湯ヲ風邪
ヲ發スレバヨイハツナレバ既ニ風邪ガ表ニクテ裏ヘ入タ風邪故ニ内
ニ風熱ガアル故ニ芍藥ヲ倍シテ内ノ熱ヲ解スルヤツニスル故ニ桂枝
湯ニ芍藥ヲ倍スレバ小建中湯ナリ然ルニ是ハ同ジナガラ桂枝加芍
藥湯トナツケテヨハツナレバトチモ同藥テ桂枝湯ニ芍藥ヲ倍
スレバ桂枝加芍藥湯ニナル又小建中湯ニ芍藥九^ナ違イ小建中湯ニ
ハ膠飴ガ入ル桂枝加芍藥湯ニハツレヲ用スト云ハカリノ違イナリ是
ハ小建中湯ニツケテ有フモ有桂枝加芍藥湯ヲツケテ有フモア
レバトチヘツケテモクニウモナイ

○若因誤下陽邪内陷而腹痛者桂枝加大黃湯

ヤハリ今ノ小建中湯加芍藥湯ノ症ヲ医ガ誤テ下劑ヲ用ルニ
ヨリテ陽邪ガ内へ陷テ腹痛スルナレバ陷タ陽邪ヲ外へ温散スル
コナラヌ故ニ桂枝湯ニ加大黃邪ヲ下サ子バナラヌ然ルニ此證ニハ
下スハツハナケレバ誤下スユヘナリ此症ナドニハ誤下スハツナケレドモ
當時仲景ノ時分ニハ下ス療治ガハマリタツ今時テハ下ス療治ハ
ムサトセヌ故ニ少々下スヘキ療治ヲ下サイテ誤ルコトハアレバ下スニ
シキ病ヲ下スコトハナイ是ハ時ノ療治ノ風ト云モノ
今按ニ近年下スニ
キ症ヲ下劑ニテ藥
スノ流行ナリ是レ
仲景古ニ復ヘル乎

○直中太陰必因内傷冷物所致胸膈滿手足冷臍上痛下利清
穀而不渴理中湯

サテ前ノ症ハ食後ニ膝理ガヒラクニヨリテ風ニラタルサレバ是ハ外邪
テハナイトカク今少々ナクテ太陰經ニテハ傷ルモノデハナイカ
内カラ藏ガ冷テ病ム藏寒ノ症ハ外邪デハナイ内カラ冷マテキ
テ胸膈ガ滿手足モ冷臍ノ上ガ痛テ清穀ヲ下利スルト云ハ
食物ガ色子ガハズニ下ルコト内虚寒ノ症故ニ咽ノカハクコトモナ
イコト故理中湯テ温補スルナリ。太陽病ニ言不得臥心下
結脉微弱寒飲在胸中此湯主之コレハ又太陰ノ症デハナケ

レ任理中ヲ用ル例ヲ挙タモノ太陽ノ症ガ二三日經テ不得臥
子ラレヌ心下結スルハ何ヤラ物カ結レアツリタマウナリ脉
微弱寒飲在胸中ハ水氣カ胸中ニ有リ痰ノフオ任今ウス
イ痰ノ寒ニ屬シタ痰カ胸中ニ有テ子ラレヌ理中湯ヲ用テ
寒飲ヲ治スレバ自ヨイ。少陰不渴而吐或乾嘔去白朮加
姜コハ又少陰ノ症ニ理中湯ヲ用ル例ヲ挙タモノ少陰ニ傳經
少陰ト直中ノ少陰トガアル是ハ直中ノ少陰寒症ナリ去白朮加
生姜乾嘔アルユヘナリ。汗下後小便難者加厚朴茯苓不應
則加附子子又一條ハ太陰經ニカキラ又或汗下ニタリ後小

便カ難キモノハ理中湯ニ加厚朴茯苓ハ水道ヲ通スルモノ
故スデニ小便カタキトアレバ尤ナク厚朴ハ加ルト云ハ汗下
後小便カタケレハ腹カ滿テルモノシ故ニ加厚朴ハ腹ノ脹ヲ
治スルモノナリ不應加附子モシレガキカ子ハ加附子テイヨク温
補ノカヲシテ温行ラス合点ナリ。誤下始覺結胸之證無與
此湯ニ太陽ノ症ハ發表スルハツノモノ是モ今ノ其時分ノ療法
アマコリ下セバ結胸トナル始テ結胸ノ症ニナルトオホハ此湯
ヲ與テ温散スレバ結胸トナラヌ。大病愈後喜唾久不了
胃上有寒此湯主之コレ大病イハバツ傷寒其外何ニモ快

氣^キシテ後タビク喜^シテツギスル久^ク了^ラトハ病後ガサツリト也
是ハ胃府ニ寒邪ガコリテアル故此理中湯ヲ與^アテ温散スルガ
ヨイ。或愈^ラ後無^ク他證^シ微^ヒ熱^キ未^ダ盡^ズ此湯加蜜^一匙^コト大病愈^レ後
別^ニ他症^ハナシ病後ノコトニ微^ヒ熱^カ未^ダ盡^ズレバ此湯ヲ
與^テ蜜^一匕^ヲ加^テ藥^勢ヲ穩^ク和^シテ用^ルガ病後ノ一ツノ療
治^ナリ

○少陰者脉微細但欲寐也若始得之反發熱脉沉者乃兼太陽
之表邪^ニ

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

是カラガ少陰ノ本症テ脉ハモハヤ少陰ノ裏症ナリ故ニ脉微細^キ
コトヲ但欲寐ハ初病マニシキ脉微細テ但寐^タガ^ル發熱スル
發熱ハ表症表症ナレバ脉浮ナルハツガヤリ沉^ナハ少陰經ノ症
テ有^リチカラ太陽經ノ表症ヲ兼^テ病^ニハ麻黃附子細辛湯ヲ
用^フニ麻黃ハ太陽ノ藥附子ハ少陰腎ノ藥細辛ハ少陰ノ藥コレ
少陰經テ有^ナカラ太陽經ヲ兼^テ病^ニハ麻黃附子細辛湯
主^シ之^レ其^レ症輕^キ者ニハ去^キ細辛加^シ甘草名麻黃附子甘草湯
○然^レ有^ク傳經直中之別先見表證至五六日後變出脉細沉數口中
燥^シ不得臥^ス六七自腹脹不大便者傳經熱證急下之宜^ナ大承氣湯^或

自利清水色純清心下必痛口乾燥者亦急下之大承氣湯

サテ少陰經ノ症ニ傳經ノ症直中ノ症ト別カアル傳經ト太陽經
カラ傳經スル段々經へ傳ル邪故傳經ノ熱症トスル直中ハ少陰腎
へ直チニ寒邪ガアタル故虚寒ノ症ニ属スルソレユへ少陰ハ傳經直
中ノ別ガ有ルソツ此ニ傳經ノ熱症云テ有ル其次第ハソツ始傳
テ此少陰經へニテモ傳へ來テ病ノ変カ出來ルソコヘナリテハ脉
沉細數ト少陰ノ脉ハ熱症ユへ脉力數ナリ熱症ユへ咽モカハ五
六日ブリハ腹ハリテ大便セズ傳經ノ熱症内實ノ症ユへ此者
ニハ傳經ノ熱症ト云テ急ニ下スガヨイ或又右ニ云ハ大便ガ閉テ

通ゼナンダガ或清水ヲ利ト或又青イ水ヲ下ス純青水トイフ
是ハ大便ハ内ニ結シテ大便ノ外ニ水ヲ下シタリ又色ノ青色ノ
水ヲ下シタリスルハ熱症ガ反テツヨイ強イユへニ心下必痛ム必
水オチノ所ガ痛シテ口モカクモノ是モ又急ニ下スガヨイ大承
氣湯

○若夫四逆而或欬或悸或小便不利或泄利下重者四逆散
是ハ又傳經ノ熱症ガ段々表カラ内へ傳テ内へ入ルニシタカフテ
中焦ノ陽氣ガ熱ノ為ニトチラレテ反テ陽氣ガ手足へメグラヌ
ソレ故手足ガ厥逆スル是ハ寒厥スルデハナヒ熱テ反テ手足

カヒ元故是ハ熱厥ノ症ナリソウシテカラ或欬シ或悸シ或小便
不利或泄瀉シタリ下重ハ後重ナリ是熱厥ノ症故ニ下劑ヲ用
テ下スハツナレバ熱厥ニモセヨ手足カヒユルハ陰進ノ症ユヘニ黃
芒硝ナド、云テ下シ藥ハ用ラレヌヨリテ四逆散ヲ用テ枳實柴
胡芍藥テ和解スル療治スレバ熱厥ノ症ナレバ手足カヒユルニヨ
リテ下劑ヲ用スニ此四逆散ヲ用テ和解スル療治ヲスル四逆
散ノ方考ハ續編ニ詳ナリ此ニテ、少陰經表症ヲ兼テ症ト傳
經ノ症トニツテ挙タ是カラ少陰經直中寒症ノ症ヲ云
○始病脈微細口中和但欲臥者為直中之寒證四逆湯

己カラハ直中ノ少陰ノ症ヲ説ク傳經ト云ハ太陽カラ段々裏ヘ傳
テ行クヲ傳經ト云直中ト云ハ直ニ少陰腎經ニアタル是ハ元來内
ニ虚寒アル症ニ寒邪カ段々ニ經ヲ傳ルヲ不俟少陰ノ經ニ直ニモ
テテヨリテ直中ノ寒症ト云其病マウハ脈カ微細ナリ脈ノ
微細ナハ不及論虚寒ノ脈ナリ口中和ト云ハ熱症ハ口ノ味カチ
カフナリ虚寒ノ症ユヘ食ハ不食スレバ食ノ味ハチカハヌヲ口中和ト
云但欲臥ト云ハ此直中ノ寒症ハ有無ニ子タカル是ハ即直中
少陰ノ本症ナリ傳經ノ症テハ熱症ユヘ口中カ乾イテ不得臥
トアル同ニ少陰ニモ直中ノ少陰ハ口中カ和シテ有無ニ寐タカル

是カ直中少陰ノ本症ナリ藥ハ四逆湯大温補ノ藥ナリ四逆湯ノ方考ハ手引續編ニ詳ナリ

○或脉微或下利或脉絶而復還元氣虚弱甚四逆加人參湯

サテ少陰ノ症ナレバ脉カイヨク微有カ無ト云ヤウテ或泄瀉

リ或微ニテリ脉ガタヘテ脉カナイゾト云ハ又ヤウニモアリ有

カ無ト云カタノ如ク微ナリ同直中ニハ前ノ四逆湯ニ人參ヲ加ヘテ

四逆加人參湯ヲ用ルナリ

○群陰拒陽脉微欲絶其人面赤或腹痛乾嘔咽痛或利脉不出危

殆種々倍乾姜回陽通脉通脉四逆湯

是モヤハリ四逆湯ノ症ナレバ前カタニクラフバ陰カ盛ナリ陽ヲヨセ

ツケヌ脉ハイヨク有ルカ無カテ絶ト欲スル其人面赤是カホシ

テナレ色ハ青イハツナレバ反ツテツシマリト其赤ハナセナレハ内伏

スル所ノ群陰ガツヨイニ陽氣ヲフセイテ内ヘウケツケヌレニ陽

氣カ反ツテ外ヘアラハレテ赤イ其面赤陽氣ヲ外ヘアラハレ赤レ是

虚寒ノ至極ナリ戴陽ト云陽ヲフセイテ外ヘ見レテクニヨリテ

面ノ赤ハ青キヨリハオトリナリ是陽氣ノ絶ニトスルナリ或腹痛

シタリ乾嘔シタリ咽ガ痛ム大抵咽痛ハ熱症テ痛ムモノナレドモ

咽ニアル所ノ陽氣ヲ内ヘヨセツケヌレニ咽ガ痛ム或利レバ脉カ

トカク出ズ危殆アマツクアブナイ所ノ證候ガ種々見ルハ故四逆湯ノ全方加乾姜テ回陽加大温テ裏ヲ温メテ脉ヲ通スルヤウニスルトテ一味ノ乾姜ヲ増シツカフニヨリテ通脉四逆湯任云畢竟ハ四逆湯ノ内カラ進退シクモノ是ヲヨク知ラ子バナラヌツ

○陰盛拒陽甚者 通脉四逆加猪膽汁湯

陰氣ガ又前ノ症ヨリハ甚盛ニテイヨク陽ヲフセイテ陽氣ヲウケヌモノニハツ嚮導ノ藥ト云テソユヘミチビク藥ガナケレバナラヌツ猪膽汁ハ嚮導ノ品ニテ温熱ノ藥ヲソヘ案内ナシニモチ

カケタトキニハヨセツケ又陰カトリコモリテ陽氣ヲフセクハニ陰ト一身スルモノヲサキヘマリ門ヲヒラカセタイテソユヘ四逆湯大温補ノ劑ヲツケユニセル前ノ通脉四逆湯ニ猪膽汁ヲ加テヒキイレヲスル手タテナリ

○太陽證發汗不解煩躁者 茯苓四逆湯

此症ハ太陽ノ症ヲ大キニ汗ヲ發シタリ或又下劑ヲ用テ下シタリシテ病ハ解セヌ又テ煩躁ト熱ガ有テモタヘルモノニハ此湯ヲ用ル茯苓四逆湯ノ方考手引續編ニ詳ナリ

○若此諸四逆湯之證尚危急者四逆湯去甘草加葱白名白

通湯

又一證アリ諸四逆湯ヲ用ル所ノ症ニシラブレバナク危急ナル者
ナバ四逆湯ノ甘草ヲ去ル甘草ハ藥勢ヲスルモノナリ四逆湯
ニ加レバ温補ノ勢ヲヨハスル夫テ四逆湯ノ藥ヲツヨクセシメニ甘
草ヲ去テ葱白ヲ加フ葱白ハ陽氣ヲ通スルモノ故ニ甘草ヲ去
テ葱白ヲ加テ白通湯ト名付ルナリ

○拒陽甚加猪膽汁為嚮導名白通加猪膽汁湯

此症モ始ノ四逆加猪膽汁湯ノ方意ト同ニ嚮導ノ意ナリ群
陰任アツニリテ陽氣ヲセイテラケツケ又故是モ同類ノモノニ

加フ

○其人素表裏俱虛得病一二日背惡寒口中和惟欲寢者直
中陰寒之甚也灸關元穴宜用附子湯

是ハ又其病人カ素リ表裏任ニ大虚證ノモノ故此傷寒ヲ病
付一日カ二日ノ内ニ直ニ少陰へ寒邪ガモテユク其人虚弱故イ
キニ邪氣ガモテユクシ故ニ背カヲ感ジテ口中ノ食ハカラヌ
ムセウニ寐タガル是少陰經ノ裏症ナリ是ニ藥ハカリテハ
トカ又故關元穴ニ灸シテ藥ハ附子湯ヲ用ユ前症ト
子ガヒ附子ヲ用ル症ニモ灸ニテスルハ何トナレハ背ハ陽氣ノ

サカシテ丸場所大抵サムケト云ハ背カゾシクトサムケ有ト云ハ
大抵ノ惡寒ナリコヲ寒邪ハ直ニ少陰腎經ニアタル医モオドロキ
サハギ關元ノ穴ニ灸ラシテ附子湯ハ内ニ芍藥アツテ陰氣ヲ
モ兼子補フモト表裏虛スルカラ附子ヲ用ヒ陽氣補スル
人參ヲ用ルハ大虛ノ症ニ少モ此テユダンハセヌツ

○病ニ百不止至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛下利
者真武湯

此湯因太陽初病不用合劑用大青竜之劇劑發汗不解却傷正氣
發熱心下悸眩暈身中蠕動振々欲擗地者亦此方主之

病二三日モ不止四五日ニ至テ腹痛シタリ小便カ不通手足沉
重ニ疼痛シテ下利スル者ハ真武湯ヲ與ルナリ此湯ニハ茯苓
アリ附子湯ニハ人參アリ此一味バカリノ異ナレバ真武湯ハ小
便カ通ゼヌガ至ナリシレテ水ヲ通センタメニ茯苓湯ヲ用ル○
細註 此細註意ハ此湯ヲ用ル至ハニツアリ一ツハ合云通リノ用カメサテヌツニ
太陽經ノ病ニツキ合劑ヲ用ユトハ桂枝湯ノ類ノ相應ノ劑ヲ不用テ
大青竜湯ノヨキ劑ヲタメニ正氣ヲ傷テ熱カ發シテ心下ガククヲドル是ラ心下悸
スルト云其上眩暈カ有テ身ノアソコカビククトシ地ニメラレントスルニモチユルナリ
○有少陰中風惟畏寒不厥冷病人自言腹滿按之軟大便秘
小便數欲吐不吐臥欲起恍惚多驚欲食而食則痞舌上灰
黑或淡紫系帶青者

桂枝人參湯加葱白生附子

是少陰中風ナリト云ハ定テ説テ有ヘケレ元來傷寒論ガ金書
テナイカラ傳ラヌ少陰ノ中風ハ其病ニヤウガ寒ヲ恐ルレ少陰
直中ノ傷寒ノマタニ手足厥冷ハセズ只寒ヲイヤカリテ厥冷ハ
セザルナリ其上病人コトノ外ニ腹ガハルト云ニヨリテ腹ヲ見レ
バヤハラカナ大便ガ秘シテ通セズニ小便ハサイク行クドシヤラ
吐逆シフウナト云テ吐逆ハセズ寐テモタビク起タカルサテハ起ル
カト思ヘバ起モセヌ寐サセテオケバ熱ニオカサレテ恍惚トシロ
リトシテ多ク驚ク食ヲ喰ト云ニヨリテ喰スレハ食カツカヘルト云

ソウシテ舌ノ色ガ灰色ニ黒クナリテ或舌色ガウス紫ニ変シテ
其内ニ青ニガハリタルハ療治ハ桂枝人參湯ニ加葱白
生附子テニ味ナカラ發散スルノ藥畢竟理中湯ニ加桂枝タモ
ノナリ方考續編ニ詳ナリ

○厥陰者有純陰無陽之證有純陽無陰之證有陰陽差多差
少之證有陽進欲愈之證有陰進未愈之證大率陽脉陽證當
從三陽經治法陰脉陰證當用少陰經治法厥陰見陽為易愈
見陰為難愈其陰陽錯雜不分有必先溫其裏後解其表設
見咽喉不利效噉膿血則溫法不可用仍當先解其表矣大汗

出_レ發_レ不_レ去_レ内_レ拘_レ急_レ四_レ肢_レ痛_レ厥_レ逆_レ惡_レ寒_レ吐_レ利_レ或_レ利_レ止_レ亡_レ血_レ脈_レ微_レ等_レ證
純_レ陰_レ無_レ陽_レ也_レ四_レ逆_レ湯_レ先_レ厥_レ後_レ發_レ熱_レ厥_レ深_レ者_レ熱_レ亦_レ深_レ下_レ利_レ止_レ反_レ汗_レ出_レ
咽_レ中_レ痛_レ便_レ膿_レ血_レ熱_レ利_レ下_レ重_レ者_レ純_レ陽_レ無_レ陰_レ也

白_レ頭_レ翁_レ湯_レ熱_レ少_レ厥_レ微_レ指_レ頭_レ寒_レ默_レ々_レ不_レ欲_レ食_レ煩_レ躁_レ數_レ日_レ或_レ厥_レ而_レ
嘔_レ胸_レ脇_レ煩_レ滿_レ便_レ膿_レ血_レ者_レ此_レ湯_レ主_レ之

傷_レ寒_レ論_レ内_レテ_レモ_レ厥_レ陰_レノ_レ一_レ篇_レハ_レ別_レシ_レテ_レ闕_レ文_レカ_レ多_レク_レシ_レテ_レト_レウ_レテ_レモ
不_レ具_レナ_レリ_レフ_レレ_レニ_レヨ_レリ_レテ_レ註_レ者_レノ_レ了_レ簡_レデ_レ色_レ々_レア_レレ_レ任_レ其_レ中_レデ_レ医_レ通_レ
ノ_レ説_レガ_レ諸_レ家_レノ_レ内_レテ_レ最_レ至_レ極_レヨ_レイ_レ故_レニ_レ是_レニ_レ隨_レテ_レシ_レク_レナ_レリ_レ元_レ來_レ
全_レ書_レデ_レナイ_レ故_レニ_レト_レウ_レモ_レロ_レウ_レフ_レガ_レナイ_レ厥_レ陰_レハ_レ專_レラ_レ陰_レ症_レハ_レカリ

ニ_レテ_レ陽_レ症_レタル_レカ_レナイ_レガ_レアル_レ是_レ直_レ中_レ厥_レ陰_レノ_レ症_レニ_レシ_レテ_レ藥_レハ_レ溫_レ熱_レ
ノ_レ藥_レヲ_レ用_レル_レ症_レナ_レリ_レ又_レ純_レ陽_レ無_レ陰_レノ_レ症_レカ_レ有_レリ_レ專_レラ_レ陽_レ症_レハ_レカリ
テ_レ陰_レ症_レノ_レナイ_レカ_レ有_レル_レ是_レハ_レ傳_レ經_レノ_レ熱_レ症_レテ_レ寒_レ涼_レノ_レ藥_レヲ_レ用_レル_レ
症_レヲ_レ叔_レ陰_レ陽_レニ_レツ_レナ_レガラ_レ雜_レテ_レ陽_レ症_レカ_レ多_レシ_レテ_レ陰_レ症_レノ_レ少_レイ_レ症_レモ_レアリ
陰_レ症_レカ_レ多_レク_レシ_レテ_レ陽_レ症_レノ_レ少_レイ_レモ_レ有_レリ_レ是_レハ_レ陰_レ陽_レ相_レ雜_レノ_レ症_レテ_レ療_レ
治_レモ_レ寒_レ藥_レ熱_レ藥_レヲ_レ交_レ用_レ症_レガ_レサ_レテ_レ又_レ一_レ色_レハ_レ陽_レ進_レ欲_レ愈_レノ_レ症_レ有_レ
厥_レ陰_レノ_レ症_レテ_レ陽_レ症_レカ_レ進_レテ_レクル_レハ_レマ_レガ_レテ_レ愈_レシ_レト_レス_レル_レ症_レニ_レアル_レナ_レリ_レ陽_レ
進_レト_レハ_レ發_レ熱_レノ_レクル_レヲ_レ云_レ少_レ陰_レノ_レ症_レハ_レ熱_レノ_レ進_レヲ_レヨ_レロ_レシ_レカラ_レザ_レル_レト_レ
ス_レル_レ厥_レ陰_レノ_レ症_レハ_レ熱_レ進_レヲ_レヨ_レイ_レフ_レニス_レル_レナ_レリ_レ陰_レ進_レ未_レ愈_レ之_レ症_レ陰

症ノ進テ厥冷ノ増テクルハ陰が進ム故ニ宜キカタハハツカヌ
ナリトツ右ノ通りノ病ノレナカ有ト意得ヘシ。○大率陽脈陽
症ト大率大クリノ一精ク云ハハ陽脈陽症トハ脈ノ浮ナガ陽脈
熱アルガ陽症ゾカウシタ症ハ三陽經ノ治法ニ隨タガヨイ三陽
經ノ療治ハ表症故ニ治方モ發表ノ意得テ療治シタガヨイ又
脈モ沉細ニ症モ寒冷ノ症テ陰症ナレバ少陰經ノ治方ニ隨ツテ
温補ノ療治ヲ用タガヨイ。○厥陰見陽為易愈コ一段ハ厥陰
ノ症ニ陽ヲ見ストハ發熱スルコト是ハ愈易キ所ノ症ツ見陰ハ
厥冷ガニシテクル是ハ愈ガタトス

○其陰陽錯雜——サテ陰症モ陽症モ有テ錯雜トシハリテワ
カタヌ症ナレバ先ツ其裏ヲ温ルヲサキヘシテ藥ハ四逆湯ノ類ヲ
用タガヨイ裏ヲ温テサシテ後ニ其表ヲ解スルヤウニシタガヨイ
藥ハ桂枝湯ガヨイ。○設見咽喉不利ノ如キ者有レハ先ツ裏ヲ温
ルガサキヘスルハツナレハ然レハ其内ニ咽喉カ利セス膿血ヲ效嚙
ハ内ニ熱ガ伏シテヨル故ニ温藥ハ用ラレヌカウニタ症ハ先ツ表ヲ解
シテオイトサシテアトニ内ヲ温ルヤウニシタガヨイ始ノトハ前後
子ガヒアリ藥ハ麻黄升麻湯ガヨイ。○大汗出熱不去トサテ汗カ
大分出テモ熱モ不去内拘急トスルハ四肢ガ痛三四肢ガ厥逆ト

惡寒吐利或ハ利ハ止テ下血デモスルカ
ナルカ始ニ云々純陰無陽ノ症ナリ此症ニハ四逆湯ノ類ヲ用タカヨ
○先厥後發熱是カラハ傳經ノ熱ヲ云フ熱ガ出シテハ其前
ニハ先ツ手足ガ冷テクルサテハ陰寒ノ症カト云ヘバサウテハナクテ
ヤガテ發熱スル先厥逆トヒヘソヨイモノハ熱モ又ツヨシ或下利ガ
止テ又テ汗ガ出テ咽中ガ痛テ便膿血熱利ト云ハ熱ニ属スル泄
瀉デフレニ後重有ルヲ下重ト云是モサキニ云通りノ純陽無陰
ノ症ゾ是ニハ藥モ白頭翁ト云テカク如ク寒藥ヲ用ル白頭
翁湯ノ方考續編ニ詳ナリ○熱少厥微指頭寒是モ同ク發

症テ此湯ヲ用ル症ナリ其症ハ熱カアリソヨウモナク厥冷モ少
ケレ指頭トユビサキガヒヘテ默々トシテ食ヲ欲セヌレナリ煩
躁ト數日イキレモダヘルフガ數日不止或手足ガ厥逆シテ嘔吐
カ有タリサテハ陰寒ノ症カト思ヘバ胸脇煩滿トハ子ワキガ煩
滿シテ膿血ヲ下スマウナモノ是モキハメテ熱症ユヘニ此湯主之
○手足厥寒脉細欲絶者當歸四逆湯○或因劇用下劑下利
腸鳴腸鳴者水飲停留也此湯主之○厥陰頭痛自顛頂引頭
角脉沉弦細手足厥冷者此湯主之若裏證頭痛則乾嘔吐涎沫
吳茱萸湯主之○舌卷囊縮者大抵用下劑脉實便秘則可用若

傳經手引少
脈浮下利者此湯主之。紫舌色燥傳經熱證也。此湯主之。少陰
傳經其人元氣素虛汗下劑太過而成未傳寒中見虛寒候者
此湯主之。少陰之經證及八九日一身盡熱尿血者此湯主之。有宿
食可禁汗若誤汗吐血者甘草湯主之兼厥冷此湯主之。此陰陽
錯雜也。厥五日熱亦五日六日不厥者欲自愈下利下重脈微
弱者欲自止雖發熱不死右陽進欲愈之證也。消渴氣上撞心
中疼熱饑而不欲食則吐或藏厥躁無暫安時或下利脈沉
其面戴陽皆可用溫藥。乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯右陰進
未愈之證也。

以上六經證治之大要

是六傳經之症。若トハ熱症。若レハ病カ未ナリテハ寒症ニ変スル
ノカアルモノシレユニ温藥ヲ用レバ元來此症カモトガ熱症ユニ附
子ノ乾姜ノト云モハ用ラレヌレ故ニ桂枝湯ニ加減シテ當歸四逆湯
ヲ用ユ此湯ノ方考續編ニ詳ナリ此湯ハコトノ外ニヨイ藥テ傷寒
デモ諸症ニ用タ例カ有ニヨリテ當歸四逆ノ下ニ段々用ヤウヲ
多ク拳テアリ是カラ其用カタヲ云テアリ。或因劇用下劑ユノ
藥ノ用カタハ右云手足厥寒ノ症ニ同シケレハ又或劇キ下劑ヲ
ツヨク用ルニヨリテソレガスキテ下利カ不止腹カ鳴ハ是ヲ腸鳴ト云ラ

作寒手引州
かハくナルハ水氣ナリ其水氣ガ停留トトコラルモノニハ又此湯ヲ
用ガヨイツレナゼナレバ方中ニ通草ナトヨ用テ小便ヲ通スル水氣
ガ腰ニトコラルヨリテ通草ヲ用テ是ヲ通スルナリ又頭痛ニモ用
ル厥陰經ノ頭痛ハ頭ノ真中カラシテ頭角ト鬢質ノ上ヘムケテ痛
ムソウシテ脈ハ沉弦ニテ細ナリ手足ノ厥冷トヒルモノニモ又此湯ヲ
用ルガヨイ然レハ頭痛ガスルカラハ表症ナリ時ニ厥陰ノ裏症テ
モ又頭痛ガスル其裏症ノ頭痛ノ目アテハ乾嘔トカラエツキヲスル
涎沫ヲ吐ス是カギレナイ目アテナリソウシタ裏症頭痛ナラ
ハ吳茱萸湯ガヨイ。舌卷囊縮コレカラ厥陰ノ症ノ大クリヲ云

舌卷囊縮ニキハルデハナケレバ大抵ガ下劑ヲ用ルナリ脈ガ實ニ
大便秘ルナレバ下劑ヲ用タガヨイ其内ニ脈カ浮テ大便カ下ルナ
ラハ此湯カヨイ是モト直^{チキマ}中ノ陰症ナレバ理中四逆湯ヲ用レバ來
ガ傳經ノ熱症故ニ今テ陰寒ノ症ニ変ジテモ附子乾姜ハ用ラレ
ヌフレ故ニ此湯ヲ用タガヨイ。紫舌色燥コレモト傳經ノ熱症ニハ
舌ノ色ガ紫也テカハ少是傳經ノ熱症ナレバ末ニナリテハ寒症ニ
ナル故ニ藥ハ此湯ヲ用ル是ニテハ皆厥陰ノ症ニ當歸四逆湯
ヲ用ルヲ論シタモノ是カラ後ハ少陰經ノ症ニモ此當歸四逆
湯ヲ用ルヲ有^ク其分ケヲ段々云テアリ。少陰傳經其久コレ

少陰傳經熱症有レ其病人が元來モトヨリ虚シタモノニ
汗下ノ劑が太過ニシテ末デハ寒中ノ症ニナルヲ末傳寒中ト
云此症始ハ熱症ナレバ後ハ虚寒ノ症ニ変スル故此湯主之。
少陰之經症コレモ少陰ノ經症ニ八九日ニ及デ一身コトクク熱
シテクルレヨリテ瀦ニ血ヲスルヤウナモノハ此湯ヲ用タカヨイ有
宿食可禁汗コレ惣ジテ内ニ宿食有モノハ汗ヲ禁ズルナリ
コレヲ医ガ誤テ汗ヲサスルト吐血ガアル若サヤウナ療治チガ
イテ吐血スルナレバ灸甘草湯主之又サシタ症ニ手足ニ厥冷
ヲ兼レバ灸甘草湯デハワレイクユデハ此當歸四逆湯ガヨイ灸

甘草湯ハ傷寒論ノ方ナリ。厥五日亦五日コレ又厥陰ノ症ヲ
云フ厥冷スルヲモ五日煩熱スルヲモ五日寒熱十日テ終リテ此
六日ハ十一日ナリ十一日目ニ厥冷セヌハ夫テ邪カ盡テ自愈シ
又泄泻シテ後重ノ有ル症ハ是厥陰ノ症ニテツノ脉ガ洪大
ナレバワレイ脉ガヨシナリテ有レハ病相應ノ脉ニ泄泻ニ發
熱ハキラヘレサヤウナレバ發熱シテカラ死ニハセヌ。右陽進欲
愈之證也トカクヨイカタヘ病ガムイテクル。消渴氣上撞心コ
レモ厥陰ノ症ツ厥陰ノ症ニ消渴トカハキツヨクテ氣ガノホリテ子
ハツクツレ故ニ心胸ノ中ガ痛ミナリニ熱スルバカリナリ痛テ熱發

シテ腹ハヒタルイヤウテ喰カレバクヘヌコヲオシテクハ蛇^{クイナウ}吐^ト
メ蛇^{クイナウ}厥^クノ症ニナル。或藏厥アルハ藏厥ノ症ニナリテ身ヲモカ
ヒテ少シノ間モヤスカラス或下利シタリ脉ガ沉テウシテ其
面也ヲ見レバツシマリト赤イ是ヲ戴陽ト云是皆寒ニ属スル
故ニ皆温藥ヲ用タガヨイ温藥ナレバ當歸四逆湯デモ見合ニ
用タガヨイ。乾嘔吐涎沫カラエツキヲシテ涎沫^{ゼンニツ}ヲハイテサウシ
テ頭痛スレバ厥陰ノ頭痛ナリサキニモ云テアル通りニ此症ニハ
呉茱萸湯ガヨイ方考ハ續編ニ詳ナリ此症ハ陰ガス、ンシテ
未愈ノ症自愈ルナド云マウニ自然ト愈ル症デハナイヨイカマ

ヘツカイテワルイカマヘムイテスルホドニ未愈證ト云。以上六經
證治之大要コレガ兼テ云通り六經ノ治方ノ大要ナリ傷寒
論ノ編サ、ムツカシケレドハ傷寒論本書ノ上テナケレバツ
キヌ先ツ是ニテ、大要ヲ知レバ是カラカサ子テ傷寒論ヲ見ル
ト云テモ大道ハスムニヨリテ小道ノ分ハヒトリスム是ヲ合点スレ
ハ是ガ雜病ノ意得ニナルレハ此講談^{コウタン}ニヒ次第ニ此口授ヲスル
トキ皆雜病ノ意得ニナリテヒツシト匙^シヘカ、リテクルマウニテ
ル何トヤラ今ニテハフダシ有リニクヒ病ノセシサクマウナレドモ
カマウニトクト文義ヲ奉テオカ子ハ手ニ入ラヌモノ故ニツ六經

ノ大要ヲ云

○汗吐下後餘邪窒塞胸中臥起不安懊懷無可奈何狀

○梔子豉湯吐之。嘔則加生姜。○氣少則加甘草。○心煩腹脹則去

香豉加枳實厚朴。○九藥傷胃則去香豉加乾姜病人舊有微溏者不可

前條ニテ、六經證治ノ大要ハスニテ此一條ハ汗吐下ノ後ニ餘邪

カ胸中ニ有テ懊懷スルヲ云懊懷ハ胸ノワルヒノ胸ノムカツクノ

ト云トモチカフテ只胸中ノ氣カワルフテドウモ云ニイワレヌ臥

テモ起テモドウモシマシマソノナヒラ云フレテ無可奈何ト云此

痿テモナレ食テモナレ汗スルカ吐スルカ下スカニツノ療治ノ内ニ

テ邪ヲ解スレバ餘邪カ胸中ニ塞テ懊懷スル此無形餘邪也

テ此湯ヲ用テ吐スルナリ痰ノ食ノト云ハ有形ノ邪ナリ瓜蒂散

ヲ用テ吐スルナリ無形ノ邪ハ此湯ヲ用テ吐之梔子豉湯ノ方考

續編ニ詳ナリ加減ニ嘔則加生姜コ嘔家ノ聖藥ナリ氣少則

加甘草コレ補氣ノ意ナリ心煩腹脹コレ枳實厚朴ヲ加テ痞滿ヲ

偏スルナリ九藥傷胃モト誤テ九藥ヲ以テ下ニテ胃ヲ傷ルニハ

加乾姜アタムルナリ病人舊有微溏者凡ツ吐劑ヲ用シト欲スル

ニ其病人少ニテモ腹中カ瀉スルナラハ吐劑ハ不可用汗吐下ノ

後コスマウニナルハ感冒ノ發汗ノ後ナドニナヒテ傷寒吐下ノ後

傷寒吐下ノ後

二此症ガ有ト知ルベシサレハ傷寒ニカギズ温熱病或雜病ノ上
 ニモ無形ノ邪ガ胸中ニ塞テ吐之ニハ此湯ヲ用ルト知ルベシ
 ○病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胸中痞鞅氣上衝咽喉
 不得息者此為胸中有寒也當吐之瓜蒂散
 此證太陽ノ中風桂枝湯ヲ用ヘキ症ノ如ニテ頭不痛項不強
 ノハ痰飲ノ症ナリ寸脉微浮ニテ胸中痞リ鞅キハ胸中ニ有痰
 氣咽喉衝上セテ不得息ナリ不得息三字此湯ヲ用ル目當
 有胸中有寒ハ寒飲アルナリ瓜蒂散方考續編ニ詳ナリ
 ○太陽少陽併病

柴胡桂枝湯

煩滿微嘔小便利而渴頭汗出寒熱往來者柴胡桂枝乾姜湯
 太陽ノ症少陽ノ症二症トモニ前ノ六經ノ所ニ詳ナリ右ニ證カ一
 度ニ指シ併セテ病ムヲ併病ト云太陽ニハ桂枝湯少陽ニハ小柴
 胡湯ト合方ニシテ用ルナリ今時流行藥ノ柴桂湯ナリ ○醫誤
 ノ症前方ノ柴胡桂枝湯ヲ用ユヘキニ不用シテ却テ發汗ノ藥
 麻黃湯ノ類ヲ用レバ太陽ノ邪ハ除ケトモ少陽ノ邪ガ除カヌ
 二病不愈ノレヲ又誤テ下劑ヲ用ルニハ脇胸煩滿微嘔小便利
 等ノ症ヲ見スニ柴胡桂枝乾姜湯ヲ用ユ方考續編ニ詳ナリ

リニ方古法瘧ニ專ラ用

○病發於陰作痞

心下痞見種々症諸瀉心湯主之

心下痞滿引脇

下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者十棗湯

病發於陰ハ陰經ノ表證ナリ傷寒論ノ始ニ發於陰者ハ

七日發於陽者ハ六日ト有ルガ此症ナリ始ヨリ無熱ニ但惡

寒スルナリ治法以温藥表散スヘキニ醫誤テ用下劑ニ

作痞症ナリ痞心下滿テ不痛ナリ諸瀉心湯ヲ以テ治之

瀉心湯ノ方ハ傷寒論ニ詳ナリ○心下痞滿引脇下コレハ痞症

ノ療治方スルニ邪脇下ニ陷ルツレニ十棗湯ヲ以テ寒飲

ヲ下スナリ

○誤下作痞者大黃黃連瀉心湯

凡ソ汗後腹中雷鳴下利スル者ハ生姜瀉心湯ニ宜シ誤下ニヨ

シテ胃虚スル者ハ甘草瀉心湯ニ宜シ少陽ノ症誤下スル者ハ半

夏瀉心湯ニ宜シ又誤下ノ後緩脈浮ニ熱邪上ニ盛ナル者ハ

黃黃連瀉心湯ニ宜シ

○前證濕熱在上陳寒在下附子瀉心湯

前症ハ誤下ニヨリテ作痞ヲ云此症濕熱在上前カタヨリ持合

タル所ノ陳寒カ在下ナレハ附子瀉心湯ニ宜シ

○汗下後虛微少氣發熱口燥

參胡三白湯 柴芫不和去柴胡加桂枝口乾心煩加麥冬五味心

下痞加黃連枳實不得服者加竹茹木方去柴胡名灸參三白湯

氣息短促而脈沉細欲絕附子湯 倍入參

或汗下或下之然後脈虛微少氣發熱口燥ハ參胡三白湯コノ

方ハ仲景ノ方ニ非ス後人ノ方ト云レ証治甚ヨク法トハ此方

ヲ此ニ載スル傷寒テモ感冒テモ邪半ハ去ルト此症ガ澤山ナ

ルモノ右ノ症ヲヨク見合セテ必此方ガヨイツカタノ如ク良方ナ

方後ニ載スル所ノ加減極メテヨクヨク考テ用ベシ

○虛煩不得眠

酸棗湯

此モ傷寒邪半ハ去テ後虛煩ニテ夜不眠ニ酸棗湯コ傷寒

論ノ方ニテ必ズ用ベシ

○傷寒餘熱未除者

參胡芍藥湯 如胸滿腹脹便秘去入參加厚朴倍枳殼小便

頻數加茯苓澤瀉嘔加竹茹血弱加當歸虛煩加茺萸

二便自利胸腹不飽形羸脈弱去枳殼倍入參不睡加炒酸

棗仁 宿糞不淨腹滿或痰便硬不通料加大黃

此症ハ常ニ有ル症ナリ餘熱ト云モノハ必アルモノ此湯必用ノ藥
ナリ傷寒ノ方ニ非ト云レバカタノ如ク効アル古方ナリ傷寒後
ノ餘熱ハ此一方テツキル方後ニ段々加減アレバアレヲ詳ニ考
用テ餘熱ノ症ヲ治スルニガル、フハナイグ

○藏厥膚冷煩躁無暫時止時煩時止蛇厥也

附子理中湯 或此湯之證舌中黑邊白滑者表裏俱虛寒脉必微弱宜用
此湯夏月大順散冷香飲子

傷寒藏厥ノ症ハ難治ノ至極ナリア、リナヒフ煩躁暫時モ
止ナキモノ若或發或止ムハ蛇厥ナリ是ハ藏厥ヨリハカク

○附子理中湯主之此湯ノ方考續編ニ詳ナリ細字ニ書ニタ
ルハ此症ニ舌ノ変ガアルモノ其目キ、ヲ此ニ載セタルナリ

○傷寒吐蛇手足冷者胃中空虛也

理中安蛇湯

此蛇厥ノ症ヲ云理中安蛇湯主之遙カ後世ノ方ナレバ効アル
方エハ此ニ載スルナリ

○汗多亡陽汗不止者

桂枝附子湯 小便少加茯苓

發汗大過亡陽汗不止モノ此湯主之方考續編ニ詳ナリ

○此證惡風咽痛脉反沉緊此陽虛陰氣上乘

白朮附子湯

惡風咽痛ハ涼解ノ劑ヲ用フタル症ナレバ脉ガ沉緊ナレバ陽虛ナルホドニ白朮附子湯ヲ用コレ脉ヲ目アテニシテ症ニカニハサル療治ナリ方考續編ニ詳ナリ

○汗多亡陰陰陽俱虛汗不止頭眩振々欲攤地并肉瞶筋惕者或下後利不止身疼痛

溫經益元湯

前ニ汗多亡陽ノ療治ヲ云此ニ汗多亡陰ノ治ヲ云亡陽スレバ

亡陰モ有ルハツ此レ陶節瘡ガ六書ニ出ル證治ニテ尤良法ナリ其症ヲ見レハ真武湯ノ症ヲ挙テアルサレバ是ハ亡陰ノ症ナルユニ溫經益元湯ヲ用ルナリ此湯ノ方考續編ニ詳ナリ

○傷寒舌戟顛掉不安蠕々瞶動此證因汗多亡陽漏風所致十四味建中湯或十全大補湯 寒邪去而惟周身痛楚用此湯人參養榮湯調理ス

前ニ汗多亡陽ノ症ト亡陰ノ症トニツク云此ニ汗多亡陰陽俱ニ亡ルヲ云其症字面如十四味建中湯或十全大補湯ハ陰陽氣血兩補ノ劑允ソ發汗太過ニヨツテ亡陽ト亡陰ト陰陽俱亡

ルト三ツ備テ精ニキ療治ナリ右ノ方考續編ニ詳ナリ

○直中三陰虚寒者

四陽救急湯

此レ陶節庵ガ方ニテ直中三陰虚寒ノ症ニ用ル藥ナリ但温補藥ト意得ヨ六君子湯ニ加味ノ藥カメノ如ク用ヨキ藥ナリ勞役ノ感冒ニ益氣湯ノ場カスキテ此方テ温補スルコト多シ

○陰極格陽虚寒陰毒者

回陽反本湯

此又陶節庵カ方ニテ陰極格陽ノ症ニ用ル藥ナリ前方救急湯

ノ症ヨリ虚寒甚ク却テ格陽ヲレユハ臘茶黃連ナドヲ用テ時導ノ藥トシテ陰毒ニ用ルナリ

○舌色中黑乾燥

生脉散合附子理中湯黑胎厚而乾燥合黃連解毒湯

此舌ツ子ニ多キ舌ナリ虚ナレ任舌黑ツカハシスハニ生脉散ヲ合シテ用ユ是又サイク有ル療治ナリ意得ベシ此レニキレモノ有リ黑胎カ厚アツクシテカハクナレハ熱症ナリ故ニ黃連解毒湯ヲ合シ用

○下虚戴陽燥渴悶乱不能作汗者

益元湯

此症モ大抵前條ト同シク似タル症ナリ下焦虛寒反テ燥渴悶
乱スルニヨツテ熱劑ニ麥門冬黃連知母ヲ加タルモノ此レモ往々
有ル症ナリ益元湯ノ方考續編ニ詳ニ見ヘタリ

○内傷夾外感則人迎緊盛而氣口虛大其症發熱惡寒頭痛
自汗惡心煩熱遍身骨節俱疼宜

補中益氣湯 有汗加桂枝無汗加羌活若陽氣不得下通而足
冷者去升麻易葛根少加熟附子羌活外感多於内傷者黃
蒼建中湯加羌活防風傷寒夾内傷者上居八九經曰邪之所

湊其氣必虛此湯從六經所見之證加減用之氣虛甚者少加
附子以行參耆之功 挾勞役傷風者加羌活防風 傷寒愈後
元氣未復於是犯房勞則必小便澀肌熱沉困此湯加附子
是内傷夾外感平生タクサニ有ル症テ補中益氣湯ヲ以
主方トス加減方後ニ詳ナリ精ク考用ヘシ

○傷寒夾虛寒勞倦者

十全大補湯 少加防風羌活細辛白芷肢冷者加乾姜附子陰
虛者八物湯加陳皮炒乾姜

前條内傷勞倦夾傷寒ヲ療治ナリ此條モ勞倦傷寒ナ

レ此夾虛寒ヲ以主トス故ニ益氣湯ヲ不用ニテ用此湯此症亦佳
有之畢竟氣血兩虛ノ症ナリ陰虛者ハ物湯加陳皮炒乾姜ニ
腎氣未虛腎陰ノ虛ナリ故ニ虛寒ト云凡未足冷但中焦虛寒
ニハ加乾姜陳皮ナリ

○傷寒鬱冒者

人參養宗湯

此レ前症ニ心虛ヲ兼タル療治ナリ

○傷寒半愈有陰虛之候者宜用

滋陰降火湯

傷寒時氣半愈テ後陰虛火炎ノ症起テ熱不退陽分ハ不虛
此湯ノ症トナリ往々有之本邦ノ老醫此治法ヲ以取効了多
○惡寒發熱為表病宜發汗足脈遲者不可發汗

黃耆建中湯 脈虛極用生附子製黃耆足脈遲弱者用此湯而後發
表九服表散之藥汗不出熱不止者死然有陽微不能作汗者此湯
加附子血虛加當歸川芎 太陽證脈沉身熱頭痛者夾陰也宜此
湯若誤汗而不愈則四逆湯温之 夾陰傷寒足脈遲弱無力足冷囊
縮此湯内用生附子製黃耆桂酒製芍藥

傷寒表症足脈遲者不可發汗用此湯ヨト云了本論ニ詳

ナリ畢竟^{ヒツキヤウ}夾陰傷寒ナリ故ニ用此湯加減方後ニ詳ナリ考ベシ

○夾陰傷寒粗^{ソコ}工每誤用^{小柴胡湯}又用^{四逆湯}則不堪附子之雄悍煩躁

血溢而死宜加減

小建中湯 尺脉遲者不可發汗宜此湯 咽喉乾燥者不可發汗宜此湯

二百心中悸而煩悸陽氣內虛煩陰氣內虛此湯主之 發汗過多

陽氣傷^{ヤウキ}手足自思此湯加參耆頰服 傷寒陽脉^{ヨウマク}瀦陰脉^{インマク}弦者陰

寒在腹中故腹中急痛此湯主之不應非陰寒證宜^{小柴胡湯}表證罷

無裏證其人體痛不減者發汗過多榮衛不和之故也宜此湯 發汗

大過致頭痛甚者此湯加川芎 丹溪治少年貧勞冬患惡寒吐血二三

且六脉^{リク}緊瀦食減中痞醫投温膽湯枳殼湯三月後發潮熱口乾不渴

有痰詢知因悲泣忍飢霜中液水以此湯去芍藥加桔梗陳皮半夏四

貼而安 產後中風熱喘肩息脉實大而緩是傷風也通宜此湯加葱白

豆散 產後傷寒遠不可用^{小柴胡湯}宜用此湯

夾陰ノ傷寒トハモト腎氣虛寒ノ人傷寒ヲ得ルヲ云ナリ其ニ症ニ

痛^{コウ}医^イ虚^{キョ}熱^{ネツ}アルヲ見テエテ用^{小柴胡湯}イヨク虚寒ヲニス然^シリト

云^云理^リ中^中四^四逆^逆ノ熱^{ネツ}劑^剤モ用ヒカタシ其^其分^分ケヲ云テ^云九^九ホトニ精^精シク

考^考ベシ此^此方^方ヲ用ルニツイテ種^種々ノ加減^{加減}方^方後ニ詳^詳ナリ

考^考スベシ

考^考スベシ

傷寒新瘧方起勞動應事或多言勞神而微復發熱者日勞復宜服益氣養神湯

此ハ病後勞復ノ療治此一方ニカキルベカラス種々ノ治方アリトイヘトモ大抵勞復熱アリ心虛ヲ兼ルモノ加減ニ用ヘシ勞復外房事ニヨツテ再發スルアリ此レヲ女勞復ト云大抵益氣大補ハ物湯ノ加減ヲ不出俱ニ加附子可ナリ

○傷寒壞證

獨參湯 張子和治一人患傷寒壞證用大參二兩煎湯服盡少頃病汗從鼻尖止消々如水此其驗也

壞症ハ傷寒ノ誤治ヨツテ救ヒガタキ壞症トナリニ宜月此方百一撰方コレヲ称脱命飲古方ナリ

○傷寒牙縫出血如吐者

黃連解毒湯合犀角地黃湯外貼綠袍散 傷寒瘧後微惡寒時發熱口乾不食脉微弱 一壯男傷寒熱毒入裏浮血數梳用藥而血止神氣太平安雖然不食口乾大便久不通脉數弱用此湯愈


傷寒血熱之症ナリ此症往々有之故ニ載之細字ニ書スル者ハ病後實火ノ者ノ療治ナリ考脉詳ニシテ可用之

○此事難知云傷寒傳至五六日間漸變神昏不語或睡中獨語二句

目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之則嘔不與則不思六脉細數而不洪大
 心下不痛腹中不滿大小便如常或傳至十日以來形貌如醉人形虛見
 神昏不得已用兼氣下之誤矣不知此熱邪傳乎少陰心經也
 導赤瀉心湯 主之與食則嘔者邪不在胃也不與則不思以其神昏也
 既不在胃誤與兼氣下之必死今傷寒溫熱傳變多有此證不可不慮也
 凡傷寒八足二傳之手不傳ト云凡先輩手足俱二傳ル論丁寧
 反復極レリ此症ハ手ノ少陰心經ニ傳ル症ナリ傷寒論此ノ證
 治ヲ不載トイヘ凡古來經驗ノ療治ナリ熱讀ノ詳考ヘシ
 傷寒論手引草畢



每部須認此圖記



安永六年丁酉五月

京都書肆

浪華書林

二系通御幸所西入

間之町御池上丁

高麗橋壹丁目

山本長兵衛

林權兵衛

浅野彌兵衛

