





Wunderlich's  
Pathologie en Therapie.

---

Bijzondere gedeelte.

Verhandeling  
over  
Longziekte.







雲堙兒理方察篇

目次

哈血

氣管血及肺血

識別

治法

肺結節

原因

誘起

體中一部ノ管為肺結節ニ関涉スル者  
病理論解剖論



急性肺結節症  
殖具症  
尿管症  
腹膜症  
腸胃症  
心臟症  
肌肉症  
皮膚症  
脊髓症  
腦症  
胸腔結構

見病  
各別症  
弓處症  
打聽症  
聞筒症  
咳嗽  
咯痰  
聲症  
局處感傷  
結節形狀



急性肺勞  
慢性肺勞  
治法

千八百五十五年鏤行

獨乙 烏雲蛭兒利伊

著

文久元年辛酉十月

日本

佐藤

舜海

重譯

咯血篇

第一氣管及肺血

氣管血肺血ハ各之ヲ弁スル丁克ハス蓋ニ肺血ハ血肺ノ  
織質中ニ貯蓄セズ却テ之ヲ其織外ニ溢出シ以テ氣管稍  
ノ出血ニ同ク死メ后之ヲ剖觀スルト魚其眞氣管ニ在ル  
乎肺藏ニ在ル乎ヲ弁スル丁克ハサル丁アリ氣管稍ニ其  
原ヲ取ル出血モ或ハ其血ヲメ肺房中ニ溢出セシムル丁



アリ是气管血肺血ヲ弁スル了克ハサレ所以也

右効ニ純テ此出血ヲ三別ス

〔第二〕气管溢血其原气管中ニ在ト肺房中ニ在ニ論ナク血  
气管梢ニ溢<sup>ル</sup>直ニ之ヲ咯出スル者即是ナリ

〔第二〕肺房溢血々无患ノ肺房中ニ爵溜シ而々其処ニ滲入  
スル者則是ナリ

〔第三〕破裂出血肺ノ織頂中ニ破裂シ以テ一洞ヲ為シ洞中  
ニ血ヲ爵積スル者是ナリ

才ニ气管溢血ノ原因及病理解剖ヲ論ス  
气管溢血ヲ癸スル原因ハ則チ气管中布分スル処ノ脉管  
ノ穿孔○气管梢ノ積血燃衝气管粘膜ノ潰瘍○肺中血積

肺結節

ヨリ生スル処ノ滲出肺燃衝<sup>テ</sup>ケル等ノ諸件皆之ニ

属ス此ノ如キ病ノ原因多ハ則チ本病ヲ所以ナリ<sup>テ</sup>此  
諸件ノ外更ニ誘因アリ<sup>テ</sup>刺<sup>テ</sup>气管中ニ血ヲ溢出スル者

ナリ而々其血ヲ溢出スル処ハ粘膜或ハ粘膜下ノ蜂巢織  
中ニアリ或气管中ニアリ或气管ノ二処ニ溢出スル者ア

リ其粘膜下ノ蜂巢織ニ致スモノハ气管粘膜暗赤ノ班点  
ヲ現シ且ツ其処隆起メ之ヲ解剖スルハ則チ血塊ヲ見ル

○血ノ气管中ニ溢出スル者ハ气管中ニ血塊ヲ見ル而々  
其粘膜灰白色ニ変スト血積ヲ致ス

第三肺房溢血及病理解剖ヲ論ス

气管血肺血尤モ多癸スル一病ナリ其素因ハ肺頂脆薄ニ



レテ破裂シ易ク血管ヲ殊ニ錯スル人ニ於テ之アリ故ニ  
体格嬌弱ニ血ニ富ム者假令ハ幼壯ノ虚弱ナル者ノ如  
ク然レモ亦虚弱ノ老人之ニ罹ラサル者トナスヘカラス  
○肺中血積レ以テ其脉管破裂スレハ此溢出ヲ致ス故ニ  
血積ノ原因ハ皆此本病ノ原因トナスヘシ而モ心病殊ニ  
其病已ニ水腫ヲ將出スル者惡液積酒家脾病肝病腎病癆  
ヲ曾テ患フル者ニ多ク肺病溢血ノ病状ハ房積著ク破裂セ  
ス其房中ニ凝血ヲ貯蓄ス故ニ肺臟中血塊无数有ルヲ見  
ル其大ナル者ハ胡桃ノ如ク其小ナル者ハ豌豆大ナリ而  
モ肺ノ深处后部殊ニ肺ノ下葉ニ多アリ之ヲ剖開スレハ  
无数ノ顆粒相集テ一塊ヲ為ス力如ク乾枯ス指ニテ押ニ

陥没セス水中ニ放セハ則沈ム○気管中又血ヲ貯積ス其  
血赤クメ粘膜放レテ又血ヲ溢出ス胸膜下ニ小血斑ヲ生  
レ以テ渗出ヲ致ス  
此病苗連メ未タ死セサル者ハ溢血變ニ其外面汚乙液ヲ  
渗出シテハ吸收セラレヌ却テ堅硬トナリ收縮メ其色黒  
シ或ハ吸收機少シモ發セス其周圍穴ヲアテハレ以テ膿  
ヲ生シ其膿漸ク塊血中ニ浸入メ膿瘡ヲ為ス又蜂窠織化  
膿レテ織中ニ在ル処ノ血惡膿ニ変スル者アリ此症凡化  
膿ニ変スル者甚希ナリ只破裂出血ヲ致ス処ノ脉支充塞  
セラル者ノヲ轉故ヲ化膿ニ致ス了アリ  
第四破裂出血ノ病理及解剖ヲ論ス



所謂肺中風是ナリ肺葉ノ蜂巢織破裂ニ血ヲ其破裂間ニ  
爵積シ气道ニ之ヲ爵積スル者希ナリ凡此症ハ血積ノ為  
肺管破レテ以テ之ヲ爵積スル者トス  
凡此症ハ肺ノ蜂巢織破レ其破処空洞ヲ為シ其洞中ニ血  
ヲ充積スル者ナリ故ニ其生スル処ハ肺房溢血ノ生スル  
所ニ同シ然レ肺ノ外面ニ近キ処ニ出血ヲ致セハ气管血  
及肺血ノ顯症諸症全ク隠レテ康健ヲ妨クルナク卒然  
トメ一敗ニ起リ其勢劇甚ニメ即死ヲ致スニ至ル者アル  
ハ則此症ナリ○之ヲ分テ二症トナス  
甲 輕症前症ナキ者アリ又之アル者アリ肺房溢血ハ咯血

セス又症状ヲ顯サス死テ后尸ヲ剖テ初テ其<sup>此</sup>症<sup>々</sup>アルヲ知  
ルナリ○前症ハ全身興奮ノ状ヲ顯シ胸中壓窄ヲ覺ヘ  
原症ニ从テ胸中脉疾実強トナリ洞中血液ヲ灌溉シ胸中  
破裂スルカ如ク感覺ヲ覺ヘ其他刺痛搖動ヲ覺フ○今胸中  
广割セラレカ如ク或温熱アリテ咳嗽ト共ニ血ヲ咯出ス  
其血淡紅ニメ泡沫アリ其量一多ヨリ一少或一時ニ咯<sup>出</sup>  
レ或ハ漸次ヲ以テ之ヲ咯出ス○若シ其出血微量ナレハ  
却テ軽快ヲ覺フ然レ虚脱ヲ覺ヒ面上<sup>汗</sup>汗ニ眩暈ノ状アリ  
或黒班ヲ見ルヲ常トス○癸作間ハ須臾ナリト急<sup>ニ</sup>再癸シ  
以テ連延<sup>ス</sup>直スルナリ又刻期<sup>ニ</sup>及復スル者アリ其及  
復スルニ及テハ著ク虚脱ヲ覺ヘ勞瘵<sup>熱</sup>熱若クハ神全<sup>熱</sup>熱ヲ



病ム

〔註〕ニ曰漸時ニ咯血スルハ前血气管中ニ在テ之ヲ排除スル者ナリ故ニ其排血ヲ得レハ胸中ノ狭窄从テ去ル故ニ及復症ト錯誤スヘカラス

〔乙〕重症又二別アリ其一ハ肺房溢血肺頂破裂出血ノ論ナク此処ニ爵積メ之ヲ少モ咯出セザル者ト咯出スル者モ甚微量ナリ病間之ヲ每別ニ難ク且<sup>且</sup>窒塞ノ恐レアリ○数日当連スル前兆ハ胸中狭窄ニ刺スカ如ク且咳嗽メ心悸動頭痛眩暈疲勞違和ヲ覺フ如此前兆或ハ之ナキ者アリ○発作ハ安<sup>安</sup>静ノ夜間ニアリ正ニ出血セシトスルノ症ハ胸中卒然トメ煩悶シ劇痛ヲ覺ハ<sup>ハ</sup>症咳ト共ニ血ヲ

咯出ス血量一ナラス或極テ微ナルヲアリ其泡沫アリテ<sup>淡</sup>紅或黧黒ニ凝結ス或初ハ<sup>ハ</sup>淡紅ニメ終ハ<sup>ハ</sup>黒ナルアリ或ハ血一漓ヲモ咯出セサルヲアリ或血口内ニ至ハ則嚥下レテ胃中ニ入り吐下<sup>下</sup>共ニ之ヲ胃中ヨリ出スヲアリ○血ヲ咯<sup>出</sup>スルハ咳嗽減スルヲ常トス○心臓ノ縮力極テ強ク其力実ス然レ速ニ跳動不<sup>正</sup>トナル肺頂破裂出血ノ始ハ脉数ニメ実レ一異ノ弦状ヲ為シ震揚ス脉カヨビ少トナルニ及テモ尚<sup>ホ</sup>震揚止サルヲアリ○皮膚熱ニ恰モ<sup>獨</sup>熱病ノ如或乾燥ス或一処発汗スルヲヤリ舌乾苔アリテ湯ヲ生ス○面色初メハ赤ク出血夥キ后初メテ灰白トナル時<sup>死</sup>尚<sup>然</sup>スル其轉<sup>改</sup>ヲ論ス第一治癒脉



沈整ニ弦状去リ肌熱減ニ而メ再発ノ血積ヲ生セス然凡  
発作后疼血ヲ致ハ是却テ宿滯スル処ノ残血ヲ掃フモノ  
也其疼粘膠ノ如ク末期ニ及テハ整ニ氣應ニ易ク疼痛去  
リ残血吸収スルニ忘レ胸中ノ喘鳴去リ以テ全治ヲ致ス  
第二胸膜焮衝胸膜ノ近処ニ血充積スル者或ハ胸膜ヲ鑽  
通スル者多ハ此ノ轉故ヨリ致ス即胸膜焮衝ノ症ヲ顯ハ  
シ或肺頂破裂血出ノ症ヲ兼併シ以テ全愈ヲ妨クルアリ  
リ或ハ寸衝ノ滲出ヲ致シテ胸膜肥厚ノ状ヲ顯ハス者ア  
リ又胸膜鑽孔ヨリ氣ヲ通スルアリ  
才三肺介衝ニ轉ス溢血ノ近傍ニ之ヲ發ス其焮衝肺ノ全  
部ニ蔓延セサル者ハ陰匿ニテ其消散ヲ妨ケ全治ヲ怠ラ

シムル若斤衝ヲ發頭スルハ發熱増進メ肺介衝ノ正微  
顯ス  
才四水腫ニ轉ス急慢ニ性アリ共ニ窒息メ死ス  
才五肺壞疽ニ轉ス肺脉血ヲ以テ常ニ充塞ニ或纖維糸凝  
結ニテ之ヲ充塞スルハ則壞疽ヲ致ス  
才六肺結節出血后数日ヲ経テ初テ此症ヲ致ス治療ヲ妨  
ケ羸瘦ニ大汗ヲ發スルノ后初テ其故ヲ轉ルヲ知ル  
第七死ニ轉ス一ハ直ニ窒息ニ或嗜眠漸ク増シテ死ニ或  
ハ續發ノ為ニ死ス則胸膜焮衝肺介衝水腫壞疽及肺結節  
腫不此レナリ  
其二重疔大量ノ血ヲ氣道ヨリ潰出ニ而直ニ其症ヲ傷フ



ル者ナリ或其死ニ至ラスト血虚ノ極度ニ至ル者ナリ  
之ヲ名ケテ咯血ト云重志ノ劇キ者ハ立トコロニ死ス死  
尚ホ口鼻ヨリ血ヲ潰出ス或気道气管枝气管ニ血ヲ充塞シ  
死后之ヨリ自流出ス○凡此志ハ病者生アルモ面色死色  
ノ如ク精神脱シ四肢厥冷脉小ニメ四体痙動ス又搐搦シ  
終ニ死ス

**識別**凡出血スレハ則先其血如何ノ処ヨリ出ルカヲ探索  
スルヲ緊要トス血気管血喉頭血及消食管中ノ出血ト  
錯誤ニ易ケレハナリ蓋シ肺血ハ淡紅ニメ泡沫アルヲ正  
兆トスト血流量僅少ニメ途中ニ滯セサルニ非サルノ  
外ハ此人如キニ兆得難シ若シ氣支中ニ抑留シ或一旦嚥

下スレハ其血炭素ニ酸化メ黧黒トナル○咳嗽ニ乘レテ  
出血スルモ亦之ヲ確兆トスヘカラス血モ又咳ニ乘メ  
出ルヲアリ又肺血吐ニ乗メ出ルヲアリ常ヲ以テ見レハ  
其確兆トナスヘキ者一モアラス経過中ノ症状ヲ参考シ  
以テ之ヲ断ルニアリ○肺血気管血ノ年別ハ則凡全身病  
及胸患微ニメ却テ洩ス処ノ血大量ナルハ即チ其ノ原氣  
管ニ在リトスヘキ是レニ及メ全身症ト胸患ト劇ク洩ス  
所ノ血微ナル者ハ肺中ヨリ出ルノ兆トスヘキ  
単性血積ト肺血トヲ弁スヘキ肺血ヲ咯出セサルモハ  
其初期肺血積ヨリ弁シ難シ然レモ至過潑直シテ治癒急  
慢シ肺血ノ症状増加スル者ハ則チ肺血ノ症ト為スヘキ



肺頂破裂出血ハ肺焮衝ト弁ニ難シ其ノ初期或ハ弁スル  
了克ハサルモノアリ然レハ破裂出血ハ肺ノ一弓所ニ限  
リテ其ノ症ヲ追迫ニ蔓延セス發熱スル了邊クリトス  
状ノ疼ヲ略カス○肺焮衝ニハ此疼ヲ略ク此其ノ弁兆ト  
スヘシ

又腦中風ヨリ弁スヘシ破裂出血ハ半身不遂ナレ○肺血  
ヲ識別スルノ后ハ更ニ其ノ原因如何ノ物ヨリ未リ其原  
病如何ノ処ニ在ルニ弁別スヘシ之レ治法ニ於テ緊要トス  
治法肺血気管支血ノ治法其ノ性危篤ニ屬スル者ハ危劇  
ニ有カノ法方ヲ要ス  
甲 前兆治法ハ肺中血積ノ法ニ月シ

乙 癸 作時ノ治

其一 肺血ノ輕症微量ノ血ヲ略キ而シテ其ノ症重症ニ前  
驅スルニアラザル下ヲ察セハ安静ニ保護シニ三日ハ減  
食ニ其ノ后輕キ滋養ノ食餌ヲ少ク許スベシ

其二 重症ハ出血ノ有無ヲ論セス出血ノ症状ヲ顯ハサ、

ル前已ニ治療ヲ乞ヒ其ノ体格瀉血ニ堪ユヘキ者ハ刺絡  
才一安トス瀉血ノ量ハ体中安スル処ノ量ニ定ム血虛ノ  
症状ヲ顯スヲ度トメ血ヲ瀉スヘシ眼黒班ヲ見ル暈ヲ生  
注ニ曰ク膊ヲ刺スヲ尤モ佳トス然レハ病経閉ヨリ未

ル如キ者ハ跗ヲ刺スヲ要ス  
常習略血及ヒ衰弱甚キモノハ略血ハ局處ノ瀉血乃チ



数條ノ蟻針ヲ貼スルヲ優レリトス  
或ハ胸或ハ臍或ハ  
大衰弱已ニ血虚症ヲ顯シ矢苟見倍若ヲ病ム等ノ如キハ  
瀉血ヲ禁ス

〔其三〕瀉血ヲ行フ丁克ハサルモノ或ハ之レヲ行フト魚  
王其功ヲ見サル丁ヲ察セハ之レニ代フルニ四手足ニ刺  
戟劑ヲ行フヘシ刺絡ニ兼用ス又胸腋ニ乾角法ヲ行ヒ刺  
戟瀉腸ヲ行フモ可ナリ

注ニ云ク刺戟瀉腸法ハラヘシ子ク之レヲ行ヘリアレ  
デラルノ説モ亦ラニエシ子クニ月ニ而シテ曰ク有ク  
瀉血ヲ及覆ニ行フニ勝レリトス  
〔其四〕其人后蔽ニ安渡シ言語動作ヲ禁ス咳嗽ハ病者自

ラ意ニテ避クヘシ常ニ背下ニ枕シテ仰卧シ清涼ノ廣室  
ニ置ク飲料ハ冷飲ヲ好トス初日ハ食ヲ禁ス  
〔其五〕内腹ハ直チニ行フニ及ハス初ハ輕キ軟化ノ藥品  
ヲ以テスヘシ刺絡ヲ行フト魚氏血止ス或其及覆ヲ恐ル  
者ニ放テハ内糸ヲ行ハスニハアラス○初メハ適宜ノ  
軟化壓塞ノ鎮症劑則チアラヒヤゴム油類乳劑硝石酒石  
青酸ジキタリ不及ヒ吐根ナリ吐根ハ只少量ニ行フテ吐  
セサルヲ好トス○肺血並連シ血ヲ咯ク丁類數ニメ病  
者峻患ニ進ム者ハセカレコロスゲム及ヒ硫酸功アリ蓋  
シ硫酸ハ咳嗽ヲ制セントスル丁克ハサル者ニ用ユヘシ  
而メ其ノ原矢苟見ニ出ル者ハ愈功アリ○肺血頑固ニメ



其ノ勢劇キ者ハ食塩末ヲ行フヘシ  
或ハ兼用ス其量一茶碗  
行フヨク出血ヲ制ス  
是レ屢ニ用イテ奇驗ヲ見ル一方ナリ又アセタスブロエン  
ビヲ大量ニ用ヒテ功アリ

〔其六〕 右ノ法方ヲ行フト虫凡出血尚止マス气道ヨリ大  
量ノ血ヲ出ス者ハ胸上ニ氷片ヲ貼シ以テ沸湧出スル処  
ノ血ヲ制スヘシ

〔其七〕 極テ危峻ニ属シ生命正ニ絶ントスル者ト先ツ其  
ノ生命ヲ止メンカ為ニ刺戟薬ヲ行フ  
注ニ曰ク血虚者ノ肺血刺絡減食法ヲ行フト虫凡尚友  
覆メ止マサルモノハ其ノ方ヲ止メ有カノ滋養法ヲ行

○日フテ直午ニ病者快復スルヲアリ

〔丙〕 右ノ法方ニ由テ出血ヲ一時壅塞セハ肺中ニ貯蓄ス  
ル処ノ血ヲ吸收セシムルニ在リ而メ更ニ其ノ反瀆ヲ防  
クヘシ之レヲ防クノ法ハ緩和鎮静ノ劑ヲ持長ス尚其症  
ニ忘レ全身局処ノ瀉血中和益及下劑大量ノ硝石再新ノ  
刺絡是レナリ蓋シ殊ニ注意スヘキハ其原因ヲ求メテ去  
ルニアリ

〔丁〕 重症發熱セハ破裂出血ニ在テハ才初日才二日ニ在  
リ之レ肺嫩衝ヲ変出スルモノカ然ラサルカニ注意スベ  
シスベテ之レヲ制スルニハ水蛭下劑ヲ以テ吐酒石ニ優  
レリトス



及復ヲ防キ得タル后ハ其ノ素回ヲ制スルニ在リ則  
 子素回ヲ去リ他道ヲ制テ血液ヲ誘導シ熱物ヲ禁シ感傷  
 ヲ避ク其他ハ肺中常ニ血充ニ舉ル処ノ法方ニ从フハシ  
 ○虚脱甚レク身体弛緩スルモノハ保固強壯薬ヲ要ス但  
 之レヲ用ヒテ血積ノ状アラハ立ニ止ムヘシ其差ハキ  
 ノゴム明砒鉄水法滋養膏梁ノ食物是レナリ

肺結節

原因論才一

肺ノ結節ハ只肺中一病アリ之ニ結節ヲ継發シ以テ  
 結節病ヲ成ス者アリト魚尾多クハ結節病ノ体格ヲ受ケ  
 而メ后本病ヲ將出スル者ナリ其ノ体格ヲ受ケルニ二ア  
 リ一ハ結節頂ト名クル者ニメヤハモスレハ本病ヲ致シ  
 易ク一ハ体中ノ一二ノ部曾テ結節毒ヲ泌別シ今肺中ニ  
 変アレハ則チ變ニテ結節病トナル者ナリ○茲ヲ以テ見  
 レハ肺結節ヲ受ルニ二因アリ一ハ結節頂ヲ稟ル丁ナク  
 局処疾患ニ乘シ變ニテ結節病トナル者一ハ先天稟賦ア  
 リテ已ニ其質ヲ有スル者ナリ



肺結節病ハ吾人尤モ多ク患フル一病ナリ死人ヲ剖観スルニ半ハ血積ノ蹤跡ヲ残ス凡ソ死人五分ノ一ハ肺結節ノ為ニ死ス

**[甲]** 外ヨリ来リ感シテ肺ノ結節ヲ促ス者ト防ク者トヲ論ス

**[年齢]** 肺結節ハ年期ヲ以テ論スルニ之レニ罹ラサル者十二ニ然レ凡胎児嬰児三月ヨリ四月ノ間ニ實ニ少ク齒牙發生ノ期ヨリニテ全身及ヒ肺臓ノ結節ヲ發揮スルノ機尤進ス故ニ之レニ罹ル者多シ只肺結節ノ機ハ微ニ又氣管節核結節ノ機ヲ抱キ十二才ヨリ十五才間ハ結節ノ機動ク然レ凡之レカ為ニ死スル者希ナリ故ニ此ノ年期ニ

當テ死スル者ハ肺臓結節アルヲ見ル十五才ヨリ廿才ノ間其ノ機少ク減スニ十才ヨリ三十才ノ間其勢極ナリ故ニ此年期ノ死人半ハ肺結節ナリ三十才ヨリ五十才ニ至テ漸クニ減ス

**[男女]** 男女ヲ以テ論スルニ其ノ比較未タ云レキ了能ハス然レ凡男子ヨリ婦人ニシテ罹ル了多キカ如シ

**[体格]** 夫レ人ハ父母ノ氣稟ヲ稟テ生ル故ニ必ス父母其ノ稟ヲ其ノ子ニ傳フ之レヲ名ケテ遺傳ト云フ父母肺稟アレハ其子又肺稟ヲ稟ルハ当然ナリ然レ凡父母親戚肺疾ナク其子結節稟ル了アリ之レ蓋シ父母ノ身体或ハ虚弱或ハスコロヒ口レニスナルニ由テ生ス經久梅毒ヲ



患フルニ由リ或ハ淫縱ナルニ由リ或ハ麤食ナルニ由リ  
或ハ不幸ニ由テ精神鬱閉スルニ由リ又年齢奇ニカラサ  
ル配合ニ由リ又親戚数ニ配合スルニ由リテ其ノ子結節  
毒ヲ化成スル者ナリ結節体格小児時ニ於テ已ニ之ヲ兆  
スル表忘ハ則チ体格嬌嫩ニメ四支薄弱皮膚緻密ニメ白  
頬上淡紅ノ如ク胸窄ク齒列不整而メ一時ニ生長ニ或ハ  
状態美麗或ハ四支長ヤ、モスレハ疲勞ヲ覺ヘ心弛元フ  
リ精神感動ニ易ク音微弱ナリ其ノ又母老年ニ及テ産  
ム処ノ小児ハ情慾発スル時常期ヨリ早ニ○ヤ、モスレ  
ハ血ニ甚嘔気管支聖京屈下利ニ易ク消化機妨ケラレ  
色情発動ノ時期ニ於テ結節頂ヲ表スル兆ハ体格ノ虚弱

ニ比スレハ色情発スル丁早ク月経不順胸内ノ発動全カ  
テス面色或ハ灰白或ハ濃赤  
大人ニ於テ発スル処ノ表ハ則チ体格嬌嫩面状緻密  
情慾発動時之結節兆ニ成育兆速月全不順胸膈ノ発動不  
十分面色或灰白或ハ濃赤ナリ  
成人結節ノ兆ニ骨格嬌嫩体少ニメ長ク面又長クレテ緻  
密時期アリテ淡紅ヲ潮レ眩アリテ汗疹ヲ発ス眼深クレ  
テ光沢アリ髪細美ニレテ髻ナク之ヲ少ナルニメ太齒白頸長ク  
頭稍屈ス○胸膈扁平ニレテ或ハ狭ク肩胛胸ヲ離レテ伏  
ニ恰モ鳥ノ翼ヲ張ルカ如ク四支軟弱ニレテ腕脚細少身  
心虚憊ニ易ク淫事ヲムサボリ月経或ハ大或微小ニレテ



不順動モスレハ冒寒ニテ病ニ卧シ易ク氣息敏ニレテ心  
跳忽チ亢ス而シテ急性流行病ニ染ムヲナシ如此状ハ必  
結節ノ素瘰ニレテ動モスレハ則チ本病ヲ患フ然レモ必ス  
其病ヲ免ル、了能ハサルト云フニ非ス又筋骨徒強努力  
ニ堪ヘ結節ノ素瘰ヲ少モ有セサル体格ト魚尾肺結節ニ  
罹リ而シテ其死期尤モ早キ了アリ  
又結節病ニ罹ラサル体格アリ則チ屈伸病不具體瘦削及肥  
胖体海綿質ノ如シ是蓋血液調化ノ為ニ体中ノ結節毒ヲ  
已ニ掃除シ尽スニアルナリ  
懷妊産辱哺乳ハ亦結節毒ヲ制ス故ニ此間ハ嘗テ結節病  
ヲ顯ス者ト魚尾一時解散ス又懷妊十月ノ間ハ其危症消

散ニ脱後再ヒ見レテ速ニ死スル了アリ○経閉ハ蓋レ結  
節ヲ將出スルノ媒トナル  
急性病殊ニ才扶思ハ結節ヲ相制ス故ニ才扶思ニテ死ス  
ル者ハ結節ノ縱跡ヲ致ス者ト希ナリ然レモ結節ヲ病ム  
者才扶思ニ罹レハ結節腫速ニ軟化溶解ス又才扶思快復  
ノ時期ニ至リ急性結節病ヲ併發シ速ニ死スル者アリ  
急性皮膚疹ニ疹ハ結節ヲ媒起ス丹毒ハ之ヲ媒起セス  
痘瘡ニ於テハ少シモ關涉ナレバ急性病回復時期ニ及  
シテハ結節腫ヲ誘發シ易キ者トス  
慢性病ノ結節腫ニ関涉スルハ未ダ知ル了能ハス只精神  
病ハ之ヲ將出スル了アリ



慢性病ハ之ヲ將出スル丁少ク只忒アリテ慢性皮膚病ノ稀  
ニ之ヲ將出スル丁アリ

慢性病ノ結節素因ヲ誘起スルト云フ丁ハ古ヨリ傳フル  
一説ナリ然レハ実験ヲ以テ見ルニ其度跡分明ナラス只  
斯格魯扶魯設斯ハ其一旦全治スル者或ハ已ニ小兒ノト  
魚尾成人ノ後更ニ肺癆ヲ發起シ易シ故ニ斯格魯扶魯設  
斯全癸スル者ハ水脈ノ諸処ニ結節ヲ泌出猶且肺ノ結節  
腫ヲ致シテ以テ死ニ至ラシムル丁必セリ然レハ斯格魯  
扶魯思私治スレハ從テ結節モ亦治ス小兒斯格魯扶魯私  
斯ヲ病ニ其瘡痕ヲ残ス者尔後肺癆ノ為ニ死スル者太々  
稀ナルヲ以テ證スヘシ○萎黃病痛風病痔疾結石病梅毒

ノ結節ニ関涉スルハ未タ知ルヘカラス只委黃病梅毒ノ  
外ハ肺癆ヲ別狀スル○慢性心病動脈癸大ハ決メ結節ヲ受ス  
○瘰癧及ヒ洩乙袋病モ亦多クハ之ヲ受ケス  
結節ヲ發起シ或ハ之ヲ誘出スル外感  
外來ノ原因甚タ多シ地方ノ氣候職業攝生等ニ関涉ス凡  
体外ヨリ入テ此原因トナル者ハ吸納殊ニ石灰鑛物ノ吸  
納ナリ而シテ堅物ノ微塵及ヒ毛布綿布ノ細末五穀ノ澱  
粉炭火氣乾油ハルスノ乾蒸卑濕氣中ノ永住皆害アリ又  
乾熱氣陰翳冒寒ノ反覆等之カ原由トナル蓋ニ実験ヲ以  
テスルモ確實ヲ取リ難シト虽凡已ニ結節ノ癸露スル者  
ハ之ヲ蔓延セシムル丁ハ必セリ



体中一品ノ常為肺結節ニ関涉スル者

腦精神努張徹夜不寐ハ肺結節ノ原因トナル而メ本病ヲ

蔓延催進不悲哀鬱憂ノ如キモ亦之カ原因トナル丁必セ

リ而シテ其素因嗜テナキ者ヲメ此病ニ陥ラシム

註曰安逸適意ノ人卒ニ悲哀ヲ生シ其鬱ヲ解ク丁能ハ

サル者及嗜テ筋骨壯強ナル者悉因ニ罹レハ肺勞ヲ將

出スルハ屢々見ル所ノ一莫ナリ

筋力ノ使用過度ナル者殊ニ其給養不足ナレハ則此因ヲ

致ス<sup>モ</sup>走<sup>ヤ</sup>奴ノ如キ是ナリ<sup>カ</sup>茶<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>其使用微少ナレハ亦害ア

リ房事過度淫妄不能施手淫ハ肺勞ノ誘因ナリ

職業ニ関涉スル者

凡テ結節ハ賤人ニ多ク貴人ニ鮮シ之ヲ比量スルニ貴人

一人ニシテ賤人三人ノ如シ○精神ヲ使令シ声ヲ張り若

クハ外風ヲ冒シ若クハ寒冷塵埃ニ觸レテ其事ヲ司ル者

結節ノ素因ヲ生ス即學校教師演<sup>武</sup>場<sup>武</sup>戲者ノ如シ魯母拔

尔<sup>馬</sup>曰声ヲ張ル者ハ結節ノ素因ヲ殺クト云此說通論ニ

反セリ

工匠ヲ以テ論スルニ結節素因ヲ促スト減スルノ二別ア

リ其之ヲ促ス者ハ種字匠摺畫工製帽製手套縫衣結髮軍

卒等ナリ

四季ニ関涉スル者

結節ハ冬ヨリ春ニ於テ始マリ多クハ其季中ニ於テ死ス



然レ凡其論弁確トラス

地方ニ關涉スル者

地方暖氣ナレハ結節ヲ病ム者愈少シ而シテ寒國ニ於テ  
モ亦少ク寒熱相半ニスルノ地方尤モ多シトスト云実驗  
以テ論スルニ結節ハ寒熱感スル者ニ非スト其之ニ感  
スル証アルナレ○泥障ノ地間歇熱頗ル流行スル代  
ハ肺勞少シ泥障乾溼ニテ地面ヲ為シ間歇熱消散スルノ  
後ニ至テ結節病尤モ多ク發ス

傳染

健全無病ノ人肺結節ヲ感受スルト云ハ信スヘカテ恐  
ク肺勞ヲ恐ル、甚シキヨリシテ起ル傳聞ハ過ナルニ

然レ凡已ニ其素傾ヲ有スル人ハ其病者ト集居日房ヲ避  
ケ其排泄物汗大便ヲ嗅クヲ禁ス

〔乙〕呼吸器ノ病産結節ノ原因トナル者ヲ論ス肺中一病ア

レハ則變シテ忽チ肺結節トナル者アリ或ハ此力為ニ肺  
一變シテ以テ結節ヲ免ル、者アリ

氣道ノ急性聖京候及廢スル者或ハ其志進ト魚尾治法ヲ  
怠ル者ハ結節ヲ變出ス

氣道ノ流行聖京候百日咳カカト云フモ結節ノ諸因ヲ致  
ス氣管支慢性聖京候ハ結節腫ヲ免レシム

肺ノ血積殊ニ其度劇甚ナラスニテ及復シ来ル毎ニ一部  
ニ限ル上葉者ハ結節ヲ致ス



肺房溢血其血凝結レテ肺中ニ止ル者結節ヲ誘發ス  
肺嫩衝候ニ結節ノ原因トナル是レ嫩衝ノ産物吸尽セス  
其処ニ鬱積レテ以テ結節物ニ変スルナリ  
肺気腫ハ結節ヲ免レシム即チ之ヲ免レシムルヲ能ハサ  
ル肝ニ能ク其勢ヲ制ス  
胸膜嫩衝其膜相合接レテ成形産物ヲ多ク致ス者ハ其物  
動モスレハ結節ニ変レ終ニ肺中ニ蔓延ス

病理論解剖論才二

肺中結節ハ何ノ為ニ生スル乎未タ知ルハカラス夫此物  
血中ヨリ直チニ生スル耶將、脉壁ヲ滲徹レテ以テ成ル耶  
抑脉管ヲ破裂レテ以テ肺箇中ニ出ル耶姑ク舎テ論セス

凡此物ヲ肺箇中ニ産出スレハ則肺結節ナルヲ知ル將ニ  
之ヲ成サントスルニ方テハ必先益内血積ヲ致ス猶尋常  
血積ノ産物ヲ成ス力如シ然レモ又血積ヲ待タズ肺中自  
結節ヲ産成スル者<sup>血虚ニシテ</sup>アリ然レハ則其原血  
質ニアリテ血中已ニ結節毒ヲ含蓄ス之ヲ名ケテ調結節  
血質ト曰フ筈レモ其虚名ニシテ其實ナク格物舎密ノ二  
術ヲ以テ之ヲ見ルヲ能ハス是ヲ以テ其判策ヲテサレ間  
ハ調結節血質者ハ結節毒ヲ泌出シ易キノ意ニシテ体中  
已ニ結節物ヲ産出スレハ此血質愈多ク而レテ發熱ハ此  
ヲ催進セシムルノ謂ナリ  
結節物ハ白色柔軟ナリ初ヨリ此状ヲ成ス者ニ非ス病者



若死セ<sup>バ</sup>必出物吸収セス又化膿セス而シテ其体格血虚  
ニシテ衰弱シ若クハ过量ノ瀉血ヲ施セハ則終ニ漸ク其  
本性ヲ成ス者ナリ而メ肺中一モ之ヲ生セサル処ナト  
虫凡殊ニ肺尖ニ多ク肺尖已ニ損敗シテ肺底ニ及フ者之  
所謂砂粒結節ナル者ハ成形滲出物ノ変性シテ成ル乎未  
タ確然タルヲ能ハス然レモ慢性肺癆衝ノ為ニ生スル肺  
底状硬結ノ或ハ其之ニ轉變スルハ必セリ○肺中ニ溢出ス  
ル崩血ノ結節ニ負変スルハ極メテ稀ナリ只假リニ如此  
ノ状ヲ表ス者ナリ結節ハ兩脚ヲ共ニ犯ス下虫モ左右各  
多少アリ而シテ肺尖ヨリ初マリ上葉之ニ次キ遂ニ下底  
ニ及フ時ニハ肺葉ノ一面ニ撒布シ或ハ全葉尽ク侵襲セ

ラレテ而シテ呼吸ヲ為シ得ルハ疑フヘキ者アリ結節ノ  
分界正シキ者ハ肺葉化肝ノ時期ニ方テ滲出物ヲ致ス者  
肺臟壓迫セラレテ結節ヲ成ス者及ヒ速ニ死ヲ致ス者ナ  
リ而シテ其化肝ニ遷ル者ニ在テハ結節下葉ニアリ

結節形状

才一砂粒結節形砂粒ノ如ク或ハ微シク透明ニシテ灰白  
色或ハ堅クシテ透明ナラス帯白黄色ナリ肺中ニ或ハ分  
置ニ或ハ累積ス時日ヲ経ルニ從テ増大シ濃黄柔軟ス凡  
此性ニ急慢アリテ此物ノ肺中ニ堆積スル者アリ或ハ  
他性物ヲ合併スル者アリ  
才二磊磔結節所謂結節物ニシテ豌豆大ヨリ鶏卵大之其



分界正ニク帯白黄色ニシテ正円ナラズ其頂脆薄カクハ  
ノ如ク或ハ乾燥或ハ柔軟ニシテ益ヲ成サズ顯微鏡ニテ  
觀ルニ至少ノ分子顆粒ノ相集リテ成ル者ナリ舎密術ニ  
テ分折スルニカリスストロニテ成リ肝脂ヲ多ク含ム  
才三浸入結節嘗テ在ル処ノ結節ノ周圍ニ生シテ其牆壁  
トナリ或ハ砂粒及礫ノ二物ヲ相連接ス此物分界正ニカ  
ラス頗ル蔓延シテ外状脂肪ノ如ク或ハ傑列ノ如ク或ハ  
惡膿帶赤膿ノ如ク○此物肺ノ多小部ニ浸出シ或ハ全肺  
ニ急ク蔓延シテ急性肺癆ヲ見シ速ニ死ヲ促ス殊ニ  
幼壯ノ者ニ多ク發ス

肺結節ノ変状

才一軟化或ハ中心ニ初マリ或ハ其他ヨリ初マリ或ハ數  
処ニ同時ニ初マル嘗テ堅硬乾燥ナル者今白色淡黄ニ變  
ニ漸ク濃黄トナリ軟脆ニシテ終ニ流動シテ膿瘍ニ化シ  
浸入物ノ全体ニ自潰シテ其膿ヲ気管或ハ胸腔内ニ排泄  
ス乃曼性者ハ膿熱ニテ出ルヲ以テ瘍内空虚ニシテ其表  
面滑沢ナリ其周圍ノ肺頂縮收シ其色淡青ニシテ弛緩ス  
或ハ肺房ヲ成サス而シテ結節物尙布置ス急性者結節物  
全ク熱膿セズ瘍状不平ニシテ其内ニ未熟ノ結節物ヲ殘  
ス其周圍未全ク浸入物ヲ致サス○又一大結節物ヲ生シ  
血脉分布シテ之ヲ分界シ數弓ニ分ツ者アリ其熱膿ヲ待  
タズ破潰スル者ハ脉管共ニ破レテ出血ニ以テ死ヲ促ス



ニ至ル〇赤夕破潰セサル膿瘍ハ黄色ニシテ脂ノ如ク取  
ニハ稍赤色ヲ帯フ自潰シテ泄ス処ノ膿ハ或ハ良膿ナル  
者アリ或ハ稀膿ニシテ之ニ雲翳ヲ雜ヘ若クハ汚赤若ク  
ハ褐若灰白帯黒ナル者アリ其膿泄シ尽テ之ニ代ルニ瘍  
内惡膿ヲ以テス而シテ粘膜之ヲ被ヒ其内面時ニハ壞敗  
スル丁アリ

若夫其膿瘍胸膜ヲ破リテ膿ヲ胸腔ニ排泄セハ呼吸ノ氣  
从テ胸腔内ニ通シ以テ劇胸膜焮衝等ノ諸症ヲ續發ス矣  
レ凡如此者希レナリ  
才ニ收縮硬結砂粒結節ノ發大セス却テ縮小硬堅トナリ  
其色帯青灰白或ハ淡黒ノ結節ニ變スル者則是之而メ終

ニ消散ス凡大結節ノ吸收機ノ為ニ減少レ而シテ終ニ硬  
結スルハ未タ其理ヲ知ル丁能ハサル者ナリ

才ニ化石灰尋常ノ變状トス良礫浸入ノ兩結節多ク之

ニ轉ス之ニ轉レハ則害ヲ致サス此物ノ石灰ニ化スル時

ハ軟化ノ初期ニ在リテ而メ滲血微ナリ生機減シ周圍ノ

動搖从テ少キニ由ルナリ故ニ結節ノ半ハ已ニ軟化スル

者ニ其機止シテ終ニ枯燥シ白色砂粒ノ如ク堅キ丁ハ骨

ノ如ク而シテ肺頂ヲ害セス最末ニハ減少消散ス如此天

幸ヲ得ル病者更ニ他処ニ再新ノ結節ヲ致セハ之カ為ニ

不幸ニ陥ル者アリ

才ニ製囊續發ノ焮衝ノ為ニ結節ノ周圍ニ產物ヲ出シ



以テ囊ヲ製シ結節ヲ包ム囊内ノ結節ハ終ニ石灰ニ化ス  
才五癰瘍 瘍面空虚トナリ其内壁坚硬ニ変ニ或ハ粘膜  
ヲ以テ罩被シ或ハ胼胝織ヲ以テ包絡ス而シテ多少ノ氣  
管枝此ニ口ヲ開ク此空門此ノ如クニシテ変セサルヲ數  
年其間ハ此ヨリ膿痰ヲ泌出ス而數年ノ後治ス○此變状  
ヲ得ルハ寔ニ少ナシ只結節微少ナル者ト原因ノ惡液積  
全ク消散スル者ノニ此状ヲ得ベシ

十月廿四日夜

○肺中結節ヲ產出スルハ其感傷ヲ近隣ノ素織及呼吸器  
諸方ト全身ニ致スヲ多シ  
軍 乃処感傷

才一肺感 肺動脈結節物ノ近処ニ及テ塞住シ氣管支動  
脈動脈ヲ合スル者ハ肋間結節ノ近処ニ未リテ新ニ肋間  
ヲ作り其血ヲ肺靜脈氣管枝ニ致ス注カス  
肺頂結節ノ為ニ壓迫セラレ萎縮是ニ蓋シ半ハ脈管ノ塞  
住スルニ由ル其壓迫セラレサレ処ハ氣入テ膨脹ス而メ  
結節ノナキ處初メハ血積ニ終ニ全肺血虛ス○此ニハ一  
脈破レテ出血  
才ニ呼吸器感氣道慢性癆衝ノ状ヲ見ハシ潰爛ス又膿ヲ  
爵積ス時ニハ成形產物ヲ為ス○小氣管枝亦ニ結節ヲ填  
テ大氣管支膨脹ス假膜產物ヲ以テ胸膜ヲ被フ○氣管枝  
核或ハ腫脹シ或ハ浸入ス小兒ノ肺勞ハ此正兆トナシ



才三心之右半時ニハ廣大シテ体中ノ全量血ヲ收納ス

〔乙〕 全身副發状

肺中結節ヲナセハ血質減ス舎密術ヲ以テ血質ヲ觀ルニ  
初メハ纖維素減ス又固成分減ス急性者ニ在テハ黴黑ニ  
シテ凝流密ノ如シ時ニハ脂肪ヲ含シ慢性者ニ在テハ膿  
ヲ混ス凡ソ血質如此變調スルノ外更ニ未タ知り得ヘカ  
ラサルノ性アリテ身体ノ諸方ニ結節ヲ新生ス  
其一腸水脈核脾ニ殊ニ結節物ヲ産成スハ小膵其他洵乙膜  
腎陰処ニ網膜攝護腺ニ致ス  
其二身体ノ脂肪減シ而シテ肝ハ却テ之ヲ貯蓄スルコトアリ  
少一

其三筋肉虚脱シ全身骨立ス

其四動脈系縮小ス

其五胸格扁平ス

其六皮ノ赤色泌出ス

其七皮腎ヨリ消耗分泌ヲ致ス

其八腸胃<sup>殊</sup>大腸ノ粘液流出時ニハ急性胃軟化ヲ生ス

其九肝臓肉豆蔻状ヲ為ス

見忘論才三

全身違和ヲ覺フルコトナク体中病アルコトヲ知ラス又局部  
ノ疾患ヲ表サスシテ肺中已ニ結節ヲ生スル者鮮シトセ  
ス而シテ或ハ自ラ治シ大命ニ終ルコトアリ是レ他病ヲ以



テ死セル尸ヲ解テ證スル処ナリ又内状稍増進シテ一時  
ニ証状ヲ發露シ生ヲ保ツ丁能ハサル者アリ

〔甲〕 各別症

才一病者局処感覺

病者多クハ病際胸中ニ疼痛ヲ覺フ其疼之或ハ如刺或ハ  
如裂或ハ其疼一處ニ牢着ス又胸中違和ヲ覺フ而メ  
病初著シク其後漸ク減ス凡疼処ハ鎖骨下ニ在左一側或ハ西側  
リ時ニハ短助ノ邊ニ在リ中央ニ在ルハ希ナリ而シテ或  
ハ打聽方ノ為ニ其疼著シク増進スル丁アリ又其疼肩背  
膊ニ達スル者アリテ恰モ倭ノ痛ノ如ク又膊ニ不遂忘ヲ  
覺スル者アリ

壓重箱頓短氣忘ヲ覺中度者ニ多ク病初疾歩程小等ニ  
由リテ少シク努力スレハ則此症ヲ發ス而シテ病進云ニ

从ヒ漸ク増加ス是レ気管枝ノ塞住及胸膜肺質ノ及覆嫩

衝ニ由リ其原ヲ取ル者ナリ殊ニ急性結節ニハ短氣症劇

甚ニシテ病者ヲシテ數週間安息セシメズ此或ニ方テハ

病者俯臥スルノ外他ナク若安卧ヲ試シトスレハ其腦

愈一層ス時ニハ病者胸中一種ノ疲憊ヲ覺エ恰モ百斤ノ

重キヲ以テ胸中ヲ壓擽スルカ如ク其状言フヘカラサル

才ニ打聽症

肺復宜シク氣ヲ含ムノ間ハ砂粒及礫ノ結石ヲ生スルト



虫氏其響を交セス然レ凡気結節ヲ通入スルノ代生スルノ代  
ニ及シテハ其響虚ニシテ汚逆ニ唾ス此兆鎖骨下ニ初マ  
ル処已ニ鼓響ヲ生スルコアリ病已ニ進ニテ空洞ヲ為ス  
ニ及ンテハ打鼓響ヲ登ス其洞上囊ニ在レハ裂胸響ヲ登  
ス其響ノ周囲ハ響唾ス

方三聞筒症

結節ヲケレハ其症ヲ聴キ難シト虫氏稍蔓生スルニ及ン  
テハ此ヲ判断スルノ一兆トスハ則鎖骨下ハ左側ニ方  
テ気響絶ニ聞キ得レハ僅ニ他処ハ気響壯盛ニナリ結節登  
大スルニ及ンテハ鎖骨下ニ方テ呼吸気延ヒ或ハ呼吸共  
ニ其響搗カ如シ是レ結節ノ正兆トナスベシ此兆ハ呼吸

殊ニ呼吸疲困スルニ由テ来ル殊ニ鎖骨下ノ処ニ方テ呼  
吸響不存ナレハ則結節ナルコト愈確定スハレ○時ニハ  
結節ノ初期肺炎ニ方テ聖京低志聞ク其響ハ呼吸粗糙ニ  
シテ喘鳴シ又鼓ヲ破ルカ如シ又胸膜嫩衝産物ノ響ヲ聞  
ク其症摩擦ノ如ク破裂ノ如シ共ニ知ラスレハアラス蓋  
レ此両肺炎ニアルハ則結節ニ陥リ易ケレハナリ○大気  
管枝ヲ繞リテ結節物ヲ産出スル者ハ聞筒症又此ヲ確断  
ス乃呼吸吸初メハ只吹鼓ノ響ヲ放ツ初ハ其響弱ク呼吸  
毎ニ放ツ者ニアラス病症増スニ从テ必見不絶ノ兆トナ  
リ从テ其響著シク且朗ナリ而シテ終ニ気管氣息ノ為ニ  
確然ヲ失フ此時ニ方テ其処ニ托テ言語ヲ聞キ得ヘク而



レテ喘鳴アレハ其声著シカラス凡如此ノ響症病初ハ鎖  
骨ノ上下有脾間背腋ニ於テ聞ク而レテ蔓延シ全肺ヲ犯  
ニ及シテ全胸ニアリ響音數○結節洞廣大ニ或ハ肺頂荒  
瘵スレハ言語咳嗽著シク耳ニ忘ス  
肺癆衝胸膜癆衝ノ為ニ気管枝塞閉シ以テ生スル響症ハ  
略異ナリ其餘ニ就テ論ス

才四 咳嗽症

急性肺結節或ハ咳嗽十ク或ハ僅ニ經過スル者アリ慢性  
肺癆モ久シク咳十ク中休息ス至過スル者少シトセスト  
魚尾咳嗽ハ一正徵トナシテ可ナリ凡病初ハ輕クシテ痰  
十ク輕微ノ外傷ニ由リテ起リ殊ニ夜分生ス末期ニ及シ

テ劇甚困窮シテ痊愈ヲ帯フ而シテ朝間夜間甚シク日中  
ハ輕シ或ハ言語疾走ニ由テ増シ或ハ燕下卧位ノ不適ニ  
由テ進ム但シ如此肺ハ一咳只癆スルニ非ス數咳陸續ニ  
来リ半連シテ時ニハ擗撃ヲ致シ以テ窒息吐逆ヲ見ス咳  
音或ハ朗或ハ哑ス

才五 咯痰症

經過中痰汁ヲ咯カサル者稀ニ之レアリト魚尾之ヲ咯ク  
ヲ常トス初メハ寔ニ少ナク又期刻シテ咯ク者アリ○痰  
汁ハ咳嗽ニ乘シテ出ツ又咯出シカタキ者アリ又之ヲ咯  
カントシテ久シク努張シ以テ咯ク者アリ又喉頭ヲ摩刮  
シテ初テ咯ク者アリ凡テ朝起ノ時ニ方テ多ク之ヲ咯ク



其之ヲ出スノ処曰カラス喉頭気管気管枝刺戟焮衝糜爛  
潰瘍シテ以テ出ス処ノ痰汁ハ粘滑澄明ニシテ流動ス時  
ニハ膠固透明ナラス時ニハ膿ノ如ク時ニハ血ヲ混シ尚  
气道軟骨ノ一小部ヲ雜ス其気管細梢肺房ヨリ出ス所ノ  
痰汁ハ血膿織白質ナリ其結節内ヨリ出ス所ノ痰汁ハ  
結節軟化物結節破片内面ノ膿汁ナリ而シテ内面腐死ス  
レハ惡膿ヲ出シ血脉内壁ニ口ヲ吻ケハ血ヲ出シ時ニハ  
肺頂ノ一片離脱シテ痰中ニ雜ハル  
才六 志志  
凡ソ声ハ初メヨリ弱ク濁リテ朗ラカナラス病増ニ以テ  
其症ニ亦増シ終ニ唾ス蓋喉頭聖京候ニ關係シテ噎志ス

若喉致潰瘍ヲ生スレハ声噎漸ク増シ終ニ噎ス  
才七 胸膈結構及ヒ呼吸症動志  
肺結節癸スルニ从テ胸膈ノ結構漸ク変ス病性ニ从テ少  
凡鎖骨上下陷リ胸ノ上辺ノ圍大減シ漸ク扁平狹隘トナ  
リテ稍ニ長ク肋亦垂レ胸圍前後ヨリ握平セル筒ノ如ク  
鎖骨ノ胸骨ニ接スル処頗ル垂レ胸骨モ从テ垂下陷凹ニ  
隆穹ノ形ヲ失フ有尖前ニ傾キ肩脾張りテ翼ノ如シ肋動  
減ス上肋ハ其胸膈呼吸ニ應ニテ張ラス故ニ膏肉ヲ以テ  
呼吸ス○急性肺癆ハ之ニ加フルニ季肋ノ辺肋膨大ス○  
肺結節及膜結節慢性膜焮衝肝臟癸大ヲ合併スル者  
ハ之カ為ニ胸膈圭状ヲ為ス○左右一側ニノ結節ヲ生



スル者 区側多ク一ハ两侧ヲ比較シテ之ヲ證スヘシ則呼  
吸ニ應スル助動ナリ扁平ナル側ハ乃其證トスヘシ○然  
レ凡胸膜焮衝ノ産物等ヲ俟祭スル者ハ上ニ言フ所ノ症  
候ヲ变革ス

才八 脳神症

勞瘵ノ腦ニ一異ノ関涉アリ凡病初ハヒホコシテ性ニ  
レテ慎ンテ本病ニ罹ラシムヲ恐レ專ラ之ヲ防クヲ務ム  
然レ凡本病已ニ發スルニ及ンテハ病状ヲ他変ニ託シ其  
状ヲ人ニ語ルコトヲ嫌ヒ意自ラ本病ヲ信スルト魚尾人ニ  
語ルニ輕微ヲ以テシ略瘥マテモ隱シテ人ニ告ケス終ニ  
咳嗽脱汗不寐等ノ輕易症ハ者做シ春暖ヲ得ヘシ又住処

轉スレハ速ニ全復スルトナス

才九 脊髄症

肺結節ノ全身症ハ脊髄ヨリ出ル者ハ甚々太シ病者未タ  
羸瘦ノ状ヲ顯ハサシル前已ニ皮体ニ大疲勞ヲ覺フルハ  
則此病ノ初兆トナス而シテ病性ヲ論セス初發ヨリ病未  
ニ及フノ間熱ヲ發セサルハナシ通例發スル所ノ熱ハ虛  
熱ニシテ局處病ノ荒瘵ニ應シ進退ス故ニ熱ノ輕重ヲ診  
シテ局病ヲ證シ得ルコトアリ乃或ハ午後或ハ日晡微ニメ  
戰震頭温掌燔動モスレハ夜汗シ易ク其重キニ至テハ肌  
焚止マス脉常ニ數ニシテ夜汗甚シ而シテ發熱モ初メハ  
輕微ニシテ漸ク増進ス午後或ハ日晡暫時ニシテ解ス其



後ハ焚逆連ニテ不止尚増進スル丁毎ニ一二時許而レテ  
其増劇度常トナリ最末ニハ才堪私焚ノ如シ是發焚ノ大  
略ナリ然レ凡又変態アリ胸患ニ先チテ虚焚夜汗ヲ發ス  
ル者アリ又気管枝胃等ノ聖京屈先ツ顯ル以テ焚ヲ生レ  
而メ勞忘ヲ誘出スル者アリ

才十 皮症

面皮初ハ活發ス焚レ凡速ニ変レテ午後ハ赤色トナリ西  
觀玫瑰色ノ赤円班ヲ見ハス中期以上ヲ徑ルニ及ニテハ  
容色灰白ニレテ活發セス發焚成只玫瑰色ヲ西觀ニ呈ス  
肌膚脆薄レテ活セス身焚ノ配当不有ニレテ変レ易ク只  
手掌乾テ焚レ其焚漸ク増レ常ニ湿フテ冷エト肺勞ノ特症  
ヲ

その他症ニ亦皮膚寒冷ニ敏ニレテ又發汗レ易ニ殊ニ夜間  
急症病侵入ニ在テハ殊ニ口困ニ錢癬状ノ疹ヲ發ス病際  
毛髮脱落ス爪屈レ且坚硬ニレテ脆レ皮下ノ脂肪織滅ス  
目陷没ス

才十一 筋肉症

全体ノ筋肉給養不足スルヲ以テ羸瘦骨立ス故ニ体力脱  
亡ス然レ凡絶命ノ時ニ至ル迄稍床外ニ出ル丁ヲナス

才十二 心臟脉管症

脉動數ニレテ九十動以上ナリ蓋シ發焚ノ時ニ於テノ  
十ヲス安息ノ時ニ亦タ然リ又変革レ易ク殊ニ身心ノ感  
傷起立飲食ノ後ハ則チ數トナル○數脉發焚盛極ノ期ニ



及ンテハ百十動ヨリ百三十動死期近キニ在ル者ハ百六十動〇肺勞症又心ノ縮力増加スル者アリ或ハ真心悸ノ動ヲ發スル者アリ殊ニ使役スレハ其跳甚シク以テ此本症或ハ誤認ルコトアリ

才十三 腸胃症

嚥下困難ハ肺勞病ニ見ル所ノ一證ナリ時ニハ咬吞共ニ為シ難ク恰モ物ノ食道中ニ懸留スルカ如シ凡嚥下困難ハ食道潰爛スルニ由ル又喉頭ノ感傷ノ為ニ此ヲ致スコトアリ胃ノ機能初ハ衰ルコトナシ本病稍進ムト魚氏食機盛ナル者ナリ然レモ未期ニ至テ發熱替差スルニ及ンテハ食機欠亡スルハ食物ヲ好シ一タビ之ヲ食而メ或ハ胃症ニ嫌忌ス而メ大渴有而メ或ハ胃症

即チ胃脘痛食機全亡吐氣吐逆等ヲ發ス舌滑亦ニシテ乾キ或ハ褐色ノ厚苔ヲ被ヒ或ハ所ニ剥脱シテ且驚口瘡ヲ生ス是胃ノ体損トナル者乃潰瘍ヲ表スル症ニシテ速ニ死ニ轉ス

下利勞病ニ在テ下利漸ク増ス故ニ下利ハ勞病ノ初徴ニシテ後初メテ止ム者アリ多クハ初メ多カラヌ毎朝二回瀉シ或ハ胃寒肉食下劑ニ由テ動モスレハ慢性下利ヲ誘發シ其下利セサル間ハ通便平ノ如キ者アリ此ニ由テ来ル下利ハ腸中変状ヲ為サズ其下利経久数月ニシテ不治者ハ腸ノ結節腸瘍ニ由ルコトアリ而シテ或ハ之ニ疝痛ヲ兼スルコトアリ或ハ瀉物膿血ヲ雜ヘ又腐敗臭甚



者ヲ放ツ若シ痢急失禁アル者ハ直腸ニ燃衝潰瘍ノ蔓布  
スルノ徴トスヘシ〇時ニハ直腸ノ周囲ニ膿瘡ヲ生シ口  
ヲ直腸内或臀腰ニ開キ以テ膿ヲ泄ス者アリ

才十四 腹膜燃衝症

結節腸瘍ノ漏泄シテ以テ腹膜燃衝ヲ致スハ稀ナリ大抵  
慢性腹膜燃衝ノ症状ヲ見ス乃疼痛ノ有否ニ拘ハラズ腹  
膨大シテ平生用ユル処ノ胸衣緊張ス之ヲ按壓スレハ必  
知覺亢進ス末期ニ及レテハ著シク膨張シ撃試方聞症  
方ニテ腹膜内溢出アルヲ證ス

才十五 尿症

其量或ハ増シテ消渴病人如ク時ニハ尿中糖ヲ含ムトア

リ其他著シキ変状ヲ顯サス

才十六 殖具症

男子ハ淫情盛ニシテ全身諸力消耗スルマテ不休女ハ月  
經不順減少シ時ニハ全ク絶ス

乙 病状経過総論

肺結節至過太夕異ナリ或ハ一二日ヨリ一二週ニシテ已  
ニ死スル者アリ或ハ十年ノ久シキヲ経テホ夕死セサル  
モノアリ

才一 急性肺結節症

肺病ノ症状ト異ナリ急性熱病ニ从テ殆ント才扶思ノ如  
シ幼壯強実ノ人此ニ罹リ易シ殊ニ發育ノ年紀ニ多シ其



原因ハ明メカタシ其症凡ソ冒寒身熱食後卒然トシテ起  
ル或ハ誘因ノ少シモ知ルヲ能ハスレテ發スル者アリ或  
ハ才扶思發疹熱ノ病際ニ於テ起リ或ハ其回復ニ赴クノ  
時ニ於テ起ル時ニハ曾得ルノ創ヲ治スルノ時ニ於テ起  
ル而シテ此病性少シトセス大抵結節病三十人ニシテ一  
人ニ則チ之ナリ  
〔觀尸〕砂粒結節肺腹中ニ摻布ス時ニハ惡露浸入ノ二物相  
雜ハル  
正發症ハ初メ寒戦ス或ハ急ニ短氣シテ増加シ或ハ胸中  
刺痛ヲ覺ハ或ハ全身違和疲勞ヲ覺フ若本病続發ナレハ  
其轉帰漸ク以テ成ルカ故ニ病状著シカラス或ハ日晡熱

ヲ發シ或ハ微少ノ寒戦アリテ回復ノ期逡巡シ以テ復シ  
危険症ニ陥ラントスルノ疑惑ヲ抱ク其他著シキ局処症  
ナリ熱或ハ誓苗ニ或ハ往來ニ脈數ニシテ變ニ易ク疲憊  
太シク頭痛頑固吃逆嗜眠精神ナク好悪ナク輕微ノ瀉暴  
アリ皮膚時ニハ乾燥シ時ニハ汗潤ス舌苔白クシテ忽チ  
乾キ遂ニ褐色黒色トナル大便或ハ頑秘ニ或ハ微利ス又  
此等ノ症ニ兼子テ初メヨリ胸患ノ症状ヲ顯ス者アリ則  
チ短氣息迫乾咳時ニハ痊咳ニシテ稀痰ヲ咯キ或ハ胸中  
刺痛アリ或ハ胸膈穎敏時ニハ血咳ス胸内雜声喘鳴ス而  
シテ空悶ヲ為スニ非サレハ響音ノ確證ヲ顯サス○病末  
ニ及ニテハ疲憊頑神著シク終ニ昏憤シテ死ス死期八十



二日ヨリ才六週ノ間ニアリ○此病ノ生死ヲ論スルニ識  
別ニシテラサルヲ以テ断スルヲ能ハス

才ニ 急性肺勞

〔肺勞ノ諸候〕 羸瘦勞瘵及ヒ胸患悉ク生ス而レテ其至過  
最モ速ナル者ナリ凡之ヲ患ル者ハ父母ノ遺傳ヲ受ケ發  
育ノ年紀結構假リニ実カヲ見フスト虽凡其實ハ脆弱ノ  
体格月至不煩ノ処女産後ノ婦人体格男子ニ奇レキ婦人  
之而メ病ニ發スル丁アリト虽凡多クハ初メ劇甚氣管枝  
聖京俚胸膜嫩衝肺嫩衝時ニハ才<sup>扶</sup>患發疹瘵其他急性<sup>性</sup>瘵病ヲ  
発シ之ニ乘ミテ本病ヲ將出スルナリ 結節三十人ニシテ  
此性ヲ病ム者九人ナリ

〔觀已〕 結節ノ諸物及ヒ荒蕪ヲ致ス  
若夫胸患氣管枝嫩衝肺嫩衝胸膜嫩衝統發スル者ハ其至  
過稍長ク其未稍ニ諸力快方セントスルノ時ニ方テ却テ  
虚勞ニ羸瘦ス每晦潮熱次テ發汗ス○若夫病ニ發スル者  
ハ頑咳ヲ生シ夜間殊ニ甚シク而シテ咯痰ナシ即瘵アレ  
ハ之ニ激血ヲ混ス又咯血ヲ致ス者アリ胸中壓重刺痛ヲ  
覺フ其処ハ胸ノ下辺殊ニ鎖骨下ニ於テ甚シク屢々轉ル  
鈍痛刺痛ヲ苦シハ然レ凡精神怡遠ニシテ只疲勞ヲ覺フ  
ノニ屯音濁リテ語言弱シ食氣衰ヘスト虽凡著シク疲憊  
ニ体格委縮シテ恐懼ス膊懸垂シテ頭前屈ス食後殊ニ身  
熱ニテ面頰頰ル赤ク手掌煩燔シ脉數ニシテ全体ノ状尤



進ス日晡寒戦スレハ次テ発熱シ発汗ヲ以テ終ル今咳嗽  
スレハ咯痰ヲ吐ク其痰初ハ稀淡漸ク粘膠之ヲ得ルト虫  
軽快セス言声漸ク衰ハ羸瘦脱力ルテ増ス発汗後ハ殊ニ  
虚脱ヲ覺フ故ニ午後ハ朝ニ比スレハ稍力アリ微シク勞  
動スレハ発汗淋漓シテ顫震ス常ニ温煖ヲ好シ夜汗ノ後  
ハ殊ニ皮膚ノ機尤進ス而シテ胸患局処症ヲ顯ス下利ヲ  
生ス今発熱替當シテ不止食機減亡大渴不可消右苔アリ  
或ハ赤シ是時胸中ノ浸出物一時ニ増劇シ或ハ舊口瘡謔  
言嗜眠ヲ以テ速ニ死ス其死期才二月ヨリ才十二月ノ間  
ニアリ○此症死スル者多シ然レ凡其病勢ヲ折キ以テ慢  
性症ニ轉セシムルコトセシトセス全治ヲ得ルコトアリ

三 慢性肺勞症

慢性肺勞ハ結節病中最多ク發スル病ナリ大凡結節病三  
十人ニシテ此症ニ罹ル者二十人虚弱人三十以上ノ  
人病ハハ皆此症ナリ而シテ正發次發アリ  
病状初ヨリ甚異ナリ則病者違和ヲ覺エス只疲勞シテ少  
シク羸瘦シ咳嗽咯血胸痛夜汗晚熱ヲ顯ス而シテ是等ノ  
症尽ク駢發スルニ非ズ症少シク進ニ至テ乃是症二三合  
併ス然レ凡症状間歇アリ其症劇度ニ登リ已ニ溶崩症<sup>略</sup>  
下利ヲ得ルニ至ルト虫凡尚間歇シテ数月数年ノ間休息  
ス其休息ノ間ハ夏日ニシテ冬日ニハ顯レ而シテ羸瘦虚  
脱ス而シテ結節ノ軟化スル者排除シ空洞ヲ為スノ間ハ



症状苗連ニ再新ノ結節ヲ産出セサル間ハ休息ス又危若  
ノ病咳下利脱汗咳咯痰止テ他症苗連スル丁アリ又気管支聖  
京一處ノ浸出肺癆瘵脱力咳頭年ニ増加レ本症一時消散スル丁アリ英  
氏主症咯痰脱汗下利年ニ増加ニ發熱漸次ニ増進シ食機  
衰ヘテ終ニ羸削骨立ス如斯危険ニ至ルト魚尾猶回復ス  
ヘキ丁アリ然レ死スルヲ定期トナス其死期ハ一歳ヨ  
リ十二歳ニアリ  
〔五〕肺勞変症至過  
急性肺勞ハ變症ヲ致ス丁少ナリ慢性肺勞ハ病者ノ年齢  
ニヨリテ變症ヲ致ス丁多シ乳兒ハ急性至過ノ症ヲ患ヒ  
副發ノ病ニヨリテ多クハ死ス

稍齡スル小兒ハ他部ノ結節気管枝核脳腸夾核ノ結節症  
ヲ多發ス而シテ肺症判然トナサル丁アリ咯痰ヲ以テ肺  
勞ノ本病ヲ決スル丁寔ニ希ナリ  
老人ハ至過甚曼ナリ胸症及ヒ脱汗下利症ヲ顯ハサズル  
丁アリ然レ死候ノ一二症ヲ必ス見ハス即チ晚熱症咳  
多痰亡食下利頭暈衝ヲ發シ恰モ喉頭勞喉勞トナシ即チ  
肺ノ本症ヲ輕曼スル丁アリ中年ノ男子此ニ罹リ易ク而  
シテ其性中等ノ慢性ナリ病未ニ及ンテ肺症羸瘦著シク  
頭心或ハ肝腦腸ノ或ハ肝腦腸ノ症状拔扈スル丁アリ或ハ委黃病併  
私病ノ為ニ肺症隱匿ニ以テ之ヲ識別シ難キ丁アリ  
初メ劇性ノ間歇熱ヲ以テ肺症亦識別シガタシ規危溼ヲ



用ヒテ三日間ハ其瘳ヲ制殺スルト雖凡速ニ復ヒ再瘳ス  
ル者ハ則チ肺勞トナスヘシ

丁 轉帰

才一 治療全治スル者少シトセス而シテ其人極老ニ至  
リ天命ヲ以テ終ル是レ諸家ノ実験ニ出テ又他病ヲ以テ  
死スル尸ヲ解クニ肺中結節ノ痕跡アル者アルヲ以テ證  
スヘシ  
才二 惡液復生シテ以テ結節毒ノ發育ヲ拒防スル丁尸  
リ然レ凡其惡瘳ハ即チ結節毒ヨリ苛酷トナスヘシ即當  
毒矢ヲ見倍苦ハ如シ  
才三 稍病症進ム者ハ其轉帰ヲ死ニ取ル者多シ而チ其

死スルニ数様アリ即チ或ハ虚勞ニテ生命漸ク以テ死ス  
故ニ病者死期ニ臨ンテハ若悩ナシ或ハ急性症ニ於テハ  
其虚勞急速ナル者アリ或ハ結節必出物出テ気管枝ヲ塞  
住シ以テ煩悶ヲ以テ死ス或ハ肺復ノ多部浸淫ニテ以テ  
死ス或ハ肺氣腫ノ為ニ大煩悶ヲ以テ死ス或ハ血液大  
溢出ニ全身血虚ノ症ヲ以テ死ス或ハ喉頭氣腫絶息ヲ以  
テ死ス或ハ鑽心ニテ気胸腔中ニ入り以テ死ス或ハ胸膜  
焮衝脳腔内溢物アリテ嗜眠ヲ以テ死ス或ハ胃軟化脆  
薄ヲ以テ死ス或ハ腸穿孔腹膜焮衝ヲ以テ死ス或ハ慢性  
腹膜焮衝ヲ以テ死ス或ハ肺壞疽ヲ生シ虚瘳状ヲ以テ死  
ス又時ニハ不虞ノ死ヲ致ス者アリ死後之ヲ觀ルニ其ノ



由ル處ヲ知ル丁能ハス

治方論才四

結節ノ産物ヲ制伏シ或ハ之ヲ分解シ又其惡液ヲ掃除シ  
瘍肉ヲ癒合セシムルハ其力ノ能ク及ブ所ニアラズ或曰  
其剖方法ノ能ク如此効驗ヲ得ルト云其方ハ則チ或ハ瀉  
血或補血強壯或ハ依蘭荅幾那等ノ諸藥或ハ惡心嘔吐  
方或ハ打膿方其他拳クルニ勝ユヘカラス然レモ皆確證  
ナレ○結節病ヲ治スル主方トナスヘキ者ハ精神ヲ安逸  
ニシ五官ヲ慰悦スルニアリ此ヲ以テ死地ニ臨ミ病者  
ヲ回復セシムル丁往ニアラズ  
[甲]素因已ニ顯ハル者治方

頗ル滋養物ヲ以テ身体ヲ強固ニシ寒洗寒浴方ヲ行ヒ的  
雪ノ弊ハ那室ヲ為シ大氣中ニ在ル旅行可ナリニ靜護ニ皮  
膚肺臟ヲ安息シ胃寒温熱ヲ避ケ全体殊ニ呼吸荅ノ努張  
ヲ禁シ精神ノ感激ヲ防ク此方ハ其主治相及スルカ如シ  
ト魚尾其宜シキヲ計リ合用セスンハアラズ職業ニ就テ  
治方ヲ論スルハ身体ヲ勞役スル者ト筋骨ヲ費用セカ  
者ハ共ニ害アリ風雨ヲ冒シ事ヲ作ス者ト常ニ室内ニ安  
居スル者トハ亦共ニ害アリ  
小兒勞瘵ノ遺傳アル頂ハ最モ職業ヲ注意スヘシ而メ思  
慮シテ發育ヲ催進スル莫ク防キ常ニ大氣中ニ在テ身体  
ヲ保固ニスル策ヲ行フヘシ本病將ニ出ントスルノ状ア







サレ者ハ慢性肺勞ニ因レ只時アリテ諸力ヲ制伏スルノ  
治方ヲ推用スルヲ異ナリトス

〔下〕慢性肺勞治方

病発スルヲ見ハ身心ノ努張殊ニ呼吸器ノ激動言語ヲ禁  
ス莫業ヲ休ミ身心ヲ安逸ニ適意ノ住処ニ移リ春秋ハ氣  
候暖和ノ地夏日ハ高燥清氣ノ松林ニ移リ冬日ハ南方ニ  
遊フ又安逸道途ヲ事トスルモ可ナリ航海亦若旅行ヲ好  
マザレハ常ニ衣服運動食餌ニ注意スヘシ衣服ハ十分ノ  
暖服ヲラ子ルヲ要ス頸胸足ヲ冷スヘカラス然レモ厚衣  
ハ區覆ヲ禁ス乃脱汗シテ虚勞スレハナリ運動ハ疲勞ヲ  
覺ヘサルヲ度トシテ毎日逍遙騎馬スヘシ殊ニ晴天ニハ

騎馬ヲ怠ルヘカラス食餌ハ滋味ノ物ヲ良トス但シ飽満  
ニ至ルヘカラス乳汁牛乳殊ニ至当トナス之ニ炭酸鑛水  
セルトセル水ヲ加用スヘシ又依蘭荅榭哥比ヲ兼用スヘ  
シ兼喫療方モ亦可ナリ○寒日ニハ呼吸器ニ注意シ寒氣  
ヲ吸入スルヲ禁ス殊ニ黄昏之行ヲ禁ス○諸症劇發スル  
ノ戒ニ方テハ胸上ノ瀉血ヲ行ヒ貫串打膿方吐酒石發疹  
膏時アリテ効アリ此戒医業ヲ禁スル丁アリ然レモ軟化  
甘味ノ煎菜礪砂惡心方實荳荳利私大ニ効アル丁アリ凡  
ソ其劇發何ニ由テ来ルト云丁ヲ探索スルハ忘ルヘカラ  
サルノ一莫トナス治方ノ規準是ヨリシテ生スル丁アル  
ハナリ



病期稍進、咳嗽留連痰沫多量發熱劇甚疲憊太多脫汗淋  
滴下利數行等ノ志アレハ隘室ニ安護ス然レモ這意ノ動  
搖ハ欠クヘカラス食餌ハ有カノ滋味依蘭苔ヲ用ヒ沃度  
録テール董方「ナプタ」ノ吸入方ヲ試用スヘシ其他鎮症  
手主治トナス此時期ニハ見忘ニ忘レ之ヲ療スルヲ要ス  
〔戌〕 見症治方

病初病未共ニ劇發ノ胸痛ニ注意スヘシ是肺中再新ノ血  
積或ハ胸膜焮衝ノ候トス病者ノ諸力脱亡セサレハ局処  
ノ滙血ヲ行フテ其疼ヲ抑制鎮撫ス疼痛水アル毎ニ五ノ蛭四六ノ角方  
廣ス疼性頑強ニレテ留連スル者ハ發泡膏巴豆由摩入ヲ  
試ムヘシ晚期ニ及レテ疼痛ヲ制スルニハ鎮症兼無ニシ

兼トナス  
短氣間歇性胸膜焮衝肺焮衝氣管枝ノ塞住ニ由テ来ラサ  
ル者ハ大氣ノ清涼緩和則温濕氣ヲ要ス其劇發スル者ハ  
之ニ兼ヌルニ温蒸方アルコト此ハ並濕揮發液ヲ擦入効  
アリ末期ニハ祛痰劑アルタメ兼甘草飲日服シテ病者著  
シク輕快ヲ覺フルトアリ  
咳嗽ヲ全ク壓絶スルハ医業ノ及フ処ニアラズ然レモ其  
痙性ナル者ヲ輕覺ニ得ヘシ則皮膚ノ反對刺戟温覆鎮症  
兼ニル子青酸液ナリ之ヲ用フル方晩ニ方テ其  
大量ヲ行ヒ日中ニハ之ヲ止メ以テ其兼能ニ慣カラシム  
○咯痰其甚微ナル者ハ之ヲ催シ其過多ナル者ハ之ヲ制



不過多十レハ虚脱レ易ク甚微十レハ困難ヲ生レハナリ  
之ヲ催進スルニハ温茶甘草飲少量ノ安鎮劑硝酸ナリ之  
ヲ制伏スルニハ寒温ノ香麝氣松依蘭荅煎汁ホレトカラ  
遠志硝酸鉛硫酸鉄コロソル石灰華寧等ナリ  
〔咳血〕安護殊ニ言語咳嗽ヲ禁ス渚カ脱亡セス而メ咳嗽血  
頑固ナル人ハ全身弓所ノ瀉血食塩酸飲汁ニ硫酸ヲ加ヘ  
共フ鎮痙羊護見比温蒸沃私青酸実芟荅殊功アリ  
〔咽喉困難〕ニハ頑ヲ温度ニ言語努張ヲ禁シ温氣中ニ保  
護ス初期ニハ水蛭末期ハ及對刺戟而レテ常ニ茶飲ヲ以  
テ口中ニ湿润ス  
〔發熱〕初メ消石硫酸実芟荅ヲ用ヒ胃ノ充滿ト刺戟ノ飲料

トヲ禁ス末期ニ至テハ諸藥効ナシ  
〔脱〕清凉ニ保護ス但シ胃寒ニ注意スレニ硫酸鉛糖ノ内  
服油脂アルコソル劑ノ擦入忘ス  
〔胃疾〕軟化食餌後性鎮痙羊硝炭酸ヲ含ム藥劑ヲ用ヒ胃ニ  
不可ナル諸藥ヲ禁ス  
〔下利〕初メハ粘滑油質ノ乳劑格倫僕煎的忘ノ食餌下利並  
連スル者ハ謨兒比温吐根量鉛糖番木鱈越幾斯羅荅尼糊  
汁ニ阿片ヲ加ヘ或ハ硝酸銀ヲ加ヘテ灌腸ス版上ノ香麝  
菴方是ナリ  
〔慢性〕敗膜嫩鷹初メハ頑膏ノ擦入水蛭晚期ニ沃篤膏的列  
並ノ擦入緩軟ノ食餌而メ常ニ大便ニ注意シ軟化吉里私



的児ニテ之ヲ疏通セシム  
〔月経閉塞〕通例ノ通徑剖然レ凡慣<sup>慎</sup>ニテ病体ヲ虚脱セシム  
ヘカラス

〔虚脱羸瘦〕ニハ宜ニク滋養シテ消化シ易キ物殊ニ新乳汁  
重肉羹汁依蘭荅ヲ用ヒ乳鉄沃鉄ヲ戒慎シテ行フヘシ  
〔眠瘡〕卧位ヲ轉シ的当ノ位置ヲ為シ血積猶留連スル間  
ハ香竈アルコトル割ノ擦入鉛硬膏已ニ破潰スル者ニハ  
鉛膏方及鉛軟膏櫛皮剪等ナリ

時は慶應紀元龍輯乙丑夏閏五月下浣  
東濃高邑堅貞  
託於伊豆國細代人相磯敬三子勝之寫料  
梨屋主人禮谷勝麻侶識  
金壹朱也敬三子即順堂社中云爾  
昔齡二旬又弋

# 弟扶私發病原證及治療



弟扶思癸病原症及治療書

日本北總佐倉 舜海 佐藤尚中 重譯

此書ハ獨乙人<sup>ウ</sup>ントルリフト云醫士ノ著原本五冊補說  
一卷千八百四十五年ヨリ千八百六十年ノ間ノ著述西洋弟  
一ノ醫書今年五月 我邦ニ舶載

第扶思病ハ即溫疫ニノ所謂神經熱ノ一種トナシ從來處置  
セル者當今ノ醫風ヲ以テ見レハ雲泥ノ相違アリ



弟扶思癸病原症及治療書

原由論第二

弟扶思熱ハ多ク顕ハル、急性病ノ一ニ其癸スルマ原由ヲ  
 知ル下克ハサル者アリト雖氏然レ氏多クハ原由アリテ而  
 メ之ヲ癸露スルモノ之  
 幼若ノ者殊ニ此病ヲ患フルノ素因カリ凡ソ小兒已ニ之レ  
 ヲ患フルト虽氏五歳以下ハ鮮シ五歳ヨリ漸ク之ヲ患フル  
 者多ク十歳ヨリ廿五歳ノ間頗ル多ク二十五歳ヨリ三十  
 歳ノ間ハ愈多シ三十歳ヨリ漸ク減シ凡四十五歳ニ至テハ  
 之ヲ患ル素質粗消ス故ニ独癸症ハ此ノ年齢ヨリ高年ニ至  
 レハ癸スルモノ希ク然レ氏流行症ハ高年ノ人ト虽氏又感  
 シ易シトス凡ソ幼若ノモノハ渾テ此病ヲ患ヒ易キノ素質  
 ヲ備フルト愈多ク齡長スルニ及テ愈減ス故ニ老人ニ至レ  
 ハ粗消ストイエ氏病度ノ輕重ヲ論スレハ及テ愈危シ○男  
 女ヲ以テ其多寡ヲ論スレハ男子之レニ羅ル下多シ身体全

日本小兒科會報 昭和 大森尚中 重刊  
 弟扶思熱病原症及治療書  
 原由論第二



備ニメ有力康健ノ者ハ之ニ罹リ易ク之レヲ患レハ重シト  
ス虚弱病身ノ者ハ之レニ及セリ。貴賤ヲ以テ論スレハ卑賤ノ  
者多ク殊ニ勞役メ往食不足ナル者尤モ多シ殊ニ軍陣后之  
レヲ患ヒ易シ故ニ軍后ハ此ノ病或ハ獨癸シ或ハ流行ス然  
レ氏富貴ノ者亦精神ヲ怒張シ困苦ノ為ニ終夜眠ラサルカ  
如キノ事故アレハ之レヲ患フ又恐懼此ノ素目トナル。急ニ  
攝生ヲ変之居所ヲ移セハ則チ此病ノ原目ヲ致ス把列私ニ  
於テ証拠スル所ニメ又疑フヘカラス外国人ノエ類此ノ地ニ  
来リ弟扶思ニ感ス其病時ハ轉居弟三月ヨリ弟三年ノ間ニ  
アリ而メ其ノ病性常ニ尤モ危峻トス。下劑ヲ用ユレハ攝  
生其ノ他良善ト虽モ此ノ病ヲ誘出スルヲアリ  
此ノ病獨癸性鮮ク流行性多シ一地方ニ癸シ或ハ一國一都  
會ノ一部ニ癸シ尚ヲ大家ノ一方ニ癸シ而メ病勢盛衰アリ  
テ或ハ減シ或ハ増スト虽モ終ニ絶エザルヲアリ又健全無  
病ノ地ニ於テ此ノ病卒然トシテ癸露シ數月數年ノ間絶エ

ス或ハ此ノ時ヨリメ全国ニ蔓延スルヲアリ此病ノ流行性  
凡土性ノ因テ起ル所以ノ理ハ未夕之レヲ究明スルヲ克ハ  
ス然レ氏或ハ其状態ヲ推シテ之レヲ察シ得ルヲアリト虽  
凡皆臆断ニメ恐ラクハ其真理ヲ得難シ只流行性ノ原目ト  
ナルモノ疑フヘカラサルヲアリ則隘処ノ人口填咽弟扶思  
病者ノ輻湊殊ニ空氣不潔ニメ身体汚穢ナル者獸植腐壞ノ  
蒸氣惡食惡飲濕氣夏時ニメ寒冷冬日ニメ湿润南風西風ノ  
連綿滌直シテ止マサルモノハ三ナ弟扶私ヲ流行蔓延セシ  
ムルノ因トナル大都會把列私ガ印子グレンセシハ四季間  
断ナク劇甚弟毘私流行ス軍后守城囚人舟中凶歲病院等ニ  
於テハ嶮惡弟扶思ノ流行スルヲ觀ル間歇熱流行スル地方  
ハ弟扶思希ナリトス  
弟扶思ノ傳染スル所以ノ理ハ究明セスニハアルヘカラス  
或ハ之レヲ断シテ傳染セサル者トナシ或ハ傳染スル者ト  
シ或ハ之レヲ二種トナシ一ハ以テ傳染シ一ハ以テ傳染セ



カルトナセリ赤夕其間ニ確断スルテ克ハス。然レ氏之レ  
ヲ視ルニ两性アルカ如シ其ノ傳染セサルモノハ則チ医士  
看護人ノ如キ病者ニ親接メ皮膚ヲ診シ兩便ヲ觀ルト虽氏  
少シモ沾染セス其ノ傳染スル者ハ軍卒弟扶思ノ難症ノ如  
シ其ノ一隊皆流行スルモノハ傳染毒<sup>ハ</sup>リ故ニ医士モ亦往  
々其ノ毒ニ觸レテ死ヲ免レサル者アリ今猶ハルランドカ  
ラスゴウエジンビュル<sup>フ</sup>コンド<sup>ン</sup>北アメリカニハ弟扶思極  
メテ流行シ看護人灌衣母屬吏ニ至ルマテ免ル<sup>レ</sup>テ克ハス  
故ニ一旦曾患ノ醫師ニ非レハ其ノ任ニ當リ難ク病性苛烈  
ニ至テハ病院ニ尋問スルモノト虽氏亦此病ニ感ス是レ則  
傳染スルノ兆トナスヘシ。所謂獨癸弟扶思ナル者モ亦或  
ハ傳染性ナキニ非ス是實驗ニ由ルニ確然トシテ疑フヘカ  
ラス小室ニ弟扶私ノ病者數人駢卧スレハ自ラ傳染毒ヲ釀  
シテ之レヲ他人ニ傳フ又人以此ノ素因アリテ而シテ曾テ神  
經病ニ罹ラントスルノ恐懼ヲ抱キ之レヲ避ケントスル心

常ニ絶エサルモノ弟扶私病者ニ親接スレハ立口ニ其毒ヲ  
感受ス然ラハ則チ弟扶私ノ性本ト良善ニメ獨癸ト云フト  
虽氏之レヲ他人ニ傳フルニ及ンデハ傳染性ナシト云フヘ  
カラズ。茲ヲ以テ此ノ病流行スレハ傳染毒アリ其ノ傳染  
毒ナキモ流行ノ時ニ當テハ病ヲ將出セントスル誘引起リ  
テ先ツ顯レテ而メ后其毒之レニ乗スル者トス。○傳染毒ノ  
生スル所以ノ理ハ已ニ言フ如ク分明ナラスト虽氏疾病ノ  
重劇ニ因リ又數人群居シ殊ニ弟扶私病者群居シ空氣温熱  
ノ腐敗湿润ナレハ則チ其ノ毒ヲ釀ス尚且流行弟扶思其ノ  
毒ヲ呼吸器ニ寓スレハ則チ他人ニ傳ヘ易シトス然レ氏其  
性遠キニ連セス故ニ病室ニ離ルレハ之レヲ受ケス病院ノ  
如キハ其ノ病者一隅ニ卧スレハ之レヲ他隅ニ傳エス然レ  
氏其ノ一室ニ満チ或ハ衣服沾染スレハ其毒久シク去ラス  
病院ノ如キハ數年ヲ経ルノ后ニアラサレハ再ヒ病者ヲ入  
レ難シ。○蓋シ傳染ノ其<sup>毒</sup>ハ何物ニヨリテ是ヲ傳フルヤ未タ



其理ヲ究ムルヲ克ハス「ホロ」止、硫酸、硝酸、舍密様ノ功カラ  
致スモノハ其毒ヲ消ス又火薬ヲ敷散シ又嚴寒ア冬ヲ寒ニ亦  
傳洩ノ大氣ヲ驅ルノ功アリ  
弟扶思ヲ感受スル性ヲ減シ且ツ之レヲ去リテ其毒ニ感觸  
セサル者アリ則此病ヲ一旦患フル者 然レモ再感スルモ須  
アノ如シ又妊娠数月ヲ重ヌル者産蓐ニアル者哺乳ノ者肺  
勞胃病慢性皮膚疹癌性惡液瘻ノ如キハ弟扶思ヲ防禦スルノ  
性アリ

此説ク解剖病理ハ然論ニ非ス各病ニ就テ論スル者之  
後本此解剖病理ニ論ナレ偶々此アルモ皆他条ニ於テ  
雜記ス今此ニ論相別レテヨリ医風真理ニ至ルト云

三 体中ノ障碍ヲ明ラムルモノ  
假令ヒ此レアルト云モノア  
リト虽氏信スヘカラス允ソ此病解剖科ニ就テ見ル所ノ變  
易ハ必ス病中露ワル、所ノ症状ニ相應レテ見ル所ノ變  
ヲ察スレハ死后是レヲ細覽スル者トイヘトモ多クハ差ハ  
ス弟扶思ニヨウテ死スル骸多クハ体中ノ諸器ニ障碍ア

リ或ハ必現トナレ或ハ特異トナス其必現ニメ正徴トナス  
ヘキ者ハ小腸及ヒ夾核ダキルケルノ變易ナリ必見ニ  
メ而メ正徴トナレ難キ者ハ氣道ト脾藏ナリ其他ノ諸器變  
易スル者多シト虽皆必見正徴ニアラス然レモ血質ハ特異  
ノ變易ヲ受ルヲ必セリ  
其一腸管及ヒ其ノ所屬ノ妨碍  
咽喉時アリテ潰瘍ス瘍状或ハ楯円或ハ正円或ハ不齊ニシ  
テ保潔セズキ希レニハ粘膜炎ヲ以テ之ヲ覆フモノアリ  
時ニハ粘膜炎下ノ蜂窠織内ニ膿汁ヲ滲入スルモノアリ多ク見  
ル所アリ而メ以テ弟扶思ノ末期ニ於テ死スルモノニ多  
ク見ル所ニシテ食道多クハ咽喉ニ閉シ又眩ニハ其ノ潰瘍只  
胃孔ノ近所ニ於テノミ発ス又其潰瘍無數発シテ食道ノ全  
面ニ分敷シ殊ニ胃口ニ近ヨルニ後フテ愈積密ナル者ナリ  
胃疝ハ弟扶思ニ於テ凡ソ免ルヘカラサルモノトス盲囊ノ  
脈管怒張シ其色暗黒大靜脈モ亦亢張ス○病者十人中六人



別冊  
別冊

其理ヲ究ムルヲ克ハス「ホロ」硫酸、硝酸、舍密様ノ功カヲ  
致スモノハ其毒ヲ消ス又火薬ヲ敷散シ又嚴寒アリ寒ニ亦  
傳染ノ大氣ヲ驅ルノ功アリ

弟扶思ヲ感受スル性ヲ減シ且ツ之レヲ去リテ其毒ニ感觸  
セサル者アリ則以病ヲ一旦患フル者然レモ再感スルモ須  
ヤノ如シ又妊娠数月ヲ重ヌル者産蓐ニアル者哺乳ノ者肺  
勞胃病慢性皮疹癌性悪液質ノ如キハ弟扶思ヲ防禦スルノ  
性アリ

甲 解剖論及ヒ病理論弟三

弟扶思ハ解剖科ノ細覽ヲ以テ体中ノ障礙ヲ明ラムルモノ  
ニ其明ラムル者ハ寔ニ希ナリ假令ヒ以レアルト云モノア  
リト虽信スヘカラス允ソ以病解剖科ニ就テ見ル所ノ變  
易ハ必ス病中露ワル、所ノ症状ニ相應シ症状ヲ以テ之レ  
ヲ察スレハ死后是レヲ細覽スル者トイヘトモ多クハ差ハ  
ス弟扶思ニヨリテ死スル骸多クハ体中ノ諸器ニ障礙ア

リ或ハ必現トナレ或ハ特異トナス其必現ニメ正徴トナス  
ヘキ者ハ小腸及ヒ夾核スダキルケルノ變易ナリ必見ニ  
メ而メ正徴トナレ難キ者ハ氣道ト脾藏ナリ其他ノ諸器變  
易スル者多シト虽皆必見正徴ニアラス然レモ血質ハ特異  
ノ變易ヲ受ルト必セリ

其一腸管及ヒ其ノ所屬ノ妨碍

咽喉時アリテ潰瘍ス瘍状或ハ楯円或ハ正円或ハ不齊ニシ  
テ保滯セズネキ希レニハ粘膜炎ヲ以テ之ヲ覆フモノアリ  
時ニハ粘膜炎ノ蜂窠織内ニ膿汁ヲ滲入スルモノアリ多ク見  
ル所アリ而メ以て弟扶思ノ末期ニ於テ死スルモノニ多  
ク見ル所ニシテ食道多クハ咽喉ニ閉シ又眩ニハ其ノ潰瘍只  
胃孔ノ近所ニ於テノミ発ス又其潰瘍無數発シテ食道ノ全  
面ニ分敷シ殊ニ胃口ニ近ヨルニ後フテ愈稍密ナル者ナリ  
胃疝ハ弟扶思ニ於テ凡ソ免ルヘカラサルモノトス盲囊ノ  
脈管怒張シ其色暗黒大静脈モ亦亢張ス○病者十人中六人



ハ胃ノ粘膜軟化ス其ノ状小斑ノ如シ殊ニ盲囊ノ辺ニ於テ  
多シ其色変シテ或ハ黯黒トナリ而シテ分界正シキ者アリ凡  
以ノ軟和ハ弟扶思ノ經過激進シテ時日ヲ移サス死亡スル  
者ニ於テ見ル其軟和スル所以ハ熱ノ為ニ溶化スルニアラ  
ス是暑寒ヲ論セス癸スルヲ以テ証スヘシ○胃中ニ潰瘍ヲ  
生スルハ希ニ若シ之ヲ癸スレハ小ニナリ或ハ楯田ニ  
メ辺縁正シク浸入物胃ノ粘膜贅肉状ヲ為シ攢簇ス以ノ疔  
弟毘私病三分ノ一ニ居ル而シテ之レニ軟化ヲ兼併ス其ノ贅  
肉胃ノ全体ニ生スルアリ或ハ尺胃ノ上口ノ近旁ニ生  
シ其ノ全面ニ攢簇シ恰モ之レヲ以テ被包スルカ如キハ乳  
頭状吸収管尖粒ホリリノ腫脹スルニ而シテ其状ハ三周ヲ經  
ルノ后死スル病者ニ於テノ見ル所ニ  
小腸ノ變易最モ多シ小腸ノ上部ハ變易スルト少ナシ十二  
指腸ハ愈鮮ニ但症如其ノ變易スル所ハ空腸ト回腸トニアリ  
而シテ回腸ノ下半部ハ尤モ多ク殊ニ障膜ノ近傍ニ於テ愈甚

トトス其ノ状次第ニ増加ス之ヲ列序スルト左ノコトシ  
才初期腸管殆シト聖京屈ノ如ク粘膜腫脹シ赤色ニメ灰白  
ヲ帯ヒ或ハ猩紅ノ如ク或ハ紫赤ノ如ク尖粒ヲマキス癸  
大ニ静脈怒脹ス小腸半分ニメ其囊下部ノ裏面ニハ物アリ  
テ粘着ス其物濃クメ膠ノ如ク色灰白ク而シテ下行スルニ从  
テ愈々厚ク小腸ノ障膜ニ接スル所ニ於テハ頗ル厚シ又粘  
膜下ノ蜂窠織ニ血積ヲ致スル尤モ甚シケレハ其ノ所ニ血  
ヲ溢出スルトアリ  
才二期聖京屈性血積去リ只其ノ血積ヲ大尖粒ベールセ核  
其ノ位置腸中ノ膜ノ接連スル所ニ在ル所ニ殘レリ其  
相對スル腸中ノ膜ノ粘膜内ニアリ或ハ楯田ナルアリ其ノ楯田  
所癸大シテ或ハ正四ナルアリ或ハ楯田ナルアリ其ノ楯田  
ナルモノハ腸管ニ應シテ長ク母三兎且ツ太シ其ノ最モ多ク  
癸スル所ハ盲腸障膜ノ近所ニアリ而シテ上方ニ上ルニ从テ  
漸ク減ス其減スルヤ次第ニ減消スルアリ或ハ一頓ニ消シ  
テ截断スルカ如キアリ○此散大血積ノ多寡ニ応シテ大小



アリト虽氏皆一種ノ泌別ヲ突シテ其ノ液ヲ小尖粒其若クハ若クハ蜂窠織中膜下ニ致ス故ニ其知著ク硬大凸起シ根脚細蒂ヲ為ス之レヲ被フ所ノ粘膜モ亦展延緊張シ而シテ其根蒂ヲ箱窄ス粘膜ハ癸大物ニ膠着シ癸大物ハ筋衣實腸ノニ膠着ス坎ヲ以テ見レハ病処ハ粘液下ノ蜂窠織トペールセ核胞トニ在ル之又或ハ更ニ胞内ノソイタイレ粒核内ニ病毒ヲ泌別シ以テ癸大シ小豆ノ如ク胞表ニ累累々突起スルナリ〇此物ヲ癸大ハ硬クシテ其色淡玫瑰赤ノ如ク或ハ帶黃赤ノ如ク或帶黃赤ニメ豚肉鐵質ヲサシ正肉トノ分界正シク辺縁隆起シ中心陷凹ス之レヲ截断スレハ断面光澤アリ〇又或ハ分泌機ノ通甚ナラサル者ハ其所凝結セスペールセ核猶其ノ本性ヲ存シ只軟弱ニシ其本色ヲ失ヒ外面網状ヲ為ス而メ坎ノ所動モスレハ再陷シ易シ再陷スレハ忽チ惡色ヲ顯ス〇腸内混濁帶黃ノ汚汁ヲ爵積ス汁中磷酸塩エビテリム房ヲ含ム

才三期期小腸ノ下半再血積ヲ致ス其ノ米粒更ニ癸大ニ腸繫ノ静脈怒張ス〇今其知ニ芽扶思毒ヲ分泌流注シテ軟化シ其ノ質脳髓ノ如ク又海綿ノ如ク其色灰白淡紅ニシテ知々ニ血ヲ注ク之レヲ被フ所ノ粘膜猶稠厚ナレハ必テ展延シ表面無数ノ小口アリテ恰モ網目ノ如ク展延シ極リテ破裂ス其ノ破裂スルニニアリ一ハ腫ノ根脚ニアリ一ハ中央ニアリ其根脚ニ於テ破裂スルモノハ粘膜猶腫頂ニ粘連シ血路ヲ絶スルヲ以テ終ニ腐死シ痂ニ変シ或ハ乾固メ委凋シ腸内ノ汚汁ニ染テ黄色トナリ終ニ脱落ス其中心ニ於テ破裂スルモノハ粘膜軟化シテ破開シ腫根ニ牽縮ス乃チ腫頂其ノ裂間ヨリ抽露シ遂ニ腸内ニ放在シ以テ海綿状ヲ為ス是ノ期末ニ及ンテ乃チ其物脱落シ大便ト共ニ漏ル而シテ其知ニ潰瘍ヲ残ス允ソ芽扶思毒ハ核ヲ犯スト虽トモ其全質ヲ悉ク潰爛剥脱スル者ニアラス或ハ其一小部ヲ存スルアリ瘍面正円且ツ煩正ナラサルヲ以テ証スヘシ殊ニ其



ノ毒ヲ血中ニ引ク者ニ於テ著シトス。○以テ時期腸内汚物  
ヲ輻積スルヲ愈多ク且ツ之レニ腫起ノ脫離セルモノヲ混  
シ更ニ凡氣ヲ醸シ腹之レカガニ膨脹ヲ孟内ニ落ツ  
才四期所謂弟扶思潰瘍ノ時期アリ前期已ニ生スル所ノ腫  
物脫離シ其瘡痕潰瘍トナル面純潔ニシテ滑澤シ深ク粘膜  
下ノ蜂窠織中ニ入り形或ハ円或ハ楕圓トナリ其ノ周縁ニ  
粘膜猶存シテ瘍底ヲ覆フカ柄ニテ之レヲ拳レハ从テ起キ  
其ノ質脆薄破裂シ易ク其色青赤ニ○又腫物ノ一片粘連シ  
テ脫離セス終ニ乾固メ縮小スルモノアリ茲ヲ以テ瘍面不  
齊トナリ若クハ弯屈シ辺縁或ハ鋸齒ヲナスコアリ  
○右拳ル所ハ本癩病状ノ真像ナリ夫レ感傷ノ廣隘病癩ノ  
遲速經過ノ轉變ニ由テ又其ノ病状ヲ異ニセサルヲ得ス或  
ハ弟扶思ニ由テ生スル所ノ產物僅少ニノ尸ヲ解テ之ヲ視  
ルニ其ノ蹤跡ヲ知り難ク猶疑ヲ存スルモノアリ或ハ其產  
物夥多ニノ獨リ「ペ」ルセ核胞質ニ泌別シテ足ラス其ノ余

勢「リ」リタイ「レ」小核ヲ侵犯スルノミナラス猶粘膜下ノ蜂窠  
織中ニ波及スル者アリ或ハ一回其產物ヲ泌別シ終リテ再  
回泌別ヲ新癩スル者アリ初回ノ間ニアリテハ殊ニソイ  
レ小核内ニアリ故ニ表症之レニ応シテ進退ス凡初回ハ產  
物多ク再回ハ產物少シ或ハ產物ノ癩成遲慢シテ病已ニ治  
癒ニ趣ケハ或ハ流離スルニ違アラス其ノ処ニ附着スル者  
アリ骸ヲ解テ之レヲ見ルニ其時期ヲ論セス產物其処ニ粘  
連スルヲ以テ之レヲ証スヘシ○瘡癩ノ方左ノ如シ  
〔甲〕血積解散スレハ則チ治ス殊ニ其処未タ病毒ヲ泌出セ  
サル時ニ於テノミ之レアリ病勢慢性ナル者ニアリテハ核  
ノ一連特リ以テノ分解ヲ受クヘシ或ハ早期以テノ分解ヲ得テ  
全病悉ク治スヘキモノアリ是實驗ヲ以テ察スルト虽氏未  
タ病理解剖科ニ在テハ其ノ踪跡ヲ視サルトコロニ  
〔乙〕病毒產物委凋吸尽スレハ則チ治ス病初ヨリ滲出物僅  
少ニシテ再回ノ血積ニ罹ラサル前ニ於テノミ視ル処ナリ



治所陷凹シ灰白色ニシテ黒色ノ小点数箇ヲ撒布ス粘膜萎縮  
血液通セス或ハ腸ノ上部ニ於テハ核ノ一連特リ此ノ治  
方ヲ致ス而メ下部ニ下ルニ从テ病愈露シ潰爛ニ至ル者  
アリ

〔丙〕産物脱落スレハ則潰瘍ヲ以テ治ス粘膜ノ辺縁瘍面ニ  
粘連シ終ニ合一シ漸ク薄ク漸ク灰白色トナリ瘍面ヨリ液  
ヲ泌別シ其ノ液漸ク濃ク漸ク堅ク白色ニシテ恰モ沍乙膜ニ  
類ス而メ瘍面ト粘膜周縁ノ凹凸漸ク平坦トナリ其ノ際界  
消シ終ニ粘膜ニ化ス痕ハ治后時日ヲ経ルト虽凡其ノ所猶  
脱薄ニシテ少シク陥凹シ小尖粒ヲナサス然レ凡歳月ヲ経ル  
ニ至テ終ニ凸起シ変シテ小尖粒トナリ数年ノ后ハ少シモ  
其ノ痕跡ヲ遺サス  
凡ソ瘡癒此ノ如シト虽凡然レ凡錯雜ナク一時ニ经过ヲ終  
ル者希ク多クハ核胞ノ一連將ニ瘡ニトスルニ至レハ他連  
ハ漸ク潰爛ニ移ル猶且潰瘍ニ陥ル者ハ其治一方ヨリ始リ

終ニ他方ニ及ホス者ニ故ニ甲所ハ已ニ瘡ニシテ所ハ病毒ヲ産  
出シ丙所ハ將ニ脱落セントスルノ状アリ  
○才毘私潰瘍ノ瘡痕ハ硬結ヲ遺サス又腸ノ狹隘ヲ致サス  
才思私ノ最末假リニ回復ノ兆ヲ顯ハス者卒然トメ病状變  
シ陰悪ニ陥リ即チ死ヲ致ス者アリ其故何ソヤ是才毘私ノ  
變症ニシテ腸ノ本患ニ代リテ他症ヲ將出スル者ナリ其症蓋  
シ才毘私ノ固有症トナシ難シト虽凡他器ニ必ス其毒ヲ致  
シ血液變調ノ表症亦之ニ相應ス  
才思私蜂窠織ニ血液ヲ甚シク迫進シ其所非常ニ過大スル  
モノアリ此ニ由テ生スル所ノ症ハ蜂窠織若クハ腸中特ニ  
肥大スルノニナラス其所出血ヲ致シ腹膜ニ血積ヲ致シ又  
腹膜ニ滲出膿汁形物ヲ致シ若シクハ粘膜及其周圍軟化ス  
産物ノ勢甚シカラサレハ假リニ膜状ヲ化成シテ其内ニ滲  
出ヲナス者アリ其処ハ尖粒胞核ノ周圍ニアリ又潰瘍ノ辺  
縁ニアリ又同時ニ如此ノ滲出ヲ他所ノ粘膜沍乙膜ニ致ス者



アリ時ニハ粘膜下ノ蜂巢織中若クハ潰瘍ノ表面ニ致スモ  
ノアリ乃是カ為ニ潰瘍深ク侵蝕シ又汎ク蔓延シ以テ或ハ  
腸ヲ穿通スルノ媒トナリ或ハ腸ノ慢性潰瘍ヲ変出ス  
又夾核軟化シテ膿ヲ醸シ之レヲ吸<sup>収</sup>管或ハ血中ヨリ傳工  
テ他所ニ膿瘡ヲ致ス其処ハ皮下筋間耳核<sup>其</sup>實ハ是ヲ<sup>蜂</sup>窠織ニアル  
リ等ス

腸中ノ潰瘍持久スレハ其毒曾テ病毒ヲ感受セサル処ニマ  
テ擴及シテ慢性腸病ヲ變出ス乃潰瘍ヲ繞ル<sup>ル</sup>処ノ粘膜鉛色  
ヲナシ軟化シテ痂ヲ結ヒ痂下深ク侵蝕ノ終ニ腸壁ヲ穿通  
ス而シテ口中肺臟胃府皮膚ニ亦壞疽軟化併發ス此症壞疽ニ  
轉スルハ甚希也  
穿穴腸ニ生ス回腸ノ下部盲腸ノ上部ニ之ヲ生ス虫様  
垂或ハ鼠蹊<sup>鼠</sup>蹊<sup>蹊</sup>患<sup>患</sup>者ニ於テ最多シ其始ハ必ス潰瘍ニ而シ  
穿穴ハ潰瘍ニ比スレハ小ナリ即チ大穴ナルモ三レイン以  
上ニ及バズ多クハ至小ニ見エ難シ是必核連ノ潰瘍スル

所ニ非ス他部ノ一旦治セントスル所再潰敗ノ穴ヲナス者  
之多クハ一穴ヲ穿ツニ三穴ナルハ希ニ<sup>口</sup>キタン<sup>ス</sup>スキ<sup>初</sup>  
ノテ之ヲ叢明セリ其生スル所以ハ弟毘私毒ノ侵蝕ニ非ス  
其毒再ヒ變易シ或ハ軟化シ或ハ化膿シ或ハ壞疽ヲ以テ穿  
穴ヲナスニ○腸穿穴ハ弟毘私ニ屢視ル<sup>ル</sup>処ノ一症ニ其時期  
ヲ論セス之ニ羅リ猶假リニ治愈セントスルノ状アルモノ  
ニ於テモ之ヲ致ス○夾核モ亦<sup>ハ</sup>核胞變易ニ志ス初  
度ハ血液充張シ其色暗赤柔軟腫脹ス才ニ度ハ益増大シ帶  
青赤トナリ堅クノ恰モ豚肉ノ如ク其内ニ浸入液アリ才三  
度ハ愈増大シ其至大ハ雞卵大ノ如シ而シテ愈堅ク血液ヲ以  
テ緊張ス其質<sup>質</sup>灰白<sup>色</sup>ニ髓<sup>髓</sup>頂<sup>頂</sup>ノ如ク終ニ柔  
軟トナリ志動アリ蓋シ其内ニ血液溢<sup>出</sup>シテ以テ然ルモノ  
ニ○夾核血液ヲ激進シ其勢劇キモノハ動モスレハ<sup>切</sup>乙膜  
之ヲ感<sup>感</sup>觸<sup>觸</sup>シ以テ腹膜炎ヲ起ス○才四度夾核再ヒ萎縮シ帶  
青赤色トナル而シテ弟毘私復其内ニ在ラス○才毘私經過ノ



右復治ノ更ニ其蹤跡ヲ遺サス平生ノ如シ或ハ萎メ膠ノ如ク其色灰白ナルモノアリ。夾核ノ膿瘡ハ腸膿瘡ニ異ナル

大腸凡氣ヲ以テ著シク膨脹ス病ノ才廿日三十日ノ間ニ死スル尸ニ在テハ殊ニ其膨脹著シク腹ノ前部ニ充滿シ胃之カ為ニ後壓シ中隔ト肝臟トハ上壓セラレテ胸内ニ在リ腸壁薄弱トナラス粘膜筋層及テ稠厚ス而シテ黄屎其内ニ充積ス。粘膜ノ細脉内血液ヲ輻積スル者ハ病者ノ三分ノ一ニ居ル其血ノ積狀一ナラス。粘膜ノ軟化モ亦甚多シ大腸ノ尖粒腫脹潰瘍スルハ必見ノ症ニ非ス其腫脹スル者ハ榛子大ニシテ只大腸ノ一辺ニアルノミ故ニ連属ノ一繞悉ク腫脹スルハ希ク其潰瘍ニ変スルニ及テハ瘍底小凹ニシテ瘍面苔被アリ其性小腸ニ生スルモノ、如ク終ニ穿孔ニ轉シ易キノ性ヲ備フ大腸ノ最下ニ於テハ弟毘私愈ルノ后モ猶下利赤痢ニ変スル如キ潰瘍ヲ生スル者往々之アリ

脾才毘私ニ罹ル者ハ脾増大スルトニ倍ヨリ六倍尚至大ニ至ルモノアリ死期早キモノハ愈大ナリ脾ノ胞衣滑沢ニシテ緊張ス而シテ病ノ経過ニ从テ漸ク其大ヲ減シ萎小ニシテ柔軟トナル才毘私病者四分ノ三ハ脾ノ織質軟化シ時ニハ変ノ流動スルニ至ル脾色モ亦変ス多クハ暗黒褐赤ナリ。或ル証ハ其表面滲出物アリテ色暗赤或ハ淡紅或ハ淡黄其界限正シク赤色暗赤ノ輪廓アリ。肝軟化过大シ血虚ス胆汁多クハ稀薄ニシテ流動シ其色赤シ又濃膠ニシテ其色黒ク胆胞ニ充滿ス或又酸味ニ変スル者アリ。腹膜脉管怒脹シ泌出物ヲ致ス其狀一異ナリ則粘膜ノ血積甚シク其所ヲ穿通シ其血積終ニ沕乙膜ニ及シ以テ腹膜ニ泌出物ヲ致ス之故ニ以テ症ハ織質ヲ軟化シ腸ノ穿通ヲ促スノ媒トナル。其二呼吸器ノ變易



鐸古語  
懸雍垂也

鐸古時ニハ補厚シ時ニハ假膜ヲナシ時ニハ潰瘍或ハ外表  
ニノミアリ或ハ性侵蝕ノ鐸舌ノ周縁ヨリ始マリ軟骨ニ及  
ホス〇喉頭ハ變易ノ一地所ナリ或ハ泌出ヲ致シ或ハ潰瘍  
ヲナシ或ハ壞痂ヲ生ス其潰瘍多クハ左右ノ一側披聲靱帶  
ノ根著スル所ニ生ス形或ハ円ク或ハ不整ニ周匝畸形ニ  
表面至小ニ見ユルト虽氏深ク侵蝕ノ軟骨ヲ侵スニ至ル〇  
會壓軟骨希ニハ浮腫ス則之カ力ニ不虞ノ即死ヲ見ル蓋シ  
多クハ病ノ末期ニ於テ此變証ヲ致ス〇氣管枝黯黑紫赤ニ  
ノ腫脹シ大量ノ粘液傑列乙ニ似タルモノヲ填充ス此症殊  
ニ肺ノ下葉ノ細稍ニ於テ多ク視ル〇氣管核少シク腫レ其  
色帶青赤之或ハ軟ニノ髓質ノ如ク或ハ半流動ノ浸入物ア  
リ如此症狀皆激動スレハ血積勃漲ノ胸膜ニ波及シ以テ泌  
出ヲ致ス〇肺才毘私ヲ病ム者ハ肺臟其卒頃ヲ得ル一克ハ  
ス通例肺ノ後部下下部トニ沉澱物ヲ致ス而シテ其全部ハ膨  
脹ノ其色帶青赤或ハ暗赤ニノ其内ニ血ヲ充テ之ヲ截断スレ

ハ黒血ヲ泄シ又響ヲ放ツ水中ニ投スレハ猶浮泳ス肺胞ノ  
胸膜ハ暗赤ノ大円班ヲ顯ハス凡ソ病者三分ノ一ハ其沉澱  
物化シテ脾臟ノ質ニ變ス其所或ハ暗赤或ハ黒赤ニノ重ク  
水ニ放テハ激クニ沉ム其内血ヲ含ム一少ナク固有ノ彈力  
ヲ失ヒ堅固ス之ヲ截断スレハ暗色膿汁ヲ出シ而シテ氣泡少  
ナシ時ニハ其質化メ脆弱トナル〇或ル症ハ肺ハ臟化脾ノ  
其周縁更ニ顆粒ヲ纏フ其産出ハ蓋シ〇肺房セル肺房ヨリ  
生ス其色帶赤灰白ナリ時ニハ肺ノ多部位化肝ス〇或ハ化肝  
ノ部溶解メ半ハ流動シ褐赤ニノ恰モ班ノ如ク所々ニ區癸  
ス〇肺ノ壞疽モ亦見ル所ノ一症ニ蓋シ此症ハ才毘私ノ復  
變ニ出ルモノナリ尸ヲ解ケハ織質ノ溶化メ惡臭ヲ放ツハ  
則壞疽ノ徵ナリ第毘私癸生后世日ヲ経其間治療ヲ加工サ  
ルモノ死スルニ及ヒ其尸ヲ解テ肺ヲ見ルニ其質半ハ透明  
ニ細微ノ顆粒ヲ生スルモノアリ是レ蓋シチベルケル夥粒ノ病際  
散抹スルカ如キモノアリ是レ蓋シチベルケル夥粒ノ病際

結節



病未若クハ繞病トナリテ生ス経過早キ者ハ決メ是ヲ見ス  
。胸膜囊全ク虚ナルヲアリ又沔乙膜液若クハ赤水ヲ充ツ  
ルアリ又血性ノ泌出物ヲ致スモノアリ

。其三神経系衰易

。胞脊髓衣血虚シ或血充シ或ハ血積ス血積ハ病ノ経過迅  
速ニノ才初期ニノ死スル者ニ於テ見ル所ニ多クハ大静脈

膨脹シ又或ハ著シク膠硬メ其質変セサル者アリ或ハ柔軟

トナルモノアリ末期ニ及ニテハ沔乙液ヲ溢出ス。腹神経

節殊ニ殖器神経叢ハ病初少シク腫レ赤色ヲ放ツ病末ハ粘

膠物ニ化シ萎小ス

。其四脉系及血質衰易

。心臟弛緩軟脆トナリ其状醜ムヘシ四壁薄弱トナリ微シク

膨脹。心ノ內衣及大動脈內衣ハ其色鮮紅或ハ灰白トナル

蓋シ血赤ヲ吸收スルノ度ニ応テ其赤色一ナラス。心胞絡

肝ニハ清水或ハ紅ヲ藏ス稀ニハ成形泌出物ノ膿ヲ混スルノ

物ヲ藏ム

血舎密科病理科ノ検査ヲ以テスルト虽氏今ニ至ル迄才昆

私特異ノ血質ヲ究明スルヲ克ハス只血質亦昆私熱ニ在テ

ハ鐵素ノ量ヲ減ス故ニ刺殺ノ血凝結セス或ハ流動スルニ

至ル之ヲ以テ第昆私病者動モスレハ出血シ易シ又死后尸

ヲ解クニ其血稀淡ニノ凝結セス自沈降シテ床ニ接スル皮

肉間ニ淫流シ以テ假リニ肥大ヲ為ス。或ハ病経過スルニ

从テ鐵素漸ク多シ遂ニ平量ヨリ過ルモノアリ此症ハ肺ノ

感傷殊ニ肺々ヲ病際中発露ス。アントラシム曰病初ニハ血

輪増加ス故ニ頭ノ血積肺ノ壓迫ヲ致シ易シ病末ニ及ニテ

血水ノ蛋白ト共ニ減殺シ以テ血稀淡トナル

其五蜂窠織殊ニ耳核周辺ノ蜂窠織及ヒ皮下蜂窠織感傷ス

其状次ノ症候篇ニ載ス

其六其他ハ表皮之此外本然ノ衰易ヲ受ル所ナシ夫ノ表皮

ノ解部科ノ検査ニ出ル衰易ハ亦症候篇中ニ挙テ以ニ列セ



サレハ其繁ヲ省ク為ナリ  
其七屍状モ特異状アリ早期死スルモノハ肉脱セス皮膚黧  
色ニノ紫斑ヲ数発シ太夕強硬ナラス肚腹膨脹シ蜂窠織緊  
脹ス定期ヲ以テ腐壞ス或ハ稍早キ者アリ○急性重症ヲ以  
テ死スルモノハ羸瘦骨立其肉悪色ニノ紫斑無数ヲ顯シ強  
硬トナラス速ニ腐壞ス○末期ニ及ンテ死スルモノハ其状  
勞瘵ノ如ク血虚乾枯ス時ニ湧乙ヲ滲出ス強硬甚少ク皮色  
光沢ナク弛縦シ或ハ鱗屑状ヲナシテ剝離ス体内熱アルカ  
如シ

〔乙〕 才毘私熱病理論

才毘私熱ハ其本原ノ主症腸恙ニアルカ抑血衰ニアルカ未  
夕判然タルト克ハス夫其重病ニアリテハ腸ノ疾患少ナク  
血液初ヨリ其調和ヲ違ヒ經過中各器ニ其毒ヲ寓シ以テ満  
身ノ疾病ヲ發露スルカ如シ然レモ其中病輕重ノ間ニア  
リテハ独血調ノ違和ヲ以テ之レヲ論スヘカラス表症ヲ以

テ已ニ之レヲ確知スル如ク腸中ノ妨碍已ニ著ク其状聖京  
倭ノ変症ニ同シク固ヨリ腸裡面ノ尖粒感傷ニ以テ病毒ヲ  
此所ニ寓スルニ似タリ之レヲ以テ之レヲ見レハ才毘私熱  
ノ主症トナスヘキモノハ腸中ノ感傷之其状猶急性皮疹ノ  
如ク時日ヲ追テ病際変化シ之ニ加フルニ才毘私固有ノ血  
変ニ由テ脳神ヲ感傷スルト猶急性脳症ノコトク乃此兩症  
相合シテ初テ才毘私ヲ發生スル者ニ然レハ此病ノ主症ト  
ナスヘキ者ハ腸恙ニアルカ將夕血衰ニアルカ未夕判断ス  
ルト克ハス夫血液ヲ解テ之ヲ検査スレハ以テ才毘私毒ヲ  
將出シ得ヘキノ理ヲ推スニ足リ又腸中ノ產物ヲ解テ之ヲ  
究明スレハ此病其処ニ寓發スル特異性アルヲ確証スルニ  
足ル只独腸中產物ノ波及ニ由テ此ノ如キ全身病ヲ發露ス  
ルト云ハ疑フヘシ若夫傳染性ノ如キハ之レヲ他人ヨリ受  
ケ當<sup>時</sup>流行スル病性ニ从テ初テ其本性ヲ發露スルト疑フヘ  
カラス



茅毘私癸成ノ理ヲ論スルニ其原起ハ腸恙ト血調違和トニ  
アリ而シテ悪物ヲ飲食シ或ハ飲食不足シ或ハ害物アリ腸  
中ヲ觸<sup>犯</sup>シ又脳神ヲ感傷シ又流行性傳染毒ノ如キ未解ス  
ヘカラサル感應アリテ以テ此病ヲ癸露ス  
是ヲ以テ才毘私癸成ノ真理ト其特異主症トハ定極スル  
克ハス故ニ表症モ亦弁別シ難キアリ病状極度ニ登ラサ  
ルノ間ハ如何ノ病象ヲ以テ之レヲ才毘私トナシ得ヘキヤ  
夫才毘私生ノ未夕日ヲ経ス其産物ヲ致サ、ル者モ甚微ナ  
リ之ヲ敢テ才毘私ト成シ難シ是其証<sup>ハ</sup>ナケレハナリ只其  
原由ト其治効ヲ以テ僅ニ之ヲ判スル<sup>ニ</sup>又腸中産物ヲナサ  
ス他状<sup>溶崩等</sup>血液ヲ以テ死スル証ニアリテハ只原由証候ノ  
二事ヲ以テ之ヲ才毘私トナスノ<sup>ニ</sup>是其本原ヲ究ムル<sup>ト</sup>克  
ハサレハ之ヲ察スルニハ其状態ヲ見ルニアリ当时  
癸スル所ノ流行蔓延及ヒ顯症ノ同類及其必顯トナスヘキ  
症候ヲ見ルヘシ故ニ各症ヲ見テ之ヲ診メ此病才毘私ニ屬

スルカ將夕不屬乎ハ果斷ニ非レハ克ハス才毘私<sup>ニ</sup>症ニ  
確徴トナス可キ者ハ則腸中ノ滲出物ナリ此物大抵病ノ才  
ニ日ヨリ才八日ノ間ニ始マル只幼少ニ<sup>テ</sup>諸カ充張<sup>ニ</sup>曾テ  
無病健全ナル者經過中性ナレハ才八日ノ間ニ滲出物全ク  
癸ス若夫腸中ノ滲出物血調ノ變易ニ出ル者ハ其癸成甚カ  
ラ<sup>ス</sup>其障碍モ亦著シカ<sup>ラ</sup>サルヲ以テ恐ル、ニ足ラス然<sup>レ</sup>氏  
其他事ニ出ル者ハ滲出物<sup>過</sup>饒ニ<sup>テ</sup>障碍モ亦從テ著シク之  
カ為ニ血虛<sup>シ</sup>若クハ其器<sup>腸</sup>ヲ劇傷シ變メ惡膿トナリ近隣  
ノ蜂巢織ヲ荒敗シ危<sup>ニ</sup>陷<sup>リ</sup>動<sup>モ</sup>スレハ治シ難キニ至夕  
ル  
急性滲出物ハ血積ノ症候ヲ顯ハシ其質液汁ニ<sup>テ</sup>器ヲ成シ  
難シ故ニ大便ニ混シ常ニ漏泄ス核屬ヨリ滲出スル物ハ少  
シク成ノ質アリ<sup>〇</sup>巴ニ滲出物ヲ成ス右ハ病良性ナレハ血  
積自<sup>ラ</sup>減ス然<sup>レ</sup>モ其滲出物<sup>其</sup>処ヲ刺戟スルヲ以テ復ヒ血  
積ヲ催シ竈透メ滲出物ヲ剥<sup>脱</sup>ス而<sup>シテ</sup>潰瘍ヲ<sup>起</sup>ス此状ハ



是單性ニノ良善純存ノ經過トナス凡腸面ノ剥脫ハ其外表  
ニノミアリ而ノ剥脫ニ易ク剥脫スレハ之ヲ漏泄スル道  
路濶大ナリ腸壁ノ深处ハ病ニ染マヌ故ニ腸症ハ危陰トナ  
スヘカラス尚病極度ニ升ルト虽氏治シ得ヘシ然氏以單性  
病ニ他事ヲ合併スルモノ屢アリ之カ為ニ腸病ニ憂ス但合  
併症アレハ毎ニ必危篤トナス可ラス其尤合併スル症ニメ  
危陰ヲ抱カサルモノハ粘膜ノ剥脫ナリ廣狹同シカラス之  
膜症若假膜ヲナシテ腸ノ内面ヲ被包スルモノハ危篤一合  
併病トナス然レ氏幸ニメ希ナリ又胆汁分泌ノ妨碍ヲ合併  
スル者アリ併病ハ本病ヲメ危陰ニ陥ルト少シトセス不  
虞ノ死ヲ致スハ多クハ是ニ関ス故ニ才昆私ノ死ヲ視ルニ  
腸中ノ本病既ニ治スル者屢ニアリ  
。弟昆私病者其毒ヲ各器ニ致シ而メ其処頗ル侵淫セラル  
、者ヲ左ニ舉ク  
腸及ヒ其所屬ノ諸器腹膜中血積ヲ致スヲ以テ其処變メ或

ハ軟化シ或ハ溶解シ或ハ終ニ穿穴ス而メ病老期ニ及テ再  
新ノ血積劇甚ナレハ病者之ニ堪エルト克ハス劇甚出血慢  
性腸瘍諸腸ノ疝膨脹劇ニ腸夾ノ軟化化膿及其萎縮才昆  
七虛勞ニ補益ルニ脾胃ノ軟化ヲ致ス腦ヲ侵淫スルモノハ希  
ニ其処ノ血積泌出虚憊ヲ致ス  
肺及氣管ヲ侵淫スル者ハ頗ル多シ其処或ハ膠痰鬱積ノ之  
ヲ略クト克ハス或ハ沉降物侵入物ヲ生メ水腫ヲ生ス此症  
忌クハ血虚ニ由テ生スル者ナルヘシ  
喉頭ヲ侵淫スル者多クハ披声靱帶ノ潰瘍水腫ナリ之カ為  
ニ卒然トメ其処ニ血積ヲ生シ僅ノ事故ヲ以テ激動シ化膿  
壞疽ニ轉ス  
血竇ヲ侵淫スル者血液ノ本原ヲ變スルハ固ヨリ其一事ヲ  
以テ死スルニ足レリト虽氏病際又變化メ危証ヲ生出不然  
氏再度ノ憂易ハ必確明ナル者ニ非ス允テ病際中血液メ憂  
化スルハ血虚洩乙性惡液虚勞ニ出ツ其因ハ滲々ノ過饒及



病蔓延スルニ其間補益滋養ヲ怠リ若クハ病未ニ及ンテハ  
腸夾核萎縮スルニ由ル若シ此等ノ症應時ニ医療ヲ加エサ  
レハ生命危険ニ陥リ不虞ノ死ヲ致ス。血液腐敗ニ變スレ  
ハ亦危険ノ一症トス是症状劇甚ナル者ニ刺戟茶ヲ誤用シ  
精神ヲ感傷シ又腸中ヲ荒癢スルノ猛烈ニメ惡膿ヲ醸シ之  
ニ壞疽ヲ兼併スレハ則發露ス而メ此症ニ繼發スル者ハ血  
液溢出血勞瘵熱軟化壞疽ナリ又布ニハ腸夾核ヨリ膿汁ヲ  
吸収シ之ヲ血中ニ混メ血液中毒ヲ生出ス以テ肺ニ侵入ヲ  
致ス吸骨變耳核周ハ則蜂窠鐵膿瘍ヲ搏シス其理化シ是ヲ  
才毘私ハ顯症頗ル多ク合併症モ亦多シ故ニ先ツ各部ノ症  
状ヲ論シ次ニ病ノ至過ニ從テ各症ヲ合論セントス  
甲 各部症論  
腦 五管脊髓症  
是等ノ各症ハ尤劇發スル者ニ然ル解部家ノ變易ニ關係ス

ル一少ナシ故ニ其理ヲ究メ難シ夫レ解部家ノ検査ハ只血  
虛ノ輕重神經中心ノ枯濕硬軟ヲ知ルニ過キス故ニ只之ニ  
関スル所ノ顯症ヲ察スルノニ其他ハ血液ノ變調及ヒ病前  
病間腦及ヒ五官ヲ感傷スル事故ニ関ハリテ病状ヲ顯ハス  
然ル氏病初顯ハス所ノ腦症ハ血積ノ輕重ニ應シテ進退ア  
リ而シテ老期ニ及テハ混亂スベカラス腦症脊髓症ハ病度ノ  
微甚ニ從テ輕重アルモノ之但シ思フ以テ推シ難キ病アリ  
譬ハ腸穿穴肺冷ノ如キ腦症微ニト垂危險トスルニ足ル  
又腦才毘私脊髓才毘私ノ如キハ他症微ニト虽氏以テ死ス  
ルニ足ル  
。此篇ニ屬スル各症ヲ左ニ舉ク  
頭痛 弟扶私病者之ヲ患ヒサル者希ニ病初ヨリ劇發ス多  
クハ數日間苗連ノ其度増サス衰ヘス又間歇セス少シク往  
来スルノニ如ク苗連スルハ此病ノ一正徵ニメ又他症ノ以  
病ヲ確斷スルヲ克ハサル氏ハ亦頭痛ノミヲ以テ或ハ才



毘私大ルヲ知ルニ足ルアリ而シテ此症痛才八日ヨリ弟  
十一日ヲ過テ初テ減シ之ニ代リテ譫語嗜眠ヲ露ス。以  
病ノ正徴トスヘキ頭痛ハ其性其度其処皆異クハ其痛  
ニ鈍クニシテ或ハ額ニアリ或ハ項ニアリ而シテ増息ナク全頭  
之カ為ニ鈍麻スルカ如シ或ハ其痛鑢刺スルカ如ク額ヨリ  
項ニ達シ或ハ左側ヨリ右側ニ達シ而シテ熱ニ応シテ増進  
ス或ハ頭中壓迫スルカ如キヲ覺エ其状恰モ重物ヲ以テ頭  
蓋ヲ壓スルニ似タリ。是等ノ頭痛弟毘私ニ固有ナル症ニ  
ト虽氏病者曾々頭痛ヲ病ム者或ハ他熱病ノ前徴トナリ未  
ル頭痛ニ異ルヲナシ而シテ弟毘私ニ發スル処ノ頭痛ハ終  
始間断ナク苗連スルヲ以テ是ヲ弁別スヘシ  
精神變革 弟毘私病ハ精神變革ニ虚憊鬱憂考慮動作適セ  
ス其状一異ニシテ難シ外ヨリ之ヲ望メハ察シ得ヘシ  
病者モ亦精神變革スルヲ許フ四肢ノ機動内神ニ比スレハ  
衰ハサルヲ以テ病者尙自芟業ヲ成シ得ヘキト思ヒ敢テ之

レヲ為サント欲スレハ則克ハス是内神疲傷スルノ症ニ強  
テ之ヲ為セハ未全ク能ハサルニ非スト虽氏平日ニ比スレ  
ハ十ノ一ヲモ得ス尚剛氣ノ者ハ病状既ニ發スト垂夜間譫  
妄下利脈数如心湯稍之ニ勝チテ二三日若クハ一二週間事業  
ヲ勉メバニ病床ニ卧スニ及テハ病一時ニ劇進シ諸症陸續  
蜂起ス。然レ通例見ル所ノ者ハ病者速ニ其違和ヲ覺ヘ虚  
憊ノ精神ナク刺衝機増加シテ動モスレハ憤怒スル者アリ  
或ハ万事ニ関セサル者アリ而シテ其状漸ク進ニ危篤ノ神經  
症譫語嗜眠ヲ露ス以時ニ至テハ病者求ムル所ナク及テ  
病者快樂ヲ知ル又絶ス呻吟ス之ニ向ヘハ愉快ト答フ而シ  
愧辱ヲ忘レ貞操ヲ失フ是其大畧ニ而シテ中稍變易症アリ  
病初ヨリ死ニ至ルマテ嘆息號泣ス是疼痛苦腦アリテ為ス  
ニ非ス又千状万態ノ精神變革ヲ顯ハス之レヲ拳ルニ暇ア  
ラズ而病未死セサル者ハ症状長ク苗連ノ或ハ其間ニ断ス  
精神醒覺スルニ及ニテハ殆ント小兒ノ如ク淫事ニ耽リ身



体先復ノ精神之ニ継クト虽氏殆ニト健忘ノ如ク数年ヲ経  
テ治セズ或ハ生涯精神衰弱ヲ遺ス者アリ  
寤寐 才毘私病者ニ在テハ寤寐煩序ヲ得ス寐中半寤シ寤  
中半寐ス其状病初ヨリ顕ル所謂此病ノ前兆ニ故ニ病者寤  
ル寸ハ恰モ寐ルカ如ク其寐ル寸ハ穂カナラズ夢ノ為ニ驚  
起シ又寐中言語シ寐間短クノ精神ヲ養フニ足ラス而メ病  
發露スルニ及テ銳鈍ノ二種ニ分ツ銳者ハ精神常ニ興奮ス  
ルヲ以テ寤寤寤マラス言語ス其真ニ寤ル氏ハ精神及テ鈍  
ク嗜眠スルカ如ク此ヲ以テ精神興奮セラレ其状尚連シ数  
日間熟眠セス病症渾ヘテ尤進スル状ヲ顕ハス者ハ甚希ニ  
而メ悪性症トナス。鈍者ハ常ニ嗜眠状ヲナシ眼終日半閉  
シ而メ熟寐セス又醒覺セズ故ニ外物ニ忘スルノ官能衰ヘ  
テ只之ヲ喚呼スレハ時ニ一夕ヒ醒覺スルノニ寐中夢ミテ  
終ニ譫語ニ轉ス寐中他人之ニ問ハ其答半ハ真ニ半ハ病  
苦ノ解スヘカラサル者ニ一旦之ヲ醒覺スレハ忽チ醒テ昏

睡ノ如ク其寤時云フトコロノモノハ渾テ朝日ノナリ蓋  
シ毎朝暫時醒覺シ其他ハ寐レハナリ若夫病状復ニ趣カン  
トスレハ安眠ニメ其間長ク平日ノ如ク乃精神ヲ養フニ足  
ルハシ而メ寤間長ク且ツ屢ナリ重病ノ如キハ快復ノ時期  
ニ及テハ一周間熟睡スルニ至ル而メ氣力復スルニ從ヒ寤  
時間漸ク短ク寤間漸ク長ク精神活発ス或ハ快復スル后時  
短ク健全ニ復スルノ后尚眠ニ就クモノアリ  
譫語 譫語ハ悉ク癡スル者ニアラス尚死証ト虽氏之ヲ癡  
セサル者アリ多クハ一二日一二夜間尚連ス而メ時期ニ後  
テ異ニ病ヒ未夕全癡セス病者日中一二時ハ床ヲ高レ事ヲ  
取ルト虽氏夜間眠リニ就ケハ乃チ譫語スルヲアリ允ソ譫  
語ハ腸中才ニ回ノ血積ヲ以テ病症險惡ニ進ムニ及ニテ癡  
スルヲ常トス又希ニハ考慮速ニ變換シ其變換ニ從ヒ譫語  
スルモノアリ而メ其譫語スル所多ク日常作スル如クノヲ  
云フ又貞烈ノ者ト虽氏淫吏ヲ語ルモノアリ是常ニ仰臥シ



血小脳ニ迫ルニヨリテ生ス又病者他人ノ同卧スルト言ヒ  
死者ト枕ヲ同フスルト言フ是レ惡徵ノ一症トナスヘシ又  
戶外ニ出ントシ或ハ房中ヲ廻リ間ヲ看テ適出セントスル  
ノヲ云フ又牖戸ヨリ躍下セントスルノ状ヲ云モノアリ  
。才毘私病ニ発スル謔語ハ多クハ靜ニメ或ハ自語シ或ハ  
人之ニ問ヘハ不解ノ語ヲ述ルノミ又謔語間断ナク其語明  
了ナルモノアリ或ハ喃々ナルモノアリ又希ニハ謔語猖獗  
ニシテ惡ムヘキ者アリ  
望觀症 眼膜赤色ニシテ脈管膨大ス時ニハ面状鈍<sup>麻</sup>ニシテ昏  
睡状ヲ顯シ眼光ヲ失ヒ死前ハ角膜混濁ス瞳孔初ハ縮小シ  
終ニハ潤大スカラヘス<sup>人</sup>云瞳孔常ニ縮小スルモノハ危險  
ノ症トスヘシ耳中病末ハ膿瘡ヲ生シ膿ヲ洩ス  
自覚症 五官ニ顯ル者ハ緊要症之病初ヨリ物ヲ見ル<sup>ト</sup>分  
明ナラ<sup>ス</sup>事ヲ判断スル<sup>ト</sup>克ハス臆想相混雜シ目眩シ朦昧  
ス耳心<sup>操</sup>擾ヲ覺エ又其内小響ヲ覺フ睡中<sup>眼</sup>目ヲ閉合ス光

輝ヲ見之カ為ニ驚起シ曰ク豈雷<sup>目</sup>目視スル<sup>ト</sup>ニナラス之  
レニ志スル響ヲ覺エリト云光氣躁擾曲音<sup>号</sup>泣ノ知覺銳ク  
ノ之ニ觸レハ疼痛ヲ覺フ。病進メハ愈其知覺劇シク耳目  
少シモ安キ<sup>ト</sup>克ハス久シク尚連シ終ニ昏睡ニ陥ル。又内  
耳劇痛ヲ訴ヘ其痛次才ニ増進留連スレハ内耳炎ニ轉スル  
ノ正兆トナスヘシ老期ニ及ニテ其耳痛或ハ自ラ去ル<sup>ト</sup>ア  
リ。病著シク險惡ニ進メハ五官ノ知覺外物ニ感応スル<sup>ト</sup>  
銳ク光氣躁擾ニ堪ヘ難シ是惡徵ノ一症トスヘシ。快復ノ  
兆顯ル<sup>ト</sup>ニ及テハ五官ノ知覺漸クニ往日ニ返リ鈍<sup>ト</sup>廣<sup>ト</sup>ナ  
リ数年ヲ経ルノ后初メテ平生ニ復ス或ハ生涯復セサルモ  
ノアリ  
面貌 其前兆時ハ容<sup>色</sup>著シク弛緩シ常ニ眠ヲ催シ一種痴  
呆ノ状ヲナシ眼光ナシ其發熱時ニ及ニテハ其状消シ及テ  
活淡トナリ赤色ヲ放ツ<sup>ル</sup>或ハ<sup>者</sup>赤<sup>子</sup>眼目炯然ナリ然<sup>氏</sup>其間  
短ク<sup>以</sup>状ヲ發スル<sup>ト</sup>希<sup>ク</sup>凡<sup>以</sup>病ハ他病ニ比スレハ容<sup>色</sup>早



ク沈衰シ精神ナク苦悩ヲ知ラス其昏睡時期ニ及テハ平常  
安眠スルカ如キ状ヲ顯ハス是ヲ喚起スレハ眼中光ナク呆  
然トシテ枕ヲ轉シ又眠ル又中毒ノ如キ状ヲナシ面色慘憺  
或ハ黄腫ノ如ク中毒ニ異ナルナシ只舌上乾キ褐色黑色  
ノ苔アルヲ以テ其中毒ナラサルヲ弁ス又病初頬上多クハ  
ニ血液沸漲ス然レ其色鮮活ナラスノ速ニ或ハ帯褐赤色ノ  
班ノ如ク或ハ帯青赤班ノ如クニ変ス而シテ其斑或ハ面部ノ  
他所ニ顯ルトアリ面状外物ニ関セサルカ如ク只或ハ面  
部ニ皺メ疼痛ノ状ヲ顯ハス○肺恙ヲ兼併スルモノハ面上恐  
苦<sup>懼</sup>ヲ顯ハス小兒ノ弟毘私殊ニ甚シ○腸ノ穿穴壞疽ヲ発ス  
レハ面上一時ニ憔悴シ灰白ニシメ鉛ノ如シ○病状復ノ期ニ  
及ト垂氏尚呆然トシテ小兒ノ如ク其状久シク去ラス  
寒熱症 多ク病初數日間寒往<sup>熱</sup>来<sup>熱</sup>来<sup>熱</sup>而レ氏寒戰ニ至ル者少  
ナシ病進ムニ至テ其往来頻數ニ終ニ熱トナル但其熱灼熱  
ニ至ラス重病ノ極度若クハ快復ノ時期ニ及ンテ或ハ寒ヲ

覺ユルナリ  
脊髄症 脊椎ヲ指ニテ按セハ知覺銳敏ニ是症希ト氏予  
ハ屢々実験スル所ニ而シ病初ニ多ク発ス  
身体一部ノ疼痛症 殊ニ病初ニ多シ身体部分ヲ論セス或  
ハ一部ニ刺痛ヲ覺エ或ハ神経ノ循路ニ從テ之ヲ覺ルナリ  
リ或ハ皮膚針刺スルカ如キ知覺アリ或ハ一部麻痺ニ或ハ  
痿癱スルナリ又厚大ノ筋肉劇痛ヲ覺エ其疼時アリテ發  
歇ス医之ヲ認メ倭<sup>廣</sup>質熱トナスナリ○快復ノ時期ニ及  
テハ疼痛去リ時ニハ強硬ヲ遠スナリ  
筋疲症 筋肉ノ疲労衰弱ハ病初ヨリ顯ル然レ病間之ヲ許  
床<sup>ル</sup>ナシ<sup>中</sup>ニアレハ筋力少シモ脱セス平生ノ如シト思  
ヒ自ラ起立シ或ハ床ヲ離ルニ及ンテ初テ疲憊スルヲ知  
ル謔妄ノ發作中モ又其疲労スルヲ知ラス發作止ムノ后  
著シク虚脱スルヲ覺フ允病者自ラ筋肉ノ衰弱ヲ覺ルハ快  
復ノ期顯ルノ后ニアリ而シテ復<sup>効</sup>スルヲ甚遲シ



鈍<sup>六</sup>症 危<sup>馬</sup> = 陷ルモノ、三鈍<sup>六</sup>ヲ全身或ハ一區ニ覺ユ  
允昏睡 = 陷レハ疼痛ヲ知ラス只疼痛アル所ニ觸レハ其疼  
ヲ面上ニ顯スノニ治后鈍<sup>六</sup>ヲ遺スモノハ甚希之  
運動症 此症ハ神經中心ノ景状ニ応シテ發スルモノト虽  
凡運動ヲ司トル処ノ筋肉中ニ血液ノ充張スル度ノ多少ニ  
ヨリテ又不随意ノ運動ヲ現ス不随意ノ運動ヲ尽ク奉ント  
スレハ廣汎ニ渉ルヲ以テ茲ニ只其一ニ緊要ナル者ノ之ヲ  
列ス假令ハ舌筋ノ運動心ノ跳動腸ノ蠕動機呼吸管納ノ運  
動等ノ如シ凡病者床上ニアリテ其初ハ平生ニ異ナラス一  
目之レヲ弁別スヘキノ兆ナシ然レ其極度若クハ老期ニ及  
ンテハ仰臥之ヲ助ケサレハ次才ニ下床ニ下リ兩股ヲ閑  
ク着<sup>護</sup>者之ヲ責レハ忽起ニ再ヒ其卧ヲ正シクス脱カセサ  
ル<sup>力</sup>又極度ニ進ム者ハ少シク煩躁ニ被衾ヲ除キ兩脚ヲ立  
テ下床ニ下ル。歩行ハ病初ヨリ醉家ノ如ク蹠如ナリ而  
死ニ瀕スル迄正行ニ得ルヲ以テ吉凶ヲ決スルニ足ラス。

病初少<sup>感</sup>感動スレハ悵慄ニ病末ハ一種ノ運動ヲテ空氣  
ニ觸ルモ戰慄ス又一二ノ筋肉少シク牽縮ニ之カ為ニ捷運  
動ス然レ肉潤シ異ナリ又痙攣性ノ運動ヲ發スルヲアリ殊  
ニ流行性ニアリテハ獨癎ノ者ヨリ見ル所アリ○舌ノ運動  
初メヨリ難澁は一ハ乾燥被苔アルヲ以テ之ハ一ハ腦ノ感動  
ニ由テ起ル精神正シキ時ハ舌少シク振動スルノ三然レ病  
者困勞スルニ非レハ之ヲ出シ難シ時期進ムニ後テ其難澁  
増加シ一旦出セハ之ヲ容レ難シ故ニ言語澁滞或ハ全クナ  
ス<sup>下</sup>克ハス或ハ吃ス。快復ノ時期ニ及テ痲痺ヲ遺シ或ハ  
生涯其<sup>痲</sup>痲去ラサル者アリ痲痺ヲ遺ス所ハ多クハ下肢或  
ハ腕或ハ聘之  
舌及ヒ口内粘膜ノ病症 病初ハ舌上寢セス清潔ナル者希  
之多クハ腸中<sup>聖</sup>京<sup>屈</sup>状ニ均シキ苔ヲ覆フ又病初ヨリ病状  
ヲ顯ス<sup>下</sup>アリ則チ非常ノ白苔黃苔ナリ或ハ脂肉ノ如ク其  
中尖粒<sup>少</sup>如キモノアリ而メ其尖粒半側ニ限リテ生スル



アリ又白線舌根ヨリ出テ舌尖ニ於テ合シ其中乾ヒテ赤溝  
ヲナスモノアリ又病初ヨリ赤クメ鮮肉ノ如キモノアリ右  
ノ諸状病ノ進ムニ忘ノ漸ク乾固ス然レモ又呼吸頻數哆口  
不潔等ノ為ニ其乾固ヲ増スアリ

今經過進ムニ從ヒ苔薄キ者ハ稍厚ク粘膠ス曾テ苔厚キモ  
ノハ乾ヒテ恰モ痂ノ如シ黄褐色ニ半ハ剥脱ス又曾テ舌  
乾赤スル者ハ其白苔離レ<sup>レ</sup>エビテ<sup>レ</sup>ム<sup>レ</sup>皮表黒色トナリ集束ノ  
齒ヲ繞ル故ニ齒根ノ周縁黒痂ヲ以テ圍繞ス而メ其黒苔猶  
兩唇ヲ覆ヒ且鼻竅ヲ覆フニ至ル病ノ極度ニ至テハ白苔  
或ハ黒苔速ニ剥脱シ舌上恰モ新肉ノ如ク其稍潤ヒシ時ア  
ルモ速ニ乾キテ再ヒ苔生シ又或ハ之ニ鶯口瘡ヲ發スルモ  
ノアリ○若夫舌苔漸クニ剥脱シ從テ湿润シ食氣復スルモ  
ハ快復ノ一兆トナス毎朝湿润清潔トナル者モ亦食后酒  
后直ニ乾燥スル者アリ然レ其症劇シカラサル者ハ患トス  
ルニ足ラス或ハ如此舌上更新スル者留連スルハ又覆ノ兆

トナスアリ故ニ注意セスハアラス且弟毘私ニ於テハ  
大渴消スヘカラサルモノアリ渴ナキ者ハ希ニ其極度ニ升  
リテ渴ヲ欲セサルモノハ是渴ヲ欲セサルニアラス其意亡  
スレハナリ故ニ飲汁ヲ口ニ接スレハ其足レリト云フヲ知  
ラス○口味全クナク或ハ粘リ或ハ苦シ○嚥下困難ナル者  
アリ是ハ咽喉食道ノ潰瘍一ハ咽喉ノ乾固ニヨル  
胃症ニ在リテハ食ヲ貪リ或ハ人々ノ好惡ナク食フ者  
ニ在リテハ腸瘍初メ正ニ治セントスルノ時ニ及テハ食氣再  
アリ彼ノ腸瘍初メ正ニ治セントスルノ時ニ及テハ食氣再  
廻リ快復ノ時期ニ至テハ自ラ節スルヲ克ハサル者アリ○  
悪心嘔吐ノ兩症ハ殊ニ病初發スル所ノ通症ニ而メ之ニ酸  
敗液粘味苦味ヲ兼又其因ナク酸敗液若クハ苦物ヲ吐クハ  
吉凶ヲトスルニタラス然レ病末ニ及テ胃症假令ハ胃痛胃  
熱嘔吐吃逆ヲ發スルハ危証ニ屬ス以此症多クハ胃ノ軟化ヲ  
表ス又死期ノ前表トスヘシ其前表ナラサル者モ貽病ヲ遺



ス  
。腹診症 病初殊ニ胃部ニ於テ知覺尤フリ之ヲ按セハ其  
知覺増ス。病症進ム。從テ自癸ノ疼痛<sup>○</sup>亦<sup>○</sup>手ニテ按スルモ  
ヲ生ス是血腸ニ激迫スルノ徵或ハ腹膜炎ノ徵トナス而  
其疼痛迅速ニ且劇甚ナルモノハ愈腹膜炎ノ正徵トメ可  
之腸穿孔ニ由テ生スル腹膜炎モ亦疼痛尤モ劇甚ク凡氣  
鬱積スルハ腹膨脹メ且ワ微痛ヲ兼ヌ。腹狀痛病初ヨリ穹  
隆ス病進ムニ從ヒ緊滿メ鼓脹ノ如シ横膈膜ト肝トハ胸中  
ニ抑壓セラレ肺之レ力為ニ縮小メ呼吸不利ナラス而メ其  
狀尤増劇スレハ死セシムルニ足ル病初病末ヲ論セス腹中  
雷鳴アリ殊ニ盲腸ノ部ヲ壓搾スレハ著シク手ニ觸レ耳ニ  
応ス。  
打響法 病初ニ之ヲ試ムレハ脾臟ノ癸大スルヲ知ル而メ  
小腹ノ右側ニ氣ノ滿ルヲ知ル病末ハ肝臟胸内ニ抑壓セラ  
レ其所ニ空氣ノ充脹スルヲ聴ク

肛門漏泄物 病初ヨリ病末ニ至ル迄下利スルヲ常トス毎  
日二回ヨリ五回其量略ク有シク疼痛後重シ病初泄ス処ノモ  
ノハ褐色ノ稀便ナリ而メ之ヲ貯フレハ黄色ノ稀汁ニ変シ  
テニ層ニ分ル其表層ハ鮮明黄色ニメ真少ナク水ノ如ク蛋  
白ヲ含マス其才ニ層ハ即チ沈澱物ニメエヒテリユム房ト  
諸種ノ燐酸塩ノ結芒ニ。或ハ下利頻數ニメ泄物亦多シ以  
症一ニ日留連スレハ危險トス。或ハ大便閉波初病希ニ稀  
便ヲ泄ス者アリト蚕氏直ニ秘結スルアリ或ハ泌泄相交換  
スルモノアリ若大便秘閉スルヲ以テ即下劑ヲ行エハ之カ  
為ニ瀉ニ轉シテ終ニ止ムルヲ以テ即下劑ヲ行エハ之カ  
或ハ病初下利スル者漸ク減シ及テ腹滿ヲ癸露スルヲアリ  
。快復ノ期ニ及ニテハ二三日毎ニ大便一行ヲ順トス然氏  
動モスルハ溏瀉シ易ク殊ニ食物ヲ誤用シ冒寒スレハ下利  
ヲ再癸ス末期ニ及テ下利及復スル者ハ數日止マ血積再進  
スルノ徵トス正ニ危險ニ陷ラントスルノ狀ヲ表スルヲ以



テ危忽ニ看過スルナカレ快復ノ時期ニ及ニテ下利ヲ発  
シ其性頑固ナル者ハ慢性腸潰瘍ノ徴トス凡病ノ经过中便  
秘スル者ハ少ナレ而レ傳染性ニ由リテ便秘ヲ尋常症トナ  
ス一アリ若夫下利セサルヲ以テ腸中疾患ナレトスヘカラ  
ス腸瘍劇甚ナレハ乃便秘ス。泄物ニ交ユル所ノ血ハ腸ノ  
血積ト尿管破裂ニ拘ハリテ生スル者之血液溢出ハ凶徴ト  
ス血ヲ早期ヨリ洩ス一多ケレハ愈凶トス之カ為ニ病者血  
虚ノ極度ニ升リ生カ沈衰メ速ニ死ス血液溶崩ノ惡臭ヲ放  
テ惡膿ヲ混スル者ハ愈凶徴トス。才毘私ノ極度ニ升レハ  
大便失禁ノ自ラ之ヲ覺エス是死徴トナレテ可ナリ  
气道症 喉頭症ハ即チ喉頭痛声啞等ナリ是喉頭ノ潰  
瘍ヲ表ス預后凶トス披裂靱帯ノ水腫ハ只快復ノ時期ニ及  
テ生スル一症ニメ愈凶徴トナス気管枝ノ聖京痙症咳嗽胸  
ノ後部ニ當リ満胞ノ激声アルハ尋常症ニメ殊ニ病極度ニ  
進ム者ハ之ヲ発セサル一ナレ九ソ胸内ニ生スル妨礙ハ増

進スレハ則病者ヲノ死セシムルニ足ル故ニ肺症ハ忽ニス  
ヘカラス夫ノ咳嗽全ク止ニ安静ナルカ如キ者ハ肺中困重  
ヲ致ス者トス  
凡ソ呼吸短數ハ肺疾ノ危症トナス呼吸緩徐ナルモノハ則  
才毘私病ノ尋常症トナスヘシ時アツテ或ハ呼吸不齊ナル  
者アリ胸中刺痛ヲ覺エ深息スレハ疼痛ヲ覺ルハ甚ク希ニ  
胸中ノ診察ハ又急ルヘカラル事トス此一症ヲ以テノミ  
確徴トナスニ足レハ心ノ肺藏ノ下部後部ニ當テ或ハ鈍響ト  
ヲ顯ハシ或ハ虚響ヲ顯ハシ或ハ呼吸離聲響ヲ顯ス者アリ  
。肺藏葉枝ノ冬潜伏スレハ即此症状ヲ顯ハサハル者ア  
リ或ハ才毘私本病ニ齟齬スル一症呼吸困難増進スルヲ以  
テ其岑ヲ断スル一アリ略疼ハ病ノ吉凶ヲトスルニタラス  
其希ナルモノアリ又未熟ナル者アリ痰中血ヲ交フレハ則  
肺炎ヲ生スルノ徴トスヘシ才毘私老期ニ及ニテハ偶然ト  
シテ凝血ヲ咯出スル一アリ。諸カ沈衰脈微ニメ絲ノ如ク



氣息惡臭ヲ呼クモノハ肺藏壞死ノ徵トス若夫結節病粟粒  
病ノ如キハ續病篇ニ挙ク  
衄血ハ病初ノ尋常症ニメ則チ毘私ヲ確断スルニ足ル及復  
數散スル者アリ之ヲ得レハ一時頭中爽快ヲ得ルト虽氏忽  
前症来ル衄血ノ分量多カラス其數癸セサルモノハ危險ト  
ナサス其散スル一愈早ケレハ愈危カラス然氏出ス所ノ血  
過多ニメ殊ニ老期ニ及テ之ヲ散スレハ諸症從テ劇進增加  
シ神經諸症ヲ媒散ス  
心藏動脈証チ毘私病極度ニ升レハ心跳非常ニ鈍廣ス頸  
動脈ノ跳動末期ニ及テハ胞響ヲ放ツ。凡ソ心跳病初ハ各  
種熱病ニ異ナル一ナレ病ノ極度ニ至テハ小ニメ鈍ク死ニ  
垂トスルニ及テハ察シカタシ  
脈チ毘私病ニ在テハ甚異ニ病初熱時ニハ數ニメ其度少  
シク増シ熱解スルニ從ヒ徐トナリ平生ニ少ク異ナリ末期  
ニ及ンテハ脈度著シク増ス一密扭葛間百二十動ニ至ルモ

ノハ重証ノ一徵トス脈度數フル一克ハス而メ間歇スル者  
ハ凶徵トス脈至速ニ變メ數トナル者ハ内器變易スルノ一  
徵トス病ノ極度ニ及ニテハ其吉凶ニ轉スルニ論ナク脈至  
變メ慢徐トナル凡ソ脈至曾テ數ヲ顯ハスモノノ身体ヲ動搖  
スレハ其數猶一層スルハ則チチ毘私熱ノ一徵トナスヘシ  
既ニ快復ノ内ニ入ル者ト虽氏此状アリ。多クハ脈至著シ  
ク虚シテ壓絶シ得ヘシ老期ニ及テハ常ニ微弱トス脈至緩  
ノ如キハ凶徵トス凡チ毘私ハ脈至ヲ以テ弁別スルモノニ  
非ス脈至ハ只全身知覺亢進スルノ輕重ト血虚ノ状態殊ニ  
心臟縮張ノ強弱ヲ察スルノニ  
皮膚及ヒ皮下蜂窠織症  
前兆及初癸ノ際ハ皮膚ヲ按スルニ処々寒冷ヲ覺フ殊ニ四  
肢ニ多シ然氏他ノ急性熱病ノ寒戰時期ノ如ク決シテ厥冷  
ニ至ラス其後經過中皮膚熱シ殊ニ腹上上肢頭上煩熱ス老  
期ニ及テ精神沈衰スレハ皮膚ノ熱度著シク減ス。皮膚全



ク乾燥スルヲ常トス癩汗スルハ希ナリ然レ氏经过中或ハ  
大汗流離スルモノアリ或ハ汗ヲ得テ軽快ヲ得ルト虽氏其  
汗必キリシスニアラス若夫皮膚寒冷ニメ而シテ汗スルハ  
惡徴トナス

汗疹ヲ散ス其状小胞ニメ奇シカラス内ニ澄水ヲ充ツ殊ニ  
頸辺鎖骨ノ周圍臍辺臍辺ニ癩ス時ニハ全身ニ癩癩スル  
アリ癩熱赤四五日ヨリ才八日ノ后癩スルヲ常トス宜シク  
必現ノ証トメ可ニ但シ癩汗ニ関係セス或ハ疹内膿汁ヲ充  
ツルヲアリ丸之ヲ癩スルト虽氏病者輕快ヲ覺ニス又去ル  
ト虽氏險惡ニ至ラス其癩散甚速ナリ。羅斯班ヲ癩スル者  
アリ玫瑰赤ノ小班ニメ指ニテ押セハ消シ其中中央尖心ナシ  
數癩スルモノニアラス其之ヲ癩スル時期ヲ定メス時ニハ  
癩病直ニ之ヲ癩シ時ニハ晚期ニ及テ癩ス或ハ癩后亦二日  
ヲ経テ消シ或ハ猶留連ノ十四日間消セサルモノアリ蓋シ  
狀ノ小班ハ血液輻湊ヲ表スル者ニメ或ハ其漏湊脉管ヨリ

泄出ス故ニ指ニテ其処ヲ按スモ消散セズ終ニブリユツフレ  
ツキニ轉ス丸ノ羅斯班ハ亦昆私病ニ多ク癩スル者ニメ吉  
凶ヲトスルニ足ラス

其他希ニ癩スル所ノ皮膚ハ則チ粟粒疹ナリ其状赤班ニメ  
中心無數ノ小粟疹攢簇メ成ル散散時ナク寒冷ヲ得レハ多  
クハ消散シ散汗淋漓雷連スレハ則チ癩露ス皮膚ニ劇シキ刺  
痛ヲ覺エ胸中ニ箱頓ヲ得レハ則チ癩疹ヲ癩スル前表トス。  
真性羅斯班ノ顔上ニ癩ス必死徴トスヘシ又四肢羅斯様皮  
膚炎ヲ顯ハシ速ニ皮下ノ蜂窠織中ニ侵淫シ其処化膿ス是  
亦死徴トナスニハアラス

眠瘡 肉薄骨立シテ久シク常ニ病床ニ觸ル、処ニ多ク癩  
ス故ニ薦骨肩胛角大回旋ニ多ク若シ早ク之ニ備ニス汚垢  
スレハ忽剥脫シ或ハ潰瘍シ或ハ化膿ノ蔓延ス長病ニ在テ  
ハ壞疽ニ變ス癩泡膏ヲ貼セシ処モ亦壞疽ニ轉スルヲアリ  
紫班 肌膚微細管メ戸痺シ以テ血液鬱積シ而シテ小班ヲナ



スニ其之ヲ為スニ自癩ナル者アリ輕微ノ損傷ニヨリ癩ス  
ルモノアリ其散スルヤ初ハ淡紅ニシテ指押スルモ消散セス  
忽チ帶赤青色若クハ黄色ニ變ス弟毘私ノ重症極度及其病  
者ノ肌膚脆弱ナルモノハ總テ此班ヲ生ス水蛭ヲ貼シ其吸  
ロヨリ血液蜂窠織中ニ溢出スルモ亦紫班ニ屬ス  
皮膚黄色 輕症ニ於テ多ク癩スル一症ナリ重症ニハ及テ  
希ナリ  
浮腫 殊ニ病ノ老期ニ於テ生スル一症トス処女或ハ陰唇  
浮腫メ鉛色ヲナス者アリ。皮膚ノ氣腫ヲ癩スルハ希ナリ  
耳核ヲ繞ル蜂窠織頗ル化膿ニ罹ル時ニハ兩脚ノ蜂窠織化  
膿スルヲアリ其他ノ蜂窠織化膿スルハ希ナリ其初メ多  
少堅硬トナリ赤色疼痛腫脹ス而メ病者死スルニ先チ遂ニ  
自潰メ膿ヲ泄ス時ニハ當時流行ノ病性ニ係リ耳核燼衝ニ  
而メ化膿スル者アリ下肢ノ蜂窠織ノ化膿多クハ一回復ニ  
趣リ者ニ生スルハ其回復ヲ急慢ナラシム時ニハ亦毘私

后身体諸部ヲ論セス皮下ノ蜂窠織中ニ膿瘡ヲ生ス而メ數  
月間治セス其毒苛烈ナレハ骨衣ヲ侵シ骨瘍ヲ將出ス  
尿分泌症 尿量ト尿質トハ病性ニ從テ甚殊ニ病初ヨリ變  
易セスメ回復ヲ得ルモノハ希ナリ而メ其變易ハ病ノ善惡  
ニ關係セス故ニ分利ヲ尿ヨリ得ルモノハ此病ニ於テ決メ  
者サル所ナリ只尿忽チ變メ透明トナリ忽チ變メ混濁トナ  
リ忽チ變メ赤色ヲナスハ多クハ峻惡ノ兆ニシテ以テ良  
善トナスハ少ナシ  
尿量モ亦一定ニ難シ多クハ大便ト共ニ漏泄スルヲ以テ之  
蓋シ病ノ極度回復ノ初ニ在テハ其量增加ス又真ノ尿崩ヲ  
癩スルモノアリ其徵ハ透明水ノコトニ  
尿質ヲ論スルニ病初ハ熱病一般ノ兆ヲ顯ス即チ水分減シ  
尿物含畜塩モ亦從テ減シ尿酸及尿酸塩増ス故ニ尿質濃赤  
若クハ黧赤ニシテ混濁ス時ニハ之ニ血蛋白膠ヲ混ス而メ他  
病ノ尿ニ比スレハ溶解スルヲ甚速ニ。病進ムニ及テ或ハ



灰白色トナリ或ハ混濁ノ乳汁ノ如シ又磷酸塩ノ沈澱アリ  
又尿中血ヲ混スルヲ以テ暗赤色褐色猶甚シキハ黒色トナ  
ルモノアリ

利尿ヲ論スルニ甚ク異ニ殊ニ注意セスンハアラ  
ス允才毘私病ハ尿利急慢シ病者尿意ヲ忘ル、モノナリ時  
ニハ膀胱筋痲痺スルヲ以テ閉塞ス尿閉スレハ即羞骨會接  
ノ上ニ當リテ膀胱緊張ス打響法ヲ以テ之ヲ弁スヘシ。渾  
テ尿閉ハ少ナク失禁ハ多シトス

出血 諸器ヨリ出血ス已ニ各器ニ就テ之ヲ論セリ茲ニ論  
スル処ハ只其合併シ来ル処ノ者ニ凡潰瘍ノ為ニ脉管頹敗  
シテ来ル処ノ出血ハ論セス只血調ノ違和ト蜂窠織弾カヲ  
失フトニ由テ来ル者ニテ論ス是才毘私ノ一症ニシテ必見  
症トナスヘカラスト虽氏全身渾テ之アチナルヲナシ之ヲ  
發スルハ危症トナスヘシ泄血悉ク恒ニ流動スルモノニア  
ラス或ハ凝結スルヲアリ其諸器ヲ尤ニ列ス

鼻粘膜

之ヨリ泄血スルハ希ニ而凡出血スルハ危峻トス

呼吸器

之ヨリ出血スルハ希ニ而凡出血スルハ危峻トス

病ノ末期

ニ及テ出血スレハ即子肺壞疽ノ忌アリ

胃

稀血ヲ吐ス

肛門

即赤痢ナリ

尿血

之ヲ癸スル者希ナリ

子宮血

屢視ル一症トス医家之レヲ認メテ早期ノ経血ト

ナシ病ノ分離トナシ良兆トスルハ甚ク誤レリ衄血ニ於ル  
モ亦然リ夫レ子宮血ハ癸熱ノ初メ病症僅少ナルヲ癸スル  
ハ恐ル、モノニアラス又病ヲメ險悪ニ進マレノス故ニ之  
ノ出血ノ外他症アラサルモノハ恐ル、ニ足ラス然レ氏以  
之血ヲ得ルト虽氏諸症緩快ノ状ヲアラワサス或ハ及テ病  
者自悪候ニ進ムヲ覺ユルヲアリ以テ月経ヲ得レハ則分利  
トナスハ予カ敢テ信セサル所トス

○才毘私病ノ出血各器ニ関係セサル者ハ如左



其一 時ヲ以テ之ヲ論ス病者体格多血質ニメ初期ニ生血  
スル者ハ全ク凶徴トスヘカラス老期ニ及ニ從テ愈惡徴ト  
ス血虚脱力等ヲ生スレハ益凶徴トナスヘシ  
其二 泄血ノ量ヲ論ス 出血微量ハ血紫斑若クナル者ハ凶徴  
トナサス而レモ出血多量ニメ數癸スル者ハ病者ヲ死セシ  
ムルニ足ル

其三 際限ヲ論ス 出血猛勢ニメ其際短カキモノハ篩出  
ヨリ良トス篩出ハ鼻中蟬針口ヨリ出テ、留連止マサル者  
ナリ

其四 血質ヲ論ス 血液速ニ凝固スルモノハ流動水ノ如  
キモノニ比スレハ良トス

### 〔乙〕病際主症論

。弟毘私熱ノ病際甚異ニ之レ悉ク論載スルト克ハス其故  
ハ千状万態悉ク究ムヘカラサレハナリ然レモ病中各種通症  
トナスヘキ者アリ其各種通症ヲ分テ茲ニ論ス凡チ毘私病

ハ重症ト極重症トノニ種多シ極輕症ハ甚希ニメ病中才毘  
私ナルトヲ知ラス而シテ卒然トメ其本症狀并ヒ起リ以テ死  
ス然レモ是等ハミナ異常ニメ論外ニ置クヘシ其通常顯ハ  
ル、モノハ多少前兆アリテ初癸已ニ重症ノ状態ヲ顯ハス  
モノナリ  
。才毘私ノ癸スルヤ多クハ慢徐ニメ病者自知ラス只身心  
違和ヲ覺ヘ漸ク益メ前兆トナル其初日惡寒ヲ覺エ以テ本  
病癸露スルハ希ク前兆アリテ漸クニ本病ヲ癸露シ終ニ其  
極度ニ至ル凡病ノ増進スルハ漸ク以テス  
前兆后病症次第ニ増進ス其間急変ナク熱狀亦夕進退ナシ  
只其時限アリテ病増進ス乃チ初期血積時期ト云フ胃ノ聖  
京偃症狀著シク勃脹シ之ニ下利ヲ兼子癸熱シ多ク脳症ニ  
苦ム其後腸中泌出ノ時ニ當テハ安静ニメ病少ク退クニ似  
タリ才ニ期乃神經時期ト云フ病狀再ヒ増加ス蓋病狀増加  
ハ泌出ノ多少血積肺疾ノ状態腦患ノ徴甚ニ目テ同シカラ



ス然氏心疾肺病腦患烈シケレハ病状モ亦微ナルヲ得ス  
其腦患尤モ烈シキヲ以テ神経時期ト云フナリ故ニ此時期  
ハ當ニ熱症ノミナラス腦神ノ妨害ヲ生出シ之カ為ニ病者  
危候ニ陥ルヲアリ以テ堪ユレハ則チ快眠ニ由テ腦神興奮  
シ其後安静トナリ肺患從テ自ラ分解シ腸中ノ産物モ亦剥  
脱ス此時期ヲ防キ得レハ腸中ノ疾患未タ全ク退キ得スト  
虽氏病ハ即チ快復ノ時期ニ至ルトナスヘシ然レ氏此時期  
ハ尤モ腸中ノ變易烈シキヲ以テ動モスレハ再感シ易シトス  
故ニ快復ノ時期ニ至ルトイヘ氏忽セニスヘカラサル所之  
才毘私熱ノ病際其良轉帰ヲ得軽症ナル者モ三周以上ニ出  
テサルヲ得ス多クハ四周ヨリ六周ヲ經過スルモノナリ病  
際中ノ時期ハ強メ定ムヘキ準則ナシ  
腸中才二度ノ血積即期ノ為ニ生スル險惡症ヲ顯ハス時  
期ハ乃才二周ヨリ才三周ノ間ニアリ。傳染后直ニ死スル  
者ハ希ク又才四初度ノ血積及産物剥脱ノ間ニ死スル者モ

亦希ク多クハ快復ノ時期ニ移ルノ后ト慢性症ノ末期トニ  
及テ死ス又貽病后ニ至テ始テ死スル者アリ各種性ノ差異  
症ハ當時流行スル所ノ病性ニ関カル故ニ流行性ハ劇甚  
ナルヲアリ或ハ簡易ナルヲアリ或ハ腦傷ヲ顯シ或ハ胸傷  
ヲ顯ハシ或ハ腹傷ヲ顯シ或ハ病毒頗ル血漿ヲ變易スルヲ  
アリ或ハ合併症ヲ發露スルヲアリ皆當時ノ流行性ニ関ハ  
ル是今年ノ流行病ニハ甲症ナク明年ニハ乙症アル所以ナ  
リ加之流行性ニヨリ或ハ羅斯或ハ紫班或ハ耳核炎大便閉  
瘕瘵等ヲ發スル者アリ故ニ之ヲ一々論シ難其他同時流行  
スル処ノ弟毘私モ亦其時期ニ從テ變証ヲ發ス流行中或疑  
似不決症アリテ經過スルノ間眞症顯ハル者アリ又合併  
症尤モ盛ニシテ之カ為ニ早ク死シ以テ本病ノ眞症ヲ得サル  
者アリ又流行ノ盛時ニ于テハ各人僅ニ其素因ヲ有スル者  
モ亦病ニ羅リ肺ノ溢軟化出血壞疽等ヲ以テ死シ以テ本  
病ヲ弁スルヲ克ハサル者アリ又流行ノ晚時ニ於テ病者漸ク



安靜トナリ次才ニ輕快シ而メ不意ニ死スル者アリ其尸ヲ  
見ルニ腸瘍清絜トナルヲ視ル是副癩病ニ由テノミ死スル  
者ナリ又流行性去ルノ后病性轉メ蔓延性トナル合併症及  
テ増劇シ之カ為ニ死シ或ハ遺病ノ為ニ死スル者アリ  
各種才毘私病ノ特異性ハ病者ノ躰格生質腦神ノ銳鈍年齡  
ノ老幼既往ノ攝生病因ノ強弱病中ノ保護等ニ因テ変セサ  
ルヲ得ス是各種病状ノ異ナル所以之ヲ列序スルヲ如左  
〔才一〕才毘私腹症最モ劇シキ者  
〔申〕輕症 此症ハ或ハ炎様或ハ腸胃症或ハ腸胃性炎熱ノ如  
ク顯ル其初ノ一二日間若シクハ一二週間前兆アリ則食機  
欠乏身心疲憊目眩頭痛或ハ瀉シ或ハ秘ス病者猶事業ヲ執  
リ疲憊漸ク進ミ頭中困重ヲ覺エ以テ床中ヲ離ル、ト克ハ  
サルニ至ル乃精神或ハ眞奮シ或ハ鬱憂ス其状他熱ノ同度  
ニ比スレハ尤著シ病次才ニ進ミ脉實ニシテ數皮膚赤ク熱  
シ或ハ乾キ或ハ汗ス舌白苔アリテ乾キ易ク食氣欠ケ大便  
瀉ス數回通宵眠リ難ク頭尤病ヲ受ケ疼痛ス耳騷鳴シ或  
ハ衄血或ハ子宮血ヲ生ス如此病状五日ヨリ八日間留連シ  
其間病状少シモ退カス則頸及膈ニ汗疹ヲ生シ肢ニ羅斯ヲ  
生ス。病經過スルニ及テ他症ヲ發ス其發スル卒然ナラス  
多クハ漸ク以テス時ニハ先假リニ佳况ヲ顯ハシテ而シ病  
状変易ス即舌清ク病者自諸カ復スルヲ覺エ食氣又稍復ス  
ルカ如シ然レ其夜ニ及テハ膚熱シ舌乾キ脉尤數通甯安靜  
ナラス翼朝ニ至テハ病者虛憊ノ症状一増シ脉實シ皮膚ノ  
灼熱頭痛シ而シ夜間安靜ナラサルハ炎熱ノ徵トス腸症ハ  
殊ニ下利吐舌上乾燥トヲ以テ知ルヘシ之ニ加フルニ神經  
症即嗜眠譫妄耳聾仰臥ヲ發ス以テ變易症留連スルト一二日  
而シ其症著カラサル者アリ病者熱眠ヲ得レハ即止シ今舌  
上清潔大便糊ノ如ク數日ヲ経スレテ諸力復ス。凡的當ノ  
処置恃心法ヲ以テスレハ即四周ヨリ五周ノ間ニ治ス若夫  
治方適當ナラサレハ此症轉メ重症トナル



〔乙〕中症 其经过粗、輕症 = 同、唯主病脈内ニ在テ其症状劇  
シク頑固ナルヲ異リトス前兆ノ間ハ病者病ニ罹ルヲ知リ  
疲憊甚シク頭痛劇シク眠ヲ妨ケ病速ニ増進シ脈実ノ數肌  
熱ノ多ルカ如ク頸動脈ノ跳動烈シク頭之力為ニ跳躍スル  
カ如ク通宵眠リ難ク五官銳敏脳神朦昧ス發熱ノ初日已ニ  
輕キ詛語ヲ發ス胸中捺スカ如キヲ覺工乾咳シ胸内雜声ヲ  
放ツ舌初ハ赤ク乳嘴ノ大ナル者ハ白苔ヲ覆ヒ動モスレハ  
乾燥シ易ク渴アリ肢ヲ診スルニ胃部回腸部ニ疼痛ヲ覺工  
如ク腹痛ヲナシ小肢鼓脹シ之ヲ押セハ雷鳴ス大便毎日二  
回ヨリ五回疼痛ナク其色黄ニ脾發大ス之ヲ按シ且之ヲ打  
發熱一周ノ終リニ當テ皮膚癢ヲ發ス。神經時期輕症ニ比ス  
レハ劇盛ニシ且其間長シ病者昏憤シ自語スルニ至テハ疼  
痛去ル只耳中騷鳴ニ苦ムヲ訴フ舌全ク乾キ其苔煤ノ如ク  
下利留連シ時ニハ其中血ヲ混ス肢ノ膨脹稍増ス病者床上  
ニ仰臥シ外物ニ関セズ肌膚沾フテ汗ニ浴スルカ如シ。其

快復ニ趣カントスルニ當テハ病者初テ安眠シ眠間少シク  
醒ルト虽氏大凡一二週間雷連シ肌熱増減ナク平生ノ如ク  
舌清潔トナリ食ヲ好ム其快復ハ前症即輕ニ比スレハ長シ  
故ニ全病ノ经过ハ五周ヨリ八週間留連ス其健全ニ復スル  
ハ猶數月ノ後ニ非レハ克ハス  
〔丙〕膽症 胆私胆熱神經是亦胆私ノ胆症ヲ合併スル者ニシ  
胆道著シク胆汁ヲ鬱積スル者ニ其之ヲ發スルハ各人ノ  
性賦ニヨリ一ハ流行性ニヨル連年流行シテ止マサル者ア  
リ時ニハ毎年生スルアリ。其前兆特ニ異ニ頭痛劇甚ニ  
ノ一処ニ限リ四肢腰辺ニ疼痛ヲ覺工胃部膨滿シ病者其充  
實スルヲ覺フ肝部ヲ按セハ疼痛シ之ヲ叩クニ其發大スル  
ヲ知ル食氣欠乏スルノミナラス之ニ強レハ則チ嫌惡ス動  
モスレハ嘔吐シ苦味惡臭物ヲ吐ク口味苦シ鼻翼眼ノ角膜  
黄色ヲ放ツ通宵眠リ難シ。通例坎前兆一時ニ増加シ發熱  
不但シ熱前寒戰ヲ覺フ則皮膚甚乾キテ熱シ脈甚數ニノ實



呼吸小疾惡心ス病者煩悶ニ頭痛著シク増加シ舌上或ハ  
厚白ノ苔アリ或ハ黄色ノ苔アリ而シテ黄症愈増加ス其自増  
加スル者アリ或ハ吐劑ヲ用イ胆道ヲ導泄スルニ由ル者ア  
リ之カ為ニ病一變ノ中症ノ如ク経過ス若如斯頓ニ病症増  
進セサレハ則チ症状漸ヲ以テ増加ス而シテ神經症加ハリ終  
ニ病証一變ノ虛性ヲ毘私ニ轉ス  
〔丁〕粘液症 粘神經熱此症ハ腸管粘膜ノ聖京屈著シク陰惡ニ進  
ニ全身赤ノ粘液熱テ才毘私性ノ衰症ヲ顯ス者ナリ而シテ各人  
特異性ト傳洩性トノ兩方ヨリ之ヲ生出ス。前兆時期ヨリ  
變症ヲ顯ス是以此病ニ特異ナル者ニ其變症ハ即チ面色慘憺  
豊大ニ常ニ寒戰ニ疲憊ヲ覺フ而シテ長ク眠ルト虽氏之カ為  
ニ精神活澹セス頭中病ヲ受クルヲ以テ目眩スレ氏疼痛ナ  
シ食氣欠テ口味糊ノ如ク舌白苔朝ハ膠苔ノ如シ腹膨脹ス  
大便閉止或ハ膠便ヲ洩ス呼吸箱窄シ尿甚混濁ス。此諸症  
漸々ニ増加シ熱往來ス初メ其熱宵ニ向テ解ス終ニハ留

連ノ灼熱ス脈頗ル疾トナル古ト齒トハ共ニ粘膠ヲ以テ被  
覆シ口味糊ノ如シ齒ハ粘膠アルヲ以テ相交接スルト克ハ  
ス惡心シ時ニハ粘汁微量ヲ吐出ス精神遲鈍ニノ脈頗ル彭  
脹シ大便或ハ閉シ或ハ粘便ヲ泄ス病者咳ノ粘膠ヲ咯出シ  
皮膚或ハ乾キ或ハ汗ス。如キノ症狀暫ク苗連シ而シテ諸  
症漸ク増加シ口内乾キ舌苔黄色トナリ瀆テ褐色ニ變シ終  
ニ黑色ニ轉ス病者口ヲ開テ仰臥シ譫妄昏憤交來ル其症狀  
苗連スレハ益陰惡トナリ虛性才毘私ニ轉ス若夫諸症増加  
セサレハ暫ク苗連スルト虽氏咳嗽大便尿中ヨリ多量ノ粘  
液ヲ洩シ初ハ輕快ヲ覺エスト虽氏漸々快復ニ趣カントス  
ルノ状アリ  
此症漸ク佳候ニ趣キ稍活澹スト虽氏動モスレハ沈衰スル  
一ニ周間終ニ病症減シ肺ヨリ咯出スル処ノ粘膠物減シ尿  
透明トナリ沈澱物分ル皮膚曾テ乾キシモノハ蒸氣發越シ  
曾テ汗スル者ハ即チ減ス眠間安静舌終ニ清潔トナル脈徐



ニノ其数減シ四十動猶徐ナル者アリ如以佳候ヲ得ルト虽  
氏快復ニ趣クニハ猶時日ヲ経ルナリ而ノ其際病状或ハ稍  
増進スルヲアリ其右食機復シ諸力從テ復ス故ニ其早キモ  
八周ヨリ十周ヲ経ルニ非レハ快復ニ至ラス其右数月ヲ経  
テ全ク治ス然レ氏翼年其時期来レハ動モスレハ再感スル  
ノ恐レアリ  
〔戊〕慢性症慢性神經此症ハ粘液症ノ留連スル者ニ弁別シ  
難シ只其留連漸巨スルヲ異ナリトスルノミ其源巨スル以  
ハ未夕知ルヘカラス恐クハ腸中ノ潰瘍ニ因テ然ル者カ凡  
才毘私病流行ノ末期ニ及テ多ク此症ヲ発ス殊ニ依母毘埜  
児家痔血家之ニ罹リ易シ。才毘私慢性症ハ其初他症ヨリ  
弁別スルヲ克ハス只其老期ニ及テ舌苔乾固シ証妄ヲ発シ  
諸力脱シ病極度ニ到リ生死ヲ断スヘキノ時ニ至ルト虽氏  
病者死セス活セス留連ノ熱稍退クカ如ク見エ朝午時ハ病  
者自佳候ヲ覺フルト虽氏夜ニ入レハ乃陰患トナリ古汚レ

眠ヲ妨ケ下利或ハ流連シ或ハ便秘シ兩脚浮腫シ食ヲ思ハ  
ス諸力復セス是則慢性ノ徵トス又粒疹ヲ發シ消耗汗ヲ發  
ス以状留連スルヲ數周若クハ三月ニ至ル快復モ亦從テ慢  
ニ或ハ最末腸穿穴ヲ以テ死スルヲアリ  
〔巳〕迅速症此症ハ常ニ死ス而シ其死スル腸恙未夕潰瘍ニ  
移ラサル前ニアリ凡輕症才毘私飲食ヲ誤リ治方ヲ失シ殊  
ニ下劑ヲ慢用スレハ則此症ニ轉ス時ニハ病初ヨリ此性ヲ  
有スルモノアリ病ノ發スル前兆ナク或ハアルモ誠ニ徵ニ  
メ知可クニス而シ病者卒然トシテ戰栗シ才毘私重症ヲ發露  
ス舌速ニ乾キテ褐黒大便數瀉シ或ハ頑秘ス時ニハ脘疼痛  
メ緊満ス而シ出血<sup>譚</sup>語紫班ヲ發シ八日ヨリ十日ノ間ニ死  
ス希ニハ猶早ク死スル者アリ若シ固ト輕症ナル者下劑ノ  
誤用ニ由テ重症ニ陥レハ舌速ニ變メ赤ク乾キ泄利増劇シ  
或ハ速ニ閉止シ脘緊満皮膚灼熱精神錯乱ノ暫時ニ病状一  
變ニ速ニ死ス



〔庚〕腸中弟毘私變性蔓延症所謂此症ハ通例其蔓延ニ應メ癸  
熱モ劇シ初ヨリ頭痛劇甚重症耳鳴ヲ兼子疲憊甚シク食機  
全ク欠ケ舌変メ膠ノ如ク或ハ甚乾燥シ燕下クモ困難ニ肢  
緊滿疼痛シ盲腸ノ辺雷鳴ス下利ハ病初ヨリ止マズ脉状炎  
熱ニ同シク實數大之ヲ診スレハ指ヲ彈ク肌膚乾赤尿少ナ  
ク其色甚夕暗シ呼吸困難ニ聖京屈症ヲ兼又其他ハ輕症  
中症ニ同シ病者自起卧シ難ク死物ノ如ク飲食ヲ欲セス  
衰ス漸アリ病者自起卧シ難ク死物ノ如ク飲食ヲ欲セス  
人飲液ヲ口内ニ滌ケハ之ヲ口鼻ヨリ及流ス嗜眠シ語ノ  
上ニ説ク所ノ神經諸症ヲ亦發露ス聽視ノ兩神鈍廣シ脉常  
ニ數ニメ其度愈増如小弱之ヲ按スレハ絶シ震場ス時ニハ  
間歇ス心跳鈍シ皮熱灼クカ如ク又蝕スルカ如ク肌膚乾燥  
粗糙シ或ハ大汗淋漓ス唇舌齒鼻共ニ乾キ初メハ細末ノ如  
ク終ニハ福黒ノ苔系ノ如ク又班ノ如キアリ病者多クハ  
飲ヲ欲セス之ヲ与レハ即吞ム肢ノ緊滿増シ疼痛銳敏及テ

減ス下利ハ猶流連ス終ニ失禁メ之ニ血ヲ混ス。此狀留連  
スルヲ才三週間ナリ今吉ナレハ則安眠メ病者佳候ヲ覺フ  
然レモ吉ナルモノ少ナク多クハ凶ナルモノニ病狀益陰  
悪ニ進ニ昏憤甚シク病症變革シ眼陷リ半閉シ口閉キ呼吸  
常ニ困難ニ喘鳴シ脉漸ク沈衰シ縷ノ如ク僅ニ診シ得ヘ  
ク心跳モ亦診シ得ヘカラス下利絶ヘス失禁ス皮膚粘汗厥  
冷ニメ終ニ死ス。而レモ如以重症其極度ニ到ルト虽モ稍  
佳候ヲ顯メ直ニ死セサルモノアリ其佳候ヲ顯シ假リニ分  
利狀ヲ顯ス所以ハ再度ノ血積輻湊ニアリ而メ其輻積ノ為  
ニ諸カ一且奮起スルト虽モ終ニ再ヒ腦溢出肺傷耳核腫膿  
瘡壞疽等ヲ以テ死ヲ免ルルヲ克ハス更ニ坎再陷ニ勝テ得  
テ亦生命ヲ引クモノハ末期虚勞水腫ニ由テ死ス。重症才  
毘私其早期腸胸腦ノ諸症著シト虽モ稍治癒ニ趣キ生ヲ保  
續シ得ヘキ徵ヲ顯ハスモノアリ然レモ以重症ハ諸カ著シ  
ク虚勞ニ其弊終ニ復セズ微少ノ事故偶然生スレハ是カ為



二 往々死亡スルモノアリ其事故トハ何ソ假令エハ氣管中  
二 膠著スル粘液ヲ病者自咯出セント思ヒ之カ為ニ怒脹ス  
レハ則氣カヲ費ス等ノ如シ如斯ヲ以テ死スル尸ヲ関キ内  
藏ヲ視ルニ各器已ニ才毘私状ハ愈ルモノナリ。重症腸才  
毘私ハ悉ク皆初ノヨリ如斯劇甚ナル者ニアラス才八日ヨ  
リ才十四日ヲ経テ腸中再未ノ血積ヲ致スニ及テ初テ重症  
ヲ表ス者アリ然ノ此時ヨリ危険ヲ経治愈ニ趣ク間ハ絶ス  
發汗ス。蔓延腸才毘私ノ治愈ニ趣ムカントスル寸モ亦安  
眠ヲ以テ始ム安眠ハ則吉兆トナスヘシ  
〔辛〕腸血重症 病者前日危険症ヲ顯ス一ナク卒然トノ腸血  
ヲ得危険ニ陥リ死スルモノアリ時ニハ腸血ノ為ニ不虞ノ  
速死ヲトルアリ而シテ或ハ其血鬱積シテ洩レサルモノア  
リ腸血ノ過量ナル者ハ虚勞ヲ以テ死ス  
〔壬〕才毘私腸壞疽ヲ生シ危険ニ陥リ死スル者前症ニ比スレ  
ハ經過異ニ此症ハ前症ノ如ク急卒不虞ノ死ヲ致サス病少

シク延テ腐敗思臭ノ泄物ヲ洩シ腹緊満シ速ニ諸力沈衰ノ  
死ス此變易症ハ殊ニ劇甚悪性流行中ニ於テ見ル所ニ  
〔癸〕才毘私腸穿孔ヲ以テ死スル者病初危険ト虽凡一旦其死  
ヲ防キ得テ吉兆ヲ顯スル者ニ於テ又病症著シカラス  
僅ニ才毘私病トナシ得ヘキ者ニ於テ生スルヲ見ル。死徵  
ノ穿孔ハ時期ヲ論セズ生スルト虽凡多クハ晩期病正ニ快  
復セントスル寸ニ於テ尤モ多ク如此モノハ病状卒然トメ  
不慮ニ陰惡トナリ劇甚症ヲ顯シ病者俄ニ腹中劇痛ヲ覺エ  
眩暈シ病症變革シ惡心嘔吐ス此症所謂神經時期ニ於テ  
露スレハ之カ為ニ昏憤譫妄全ク止ム其故ハ疼痛劇甚ナル  
ヲ以テ病者ヲ全ク鼓舞スレハナリ脉小ニ系ノ如ク下利  
止ニ腹緊満接觸ニ堪エス。通例其疼痛暫時ニ止ニ病者  
安靜トナリ少モ訖ル一ナク只腹中ヲ按スレハ顔ヲ皺メテ  
其疼痛ヲ表スルニ而シテ死ス。希ニハ治スル者アリ凡腸ノ穿孔  
二三日ヲ待スレテ死ス。希ニハ治スル者アリ



至小ニノ相粘連シ腸中ニ在所ノ物之ヨリ外出セザルハ則チ治ス故ニ病ヲ受ル所ノ腸部ハ常ニ少シモ動搖セザルヲ要ス

〔子〕才毘私毒ノ軟化ハ乃膿様物ニシテ腸中ノ大粒腸夾膜ノ核内ニアリ又本病ノ為ニ死セス肝瘡肺瘡脾瘡皮下蜂窠織瘡ノ為ニ死スル者アリ。若夫如斯証ヲ治セント欲セハ必先

其症状ヲ弁別シ其之ニ応スル治法ヲ以テスヘシ才二腦主症才毘私以症ハ腹症ヲ顯サス或ハ之ヲ顯スモ誠ニ少ナシ然レ死後尸ヲ開テ腸中ヲ見ルニペーヒル小核特異ノ變易ヲ見ル以テ才毘私ナルヲ弁ス茲ヲ以テ察スレハ生時腹症ナシトスヘカラス時ニハ腹症著キ者アリ而シテ其症腦症ニ合併ス。エンゲランドイルランド組ニ發スル才毘私ハ其初ヨリ腦中心ノ病症ヲ合併ス則腦症ヲ病原トス我國ノ如キハ病腹症ヲ發シ而後神經症ヲ続發ス而シテ神經症ヲ發スルニ急ヲ

以テスルアリ漸ヲ以テスルアリ凡腦主症ノ才毘私ヲ別テ

ニ種トナス

其一腦刺衝機亢進ヲ主症トスル才毘私是ニ其症ハ腦神五官錯乱ノ著シク興奮シ感応鋭トク物響ヲ思シ光明ヲ嫌ヒ瞳孔收縮シ容負猖獗ニシテ言語劇甚ニ眼面殷赤灼熱豐大眼中朱ヲ灌クカ如シ膚熱ニシテ脈緊ニシテ甚數ナラス加之才毘私特異証則皮失血腸瘡等ヲ顯ハス一ニサハル日以種ノ才毘私夥量血ヲ得ルハ良徴ニシテ則一二日間ニ快復ノ期顯

ルト云

其二腦壓迫ヲ主症トスル才毘私是ナリ各種ノ才毘私極度ニ升リテ速ニ死セサル者ハ則以種ヲ続發ス我國ニ於テハ希ニ嗜眠及ヒ痲痺症ヲ原發スルモノ病初ヨリ以種ヲ得ルヲアリ。凡痲痺狀態解剖家ノ術ヲ以テ之ヲ得ルヲ克ハス只其病原ハ腦膜中ノ瀦水凝血鬱膿若シクハ腦質浮腫ニ硬結シ或ハ血液變調シ以テ疒痲ノ原ヲ致ス者也其他ハ此原



ヲ講究スルヲ克ハス。茲ヲ以テ此種ノ症状ハ精神五官ヲ  
妨碍スルノ輕重ニ応シ病症モ亦異ナリトス此ニ之ヲ概論  
スルヲ克ハス  
才三脊髓主症ノ弟毘私  
各種ノ才毘私皆脊髓ヲ感傷ス散發流行ニ論ナク脊髓症ヲ  
顯ハス者之茲ニ論スル所ノ脊髓主症ト云モハ腸症先顯  
ハレ其去ルニ從ヒ脊髓諸症ヲ代發スルニ其脊髓諸症ハ搐  
抽癲痲牙関緊急時ニハ又恐水病之又之ニ語ヲ添加シ而  
ノ以諸症或ハ間歇シ或ハ留連シテ一二日間断ナキアリ  
脊髓ノ痲痺ハ病末ノ症トナリ顯レ而シテニ腦廣痲ヲ加フ  
ル者アリ四肢腸膀胱廣痲ハ則其一徵トナス。此種ノ經過  
ハ慢ナラス病者廣痲ヲ以テ死シ或ハ不虞ノ回生ヲ得ル  
アリ  
才四气道主症ノ才毘私  
胸内各器病ヲ受ク之ヲ才毘私ノ據テ然ラシムルト定ムル

ハ疑フヘシ其症ヲ視ルニ多クハ肺冷症ニシテ固有ノ性  
劇ト經過トヲ具ヘ且ツ神經症ヲ合スル者之。但シ胸才毘  
私ト云フモノハ其ノ症ニ種アリ其一ハ全身重症ヲ顯シ血  
液變調ニ出ルカ如ク死后尸ヲ開キ体中ヲ探ルニ凝体少シ  
モ變易セラル、ナク只肺中血ヲ充テ其一ニ所ニ血液浸  
入シ而シ肺質ハ障礙セラレ、所少ナキ者之其一ハ腸症ノ  
疾患著シト虽凡肺症主トシテ危險ニ陥ラシムル者ナリ此  
症ハ我國ニ於テ流行才毘私中殊ニ視ル所ニ散在才毘私ニ  
モ亦ナキニ非ス。肺症ハ經過ノ時期ヲ論セス又輕重ヲ論  
セス發露スル者之又他症則頭症語尸痲沈衰熱症失血等  
モ時期ニ由テ生スル者ニアラス  
○右論スル所ハ体中各器主トシテ病ヲ受ケ病際之ニ関ハル  
者之以外更ニ人身特異性質ニ由リ亦才毘私ノ症状ヲ異ニ  
スル者アリ則左ニ論ス  
其一小兒弟毘私



千八百世九年前ハ小兒弟毘私ヲ病ムト云テ知ラス其後  
ニ至テモホメルハ猶十歳以下ノ小兒此病ヲ病ムヲ誠ニ  
希ト云ヘリ此年ハ千八百ヨリ以來小兒弟毘私ニ罹ルヲ尤  
モ多キヲ聞發セリ殊ニ小兒五歳ヨリ十歳ノ間ニ多シ口  
セ子ルハ小兒六千五百人ヲ療シ其内百餘人ハ弟毘私ハ  
九人ハ五歳ヨリエリトレベシ千八百四十二人ノ小兒  
ヲ療シ其内九十八人ハ弟毘私ニ屬スル變易ハ粗大人ニ同シ只ペール  
小兒第毘私解剖家ニ屬スル變易ハ粗大人ニ同シ只ペール  
セ核胞ニ弟毘私毒ヲ侵入スルヲ甚シカラス只其末期ニ及  
テノニ稍大人ニ齊シク核胞癸大スルト虽氏而ノ潰瘍ニ變  
セス乃分鮮ヲ以テ治ス若夫潰瘍ニ變スルモ其毒夫粒ノ表  
面ノニヲ侵淫スルヲ以テ大人ノ如ク甚シカラスソリタイ  
レ小核ハ多クハ病ヲ受ケサル者トス腸夾核ハ僅ニ襲ハル  
、ヲ以テ泌出ノ状ナシ。病ノ初期ニ周間ハ血中纖維素ヲ  
多ク含ム故ニ此時ニ死スル尸ヲトキ心藏ヲ見ルニ其中ニ

アル所ノ血ハ尽ク凝結ス此時期ヲ過レハ血質ノ凝結減シ  
恰モ大人ノ弟毘私ノ如ク凝結セス脾臟モ亦初期ハ發大シ  
且堅硬ニ其後柔軟ニ變ス  
病ノ經過ハ解剖家ニ因テ見ル如ク其性緩ナルヲ以テ又大  
人ノ如ク劇シカラス死スル者モ亦少ナシ。其症狀ヲ  
論スルニ弟初周ノ間ハ大便秘結ニ其後順序アリ終ニ下利  
スルト虽氏其勢劇シカラス時ニハ大便ニ血ヲ混ス肢ハ病  
初ヨリ膨脹ス頭痛耳聾目眩ハ患ルヲ鮮シ証語ナク或ハ之  
アルモ甚微ニ其他險惡症ヲ顯サス  
弟ニ姓婦弟毘私  
妊煩糸婉期ニ近ク者ハ弟毘私ヲ患ルモノ甚タ希ニ妊娘弟  
初月之ヲ患ル者尤多シ之カ為ニ多クハ半産ス故ニ此症ハ  
半産ノ前徴トナス嗜眠ノ時期中或ハ此時期ヨリ早ク陰中  
ヨリ出血ニ其出血或ハ過饒ナルモノアリ或ハ數回反復シ  
病婦之カ為ニ沈衰面負灰白色トナル而ノ胎子宮ヨリ落



テ陰道中ニ滞リ死ノ后之ヲ知ルヲアリ或ハ産下ヲ速ニ諸  
カ沈衰シ以テ死スルモノアリ

其三勞瘵弟毘私  
勞瘵病中才毘私ヲ患ル者甚希之ヲ患レハ結節物殊ニ  
其腸中ニアル者ヲ速ニ軟化セシム凡生間之ヲ断スルヲ克  
ハス其故ハ勞瘵經過中ノ諸症才毘私ニ類スルヲクケレハ

其四幽囚饑饉軍卒才毘私  
是ホノ才毘私ハ其毒著シク寄偶スル所ナシ其寄偶シテ解

剖家ノ變易ヲ顯ハス所ハ假令ニ未タ全シト云フ克ハスト  
虽凡腸中ト肺藏ト之茲ヲ以テ腸中胸中ノ諸症ヲ發露スル  
劇シカラス只全身ノ症状發熱等著ク當時流行スル処ノ  
特異感傷ヲ發露ス局所症候ノ才毘私トナス可者ハ羅斯様  
班及ペテシヤヲ必見症トナスヘシ此症ハ蓋シ先年軍中ニ  
於テ流行スル者ニ猶「エ」ンゲラント。イルラント。北アメリ

カ細ニ在テハ今ニ發露スルヲアリ此症左ニ分ツ

〔甲〕輕症凡流行スル所ノ才毘私輕症ナレハ病者目眩シ

頭中壓迫ヲ覺ニ急懣スルト虽凡猪隻業ヲ營ム凡ソ八日ヲ  
経ルノ后無數ノ赤疹ヲ發ス其發スルヤ時ニハ劇甚ノ發熱  
証語ニ乘シ時ニハ証語ナキヲアリ十四日ヨリ廿一日間ニ  
生死ヲ断ス凡坎症軍中及「エ」ンケリス才毘私ニ在テハ重症

ニ陥ル者ニ

〔乙〕重症真性軍卒才毘私赤班コースヒルデングラント才

毘私ト云ヒルデングラント此症ヲ序論ス我國ニ於テハ此  
症少ナキヲ以テ其實験ニ乏シ故ニヒルデングラントノ説  
ヲ奉ク其一傳染時期ト云坎時期ハ暫間ニメ或ハ寒戦ヲ覺  
フ或ハ一種不快ノ知覺ヲ覺フ其一ヲ感受ノ時期ト云フ口  
中ヨリ惡臭ヲ放テ目眩頭傷ヲ顯ハシ手顫ヒ四肢疼痛ス脊  
髓ニ強痛アリテ中隔ノ部ニ箱搾ヲ覺工嗜眠スルト虽凡精  
神活潑セス其他熱病ニ全發スル所ノ前徴ヲ顯ス坎時間ハ



三日ヨリ七日ナリ其三ヲ癸作ノ時期ト云寒戦散作ス其間  
六時ヨリ十二小時其四炎時期ト云癸熱劇甚ニメ頭中重壓  
ヲ覺工思慮沈衰ノ眠穩ナラス詛語ヲ癸シ舌黒ク脛ニ痛ア  
リ血咳胸中攪迫脈數実腸中聖京屈ノ諸症ヲ顯ハシ羅  
斯班癸露メ之ニ粟粒疹紫斑ヲ混ス其間苗連スルヲ七日之  
其五神經症時期ト云瞬間佳候ヲ致スノ后癸熱新癸シ一層  
ス茲疹ト腸中聖京屈症ト消散シ膚ト舌トハ乾キ大便頻數  
水ノ如シ然レ氏是必見ノ症トスヘカラス嚥下困難呼吸短  
息脈動小弱之舌苔煤黑肚腹膨脹ス嗜眠シ思慮一箇ニ粘著  
ノ他件ヲ顧ミルヲセス肌肉震動ス此間苗連スルヲ七日  
之其六分利時期ト云肌膚ト粘膜ト潤イ病者痰ヲ吐シ尿過  
量ニメ塗滓アリ蒸氣癸越メ則病者輕快ヲ覺フ大便蜜ノ如  
ク之ヲ得レハ病者愉快ヲ覺フ眠醒ル毎ニ精神活潑ス其七  
減退ノ時期ト云排泄雷連シ容貞一新シ脈奮ヒ病者蘓スル  
ヲ覺フ食機復シ快眠ス然レ容貞灰白ニメ瘦削シ耳聾去ラ

動モスレハ眼ヲ嗜ミ發汗メ大便秘ス精神不奮其ハ快復時  
期ト云此時期ニ及テハ別ニ述ヘキ症ナシ只知覺機症尤進  
スルノ云  
右ニ記スル如クノ症状ハ英國イルラントニ於テ一般実験ス  
ル所ノ者之蓋其流行時ノ移ルニ後ヒエロワパ諸州ニ蔓  
延スヘシ然レ流行性ニ從ヒ其症狀少シク衰セサルヲ得ス  
〔丙〕轉旣論  
才毘私熱全治ヲ得ル者三人ニメ二人之蓋シ其時ノ流行性  
ニヨリテ尚吉轉ヲ得ル者アリ又年季地方ニヨリ獨癸ノ者  
ト虽氏猶吉轉ヲ得ル者アリ凡其快復ニ趣クハ慢徐ナリ數  
月ヲ経ルニ非レハ諸運營快復セス猶二年ヲ経テ初テ諸力  
快復スル者アリ其快復ノ時ニ當テハ毛髮脱落ス而メ皮膚  
尤長ク病狀ヲ存ス則瘡瘡膿瘡ヲ指節ニ癸スル者ヲ屢歴驗  
セリ而メ此病雷連スルヲ一二年若シ腸傷潰瘍ニ變スル者  
ハ數月ヲ経テ初テ治ス若腸症未夕泌出ニ至ラス又治ニ趣



ク者ハ其処速ニ分解メ全癒ス此症ハ病者輕快ヲ覺フル  
尤早ク只衰弱ノ快復慢ナルノミ  
○其他才毘私ノ遺病ニ移ルモノアリ而メ其遺病自ラ衰メ  
本病トナルアリ之ヲ尤ニ列ス

〔其二〕**神経系一部ノ衰弱及半広痲假令ハ視力衰耗視力曇暗**  
耳聾皮膚知覺機ノ減損四肢ノ広痺等ノ如シ此症多クハ時  
日ヲ経テ治ス然レモ久メ雷連シ而メ其証増劇シ若シクハ  
蔓延スルモノアリ

〔其三〕**腸瘍留連ス是多ク發スル一症トス○若シ夫腸瘍愈**  
エス苗連スレハ乃チ變メ純粹腸瘍トナル則チ毘私性消滅  
メ亦知ルヘカラス一旦食欲復スモ再ヒ減シ大便或ハ瀉シ  
或ハ閉シ相代謝ス諸力脱耗シ發汗淋漓精神活發セス却テ  
尙憂スヒボコニ終ニ浮腫メ斃ル而レモ多クハ腸瘍数月止  
リテ進マス而メ他器ニ病毒ヲ及サ、ルモノハ則チ全復ヲ得

ルモノナリ  
〔其四〕**虚勞是ヲ發スル者多シ夫才毘私ノ曾テ腫脹侵入スル**  
処ノ腸夾核衰シテ硬結スル者アリ而メ病者快復ニ趣ト虽  
凡其硬結更ニ解散セス則チ腸中ニ於テ消化スル所ノ食餌ヲ  
吸收スルヲ能ハス之ニ由テ病者日ヲ追テ羸瘦ニ次テ勞瘵  
ヲ致ス此症ハ腹水症ヲ以テ死スルト虽凡其其ハ則チ虚勞

ナリ  
〔其五〕**脾臟ノ癸大耳核ノ腫脹四支ノ浮腫胃病外部ノ潰瘍腋**  
胸膜ノ泌出等ヲ癸露ス此症ハ才毘私間已ニ顯ル、者之其  
他才毘私ニ乘シテ顯ル、所ノ疾病アリテ快復ノ時期或ハ  
其后發露スル者アリト虽凡才毘私ニ關係セス故ニ遺病ト

ナス可ラス只其素因トナル者之其一ニテ挙ク  
〔其二〕**勞瘵殊ニ其急性症ヲ顯ハス此症ハ則チ肺臟至小ノ粟粒**  
疹ヲ以テ散布スルカ如ク又相密接メ恰モ肺質ニ浸入スル  
カ如シ又身体他部ニ如斯粟粒疹ヲ發スルモノアリ肺質變



易シ或ハ気腫シ或ハ水血ヲ充テ或ハ肺葉肺頂ニ変ス凡肺  
中如斯泌出物ヲ致ス症候ハ分明ナラス聴症ルアウチキエ打  
響ノ良法モ確實ナラス○此遺病ハ必死症ニ弟毘私再發  
シ嗜眠語突熱再ヒ顯ル時ハ如以症狀ヲ顯サス胸中或  
ハ箱搾シ或ハ煩悶シ顔面赤熱發汗シ少シク咳ス或ハ寒熱  
往來シテ間歇熱ノ如ク或ハ急性肺旁ノ如ク順序ヲ追フ者  
アリ而シテ皆ナ死ヲ以テ終ル  
〔其二〕腎臟グリツセ浸入ヲ癸ス屢々才毘私ノ經過中ノヲ顯  
ス  
〔其三〕大腸下部ノ赤痢屢癸スル遺病ノ一ニメ新癸スルカ如  
シ其症裏急後重メ大便血ヲ混ス以テ之ヲ癸ス可シ腦中凡  
及腦軟化時ニ顯ル、症ニメ殊ニ潰瘍ヲ生スル片之ヲ癸ス  
ルヲ多シ  
治法論才五  
〔甲〕預防法

預防法ニニアリ一ハ人平生行フテ其特發ヲ防クニアリ一  
ハ才毘私流行ノ時ニ當テ其沾染ヲ防クニアリ医ノ司トル  
所ノ預防法ハ才毘私將ニ流行セントスルノ狀アレハ之ヲ  
拔除シ其流行已ニ顯ルニ及テハ其増劇ヲ剋止シ其蔓布  
ヲ制伏シ其毒人体ニ入ルニ及ンテハ之ヲ致治スルニアリ  
皆其狀態ニ從テ其法ヲ立ツヘシ茲ニ預メ論スヘカラス要  
スル所的當ヲトルニアリ假令ハ人畜ノ輻湊ヲ解キ新鮮ノ  
空氣ヲ通セシメ清潔ヲ專ラニス才毘私ノ蔓布ヲ制スルニ  
ハ的當ノ食餌ヲ用ヒ衣服ヲ清潔トナシ惡水ヲ禁シ精神ノ  
怒脹ヲ避クヘシ允リ才毘私熱ヲ恐懼スルノ甚シキ者ハ以  
病ヲ誘出ス故ニ如斯人ハ殊ニ細心ヲ加テ衛生ヲ慎ムヘシ  
允病院ニ在テハ才毘私病者ノ同房ヲ禁シ猶此病ニ用ヒシ  
処ノ器皿ヲ他人ニ用フヘカラス而レモ才毘私流行メ各人  
室ヲ別ツテ克ハサル者ハ務テ病床ヲ相離シ之ヲ駢別スヘ  
シ若其病院街市ニ近ケレハ其街市ニ向フ所ノ幘戸ヲ閉チ



以テ傳毒ヲ市人ニ傳ヘサラシム而シ病室ハ絶エス  
○各人此毒ヲ防禦スルモ亦他術アルニ非ス上法ヲ以テス  
ヘシ而シ身心ヲ衰弱セシムル諸件ヲ避ケ撰生ヲ整理シ支  
体ヲ清潔ニス但如此スレハ決メ傳毒セサルト云ニアラス  
只其之ニ罹リ易キノ素因ヲ減殺スルノコト凡止ヲ得サル  
一有ニ非レハ才毘私病者ニ近ヨルヘカラス呼吸スルニハ  
必新鮮空氣ニ向テナスヘシ其他預防法ノ諸方唾液ノ嚥下  
芳香醋ノ頓服竜腦ノ燻子ヲ帯ヒ衣服ニ被衣ヲ加エ「ホロ」  
ルカルク水ヲ以テ數回洗滌スル等ノ如キハ只恐懼ヲ抱カ  
シムルノコトニハ鴻益ナキモノ之  
〔乙〕發生治法  
一茶ノ克此病ヲ初癸ニ截除シ得ヘキモノアルカ曰ク否ナ  
只病ノ前徴若クハ其初期ニ茶ヲ以テ其險惡ヲ轉シテ良善  
ニ級セシムルヲアルノニ其効アル茶石ハ吐劑殊ニ古

キモハ効アリ吐石諸症劇進ス然レモ吐劑ヲ用腹上ノ放血  
得テハ時ニハ才毘私病ノ酒之ヲ行フテテ可ナリ數回ノ全身汚血甘  
一タリト殊ニ才毘私病ノ酒之ヲ行フテテ可ナリ數回ノ全身汚血甘  
承一又若クハ才毘私病ノ酒之ヲ行フテテ可ナリ數回ノ全身汚血甘  
緩順ナシ其経過ヲノ頓服セシムル法ニ截除スル功ナレト  
奏スル諸茶勝テ數ヘカラス然レハ皆其確功ニ至テハ未  
夕判然タル「ク」ハス  
才毘私病ヲ制伏スル奇茶トナスヘキモノハ則放血下劑アル  
チモニ劑炭酸「ホ」ノ頓服ヨド剥萬亜私キナ塩番木鱈竜  
數回入甘承一月ノ頓服ヨド剥萬亜私キナ塩番木鱈竜  
腦麝香嶺草撰耳扁太利亜及ヒ冷水是ニ是等ノ奇茶ハ皆実  
験ヲ以テ其効ヲ論スヘカラス只理論上ニ係リテ奇ト称ス  
ルノニ必ス効ナシト云ヘカラス假令ハ「ホ」ル「キ」塩甘  
承等ノ如キハ其時期ヲ計リ之ヲ用エレハ奇効ヲ致ス然レ  
凡其効ヲ奏スル所以ノ理ニ至テハ未夕知ルヘカラス実理  
ヲ求メズンハアラス才毘私病ヲ其初癸ニ於テ截除スル「ク」



ハス或ハ其時期已ニ進ニ本癸ノ症状ヲ癸スルニ及テハ之  
ニ応メ治スヘシ允リ是ヲ治スルノ法ハ急性皮膚ノ如シ必  
ス其経過ヲ妨クルナカレ而メ其末期ニ及フ迄症状ニ待  
応スルヲ要ス只医ノ務トナスヘキ処ハ陸續ニ顯ハルハ  
ノ諸症殊ニ其危険症ヲ制伏シ以テ病初ヨリ病末ニ至ル迄  
攻戦ノ劑ヲ行フヘカラス  
○以主法ハ勉メテ安静ニシ刺戟煩躁ヲ生出スル一切ノ諸  
件ヲ避ルニアリ是レ危険症ヲ預防スルノ一良法トナス然  
レ氏特リ医威ヲ以テ專ニスルヲ克ハス病者自ラ之ヲ修メ  
看護人モ亦傍ヨリ之ヲ扶クヘシ茲ヲ以テ人身各器中ニ悉  
ク注意シ劇癸スル顯症アレハ立口ニ之ヲ制伏ス凡ソ医士  
自ラ実験シテ知ル所ノ危険症ハ殊ニ注意セズンハアルヘ  
カラザル所以ナリ  
凡ソ病者ハ初發ヨリ床上ニ安護シ精神ヲ感傷シ五官ヲ激  
動スル諸件ヲ避ケ病初ハ食餌ヲ禁ス飲食ハ軟滑ニシ微温

ナルヲ婁ゲ只大渴消スヘカラサルモノニシテ冷飲ヲ許ス  
服ハ常ニ服帶ニテ包裹ス清涼ノ氣ヲ病室ニ放チニ便ノ泄  
物ハ病者ノ近傍ニ置クヘカラス大汗淋漓ナルモノハ襯衣  
ヲ更換ス毎日二回ヨリ十回猶數回ナルヘシ亦ニ周ヨリ三  
周ヲ過キ食餌ヲ減シ下利出血大汗癸熱興奮神經ノ故ヲ以  
テ快復ノ機ヲ得ルヲ克ハサル者ハ其熱減スルニ至ヒ虚脱  
ノ或ハ命ヲ換スルヲアルニ至ル故ニ漸ク餌養ノ食ヲ与ヘ  
以テ諸カヲ補翼スヘシ蓋シ此間嗜眠アルモノハ尖テ之ヲ  
妨クヘカラス病極度ニ上リ或ハ全身虚脱シ或ハ偶症ニ倚  
テ諸カ衰弱スル者ハ尚葡萄沔竜キナ乳劑ニ造リテ用  
フヘシ若シ精神再ヒ沈衰スルモノハ之ヲ驚躁セシム可ラ  
ス○此法方ヲ用テ亦毘私症多クハ其轉故ニ至ル者トス蓋  
此間医葉ハ病状ニ応メ用捨スヘシ  
各症ノ殊ニ初期ニ初度血積ヲ云フ期及ニ於テハ特異治方緊  
要トスヘキ者アリ之ヲ列ス



〔其一〕病性恐ラクハ傳染毒ニ出テ初症見ハレ而メ嘔氣ヲ兼  
ルモノ直チニ吐劑ヲ用井テ殊ニ切アリ  
〔其二〕舌苔厚黄惡心嘔氣アリテ而メ腹ノ知覺銳カラサル者  
亦吐劑ヲ行フヘシ

〔其三〕腹部知覺非常ニ劇甚ナルモノハ其処ニ水蛭ヲ貼スレ  
ギオ。イデヲクノカリス非常ニ疼痛劇シク病性初ヨリ劇甚  
ニシテ其經過甚速ナルモノモ亦水蛭ヲ貼スヘシ而メ緩軟ノ  
食餌些少ノ氷片ゴム漿ヲ与フ小腹上ヲ蒸ス以症恐クハ甘  
汞効アリトス

〔其四〕劇甚下利ニハゴム漿油質乳劑小量ノ麻碎菜小量ノ吐  
根ヲ与ス腹上ヲ温蒸ス其下利頑固ナル者ハ粘汁ニ明礬ヲ  
加ス与フモシソレ大便秘結スル者ハ輕易ノ下劑則醋酸剥  
芎亞私灌腸法及ヒ腹上ノ温蒸法若之ヲ行ト虽凡通利ナケ  
レハ甘汞常油ヲ用フ

〔其五〕頭痛顔面赤ク眼中怒脹スレハ顛顛ノ水蛭項ノ角方ヲ  
行フ而レ凡角方ハ急劇症アルニ非レハ行フヘカラス之ヲ  
行フモ二回以上ヲ許サス若シ夫レ顔面甚ク赤カラサレハ  
醋水ノ寒菴及ヒ氷片ノ散布ヲ佳トス又下肢ニ芥子泥ヲ行  
フヘシ夫レ如汝誘導法ハ放血法ニ兼用シテ効アリ又放血

法再ヒ用フルト克ハサル処ニ行フテ効アリ  
〔其六〕大渴消スヘカラサル者ハ粘滑汁若シクハ粘滑酸味汁  
ヲ以テ之ヲ消スヘシ其酸ハ塩酸硫酸ヲ尤適當トス  
〔其七〕多血強実ノ人オ毘私ヲ患ヒ其勢初メヨリ劇甚ニシテ殊  
ニ胸症ヲ著シク癸スル者ハ刺絡時有テ非常ニ効アルトア

〔其八〕神経質ノ人病初ヨリ精神沉衰シ早ク瘥寧詛妄ヲ癸ス  
ル者ハ纈草薄荷浸汁ニ塩酸安息香酸ノ類ヲ加味シ与フ又惡  
心法吐酒石吐根甚効アリ

〔其九〕病初ヨリ血調著シク遠和スル者ハ汚血諸法皮膚刺戟  
法ヲ禁シ速ニキナ煎汁鑛酸ヲ与フヘシ



〔其十〕脊髄刺戟劇甚ナル者ハ浴法殊ニアルカリ浴奇功アリ又身体ヲ热水ニ漬テ而シテ灌水ヲ行フテ顯症ヲ一時ニ制伏スルヲアリ

〔其十一〕肺症其微少ナルモノハ別ニ法ヲ設ルニ及バス然レ氏病者側卧シ其下側頗ル血液ヲ充塞スレハ轉側セシムルヲ妙トス若肺症劇甚ナルハ局所瀉血ヲ行フヘシ然レ氏効ヲ得ルヲ少ナシ内服ハ安奠劑ノ下利ヲ促サ、ル者、粘滑劑安息香酸少量ノ礮砂吐根ヲ行ヒ又散泡膏ヲ貼ス但シ病ノ初期ニ在テハ肺症危険トナル者希ク腸中再新ノ血積ヲ致スニ及ンテハ表症モ亦一新ス而神經諸症之カ主トナリ以テ危篤ヲ顯ハス然レ氏病症至極狀ヲ顯スニ非サレハ攷撃ノ劑ヲ行フヘカラス彼ノ重症昏愎ノ如キモ医菜ヲ用ヒス只待応法ノミヲ以テ治スルヲアリ又夕虛勞極ルカ如キ病者ト虽氏輕易ノ刺戟菜キナ及酒等ヲ用井テ足レリトスルヲアリ然レ氏經過中危劇症アレハ別ニ其治療ヲ設ケテ

以テ之ヲ攷撃セシムハアラス是ヲ危ニ列ス

〔其二〕血液變調出血夥多ハ鑛酸硫酸磷酸ヲ緊要トス是ニ兼用ノ適當スヘキモノハキナ煎汁ナリ此時ニ當テ諸力沈衰ヲ合併スレハ竜腦ノ主治トナス若シ出血由連メ危篤極ル者ハ灌水及ヒ收斂劑ヲ以テ之ヲ制スヘシ

〔其三〕腦症安靜保護ヲ緊要トス慢リニ病者ヲ喚起スヘカラス又記憶存ルヤ否ヤヲ試シムカ為ニ外物ヲ見セシムヘカラス又其思慮ヲ少シモ用井シムヘカラス是等ハ皆精神ヲ安護スル法ナリ又夕病者ニ對メ愉快ノヲヲ為ヘカラス是即精神興奮詛妄ノ媒トナルナリ以テ病ヲ險惡ニ陷ラシム係セスレハアルヘカス然テ猶テ精神ヲ興奮セシムルハ病者ヲ毒殺スルニ同シ殊ニ聰明ナルモノハ四隣ノ騷擾ヲ避クヘシ病者眠リニ著ケハ勉テ熟セシム故ニ睡レハ医菜トイヘ氏与フルヲナカレ熟眠ハ則チ医菜ニ優レハナリ〇知覚機著シク増進ル少モ安靜ナラサル者ハ時トメ鎮症劑ヲ用イテ



之ヲ制伏ノ殊功アリ「グラヘス」曰ク瞳孔ノ縮張ヲ見テ鎮  
痙茶ヲ用捨セリ瞳孔縮小スル者ハ阿芙蓉ニ堪エヘカラサ  
ルノ脳症トナス則莨菪主治トナス瞳孔散大スルモノハ阿  
芙蓉神功ヲ奏スルノ徴トナス○神經ノ興奮尚一層スルモ  
ノハ寒罨法寒洗法効アリ又夕微温浴灌注法モ効ヲ同フス  
若シ頭中熱シテ面色赤者頭上ヲ灌注メ功アリ之ニ由テ安  
静トナリ眠ヲ催シ搖擲等ノ諸症減ス○病老期ニ及ヒ血虛  
ノ状ヲ顯ハシ皮膚肝アリテ厥冷トナリ脈極テ數神經ノ機  
能順序ヲ乱ス者ハ麝香ニ三氏ヲ取リ服セシムル毎三  
回ヨリ六回ニノ奇効アリ乃チ皮膚温アリ蒸氣發シ脈安ク  
興奮ノ機減シテ眠リヲ催シ速ニ快復ノ門ニ臨ムトアリ已  
ニ其良徴ヲ顯スニ及ニテハ麝香ノ後服ヲ或ハ止メ或ハ減  
ス然レ氏其量ヲ止ムレハ必テ惡症ヲ生スルトアリ即チ直  
チニ之ヲ再服スヘシ其間頭熱増ス者ハ頭上ニ寒罨法ヲ行  
フ○昏睡モ亦廣香亦ス然レ氏酒キナ竜腦却テ功アリ嗜眠

未夕昏憤ニ至サル者ハ危症トスルニ足ラス故ニ攻撃ノ某  
ニ過ク可ラス  
[其三] 心症心跳実ノ力アル間ハ刺戟茶ヲ禁ス然レ氏其勢弱  
リ人事ヲ乱リ心響鈍ナルハ則酒阿芙蓉ヲ用ルノ正期ト  
ナス若シ心跳短縮メ痙状ヲ挿ニ極レハ則チ廣香効アリ之  
ニ依テ痙牽鎮シ血行滑利ス脈小ニシテ系ノ如ク又夕衰弱極  
マリテ間歇シ皮膚厥冷ナル者大量ノ竜腦ヲ用ヒテ之ヲ蘇  
生スルトアリ  
[其四] 呼吸器症神經性時期ニ在テハ咳嗽ノ為ニ苦惱シ喘息  
甚シキトアリ此症ハ鑛酸應スキナ酒ヲ止ムヘシ肺炎ニ出  
サルモノハ瀉血効ヲ見ス癸泡膏及ヒ内葉ハ即功ヲ得難シ  
故ニ胸上及ヒ膊ノ芥子泥胸上ノ温罨法亦チ私喘息ノ  
内葉ハ少量ノ安質劑安息香酸硃砂遠志肝アツテ奇効ヲ見  
ルトアリ又夕鎮痙藥時アリテ之レヲ治ス「エウマン」ハ  
キ魏ヲ称ス予ハ其効ヲ未夕知ラス凡ソ喘息劇甚ナルモノハ



凶兆トスヘシ気管枝及ヒ気管中ニ粘痰膠著シ之カ為ニ困  
苦ヲナス者他菜ヲ以テ之ヲ治スルヲ克ハサレハ巴ムヲ  
得ス吐劑ヲ行フベシ或ハ毛羽ヲ以テ咽喉ヲ刮摩シ以テ吐  
ヲ散シ粘痰ヲ略去シ而シ害ヲ見サルヲアリ  
其五腸症神経時期ニ於テ時アリテ吐ヲ癸ス之レ腦症ニシ  
制伏シ難シ炭酸ヲウリル水酒芳香葉鉛塩ロドソイリ  
法効アリ硝酸銀ヲ各別ニ試ムヘシ外用ハ芥子泥乾角法氷罨  
トヲ用ヒテ速効ヲ見タリ蓋胃軟和ニ目テ起ル者ハ諸菜必  
功ナシニ神經時期ニ於テ大便ニ日以上秘結シ肢膨脹スル  
モノハ忽ニスヘカラス緩軟ノ下劑ヲ用テ通利ヲ取ルヘシ  
殊ニ軟化キリスステール忘ス内服ハ大黃常油尤功アリ○下  
利劇シキ者ハ明礬鉄コリユンボ鉛ヲ用テ硝酸銀ニハヲキ  
リスステール料四ヨリ和シ之ヲ灌腸ノ更ニ功アリ或ハ鉛或  
ハ阿芙蓉ヲ粘滑汁ニ加工行テ佳シ○瀉泄中血ヲ混スル者

大量ニ非レハ別ニ法ヲ要セス其法ハ峻カノ鑛酸殊ニ硫酸  
殊ニ硫酸燐酸或ハ吉納ゴムヲタニエキスタラクト成ス病  
状悪性ナルモノハ竜腦アナルレブチカ成ス出血劇シキモノ  
ハ小肢ニ氷片ヲ置ベシ○肢満腫ハ困苦ノ一症トス水銀膏  
揮發膏醋酸トテレビン油ノ合劑ヲ摩擦シ「キナ若クハ」ホロ  
ルヲキリスステールトス又夕長頸ノスホイトヲ以テ腸中  
ヨリ風氣ヲ驅除スルモ可也○腸穿穴ノ症ヲ頸ハレ危急ニ  
屬スル者ハ大量ノ阿芙蓉ヲ頻服スヘシ毎服半片ヨ病者素  
ヨリ強実ニシテ尚虚脱甚シカラサル者ハ之ニ兼テ局所ノ瀉  
血ヲ行フ  
其六尿管症常ニ膀胱ニ注意シ其虚実ヲ察スヘシ之ヲ知ニ  
ハ按脈ト打響法トニアリ若シ実スレハ病者ヲノ尿意ヲ獎  
勵シテ之ヲ利セシムヘシ然レハ病者尿ヲ利スルノ意ヲ失  
シ又夕其膀胱ノ筋肉意ニ応セサル者アリ斯ノ如キ症ハ先  
温蒸法膀胱上ノ按摩温浴法ヲ試テ之ヲ促スヘシ其効ヲ



見ハサ、ルニ及テ初テカテ、テルヲ行フヘシ此術蓋シ危  
険ニ属スレハナリ

〔其七〕皮膚症 皮膚乾燥スルモノハ是ヲ寒保シ寒洗シ寒注

ス但シ侷格脆薄ナルモノハ微温湯ヲ灌注スヘシ脱汗劇シ

キモノハ芳香水或ハ竜腦ヲ加フル酸ヲ以テ温洗ス又夕暫

時寒注ヲ用ヘテ効ヲ見ルヲアリ○皮膚疹ハ其治方殊ニ注意

セスノ處ト病者ノ侷格ニ從テ各別ニ法ヲ設クヘシ若シ夫顔

面口トズハ治方ヲ施ストイヘ凡効ナシ故ニ其自然ニ任セ

待応法ヲ要ス○脚ノ罹斯ハ鉛糖水水銀膏施ス而メ化膿ヲ

避ルニ及ハサル者ハ琶布ヲ用エ但シ侷格ニ從テ罹斯ヲ誘

發スル事故アレハ其症ヲ或ハ消炎劑或ハ苦味香芬劑ヲ行

フテ制伏スヘシ○眠瘡ハ殊ニ其発出ヲ防クヘシ則皮膚ヲ

清潔ニシテ清凉ノ衾床ニ置キ亦夕病者ノ位置ヲ常ニ轉メ一

所ヲ久シク壓迫セシムヘカラス床上ニ当ル所已ニ赤色ヲ

顯ハセハ之ヲ安放シ醋竜腦酒火酒鉛糖水ニテ洗シ或ハ鉛

草硬膏ヲ貼ス既ニ其所刺脱シ化膿スレハキナ煎汁ニテ浸

シ或ハ草ヲナシプリユムビ膏ヲ貼ス壞疽ニ陥ルモノハ刺

戟ニテ竜腦ヲ含ム主劑ヲ以テ洗フ其結痂坚硬ナレハ其痂

ヲ割断シ稀薄硝酸テレビン油ヲ注ク其壞痂自ラ剥脱スレ

ハ膿汁顆シク流ル乾滯帯デゲス膏ヲ行ヒ苦味藥幾那ノ如

キヲ内服セシム○耳核ノ腫脹ハ初メニ水蛭水銀膏塗ニ軟

和芳香ノ罨法及ヒ竜腦ヲ加ル琶布ヲ用ユ已ニ膿ヲ膿セハ

刺肉ノ之ヲ洩ス四支之浮腫ハ利尿劑日永ニキタリスノ浴法芳香

罨法施ス○四支蜂窠識ア下ニ炎化膿ハ局所ノ渾血水銀膏琶

布ヲ以テ施スヘシ膿ハ早く洩スヲ貴フ若シ其刺肉ヲ急シ

ハ蔓延荒蕪ノ動モスレハ危険症ヲ致セハナリ真奮機減シ

或ハ昏憤減シ爽快ヲ覺ユルノ時期ニ及ヒ右ノ清潔トナリ

食氣復スレハ即脳神銳敏トナリ腸瘍清潔トナルノ徴トス

ヘシ然レ腸瘍ハ未夕治癒セサルヲ以テ注意スヘキハ血虛



血積ヲ致セ  
水片ヲ置キ  
水蛭ヲ貼ス若  
ニ腦中

虚勞ナリ  
二此時期ハ尋常ノ危険ニノ忽ニスヘカラサル所ナリ  
腦症復反スル者ハ極テ安静ニ保護スヘシ頭中血積ノ状ナ  
キモノハ大量ノ阿片温浴广香功アリ此症動モスレハ即チ  
死スルアリ腸瘍反復スル者ハ多クハ食物ノ誤用ニ出ツ其  
物猶胃中ニ宿滯スレハ吐削ヲ行フ時已ニ過レハ再ニ食禁  
ヲ嚴ニス大便秘スル者ハ琶布ヲ貼シキリスルヲ行フ  
テ腸ノ氣道ヲ獎勵ス下利ヲ生スルモノハ油魚乳削ヲ行フ  
煩悶劇シク脈ヲ按スレハ其知覚亢進スル者ハ水蛭琶布ヲ  
貼ス腸穿穴ノ疑アルモノハ之ニ応スル治方ヲ行フ  
血虚速ニ増進スルモノハ收斂強壯ヲ含ニ大便ニ変スル少  
ナキ食事ヲ与ヘ酒キナ煎汁ヲ行フ急危ノ肝ニ及テハ滋養  
ノキリスルテ及ヒ滋養ノ浴法ヲ以テ精力沉衰ヲ防ク  
快湊ノ時期ニ及テ滋養物ヲ与ヘ新鮮氣中ニ居ラシム適宜  
ノ運動ヲ致シ腦神五管ヲ安護シ大便ノ通意ニ注意スヘシ





脚気病論

西曆紀元千八百五十八年我安斐五年於長崎出島

和蘭官醫浦謨百氏筆記

往昔ハ医以病ヲ識得スルヲアルヲナシ印度地方病ヲ論ズル畧中絶テ此病ヲ記スルヲ見ス「チ」ラリフトヤハサシターム<sup>書</sup>等ノ書中ニハ脚気病ヲ記載スレ其説粗漏ニメ取ニ足ラス且ツ輒近十年之間実験スル知ヲ以テ其説ヲ確定スルモノナシ脚気病原因一ハ識得スベキモノアリ一ハ未タ明白ナラザル者アリ〇近年和蘭藩属ノ印度ニ居留セル医官レイセホアムヘリンドマシターヘル<sup>人</sup>等此病ヲ論説シ普ク之ヲ世ニ識ラシテ且ツ其他諸般ノ流行病ヲ實



驗セリ彼ノ説ニ從テ脚氣病ノ原因ヲ揭示スルヲ尤ノ如シ

〔一〕 夏月汚湿ナル沼沢ノ地方ニ久シク居住シ沼沢ヨリ蒸氣スル氣ニ感シ殊ニ晝冬熱酷烈ニ夕夜寒冷ナルハ最モ害アリ

〔二〕 天气湿润ナルノ日力作勞動殊ニ蒸氣閉塞スル等殊ニ害アリ

〔三〕 塩及ビ酸類ニ浸漬スル野菜ヲ久時多食シ新清ナル食餌ヲ交換シ用フルヲナク之ニ兼ルニ飲液僅少ナレバ殊ニ宜シカラズ

〔四〕 前章記スル所ノ病因ニ兼テ大便通利ヲ怠リ抑鬱セル精神ノ感動余印度海ニ繋ケル和蘭ヲル

ヂストト号スル軍艦中ニ在テ此病ノ流行スルヲ實驗スルニ精神抑鬱セルノ人此病ニカ、リ多ク死セルヲ見タリ舟中ノ乗組七十人アリ之者其半ハ此病ニ罹リ死タリ唯諸長官絶テ此病ニ感ズル者ナキヲ最モ注目スベキ也是其食餌ノ善良ナルト精神寛快ナルニ因テ此病ヲ免ル、ヲ知ルベシ

〔六〕 土地固有ノ水蒸氣殊ニ金坑ヲ穿洞スルニ當テ蒸氣スルノ氣此病ノ原因トナル「パナア」島ニ於テ錫坑ノ近傍ニ脚氣病大ニ流行ス〇沼沢ヲ涸乾セシムルモ亦甚タ害アリ

病性分別

病性ヲ分テ二種トナス



才一 單純焮衝此症經過甚夕迅速ナリ  
才二 麻痺性此症經過緩慢ナリ。此二症共ニ腸胃病  
性胆液性聖京偃性倭麻質私性ヲ合併スル者アリ

焮衝性

才一 期限 前徴及ビ初發一二日ノ間夕患者身體違和  
スルヲ覺ヘ二日或ハ三日ノ后若クハ猶是ヨリ早ク此  
期限ニ至ル

才二 期限 劇症發現。顔色赤紅眼膜赤腫眼目光冷ア  
リ頭痛若クハ輕語脊髓劇痛ニ殊ニ按撫シ或ハ身體ヲ  
動揺スレバ其疼痛増劇ス外部ヨリ脊推ヲ見ルニ毫モ  
違変スル処アルヲナシ

呼吸素篇

呼吸困難胸腔稍々腫起シ呼吸苦悶眩アリ

血液運行

之ヲ以テ病ノ輕重ヲ推測スルニ最モ肝要  
タリ脉緊実或ハ細小ニメ緊張ニ常ニ數ニメ一密<sub>ニ</sub>扭<sub>ト</sub>篤<sub>ト</sub>  
間百搏或ハ百二十搏ヲ數フベシ。心動悸甚ダ多クハ

全胸腔著ク築動ス

飲食不化

舌上絳赤乾燥シ或ハ舌苔胆液性ヲ見ハシ  
胃部苦悶及ビ壓迫ヲ覺ヘ屢々嘔吐ス又屢々此證ノ缺  
ルヲアリ大便遲滯シ或ハ秘閉ス小便不利ニメ赤色或

ハ紅色ヲナシ速ニ惡臭ヲ生シ而メ沈渣アリ

分泌排泄

皮膚灼熱乾燥腫脹シ毫モ發汗アルヲナク  
唾液分泌減損ノ口中乾燥シ或ハ淚液流出スルヲ屢之



アリ。此諸證漸ク増進シテ危峻ニ至ル有カナル者ヲ以テ其病因ヲ防グヲ能ハサレバ卒ニ死ニ至ル者アリ。○六日八日或ハ十日二十日ヲ過クルノ后死スル者アリ。是ヲ以テ余此脚氣症ニ經過迅速ナル病之名ヲ附ス。多ハ窒息諸症ヲ發シ斃ルハ也。

〔才三期限〕 此期ニ至テ前ニ記載スル処ノ諸症或ハ間歇シ或ハ弛張ス。此此ニ當テ療治宜キヲ得テ速ニ患者ヲ救フヲ得ヘシ若シ処置宜キヲ得ザレバ患者ノ危篤ヲ挽回スル能ハス其治療適応スレバ肌膚潤沢アリ。輕ク發汗シ脉數減シ緊脉去テ緩トナリ呼吸寬暢シ煩悶減シ眼彩靜和ニシ嘔吐退散シ腰脊ノ疼痛減却シ小便多量ニ快利ス然レ氏此改ニ當テ猶未夕危険ノ恐ア

ルヲ忘ルベカラス何トナレバ更ニ諸症ノ増進スルニ由テ或ハ死ニ至ルヲアルヲアレバ也。是ヲ以テ有力ナル療法ヲ怠ルヘカラス。○危劇ノ諸症退散スルノ后足脚ノ一部或ハ全脚麻痺ヲ残ス者アリ余脚氣急症ニ於テ足部ノ麻痺ヲ見ルヲ甚タ稀ク。此急性症ノ經過ハ凡テ十日十二日ヨリ十四日ニ至ル或ハ眩ニ快後ノ期限稍遅延スル者アリ。

劇烈ナル吃逆ハ甚タ惡候ナリ多ハ死ニ瀕スルノ兆ニ

〔乙〕 麻痺性脚氣 即チ慢性脚氣 往昔ハ唯此證ヲ以テ脚氣トナスノミニメ甲種ノ嫩衝性脚氣アルヲ知ル者ナシ

〔才一期限〕 數日若クハ十四日間患者ノ意思慰暢セズ



坐右更物ヲ操ルヲ欲セズ精カ甚ク鬱憂ス。終夜安眠  
スル能ワズ夢多ク朝ニ至リ醒覺シテ精神清爽ナラス  
○食欲缺亡シ若クハ大ニ飢餓ス呼吸困難脊部惡寒震  
慄大便秘閉腰痛アリ而后病証次ノ期限ニ遷移ス  
【才二期限】前章記載スル如ク諸症漸次ニ増進ス然レ  
較著ナル熱發アルナリ或ハ熱ナシ○徐々ニ足部腫  
脹シ其腫脚ヨリ股及ビ膝部ニ及シ數日ニ全肢ニ滌  
漫シ竟ニ胸部ニ迫ル之ニ由テ更ニ呼吸困難ヲ誘發シ  
兼テ両手腫スル者屢之アリ○皮膚ノ腫脹胸腔ヲ侵ス  
時ハ初メ數狀ニシテ微細ノ脉變メ甚ク數トナリ愈細小  
トナル胸膈ノ筋挛急シ吐ヲ發シ呼吸困難愈増盛シ呃  
逆頻發シ終ニ死ニ至ル○医ノ療法期限ニ忘メ其処置

宜キヲ得レバ病ノ増進スルヲ防キ得テ快復ニ至ル者  
屢之アリ

【才三期限】數週若クハ數月麻痺苗連シ麻痺發メ腫脹  
散シ四肢更ニ平常ノ如ク或ハ瘦疲スルアリ腰脊ノ知  
覺減少スレテ痺ニ至ラス大便閉止シ体力疲弊ス○右  
ノ諸症漸ク減退シ快復ノ期限ニ至ル○此慢性症ハ燼  
衝症ニ比較スレハ其經過緩慢ニシテ死亡スル者甚ク少  
シ

病性

吾輩此病ヲ以テ斃ル人ノ屍ヲ解部シ古未未夕詳カナ  
ラザル脚氣病ニ就テ發明スル所ノ者多シ此病ノ侵襲  
スル処ハ多ク脊髓ニ在テ胸推才九ヨリ腰推才三或ハ



剖

脊四ニ至ルノ部ニアリ。脊髓及ヒ脊髓膜時トメ血液蓄積シ若クハ其組織中ニ血液漏泄シ或ハ慢性症ニ在テ脊髓ト其膜ノ間ニ洩チヲ交ユル血液滲出ス。余嘗テ死体ヲ解剖スルニ當テ前ニ記スル所ノ脊髓部分ニ於テ多少其部ノ軟脆ナルヲ目撃セリ。余按ニ此病ノ本原ハ脊髓ニ在テ上ニ記載スル原因ヨリ其患害ヲ發起シ流行性ノ諸症ヲ發スルナルベシ。其他死体ノ胸腔及ビ腹腔ニ於テ多少ノ水液蓄聚スルアリ且ツ心囊ニ於テ亦然リ是脊髓ノ患害ヨリ起ル病證トナシ考フヘキ所也。又腦髓時アリテ尋常ノ形質ヨリ稍軟柔トナリ或ハ腦蓋中ニ水液蓄留スルヲ見ル前ニ記載セル所ノ脚氣原因又他ノ景況ニ在テハ惡性

ニシテ頑固ナル間歇熱ヲ發スルヲアリ注目セザルベカラス是レ一種ノ傳染毒脊髓ヲ侵襲セルヲ知ルベシ

預后論

急劇症

此證急劇ニメ數時ナラスメ斃ル者アリト余氏医能ク熟考メ有カナル処置ヲナス時ハ幸ヒ救極スル者アリ發症間歇ノ時ニ當テ有カナル治療ヲ施スヲ得ルハ尚治路ヲ得ルヲ望ムベシ

遷延證

此證ハ前症ノ如ク厄篤ナラス治療ノ効多クメ快復ニ至ル者屢之アリ然レ經過緩慢ニメ體質大ニ疲弊スルナリ



治法

急劇症

單思熟考メ速ニ峻効アル茶ヲ撰用スベシ若シ躊躇メ  
機會ヲ失フ時ハ暫時ニ救フベカラサルニ至ル。其処  
置ノ法方尤ノ如シ

〔方二〕 少壯強健ノ人多血ナルモノニ於テハ脈狀ニ赤  
メ刺絡ヲ行フベシ但シ猥ニ多量ノ血ヲ泻スルハ宜シ  
カラズ

〔方三〕 脊髓ヲ按メ疼痛アル処ノ脊梁骨ニ次テ吸角法  
ヲ施シ若シ吸角ノ缺ニ遇ハ、疼痛ノ部分兩側ニ於テ  
蟻針ヲ施スベシ。蟻針ヲ以テ吸角ニ代用スベシト魚  
氏吸角ノ如ク良効アルナレ

〔方三〕 脊梁骨ノ患部ニ蒼水銀軟膏ヲ貼シ或ハ之ヲ摩  
摺スベシ

〔方四〕 或ハ菲沃斯加蜜列菘若等ヨリ製スル鎮瘡琶布  
ヲ貼シテ疼痛輕快ヲ得ルアリ。琶布ハ長サ

〔方五〕 内腹ニハ硫酸規尼涅多量ヲ共フベシ。余カ經  
驗ニ拠レハ此茶無双ノ良茶ニメ此病ヲ治スルニ缺ク  
ベカラザル者也

是ヲ以テ躊躇スルナク幾那塩三十匁ヲ取り分テ六  
包トナシ其一包中五匁ヲ含ム者ヲ每一抄時ニ共フ此  
方此症ノ方劑ニメ他ニ換用スベキ薬剤アルナレシ。  
若シ諸症緩解スレバ幾那塩ノ量ヲ減シ一日二十匁ヲ  
投シ十匁ニ至ルヘシ。脚氣急劇症ニ在テモ亦其癸作



純粹ノ間歇性ナル者ニハ余間歇眩ニ放テ每一抄時ニ  
機奈塩十氏ヲ与ヘ以テ患者ノ命救フアリ

〔才六〕 実芟荅利斯海葱ノ散劑及ビ浸劑甚タ良効アリ

煩悶尿閉及ビ心臟竦動ノ症ニハ殊ニ異効アリト為ス

〔才七〕 加羅蔑兒輕量ヲ取テ幾那塩ト配合シ与フベシ

其量大概昼夜ニ三氏四氏ニ至ルヲ以テ足レリト為ス

〔才八〕 嘔吐アルノ症ニハ輕量ノ醋酸没尔以涅或ハ塩

酸没尔以涅ヲ与フベシ決メ沸騰散ヲ与フルトナカレ

〔才九〕 大便秘閉スル者ニハ絶テ内服ノ下劑ヲ与フヘ

カラス唯須ク刺衝茶ヲ以テ製スル所ノキリステール

ヲ行フヘシ

〔才十〕 煩悶劇ク心藏ノ部壓迫強キ者ニハ胃部及ヒ胸

胸骨ノ下部ニ大ナル莖著硬膏ヲ貼スルヲ佳シトス

〔才十一〕 其他ノ傍症ハ各亦景況ニ應メ処置スヘシ上

ノ諸法ヲ以テ病ヲ防治スルヲ得レバ適応ナル補裡

ノ処置ヲナスベシ則チ尤ノ如シ善良ノ食餌植物殊ニ

植物実ヲ宜トス雞卵ヲ喫シ及ヒ清潔ニメ寒冷ナル新

鮮ノ大氣ヲ通シ幾那煎劑ニ鑛酸赤葡萄酒及ヒ陳旧ナ

ル白葡萄酒ヲ加ヘ与フベシ

脉状穩靜トナリ呼吸緩暢シ小便分泌快利シ殊ニ脊髓

ニ關係スル諸症退散スルニ至テ規尼涅及ビ実芟荅利

私ノ腹用ヲ止ムベシ然ラサル者ニハ此兩茶ヲ持重シ

用フベシ

遷延症



遷延症ニハ上ノ如ク有カナル治方ヲ行フベカラス謹  
慎メ能ク症候ヲ熟察シ而メ后蒸劑ヲ投ズベシ。此症  
ニ於テハ急劇症ニ於ケルカ如ク急卒且ツ有カナル治  
法ヲ專要トセズ然レモ悠然時日ヲ引キ処置ヲ怠ルベカ  
ラス若シ時期ヲ怠リ其治ヲ誤ルハ故ニ復スベカラ  
サルニ至ル。其処置ノ法尤ノ如シ

〔身重〕

吸角法及ヒ蟻針ニ因テ局所ノ瀉血ヲ行フベシ  
必ス少量ニ過クベカラス余此症ニハ刺絡ヲ行フヲ禁  
ス苟モ之ヲ行フ時ハ必ス大害ヲナシ決メ良効ヲ取ル  
ヲナク却テ水腫症ヲ誘發スルニ至ル

〔脊二〕

脊髄疼痛アルノ部分ニ水銀軟膏ヲ摩摺シ或ハ  
之ヲ貼スベシ

〔脊三〕

芫菁硬膏。脊推ノ两侧ニ芫菁硬膏ヲ長キ片ト  
ナシ貼スレバ殊ニ確効アリ其大サ一指横徑ナルヲ取  
リ患部ヲ按メ疼痛ヲ覺ユルノ間持重ニ施スベシ。病  
證ノ景況ニ準シ芫菁硬膏ヲ以テ久シク打膿セシメ或  
ハ之ヲ乾痊セシムベシ

〔脊四〕

内服劑。此症ニ於テモ亦少量ノ硫酸規尼涅ヲ  
与ヘテ良効アリ。鑛酸ニ溶解シ水劑トシ与フルヲ最モ  
宜シトス規尼涅十二分ヲ取り稀硫酸半分ヲ以テ溶シ  
一昼夜ノ量トナス。其他実芫荈利私海葱葡萄酒ヲ与  
ヘ且ツ燒酒ヲ水ニ和シ服セシメ輕キ進運劑ヲ用フベ  
シ。此症ニハ絶テ加羅蔑尔及ヒ硝石ヲ与フベカラス

〔脊五〕

病ノ終期幾那煎劑越栗幾失兒赫馬利沃里ヲ加



へ用フルヲ宜シトス亜児尼加及ヒ嶺草等ノ如キ刺衝  
弓キ茶ハ最モ謹慎メ用フヘシ快復ノ期ニ當テハ是等  
ノ茶良効アリ

〔才六〕 四支腫脹スル者ニハ揮發劑加耶布底油羯布羅  
丁幾礪砂揮發膏等ヲ塗擦スベシ

〔才七〕 善良ナル食物葡萄酒及ビ新清ノ大氣ハ快復ノ  
期限ニ當テ偉効アリ

〔才八〕 手足ヲ適宜ニ運動シ其<sup>且</sup>ツ謹慎ヲ加ヘテ越列幾  
的児ヲ施スベシ

文久元年辛酉春三月

白杵 宮川有俶 朗譯

麻疹略說

和蘭官医岡百氏壬戌四月七日於崎陽養生館幾里仁

幾口授 日本・松本蘭疇先生筆記

夫レ麻疹ハ熱性病ニシテ固傳染ヨリ発ス<sup>空</sup>觸<sup>及</sup>テ病者  
ナル諸病小児ニ発スル者ニ然<sup>氏</sup>當今ノ如ク久シク流行  
ナクメ天行スレバ大人モ亦得ルナリ故ニ每人ニ染ム  
ベキニ而メ其毒元ト麻泡中及ビ涕涎中ニ含有スルヲ  
以テ津液ヲ以テ他<sup>人</sup>ニ毒アリ故ニ其疹漿<sup>克</sup>ク痘ノ如ク  
接引スベシ然<sup>氏</sup>病性不危ナリ故ニ種接スルニ不及<sup>種</sup>  
シ麻疹ヲ求メ<sup>癩</sup>疹ハ散疹中善性病<sup>ノ</sup>性ヲ論<sup>ト</sup>  
スル<sup>癩</sup>疹<sup>ハ</sup>散疹中善性病<sup>ノ</sup>性ヲ論<sup>ト</sup>  
兆<sup>ハ</sup>一二時后<sup>前</sup>兆<sup>ハ</sup>一二時后<sup>前</sup>兆<sup>ハ</sup>一二時后<sup>前</sup>  
兆<sup>ハ</sup>一二時后<sup>前</sup>兆<sup>ハ</sup>一二時后<sup>前</sup>



日ニメ大凡消散シ次テ又發熱メ大ニ發疹ス則チ麻疹  
患症ヲナス之其熱劇シケレハ則チ總テ其熱ノ多少ニ  
從テ發疹モ亦輕重アリ熱替苗メ脉ノ進騰スル者皆不  
良且ツ此病多少喉頭氣管枝ノ疾患ヲ兼又其喉頭氣管  
枝ノ見症須ク發疹ト共ニ消散スベシ若シ發疹去ルモ  
咳嗽等不去者ハ呼吸器甚タシク義膜炎様ヲナ  
スノ症トナスベシ麻疹ノ恐ルベキ者ハ續發ノ呼吸器  
病之所疹傍ニ続キ来ル就中氣管枝頭肺圈トノ二器共ニ  
燦衝ヲ致ス所謂氣管肺炎是之而メ其初期劇シキ頭症  
ナク醫是ヲ知ラス而メ已ニ知り得ベキ時ニ及テハ病  
已ニ増進ス故ニ注意スベシ又取トメ小腸ノ炎性疾患  
ヲ發スル者アリ然レハ不危也小腸炎ハ危キ者トセズ心炎等ノ症

ヲ發スル者アリ是亦輕症ニメ不危ナリ其小腸面ノ共ニ粘膜皆  
上ニ麻疹ヲ發共ニ皆粘膜上ニ發疹スルニ由ル或ハ麻  
疹毒ヲ以テ血質ヲ毒スルニ由ル之良血ヲ毒スルニ混  
須ク皆症ニ從テ療法ヲ下スベシ就中可用者ハ肺炎ノ  
治法ナリ處方

金硫黃 菲沃私 吐酒石 是ナリ

發泡 水蛭 血角 刺絡等亦用ユベシ

麻疹ハ醫治ヲ要セズ清凉空氣寒冷被衾輕キ發汗法ヲ  
行フヲ以テ足レリ唯其余ヲ注意メ是ヲ療スヘシ疹ハツ  
醫治ヲ施サス  
麻疹ハ他ノ發疹ノ如ク二年齡其他ヲ括スル凡士總撰バ  
ス初生兒ニ感シ極老ニ感シ病者モ感ス加之大病瀕死



ノ日ニモ亦感ス亦死ニ向ニトム故ニ他病ト合併スレバ  
本病ヲ増悪シ就中肺病家ニ発スレバ甚夕危篤ナリ○  
麻疹ハ悪性希ト虫疔可恐者ハ其疹紫色ヲ為シ経過  
不有ニメ発疹多シ犹痘瘡ニ黒色痘アルカ如シ甚夕危  
シトス腐敗熱ノ療法ヲ得フベシノキ那鑛酸卒然内陷ス  
ル者ハ發疹皆去リ肌色灰白短息寒戰等発ス麝香竜腦  
等ヲ行フベシ又外部洗滌法ヲ行フベシ又眼炎ヲ發ス  
多クハ不甚者之不可為意

前兆期 浴法

初期便閉者 蓖麻油 六勺 水 一升  
常法 如密列 一多 或ハ吐酒石 一 水 一升  
吐酒石 二勺

喉頭預メ含嗽スベシ 硃砂 二多 蜜 二多 水 適宜

咳強キ者 金硫黄 六勺 菲沃私 四勺

甘草末 二十勺 右六包 一日之量

又法 如密列煎中 老利兒結兒水 二多 加フ 或ハ硝

石 一多 加フ 中ヲ加フ 煎 煩燥不安眠者

ドーフルス散 十二勺 煩腹ス

麻疹丸方 金硫黄 二多 菲沃私 二多

為三百六十九丸 每時二丸 宛十二粒 一日之量 トス 通常輕

度ノ者ハ如密列煎ノ熱良劇者ハ硝石ヲ加フ 咳甚夕

シキ者ハ必ス老利兒水ヲ加フ

喉頭患所甚シキ炎症盛ナル者ハ胸下血角水蛭必ス相

施ス最モ大人ノ分量小兒ニハ宜ク用捨スベシ。加密



列下水土ノ量相應セザルニ似タリト金氏実ニ此ヲ如  
吐酒石ハ其煎中へ溶解スヘシ

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

麻疹論

佐倉 佐藤舜海 譯

麻疹ハ皮膚熱ノ種類ニ属シ一名聖京偃斑熱ト云一種  
ノ熱ニシテ皮膚ニ班疹ヲ發シ呼吸器ノ聖京偃性燉衝及  
ビ聖京偃熱ヲ兼併スル一病之ヲクハ傳染ニ由テ流行  
ス獨發散布スル者少シ而シテ陽性陰性急性慢性  
急性ニ十四日ヨリ誓苗性往來ノ別アリトス  
時期ニ前兆既發疹既極度ニ高脱脱落既ニメ際限アリ  
合併病 深处之呼吸器燉衝呼吸器体損結節病聖京偃  
咳氣管枝瘞喉頭瘞ナリ  
雜加病 熱内臟燉衝發疹熱皮膚發疹血液混合不良惡  
液瘞殊ニ腺病也



**病形** 單性ナル者ハ粟粒ノ如ク分界正ニ或ハ混流性ナル者アリ一層相重密ス

**轉帰** 分離ヲ以テ治ス或ハ皮膚壞死ス

**續病** 若一旦發スル所ノ班疹消散スルカ或ハ癩疹不

齊ナレバ則チ呼吸器ノ深处焮衝ヲ將出ス

**后病** 気管枝ノ慢性聖京焮衝气道ノ結節病眼病口

内悪性侵蝕焮衝婦人陰処悪性焮衝ナリ此病ノ為ニハ

死セズ其死スル者ハ續病后病ニ由ル之而メ再患スル

者甚タ少シ○此ニ錯誤シ易キ病ハ腸胃性聖京焮班熱

羅私温疾思扶痘瘡ナリ

**原因** 素因ハ小兒刺衝機敏頻天氣ノ變革寒温ノ街市

腺病呼吸病及覆聖京焮病ナリ○其誘因ハ泥障排泄物

之滯澁殊ニ此病流行ノ時ニ方テ皮膚之排泄障妨セラ  
ル者及流行時ナリ

**顯症** 才初期寒熱往來皮色灰赤交代シ生机旺盛眼胞

ニ血実メ而メ痒ヲ覺ヘ耻明流涕ス鼻粘膜之聖京焮

衝メ喉頭症気管症ヲ繼發ス○交感症交応症屢々發嚏

シ急情快惱嗜眠ス又諸机能ク旺盛シ眠リ難ク食机減

シ大便難シ○全身症ハ單熱聖京焮熱而メ日晡眩其熱

癩揮ス

**才二期** 即癩疹時ニメ發熱后才三日四日ニメ小赤班ヲ

發ス其癩スル処ハ皮膚口内鼻中喉ノ粘膜ナリ班狀略

同クノ界限正シカラス班ノ正中ニ小結節アリ顯微鏡

ニメ之ヲ觀レハ透明液ヲ含ム初メハ顔ニ發シ次テ頸



手胸ニ癢ニ肢足ニ終ル混流モ亦顔ヲ以テ初トナス而  
メ亦周圍之皮膚緊張腫大ス通例此眩期ハ二十四時ヨ  
リ三十六時間也○全身症聖京倨性焮衝熱單性麻疹之  
顆粒ヲ分ツ者ハ其發疹定マレハ即其熱自ラ解ス混流  
性ノ重密ナル者ハ分離時ニ至ルマデ其熱苗連ス  
才三期 即チ分離時ニ癢班二三日ノ后分離ヲ得ル  
之此眩ニ方テハ一種之發汗ヲ致シ小便混濁ニメ塗滓  
アリ舌上ノ粘苔弥厚ク濃黄ト也剥脫ニ易ク而メ皮膚  
ノ緊張弛シ班色減シ白色之細鱗屑トナリ脫落或ハ尤  
モ遲キナリ  
交易症 班色尤モ濃赤ニメ混流至大癢疹尤モ早ク凡テ  
至過迅速ニメ脫落ス

病際变化 呼吸器ノ感傷危劇ナレバ癢疹ニ難ク或ハ内

攻レ后病ヲ將出ス

豫后 凡テ吉トス若シ夫レ才扶思呼吸器ノ体損呼吸器  
之焮衝悪性喉頭焮衝症啞齒牙癢生之眩期ハ凶トス而  
メ流行之性ニ関涉スルナリ頗ル甚シ又后病ニ陥リ最モ  
晩劇症ヲ將出スルナリ有リ

治法 主治才一 順整之發疹ヲ催進シ不時ノ消散ヲ防ク  
可シ其方ハ緩和稀釈之飲料鎮瘡香竈之發汗法是ナリ  
主治才二 合併病雜加病ヲ制ス其方ハ焮衝熱危劇之呼  
吸器症ニハ刺絡及頰胸之水蛭軟化清涼之飲料疏解茶  
ハ殊ニ吐酒石ヲ良トス又微温浴効アリ○才扶思ヲ合  
併スル者ハ寒水浴鑛酸之稀溶水塩酸水等也其他ハ才







方扶思篇ヲ参考スベシ  
主治方三危劇症苦腦症ヲ治ス。乾瘰啖ニハ菲葉斯越  
幾斯罌粟堯舍利別老利尔水也。○眼胞眼球結膜焮衝ニ  
ハ眼困ニ水銀軟膏ヲ摩入スベシ。○癩疹十分ナラズ或  
ハ内攻スル者ニハ緩和下劑ヲ行フ蓋シ刺戟キリステ  
ルヲ以テ勝レリトス。○血液輻輳症ニハ全身局処之瀉  
血ヲ要ス  
撰生方清潔ニメ同度之温ニ過ザル空氣之床中ニ安放  
シ被衣ヲ薄フシ消化ニ易キ食物ヲ微食セシメ緩和多  
汁之飲料ヲ大服シ精神之感傷ヲ禁ス

慶應紀元龍舎乙丑葉月朔旦騰了于  
下總国印幡郡仇倉本街舜海佐藤先  
生塾中

岩邑藩  
藤原神谷積恕誌  
也



