

FOR THE PEOPLE
FOR EDUCATION
FOR SCIENCE

LIBRARY
OF
THE AMERICAN MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY



COMMENTARII
ACADEMIAE
SCIENTIARVM
IMPERIALIS
PETROPOLITANAE

50 1047

TOMVS IV.

AD ANNUM clb lccc xxix.



PETROPOLI

TYPIS ACADEMIAE

clb lccc xxxv.

16.7025 - April 28

I N D E X
C O M M E N T A R I O R V M
I N C L A S S E M A T H E M A T I C A ,

- Frid. Cristoph. Maier* de Orbita solis definienda
pag. 3.
- Iac. Hermanni* de Locis solidis ad mentem Cartesii
concinne construendis. pag. 15.
- Frid. Cristoph. Maier* de Aequinoctiorum et Solstitionum
momentis, nec non de Obliquitate Eclipticae obseruandis. pag. 25.
- Ejusdem* Problema Trigonometricosphaericum. p. 31.
- Iac. Hermanni* Consideratio Curuarum in punctum
positione datum projectarum, et de affectionibus earum inde
pendentibus. pag. 37.
- Ejusdem* de Ellipti Conica, cuius axis alteruter
datus est, angulo positione et magnitudine dato
ita inscribenda, vt centrum eius intra datum
angulum sit etiam positione datum. pag. 46.
- Leonh. Euler* de innumerabilibus Curuis tautochronis
in vacuo. pag. 49.
- Ejusdem* Curua tautochrone in fluido resistentiam
faciente secundum quadrata celeritatum. p. 67.
- Dan. Bernoulli* Problema astronomicum inueniendi
altitudinem poli, vna cum declinatione stellae,
eiusdemque culminatione ex tribus altitudinibus
stellae et duobus temporum interuallis breui calculo
solutum. pag. 89.

Jac.

Iac. Hermanni Problema ex obseruatis tribus altitudinibus alicuius stellae immutabilem habentis declinationem, et interuallis temporis inter primam et secundam obseruationem, et inter secundam et tertiam, inuenire altitudinem poli et declinationem stellae. pag. 94.

Leonb. Euleri Solutio problematis astronomici ex datis tribus stellae fixae altitudinibus, et temporum differentiis inuenire elevationem poli, et declinationem stellae. pag. 98.

Frid. Cristoph. Maier Problema Sphaerico astronomicum. pag. 102.

Georg. Wolffg. Krafft Solutiones quorundam problematum astronomicorum. p. 110.

IN CLASSE PHYSICA.

Frid. Cristoph. Maier de Luce boreali. pag. 121.

Iob. Georg. Duvernoi de Sinibus cerebri. pag. 130.

Dan. Bernoulli Theorema de motu curuilineo corporum, quae resistentiam patiuntur velocitatis suae quadrato proportionalem, vna cum solutione problematis in Act. Lips. M. Nou. 1728. propositi. pag. 136.

Georg. Bernb. Bulffingeri Solutio Problematis de vi centrifuga corporis sphaerici in vortice sphaerico gyrantis. pag. 144.

Iob. Georg. Duvernoi de Liene. pag. 156.

Georg. Bernb. Bulffingeri de Solidorum resistentia specimen. pag. 164.

Eiusdem de Tracheis plantarum ex Melone obseruatio. pag. 182.

Eiusdem de Ventriculo et intestinis. pag. 187.

Dan.

Dom. Bernoulli Experimenta coram societate instituta in confirmationem theoriae pressionum, quas latera canalibus ab aqua transfluente sustinent. p. 194.

Job. Georg. Leutmann. Anamorphoseos polyedricae constructionis methodus vera atque certa notatis falsarum manuactionum passim propositarum anomaliis opticis. pag. 202.

Eiusdem Confirmatio dilationis atque contractionis metallorum atque vitrorum momentaneae per experimenta et instrumenta nouiter inuenta. pag. 216.

Jos. Weitbrecht de Actione musculorum ab ipsorum directione pendente specimen. pag. 234.

Eiusdem Ligamenti clauicularum communis descriptio. pag. 255.

Eiusdem Observationes anatomicae. pag. 258.

Job. Georg. Leutmann Annotationes et experimenta quaedam rariora et curiosa ad rem scolopetariam pertinentia. pag. 265.

Job. Christ. Buxbaum de Ocymophyllo nouo plantarum genere. pag. 277.

Eiusdem de Plantis submarinis observationes p. 279.

Eiusdem de Fungoidibus pediculo donatis. pag. 281.

IN CLASSE HISTORICA,

Theoph. Sigefr. Bayeri Elementa Brahmanica, Tangutana et Mungalica p. 289.

Eiusdem Numi duo Ptolemaei Lagidae explicati pag. 264.

Eius

Eiusdem de Venere Cnidia in crypta conchyliatā
horti Imperatorii ad aulam aestiuam et in du-
obus numis Cnidiis. p. 259.

Eiusdem de Varagis. p. 275.

Observatio defectus lunae habita ab *Jo. Poleno*
p. 315.

J. N. De L'Isle Continuata relatio eclipsium satel-
litum Iouis. pag. 317.

Ludovici De L'Isle de la Croyere Observatio Lon-
gitudinis penduli simplicis pag. 322.

CLASSIS PRIMA

CONTINENS

MATHEMATICA

ASTAMMATA



DE ORBITA SOLIS DEFINIENDA.

Auctore F. C. Majero.

I.

Qui solem secundum Kepleri placita moveri M. Januario, 1729. supponunt, (quod hodierni omnes faciunt Astronomi) majores inveniunt difficultates in determinatione viæ solaris, quam qui alias sequuntur hypotheses. Suscepi in me idem opus ad mentem Kepleri absolvendum; sensi quoque difficultates solitas; superavi tamen subsidio Theorematum Geometricorum, quæ, quantum scio, a nemine in hoc negotio usurpata sunt. Hæc profero nunc, ut quam bene opere defunctus sim, alii judicare possint.

2. Tribus absolvam capitibus omnia. Primo theoremata explicabo. Secundo exemplis illustrabo theoremata, idoneisque observationibus speciem orbitæ definiam. Tertio capite de sole varia huc pertinentia dicam.

CA-

CAPUT I.

Theorema I.

Fig. 1

3. Sit datus radius circuli $=r$, et quadrilinum $ABDE$ a diametro AB et chorda parallella DE formatum, cujus area sit $=2bb$; Erit hoc pacto normalis

$$FC = \frac{bb}{r} + \frac{b^6}{2.3.r^5} + \frac{1.b^{10}}{2.4.5r^7} + \frac{1.3.b^{14}}{2.4.6.7.r^{13}} + \frac{1.3.5.b^{18}}{2.4.6.8.9.r^{17}} + \dots$$

Ponatur $FC = x$, et inde $FE = \sqrt{rr - xx}$; sit fe ipsi FE quam proxima, ut habeatur $FfEe$ elementum spatii $FCBE$, scilicet $=\sqrt{rr - xx} dx$,

$$\text{cujus integrale est } = rx - \frac{x^3}{2.3.r} - \frac{1.x^5}{2.4.5.r^3} - \frac{1.3.x^7}{2.4.6.7.r^5}$$

----- $=bb$. Extracta igitur radice ex hac æquatione, prodit $x = \frac{bb}{r} + \frac{b^6}{2.3.r^5} + \frac{b^{10}}{2.4.5.r^7} + \dots$ Q.E.D.

Problema I.

Fig. 2.

4. Ex datis quatuor solis in sua orbita locis, quorum bina sibi opposita sunt, et temporibus, quibus ibi sol extitit, invenire locum apogæi et eccentricitatem.

Sit $ALPM$ eccentricus orbitæ ellipticæ, in quo quatuor data loca, Υ et Ω , quasi legitime ad eum reducta essent, existant (reducentur autem postmodum si opus est.)

Quo-

Quoniam areae $\Omega \simeq P \approx$, & $\simeq P \approx \Upsilon$, sunt ad integrum circulum, uti tempora ab Ω ad \approx , itemque ab \simeq ad Υ elapsa ad integrum solis circuitum, patet data esse magnitudine segmenta $\Omega P \approx$ & $\simeq P \Upsilon$, & proinde etiam quadrilinea $\Omega L \approx M$, $NO \simeq \Upsilon$, quorum normales BC & CD ex centro C ductae innotescunt per §. 3.

Lineae oppositorum locorum $\Omega \approx$ & $\simeq \Upsilon$ intersecant sese in loco observatoris, hoc est in terra, existit igitur Terra in T ; ducta autem AP per centrum C & terram T transeunte, erit in A locus apogaei, in P locus perigaei, & CT erit eccentricitas. Haec omnia per se intelliguntur.

Ob data quatuor loca, datur distantia ipsius Ω ab \simeq hoc est angulus $\Omega T \simeq$, sive ejus aequalis verticalis $\approx T \Upsilon$. Hoc modo angulus BCD normalium BC & CD etiam datus est, aequalis quippe ang. $\Omega T \simeq$.

In triangulo BCE datur BC & angulus ad C , dabitur inde quoque CE , quae ablata ab CD , relinquit ED ; sic in rectangulo EDT ex data ED , et angulis, invenitur DT . Tandem in rectangulo CDT , datis CD et DT , invenitur eccentricitas CT , et angulus ad T , quo linea apsidum AP inclinatur ad datam $\simeq \Upsilon$, quo ipso locus apogaei innotescit ultro.

Hoc pacto species ellipsis quaesitae determinata est, sed nondum quam exactissime. Supra enim quatuor data solis loca, quae in ellipsi sunt, tanquam in eccentrico existere ponebantur, ex qua

hypothefi nonnihil erroris oritur. Corrigi autem nunc facile potest: *reducantur nimirum more folito quatuor haec loca ex inventa ellipfi ad eccentricum, et repetatur calculus ut veritas difpalefcant quaefita.* Ceterum exemplis poft hac patebit, correctione non opus effe, quia error nullius effe momenti.

Theorema 2.

Fig. 3.

5. In femicirculo ANMB fit datus radius $AC=r$, eccentricitas $FC=f$ angulus anomaliae verae MFB , adeoque et arcus $MB=q$, ejusque finus $MP=p$: dico effe anomaliam mediam $NB=\frac{fp}{r}+q$

Ob datas FC et PM effe area trianguli $FMC = \frac{1}{2}fp$ et area feftoris $MCB = \frac{1}{2}rq$, ob arcum MB datum; collectis feftore et triangulo, habetur area anomaliae verae $MFB = \frac{fp+rq}{2}$, fed tanta debet quoque effe area anomaliae mediae, hoc effe feftor NCB , qui effe $= \text{arc. } NB \cdot r : 2 = (bp+rq) : 2$ fit ergo reducta aequatione, $\text{arc. } NB = \frac{fp}{r} + q$. Q.E.D.

CAPUT II.

6. Exempla quibus praemiffam illustrarem theoriam ab Hevelio mutuavi. Ex obfervationibus altitudinum folis meridianarum, quas per plures annos multa diligentia et fide habuit, loca folis fibi mutuo oppofita elicui, methodo paucis nunc indicanda.

7. Ad

7. Ad corrigendas altitudines, tabulas refractionum Hireanas adhibui, quoniam illarum ope vera altitudo poli Dantiscana, et obliquitas eclipticae ex maxima et minima altitudinibus producuntur. Altitudo solis maxima ab Hevelio in suis observationibus traditur = $59^{\circ} 7' 20''$ minima autem = $12^{\circ} 12' 45''$, altitudines hae, secundum Hiraei tabulas refractionum, correctae, dant altitudinem poli Dantiscanam = $54^{\circ} 22' 40''$ et obliquitatem eclipticae = $23^{\circ} 29' 16''$ quae obliquitas congruit ei quam recepere Astronomi hodie fere omnes. Altitudo vero poli ab Hevelio, ex observatis stellae polaris altitudinibus inventa, traditur = $54^{\circ} 22' 52''$ cui ante dicta valde appropinquat. Non dubito quin refractiones ab Hevelio ipso in tabulam redactae idem praestent, quod refractiones Hireanae; sed ad manus mihi non sunt. Aliorum Autorum refractionum tabulas consului quoque, deprehendi autem per eas omnes altitudinem poli et eclipticae obliquitatem obtineri avaro nimis aberrantes, ut iis merito tabulam Hiraei longe praetulerim.

8. Datis itaque altitudine poli, obliquitate eclipticae, et altitudine meridiana correctae, invenitur locus solis ad illum meridiem; invenitur praeterea locus solis pro meridie sequente aut antecedente, si vel motus solis diurnus aliunde cognitus loco solis invento demitur aut adjicitur, vel si ad meridiem sequentem praecedentemve altitudo solis quoque observata fuit; Datis hoc pacto solis locis ad duos meridies contiguos dabitur etiam solis locus

quodvis momentum intermedium, instituto simplici analogia, pro more solito.

9. Hac ratione plurima loca solis sibi opposita inveni, maxime autem in eo fui ut æquinoctiorum intervalla certo cognoscerem. Eo fine plures solis ingressus in arietem et libram methodo ante descripta, erui, quorum aliquot in sequente tabula continentur.

Annus et æquinoctium	tempus apparens et completum				Intervalla æquinoctiorum			
	Mens.	D.	H.	/ //	D.	H.	/ //	
1657	vernale	Martii	18.	16.	18.	1.		
	autumnale	Septembr.	21.	7.	13.	18.	186.	14. 55. 17.
1658	vernale	Martii	18.	22.	18.	39.	178.	15. 5. 21.
	autumnale	Septembr.	21.	12.	39.	12.	186.	14. 20. 33.
1661	vernale	Martii	18.	15.	18.	0.	186.	15. 20. 0.
	autumnale	Septemb.	21.	6.	38.	0.		

10. Quam lubrica fit et incerta methodus qua æquinoctia inquisivi, (quae et sola fere vulgo in usu est,) patet non tam ex intuitu tabulae praecedentis, quam potissimum ex plurimis calculis quos hic non communico. Tria in tabula sunt ab æquinoctio vernali ad autumnale intervalla, quae ultra semihorium a sese differunt, quodnam verius sit, dictu impossibile est; eligo autem ultimum, quod aequatione temporis rite correctum, est = 186 D. 15 h. 0. et sic cum intervallo a Cassino proditum propius convenit, qui ei tribuit 186 D. 14 h. 53.

11. Quae porro hic sequitur tabula, diversa alia continet eclipticae loca sibi mutuo opposita, methodo priori reperta.

Annus	Tempus completum apparens				Locus solis				Intervalla temporis aequata.		
	Menf.	D.	H.	/	S.	o.	/	//	D.	H.	/
1660	Maji.	11.	0.	0.	1.	22.	23.	10.	185.	13.	30.
	Nov.	12.	13.	42.	7.	22.	23.	10.			
1661	Maji.	8.	0.	0.	1.	19.	13.	15.	185.	16.	30.
	Nov.	8.	16.	40.	7.	19.	13.	15.			
1661	Maji.	9.	0.	0.	1.	20.	10.	53.	185.	15.	25.
	Nov.	10.	15.	37.	7.	20.	10.	53.			
1662	Febr.	9.	5.	48.	10.	22.	17.	57.	185.	10.	0.
	Aug.	13.	15.	36.	4.	22.	17.	57.			
1673	Maji.	2.	0.	0.	1.	13.	29.	35.	185.	22.	0.
	Nov.	3.	22.	11.	7.	13.	29.	35.			

Praeter haec loca opposita plura alia computavi, pauca haec speciminis causa adducere volui. Id vero reticendum non est, intervalla haec aequae incerta esse, ac aequinoctiorum intervallum, quod supra (§§ 9 et 10) dubium deprehensum est.

12. Ut nunc problema articulo 4to memoratum exemplo illustrem, assumo opposita solis loca quatuor haec: $\overset{s}{0} \overset{o}{0} \overset{'}{0} \overset{''}{0}$ et $\overset{s}{6} \overset{o}{0} \overset{'}{0} \overset{''}{0}$ item $\overset{s}{10} \overset{o}{22} \overset{'}{17} \overset{''}{57}$ et $\overset{s}{4} \overset{o}{22} \overset{'}{17} \overset{''}{57}$. Intervallum temporis duorum priorum est $\overset{D}{186} \overset{H}{15} \overset{/}{0}$ quod supra §. 10. definitum est. Intervallum posteriorum locorum temporarium est $\overset{D}{185} \overset{H}{10} \overset{/}{0}$ uti ad annum 1662 ex tabella praecedente constat.

Haec intervalla converto in areas circuli, inferendo: ut tota anni quantitas $\overset{D}{365} \overset{H}{5} \overset{/}{49}$ ad intervallum aequinoctiorum $\overset{D}{186} \overset{H}{15} \overset{/}{0}$ ita tota circuli area $(3. 141593)$ ad segmentum $\triangle A O \Upsilon$

Tom. IV.

B

(1.

Fig. 2.

(1. 605193) Sic et alterum segmentum $\Omega LA \approx$ reperitur esse = 1. 594770.

Auferatur ab inventis segmentis dimidia circuli area, residui sumatur semissis, ut restent quadrilinea $\Upsilon OCD = 0.017198$ et $\approx MCB = 0.011987$. Haec quadrilinea repraesentantur in articulo 3. per bb . radius per r . et perpendiculara BC et DC per x , igitur per theorema ibi demonstratum perpendiculara reperiuntur. Sufficiunt autem ad calculum vel praecisissimum duo priora theorematis membra $\frac{bb}{r} + \frac{b^6}{6r^5}$

Dat inde calculus

$$\frac{bb}{r} = 0.017198$$

$$\frac{b}{6r^5} = 0.000001$$

$$x = 0.017199 = DC$$

eodem modo altera normalis BC reperitur = 0.011987.

Porro angulus $\Omega T \triangle = \text{ang. BCD}$ habetur auferendo $4^{\circ} 22' 17''$ ab $8^{\circ} 0' 0''$ is ergo est = $3^{\circ} 42' 3''$. Igitur in rectangulo BCE, data normali BC et angulis, invenitur latus EC = 0.015149 quod ablatum a normali DC, relinquit lineam ED = 0.002050.

In rectangulo DET dato latere DE et angulis per priora, invenitur DT, tandemque in rectangulo EDT, datis DT, per antecedentem calculum, et normali CD, invenitur CT = 0.017404 quae est eccentricitas quaesita. Invenitur etiam per eadem data angulus DCT = $8^{\circ} 46' 2'' = \text{angulo AT} \triangle$ quo ni-
mi-

mirum Apogaeum superat principium cancri; igitur locus apogaei solaris est in $\text{♁ } 8^{\circ} 46' 2''$. Q. E. I.

13. Reperta eccentricitas et locus apogaei correctione indigent. (§. 4.) Nam loca solis quatuor assumpta pertinent ad Ellipsin, et in adjecto schemate designantur per $\Upsilon \approx \Omega \approx$. In solutione problematis autem eccentricus ACBDA loco Ellipseos adhibitus est, ergo adhibenda quoque erant loca solis ad eccentricum reducta. Nimirum pro loco Ω in Ellipsi sumendus erat locus C in eccentrico, qui, data nunc Ellipseos specie, solito more invenitur $= 4^{\circ} 22' 18'' 13''$ ejusque oppositus D $= 15^{\circ} 22' 18'' 13''$. Locorum Υ et \approx nulla est reductio, quia prope diagaecum versantur. Restaurato igitur superiore calculo (§. 12.) reperitur *eccentricitas correcta* $= 0.017404$ et *apogaeum* in $\text{♁ } 8^{\circ} 46' 2''$. Quo ipso patet correctionem hanc nullius esse momenti; nam eccentricitas invariata mansit, locus autem apogaei $18''$ auctus est.

Fig. 4.

14. Quoniam computus ostensus brevis est et facilis, ex aliis datis plurimis eccentricitatem et apogaeum quaesitum indagavi. Sic ex assumtis locis oppositis ad annum 1660 repertis (§. 11.) et aequinoctiorum intervallo inveni *eccentricitatem* $= 0.017381$ et *locum apogaei* in $\text{♁ } 8^{\circ} 16' 20''$, Ex oppositis locis anni 1661, elicui eccentricitatem $= 0.017496$, et *locum apogaei* $= \text{♁ } 8^{\circ} 36'$ denique ex oppositione ad annum 1673 notata *eccentricitas prodiit* $= 0.01738$ et locus apogaei $= \text{♁ } 8^{\circ} 18' 32''$. (Notandum hic est, quod in omnibus hisce casibus altera oppositio semper fuerit aequinoctiorum.)

Commisiss autem duabus oppositionibus annorum 1661 et 1662 sc. γ -M. $20^{\circ} 16' 53''$ et Ω - $\approx 22^{\circ} 17' 57''$ apogaeum locatur in $\Xi 8^{\circ} 6'$ et eccentricitas provenit = 0. 01722. Praeter hos casus bene multos alios computavi, quorum pauci quidam ab allatis ultro citroque ita differunt, ut differentia in positione aphelii ad 4 gradus assurgat.

15. Paucorum casuum dissensum non moror: sufficit ad stabiliendam veritatem consensus plurium casuum, quorum aliquot recensui articulo praecedente. Dico illos consentire, licet aliqui ultra semigradum discrepent ab invicem; Nam in hoc lubrico negotio multum me profecisse autumo, quod consensum intra gradum assecutus sum. Si aliorum labores circa hanc rem considero, animadverto neminem facile tot casus, calculo examinasse, nec ququam tantum consensum plurium casuum expertum esse. Nonnihil igitur tribuo meis repertis, inventamque *eccentricitatem* = 0. 0174, itemque *apogaeum* in $\Xi 8^{\circ} 46'$ tamdiu pro verioribus amplector, donec certiora discam.

16. Reperta eccentricitate reliquae orbitae affectiones ex natura Ellipseos determinantur. Subiecta tabula eas continet fere omnes.

			logarithmi
Axis major	=	2. 000000	10. 3010300
Axis minor	=	1. 999677	10. 3009642
Parameter	=	1. 999848	10. 3009971
Dist. aphelii a sole	=	1. 017400	10. 0074917
Dist. perihelii	=	0. 982600	9. 9923768
Eccentricitas	=	0. 017400	8. 2405492

17. Dabo et modum quo prosthaphaeresium tabulam repertae eccentricitati congruam in meos usus calculaverim. Utui fuit theorema articulo 5to allatum, quod regulam praestat, qua ex vera anomalia computatur media. Exemplum ejus hoc esto: In figura 5ta sit anomalia vera $BFM = 3^{\circ}$ reducatur ea ad anomalias circulares BFN ita: Fig. 5.

$$\begin{array}{r} \log. \text{tang. } 3^{\circ} = 9.7614394 \\ \log. \text{fin. tot.} = 10.0000000 \\ \hline 19.7614394 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \log. \text{axis min. CD} = 9.9999342 \\ \log. \text{tang. ang. NFB} = 9.7615052 \end{array}$$

$$\text{ang. NFB} = 3^{\circ} 0' 14''$$

Inveniatur porro angulus NCB qui angulo NCF deinceps jacet:

$$\begin{array}{r} \log. \text{FC, eccentric.} = 8.2405492 \\ \log. \text{ang. } 3^{\circ} 0' 14'' = 9.6990210 \\ \hline \log. \text{ang. FNC} = 7.9395702 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ang. ipse} = 0^{\circ} 29' 55'' \\ \text{ang. NFC} = 30^{\circ} 0' 14'' \\ \hline \text{ang. NCB} = 30^{\circ} 30' 9'' \end{array}$$

Hujus anguli finus in theoremate allegato denotatur litera p ejusque arcus explicatus litera q ; f , ibi-

dem est eccentricitas, ipsaque anomalia media est
 $= \frac{fp}{r} + q$. Hinc calculus oritur

$$\begin{array}{r} \log. f = 8. 2405492 \\ \log. p = 9. 7055010 \\ \hline \log. \frac{fp}{r} = 7. 9460502 \end{array}$$

ipsum $\frac{fp}{r} = 0. 008832 =$ arcui NM fig. 2.

$$\begin{array}{r} \text{five} = \begin{array}{ccc} 0 & ' & '' \\ 0 & 30 & 22 \\ q = 30 & 30 & 9 \end{array} \\ \hline \end{array}$$

Anomalia media = 31 0 31 Q. E. F.

18. Pro construendis tabulis prosthaphaereticis, problema prioris inversum (quo sc. ex media anomalia vera exquiritur) solvere vulgo solent; At vero solutio suas habet difficultates; Certe ad solutionis articulo 17. exhibitae facilitatem nunquam perducetur. Deinde nulla ratio est, cur potius hoc quam priore problemate tabulae condantur. Malo ergo ob facilitatem suam prius problema in usum adhibere.

19. Tertium tandem caput conscribendum esset quoque. Id vero ut omittam graves cogunt causae: erit tamen ubi id alio loco uberius excolam. Ago in eo de epocha motuum mediorum, quam ex observationibus Hevelii pluribus constitui. Ea cum epocha tabularum Rudolphinarum in ipsis secundis convenit, qua quidem re Rudolphinarum motus medii pro optimis declarantur. De aphelii loco et motu multa disputo: statuo locum ejus in Zodiaco immo-

bi-

bilem, hoc est constanter in $\infty \frac{0}{8} \frac{46}{46}$: sed per consequens sub coelo stellato mobilem; motumque tribuo aequalem præcessioni æquinoctiorum. Ostendo tandem, hisce meis suppositionibus, Albategnii non solum, sed et Hipparchi, antiquissimas observationes tam bene congruere quam aliis aliorum hypothesebus. Haec vero omnia nunc missa faciam, donec opportunitas melius faveat.

DE
LOCIS SOLIDIS AD MENTEM
CARTESII CONCINNE CONSTRUENDIS.

A. I. Hermann.

Per *loca geometrica* intelligunt Geometrae Figuras quascunque Curvilineas, quarum indoles per æquationes duas indeterminatas x et y , quas coordinatas vocant, et quantitates constantes involventes, explicatur. In hoc vero schediastate ea tantum loca considerabimus, quæ, *sectiones conicæ*, aut passim etiam, *loca solida*, appellantur; haud dubie ideo, quia ex solido, nempe ex cono secari possunt, et præterea ad constructionem problematum solidorum conducunt.

Jam antiquitus geometrae hæc loca solida contemplati sunt, testibus septem, qui adhuc supersunt, libris conicorum Apollonii Pergæi, et iis, quæ de *Euclidis* inventis circa sectiones conicas et *Aristæi* senio-

Mens. Febr.
1729.

nio-

nioris libris circa loca solida refert *Pappus Alexandrinus* in collectionibus suis mathematicis, sed quæ temporum injuria perierunt.

Vocantur autem figuræ illæ *loca geometrica*, quia locum indicant, quem lineæ quædam variabiles, certam aliquam inter se relationem ubique servantes, occupant.

Inter recentiores insignis ille Philosophus *Renatus Des-Cartes* doctrinam locorum geometricorum primus, quod sciam, algebraice excoluit, atque methodi suæ magnificum specimen edidit Lib. II. Geometriæ, ubi veterum problema de loco ad quatuor lineas positione datas, quod narrante Pappo, veteribus insolutum manserat, felicissime expedivit, et sectiones conicas aut subinde etiam circulum aut lineam rectam, pro circumstantiarum varietate loco quæsito assignavit. Sed assertionum suarum demonstrationes fere ubique reticuit, adeo ut *Florimundus a Beaune*, et *Franciscus a Schooten* in hanc et alias Geometriæ Cartesianæ partes, notas et commentarios conscribere necessum haberent, quibus aditum in hanc geometriam planiorem redderent. *Beaunius* quidem paucis & brevibus notis rem suam peregit; *Schootenius* vero ea quæ pertractanda sumit fusius persecutus est, percurrendo singulos casus quibus modo hanc modo illam sectionem conicam, circulum vel etiam lineam rectam in locum quæsitum abire Cartesius edixerat, adductis ubique demonstrationibus analyticis.

Sed

Sed prolixa hæc Schootenii diligentia successo-
ribus procul dubio ansam dedit alias vias in doctri-
na locorum tentandi, quæ magis expeditæ essent.
Nam Ill. *Job. de Witt* in elementis linearum curva-
rum geometriæ Cartesii annexis, æquationes suas
locales ut libet compositas, ad æquationes primiti-
vas sectionum conicarum reducere docuit. Hoc
modo viam ad constructiones facilem sternere co-
natus est.

Sed quia forte neque hæc methodus satis brevis
visa est, ideo in alias adhuc Geometriæ inquisiverunt.
Sane Vir Cl. *Job. Craige* ad calcem tractatus de *Qua-*
draturis, quem anno 1693 Londini edidit, rem
paullo aliter aggressus est. Non enim ex æquatione
construenda, positionem et magnitudinem diametri
ejusque parametri eruere suscepit, sed per compa-
rationem singulorum terminorum æquationis con-
struendæ, cum totidem terminis homologis æqua-
tionis generalis illius sectionis conicæ, quæ ad rem fa-
cit, omnia ea elicit, quæ ad loci quæsitæ constructi-
onem requiruntur. Dedit ideo pro singulis sectio-
nibus conicis æquationes generales, ad quos deinceps
omnem æquationem localem exigere et constructi-
onem inde derivare posset.

Ut pulchra est hæc methodus, ita non parum
videtur placuisse Geometris. Nam Ill. *Hospitalius* in
tractatu suo posthumo de sectionibus conicis eam non
modo suam fecit; sed in multis quoque illustravit,
et Cel. *Wolffius*, hanc solum, missis reliquis, in suis
analyseos elementis exposuit.

Veruntamen cum Cartesiana methodus æque brevis sit, si non brevior quam ulla alia methodus ad eundem scopum tendens, præterea vero directe procedat, et hoc tamen non obstante nunc pene oblivioni tradita sit, eam nitore suo restitutam et illustratam postliminio in scenam producere visum est. Hæc methodus enim nullis substitutionibus peregrinis, nullis reductionibus æquationis propositæ ad primitivas, aut aliis ejusmodi metamorphosis eget, sed magnitudo et positio diametri et parametri sectionis immediate ex æquatione construenda, nullo fere negotio eruuntur, quibus inventis locus facile construi potest.

I. Æquatio generalis ad sectiones conicas ea est quæ signatur littera A - - - $\alpha yy + 2\beta xy + \gamma xx + 2\delta y + 2\varepsilon x + \Phi = 0$.

In hac x significat abscissas, y applicatas, litteræ vero græcæ $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \Phi$ coefficientes indefinitas cum suis signis $+$ vel $-$. Extrahendo radices ex æquatione A, obtinetur altera B.

$$B \quad y = \frac{-\beta x - \delta}{\alpha} \pm \sqrt{\left(\frac{\beta\beta - \alpha\gamma}{\alpha\alpha}xx + \frac{2\beta\delta - 2\alpha\varepsilon}{\alpha\alpha}x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha\alpha}\right)}$$

Dicatur in hac pars rationalis u , et irrationalis z , et construenda est utraque seorsim.

II. Constructio partis rationalis $\frac{-\beta x - \delta}{\alpha} = u$, facilis est, nam si primum fingatur $x = 0$, fiet $u = \frac{-\delta}{\alpha}$. Assumo nunc in omnibus figuris adjunctis PQ significare lineam rectam in qua abscissæ x capiuntur a puncto in ea fixo A, et si per hoc punctum ducatur in dato angulo altera indefinita L , capienda est in

ea portio $AB = \frac{-\delta}{\alpha}$, et quidem sursum versus L si fractio $\frac{-\delta}{\alpha}$ est affirmativa, aut in partem oppositam / si negativa est, punctum B jam erit in linea illa in qua diameter sectionis conicæ seu loci quæsitæ sita est.

Alterum punctum hujus lineæ reperitur si in æquatione $u = \frac{-\beta x}{\alpha} \frac{\delta}{\alpha}$, nunc ponatur $u = 0$, invenietur $x = \frac{-\delta}{\beta}$; abscindatur ergo in indefinita PQ , pars $AC = \frac{-\delta}{\beta}$, ad partes Q si fractio $\frac{-\delta}{\beta}$ est quantitas affirmativa vel in partes oppositas P , si negativa est; linea BC quam vocabo ubique $= \eta$ quantum opus est producta, dat positionem diametri sectionis respectu lineæ indefinitæ PQ .

III. Quantum ad partem irrationalem attinet æquationis B , ea debite evoluta manifestabit magnitudinem diametri ejusque conjugatæ, et locum verticum. Hos vertices signabimus in figuris per litteras G, g , centrum sectionis littera O . Ductisque per puncta G, g, O , rectis GN, gn , et OM parallelis ad Ll , indefinitæ PQ occurrentibus in punctis N, n et M . Puncta N, n dicentur vestigia verticum in recta PQ , et M vestigium centri; Quare Nn vestigium erit ipsius diametri.

IV. Consideremus nunc æquationem $Z = \sqrt{\left(\frac{\beta\beta - \alpha\gamma}{\alpha^2} x \cdot x + \frac{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}{\alpha^2} x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha^2}\right)}$ ex qua dixi eliciendas esse magnitudines parametri et diametri sectionis; hæc vero æquatio sic generaliter spectata est ad sectiones conicas; veruntamen in quibusdam casibus, mutatur in æquationem quæ est ad lineam rectam: nam si $\epsilon = \frac{\beta\delta + \sqrt{(\beta\beta\delta + \alpha\alpha)\Phi - 2\gamma\delta\delta - \alpha\beta\beta\Phi}}{\alpha}$, æquatio illa tran-

fit in $Z = \frac{x\sqrt{\beta\beta-\alpha\gamma} + \sqrt{\delta\delta-\alpha\Phi}}{\alpha}$, et æquatio totius loci in $y = \frac{-\beta x - \delta + x\sqrt{\beta\beta-\alpha\gamma} + \sqrt{\delta\delta-\alpha\Phi}}{\alpha}$, quæ est ad lineam rectam, cujus constr. per §. 11. facile obtinetur.

Fig. 1.

Nempe capiatur in PQ pars $AC = \frac{\delta}{\beta}$, et in L/ pars $AB = \frac{\delta}{\alpha}$, producat CB in utramque partem, et abscindantur præterea in L/ partes $BL = B'l = \frac{\sqrt{\delta\delta-\alpha\Phi}}{\alpha}$, in PQ vero pars $AN = \frac{\sqrt{\delta\delta-\alpha\Phi}}{\sqrt{(\beta\beta-\alpha\gamma)}}$, ductaque per N recta NG, jungantur GL, et G/, partes earum LF, et l/ sunt locus quæsitus. Nam applicatæ EF quæ sunt in angulo LAQ præbent omnes $+y$, et applicatæ Ef, quæ sunt in angulo lAQ omnes $-y$. Demonstratio facilis.

Ducta enim ubilibet FKf parallela L/, si ergo $AE = x$, et $EF = y$, propter parallelas FK et LB, invenientur $GB = \frac{\beta\eta\sqrt{\delta\delta-\alpha\Phi}}{\delta\sqrt{(\beta\beta-\alpha\gamma)}}$, $KE = \frac{\beta x + \delta}{\alpha}$, et $KF = \frac{x\sqrt{(\beta\beta-\alpha\gamma)} + \sqrt{(\delta\delta-\alpha\Phi)}}{\alpha}$, adeoque $+y (EF = KF - KE) = \frac{-\beta x - \delta + x\sqrt{(\beta\beta-\alpha\gamma)} + \sqrt{(\delta\delta-\alpha\Phi)}}{\alpha}$ et $-y (= Ef) = \frac{\beta x + \delta - x\sqrt{(\beta\beta-\alpha\gamma)} - \sqrt{(\delta\delta-\alpha\Phi)}}{\alpha}$.

Qui est locus construendus.

Si $\varepsilon = \frac{\beta\delta}{\alpha}$, et $\Phi = \frac{\delta\delta}{\alpha}$, erit etiam nunc locus quæsitus linea recta.

V. Si in æquatione $Z = \sqrt{\frac{\beta\beta-\alpha\gamma}{\alpha\alpha}xx + \frac{2\beta\delta-2\alpha\varepsilon}{\alpha\alpha}x + \frac{\delta\delta-\alpha\Phi}{\alpha\alpha}}$ fit $\beta\beta\alpha\gamma = 0$, vel $\gamma = \frac{\beta\beta}{\alpha}$, æquatio erit ad *Parabola*, cujus vertex inuenietur ponendo $Z = 0$, inde enim resultat $x = \frac{\delta\delta-\alpha\Phi}{2\alpha\varepsilon-2\beta\delta}$, quæ dat vestigium N verticis Parabolæ G, in linea PQ. Si jam $\beta\delta - \alpha\varepsilon$ existente affirmativa $\delta\delta - \alpha\Phi$ sit negativa, fractio $\frac{\delta\delta-\alpha\Phi}{2\alpha\varepsilon-2\beta\delta}$ vel $\frac{\alpha\Phi-\delta\delta}{2\beta\delta-2\alpha\varepsilon} = x$. Ideo capienda est in PQ portio AN

AN = $\frac{\alpha\Phi - \delta\delta}{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}$ versus Q, ductaque NG parallela Ll, quæ BB productæ occurrat in G, erit hoc punctum vertex parabolæ. Ejus parameter vero, quam π deinceps vocabimus erit = $\frac{(2\beta\delta - 2\alpha\epsilon)\delta}{\alpha\alpha\beta\eta}$. Pono autem α , β et δ æquationis A esse singulas affirmativas. His positis, vertice G, parametro $\pi = \frac{(2\beta\delta - 2\alpha\epsilon)\delta}{\alpha\alpha\gamma\eta}$ descripta circa diametrum GK parabola FGf, pars ejus quæ est in angulo LAQ dat omnes +y, et pars ejus quæ est in angulo LAQ dat omnes -y.

Fig. 2.

Ducta enim recta FKf parallela Ll, vocandoque AE = x, EF = y, erunt BK = $\frac{\beta\eta x}{\delta}$, et BG = $\frac{(\alpha\Phi - \delta\delta)\beta\eta}{(\beta\delta - \alpha\epsilon)2\delta}$, ergo GK = $(x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon})\frac{\beta\eta}{\epsilon}$. Quare $\sqrt{\pi GK} = \sqrt{(x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon})\frac{\beta\eta}{\epsilon} \times \frac{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}{\alpha\alpha\beta\eta}} = \sqrt{(\frac{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}{\alpha\alpha}x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha\alpha})} = Z$, nec non EK = $\frac{\beta x + \delta}{\alpha}$, quare $y = \frac{-\beta x}{\alpha} + \sqrt{(\frac{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}{\alpha\alpha}x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha\alpha})}$. Qui erat locus construendus.

Secundo, si ambæ quantitates $2\beta\delta - 2\alpha\epsilon$, et $\delta\delta - \alpha\Phi$ sint affirmativæ, erit $x = \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{2\alpha\epsilon - 2\beta\delta}$ negativa, adeoque in hoc casu AN = $\frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}$ capienda est ad partes ipsius P, ductaque NG parallela LL, erit nunc vertex G parabolæ ad partes P inter A & P, parameter $\pi = \frac{(2\beta\delta - 2\alpha\epsilon)\delta}{\alpha\alpha\beta\eta}$, ut in casu præcedenti, et parabola qualis Fig. 3.

Fig. 3.

Tertio, si $\delta\delta - \alpha\Phi$ sit adhuc positiva, sed $2\beta\delta - 2\alpha\epsilon$ negativa, invenietur $x = \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{2\alpha\epsilon - 2\beta\delta}$ affirmativa. Propterea capienda est versus Q, pars AN = $\frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{2\alpha\epsilon - 2\beta\delta}$ propterea parabola FGf, vertice G, parametro

Fig. 4.

$\pi = \frac{(2\beta\delta - 2\alpha\epsilon)\delta}{\alpha\alpha\beta\eta}$ circa diametrum GC descripta habebit positionem qualis fig. 4 cernitur.

VI. Si in æquatione $Z = \sqrt{\left(\frac{\beta\beta - \alpha\gamma}{\alpha\alpha} x x + \frac{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}{\alpha\alpha} x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha\alpha}\right)}$ quantitas $\beta\beta - \alpha\gamma$ sit negativa, vel quod idem est, si γ excedit $\frac{\beta\beta}{\alpha}$, hæc æquatio pertinet ad *Ellipses*. Est enim $Z = \frac{\sqrt{(\alpha\gamma - \beta\beta)}}{\alpha} \times \sqrt{(-x x + \frac{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}{\alpha\gamma - \beta\beta} x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha\gamma - \beta\beta})}$. Dicantur brevitatis causa $\lambda = \frac{\beta\delta - \alpha\epsilon}{\alpha\gamma - \beta\beta}$, et $\mu = \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha\gamma - \beta\beta}$, eritque $Z = \frac{\sqrt{(\alpha\gamma - \beta\beta)}}{\alpha} \times \sqrt{(-x x + 2\lambda x + \mu)}$. Si nunc $Z = 0$, æquatio $-x x + 2\lambda x + \mu = 0$ duas habet radices nempe $x = \lambda + \sqrt{(\lambda\lambda + \mu)}$ et $x = \lambda - \sqrt{(\lambda\lambda + \mu)}$. Quod indicat hanc sectionem duos habere vertices. Positis enim α, β, δ , affirmativis et constructione lineæ CB posita ex §. II. Si $\beta\delta - \alpha\epsilon$, et $\delta\delta - \alpha\Phi$ sint affirmativæ, capiatur in PQ pars $AM = \lambda$, dein $MN = Mn = \sqrt{(\lambda\lambda + \mu)}$ erunt puncta N, *n vestigia* verticium Ellipsis et M vestigium centri ejus, quare ductis NG, *ng* et MO parallelis Ll, vertices ipsi erunt G et g et centrum Ellipseos O, atque adeo diameter $Gg = \frac{2\beta\eta\sqrt{(\lambda\lambda + \mu)}}{\delta}$. Diameter vero conjugata Rr invenietur, si in $Z = \frac{\sqrt{(\alpha\gamma - \beta\beta)}}{\alpha} \times \sqrt{(-x x + 2\lambda x + \mu)}$, pro x scribatur λ , invenietur hoc modo $OR = \frac{\sqrt{(\alpha\gamma - \beta\beta) \times \lambda\lambda + \mu}}{\alpha}$. Parameter vero π ad diametrum Gg spectans, est tertia proportionalis ad Gg et Rr, hanc ob causam $\pi = \frac{2\delta(\alpha\gamma - \beta\beta)\sqrt{(\lambda\lambda + \mu)}}{\alpha\alpha\beta\eta}$. Quare Ellipsis Ggl hac parametro $\pi = \frac{2\delta(\alpha\gamma - \beta\beta)\sqrt{(\lambda\lambda + \mu)}}{\alpha\alpha\beta\eta}$, circa diametrum $Gg = \frac{2\beta\eta\sqrt{(\lambda\lambda + \mu)}}{\delta}$ descripta, est locus quaesitus.

Fig. 5.

Ducta

Ducta enim ubilibet FK, dicantur AE=x, EF=y, erit EK= $\frac{\beta x + \delta}{\alpha}$ et FK= $y + \frac{\beta x + \delta}{\alpha}$; ex natura vero Ellipsis fit FK= $V(\frac{\pi \cdot GK \cdot GK}{Gg})$. Per constr. habemus $\frac{\pi}{Gg} = \frac{\delta \delta (\alpha \gamma - \beta^2)}{\alpha x \beta \eta}$, et propter parallelas AB, EK, rectum GKg= $\frac{\beta \beta \eta \cdot nE \cdot NE}{\delta \delta}$, quare fit $\frac{\pi \cdot GK \cdot GK}{Gg} = \frac{\alpha \gamma - \beta^2 \cdot nE \cdot NE}{\alpha \alpha}$, sed $nE \cdot NE = Mn^2 - ME = \mu + \lambda \lambda, -\lambda \lambda + 2\lambda x - x x = -x x + 2\lambda x + \mu$, ergo FK= $\frac{\sqrt{\alpha \gamma - \beta^2}}{\alpha} \times V(-x x + 2\lambda x + \mu) = V(\frac{\beta^2 - \alpha \gamma}{\alpha \alpha} \cdot x \cdot x + \frac{2\beta \delta - 2\alpha \epsilon}{\alpha \alpha} \cdot x + \frac{\delta \delta - \alpha \Phi}{\alpha \alpha}) = y + \frac{\beta x + \delta}{\alpha}$, quare $y = \frac{-\beta x - \delta}{\alpha} + V(\frac{\beta^2 - \alpha \gamma}{\alpha \alpha} \cdot x \cdot x + \frac{2\beta \delta - 2\alpha \epsilon}{\alpha \alpha} \cdot x + \frac{\delta \delta - \alpha \Phi}{\alpha \alpha})$. Qui erat locus construendus.

VII. Omnes reliquos casus percensere, qui a signorum varietate pendent, nimis longum foret, sed eorum loco libet construere æquationem generalem quam Illustriff. *Marchio Hospitalius* in suis sectionibus conicis pag. 226 pro ellipsis instar canonis dedit, cum qua omnes casus particulares locorum ad Ellipsis comparavit. Ejus æquatio hæc est

$$yy - \frac{2nxy}{m} + \frac{nn}{mm}xx - 2ry + \frac{2nr}{m}x + rr - \frac{p1t}{2t} + \frac{pss}{2t} = 0.$$

$$+ \frac{eep}{2mt} \quad - \frac{2eps}{mt}$$

Sunt ergo $\alpha = 1, \beta = \frac{-n}{m}, \gamma = \frac{nn}{mm} + \frac{eep}{2mmt}, \delta = -r,$
 $\epsilon = \frac{nr}{m} - \frac{eps}{mt}, \Phi = rr - \frac{p1t}{2t} + \frac{pss}{2t}$. Ergo $\alpha \gamma - \beta^2 = \frac{eep}{2mmt},$
 $\beta \delta - \alpha \epsilon = \frac{eps}{2mmt}, \beta \delta - \alpha \epsilon = \frac{eps}{2mt}, \delta \delta - \alpha \Phi = \frac{p1t - pss}{2t},$ et
 $\lambda (\frac{\beta \delta - \alpha \epsilon}{\alpha \gamma - \beta^2}) = \frac{ms}{e}, \mu (\frac{\delta \delta - \alpha \Phi}{\alpha \gamma - \beta^2}) = \frac{mm1t - mmss}{ee},$ ergo $V(\lambda \lambda + \mu) = \frac{mt}{e},$ hinc $Gg (\frac{2\beta n \gamma \lambda \lambda + \mu}{\delta}) = \frac{2nt\eta}{er}$ (vel propter $n\eta = er$)
 $= 2t$. Denique $\pi (\frac{2\delta \cdot \alpha \gamma - \beta^2 \sqrt{\lambda \lambda + \mu}}{\alpha \alpha \beta \eta}) = \frac{epr}{n\eta} = p$. Ex hisce jam manat constructio facilis.

Ca-

Fig. 6. Capiatur in PQ pars $AC = \frac{mr}{n}$ versus P, et in Ll pars $AB = r$, ductaque CBO, abscindantur porro in PQ partes $AM (= \lambda) = \frac{ms}{e}$, dein $MN = Mn = \frac{mt}{e}$, ductisque NG, ng et MO, invenietur $Gg = 2t$, quare si circa hanc diametrum parametro $\pi = p$, Ellipsis GRgr describatur erit ea locus æquationis Hospitalianæ.

VIII. Si in æquatione $Z = \sqrt{\left(\frac{\beta\beta - \alpha\gamma}{\alpha}xx + \frac{2\beta\delta - 2\alpha\epsilon}{\alpha z}x + \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\alpha z}\right)}$ quantitas $\beta\beta$, excedit $\alpha\gamma$, æquatio est ad Hyperbolam, fit enim $Z = \frac{\sqrt{\beta\beta - \alpha\gamma}}{\alpha} \sqrt{xx + 2\lambda x + \mu}$ existentibus $\lambda = \frac{\beta\delta - \alpha\epsilon}{\beta\beta - \alpha\gamma}$, et $\mu = \frac{\delta\delta - \alpha\Phi}{\beta\beta - \alpha\gamma}$, atqui $xx + 2\lambda x + \mu = 0$ præbet $x = -\lambda \pm \sqrt{\lambda\lambda + \mu}$. Capiantur ergo

Fig. 7. $AM = -\lambda = \frac{\alpha\epsilon - \beta\delta}{\beta\beta - \alpha\gamma}$, et $MN = Mn = \sqrt{\lambda\lambda + \mu}$, ductisque NG, ng et MO parallelis Ll, erit Gg Diameter $= \frac{2\beta\gamma\sqrt{\lambda\lambda + \mu}}{\delta}$, et parameter $\pi = \frac{2\delta \cdot \beta\beta - \alpha\gamma\sqrt{\lambda\lambda + \mu}}{\alpha\alpha\beta\gamma}$. Ex hisce datis hyperbola facile describitur. Demonstratio fere eadem est ac pro Ellipsi, in §. præcedenti tradita.

IX. Si $x = \infty$, fiet $\sqrt{xx + 2\lambda x + \mu} = x + \lambda$, quare deprehendetur $y = \frac{-\beta x}{\alpha} \frac{\delta}{\alpha} + \frac{x\sqrt{\beta\beta - \alpha\gamma}}{\alpha} + \frac{\beta\delta - \alpha\epsilon}{\alpha\sqrt{\beta\beta - \alpha\gamma}}$, Cujus constructio breviter huc redit, ut in Ll capiuntur $BL = B/ = \frac{\alpha\epsilon - \beta\delta}{\alpha\sqrt{\beta\beta - \alpha\gamma}}$, atque per centrum hyperbolæ O ducantur LOr et LOR erunt hæ, binæ ejus asymptotæ.

X. Si in æquatione A coefficientis α evanescit æquatio mutatur in $y = \frac{-\gamma xx - 2\epsilon x - \Phi}{2\beta x + 2\delta} - \frac{-\gamma x}{\beta 2} + \frac{\gamma\delta - 2\beta\epsilon}{2\beta\beta} + \frac{2\beta\delta\epsilon - \beta\beta\Phi - \gamma\delta\delta}{2\beta\beta x + \delta}$ æquationem ad hyperbolam inter asymptotas. Ejus con-

constructio ita habet: in linea PQ capiatur $AC = \frac{\gamma\delta - 2\beta\epsilon}{\beta\gamma}$, et in Ll , portio $AB = \frac{\gamma\delta - 2\beta\epsilon}{2\beta\beta}$, ductaque BC erit una ex asymptotis, facta deinceps $AN = \frac{\delta}{\beta}$, ductaque MN parallela AB occurret ea alteri CB in centro hyperbolæ O, quare facta insuper $Al = \frac{\Phi}{2\delta}$, si intra asymptotas OC et OM per punctum l hyperbola Ff describatur erit ea locus

Fig. 8.

$$2\beta xy + \gamma xx + 2\delta y + 2\epsilon x + \Phi = 0.$$

DE
AEQUINOCTIORUM ET SOLSTI-
TIORUM MOMENTIS, NEC NON DE
OBLIQUITATE ECLIPTICAE
OBSERVANDIS.

Auth. F. C. Mayero.

I.

Venit mihi in mentem modus, quo has res Mens. Mart. 1729.
omnes observationibus definire licet;
Nescio autem an aliis jam notus fuerit?
aut praxi satis accommodus futurus sit? Dicam tan-
tum quid meditatus sim.

2. Observetur quotidie solis sub meridiano et
momentum et altitudo, (quod vulgo fit) quavis et-
iam nocte (dieve si possit fieri) stellæ unius alteri-
us vefixæ culminatio quam accuratissime observetur:
Dico, si observatio talis per integrum annum continu-
etur, ejus ope innotescere æquinoctiorum et solsti-
tiorum momenta, itemque eclipticæ obliquitatem.

Tom. IV.

D

3. Nam

3. Nam per tempus quod intercessit culminatorem solis et stellæ innotescit ascensio recta stellæ a loco solis (quem in meridie præcedente obtinuit) numerata, vel vicissim, A. R. loci solaris culminantis, a stella numerata; Exinde, si observationes sint quotidianæ, incrementa A.Ræ solaris diurna fiunt nota. Imo, etsi cœli obscuritas impediatur quotidianas observationes, nihilominus assignare licet cuilibet meridiei solis A.Rm a stella; Nam quia incrementa hæc intra dies aliquot non multum variant, distributione facta idonea (ope interpolationis methodi, aut alia adhibita dexteritate) arcus ejus qui intra duas observatas A.Ras intercipitur, per totum annum scire licet, quantum distiterit sol a stella (quoad A.Rm) quolibet meridie, imo (instituta proportione debita) quolibet temporis momento.

4. Deinde ex duabus altitudinibus meridianis æqualibus, cis et ultra solstitium factis, reperiuntur duo loca antiscia in quorum medio exacte jacet solstitium. Locorum antisciorum Asc. Ræ a stella dantur (§. 3.) ergo et arcus interjectus, cujus semissis addita uni antiscio vel demta alteri ascensionem a stella rectam prodit, quam sol obtinuit solstitii momento: Hæc Asc. R. inter observationes illius anni habitas (§. 3.) disquiratur, ut pateat quo temporis momento hæc Asc. R. sive ipsum solstitium observatum fuerit. Equidem nec altitudines meridianæ prorsus æquales, nec Asc. recta solstitii exacte inter observationes (§. 3.) habitas continebuntur

tur (nisi rarissime): At jam monui (§. 3.) partem proportionalem detegere momenta extra meridiem sita.


5. Cognitis solstitiis, æquinoctia non amplius ignota manent; Nam eorum Asc. rectæ distant quadrante ab Asc. recta solstitii alterutrius, dantur ergo eorum Af. Ræ a stella, quæ in catalogo observationum (§. 3.) quæsitæ tempus produunt, in quod istæ Af. Ræ adeoque ipsa æquinoctia ceciderunt.

6. Hic ergo modus est observandi puncta cardinalia, quem duò commoda habere autumo; primum est, quod quæsitæ non ex una aut paucis, sed pluribus observationibus elici possint, sic enim ex consensu aut dissensu calculi observationes certæ ab incertis quodammodo discernuntur, et animi certitudo firmatur. Secundum est, quod a refractionibus ne hilum quidem turbetur, quæ sane res magni momenti esse censeretur, nimium enim insidiosæ sunt refractiones. Quod si insuper accedat justum horologium, et quadrans exacte meridionalis et stabilis, non video quid attentum Astronomum impedire possit amplius quo minus omnia impetret quæ optaverat.

7. Restat ut explicem quomodo per has observationes obliquitas eclipticæ inveniatur. Hic mox in limine moneo, rem non æque facile ut ante procedere; Calculus enim molestior evadit et refractionum insidiæ verendæ sunt nonnihil, quod statim palam fiet. Præmittenda sunt autem ad rei

intelligentiam lemma unum et problema, quibus stabilitis, reliqua plana sunt. Lemma igitur hoc esto :

8. Sint datæ duorum arcuum tangentes, majoris quidem $\equiv p$ et minoris $\equiv q$. Dico: tangentem summæ horum arcuum esse $\equiv rr \frac{p+q}{\pm pq + r^2}$ (ubi r significat radium). Demonstratio lemmatis in elementis trigonometriæ tradita potest omitti; sequatur problema.



9. Datu arcu DH, quo differunt arcus DE et BC ad AF normales; datisque arcibus AC et AE; invenire angulum ad A.

Sint Sinus arcus AC $\equiv m$
 Sinus arcus AE $\equiv n$.
 Tangens arcus DH $\equiv t$
 Contangens anguli ad A $\equiv x$.

Est autem per præcepta trigonometriæ sphaericæ, ut cotangens ang. A, ad radium, ita sinus arc. AC ad tangentem arcus BC. Sive
 $x : r \equiv m : \frac{mr}{x} \equiv$ tangenti arcus BC sive HE.

Exin-

Exinde porro conficitur tangens arcus DE (per

$$\S. 8.) = \frac{t + \frac{nr}{x}}{+ \frac{mr}{x} + 1} \cdot \frac{tx + mr}{+ mt + rx} \quad \text{Eadem vero}$$

tangens invenitur per priorem analogiam, hoc modo: $x : r = n : \frac{nr}{x} = \text{tang. arc. DE.}$

Formetur ergo æquatio et reducatur

$$\frac{nr}{x} = \frac{tx + mr}{+ mt + rx} \cdot x \quad \text{unde fit}$$

$$\frac{+ \sqrt{(m+n)^2 r^2 + 4mnt^2} - (m+n)r}{2t} = x.$$

Hac regula invenitur cotangens anguli ad A; nec adeo difficilis est executu, uti videri posset; ostendam suo tempore exemplis, quomodo per solos logarithmos effici possit.

10. Nunc ad propositum revertar: Repræsentet in priori schemate arcus AF æquatorem; arcus ABD eclipticam; Angulus ad A sit obliquitas eclipticæ, et arcus BC, DE, sint duæ diversæ declinationes solis. Per superiores observationes innotescunt ascensiones rectæ solis tam a stella (§. 3.) quam a principio arietis (§. 5.) dantur ergo arcus AC et AE. Porro (per §. 2.) dantur quotidianæ solis altitudines maximæ, earumque differentiæ; hæc vero differentiæ sunt simul differentiæ declinationum solarium; ergo per observationes easdem notus fit arcus DH, ex quibus omnibus elicitur angulus ad A, sive obliquitas eclipticæ. (per §. 9.) Q. E. J.

11. Omnia, puto, plana forent, modo arcus DH refractionibus obnoxius non esset: Dispiciam ergo quantum refractiones valeant in hunc ar-

cum. Si refractiones ubique æquales forent, arcus hic salvus evaderet, nam quantum una altitudo solis five declinatio BC turbaretur, tantum turbaretur quoque altera DE, ergo differentia DH nil turbaretur, quod per se clarum est; ast quia declinatio BC (si borealis sit) plus turbatur quam altera DE, patet arcum DH turbari quidem, sed non nisi a refractionum differentiis; hoc est, quantum refractione in BC major est refractione in DE, tantum quoque arcus DH justo major observatur. Existimo autem, si Authorum celebrium refractionum tabulæ exactissimæ non sint, satis tamen exactas esse quoad refractionum differentias, quia in eas minima pars erroris redundat, maxime in minoribus majorum altitudinum refractionibus. Corrigatur ergo arculus DH per differentias refractionum in tabulis Authorum obvias, eligantur autem declinationes boreales, sic error qui irrepere potest, erit, meo judicio, pene contemnendus.

12. Ne autem vel curiosissimus quisquis habeat quod ipsum cruciet, ostendam alio tempore modum quo omnis a refractionibus formido e medio tollatur in hoc negotio, nihilque præter instrumentorum et observatoris exactitudinem animum suspendere possit. Hæc vero pro nunc satis sunt.

PRO-

PROBLEMA

TRIGONOMETRICOSPHERICUM.


Auth. F. C. Mayero.

1.

Si duo triangula sphaerica sibi mutuo ita inferuntur, ut duae partes in uno sint duabus partibus in altero aequales vel coincidentes, si praeterea quatuor aliae partes cognitae sunt vel datae; reliquae sex omnes determinatae sunt quoque, et reperiri possunt. Multa hujus generis problema comminisci licet, in quibus nonnulla solutu difficilia sunt valde. Horum praecipua, ususque astronomicos non contemnendos habentia, solvere mihi contigit, quae, quia ab aliis nondum satis exulta videntur, in medium proferre, intelligentiumque judicio subdere volui. Si occasio aliquando fuerit ut idoneis observationibus theoriam hanc illustrare detur, officio non deero communicaboque reperta.

2. Primum itaque nunc describendum problema sic se habet: In duobus triangulis sphaericis SPZ et sPZ , communi basi PZ insistentibus, et latera SP , sP aequalia habentibus, sint dati anguli ad P et Z omnes: quaeruntur reliqua.

Sit



Sit igitur

Sinus anguli	SPZ=A	cofinus ejus	=C
- - -	sPZ=a	- - -	=c
Sinus anguli	SZP=P	cofinus	=Q cotangens M
- - -	sZP=p	- - -	=q - - m
Sinus baseos	PZ=x	cofinus	=y
- lateris PS	=Ps=t	- - -	=z
radius	= r		

propter analogiam inter latera et sinus angulorum lateribus oppositorum erit quoque.

Sinus lateris $SZ = \frac{At}{P}$, qui ponatur = f ejus cofinus = g . Cum igitur in triangulo SPZ latera omnia denominata sint, una cum angulis SPZ, et SZP poterunt duae aequationes formari ope theorematis
in

in II. Tom. Comment. pag. 23. atque tractari sequente modo :

1 - - $C = \frac{rf \cdot yz}{rx} r$ adeoque

2 - - $g = \frac{txc + yzr}{rr}$ item

3 - - $Q = \frac{rz \cdot yf}{jx} r$, adeoque

4 - - $g = \frac{rrz - fxQ}{ry}$

ex aeq. 2 et 4 fit

5 - - $txCy + y^2 rz = r^3 z - rfxQ$

substituantur pro f et y^2 aequivalentia

sc. $f = \frac{At}{P}$ et $y^2 = rr - xx$. Fiet ita

6 . . $txCy - xxrz = -\frac{rxtAQ}{P}$

dividatur aequatio per tx et transponantur termini

7 . . $Cy + \frac{rAQ}{P} = \frac{rxz}{t}$ vel

8 . . $Cy + AM = \frac{rxz}{t}$ (ob $\frac{rQ}{P} = M$)

Quod si idem calculus pro altero triangulo sPZ repetatur, inveniatur denuo

9 . . $cy + am = \frac{rxz}{t}$

igitur ex 8 et 9. fiet porro

10 . . $(c - C)y + am - AM = 0$. five

11 . . $y = \frac{AM - am}{c - C}$ Q. E. J.

3. Formula igitur inservit inveniendo lateri PZ , quo dato, reliqua omnia per communia praecepta trigonometrica indagari possunt. Ceterum ut formula ad calculum aptior fiat, ponatur sinus semisummae angulorum SPZ et $sPZ = N$, sinus vero femidifferentiae $= n$. Ita fiet $c - C = \frac{2Nn}{r}$ (per §. 9. pag. 17. commentar. Tom. II.) et consequenter $r = \frac{AM - am}{2Nn} r$.

4. Notandum est in solutione problematis omnes triangulorum partes quadrante minores sumtas fuisse; eaque propter formulam $\frac{AM-am}{2Nn}r$ pro solo hoc casu valere. Quod si igitur angulus sZP obtusus fuerit, erit ejus cotangens negativa ($=-m$) adeoque hoc casu fiet $y = \frac{AM+am}{2Nn}r$. Si uterque angulus ad Z obtusus fuerit fiet $y = \frac{am-AM}{2Nn}r$. Si tandem angulus SZP rectus fuerit, fit $M=0$ adeoque $y = \frac{amr}{2Nn}$. Eodem modo ceteri casus definiuntur.

5. Usum problematis astronomicum ut paucis attingam, notandum est S et s designare duo loca sideris alicujus in suo parallelo, quod declinationem intra horas aliquot aut nihil aut insensibiliter mutat. Angulos ad verticem Z esse azimutha sideris observata, angulos ad P esse horarios azimuthis datis respondententes. Esse etiam PZ altitudinem aequatoris, et $PS=Ps$, declinationis complementum, item, ZS et Zs esse altitudinum complementa.

6. Datis itaque observatione sideris alicujus declinationem ad sensum intra paucas horas non mutantis duobus azimuthis, vel eorum complementis ad duos rectos SZP et sZP , angulisque horariis SPZ et sPZ ad dicta azimutha pertinentibus, invenire licet. 1° altitudinem aequatoris PE five poli, quae est prioris complementum ad 90° . 2° declinationem sideris, cujus ad 90 complementum est $PS=Ps$, 3° altitudinem sideris ad momenta observationis, latera enim SZ et sZ sunt altitudinum complementa ad 90° .

7. Quod

7. Quod si ad momenta transituum per azimutha capiantur simul altitudines visae, atque ab iis auferantur altitudines verae ante repertae, dispalescet sideris refraction, si modo parallaxi careat, aut residuum refractionis a parallaxi, si parallaxi afficiatur: Secernitur autem parallaxis a refractione, si per aliud sidus a parallaxi liberum refractione ejusdem altitudinis simul indagetur, residuum enim illud ab hac refractione subductum relinquit parallaxim quaesitam, unde quartus hujus problematis usus est, quod per illud inveniantur siderum refractiones, et 5to eorundum parallaxes.

8. Aliis vulgo methodis indagantur, altitudo poli, declinationes siderum, eorumque refractiones et parallaxes, nec memini methodum a me recensitam cuiquam in mentem venisse antea. Differt autem mea haec methodus ab aliis, quod praeter observationum possibilitatem et exactitudinem nil supponat nisi motum primum aequabilem, aequabiles etiam aut observatione definiendos motus planetarum diurnos et horarios quoad ascensiones eorum rectas, reliqua pure geometrica sunt. Aliae vero methodi praeter supposita ante recensita, precario vel ex conjectura assumunt ut cognita, mox theoriam solis, mox declinationes siderum; mox refractiones; et quae sunt alia &c. &c. Vincit ergo mea methodus paucitate suppositorum.

9. Possit alicui observationum facilitas vel exactitudo scrupulum movere. Videamus quid differam ego ab aliis. 1. Requiro horologium oscilla-

torium probum. 2. Momentum quo sidus ad verticalem azimuthi alicujus appellit. 3. Quadrantem quo altitudines visae capiuntur. 4. Instrumentum vel observandi methodum idoneam qua azimutha exacte definiuntur. De horologio oscillatorio notum est, quam commendetur ab omnibus, ut non opus sit plura dicere. Appulsus siderum ad verticales sive in tubo ad filum verticale, vel in camera obscura ad filum horizontale extensum (prout Dnus Pr. Del'isle facere solet) vel et ad utrumque latus dioptrarum Tychonicarum observentur, satis distincte percipiuntur, ita ut exercitatus observator nunquam facile unius minuti secundi errorem committat; igitur et hoc requisitum satis exacte obtinetur. Quod quadrantem attinet, eo utuntur etiam alii pro suis methodis, instruunt eum quoque Astronomi hodierni ejusmodi artificii, ut fidem non parvam habeat. Igitur quoad tria priora requisita nulla difficultas mihi objici potest qua magis premar ac alii.

10. Verum enim vero azimuthorum inventio et determinatio accurata, operam facessit forsitan? Tycho jam de incertitudine azimuthorum conquestus est. Hodierni quoque fere omnes astronomi azimuthorum usum quocunque modo effugiunt, conscii, opinor, difficultatum quibus obnoxia est eorum observatio. Me quod attinet, fateor, nullum dum rei experimentum cepi; at rem perpendens, invenisse me puto modum non unum, queis, nisi fallor azimuthorum observatio aeque facilis et certa, saltem pro usu praesentis problematis, evadit, ac observati-
ones

ones aliae. Multum me confirmavit inspectio schematicorum quibus Romeri machinae astronomicae novae depinguntur, quas inter et azimuthale instrumentum est, cui sine dubio Romerus aliquid tribuit cum ei locum inter reliquas fecerit. At de hac re ut plura dicam nunc nil attinet. Dixi, quae problemati meo valorem conciliare queunt. Dicant alii, quae illum aut adimere possint, aut minuere.

CONSIDERATIO CURVARUM IN
PUNCTUM POSITIONE DATUM PROJECTA-
RUM, ET DE AFFECTIONIBUS EARUM
INDE PENDENTIBUS.

Auctore Iac. Hermanno.

I.

Curva AHD mihi in punctum E projici dicitur, cum ex singulis ejus punctis ad punctum illud rectae ducuntur, ut HE, BE, CE, AE, DE, &c. Has lineas deinceps *radios* projectionis, et angulos HED, BEA, CED, angulos projectionis vocabo, atque radios EB, EC ad communem angulum pertinentes, *coincidentes*. Sinus cujuslibet anguli projectionis CED dicatur m , ejus cofinus $n = \sqrt{1 - mm}$, existente sinu toto $= 1$. Dicantur radii EB(EG) $= z$, applicatae orthogonales BF(CG) $= y$, erunt $y = mz$, EF(EG) $= nz$.

Tab. III.

Fig. I.

II. In doctrina locorum Cartesiana haftenus recepta, curvarum natura per aequationes coordinatas AF(AG) et BF(CG) atque quantitates constantes involventes explicatur. Sed pari jure per relationem quam radii projectionis et sinus aut cosinus angulorum projectionis inter se servant, exponi potest, ex hac enim consideratione manant proprietates curvarum aeque elegantes ac sunt illae quae consueto more eliciuntur.

III. Ad id ostendendum opus est, ut aequatio curvae more consueto coordinatas AF(AG) $\equiv x$ et BF(CG) $\equiv y$ continens convertatur in aliam, in quam radii tantum projectionis et sinus aut cosinus angulorum projectionis ingrediuntur, quod facile succedet, sufficiendo in data aequatione mz pro y , et $nz-a$ pro x , posita nempe EA $\equiv a$. Sed si punctum datum E caderet inter A et D, tunc pro x , scribendum esset $a-nz$. His positis.

IV. Sit aequatio Parabolae $yy\equiv px$, existente p parametro, cumque sint $y\equiv mz$, et $x\equiv nz-a$, aequatio mutabitur in $mmz^2\equiv npz-ap$, cujus binae radices dant radios coincidentes majorem EC et minorem EB, nempe

$$\begin{aligned} EC &= \frac{np + \sqrt{(nnp - 4mma)}}{2mm} \\ EB &= \frac{np - \sqrt{(nnp - 4mma)}}{2mm}, \text{ adeoque} \\ EC + EB &= \frac{np}{mm} \\ EC - EB &= BC = \frac{\sqrt{(nnp - 4mma)}}{mm} \\ EC \cdot EB &= \frac{ap}{mm} \end{aligned}$$

Hinc

Hinc si $BC = \frac{\sqrt{nnpp-4mmcp}}{mm} = 0$, id est $a = \frac{np}{4mm}$, fiet
 $EH = z = \frac{np}{2mm}$, adeoque $a(\frac{np}{4mm}) = \frac{1}{2}nz$, atque
 adeo subtangens Parabolae duplo abscissae, ut fieri
 oportet.

V. Sit generalius aequatio ad sectiones
 conicas $yy = gxx + 2bx + i$, haec mutabitur
 in $+mmzz = -2agnz + aag,$
 $-gnn \quad + 2bn \quad - 2ab$
 $\quad \quad \quad + i$

furrogatis in ea mz et $nz = a$, y et x . Ex ista vero
 eliciuntur

$$EC = \frac{agn-bn}{gnn-mm} + \sqrt{\left(\frac{agn-bn}{gnn-mm}\right)^2 - \frac{aag+2abi}{lgnn-mm}}$$

$$EB = \frac{agn-bn}{lgnn-mm} - \sqrt{\left(\frac{agn-bn}{gnn-mm}\right)^2 - \frac{aag+2abi}{lgnn-mm}}. \quad \text{Ergo}$$

$$EC + EB = \frac{2ag-2b.n}{gnn-mm}$$

$$EC - EB = 2\sqrt{\left(\frac{agn-bn}{gnn-mm}\right)^2 - \frac{aag+2abi}{lgnn-mm}}$$

$$EC \cdot EB = \frac{aag-2ab+i}{lgnn-mm}$$

Hinc si $EC - EB = 0$, fiet $a = \frac{bn + \sqrt{(gnn-mm)(gi-bb)}}{gn}$, adeo-
 que $EH(\frac{agn-bn}{gnn-mm}) = \frac{n\sqrt{gi-bb}}{m\sqrt{gnn-mm}}$. Ex hisce jam passim
 notas proprietates Diametrorum in Sectionibus Co-
 nicis et multa alia facili negotio deduci possent, sed
 nolo in rebus jam satis cognitis atque usu tritis pro-
 lexior esse.

VI. Si aequatio curvae AHD sit $y^3 = bxy - x^3$,
 inuenietur propter $y = mz$ et $x = nz - a$, aequatio
 $-m^3z^3 = -n^3z^3 + 3annzz - 3aanz + a^3$, quae reje-
 ctis omnibus ad eandem aequationis partem abit
 in $+m^3z^3 - 3annzz + 3aanz - a^3 = 0,$
 $-n^3 \quad - bmn \quad + abm$

Fig. 2.

cujus tres radices reales totidem radios ad unum eundemque projectionis angulum pertinentes praebet, ex quo proinde constat lineam quamlibet per punctum projectionis E ductam curvam AHD in tribus punctis secare, quoties radices illae omnes inaequales sunt. Sed si $a=0$, hoc est, si punctum projectionis cadit in ipsum initium abscissarum x , invenietur tunc $z = \frac{bmn}{m^3 + n^3}$.

VII. Sed missis pluribus exemplis aliis, nunc rem paulo invertere libet quaerendo curvas AHD in quibus radii projectionis coincidentes EC et EB, determinatam aliquam relationem inter se habeant. Hujus generis Problema primus quod sciam Cel. *Job. Bernoulli* attigit in schediasmate Actis Erudit. 1696 pag. 264 inserto, cui titulus fuit, *Supplementum Defectus Geometriae Cartesianae circa inventionem locorum*, in quo duorum casuum solutiones exhibuit celata tamen analysi et demonstratione. Eorum primus est, ut inveniantur curvae AHD, in quibus ducta ex puncto projectionis E radio EBC rectangulum CEB sit ubique aequale quadrato tangentis EH vel dato plano, ad hujus solutionem exhibuit aequationes sequentes $y = ax^\alpha + ax^{2-\alpha}$, vel $y = ax^\alpha + ax^{2-\alpha} + bx^\beta + bx^{2-\beta}$, vel $y = ax^\alpha + ax^{2-\alpha} + bx^\beta + bx^{2-\beta} + cx^\gamma + cx^{2-\gamma}$, vel $y =$ quantitati hoc modo quousque libuerit continuatae, in quibus aequationibus $x = EB(=EC)$ et $y = BF(=CG)$, et hae in dato angulo ad AD inclinatae sunt. Alter casus cujus etiam solutionem sine demonstratione dedit, est, ut inveniantur curvae in quibus $EC + EB$ ubique $= 2EH$,
pro

pro his curvis dedit aequationem $y = \sqrt{x \cdot x - x \cdot x^n}$. Sed in programmate quod ineunte anno 1697 Groningae edidit, quo Geometras ad solutionem problematis de Curva celerrimi descensus invenienda invitabat, problema paulo generalius proposuit, postulando curvas, in quibus $\overline{EC}^a + \overline{EB}^a$ ubique constantem summam efficere debet. Hujus solutiones exhibuerunt Geometrae illius aevi Illustrissimi *Leibniti*, *Jac. Bernoulli*, *Marcio Hospitalius*, atque *Newtonus*. Videantur Acta Erudit. 1697. Mens. Maj. Sed nullus eorum solutionis suae analysin edidit.

VIII. Primo intuitu videntur haec problemata facillima et tantum non ludicra esse; ecquid enim facilius est, quam ut in data curva ABH ducta indefinite per punctum datum E recta EBC, in ea invenire possit punctum C tale, ut tota EC ad ejus partem EB relationem pro libitu assignatam habeat. Ultro fateor nihil esse hoc facilius, sed non est id de quo agitur. Curva enim ABH non debet esse data, sed est ea quae quaeritur: nam si ABH est data et per constructionem expositam invenitur altera HCD, non sequitur quod haec altera pars sit continuatio primae ABH, ita ut utriusque natura per unam eandemque aequationem localem exponatur, sed fere semper curvae anterioris ABH aequatio diversa esset ab ea quae naturam curvae alterius exprimit, uno verbo ut rem expediam, curvae ABH et DCH essent diversae, et quaeruntur curvae AHD

Fig. 3.

in quibus radii EC, EB assignatam inter se relationem habeant et tamen utraque earum pars ABH et DCH una eademque aequatione locali exponatur.

IX. Ad ejusmodi problematum solutionem vocando $EC(EB)=z$; $CG(BF)=y$, et $EG(EF)=x$, adhibeo aequationem quadraticam $Z^{2\eta}-2QZ^\eta+R=0$, fit $EC=Z$, et $EB=z$, erit $Z^\eta=Q+\sqrt{(QQ-R)}$ et $z^\eta=Q-\sqrt{(QQ-R)}$, ipsae vero Q et R ex Problematibus circumstantiis varie dantur.

X. Quod si ergo curvae AHD quaerantur in quibus $EC.EB=\overline{EH}^2$ problemati ilico satisfiet, nam quia $Z^\eta=Q+\sqrt{QQ-R}$, et $z^\eta=Q-\sqrt{QQ-R}$, fiet utique $Z^\eta z^\eta=R$, atqui debet esse $Zz=cc$, vocando tangentem $EH=c$, ergo $Z^\eta z^\eta=c^{2\eta}=R$; itaque in locum ipsius R poni debet in aequatione $z^{2\eta}-2Qz^\eta+R=0$, quantitas $c^{2\eta}$, et habetur $z^{2\eta}-2Qz^\eta+c^{2\eta}=0$, vel $2Q=z^\eta+c^{2\eta}z^{-\eta}$, sed quid est Q? Si Q esset constans, aequatio $2Q=z^\eta+c^{2\eta}z^{-\eta}$, non esset ad curvam, sed ad duo puncta. Quare opus est, ut Q sit variabilis, et tamen eadem pro duobus punctis B, et C; nempe si angulus CED sit alius major aut minor etiam Q debet esse alia major vel minor, ita tamen, ut eadem sit pro radio minore AB ac pro majore AC; fiat ergo $Q=b+\frac{m}{2a}$, seu quaelibet quantitas composita ex constante b et sinu anguli CED diviso per 2a, vel quia $y=mz$ adeoque $m=\frac{y}{z}$, $Q=b+\frac{y}{2az}$, adeoque $2b+\frac{y}{az}=z^\eta+c^{2\eta}z^{-\eta}$, vel $y=-2abz+az^{1+\eta}+ac^{2\eta}z^{1-\eta}$, sit $\alpha=\eta+1$, aequatio mutabitur in $y=-2abz+az^\alpha+ac^{2\alpha-2}z^{2-\alpha}$, faciendo vero $b=0$,
et

et $c=1$, fit $y=az^{\alpha}+az^{2-\alpha}$, et haec est prima aequatio earum quas Cel. *Job. Bernoulli* dedit in solutionem Problematis, sed reliquae ejus aequationes methodo hoc loco exposita non eliciuntur, earum tamen in locum ex infinitis infinitis, quae omnes problemati satis faciunt, adducam sequentes.

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{cccccccccccc}
 0 & \beta & & \beta-1 & & \beta-2 & & & & \beta & & & & & & & & \alpha+\beta & 2\alpha-2 & 2+\beta-\alpha \\
 1. & az & + & byz & + & cyz & z & . & . & + & yz & . & . & . & . & . & . & = & z & + & c & z \\
 10 & \beta & & \beta-1 & & \beta-2 & & & & \beta & & & & & & & & \alpha+\beta & 2\alpha-2 & 2+\beta-\alpha \\
 2. & az & + & bxz & + & cxxz & . & . & + & yz & . & . & . & . & . & . & . & = & z & + & c & z \\
 0 & \beta & & \beta-1 & & \beta-1 & & \beta-2 & & \beta-2 & & \beta-2 & & \beta & & \beta & & \alpha+\beta & 2\alpha-2 & 2+\beta-\alpha \\
 3. & az & + & byz & + & cxxz & + & eyyz & + & fxyz & + & gxxz & + & tx & + & yz & = & z & + & c & z
 \end{array}
 \end{array}$$

Ex infinitis infinitis transcendentibus unam

$$4. dy = -adx + \frac{axdz-ydz}{z} + (z^{\eta-1} + c z^{2\eta-\eta-1}) \times (zdx - xdz)$$

XI. Invenire curvas AHD in quibus $\overline{EC} + \overline{EB}$ facit ubique summam constantem. Quoniam (§. IX.) $Z^{\eta} = Q + V(QQ-R)$ et $z^{\eta} = Q - V(QQ-R)$ fiet $Z^{\eta} + z^{\eta} = 2Q$, sic $\eta = a$, erit $Z^a + z^a = 2Q = 2c^a$, quare $Q = c^a$. Surrogataque hac litterae Q aestimatione in aequatione $Z^{2\eta-2}QZ^{\eta} + R = 0$, proveniet $z^{2a} - 2c^a z^a + R = 0$, et $R = 2c^a z^a - z^{2a}$. Haec etiam suppeditat, infinitis infinitas curvas quaestioni satisfaciennes, nam si $R = b + cm + dn + emm + fmn + gnn + \&c.$ habebimus $bz^{\beta} = cyz^{\beta-1} + dxz^{\beta-1} + eyyz^{\beta-2} + fxyz^{\beta-2} + gxxz^{\beta-1} + \&c. = 2c^a z^{a+\beta} - z^{2a+\beta}$. Si $b, d, e, f, g \&c. = 0$, $a = 1$, et c in parte sinistra aequationis $= 1$, in parte vero dextra $c = \frac{1}{2}$, prodibit $y = x.x - x.x$, quae est aequatio Cel. *Job. Bernoulli* cum in ea $n = 1$.

Sed ipsa quoque $y = x.x - x.x$ ex praecedentibus facile

deducitur, nam $R = 2c^a z^a - z^{2a}$ praebet $R^n = (2c^a - z^a)^n z^{na}$, si nunc R^n facias $= b + em + fn + gmm + bmn + \&c.$ habebis $bz^\beta + eyz^{\beta-1} + fxyz^{\beta-1} + gyyz^{\beta-2} + bxyyz^{\beta-2} + \&c. = z^{a\alpha + \beta} (2c^a - z^a)^\alpha$, in qua si $a = 1$, $b = 0$, $g = 0$, $h = 0$, &c. inveniatur $y = z^{n+1} (1-z)^n$, posita $c = \frac{1}{2}$, id est $y = z \cdot z - z^2$, ut habet solutio Bernoulliana, sed mallem adhibere $y = -b + z \cdot z - z^2$.

XII. Invenire curvas AHD in quibus $EC^m \cdot EB^n = EH^{m+n}$. Quoniam (§. IX.) $Z^n z^n = B$, vel posita $\eta = m$, $Z^m z^m = R$, adeoque $Zz = R^{\frac{1}{m}}$, et $Z^m z^n = R z^{n-m}$ (hyp.) $= c^{m+n}$, fiet $R = c^{m+n} z^{m-n}$, quod in aequatione $z^{2m} - 2Qz^m + R = 0$, susceptum, praebet $z^{2m} - 2Qz^m + c^{m+n} z^{m-n} = 0$, Hinc $2Q = c^{m+n} z^{-n} + z^m$, et $(2Q)^p = (c^{m+n} + z^{m+n})^p z^{-np}$. Ponatur nunc $(2Q)^p = b + em + fn + gmm + bmn + \&c.$ et positis pro m et n , $\frac{y}{z}$ et $\frac{x}{z}$, proveniet $bz^\beta + eyz^{\beta-1} + fxyz^{\beta-1} + gyyz^{\beta-2} + \&c. + tax^\beta + vyz^\beta = (c^{m+n} + z^{m+n})^p \cdot z^{\beta-np}$. Possent adhuc infinities infinitae aequationes aliae, praeter hanc generalem, exhiberi in solutionem Problematis.

Ad duo problemata §. §. XI, XII non addidi exempla curvarum transcendentium quorum infinita problemati satisfaciunt, qualia unusquisque juxta ductum praecedentium facile excogitabit.

Fig. 4.

XIII. Methodus in superioribus tradita extendi potest etiam ad curvas BHC in quibus secantes CBE sunt parallelae tangenti HI. Si RE sit axis ad quem secantes CBE et tangens HI in dato angulo inclinatae sunt.

Di-

Dicantur nunc $AE=x$, $CE(BE)=y$, tangens $HI=c$, et si quaerantur curvae BHC , in quibus $CE.BE=HI^2$, vel $Yy=cc$. Huc etiam nunc faciet aequatio $y^{2\eta}-2Qy^\eta+R=0$, habens duas radices majorem $Y^\eta=Q+\sqrt{(QQ-R)}$ et minorem $y^\eta=Q-\sqrt{(QQ-R)}$, quare $Y^\eta y^\eta=R=(hyp.)c^{2\eta}$, et si hic valor in aequatione $y^{2\eta}-2Qy^\eta+R=0$, substituatur, reperietur iterum $2Q=y^\eta+c^{2\eta}y^{-\eta}$. Ubi autem Q dari debet per x et constantes quomodo cunque libet ;

Si $\eta=1$, et $2Q=x$, erit aequatio $x=y+\frac{ccy}{y}$ ad Hyperbolam cujus centrum est in A et recta AF est una Asymptota, $AI=2HI$, productaque IH in K , ut $HK=HI$, altera Asymptota erit AK producta sursum, et AH , in eundem sensum protensa, Diameter. Aliunde jam constat Hyperbolae intra asymptotas competere proprietatem quam fundamenti loco assumimus, sed non est sola; infinitae enim aliae curvae hanc eadem proprietatem habent, cum in superiori aequatione $2Q=y^\eta+c^{2\eta}y^{-\eta}$, pro Q substitui possit quantitas, ut libet composita indeterminata x , et constantibus.

Si quaerantur curvae in quibus $CE^m.BE^n=HI^{m+n}$, in hoc casu per ratiocinium simile illi quo §. XII. usi sumus invenietur aequatio $2Q=(c^{m+n}+y^{m+n})y^{-n}$, quare si $2Q=ax$, resultabit aequatio $axy^n=c^{m+n}+y^{m+n}$, quae est etiam Hyperbolici generis et simplicissima earum quae problemati satisfaciunt et quoque Hyperbolici generis sunt quorum numerus infinitus est.

Si quaeruntur curvae BHC, in quibus $CE^m + BE^m = 2HI^m$, inveniemus nunc iterum ut in §. XI. $R = 2cy^m - y^{2m}$, in qua R nunc designat quantitatem ut libet datam per x et constantes. Si $R = ax$ et $m = 1$, aequatio tunc fiet $ax = 2cy - yy$, quae est ad *Parabolam*.

Fac. Hermannii.

DE

ELLIPSI CONICA CUJUS AXIS

ALTERUTER DATUS EST, ANGULO POSITIONE ET MAGNITUDE DATO ITA INSCRIBENDA, UT CENTRUM EJUS INTRA DATUM ANGULUM SIT ETIAM POSITIONE DATUM.

Menf. Aug.
1729.
Tab. IV.

Inſignis Geometra *Philippus de la Hire* per plura elegantia problemata circa ſectiones conicas in novem libris, quos de his lineis Lutetiae olim edidit, ſoluta dedit; in iis tamen fruſtra quaeras illud quod huic diſſertatiunculæ argumentum præbebit, quoque ipſi quoque *de la Hire* acceptum eſt ferendum, qui interventu Cel. *Varignon* illud ad Excell. aliquem Geometram olim miſerat, faſſuſque erat, nullam tunc ſibi ſolutionem ejus occuſſiſſe. Vir autem eximius ad quem problema ſic delatum erat, ſolutionem ejus ſtatim naſtuserat ope calculi analytici et in æquationem biquadraticam parium ni
fal-

fallor dimensionem incidit, quam simplicissimam suppeditare puto solutionem earum, quæ per hanc viam sperari possunt. Quod si vero via geometrica in constructionem problematis inquirere velimus, invenietur ea oppido simplex et facilis, quod hoc loco ostendere placet, ut eo magis veritas ejus quod alibi jam monui, pateat, geometriam linearem absque calculo procedentem, simpliciores subinde solutiones suppeditare, quam calculum analyticum.

Problema ita habet: *Dato angulo CQE Ellipsin CAE inscribere cujus axis transversus AD æqualis sit datæ lineæ MN, ita ut Ellipsis crura anguli contingat in C et E, et centrum ejus sit in puncto intra angulum PZS positione dato R.*

Fig. 1.

Ut ergo per analysin geometricam in constructionem hujus problematis inquirerem, ita ratiocinatus sum. Positis ACDE ea Ellipsi, quæ quæritur, et AD axe transverso, punctisque C et E punctis contactus, ex his punctis duxi ad focos Ellipsis, quos posui in H et *b*, rectas CH, C*b*, et EH, E*b*, et videbam propter Ellipsin esse tum $HC + bC = AD = MN$, tum etiam $HE + bE = AD = MN$. Videram quoque, quod, ductis ex foco H perpendicularibus HI et HT ad crura anguli dati QP et QS, iisque productis in K et L ita, ut $IK = HI$, et $TL = HT$, rectæ *b*K et *b*L ex altero foco *b* ad terminos K et L rectarum IK et TL ductæ, axi transverso AD, æquales sint futuræ. Sunt enim $HC = CK$ et $HE = EL$, propter $HI = IK$, et $HT = TL$ et angulos ad I et T rectos.

Vi-

Videram præterea, ductis RI et RT has ipsas bK et bL parallelas esse, ac denique propter $HR = bR$; fore $RI = \frac{1}{2}bK = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}MN$, et $RT = \frac{1}{2}bL = \frac{1}{2}AD = \frac{1}{2}MN$, atque adeo $RI = RT = \frac{1}{2}MN$, id quod mihi sequentem constructionem facillimam suppeditavit.

Constructio. Centro R et intervallo $RI = \frac{1}{2}MN$, descripto circulo IDT, secante crura QP et QS in I et T, demittantur ex his punctis perpendiculara IH et TH, sese secantia in puncto H, erit hoc punctum alteruter focus Ellipseos describendæ, rectaque ex centro R per hunc focum H ducta dabit positionem axis, factisque $RD = RA = \frac{1}{2}MN$, tota AD erit axis ipse major. Semiaxis conjugatus vero RB vel RT erit media geometrica inter AH et HD. Ex hisce jam Ellipsis facile describi potest. Demonstratio ex præcedenti Analyfi facilis est.

Fig. 2.

Quid si vero circulus IDT crura QP, et QS nusquam secet? Constructio nihilo difficilior erit. Nam (Fig. 2.) descripto centro R et intervallo $RB = \frac{1}{2}mn$ circulo BF, ductisque RP et RS normalibus ad QC et QE, et ex P ac S tangentibus circuli BF, nempe PW et SV, captisque $RX = PW$ et $RY = SV$, ducantur XH parallela QC, et YH parallela QE, et YH parallela QE, occurrent hæ sibi invicem in H alterutro foco Ellipseos quæsitæ; ductaque RH ipsique normali RB, erit $BH =$ semissi axis transversæ, atque adeo Ellipsis describi potest.

De-

Demonstratio. Nam demissis perpendicularibus HI, HT ad rectas PQ et SQ, erunt HI=PX, et HT=SY, jungantur BH, TH et invenietur $BH^2=BR^2+RH^2=BR^2+RX^2+PI^2=RW^2+PW^2+PI^2=PR^2+PI^2=RI^2$, ergo BH=RI, simili argumento erit TH=RT, atqui BH=TH, ergo RI=RT, adeoque per præc. casum erit RI semi axis major, et BR semi axis minor. Q. E. D.

DE
 INNUMERABILIBUS CURUIS
 TAUTOCHRONIS IN VACUO.

Auct. Leonb. Eulero.

§. I.

Quoties ego insignem tautochronismi proprietatem, quam *Hugenius* primus in cycloide inesse deprehendit, contemplatus sum, semper dubitabam, an præter cycloidem aliae curvae eandem forte habeant proprietatem. Hocque mihi eo probabilius videbatur, quod ipsum *Hugenium* non ex tautochronismi contemplatione ad cycloidem peruenisse intelligebam: sed potius cycloidis proprietates scrutantem hanc ipsum inter alias detexisse. *Newtonus* quidem atque *Hermannus*, qui deinceps eandem rem tractarunt,

Menf. Sept.
 1729.
 Tab. V. &
 VI.

Tom. IV.

G

ana-

analytice cycloidem elicuerunt, sed vsi sunt principio non satis late patente hoc; accelerationes viis percurrendis esse oportere proportionales. Aliis enim modis accelerationes possunt determinari, ut tautochronismus nihilominus conseruetur. Quamobrem mihi jure suspicari visus sum, praeter cycloidem in alias fortasse curvas eandem tautochronismi proprietatem competere.

§, 2. Ad hanc dubitationem tollendam genuina opus esse methodo censebam, qua sine vilo principio aliunde assumpto ex sola tautochronismi consideratione curuae hac proprietate praeditae erui possent. Diu igitur omne studium operamque in hanc inuestigationem contuli, donec tandem voti compos factus, quicquid desiderabam, sum consecutus. Animaduerti autem, cum de curua tautochrona inuenienda quaestio proponitur, duas omnino quaestiones bene a se inuicem distinguendas in ea esse inuolutas. Quarum altera hujusmodi curuam requirit, in qua graue descendens aequalibus temporibus ad punctum infimum perueniat, ubicunque sumatur initium descensus. Altera vero in ejusmodi curuis inquirendis est occupata, super quibus integrae oscillationes ex descensu et ascensu constantes omnes sint isochronae. Illi quidem quaestioni solam cycloidem satisfacere deprehendi: huic vero praeter cycloidem innumerabiles aliae conuenire mihi inuentae sunt.

Fig. 1.

§. 3. Posteriolem hanc quaestionem primum hoc modo proposui, vt data curua quacunque AMC
in-

inueniatur curua ei in A jungenda AND ejusmodi, vt graue super composita ex iis curuae CMAND oscillans omnes oscillationes absoluat aequalibus temporibus. Postquam autem hujus solutionem sum adeptus, eos inuestigauit casus, quibus hae duae curuae vniam constituent lineam continuam, atque eadem contineantur aequatione. Hujusmodi mihi curuae admodum notatu dignae visae sunt, eo quod eundem quem cyclois, praestent effectum et aequae ac illa ad horologia accommodari possint. Praeterea non sine admiratione cognoui in his curuis tautochronis curuas etiam algebraicas contineri, ad quas Analystae in problematis soluendis tanto semper studio peruenire nituntur. Haec igitur omnia eo, quo ipse sum affectus modo, hic proponere constitui tam propter ipsius methodi nouitatem, quam eorum, quae ex ea prodierunt, dignitatem.

§. 4. Sit igitur curua data AMC, quaesita vero AND, quae communem habeant axem verticalem AB. Incipiat graue descensum ex puncto quocunque C, ascendet id rursus in altera curua ad eandem altitudinem D, ita vt recta CD sit horizontalis; animum enim ab omni resistantia abstrahimus. Hac ergo oscillatione percurrit corpus arcum CAD, secundum legem Galileanam et in quouis loco M habebit celeritatem, quam lapsu ex altitudine BP acquirit, ducta nempe per M horizontali MPN. Tautochronismi autem conditio requirit, vt tempus hujus oscillationis sit constans, retineatque eandem quantitatem, ubicunque accipiatur punctum C.

Fig. 1.

G z

Quam-

Quamobrem formula hoc tempus exprimens ita esse debet comparata, ut in ea neque linea AB infit neque quaequam alia quantitas a loco puncti C pendens.

§. 5. Maxima celeritas corporis, dum hanc oscillationem absoluit, est in puncto infimo A, atque respondet altitudini AD, quippe ex qua est genita. Haecque celeritas ipsa debet exponi radice quadrata ex hac altitudine AD, et simili modo in loco quocunque M celeritas est ut radix quadrata ex altitudine BP. Quamobrem sumtis elementis Mm et Nn aequae altis, erit corporis celeritas dum utrumque describit eadem atque ut \sqrt{BP} ; Et tempusculorum, quibus haec elementa percurreuntur, summa est $\frac{Mm + Nn}{\sqrt{BP}}$. Hujus ergo integrale dabit tempus, quo arcus MAN absoluitur, et posito in eo $AP = AB$, prodibit tempus integrae oscillationis.

§. 6. Ponantur nunc $AB = b$, $AP = x$; arcus $AM = s$ et $AN = t$. Erit $Pp = dx$; $Mm = ds$; $Nn = dt$ et $BP = b - x$. Celeritas ergo, quam habet corpus elementa Mm et Nn percurrens, erit $= \sqrt{b - x}$. Et propterea tempus, quo haec elementa absoluuntur, est $\frac{ds + dt}{\sqrt{b - x}}$, seu posito $ds + dt = dv$, erit id $\frac{dv}{\sqrt{b - x}}$. Cujus integrale dabit tempus, quo arcus MAN absoluitur, siquidem tanta constans adjicitur, ut facto $x = 0$ ipsum tempus evanescat. In illo integrali deinde, si ponatur $x = b$, habebitur tempus totius oscillationis. Quamobrem in eo neque litera b neque alia ab ea pendens inesse debet. Inveniri ergo debet litera v in x ut integrale hanc obtineat proprietatem.

§. 7. Fiat $dv = pdx : e$; per e diuido, vt homogeneitas conseruari possit, cum cognita fuerit functio p . Est itaque differentiale summae temporum $= pdx : eV(b-x)$ sive $\frac{1}{e} pdx : V(b-x)$. Jam, ut ex praecedentibus elucet, oportet $pdx : V(b-x)$ ita esse constitutum, ut, si integretur talisque constans addatur, quae faciat integrale $= 0$, si $x = 0$ factoque $x = b$, tum b penitus ex expressione excedat. Hisque conditionibus ut satis fiat, oportet determinare p . Consistat integrale hujus $pdx : V(b-x)$ debita constante auctum quotcunque terminis simplicibus; nam et irrationalia in series huiusmodi terminorum resolvere licet. Necessesse est igitur, vt vnusquisque horum terminorum quantitate x seu dignitate ejus exponentis affirmativi sit affectus; ea propter ut tota expressio euanescat, si fiat $x = 0$.

§. 8. Singuli ergo termini talem habebunt formam gx^m , ubi g etiam in b dari ponitur. Cum vero in hisce omnibus facto $x = b$, b debeat euanescere seu ex computo egredi: fiat $x = b$, termini hanc habebunt formam gb^m , ex qua vt b eliminetur, oportet sit $g = nb^{-m}$ vbi n ipsa b non sit affectum, sed denotet numerum quem vis in quantitatem datam ductum; hanc vero quantitatem in e complecti licet, vt ergo n solum numerum significare possit. Hac ergo ratione singuli termini erunt $nb^{-m}x^m$. Ubi cum dimensiones ipsius b destruant dimensiones ipsius x , perspicuum est integrale nullam dimensionem habere debere. Deinde id quoque manifestum est in integrali praeter b et x , et

numeros alias quantitates contineri non oportere; unde sequitur idem et in differentiali locum habere. Quapropter p cum ab b affici nequeat, in meris x dari debet, eritque p potentia ipsius x quae fit x^n .

§. 9. Ex hac conditione differentiale $pdx : V(b-x)$ transmutatum est in $x^n dx : V(b-x)$. Accedat altera atque prior conditio, qua integrale nullam habere debet dimensionem, ut inde n determinetur. Requiritur autem ad id, ut integrale nullius sit dimensionis, ut et in differentiali dimensiones sese destruant elemento dx vnam dimensionem implere posito; manifestum enim est, semper differentiale tot habere dimensiones, quot integrale. Numerus vero dimensionum in nostro differentiali $x^n dx : V(b-x)$ est $n+1-\frac{1}{2}$ seu $n+\frac{1}{2}$, qui ergo debet aequari nihilo; unde habetur $n=-\frac{1}{2}$. Ex quo emergit $p=x^{-\frac{1}{2}}$ seu $1 : \sqrt{x}$, hinc porro erit $dv = dx : e\sqrt{x}$. Quia e eum in finem tantummodo erat assumptum ut homogeneitas conseruetur, fiat $e=1 : \sqrt{a}$; eritque $dv = dx\sqrt{a : x}$.

§. 10. Erat vero $dv = ds + dt$, quare $ds + dt = dx\sqrt{a : x}$, cuius integrale est $s + t = 2\sqrt{ax}$. Erit igitur summa arcuum $AM + AN$ semper in ratione subduplicata sagittae AP . Construat ergo alia curva ALE , talis ut productis MN , mn in L et l sit arcus $AL = AM + AN$. Eritque $Ll = Mm + Nn = ds + dt = dv$. Unde $AL = v = 2\sqrt{ax}$, adeoque $vv = 4ax$. Ex quâ perspicuum est curuam ALE esse cycloidem, cui

cujus circuli generatoris diameter est a . Descendat corpus in hac cycloide ex puncto E aeque alto ac C vel D ; erit velocitas ejus in L vt $\sqrt{(b-x)}$. Ergo tempusculum per Ll est $dv : \sqrt{(b-x)}$. Id quod igitur aequale est summae tempusculorum per elementa Mm , Nn . Quare totum tempus descensus per ELA , aequale erit summae temporum per arcus CA et DA . Oscillatio ergo per CAD contemporanea est dimidia oscillationi penduli longitudinis $2a$, seu integrae oscillationi penduli long. $\frac{1}{2}a$.

§. 11. Ex his jam facile apparet, quomodo data altera curua AC inueniri debeat altera AD . Sit quaesitae AD applicata $PN = z$; erit $Nn = dt = \sqrt{dx^2 + dz^2}$. Erit igitur $ds = \sqrt{(dx^2 + dz^2)}$ $= dx\sqrt{(a : x)}$. Vnde $\sqrt{(dx^2 + dz^2)} = dx\sqrt{(a : x)} - ds$. Denique $dz = \sqrt{(a dx^2 : x + ds^2 - dx^2 - 2 ds dx \sqrt{(a : x)})}$. Cum curua AMC sit data, dabitur ds in x et dx ; ponatur igitur $ds = p dx$. Erit $dz = dx\sqrt{(a : x + p^2 - 1 - 2p\sqrt{(a : x)})}$. Quae aequatio, cum p in x dari ponatur, exprimet naturam curuae AND quaesitae. Hinc intelligitur, cum a non a curua pendeat, et ideo pro lubitu accipi possit, infinitas inueniri posse curuas loco quaesitae AND , quae cum AMC junctae tautochronas praebent. Notandum tamen accidere casus, quibus, si a quantitate quadam minor accipiat, curua quaesita fiat imaginaria.

§. 12. Sit curua data AC linea recta, cum

Fig. 2.

verticali AB angulum quemcunque BAC constituens,

erit $ds = n dx$, n denotante numerum ei angulo con-

ue-

uenientem, unde $p=n$, quare $dz=dx\sqrt{(a:x+n-1-2n\sqrt{(a:x)})}$. Quae aequatio integrationem admittit in casu $n=1$, quo recta AC fit verticalis inciditque in AB. Hic fit $dz=dx\sqrt{(a:x-2\sqrt{(a:x)})}$, fiat $2\sqrt{ax}=q$, erit $x=qq:4a$, et $dx=qdq:2a$; ergo $dz=\frac{qdq}{2a}\sqrt{(\frac{4aa}{qq}-\frac{4a}{q})}=\frac{dq}{2}\sqrt{(\frac{a-q}{a})}$. Est igitur $z=C-\frac{2(a-q)\sqrt{(a-q)}}{3\sqrt{a}}=C-\frac{2(a-2\sqrt{ax})\sqrt{(a-2\sqrt{ax})}}{3\sqrt{a}}$. Vt z fiat $=0$ si $x=0$, oportet fit $C=\frac{2a}{3}$, adeoque est $z=\frac{2a\sqrt{a}-2(a-2\sqrt{ax})\sqrt{(a-2\sqrt{ax})}}{3\sqrt{a}}$. Quae est aequatio ad curuam quarti ordinis; Hic x nunquam $\frac{1}{4}a$ superare potest.

§. 13. Si curua altera AMC fuerit semicyclois, cujus diameter circuli generatoris $AB=b$. Erit dictis AP, x , AM, s , tum $ss=4bx$, ergo $s=2\sqrt{bx}$. Sit altera curua quaesita ANE in qua $AN=t$, oportet fit $s+t=2\sqrt{ax}$, unde habebitur $t=2\sqrt{ax}-2\sqrt{bx}$. Dicatur $\sqrt{a}-\sqrt{b}=\sqrt{c}$; $t=2\sqrt{cx}$. Est itaque altera curua ANE etiam cyclois, idque quaecunque: ejus enim diameter c pro lubitu potest accipi. Oscillationes vero cotemporaneae sunt dimidia oscillationi penduli, cujus longitudo est $2a$, vel integrae si longitudo fuerit $\frac{1}{2}a$. Est vero $\sqrt{a}=\sqrt{b}+\sqrt{c}$, unde $a=b+2\sqrt{bc}+c$. Longitudo igitur penduli isochroni est $\frac{1}{2}b+\sqrt{bc}+\frac{1}{2}c$. Notandum vero in cycloide majori AMC initium descensus non supra punctum E, vbi ED producta secat, esse accipiendum; alioquin enim corpus ascendens in curua AE ultra E ascenderet, et oscillatio nusquam terminaretur.

§. 14. Queramus casus, quibus ambae curvae sint inter se aequales. Erit igitur $s=t$. Quare cum sit $s+t=2\sqrt{ax}$; erit $2s=2\sqrt{ax}$; seu $s=\sqrt{ax}$. Ex quo cognoscitur, utramque curvam esse cycloidem, neque alias hoc sensu satisfacere curvas praeter cycloidem: Supra enim demonstratum est nostra methodo problema propositum generalissime solvi. Quemadmodum hic positum erat $s=t$, sic quaecunque aequatio inter s et t potest accipi, et deinde duae curvae dari, ut arcus ascensus et descensus eam habeant inter se relationem. Ut, si quaerantur duae curvae problemati satisfaciennes CA, DA, ut sit semper $AM : AN = m : n$, erit $mt=ns$, et $t=ns : m$. Ergo $s+t=(ms+ns) : m = 2\sqrt{ax}$, unde efficitur $s = \frac{2m}{m+n}\sqrt{ax}$. Perspicuum ergo est, curvam AC esse semicycloidem diametri $\frac{m^2 a}{(m+n)^2}$, et alteram ADN

Fig. 1.

quoque semicycloidem diametri $\frac{n^2 a}{(m+n)^2}$.

§. 15. Cum esse debeat $s+t=2\sqrt{ax}$, ut ambae curvae praebent tautochronam oscillationes isochronas penduli longitudinis $\frac{1}{2}a$ habentem; Sit $s=\sqrt{ax}+v$, et $t=\sqrt{ax}-v$. Hoc igitur modo duae curvae inveniuntur satisfaciennes. Erit itaque $ds = \frac{adx}{2\sqrt{ax}} + dv$, et $dt = \frac{adx}{2\sqrt{ax}} - dv$. Ponatur $dv = udx$; habebitur $ds = \frac{adx}{2\sqrt{ax}} + udx$, et $dt = \frac{adx}{2\sqrt{ax}} - udx$. Quare si y illius et z hujus curvae denotent applicatas, erit $dy = dx\sqrt{\left(\frac{a}{4x} + \frac{au}{\sqrt{ax}} + uu - 1\right)}$. Atque $dz = dx\sqrt{\left(\frac{a}{4x} - \frac{au}{\sqrt{ax}} + uu - 1\right)}$. Hic si loco u substituatur quaecunque fun-

ctio ipsius x ; habentur duae aequationes pro curvis problemati satisfaciendis. Obseruandum hic, si ponatur $a=4b$ fore $dz=dx\sqrt{\left(\frac{b}{x}-\frac{2bu}{\sqrt{bx}}+uu-1\right)}$. Quae aequatio conuenit cum aequatione §. 11. $dz=dx\sqrt{\left(\frac{a}{x}+pp-1-\frac{2ap}{\sqrt{ax}}\right)}$ si fit $b=a$, et $u=p$. Ex quo intelligitur curuam $dz=dx\sqrt{\left(\frac{a}{4x}-\frac{au}{\sqrt{ax}}+uu-1\right)}$, etiam cum hac $ds=udx$ seu $dy=dx\sqrt{(uu-1)}$, conjunctam constituere tautochronam oscillationes absolutentem eodem tempore, quo pendulum longitudinis $\frac{1}{2}b$ seu $\frac{1}{8}a$.

Fig. 4. & 5.

§. 16. Constituatur super axe AP curua quaecunque BE, in qua posita AP= x fit PE= u . Tum describatur hyperbola cubicalis VKLT, cujus applicata PK vel PL si dicatur r , fit $4xr^2=a$, recta quadam pro unitate accepta, erit PK vel PL= $\sqrt{a:4x}$. Deinde constituantur duae nouae curuae RF, SG, in quibus fit PF= $\sqrt{LE^2-1}$; et PG= $\sqrt{KE^2-1}$. Erit PF= $\sqrt{\left(\frac{a}{4x}-\frac{au}{\sqrt{ax}}+uu-1\right)}$ et PG= $\sqrt{\left(\frac{a}{4x}+\frac{au}{\sqrt{ax}}+uu-1\right)}$. Quibus factis accipiatur PM in x ducta aequalis areae APFR: et PN in x ducta aequalis areae APGS. Erunt, cum fit APFR= $\int dx\sqrt{\left(\frac{a}{4x}-\frac{au}{\sqrt{ax}}+uu-1\right)}$ et APGS= $\int dx\sqrt{\left(\frac{a}{4x}+\frac{au}{\sqrt{ax}}+u^2-1\right)}$, PM= z et PN= y , atque eapropter curuae MA et NA junctae in A exhibebunt curuam tautochronam.

§. 17. Ex hisce perspicuum est, quomodo data curua quacunque inueniri oporteat alteram tautochronismo producendo aptam. Nunc eos inuestigare statui casus, quibus ambae eae curuae ita, vt decet, junctae, eandem constituunt curuam conti-

tinuam; vt et aliae curuae eaeque innumerac cyclo-
idis similes habeantur, eundem effectum in horolo-
giis praestantes. Sit MAN huiusmodi curua circa
axem verticalem AP posita. Dicatur, vt ante,
AP, x , arcus AM, s et alter AN, t , oportet esse
 $s+t=2\sqrt{ax}$. Constituatur alia lecurua GAH talis,
ut ejus applicatae PG, PH sint arcubus AM, AN re-
spectiue aequales. Erit ergo $PG=s$, $PH=t$, ea-
que curuae GAH erit proprietas, ut sit $s+t=2\sqrt{ax}$.
Perspicuum est, si curua GAH fuerit data, alteram
MAN ex ea posse construi, atque si illa fuerit curua
continua, et hanc quaesitam talem fore. Huc igitur
quaestio est reducta, vt inueniatur curua GAH,
quae sit continua, eamque habeat proprietatem, vt
sit $GP+GH=2\sqrt{a}$. AP.

Fig. 6.

§. 18. Respondent ergo in curua GAH sin-
gulis abscissis AP duae applicatae GP, PN, qua-
rum altera est negatiua, si altera affirmatiua fuerit.
Talis proinde aequatio inter abscissas et applicatas
esse debet, vt litera applicatas denotans pro singulis
abscissis duos habeat valores ad conditionem quae-
stionis accommodatos. Vt haec facilius efficiam,
assumo nouam indeterminatam v , ex qua vna cum
constantibus et abscissae et applicatae determinari
debent; ita autem, ut, posita v affirmatiua, inue-
niatur punctum G; posita vero v negatiua, tunc
punctum H inueniatur. Consideremus igitur x , tan-
quam functionem ipsius v , atque s . Functio au-
tem s significans dabit t sed negatiue, quia PN ad
alteram axis AP partem cadit, si v abeat in $-v$.

§. 19. Cum abscissa AP eadem maneat pro utroque puncto G et H, oportet ut ea x ita in v determinetur, ut eadem maneat transmutato v in $-v$. Siue x debet esse functio par ipsius v : sit talis functio P, erit $x = P$. Ponatur applicata PG, $s = Q + R$, denotantibus Q functionem impari, R vero pari ipsius v . Ponatur in hac formula $Q + R$ loco v , $-v$, abibit ea in $-Q + R$; quemadmodum constat ex iis, quae de functionibus paribus et imparibus in dissertatione de trajectoriis reciprocis tradidi. Posito vero $-v$ loco v , habebitur punctum H, quare $-Q + R$ exprimet applicatam PH. Quae autem, cum in alteram partem cadere debeat, erit valor $-Q + R$ negatiuus. Absoluta ergo applicatae PH seu t magnitudo erit $Q - R$, unde habetur $t = Q - R$. At vero est $s = Q + R$, et $x = P$.

§. 20. Ex conditione problematis haec habetur proprietas, ut sit $s + t = 2\sqrt{ax}$, ut in §. 17. ostensum est. Quare cum sit $s = Q + R$, $t = Q - R$, et $x = P$, erit $2Q = 2\sqrt{aP}$ seu $QQ = aP$, hincque $P = QQ : a$. Hic inquirendum est, an hic valor ipsius P inuentus, et superior, secundum quem P debet esse functio par ipsius x inter se non repugnent? Si enim repugnarent, nihil inde ad propositum elici posset. Non autem ii inter se repugnant: nam, quia Q est functio impar, ejus quadratum erit functio par; porro diuisore a nihil ad haec faciente, perspicuum est hic P functioni pari aequale poni. Est ergo $P = QQ : a$. Ex his curua GAH inuenitur. Accipiat enim AP seu $x = QQ : a$, et PG seu $s = Q + R$,
vbi

vbi loco Q quaecunque functio impar, loco R vero quaecunque par substitui potest ipsius v . Quia $x = QQ : a$ erit $Q = \sqrt{ax}$, et idcirca $s = R + \sqrt{ax}$. Hic R potest accipi functio par ipsius Q seu \sqrt{ax} , siue duntaxat ipsius \sqrt{x} .

§. 21. Ex hisce facile elicitur curvarum nostro instituto inseruentium constructio. Circa axem verticalem AP constituatur parabola MAN , cujus parameter $= a$. Ducta ergo ordinata ad axem orthogonali MN , erit, si sit $AP = x$, $PM = \sqrt{ax}$. Infra hanc parabolam circa eundem axem describatur curva quaecunque QAS , cujus axis AQ simul est diameter. Ducantur verticales MR , NS , horizontalem per A transeuntem secantes in T et V . Erit $AT = \sqrt{ax}$, et $AV = -\sqrt{ax}$; TR autem et SV erunt aequales. Quae, cum sint ad eandem plagam sitae, erunt functio par lineae AI quae est \sqrt{ax} , quare IR exprimet functionem R . Tum nova construatur curva GAH , cujus applicata PG sit $= PM + TR$, erit altera PH ob legem continuitatis $= PN - SV$ seu $PN - TR$. Quare erit $PG = R + \sqrt{ax}$, et $PH = -R + \sqrt{ax}$. Unde sequitur curvam GAH eandem esse, quae quaeritur.

§. 22. Hoc ergo modo inveniuntur curvae infinitae, non quidem tautochronae, sed tales ex quibus tautochronae possunt construi. Sit curva AG praecedenti modo constructa, inde si alia AM construatur, ut ejus arcus AM ubique sit aequalis respondententi applicatae PG , erit haec curva tautochrona (§. 17.). Ex data vero AG , requisita AM

Fig. 8.

sequenti modo constructur. Ducatur recta in G tangens GI, occurrens axi producto in I. Centro G radio GP describatur arcus circuli PL, quem horizontalis ex I ducta secet in L. Jungatur GL, et a P in axe capiatur longitudo arbitraria PE, sed ubique eadem. Tum ex E ducatur linea ER parallela ipsi LG, secans applicatam PG in R. Per omnia hoc modo determinata puncta R transeat curua SR, quae plerumque affymtoton habeat horizontalem AO. Denique construatur curua AM talis, vt rectang. PM. PE aequale sit spatio OAPRS. Erit haec AM curua tautochrone. Est enim arcus $AM = PG$.

§. 23. Rem analytice persequor. Cum x debeat esse functio par ipsius v , insuper autem sit $Q = \sqrt{ax}$, oportet sit \sqrt{ax} functio impar ipsius v , pono $\sqrt{ax} = v$, erit $x = v^2 : a$ functio par, vt requiritur. Habemus igitur ex §. 20. hanc aequationem $s = R + v$, vbi R denotat functionem parem ipsius v . Erit itaque $ds = dR + dv$, sit $dR = Vdv$, necesse est, vt V sit functio ipsius v impar. Quare erit $ds = dv(1 + V)$, ideoque $ds^2 = dv^2(1 + 2V + VV) = dx^2 + dy^2$. Quoniam autem $x = v^2 : a$, erit $dx = 2vdv : a$, et $dx^2 = 4v^2dv^2 : a^2$. Consequenter $dy^2 = dv^2(1 + 2V + VV - 4v^2 : a^2)$ atque $dy = \frac{dv}{a} \sqrt{(a^2 + 2a^2V + a^2V^2 - 4v^2)}$. Hanc aequationem nullo modo rationalem efficere potui, substituendis loco V valoribus legitimis, vt nimirum V aequalis ponatur functioni impari ipsius v . Quamobrem nescio, an alii casus
in-

inde erui queant, quae integrationem admittunt, praeter cum, quem hic expositurus sum.

§. 24. Ponatur aV , id quod fieri potest; aequale $2v$, vt termini a^2V^2 et $4v^2$ sese destruant; erit $dy = \frac{dv}{a} V(aa + 4av)$, quae aequatio integrationem admittit quia v unius tantum est dimensionis. Integralis ejus est haec aequatio $y = \frac{C + (a + 4v)\sqrt{a + 4v}}{6\sqrt{a}}$
 $= \frac{C + (a + 4\sqrt{ax})\sqrt{a + 4\sqrt{ax}}}{6\sqrt{a}}$ ob $v = \sqrt{ax}$. Vt y evanescat, posito $x = 0$, oportet vt sit $C = -a\sqrt{a}$; erit igitur
 $y = \frac{-a\sqrt{a} + (a + 4\sqrt{ax})\sqrt{a + 4\sqrt{ax}}}{6\sqrt{a}}$ seu $6y\sqrt{a} + a\sqrt{a} = (a + 4\sqrt{ax})\sqrt{a + 4\sqrt{ax}}$. Hinc habebitur $a + 4\sqrt{ax} = (6y\sqrt{a} + a\sqrt{a})^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(36a^2yy + 12aay + a^3)}$. Quamobrem sumtis utrinque cubis erit $12aa\sqrt{ax} + 48aax + 64ax\sqrt{ax} = 36a^2yy + 12aay$ seu $12ax + (3a + 16x)\sqrt{ax} = 9yy + 3ay$. Quae penitus ad rationalitatem reducta dabit hanc aequationem ordinis quarti: $81x^4 + 54axy^3 - 216axy^2 - 256ax^3 + 9a^2yy - 72aaxy + 48a^2xx - 9a^3x = 0$.

§. 25. Habemus ergo curuam algebraicam ordinis quartis, quae perinde atque cyclois ad oscillationes omnes aequitemporaneas faciendas est idonea. Eam igitur aliquanto accuratius hic describere operae pretium erit. Sit axis AE ; habebit curua nostra hanc formam $BACD$, ejusque, dictis AP , y , ea erit aequatio, quam §. praecedente inuenimus. Tempus autem, quo oscillatio quaecunque per MAN absoluitur, aequale erit tempori oscillationis penduli ordinarii, cujus longitudo est $\frac{1}{2}a$. Notandum est, hanc curuam ab altera parte axis AE ,
in

Fig. 9.

in C habere punctum reuersionis; Punctum vero C reperitur sumendo $AE = \frac{1}{6}a$, et applicatam $EC = \frac{1}{6}a$. Porro in C curua producta ita reuertitur, vt fit arcus CD aequalis similisque arcui CAB. Quapropter si ex C ducatur verticalis CF, erit ea diameter curuae orthogonalis. Oscillationes vero in alterutra tantum parte BAC constitui debent.

§. 26. Cum igitur CF sit diameter hujus curuae, quaeramus aequationem ad hanc diametrum relatum. Sit nimirum $CQ = t$, et $QM = z$, erit $AP = x = AE - CQ = \frac{1}{6}a - t$, et $PM = y = QM - CE = z - \frac{1}{6}a$, his valoribus loco x et y in aequatione inuenta §. 24. substitutis, sequens resultabit aequatio, $81z^4 + 216atzz + 256at^3 - 18aaz = 0$, siue, quae ad hujus curuae proprietates inueniendas magis est apta, haec $t = \frac{aa - (\sqrt{36aaz - a})^2}{16a}$ seu $z = \pm(a + \sqrt{(aa - 16at)})^{\frac{2}{3}} : 6\sqrt{a}$. Unde perspicuum est z quatuor valores habere manente t , idque hoc modo, si ambo signa \pm valeant habetur punctum M; Si prius signum $-$ et alterum $+$ valeant habebitur punctum K; Si prius $+$ et posterius $-$ sumantur, punctum N; Si denique vtrumque signum $-$ locum habeat, obtinebitur punctum L.

§. 27. Ex hac aequatione perspicitur curuam hanc esse quadrabilem. Ponatur $a + \sqrt{(aa - 16at)} = p$, erit $t = \frac{2ap - pp}{16a}$ et $z = \frac{p\sqrt{a}}{6\sqrt{a}}$. Ergo $dt = \frac{dp}{8} - \frac{pdp}{8a}$. Itaque $zdt = \frac{pdp\sqrt{p}}{48\sqrt{a}} - \frac{ppdp\sqrt{p}}{48a\sqrt{a}}$. Quod integratum dabit $\int zdt = \frac{pp\sqrt{p}}{120\sqrt{a}} - \frac{p^3\sqrt{p}}{168a\sqrt{a}}$. Quae quantitas exprimit spatium inter

ter abscissam, applicatam et curvam contentum. Constat deinde ex curvae inuentione eam esse rectificabilem. Quia $z = \frac{p\sqrt{p}}{6\sqrt{a}}$ erit $dz = \frac{dp\sqrt{p}}{6\sqrt{a}}$; unde $dz^2 = \frac{p^3 dp^2}{16a}$. Est vero $dt^2 = \frac{dp^2}{6a} - \frac{p dp^2}{3-2a} + \frac{p^2 dp^2}{6+4a}$. Quare $dt^2 + dz^2 = \frac{dp^2}{6a} + \frac{p dp^2}{3-2a} + \frac{p^2 dp^2}{6+4a}$, et hinc $\sqrt{dt^2 + dz^2} = \frac{dp}{8} + \frac{p dp}{8a}$. Consequenter $\int \sqrt{dt^2 + dz^2} = \frac{2ap + pp}{16a}$. Quae expressio dat vel arcum CN vel CAM vel quoque eorum negativos CL vel CLK.

§. 28. Inuentis area et longitudine hujus curvae; residuum est id, quod maxime ad usum ejus in horologiis pertinet, ut inuestigemus radium osculi, eoque inuento curuae hujus euolutam, quo pendulum oscillationes in hac curua absoluens constitui queat. Radius osculi vero erit, posito dz constante $\frac{(dt^2 + dz^2)^{\frac{3}{2}}}{dz ddt}$, cujus valor ex superioribus inuenietur. Namque est $(dt^2 + dz^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{(a+p)^3 dp^3}{64a^2}$, atque $dz = \frac{dp\sqrt{p}}{6\sqrt{a}}$, hinc quia dz ponitur constans, erit $ddz = 0 = \frac{2p ddp + dp^2}{8\sqrt{a}p}$, unde habetur $ddp = -\frac{dp^2}{2p}$. Denique quia $dt = \frac{adp - pdp}{8a}$, erit $ddt = \frac{addp - dp^2 - pdap}{8a} = -\frac{adp^2 - pdp^2}{16ap}$. His valoribus in formula $\frac{(dt^2 + dz^2)^{\frac{3}{2}}}{dz ddt}$ substitutis, orietur radius osculi $= -\frac{(a+p)^2 \sqrt{ap}}{8aa}$, signum - indicat radium osculi et diametrum inter se diuergere.

§. 29. Cum radius osculi sit cognitus, facile erit curvae nostrae tautochronae euolutam inuenire:

Fig. 10. Sit CNB tautochrone. Maneant $CQ = t = \frac{2ap - pp}{16a}$,

$QN = z = \frac{p\sqrt{p}}{6\sqrt{a}}$. Sit radius osculi $= \frac{(a+p)^2\sqrt{ap}}{8aa}$, qui tanget in M euolutam quaesitam CM. Demittatur ex M in axem applicata MP, sintque CP = x, PM = y. Inuenientur hae coordinatae ex relatione cognita coordinatarum CQ et QN. Calculo utpote facili hic omisso habebitur $x = \frac{2ap + 5pp}{16a}$ et $y = \frac{(3aa - 3pp + 4ap)\sqrt{ap}}{24aa}$, harum aequationum ope euoluta CM per infinita puncta jam describi poterit. Si autem velimus p eliminare, ut aequatio inter x et y supersit, p ex priore aequatione inuenitur in a et x, qui valor si deinde in altera substituatur, sequens emergit aequatio: $576ayy - \frac{37632}{125}axx - \frac{32160}{625}a^2x + \frac{529}{3125}a^3 = (\frac{2304}{125}xx + \frac{8608}{625}ax + \frac{529}{3125}a^2)\sqrt{(a^2 + 80ax)}$. Quae aequatio si prorsus ad rationalitatem reducatur, erit ordinis quinti.

§. 30. Id denique silentio praetereundum non est, hanc curuam tautochronam eandem esse prorsus, quam lineae rectae verticali jungendam inuenimus (§. 12.). In eo enim solo aequationes differunt, quod ibi parameter a quadruplo sit maior quam hic. Quia igitur longitudo penduli isochroni pro nostrâ curua tautochrone est $\frac{1}{2}a$, erit si haec eadem curua cum verticali AE jungatur, longitudo penduli isochroni $\frac{1}{8}a$. Tempora ergo oscillationum in curua MAN duplo sunt maiora quam oscillationum

cillationum per PAN. Quare si in utroque lapsu graue ad N vsque perueniat ascendendo, erit $tMA + tAN = 2tPA + 2tAN$. Consequenter $tMA - tAN = 2tPA$. Differentia ergo temporum descensuum per arcus MA et NA aequatur duplo tempore descensus per verticalem AP.

CURVA TAUTOCHRONA IN
FLUIDO RESISTENTIAM FACIENTE
SECUNDUM QUADRATA CE-
LERITATUM.

Auct. Leonb. Eulero.

§. 1.

Postquam *Hugenius* primum inuenisset cycloidem esse curuam Tautochronam in vacuo et Hypothesi grauitatis vniiformis; *Newtonus* atque *Hermannus* dederunt quoque Tautochronas pro hypothese grauitatis difformiter agentis et tendentis ad punctum quodcunque fixum tanquam centrum. Posuerunt autem motum fieri in vacuo, neque vllam pati resistantiam. Quod vero ad media resistantia attinet, *Newtonus* etiam demonstrauit cycloidem esse tautochronam in medio in celeritatum ratione resistente; ad alia autem resistantia media neque ipse neque quisquam alius est progressus, vt, quae curuae in iis tautochronismum producant, ostenderent.

M. Octobr. 1729.

Tab. VII.

I 2

§. 2.

§. 2. Non quidem est difficile in medio quocunque resistente inuenire curuam, super quâ graue eodem modo descendat, quo super data curuâ in vacuo. Id, cum intellexissem eas quaesui in quacunque resistantiae hypothesei curuas, super quibus graue aequaliter descendat ac super cycloide in vacuo, quae mihi curuae tum tautochronae in mediis his resistantibus esse videbantur, eo quod corporis super iis descensus aequalis esset descensui corporis super Tautochronâ curua in vacuo. Arque hanc ipsam proprietatem eae habent curuae, quas in Actis Lips. Ao. 1726. dedi, et corpora super quaque earum in medio, ad quod ea pertinet, resistente collocata eodem descendunt modo, quo super cycloide in vacuo; quamobrem eas etiam Tautochronarum nomine appellauit.

§. 3. Rem vero hanc postea accuratius perpendens, eam ita habereprehendi; vt tota curua in medio resistente percurrenda ab initio descensus super curua in vacuo percurrenda assumpto pendeat. Quare si in curua data aliud ponatur descensus initium ipsa curua datae in medio resistente similem descensum producat alia erit. Ex quo intelligitur etiam si habeatur curua, super qua corpus in medio resistente aequalem habeat descensum, ac super cycloide in vacuo, initio descensus videlicet dato; tamen hanc nondum eam habere proprietatem, vt graue ubicunque descensum inchoauerit eodem tempore ad punctum infimum perueniat, etenim

nim descensus non cum descensu in cycloide congruet, nisi is ex dato puncto incipiatur.

§. 4. Idem attendenti uberius palam fiet, si inspiciat aequationes ibi datas, et modum, quo erutae fuerunt. Deprehendet enim in iis adhuc litteram, quae constantis speciem prae se fert; quae vero re ipsa ac initio descensus pendet. Id ergo si aliter voluerit assumere ea apparens constans alia erit et idcirco curua quasi alium parametrum acquireret, et a priori diuersa euadet. Hoc incommodum non diu post ipse animaduerti, et praeterea *Celeb. Hermannus* in dissertatione de motibus variatis Actis Anni 1727 inserta, in qua ostendit, curuas, quae ex eodem principio, quo ipse usus sum, inueniantur, quaeque tautochronae esse videantur, huiusmodi tamen non esse, tum ob rationes a me quoque perspectas hicque expositas, tum tempus descensus ipsum inuestigauit, idque constans non esse pro variis descensus initiis reperit.

§. 5. Nolo igitur, quanquam eas ipse principio in tautochronarum numero habui, aliud iudicium de iis ferri, nisi quod pro quolibet medio resistente aequatio ibi data ob constantem memoratam variabilem ponendam totam exhibeat familiam curuarum, super quibus grauia ex debito cuique puncto descensum incipientia aequali tempore ad punctum infimum perueniant, idque eodem modo, quo in vacuo super cycloide. Cum igitur cognouissem curuas has ad tautochronismum producendum non esse aptas, statim non solum ego verum

etiam alii, cum quibus communicaueram in id incubuimus, vt veras tautochronas in medio quocunque resistente inueniremus. Postquam igitur rem multis modis tentassem, potitus sum tandem tautochrona, sed in vnica tantum resistantiae hypothesei iuxta velocitatis quadrata, quam in hac dissertatione exponere constitui.

§. 6. Cum nuper nouam quandam detexissem methodum, quâ a priori non solum cycloidem, sed insuper infinitas adhuc alias inueni curuas tautochronas in vacuo, eâ quoque ad tautochronas in mediis resistantibus inueniendas vti institui; methodi vniuersalitate fretus, si quae sint tautochronae in mediis resistantibus, eas ope huius methodi inueniri debere. Quantum autem adhuc hac in re efficere potui, prorsus mihi necesse esse visum est, vt velocitas corporis super curua quacunque in eo resistanti medio, pro quo tautochrona desideratur, descendens vel ascendens in puncto quocunque possit exprimi, non quidem algebraice, sed transcendenter quomodocunque. Id vero cum non nisi in vacuo, et in medio resistantiam in ratione duplicata celeritatum faciente praestare in potestate sit, tautochronam saltem in fluidis, quia haec in ratione duplicata celeritatum resistere putantur, hic inuenire docebo.

§. 7. Volui primum problema ita instituire, vt nuper eandem quaestionem in vacuo tractaui, vt, quemadmodum ibi factum est, data curua quacunque inuenirem aliam, quae cum ea conjuncta tauto-
chro-

chronismum oscillationibus inducat. Verum istam quaestionem nondum enodare licuit, cum plane dissimilis sit ejus quae ad vacuum spectat. Nam ad rem eodem modo, quo in vacuo feci, expediendam opus est, ut in duabus curuis data et quaesita duo semper puncta dari queant, in quibus corporis oscillantis celeritates sunt aequales, atque ut eorum determinatio non ab ipsa velocitate pendeat; sed quibus in punctis una oscillatione celeritates aequales fuerunt, ibidem in aliis oscillationibus sint aequales. Id vero cum in fluido fieri nequeat, contentus hic ero eam determinasse curuam, super qua corpus descendens aequali semper tempore ad punctum infimum pertingat.

§. 8. Sit CMA curua quaesita ad axem AP Fig. 1.
 verticalem relata. Hanc ejus esse oportet proprietatem, ut corpus super ea in fluido collocata descendens aequalibus temporibus ad punctum infimum A perueniat, ubicunque descensum adorsum fuerit. Fiat is ex E , perspicuum est, corpus descendendo a vi grauitatis, quatenus ejus grauitas specifica major est illa, quam habet fluidum, continuo accelerari, simul vero propter resistentiam fluidi continuo in ratione duplicata celeritatum retardari, donec tandem in A retineat certam celeritatem, quam ponam in vacuo acquiri posse lapsu ex altitudine b . Ut corpus ex A hac celeritate rursus in E vsque ascendere possit, oportet grauitatis vim, quae ante promouebat, aduersam; resistentiae vero vim, quae ante aduersa erat, nunc secundam et promouentem po-
 ne-

nere, quo fiet, vt hic ascensus prorsus similis sit descensui. Quia magis iuuat ascensum considerare, hoc praemittere oportuit.

§. 9. Ascendere ergo ponatur corpus ex *A* velocitate altitudinis *b*, ita vt acceleretur in ratione duplicata celeritatum, perueniet id rursus ad *E*. Sit hoc corpus cylinder altitudinis *a* secundum axis directionem motus; etsi haec figura minus idonea sit ad oscillandum, tamen, quia calculus fit simplicior, facileque ad alias figuras transferri potest, hanc figuram retinere volui. Sit porro grauitas specifica corporis ad eam fluidi vt *m* ad *n*. Peruenerit corpus hoc modo ascendens ad *M*, vbi ejus celeritas sit tanta quanta ex altitudine *v* in vacuo generatur. Dicatur arcus percursus *AM*, *s*, et abscissa *AP*, *x*. Momento perueniant omnia in situm proximum corpus nempe in *m*. Erit celeritas corporis in *m* genitae ex altitudine $v + dv$ aequalis atque $Mm = ds$ et $Pp = dx$.

§. 10. Quia corpus in fluido versatur, non toto suo pondere descendere conatur, sed excessu sui ipsius ponderis super pondus aequalis voluminis fluidi. Vis ergo corpus sollicitans est ad verum ejus pondus vt *m-n* ad *m*. Si igitur vis grauitatis dicatur *g*, erit vis haec sollicitans $= (m-n)g : m$. Ascendente corpore per elementum *Mm*, si vis grauitatis ipsa *g* ageret foret $dv = -dx$, si nimirum corpus in vacuo ascenderet. Quia autem vis sollicitans est ad vim grauitatis vt *m-n* ad *m*, erit effectus illius ad hujus effectum $-dx$ vt *m-n* ad *m*. Quamobrem
agen-

agente vi hac sollicitante, erit $dv = -(m-n)dx : m$ signum hic negatiuum obtinet, quia vis grauitatis contraria ponitur motui corporis. Haec igitur haberetur aequatio $dv = -(m-n)dx : m$, ex qua motus corporis determinari deberet, nisi acceleratio, quae resistentiae fluidi aequalis est, accederet.

§. 11. Videamus nunc, quanta sit resistentia fluidi in cylindrum velocitate alt. v motum basin suam obuertentem. Vis haec aequalis est vi, quam fluidum eadem celeritate motum in cylindrum quiescentem exereret; haec vero vis aequatur ponderi cylindri fluidi altitudinis v , et basis aequalis ei, quam habet ille cylinder oscillans. Est itaque pondus ejus cylindri fluidi ad pondus hujus vt nv ad ma . Vis igitur haec resistentiae se habet ad vim grauitatis quoque vt nv ad ma . Corpore autem ascendente per Mm , si grauitas acceleraret, et secundum directionem Mm ageret, foret $dv = ds$. Vis ergo resistentiae pro ea ratione effectum edens et accelerans corpus motum, faciet vt sit $dv = n v ds : ma$; si autem retardaret, foret $dv = -n v ds : ma$.

§. 12. Si igitur sola vis grauitatis ageret retardando motum corporis, tum esset per §. 10. $dv = -(m-n)dx : m$, sin vero sola vis accelerans aequalis vi resistentiae ageret, tum esset per §. 11. $dv = n v ds : ma$. Ex quibus colligitur, si vtraque simul agat, tum esse $dv = n v ds : ma - (m-n)dx : m$, seu $madv + (m-n)adx - n v ds = 0$. Ex qua aequatione motus corporis determinari debet. Quia autem in hac aequatione v vnicam habet dimensionem, ea

integrari potest. Reducatur ad hanc formam dv
 $\frac{-n v ds}{ma} = \frac{-(m-n) dx}{m}$. Multiplicetur ea per $c^{\frac{-ns}{ma}}$; denotat
 vero c numerum, cujus logarithmus hyperbolicus
 est 1, habebitur $c^{\frac{-ns}{ma}} dv = \frac{nc}{ma} v ds = \frac{-(m-n)c}{m} dx$. Cu-
 jus integralis est sequens $c^{\frac{-ns}{ma}} v = C - \frac{(m-n)}{m} \int c^{\frac{-ns}{ma}} dx$.

§. 13. Ponatur $\frac{m-n}{m} \int c^{\frac{-ns}{ma}} dx = t$, cum ejus inte-
 grale ex curua cognita possit haberi, vel saltem con-
 strui. Ita autem, si fieri posset, integrari ponitur,
 vt ejus integrale fiat $= 0$, si ponatur $x = 0$, quo s
 determinatum valorem adipiscatur. Habemus ergo
 sequentem aequationem $c^{\frac{-ns}{ma}} v = C - t$. Constans
 haec C ita debet accipi, vt, posito $x = 0$, fiat $v = b$,
 talis enim ponitur esse celeritas corporis in puncto
 A, sed posito $x = 0$, erit et $s = 0$ et $t = 0$, vnde
 quia $c^0 = 1$, oritur $C = b$. Quamobrem inuenitur, se-
 quens ad institutum nostrum prorsus accommodata
 aequatio $v = c^{\frac{ns}{ma}} (b - t)$. Et hinc quoque intelligitur,
 vbi velocitas euanescat, seu quousque corpus in cur-
 ua sit ascensurum, ibi nimirum vbi est $v = 0$, seu
 $t = b$. Celeritas vero ipsa corporis in M erit vt \sqrt{v}
 seu vt $c^{\frac{ns}{2m^2}} \sqrt{b - t}$.

§. 14. Cum jam habeatur celeritas corporis M, erit
 tempusculum per arcum Mm, quod est vt $\frac{ds}{\sqrt{v}}$, seu
 lo-

loco v superiore valore substituto vt $\frac{ds}{c^{2ma} \sqrt{(b-t)}}$. Id

quod exprimit elementum temporis. Hujus ergo integrale ita debet esse comparatum, vt, ea adjecta constante, quae facit tempus = 0 si ponatur x vel t vel $s=0$, vt inquam, si fiat $t=b$, quo in casu integrum obtinetur tempus ascensus, tum b quae a quantitate arcus descripti pendet prorsus ex computo abeat. Hoc vt fiat jam alibi demonstraui oportere, vt tota expressio elementi temporis nullam habeat dimensionem. Quaeritur ergo qualis s functio ipsius t esse debeat? Quia ad s exprimendum b in computum ingredi non potest, sed solum t , perspicuum

est fore $\frac{ds}{c^{2ma}} = \frac{dt \sqrt{e}}{\sqrt{t}}$ et sic elementum temporis erit

$\frac{dt \sqrt{e}}{\sqrt{bt-tt}}$. Ergo longitudo penduli isochroni in vacuo est $2c$.

§. 15. Ex determinatione curuae, vt fiat tautochrone, haec orta est aequatio $ds : c^{\frac{ns}{2ma}} = dt \sqrt{e} : \sqrt{t}$ ex qua natura curuae determinari debet.

Aequatio ea integrata dat hanc $C - \frac{2ma}{n} c^{\frac{-ns}{2ma}} = 2\sqrt{et}$; vt, facto $t=0$, fiat $s=0$, necesse est, vt sit $C = \frac{2ma}{n}$; Propterea haec inuenitur aequatio pro curua quae-

sita, $\frac{ma}{n} (1 - c^{\frac{-ns}{2ma}}) = \sqrt{et}$, et sumendis quadratis haec $\frac{m^2 a^2}{n^2} (1 - c^{\frac{-ns}{2ma}})^2 = et$. Quae denuo differentiata dat

$$\frac{m^a}{n} (1 - c^{\frac{-ns}{2ma}}) c^{\frac{-ns}{2ma}} ds = edt \text{ feu } mac^{\frac{-ns}{2ma}} ds - mac^{\frac{-ns}{ma}} ds = nedt.$$

Est vero $t = \frac{m-n}{m} \int c^{\frac{-ns}{ma}} dx$, ergo $dt = \frac{m-n}{m} c^{\frac{-ns}{ma}} dx$. Quo- circa ejecto t , habebitur aequatio inter s et x , haec $mmac^{\frac{-ns}{2ma}} ds - mmac^{\frac{-ns}{ma}} ds = (m-n) nec^{\frac{-ns}{ma}} dx$. Quae mul- tiplicata per $c^{\frac{ns}{ma}}$ abit in hanc $mmac^{\frac{ns}{2ma}} ds - mmads = (m-n) nedx$.

§. 16. Aequatio differentialis inuenta est ite- rum integrabilis; integrata vero dat, $\frac{2m^3 aa}{n} c^{\frac{ns}{2ma}} - mmas - \frac{2m^3 aa}{n} = (m-n) nex$, postquam debita constans $\frac{2m^3 aa}{n}$ ablata est. Quae magis accommodatur hoc

$$\text{modo } c^{\frac{ns}{2ma}} = \frac{ns}{2ma} + 1 + \frac{(m-n) nex - m^2 aas + 2m^3 aa + (m-n) n^2 ex}{2m^3 aa}$$

Haec quidem aequatio sufficeret ad curuam constru- endam; sed commodior euadet liberata ab expo- nentialibus. Hanc ob rem sumantur logarithmi, eritque $\frac{ns}{2ma} = l(m^2 nas + 2m^3 aa + (m-n) n^2 ex) - l 2m^3 aa$.

$$\text{Hinc differentiando acquiritur } \frac{nds}{2ma} = \frac{m^2 nads + (m-n) n^2 edx}{m^2 nas + 2m^3 aa + (m-n) n^2 ex}$$

et ex hac ordinando $m^2 n^2 as ds + (m-n) n^3 ex ds = 2(m-n) m n^2 aedx$. Quae diuisa per m praebet sequen- tem aequationem finalem pro curua quaesita, $m^2 as ds + (m-n) nex ds = 2(m-n) maedx$.

§. 17. Si itaque curua AME eam habuerit pro- prietatem, vt fit $m^2 as ds + (m-n) nex ds = 2(m-n) maedx$

ea erit tautochrone hoc sensu, ut corpus cylindricum altitudinis a super ea descendens eodem semper tempore ad punctum infimum A perveniat, ubi-
 cunque descensum inceperit. Si loco cylindri placuerit globum adhibere ejusdem gravitatis specificae et diametri a , oportebit loco a in aequatione scribere $\frac{4}{3}a$, habebiturque $4m^2asds + 3(m-n)nfxds = 8(m-n)masdx$, pro motu globi, cujus diameter est a . Si longitudo penduli isochroni in vacuo oscillanti dicatur f , erit $e = \frac{1}{2}f$; et hinc resultabit aequatio $8m^2asds + 3(m-n)nfxds = 8(m-n)masdx$. Hanc aequationem jam ad quemvis casum specialem accommodare licet.

§. 18. Ponamus densitatem fluidi evanescere, quo motus corporis fiat in vacuo; erit, $n = 0$. Hoc igitur posito aequationis terminus secundus $3(m-n)nfxds$ evanescit, et tunc pro tautochrone in vacuo prodibit aequatio $8m^2asds = 8(m-n)masdx$. Quae, cum sit $n = 0$, divisa per $8m^2a$ reducitur ad $sds = fdx$. Haec vero integrata est $ss = 2fx$, aequatio ad cycloidem, cujus circuli genitoris diameter est $\frac{1}{2}f$. Id quod prorsus congruit cum iis, quae de tautochronismo cycloidis demonstrata sunt. Si ergo aequatio inuenta tautochronae in fluido ad vacuum reducitur, litera a diametrum globi oscillantis denotans exit ex aequatione; et tautochrone in vacuo proinde a magnitudine et figura corporis oscillantis non pendet. Sed in fluido ad tautochronam determinandam et magnitudine et figura et gravitate specificâ corporis oscillantis opus est.

§. 19. Curua, quam inuenimus, tautochrona inferuit descensui corporis, sed ex ea tautochrona, quae ad ascensum spectat in eodem fluido, inueniri poterit. Ponatur enim corpus in curua AME ascendere celeritate initiali, vt ante, ex altitudine b genita; habebit id et vim grauitatis, et resistantiam fluidi contrarias. Quamobrem, cum supra pro descensu haec inuenta sit aequatio, $madv + (m-n)adx - nvd s = 0$, vbi vis resistantiae, vti rem ibi considerauimus, erat accelerans; hoc in casu corporis ascendentis signum $-$ praefixum termino $nvd s$, qui vim resistantiae fluidi exponit, mutari debet in $+$. Quo facto habebitur aequatio $madv + (m-n)adx + nvd s = 0$. Ex qua ascensus ejusdem corporis, quod ante descendere positum est, determinabitur.

§. 20. Perspicuum est hanc aequationem ex superiore ad descensum spectante deriuari posse, modo in illa fiat s negatiuum. Quocirca, ad tautochronam ascensui inferuentem inueniendam non est necessarium, vt eodem, quo pro descensu, progrediar modo, sed tantum in aequatione pro tautochrona descensus inuenta loco s poni poterit $-s$. Hoc enim ea transformabitur in tautochronam ad ascensum accommodatam. Si ergo corpus ascendens fuerit globus diametri a , ejus grauitas specifica ad eam fluidi vt m ad n , habebitur pro tautochrona sequens aequatio $8m^2 as ds - 3(m-n)nbx ds = 8(m-n)mbdx$. Vbi loco f posui b , ne tempora ascensus et descensus aequalia esse debere videantur.

§. 21.

§. 21. Cum igitur curuam et descendente corpore et ascendente tautochronam inuenerim; eae si in punctis infimis jungantur, repraesentabunt tautochronam ascensui et descensui simul inferuentem. Sit AM tautochrona pro descensu, altera AN pro ascensu; manifestum est, si corpus semper in curua AM descensum incipiat, et ultra punctum in curua AN ascendat, tum oscillationes has absolutum iri atqualibus temporibus, vbicunque initia descensus in AM assumantur. Si igitur AP fuerit x et AM s , erit $8m^2asds + 3(m-n)nf x ds = 8(m-n)maf dx$, pro altera curua AN vero, si dicatur AQ = u , et AN = t , erit $8m^2atdt - 3(m-n)nbudt = 8(m-n)mabdu$. Tempus vero oscillationis vnus aequale est duabus dimidiis oscillationibus duorum pendulorum in vacuo, quorum alterius longitudo est f , alterius b , seu vni integrae oscillationi penduli cuius long. = $\frac{f+2\sqrt{fb}+b}{4}$.

§. 22. Si fuerit $f=b$, erunt duae curuae AM, AN partes ejusdem curuae continuae: Id quod ex eo intelligi potest, quod tum, si loco x ponatur u et loco s , quia in altera curua arcus fiunt negatiui, $-t$, aequatio illa ad descensum pertinens mutetur in hanc ascensui inferuentem. Curua ergo MA ab altera parte continuatur in curua AN, et tota curua MAN hanc habet proprietatem vt globus diametri a , et grauitatis specificae m super ea in fluido grauitatis specificae n constituta motum aequalibus semper temporibus oscillationis absoluat. Descensus vero fieri debent in curua MA, et ascensus in AN, nisi forte eae curuae hanc insuper habeant proprietatem,

tem, vt et, si descensus in NA et ascensus in AM fierent, oscillationes totae omnes vt ante essent tautochronae.

§. 23. Aequatio exponentialis §. 16. in eo solum differt ab ea, quam §. 21. dedimus, quod ibi fit a id quod hic est $\frac{4}{3}a$, et c , quod hic $\frac{1}{2}f$. Si ergo in ea aequatione ponatur $\frac{4}{3}a$ loco a , et $\frac{1}{2}f$ loco e , habebitur $64m^3aac^{\frac{3ns}{8ma}} - 64m^3aa - 24m^2nas = 9(m-n)n^2fx$ quae aequatio conuenit cum eâ quae descensui §. 21. inferuire inuenta est, $8m^2asds + 3(m-n)nfxds = 8(m-n)mafd$. At alteri aequationi ad ascensum pertinenti $8m^2atdt - 3(m-n)nbudt = 8(m-n)mabdu$, respondet haec $64m^3aac^{\frac{3nt}{8ma}} - 64m^3aa + 24m^2nat = 9(m-n)n^2bu$. Hae aequationes exponentiales sufficiunt ad curuas construendas, quarum coordinatae sint x et s ; atque u et t , ex quibus deinceps ipsae curuae tautochronae construi poterunt.

§. 24. Cum c fit numerus cuius logarithmus hyperbolicus est 1, erit $c^z = 1 + \frac{z}{1} + \frac{z^2}{1.2} + \frac{z^3}{1.2.3} + \frac{z^4}{1.2.3.4} etc.$ Hanc ob rationem est $c^{\frac{3ns}{8ma}}$ seu dicto $\frac{3n}{8m} = k$, $c^{\frac{k s}{a}} = 1 + \frac{ks}{a.1} + \frac{k^2 s s}{a.^2.1.2} + \frac{k^3 s^3}{a.^3.1.2.3} + \frac{k^4 s^4}{a.^4.1.2.3.4} etc.$, adeoque $64m^3 a^2 c^{\frac{k s}{a}} = 64m^3 a^2 + \frac{64m^3 aks}{1} + \frac{64m^3 k^2 s s}{1.2} + \frac{64m^3 k^3 s^3}{a.1.2.3} + \frac{64m^3 k^4 s^4}{a.^2.1.2.3.4} etc.$ Aequatio igitur superior exponentialis,

lis,

lis, quae ob $\frac{3n}{8m} = k$ et inde $3n = 8km$, mutatur in

$$64m^3 aac^{\frac{ks}{a}} - 64m^3 aa - 64km^3 as = 64 \left(1 - \frac{8}{3}k\right) k^2 m^3 fs,$$

seu in $a^2 c^{\frac{ks}{a}} - aa - kas = \left(1 - \frac{8}{3}k\right) k^2 fs$, reducetur ad sequentem ex terminorum infinito numero constantem

$$\frac{k^2 s^2}{1.2} + \frac{k^3 s^3}{a.1.2.3} + \frac{k^4 s^4}{a^2.1.2.3.4} \text{ etc} = \left(1 - \frac{8}{3}k\right) k^2 fs,$$

per kk dat $\frac{ss}{1.2} + \frac{k^3 s^3}{a.1.2.3} + \frac{k^2 s^4}{a^2.1.2.3.4} \text{ etc} = \left(1 - \frac{8}{3}k\right) fs$ simili-

ter pro ascensu erit $\frac{tt}{1.2} - \frac{kt^3}{a.1.2.3} + \frac{k^2 t^4}{a^2.1.2.3.4} \text{ etc} = \left(1 - \frac{8}{3}k\right) hu$.

§. 25. Ex his aequationibus colligitur, curvam utramque et descensus et ascensus abire in cycloides, si ka fuerit infinite paruum; est vero $k = \frac{3n}{8m}$; Ergo eae curvae erunt cycloides si $3n : 8ma$ fuerit quantitas evanescentes. Id duplici modo euenire potest; Primo si $n : m = 0$, id est, si fluidi densitas nulla sit, quo casu motus fit in vacuo. Alter est casus, si $a = \infty$ seu si globus oscillans fuerit infinite magnus ratione videlicet arcuum descriptorum s . Id ergo si acciderit, tautochrone quoque erit cyclois. Porro et id inde concluditur, quo major minorue sit fractio $3n : 8ma$ seu tantum $n : ma$ eo magis minusue tautochronas a cycloide discrepare. Ex quo, quanto magis minusue in quouis fluido datus globus secundum cycloidem oscillans a tautochronismo aberret, perspici poterit.

§. 26. Perpendam nunc, qualem tautochronae inuentae figuram habere debeant, et primum ea,

Fig. 3. quae ad descensum pertinet. Sit AMB talis curua super axe AP vt dictis abscissis AP , x , applicatae PM expriment s . Habebitur pro hac curua haec aequatio, $8m^2asds + 3(m-n)nf x ds = 8(m-n)maf dx$, vel haec $64m^3aac^{\frac{3ns}{8ma}} - 64m^3aa - 24m^2nas = 9(m-n)n^2fx$. Ex hac aequatione apparet hanc curuam nusquam habere punctum flexus contrarii, sed vniformi tractu, vt parabolam, in infinitum progredi. Curua autem inde formata, cujus arcus sunt respondentibus applicatis PM aequales, ibi habebit punctum reuerfionis vbi $ds = dx$. Hoc vero erit ibi, vbi est $8m^2as + 3(m-n)nf x = 8(m-n)maf$. Quae cum exponentiali aequatione conjuncta dat $64m^3aac^{\frac{3ns}{8ma}} - 64m^3aa = 24(m-n)mnaf$. Hinc elicitur punctum flexus contrarii esse in eo loco, vbi $s = \frac{8ma}{3n} \sqrt{\frac{8m^2a + 3(m-n)nf}{8mma}} = \frac{8ma}{3n} \sqrt{\left(1 + \frac{3(m-n)nf}{8mma}\right)}$.

§. 27. Cum sit $8m^2as + 3(m-n)nf x = 8(m-n)maf$ erit $x = \frac{8ma}{3n} - \frac{8m^2as}{3(m-n)nf}$. Sed inuentum est $s = \frac{8ma}{3n} \sqrt{\left(1 + \frac{3(m-n)nf}{8mma}\right)}$. Quamobrem punctum reuerfionis erit ad altitudinem x ab imo puncto A , estque $x = \frac{8ma}{3n} - \frac{64m^3aa}{9(m-n)n^2f} \sqrt{\left(1 + \frac{3(m-n)nf}{8mma}\right)}$. Conuertam logarithmicam in seriem, vt facilius de loco puncti reuerfionis iudicare liceat. Est vero $\sqrt{\left(1 + \frac{3(m-n)nf}{8mma}\right)} = \frac{3(m-n)nf}{8mma} - \frac{9(m-n)^2n^2ff}{2 \cdot 64m^4aa} + \frac{27(m-n)^3n^3f^3}{3 \cdot 512m^6a^3} - \frac{81(m-n)^4n^4f^4}{4 \cdot 4096m^8a^4} etc$, ergo $\frac{64m^3aa}{9(m-n)n^2f} \sqrt{\left(1 + \frac{3(m-n)nf}{8mma}\right)}$

$$l(1 + \frac{3(m-n)^2nf}{5m^2a}) = \frac{8ma}{3n} - \frac{m-nf}{2n} + \frac{3(m-n)^2bf}{3.8m^3a} - \frac{9(m-n)^3a^2}{4.64m^5aa} +$$

$$\frac{27(m-n)^4a^3}{5.512m^7a^3} \text{ etc. Consequenter habebitur } x = \frac{(m-n)f}{2m}$$

$-\frac{3(m-n)^2nf}{3.8m^3a} + \frac{9(m-n)^3n^2f^2}{4.64m^5aa} - \frac{27(m-n)^4a^3}{5.512m^7a^3} \text{ etc.}$ Quia haec series eam habet proprietatem, ut ex logarithmis notum est, ut summa eius minor sit termino primo, manifestum est quo minor sit fractio $\frac{nf}{ma}$, eo magis eam conuergere, et proinde eo esse punctum reuersionis altius situm.

§. 28. Sit pro ascensu curva AN, in qua, dicta AQ = u sit QN = t, erit $8mmatdt - 3(m-n)mbudt$ Fig. 4.

$$= 8(m-n)mbadu, \text{ seu } 64m^3aac \frac{3nt}{5ma} - 64m^3aa +$$

$$24mmnat = 9(m-n)mbu. \text{ Neque vero haec curva habet punctum flexus contrarii, sed quoque in infinitum vniformiter protenditur, non vero vt prior, quemadmodum parabola, sed fere vt hyperbola. Multo enim magis ab axe diuergit quam illa. Si ex hac tautochrone ascensui interuiens construenda sit, oportet describere curuam ad eundem axem, cuius arcus sint applicatis QN aequales. Hujus tautochronae punctum reuersionis habebitur, si capiatur } u =$$

$$\frac{(m-n)b}{-m} + \frac{3(m-n)^2nffb}{3.8m^3a} + \frac{9(m-n)^3n^2b^2}{4.64m^5aa} \text{ etc, semper ergo est al-$$

tius situm, quam in curua pro descensu, et sunt prorsus casus, vbi in infinitum excurrit, aut nullibi existit, id quod euenit si $3(m-n)nf$ est aequale vel maius quam $8mma$.

Fig. I.

§. 29. Progredior nunc ad ipsius curvae constructionem et quaero aequationem inter coordinatas orthogonales. Sit AME tautochrone descensui inseruiens. Sit AP=x PM=y et arcus AM=s. Huius curvae natura exprimitur ex §. 24. hac aequatione $8mmasds + 3(m-n)nsfds = 8(m-n)masfdx$. Ponatur ds constans, et differentietur aequatio, habebitur $8mmasds^2 + 3(m-n)nsfdxds = 8(m-n)masfdx$. Fiat ds=pdx, erit $dy = dx\sqrt{pp-1}$; verum $dds = 0 = pddx + dx dp$, quare est $ddx = -dx dp : p$. Quibus in aequatione substitutis ea abibit in $8m^2appdx + 3(m-n)nsfpdx + 8(m-n)masfdp : p = 0$. Ex qua obtinetur $dx = \frac{-8(m-n)masfdp}{8m^2ap^3 + 3(m-n)nsfp}$. Quocirca ad curvam construendam, accepta variabili tertia p, sumatur $x = 8(m-n)masf \frac{-dp}{8m^2ap^3 + 3(m-n)nsfp}$. Deinde quia $dy = dx\sqrt{pp-1}$ capiatur $y = 8(m-n)masf \frac{-dp\sqrt{pp-1}}{8m^2ap^3 + 3(m-n)nsfp}$. Atque hoc modo curva quaesita erit constructa.

§. 30. Simili modo vt curua pro ascensu construatur, hoc tantum opus est, vt in illa constructione ponatur -a loco +a. Hoc enim modo, vt ex aequationibus generalibus celeritatem corporum in medio resistente motorum exprimentibus videre licet, aequatio descensui inseruiens transmutatur in eam, quae ad ascensum pertinet. Porro radius osculi curuae in puncto M erit $= \frac{(m-n)fdy}{mc \frac{3ns}{8ma ds}}$. Vnde patet radium osculi in puncto infimo A esse $= \frac{m-n}{m}f$, Cui

Cui in eo puncto longitudo penduli aequalis accipi debet. Denique ex constructione colligere licet, qualem figuram nostra curua habeat. Sit AB tautochrona descensus, quae continua erit cum AC curua ascensus. Ultra B et C continuatur in D et E, ita ut arcus BD, ED similes et aequales sint arcui BAC. Atque hoc modo in infinitum producitur.

Fig. 5.

§. 31. Perpendamus nunc qualis corporis seu globi, ut positum est, super curua tautochrona inuenta sit motus. Consideremus oscillationem vnam, quâ globus in puncto infimo habeat velocitatem ex altitudine b acquisitam. Dicatur, ut ante, altitudo genitrix velocitatis globi in puncto quo-

cunque curuae descensus v . Erit ex §. 13. $v = c^{\frac{ns}{ma}}(b-t)$

vbi est $t = \frac{m-n}{m} \int c^{\frac{-ns}{ma}} dx$. Hic vero a altitudinem cylindri oscillantis designat, ut ergo globus introducatur ponatur $\frac{4}{3}a$ loco a , prout §. 17. factum est et erit

$v = c^{\frac{3ns}{4ma}}(b-t)$, et $t = \frac{m-n}{m} \int c^{\frac{-3ns}{4ma}} dx$. Cum his aequationibus ea quae naturam curuae exprimit est con-

jungenda, quae est haec $64m^3aac^{\frac{3ns}{5ma}} - 64n^3aa - 24m^2nas = 9(m-n)n^2fx$; seu hujus differentialis, ut

habeatur dx , $24m^2nac^{\frac{3ns}{5ma}}ds - 24m^2nads = 9(m-n)$

n^2fdx , siue $8m^2ac^{\frac{3ns}{5ma}}ds - 8m^2ads = 3(m-n)nsdx$.

§. 32. Est igitur ex posteriore aequatione

$\frac{m-n}{m} dx = \frac{8ma}{3nf} c^{\frac{3ns}{5ma}} ds - \frac{8ma}{3nf} ds$. Unde erit $\frac{m-n}{m} c^{\frac{3ns}{4ma}} dx =$

L 3

$\frac{8ma}{3nf}$

$\frac{8ma}{3nf} \cdot \frac{-3ns}{8ma} ds - \frac{8ma}{3nf} \cdot \frac{-3ns}{4ma} ds$. Quae integrata dat $t=C-$
 $\frac{64m^2aa}{9n^2f} \cdot \frac{-3ns}{8ma} + \frac{32m^2aa}{9n^2f} \cdot \frac{-3ns}{4ma}$. Constans C adjecta ita de-
 bet determinari, utposito $s=0$, fiat et $t=0$, ut
 §. 13. requirebatur, est igitur $C=\frac{32m^2aa}{9n^2f}$. Quamob-
 rem cum ea expressio euadat quadratum erit $t=$

$\frac{32m^2aa}{9n^2f} (1 - c^{\frac{-3ns}{8ma}})^2 = \frac{32m^2aa}{9n^2f} (c^{\frac{3ns}{8ma}} - 1)^2$. Sed ex aequa-
 tione exponentiali pro curua habetur $c^{\frac{3ns}{8ma}} - 1 =$
 $\frac{24m^2nas + 9(m-n)^2fx}{64m^3aa}$. Itaque erit quoque $t=$

$\frac{(8m^2as + 3(m-n)^2fx)^2}{128m^4aaf} \cdot c^{\frac{3ns}{4ma}}$. Ex his reperitur $v = c^{\frac{3ns}{4ma}} (b -$
 $\frac{32m^2aa}{9n^2f} (c^{\frac{3ns}{8ma}} - 1)^2) = bc^{\frac{3ns}{4ma}} - \frac{32m^2aa}{9n^2f} (c^{\frac{3ns}{8ma}} - 1)^2$. Vel et-
 iam hoc modo $v = bc^{\frac{3ns}{4ma}} - \frac{(8m^2as + 3(m-n)^2fx)^2}{128m^4aaf}$.

§. 33. Expressio haec celeritatis dabit locum
 in curua descensus, quo velocitatem globus habet
 maximam; etenim ea non incidit in punctum infi-
 mum. Id vero punctum erit ibi, ubi $dv=0$. Qua-
 re cum inuenta sit $v = bc^{\frac{3ns}{4ma}} - \frac{32m^2aa}{9n^2f} (c^{\frac{3ns}{8ma}} - 1)^2$, erit

$dv = \frac{3nb}{4ma} c^{\frac{3ns}{4ma}} ds - \frac{8ma}{3nf} (c^{\frac{3ns}{8ma}} - 1) c^{\frac{3ns}{8ma}} ds$. Ergo erit $dv=0$;
 si

$$\text{fi } \frac{3nh}{4ma} \cdot \frac{3ns}{8ma} = \frac{8ma}{3nf} \cdot \frac{3ns}{8ma} = \frac{8ma}{3nf}, \text{ seu fi } c^{\frac{3ns}{8ma}} = \frac{32m^2a^2}{32m^2a^2 - 9n^2bf}.$$

$$\text{Vnde deducitur } s = \frac{8ma}{3n} \frac{32m^2a^2}{32m^2a^2 - 9n^2bf} \text{ seu } s = \frac{8ma}{3n} (1 - \frac{9n^2bf}{32m^2a^2}).$$

Ex quo colligitur arcum s eo esse majorem quo factum bf majus fuerit, quam a^2 , ceteris paribus. Porro ex velocitate finali, quae est ut Vb , inuenitur totus arcus descensus faciendo $v=0$.

$$\text{Quo in casu erit } c^{\frac{3ns}{8ma}} Vb = \frac{4ma}{3n} (c^{\frac{3ns}{8ma}} - 1) V \frac{1}{f} \text{ seu } 3nc^{\frac{3ns}{8ma}} V \frac{1}{2} f = 4mac^{\frac{3ns}{8ma}} - 4ma, \text{ vnde } c^{\frac{3ns}{8ma}} = \frac{4ma}{4ma - 3nV \frac{1}{2} bf}.$$

$$\text{Totus igitur arcus descensus erit } = \frac{8ma}{3n} (1 - \frac{3nV \frac{1}{2} bf}{4ma}).$$

§. 34. Deinceps, si corpus celeritate descensu acquisita in altera parte ejusdem curuae ascendat, (inferuit enim ea pars ascensui) inuenitur totus arcus descensus $= \frac{5mz}{3n} (1 + \frac{3nV \frac{1}{2} bf}{4ma})$. Si hi logarithmi in

$$\text{series resoluantur habebitur arcus descensus } = 2V \frac{1}{2} bf + \frac{3n(\frac{1}{2}bf)^2}{2 \cdot 2ma} + \frac{9nn(\frac{1}{2}bf)^3}{3 \cdot 8m^2a^2} + \frac{27n^3(\frac{1}{2}bf)^4}{4 \cdot 32m^3a^3} \text{ etc. Simili modo}$$

$$\text{erit arcus ascensus } = 2V \frac{1}{2} bf - \frac{3n(\frac{1}{2}bf)^2}{2 \cdot 2ma} + \frac{9n^2(\frac{1}{2}bf)^3}{3 \cdot 8m^2a^2}$$

$$- \frac{27n^3(\frac{1}{2}bf)^4}{4 \cdot 32m^3a^3} \text{ etc. Ex quibus perspicuum est arcum}$$

ascensus esse minorem arcu descensus. Si $\frac{nhf}{ma}$ valde lue-

fuerit paruum, harum ferierum duos terminos initiales tantum assumere sufficit, et tum differentia inter arcum descensus et ascensus erit $\frac{3nbf}{4ma}$. Cum eorum summa sit $2\sqrt{2bf}$. Sunt ergo differentiae q, p , in ratione duplicata summarum.

§. 35. Haec est igitur tautochrone in medio, quod mobili resistit in ratione duplicata velocitatum. Pro aliis vero mediis resistentis hypothesibus, quibus resistentia alicuiusmodi celeritatis dignitati aut functioni proportionalis ponitur, hac methodo tautochronae inueniri non possunt; non quidem vitio methodi, quasi ea vniuersalis non esset, sed defectu analysis; quod in aliis hypothesibus velocitas non potest exprimi. Persuasus autem sum hanc solam resistentiae hypothesin secundum quadrata celeritatum in rerum natura locum habere. Quanquam enim ex experimentis constat, fluida aliam praeter hanc exercere resistentiam a tenacitate eorum ortam, quae velocitati proportionalis esse nonnullis visa est, tamen *Neutonus in Princip. Phil. Edit. nouissima pag. 274* potius existimat eam prorsus non a velocitate pendere, verum eam esse vniuniformem seu in ratione momentorum temporum. Qua fit ut vires viuae amissae sint, ut spatia percursa, id quod aliis rationibus ex natura huius resistentiae deductis praetermissis ex eo intelligi potest, quod mobile, si resistentiae velocitatibus essent proportionales nunquam ad quietem perueniret, quod tamen tandem accidere experimenta confirmant; si vero insuper resistentia adsit, secundum quam mobile amittit de

vi viua in ratione spatiorum descriptorum, tautochronam exhibere in promptu est; eaque facile ex inuentâ hac formari potest. Ponatur enim tantummodo in aequatione nostra tautochronae inuenta loco x haec quantitas $x+gs$, vbi litera g , ex quantitate hujus resistentiae a tenacitate vel frictione orta determinari debet. Quo facto habebitur tautochrona quaesita.

PROBLEMA ASTRONOMICUM
 INUENIENDI ALTITUDINEM POLI VNA
 CUM DECLINATIONE STELLAE EJUSDEM-
 QUE CULMINATIONE EX TRIBUS ALTI-
 TUDINIBUS STELLAE ET DUOBUS TEM-
 PORUM INTERUALLIS BREVI CAL-
 CULO SOLUTUM.

Auctore

Daniele Bernoulli Job. Fil.

Lemma. Sint tres arcus circulares contigui IP, PQ, QR, dico fore $\pm \frac{IZ - \frac{LN \times QX - LM \times RY}{LN \times PX - LM \times PY}}{IV}$ vbi IZ significat tangentem arcus IP; LN differentiam cosinum pro arcubus IP et IR; LM differentiam cosinum pro arcubus IP et IQ, QX et RY sunt sinus versi arcuum PQ et PR; et PX, PY sunt eorundem arcuum sinus; denique IV est sinus

Menf. Nov.
1729.

Tab. VIII.
Fig. 2.

Tom. IV.

M

nus

nus totus. Demonstrationem cuius sibi facile formabit via analytica, si syntheticam non obuiam habet.

Problema. Datis tribus altitudinibus stellae fixae et duobus temporum interuallis, inuenire ejusdem declinationem, eleuationem poli, punctumque temporis quo stella meridianum transit.

Fig. 2. Solutio. Sit ABCD horizon; COIA meridianus; ORQPI parallelus a stella descriptus, fueritque stella obseruata in punctis R, Q, P; ducantur RN, QM, PL ad IO perpendiculares, et ex punctis I, L, M, N, O, demittantur in horizontem verticales IE, LF, MG, NH, et OU, quae scilicet repraesentant sinus altitudinum punctorum I, P, Q, R, O, quia lineae PL, QM, RN, sunt parallelae horisonti, adeoque ab eodem aequidistantes: Denique ducantur OW, NT, MS et La parallelae ipsi CA. Sit nunc, considerando circulum ORQPI vt ipsum aequatorem, sunt enim in vtroque circulo omnia similia:

Sinus totus	-	-	-	-	= 1
tangens arcus IP	-	-	-	-	= z
sinus versus arcus horarii PQ	-	-	-	-	= a
sinus versus arcus horarii PR	-	-	-	-	= b
sinus arcus horarii PQ	-	-	-	-	= α
sinus arcus horarii PR	-	-	-	-	= β,

habebitur per praecedens lemma talis aequatio

$$\frac{+ z}{-} = \frac{LN \times a - LM \times b}{LN \times \alpha - LM \times \beta}$$
 ponantur tum in numeratore tum in denominatore loco LN et LM earundem propor-

portionales LT et LS (quae sunt differentiae sinuum inter primam et tertiam stellae altitudinem, atque inter secundam et tertiam, quasque proin ut datas vocabo, m et n) et sic habetur $\frac{+}{-} \approx \frac{a-nb}{mz-nb}$ quod est desideratum problematis ultimo loco nominatum. Cognita tangente arcus IP, innotescunt reliqui arcus lineaeque ad illos pertinentes. Hinc ponam

$$\begin{aligned} \text{IL} &= b \\ \text{LN} = \text{IN} - \text{IL} &= g \end{aligned}$$

ergo ob similitudinem triangulorum NLT et LT α , fit

$$\text{I}\alpha = \frac{mb}{g};$$

Huic si addamus αE , seu sinum tertiae stellae altitudinis, quem ponam $= f$, erit sinus maximae stellae altitudinis meridionalis, seu $\text{IE} = \frac{mb}{g} + f$, porro est $\text{IW} = \frac{2m}{g}$; ergo $\text{IE} - \text{IW} = \text{OU}$, seu sinus minimae stellae altitudinis meridionalis $\text{OU} = f + \frac{(b-z)}{g}m$: vel si dicatur $\text{UL} = l$, erit $\text{IE} = (f - \frac{lm}{g}) + \frac{m}{g}$, et $\text{OU} = (f - \frac{lm}{g}) - \frac{m}{g}$. Hinc igitur innotescit declinatio stellae et elevatio poli. Q. E. F.

Nunc vero regulam ita erutam contraham, ut eo manifestior fiat atque concinnior.

Regula. Sit sinus totus $= 1$, erit differentia sinuum primae et tertiae stellae altitudinis $= m$ erit differentia sinuum primae et secundae stellae altitudinis $= n$ sinus versus arcus horarii inter secundam et tertiam observationem $= a$, sinus ejus arcus $= \alpha$, sinus versus arcus horarii inter primam et tertiam observationem $= b$, sinus ejusdem arcus $= \beta$, erit tangens arcus horarii inter tertiam observationem

et stellae culminationem, vel $\pm z = \frac{ma-nb}{m\alpha-n\beta}$. Ponatur deinde cosinus arcus horarii inter tertiam observationem et stellae culminationem $=l$, sinus tertiae stellae altitudinis $=f$, differentia cosinuum pro arcu horario inter tertiam observationem et culminationem, et arcu horario inter primam observationem et culminationem $=g$, erit sinus majoris altitudinis meridionalis $(f - \frac{lm}{g}) + \frac{m}{g}$, et sinus minoris altitudinis meridionalis $(f - \frac{lm}{g}) - \frac{m}{g}$. Et hinc altitudo poli.

Scholium. Si tangens z fit negatiua, est etiam arcus respondens negatiue sumendus. De finibus versis obseruetur, illos (si eorum tabulae defint) haberi auferendo cosinum a sinu toto, eorumque logarithmos obtineri, sumendo duplum logarithmi sinus arcus dimidii, addendoque log. 2.

Habet istud problema hanc proprietatem, quod declinatio stellae et eleuatio poli inuerti possint, ita vt v. gr. eleuatio poli 20° . et declinatio stellae 30° . eadem producat phaenomena, atque eleuatio poli 30° . et declinatio stellae 20° . Igitur obseruator cautus sit in stabilienda eleuatione poli, stellamque seligat talem, ne facile illius declinationem cum eleuatione poli confundat.

Vtilitas problematis in eo consistit, quod sine vllis praecognitis singula determinentur facile, vt et in eo, quod refractionum incommoda sere tota auferri possint, siquidem tres obseruationes in stella institui possunt tales vt minima stellae altitudo sit aliter 80° , adeoque a refractionibus sere libera.

AD-

ADDITAMENTUM.

Quoniam in demonstrando lemmate nostro facile est in prolixos et superfluos se immittere calculos, neque demonstratio brevis et synthetica cuius statim apparet, monitus fui, ad subleuandam aliis demonstrationis operam, ut meam apponerem; id igitur faciam, postquam meminero de sequentibus propositionibus, quae in elementis Geometriae demonstrari solent.

I. Chordam arcus $A+B$ haberi multiplicando chordam arcus A , per chordam complementi ad duos rectos arcus B , ut et chordam arcus B , per chordam complementi ad duos rectos arcus A , summamque productorum diuidendo per diametrum.

II. Sinum versum alicujus arcus haberi, diuidendo quadratum chordae ejusdem arcus per diametrum.

III. Tangentem alicujus arcus, cujus chorda ponitur A pro radio R , esse $= \frac{AR\sqrt{4RR-AA}}{2RR-AA}$.

IV. Productum chordae alicujus arcus in chordam complementi ad duos rectos, esse aequale producto sinus illius arcus in diametrum.

Hicce in memoriam reuocatis, ductisque (in fig. 1.) rectis PI , PQ , PR , et QI , erit (per art. I.) ponendo vbiq; IV pro radio, $QI = [PQ\sqrt{4IV^2 - PI^2} + PIV\sqrt{4IV^2 - PQ^2}] : 2IV$, vnde habetur (per art. II.) $LM = IM - IL = [2IV^2 \cdot PQ^2 - PQ^2 \cdot PI^2 + PQ \cdot PIV(4IV^2 - PQ^2) \cdot (4IV^2 - PI^2)] : 4IV^3$. Eodem modo obtinetur quoque $LN = [2IV^2 \cdot PR^2 - PR^2 \cdot PI^2 + PR^2 \cdot PI^2 \cdot (4IV^2 - PR^2) \cdot (4IV^2 - PI^2)] : 4IV^3$, ergo erit

M 3

$\frac{LM}{LN}$

$\frac{LM}{LN} = \frac{2IV^2 PQ^2 - PQ^2 PI^2 + PQ \cdot PI \cdot \sqrt{(4IV^2 - PQ^2)} \cdot (4IV^2 - PI^2)}{2IV^2 PR^2 - PR^2 PI^2 + PR \cdot PI \cdot \sqrt{(4IV^2 - PR^2)} \cdot (4IV^2 - PI^2)}$ multipli-
centur numerator et denominator per IV posteaque
diuidantur per $2IV^2 - PI^2$ et ponatur (*vi art. III.*)
 $+ZI$ loco $[IV \cdot PI \cdot \sqrt{(4IV^2 - PI^2)}] : [2IV^2 - PI^2]$; sic-
que erit $\frac{LM}{LN} = \frac{IV \cdot PQ^2 + PQ \cdot ZI \cdot \sqrt{(4IV^2 - PQ^2)}}{IV \cdot PR^2 + PR \cdot ZI \cdot \sqrt{(4IV^2 - PR^2)}}$ est vero (*per art.*
II.) $PQ^2 = 2IV \times QX$, et $PR^2 = 2IV \cdot RY$, nec non
(*per art. IV.*) $PQV \cdot \sqrt{(4IV^2 - PQ^2)} = 2IV \times PX$ atque
 $PRV \cdot \sqrt{(4IV^2 - PR^2)} = 2IV \cdot PY$. hisce ergo valoribus in
posteriori aequatione substitutis fit. $\frac{LM}{LN} = \frac{IV \cdot QX + PX \cdot ZI}{IV \cdot RY + PY \cdot ZI}$.
vnde denique deducitur $\frac{+ZI}{IV} = \frac{LN \cdot QX - LM \cdot RY}{LN \cdot PX - LM \cdot PY}$. Q. E. D.

PROBLEMA


EX OBSERVATIS TRIBUS ALTITUDINIBUS
ALICUJUS STELLAE IMMUTABLEM HA-
BENTIS DECLINATIONEM, ET INTERUAL-
LIS TEMPORIS INTER PRIMAM ET SECUN-
DAM OBSERVATIONEM, ET INTER SECUN-
DAM ET TERTIAM, INUENIRE ALTI-
TUDINEM POLI ET DECLINA-
TIONEM STELLAE.

Auctore Jac. Hermanno.

I.

Mens. Nou.
1729.

Sint in adjecta figura ACP parallelus stellae, et
communis sectio ejus plani et plani horizon-
tis, recta HIS. Puncta A, B, et C designent
loca stellae quando ejus altitudines captae fue-
runt,



runt, demissisque ex his punctis perpendicularibus
 AE, BF, et CG, ad planum horizontis, exponent
 illae sinus altitudinum stellae obseruatarum, atque
 adeo (hyp.) datae sunt. Anguli AOB, et BOC
 quoque (hyp.) dati sunt, refert enim angulus AOB
 tempus per arcum BA, et angulus COB tempus per
 arcum CB, in gradibus aequatoris expressum, qua-
 re vocando sinum semisis anguli AOB = m , et sinum
 semisis BOC = n , ad sinum totum = r , item cosi-
 num declinationis stellae seu OQ = x , inuenietur sub-
 tensa arcus AB = $2mx$, et subtensa arcus Bc = $2nx$.
 Dicantur praeterea sinus altitudinis mediae seu
 BF

BF = a , AM = AE - BF = b , et BN = BF - CG = c ,
 et producantur chordae AB et BC vsque ad occur-
 sus H et K sectionis planorum horizontis et paralleli
 HS, et triangula similia MAB, FBH, praebebunt
 $AM(b) : AB(2mx) = BF(a) : BH(\frac{2amx}{b})$. Nec non
 triangula similia NBC et FBK, analogiam NB(c),
 $BC(2nx) : FB.(a) : BK(\frac{2anx}{c})$.

II. His omnibus jam positis, in triangulo recti-
 lineo HBK, ex data ratione laterum BH($\frac{2amx}{b}$) et
 BK($\frac{2anx}{c}$), quae est, vt cm ad bn , et angulo inter-
 cepto, HBK cuius mensura est semissis arcus AC, in-
 uenientur anguli BHK, BKH, vel BKI, et KBI po-
 sita BI normali ad HK, faciendo analogiam, cm
 $+bn : cm - bn = \text{tang. ang. } 2 \text{ rect.} - \frac{1}{4}AOC : \text{tang.}$
 $\text{anguli cuiusdam } x$. Erit enim BKH = $2 \text{ rect.} - \frac{1}{4}AOC$
 $+ x$, atque adeo datus, sit sinus ejus = p .

III. Porro in triangulo rectangulo BKI, ha-
 betur sinus tot. (1.) sinus ang. BKI (p .): $BK(\frac{2anx}{c})$,
 $BI(\frac{2anpx}{c})$. Duetaque IF, erit angulus BIF mensura
 inclinationis paralleli ACP ad horizontem, seu ele-
 uationis aequatoris cuius sinus dicatur = y . In tri-
 angulo vero BFI ad F rectangulo fit $BI \frac{2anpx}{c}$. BF.
 $(a) : \text{sin tot. (1.) sin. ang. BIF}(y)$. Adeoque ductis
 extremis et mediis habetur aequatio $2npxy = c$. Ex
 hac aequatione iudicavi antea problema indeterminatum esse ideo,
 quod nullae conditiones superes-
 sent, ad quas non respexerim, et quarum ope alte-
 rutra indeterminata exterminari possit ex inuenta
 aequa-

aequatione, sed inuestigando ex praecedentibus altitudines stellae culminantis, sententiam mutare coactus sum.

IV. Nam inuento (§. II.) angulo BKI ejus complementum angulus KBI datus est, atque adeo arcus CT, cujus semisis illius mensura est; hanc ob rem dabitur quoque arcus BCT; atqui demissa ex centro circuli normali OX in subtensam BT, ipsa BX vel XT aut ipsis aequalis OV, ductis nempe BV parallela OX, et per centrum O recta QR aequidistante ipsi BI. Itaque si in diametro alius circuli, cujus radius = r, capiatur à centro interuallum analogum ipsi OV aequale sinui semisis anguli BOT, atque in illa diametro partes analogae ipsis QV et RV dicantur r et s, quae utique datae sunt, inuenientur in schemate $QV = rx$, et $RV = sx$, adeoque $QS (= BI + QV) = \frac{2anpx + crx}{c}$, et $RS (= BI - VR) = \frac{2anpx - csx}{c}$.

Est vero ut $BI \left(\frac{2anpx}{c} \right) . BF(a) : QS \left(\frac{2anpx + crx}{c} \right) . \sin .$
 alt. stell. in $Q \left(\frac{2anp + cr}{2np} \right)$, et $BI \left(\frac{2anpx}{c} \right) . BF(a) : RS$
 $\left(\frac{2anpx - csx}{c} \right) . \sin .$ alt. stell. in $R \left(\frac{2anp - cs}{2np} \right)$. Ex quibus constat, quod altitudines meridianae stellae nostrae maxima in Q, et minima in R datae sint. Semisis vero excessus altitudinis maximae supra minimam dat elevationem aequatoris, ejusque complementum *Elevationem Poli*, et excessus maximae altitudinis stellae supra elevationem aequatoris, *Declinationem Stellae*, quae erant inuenienda.

SOLUTIO PROBLEMATIS

ASTRONOMICI EX DATIS TRIBUS STELLAE FIXAE ALTITUDINIBUS ET TEMPORUM DIFFERENTIIS INUENIRE ELEVATIONEM POLI ET DECLINATIONEM STELLAE:

Auct. Leonh. Eulero.

Tab. IX.
Fig. 1.

Lemma. In triangulo sphaerico quocunque ABC est $\cos: \text{anguli } A = \frac{\cos: BC - \cos: AB \cdot \cos: AC}{fAB \cdot fAC}$, posito radio vel sinu toto 1. Liquet hoc ex iis, quae *Clar. Professor Maier* in suis Trigonometricis tradidit.

Coroll: Ex his fluit esse $\cos: BC = \cos: AB \cdot \cos: AC + \cos: A \cdot fAB \cdot fAC$.

Theorema. In omni triangulo sphaerico ABC, est $\cos: BC = \frac{\cos: (AB + AC) - \cos: (AB - AC)}{2} + \frac{\cos: A \cdot \cos: (AB - AC) - \cos: A \cdot \cos: (AB + AC)}{2}$. Posito sinu toto 1.

Demonstratio. Factum duorum cosinum aequatur semissi cosinus summae cum semissi cosinus differentiae arcuum vel angulorum. Atque factum duorum sinuum aequale est semissi cosinus differentiae, demta semissi cosinus summae arcuum vel angulorum. Vt ex iisdem citatis vel apparebit, vel facile colligetur. Erit igitur $\cos: AB \cdot \cos: AC = \frac{\cos: (AB + AC) + \cos: (AB - AC)}{2}$, et $fAB \cdot fAC = \frac{\cos: (AB - AC) - \cos: (AB + AC)}{2}$.

His ad aequationem in lemmatis corollario accommodatis prodibit $\cos: BC = \frac{\cos: (AB + AC) + \cos: (AB - AC)}{2} + \frac{\cos: A \cdot \cos: (AB - AC) - \cos: A \cdot \cos: (AB + AC)}{2}$. Q. E. D.

PRO-

PROBLEMA.

Ditis stellae fixae in tribus locis ABC successive Fig. 2. observatae altitudinibus siue earum complementis ZA, ZB, ZC, temporibusque inter observationes praeterlapsis, vel angulis ad polum P, APB, BPC, inuenire elevationem poli seu ejus complementum PZ, et declinationem stellae seu ejus complementum AP vel BP vel CP.

Solutio. Dicantur sinus altitudinis primae vel cos. AZ, a ; Cofinus BZ, b et cos. CZ, c . Atque \sphericalangle APB, P; ejusque cofinus, p ; \sphericalangle APC, Q, ejusque cofinus, q . Sit autem \sphericalangle ZPA = Z ejusque cofinus = z . Tum compendii causa fit cos. ZPB = r et cos. ZPC = s . Ponatur porro cos. (PZ + AP) = x , et cos. (PZ - AP) = y . Habebitur in triangulo sphaerico ZPA, cos. AZ vel $a = \frac{x+y+zy-zx}{2} = \frac{(1-z)x+(1+z)y}{2}$. Deinde in triangulo ZBP est $b = \frac{x+y+ry-rx}{2} = \frac{(1-r)x+(1+r)y}{2}$. Et similiter in triangulo ZPC erit $c = \frac{(1-s)x+(1+s)y}{2}$. Ex quibus tribus aequationibus tres incognitas x , y et z determinari oportet. Aequationes I et II dabunt $y = \frac{a(1-r)-b(1-z)}{x-r}$. Secunda vero et tertia dant $y = \frac{b(1-s)-c(1-r)}{r-s}$. Vnde colligitur haec aequatio $a(1-r)(r-s) - b(1-z)(r-s) = b(1-s)(z-r) - c(1-r)(z-r)$. Quae abit in hanc, $a(1-r)(r-s) + c(1-r)(z-r) = b(1-r)(z-s)$, atque diuisa per $1-r$ dat $a(r-s) + c(z-r) = b(z-s)$. Sed ex conjunctione sinuum sequitur esse $r = pz - PZ$ et $s = qz - QZ$. Vnde habebitur $az(p-q) - aZ(P-Q)$

N 2

+ cz

$+cz(1-p)+cPZ=bz(1-q)+bQZ$. Ex qua conficitur haec $\frac{z}{z} = \frac{a(p-q)-b(1-q)+c(1-p)}{aP-aQ+bQ-cP} = \frac{a(p-q)-b(1-q)+c(1-p)}{P(a-c)-Q(a-b)}$.
 Est autem $\frac{z}{z}$ tangens anguli ZPA; dicatur ea T, fitque etiam $1-p=\pi$ et $1-q=\kappa$, denotabunt π et κ , finus versos angulorum APB, APC. Eruitur igitur haec aequatio $T = \frac{a(\kappa-\pi)-b\kappa+c\pi}{P(a-c)-Q(a-b)} = \frac{\kappa(a-b)-\pi(a-c)}{P(a-c)-Q(a-b)}$. Ex qua determinatur angulus ZPA, ex eoque reliqua. Est autem $y = \frac{a(1-r)-b(1-z)}{z-r}$ et $x = \frac{b(1+z)-a(1+r)}{z-r}$ vt ex praecedentibus apparet. Dato vero angulo ZPA, dabitur et ZPB et proinde r . Erit autem $\frac{y+x}{2} = a - \frac{z(a-b)}{z-r}$ et $\frac{y-x}{2} = \frac{a-b}{z-r}$. Hinc facile inueniuntur y et x , cosinus summae et differentiae arcuum quaesitorum, Q. E. T.

Exemplum hic appono, quod antea ex altitudine poli 54° , $43'$ assumpta computaueram, vt inuestigarem iidemne hac methodo eruantur numeri. Est altitudo prima 71° , $15'$, secunda 68° , $34'$, et tertia 63° , $54'$. Tempus inter I et II observationem seu angulus APB est 7° , $52'$. Tempus inter primam et tertiam seu ang: APC est 20° , $36'$. Erit ergo $a=9469502$, $b=9308279$, $c=8979213$. Ergo $a-c=490289$, $a-b=161223$, porro $P=1368683$ et $\pi=94107$, $Q=3518416$, $\kappa=639404$. Erit $\kappa(a-b)-\pi(a-c)=5692700$ et $P(a-c)-Q(a-b)=10380060$. Vnde inuenitur $T = \frac{5692700}{10380060} = \text{tang: } 28^{\circ}, 45'$. Est ergo angulus ZPA $= 28^{\circ}, 44'$, et ZPB $= 36^{\circ}, 37'$. Habetur itaque $\text{cos: ZPA} = z = 8767267$ et $\text{cos: ZPB} = r = 8026440$. Ergo $z-r = 0740727$. Cum vero fit $\frac{a-b}{z-r}$

$a-b=162223$, Erit $\frac{a-b}{z-r}=2176264=\frac{y-x}{2}$. Deinde est $\frac{z(a-b)}{z-r}=1907988$. Hoc ab $a=9469502$ ablato restat $\frac{y+x}{2}=7561514$. Hinc inuenitur $y=9737778$, et $x=5385250$. Est ergo summa arcuum $AP+ZP=57^{\circ}, 25'$, et differentia arcuum $AP-ZP$ vel $ZP-AP=13^{\circ}, 9'$. Ex his pro AP et ZP inueniuntur hi duo valores $35^{\circ}, 17'$ et $22^{\circ}, 8'$. Et pro eleuatione poli et declinatione stellae consequenter hi duo qui sunt illorum complementa $54^{\circ}, 43'$ atque $67^{\circ}, 52'$. Quis autem horum sit pro declinatione aut eleuatione poli ex problemate non determinatur. Id tamen certum est alterum eleuationem poli, alterum declinationem stellae praebere.

Verum etiam hinc stellae tempus culminationis cognoscitur: distat enim a tempore primae obseruationis angulo ZPA , quia PZ est arcus meridiani. Inuentus vero est ang. $ZPA=28^{\circ}, 45'$, qui ad tempus reductus dat 1 hor. $55'$, hocque tempore vel addendo vel subtrahendo a momento obseruationis primae, prout circumstantiae requirunt, inuenitur tempus culminationis, si ipse sol in obseruationibus hisce adhibeatur, inuenietur verum meridiei tempus.

PROBLEMA

SPHAERICO - ASTRONOMICUM.

*Auth. F. C. Mayero.*Tab. IX.
Fig. 3.

Datis alicujus stellae tribus altitudinibus, Aa , Bb et Cc , itemque angulis aPb , aPc et bPc ex tempore obseruatarum altitudinum cognitis, inuenire altitudinem aequatoris, PZ et complementum declinationis stellae $aP (=bP =cP)$ adeoque et altitudinem poli cum ipsa declinatione.

Sit sinus altitudinis Aa , siue cosinus arcus $aZ = a$
 - - - Bb , - - - $bZ = b$
 - - - Cc , - - - $cZ = c$

Sinus anguli $aPb = m$ ejusque cosinus $= n$
 - - $aPc = f$ - - $= g$
 - - $aPZ = x$ - - $= y$

Sinus lateris $PZ = v$ - - $= z$
 - - $aP = p$ - - $= q$

Per notam regulam habetur porro

Cosinus anguli $ZPb = \frac{ny - mx}{r}$
 - - $ZPc = \frac{gy - fx}{r}$

Cum in triangulis aPZ , bPZ et cPZ omnes anguli ad P , (per praecedentia) vna cum triangulorum lateribus notationem debitam habeant, poterunt angulorum expressiones siue notationes per regulam meam aliae formari et sic aequationes institui, vti mox sequitur.

In

In triangulo aPZ est

1 - - $y = r \frac{ra - qz}{pv}$, et inde

2 - - $rrra - rpv y = rrqz$.

In triangulo bPZ est

3 - - $\frac{ny - mx}{r} = r \frac{rb - qz}{pv}$ ex qua fit

4 - - $rrrb - pv(ny - mx) = rrvqz$.

In triangulo cPZ est

5 - - $\frac{gy - fx}{r} = r \frac{rc - qz}{pv}$ porroque

6 - - $rrrc - pv(gy - fx) = rrvqz$.

Ex aequationibus 2 et 4ta fit

7 - - $rrra - rpv y = rrb - pv(ny - mx)$, inde oritur

8 - - $\frac{r^2(a-b)}{ry + ny - mx} = pv$

Ex 2 et 6 emergit

9 - - $rrra - rpv y = rrc - pv(gy - fx)$ exinde fit

10 - - $\frac{r^2(a-c)}{ry + gy - fx} = pv$.

Ex hac et 8 fit

11 - - $\frac{a-b}{ry - ny + mx} = \frac{a-c}{ry + gy + fx}$ quae reducatur ut
randem fiat

12 - - $\frac{rx}{y} = \frac{(a-b)(r-g) - (a-c)(r-n)}{(a-b)f - (a-c)m} r$.

Hac regula tangens anguli aPZ inuenitur, quo dato dantur et anguli bPZ et cPZ . Potest autem regula breuior fieri hoc medio: formetur arcuum aZ et bZ semisumma et semidifferentia, illius sinus fit $=A$, huius sinus $=B$ ita habetur $\frac{z^{AB}}{r} = a-b$. Formetur porro semisumma et semidifferentia ex arcubus aZ cZ ponaturque illius sinus $=C$ et huius $=D$, ut sit $\frac{z^{CD}}{r} = a-c$. Ponatur tandem semitan-

gens

gens $aPc = \alpha$ et semi-tangens anguli $aPb = \beta$, ut fit
 $(r-g) = \frac{\alpha g}{r}$ et $(r-n) = \frac{\beta m}{r}$. quare

$$13 \quad - \quad - \quad \frac{rx}{y} \left\{ \begin{array}{l} \frac{-\Lambda B \alpha g - CD \beta m}{\Lambda B j - CD m} \\ \frac{-CD \beta m - \Lambda B \alpha g}{-CD m - \Lambda B j} \end{array} \right\}$$

Postquam anguli aPZ , bPZ et cPZ innotuerunt, ad inuentionem reliquorum quaesitorum tribus altitudinibus non opus est amplius, sufficiunt duae, reductum enim est problema ad aliud, quod non nisi duo triangula sibi mutuo inserta assumit ex: gr: aPZ et bPZ in quibus dantur latera aZ et bZ , atque anguli ad P , ex quibus reperiuntur reliqua.

Dedi solutionem problematis alibi, igitur ea nunc supersedeo, tantumque quod resultat afferam rententis symbolis supra assumtis; opus vero est praeterea paucis aliis, scilicet ponatur anguli aPZ cosinus $= S$, et cosinus anguli $bPZ = f$ ita habetur:

$$14 \quad - \quad - \quad qz = \frac{sb - fa}{s - f} r \quad \text{et}$$

$$15 \quad - \quad - \quad pv = \frac{a - b}{s - f} r \quad \text{inde fit}$$

$$16 \quad - \quad - \quad \frac{qz - pv}{r} = \frac{(r+s)b - (r+f)a}{s - f} = \text{cosinui summae quaesitorum.}$$

$$17 \quad - \quad - \quad \frac{qz + pv}{r} = \frac{(r-f)a - (r-s)b}{s - f} = \text{cosinui differentiae quaesitorum.}$$

Quibus datis quaesita ipsa data sunt quoque, S. E. I.

Duae hae regulae, quibus summa et differentia quaesitorum inuenitur, breues, et calculo aptae sunt; licet enim sinus versi $r - S$, $r + f$ &c. &c. in tabulis sinuum non inueniuntur, possunt tamen quam facillime formari notis regulis. Praeterea, si angulo-

rum

rum aPZ et bPZ constituentur semisumma et semidifferentia, et illius sinus dicatur M , hujus vero N , erit $S = \frac{2MN}{r}$, adeoque regulae contrahuntur hoc modo :

$$18 \quad - \quad - \quad \frac{qz - pv - (r+s)b - (r+f)a}{r} \cdot \frac{2MN}{2MN}$$

$$19 \quad - \quad - \quad \frac{qz + pv - (r-s)a - (r-s)b}{r} \cdot \frac{2MN}{2MN}$$

Habet idem problema aliam solutionem. Sicut enim in priore solutione tres primordiales aequationes (prima, tertia et quinta) in alias fuerunt reductae, quibus incognitae qz et pv exesse coactae sunt, ut solae x et y remanserint, quarum valores tum facile determinabantur: Ita vicissim in altera hac solutione aequationes primordiales eo modo tractantur, ut x et y eliminentur, solaeque pv et qz restent. Non opus est ut calculum apponam, ejus enim primordia, ut dixi, in prima solutione jam extant, reductiones autem ad qz et pv consuetis reducendi artificii peraguntur. Dabo tamen ultimas aequationes, has sc: $qz = r \frac{anf - amg + rcn - rbf}{nf - mg + rm - rf}$ vel quia $\frac{nf - mg}{r}$ sinus est anguli bPc , quem brevius $= b$ ponere licet erit $qz = r \frac{ab + cm - bf}{b + m - f}$ item $pv = \sqrt{[rr(ra - qz)^2 - 2rn(ra - qz)(rb - qz) + rr(rb - qz)^2]} : m$ vel $pv = \sqrt{[rr(ra - qz)^2 - 2rg(ra - qz)(rc - qz) + rr(rc - qz)^2]} : f$. Quibus expressionibus uti ante summa et differentia quaesitorum, at quam difficillima et prolixissima opera, inveniuntur: prior ergo solutio longe praefenda est.

Tertia Solutio.

Haec in eo consistit ut triangula sphaerica in planum projiciantur, et sic reliqua per trigonometriam planam efficiantur.

Fig. 4. Sphaera ut patet inversa jacet et polo P incumbit. PB, PC, PD, latitudinis, ZB autem et ZC, ZD altitudinum complementa sunt.

Axis sphaerae est AP, ex puncto autem A fit projectio. Ducatur itaque ex puncto A per punctum Z linea quae plano subjecto occurrat in E, ducatur praeterea PE. Haec ergo erit tangens anguli EAP (sive dimidiae altitudinis aequatoris), et AE ejusdem anguli secans est. Sit hujus anguli sinus $\equiv v$, cosinus $\equiv z$ adeoque tangens $\frac{rv}{z} \equiv \alpha$ et secans $\equiv \frac{rr}{z} \equiv \beta$.

Ducantur porro ex A per B, C et D lineae quae plano occurrant in punctis F, G, T, hae lineae omnes sunt aequales, sicuti et lineae PF, PG et PT, propter aequales arcus PB, PC, PD. Sunt autem illae secantes, hae vero tangentes angulorum FAP, GAP, TAP, qui anguli omnes aequales sunt inter se, et praeterea complemento latitudinis. Sit hujus anguli sinus $\equiv p$, cosinus $\equiv q$, adeoque tangens $\equiv \frac{rp}{q} \equiv \delta$ et secans $\equiv \frac{rr}{q} \equiv \epsilon$.

Per naturam projectionis hujus fiunt anguli EPT, TPG, GPF aequales angulis ZPD, DPC et DPB, quorum primus incognitus est, reliqui per observationem dati. Sit igitur sinus primi $\equiv x$ cosinus $\equiv y$. Sinus secundi $\equiv m$ et cosinus $\equiv n$. Sinus tertii $\equiv f$
et

et cosinus = g . Inde porro habetur cosinus anguli EPG = $\frac{ny - mx}{r}$ et cosinus anguli EPF = $\frac{gy - fx}{r}$.

In triangulis TAE, GAE et FAE anguli ad A dati sunt, subtendunt enim complementa altitudinum ZB, ZC et ZD, quibus igitur semissibus aequantur. Sit anguli TAE cosinus = a , anguli GAE cosinus = b et anguli FAE = c .

Quoniam latera ET, EG et EF, tam ad triangula in plano (EPT, EPG, EPF) quam ad triangula projectoria TAE, GAE et FAE pertinent, poterunt illa bis determinari et sic aequationes formari uti sequitur:

- 1 - - $ET = \frac{2ae\beta}{r} - \epsilon\epsilon - \beta\beta = \frac{2y\alpha\delta}{r} - aa - \delta\delta$
 - 2 - - $EG = \frac{2be\beta}{r} - \epsilon\epsilon - \beta\beta = \frac{2(ny - mx)\alpha\delta}{rr} - aa - \delta\delta$
 - 3 - - $EF = \frac{2ce\beta}{r} - \epsilon\epsilon - \beta\beta = \frac{2(gy - fx)\alpha\delta}{rr} - aa - \delta\delta$
- auferatur secunda a prima et fiet
- 4 - - $r(a - b)\epsilon\beta = (ry - ny + mx)\alpha\delta$
et tertia a prima
 - 5 - - $r(a - c)\epsilon\beta = (ry - gy + fx)\alpha\delta$
ex quarta et quinta fit
 - 6 - - $\frac{ry - ny + mx}{a - b} = \frac{ry - gy + fx}{a - c}$
- quae debite reducta reddit tandem
- 7 - - $\frac{rx}{y} = \frac{(c - b)(r - g) - (a - c)(r - n)}{(a - b)f - a - c, m}$.

Hac regula innotescit tangens anguli EPT, in simulque anguli EPG, EPF. Ponatur cosinus anguli EPT = S, cosinus autem anguli EPG fit = f ille antea fuerat = y, hic vero = $\frac{ny - mx}{r}$. Ponatur etiam cosinus anguli EPF = Q qui antea fuit = $\frac{ey - fx}{r}$.

Notandum est esse $\epsilon\epsilon - \delta\delta = \beta\beta - \alpha\alpha = rr$, q uadrum enim secantis minutum quadrato tangens relinquit quadratum radii.

In prima aequatione auferatur vtrunque $\alpha\alpha + \delta\delta$, deinde pro α , β , δ , et ϵ substituuntur valores supra assignati, vt facta reductione debita, prodeat

$$8 \quad - \quad - \quad qz = \frac{arr - spv}{r} \text{ et}$$

$$9 \quad - \quad - \quad pv = r \frac{ar - qz}{s}$$

secunda aequatio tractata vt prima dat

$$10 \quad - \quad - \quad qz = \frac{brr - fpv}{r} \text{ et}$$

$$11 \quad - \quad - \quad pv = \frac{br - qz}{s} r$$

Tertia denique aequatio reddit

$$12 \quad - \quad - \quad qz = \frac{crr - Qpv}{r}$$

$$13 \quad - \quad - \quad pv = \frac{cr - qz}{Q} r$$

ex octaua et decima fit

$$14 \quad - \quad - \quad pv = r r \frac{a-b}{s-s}$$

item ex 9 et 11. } Q. E. I.

$$15 \quad - \quad - \quad qz = \frac{sb - sa}{s-s} r$$

De hisce regulis notetur,

1. quod similes sint regulis in prima solutione inventis, licet ibi aliae ut videtur quantitates et dentur et quaerantur.

2. Quod, post inuentum angulum EPT, reliquae regulae non nisi duabus determinentur altitudinibus. Sic regulas pro pv et qz inueniendas non nisi a et b item S et s ingrediuntur, desunt c et Q . Hinc est, quod eadem regulae aliis praeterea modis possint exprimi. Si enim comparentur aequationes, 8 et 12, 9 et 13, item 10 et 12, 11 et 13, aliae prodibunt expressiones aequiuales.

NB. Similitudo harum et primo inuentarum regularum in omnibus aliis problematibus secundum has methodos solutis obtinet. Quae proprietas notatu dignissima est.

Intelligitur autem ita: Arcus in superficie sphaerica descripti ipsi sunt mensurae angulorum ad A , ab quibus subtenduntur, nam hoc casu semicirculus 90° tantum constat gradibus, uti ex elementis patet. Sic dispalescit regulas has et primas eadem esse debere necessario.

SOLUTIONES
QUORUNDAM PROBLEMATUM ASTRONO-
MICORUM.

Aut. Georg. Wolffg. Krafft.

§. I.

Mens. Dec.

1729.

Tab. X.

Trigonometria sphaerica ancillatur et subser-
uit Astronomiae, sed ita tamen subser-
uit, ut saepe officia debeant extorqueri.
Factum quidem iamdiu est, ut in singulis
Triangulis sphaericis soluendis nihil amplius require-
re possit aut necessitas aut commoditas: verum, si
non ex vnico, sed ex aliquot inter se connexis eius-
modi Triangulis pendeat quaesitum, tum plerum-
que omnia nodis ita inter se contortis laborant, ut,
si vel maxime detexeris callem, quo adiri quaesitum
possit, accuses tamen molestiam in obeunda via saepe
non exiguam. Consultitur his incommodis tri-
plici potissimum modo: *Vno*, quo, sphaericis la-
teribus et angulis vnice consideratis, in promptu sunt
artificia, quibus Sinus, Cosinus, Tangentes, sum-
mae vel differentiae arcuum, dignosci ex inspectis
Algebraicis Formulis possunt, licet mutato et dif-
fuso habitu incedant; in quo genere eximia sunt,
quae Cl. *Maierus Commentariis Anni 1727* inseruit.
Altero, quo ipsa Sphaera, pro natura Problematis,
varie dissecta, ex principiis Geometriae rationes
eruuuntur, quibus ad propositum deueniri queat;
quor-

quorum pertinet elegans Solutio Problematis cuiusdam Astronomici, à Cel. *Hermanno* huic Tomo inserta. *Tertio*, quo ex legibus Projectionum Sphaerica mutantur in plana triangula; cuius elegantissimum est exemplum Solutio *Neperiana* trianguli Sphaerici, ex datis tribus lateribus, *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptioni*, praemissa, pag. 50. Merentur hi modi, ut, ad Astronomici calculi commoda, indies magis magisque perficiantur.

§. 2. Primo quidem utilitate non caret, si ad manus sit Formula Algebraica, qua, ex datis tribus trianguli Sphaerici lateribus, angulorum aliquis definitur: cum tale triangulum per ordinariam resolutionem in duo triangula rectangula solui non possit. Obtinetur talis Formula facillime sequenti modo. Sit in triangulo ABC demissus ex vertice arcus perpendicularis in AB, atque ponantur ipsius AB sinus S. Cofinus C; AC sinus s cofinus c; CB sinus p, cofinus q; BAC sinus m, cofinus n, sinus totus = 1, quod in sequentibus ubique faciam. Erit igitur in triangulo rectangulo ACD, haec analogia 1 : Cof. A (n) = tang. AC ($\frac{s}{c}$) : tang. AD = $\frac{ns}{c}$, vnde erit sinus AD = $\frac{ns}{\sqrt{c^2 + n^2 s^2}}$; et cofinus AD = $\frac{c}{\sqrt{c^2 + n^2 s^2}}$; hinc per §. 5. *Trigonometr. Maieri Tomo II. horum Commentar.* DB Cofinus = $\frac{cc + ncs}{\sqrt{c^2 + n^2 s^2}}$. In eodem triangulo ACD erit etiam $\frac{c}{\sqrt{c^2 + n^2 s^2}}$: c = 1 : Cof. CD = $\sqrt{c^2 + n^2 s^2}$; tandem in triangulo CDB habebitur $\frac{cc + ncs}{\sqrt{c^2 + n^2 s^2}}$: q = 1 : Cof. CD;

Fig. 1.

=

$$= \frac{q\sqrt{c^2+n^2s^2}}{Cc+nSs} = \sqrt{c^2+n^2s^2},$$
 ex qua aequatione fit
 $q = Cc + nSs$, vel $n = \frac{q-Cc}{Ss}$, quae Formula eadem est cum illa, quam dedit Cl. *Maierus* §. 18. suae *Dissertat.*

Fig. II. §. 3. Sit angulus quicumque ACD, huius dimidium ACE, erit ob triangula similia ACE, ADB, $1 : AE = 2AE : AB$, hinc $AE = \sqrt{\frac{1}{2}}AB$, et vocato Cofinu BC, C, erit finus anguli dimidii $= \sqrt{\left(\frac{1-C}{2}\right)}$. Vnde posito angulo quocunque A, cuius Cofinus sit C, et ipsius $\frac{1}{2}A$ finus M, Cofinus N, erit $M = \sqrt{\left(\frac{1-C}{2}\right)}$ vel $2M^2 = 1 - C$. Eodem modo facile deducitur haec aequatio $2N^2 = 1 + C$. In praeced. §. 2. in-

Fig. I. ventus est Cofinus $A = \frac{q-Cc}{Ss}$, erit itaque $(\text{fin. } \frac{1}{2}A)^2 = \frac{Cc+Ss-q}{2Ss}$; vocetur Cof. $(AB-AC) = k$, erit $Cc+Ss = k$, per §. 5. *Differt. Maierianae*, hinc $(\text{fin. } \frac{1}{2}A)^2 = \frac{k-q}{Ss}$; porro fit finus $\frac{1}{2}(BC+AB-AC) = \alpha$, et fin. $\frac{1}{2}(BC+AC-AB) = \beta$, erit per §. 9. *Differt. cit.* $k-q = 2\alpha\beta$, hinc $(\text{fin. } \frac{1}{2}A)^2 = \frac{\alpha\beta}{Ss}$, vel $\log. \text{fin. } \frac{1}{2}A = \frac{l\alpha+l\beta-ls-ls}{2}$, quae est regula, quam pro solutione horum triangulorum dedit *A. Vlacq. in Tabb. Sinuum* cap. V. prop. 6.

Fig. III. §. 4. Transeo nunc ad Problemata Astronomica, quorum primum sit sequens: *Imuenire locum, quem Sol obtinere debet, ita ut eius motus in longitudinem sit aequalis motui Ascensionis rectae.* Ponatur in hunc finem EDA Aequator, CBA Ecliptica, H Solstitium aestivum. Deinde fit locus aliquis Solis B, et alius C, erit eo tempore motus in longitudinem BC,

BC, et ductis ex polo aequatoris P quadrantibus PD, PE, erit DE conueniens motus Ascensionis rectae; debent ergo arcus BC et DE inter se aequari. Vocatis obliquitatis Eclipticae Cosinu c , BC aut DE tangente a , AB tangente x , erit in triangulo rectangulo ABD $1 : c = x : \text{tang. AD} = cx$, vnde tangens summae $AE = \frac{a+cx}{1-ax}$ per §. 6. *Dissert. cit.* Ex eadem ratione tangens AC est $= \frac{a+x}{1-ax}$; et in triangulo CEA est rursus $1 : c = \frac{a+x}{1-ax} : \text{tang. AE} = \frac{ac+cx}{1-ax}$, vnde fit $\frac{a+cx}{1-ax} = \frac{ac+cx}{1-ax}$, qua aequatione ad eandem denominationem redacta, et diuisa per $1-c$,

fit $x = \pm \frac{\sqrt{4c+1+c^2 a^2} - 1 + c.a}{2c}$. Itaque si desideretur locus aliquis B talis, vt assumto motu in longitudinem dato, cuius tangens sit a , conueniens motus Ascensionis rectae motui priori in longitudinem sit aequalis, sumendus erit pro x valor modo inuentus. Si vero motus in longitudinem assumatur instantaneus, fiet BC arculus infinite paruus, cuius proinde tangens a euanescet; vnde formula inuenta degenerat in hanc: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{c}}$, aut vocata cotangente ipsius AB, quae erit tangens ipsius HB distantiae Solis à Solstitio, $= t$, erit $c = t^2$, vnde concluditur, quod tangens distantiae Solis à Solstitio, sit media proportionalis inter radium et cosinum obliquitatis Eclipticae; quae est eadem regula quam inuenit *Dom. Parent* ope Calculi Differentialis in *Comment. Acad. Scient. Parisinae 1704, pag. 187. Edit. Amstelod.* Itaque pro obliquitate Eclipticae hodie fere recepta $23^\circ 29'$ inuenitur $lt = 9.9812263$, cui

pro AB quatuor sequentes respondent arcus 46°
 $14' 17''$, $133^{\circ} 45' 43''$, $226^{\circ} 14' 17''$,
 $313^{\circ} 45' 43''$. Qui coincidunt cum locis
 Eclipticae sequentibus $\overset{\circ}{m} 16^{\circ} 14' 17''$, nec
 non $\overset{\circ}{m} 13^{\circ} 45' 43''$. Non vero poterunt per
 hanc regulam corrigi Tabulae Ascensionum re-
 ctarum, prout l. c. dicitur; atque absoluenda est
 Trigonometria Sphaerica ab ea labe, quod inter-
 dum palpando tantum perficiat negotia sua. Quod
 si enim occurrunt Tabulae quae inuentis his longitu-
 dinibus Solis non congruunt, illae, si iuxta regulas
 Trigonometriae Sphaericae probe sint calculatae,
 non aliter errant, nisi quod aliam obliquitatem
 Eclipticae quam $23^{\circ} 29'$ supponant, quod si vitium
 est, vitium certe est Hypotheseos Astronomicae,
 non vero methodi Trigonometricae, quae non mi-
 nus principiis Geometricis innititur quam calculus
 Algebraicus. Vt vero generalis solutio huius Pro-
 blematis per Logarithmos absolui possit, erit ex
 §. 3. vocato Cosinu dimidia obliquitatis Eclipticae
 n , $1+c=2n^2$, vnde fit $cx=\sqrt{(c+a^2n^4)-an^2}$; po-
 natur porro $c=a^2n^4+m^2$, erit $m^2=\frac{c^2}{a^2n^4}$, et habebitur
 $\sqrt{mm+1}-1=\frac{cx}{an^2}$. Sit m , quae per Logarithmos
 inueniri potest, tangens anguli cuiusdam, quem
 voco M ; erit huius anguli secans $=\sqrt{mm+1}$, ita-
 que secans $M-1=\frac{cx}{an^2}$. Sit praeterea huius anguli co-
 gniti M cosinus $=p$, erit secans $M=\frac{1}{p}$, et $1-p=\frac{p^2cx}{an^2}$;
 po-

ponatur denique sinus $\frac{1}{2}M=q$, erit $1-p=2q^2$, unde oritur $x=\frac{2an^2q^2}{cp}$ ex qua acquatione x per solos Log-mos inueniri poterit.

§. 5. *Datis duabus altitudinibus stellae cuiuslibet, una cum Azimuthis, quae illis altitudinibus conueniunt, inuenire eleuationem Aequatoris.* Sit Meridianus PZG, Aequator DEF, Horizon GEH, parallelus stellae CBA, complementa altitudinum BZ, AZ, Azimutha BZP et AZP; ponantur Sinus et Cofinus BZ s, c ; AZ S, C ; PZ x, y ; et quia BZP et AZP anguli erunt ut plurimum obtusi, sint Cofinus illius $=-m$, huius $=-n$. Ergo per §. 2. erit Cof. BP $=cy-mx$, nec non Cof. AP $=Cy-nSx$, unde ob BP $=$ AP, fit $cy-Cy=mx-nSx$, aut vero $\frac{c-C}{s-nS}=\frac{x}{y}=\text{tang. PZ}$. Quae formula ut ad Log-mos reduci possit, ponatur $s=\frac{qs}{m}$, erit $q=\frac{ms}{s}$; sit q Cofinus anguli cuiusdam, quem uoco M; hoc uero semper fieri poterit; nam ob $S:s=m:q$, et $S>s$ erit $q<m$, atque ob $m<1$, etiam $q<1$. Vocetur deinde sin. $\frac{1}{2}(AZ+BZ)=A$, et sin. $\frac{1}{2}(AZ-BZ)=a$, erit $c-C=2Aa$, hinc fit tang. PZ $=\frac{2Aa}{q-n.s}$; ponatur denique Cof. $\frac{1}{2}(AZP+M)=B$, Cof. $\frac{1}{2}(AZP-M)=b$, erit $q-n=2Bb$, quare tang. PZ $=\frac{Aa}{bBs}$.

Fig. III.

§. 6. *Datis duabus altitudinibus Solis, aut stellae cuiuscunque, una cum earum temporibus, uel distantis à meridiano, inuenire altitudinem meridianam, et eleuationem Poli.* Sint sinus et cosinus BZ s, c ; AZ S, C ; PZ x, y ; BP $=$ AP t, u ; BPZ m, n ;
 P 2 APZ

APZ p, q ; erit $c = uy + ntx$; nec non $C = uy + qtx$; fit ergo ex combinatione harum aequationum $c - ntx = C - qtx$, vnde $\frac{c - C}{n - q} = tx$; qui valor subrogatus in vtriusque praecedentium aequationum dat $uy = \frac{cn - cq}{n - q}$. Ergo erit Cof. (PB + PZ) $= uy - tx = \frac{1 + n \cdot \frac{cn - cq}{n - q} - 1 + q \cdot c}{n - q}$; et Cof. (PB - PZ) qui simul est sinus altitudinis meridianae $= uy + tx = \frac{1 - q \cdot \frac{cn - cq}{n - q} - 1 - n \cdot c}{n - q}$. Poterit ergo ex his inueniri summa et differentia arcuum incognitorum PZ et PB, quibus datis arcus ipsi non latebunt. Ex praecedentibus autem facile erit hanc operationem per logarithmos absoluere, cui-cunque placebit hoc Problema ad vsum transferre.

§. 7. Continetur sub hac generali Solutione etiam Solutio illius Problematis Astronomici, quod à *Jacobo Bernoulli* in Dissertatione aliqua Basileae 1687 habita exponitur. Nempe, *Observatur alicubi hora sexta post meridiem altitudo Solis supra Horizontem 12°; elapsa autem post momentum observationis hora una cum 12 minutis, occidit Sol; quaeritur sub qua Latitudine instituta sit observatio, et quo die?* Fiant enim, retinendo denominationes Problematis generalis, s, c , sinus et cosinus $78°$; $S = 1$, $C = 0$; $m = 1$, $n = 0$; p sinus $108°$, q cosinus $108°$, hinc pro q scribendum $-q$; quibus substitutis fit Cof. (PB + PZ) $= -\frac{1 - q \cdot c}{q}$, quod indicat summam hanc facere angulum obtusum. Cof. (PB - PZ) $= \frac{1 + q \cdot c}{q}$. Ponatur sinus $\frac{1}{2}ZPA = \alpha$, cosinus $= \beta$, erit $1 - q = 2\beta^2$, $1 + q = 2\alpha^2$, hinc existit Cof. (PB + PZ) $=$

Fig. V.

$= -\frac{2\beta^2 c}{q}$, $\text{Cof.}(PB-PZ) = \frac{2\alpha^2 e}{q}$. Itaque Problema per solos Log. mos facile resoluetur.

Fig. VI

§. 8. Sequenti Problemati soluendo inferuiet hoc Lemma: Sit Semicirculus AGJK, atque in eo duo anguli, maior ADI, minor ADG; illius sint Sinus rectus CI, Cofinus CD, sinus versus AC; huius autem sinus rectus BG, Cofinus BD, sinus versus AB. Differentiae horum duorum angulorum sinus rectus erit FI, sinus versus FG. Ob similia triangula GBD, ECD, habebitur $BD:DG(1) = CD:DE = \frac{CD}{ED}$, hinc $GE = 1 - DE = \frac{BD - CD}{BD} = \frac{BC}{ED}$. Erit etiam in Triangulo FEI sinus E(BD):FI = sinus FIE(GB):FE = $\frac{FI \times GB}{BD}$, unde erit sinus versus differentiae $GF = GE - FE = \frac{BC - FI \times GB}{DE}$.

§. 9. Problema ipsum vero hoc est: *Datis tribus altitudinibus stellae cuiuscunque, una cum differentiis temporum inter obseruationem primam et secundam, secundam et tertiam, inuenire Eleuationem Poli, et Declinationem stellae.* Sit Meridiani planum RAO, Horizontis RST, Paralleli in quo stellae mouetur AHO, erunt datarum altitudinem sinus FK, GL, HM, et differentiae temporum datae, anguli FEG, GEH; sinus altitudinis meridianae AI. Ponantur itaque $AI = x$, $FK = a$, $GL = b$, $HM = c$; anguli FEG sinus rectus = g versus = l ; anguli FEH sinus rectus = k , versus = n ; praeterea sint sinus versi $\angle EAF = u$, $\angle AEG = y$, $\angle AEH = z$. Ex solutione Problematum §. 6. elicitur $x = \frac{ay - lu}{y - u}$; nec non $x = \frac{bx - cy}{z - y}$,

Fig. VII.

aut etiam $x = \frac{az - cu}{z - u}$. Ex his aequationibus deducitur (A)
 $y = \frac{a - b \cdot z + b - c \cdot u}{a - c}$. Per Lemma praemissum habebitur
 $l = \frac{y - u - g\sqrt{2u - uu}}{1 - u}$, et $n = \frac{z - u - k\sqrt{2u - uu}}{1 - u}$; ex illa fit
 $y = g\sqrt{2u - uu} - ul + l + u$, ex hac vero $z = k\sqrt{2u - uu} + u + n - nu$,
 qui valor substitutus in aequatione (A) efficit $y = \frac{a - b \cdot (k\sqrt{2u - uu} + n - nu)}{a - c} + u$; aequentur itaque
 hi duo valores inuenti ipsius y , fiet exinde $\frac{\sqrt{2u - uu}}{1 - u} =$
 $\frac{a - b \cdot n - a - c \cdot l}{a - c \cdot g - a - b \cdot k}$. Est vero quantitas prior tangens anguli
 AEF; hinc tangens AEF huic valori dato aequatur. Hoc igitur pacto cognitus erit
 angulus AEF, et huius ope reliqui AEG, AEH, ergo dabuntur u, y, z , et harum
 auxilio sinus altitudinis meridianae x . Reducetur vero etiam Problema
 hoc ad §. 6. quo traditur modus inueniendi altitudinem Poli ex datis duabus
 altitudinibus et earum temporibus; quare per illud reliquum huius poterit
 solui. Ex praecedentibus vero Operatio Logarithmica haud difficulter adornabitur.

CLASSIS SECUNDA,

CONTINENS

PHYSICA.

CLASSICAL STUDIES

LIBRARY

HARVARD UNIVERSITY



DE
LUCE BOREALI

AUTORE
F. C. Mayero.

I.

Anno 1726 mense Octobri obtuli Academiae obseruationes meas de luce boreali, vna cum explicatione phaenomenorum huius lucis. Ab eo tempore non tantum noua obseruauim phaenomena, sed et nouas theoriae meae feci accessiones. Par est vt haec quoque Academiae sistam eiusque iudicio exponam.

Mense Oct.
1728.
Tab. XI,

2. Apparuit nuper, sc. post mediam noctem quae diem 16 Sept. huius anni antecessit, lux pulcherrima: haec vnica comprehendit omnia ista phaenomena noua quae seorsim ante annotaui. Hanc igitur quia instar est omnium solam recensibo.

3. Aër tum fuit desoecatissimus atque tranquillus adeo vt Neneae fluii superficies stellarum imagines incorrupta fere forma reflecteret, quod

Tom. IV.

Q

ante

ante nunquam vidi. Animaduerti tamen summa adhibita attentione aërem ex Sud-Ost quam lenissime fluentem.

4. Ab initio arcus aderat lucidus, fatis bene terminatus, 30° circiter altus: Vertex ejus boream exacte non tenebat, declinabat enim ad occidentem sensibilibiter valde: Margo interior niger aut fuscus non erat sicut alias, sed aequè ac reliqua lucidus: crura horizontem non attingebant, desinebant in vapores obscuros, qui horizontem 10° fere gradus alti cingebant: Interius spacium, chasma dictum aut vorago, nigerrimum non erat uti alioquin, sed pallida luce diluebatur: Trabes siue virgae intra voraginem nullo ordine visae sunt oriri, quae ab initio ultra arcum non extendebantur:

5. Posthaec trabes ultra arcum profilire ceperunt, ortum in voragine ut ante habentes: oriebatur intra voraginem arculus non diu duraturus in quo trabium radices terminabantur: Motus trabium mirus erat, quae enim in occidentali arcus parte extabant, versus occidentem ferebantur, ad orientem ferebantur quae in orientali arcus parte sitae erant; boreales autem trabes stabant immobiles; Ex hoc phaenomeno intellexi lucem moueri ex Nord-West versus verticem meum, id quod et sequentibus phaenomenis confirmatum est.

6. Arcus quo subinde altior eo quoque deformis magis euadebat: Motus hic ascendens ab initio lentus, postea subinde celerior fiebat: Altitudinem 40 graduum (mea leui aestimatione) postquam

fu-

superavit, in partes abire, hoc est in nubeculas lucidas albore viam lacteam imitantes diuidi coepit: Hae nubeculae mouebantur versus verticem, euanescebant mox, moxque redibant sed non exacte sub priore forma et loco: (agitabantur enim nimis). Tota tandem hemisphaerii nostri pars borealis eiusmodi nubeculis confita videbatur: Ex paruis virgis sine trabibus compositae erant interdum: Interdum maiores trabes traiciebant tres pluresue nubeculas, trarium vero partes in nubecularum interstitia cadentes non poterant videri, vt hoc pacto trabes ruptae siue non continuae fuerint.

7. Trabes quo erant occidentaliores eo obliquius horizonti insistebant, atque hoc pacto non ad verticem tendebant, sed ad aliud punctum quod a vertice versus occasum aliquot gradibus distitit: Hoc punctum, quod verticem vicarium vocare lubet, ab ipsis trabibus eleganter notabatur; cœeuntes enim ibi interdum figuram formabant similimam nimbis queis Deorum aut Sanctorum capita ornare solent:

8. Haerebat aliquantisper circa horizontem in occasu nubecula subfusca et fumida, postea sensim ad verticem ascendebat, motu subinde celeriori quo se propior fiebat vertici: Quo propior fiebat eo ruborem acquirebat saturiorem, donec tandem vertici proxima exquisitissime rutilaret: Trabes eam traicientes rubro tingebat colore: euanescebat mox, et mox redibat: Tandem vero verticem praetergressa penitus euanuit.

9. Hae sunt *obseruationes nouae* quas enarrare pollicitus sum. *Primum* quod ex illis deduco, monitum est, obseruationum, quas Anno 1726 dedi, nonnullas corrigi debere, sunt enim ibi phaenomena allegata, de quibus dixi ea *constanter* sic se habere, cum dicere debuisssem *quam plurimum* sic se habere: Ex. gr. §. 4. nro. 12 dixi, *omnes virgae rectae ad verticem tendunt*: (id tum aliter non obseruaui) nunc dicendum est, *vt plurimum* ad verticem tendunt, interdum vero ad verticem vicarium. (§. 7.) Dixi; l. c. nro. 3. *altissima arcus pars boream ad sensum semper exacte tenet*. Debebam dicere *vt plurimum*. Nro. 9. dixi: *chasma semper est tenebricosum*, nunc dico, *vt plurimum*. Hae sunt fere correctiones omnes quas primae meae obseruationes postulant.

10. *Altera conclusio* haec est: Suprema aëris superficies a centro terrae non vbique aequaliter distat, sed mox hic intumescit mox alibi subsidet. Sequitur id ex theoria mea de luce boreali, statuo enim trabes esse lucem reflexam a superiori quadam superficie lucidis nubeculis imminente. (vide I. Tom. Comment. pag. 356, 361, 362.). Cogitetur planum aliquod transiens per oculum spectatoris, per trabem et per punctum radians, planum hoc fecabit superficiem reflectentem ad angulos rectos. (id ex opticis constat) Si superficies reflectens a centro terrae aequaliter vbique distat, plana eiusmodi, quotquot finguntur, omnes per verticem transeunt
spe-

ſpectatoris, propter regulam ante allegatam: Si vero ſuperficies reflectens aequaliter a centro terrae non diſtat, neceſſe eſt etiam ob regulam allegatam vt plana talia non amplius in vertice ſed alibi cœant, nimirum in vertice vicario: ibi nimirum vbi trabes cœunt; exiſtunt enim trabes in hiſce planis. (nolo haec ſcrupuloſius demonſtrare ne nimius ſim). Inuerto igitur poſtერიorem propoſitionem et dico, quia vertex vicarius obſervatus eſt (§. 7.) igitur ſuprema reflectens ſuperficies, et proinde aëris quoque extrema ſuperficies a centro terrae, aequaliter non diſtant vbiſque et ſemper.

11. Eadem vero poſitio aliunde conſtat quoque: Certum eſt, quod ſi aër non niſi gravitatis actione ad terram cogeretur, ſuperficies eius extrema a centro terrae ſemper et vbiſque diſtaret aequaliter. Atque hunc caſum ſolum conſideravi in primo meo de luce boreali ſcripto: (vid. l. c. pag. 358.). At nullum eſt dubium quin aër noſter, praeter gravitatem, Solis etiam, Lunae, Martis et Veneris attractiones ſentiat: Solis et Lunae actiones aquarum in oceano ſuperficiem hic attollunt deprimunt alibi, quidni ergo et aër, qui aqua longe fluidior eſt, eodem modo deprimeretur et attolleretur?

12. Aëre ſic conſtituto, Aſtronomos moneo, vt de *refractionibus azimuthalibus* poſthac magis ſint ſolliciti, nullas enim plerique agnoſcunt; nullae quidem darentur ſi ſuperficies aëris ſemper a centro terrae aequaliter diſtaret, aut ſi non niſi in vertice obſervatoris intumeſceret ſubſideretue, ſed

rem multo aliter se habere ex duobus praecedentibus articulis aperte constat. Suspicio aequae magnas posse interdum esse, refractiones azimutales, ac sunt altitudinum refractiones: De altitudinum refractionibus iudico versus *diuersas plagas* etiam diuersas esse posse eodem tempore, ob aëris superficiem versus diuersas plagas diuerse a centro terrae remotam. Paucis haec et obiter tangere volui.

13. *Tertium* quod adductae obseruationes praestant, est, quod theoriam meam de luce boreali firmiter stabiliant. Dixi in meo primo scripto duas lucis borealis species esse, easque reipsa non differre, sed solo nubecularum lucidarum situ effici duplicem apparentiam, et quomodo efficiatur, explicari ibidem §. 19. iam si quis attendat ad phaenomena in §. 6. huius scripti recensita, aperte videbit, quod vna species in alteram transuerit, solo motu materiae lucidae, quo ad verticem tendebat, quod quidem explicationi ad amissum congruit. Porro, trabes non nisi lucem reflexam esse aperte constat ex eodem articulo, in quo sub finem trabes allegantur in frustra sectae. Qui enim hoc modo discerni posset ignis actu existens? Caeterum per haec obseruationes confirmatur quod in primo scripto de vento notavi, nempe superioris et inferioris regionum ventos, in contrarias spirare plagas, conferantur §. 3. et §. 5.

14. *Quarta conclusio* est, quod interdum duo lucidae materiae strata existant, quorum vnum alteri imminet, ita vt nubeculae lucidae superioris
stra-

strati reflectant lucem inferioris strati sub forma trabium. Sic in praesenti casu lux quae in chasmate fuit, infra eam stetit, ex qua arcus componebatur, arcus enim reflectebat trabes in chasmate ortas v. §. 4. et 5. Nubeculae item lucidae §. 6. allegatae et paruas et magnas reflectebant trabes; imo et nubecula rubra §. 8. idem praestitit.

15. Quid *rubra nubecula* §. 8. allegata sit, dicere non possum. Aquea solummodo certe non fuit, admixta debuit esse materia vere non apparenter, rubicunda. Testis simul est varias in aëre vagari materias quas non facile adesse suspicamur. Mihi hanc solam videre contigit; ab aliis tamen habeo saepius tales apparere nubes, tum temporis quum lux borealis existit.

16. Articulo 37mo scripti mei primi regulam dedi qua *materiae lucidae altitudo* computari potest. Manifestum autem est eam supponere aëris superficiem a centro terrae aequidistantem, quem quidem casum solum in isto scripto consideravi; Igitur inutilis semper est regula quoties trabes ab horizonte normaliter non ascendunt, nec ad verticem tendunt. Crebro tamen casus hic obtinet, et tum reguli prodesse potest; ostendam itaque paucis, quomodo eam inuenerim.

Problema.

17. Datis per observationes altitudine lucis borealis maxima, eiusdem amplitudine horizontali, et latitudine loci quo spectator est, inuenire materiae lucidae distantiam a terra.

Ex-

Explicatio Figurae I.

Fig. 1. *Circulus interior GLS globum terrae, simulque meridianum spectatoris S refert.*

Circulus exterior EIK superficiem atmosphaerae eam designat in qua materia lucida suspensa haeret.

Linea PCL est axis mundi, qui normaliter transit per centrum plani circuli paralleli FEDKF, cuius diameter est EK. In hoc parallelo materia lucida existere concipitur.

Linea MR est linea meridionalis in plano horizontali ducta, quod planum horizontale semidiametro terrae SC normaliter incumbere et indefinite extendi concipiendum est.

Linea FD est locus ubi planum horizontis et planum circuli paralleli se interfecant. Pars ergo huius circuli FED supra horizontem eleuata arcum lucis borealis format.

Triangulum SFD in plano horizontis descriptum est; duo eius crura SF et SD sunt aequalia, angulus ad S metitur amplitudinem crurum lucis borealis. F et D sunt loca ubi crura arcus borealis horizonti insistant.

In triangulo ESN angulus ad S est altitudo maxima arcus borealis; angulus vero ad N est altitudo aëtoris, ergo angulus ad E datus est quoque.

Lineae EC, FC, DC sunt aequales omnes, sunt enim semidiametri atmosphaerae.

Hisce

Hisce explicatis, quantitibus calculum constituentibus notas tribuere oportet; sit ergo

Sinus totus = r

Latitudinis loci cosinus = q

Altitudinis arcus ESN sinus = m

Dimidiae amplitudinis (FSN = DSN) cosinus = g

Anguli SEN sinus = b

Semidiameter terrae SC = a

Semidiameter atmosphaerae CD = x .

Distancia spectatoris S ab vertice arcus E = y .

In triangulo CSE est latus ES = y , EC = x , SC = a , et cosinus anguli ad S est = m (ob rectum angulum CSN accedentem ad ESN) habetur ergo per triangulorum naturam.

1 - - $m = r \frac{aa + yy - xx}{2ay}$
ex qua fit

2 - - $xx = \frac{raa + ryy + 2amy}{r}$

In triangulo SEN est SE = y , sinus anguli ad E est = b sinus anguli ad S est = m , et sinus anguli ad N est = q , habetur inde

3 - - $q : y = b : SN = \frac{by}{q}$

In triangulo rectangulo SNF siue SND habetur SN = $\frac{by}{q}$, anguli ad S cosinus = g , sit ergo

4 - - $g : \frac{by}{q} = r : SF = \frac{rby}{gq}$

In triangulo rectangulo FSC habetur SF = $\frac{rby}{gq}$, SC = a , et FC = x , inde per pythagoricum prouenit.

5 - - $xx = \frac{rrbbyy + gggqqa}{ggqg}$

Ex hac quinta et praecedente secunda fit

$$6 - - r a a g g q q + r g g q q y y + 2 a m g g q q y = r r r b b y y \\ + r g g q q a a$$

$$7 - - r g g q q y y + 2 a m g g q q y = r r r b b y y$$

$$8 - - r g g q q y - r r r b b y = - 2 a m g g q q$$

$$9 - - y = \frac{-2 a m g g q q}{r(g g q q - r r b b)} = \frac{2 a m g g q q}{r(r r b b - g g q q)}. \quad \text{Q. E. I.}$$

18. Nullas idoneas hactenus licuit obseruationes instituere, quibus regulam illustrarem, igitur futuro tempore nos committamus. Restat ut moneam, duo esse *errata* in §. 37. scripti mei prioris de luce boreali; (v. Tom. I. Comment. pag. 365.) Dixi *q* esse sinum eleuationis poli; *cosinum* debueram dicere. Deinde *g* posui = sinui dimidiae amplitudinis, cum *g* potius *cosinum* notet.

DE SINIBUS CEREBRI

AUCTORE

Jo. Georg. Du vernoi.

§. 1.

Mense Dec.
1728.
Tab. XII.



Operam toties perdidit, in Sinuum cerebri qui anteriores *Galeno* lib. 8. de usu partium, Aliis superiores, item laterales vocantur, ex aliorum descriptionibus figurisue addiscenda natura; At nedum eorundem faciem structuramue integram unquam satis, ut op-

tarem, intelligere valui, quia in praefatis descriptionibus iconibusue, vnica solummodo sinuum facies in conspectum venire, altera in totum deficere visa est. *Julius Caesar Arantius Bononiensis* id primum animaduertisse videtur cap. I. et III. Obseruat. Anatom. his verbis: *Praeter iam perspectos in cerebri substantia sinus, quos ventriculos appellare consueuimus, duos insignes alios sinus, aut cavitates in penitioribus cerebri partibus reconditas, atque alte delitescentes reperio, qui a superiorum sinuum, aut ventriculorum magnitudine non admodum, recedunt, membranaeque cerebri quadam solidiore substantia, velut priores, circumscribuntur. Resident hi sub duobus illis ventriculis anterioribus, atque hinc inde, quasi in subiecto nauigii alicuius abdito cubiculo, latent, ad anterioraque, versus frontem protenduntur, tertioque, vel communi sinui vt dicemus, quemadmodum et duo superiores, continui euadunt, atque in illum velut cerebri centrum concurrunt.*

Horum ventriculorum basi, quae intro ad medium respicit, candida insurgens supereminet, et quasi adnascitur substantia, quae ab inferiori superficie, velut additamentum extollitur, psaloidique corpori, seu testudini est continua, ac per longitudinem in anteriora, versus frontem protenditur, inaequalique, ac flexuosa figura praedita est, quae Hippocampi, hoc est marini equuli effigiem refert, vel potius bombicini vermis candidi, spinalis medullae initium hinc inde amplexantis, formam indicant, de cuius usu alibi dicemus: huius particula caput referens tertio vocato ventriculo proxima est, reflexum vero corpus in caudam abiens ad anteriora pro-

tenditur; quocirca ad superiorum differentiam *Hippocampi*, vel *Bombycini* vermis ventriculos appellare libuit.

§. II. Quoniam hac in descriptione nouorum ventriculorum seu sinuum mentio facta est, dudum laboraui, vt verum sensum Auctoris caperem, quidnam per duos insignes alios sinus intelligat. Equidem, vulgaris opinio est, Sinus illico apparere resectis sensim ac sensim particulis cerebri incumbentibus, donec spatium appareat in quo corpus striatum, medulla oblongata et plexus choroideus continentur. Id vero, vti recte annotat *Arantius*, idaeam sinuum imperfectam et mutilam suppeditat. Namque reuera praeter modo indicatum spatium, alia dantur spatia, quae in profundum demersa ac minus oculis obuia sunt: Quare haud improbabile est, ea fere haecenus neglecta fuisse: Nam si *sinum bombycinum* oculi vidissent, miror quomodo res notatu dignissima praefato sinui inclusa, quae ab *Arantio* detecta et titulo *Hippocampi* vel *Bombycini* vermis descripta est, vsque adeo obscure exposita sit. Non solum eius figuram nullam adhuc videre potui; Verum etiam, de eiusdem structura et vera sede vix quicquam effatu dignum apud Auctores reperio, quinque mole sua quae pollicem aequat, tum etiam structurae elegantia valde conspicua pars existat ac denique psallogidi corpori continuata sit, perspicuum est, nullam aut mediocrem notionem eius fuisse post *Arantii* tempora, nisi sub titulo vago crurum aut brachiorum *Fornicis*.

§. III. His motus rationibus, sequentem *Hippocampi* descriptionem, adiecta simul figura, exhibere

bere operae pretium visum est. Vt is in conspectum veniat, primo sinus vulgo notus aperiendus est, qui inter duos apices hemisphaerii AA. in eisdem latere interno falcem respiciente superficietenus excavatus est, quemque tota massa corticalis medullarisque undiquaque superius inferiusque usque ad rimam sinus, vel usque ad concursum seu conjunctionem utriusque hemisphaerii ambit. Huius rimae limbo BBB. tertius paries horizontalis titulo septi seu speculi lucidi, vel si mauis, tympani appositus est; estque tenuissima lamina medullaris, duos fere digitos lata, ante utrumque sinum affixa. Tametsi ut simplex diaphragma cum Galeno a multis consideretur, quia ambae praefatae laminae sese proxime tangunt ac momento fere disiliunt, revera tamen duplex, ac hiatu intermedio in quo aquam vidimus, distinctus ac diuisus paries est. Utriusque laminae substantia tenuissima est ac diaphana, immisso in alterutrum sinum aëre, instar veli aut vesicae sese expandens ac tumorem efficiens, sicuti in cerebris admodum idoneis diu contemplari proclive fuit. An via in tertium ventriculum, ea non obstante lamina, pateat nec ne, id internofcere haud potui; Verum rem obseruavi aliam haud in curiosam, scilicet interior superficies praefatae laminae, perexiguas ac visum pene effugientibus granulis aut papillulis ex asperata visa est.

§. IV. Jam remota ea lamina, pars magna sinus vulgo noti, id est spatium *ab*, helicem auriculae humanae aemulans, in quo corpus

striatum, pars medullae oblongatae et plexus choroideus continentur, apparet. Sed ab huius, ceu satis obviae cavitatis descriptione consulto abstinemus ac versus duo alia spatia insignia oculos conuertimus. Ac primo, vbi Fornix sinusque praecedens terminari videntur, lit. *b*, ductum geminum obserua in diuersas plagas haemisphaerii tendentem, quorum alter *c* lobum auriculae simulans, in posteriori apice haemisphaerii recta excurrit, eaque cavitatis est, quam *Thomas Bartholinus* in *Anatome* quintum renouata pag. 491. digitali similem obseruat. In hac cavitatis nullae conspicuae sunt protuberantiae. Alter ductus, ad ventriculum nouum seu bombycinum ducit, ac veluti cavitatem conchae simulat. Is, statim a principio *d* curuus et arcui similis, super inferiorem hemisphaerii limbum, circa basin medullae oblongatae, finem semisphaericum describit, qui ex angusto sensim latior ampliorque factus, postquam ad latus internum medullae oblongatae peruenit, in saccum oualem reliqua sinus cavitatis triplo maiorem terminatur *e*. In hoc sacco *particulam* obserua, qua in toto cerebro propter albedinem occaecantem fabricaeue elegantiam, pulchrior haud datur, puta Vermem bombycinum seu caput Hippocampi *Arantii C*, extra praefati sacci planum, ad altitudinem 5 fere linearum et latitudinem xi. linearum protuberans, in cuius exteriori superficie, spiralia circumvolutionum exsculpta sunt vestigia *ff*. Ad haec, quum tereti et ovali figura, vsque ad duorum fere pollicum longitudinem, gaudeat, eo toto

to itinere ad vermis bombycini crassioris effigiem non nihil accedit, vel ad effigiem cornu arietini, ad quam adhuc propius accedere mihi visus est. Namque idem corpus, postquam è sacco, cui inclusum est, sese in ductum angustiozem demittit, valde gracilescens, spiralem circumvolutionum impressiones amittit quidem, ac in modum arcus incuruatur, *g.* formaque intestinali, suo tandem extremo, (quod sub vocabulo cruris seu brachii Fornicis vulgo notum est) vna cum oppositi lateris brachio, Fornicis corpus immediate producit *b.*

Explicatio Figurae.

- A. A.** Duo apices haemisphaerii, cum intermedio sinu *a. b.*
- B. B. B.** Limbus medullaris finum ambiens.
- a. b.* Sinus vulgo notus helicem auriculae humanae aemulans.
- c.* Sinus, lobum auriculae simulans, in posteriori apice haemisphaerii,
- d. e.* Sinus bombycini vermis seu hippocampi *Arantii.*
- C.** Hippocampus seu vermis bombycinus *Arantii.*
- ff.* Spirales circumvolutiones vermis bombycini.
- g.* Curvatura et pars gracilior vermis bombycini.
- b.* Fornicis pars.

THEOREMA

DE

MOTU CURVILINEO CORPORUM, QUAE
RESISTENTIAM PATIUNTUR VELOCITATIS
SUAE QUADRATO PROPORTIONALEM UNA
CUM SOLUTIONE PROBLEMATIS IN

ACT: LIPS: M: NOU: 1728

PROPOSITI.

Auctore

Daniele Bernoulli Job. Fil.

§. I.

Mense Jan.

1729.

Tab. XIII.

Quandoquidem plurimis experimentis extra
dubium positum fuit, corpora in fluidis
non admodum lente mota resistantiam
plerumque pati quadrato velocitatis suae
vbique proportionalem; vtilia erunt in hoc argu-
mento illa potissimum theoremata, quae huic hy-
pothesi sunt specialia: ad hanc classem quoque per-
tinet theorema mox indicandum, quia simile in
nulla alia resistantiae cum velocitate comparatae po-
sitione exhiberi posse mihi persuadeo.

Fig. 1.

§. 2. *Theorema.* Sit curua qualiscunque $aACc$,
super qua corpus moueri ponatur ita vt vbique resi-
stentiam offendat quadrato velocitatis suae propor-
tionalem. Incipiat primo descendere grauitate sua
in A, perueniatque priusquam retrogrediatur, in C;
dein descendere incipiat idem corpus in a ascensuque
suo

suo maximo perueniat in c , ducantur verticales Ab et Cd atque horizontales ab et cd , sintque elementa Aa et Cc infinite parua. Dico fore semper spatium percursum AC proportionale logarithmo rationis Ab ad Cd .

Demonstratio. Descendat primo corpus ex A , perueneritque in punctum F , moxque post tempusculum infinite paruum dt in E , ducantur horizontalis FG , et verticalis GE ; ponatur velocitas in puncto $F = v$, in $E = v + dv$; exprimatur actio grauitatis corpus fluido submersum animans per g , numerusque ille qui multiplicatus per quadratum velocitatis dat resistantiam fluidi indicetur per n . Sic erit vis accelerans in puncto $F = g \frac{EG}{FE} - nvv$, quae multiplicata per tempusculum dt dat incrementum velocitatis dv ; hinc igitur habetur aequatio

$$I. [g \frac{EG}{FE} - nvv] dt = dv.$$

quae posito $\frac{FE}{v}$ pro dt abit in hanc aequationem

$$II. g \times EG - nvv. FE = v dv.$$

Jam vero fingamus corpus idem descendere incepisse ex puncto a , rursusque peruenisse in punctum F moxque in E ; dicatur retentis caeteris positionibus velocitas eius in $F = p$, et in $E = p + dp$: ita obtinebitur loco secundae aequationis haec altera

$$III. gEG - npp \times FE = p dp$$

subtrahantur termini aequationis tertiae a terminis aequationis secundae; sic erit facta ab vtraque parte diuisione per $pp - vv$

$$IV. n.FE = \frac{-p dp + v dv}{pp - vv}.$$

Tom. IV.

S

Cui

Cui postremae aequationi id commode accidit, quod integrari possit; ut vero debita constans addi possit, consideranda est velocitas corporis ex a delapsi in puncto A ; sit ergo illa velocitas $=a$, ita ut existente puncto F in A sit $p=a$ et $v=0$, dicaturque numerus, cuius logarithmus est unitas $=c$; atque ita aequatio quarta, si integretur, dat

$$V. \quad pp = vv + c^{-2n \cdot AP} aa$$

verum cum corpus ex A delapsum peruenit in C fit $v=0$ et $AF=AC$; tunc igitur habetur $pp=c^{-2n \cdot AC} aa$ vel

$$VI. \quad 2n \cdot AC = \log. \frac{aa}{pp},$$

vbi iam per p intelligitur velocitas corporis ex a delapsi in puncto C .

Porro patet, resistantiam nullam esse in descensu per aA pariter ac in ascensu per Cc , quia velocitas utrobique est infinite parua: erit igitur in hoc casu de quo dicimus $\frac{aa}{pp} = \frac{bA}{Cd}$; unde vi sextae aequationis

$$VII. \quad AC = \frac{1}{2} n \log. \frac{Ab}{Cd}$$

adeoque spatium percursum AC vbique proportionem habet logarithmi rationis, quae est inter Ab et Cd . Q. E. D.

§. 3. Coroll. I. Si medium resistens est infinite rarum id est, si corpus mouetur in vacuo, ostendunt praedictae aequationes, esse Cd semper $=Ab$, quod notissimum est principium mechanicum.

§. 4. Coroll. Quia ex comparatione aequationis II. cum III. euauit litera g , sequitur actionem grauitatis haud immutare calculum, et indicat aequatio VII. arcum AC constantis manere magnitudinis,

si grauitates specificae corporis et medii resistentis constantem seruent rationem, quamuis tempora mutantur, quibus arcus isti AC describuntur.

§. 5. *Scholium.* Si numeri et mensurae absolutae desiderantur (quod in calculo experimentorum requiritur) attendendum est ad figuram corporis, rationemque grauitatum specificarum inter corpus et medium resistens: ponamus corpus esse sphaericum eiusque diametrum continere tot millesimas partes vnius pedis quot continentur vnitates in m , et esse grauitatem specificam globi in vacuo ad grauitatem specificam medii resistentis in vacuo, vt 1 ad b erit $n = \frac{375b}{m}$ (conf. Comment. Tom. II. pag. 324. et pag. 326.

Caeterum potest theorema istud generalius reddi et extendi ad media, quae partim in duplicata ratione velocitatum, partim in ratione momentorum temporis (quam hypothesin *Newtonus* in vltima editione *Princ. Phil.* secutus est) resistunt, quod alibi ostendam. Jam vero quaedam problemata attingam, quae ex theoremate nostro facile ducuntur.

§. 6. *Problema I.* Determinare velocitatem corporis grauitate sua in curua quacunq; moti et vbique resistentiam patientis velocitatis suae quadrato proportionalem.

Solutionem admittit hoc problema duplicem, quarum quaelibet vsum suum habere potest particularem: igitur e re nostra erit vtramque apponere, quamuis altera iam diu sit nota.

Solutio I. Sit curua proposita aFC , quaeraturque velocitas in F , considerando punctum F , ut fixum, initium autem motus ut variabile; sit initium primo in A , postea autem in a ; ponatur $FA = s$; $Aa = ds$; $Ab = dy$; velocitas, quam habet corpus in F ex puncto A delapsum, $= v$; velocitas quam idem corpus in eodem puncto F sed ex puncto a delapsum habet $= v + dv$. His positis degenerabit aequatio quinta theorematis nostri in hanc aliam, posito scilicet $(v + dv)^2$ vel $vv + 2v dv$ pro $pp(a)$ $2v dv = c^{-2ns} aa$. Est autem aa aequale quadrato velocitatis corporis ex a in A delapsi, et quia resistentia ibi nulla est, sequitur esse aa proportionale ipsi Ab seu dy , ponam igitur $aa = g dy$; intelligendo rursus per g actionem gravitatis corporis fluido submersi: hinc erit $(\mathcal{E}) vv = g s c^{-2ns} dy$. Q. E. I.

Solutio 2. Consideretur nunc initium motus A ut fixum, sed punctum F , pro quo velocitas quaeritur, ut variabile: sit ut ante $AF = s$, velocitas in $E = v + dv$; erit vis accelerans in puncto $F = (\frac{g dy}{ds} - n v v)$; ergo $v dv = g dy - n v v ds$; ponatur $vv = c^{-2ns} z$, et erit $-n c^{-2ns} z ds + c^{-2ns} dz = g dy - n c^{-2ns} z ds$; vel $z = g s c^{2ns} dy$; hinc $(\gamma) vv = g c^{-2ns} s c^{2ns} dy$. Q. E. I.

§. 7. *Coroll.* Non difficile est ostendere identitatem inter aequationes (\mathcal{E}) et (γ) , ut ut diuersam habeant formam: Recordandum vero est in constructione quantitatum $s c^{-2ns} dy$ et $s c^{2ns} dy$ litteras s et y diuersas a diuersis partibus habere significationes.

§. 8. *Problema 2.* Data curua OAB inuenire alteram BCP, commune habentem initium cum priori et talem, vt, vbicunq; descendere incipiat in curua OAB, veluti in puncto A, et moueri pergat donec tota velocitas exhausta fuerit puta vsque in punctum C, sint semper arcus in vtraque curua descripti nempe BA et BC aequales. Fig. 2.

Solutio. Ducatur BN verticalis, descendat corpus ex A totoque suo ascensu perueniat in C dein cogitemus descendere ex puncto priori infinite propinquo a , sicque attingere punctum c ; agantur aM , AL , CH et cI horizontales, atque Ab et Cd verticales, dicatur $BA = s$, $Aa = ds$, $BL = x$, $LM = dx$, $BC = s$, $Cc = ds$, $BH = y$, $HI = dy$; erit per VII. aequationem in paragrapho secundo expositam $4^{ns} = \log: \frac{dx}{dy}$, vel $c^{4ns} = \frac{dx}{dy}$, vel $dy = c^{-4ns} dx$. Q. E. I.

§. 9. *Coroll. I.* Sit curua OAB recta verticalis, ita vt sit $x = s$; igitur erit $dy = c^{-4ns} ds$, vel integrando $y = \frac{1 - c^{-4ns}}{4n}$. Si HC dicatur $= z$, erit

aequatio inter coordinatas BH (y) et HC (z) talis $dz = \frac{\sqrt{(8ny - 16n^2yy)}}{1 - 4ny} dy$: ponatur $1 - 4ny = \sqrt{1 - rr}$, et

erit $4ndz = \frac{rdr}{1 - rr} = -dr + \frac{\frac{1}{2}dr}{1 - r} + \frac{\frac{1}{2}dr}{1 + r}$. Ergo $z = \frac{-2r + \log(1 + r) - \log(1 - r)}{8n}$, ita vt curua desiderata hoc

in casu per logarithmos construi possit. Verum Pater meus, cui haec aliquando perscripsi, obseruauit, hanc curuam ipsam esse tractoriam *Hugenii*; id quod statim apparet ex duabus superioribus aequationibus

$dy = c^{-4ns} ds$ et $y = \frac{1 - c^{-4ns}}{4n}$; hinc enim deducitur

Fig. 3. tur $\frac{dy}{1-4ny} = ds$. Igitur si in linea verticali indefinite longa OB abscindatur $BQ = \frac{1}{4n}$, et ex Q erigatur horizontalis QR indefinite longa, corpusque in B positum ita trahatur mediante filo longitudinis BQ, ut altera extremitas Q describat rectam QR, describet corpus curuam BP, conditioni problematis satisficientem.

Fig. 2. §. 10. Coroll. 2. Facillimum est infinitis modis efficere ut ambae curuae OAB et BCP vna eademque aequatione exprimantur. Ad hoc nimirum requiritur, ut functio quaedam assumatur pro s talis ut diuisa per c^{4ns} idem exhibeat quod oritur si in functione fuisset littera S negatiue sumta, huicque functioni ponendum est elementum dx aequale talis functio est $c^{2ns} s ds$, vel $c^{2ns} s^3 ds$ vel generaliter $c^{2ns} s ds$, intelligendo per functionem imparem ipsius s . Ergo curua quaesita haec erit $dx = c^{2ns} s ds$. Casus particularis est, qui hac aequatione continetur $dx = c^{2ns} s ds$, vel $x = \frac{1}{2n} c^{2ns} s - \frac{1}{4n} c^{2ns} + \frac{1}{4n}$. Qui pariter ac reliqui omnes geometricam admittunt constructionem.

Atque hoc est problema illud haud inelegans, quod Geometris soluendum *Anonymus* quidam proposuit in act. Lips. m. 9br. 1728.

Fig. 2. §. 11. Coroll. 3. Si curua BCP socia sit curuae datae OAB et quaeratur curua tertia socia cum BCP, erit posito dz pro elemento abscissae in linea verticali BO sumtae, $dz = c^{-4ns} dy = c^{-3ns} dx$ et sic quarta quintaque atque omnes reliquae vna eadem-

demque opera inueniri possunt. Sequitur exinde si in fig. 3. secetur bifariam BQ in q , et ope fili longitudinis B q alia formetur tractoria B p , cuius asymptotos qr sit ad BO perpendicularis, erit tractoria B p focia tractoriae BP; sic vt ambae curuae sint inter se similes. Si porro longitudo fili sit $= \frac{1}{12n}$ et dein $= \frac{1}{16n}$ et sic deinceps, continuo alia formabitur tractoria, quae cum sua praecedente iuncta, problemati satisfaciet: sic igitur si retrogrado ordine procedamus apparet, etiam rectam BO esse vt tractoriam considerandam, formatam nempe filo longitudinis $\frac{1}{on}$ seu infinitae. Caeterum vsus quem theorema §. 2. expositum in physicis rebus habere potest, non est spernendus; namque illius ope multa calculo perfacili absoluuntur circa oscillationes pendulorum, quae alia methodo laborem vix superabilem postulant. De his vero proxima occasione vberius dicam.

SOLUTIO PROBLEMATIS
DE
VI CENTRIFUGA CORPORIS SPHAERICI
IN VORTICE SPHAERICO
GYRANTIS.

Auct. G. B. Bulffingero.

§. I.

Menf. Febr.
1729.
Tab. XIV.

Dedit huic argumento occasionem Amicus, cui forte visum erat, si sphaera componatur ex duobus hemisphaeriis inaequaliter grauibus, sic tamen, vt integra sphaera aequet pondus sphaerae fluidae sibi volumine aequalis, eam in vortice fluido ita gyraturam, vt eandem a centro vorticis distantiam constanter teneat, conuerso erga centrum hemisphaerio leuiore. Erat vortex, de quo agebatur, eiusmodi, vt celeritates directe responderent distantii. Id mihi suspicionem mouit, vim sphaerae heterogeneae centrifugam maiorem fore, quoniam vires partiales materiae ex hemisphaerio leuiore in grauius translatae ob maiorem rotationis in maiori distantia celeritatem, maiores sunt in hoc materiae situ, quam in priori. Addidi autem eo tempore, si celeritates rotationum sint vbique aequales, videri mihi, quod aequales futurae sint vires sphaerae heterogeneae memoratae, et alterius homogeneae. *Primum recte se habet: sed in secundo falsus fui, praecipitata*

au-

ante examen sententia. Cognoui statim, re ad calculum reducta, eam fecius se habere; nec celeritates gyrationum in diuersis distantis easdem supponi debere, sed vires centrifugas potius, si duae sphaerae, heterogenea et homogenea, eandem virium centrifugarum summam debeant exhibere.

§. 2. Dabo hic eius Problematis, in suos quasi casus diuisi, solutionem non nihil generalem; quoniam singuli casus suos prae alteris vsus habent. Maneo autem intra *vortices sphaericos*, hoc est, eos, quorum vires centrifugae omnes ab eodem communi centro recedunt; atque in sola *corporis sphaerici* consideratione. Vtraque haec restrictio *coelestibus* accommodatur corporibus, et, si qui sunt, *vorticibus*. De Cylindrico vortice, et experimentis eo pertinentibus, curiosis plane et egregiis, dixit iam ante complures annos Salmonus, Academiae Scientiarum Parisinae Socius. Vide Histor. et Memorias Acad. Paris. ad A. 1714, 1715, et 1716.

PROBLEMA.

§. 3. *Sit vortex sphaericus, et celeritates rotationum proportionales dignitati cuiusque (n) distantiarum a Centro, quaeritur vis centrifuga globi heterogenei e duobus segmentis sphaericis ita compositi, ut gravitas totius globi aequet gravitatem sphaerae aequalis, et fluido homogeneae.*

SOLUTIO.

1. Duplex potest esse *sensus* Problematidis. *Vel* requiritur *aggregatum virium centrifugarum omnium*, sine attentione ad certam directionem, secundum quam globus sibi cohaerens actu ipso fugeret, datis sub circumstantiis. *Vel* quaeritur vis centrifuga in *directione*, quae centrum vorticis et globi transit, et in qua sphaera nostra fugeret aut peteret vorticis centrum mota. Prior casus magis pertinet ad globum *fluidum*, vbi partes inter sese non cohaerent: Posterior ad *solidum*, in quo positae ex vtraque diametri parte materiae ob cohaesionem suam limitant vires centrifugas primitiuas.

2. Duplex etiam esse potest *segmentorum ratio*. Vel segmenta sphaerica terminantur *plana basi*, qualis supponitur superius, cum de hemisphaeriis inaequaliter densis agitur; et qualem praecipue supponi conuenit, cum de sphaeris agitur solidis. Vel segmenta illa terminantur *basi sphaerica*; qualem concipere decet, si sphaera fuerit fluida, contentis scilicet in eadem crusta sphaerica duobus fluidis inaequaliter densis.

§. 4. Velim autem notari, nihil hic aliud inquiri, quam *vis centrifugae magnitudinem*, pro situ aliquo momentaneo, quo hemisphaerium, vel segmentum alterutrum, (hoc loco densius) occupat maximam a vorticis centro distantiam. De *Physicis conclusionibus*, circa ipsum motum sphaerae centrifugam aut centripetam, circa inclinationem seg-
meu-

mentorum, aut rotationem ipsius sphaerae hic nihil dici. Sit igitur fig 1. O centrum vorticis; GLPQMH Sectio sphaerae maxima; distantia centrorum vorticis et sphaerae, hoc est $OT=c$. $OL=m$. $LT=TM=r$. $LX=x$. $Xx=dx$. $x\delta=y$. $\delta f=dy$. $MV=v$. $Vv=dv$. $VR=z$. $Rr=dz$. Ratio radii ad peripheriam circuli $=1:\Phi$. Densitas sphaerae fluido homogeneae $=a$. Segmenti exterioris $HMQ=a+f$. Segmenti interioris $=a-g$. Dico,

Quoniam vires centrifugae generaliter sunt in ratione composita ex directa massarum simplici, et duplicata celeritatum, itemque inuersa distantiarum: Hoc est, posita $Vi=V$, Massa $=M$, celeritate $=C$, et Distantia $=D$, quoniam generaliter $V=\frac{M \times C^2}{D}$. Erit in nostro casu, propter $C=D^n$, $V=M \times D^{2n-1}$. Vnde sequens oritur computus.

I. De segmentis Basi plana terminatis.

Casus primus.

§. 5. Pro vi segmenti GLP inuenienda. Rotetur xSf circa centrum X, vt elementum Sf describat zonulam circularem $=pydy$. Quoniam densitas illius est $=a-g$, erit Massa huius zonulae $=(a-g)pydy$. Et propter distantiam eius a centro Vorticis $O=OS=\sqrt{(OX^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}$ erit Vis centrifuga zonulae $=$

Fig. 1.

T 2

$$= (a-g) p y dy (\text{OX}^2 + y^2)^{\frac{2n-1}{2}}$$
 Consequenter integrando, Vis centrifuga totius circuli radio XS descripti

$$= p \frac{(a-g)}{2n+1} (\text{OX}^2 + y^2)^{\frac{2n+1}{2}} + \text{Const.}$$
 Euanescente autem y euanescit Vis centrifuga: igitur constans

$$= -p \frac{a-g}{2n+1} \text{OX}^{2n+1}$$
 unde Vis totius circuli, radio XS, vel XG (= y) descripti

$$= p \frac{a-g}{2n+1} [(\text{OX}^2 + y^2)^{\frac{2n+1}{2}} - \text{OX}^{2n+1}]$$
 Haecenus autem, cum de solo circulo radii XS, vel XG ageretur, assumi OX pro constante debuit. Fiat nunc LX variable = x , adeoque OX = $m+x$, erit OX = $m^2 + 2mx + x^2$ et $y^2 = 2rx - x^2$, adeoque Vis Circuli praedicti

$$= p \frac{a-g}{2n+1} [(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n+1}{2}} - (m+x)^{2n+1}]$$
 Haec vis ducta in altitudinem Xx = dx , dabit vim Cylindruli elementaris GPp g

$$= p \frac{a-g}{2n+1} dx [(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n+1}{2}} - (m+x)^{2n+1}]$$
 Adeoque Vis segmenti sphaerici GLP = $p(a-g)$

$$\left[\frac{(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n+3}{2}} - m^{2n+3}}{(2n+1)(2n+3)(m+r)} - \frac{(m+x)^{2n+2} - m^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)} \right]$$

§. 6. Pro vi centrifuga segmenti HMQ inuenienda, nihil aliud requiritur, quam vt homologae eadem ratione tractentur lineae et superficies. Vnde in denominationibus superioribus efficitur vis centrifuga segmenti HMQ = $p(a+f) \times$

$$\left[\frac{(q-2qv+2rv)^{\frac{2n+3}{2}} + q^{2n+3}}{(2n+1)(2n+3)(q-r)} + \frac{(q-v)^{2n+2} - q^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)} \right]$$

Ca-

Casus secundus.

§. 7. In Segmento GLP pro inuenienda vi globi secundum directionem OLM, notandum est, quod vis singulorum punctorum vt S, limitetur per oppositam in Y. Dicendum igitur: vti OS ad OX, ita vis primitiua ad vim limitatam puncti S. Igitur Vis Zonulae circularis antehac inuenta, ducenda

est in $\frac{OX}{OS}$, vt fiat $= (a-g)pydy \left(\frac{OX}{OS} + y \right)^2 \frac{OX}{OS}$

$= (a-g)pydy \left(OX + y \right)^{2n-1} OX$, et integrando Vis circuli radio XS, (vel XG=y) descripti, addita statim

constante $= p \frac{a-g}{2n} [(OX + y)^{2n} - OX^{2n+1}]$. Fiat nunc OX

variabile $= m+x$, substituatur valor ipsius $y^2 = 2rx - xx$, et ducantur omnia in altitudinem

$Xx = dx$: erit Vis Cylindruli elementaris GPfg

$= p(a-g) \frac{(m+x)^n (mm+2mx+2rx)^{2n+1} - (m+x)^{2n+1}}{2n} dx$, et integrando cum addita

constante, Vis Segmenti Sphaerici GLP $= p(a-g)$, ductum in quantitates

$$\text{feqq. } \frac{(m+x)^{n+1} (mm+2mx+2rx)^{2n+3} - m^{2n+3}}{2 \cdot 2n \cdot (n+1) (m+r)}$$

$$- \frac{(mm+2mx+2rx)^{n+2} - m^{2n+4}}{4 \cdot 2n \cdot (n+1) (n+2) (m+r)} - \frac{(m+x)^{2n+2} - m^{2n+2}}{2n \cdot (2n+2)}$$

§. 8. Similiter prodit vis centrifuga segmenti sphaerici HMQ $= p(a+f)$ ductum in quantitates sequentes

$$- \frac{(q-v)^{n+1} (77-2qv+2rv)^{2n+3} - q^{2n+3}}{2 \cdot 2n \cdot (n+1) (q-r)} + \frac{(77-2qv+2rv)^{n+2} - q^{2n+r}}{4 \cdot 2n \cdot (n+1) (n+2) (q-r)^2}$$

$$+ \frac{(q-v)^{2n+2} - q^{2n+2}}{2n \cdot (2n+2)}$$

II. De segmentis Basi sphaerica terminatis.

Casus Primus.

Fig. 2.

§. 9. In Segmento GLP fingatur semicirculo Radii OG describi sphaeram circa centrum vorticis O: Transibit superficies eius per sphaeram LGHMQL; et repraesentabit arcus GSP sectionem superficiei sphaericae, quae utrique sphaerae communis est. Haec superficies est aequalis superficiei Cylindricaе, cuius Diameter baseos est OG, et altitudo XY: Hoc est, facto ex circumferentia baseos in XY. Propter $OG = (\overline{OX}^2 + \overline{XG}^2)^{\frac{1}{2}} = (m^2 + 2mx + x^2)^{\frac{1}{2}}$ et $XY = OG - OX = (m^2 + 2mx + x^2)^{\frac{1}{2}} - (m+x)$. Erit superficies praedicta $= p(m^2 + 2mx + 2rx) - p(m+x)(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{1}{2}}$. Haec ducta in densitatem ($= a-g$) et in dignitatem distantiae $= OG^{\frac{2n-1}{2}} = (m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n-1}{2}}$ dabit Vim centrifugam totius superficiei praedictae $= p(a-g)(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n+1}{2}} - p(a-g)(m+x)(m^2 + 2mx + 2rx)^n$. Ducatur illa in altitudinem Yy ($=$ differentiali ipsius OG) hoc est, in $d. OG = (m+r)dx(m^2 + 2mx + 2rx)^{-\frac{1}{2}}$, erit Vis solidi elementaris sphaerici $GPPg = p(a-g)(m+r)dx[(m^2 + 2mx + 2rx)^n - (m+x)(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n-1}{2}}]$, et integrando, addita constante, Vis totius Segmenti sphae-

sphaerici GLPSG = $p(a-g)$, ductum in terminos seqq.

$$\frac{(m^2 + 2mx + 2rx)^{n+1} - m^{2n+2}}{2 \cdot (n+1)} - \frac{(m+x)(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n+1}{2}} - m^{2n+2}}{2n+1}$$

$$+ \frac{(m^2 + 2mx + 2rx)^{\frac{2n+3}{2}} - m^{2n+3}}{(2n+1)(2n+3)(m+r)}$$

§. 10. Eadem methodo prodit vis totius segmenti sphaerici HMQWH = $p(a+f)$, ductum in terminos sequentes

$$\frac{(q^2 - 2qv + 2rv)^{n+1} - q^{2n+2}}{2(n+1)}$$

$$- \frac{(q-v)(q^2 - 2qv + 2rv)^{\frac{2n+1}{2}} - q^{2n+2}}{2n+1} - \frac{(q^2 - 2qv + 2rv)^{\frac{2n+3}{2}} - q^{2n+3}}{(2n+1)(2n+3)(q-r)}$$

Casus Secundus.

§. 11. Pro Vi Segmenti GLP. Distantia Arcus GSYF eadem est a centro vorticis, sed modificatio virium diuersa. Itaque vt habeas vim puncti S, massa eius non est ducenda in OS²ⁿ⁻¹ sed in OZ²ⁿ⁻²

OS sit OS = b , quoniam constans est in Arcu GSP, et YZ = t , adeoque Zz = dt . Annulus sphaericae superficiei ab elemento S f circa Zz rotato descriptae, erit = $pbdt$. Igitur Massa eius = $(a-g)pbdt$, et Vis centrifuga huius annuli = $(a-g)pbdt \cdot OZ$. OS²ⁿ⁻² = $(a-g)pb^{2n-1}(b-t)dt$, et integrando, Vis centrifuga totius superficiei sphaericae, ab arcu YS circa YZ rotato, genitae = $p(a-g)(b^{2n}t - \frac{1}{2}b^{2n-1}t^2)$. Si iam YZ = YX = $b-m-x$, et YS = YG, erit Vis totius superficiei sphaericae, per Arcum GSYF representatae, = $p(a-g)\frac{1}{2}b^{2n-1}(b^2 - m^2 - 2mx - x^2)$ = $p(a-g)\frac{1}{2}b^{2n-1}GX$. Fiat nunc OS variabilis, vel

vel $b^2 = \overline{OX}^2 + \overline{XG}^2 = m^2 + 2mx + xx + y^2 = m^2 + 2mx + 2rx$ et ducatur vis inuenta in altitudinem Yy : erit Vis Elementi solidi $GgpP = p(a-g)^{\frac{1}{2}}(m+r)(2rx-xx)(m^2+2mx+2rx)^{(n-1)}dx$. Quare integrando, addita constante, Vis solidi sphaerici $GLPYG = p(a-g)^{\frac{1}{2}}(m+r)$, ductum in terminos sequentes

$$\frac{rx(m^2+2mx+2rx)^n}{n(m+r)} - \frac{r(m^2+2mx+2rx)^{n+1}}{2.n.(n+1)(m+r)^2} - \frac{-rm^{2n+2}}{2.n.(n+1)(m+r)^2}$$

$$- \frac{xx(m^2+2mx+2rx)^n}{2.n(m+r)} + \frac{x(m^2+2mx+2rx)^{n+1}}{2.n.(n+1)(m+r)^2}$$

$$\frac{(m^2+2mx+2rx)^{n+2} - m^{2n+4}}{2.2.n.(n+1)(n+2)(m+r)^3}$$

§. 12. Pro Vi Segmenti HMQ , si eandem sequaris methodum, prodit Vis solidi sphaerici $HMQWH = p(a+f)^{\frac{1}{2}}(q-r)$; ductum in terminos seqq.

$$\frac{rv(q^2-2qv+2rv)^n}{n(q-r)} + \frac{r(q^2-2qv+2rv)^{n+1}}{2.n.(n+1)(q-r)^2} - \frac{-rq^{2n+2}}{2.n.(n+1)(q-r)^2}$$

$$- \frac{vv(q^2-2qv+2rv)^n}{2.n(q-r)} - \frac{v(q^2-2qv+2rv)^{n+1}}{2.n.(n+1)(q-r)^2}$$

$$\frac{(q^2-2qv+2rv)^{n+2} - q^{2n+4}}{2.2.n.(n+1)(n+2)(q-r)^3}$$

Quae cum vires exhibeant segmentorum GLP , et HMQ , patet sola valorum x et v substitutione in partibus diametri facta, inueniri vim centrifugam sphaerae heterogeneae e duobus Segmentis ita compositae, vt grauitas eius aequet grauitatem sphaerae homogeneae. Q. E. I.

Euo-

Evolutiones quorundam Casuum specialium.

§. 13. Si sphaera sit homogenea, adeoque $f=g=0$, fiatque $m+r=c$, erit in casu primo, posita $n=1$. Vis centrifuga $=p(\frac{2}{3}acr^3 + \frac{2ar^5}{15c})$, et si $n=0$, erit vis sphaerae $=p \cdot \frac{2}{3c} ar^3$. Sed in casu secundo erit, posita $n=1$, vis centrifuga $=p \cdot \frac{2}{3}acr^3$ et pro $n=0$ inducet formula in Logarithmos. Vis autem sphaerae in centrum grauitatis collectae, facta $n=1$, erit $=p \cdot \frac{2}{3}acr^3$, et pro $n=0$, fiet $=p \cdot \frac{2}{3c} ar^3$.

Si sphaera concipiatur diuisa in duo hemisphaeria §. 1. sic, vt $f=g$, dabit casus primus §. 5 et 6, posita $n=1$, vim sphaerae centrifugam $=p(\frac{2}{3}acr^3 + \frac{2ar^5}{15c} + \frac{2}{15}fc^4 + \frac{1}{3}fc^2r^2 + \frac{1}{2}fr^4 - \frac{2f}{15c}(c^2+r^2)^{\frac{5}{2}})$ et pro $n=0$, vim $=p(\frac{2ar^3}{3c} + \frac{2}{3}fc^2 + fr^2 - \frac{2f}{3c}(c^2+r^2)^{\frac{3}{2}})$. Casus autem secundus §. 7 et 8. dabit, posito $n=1$, vim $=p(\frac{2}{3}acr^3 + \frac{1}{4}fr^4)$, et, si $n=0$, inuoluet Logarithmos. Vis autem sphaerae huius in centrum grauitatis collectae, posito $n=1$, erit $=p(\frac{2}{3}acr^3 + \frac{1}{3}fr^4)$, et posito $n=0$, erit $=p(\frac{2ar^3}{3c} + \frac{16a^2r^2}{9f})$. Si fuerit $a=\frac{3}{2}r$, et $v=\frac{1}{2}r$ in §. 5. 6. 7. et 8. erit $g=\frac{5}{27}f$, vt sphaerae compositae et homogeneae sit eadem grauitas. Fiat $n=1$, erit §. 5. et 6. vis centrifuga $=p(\frac{2}{3}acr^3 + \frac{2}{15c}ar^5 + \frac{32f}{405c}(c^2+cr+r^2)^{\frac{5}{2}} + \frac{32}{405}fc^4 + \frac{16}{81}frc^3 + \frac{28}{81}fc^2r^2 + \frac{25}{81}fcr^3 + \frac{49}{162}fr^4 + \frac{22fr^5}{405c})$ saluo

errore calculi. Sed §. 7. et 8. erit $Vis = p(\frac{2}{3}acr^3 + \frac{1}{12}fr^4)$. Eademque erit Vis sphaerae in centrum grauitatis collectae. Sit enim E centrum grauitatis segmenti GLP, erit $LE = \frac{8rx - 3xx}{12r - 4x} = \frac{7}{8}r$. Sit F centrum grauitatis segmenti alterius HMQ, erit $MF = \frac{8rv - 3vv}{12r - 4v} = \frac{13}{8}r$, et $EF = \frac{4}{5}r$. Sit nunc D centrum grauitatis commune inueniendum: dico, sicut pondus in F suspensum $= \frac{5}{8}r^3(a+f)$ ad pondus suspensum in E $= \frac{27}{8}r^3(a - \frac{5}{27}f)$ ita distantia ED ad distantiam DF. Ex quo fit $ED = \frac{1}{3}r\frac{a+f}{a}$, et $LD = LE + ED = r(1 + \frac{f}{8a})$; Vnde tandem distantia centri grauitatis sphaerae a centro vorticis $= OD = c + \frac{f}{8a}$: et vis centrifuga $= \frac{2}{3}ar^3p(c + \frac{f}{8a}) = p(\frac{2}{3}acr^3 + \frac{1}{n}fr^4)$ vti prius obtinuimus pro §. 7. et 8.

Corollaria.

§. 14. Patet ex dictis: Non posse pro sphaera vel homogenea, vel heterogenea indifferenter substitui eius centrum grauitatis. In solo casu secundo, et hypothese ipsius $n=1$, id semper succedit: in primo nunquam. Intelligitur hoc ex illo: illud praeter exempla iam allata ex generali ratiocinio. Sint T et U duo puncta quaecunque globi heterogenei, quorum densitates exponantur per T et U. Sit eorum commune centrum grauitatis K. Demittantur in lineam OLM perpendiculara Tt, Kk, Uu: erit ex natura centri grauitatis $U : T = TK : KU = tk : ku$. Vnde $U. uk = T. tk$. Cumque vires centrifugae in

ca-

casu §. 7. et 8. pro $n=1$, sint in ratione massarum U , T , K , et distantiarum Ou , Ot , Ok , habebitur:

$$T. Ot = T. Ok + T. kt$$

$$U. Ou = U. Ok - U. uk = U. Ok - T. kt. \text{ Vnde}$$

$$T. Ot + U. Ou = (T + U)Ok = K. Ok.$$

Patet porro, quod salua manente grauitate ipsius sphaerae, et modo compositionis, diuersa fit vis centrifugae differentia a vi sphaerae homogeneae pro diuersa globi a centro vorticis distantia, quia c ingreditur formulam vis centrifugae: quod etiam diuersa fit in eadem distantia pro differentia grauitatis in utroque hemisphaerio, quoniam f ingreditur in eandem formulam: quod denique magis magisque diuersa fit, prout segmenta sphaeram componentia sunt magis inaequalia volumine et densitate. Facile inueniri potest punctum in quod colligi deberet tota sphaerae massa, vt eadem prodeat quantitas vis centrifugae, quae in heterogenea obtinet. Possit id vocari centrum virium centralium. Denique etiam illud oculis patet, pro diuersa vorticis lege nunc maiorem esse vim sphaerae compositae, nunc minorem, quam est in homogenea.

Scholium.

§. 15. Nemini non obuium erit, plurima per hasce formulas Problemata non difficulter resolui, prout vnam vel alteram ex literis formulam componentibus pro incognita assumseris. Sola n , quae leges vorticis exponit, difficultates complecti-

tur, si pro incognita sumi, et ex formulis praemis-
sis debeat inuestigari.

Caeterum et illud facile intelligitur, componi
sphaeram ex pluribus quam duobus segmentis posse;
nec requiri, vt sphaerae compositae grauitas aequet
grauitatem alterius fluido homogeneae: Inueniri
potius hac methodo vim sphaerae compositae cen-
trifugam, quaecunque demum densitas, numerusque
et ordo segmentorum fingatur.

DE LIENE.

AUCTORE

Jo. Georg. Du vernoi.

§. I.

M. Octobr.
1729.

Aphaenomenis circa Lienem obseruatis, ac
ante omnia, a situ eiusdem naturali initium
faciam.

1. Insignis in Hypochondrio sinistro cauitas
seu spatium amplum vacuum existat, cuius portio ad
sedem ventriculi et Lienis destinata, reliquum vero
spatii vacuum et liberum est, sic vt manum in eo
circumuertere et circumagitare procliuē sit. Dein-
de, idem spatium, intuitu costarum et Diaphragma-
tis, eleuatione et concidentia earundem, instar
Thoracis maius minusue effici potest. Tales proinde
circumstantiae suspicionem mouent, corpus Lienis
in

in viuo et sano homine, totum praefatum spatium aliquando forte replere, alio autem tempore non replere, Lienisque adeo fitum seu conditionem qualis in demortuis cernitur, fallacem esse. Caeterum, Lienis ea figura est, vt in modum linguae parum incuruatae et conglobatae super ventriculi extremitatem sinistram oblique versus dorsum, iuxta ductum costarum sese accommodet.

2. Quemadmodum vteri fundo Placenta foetus, sic Lien superficiei ventriculi adhaerescit; imo auferre ventriculum haud licet, quin cum eo simul lien extrahatur vna cum omento, cuius folium pluribus digitationibus seu appendicibus veluti tendineis, limbo lienis accretum saepe obseruavi, vnde Sinus inter omentum et lienem enascitur, cuius vsum ignoro.

3. Inter Lienis et ventriculi Neruos, inter neruos et vasa splenica, idque in limine lienis, commercium singulare et admirabilis societas intercedit. Neruei enim funiculi corpus lienis nequaquam subeunt, sed in praefato limine ab vna extremitate ad aliam protensi subsistunt, a quibus propagines partim ad Lienem partim ad ventriculum omentumque contendunt. Eadem quoque vasorum sanguineorum lex obtinet. Deinde a neruorum singulari complicatione, laquei annulares seu circulares efformantur quam plurimi, quibus vasa splenica inclusa ac incarcerata detinentur.

4. Transfusionem sanguinis inter praefata viscera dari, eamque si non perpetuo, certis tamen temporibus locum habere ex eo perspicuum est, quoni-

am in limine vbi nexus est lienis cum ventriculo, canales breuissimi cum arteriosi tum venosi, ex vno ad alterum reciproce tendunt.

5. Proportio venae et arteriae splenicæ ad aliarum partium vasa multo maior visa est; Idque fortassis, moram seu collectionem sanguinis certis temporibus denotat.

6. Venosæ radices ramificationesque intra corpus lienis conspicuæ, nouam ac extraordinariam a caeteris diuersam legem oculis obiiciunt. Nam quod Bruta attinet ex. gr. in Equo, Elephantoque, venae tunicis carent proprie sic dictis, suntque foramina figuram canalis adumbrantia, ad modum canalibus per puncta super chartam expressi. Verum in Liene humano advertendum est, etsi venosæ ramificationes tunicis veris et imperforatis constare videantur, eas tamen reuera perforatas esse plurimaque in iis foraminula cribrum æmulantia facile internoscere fas est, prouti *Hygmorus* recte annotauit. Atque duplex solummodo exemplum præfatae conformationis in corpore humano, idque in duabus partibus magna inter se analogia gaudentibus hætenus reperire valui, vnum in Mentula, alterum in Liene.

7. Omnes Lienes quotquot in cadaueribus optimis examinaui, instar spongiæ, molles, tumidi, distenti, liuidique obliti sunt.

8. Facto vulnere, ac inter digitos compresso Liene, molem et volumen eius reduci ac diminui perspicio, perque foramen vulneris sanguinem pleno flumine exire.

9. Recessus omnes Lienis vero sanguine tinctos infectosque, antequam vlla vasa laesa vulnerata essent, inuenio.

10. Post crebram agitationem intinctionemque solam in aqua tepida, sanguis cito eluitur, ac sine alia praeparatione, Lienis fabrica simplicior oculis sistitur.

11. Aqua, Aer et quoduis liquidum, omnes recessus celeriter peruadit, corpusque lienis inflatur.

12. Fabricam denique Lienis interiorem, vel substantiam diligentissime perlustranti, ea rara, spongiosa filamentorumque varie inter textorum et acernosorum congeries visa est.

§. 2. E prolatis Phaenomenis, utpote certis et eidentibus, notiones 1. de vera structura Lienis, 2. de actione, 3. de eiusdem vsu formare; vel minimum, notionum hactenus receptarum veritatem aut falsitatem internoscere proclive erit.

Quoad primum; in tota fabrica Lienis nihil quod eius notitiam perarduam, difficilem, impossibilemve efficit, perspicere valeo; quumque in toto eius contextu simplicior, rara, porosa, filamentosaque substantia quae in toto liene dominatum obtinet, quae in aliis visceribus haud obuia est, quaeque in solis corporibus spongiosis reperiri solet, in conspectum venit; quumque vasorum conformatio caeteraque phaenomena allegata huicce id eae minime aduersentur, rationi consonum est in data structura eidenti conquiescere, donec contrarium demonstretur. Caeterae enim particulae solitariae,

mi-

minutioresque, utpote accessoriae et ad functionem principalem haud primario concurrentes, quales sunt puncta seu corpuscula candidantia a *Malpighio*, *Tauwryo*, *Meryo* aut Aliis obseruata, ea siue adsint siue non adsint, ad rei fundamentum seu contra generalem structuram nihil conferre valent.

§. 3. Quia tamen scire interest, an Glandulae seu corpuscula praefata reuera adsint nec ne? Item an Lien ex fibrarum ac cellularum congerie iuxta *Hygmarum*, *Malpighium* constet; ac denique quid de modo allegatis fibris vere statuendum sit; dico 1. quod recte monente *Rhuyshio* ne umbra aut vestigium glandularum tam in Humano quam in Animantium mihi oblatorum in specie Elephanti Liene appareat. 2. Eiusdem laudati Auctoris contra fibras Lienis assertioni, quoad Lienis substantiam propriam, quoque adstipulor. Fibrarum equidem imago et species quaedam cernitur, sed falsa et illusoria, quia veros Ductus cauos esse certis experimentis constat, cuius erroris causa est, quod hi diuerso aliorum ductuum in aliis visceribus more, haud glomeris aut plexus aut ordinaria forma comparent, sed tenuium filamentorum nudorum et simplicium naturam referunt. 3. Quod poros et intercapedines attinget, in toto Lienis contextu, seu in Humano seu in supra memoratorum Animantium liene, cauernulas sanguinem continentes inuicemque communicantes, quas immisso flatu extendere et dilatare fas est, clare perspicio.

§. 4.

§. 4. Fabricam Lienis simplicem, perspicuam inque aliis visceribus haud obuiam; me hic exhibente, Alii vice versa difficultates, obstacula, caliginemque perpetuo inculant, inde ad idaeas remotiores, in specie ad motum sanguinis splenici ad Hepar tendentis respicientes, Lieni communem structuram concessam esse, qualis est structura Parenchymatum seu viscerum secernentium pronuntiant; Eaque hodie recepta est opinio de Structura Lienis, quamquam valde incerta et ad legem Parenchymatum, iudice saltem oculo, parum accommodata, tumque postremo cum vasorum conformatione, sanguinis in eo exundatione, cum situ pendulo aliisque phaenomenis male concordans. Porro, quod de motu sanguinis splenici allegatur, cernimus sanguinem quoque aliarum partium ab Hepate recipi, sanguinem nimirum omenti, ventriculi, mesenterii, intestinorumque, de quarum partium structura earumque refluo sanguine, si consequentia supra memorata vera esset, idem quod de Lienis structura iudicium proferendum esset, quod tamen evidenter falsum est. Pone vero, solum ramum splenicum ad Hepar tendere, caetera vasa venosa Abdominis in venam Cauam terminari, sanguinemque Lienis (excluso omni aliarum venarum sanguine) ad Hepar transmitti, tum forsan de quodam negotio aut commercio inter Hepar et Lienem, suspicio haud iniusta formaretur; Sed eo in casu distincta prouti quidem mihi videtur Rami Splenici indoles conspicua esset, quod tamen nequaquam obseruatur.

Malo credere, tales venarum et sanguinis directiones minus denotare arcanam partium functionem, quam in legibus generalibus Circulationis rationem habere &c.

§. 5. Intuitu expositae Lienis fabricae, Idaeam concepi nouam de eius actione, quam tamen minime caueo ac pro coniectura solummodo haberi cupio. Lienem considero non vt viscus, sed vt partem instrumentalem, ad exundationes fluidorum in eo fluentium, intumescenciasque suscipiendas destinatam, sine alia occulta et a subtiliore mechanismo pendente functione, qualem sic dicta *Parenchymata* corporis humani exercent. Partem instrumentalem eam vocamus, cuius operatio aperte et sensibilibiter mechanica est, vti valuulae respectu cordis et venarum, Palpebrae respectu visus, Auris externa respectu auditus, Epiploon respectu intestinorum, Capsulae forsan atrabiliariae respectu renum, corpus Spongiosum respectu vrethrae &c. Id mihi persuadeo 1. ex generali Corporum spongiosorum proprietate quae a fluido intro stagnante retentoque, cellulis seu cauernulis eorum distentis inflatisque nulloque extus incumbente corpore compressis, mox in tumorem attolluntur; è contra, cessante fluidi stagnatione, in priorem statum restituuntur. 2. E facilitate post mortem, quoties aër vel quoduis liquidum intra lienem penetrat, molem lienis augendi. 3. Constat quoque è 7. 8. et 9. experimento, omnes cauernulas lienis sanguine vt plurimum distentas infectasque esse. Denique 4. ad Sedem Lienis respicio,

in

in eo spatio amplo, quod inter costas spurias, Diaphragma et Ventriculum vacuum est, quod vt inutile, nequaquam considerare licet. Lubenter hic testimonia Medicorum adderem, de motu Liens in vivis hominibus tam oculo quam auditu percepto, item signa inflati Liens vti sunt costarum spuriarum finitri lateris protuberantia versus dorsum progrediens, aestus, pulsatio, tumor et grauitas hypochondrii finitri, contactus tumidi liens &c. Sed supra allegata Phaenomena Anatomica hac vice nobis sufficiunt. Ex hisce concludo probabiliter, Lienem in viuo Homine instar Follis inflationibus obnoxium esse, molemque eius interdum naturaliter augeri interdum diminui, corpusque Liens spatium hypochondrii vacuum (vid. 1. phaenom.) aliquando replere, alio vero tempore non replere, etsi in sanitatis statu earum mutationum nullam sensationem percipiamus. Quamobrem, duplicem inflationem seu intumescenciam Liens statuere proclive est, vnam violentam et praeternaturalem, alteram naturalem, benignam necessariamque, quam veram actionem Liens appello.

§. 6. In eo difficultas sola nunc versatur, vt Agens seu id quod sanguinis in Liene motum sistere, eius exundationem excitare intumescenciamque adeo Liens producere potest, assequamur: Alias enim intumescencia Liens fieri haut potest, etsi venarum tunicae perforatae sint, quia cum hae tum cellulae nisi sanguinis sese opponere valent. Illud vero Agens num forte ventriculus dicendus est?

DE
SOLIDORUM RESISTENTIA
SPECIMEN

G. B. *Bulffingeri.*

§. I.

MM. Aug.
et Dec.
1729.
Tabb. XV.
et XVI.

De solidorum resistentia commentati sunt Viri omnino egregii. *Galilaeus*, ut magno erat ingenio, nobile argumentum primus et feliciter aggressus est. Legitime e principiis suis intulit, quicquid edixit. *Hypothesin*, qua usus est, corpora ut perfecte rigida considerans, successores facti naturae non omnino congruere observarunt. Inter eos *Leibnitius* peculiari schediasmate conatus est evincere, quam natura Legem in resistentia solidorum sequatur, admonitus discrimine hypotheseos Galilaeanae, et experimentorum, a *Paulo Wurzio*, et *Mariotto* factorum. Ipse *Mariottus*, si quisquam alius, bene de hoc argumento meritus est: dum et physicas considerationes primus illi distincte intulit, et experimentis compluribus rem perdiscere tentavit. *Varignonio* debet haec tractatio, quod aliae complures: persecutus est haec problemata generali solutione, eademque auxit corollariis, universalitate aut elegantia commendabilibus. *Fac. Bernoullio* obviam facta est eadem haec meditatio, cum de figura laminae elasticae sollicitum gerebat animum. Vidimus et *Parentium* saepius in hoc negotio versatum, Virum, cuius longe infra meritum

sa-

fama est. Is alibi geometram, physicum alibi, et aliquando oeconomum egit in hoc argumento.

§. 2. *Nobis* id curae est, vt factis repetita vice experimentis, tandem aliquando appareat, num dicta Virorum naturae congruant? aut quousque aberrent? Id vt consilio magis, quam casu, fiat, praemitti vtique considerationes abstractae debent, sed paucae illae, nec difficiles, nec omnes nouae.

§. 3. Principio illa *Mariotti* laus est, quod duo corporum resistentium genera distinxit liquido. Sunt, quae solida dici, et rigida debent, exemplo lapidum, vitri et lignorum: Sunt, quae solida quidem, sed flexilia, cuius modi sunt laminae metallicae tenuiores, corium, papyrus, et similia. Differunt haec corpora resistentiarum legibus et seorsim singula examinari postulant.

§. 4. *Secunda* vbique innotuit *distinctio*, quae modum respicit, quo solida simul et rigida adhibentur corpora. Trabes posthaec appellabo, cum de his agitur corporibus. Ea autem vel vna sui extremitate muro infiguntur: vel duabus innituntur, non fixae, vel vtraque extremitate muro infixae firman-
tur. *Primum* hic examinamus casum.

§. 5. Is in duas diuiditur partes. Quando vis trabem ruptura directionem trabis longitudini parallelam seruat, dicemus trabem *directe euelli*: quando vis in directione ad trabis longitudinem perpendiculari agit, vocabimus id, trabem *transuerse abrumper*. Nomenclator est *Leibnitius*. In Actis Erud. 1684. pag. 320. Directiones obliquas speciatim

memorare hominis otiosi foret: quomodo illae ex prioribus fluant, nemini ignotum est. Itaque, nisi in experimentis aliquid singulare prodeat, non utique illis immorari operae pretium est.

Fig. 1. §. 6. Sit igitur potentia Q , quae trabem debeat *directe euellere*, quaeritur, ut trabem disrumpat, quanta ea requiratur? Id obuium est, seu extendi fibras ligneas posse, seu non extendi, singas, rem eandem fore. Tensiles enim fibrae eodem omnes modo afficiuntur in hoc casu. Fac itaque, vniuersam trabis propositae massam componi fibris rupturae resistentibus. Equidem causa non est, cur in calculo vercaris eam resistentiam in fibris aequalibus et aequaliter tensis aequalem ponere. Igitur omnis in eo res vertitur, ut multitudo fibrarum ducatur in vim resistenti supremam: Huic scil. facto aequari potentia Q debet.

Fig. 2. §, 7. Exprimat Area ABCDA, basin trabis muro resectam. Sit altitudo $BD = a$, abscissa $BH = x$, elementum eius $Hb = dx$. Applicata $EF = y$. Sit porro vis fibrae singularis lineae exposita per lineam $BG = b$. Erit multitudo fibrarum in elemento $EefF = EF \cdot Hb = ydx$, et earundem resistentia maxima $= bydx$. Ex eo prodit firmitas totius spatii $eEBF = fbydx$. Et consequenter firmitas totius trabis ABCDA $= Q = fbydx$, si post factam integrationem altitudo $BH (= x)$ migret in $BD (= a)$.

Fig. 3. §. 8. Sunt ordinarie traves parallelepipedae, et Areae ABCDA parallelogramma. Itaque applicatae EF constantes. Sit igitur $y = c$. Erit $Q =$

$Q = \int b y dx = \int b c dx = b c x + \text{const.} = b c a$. Cuius quidem formulae hic usus est, ut datis, quod fieri potest, per experimenta valoribus literarum Q , c , et a , inueniatur $b (= \frac{Q}{c a})$ pro firmitate fibrae lignae, quales totam complere aream finguntur. Itaque si fibram datae crassitiei velis cognoscere: Sit area fibrae transuersim sectae $= k a$, erit vis eam ruptura $= \frac{Q k x}{c a}$.

§. 9. Supponitur autem in hoc calculo, texturam trabis internam satis esse similem, ut negligi differentia situs fibrarum possit. Si enim fibras interstitiis a se inuicem irregulariter seiunctas esse velis, certum est, valores prodire alios atque alios; prout id multitudini fibrarum detrahit, utpote quae sola hic in computum venit, cum in sequenti casu etiam diuersitas positionis plurimum conferat. Licet tamen vulgari methodo insistere, et fibras uniformiter per trabem distributas fingere, quoniam nec detegere verum, quo iacent, ordinem, nec ad praxin, si vel maxime innotesceret, cum insigni discrimine applicare possumus.

§. 10. Sit iam porro potentia P , quae trabem debeat *transuersim abrumpere*. Galilaeus rigidum corpus considerans, rumpi simul omnes fibras, adeoque et omnes tota sua vi resistere, intulit. Inde sequitur rumpi illas super basi ADC , et resistentias fibrarum habere momentum tanto fortius, quanto longius a basi rupturae absunt. Igitur momentum resistendi, quod elementum $E f F$ potentiae P opponit, est aequale facto resistentiae absolutae $(= b c dx)$

Fig. 4

in distantiam DH [= (a-x)]. Vnde fit momentum huius elementi =bc(a-x)dx, et momentum totius spatii EFBE = ∫bc(a-x)dx = bcax - ½bcx²: Et momentum trabis totius, posita x=a, exit = ½bca². Est vero id momentum aequale momento ponderis P, quod applicatur in distantia DR, et exposita distantia hac per g, aequatur Pg. Vnde formula Galilaei P = $\frac{bca^2}{2g}$, et propter Q = bca, est tandem P = $\frac{Qa}{2g}$, vel factò g=a, est P = ½Q.

§. II. Cum experimenta discordarent propositionibus, coeperunt hypothesein Eruditi mutare. *Primus*, quod sciam, *Mariottus* tendi fibras, adeoque superiores resistere fortius animaduertit. *Leibnitius* illi hoc tribuit, quod P tegerit ¼Q. Id in prima editione factum oportet, namque in secunda ait, cadere P inter ½Q et ¼Q. Ipse *Leibnitius* veram sibi videtur et naturae congruam dedisse Problematum solutionem, faciens P = ½Q, vsus hypothesi, quam alibi confirmatam dicit, quod *extensiones* sint *viribus tendentibus proportionales*. Equidem ex illa facile consequitur, quod Vir magnus infert. Est enim resistentia fibrae cuiusque absoluta proportionalis distantiae eius a basi fractionis ADC hoc est, uti distantia AB (=a) ad resistentiam summam BG (=b) ita DH, distantia fibrae propositae (=a-x) ad resistentiam huius fibrae absolutam. Vnde, quia numerus fibrarum elementi EefF = cdx, fit resistentia earum absoluta = $\frac{b(a-x)c dx}{a}$, et momentum huius re-

HK(-v) exprimat resistantiam fibrae Hb in momento ruptionis. Erit

Numerus fibrarum elementi EefF = ydx.

Resistentia earum absoluta = vydx. et

Momentum eius super basin ADC = (a-x)vydx.

Vnde Resistentia totalis spatii EPF = ∫(a-x)vydx.

Quae formula dat resistantiam totius ABC, si post integrationem completam fiat x=a. Haecenus gradior cum Varignonio: nescio autem, cur ille praeter morem suum (solutiones enim facillimas solebat et breuissimas reddere) in deuia se coniecit. Iam enim praesto est aequatio, quam ille per ambages reperit. (*) Aequalia esse debent momenta, resistantiae vnum, et potentiae frangentis alterum. Itaque habetur ∫(a-x)vydx = P×g, hoc est = potentiae ductae in distantiam applicationis. Vnde fit P = $\frac{\int(a-x)vydx}{g}$: et, quoniam Q = ∫bydx, erit P:Q = $\frac{\int(a-x)vydx}{g}$: ∫bydx, faciendo x=a post integrationem.

Tab. XVI.

Fig. 5.

§. 14. Pro applicatione formulae fit ABC, parallelogrammum, adeoque y=c, et definiatur scala resistantiarum GKD. Sit ea primo pro Galileana hypothese recta GL, adeoque HK=v=b, erit peracta summatione P = $\frac{bc}{g} \cdot \frac{1}{2} a^2 = \frac{a}{2g} \times Q$. Sit deinde recta GD, pro Leibnitio, vt fiat HK=v=b(a-x):a erit post integrationem P = $\frac{bc}{g} \cdot \frac{1}{3} a^2 = \frac{a}{3g} \times Q$. Sit GKD parabola externa, vt fiat $v = \frac{b(-x)^2}{a^2}$ erit

P =

(*) Memor. Acad. Scient. 1702. p. m. 89. sq.

$P = \frac{bc}{g} a^2 = \frac{a}{4g} \times Q$. Sit GMD parabola interna, et

$v = \frac{b(a-x)^2}{a^{\frac{1}{2}}}$ fit $P = \frac{bc}{g} \cdot \frac{2}{3} a^2 = \frac{2a}{3g} \times Q$. Sit denique resi-

stentia ut dignitas quaecunque extensionis, hoc est $v = \frac{b(a-x)^m}{a^m}$, fiet hoc casu $P = \frac{bc}{g} \cdot \frac{a^2}{m+2} = \frac{a}{(m+2)g} \cdot Q$.

§. 15. Equidem in hac enumeratione patet, si ceteris paribus plures inuicem trabes comparentur, sequi earum resistentias rationem solidi ca^2 , hoc est compositam ex simplici latitudinis et duplicata altitudinis. Idemque in omni alia resistentiae per extensionem facta determinatione locum habere sic intelligitur. Sit loco dignitatis functio quaecunque; adeoque b ad v , sicut functio lineae BD (=A) ad functionem similem lineae HD (=X) siue $v = \frac{bX}{A}$, patebit in formula $\int(a-x)vydx = \int \frac{(a-x)bXcdx}{A}$, ob dimensiones literae a in functionibus X et A similes, et sese destruentes, semper in numeratore duas literae a dimensiones superare, quando post integrationem x aequatur a . Eandem conclusionem Parentius alia methodo directe inuenerat, qua tensionum leges non sine artificio euitauerat. (*)

§. 16. Fateor hic, quod saepe alias testatus sum, videri mihi, quod *resistentiae* fibrarum maiores sint, quam pro extensionis ratione. Nescio, annon ambigui aliquid in hypothesin §. 11. irrepsit. Dicitur, extensiones esse viribus tendentibus propor-

Y 2

tio-

(*) v. Memor. Acad. Scient. Paris. 1708. p. 20. et Histór. eiusd. anni p. 142.

tionales; Resistentias esse aequales momento tensionis certum est. Sed cur ipsa extensio debet esse proportionalis vi tendenti? An fieri non potest, ut maior sit renifus fibrae, quam pro extensione actuali? Equidem id ex structura definiendum esset, si structuram penitus cognosceremus; quoniam id fieri non potest, experimentis rem tentare oportet; eademque colligere in hypothesin, quoad fieri poterit, simplicem et verae proximam.

§. 17. Simplicissimae sunt hypotheses, quae curvam resistentiarum assumunt generis parabolici, sic, ut $v = \frac{b(a-x)^m}{a^m}$. Examinaui primo, quid pro-

deat, si m fiat $= \frac{3}{2}$, hoc est: $P = \frac{2}{7}Q$. Monet enim *Mariottus* in experimentis P fuisse maius quam $\frac{1}{4}Q$ et $< \frac{1}{3}Q$, hoc est $> \frac{2}{8}Q$ et $< \frac{2}{6}Q$, supponendo $g = a$. Cum vero haec hypothesis exigeretur ad experimentum *Mariotti* p. 358. sq. propositum, prodiit ex assumta $m = \frac{3}{2}$, pondus $Q = 7 \times 47$ libr. $= 329$ libr., cum in experimento ipso esset 330. libr.

§. 18. Fecit hic successus, ut directe inquirendum exponentis m valorem statuerim. Est vero $P = \frac{bc}{g} \cdot \frac{a^2}{m+2}$. et $Q = bca$, hoc est $P = \frac{a}{(m+2)g} Q$ unde fit $m = \frac{aQ}{gP} - 2$. Iam in facto *Mariotti* l. c. fuit distantia ponderis P , siue $g = 47$ lin. ipsum $P = 6$ libr. et Altitudo $a = 3$ lin. Pondus autem $Q = 330$. quare $m = \frac{aQ}{gP} - 2 = \frac{3 \times 330}{6 \times 47} - 2 = \frac{71}{47} = 1 \frac{24}{47}$, hoc est, proxime $= 1 \frac{1}{2}$.

§. 19.

§. 19. Quod autem in ligno tentauimus, idem de vitro quoque ad aliud *Mariotti* experimentum (*) peregrimus. Monet ille, cum per *Galilaei* leges expectaretur ruptura Cylindruli vitrei a pondere Q 30 libr., frustratum se effectu, donec librae omnino 50 adhiberentur. Apud *Galilaenum* est $P = \frac{1}{2}Q$, in nostra de ligno hypothesi $P = \frac{2}{7}Q$. Itaque sit $\frac{2}{7} : \frac{1}{2} = 30$ ad pondus experimenti, quod exit $= 52\frac{1}{2}$ libr. commodius utique, quam si P facias $\frac{1}{3}$ vel $\frac{1}{4}Q$, adeoque pondus Q librarum 45 vel 60, sed tamen experimento minus conformiter. Igitur inuersa ratione praestat inquirere in valorem ipsius m , ex aequatione $\frac{30}{2} = \frac{50}{m+2}$ hoc est: $50 : 30 = \frac{1}{2} : \frac{1}{m+2} (= \frac{3}{10})$ vnde fit $m = \frac{4}{3}$, et $v = \frac{b(a-x)^{\frac{4}{3}}}{a^{\frac{4}{3}}}$, quod, nisi fallor, naturae vitri non male conuenit. Conferrem ligni et vitri resistentias ad se inuicem, si posterioris Cylindri dimensionem annotasset Vir egregius.

§. 20. Sunt experimenta quoque fidibus instituta a *Jac. Bernoullio*. Ille chordam 3 pedes longam extendit pondere librarum 2, 4, 6, 8, viditque crescere longitudinem lineis 9, 17, 23, 27. (**)

Si extensiones viribus proportionales essent, aucta longitudo fuisset lineis, 9, 18, 27, 36, quod longe differt a priori ratione. Sed si nostram examines rationem, faciendo, vt resistentiae sint ad extensiones in ratione subduplicata Cubi extensionis,

Y 3

pro-

(*) vid. du Mouu. des Eaux p. m. 360. (**) Memor. Acad. Scient. Paris. 1705. p. m. 235.

proxime ad rationem experimentorum accedes. Sit enim $v = b(a-x)^{\frac{3}{2}} : a^{\frac{3}{2}}$ et ponatur $b = a = 1$. et $a-x = z$, sic vt $v = z^{\frac{3}{2}}$ exhibeat v resistantiam vi trahenti aequalem §. 16. et z proportionem extensionis. Substituendo igitur in locum v valores 2, 4, 6, 8, vt fiat $S = z^{\frac{3}{2}}$, $6 = z^{\frac{3}{2}}$ etc. exhibunt pro z numeri proportionales, 15, 25, 23, 40, quorum proxime eadem est ratio cum superioribus, 9, 17, 23, 27. Ex aduerso, si feceris $v = z^{\frac{4}{3}}$ numeri sequentur parum commodi.

§. 21. Plura haecenus experimenta huc pertinentia, ad manum non sunt, erunt autem suo tempore: atque tum licebit inquirere plenius in eam legem, quam tensiones habent ad resistantias. Plures nimirum vtriusque termini requiruntur. Interim illud facile patet, ob formulam $P = \frac{aQ}{g(m+2)}$ datis quatuor literis inueniri quintam; supponendo semper curuam resistantiarum esse sub formula $v = b(a-x)^m : a^m$, quod vtique necessarium non est, sed in praxi commodum foret, et, si recte speramus, a valore iusto non multum abluet.

§. 22. Ista de hypothesi, quae *solum* spectat fibrarum *extensionem*. Sequitur *altera* consideratio, qua extensioni *compressio* additur: Non enim extendi solum fibras in A contingit, sed comprimi etiam oppositas in D. Primus, quod publice constet, *Mariottus* hoc argumentum examinavit, in secunda de motu Aquarum editione. Secuti sunt non mul-

to post *Jac. Bernoulli*, et *Parentius*. Quaeritur autem, quanta ad rumpendam trabem vis requiratur, cum extendi illa superius et inferius comprimi potest. Abeunt in diuersa *Viri* eximii. *Alteri* hanc vim aequant illi, quae requiratur, cum nulla fit compressio: *Alter* minorem facit in ratione altitudinis fibrarum tenfarum ad altitudinem totius trabis. *Mibi*, si quid iudico, inter vtramque aestimationem placet esse medio.

Fig. 6,

§. 23. *Mariottus* vult, trabem ABCD, sic affici ab actione ponderis P, vt, diuisa altitudine AD in duas partes aequales AI et ID, fibrae superiores inter A et I positae extendantur, et comprimantur inferiores ab I ad D. Vult porro, resistentiam, quam compressioni suae opponunt fibrae lignae, ceteris paribus, esse aequalem et similem illi resistentiae, qua extensioni renituntur. Atque hinc demum infert: dimidium ponderis P(=L) agere in fibras AI extendendo illas, et dimidium eiusdem ponderis P(=M) comprimere fibras ID. Praeterea ad fibras AI tendendas requiri ex § XI. pondus $L = \frac{Q \cdot IA}{3 \cdot IF}$: Itaque pondus P=L+M esse $= \frac{2 \cdot Q \cdot IA}{3 \cdot IF} = \frac{Q \cdot AD}{3 \cdot IF}$, quod idem est, cum pondere eius casus, vbi nullam fieri compressionem, sed omnes ab A ad D fibras extendi diximus §. XI. Igitur si rationem sic ineas, alter in alterum casus resoluitur.

Fig. 7.

§. 24. Equidem hic nemini non in mentem veniet: gratis vtique et contra oculorum fidem fingi limitem extensionis et compressionis in medio altitudinis AD. Si tamen cetera bene habeant, nihil haec

haec animaduersio morari conclusionem poterit. Sit punctum I in quacunque altitudinis AD parte positum: Dederis *Mariotto*, quod postulat, compressionis eandem esse, quae extensionis, rationem; dederis, quod tacite inuoluit, punctum I esse fulcrum extensionis aequae ac compressionis; Perfecta res erit ex voto Viri. Nimirum, ponderis P pars vna S, quae extensionem praestat fibrarum IA super fulcro I, erit $\frac{Q \cdot IA}{3 \cdot IF}$, et altera T, quae comprimit ID super fulcro I, erit $\frac{Q \cdot ID}{3 \cdot IF}$: itaque ipsum $P = S + T = \frac{Q \cdot (IA + ID)}{3 \cdot IF} = \frac{Q \cdot AD}{3 \cdot IF}$, planè vt intenditur.

§. 25. Compressionem quidem aliis regi legibus, vulgo credimus. Id tamen non accidit hic omnino incommode. Si enim maior quam pro ipsa compressione resistentia est fibrae pressae, pondus T prodit $< \frac{Q \cdot ID}{3 \cdot IF}$, non praeter experientiam, quae $P < \frac{Q \cdot AD}{3 \cdot IF}$. Etsi igitur vtriusque casus §. XI. XXIII. aequivalentia non subsistat, nisi eadem extensionis et compressionis ratio fuerit: non tamen haec aestimandi methodus multum ab experimentis abluet.

Fig. 8.

§. 26. An punctum I commode pro fulcro haberi possit: dubia magis ratio est. Equidem fibra lignea in I nullam videtur vim pati, adeoque nec fulcri locum subire: nihil tamen haecenus absurdi sequitur, si ex puncto illo tanquam fulcro computes momenta extensionis et compressionis. Id ita intelligitur. Sit punctum O eiusmodi, vt summa resistentiarum tensionis absolutarum collecta in centrum O aequipolleat momento suo summae resistentiarum.

stentiarum respectuarum super fulcro I: prodibit vectis OIF, cui in O resistentia, et in F pondus S applicantur circa hypomochlium I. Eritque completo parallelogrammo IOHF; et producta HI in K, nisus fulcri I secundum lineam IK, et proportionalis lineae IH, si resistentiae absolutae sint vt OH, et pondus S vt linea HF. Similiter sit Y centrum resistentiarum compressionis, erit nisus fulcri I in linea IG, et eidem proportionalis, si summa resistentiarum absolutarum omnium exponatur per YG, et pondus T per lineam IY. Ex quo patet, punctum I ob nisum IN extensioni aduersantem, et nisum IF compressioni oppositum, nec extendi debere nec comprimi, etsi fulcrum sit tensionis aequae ac compressionis. Certum tamen est, illud deorsum vrgeri pro ratione lineae OY.

§. 27. Id obiter animaduertas: 1. Resistentiam quidem fibrarum tenfarum in directione HO eandem esse, quae compressarum in directione YG sed 2. momentum compressionis vniuersum longe minus esse momento fibrarum tenfarum, et quidem 3 in ratione lineae YI ad IO, hoc est ID ad A, si eadem compressionis et extensionis leges fuerint; sin 4. fibrarum pressarum renisus in maiori ratione crescant, quam resistentiae extenfarum, fore illa quidem in ratione YI ad IO, sed $YI:IO < ID:IA$, quod iam ante diximus.

§. 28. Breuiorem videtur *viam* iniisse *Vir insignis*, cuius hoc est ratiocinium. Fulciatur trabs in puncto A, vt extendi solum superiores fibrae

debeant, nihil comprimantur inferiores. Extendentur ab actione ponderis P fibrae per $\triangle BAF$. Eo facto, fulciatur in F, nec extendi amplius, sed comprimi patiatur: comprimantur ab eadem actione fibrae in $\triangle AFG$. Jam, si sine fulcris trabem sibi reliquisses, statim ab initio in situm FG peruenisset ab actione eadem ponderis P. Igitur vis eadem est, quae fibras $\triangle BSF$ extendit, et fibras $\triangle ASF$ comprimit, cum ea, quae vel extendit fibras $\triangle ABF$, vel comprimit fibras $\triangle AFG$. *Atque iterum:* Cum fibra H super fulcro A extenditur ad HK, et super fulcro F comprimitur per KI, perinde est; ac si tensa esset solum per $HI=HK-KI$. Sic et fibra N extensa super fulcro A per NM, et compressa super fulcro F per ML exhibet fibram compressam solum per $NL=ML-NM$. Sed omnes HI et NL efficiunt $\triangle BSF$ et $\triangle ASG$, non fecus atque omnes lineae HK, faciunt $\triangle ABF$, et omnes KI triangulum $\triangle AFG$.

Fig. 9.

§. 29. Acute id vero, si quicquam aliud. *Vnum* desidero pro mea tarditate. Cum *fulcri* tantus in momentum resistentiae influxus est: unde constat, id momenti, quod in singulis casibus simplicibus a distantia fulcrorum A, vel F oritur, compensari exacte per utriusque casus combinationem, sine fulcris factam? Certum est, situm trabis eundem prodire per suppositiones Viri duas sibi succedentes, qui per compositam exit: sed an ideo *momentum resistentiae* idem prodit *remotis*, quae posuit, *fulcris*. Non esse hanc de nihilo sollicitudinem, patebit plenius, si eandem ad ratiocinium applices secundum. Di-

citur: Cum fibra H super fulcro A extenditur ad HK, et super fulcro F comprimitur per KI perinde est, ac si tensa esset solum per $HI = HK - KI$. Recte id profecto, si praeter spatium extensionis nihil spectaueris. Non licet autem similiter inferre: Momentum fibrae H, super fulcro A extensae, per HK, si demas momentum fibrae KI super fulcro F compressae, aequialet resistentiae fibrae $HI (= HK - KI)$ extensae sine fulcro. Quod si igitur recte Vir magnus intulit, *suppleri* ratiocinium dilucidatione noua et potest et debet.

§. 30. Tractemus negotium *sine omni artificio*. Si nullam trabs compressionem patitur, erit A fulcrum extensionis fibrarum in $\triangle BAF$: eritque nisus, quo fulcrum A vrgetur in directione lineae AK, et proportionalis lineae $AK = AH$, si pondus P exponitur per AO distantiam centri tensionis §. 26. et resistentia fibrarum absoluta per OH. Tolle fulcrum, et patere, vt compressionem admittat lignum: vtique hic ipse nisus comprimet fibram in A, cumque ea cedere non possit, quin et proxima nonnihil concedat: comprimuntur fibrae contiguae omnes, donec resistentia earundem coniuncta aequet nisum, qui fulcro incumbit. Fingamus id accidere, cum pars fibrarum $\triangle ASG$ inclusa sic comprimitur, vt sectio trabis sit FSG. Hic vtique nec A fulcrum erit fibrarum tenfarum, nec S. Singulae potius fibrae inter S et A, vel S et G positae fulcri, sed partialis rationem habent, vnaquaeque pro suae compressionis modulo.

§. 31. Hic vero statim patebit, quoniam minus est momentum fibrarum inter S et B tenfarum, quatenus referuntur ad fulcra prope S posita, quam ad ipsum A: Minus esse momentum resistentiae vniuersae in hoc casu, quam in priori, quo nulla fiebat compressio. Ex aduerso, quoniam maius est tensionis momentum, quatenus illa refertur ad fulcra prope A posita, quam ad fulcrum S: igitur momentum totale maius fore, quam si sola spectaretur extensio fibrarum trianguli BSF relata ad fulcrum S. Quodsi igitur omnes haec inaequales sustentationes mutuo compensentur, fingi potest punctum inter S et A positum, quod pro fulcro haberi possit.

§. 32. Equidem, si cognitae essent leges compressionis et resistentiarum eius: posset huius puncti distantia ab S vel A definiri: S autem per experimenta capi. Quoniam id non licet: fingi punctum hoc potest, v. g. in Z, et instrui computus, vt deinde collatis experientiae conclusionibus innotescat, quam prope absumus a veritate.

Fig. II.

§. 33. Sit $AB=a$, $BF=b$, $BS=c$, cognoscendo c per experimenta. Sit porro $BP=x$, et $BZ=p$, distantia haecenus incognita, sed in momento rupturae constans. Erit vis fibrae PM absoluta (posita lege Marioti §. 11.) proportionalis ipsi PM. Adeoque $BS:BF=PS:PM$, hoc est $c:b=c-x:\frac{(c-x)b}{c}$: et vis totius elementi $PpM=dx\frac{bc-bx}{c}$, quae ducta in distantiam a fulcro Z, hoc est in $PZ=p-x$, dat resistentiam respectiuam $=\frac{pbe-pbx}{c}dx$

$dx + \frac{bx^2 - bcx}{c} dx$. Vnde vis totius spatii BPMF = $pbx - \frac{pbx^2}{2c} + \frac{bx^2}{3c} - \frac{bx^2}{2}$, et faciendo $x=c$, summa totius resistentiae trabis $\frac{1}{2}pbc - \frac{1}{8}bc^2 = Pg$ ex §. 11. vnde fit $p = \frac{6Pg + bc^2}{3bc} = \frac{2Pg}{bc} + \frac{1}{3}c$, et si $p=a=c$, vti §. XI. erit $Pg = \frac{1}{3}ba^2$.

§. 34. Sit exempli gratia $c=a-q$ et $p=a-\frac{1}{2}q$ et $q=\frac{1}{10}$ adeoque $c=\frac{9}{10}a$ et $p=\frac{19}{20}a$, fiet $Pg=\frac{7}{24}ba^2$ quod proxime accedit ad id, quod supra inuenimus, §. 11. vbi $Pg=\frac{2}{7}ba^2$ hoc est $=\frac{14}{49}ba^2$. Cumque constet, in experimentis Pg cadere inter $\frac{1}{3}ba^2$ et $\frac{1}{4}ba^2$: possunt facile limites assignari, inter quos consistere debet q , si facias $Az=zs$, quod aut proxime verum erit, aut eiusmodi saltem, vt errorem gignere sensibilem non possit. Si enim feceris $c=\frac{m}{n}a$, prodibit $c=a$, et $p=a$ pro formula $Pg=\frac{1}{3}ba^2$: et $c=\frac{1582}{2000}a$, sine $\frac{16}{20}a=\frac{4}{5}a$, $p=\frac{n+m}{2n}a=\frac{9}{10}a$ pro aequatione $Pg=\frac{1}{4}ba^2$. Non potest igitur AS maius esse, quam $\frac{1}{5}a$, nisi aut methodus nostra, aut aliquod e suppositis, fefellerit.

§. 35. Quomodo haec ad experimenta exigi debeant, quidue per illa eruatur, fortassis alias dicendi locus erit, cum tandem aliquando patientia nostra, aut flagitandi importunitas, expugnauerit opificum tarditatem. Suffecerit interea temporis ostendisse, in quo hypotheses haecenus adhibitae aut deficiant, aut videantur deficere.

DE
TRACHEIS PLANTARUM
EX MELONE OBSERUATIO

G. B. Bulffingeri.

M. Sept.
1729.

Cum nudius tertius (d. 3. Sept. 1729.)
Melonem plantam tribus maturis fructibus
commendabilem in hortulo meo ex terra
extraherem, excitauit figura radicum ex-
terior cupiditatem inquirendi in structuram eius. Ea
autem oculis subiecta *Trachearum forma* adeo placu-
it, vt eandem per integram persequi plantam ope-
rae pretium iudicauerim. Non enim vbique videas
explicite, quae hic distincte patent.

Phaenomena

haec sunt: 1. secta transversim radix praeter
corticem, etc. plurima obtutui foramina obiicit,
maiora aut minora, prout radice fortior portio
fuerit. Patent illa nudo oculo facillime. 2. Colli-
guntur autem in fasciculos quasi circa axem radice.
Eorum tres vidi in minoribus radicum furculis, in
maioribus quatuor, estque materia in qua conspici-
untur diuersa ab ambiente, et durior. 3. Pleri-
que horum fasciculorum denuo in suas, et plerumque
tres, partes diuisae sunt, sensibilibus, suntque inter-
capedines repletæ materia eadem, qua ambitus.
4. Si plures successiue orbiculos examines (seu nu-
do oculo, seu armato) foraminum idem ordo est,
et

et numerus. 5. Cum frusta duos, tres, quinque, octo pollices longa et tortuosa abscinderem, licuit et aerem et humores trans illa sugere. 6. Perinde etiam fuit, seu a radice seu caule frusta illa abscinderem; quin imo 7. cum eiusmodi frusta partem radicis et trunci complecterentur, transit aer, siue per eam extremitatem, quae radix erat, siue per alteram insufflaretur. Iuuat autem fluido immergere extremitatem frusti, vt egredientes ex fluido bullulae transitum aeris ostendant. 8. In trunco seu caule plantae duodecim distinguere fasciculos eiusmodi constanter licet, foraminibus suis insignes; 9. Vacua esse foramina ad sensum patet, maxime si orbiculi inter lumen et oculum ponantur medii. 10. Numerus et ordo et magnitudo foraminum in singulis fasciculis non nihil differre visus est: sed in eodem fasciculo, quem in pluribus orbiculis sibi succedentibus examinaui, differentiam sensibilem nullam vidi. 11. Idem fuit fasciculorum numerus, siue propius ad radicem secaretur canlis, siue remotius. 12. Quin imo idem numerus in ramis; 13. Idem in furculo tendente ad fructum, 14. et idem plerumque numerus cellularum in ipso fructu, saltem vbi perfectus apparuit; namque in aliis decem aliquando aut vndecim numeravi. 15. In pedunculis fructuum plures conspiciuntur quam duodecim, sed ramificationes sunt illorum duodecim, qui ex furculo veniunt, vti videre est, si nudentur vestimento suo fibrae hae ad vsque originem pedunculi. Contra vero 16. in pedunculis foliorum tales fasci-

culi

culi non nisi nouem apparent, quinque omnino fortiores, ex parte conuexa pedunculi, duo mediores, et duo tenuissimi in vicinia eius crenae, quae observatur in latere folii ad furculum conuerso. 17. Habent illa originem ex nouem fasciculis caulis sibi subiectis; tres enim in parte caulis, qua folium non respicit, sine bifurcatione aut diuisione ad folium tendente, eunt ulterius, et 18. ad nouum folium formandum pergunt, sic, vt folia semper ab alternis generentur fasciculis. 19. Vbi pedunculus in folium expanditur, tres fasciculi medii formant tres costas folii maiores, singuli singulas: sed duae laterales costae formantur reliquis tribus minoribus fasciculis, in quibus tamen aliquando duo tantum, aliquando tres distincti apparent. 20. In singulas costarum ramificationes abit fasciculi praedicti aliqua pars, quousque rem licuit persequi. 21. Illud notabile est, fasciculos eiusmodi continuatos tam in caule, quam in pedunculis foliorum, fibrae alicuius lignae subalbidae speciem referre: et 22. si diutius continetur, vt v. g. in ramis tenuioribus, vel in pedunculis foliorum, fieri, vt foramina eorum non amplius sint conspicua, ne quidem optimis si vtare microscopiis. 23. Cum alicubi prope folii insertionem caulis et folium computruerit, distincte licuit fibras hasce, seu fasciculos extrahere, duodecim ex caule, ex folio nouem, diuersae, vt supra diximus, crassitiei. Habebant illae foramina sua satis conspicua. 24. Foramen in medio caulis obuium in radice, et foliis non conspicitur. 25. Circa furculorum
rum

rum origines, etsi mihi nondum satis fecerim, vidi hoc tamen. Esse eo loco, cui interior folii ortus respondet, diaphragma medium caulem occupans, viridiusculum, in quod fibrae caulis facta sui bifurcatione inferantur lateraliter. 26. Tum vero, ex eo latere, vbi furculus est, egressae illae formant quasi membranam, qua furculi exortus integitur; 27. Ea autem membrana denuo in duodecim fasciculos colligitur, atque sic, vt ante diximus, pergunt deinceps fasciculi, quorum aliquando 28. Decem tantum, aut vndecim numerantur, donec sese diuidant, qui casu aliquo nimis propinque quasi cohaeserant.

Conclusiones.

Patet autem ex dictis, decidi posthac *de tracheis plantarum* quaestionem.

1. Si trachea est canaliculus continuus, aere solo plenus, et lateribus fortioribus compositus: Sunt vtique trachearum fasciculi, quos haecenus descripsimus. Canales enim vacuos probant phaenomena 4-10. Neque obest 2. in plantis compluribus non posse foramina vel microscopiis detegi; nam propter phaen. 22. credibile est, vel minora esse, vel dum rescantur orbiculi foramina succo obstrui ex fibris contiguis expresso. 3. Videmus, per vniuersam plantae substantiam tracheas istas protendi, magna vniformitate. 4. Includi vero fibris, quas vulgo ligneas vocamus, et ex earundem contextu quasi formari. 5. An ipsae hae fibrae praeter cavitates

hasce aere plenas, succum ferant in aliis minoribus
 cavitatibus: non facile dixerim; sunt ad sensum
 multo reliquis fibris sicciore, et quales apparere
 debent, quae praeter sui nutritium non habent suc-
 cum alium; 6. Reuehere illas succum a plantarum
 nutritione reducem, coniectura est Viri docti apud
Wolfium T. II. Phys. p. 626. Id post obseruationes
 nostras non est verosimile. Originem enim conie-
 ctationi dedit sine dubio, quod foramina nostra non
 apparent. 7. An situs harum trachearum inter
 fibrarum viridium et vtricularum ordines patrocini-
 netur explicationi receptae de eleuatione succi nu-
 tritii per actionem systalticam trachearum, in id
 non inquiram. 8. Foramen in medio caule credo
 tribni posse expansioni fibrarum viridium, et vtri-
 cularum, qua etiam fit, vt fasciculi in radice colle-
 cti discerpantur, et e quatuor tripartitis fiant duo-
 decim. 9. Debemus autem teneritudini plantae et
 trachearum amplitudini, vt sine artificio illas dete-
 gere et persequi possimus. Ita enim se sponte nobis
 obtulit, quod difficiliore methodo inquirendum sibi
 proposuit *Christ. Wolfius* T. II. Phys. p. 639. 10.
 Intelligimus quoque, quid lignea pars ad nutritio-
 nem conferat, si in fibris ligneis, non alibi, tra-
 cheae sunt, et cur insitiones non succedant, nisi
 furculus partem ligneam intret. v. Hist. de l' Acad.
 1711. p. 56. Namque in ligneis tracheae collo-
 cantur fibris, vt igitur cum illis communicent tra-
 cheae furculi inserendi, necessum est, vt eas fibras
 intrent. Quicquid autem sit de reliquis nutritionis
 plan-

plantarum momentis, maneamus **II.** hac vice in eo, quod ad veritatem *existentiae trachearum* pertinet. Scilicet haec certa et sufficiens observationis nostrae utilitas est, quod posthac *dubium* cessare possit Virorum Magnorum, quod more suo iucunde extulit *illustris Fontenellius*, ubi suam de plantarum nutritione expositionem hisce verbis concludit:

„Si on entroit dans un plus grand detail, on y mettroit aussi plus de coniectures, et plus d'incertitude. On iroit iusqu'aux vtricules, aux infertions, et aux *Trachées*, parties des plantes, que de grands Auteurs, à la verité, ont voulu établir, et qui pourroient exister, mais qu'il faut avouer, qu'on ne voit gueres avec les meilleurs microscopes, qu'autant qu'on a envie de les voir. v. Hist. de l'Acad. 1711. p. 65.“ Edit. Bat.

DE
VENTRICULO ET INTESTINIS.

AUCTORE

Jo. Ceorg. Du vernoi.

Artic. I.

DE VENTRICULO.

§. I.

Mense Jun,
1729.

In Ventriculo, pulcherrimum opus olim a *Sevisum* fuisse testatur *Celeb. Rhyssch*, hisce verbis; „In Stomacho inuerso non solum innumerocurrunt pori visibiles. - - Verum etiam antequam stomachus in os inferius exeat, alia Phaeno-

Aa 2

„me-

„mena mihi patefacta sunt, sc. innumerae et minutissimae cellulosae intercapedines quadrangulares, diuersae magnitudinis, quae analogiam habent cum illis quae reperiuntur in stomacho vitulino, et quidem ea parte quae belgice audit *de Kraag*, sunt tamen longe maiores quam in stomacho humano. vid. Thef. anatom. 2. As. III. N. 14.

§. 2. Post *Rbuischium*, ante 4 fere annos, eius Rei mentionem factam fuisse a Viro Cel. *Jo. Dominic: Santorini* animaduerto, qui in praeclaro Obs. anat. Libro, cap. IX. art. 6. mentem suam ita explicat. *Minutissimas, inquit, cellulosas intercapedines quadrangulares, quas praeclariss. Rbuisch in stomachi fundo animaduertit, diligentissime perquisitas, nunquam tamen detegere vel nostris vel alienis oculis valuimus, quas non idcirco diligentiss. Virum vidisse negabimus, quum fortasse nec ubique nec cuique id ipsum saepe varia natura demonstrat.* De hocce itaque elegantissimo Naturae opere in cauo ventriculi, *Rbuischiano* scil. inuento, Obseruationes quasdam rariores, ex vtraque Anatome depromptas modo sum prolaturus.

§. 3. Prima occasio oblata est, in quodam viro *Veneno* extincto, ex quo figura quoque gemini ductus thoracici desumpta fuit, quam in I. Tom. Commentar. Petropolit. videre licet. Postquam Veneni gratia, sollicite stomachum explorassem, multisque lotionibus quasi dealbasssem, ecce! in nonnullis locis, Reticulatum opus, minutissimorum filamentorum niveo colore splendentium, mire sese implicantium, ac inter capedines cineritii coloris efformantium,
nu-

nudo oculo obseruare mihi visus sum. Id cum admirabili fibrarum contextu in foliis et corticibus quarundam plantarum conspicuo, vel cum dorsi manus lineolis fere analogiam habet.

2. In Iuuenis viri stomacho, ope microscopii, quasdam similibus cellularum areas obseruavi, nec non in duobus aliis, in quibus magna ventriculi distensio conspicua erat. In aliis tamen cadaueribus idem successus defuit.

3. Ne autem causae alicui praeternaturali, forte veneno vel imaginationi hocce phaenomenon tribuatur, perpendendum est similem nos detexisse in stomacho *Elephanti* texturam, sed longe conspectiorem euidentioremq; super totam ventriculi superficiem extensam, quemadmodum inter huius Animalis praeparata No. 16. in Ventriculi Elephantini extremitate dextra, in Museo Imperiali id conspiciere datur.

§. 4. Huius itaque admirandae texturae facies in citatis exemplis sic luculenter nobis oblata est. Congeries erat subtilissimorum, instar telae aranearum, visum pene effugientium filamentorum, niueo colore splendentium, ac denique retis in modum facta inuicem implicatione summam cavitatis ventriculi superficiem lambentium. Hisce, frequentissimae interiacebant angustissimae intercapedines, seu aluoli aut spatiola profunditate ad visum carentia, cinericii coloris, quibus *Cel. Rbuy. b.* nomen intercapedinum quadrangularem affluxit. Mihi omnes haud quadrangulares apparuere, verum irregulares plurimae,

quaedam rotundae. Distenta et diducta tunica praefata, eae haud minus apparebant. Magnitudo instar minimi grani fabuli. Numerus ineffabilis.

§. 5. Determinare aut diuinare naturam et qualitatem istius opificii, et cuiusmodi vsui a natura illud comparatum sit, haud procliuè est. An contextus vasculosus? quemadmodum prima fronte suspicatus sum. Sed Scrutator Vasorum Solertissimus *Rhuyfbius* id pro tali non agnoscit. Notum autem est, quanta *Rhuyfchii* sagacitas fuerit ac industria, in erendis vasculis minimis ad stuporem et inuidiam usque. 2. Obseruare minima vascula in superficie ventriculi interiore quae crusta vocatur, contra morem est minimorum vasculorum, quae nusquam nude apparent, verum artis iniectoriae beneficio demum sub oculos cadunt. An denique corpus reticulare? analogum linguae aut curis corpori reticulato Id sane disquisitione dignum est.

§. 6. Subiit aliquando cogitatio forte contextum nerueum esse ventriculo proprium, a quo sensatio ventriculi immediate oritur. Equidem haud dissimulandum est, Nervi ad ventriculum aliasque partes tendentium exteriorem magis habitum innotuisse haecenus quam ultimos fines, vltima capillamenta modificationesque eorundem in fabrica seu contextu nerueae tunicae praefatarum partium in qua omnes nervi congregantur, eorumque nervorum, cum in ventriculo, tum in plurimis aliis partibus, singulares ac specificas dispositiones minus perspectas esse. Namque vnum ac idem generale et com-

commune structurae genus in plerisque neruearum tunicarum descriptionibus exponitur. Nullum aut perexiguum discrimen in earundem conformatione, quoad incessam contextumque neruorum annotatum video. Verum simplex tela membranacea vasis sanguineis picta propter sentiendi facultatem neruea appellatur, etsi in ea nerui nequaquam appareant. Idcirco sapienter Ceb. *Rhuyfchius*. *Notauit inquit iam dudum extrema vasorum sanguiferorum singulis fere plagis corporis quam maxime differre in structura qua constant. Verum etiam didici deinde id ipsum quoque in neruorum obtinere extremis.* Id Naturae profecto valde consentaneum esse arbitratus sum; sed quoad *Papillarum* hypothesein, ea admodum problematica mihi visa est, si ad interiores aequae ac exteriores partes corporis Humani extenditur, quoniam vbi sensationes partium ac impressiones corporum Agentium adeo discrepantes sunt, ibi extremorum neruorum fabricam sub formis ac speciebus distinctis ac singularibus animo concipere necesse est, donec experientia rerum magistra contrarium edoceat, id quod in ventriculo futurum vix praesumo, propter papillarum solidam crassam ac rudem indolem, quae loca amat pilis, pinguedine, corpore reticulato aspera tendineaque, vti sunt Lingua et Cutis; tum etiam propter memoratum contextum in ventriculo detectum, quem vt Organum immediatum considero sensationum ac effectuum admirandorum, quos in Homine seu sano seu aegrotato peragi videmus.

Artic. 2.

DE INTESTINIS.

§. 7. In verso intestino vasisque sanguiferis probe distentis, aufer tunicam nerueam, sed prospice, vt caetera loco haud moueantur: Sic obseruabis iuga seu valuulas intestinales constanter apparere, sicuti ante detractam nerueam tunicam: Viceuersa eandem planam reddi rugis euanescentibus. Hocce Experimento didici, 1. Sedem veram valuularum intestinalium in tunica neruea aut villosa perperam statui. 2. Tunicam nerueam praefatas Valuulas haud efficere, sed solummodo inuestire, iisque vt vestimentum sese accommodare, vnde eius longitudo oritur. 3. Intelligitur quoque ratio seu causa, cur annotante *Rhuyfchio* Valuulae saepe concidant ac interdum oblitterentur Homine aegrotante.

Pinguedo duobus in locis intra intestini tunicas inclusa obseruatur: Namque 1. sub tunica extrema, quae lamellarum mesenterii productio ac continuatio est, prouti Tom. I. Commentar. Petrop. indicaui, stratum apparet celluloso - adiposum, tenue, in modum telae complanatum, cuius similiter originem a mesenterio eiusque septo intermedio c.l. repetii, quod postquam ad intestinioram pertingit, eo nequaquam subsistit, sed inter extimam et muscularem tunicam serpendo, speciem tunicae nouae efformat: Hanc ab Inuentore *Rhuyfchii* tunicam appellabimus cellulosam *Rhuyfchii*, quae ad praesens modo institutum haud proprie pertinet, nisi qua-

quatenus ea connexionem fortassis obtinet cum alio strato pinguedinis, ad formationem valuularum intestinalium proxime inseruiente;

§. 9. Ista pinguedo, a praecedente ita distat vt inter eas duo alia innolucra, vnum carneum seu musculare, alterum vasculosum ex capacibus amplisque vasis sanguineis arcuatis constans, locum occupent, super quae vasa praefata pinguedo eminent ac vna cum ipsis iuga supra memorata efformat, quibus neruea tunica postremo agglutinata ac telae instar imposita est: Tres itaque diuersi generis partes ad fabricam valuularum necessariae sunt. 1. Vasa maiora arcuata seu fornicata. 2. Adeps seu pinguedo. 3. Tunica neruea. Quare vbi vasa arcuata deficiunt, in interstitio scilicet duarum valuularum, ibi neque pinguedo neque neruea tumorem seu iugum excitant, sed complanatam superficiem exhibent. Rursus, quando vasa nimis compressa aut vacua sunt defectusque pinguedinis adest, necesse est eo in casu deprimi iuga, sicuti consideranti patet. Postremo obseruavi in nonnullis cadaueribus, ab alia causa deletas fuisse Valuulas, quando nimirum Aër cellulas adiposas ita inflat et expandit, vt tumore exinde enato cavitates intestini fere occludatur. Sed de hocce Tumorum intestinalium genere alias.

EXPERIMENTA

CORAM SOCIETATE INSTITUTA IN CONFIRMATIONEM THEORIAE PRESSIONUM QUAS LATERA CANALIS AB AQUA TRANSFLUENTE SUSTINENT.

A

Daniele Bernoulli Job. Fil.

Tab. XVII.

Quaenam sit pressio aquarum in vase stagnantium a remotissimis temporibus fuit omnibus notum. Nemo autem, quantum scio, pressionem aquarum per canales fluentium adhuc recte definiuit: fuerunt nonnulli, qui huius argumenti veluti in transitu mentionem facientes putarunt, latera canalium ab aquis siue stagnantibus siue transfluentibus perinde premi, si modo eadem utrobique fuerit aquarum altitudo: sed falsi sunt. Interim argumentum mihi visum fuit dignissimum, quod omni attentione examinaretur. Inde enim pendet vera aestimatio quantitatis aquae, quae per tubulos riuus lateraliter implantatos, erogatur, qua de re *Frontinus* egit et post eum multi alii: pendet etiam requisita aquaeductuum firmitas, multarumque quaestionum ad motum fluidorum in corpore animali pertinentium solutio et quae huiusmodi desideratorum sunt alia. Mox autem animaduerti, problema nostrum solui prius non posse quam motus aquarum recte definitus fuerit, et ita quidem definitus ut singulis momentis a quiete seu motus
ini-

initio vsque ad datum terminum maximas accelerationes innotescant: quae ratio est, quod ad tempora nostra vsque latuerit ista, quam fluida per canales mota exerceant, pressio; neque illam ego detecturus fuisset, nisi prius in theoriam generalem *de motu aquarum per canales quoscunque fluentium* incidissem, quam videre est in *Comment. Acad. Scient. Petrop. Tom. II. pag. 111.* Ope istius theoriae Staticam fluidorum motorum adornavi integram, cuius specimina quaedam hic apponam ceu exempla experimentis coram societate confirmata: Neque enim angusti limites huiusmodi Dissertationibus Academicis praescripti id aliter permittunt atque propterea malui omnia, quae in res aquarias feci meditata, in vnum congerere tractatum.

Finge igitur fistulam cylindricam castello amplitudinis veluti infinitae et aquae plenae horizontaliter implantatam, eiusque orificium externum digito obturatum puto: ita vides singulas fistulae partes secundum regulas ordinarias toti aquae altitudini conuenientes pressum iri. At vero cum remoto digito aquae per fistulam effluere incipiunt, mox diminuetur aquae pressio, imo tandem tota euanescet: neque tamen mutatio ista in instanti fiet, praesertim si longior fuerit fistula: dum demum tota euanescet, cum aqua omnem quam acquirere potest velocitatem habuerit; Id vero fit post tempus, si accurate loqui velimus, infinitum, quamuis tam celeriter acceleretur aquae motus, vt di-

cto citius tantum non totus, qui oriri potest, adfit, nisi aquae ductus castello praelongus insertus fuerit.

Si vero aquae non pleno orificio per fistulam erumpant, aquarum pressio non omnis tolletur, etiamsi aquae tota sua velocitate per fistulam transfluant.

Non attendemus ad illas pressionum mutationes, quae fiunt a fluxus initio, donec aquarum transfluxus censeretur aequabilis: dicemus saltem de vltima illa pressione quae effluxui aequabili conueniat: impedimentorum autem, quae effluxum aquarum per fistulam casu retardare possunt, veluti adhaesionis aquae ad latera tubi, contractionis venae effluentis a *Newtono* obseruatae (quae pariter casualis est totaque vitari potest) aliorumque similium nullam rationem habebimus.

Fuerint iam amplitudines fistulae eiusque orificii aquas emittentis vt m ad n ; altitudo aquae in castello supra fistulam $= a$: intèlligantur aquae pleno orificio totaque sua velocitatè, quae dictae altitudini a conueniat, effluere; pressio autem aquae obturato orificio cen proportionalis altitudini aquae indicetur per a : dico pressionem aquae per fistulam transfluentis fore aequalem $\frac{mm-nn}{mm}a$, atque proinde nullam si fuerit $m=n$, id est, si fistula tota fuerit aperta.

Vt istam fluidorum motorum Staticam experimentis confirmarem, vsus sum arca lignea, cuius latitudo erat vnus pedis longitudo trium pedum,
alti-

altitudo quatuordecim pollicum: hanc aqua impleui eiusque parti infimae fistulam accurate cylindricam ex ferro fabricatam infixi horizontaliter: Ita autem factus erat tubus iste ferreus. Longitudinem nempe habuit AB 4 poll. 2 lin. Angl. diametrum BC 7. lin. in medio tubus foraminulo *m* erat perforatus ibidemque tubulus DE pariter ferreus sex lineas longus ac sesquilineam in diametro habens afferuminatus erat, ita vt foraminulum *m* in medio basis foueret. Huic postmodum tubulo imposui tubum vitreum aequabilis amplitudinis vt apparet in figura tertia, quae modum totius experimenti indicat. Porro tria opercula confieri curavi tubo ferreo adaptata, foramine diuersae magnitudinis pertusa: tale operculum repraesentatur figura secunda.

Fig. 1.

Hisce omnibus coniunctis eum in modum quem ostendit figura tertia factoque ne aqua per alias rimas quam aperturam in BG efflueret, obturavi orificium in BC, tumque obseruavi in tubo vitreo verticaliter posito, punctum *n* ad quod aquae ascendebant, idque filo sericeo circumuoluto notavi: prius autem exploraueram virtutem capillarem istius tubi vitrei huncque inueneram quinque linearum, ita vt tubo aquae verticaliter immisso differentia inter vtramque superficiem aquae esset quinque linearum: propterea punctum *n* supra superficiem EF eleuatum fuit totidem lineis, hincque in calculo quaeuis altitudo *Dn*, *Dg* quinque lineis diminuta censenda est. In singulis experimentis arca aquis ita plena conser-

Fig. 2.

Fig. 3.

uata fuit vt altitudo AF effet 9 poll. 7 lin. altitudo autem Dn 10 poll. His omnibus ita ad experimentum praeparatis, tunc aperto orificio in BC aquis effluxus concedebatur et protinus descendit aqua in tubo vitreo, veluti ex *u* in *g*, quem locum *g* rursus alio notauimus filo sericeo, antea tubo circumuoluto. Et sic denique talia cepimus experimenta.

Experimentum 1. Cum diameter foraminis in operculo BC effet $2\frac{1}{2}$ lin. fuit descensus *ng* tantillo maior vna linea, ita vt nulla differentia inter theoriam et successum experimenti obseruari poterit.

Experimentum 2. Assumto alio operculo in quo diameter foraminis erat $3\frac{2}{5}$ lin. aut paululum maior descensus *ng* obseruatus fuit sex linearum cum duabus tertiis plane rursus vt theoria indicat.

Experimentum 3. Adhibito tertio operculo, in quo diameter foraminis erat quinque linearum aut aliquantulum minor: descensum *ng* obseruauimus 28. linearum. Vi theoriae debebat esse circiter 29 linearum nec enim foramen omnino quinque lineas in diametro habere visum fuit. Differentia paruula tribuenda est impedimentis, quae aqua in transfluxu per fistulam patitur, maioribus quam in praecedentibus experimentis ob auctum motum intra fistulam.

Experimentum 4. Denique nullo appposito operculo aquas pleno orificio effluere siuimus, tuncque omnis fere aqua è tubo vitreo egressa fuit: pars tamen aliqua remansit, quam deprehendimus octo lineas altam. Earum autem quinque tribuendae sunt

sunt virtuti tubi capillaris: tres reliquae debentur impedimentis, quae aqua in transfluxu à D vsque ad B offendit.

Sic igitur experimenta ad amissim cum theoria conueniunt. Inde autem non difficile est praevidere, fieri posse vt latera fistulae non solum non premantur versus exteriora, sed et vt versus axem fistulae introrsum comprimantur: Id autem edoctus sum hoc alio experimento.

Experimentum 5. Loco tubi cylindrici AB adhibui conicum, cuius orificium externum erat maius orificio interno, simulque vsus sum tubo vitreo incuruato, qualem ostendit figura 4. Et cum ante fluxum, aqua haesit in tubo vitreo in *n*, descendit in eodem tubo aqua vsque in *g*, cum aquae effluerent per tubum conicum; fuitque punctum *g* infra D: iudicio compressum fuisse durante fluxu tubum conicum. Sic his autem casibus impedimenta motus sunt insignia, quae faciunt vt velocitates aquae in orificio externo admodum minores sint, quam quae respondent altitudini aquae: hancque ob rationem altitudo puncti D supra *g* tanta non fuit quanta alias futura fuisset: fuit tamen aliqua.

Fig. 4.

Similem effectum alio obtinui modo, sed admodum notabiliorem; experimentum hoc alterum subsequente anno coram Academicis institui; praesente Serenissimo Portugaliae Principe *Emanuele*.

Experimentum 6. In figura 5. repraesentat ACFB cylindrum, in cuius fundo implantatus erat tubus conicus DGHE; hicque ad latus habuit paruum
lum

Fig. 5.

lum tubulum in *l*, qui reciperet extremitatem tubi vitrei incurvati *lmn*: altitudo *CA* erat 3 poll. 10 lin. *El* 4 lin. *lH* 2 poll. $9\frac{1}{2}$ lin. amplitudo tubi conici in *l* erat ad amplitudinem orificii *GH* vt 10 ad 16: altitudo *ln* erat 5 poll. 6. lin. eiusque orificium *n* erat aquae in vasculo *M* submersum.

Apposito digito orificio *GH* impletoque vase stillabunt aquae per tubum vitreum *lmn* in vas *M*: remoto autem digito et effluentibus iam aquis per *GH*, motu reciproco aqua sponte ex vasculo *M* ascendit per tubum *nml* et vna cum reliquis aquis effluxit per *GH*, donec totum vasculum *M* euacuatum esset. Afundebantur autem superius continue aquae vt vas plenum seruaretur. Si digito pars orificii *GH* obtegebatur, facile erat efficere vt pro lubitu aquae in tubo vitreo *lmn* fursum deorsumve mouerentur. Notabile visum fuit istud experimentum, quod vasculum *M* multo humilius quam orificium *GH* positum erat.

Inde apparet ratio, cur fumus per caminum ascendens non solum non exeat per aperturas, quas facere solent in lateribus camini, sed et aërem magno cum impetu post se trahat: Notandum autem est latera tubi *DGHE* comprimi interiora versus, etiam si cylindricus fuerit iste tubus et caminum tubum esse inuersum fumumque idem quod fluidum sua natura altum petens.

Praeter ea, quae ad hanc fluidorum motorum staticam pertinent, alia sunt quae aliam theoriam postulant: Vbique autem motus aquarum prius recte est

est definiendus, quam sententia ferri tuto possit de earundem pressione: quod ut exemplo alio illustretur, considerabimus cylindrum verticaliter positum amplitudinis quasi infinitae, qui in medio habeat diaphragma horizontale, in parte inferiore autem fundum pariter horizontalem: fuerint tum diaphragma tum fundus foraminibus pertusa siue aequalibus siue inaequalibus. Si cylindrus iste aquis plenus sit orificiumque inferius obturetur perspicuum est singulas cylindri partes premi secundum regulas ordinarias: Sed statim atque effluere incipiunt aquae etiamsi foramina infinite parua censeantur ratione amplitudinis cylindri, aliam sentient pressionem partes cylindri, quae infra diaphragma sitae sunt: saepe etiam partes diaphragmati proximae introrsum prementur; quae vero supra diaphragmata positae sunt, suam pressionem conseruant.

Ita quoque si in A aliud operculum fingatur, alia erit pressio in latera tubi AC et alia quoque velocitas aquae in BC effluentis. Haec utcumque composita videantur, non sunt tamen supra theoriam nostram, ope cuius facile est et pressionem et velocitatem definire: experimenta autem huius quoque rei accepi plurima, quae semper theoriam animo conceptam confirmarunt: Quia vero coram societate instituta non fuerunt, eorum recensio hic non immorabor.

Fig. 3.

ANAMORPHOSEOS
 POLYEDRICAE CONSTRUCTIONIS METHO-
 DUS VERA ATQUE CERTA, NOTATIS FAL-
 SARUM MANUDUCTIONUM PASSIM
 PROPOSITARUM ANOMALIIS
 OPTICIS.

Joh. Georg. Leutmann.

§. 1.

Tab. XIX.
 et XIX.

Exhibui Ao. 1726 in Festo CATHARINAE, Imperatricis nostrae Potentiss. Protectricis Academ. Clementiss. piae memoriae, Onomastico Sacro, Anamorphosin Polyedricam, qua Nutrici Indulgentissimae gratulabatur Academia obseruantissima suamque deuotionem humillimam votis declarabat.

§. 2. Hanc in praesenti Differtatione recensere, et quae ad structuram tam externam quam internam notatu digna videbuntur explicare constitui. Simulque indicabo erroneas Methodos, quibus nobilis huius inuenti difficilis redditur elaboratio et plane impossibilis. Methodum deinde veram atque genuinam, et enchireses constructionis additurus.

§. 3. Huius Anamorphoseos machinae atque structurae facies externa exhibebat asserculum $28 \frac{1}{2}$ dig. decimal. pedis Rutenici longum, latum 7 dig. spissum $1 \frac{1}{4}$ digit.

§. 4.

§. 4. In anteriori afferculi extremitate, erectum est fulcrum ad angulos rectos, et $3\frac{1}{2}$ digitos ab hoc distat adhuc alterum tale priori simile. Sustentant haec tubum ex bractea ferrea stanno obducta confectum $10\frac{1}{2}$ digit. longum, cuius diameter amplitudinis 18 lin. aequat. Horizontalis est eius situs, et cum planitie afferculi parallelus, distat ab ea $6\frac{1}{2}$ digit.

§. 5. Tubi anteriori orificio insertum est operculum in centro foraminulo $1\frac{1}{2}$ lineas in diametro amplo perforatum. Posterius tubi extremum recipit capsulam vitro polyedrico instructam.

§. 6. In altero afferculi extremo erecta est tabula alba perpendicularis, planitici polyedri e diametro opposita, ita vt axin ex centro polyedri per centrum tabulae transire concipiatur.

§. 7. In medio tabulae picta est imago Imperatricis, viuis coloribus, sparsis circa illam variis floribus, vario situ, flagrantibusque coloribus visum delectantibus. Tabula 12 dig. decimal. Rutenicos et alta et lata erat, Effigies in medio posita campum replebat 4 digit. in diametro aequantem.

§. 8. In superioribus tabulae angulis conspiciantur duo clypei, ceruleo colore tincti, et ornamentis pictis septi, inscriptionem et dedicationem exhibentes;

In vno clypeo conspiciebatur dedicatio:

PALLADI RUSSICAE
CATHARINAE SAPIENTI
 POTENTISSIMAE CLEMENTISSIMAE,
 IMPERATRICI
 PIAE FELICI AUGUSTAE.

In altero extabat gratulatio:

ONOMASTICUM
 SOLENNITER, VTINAM SAEPIUS,
 CELEBRANTI,
MATRI INDULGENTISSIMAE
 ANAMORPHOSEI POLYEDRICA
 GRATULATUR
 ACADEMIA St. PETROPOLITANA.

§. 9. In inferiore tabulae parte expressa erat charta quasi volans et vento agitata, quae sequentem continebat applicationem Anamorphoseos:

EX FLORIBUS NOMEN ADMIRABILE.

Tota machina lacca rubra et auro distincta erat conspicua.

§. 9. Haec omnia eleganter adornata, vividis coloribus delectabant visum intuentium, et nudo oculo tabulam contemplantium.

§. 10. Si vero per tubum polyedro instructum hanc tabulam intuereris tunc omnis pictura euanescebat, ita vt et imago Imperatricis centrum tabulae occupans, et centro vitri directe opposita, visum superfugeret, et apparebat tabula alba nihil nisi nomen Augustae CATHARINA IMPERATRIX inscriptum sistens, caeteris cunctis inconspicuis.

§. 11. Versatilis erat tabula et axi perpendiculari praedita, quae versa aliam et similem fere exhibebat figuram nisi quod loco effigiei, Aquila biceps, Insigne Magnae Russiae, esset picta, floribus cincta etc. Clypei ad angulos superiores positi continebat sequentem inscriptionem :

Vni inscriptum erat :

FORTUNAE RUSSIAE
IMPERANTE
CATHARINA SAPIENTE,
FLORENTI,
ET
CONSTANTER DURATURAE,

Alteri :

FESTO SACRI NOMINIS DIE
VOTO
PER
ANAMORPHOSIN CONSPICUO
APPLAUDIT
ACADEMIA St. PETROPOLITANA
ANNO MDCCXXVI.

Chartae volanti inferius pictae inscriptum erat :
FLORENS CONSPECTUS IMPERII RUTENICI.
Per Polyedrum vero visa prodibat tabula alba, in qua VIVAT erat expressum, cacteris cunctis iterum sese occultantibus.

§. 12. Haec ad formam externam machinae exprimendam faciebant, internam artificialem nunc etiam explicabo.

§. 13. Polyedri semidiameter erat 1 dig. $7\frac{2}{3}$ lin. Eius crassities 7 linearum. Elevationum latus contine-

bat 54 plana inclinata, quorum nouem ad centrum sita, et cuspidem vitri centralem constituentia, stellam egregie radiantem repraesentabant, reliquis planitiebus inferius septem. Alterum latus erat planum.

§. 14. Tubus, in fulcris latis, ex asserculo factis, firmatus, per laminas ferreas traiectus est, fulcris insitas, duabus affixas cochleis, scil. superius et inferius, ad ductum diametri foraminum tubum recipientium. Reliquo ambitu laminarum non affixo, ne coeunte a sicciditate ligno, aut ab aere humido dilatato, situs tubi vitietur id quod figurae repraesentandae maxime nocet, totumque artificium plane perdit.

§. 15. Eandem cautionem adhibui in firmanda tabula picta, eamque et superius et inferius in medio asserculi; hanc sustentantis, affixi, et sic contractio et dilatatio asserculi situm eius vitare non potest.

§. 16. Distabat vitri latus planum a tabula picta 14 dig. decimal. et contemplationi sistebat circuli campum cuius diameter erat 10 dig. 5 lin. areolas 54 in se continentem, planorum vitri inclinatorum figuras in plano proiectas repraesentantes, et planitiebus vitri propter radios dilatatos, maiores, et propter decliuem eorum situm alteratas.

§. 17. Literae per polyedrum apparentes ex caulibus atque foliis florum pictorum sese componebant, ita vt particulae eorum nonnullae literas formarent reliquis eorum partibus areolas non ingredientibus, inconspicuis manentibus, sicut et cuncti radii picturae, qui areolas non tangunt, ad visum peruenire non poterant. Hinc in medio tabulae

ma-

magnum tale spatium remanebat inconspicuum, quod ad effigiem recipiendam erat destinatum.

§. 18. Haec sunt ea quae ad internam machinae constructionem intelligendam faciunt.

§. 19. Arbitrabantur nonnulli, elaborari quidem posse eiusmodi anamorphosin literas representantem, sed impossibile fere esse effigiem tali deformatione et restitutione depingere, quae similitudinem personae alicuius exprimeret. Ideoque ut et in eo artem vindicarem, opus aggressus sum et illud feliciter praestiti.

§. 20. Nempe Ao. 1729 Effigiem noui Imperatoris PETRI II. nunc piae memoriae, anamorphotice depinxi et egregie ad viuum expressi, in tabula aenea, eamque in publica solennitate Academica exhibui, atque oratione de hac elaboratione habita explicauit.

§. 21. Conspicitur oculo nudo in medio tabulae aquila biceps coronata, insigne Imperii Rutenici, sceptrum et globum Imperialem tenens. In medio inferiore tabulae pictum est vas quasi caelatum et egregie decoratum, in expansione medii ventris ad utrumque latus duo simulacra semi-expressa habens pro ornamentis. Ex hoc vase prodit Laurus, cuius rami se diffundunt circa aquilam, et partes picturae, effigiem constituentis, tanquam fructus ex ramis habent dependentes. Circa Laurum insignia Regnorum Rutenico Imperio subiectorum collocata sunt Astracanensis, Casanensis, Siberici etc. Infra vas charrae volanti inscriptum cernitur. VI-VAT PETRUS II. IMPERATOR. §. 22.

§. 22. Per polyedrum vero inspicienti apparet in tabula alba effigies Imperatoris PETRI II, pie memoriae, apprime ad viuum expressa, fascia caerulea Ordinis St. Andreae ab humeris eius dependente, caeterum trabeati et Lauro in capite cincti. Ad dextram mensa in qua corona et sceptrum collocata conspiciebatur. Reliquis picturis, Lauro, vase, et insignibus Regnorum vna cum Aquila, plane inconspicuis. Et hac ratione praestiti quod multi impossibile iudicabant.

§. 23. Quod itaque ad Anamorphoseos huius elaborationem attinet, totum processum hic apponendum duxi, quanquam illum in tractatu aliquo Optico germanice a me edito accurate et fideliter proposui vid. *Leutmann Numerckungen vom Glaszschleiffen, Wittenberg 1719.*

§. 24. Recensebo tamen prius adinata nonnulla, ab omnibus fere Opticis pro possibilibus, et in praxi ad Anomorphosin elaborandam idoneis proposita, et in publicis eorum scriptis reperiunda. Hos vt inanes conatus successu utique destitutos indicabo.

§. 25. Quotquot itaque deformationis, per vitrum polyedricum restituendae, methodum tradiderunt, et mihi noti sunt, vnanimiter fere contendunt, situm atque figuras planitierum vitri, quarum

Ad §. 25. vid. Joh. Christoph. Sturm *Mathes. Juv. part. II. p. 202 ff.*
 Leonh. Christ. Sturm *Mathes. part. IV. p. 152.*
 Joh. Mich. Conradi, *Optices p. 99.*
 Pater Schottus et alii qui mihi nunc ad manus non sunt.

rum areolas in tabula proiectas, exhibet lampadis lux, foramini tubi polyedrum continentis praeposita, esse primo in tabula stylo circumscribendas atque signandas accuratissime, deinde colligendas et componendas in charta aliqua, vt tota figura areolarum, seu totum systema, sistat vitri polyedrici delineationem atque imaginem in charta plana expressam.

§. 26. Sed impossibile atque inane hoc est praeceptum, et conatus plane irritus. Situs enim decliuis planitierum vitri aliam pingit figuram, quam exhibitura essent plana, si ponerentur planitiei tabulae parallela, id quod contemplatio Geometrica et Optica facile docebit, experientia confirmante.

§. 27. Commisso iam vno errore, fieri non potest, quin plures sequantur. Iubet proinde erronea haec methodus, imagines aut verba deformanda, figurae huic in charta consignatae inscribere, deinde chartam dissecare ad ductum linearum areolas circumscribentium, et tandem frustula illa dissectae figurae aereolis in tabula notatis imponere, et agglutinare, tunc rem esse confectam, et imaginem seu literas deformatas restitutas, vt compositae prodeant, et integrae ad desideratam Anamorphosin producendam.

§. 28. Facilis et iucunda imo et brevis haec esset via, in re tam intricata difficili atque alias laboriosissima ad optatum finem obtinendum, si modo euentus desideratus responderet labori huic non adeo magno et iucundo.

§. 29. At ex antea dictis haec institutio facile tanquam frustranea deprehenditur. Non enim lux lampadis fines lucidarum areolarum exacte determinat, ut excisae cum planitiebus vitri concordent. Et quod maximum, si ex tabula secundum magnitudinem angulorum et laterum singulae magno cum labore in chartam transferantur areolae, non tamen cohaerebit figura, sed hiatus conspiciuntur areolas ab inuicem disiungentes, quia eleuata vitri figura, et ab illa proiectae areolae, si in plano repraesentantur, maius spatium occupant, et dilatantur quae antea erant coniunctim eleuatae, acuminatae et conuexae cohaerebant. Hinc labor anxie institutus irritum dat successum. Id quod propria experientia magna cum indignatione didici atque expertus sum.

§. 30. Quandoquidem vero nonnulli Optices magistri cognouerunt, quod areolae in tabula omnino maiores producantur planitiebus vitri polyedrici, adhuc breuiori methodo, ex eorum scilicet sententia, et aptiori rem aggrediendam tradiderunt: Iubent enim, ut longitudo vnius areolae in tabula proiectae, ut et latitudo eius exacte mensuretur, longitudo pro radio circuli in charta ducendi assumatur, quo ducto tot ei areolae aequales inscribantur, quot primis ambitus et series planitierum polyedri in se comprehendit. Hunc deinde laborem ad alteram

Ad §. 30. vid. Jean Franc. Nicéron de la perspective curieuse, et ex eo
Christ. Gottlieb Hertels vollständige Anweisung zum Glaspolyedrum.
p. 125 ff.

ram seriem areolarum esse applicandum, et sic productam putant, totam figuram polyedri areolas in tabula ampliata referentem. Huic deinde inscribi deformandam imaginem posse, et dissectas eius atque excisas tandem areolas tabulaeque agglutinatas anamorphosin putant esse repraesentaturas.

§. 31. At, iisdem cum antecedenti haec manu ductio laborat falsis praesuppositis. Aggressum enim hac ratione opus, spe sua frustratum reddit artificem, mentemque falsis hypothesebus confundit, ut nisi ad principia Optices atque Geometriae confugiat, errorisque fundamentum quaerat ex eisque errorem cognoscat, lassetur atque a coepto opere deterreatur.

§. 32. Compositae enim hac ratione areolae et ad magnitudinem primae quaesitae atque inventae delineatae, non replebunt totum circulum, sed magnum relinquent hiatum in figura, ex causis §. 29 adductis. Aut si circulus prius in partes aequales, polyedri planitiebus numero respondentes, lineis fuerit diuisus, ut singulae per longitudinem areolarum transeant, eademque iis cum proiectis in tabula detur latitudo, tunc nulla areolarum cohaerebit cum vicinis, sed distabunt inuicem, ineptae hac ratione ad inscriptionem imaginis. Huius rei causam suppeditabit consideratio in Geometria et Optica fundata.

§. 33. Nullam itaque aliam mihi cognitam habeo methodum, praeter eam quam in citato libel-

lo meo Optico fideliter tradidi, saepiusque certam expertus sum, cuius momenta hic sincere exponam:

1. Quaeratur quantam distantiam polyedrum a tabula alba ferat, ut areolae prodeant ad proportionatum situm, non nimis inuicem distantes, neque admodum inter se propinquae.

Fiet id ope lampidis foramini operculi tubi praepositae, quemadmodum Optici vulgo id recte docent. Tubus ille fit ductilis, ut vera proportio et tubi, et distantiae tabulam inter et vitrum, et situs areolarum commodus innotescat.

2. Circumscribantur areolae in tabula lucidae plumpo scriptorio, situsque lampadis sedulo conferuetur idem, qualis in prima delineatione erat datus. Quanquam enim fines areolarum lucidarum hoc modo exacte determinari nequeant, propter penumbram, locus tamen designabitur in quem cadunt.

Si vero alicui animus est accurate eas confignandi, poterit is hoc exactissime praestare, si tenue lineale nigrum, vel ei simile ex charta duriuscula confectum, ad fines areolae, in loco maxime tenebricoso, ex lampadis radio lucido, confuse indicatas, de die in loco luminoso ad tabulam ope cerae applicet, deinde per polyedrum, admoto ad foramen operculi oculo, obseruet situm linealis, illud tam diu mouendo, usque dum in eum locauerit situm, ut fines

nes areolae in vno latere exacte tangat, et spatium areolae nec intret, neque lineale plane dispareat, sed areolae fines tantum stringat et terminet. Idque ad cuncta areolae latera continuetur, et lineae ducantur, tunc circumscripta erit areola lineis. Hinc radii, ex situ inclinato planitiei vitri procedentes, et in tabulam perpendiculariter erectam incidentes, terminabunt spatium quod veram figuram areolarum lucidarum indicabit. Simulque innotescet, quantum differant planities vitri polyedrici a figura areolarum in tabula expressarum, et ex eo indicari poterit de antea commemoratarum methodorum impossibilitate.

3. Consignatis areolis eligatur earum inferior in tabula, quae per polyedrum visa, apparebit superior, et in ea, aut alia commoda, fiat initium delineationis iconis deformandae. Huius imaginis ductus atque lineae, si vniam areolam transuerunt, connectantur cum alia areola, quae ope baculi tenuioris et acuminati vt et denigrati erit inuestiganda, perspicendo per tubum, vbi simul areolae limites innotescunt, atque locus inuenitur picturae conueniens.
4. Absoluta tota deformatione rudi, correctio typi instituat ad prototypum, transpiciendo semper per foramen tubi, donec cunctae recte cohaereant et figuram prototypi exprimant.

Dico hoc modo rite deformatam fore imaginem in tabula et restitui per polyedrum eius formam.

5. Tandem in tabula decorationes, ita vt cum deformatata imagine coalescant, illam quasi absorbeant, aliam figuram metiendo et ante oculos ponendo nudos, quam per polyedrum contemplata prodit. Caueat tamen artifex ne aliquid de exornationibus areolas consignatas et limitibus circumscriptas intret, sed maneat illae in interstitiis areolarum. Et si contingat vt aliqua areolarum ab imagine vacua remaneat, huic ne aliquid de ornamentis inscribatur sedulo inuigilet.

§. 34. Si polyedrum acuminatum est, spatium aliquod vacuum in medio tabulae remanebit, dispositioni magistri artis relictum, quicquid enim in eo pingitur, visui per polyedrum se subducit et disparet.

Si vero centrum polyedri occupat planum, tunc et planum illud centrale in tabula areolam efficit, quae per polyedrum in oculos incurrit, et praeter interstitia areolarum nihil remanebit inconspicuum. Caetera vsus atque praxis docebit.

§. 35. Tandem sciendum: vitrum polyedricum depressioris formae inidoneum esse ad deformationem, quia longiorem requirit distantiam inter vitrum et tabulam, propinquior enim areolas aut confundit aut interstitia admodum angusta producit;

lon-

longius autem remotum a tabula polyedrum, ob-
scuram repraesentat figuram, quae exinde nullam
gratiam sibi conciliare potest. Sed et acutioris for-
mae vitrum, et ex eo spissius, minores dat areo-
las, deformationi minus aptas. Ideo media pro-
portio inter utramque erit tenenda, atque ad hoc
opus adhibenda.

§. 36. Haec vera est methodus Anamorpho-
sin polyedricam construendi, cui unusquisque rem
tentaturus fidere, tutoque insistere exoptatumque
finem sperare poterit.

§. 37. Quod vero maxima cum difficultate
coniunctae sint, et elaboratio melioris notae poly-
edri et applicatio eiusdem ad deformationem con-
cinnam, hoc puto deterruisse plurimos scientia Ma-
thematica peritissimos viros, meditationi potius in-
dulgentes, quam operationi manuarum, et vitris
opticis elaborandis idoneos atque peritos, quo mi-
nus rem ipsam aggressi fuerint expediendam. Et
hoc ipsum in causa esse arbitror, quod tam erro-
neae prodierint instructiones, quandoquidem natae
sint illae magis ex speculatione, quam praxi, hinc
omnibus impedimentis vix villo modo potuit pro-
spici, et fere impossibile fuit ea evitare.

§. 38. Ultimo loco indicandum puto: Vi-
tra ab ordinariis vitrorum caelatoribus ad hoc opus
perficiendum esse inidonea, requiritur enim in illis
perfecta planities, non caua aut conuexa, quales
inducere necesse habent isti operatores, quia vi-

trorum planities ad marginem orbis plumbei, a rota maiori agitati perpendiculariter, deterunt et poliunt, Mathematicus vero certis a me in tractatu optico § 23 citato descriptis opus habet instrumentis, quorum ope etiam efficitur, ut planitiebus dictis ad eandem angulum inducatur decliuitas, et latera se inuicem tangentia, ut et anguli prodeant puri, et ne minimum quidem a planitie decedentes. Si haec requisita non habuerit polyedrum, ineptum erit ad polyedricam deformationem.

CONFIRMATIO DILATATIONIS
ATQUE CONTRACTIONIS METALLORUM
ATQUE VITRORUM MOMENTANAE PER
EXPERIMENTA ET INSTRUMENTA
NOUITER INUENTA.

Auctore

Job. Georg. Leutmann.

§. 1.

Tabb. XX.
et XXI.

Celebris inter Physicos agitur controuersia, utrum vitrorum dilatatio atque contractio momentanea fieri possit.

§. 2. Multi hoc negant, plurimi affirmant, neutri experimentis, rem extra dubium ponentibus, litemque dirimentibus, satis instructi, nisi quae Florentini eruditi exhibuerunt.

§. 3.

§. 3. Affirmatiuam tenentes sequenti maxime nituntur experimento.

§. 4. Si phiala angustiore tubulo instructa et liquore aliquo colorato e. g. aqua ad dimidiam tubuli partem repleta in aquam feruentem immergitur vsque ad tubulum, tunc liquor coloratus ad momentum regreditur, et deinde iterum assurgit, atque a calore dilatatus ascendit.

§. 5. In frigidam et glacie mixtam si demittatur phiala, saltu quasi concepto assurgit liquor ad momentum, et deinde statim descendit a frigore contractus:

§. 6. Ex his naturae contrariis phaenomenis concludunt, dilatationem vitrorum eorumque contractionem probari.

§. 7. Afferunt enim, quod per calidam aquam non aliter fieri possit, quam vt liquor dilatetur atque ascendat. Et per frigidam necessario descensus eidem inducatur vt coeat, quandoquidem eundem contrahat frigus.

§. 8. Quia vero duo haec experimenta contrarium monstrant motum, concludunt, ex eo id fieri, quod calida aqua vitrum prius dilatet, vt amplius spatium acquirat, in quod se recipiat liquor atque subsidat, et deinde a calore expansus iterum assurgat.

§. 9. Frigida vero aqua, quia vitrum eiusque sphaerulam contrahat efficiat, vt liquor, priusquam a frigore contrahatur, per coarctatum vi-

trum impellatur vt ad momentum affurgat, et postea statim, a frigore contractus regrediatur atque descendat.

§. 10. Non aliam itaque dari posse rationem autumant effectus huius legibus naturae contrarii quam contractionem et dilatationem phialae sphaerulaeque eius vitreae.

§. 11. Contractionem momentaneam negantes alias causas saltus liquoris quaerunt, eamque non ex mutatione instrumenti, seu contractione et dilatatione phialae vitreae deducendam volunt, sed in liquore quaerendam putant, et ita causam saltus liquoris non in vase continente, sed liquido contento latitare existimant.

§. 12. Non vero in dubium vocatur contractio et dilatatio vitrorum imo et metallorum successiua, quam Florentini Eruditi experimentis factis extra ,,dubium posuerunt; sed quaeritur vtrum tam momentanea contractio et dilatatio fieri possit in ,,corporibus adeo duris atque firma compage gaudentibus.

§. 13. Hanc itaque controuersiam considerandam mihi sumsi et experimentis per idonea instrumenta hunc in finem excogitata veritatem indagandam atque ante oculos ponendam opere pretium duxi.

Fig. 3. §. 14. Experimentum in phiala vitrea hoc modo adornauit: Phiala seu sphaerula duobus tubulis vitreis instructa erat, globi capacitas diametrum vnus digiti Anglicani pedis decimalis aequabat tubu-

buli ita erant formati vt alteruter 1 digito longior alteri existeret Fig. 1.

Fig. 1.

§. 15. Binos tubulos adhibui, vt eo promptius sphaerulam implere et de certitudine repletio- nis omnimodae certior esse possem. Quandoquidem repletio globi, ope ignis instituta, et difficul- ter succedit, et bullulam aeream nonnunquam in sphaerula relinquet. Duobus vero tubulis eisque in- aequalis longitudinis sugendo vnum alterum breuio- rem in aquam immittendo cito et tuto operationem perfeci.

§. 16. Repletum aqua instrumentum in aquam fermentem immisi et descensum momentaneum ob- seruaui, et quidem eo ipso in momento quo phiala feruentem aquam intraret, quem insequabatur ascensus liquoris. Exemptam phialam in aquam glacie permixtam immerfi, et saltum seu ascensum momentaneum vidi, quo peracto, aqua in phiala sensim, pro more descendebat.

§. 17. Non fieri posse, coniciendum omni- no esset, quod tam momentanea dilatatio et con- tractio vitri, ex materia satis compacta ac dura con- stantis, oriri possit, cum alias contractio atque di- latatio corporum duriorum vt plurimum successiue peragatur, tractu temporis demum perceptibilis.

§. 18. Quapropter experimentum hoc ten- tauit in phiala orichalcea, cuius bini tubuli canali- culis vitreis, prioribus similibus, erant instructi eis- que inferti et lacca sigillatoria firmati. Experimen-

tum hoc instrumento feci et cum priori vitreo, eundem saltum fieri expertus sum.

§. 19. Adhibui postea tertiam phialam ex bractea ferrea stanno obducta paratam, et saltus liquoris ut antea accidebat.

§. 20. Iam vero rationes satis probabiles dantur, quibus euinci posse videtur aliam subesse posse causam saltus liquoris quam contractionem atque dilatationem materiae.

§. 21. Si enim eiusmodi dilatatio et contractio in his praedictis instrumentis locum haberet, accideret haec in crassitiae eorundem materiae, illa extenderetur et contraheretur in longum, latum et profundum. Et sic extensio ambitum externum ampliolem internum spatium arctius ut fieret, efficeret. Contractio vero contrarium daret effectum.

§. 22. Concipiatur linea aliqua in medio crassitiei materiae, ut ab ista in dilatatione extenderetur crassities materiae vasis ad externum ambitum, altera dimidia pars crassitiei ad internam cavitatem intumesceret, tunc ea amplitudinem cauam coarctaret. Contrarium vero eueniret in contractione vitri, tunc enim interna cavitatis ampliaretur et externus ambitus coiret et minueretur.

§. 23. Si lineam istam extensionis concipere vellemus in superficie ambitus interni, scilicet quod sphaerulae expansio ab intra ad extra fieret, tunc sequens experimentum contrarium probare videtur.

§. 24. Nimirum in aliis corporibus cauis, eiusmodi alterationem patientibus, contrarium conspi-

spicitur, e. g. frustum ligni foramine pertusum, tum a sicco aere contrahitur, externum ambitum contractiorem et cavitatem ampliorem accipit; ab humido vero aere dilatatum, contrario modo se res habet, intumescit enim lignum ab extra et foramen etiam coarctatur.

§. 25. Videmus hoc si per foramen ligni alienius, etiam durioris, vitreus vel metallicus embolus vel Cylindrus intrudatur exicato ligno excidit, humectato arctius iterum tenetur. Idem in operculis metallicis, quibus eburneae capsulae clauduntur, observamus.

§. 26. Deinde calorem hunc feruentis aquae insufficientem iudicare quis posset ad dilatationem phialarum maxime metallicarum. Si enim cochlea quaedam ferrea mas, vna cum foemina, in aqua feruente coquitur et ita calefit, vt eius tactum manus ferre nequeat, tunc adhuc mas per foeminam trahi potest; Si vero incandescunt prunis impositae, tunc mas crassior redditur vt per foeminam coarctatam transmitti nequeat.

§. 27. Cochlea itaque mas et foemina per coctionem in aqua calefacta non intumescunt, inde coniicere quis posset, metalla hoc modo non dilatari, hinc multo minus phiala metallica ab aqua feruente in momento expandi potest.

§. 28. Videri itaque, rationem huius phaenomeni, saltus scil. liquoris in phialis, non in vase continente, sed in materia contenta esse quaerendam cui accidentia a calore et frigore inducta,

tanquam in substantia apta inhaerere et sic liquorem, dilatationi et contractioni subitaneae magis quam metalla rigida aptum efficere et alterare posse.

§. 29. Non potui quin aliquam machinam inuenirem qua mediante experimentum certum institui posset, vtrum metalla in aqua feruente dilatentur nec ne, et contrarium fieret in frigida, et quidem vtrum mutationes istae in momento accidant an vero successiue et post aliquam moram. Instrumentum itaque tale adornaui.

Fig. 2.

§. 30. Fiat trabs ferrea A, in vtroque extremo ad angulos rectos incuruata, et brachiis BB, quasi instructa, trabe 1 pedem et brachiis 3 dig. longis.

Ad brachium vtrumque instrumenti adferruminatae sint decem trochleae metallicae CC minoris diametri e. g. $\frac{1}{2}$ dig. circa communem axem chaliceum L mobiles.

Super has trochleas tendatur chorda seu filum metallicum tenue, candefaciendo prius emollitum et obsequiosum redditum *aaa*. Vno extremo *d* firmetur ad cochleam aliquam marem D cuius vnum extremum quadrangulare sit et hamulo praeditum, illudque in foramine quadrangulari brachii alterutrius B mobile, ope cochleae foeminae, superius applicatae ad E.

Tandem circumuoluatur filum illud orichalceum seu metallicum trochleae F aliquantulum latae, quae axem G, per ferream trabem transeuntem et longius prominentem, habeat.

Ultimo loco filum *aaa* elastro *H*, ad longitudinem brachii firmato, alligatur et ope cochleae *E* adducatur et tendatur vsque ad elastri *H* inclinationem.

Ad axem prominentem *G* applicetur index *K* longus vnum pedem, in anteriore parte trabis, super linea, in longitudinem ducta, contractionem et dilatationem chordae, si quae accidat, declinatione sua indicaturus.

Ne vero ob nimiam longitudinem et ex illa dependente grauitate fluctuet atque vacillet index *K* sed situm erectum constanter retineat, et super linea ducta maneat, adaptari ad latera parallelepipedi anteriora duas pinnulas *zz* in quibus ope cochleae perpetuae *y*, dirigi potest fulcrum quoddam *x*, super plano parallelepipedi anteriori versatile; In medio fulcri lateris superioris incisae crenae insertum est elastrum rotundum *f*. Elastrum ipsum ad *r* firmatum sit, et in *m* incuruatum ad angulum rectum, quae incuruata sursum pars pertranseat crenam indicis *K*.

Indici ad inferius extremum addatur contrapondium *p*, quo mediante superior eius pars longior erecta tenetur, ne propria grauitate ruat. Ope vero cochleae perpetuae *y* dirigitur elastrum *S*, et per illud index *K*, vt apex eius super linea, indici subiecta accurate situm suum conseruet.

Quando itaque per trochleam *F* mouetur index, tunc cedere potest in alterutrum latus leue elastrum *S* quandoquidem chorda vel contracta vel dilatata trochleam *F* mouet ad cuius axem applicatus est index, et hac ratione mutatio chordae potest obseruari.

§. 31. Dico igitur ope huius machinae in aquam feruentem immiffae palam fieri, vtrum filum metallicum dilatetur feu elongetur. Et in aquam frigidiffimam immerfa machina docebit, vtrum contractio fili feu abbreviatio accidat. Dilatata enim chorda femper adducitur eadem atque tenditur ab elafiro H, et quando chorda contrahitur, elaftrum cedit. Ex vtroque trochlea F cui circumuolutum eft filum circumducitur, et indicem applicatum K mouet vel ad dextram vel ad finiftram. Haec mea erat intentio de hac machina.

§. 32. Experimenta hac machina inftituta hoc modo cefferunt: Immerfo inftrumento in aquam frigidiffimam, nulla mutatio indicis percipiebatur, quanquam per horam ibi reliquiffem inftrumentum. Deinde ftatim in feruidiffimam impofui inftrumentum, fed et ibi nulla plane mutatio indicis obferuari poterat, diutius etiam in ea manente inftrumento.

§. 33. Constantia haec inftrumenti faciebat, vt de eius fufficientia ambigerem, quia mutationem fucceffiuam non monftrabat, quam tamen neceffario contractioni et dilatationi fucceffiuae, de qua nullum dubium habebam infecuturam fuiiffe fciebam, quanquam momentanea, de qua controuerfia, incerta maneret.

§. 34. Aliud e vitro inftrumentum ad hoc phaenomenon inquirendum et cauffam faltus liquioris in phiala indagnandam exhibitum eft a Clariff. Dno. *Bülfingero* Colleg. honoratiff. quod et e cupro conficiendum curauit, fcil.

§. 35.

§. 35. E lamina cuprea elaboratum est hemisphaerium intus cauum Fig. 3. M, ex cuius fundo A prodibat tubulus B assurgens in C. Deinde ex margine superiore hemisphaerii caui D exsurgebat alius tubulus E, deorsum inflexus et iterum ascendens ad altitudinem prioris tubi. Vtrique tubulo cupreo inferebantur tubuli vitrei F et G et instrumentum erat confectum.

§. 36. Repleto hoc instrumento aqua frigida (quod commode fieri poterat immittendo orificium tubuli GE in aquam, et alterum tubulum BC ore sugendo) sequentia obseruata sunt phaenomena.

§. 37. Totam machinam immisi in aquam feruentem vsque fere ad tubulos, et descendit liquor aequae ac in prioribus phialis more solito, deinde iterum ascendit.

2. Deinde frigidae glaciali imposui machinulam, et ascendit, sed post saltum iterum coiuuit.

3. Vterius immisi instrumentum in aquam feruentem vsque ad labra cavitatis g, et descendit liquor in canaliculis, postea iterum ascendit.

4. Refrigeratam machinam in feruentem iterum immisi, ita tamen vt labrum g non transgrederetur aqua, et cavitatem superiorem M, aqua gelida glacie mixta repleui, et tamen descendit liquor ante dilatationem, glacie quanquam in cavitare nondum resoluta.

5. Aquae frigidae imposui machinam, et in eo momento feruentem in M, insudi, simulque frustum ferri candentis in feruentem aquam inieci ad

confortandum et conseruandum feruorem; tunc liquor saltum non fecit deorsum, sed sursum et quidem ab initio celeriter, deinde sensim, ita vt prior a posteriore distingui poterat.

6. In tubulis, machinula externo aeri relicta a frigidae aquae in M infusione saltus nullus sursum percipiebatur, sed descensus celer quem lentus excipiebat vt vix sentiretur. A calidae infusione vero primo ascensus non adeo sensibilis momentaneus tamen deinde ascensus sequebatur.

§. 38. Haec sunt phaenomena quae in illa machinula apparebant, saepius iteratis experimentis.

§. 39. Experimentum itaque 5 et 6 fauent hypothese mutationem momentaneam asserenti, sed non satis clare eam exprimere videntur quanquam mihi satisfaciant.

§. 40. Quia vero mutatio citatior in hoc 5 et 6 experimento ex eo deducere aliquis posset, ac si in 5to calor vehemens ascensum citatiorem causasset, et liquor ab initio celeriter expansus, postea lentius ascendisset. Et in 6to experimento idem cum aqua frigida factum esset. Et quae sunt alia a nonnullis non facti saltus contrarii veram causam inficias euntibus proferi possent.

§. 41. De alia machina mecum meditatus sum, quae dilatationem et contractionem momentaneam vitrorum et metallorum proderet, vt de ea certi esse possemus et sequentem confeci.

Fig. 4. §. 42. Annulum itaque cupreum A $2\frac{1}{2}$ dig. latum et in diametro 4 dig. habentem confeci. Fig. 4.

Ei

Ei laminam B erectam et satis crassam atque inflexilem ita adaptaui, vt tribus cochleis chalibeis ad anulum super commissura esset firmata.

Habebat lamina B figuram linealis cum cruce C angulum rectum formante, $1\frac{1}{4}$ dig. latum, 15 dig. longum erat lineale vsque ad angulum externum. Crus vero ab angulo ad $2\frac{1}{2}$ dig. se extendebat.

Deinde feci catenam D, eius formae, qualem horologia portatilia helici eorundem circumuoluentam habent, et quidem talem cuius quiuus articulus intermedius gibbum prominentem *a* habebat.

Hic catena cingebatur annulus A in cuius medio latitudinis peripheriae tot crenae erant incisae *b*, quod gibbi *a* in catena D prominebant, qui in crenas immittebantur. Ita enim catena neque sursum neque deorsum deflectere poterat sed arcte claudebat anulum.

Vnum catenae extremum *c* vncu recuruato *d* instructum inferebatur in annuli superficiem, et alterum extremum *e* vncu cochlea praedito adduci poterat, qui per extremum indicis *f* totam longitudinem linealis occupantis transibat.

Index $1\frac{1}{2}$ dig. ab inferiori extremo, C linealis B situm habebat, mobilis erat circa axem *g*, et huic extremo indicis insertus erat vncus *e*, vt ope cochleae maris *b* adduci et remitti posset deflexa *a* linea media *l* per elastri *k* impulsu longior pars indicis, quae super illa linea *l* conseruanda erat.

In externi superficie linealis linea ducta *l* indicabat situm indicis vel mutatum vel constantem.

§. 43. Haec machina in olla aqua feruente repleta et super prunis posita vt semper ebulliat apta videbatur indicare, vtrum annulo cupreo A contingat mutatio momentanea, an post defluxum horae successiua. Item frigidae immersa vtrum ex contractione declinet index vel in momento, vel post aliquod tempus.

§. 44. Experimentum itaque institutum est in aqua feruente atque super prunis continuo bulliente, at neque momentanea dilatatio annuli cuprei, neque successiua percipiebatur, et quanquam per horas duas et vltra in hac continua efferuescentia permaneret instrumentum, tamen index situm suum ne ad momentum mutauit. In frigida etiam ne minima quidem contractio obseruabatur.

§. 45. Hac ratione et hoc instrumentum hypothesei contractionis et dilatationis metallorum aut vitri neque fauebat, neque controuersiam dirimebat, in tantum, quod exinde probari possit, falsum liquoris ex eo prouenire. Imo quia etiam post diuturniorem coctionem nullam mutationem indicaret, suspectum hoc mihi valde reddebatur.

§. 46. Quandoquidem itaque prima machina tanquam valde composita fallax videbatur, ac si ex frictione frequentiore absorberetur contractio et dilatatio in filo orichalceo facta. Altera Bülfingiana etiam certam diremptionem litis non satis clare euinceret quanquam eam indicaret. Tertia quoque haberet, quod contradicentibus iustam occasionem suppeditare posset de impedimentis non
fa-

factae mutationis cogitandi, quandoquidem firmis experimentis destituantur.

§. 47. Hinc de tali machina mihi erat cogitandum quae et simplicissima omnem contractionem remoueret, et effectum ipso rem adeo subtilem atque sensus subterfugientem clare ac distincte produceret.

§. 48. Ad acusticam itaque meditationes meas direxi periculum facturus, vtrum ex sono aliquid mutationis momentaneae percipi possit in chordis metallicis. Instrumenta quidem musica e.g. clauicordia mutatum tonum produunt, quando aer mutatur; sed suspecta mihi erant quia lignea, nota vero est et contractio et dilatatio lignorum.

§. 49. Et sic quartam machinam adornaui et simplicissimam et optimam, quandoquidem expectationi meae egregie respondebat.

§. 50. Ex ferro confeci trabem 2 pedes longam Fig. 5., latum et crassum 1 dig. recuruatis vtrisque extremis ad 3 digitos, eaque corpore seu scapō latiores feci ut 2 dig. aequarent, et cum scapo duos angulos rectos facerent.

Fig. 5.

Ab vno extremo annexa duo fila orichalcea tendebantur vsque ad alterum, vbi ope duarum cochlearum et adduci et remitti poterant. Quae deinde ad monotonium extendi.

§. 51. Alterum adhuc tale instrumentum priori plane simile feci, et ad monotonium chordis prioribus in instrumento consonis aequè perductis, vnum instrumentum ad fornacem in hypocauſto ca-

lesacto reposui, alterum per 12 horas frigidissimo aeri tempore hyemali exposui, et obseruavi vtrum vtraque instrumenta monotonium et consonantium sint conseruatura nec ne.

§. 52. Experimenta itaque feci sequentia:

1. Cognoui quod tonus chordarum illius instrumenti quod in frigore collocatum erat grauior factus fuerat, quam istius quod post fornacem in calore permanerat, et vnum ab altero vltra vnā clauem musicam differret, ita vt si illius chordae quod in frigore haeserat *c* sonarent, alterius in calore detenti *d* audirentur, cum tamen vtrumque ante separationem tonum *d* ederent.
2. Instrumenta commutavi et quod in frigore fuerat in calore reliqui, et quod in calore steterat, frigori exposui, tunc eodem modo *frigus tonum remissioem, calor acutiorem* reddidit. Et haec experimenta saepius iterata eundem semper effectum habuerunt.
3. Instrumentum quod in frigore fuerat et tonum remissioem nactum erat, ad alterum instrumentum post fornacem reposui et post 12 horarum spatium vtrumque erat consonum, tonusque in frigore depressus vires iterum receperat et exaltatus in calore priori se conformauit.
4. Tale quid etiam obseruabatur quando vtraque instrumenta vel frigori vel calori simul committebantur, tunc vtriusque tonus vel grauior vel acutior reddebatur.

5. Por-

5. Porro expertus sum, quod chorda vnus instrumenti, quando eam intra duo frusta glaciei leniter madefacerem, *altiore* tonum acquireret quam altera sicca.

Aqua tepida cum linteolo madefacto diutius fricata chorda, tonum etiam assumebat *altiore*.

Absterfis linteolo chordis, tamen acutior tonus manebat, vsque dum per se ad pristinam siccitatem et statum redientes, iterum concordarent cum chordis sociis et vnisonae omnes redderentur.

Calida aqua eodem modo affricata ad vnam chordam, tonum depressit, qui grauior permansit quam diu mador calidus manebat, deinde retrigerata chorda, pristinum tonum *altiore* recepit.

6. Intra rimam ligni calidissimi et sicci demulsa chorda tonum *depressiore* recepit.
7. Intra rimam calidam cocti in aqua ligni et exinde madidam chorda tonum *grauiore* nanciscebatur.
8. Intra rimam ligni, in aqua frigida diutius macerati, fricata chorda tonum *acutiore* sisebat.
9. Intra rimam ligni sicci et frigidi terendo tonus chordae acutior reddebatur.
10. In aquam feruentem immisso toto instrumento extra aquam manentibus chordis tonus *acutior* fiebat.
11. In aquam feruentem immersis solum chordis, ita vt corpus instrumenti extra aquam in
sic-

sicco maneret, chordae tonum *in momento grauiorem* acquirebant.

12. Vna cum instrumento immerfae chordae in aquam feruidam, retinebant chordae tonum *acutiorem*.
13. In aquam frigidissimam immisso instrumento, extra aquam manentibus chordis, tonum *remissiorem* dabant chordae.
14. In aqua frigidissima immerfis solum chordis, ita vt corpus ferreum, ante post fornacem detentum, aquam non tangeret, chordae *altior* tonum in momentum acquirebant.
15. In aquam frigidam immisis solum chordis instrumenti antea in frigore effervati tonum fere retinebant eundem.
16. In aquam frigidam totum immersum instrumentum vna cum chordis, quod antea in frigore fuerat tonum acquirebat *acutiorem* sed tantum ad semitonium.
17. In aquam frigidissimam immersum totum instrumentum, antea post fornacem repositum, tonum acquirebat *acutiorem*.

§. 53. Constat itaque per haec experimenta, quod metalla in momentanea immersione in aquam calidam dilatentur quia tonus acutior reddebatur per experim. 10, 11, 12, dilatato enim instrumento chordae magis tenduntur. In aquam vero frigidam demissa metalla contrahantur per experim. 13, 14, 15,

15, 16, id quod tonus grauior indicabat; contractio enim instrumenti chordas remittit vnde grauius fonant.

§. 54. Quod vero chordarum tonus in frigore detenti instrumenti grauior fiebat exper. 1, 4, ex eo est, quia instrumentum ferreum contrahitur per frigus; chordarum vero iamiam intentarum contractio ab intensione impeditur. Contrarium euenit reposito instrumento in calore, experimentum 2, 4.

§. 55. Hoc vltimum instrumentum docuit quod priores machinae et propter frictiones et propter exiguitatem dilatationis et contractionis, visui imperceptibilem, sensus partim eluserint; partim, vt in tertia machina, vtraeque partes et cupreus annulus, et catena ferrea vna mutationem susceperint ideoque indicem non mouerint.

§. 56. Sonus autem in quarto instrumento solum sufficiens fuerit mutationem indicandi, litemque dirimendi, et certos nos reddendi, quod omnino et dilatatio et contractio *momentanea* fiat in metallis aequae ac vitris, et quod saltus liquoris in phiolis vitreis et metallicis ab illis mutationibus certo dependeat.

DE
 ACTIONE MUSCULORUM
 AB IPSORUM DIRECTIONE PENDENTE,
 SPECIMEN,

AUTORE

Fosia Weitbrecht.

§. 1.

Mense Jul.
 1729.
 Tab. XXII.

Doctrina de Musculis, si, quae generalia sunt, spectaueris, Anatomicorum industria plurimum est exulta. De Numero fere omnes conspirant, nisi quod accuratissimus quisque subtilissimas faciat diuisiones in fibrarum fasciculos plurimos, quos alii pro unico tantum musculo accipiunt. Huiusmodi fata, ut exempla allegem, iam *Vesalii et Columbi* tempore *Musculi pollicis*, qui hodie *Thenaris, Antithenaris* et *Hypothenaris* nomine venditantur, passi sunt. Figura musculorum ac magnitudo ad staturae corporis rationem est exacta; hinc propter subiectorum diuersitatem necessario inter se differunt. Manet tamen semper aliqua illorum similitudo, quae vero in nonnullis ita variari videtur, ut illorum descriptionem semper et ubique congruentem non liceat proponere, nisi longa ac non interrupta cadaverum serie, sedulo collatis obseruationibus, de constantia aliqua conuicti fuerimus.

§. 2.

§. 2. De *directione* autem musculorum, et inde dependente *actione* inter Autores nondum plane conuenit, nec etiam ita specialiter actum aut disquisitum est. Pauci Vesalii vestigia ingredienti patientia simili, qualis in hoc opere requiritur, ad musculorum progressum attenderunt: plurimi, compendia sectantes de origine ac fine nuda verba faciunt. Inde factum est partim, vt alii eosdem musculos ad alia membra mouenda referant: alii partim eidem musculo eidem ossi inserto diuersam actionem tribuant.

§. 3. Duo igitur sunt, quae ad Myologiam vltius excolendam forte non inutilia iudicabunt Anatomici; alterum, vt, si quae sunt principiorum atque insertionum *differentiae*, quatenus constantes magis aut rariores sint, et in quonam variationes illorum potissimum consistant, innotescat; alterum, vt *actiones* musculorum ex ipsorum *directione* accuratius determinentur. Scopi huius duplicis periculum in artuum superiorum Musculis extremis factum hoc specimine exhibere tentabo ita, vt vtrumque Thema pro re nata commisceam. Cum vero ad determinandas actiones mechanicis quibusdam atque osteologicis propositionibus opus sit: praemittere illas Lemmatum titulo, e re fore confido:

§. 4. Musculi sunt instrumenta motus, annexi partibus vicinis extremitate duplici plerumque opposita, quarum altera pro origine aut principio, altera pro fine aut insertione considerari solet: pars

autem fini connexa semper mobilis est. Vbicunque igitur est membrum motui exercendo destinatum: ibi etiam inferti sunt musculi, ex quorum actione reali, per abbreviationem quoquo modo factam se exerente, supposita, motus membri sufficienter potest explicari: infertio autem in membrum plane immobile facta necessario pro origine musculi haberi debet.

§. 5. Si musculus connexus est principio ac fine duobus membris, quorum alterum magis, alterum minus mobile existit: principium quaerendum est in membro minus mobili, finis contra. Dum enim membrum vtrumque mobile supponitur, Musculus quidem agens vtrumque illud aequali vi ad se attrahit: cum vero id, quod est magis mobile, eidem vi facilius cedat atque illud, quod est minus mobile; igitur reactione membri minus mobilis, atque actione musculi ex illa plaga mutuo sese destruentibus, reliqua vis musculi omnis in mobiliori membro mouendo consumitur.

Fig. 1. §. 6. Si corpus A pellit corpus B secundum directionem AB, cum vi, quae est vt linea AB: idem producit effectus, ac si idem corpus B traheretur a corpore C = corpori A, secundum directionem BC, directioni AB contrariam, cum vi, quae est, vt linea BC = lineae AB: in vtroque enim casu corpus B fertur versus plagam corporis C. Et corpus A in corpus B directe dicitur agere, si linea per vtriusque centrum grauitatis ducta coincidit cum linea directionis. Intelligatur igitur membrum

mouendum per corpus B, musculus mouens per corpus C, sequitur, actionem muscoli consistere in in. attractione membri mouendi versus suam plagam.

§. 7. *Directio* motus dependet partim ab *articulatione* ossium inter se: partim a *progressu* atque *inflexione* tendinum, in quibus videlicet omnes fibrae musculares concurrunt. *Articulatio* autem vel *simplex* est vel *composita*. *Simplex*, si caput epiphyseos vnicum excipitur. fovea vnica; idque vel profunde vel superficialie; vocantur hi modi *Enarthrosis* atque *Arthrodia*: *Composita*, si duo capita vel plura iuxta se posita excipiuntur duabus vel tribus foveis similiter positis; et vocatur *Ginglymus*, siue *Cardo*. *Species prima* admittit motus omnes in gyrum; *secundâ* duos in plagas contrarias.

§: 8: Posthabita quaestione de motu manifesto atque obscuro; hae duae species articulationibus indiuiduis omnibus haecenus satisfecerunt; aut saltem omnes articulôs ad illas referre Autores conati sunt. Fateor autem occurrere mihi aliquam, de qua, cui potissimum speciei adscriberem, haecenus haesitauerim. Est haec, articulatio internodii primi pollicis cum ossè quinto carpi. Equidem haud ignoro, esse alios, (*a*) qui pro *Enarthroseos* aut *Arthrodiae* specie habeant; alios, (*b*) qui pro *Ginglymo* quidem, sed dubitanter. Haec ipsa tamen Autorum discrepantia opinionem meam ex praegressis sectionibus conceptam confirmant, dum *tertiam* adhuc *speciem* adducendam putauerim, quae

G g 3

est,

(a) R. Columbus Anat. L. I. C. 26. (b) Andr. Vesalius An. L. I. C. 27-

- est, si in eodem capite aut in eadem fouea enarthrosis enarthrosin, aut (si quis articulationem tantum superficialiariam esse contenderit) arthrodiarthrodiam ad angulos rectos secat, et motum in plagas quatuor admittit. Habet enim *quintum os carpi* in latere exteriori atque interiore duas prominentiolas *a, b*, ut cum interiecta media superficie *c* speciem cavittis seu sinus oblongi forment: anterieus *d* vero et posterius *e* ad marginem ossis inter dictas prominentiolas, declivitates exsculptae sunt, quae quia profundius, quam interiecta media superficies positaee sunt, cum illa ipsa speciem capitis efficiunt; ita, ut dicta media superficies tam ad sinum, quam ad caput efficiendum, indifferenter se habeat. Similiter, *internodium pollicis* interius *a* atque exterius *b* declivie est, et cum protuberante media superficie sua *c* oblongum caput efficit, quod praedicto sinui ossis carpi respondet, ipsique immittitur: contra vero anterieus *d*, ac posterius *e* (magis tamen anterieus, ut recte *Vesalius* (*c*) monet) extuberat; et quia haec protuberantiae altius, quam superficies media positaee sunt, cum hac ipsa sinum componunt; ita, ut in hoc quoque osse dicta superficies media, pari modo, tam ad caput, quam ad sinum efficiendum indifferenter se habeat. Quatenus igitur hoc primum pollicis internodium oblongo capite suo in cavittatem ossis carpi insinuatur; eatenus a latere interno versus externum movetur, et contra: quatenus autem internodii cavittas seu sinus recipit, caput ossis car-

carpi; eatenus a parte anteriore versus posteriorem, et vicissim dirigitur. Qua in re hanc concedendam iustitiam esse Vesalio arbitror, cuius in hoc loco diligentia omnium fuit accuratissima, ut primum illum fuisse fateamur, qui hanc sententiam (d) stabiliverit.

§. 9. Musculus agit vel *directe*, vel *inflexe*, vel *oblique*. Actionem *directam* voco, si cum membro mouendo in *directum* iacet, et dum membrum ad se trahit, haec linea directionis cum linea, quae centra magnitudinis ossis et totius musculi iungit, in *eiusdem* plani sectione permanet; cuius Gastrocnemii cum sociis *Exemplum* exhibent. *Inflexa* est actio, si *tendinis extremum* tantum cum membro mouendo in *directum* iacet; *neque* illae duae lineae in *eiusdem* plani sectione permanent: quae est, si musculi tendo deflectit a prima directionis via, ope trochleae, quam transcurrit. Hanc speciem *Borellus* (e) fusius explicat. *Obliquam* actionem dico, si musculus cum membro mouendo plane *non* in *directum* iacet, sed in contactu angulum obliquum facit, atque illum quidem constantem, ut musculus radii rotundus. His praemissis, quae sequuntur, occasione data superstruemus.

§. 10. In Extensore digitorum communi nonnullae deprehenduntur differentiae ab Autoribus varie hinc inde descriptae: sunt tamen aliqua notatu digna, quae aut nostris temporibus obliuioni plane tradita iacent, aut a paucissimis subobscu-

re

(d) l. c. (e) De motu animal, P. I. prop. 76.

Fig. 4. re innui videntur; Videlicet inter tendines *a* extensoris Auricularis, Annularis et Medii ordinarios interiacent adhuc duo alii *tendines minores b, c, (f)* quorum quisque prope insertionem in phalangam digitorum primam in duo cornicula *d*, magis plana quam teretia diuiditur, ita, vt alter tendo *b (g)* simul in phalangam primam Auricularis et Annularis, alter *c* vero in eandem phalangam annularis et medii inferatur. Facit haec connexio non solum, vt reliquos tendines in extendendo adiucunt, aut illorum laesorum vices sustineant; sed etiam, vt tam digitos ipsos, quam hos eosdem tendines maiores contineant, ne aut illi nimium distendantur, aut hi a sua directione nimis deflectant. Siquidem et hoc eodem fine tendines medii et indicis per *membranam* aliquam (*b*) albedine sua et tenacitate satis conspicuam *e* (quam hactenus nunquam deesse deprehendi), pollicem circiter ab articulatione phalange primae cum osse metacarpi, colligantur.

Fig. 5. §. II. Ceterum *Insertio* tendinum *Extensoris* communis in internodia ipsa admirabilis est. Postquam enim inter duo tubercula cartilaginea ossium metacarpi tanquam super trochleam diriguntur; initio phalange primae in *tres* partes dirimuntur; quarum quae *media a, b*, et crassissima est, super gibbum huius phalange progressa, articulationem

(f) Hos omnes in Eustachio Tab. XXVIII. delineatos obseruat quem Lancisius; sed ibi cum tendinibus maioribus quasi in vnum coalescant, quod a natura abhorret.

(g) Vid. Vesal. L. II. C. 43. de Musculo 18.

(b) Loco huius membranae falso Eustachius Tab. XXIX. tendines interstitios fingit.

secundam superascendit in *c* atque in principium internodii secundi recta inseritur. Reliquae autem duae *d* ad internodii latera vtrinque deflectentes cum tendinibus lumbricalium atque interosseorum longis *e* concurrunt, atque intra suos limites interstitium triangulare *f* Membrana obtectum formant: postquam deinde articulationem *g* ambiunt, versus gibbum phalangae mediae denuo reflectentes *b*, ac sese decussantes *i*, internodio tertio oblique inseruntur *k*; quo fit, ut non solum venustati consulatur, sed etiam phalanga tertia ex utroque latere similiter tracta, iuxta directionem ex motu composito resultantem extendatur. Haec autem Membrana interstitio illo triangulari comprehensa revera tendo latus sive aponevrosi *l* musculorum interosseorum est, id quod tam ortus, quam progressus fibrarum tendinearum ostendit, quippe quae in termino fibrarum carnearum exsurgentes tamquam radii ex centro quaquaversum se diffundunt, atque extremitate sua tendinibus extensoris affiguntur atque implicantur.

§. 12. Credo obuiam esse mihi eundem lectori, ne obiiciat, me in eo errare, quod stantibus his tendinum progressionibus et coniunctionibus actiones musculorum confundam: qua propter paulo fusius hac de re mentem meam explicabo. Cum digiti manuum tres potissimum motus diversos patiantur, *flexionem*, *tensionem*, et *inclinatorem* ad latera: tribus his finibus suis quoque musculis satis-

facere natura studuit. De flexione duarum extremarum phalangerum, utpote manifesta satis, nulla umquam oborta est quaestio; neque extensio per extensorem communem facta ullis implicita est difficultatibus. An vero extensio per dictum hunc musculum solum fiat, et quinam Musculi primam phalangam flectant aut ad latera inclinent? disquiritur. Vulgo *Lumbricales* pro *flexoribus* internodii primi, *Interossei* pro *inclinantibus* venditantur. Sed Columbus primus annotavit, *Lumbricales in teretem et nerveum tendinem desinere, et per internos digitos iuxta eorum longitudinem delatos adhaerescere tendinibus musculi extensoris, et in tertium articulum suis finibus immitti; et hinc extensioni potius inservire* conclusit. Porro I. Duglasius de *Interossei* tradidit, ipsos formare *tendines duos, quorum alter mox superiori et laterali parti primi internodii inseratur; alterum vero valde ampliari, ita ut maximam iuncturae partem tegat, deinde, ubi ad secundum internodium appropinquaverit, iuxta longitudinem huius ossis excurrere, ibique in parte superiore articuli extremi, postquam prius cum socio alterius lateris se coniunxerit, finire: hinc cum tendines longi agant, ultimum articulum extendi, atque sic eos supplere vicem Extensoris magni, qui hic deficeret.*

§. 13. Positis his sententiis combinatis *Lumbricales* fiunt *Extensores*, et *Interossei* partim *Inclinatores* sunt, partim *Extensores*. Tam vera autem sunt, quae Columbus proposuit, ut verius esse

esse nihil possit. Neque, quod Duglasio regeramus, multum habemus. In hoc solo falli mihi videtur, quod *primo* tendinem longum in supplementum Extensoris *deficientis* datum esse putet, quod tam ex Columbo §. 12. quam ex nostris observationibus aliter esse §. 11. innuimus; *deinde*, quod duplicem tendinem tribuat musculis omnibus, cum tamen id de aliquibus tantum verum esse sectiones repetitae testentur. Quinam autem tales sint, antequam determinemus, de numero atque insertione illorum erit dispiciendum. Quapropter, cum, *ut historiam Interosseorum* hic intexamus, omnes Anatomici *sex* illorum haecenus memoriae prodiderint, Cl. Heisterus autem in *Compend. Anatom. Not. 74.* ex Stockhusianis observationibus *senarium tribus* augeat: neutra sententia damnata, quid cultro meo multoties studiose huc directo occurrerit, simpliciter narrabo.

§. 14. Verum quidem est, in vola manus plerumque *sex* distinctos musculos interosseos (quos internos dicemus) apparere, si ita nude et sine ulteriori praeparatione aspiciuntur: verum, si paulo profundius illi investigantur, deprehendes: Esse *I^{mo}. Interosseum primum internum*, qui alio fascicularum numero a condylo ossis metacarpi indicis, alio autem a condylo ossis metacarpi Medii oriatur, atque in vola magis, in dorso minus conspicuus tendine duplici *longo* et *lato* in indicis *latus externum* (nam latera digitorum *interna* vocabo illa

quae pollicem respiciunt.) inferatur. Esse II^{do} *Interosseum secundum internum*, qui a latere ossis metacarpi Medii digiti ortus solam *aponeurosin*, seu tendinem *latum* ex latere huius ipsius digiti interno formet. Esse III^{io} *Interosseum primum externum*, qui *partim* ex adverso tendinis radiacii externi et latere ossis metacarpi Medii interno, *partim* obliquo, applanato ac longiusculo tendine ex dorso huius ipsius ossis metacarpi ortus, totum interstitium compleat, atque paullo inferius, quam antecedens inferatur. Et quamvis interdum hi duo muscoli difficulter a se invicem separentur, semper tamen distincta *duplicis* tendinis lati insertio adest. Esse IV^{to} *Interosseum tertium internum fictitium*, qui non possit separari ab *Interosseo secundo externo*, qui solus in dorso conspicuus, a lateribus ossium metacarpi Medii et Annularis exortus, interstitium horum ossium repleat, atque similiter, uti *Interosseus primus internus duplici* tendine, *longo* atque *aponeurosi*, in Medii digiti latere externo affigatur. Esse V^{to} *Interosseum quartum internum verum*, qui *sola aponeurosi* in latus annularis digiti *internum* tendat, postquam ortum suum ex superiore capitulo, et tota facie cava ossis metacarpi ad dictum digitum pertinentis duxerat. Esse VI^{to} *Interosseum quintum internum* similiter *fictitium*. Esse VII^{mo} *Interosseum tertium externum* cum Antecedente unum atque eundem, qui tam interstitium ossium metacarpi, Annularem atque Auricularem sustentium, quam dorsum manus repleat, *lataque apo-*

aponevrofi ac *tendine longo* gaudeat ad annularem pertinente. Esse VIII^o *Interosseum sextum internum verum*, qui ex tubere octavi ossis carpi ortus, ac secundum faciem cavam ossis metacarpi, quod Auricularem sustinet, delatus *sola aponevrofi* in *latus internum* Minimi digiti inferatur. Quibus praemis-
sis, quid inde sequatur, videamus.

§. 15. Ante omnia apparet, *origines musculorum Interosseorum*, quales nos hic sistimus, cum descriptionibus *Duglasianis* vehementer concordare. Sunt autem illorum solummodo *septem*; *externi tres*, *interni quatuor*, ita, vt ex superinductis *Stockhusianis* ille solus, qui ordine suo *secundus* recensetur, et lateri Medii interno affigi praetenditur, ex rationibus §. 14. N. III. allegatis admitti posse videatur. Horum septem autem non sunt nisi *tres*, nimirum *Internus primus*, *Externus secundus*, atque *Externus tertius*, qui *duplici* tendine simul gaudent; reliqui enim *quatuor* in *solam aponevrofin* terminantur: atque illi quidem omnes ex latere digitorum *externo*, *bi* vero ex *interno* positi sunt. Namque in hac re mirificum natura ordinem servavit, vt *cuius* digito ex quovis latere *duos* quidem tendines *longum* atque *latum*, sive *aponevrofin* adiecerit: cum vero *Lumbricales* quatuor muscoli omnes ex latere *interno* positi in hoc idem quoque *latus* suos tendines *longos* implantandos impertiant, ex latere autem *externo* deficient; factum est, vt ex hoc *solo* quoque *externo* latere muscoli *Interossei* tendine *duplici* in *Lumbrica-*

calium locum surrogarentur, interne autem *sola aponeurosis* ad ipsos pertineret. Sunt igitur *Lumbricales Inclinatores* vel *Adductores*, cum *soli* agant, ut Vesalius suo loco indicavit; sunt *illi* autem et *Extensores* phalangae digitorum extimae ex uno latere, quoties ex altero *simul* cum illis agunt *Interossei* tendine *longo* praediti, quos iam supra allegavimus, nimirum Internus primus, Externique secundus ac tertius: qui autem simul vi aponeuroseos phalangam digitorum Indicis, Medii, atque Annularis primam, et consequenter totos hos digitos a pollice *declinant*, aut (uti Anatomici loqui amant) *abducunt*, cui motui Auricularis exequendo Abductor eius proprius satisfacit. Contra *Interossei* in *solam aponeurosin* terminati, quales sunt *Externus primus* cum *Interno secundo*, *Internique tertius et quartus*, *soli* agentes, *inclinant* phalangam digitorum Medii, Annularis atque Auricularis primam, et consequenter totos hos digitos versus pollicem; in inclinando autem Indice Abductor eius vulgo ita dictus simile officium praestat. Quum vero et Lumbricales et Interossei *omnes ex utroque latere simul* agant, atque ab allegatis duobus musculis, Abductore Indicis atque Abductore Auricularis adiuvantur: ipsorum actio in *flexione* phalangae primae, et *extensione* extimae potissimum consistit, quos *duos* motus simul fieri posse experientia confirmat; cessat autem illorum *posterior* tum demum, cum musculus Profundus Antagonistarum suorum vim superaverit.

§. 16. Nisi natura in construendis ac locandis musculis *extendendo pollicis* dicatis simplicior esset et constantior, quam autorum in describendis illis confusio: sine dubio ab illorum examine abstineres. Neque hic multum novi adduci posse arbitraris, cum ex veterum sedulis laboribus in memoriam revocare suffecerit, quae a neotericis neglecta sunt; ita enim apparebit, talem eorum descriptionem dari posse, quae cum subiectis omnibus mire conveniat. Quapropter exponere liceat, quid deprehendere quaerentibus nobis contingerit. *Duo* sunt proprie *Musculi* pollicis, quibus *extensoris* munus tribuitur; *unus inferior* ex ulnae medio exortus, atque ab Extensore digitorum communi, interdum vero (quod Vesalius praetendit) ab Extensore indicis proprio, solutu difficilis secundum longitudinem cubiti progreditur, deinde fossulam suam propriam radio insculptam iuxta tendines radiaci externi transcurrens versus pollicem inflectitur et mediae extimaeque eius phalangae *tendine simplici* affigitur. Erigit hic musculus, seu *extendit*, non quidem pollicem integrum, sed eiusdem phalangam extimam, et si fortius agat, etiam mediam, primum vero internodium immotum relinquit: quapropter abductionis actio a Columbo (i) ipsi falso attribuitur.

§. 17. Musculus *alter*, quam vere *Extensor pollicis* dici mereatur, dispiciamus. Pollex cum Carpi ossiculo quinto iungitur per articulationis

spe-

(i) L. V. C. 34. de Musculo quarto.

ciem tertiam, quam (§. 8.) fusius descripsimus, et quae motus *quatuor* admittit; quos eo clarius intelliges, cum totum postbrachiale, et primum pollicis internodium, super brachiale in arcu circuli iuxta se posita esse finxeris. Erit enim tunc *primus* motus, si primum pollicis internodium, in hoc arcu movetur, atque ad postbrachiale propius *apprimitur*; *secundus*, si ab illo *declinatur* seu abducitur; *tertius* erit, si hoc pollicis internodium in linea quasi radii circuli movetur, hoc est versus volam *inclinatur*, qui motus se potissimum *exerit*, si concavam reddere manum velis, aut digitorum apices coniungere; *quartus*, si pollex *reclinatur* in sensu antecedenti *opposito*, et fortiter *extenditur*. Iam hic, de quo nobis sermo est musculus, supra antecedentem (§. 16.) positus ex media ulnae parte et ligamento cubiti ortum suum ducit, atque in *tres* tendines distinctos dividitur, qui omnes obliquo ductu tendinibus radiaei externi instrati versus pollicem diriguntur, eique movendo inserviunt. Horum trium tendinum *infinus*, internodio pollicis primo adhaerescens usque ad initium medii descendit, atque in latere illius *posteriore* inseritur: hinc et internodium medium sine dubio erigit seu *extendit*; et si fortius agat, primum quoque: quoad hanc portionem igitur hic musculus dici *Extensor* potest, dum motum illorum, quos recensuimus, quartum exercet. Portio *suprema* tendinem educit, nonnumquam subtilem, nonnumquam crassiorem, atque in pollicis
latus

latus *interius*, non autem, ut nonnulli memoriae prodiderunt, in carpi quintum os inferitur, ibique origini tendineae musculi Thenaris implicatur. Portionis *mediae* et principalis tendo crassissimus inferitur in *latus internum* pollicis immediate infra declivitatem (§. 8.) interiorem e primi eius internodii. Hanc portionem igitur non extendere pollicem, sed *abducere* a reliquis digitis, ex tendinis sui *directione* et *fine* patet. Dum enim a linea sua *recta deflexit*, qua super ligamentum cubiti currebat, ac super crenam in hunc finem radio insculptam tamquam super trochleam incurvatus denuo versus pollicem dirigitur; illam *actionem* exercet, quam (§. 9.) *inflexam* vocavimus. Cum vero via *recta* in *latus interius* pollicis, non vero posterius terminatur: versus illam quoque plagam hoc internodium inclinatur, et motum exercet illorum, quos supra allegavimus, secundum; quem motum iam Vesalius si recte eius mentem assequi valeam, (k) indigere conatus fuit. Quapropter, annon hic musculus, quoad portionem suam maximam Abductor potius, quam Extensor vocandus sit, illorum, penes quos est, iudicio libens relinquo.

§. 18. Flexorem internodii pollicis extimi in pluribus cadaveribus invenio *bicipitem*. Dum enim caput *principale* ordinarium originem suam ex superiore cubiti sede trahat, atque in progressu ligamento, quod radium cum ulna continet, ac radio ipsi adnascatur: corpus *alterum* teres et gra-

Fig. 6,

Tom. IV.

I i

cile

(k) L. II. C. 43. in fine de Musculo vigesimo secundo, 1

cile principium ex ipso flexore digitorum sublimi ducit, a quo facile potest separari; postquam vero a sublimi deflexit, tendines utriusque in *unum* plane coalescunt, ut nulla diuisionis nota appareat, qui suo loco ab autoribus satis descripto implantatur.

§. 19. Palmarem longum nonnumquam deficere, multi autores notarunt: mihi idem aliquando observare contigit in cadavere feminino, praesente tamen aponeurosi in vola. Si musculus ipse cum aponeurosi adest, modus, quo limites ligamenti annularis transgreditur, varius indicatur. Quibusdam simpliciter transcendit, aut supra illud ambulat; eius sententiae fuisse videtur B. Eustachius in Tabularum suarum vigesima prima paranda. Sed aliis in locis mens alia se prodit: nam Tab. XXVIII. XXX. tendo palmaris gracilis ligamentum plane perforat aut transfodit; quem modum tamen nimis affectatum deprehendere mihi hactenus numquam licuit. Cohærere hunc tendinem cum aponeurosi, et quidem in confinio ligamenti annularis, verum est; sed non adeo conspicue se res prodit: quin potius in duas partes mihi visus est dirimi; quarum una de ligamento nihil participat, sed sub membrana musculorum communi abscondita illud simpliciter transgreditur atque in aponeurosin ordinariam terminatur; altera vero partim in ligamentum ita implantatur, ut fibrae minutatim sibi intextae, se invicem decussent, partim (quod et Eu-

Eustachius Tab. XXXII. vidit) cum principio Thenaris se confundit. An vero circa confinia digitorum desinat aponcurosis, siue an usque ad extremitates illorum pertingat? disputatur. Numquam mihi tam felici esse contigit, vt tam longe illam prosequi potuissem: sed illam mox a ligamento discedentem plerumque in tres partes dirimi, veluti radii circuli tamquam e centro productas, ad tres digitos, Indicem, Medium et Annularem directas; ac fibris suis perpetuo se diminuentibus, partim cum vaginis tendinum Extensorum, partim cum ligamento aliquo transverso (1) prope radices digitorum, eadem ratione ac cum ligamento annulari, confundi semper mihi visum fuit.

§. 20. Non meum est nunc examinare: an hic musculus creatus sit, vt depilis fiat cutis? an? vt sensu acutiore sit vola praedita; an? vt cutis manus in apprehendendis obiectis firmetur: haec enim omnia partim ab aliis resutata sunt, partim sua infirmitate labascunt. Sunt usus alij, qui maiorem veritatis speciem prae se ferunt. Constringere manum, seu cauam illam reddere posse, et corrugare hunc musculum negat in Anatomia sua rationali Taurys; sed credibile tantum esse, vt metacarpum versus originem suam trahat, arbitratur. Verum primo, nihilominus in manu constringenda eundem adiutorem esse crediderim: partim, quia, dum abbreviatur, aliquam pinguedinis

I i 2.

portio-

(1) Huius ligamenti meminit Duglasius. optime autem delineauit totam aponcuroseos divisionem una cum ligamento Casserius de Org. Sens. T. I. f. 2. B. C.]

portionem, quae aponeurosi illius implicita est, et cavitatem impedit, secum abducit; partim, quia aponeuroseos fibrae, quae diuergebant prius semper minorem inter se angulum constituunt, atque ita partes illas, quibus extremitate sua iunguntur, arctius et propius contrahunt; quemadmodum duo termini arcus, si chorda tenditur, propius ad se invicem accedunt. Quid, si deinde eo etiam inseruiat? ut ligamentum; annulare sursum trahat, quo facto flexores digitorum magis firmantur, et ossicula carpi, quae ligamentum vtrinque adhaeret, erga se inclinantur, modo ligamentum mobile statuere liceat, quod ob propriam elasticitatem, ac debilem ossium carpi inter se cohaesionem nemo facile negauerit. Nihil definitio: opta Lector, aut, qui praestas, Sector, ipse; et experire.

Explicatio Tabulae.

Fig. 1. per se patet.

Fig. 2. exhibet os carpi quintum manus dexteræ, ex illa superficie, qua articulatio fit cum primo pollicis internodio, conspiciendum.

- lit. a. prominentiola ad marginem interna.
 b. prominentiola externa.
 c. media superficiei pars.
 d. decliuitas anterior.
 e. decliuitas posterior.

Fig. 3.

Fig. 3. exhibet superficiem primi pollicis internodii, qua ossis antecedentis superficiem tangit.

- a. declivitas interior.
- b. declivitas exterior.
- c. superficies media.
- d. prominentia anterior altior.
- e. prominentia posterior.

Fig. 4. Sistit manum integram, in cuius dorso tendines Extensoris magni ac tendines interstitii, illorumque inter se coniunctiones videri possunt.

- a, a, a. tendines maiores ad tres digitos progredientes.
- b. tendo interstitium inter Auricularem et Annularem.
- c. tendo interstitium inter Annularem et Medium.
- d. divisio tendinum in duo cornicula.
- e. Membrana, alba, tenax, tendines ad indicem et Medium pertinentes continens.
- f. ligamentum annulare exterius discissum.

Fig. 5. exhibet digitum Medium, atque insertiones tendinum extensoris communis, interosseorum, ac Lumbricalis.

- a. b. Tendinis pars media, in
- c. articulationem secundam superascendens.
- d. portio secunda et tertia lateralis.

- e. tendo lumbricalis longus.
- f. interstitium triangulare, membrana aponevrotica tectum.
- g. ambitus tendinis lateralis ad articulationem secundam.
- h. illius reflexio, versus dorsum,
- i. decussatio, et
- k. insertio.
- l. duplex musculus interosseus, in latere digiti medii interno, cuius tendines aponeurosin latam formant.

Fig. 6. exhibet insertionem lateralem Portionis tendineae mediae Musculi vulgo extensoris dicti in phalangam pollicis primam, quae cum carpo articulatur.

- a. capitulum inferius, quo cum phalanga media iungitur.
- b. latus interius, seu a digitis auersum.
- c. protuberantia anterior, siue in dorso conspicua.
- d. tendinis Extensoris portio media.
- e. eius insertio infra decliuitatem lateralem interiorem.

LIGAMENTI

CLAUICULARUM COMMUNIS DESCRIPTIO,

AUTORE

Josia Weitbrecht.

Clauculas cum sterno cohaerere, ita quidem, Tab. XXXIII
 vt non omnis ipsi motus denegari possit,
 vno omnes ore Anatomici affirmant. Hinc
 et cartilagine[m] mobile[m] non solum in-
 teriectam habent, sed et tam sternum quam clauiculae in ipsius iuncturae superficie cartilagosae sunt, suoque muc[o] obliniuntur, ne ex nimis forti fric[t]ione quidquam damni oriretur. An vero clauiculae alio quodam vinculo cum sterno firmiter coniungantur? siue an inter se sint copulatae? de hoc vero altum est vbiq[ue] silentium. Blanditus igitur sum mihi et ego ipse diu, et facile ab aliis assensum obtinui, quasi hoc ligamentum, cuius nunc descriptionem dabo, plane nouum esset, nisi tandem in Iohannis Riolani Enchiridion Anatomikum incidissem, in cuius Libro sexto Osteologiam nouam ex recentibus cadaueribus depromere molitus Autor Capite decimo tertio de Clauiculis memoriae tradidit: „quod inter se iunctae sint ac reuinctae, *interuentu robusti ligamenti* „. Haec vero admonitio cum a posteris scriptoribus neglecta fuerit; inuentum in se quidem non plane nouum

uum, sed obliuione sepultum resuscitabo, atque eorum, quae vel nudo verbulo Riolanus indicauit, vberiore explanationem sistam.

Situm est igitur hoc ligamentum inter duas clauicularum extremitates, quae sterno applantantur, subter sterni huius superficiem internam, cauum pectoris respicientem, ita quidem, vt ex vno latere ab hac ipsa superficie, ex altero vero a terminis musculorum parium sternohyoidis ac sternothyroidis obtegatur. Termini Ligamenti sunt vtrinque protuberantia seu angulus acutior capituli claviculae, quo cum osse pectoris articulatur, sursum ac retro spectans, quemadmodum ab A. Vesalio in Hum. Corp. Fabr. L. I. C. XXII. f. 2. Lit. D. eleganter exprimitur: a quorum vno ad alterum transversim sub sterni summitate furcata subducitur. Ligamenti figura nec plana, nec rotunda dici potest, sed pro subiectorum diuersitate variat; interdum duplex esse ac interspersa pinguedine distinguui videtur.

Cui detegere Ligamentum, et simul eius usum volupe fuerit, facile id praestabit, si remotis integumentis communibus primo clauiculas in ipsa iunctura cum sterno solvat, et quidem cautela summa, ne cultellus vltra iuncturam adigatur, quia alias ligamentum ipsum vna discinditur (quam rationem subesse putem, quare a tam paucis notatum fuerit): deinde cartilagine costarum pro more scindat, ac sternum deorsum reflectat. Tunc enim ligamentum tamquam chordam tensam, validam-

lidamque, ab vna clauicula ad alteram productam deprehendet: quo edocemur, clauiculas non solum inter se coniungi, sed et in sua articulatione cum sterno eo fortius detineri atque apprimi, ne illarum motu nimis lubrico, aut actione musculorum in ipsas implantatorum vehementiore luxationibus frequentioribus sint obnoxiae.

Poterit etiam in situ suo conspici, externe, si membranulae et vascula, quae in curvatura supremi ossis sterni, inter clavicularum capitula oberrant, diligenter separaueris: interne autem si in conspectum producere velis, solutis musculis supra nominatis in insertione sua, portio sterni ac clavicularum vtrinque abscissa, ex corpore auferri, dictique musculi postmodum vsque ad originem suam remoueri debent.

Ut imaginationi illorum, quibus aut cadavera aut sceleta ad manus non sunt, succurramus; luculentius rem omnem ante oculos ponit sequens

TABULA.

cuius

Fig. 1. exhibet resectam sterni, clavicularum ac musculorum allegatorum portionem, quatenus a latere externo omnia conspiciuntur. notatur autem

- a. Musculus sterno-hyoides ab osse hyoide solutus.
- b. Musculus sterno thyroides antecedenti subiectus.

Tom. IV.

K k

d.

- d. Musculus coraco hyoides.
 - e. Venula sternohyoidem interiacens, quae interdum simplex, hic duplex est.
 - f. membranula glandulam Thyroidem tegens.
 - g. abscissae claviculae.
 - h. abscissum sternum.
 - i. Capitula clavicularum iuncta cum sterno.
 - k. Ligamentum clavicularum.
 - l. venula abscissa, sanguinem fundens.
- Fig. 2. monstrat dictae portiois sterni et clavicularum faciem interiorem pectus respicientem cum accumbente ligamento.
- a. abscissum sternum.
 - b. abscissa clavicula dextra.
 - c. abscissa clavicula sinistra.
 - d. Clavicularum capitula.
 - e. Ligamentum clavicularum in hoc subiecto duplex visum.

OBSERVATIONES ANATOMICAE

AUTORE

Josia Weitbrecht.

Tab. XXIV.

I.

Musculus in
pectore ex-
traordinari-
us.

SI apud naturae Scrutatores gratiam merentur illi, qui in variationes partium corporis humani diligenter inquirunt; vel, qui in parvis magnam sedulitatem locantes ac operam, duo esse ostendunt, quae ab aliis, quorum aut oculi

Oculi non tam lyncei, aut cultellus non tam acutus, pro vno simplici habita iunt: spero, me veniam saltem esse promeriturum, si musculorum par integrum, insolitum alias, et magnitudinis non contemnendae prodacam, quod e cadauere militis cuiusdam tale deponi:

Immediate sub thoracis integumentis ex osse summo sterni duo musculi oriebantur aponeurosi communi breui, quorum alter paulum ad dextram, alter similiter ad sinistram flexus, super cartilagine costarum et origines musculi pectoralis maioris decurrebat, relicto sterno propemodum intacto et nudo. Corpus huius paris musculorum tres digitos latum et digitum crassum postquam peruenerat ad costae quintae verae cartilagine, denuo degenerabat in aponeurosin, quae fibras tendineas, quae a serrato maiore antico proueniunt, decussans, et principium musculi abdominis recti transgressa tandem in inscriptione huius prima maximam partem obliterabatur. Si de actione interroger: autumo, contrahendo sese Rectum abdominis propius ad pectus attrahere, atque ita in respirationis negotio suos usus exerere.

Ceterum et situs, et progressus et insertiones facile partes meas tuentur, si quis me perperam vidisse mihi obiecerit. Neque suspicionis metum me incurrere putem, quasi homini affingere stude-rem, quae quibusdam tantummodo animalibus propria esse constat. Equidem non ignoro, Vesalium omnem mouere lapidem contra Galenum,

Musculus
abdominis
extraordi-
narius.

ne quis musculum fere similem, quem in sua C. H. Fabrica L. II. C. XXV. quintum thoracis descripsit, et Tab. V. delineavit, utpote a similibus transsumtum ad hominem pertinere crederet: praesenti tamen exemplo rei saltim possibilitas evincitur. Si quidem et alibi musculos tales extraordinarios nunquam dari, sectionibus expertus sum. Inter musculos enim abdominis descendentes et ascendentes occurrit aliquando mihi alius quidam musculus, calami scriptorii crassitie: qui ortus ex apice cartilaginosa costae undecimae excurrit intra Descendentem iuxta huius fibras, et Ascendentem. Non autem pro fibra descendente separata haberi debebat: neque enim in membrana huius communi involutus erat, et sine etiam gaudebat plane peculiari, utpote in aponeurosin ascendentes insertus. Nec pertinebat ad ascendentes, nam huius fibras decussabat. Erat igitur musculus plane peculiaris et insolitus; quem quidem facile reticuissem, nisi argumenti conditio mentionem eius facere iussisset.

Vt ut vero talia organa levis momenti esse videantur: non tamen, meo quidem iudicio, plane sunt negligenda. Gaudent enim suis vasibus et ad motus edendos aequè apta sunt ac cetera. Si corpus motum in aliud impingit, a directione pristina deflectit. Si filum diuersis locis diuersimode tenditur, flexurae oriuntur diuersae. Non dubium igitur est, quin et in corpore humano praesentibus istiusmodi organis insolitis, motus aliqui con-

consequantur, qui gigni non potuissent, si organa ista abfuisent. Cum vero homo, ut homo, etiam sine his instrumentis raro occurrentibus perfectissimum animal esse iudicetur: quare illa, cum adsint, non aequè miramur, ac si ia hominem pede aut digito supernumerario ditatum incidimus? Scilicet huius incommoda aut comoda in oculos statim incurrunt: ista autem despiciamus, quia ignoramus.

II.

Res omni attentione dignissima oblata mihi est in utero feminae alicuius a me dissectae. Erat Tabz Fallo-
piana vtra-
que in ex-
tremitate
fimbriata
coalita. uterus ea magnitudine, qua esse solet in virginibus, tubaeque ambae apertae quidem ad ingressum uteri, ita ut ex hoc in illas cum specillo facile possem transire, ac statim iniicere: sed in tubarum extremo nulla dabatur apertura, nullus aditus. Fimbriarum enim ne vestigium quidem aderat, sed loco illarum bulbus aliquis pyriformis, materia subalbida fluida turgens, in cuius medio fibra plana nervea, cicatriculae aemula apparebat, quae sub ligamentuli specie usque ad ovarii involucria protendebatur.

Dices: eadem a Regnero de Graaf iam olim notata. Equidem non negauerim, illustrem hunc Profectorem in libro suo de Organis muliebribus non modo similem Tubam delineasse Tab XIX. f. 3. sed et monuisse „Tubas, quamvis secundum ordinariam naturae dispositionem in extremitate sua

notabilem semper coarctationem habeant; praeter naturam tamen aliquando claudi., Verum enim vero cum non meminerit Autor, an id in vtraque tuba itaprehenderit? an in virgine? an status iste praeternaturalis sterilitatem inducat? an vero conceptio nihilominus fieri possit? an a principio vitae talis structura suam originem ducat? siue, an tractu temporis ita degenerare tubae possint? facile perspicimus, multa nobis relicta esse problemata, quae vtcunque soluta multum negotii facebant in exemplo nostro. Erat enim haec femina maritata, viginti quatuor annos nata, quae filium pepererat, quem vidi ipse, octo iam annos natum, vna cum auia ex matre, matris et filiae cadauer a me petentem. Dic igitur, tubas ab incunabulis clausas sterilitatem inducere: quare haec nostra femina peperit? Dic, concepisse tubis clausis: quomodo ouulum ingredi tubam potuit? Dic, coaluisse tubas post partum: quomodo id nosti? quomodo adeo euanescere in vtroque latere fimbriae possunt, tamquam numquam adfuisse? Si quidem ex ovario ad tubas alia daretur via praeter illarum orificium: vnico gressu omnes superarentur difficultates. Sed fictiones intellectum quidem adiuuant, rei veritatem non demonstrant. Praestat igitur, ignorationem fateri, quam speculationibus indulgere.

Non discedere ab hoc cadauere possum, quin et reliquas addam obseruationes, non tam raritate aut vsu, quam potius, quod in vno eodemque

cor-

corpore factae, commendabiles. Arteriae umbilicales tres pollices ante, quam ad umbilicum accederant, in unum truncum coaluere. Ren sinister ex vna pelui duos vtereres produxit, qui duos pollices ab egressu iungebantur. Observatum est id Ruyfchio aliisque multoties; sed pelues duae inter se non communicantes, quales ren dexter exhibebat, cum duobus vtereribus vsque ad vesicam deductis, oppido raro occurrunt. Ex Ileo latam manum ab insertione eius in Coecum, immediate supra vterum oriebatur processus seu intestinulum aliquod coecum, diametro pollicem longitudine duos pollices aequans, capacitatis vbique aequalis: in fine duo erant tubercula itidem caua, quasi duo cornua, alterum supra vteri fundum alterum infra ipsum vergens, ita vt illum tamquam digiti complecterentur. Non haberi poterat hic processus pro aliqua ilei dilatatione, saccum formante, siquidem suis propriis ligamentulis ac fibris motricibus erat praeditus, sine quibus extra dubium, excrementa, si qua diuerticulum ibi quaesivissent, delitescencia expelli non potuissent. Totus processus magis dilucide conspicuus est in Tabula, cuius Fig. 1. exhibet portionem Intestini Ilei, cum processu insolito in suo situ.

Arteriae umbilicales in unum truncum coalitae

Vtereres duo cum pelui duplici

Fig. 2. exhibet portionem eandem, sed processum sursum reflexum.

- a. Ileum ab intestinis crassis abscissum.
- b. Ileum abscissum ex altera parte.
- c. Mesenterium separatum.

d.

- d. Processus extraordinarius.
- e. locus vbi ex illo oritur.
- f. duo tubercula.
- g. curuatura, cui vterus adiacuit.
- h. ligamentula, ac fibrae circulares eodem modo ac in aliis intestinis conspicuae.

III.

Obliquus
vteri situs

Vterum loco suo moueri, et vtrinque ad latera inclinari posse, multum ac vehementer disputat Henr. a Deuenter in Nouo Lumine de arte Obstetric. Hinc erroris arguit obstetricantes, qui interdum secundinas non in fundo vteri sed ad latera adhaerere et sibi et aliis persuadent: cum tamen hæc loci mutatio non a secundinis ipsis, sed potius a reflexo situ vteri ipsius proueniat. Plurimum fauet sententiae huic Deuentrianæ positio vteri, qualem his diebus in quadam femina detexi. Erat vterus constitutionis naturalis, qualis in non praegnantibus esse solet. Non iacebat autem in medio inter vesicam vrinariam et intestinum rectum, sed ad latus dextrum deflectebat, ita vt ligamentum, quod latum dicitur, hoc ipsum intestinum super-scanderet, et tamquam velamen obtegeret: ex peruerso situ necessario sequebatur, vt ala sinistra multo longior ac latior cum annexis esset, quam dextera. Haec extensio ac positio num a statu grauiditatis antecedaneo vel iam inde ab ovulo ortum suum duxerit? nunc non inquirō: ceterum tamen dubium non est, quin vterus hic postliminio impraegnatus in eodem situ inclinato perman-

mansurus, atque ita parturienti plurima incommoda obiecturus fuisset. Non erravero igitur, si argumentis illis satis firmis, quae obliquum vteri situm in gravidis adstruere annis est à Deuenter, hoc addidero, quod et nonnunquam in antecedentem distorsionem matricis nondum foecundatae ac ligamentorum inaequalem explicationem illius culpa redundare possit.

IV.

Sartor aliquis, fanissimus habitus, inclinando corpus, ut ferramentum ad laeuigandas simbriarum inaequalitates capefferet, subito concidit examinis. Repentinae mortis causa ut sciretur, sectioni traditum est cadaver. Sub cranio violentiam quaesivisses mecum: Sed intra thoracis penetralia malum omne delituit. Ecce enim, remoto sternone ex pericardio vehementer turgido aqua ordinaria cum impetu profilit. Putabam, omnem pericardii cavitationem illa repletam fore: igitur spongia exhaustare tentabam. Sed mea me fefellit opinio. Lympha enim pauca supernatabat grumis sanguineis recentibus octo uncias pendentibus. Stupefactus ad tam insolitum phaenomenon, in profusionis causam inquirere adgredior. Inflo igitur primo venam caavam, et ecce per foraminulum in aortae principio aer omnis redit. Duo mihi curiosa videbantur: primo quod laesio in tam robustis tunicis sedem haberet; deinde, quomodo aer ex caava in aortam posset transire, cum nullam mutationem pulmones paterentur. Cor igitur excindo cum

Tom. IV. L 1 vasis

Abcessus in
principio
aortae.

vasis adhaerentibus summa cura, et apertis cavitatibus inuenio corrosas, et tamquam a muribus exefas tunicas aortae immediate supra valvulas semilunares, et membranam adiposam, quae vasorum e corde egredientium principia cingere solet, in regione sternum respiciente perforatam.

Causa huius abscessus sine dubio aut pus, aut alia quaedam materia acris esse debuit, quae primum intra tunicas aortae proprias stagnavit illasquam tam introrsum quam extrorsum exedit. Tunicis vero solutis membrana exterior vi cordis sustinendae impar fibrarum suarum rupturam sensim perpeffa omnimodam, sanguini tandem necessario locum concessit, quo dilaberetur. Si autem membrana haec exterior prius rupta fuisset: non modo a materia rodente in pericardium effusa, cor quod cetera sanum apparet, corruptionem contraxisset: nec etiam aortae tunicae tam longe ac late absumtae atque exefae visae essent.

Valvula foraminis ovalis non penitus clausa.

Alterius phoenomeni ratio similiter statim se prodidit. Scilicet foramen ovale ad limbum valvulae aperturam reliquerat, qualem Morgagnus in Aduers. IV. f. 4. delineat, ita, vt ouum ovo similis esse non possit, atque ejus pictura meae observationi; si positionem solam excipias: dum nosster hic sinus propius ad valvulam accederet, et magis ad latus quam inferiora versus applantaretur.

ANNOTATIONES

ET

EXPERIMENTA QUÆDAM RARIORA ET
CURIOSA AD REM SCLOPETARIAM
PERTINENTIA.

Job. Georg. Leutmam.

§. 1.

IN antecedentibus Tom. III. scil. Commentario-
rum, modum tradidi, quomodo sclopetis co-
chleati sulci recte possint incidi. Nunc quæ-
dam exponam ad intimiorem cognitionem
rationum spectantia, accuratioris propulsio-
nis globuli ex sclopetis eiiciendi, quæ hæc-
tenus partim ignota partim pro secretis fuerunt habita.

Tab. XXV,
et XXVI.

§. 2. Certum est, lineam quam globulus,
ex sclopeto proiectus, describit, non esse rectam.
Linea quidem directionis, quam tubus globulo in
explosione imprimit, rectam intendit progressio-
nem, sed duplum hic impedimentum obseruatur,
quo minus id fieri possit:

§. 3. Quo longius enim progreditur globu-
lus, eo magis decrescit vis impellens. Deinde
grauitas globuli semper deorsum tendit, et nisi vi
propelleretur, statim post exitum ex tubo decide-
ret. Impulsus itaque virtutis mouentis, vehemens
quidem, paulatim tamen semper remittens, et
grauitas globuli propria, motum recipiens, deor-
sum vero natura tendens, contrario nisu agunt,

de Praxitele et Lyſippo , non vt de aequalibus loquitur , ſed vt de ſtatuariis , qui ante ſe fuerint. Ergo poſt Alexandrum hunc Calliſtratum poni patiar , ſi cui ita videbitur , aequalem Alciphroni rhetori , cuius item aetas nos latet , dicendi ratio perſimilis eſt. Quam vero obſcurus hic Calliſtratus fuerit , qui de ſtatuis , qui , teſte Athenaeo , de ſcortis et de Athenis ſcripſit (puto enim eundem auctorem hos libros edidiſſe) ex eo intelligo , quod Harpocracion , quoties eius περὶ ΑΘΗΝΩΝ librum citat , citat autem tribus in locis , toties dubius animi haeret , Meneclen eum nomet , an Calliſtratum. Quae cum ita ſint , nihil eius in auctoritate eſt ſitum , vt Praxitelen illo , quo dixi , tempore fuiſſe , Plinio non concedamus.

Et Venerem vero Cnidiam Praxiteles extremis Philippi aut ſub primis auſpiciis Alexandri feciſſe videtur. Quod quomodo indagauerim , videte. Solus eſt Clemens Alexandrinus , (1) qui memoriae proditum reliquit , Cnidiam , ad Cratinae , quam ſecum habuerit Praxiteles , formam eſſe factam. Auctorem citat Poſidippum de Cnidiis rebus. At ceteri fere conſentiunt , Phrynen Theſpiacam in marmore ductam eſſe a Praxitele. In iis eſt Arnobius. (2) *Phryne* , inquit , *ſicuti illi referunt , qui negotia Theſpiaca ſcriptitarunt , cum in acumine ipſo eſſet pulcritudinis venuſtatis et floris , exemplar fuiſſe perhibetur cunctarum , quae in opinione ſunt , Venerum , ſive per vrbes Graias , ſive quo iſte fluxit*

(1) In protreptico ad gentes p. 35. (2) Aduerſus gentes l. VI. p.

xit amor talium cupiditasque signorum. De Cnidia Venere nominatim Athenaeus, (3) quam, ut dixi, Phrynae adimit Clemens, cum ceteras Veneres ad eius formam sculptas fuisse concedit. At Cratina aliqua, tanta fama pulcritudinis, non a Deipnosophistis, non ab Alciphrone, non alio in scriptore celebratur: in Phrynes venustate atque illecebris tota insaniuit Graecia. Huius pulcritudinem foeminae iudicium nobilitauit ad aetatem eius cognoscendam. Nam cum Euthias Phrynen adolescentulam haberet, Hyperides orator Myrrhinam, illa ab Euthiae consuetudine discessit ad Hyperidem, Myrrhina ad Euthiam. Euthias, ut amicae perfidiam ulcisceretur, dicam ἀσεβειας ei scripsit, in qua de Eleusiniis sacris nescio quid inerat, Hyperides defendit. (4) Cum autem iudices eam damnaturi viderentur, incertum an Hyperides accedens ad ream dilacerata veste corpus speciosissimum ad misericordiam mouendam nudauerit, an ipsa perculsa periculo scissa veste nudoque pectore ad pedes sese proiciens iudices perculerit: diuersi enim sunt et graues utrimque testes. Isthuc tamquam de forma eius mulieris iudicium mox Athenis et tota Graecia pererebuit: eo motus Praxiteles Phrynen potissimum selegit, cui Venerem suam vellet similem. Huius tempus iudicii e Plutarcho mihi videor

S s 2

sta-

(3) p. 591. Πραξιτέλης δ' ὁ ἀγαλματοποιὸς ἐρεῖν αὐτῆς, τὴν Κνιδίαν Ἀφροδίτην ἀπ' αὐτῆς ἐπλάσασατο. (4) Alciphron l. i. ep. 30. 31. et quos ibi Stephanus Bergler, V. C. amicus meus produxit testes.

§. 11. Grauior horum globulorum apex praecedit semper, caua parte conica, tanquam leuiore, subsequente, id quod theoria motus docet, et praxi confirmatur. Si enim eiusmodi globulus murum, ex lapidibus durioribus extructum, ferit, tunc autopfia veritatem probat, dum in dilatato globo circulus cognoscitur à basi coni residuus.

§. 12. Vehementia vero ictus ex eo apparet, quod globulus, ad lapidem allisus in tenuem laminam plumbeam dilatatus conspiciatur, ac si mallei ictu diductus esset.

§. 13. Meliorem adhuc effectum hi globuli exhibent, si maiores adhibeantur ipsa cauitate sclopeti cochleatis fulcis instructi. Orificium scilicet sclopeti oleo, axungia porcina mixto, intus inungitur, imponitur globulus in orificium, ita vt cauitas conica introrespiciat et mallei plumbei Fig. 3 A ictibus iteratis impellatur, tunc globus fulcis imprimitur, super abundantia vero ramenta plumbea, ad superficiem orificii haerentia, abscinduntur. Postea bacillo ligneo Fig. 4. B digitos tantum 5 longo, et, si placet, in utroque extremo annulis orichalceis *a a* munito, ulterius ope mallei plumbei A propellitur, tandem per baculum ordinarium, onerationi sclopetorum dicatum, intruditur vsque ad pulueris pyrii obduraculum seu spiffamentum, tunc leui negotio cedit globulus baculo, modo recte se habeat et omnis labis expers fit tubulus sclopeti.

§. 14.

14. Obduraculum seu spiffamentum , pulveri pyrio imponendum , optimum adhibetur , quod ope cylindri chalybei caui , Fig. 5 B, aperturam sclopeti aequantis , acie praediti , et sensim ad figuram conicam assurgentis patentiorem , ex pileo excinditur , per ictum mallei ferrei , quorum deinde duo combinantur glutine , Fig. 6 D, ut cylindrum referant , aequè vere altum ac latum , ne tenuiores ad latus deflectendo aerem transmittant. Hoc tubum sclopeti arctè claudit , et virtus elastica pulveris pyrii cöercetur optime , ne ad circumferentiam globuli erumpat , sed omnem nisum ad propellendum globum intendar.

Fig. 5.

Fig. 6.

§. 15. Globulus vero cavitare conica praeditus leui negotio hunc in modum formatur : Modulo in quo globuli plumbei funduntur incidatur foramen (a) Fig. 7 a infundibulo (b) e diametro oppositum. In hoc foramen ponitur ferreus conus d, collum f in basi habens foramini moduli conforme. Huic cono superinfunditur plumbum liquidum , et sic confectus erit globulus b , fig. 2. cavitare conica praeditus.

Fig. 7.

Fig. 2.

§. 16. Quoniam hic de globulis sermo fuit, obseruationem merentur et illi globuli , qui explosi et feram ferientes in quatuor se explicant et dissiliunt partes, vulnusque maxime amplum infligunt ita ut aper vel versus iis ictus statim animam cum vnda sanguinis effandat.

§. 17. Conficiuntur illi si ad modulum conficiatur tenuis ex bractea chalybea orbiculus Fig. 8. ad

Fig. 8.

ad amplitudinem cavitatis moduli limatus *a*, cui ad angulos rectos decussatim adferruminatus est alter eiusdem magnitudinis et formae orbiculus *b* inferius adaptatur et firmatur pedunculus *c*, orbiculari huic cruci firmiter adhaerens, qui foramini, inferius modulo incisi, imponitur ut orbiculi à modulo includantur. Super has lamellas infunditur plumbum. Globuli deinde formati *d* collum *g* abscinditur non admodum curtum et lamellae extrahuntur postquam cultello globuli fissurae a lamellis factae aliquantulum diductae fuerint, tunc globus decussatim diuisus in quatuor quadrantes et ad collum cohaerentes erit confectus Fig. 8.

Fig. 8.

§. 18. Hoc globulo ita oneratur sclopetum, ut collum sursum ad orificium respiciat, fissurae vero spissamento pulueris pyrii incumbant. Tunc explosi et obiectum ferientis globuli quadrantes se explicant ingens, atque amplum vulnus animanti infligunt, mortem subitanam inducens ex profluvio sanguinis largiori, cum prostratione virium momentanea.

§. 19. Hoc genus globulorum non excauatur conice inferius, ne aer irruens explicet coniunctos quadrantes, antequam obiectum feriant, sed per aerem transiens globulus integer maneat, usque dum tangat obiectum et tunc demum ab ictu dissiliat. Attamen hi globuli inuolucro linteo sebo illito circumuoluti ad tubos cochleatos atque sclopetum manuarum adhiberi possunt.

§. 20.

§. 20. Paucis etiam noti sunt globuli concatenati seu per filum orichalceum connexi, breuiter itaque parandi modum indicabo. Fig. 9. Circumuoluitur filum *a* orichalceum, crassiusculum et igniando bene emollitum et obsequiosum redditum, cylindro *b*, vt altitudinem fere dimidii pollicis exaequet. Eximatur cylindrus circumgyrando et extrema fili *c* et *e* recuruentur, et iterum cande fiat paululum conuolutum filum orichalceum *a*. Deinde vnum extremum *c* recuruat in modulum formando globulo destinatum imponatur et fundatur globulus tunc globulus filo firmiter adhaerebit; Ad alterum extremum fili *e* etiam fundatur globulus. Tandem duo isti globuli filum flectendo ita disponantur vt supra vnum globulum *f* conuolutum filum *a* situm sit, cui insistat alter globulus *d* et concatenati globuli erunt recte parati.

Fig. 9.

§. 21. Explosi hi globuli combinati magnam vim exerunt. Aut enim corpora difsecant, per filum projectione explicatum et extensum; aut globulus, corpus feriens, efficit, vt à filo illud dilaceretur, eique magnum vulnus infligatur.

§. 22. Praeterea considerationem meretur cochlea mas, qua cum orificium posterius clauditur tubi sclopetorum (die Schwanz-Schraube). Haec si ad figuram parabolicam excauetur, à puluere pyrio magna vis conciliatur sclopetis Fig. 10.

Fig. 10.

§. 23. Cum enim parabola hanc habeat indolem, vt omnes radii, ex foco parabolae pro-

Tom. IV. M m ue-

uenientes, tendant ad latera parabolae, et iuxta leges geometricas ab iis reflectantur modo parallelo. Ex eo fit, vt tota vis pulueris, in foco accensi, in globum dirigatur, eumque vnita virtute eiaculet.

§. 24. Accedit et hoc, quod non facile dirumpi soleat tubus sclopeti, hoc modo efformata cochlea clausus, quia pulueris expansio non agit in latera tubi, sed recta globum propellit, cum in aliis sclopetis accensi pulueris radii vage ad latera tubi allidant, et ad angulum incidentiae iterum ad latera tubi repercutiantur, vnde magnam vim virtutis expultricis ex multis repercussionibus amittunt et elanguescunt. Ad lit. C vnus tantum radii α repercussiones iuxta regulas Geometricas delineauimus, quorum tamen innumeri mente sunt concipiendi, inde per multas repercussiones virtus pulueris debilitatur. Tubus vero magnam vim patitur, et disruptioni valde est obnoxius.

§. 25. Ex iis considerationibus inuenta sunt in Saxonia Mortaria, camera parabolica praedita, quae ad stupendam distantiam proiciunt pilas ferreas, Granata dictas. De quibus fortasse alia occasione agam.

§. 26. Nec minus foramina, accensionipulueris dicata, ita sunt adornanda, vt figuram conicam nanciscantur, sic vt basis coni caui intus
 Fig. 11. versus cavitatem tubi spectet Fig. 11. Id quod hoc modo obtinetur.

§. 27.

§. 27. Fiat in tubo *A* foramen *a*, usque ad cavitatem tubi, amplitudinem pennae anserinae exaequans., incidatur ei cochlea foemina. Paretur ad eam cochlea mas ex orechalco. Cochlea illa mas *d*, in medio axeos, foramine exiguo perforetur. Hoc ex ea parte, qua intus spectat, conice ampliatur. Postea cochleae foeminae tubi, in margine exteriori, incidantur rimae *a* ad modum stellae. Cochlea mas *d* imponatur in hanc suam foeminam *a* ut aliquantum promineat, et mallei ictibus diducatur, pars prominens, ut se insinuet in rimas stellae. Tandem ad planitiem tubi exteriorem lima abradatur superfluum, et exterius aliquantulum excavetur foramen, ut eo facilius ignem concipiat pulvis pyrius, et res recte erit peracta.

§. 28. Tandem singulare problema explicabo: Scilicet conficere sclopetum cochleatis sulcis non praeditum, quod tamen globulum gyrando circa suam axem proiicit. ac si cochleatum esset, cum tamen perspiciendo per tubum nullo modo cognosci poterit, unde gyralem directionem concipiat globulus. Tale sclopetum omnia praestat quae a cochleato tubo expectari possunt.

Fig. 12.

§, 29. Fiat itaque lima *A* Fig. 12 rotunditate elliptica seu ovali praedita ex duabus partibus *c* et *e*, ut per mediam longitudinem dissecta quasi appareat. In medio longitudinis *b b* crassiuscula. Aptetur superius et firmetur ad scapum quadratum *a* cochlea *b* traiecta.

Haec lima indatur scapo suo quadrato *a* in vir-

gae chalybeae extremi foramen quadratum , quae virga pertinet ad machinam pro tubis cochleatis parandis adornata et descripta extat Tom. III. Commentariorum §. 17. pag. 163. et ibi etiam firmetur clauo vel cochlea traiecta.

§. 30. Deinde lima immittatur in tubum sclopeti , et ope cochlearum *f k* et *g l* distendatur vt crura *e* et *c* latera tubi tangant , et exercitata machina libere sed tamen arcte per tubum transeat.

§. 31. Versetur machina donec lima tubum non amplius radit. Tunc vltcrius diuaricentur crura limae , per cochleas *f k* et *g l* , et iterum exercitata machina operetur , vt profundius se insinuet lima in tubi latera. Hoc toties repetatur , donec orificium sclopeti aliquantulum ouale accuratius intuenti appareat.

§. 32. Tandem cylindrus quidam ferreus longus 4 vel 5 digitos immittatur in tubum ad 3 vel 4 digitos et circumfundatur plumbum liquefactum , postquam tubus intus *a* fumo lampadis suppositae fuligine bene erit obductus. Hic cylindrus plumbeus post extractionem oleo illiniatur , et loco limae in virga chalybea firmetur , et bis vel ter per tubum transmittatur. Postea puluere smiridis conspergatur addito oleo , et postquam occupauerit locum limae machina iterum exerceatur , idque tam diu iteretur donec tubus et satis splenditus et sine rimulis per limam factis erit conspicuus. Cylindrus plumbeus vero , post multas exercitationes machinae , laxior factus , de nouo erit refundendus,

duſ, vt ſemper arcte pertranſeat tubum. Et ſic res erit peracta.

§. 33. Gyrum enim lima excavat in tubo oualem, perſpicienti plane imperceptibilem, per quem globulus propellitur gyrando, eique eundem motum gyralem imprimit ac dirigit.

§. 34. Quando itaque onerandum eſt tale ſclopetum tunc globulus oblongus et aliquantulum maior cauitate tubi, malleo plumbeo crebrioribus iſtibus adigatur vt intret, ſuperfluum plumbum ad orificium ſclopeti haerens abſcindatur, et reliqua obſeruentur quae §. 13 ſunt propoſita, tunc globus eodem modo ac in ſclopetis cochleatis gyrando proiicitur, cum tamen cochlea in tranſpiciendo tubo nullo modo appareat.

§. 35. Quod ad veram meſuram pulueris pyrii pro oneratione ſclopetorum attinet ſequentia habe; Edidit ante plures annos Italus quidam *Nicol. Spadoni* librum in lingua Italica cui titulus *Venatio cum ſclopeto, nunc valde rarum*. In eo de onerandis ſclopetis ſequentia proponit: Oneratio ſclopeti requirit vt $\frac{2}{3}$ ponderis pulueris pyrii aſſumantur ad grauitatem globi plumbei.

Ad globulos plumbi comminuti (Schrot) aſſerit generaliter, quod ad ordinariam onerationem 1 Libr pulueris pyrii ſufficiant 4 Libr plumbi. Si vero fortior iſtus expetatur, tunc ad 1 Libr. pulueris aſſumi poſſunt 3 Libr. plumbi.

Item ad ordinariam onerationem ſclopeti adhibeatur altitudo pulueris 2 diametrorum amplitu-

dinis sclopeti. Tantum ille, Consuetudo est vt ad globum sclopeti maiorem adhibeant tantum pulueris quantum modulus globi ter recipere potest; si minor fuerit globulus quatuor modulus dant.

§. 30. Mihi mos est sequentem in modum explorare quantitatem pulueris adhibendam; Operationem sclopeti adorno cum quantitate pulueris quam iudico conuenientem et explodo sclopetum. Si placide et sine reactione seu repulso sclopeti solutio procedit, addo aliquid pulueris, et iterum in exoneratione obseruo vtrum retropellatur sclopetum etc. Idque tam diu repeto, puluerem semper augendo, donec reactionem percipio, tunc de puluere pauculum detraho, et illa vltimo inuenta quantitas dat veram mensuram pulueris sclopeto proportionalem.

§. 37. Ad plumbum comminutum vtor eo modulo quem ad puluerem adhibui, modo modulus diametrum externae circumferentiae aequalem habeat orificio sclopeti vt immissus ad illud quadret, et crassities moduli sit instar bractee ferreae communis.

DE

OCYMOPHYLLO

NOVO PLANTARUM GENERE

Aut. Job. Christ. Bauxbaum.

Ocymophyllum ob foliorum cum foliis Ocymi similitudinem appellamus plantam palustrem paucis memoratam Botanicis, et cuius accuratus character haecenus plane fuit incognitus. Hanc itaque in civitatem recipere, genuinas ipsi notas assignare et suo loco inferere iuvat.

Tab.
XXVII.

Descripsit primo Boccone in Museo Plantarum rariorum, cui audit: Glaux maior palustris, flore herbaceo. Sequenti vero describit modo: in locis palustribus oritur planta quaedam repens, caulibus palmam circiter altis, nonnihil rubentibus, rotundis, Beccabungae similibus, quorum medium percurrit nervulus luteus, qui caule rupto integer manet, cuiusmodi etiam observatur in Beccabungae et Mortu gallinae. Folia ex singulis geniculis exeunt coniugata, pediculo satis longo insidentia, substantia Myrtacea, verum molliora et tenera, Beccabungae valde similia, primo exortu rotunda, postea paulum elongata. Ex iisdem persaepe caulibus geniculis exeunt ramuli eodem ordine. Inter folia et caulem in vtraque parte ordinate cernitur flos parvus, qui antequam aperitur, una cum seminis involucri clavi capitulum exprimit quadri-

la-

lateri, postea explicatus quatuor folia herbacea ostendit coloris pallidi, in stellae formam disposita. Radix alba est, tenuis et fibrosa. Tota planta omni odore caret; saporem autem habet herbaceum, fatuum, cum pauca adstrictione. Floret mense Iulio et Augusto semen maturat coloris rufescentis, minutum, rotundum in quatuor capsulis distinctis, quae involucrium integrum efficiunt, contentum.

De hac Bocconis descriptione notandum primo quod folia minime Beccabungae similia sed potius Ocympo. Secundo quod Flos iste in quatuor foliola herbacea expansus non sit flos, sed calycis segmenta in stellae formam disposita; flores enim fert exiguos stamineos, luteos, apicibus parvis, rotundis, pariter luteis instructos, fructui insidentes et calyce tetraphyllo circumdatos.

Est itaque Ocympophyllum plantae genus, flore apétalo stamineo, embryoni insidente, qui deinde abit in fructum oblongum, quadrangularem, in quatuor loculamenta divisum, seminibus foetum exiguis, subrotundis. Adde folia Ocympis et locum natalem in palustribus.

Pertinet ad herbas flore stamineo, fructui contiguo, seminibus vasculo inclusis in Raj. Meth. em. et auct. in Tournefortii vero ad Classis XV. sectionem 1. de herbis flore stamineo, cuius calycis posterior pars abit in fructum. Vide Fig.

DE

DE
 PLANTIS SUBMARINIS
 OBSERVATIONES.

Aut.

I. C. *Buxbaum.*

Plantae submarinae paucae fuerunt antiquioribus notae Botanicis, quarum numerum valde auxerunt Raius, Plukenetius aliique, qui his observationes suas communicarunt. Distinxit quidem in aliquot has classes modo laudatus Raius, sed si accuratius inspicias ipsum inuenies confusum, nullos veros terminos constituentem inter Fucos et Algas et Muscos marinos, quae illi promiscue nunc sub hoc nunc sub illo nomine proponuntur.

Tab.
 XXVIII.

Meliorum plantarum submarinarum in genera certa diuisionem debemus Tournefortio, qui tamen in eo reprehendendus, quod sub Fucorum et Corallarum nomine plantas inter se parum conuenientes comprehendat.

Quo autem plantae marinae accuratius inter se distinguantur et confusio euitetur, adhuc aliquot ipsorum genera, praeter ea a Tournefortio facta, introducenda sunt, et vt errores haecenus in hac re commisi corrigantur, sequenti procedendum modo.

Sub Fucis relinquuntur species a Tournefortio recensitae, quae cum Fucis vulgari conueniunt, ab-

Multa alia in mentem venerunt aduersus superiores sententias, quae fiducia meae opinionis, quam nunc expositurus sum, consulto praetermisi. Aio igitur, Varagos Ruthenicorum scriptorum, fuisse ex Scandinavia Daniaque homines nobiles, socios in bellis et stipendiarios milites Russorum, regum satellites, limitum custodes, rebus etiam ciuilibus et magistratibus admotos : ab iis deinde in vniversum omnes Suedos, Gothlandos, Noruagos, Danos dictos fuisse Varagos. Et primum quidem Russici annales quamquam ab Rurico exordiuntur, tamen tenuem memoriam admiscunt, eum ex superiorum Russiae regum, qui et ipsi Varagi fuerint, prosapia exstitisse, pulsos autem a Gostomislo fuisse hos ex eo sanguine reges. Iam vetustae Suedorum et Noruagorum sagae non ita penitus sunt explodendae, ut, cum Gardarikiae et Holmgardiae, hoc est, Russiae reges ante Ruricum nominant, quamquam multa etiam ex vano hauriunt, earum memoria rerum fide digna sit nulla. Alii loco atque tempori haec edifferere magis conueniet : nunc ex Annalibus Francisci Bertiniani⁽⁸⁾ locum apponam cum primis insignem. Ita anonymus ad A. C. 839. Teophilus Imperator CPlitanus *misit cum eis* (cum legatis ad Ludouicum Pium Imp.) *quosdam, qui se, id est, gentem suam, Rhos vocari dicebant : quos rex illorum Chacanus vocabulo, ad se amicitiae, sicut asserabant, caussa direxerat, (sine gubio secundo Borysthene nauibus)*
pe-

(8) Apud Duchesium t. III. p. 195. b.

petens per memoratam epistolam, quatenus benignitate Imperatoris, redeundi facultatem atque auxilium per imperium suum totum habere possent: quoniam itinera, per quae ad eum CPlin venerant, inter barbaras et nimiae feritatis gentes immanissimas habuerant, quibus eos, ne forte periculum inciderent, redire noluit: quorum aduentus causam Imperator (Ludouicus) diligentius inuestigans, comperit, eos gentis esse Sueonum, exploratores potius regni illius (CPlitani) nostrique, quam amicitiae petitores ratus, penes se eousque retinendos iudicauit, quoad veraciter inueniri possit, utrum fideliter eo nec ne peruenerint: idque Theophilo per memoratos legatos suos atque epistolam intimare non distulit et quod eos illius amore libenter susceperit, ac, si fideles inuenirentur et facultas absque illorum periculo in patriam remeandi daretur, cum auxilio remittendos: sin alias, vna cum missis nostris ad eius praesentiam dirigendos, et, quid de talibus fieri deberet, ipse decernendo efficeret. Habes gentem Rossicam ante Ruricum, cuius nominis multo quam annales Russici edunt, antiquioris, auctores Graecos alio loco producam: habes regem tanta maiestate, vt *Μα Cbakan*, seu Imperator et *Αυτοκράτωρ* iam tum diceretur: vides hos legatos Rossicos ab stirpe fuisse Sueonas.

Inde autem ab Rurico, omnia nomina Varagorum in Russicis annalibus conseruata, nullius alterius sermonis magis sunt, quam Suionici, Noruagici, Danici: neque vero obscure et parce, vt me

Peculiâres huius generis species profert Ingrid nostra, quae enim a Tournefortio et alii recensentur terrae adnascuntur basi acetabuli, nostrae vero pediculo nunc longiori nunc breuiori insident, in reliquis tamen aliis respondent.

Operae pretium erit has describere et bonis ornare figuris. Occurrit itaque primo

1. *Fungoides nigrum vernum, pediculo donatum*, quod in foliis putridis deiectis Aprili mense prouenit, colore nigro-spendente, pediculo femunciam longo, satis rigido, cui insidet acetabulum instar paruae ollae, cuius orae parum contractae intro flectuntur. Vide figuram 1.

Fig. 1.

2. *Fungoides fuscum, pediculo longiori donatum*. Huius pediculus biuncialis fere, ex albo fuscus et striatus, fert acetabulum instar patellae expansum, oris nonnunquam laceris. Occurrit in lignis deiectis autumno. Vid. fig. 2.

Fig. 2.

3. *Fungoides fuscum, pediculo breuiori donatum*, quod cum praecedente conuenit, nisi quod color ad album vergat, et pediculus fit breuior; hinc pro varietate haberi potest. Vid. fig. 3.

Fig. 3.

4. *Fungoides vernum, purpureum, pediculo albo donatum*. Hoc colore superbit elegantissimo, et magnitudine mirum variat. Pediculus tumidus est et crassior, albicans; orae interdum eleganter sunt ferratae. In syluis nostris Martio et Aprili mensibus. Vid. fig. 4.

Fig. 4.

His

5. *Fungoides purpureum, pediculo ramoso.* Huius pediculus in aliquot diuiditur ramos ex cinereo albicantes, qui ferunt acetabula parua, intus coccinea, exterius fusca, pisi magnitudine. In syluis mense Octobri. Vid. fig. 5.

Fig. 5.

His accenseri potest alia species exigua, valde tenera, in foliis Alni putridis nascens, quam, quia nunc ad manus non est, delineare non potui.

Et quia paucae adhuc Fungoidum prostant figurae, addimus hic duas species sine pediculo, nondum descriptas. Prima est *Fungoides fuscum maius*; secunda vero *Fungoides lutescens ollam referens*, quae in Ingriae syluis gramineis post pluuias autumnales reperiuntur. Vid. fig. 6. & 7.

CLASSIS TERTIA,

CONTINENS

HISTORICA.

CLASSIC LIBRARY

HISTORICAL



ELEMENTA BRAHMANICA, TANGVTANA, MVNGALICA. T. S. B.

Superiori tomo Commentariorum Academiae
tabulas decem scripturae Brahmanicae, Tan-
gutanae et Mungalicae dedimus: nunc tabu-
las reliquas octo ex eodem libro Sinicae ty-
pographiae cum interpretatione nostra subiungimus.
In tabula undecima et duodecima et parte quadam
tertia et decimae tabulae exstant desinentia con-
sonantibus *r* et *l* et vocali *u*. Parte altera tabulae
XIII. et in tabulis XIV. XV. sequentisque maiori
parte, syllabae binae vocalibus solis terminatae,
in quibus sunt sex litterae, quas indagare nulla ar-
te potui. Tandem variae excipiunt syllabae, et ex-
trema pagina Brahmanicae exstant voces ingenti-
bus ductibus inter se deuinctae. Tangutanae et
Mungalicae Brahmanicis subiiciuntur. In his ex-
tremis Brahmanicis, mihi videor videre similes
Tom. IV. il-

Tab. XXX.
XXXVII.
El. Tab.
XI.-XVIII.

illarum, de quibus Apuleius in *Metamorphoseon* libro vndecimo: (1.) Aegyptium sacerdotem de opertis adyti protulisse quosdam libros *litteris ignorabilibus praenotatos, nodosis et in modum rotae tortuosis capreolatimque condensis apicibus, a curiositate profanorum lectione munita.* Aut quae Nonnus Panopolitanus in *Dionysiaca* (2) vocavit *Χαράγματα λοξὰ καὶ ἀγκύλα κύκλα.* Tangutanae syllabae Brahmanicis spatii causa κιονηδόν appositae sunt, quae alioquin ratio illo in genere scripturae non obtinet. Hoc modo autem litteris Tangutani in incantationibus utuntur. Calmucci eam scripturam vocant *Tarni.* Mungalica *χαμαφύρωσ* scribi satis constat. Hoc Maeandricum genus Brahmanes in peninsula Indica, *Kia-kanakku* vocant. Plures litterarum illarum tortuosae formae in libro Sinico exstabant, sed operae pretium non visum est fore, ut omnes euulgarentur.

Cum has litteras Brahmanicas, ad R. V. Beniaminem Schultziū transmisissem, ab eodem hoc responsum Madraſta A. 1731. 19. Nov. tuli: *Advocaui aliquot Brahmanes extraneos et peregrinos, illisque ostendi figuras et litteras, quas de lingua Brahmanica miſiſti: unus ex illis characteres ferme omnes legebat, sed circa aliquot eorum paullulum haesitabat.* Itaque de his litteris Brahmanicis earumque diversitate, quae res in Europa adhuc perquam obscurae sunt, quantum satis esse videbitur, dicam. Brahma-

(1.) p. 430. (2.) l. IV. p. 126.

manes gens est Indica, (quales apud Romanos fuisse, Fabia, Cornelia, Claudia,) quae et diuinam originem a *Brama*, supremo deo sibi attribuit et summam nobilitatem, et sacrorum, auspicioꝝ doctendique alios quod verum rectumque sit, praerogatiuam. Puta te audire Patritios Romanos, qui ista omnia propemodum sibi vindicarunt. Sunt igitur Brahmanes diuersi a Gymnosophistis. Gymnosophistae ex quibuscumque aliis gentibus et familiis esse possunt: Brahman ut quis sit, necesse est ut nascatur Brahman. Hi, cum per vniuersam Indiam dispersi sunt, ubi de rebus diuinis caeremoniisque tractant, pro diuersitate locorum, aut peculiaribus linguis vtuntur, aut populari quidem aliqua, litteris tamen diuersis, quas vocant sanctas. Litterae sacrae inter se vehementer discrepant. Dicam primum de illis, quarum cum his editis est congruentia. *Devavágarám* tamquam mater omnis sacrae scripturae editur, qua legem a deo in Caschia promulgatam praedicant. Caschia

mons et vrbs **कश्मीर** *Kascha*, quae et **बनारसे**

Banàres haud procul a Gange fluuio, ubi Academia est Indorum. Eas ego, ut ex India accepi, hic communicandas duxi. *Balabandu* seu Balabandeca paullo vastior scriptura est, ductibus litterarum pinguioribus. Hac veluti sancta Brahmanes in Marathis vtuntur. Lingua eorundem Brahmanum a populari Maratharum non abhorret: quae autem

profana sunt, aliis, ut postea dicam, litteris scribuntur. Scribunt et ipsi in foliis palmae Indicae: atramen chartam habent Sinicae non dissimilem, crassiorem vero et radiorem magisque atram. Eiusmodi libellum quoque possideo. Septentrionales Indi palmarum folia ad scribendum non adhibent: charta utuntur a bombycina veterum non absimili. Populi

ad Indum litteras suas. **आषशःनाघशः** Akār

Tab.
XXXVIII.
III.

Nāgarī seu *litteras Nagaricas* appellant, a superioribus non multum diuersas. Eas ab Indo quodam suarum rerum intelligentissimo non perfunctorie cognoui. Balebandecas et has, de quibus modo dixi, vide in Tabula. Figurae quatuor, quae harum initio ponuntur, principii signum sunt. Pri-

ma vocatur **उशः** *Vrā* altera **इकङ्गुः** *ekāngu,*

reliquae duae lineae **दुडः दुडः निकः** *Dhu dhu*

lika i. e. *duae lineae perpendiculares*. Quae sequuntur, sic legi debent: *Shri ghanée-sá innama. Sanctus Ghanéssa inuentor beneficus*. Ferunt, mulierem quandam cum domi relicta sola balneo uti vellet, hunc ex cera formasse, animaque corpori inspirata, custodem eum apposuisse foribus: rediisse tum maxime maritum illius *Mahandée* ab longinqua mercatura, prohibitumque aditu, huic tamquam pudicitiae vxoris insidiatori amputasse caput, deinde,

de,

de, re cognita, anguineum pro humano repositum, filiumque eum adoptasse. Hunc litterarum auctorem Indi in omnium librorum principio illa formula commendant. Litterae vero secundum certas classes dispositae sic sunt, ut canendo disci queant. Explicabo singularum pronuntiationem secundum os Teutonicum.

Pröemium.

- 1 o, Reuera vocalis nostra quarta, vide 18^m
 2 na, n, vide 40^m.
 3 ma, m, vide 44^m.
 4 ffi, sf, vide 49^m. et 51^m.
 5 dbau, d auditur separatim et b etiam fortiter protruditur: au quasi in n desinit, quod n tenerrime subauditur. Vide 39^m.

Vocales.

- 6 a breue
 7 a longum
 8 i breue, lingua ad dexteram inclinata.
 9 i longum, lingua ad sinistram mota.
 10 u breue, recta ex ore protruditur.
 11 u longum, quasi duplex, sono in altum prolato.
 12 ri breue
 13 ri longum
 14 li breue
 15 li longum
 16 e vocalis nostra secunda.
 17 ai ut utraque vocalis diserte exaudiat.

- 18 *o* eadem, quae prima fuit.
 19 *au* utraque auditur vocalis.
 20 *ang* *g* non auditur, sed *n* effertur, ut in Gallicis vocibus: saepe etiam pronuntiatur ut *ab*, *b* vehementer protruso.

Consonantes.

- 21 *gha*, *gh* consonans est cum vocali longa: si fulcrum dexterum demas, fiet brevis.
 22 *ka*, ut *Caph* Hebraeorum, Arabum *Keph*.
 23 *ka*, ut *Kuph* Hebraeorum, Arabum *Kaph*.
 24 *gha*, *gh*, *g* obscurum in interiori gutture formatur, ut ξ Arabicum, sed sine narium ministerio.
 25 *dgja*, *d* vix a ne vix quidem subauditur, *gj* fere ut Arabicum ζ , modo fortius proferatur.
 26 *nia*, Raro occurrit: *i* et *n* inter pronuntiandum in unam vocalem confusae sunt: *i* ita cohaeret cum *n* ut vix sentiatur.
 27 *tgja*, concordat cum 24^a. tantum fortius adhuc effertur.
 28 *tscha*, *tsch*
 29 *dbea*, *db*, lingua, quando ad palatum *d* formavit, inde sese protrudit, ut quasi *b* adiiciat.
 30 *dgja* differt a 24^a. quod lingua interiori palatus regioni appellitur, sono obscuriori.

- 31 *nia* plane eadem cum 25^a.
- 32 *tba* *t* formatur strenue in palato proxime dentes, quasi duplex *d* et *b*.
- 33 *tſc̄ba* *t* formatur fortiter.
- 34 *dba* *d* formatur lingua quasi apoplectica, vt ſaliua ad palatum opem ferat, *b* admodum auditur: ceterum quasi aliquod *n* praemittitur, quod in primis ſentitur, quoties vocalis praecedat e. g. *ba-ndba*, legitur plane *ban-dba*.
- 35 *dbgja*, ita fere vt praecedens, tantummodo quod τ Arabicum clare auditur.
- 36 *nrba*, est *r*, sed cui apoplectica lingua praefigitur quoddam quasi *n*.
- 37 *ta*, *t*
- 38 *tba*, hic *b* magis auditur, quam *t*.
- 39 *dba*, eadem quae 33^a. et figura et ſono, carminis cauſſa hic repetita.
- 40 *da* *d* eadem quae 5^a. vbi tamquam in pröemio *dhau* dicebatur.
- 41 *na*, *n*, eadem, quae in pröemio, 2^a
- 42 *pa* *p*
- 43 *p'ba*, *p'b* non est Φ , sed vtraque littera per ſe clare pronuntiatur.
- 44 *ba*, *b*, formatur labiis quasi per vim diremitis, vt *bb*.
- 45 *bbam*, *b* et *b* ſolitarie efferuntur: *am* pro *a* ex conſuetudine tantum dicitur.
- 46 *ma*, *m*, eadem quae 3^a.
- 47 *ja* *j*

- 48 *ra* , *r* .
 49 *la* , *l* vide 53^m.
 50 *wa* , *w*, sed saepe vt *m* pronunciatur, sono medio inter utramque litteram.
 51 *ssang* , *sf*, eadem quae 4^a. *s*, fortiter ex ore elisum, non tamen vt *z*, sed vt duplex *s*: *n*, in fine litterae, *g* quoddam tenerime subaudiendum habet, sono suspenso.
 52 *k'cho* , *k'ch*, *k* auditur et *ch* Germanico mollius, neque tamen *sch*, vide 54^m.
 53 *ssa* , *sf*, eadem quae 5^a. et 49^a. carminis causa repetita.
 54 *ha* , *hb* duplex Germanico ore prolatum, *z* Arabicum.
 55 *lang* , *l*, eadem quae 47^a.
 56 *k'cha* , *k'ch*, eadem quae 50^o. loco *k'cho* dicebatur.


Vocales adiiciuntur per apices in hunc modum



Tab.
XXXVIII.
III.

1 *pa* breue. 2 *pa* longum. 3 *pi* breue. 4 *pi* longum.
 5 *pu* breue. 6 *puu* longum. 7 *pe* breue. 8 *pei* s. *pe*
 longum. 9 *po* breue. 10 *po* long. 11 *pang*. 12 *p*.

Littera prima cum vltima figura conuenit: pro diuerso positu, modo *pa* breue pronunciatur, modo, vt in fine vocis, *p*, vbi vero etiam *a* lenissime subauditur. Idem fit ceteris vocalibus breuibus in fine vocis. Quando *r* cum alia consonante coniungunt, solent pedi consonantis adiicere lineolam in hunc modum:

13 *pra breue.* 14 *pra long.* 15 *pri breue.* 16 *prie long.* 17 *pri breue.* etc.

Extremum signum, quod in alphabeto et ali-
as finale est, vocant *dbu dbu*  *mindà*, *dbu dbu lika*: duos circulos et duas lineas perpendiculares.
Duos illos circulos Calmucci *Dokschin tshbek* vocant.

Ex his igitur velim quisque pronunciationem, quam superioribus tabulis subieci, accuratius et certius sibi informet. Si autem hae tres formæ comparentur cum litteris ex Sinico libello a nobis editis, per se apparebit, quae illarum congruentia sit. Ad modum harum maiorum alias accepi ex Calmucci *Songar*, non nisi in apicum elegancia discrepantes, subiunctis minoris formae litteris, quales vulgo *cur suas* appellamus. Bordon legatus Calmuorum *Torgoit*, qui sub imperio Russico degunt, cum domi meae me inuiferet, et agnoscebat Brahmanicas et a suis  *Enekke* dici asseuerabat. Eodem nomine has litteras a Calmucci *Songar* prope Tibetum ad Irtim fluuium appellari, ex illorum  legatis postea cognoui. Ceterum, vt dixi, minores litteras τῶν ταχυγράφων me ex Calmucci accepisse, ita eas quibus Dellienses et Multanienses vtuntur, *Sonbar* beneuole me docuit. Mercatores iis maxime rationaria sua et epistolas
Tom. IV. P p scri-

scribunt. Neque per vocales vel aliquantum mutantur, neque omnium eadem forma est, cum ut in Latinis et Germanicis fit, pro suo quisque ingenio eas pingit. Haud melius cum maioribus comparari possunt, quam si dicamus, eandem esse diuersitatis rationem, quae inter Ebraicas et Germanorum Iudaeorum litteras est. Indi has

श्राषशः यकरीः *Akar thákari, Litteras cursivas*

vocant. De iis forte alias plura. Confecto hoc spatio, exempli causa, carmen Indicum apponam :

धोहराः गमणः

Dhóhara gamòn (1)

जिनीः नरुः क्षीरधुः सुनीः येजेः

Gjeni nábendaràdu sfúlli itsche
Qui homo non scribit, opus (est ut) palo

नेनेषेः॥ सेधाराधारीः राधुः कंधुरेः

tenechè sfederghabo ráddu kadúr
transfigatur : Deus abominatur (eum qui) bonam
na-

(1) *Dhobara* est carmen, quod duo, tres, plures sibi accinunt.

नाशयेजेः दोसनेजेः॥

nagbanen dōsdojo
nescit amicitiam (colere)

Persequar nunc ceteras Indicas scripturas ab his diuersas, ortas tamen ab vna stirpe, de qua re, alias dicendi maior erit opportunitas. *Kirendum*, *Grantham*, *Graendica*, ita enim diuersis modis appellatur, a quibusdam pro Brahmanica editur. Et est Brahmanum eorum, qui in Tamulis agunt, sancta scriptura. Lingua diuersa est a Tamulica, corrupta Santerutamicae et Dewa-nagricaе dialectus: litterae Tamulicis non ita dissimiles. At cum Tamuli XXXI. litteris vtuntur, in *Grantham* sunt numero L. Alphabetum *Grantham* in foliis palmae Indicae sedecim longissimis *Trangambaria* ab amicis accepi, quorum munere etiam libellum *Graendicum*, qui de *Vuischtmu*, cognomine *Ramen* agit, et encomium *Pullejas* idoli continet, possideo.

Tamulicam scripturam (vulgo *Malabaricam*) Bartholemaei Ziegenbalgii viri beatissimi opera, grammatica in primis edita, ad cognitionem patefactam accepimus, quocum ceteri Missionarii Evangelici Serenissimi Regis Daniae patrocinio vfi, cum vniuersam Scripturam Sanctam tum alios libros elegantissimis typis *Trangambariae* euul-

garunt, vbi nunc maxime Lexicon Tamulicum excuditur.

Ab his differunt litterae *Samscrutam*. Athanasius Kircher in *China illustrata* (2) *Hanscret*, Thomas Hyde in *Iudis orientalibus*, *Sanscroot*, Andreas Muller in *Alphabetis vniuersi*, *Hanscriticam* vocarunt. Iidem pro hisce, meras litteras *Balabandiu* nobis dederunt. Sunt vero *Samscrutam* ab iis haud leuiter discrepantes, minutae, capreolatum contortae et cincinnatae. *Varugorum* seu *Telugorum* illa scriptura sacra est: lingua Anglis *Gentou* dicta, eadem fere, quae *Dewa-nagrica*. *Telugi* seu *Varugi* caractere prope eodem in communi vita scriptisque profanis vtuntur. Has litteras propediem illustratas nanciscemur a R. Beniamine Schulzio Madrastensi Missionario, qui S. Scripturae versionem, typis ex aere fuis, parat mihiq; etiam in his, quae diximus, pleraque beneuolentissime communicauit. Ab his litteris *Canaricae* et *Ceylanenses* non multum sunt diuersae.

Aliae iterum sunt *Marathicae* et *Gutzariticae*. *Marathicas* dico profanas populi Indici, ex quo nunc rex Tangjurenensis est: lingua eadem, quae Balabandica. *Guzaratica* lingua proxime congruit cum lingua *Moura*, tamquam dialectus: litterae Marathicis congruunt. At *Moura* seu Maurorum in India lingua, etiam *Tuluca* dicta, Persicas voces admixtas habet, Persicisque litteris vtitur. Litte-

(2) p. 162.

terae Marathicae, Guzaraticae et Siamicae propiores sunt Tangutanis seu Tibetis. De omnium illarum litterarum cognatione atque origine, praestat filere, quam pauca dicere. Erit alias tempus et locus, vbi non sine grata amicorum, qui me subleuarunt, recordatione, quae sentiam, explicare liberius possim. Haec praefanda duxi, quod ex ignorantia illarum rerum multa confuse et incommode dicuntur, per quae nos quoque in errores varios superiori tomo seductos fuisse, beneuolus lector facile sentiet.

De Tangutanis pauca hic commemorabo. *Tangut* populi nomen esse comperi: *Tibet* regionis, in qua degit. In syllabis hanc rationem sequuntur, vt aliquas litteras elidant tamquam mutas, alias transponant, vt a Bordone legato Calmuccio intellexi: voces vero omnes monosyllabas esse oportet, vt in sermonis genio Tangutani quam proxime accedant ad Sinenses. Quae autem ratio in his obseruetur, nondum potui indagare. Dixi superiori tomo, litteras Tangutanorum minores seu *Schar*, nondum esse explicatas. Naetus deinde syllabarium Tangutanum integrum, intermistis his litteris, comparando has cum maioribus, quae essent, facile inueni. Quare mihi recte videbar facturus, si eas hoc loco reponerem. De Mungalicis litteris quaedam commodius proximo in tomo Commentariorum dicam.

Tab.
XXXIX,

NVMI DVO
PTOLEMAEI LAGIDAE EXPLICATI
T. S. B.

Numus aeneus in museo meo. Caput Iouis laureatum.
= *Aquila vnguibus tenens fulmen: scutum fulmine*
insignitum: ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ.

Numus aeneus in museo Delisliano. Caput Iouis laure-
atum = Aquila, fulmen, scutum: ΠΤΟΛΕΜ...
et inter pedes A. ad pectus siglum.

Tab.
XX. XIX.
I. II.

Quod Iupiter in his numis signatus est, quod aquila cum aegide Iouis, id stirpi Ptolemaeorum celebrandae inferniit. Nam Ptolemaeus Lagi filius cum in solida laude fundatam populi de se existimationem habuit, tum arte quoque totam non neglexit. Sic sunt hominum iudicia, ut in summis virtutibus meritisque alimenta fulgoris externa requirant, nec simul nasci et perfici in vno homine excellentem virtutem gloriamque existiment, sed traduci a maioribus et communicari. Quamquam haec qualia essent, videbat Ptolemaeus, tamen non vanitate ementiendae stirpis, sed decora sua etiam per populi errorem muniendi prudentia, facile est passus, ut docti homines, qui cum eo assidue erant, genus suum diuinis originibus infererent. Idque iure suo, quod apud lasciuientem populum obscuritatem generis obici sibi intelligeret.

ret. Cum notae inscitiae grammaticum interrogaret, quis Pelei fuisset pater, ille dicturum se respondit, si prior ipse rex diceret, qui fuisset suus. Indignantibus ceteris qui cum eo erant, regem tali dicto impune irrideri, Ptolemaeus moderati animi insigne exemplum edidit, ipse sese reprehendens. Si non regium est, inquiebat, aliorum false dicta pati, ne hoc quidem regis fuit, in alios iacere. (1) Contra ea docti homines matrem Ptolemaei Arsinöen ex regum Macedonum stirpe editam cognouerant: idcirco ad Herculem et Bacchum et Iouem τὴν γενεαλογίαν prosecuti sunt. De Hercule quidem Theocritus in encomio Ptolemaei Philadelphi, cum Alexandro Ptolemaeum Lagi comparans: (2)

Ἀμφὶν γὰρ πρόγονός σφιν ὁ καρτερός Ηρα-
κλείδης,
Ἀμφότεροι δ' ἀριθμεῦνται ἐς ἑκατον Ηρακλήα.

*Vtrisque enim proauus est fortis Heraclides ,
Ambo igitur recensentur usque ad Herculem ex-
tremum.*

Fortem Heraclidem, communem vtriusque πρόγονον, Alexandrum regem Macedoniae dicit, sextum ab Alexandro et Ptolemaeo parentem.

Hoc autem Ptolemaeus Lagi filius gratanter accipiens, in numis signauit Iouem et aquilam cum
aegi-

(1) Plutarchus de ira cohibenda p. 458. (2) Idyl. 12, v. 26

aegide. Vt deinde aquila in nepotum numis, ob hanc diuini generis opinionem, mansit, ita Ptolemaeus Evergetes in monumento Adulitano illa fama vt maxime est gloriatus. Necessè est, vt totum monumenti principium huc ponam, quia in eo eruditissimi viri non vno modo lapsi sunt.

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΓΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
ΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΘΕΩΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΤΟ-
ΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΒΕΡΕ-
ΝΙΚΗΣ ΘΕΩΝ ΣΩΤΗΡΩΝ ΑΠΟΓΟ-
ΝΟΣ ΤΑ ΜΕΝ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΑ ΔΕ ΑΠΟ ΜΗ-
ΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ

Βασιλεὺς μέγας Πτολε-
μαῖος, υἱὸς βασιλέως Πτο-
λεμαίου καὶ βασιλίσσης Ἀρ-
σινόης Θεῶν Ἀδελφῶν τῶν
βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βα-
σιλίσσης Βερενίκης Θεῶν
Σωτήρων ἀπόγονος, τὰ
μὲν ἀπὸ πατρὸς Ἡρα-
κλέως τῆς Διός, τὰ δὲ ἀ-
πὸ μητρὸς Διονύσου Διός.

*Rex magnus Ptolemaeus,
filius regis Ptolemaei et
reginae Arsinoes Deo-
rum Fratrum, Deorum
autem Seruatorum, regis
Ptolemaei et reginae Be-
renicae nepos, prognatus
patre Hercule, Iouis fi-
lio et matre (Deianira)
quae Baccho Iouis filio
genita fuit.*

Nos

Nos partem hanc ex apographo codicis Vaticanani edimus, quod accuratissima et linearum et litterarum imitatione nostra causa fecit vir summus Iosephus Simonius Assemanus. Leo Allatius et Iacobus Sponius ΑΠΟ ΠΑΤΡΟΣ omiserunt, Bernardus Montefalco in Cosma Indicoplcuste restituit. (3) Vniuersi autem ediderunt ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ. Quaerit vir excellenti doctrina Edmundus Chishull, (4) quid hic βασιλέων sibi velit, meoque iudicio argute respondit: *Iure adoptiuo et legitimo diuac Arsinoes filium se tulit Euergates: unde praclatus est iste minus solens verborum ordo ΥΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΙΝΟΗΣ pro alio longe vsuatiore ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΥΙΟΣ. Iterum, vt vno eodemque iure, hoc est, naturae ipsius, non adoptionis lege, tum Berenices, tum Soteris nepotem se innueret, admissa est insolita locutio ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ κ.τ.λ.* In primo non diffiteor, causam mihi placere: in altero autem neque rationem aliquam video, neque sane ad sensum medelam, neque cur a Ms. lectione viri doctissimi discesserint, in quo manifeste est ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (5) satis mirari possum. Igitur illud ΤΩΝ cum ΘΕΩΝ ΣΩΤΗΡΩΝ cohaeret. Quod quidem durum adhuc est, (eo enim tandem factum opinor, vt docti viri aliquid mutarint) nequaquam vero ita durum, vti alterum,

Tom. IV. Qq rum,

(3) p. 141. (4) In Antiquitatibus Asiaticis Christianam aeram antecedentibus p. 84. (5) In Ms. C semper scribitur, quod nos mutauimus, quia satis constat, Ptolemaei Euergetis aeuo Σ tantummodo in monumentis existisse,

rum, et ad mentem Chishulli multo magis accommodatum. Quae sequuntur, Leo Allatius incommode conuertit: *paternum genus ab Hercule, maternum ab Dionyso Iouis filio deducens*. In eundem fere modum Edmundus Chishull. Bernardus autem Montefalco: *ex patre quidem Hercule Iouis filio, ex matre autem Baccho item Iouis filio oriundus*, quod ambigue positum veram sententiam potest continere. Nam Allatius, tamquam Energetes gloriatur, Philadelphum patrem ad Herculem genus referre, eiusdem vero sororem et coniugem, ad Bacchum. Aut neuter fuit ab Hercule, aut ambo a Dionyso. Sensit hoc praestantissimus Chishull et confitetur se sentire, itaque ut desperato in morbo aliquid audet amplius: *Qui matrem natura, Arsinoen, inquit, superius silebat, hic genus per eam ductum non silet Energetes: sed palam facit, eam genitam a Lyfimacho, Lyfimachum generis sui auctorem perhibuisse Bacchum*. Primum mihi et insolitum et plenum mysteriis videtur, matris Arsinoae ex qua natus fuerat, ipso nomine Energetem ita erubuisse, ut Berenices, a qua adoptatus fuerat, filium sese diceret, tamen genere alterius, quam ut ignominiosum nomen abdicauerat, sese deinde iactasse. Veluti si quid aut a patre aut a Berenice non erca metueret, qui iam diu sui iuris effet. Et si id maxime voluisset dicere Energetes, iis tamen verbis dicere non potuit. Ita enim dixisset fere, *κατὰ τὸν πατέρα μὲν εἰς Ἡρακλέα ἀνάγων τὸ γένος, κατὰ δὲ τὴν μητέρα εἰς Διόνυσον*, ut vitarum scriptores,

scho-

scholiastae, mythologi solent: aut sicuti Plutarchus in Alexandro: τῷ γενεῖ πρὸς πατρὸς μὲν ἦν Ηρακλείδης, ἀπὸ Κερῶν, πρὸς δὲ μητρὸς Διακίδης, ἀπὸ Νεοπτολέμου. Ita πρὸς πατρὸς, πρὸς μητρὸς apud Plutarchum significant, quod Philippi patris et Olympiadis matris genus deductum in ultimam maiorum stirpem attinet: haec autem ἀπὸ Κερῶν, ἀπὸ Νεοπτολέμου, a quo primo parente ius necessitudinis cum Heraclidis aut cum Aeacidis repetatur. Sic in Thalete Diogenes Laertius: ἐυγενέστατοι τῶν ἀπὸ Κάδμου καὶ Αἰγύρου, nobilissimi eorum, qui a Cadmo et Agenore ad eam usque aetatem geniti sunt natorum nati. Ammonius περὶ διαφόρων λέξεων eum in modum loquitur: βασιλεὺς ἐστὶν ὁ πατὴρ θεῶν ἢ ἀπὸ γένους τὴν ἀρχὴν παραλαβὼν, rex est, qui seu a patre seu a maiorum stirpe principatum accepit. Diverſitatem harum dictionum Diogenes in Platone, de patre eius loquens, sic est complexus: Φασὶν ἀνάγειν εἰς Κόδρον, οἵτινες ἀπὸ Ποσειδῶνος ἰσοεῖνται, patrem eius ad Codrum genus referre dicunt, qui genealogiam Platonis, Ibrasylo teste, usque a Neptuno recenent. Itaque in monumento Adulitano ἀπὸ πατρὸς, ἀπὸ μητρὸς, non Euergetis parentes, Philadelphum et Arsinöen respicit, sed maiores Herculem et Deianiram, ut supra explicui.

Summa stirpis gloria a Ioue, in quo consistere maluit Euergetes, quam ad minora nomina excedere. Cum Iouem ostentare vellet ἀρχηγέτην, ἐν ᾧ μάλα θυμὸς, Herculemne an Bacchum po-

Fig. III.

neret : vtrumque tandem posuit. Originem ab Hercule in Ptolemaei Epiphanis numo Salaminio, quem Ioannes Valens produxit, signari puto claua. Clarissimus antiquarius hanc monetarii notam esse putat : malim, quod dixi, Herculis. Nam etiam alium numum ad manus habeo, e Buxbaumianis, qui nunc in Museo Delisliano sunt, cum aquila et claua. Caput est Iouis diademate cinctum: nauis inscribitur ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ Iouis in hoc numo nostroque tanta conuenientia lineamentorum, vt ambo videantur ex eadem officina prodiisse. Dionysum autem a Ptolemaeis summo in honore fuisse habitum, multa sunt indicio, quae quidem ab Ioanne Valente iam studiose obseruata praetermitto.

Satyrus Peripateticus, qui Ptolemaeo Philopatore rege, τῆς δῆμης τῶν Ἀλεξανδρέων scripsit, genealogiam Ptolemaei Soteris inde vsque ab Hercule et Dionysio persecutus est, quam ex eo Theophilus Antiochenus conseruauit. (6) Διονίσης καὶ Ἀλθίας τῆς Θεσίς γεγενῆσθαι Δηϊάνειραν. τῆς δὲ καὶ Ηρακλέους τῆ Διὸς Ὑλλον. τῆ δὲ, Κλεόδημον. τῆ δὲ Αρισόμαχον. τῆ δὲ Τήμενον. τῆ δὲ Κεῖσον. τῆ δὲ Μάρωνα. τῆ δὲ Θεσίον. τῆ δὲ Ἀναόν. τῆ δὲ Αρισομίδαν. τῆ δὲ Καφανόν. τῆ δὲ Κοινόν. τῆ δὲ Τυρίμμαν. τῆ δὲ Περδίκκην. τῆ δὲ Φιλιππον. τῆ δὲ Αέροπον. τῆ δὲ Ἀλκέταν. τῆ δὲ Ἀμύνταν. τῆ δὲ Βόκρον. τῆ δὲ Μελέαγρον. τῆ δὲ Ἀρσινόην. τῆς δὲ

(6) Ad Autolyicum p. 98. ed. Vuolfianae.

δὲ καὶ Λάγυς Πτολεμαῖον τὸν καὶ Σωτῆρα. Hercules nepos, Claeodaeus est Tzetzi ad Lycophronem. (7) Et quamquam Pausanias alicubi (8) eum Κλεόδαμον citat, tamen idem alibi (9) Κλεόδεον dixit, quod proxime abest a Κλεοδαῖος quo, nomine cum non modo Tzetzes ille, aut Suidas, sed, quod maioris fieri debet, Herodotus appellat. Apud Aelianum et scholiastam Pindari (10) Κλεάδας est et Κλεόδατος apud Dexippum. (11) Apud Apollodorum Κλεέλαος corruptum ex Κλεόδαος seu Κλεοδαῖος. Nescio autem quid Sylburgio in mentem venerit ad Pausaniam ut scriberet, illum Cleodaeum apud Eusebium Αρειδαῖον vocari. Locus est in praeparatione Evangelica (2) quem respexit, e decimo Platonis de republica, (3) ubi Αρειδαῖος, tyrannus est in aliqua Pamphiliae vrbe, qui patrem senem occidit. In posteris Cleodaei sic satis inter se consentiunt Graeci, neque enim dissensionum quasuis minutias exigere nostrum hic est, nisi quod Aristomachum Tzetzes perperam omittit, quem praeter Satyrum Pausanias (4) atque Hyginus (5) habent. Temenus iterum magnum nomen, quod cum fratre Cresphonto Heraclidas in Peloponnesum reduxit. Inde iam Τημενῆϊσι eius posteris apud Lycophronem, (6) Herodoto (7) ἀπόγονοι τῆς Τημενῆς, et passim Temenidae. (8) At a Temeno usque quidam genus isthuc aliter recensuerunt apud

Q 9-3

De-

(7) ad v. 804. (8) p. 127. (9) p. 246. (10) In Isthmionica E. Z. (1) In Excerptis Eusebianis p. 57. (2) p. 669. (3) p. 471. ed. Henr. Petri. (4) p. 127. (5) p. 184. ed. Munck. (6) v. 804. (7) l. c. (8) Vid. Tertullianus de anima c. 30.

Dexippum, donec ad Caranum perveniunt. Nihil hoc magnopere ad nos. Deinde Dexippus Ἀγχιόνος filium Tyrinnae, patrem Philippi edit. Sed facile apparet, in Dexippo Perdiccam, Argaeum in Satyro excidisse, si Herodoti Vraniae (9) auscultemus. Herodotus deinde ad Amyntam usque regem cum Satyro convenit. Quod restat in Satyro, corruptelam videtur passum. Ex Herodoto Satyro Dexippoque inter se collatis hanc γενεαλογίας formam esse oportere sentio:



Et nisi hoc mihi concedatur, neque Alexandri M. aequalis esse potuit Ptolemaeus, neque Philippus rex potuit corrumpere Arsinöen, antequam LAGO nuberet, si Philippo adolescente Arsinöe fuisset propemodum anus. Ita enim Satyri stemma postulat. Ex his denique intelligi poterit Lycophron Chalcidensis cum de Thesprotio et Chalcidracone leone seu de Alexandro M. vaticinantem Cassandram inducit atque in Ptolemaeo Lagi definit iis verbis :

ὦ δὴ, μεθ' ἕκτην γένναν αὐθαίμων ἐμῶς
 εἰς τις παλαστής, συμβαλὸν ἀκρίν ὄσθός,
 πόντος τε καὶ γῆς εἰς διαλλαγὰς μωλῶν,
 πρέσβυτος ἐν Φιλοισιν ὑμνηθήσεται,
 σκύλων ἀπαρχὰς τὰς ὄσφυκτῆτες λαβῶν.

Hi versus in tenebrosissimo poeta, neque a vetustis criticis, neque a superiorum aetatum sagacissimis ingeniis ante Maturinum Veyssiere Lacrosum, virum omni doctrina consummatum, sunt intellecti. Et Ptolemaei quidem ipsum quasi nomen insertum est, ut tanto sit plus mirandum, eruditos viros scripturae errorem in ἐμῶς non deprehendisse. Id enim solum obstitit, quo minus Ptolemaeus nosceretur, quod Cassandra videretur gentilem eum suum vocare. Lacrofus emendat ἐμῶς. Malo: αὐθαίμων ἐὼς, qua voce et Homerus et poetae alii vehementer delectantur, quamquam in Lycophrone eam nondum inueni. Sic autem conuerto Latine:

Quo-

*Quocum, (Alexandro M.) eius, inde usque
a sexta generatione consanguineus
Palaeſtes (Luctator, Ptolemaeus) vnus ali-
quis, confociato robore haſtae,
Marique terraque foederibus pacis conciliatis,
Vetuliſſimus inter amicos (Alexandri) cele-
brabitur,
Spoliorum primitias bello partas confeſcutus.*

Sic igitur Ptolemaeum Lagi filium Lycophron Philadelphi regis cliens admiscuit, vt P. Virgilius Augustum Caesarem et Marcellum. Μεθ' ἑκτην γενεάν Alexandrum Amyntae tangit. Solent enim Graeci ἐν γενεαλογίαις vtrumque extremum in toto genere sic complecti, vt apud Herodotum (10) τῷ δὲ Ἀλεξάνδρῳ ἑβδόμος γενέτωρ Περδικκῆς ἐστὶ. *Alexandri huius, (qui Xerxis temporibus fuit) septimus genitor Perdiccas est.* Scilicet, vt ipse recenset: *Perdiccas, Argaeus, Philippus, Aeropas, Alcetas, Amyntas, Alexander.* Poterat dicere Lycophron μετὰ πέμπτην, quoniam ab Amynta Alexandri regis filio confociatio sanguinis procedit. Sed Amyntam transfiliit, vt in rege potius confisteret, quam in priuato. Iam sexta generatio non procedet vtrunque, nisi errore sublato in Satyro, sic vt nos ex Dexippo restituimus.

In Ioue deo auctore generis subſtitere, ne diuinas ſtirpes obſcurent. Ceteri in Graecia et
Ale-

Alcmenen Herculis matrem γενεαλογῶσιν et Deianiram, ita ut Iapetus et Inachus denique prodeant. Iapetus sine dubio Noae patriarchae filius. Inachus, a quo, ut Ocellus Lucanus (1) obseruauit, Graeca fere historia initium in fabulis capit, quod eo auctore insignem mutationem Graecia subiit: πολλάνκις γὰρ καὶ γέγονε καὶ ἔσα βάρβαρος ἡ Ἑλλάς. Praeter Ionem et Herculem, Marte patre gloriati sunt Ptolemaei reges. Nam Deianirae mater Thestii filia fuit, Thestius, ut apud Apollodorum, Martis et Demonices filius. Ergo Ptolemaeus Euergetes in monumento Adulitano, cum Martem nominasset: Ο ΜΕ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ.

Aquilam in numis nostris ad Iouem auctorem stirpis retulimus, quia aegida pedibus tenet. Alioqui haud ignoro, in huius natiuitate Ptolemaei aquilam prodigio fuisse. Eam rem vero scutum in numis signatum indicat. Sunt enim qui tradant, Arsinöen a Philippo rege vitiatam, Lago deinde datam in matrimonium. Quare, ut Pausanias scripsit, (2) Macedones Πτολεμαῶσιν Φιλίππου παῖδα εἶναι, λόγῳ δὲ Λάγῳ ἐνόμιζον. Cum autem Arsinöe filium Eordacae in Mygdonia peperisset, partum in aeneo clupei seu scuto exposuit. Inferitur huic loco, aquilam alis expansis ab ardore solis imbriumque molestiis infantem defendisse et coturnicibus dilaceratis, earum nutriuisse sanguine. Credo ego,
 Tom. IV. R r Arsi-

(1) p. 530. (2) p. 14. 15. confer Athenaeum p. 557.

Arfinöen, fallendi causa Lagi, culpam corruptae pudicitiae ad Iouem relaturam, certos homines subornasse, qui Lagum hac fama percellerent, ut tolli infantem pateretur. Sed ab cluqueo illo καὶ παρὰ τὸν πόλεμον, seu ut Athenienses Cypriique dicebant, πόλεμον, Πτολεμαῖος appellatus est, unde Lycophron Παλασθὴν dixit, uti Theocritus Αἰχμητῶν. Philippum quoque dictum scribit auctor semibarbarus, (1) qui ex Alexandrinis fastis sua transtulit, sed hic quid de Ptolemaeis diceret, prae infantia aequae non vidit, ac Theocriti scholiasta, qui Lagum quoque Ptolemaeum dictum contendit, aut L. Ampelius. Hic Ampelius nobis in memoriam reuocat, Ptolemaeum apud Oxydracas Alexandrum obiecto cluqueo defendisse. Nihil vero hoc ad huius numi cluqueum. Fabula illa quidem est a Clitarcho et Timagene conficta. (2) Fulmen autem in cluqueo non aegis est, sed ornamentum, ut solebat in fortium virorum armis.

Altero in numo A. sub pedibus aquilae, Alexandriam demonstrat, qua in vrbe signatus est. Ita antiquarii ΠΗ Πηλῆσιον, AB. Αβυδόν, ΠΑ. Πάφον ΚΙ. Κίττιον ΗΡ. Ηρακλέσπολις, ΣΑ. Σαλαμίνα, ΔΙ Διόπολις ΜΕ. et Ioannes Valens et Nicolaus Haymus Μέμφιν interpretati sunt. Decet Alexandriam elegantia numorum: in interiori Aegypto custos vidi complures, sed insigni deformitate, quos nihilominus ab antiquariis neglectos ad hunc diem fuisse doleo.

(1) p. 78. ed. Scal. (2) Vide Q. Curtium I, IX. 5.

DE VENERE CNIDIA

IN CRYPTA CONCHYLIATA HORTI

IMPERATORII AD AVLAM

AESTIVAM ET IN DVOBVS

NVMIS CNIDIIS.

T. S. B.

IN crypta conchyliata horti Imperatorii ad Av-
lam Aestiuam aedacula est tum signis aliis exor-
nata, tum Venere, opere antiquo. Roma
transuectam esse ante annos admodum viginti,
multi inter nos recordantur. Ferunt deinde, Ro-
mae aliquem, qui fundamenta nouarum aedium
iacturus erat, inter fodiendum reperisse sub humo:
multa alia huic sermoni interferi audiui, quae, cum
auctoritatem praestare non possum, consulto prae-
tereo. Venus nuda prostat, superiori corpore
leniter inclinato, ut, quae pudori suo obiecta dex-
tera et reducto sinu consulit: sinistram dexteræ
papillae obiicit: ore hilari, ut subridere videatur.
Vtroque brachio mutilata cum esset, inde a sca-
pulis spithama vna, artificio non ineleganti, sed
minime ad reliquum corpus conferendo restituta
fuit Romae.

Cnidia est meo iudicio, traducta in exemplum
ex Praxitelis opere. Nam, quae de forma Vene-

ris Cnidiae comperi, ea huic signo conueniunt. Primum, vt Luciani Ερωτες (1) Venerem apud Cnidios spectarunt, σεσηρότι γέλατι μικρόν ὑπεμαιδῶσαν, ita haec *semibiante labello*

fwit delicias libidinesque.

Tab.
XXXIX.
Fig. 4.

Quae is ipse Lucianus de auersae Veneris forma commemorauit, eadem in hac statua eximie spectantur. Vultum autem Veneris Cnidiae in numo argenteo Cnidiorum, quem e museo Imperatorio produxi, huic statuae sic congruere video, vt nihil possit magis. Et is vero ob admirabilem artificii elegantiam iis temporibus inferendus est; quae haud ita longe a Praxitelis aetate distent. Cum a Cnidis cufus est, qui Venerem suam summum ciuitatis decus esse iudicarunt, vultus vtique ad Praxitelem deae signum expressus eorum in numo fuisse videtur. Vbi autem tanta Venerei oris hoc in numo atque in statua cryptae Imperatoriae congruentia est et similitudo, ad postremum mecum conclusi, fore vt mihi de reliquo corpore ad Praxitelei formam simulacri sculpto concedatur. Vna in re, sane perexigua, ambigere quis potest, quod vnionem in aure gerit numi Cnidii Venus, Veneris statua non gerit. Nempe Praxiteles, vt Venerem suam solius corporis excellentia commendaret, omnem adscititium ornatum praetermisit: aurem fecit, quanta potuit tantilla in parte esse elegantia: stulta posteritatis adulatio, veluti quam

ar-

(1) p. 880.

artis eius poeniteret, perforatae auriculae marmoris, magni pretii, ut puto, unionem inseruit. Hinc unio in numo: in signo artifex plus sapuit, qui Praxitelem manum imitatus est potius, quam populi lenitatem. Nihil temere suspicor: ista supersticiosorum hominum consuetudo fuit. Aelium Lampridium (2) testem habeo, Alexandrum Severum Imp. cum legatus uniones duos Augustae per ipsum obtulisset magni ponderis, primum quidem iussisse vendi, ubi autem emptorem ob pretii magnitudinem non inueniret, in auribus Veneris dicasse. Alterum numum Cnidium ex aere, qui Veneris $\pi\rho\sigma\tau\alpha\mu\eta\eta$ haberet, ex Asia a Buxbaumio aduectum vidi. Numi ea ruditas, qualis post Antoninorum tempora in numis Graecis fere spectatur: attamen vel sic similitudo aliqua oris est et ad primum numum et ad statuam.

Tab.
XXXIX.
Fig. 5.

Venus Cnidia tanta in fama et admiratione fuit, ut opera ante omnia, non dicam Praxitelis, is enim Pario e marmore finxit deam, sed omnium toto terrarum orbe statuariae poneretur. Multi eam ut viderent, Cnidum nauigarunt: (3) multa in eam epigrammata honoris causa sunt facta, quorum bonam copiam Luciano auctore et Platone poeta et Eueno, aliisque, neque ingenio tamen magno, neque argumenti varietate commendam anonymus in Antiquitatibus CPlitanis (4)

Rr 3

pro-

(2) p. 1005. (3) Plinius l. XXXVI. c. 5. confer Constantinum Porphyrogenetam in Thematibus l. I. c. 14. (4) In Bandurii Imperio Orientali. t. I. p. 141.

produxit, ne quid nunc Anthologiam commemorem. Praxitelen, Philippo Amyntae et Alexandro M. regibus floruisse reperio, aliquanto maiorem Lysippo, cui aeneis in signis ita concedebat, ut in marmoreis esset summus. Ob eam causam Plinius (5) illum Olympiade CIV. in quam initia Philippi incidunt, hunc Olympiade CXV. ipso in exitu Alexandri collocavit. At cum Harmodium et Aristogitonem tyrannicidas a Praxitele in aere fusos scribit, ea autem signa a Xerxe in Persiam fuisse transportata, ab Alexandro populo Atheniensi restituta, summam rerum et temporum confusionem admiscuit. Nam ab expeditione Xerxis ad Olympiadem CIV. anni centum et viginti intercedunt, ut illorum signorum auctor Praxiteles esse non potuerit. Pausanias (6) utique Antenorem signa Harmodii et Aristogitonis, quae Xerxes rapuit, fecisse scribit. Hanc Praxitelis et Lysippi aetatem, quam ex Plinio edidi, ceteri fere confirmant. At Callistratus in statu is, scrupulum alicui iniicere potest. Cum enim illius *Ἐκφρασις* Scopae, Praxitelis et Lysippi statuarum existet, eam autem Ioannes Meursius et Godofridus Olearius, quos honoris causa nomino, Callistrato oratori tribuunt, quem Demosthenes sectatus est, non absurdo ratiocinio colligitur, superiorem Philippo rege Praxitelem fuisse et Callistrato ipso. Sed quod isti quidem tanta veri fiducia asseruere, id nos videlicet negamus, Callistratum oratorem *Ἐκφράσεις*
il-

(5) l. XXXIV. 8. (6) p. 20.

illas edidisse. Sentio necessitatem mihi imponi, ut, quod dixi, contra summorum virorum auctoritatem muniam. Plutarchus ad Sositam suum in vita Demosthenis, Gellius item et Libanius narrant, Callistratum oratorem cum Oropiam causam acturus esset, tantam illius iudicii expectationem Athenis concitasse propter et testatam eloquentiae gloriam et illustrem in re publica auctoritatem, ut cives omnes, die dicta, maximis studiis ad audiendum eum concurrerent: eodem paedagogos Demosthenem puerum adduxisse, qui, cum tantos clamores eius in oratione excitari, illum populi consensum in ornando deducendopue Callistrato cerneret, repente animo ad eius aemulationem laudis exarserit. Communem habent auctorem et Plutarchus et A. Gellius, Hermippum. Exstat Plutarchi nomine altera Demosthenis vita, quam ab alio quocumque profectam crediderim magis, quam a Plutarcho. Olearius Plutarcho relinquit, sed adolescenti. Qui autem Plutarcho postea exciderunt, quae scripserat adolescens, cum praesertim incredibilis rerum memoria in eo fuit etiam senes? qui illi adeo Hegesiae Magnesi in mentem non venit, cum plenius omnia et copiosius tradere videretur, quam Hermippus. Nempe Hegesia auctore alter ille de Demosthenis vita, quisquis is est, quod Plutarchum fugit, commemorat, Callistratum Empedi fuisse filium, Aphidneum, equitum magisterio functum, tanta eloquentiae laude, ut cum Demosthenes vnice sectaretur, donec vrbe pulsus Callistratus

tus in Thraciam abiit exulatum: ex eo enim tempore Demosthenem Isaeo se tradidisse, quatuor autem annis post, actionem suscepisse contra tutores, Timocrate archonte, Olympiadis CIV. 1. cum, ut testatur Dionysius Halicarnassensis, septemdecim annorum esset Demosthenes. Quod Callistratum oratorem Empedi filium prodidit, in eo turpiter errat. Is enim Empedi filius multo ante fuit et bello Peloponesiaco in Sicilia equitatu Atheniensium praefectus, fortiter pugnans cecidit. (7) Qui in Sicilia occubuerat, is postea, quomodo mihi persuadeo, neque in Oropia caussa versatus est, neque in Thraciam abiit exulatum. Tam turpis hallucinatio siue Hegesiae, siue alterius scriptoris, in exilio quoque Callistrati fecit, ut circumspiciam, si quid offensionis sit admistum. Cum vero Aristoteles Leodamantis in Callistratum actionem producit talem, ut in *δημαγωγὸν* et oratorem conueniat, puto in hoc altero fidem adhibere me posse Hegesiae. Iam videte, quae ex his aduersus Olearium consequantur. Si quatuor annis ante Timocratem archontem solum vertit Callistratus, ut paullo ante dixi, exilium eius in Olympiadis CII. exitu poni debet. Si ante exilium Callistrati iam omni laude artis floruit Lyfippus, annos circiter triginta natus aut amplius, qualem aetatem eximia ars requirebat, fuerit sane Philippo rege defuncto haud multo minor annis septuaginta: quae aetas non ita apta est statuario, a quo solo Alexander duci in aere voluit.

(7) Pausanias p. 561.

luit. Ergo cum Lysippum aetate et ingenio maxime florentem, Alexandro tum superstite tum vita defuncto, prodi reperimus, incamus aliam viam, si qua Callistratus *Εκφραστῆς* et Callistratus orator, vnus et idem tum multo ante Demosthenem in foro regnare, tum post Olympiadem CXIV. statuas Praxitelis et Lysippi commendare potuerit. Reuocemus eum plebiscito domum e Thracia: largiamur eidem annos vitae, quantum in hominis naturam cadit: nondum quod cupit Olearius consequitur. Nam Callistratus, qui Athenis tanta in admiratione fuit, qui tam multum potuit in re publica, ante Olympiadem CII. non sane admodum minor annis quadraginta fuit, ita difficile, et tam multi vsus, temporis, laboris res fuit Athenis, inter demagogos principatum tenere. Fuerit igitur ad Olympiadem CXIV. nonaginta fere annos natus, cum Lysippum laudaret. Nec tamen quidquam fenile istis in statuis Callistrati deprehenditur, e contrario aetatis iuuenilis viriditas, flos ipse atque luxuria. Postremo cognoscite mecum apud Aristotelem fragmentum orationis Messeniacaе, in quo Callistratus Atticae eloquentiae lacertos mouet, cum hae statuae non oratorem Attici nasi sapiunt, sed sophistam inferiorum temporum et paene infra classē. Non mirabimur adhuc, hunc scriptorem Demostheni summam in eloquentiae laude concedere, neque hunc locum expungemus, vt Olearius fecit, sed potius hunc *Εκφραστῆν* Demosthene minorem fuisse, vel ex hoc loco redarguemus. Praeterea

de Praxitele et Lyſippo , non vt de aequalibus loquitur , ſed vt de ſtatuariis , qui ante ſe fuerint. Ergo poſt Alexandrum hunc Calliſtratum poni pariar , ſi cui ita videbitur , aequalem Alciphroni rhetori , cuius item aetas nos latet , dicendi ratio perſimilis eſt. Quam vero obſcurus hic Calliſtratus fuerit , qui de ſtatuis , qui , teſte Athenaeo , de ſcortis et de Athenis ſcripſit (puto enim eundem auctorem hos libros edidiſſe) ex eo intelligo , quod Harpocracion , quoties eius περὶ Ἀθηνῶν librum citat , citat autem tribus in locis , toties dubius animi haeret , Meneclen eum nomet , an Calliſtratum. Quae cum ita ſint , nihil eius in auctoritate eſt ſitum , vt Praxitelen illo , quo dixi , tempore fuiſſe , Plinio non concedamus.

Et Venerem vero Cnidiam Praxiteles extremis Philippi aut ſub primis auſpiciis Alexandri feciſſe videtur. Quod quomodo indagauerim , videte. Solus eſt Clemens Alexandrinus , (1) qui memoriae proditum reliquit , Cnidiam , ad Cratinae , quam ſecum habuerit Praxiteles , formam eſſe factam. Auctorem citat Poſidippum de Cnidiis rebus. At ceteri ſere conſentiunt , Phrynen Theſpiacam in marmore ductam eſſe a Praxitele. In iis eſt Arnobius. (2) *Phryne* , inquit , *sicuti illi referunt , qui negotia Theſpiaca ſcriptitarunt , cum in acumine ipſo eſſet pulcritudinis venuſtatis et floris , exemplar fuiſſe perhibetur cunctarum , quae in opinione ſunt , Venerum , ſive per vrbes Graias , ſive quo iſte fluxit*

(1) In protreptico ad gentes p. 35. (2) Aduerſus gentes l. VI. p.

xit amor talium cupiditasque signorum. De Cnidia Venere nominatim Athenaeus, (3) quam, ut dixi, Phrynae adimit Clemens, cum ceteras Veneres ad eius formam sculptas fuisse concedit. At Cratina aliqua, tanta fama pulchritudinis, non a Deipnosophistis, non ab Alciphrone, non alio in scriptore celebratur: in Phrynes venustate atque illecebris tota insaniuit Graecia. Huius pulchritudinem foeminae iudicium nobilitavit ad aetatem eius cognoscendam. Nam cum Euthias Phrynen adolescentulam haberet, Hyperides orator Myrrhinam, illa ab Euthiae consuetudine discessit ad Hyperidem, Myrrhina ad Euthiam. Euthias, ut amicae perfidiam vlcisceretur, dicam ἀσεβειας ei scripsit, in qua de Eleusiniis sacris nescio quid inerat, Hyperides defendit. (4) Cum autem iudices eam damnaturi viderentur, incertum an Hyperides accedens ad eam dilacerata veste corpus speciosissimum ad misericordiam mouendam nudauerit, an ipsa percussa periculo scissa veste nudoque pectore ad pedes sese proiciens iudices perculerit: diuersi enim sunt et graues vtrimque testes. Isthuc tamquam de forma eius mulieris iudicium mox Athenis et tota Graecia percrebuit: eo motus Praxiteles Phrynen potissimum selegit, cui Venerem suam vellet similem. Huius tempus iudicii e Plutarcho mihi videor

S s 2

sta-

(3) p. 591. Πραξιτέλης δ' ὁ ἀγαλματοποιὸς ἐρεῖν αὐτῆς, τὴν Κνιδίαν Ἀφροδίτην ἀπ' αὐτῆς ἐπλάσασατο. (4) Alciphron l. 1. ep. 30. 31. et quos ibi Stephanus Bergler, V. C. amicus meus produxit testes.

statuere posse. Nam is in Hyperide scribit , (5) hunc oratorem filio expulso introduxisse domum Mirrhinam , cui Phrynen successisse dixi. Filius autem cum patre utique, eodem teste, fuit, ante Byzantii obsidionem , cum Philippus rex Euboeam cum classe peteret. Byzantium obsessum Olymp. CIX. 4. ut ex Phlegontis Tralliani Ολυμπιάδων ἀναγραφή cognouimus, quatuor annis ante Philippi regis mortem. Igitur et iudicium de Phryne non nisi postremo Philippi tempore peractum , et post isthuc iudicium celebrata iam formae fama Phryne Eleusiniis in sacris Venerem imitata e mari processit nuda , sicque ab Apelle picta est, sic, ut forma docet simulacri, a Praxitele sculpta. Igitur ante hoc tempus a Praxitele , cui propter Cupidinem marmoreum Thespiis deinde a se dedicatum, copiam sui fecit, non videtur in marmore ducta. Videtis, ut vero simile euadat, seu extremo aliquo tempore Philippi regis , seu sub auspiciis, quod equidem censeo, Alexandri M. statuam ex officina Praxitelis prodiisse.

Duas Veneres Praxiteles fecit eodem tempore, alteram velato corpore, alteram nudam. Illam Coi, quibus optio relicta fuit, praetulerunt, verecundiae matronarum suarum consulentes, hanc Cnidii emerunt: utrique signo Praxiteles pretium statuerat idem. Famam tamen Cnidia multo est consecuta celebriorem. (6) Aedes Veneris apud Cni-

(5) P. 849. (6) Luciani Amores p. 880. seq.

Cnidios haud longe a portu dedicata fuit. Subdiale circa aedem non lapidibus stratum, sed frugiferis arboribus syluae in modum dispositis: cyparissi, laurus, platani interiectae, haederaeque ac vites, (vino enim abundabat Cnidus tali, quod multum nutrire et sanguinis copiam venis suppeditare ferebant Graeci,) (7) vites igitur, circa vnaquamque ductae arborem, gratissimum oculis ad voluptatem spectaculum praebebant. Sub opacis syluis exedrae erant, in quibus conuiuari licebat et genio indulgere, ab iis tamen honesti homines refugiebant. Aedes ipsa parua, vt dea spectari tota non posset. Foribus enim patefactis sola Venus anterior cernebatur: aliae a tergo fores, quibus ab aedituo referatis, auersa patebat oculis. Sic Lucianus, vt ex eo Plinius explicari queat, qui subobscore dixit: *aedicula eius tota aperitur, vt conspici possit vndique*. Anticae fores plerumque erant apertae: auersas clausas tenebat aedituus, virili et vestitu et nomine foemina sacerdos, ne Venus, vt accidit aliquando, iniuriae prostaret.

Vt autem toto orbe dicta fuit Cnidia, ita Cnidii ipsi Ἐπλοῖαν dixere, teste Pausania. (8) Nam Venerem, quod e mari prodiisset, salutarem nauigantibus credebant prauissima superstitione mortales. Leander apud Musaeum:

(7) Athenaeus p. 32. (8) p. 4.

Αγνώσεις, ὅτι Κύπρις ἀπόσπορός ἐστι Φα-
λάσσης
 καὶ κρατέει πόντοιο καὶ ἡμετέρων ὀδυνάων.

Neque vero credebatur, hanc tutelam solis in-
 faniae suae victimis praestare, sed nautis quibusvis.
 Quare Mnesalci epigramma ad maris litus facellum
 Cypriae marinae collocat, Anytas autem statuam
 Veneris, ὄφρα Φίλον ναύτησι πλόον τελῆ, *ut nautis*
nauigationem ex voto secundaret. Anytae epigramma
 etiam Antipatri versibus expressum est, qui quidem
 etiam plus venustatis habent. A Graecis ad Ro-
 manos similis persuasio errorum peruasit. Rutili-
 us Numantianus in itinere suo: (9)

Pande, precor, gemino placatum Castore
pontum:
Temperet aequoream dux Cytherea viam.

Quo loco, ut id dicam obiter, malim equidem

Pande, precor, gemino placato Castore,
portum.

Romam enim deam veneratur, ut portum O-
 stiensem sibi panderet placatis Castoribus, (quibus
 populus Romanus cum praefecto urbis vel consule
 quotquot annis ea caussa prope Ostiam sacra facie-
 bat,) (10) inde vero ut maritimum cursum secun-
 daret, Venerem. De Cnidia ipsa Lucianus per iocam,
 vt

(9) l. i. v. 155. (10) Aethicus in Cosmographia de Tiberi.

vt affolet, ἡρέμα τῆ γῆ προσηνέχθημεν, αὐτῆς ἴμαγ τῆς θεῆς λιπαρῆ γαλήνη-πομπὸς οὐλοῦσης τὸ σκά- φος, *sensim in portu Cnidio appulimus, veluti, vt opinor, ipsa dea nauem deduceret iucundissimam per tranquillitatem.*

Nicomeden regem accepimus signum a Cnidiiis petiisse ea conditione, vt aes alienum ciuitatis, quod erat ingens, dissolueret, Cnidios omnia maluisse perpeti, quam regi, quod cupiebat, concedere. Post id CPlin fuit traductum. Nam vbi Cedrenus de Theodosio M. dixisset, δι' ἐπιτομῆς subiiciuntur de simulacris et ornamentis vrbis: in quibus traditur, Cnidiam Venerem in Lausi palatio, id media vrbe haud procul a foro Constantini M. erat, fuisse collocatam. (1) Anselmus Bandurius(2) inde Romam, tum Florentiam esse transportatam asseuerate edidit, (3) nullo ad fidem testimonio. Haec illa Medicea Venus, quam alii vero omnes ad Praxitelei simulacri exemplum factam contenderunt. Dubitari non potest, a tam excellenti opere exempla esse ducta. Ita, quae secundum Venerem praecipua in laude fuit statua Cupidinis Thespiaci, eodem auctore Praxitele, cum a C. Caesare, illo inquam Caligula, Romam esset asportata, Menodorus Atheniensis τὸ ἔργον τῆ Πραξιτέλους μιμήμενος aliam fecit, quam Pausanias scribit, sua aetate a Thespiensibus cultam. (3) Conon Atheniensis, La-

ce-

(1) p. 322. ed. Paris. (2) In Orbe Orientali t. II. p. 846.
(3) p. 4.

cedaemoniorum classe ad Cnidum superata, Athenis iuxta mare dedicauit Venerem. Cnidiam sane, sed non hanc Εὐπλοϊαν, quae nondum exstabat. Puta alteram Cnidiorum Ακραιαν. Et mos ille veterum artificum insignia opera imitandi, numquam cuiquam statuario dedecori fuit in Graecia, vt si quam statuam ad exemplum factam dicamus, nihil tamen ex arte decerptum velimus. At Venus Medicea ne exemplum quidem Cnidiae esse potest. Videte eam in Dominici Rosfi splendido opere, (4) in quo nihil ita miror, quam insignem inconstantiam, quod ipsa statua sic inscribitur

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΠΩΛΛΟΔΟΡΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ

illustri vero Maffeus in commentariis veluti alium titulum edidit: (5)

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΟΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ

In Apollodori nomine duae extremae litterae a Maffeo vtique bene restitutae sunt: tantae autem in nomine diuersitatis, vt hic Cleomenes effret, ibi Diomedes, cui culpam imputem video, quis enim Maffei eruditioni vmquam diffidit, quae summa fuit,
at-

(4) *Raccolta di statue antiche e moderne, data in luce da Domenico de Rosfi, illustrata di Paolo Alesandro Maffei in Roma 1704. Tab. XXVII. Corf. Bernardus Montfacon in Antiquitatibus illustratis tom. 1. parte 1. tab. CII. (5) p. 28.*

at quid sculptorem aeris adeo fallere potuerit, non video. Quid vero tandem in hac Venere est, quod Cnidiam referat. Nam sinus reductus obiectaque manus non protinus Praxitelem opus arguunt: sumebantur haec vel a lasciuia vel a pudore. (7) At in capite non illa est species, quae in numo, atque in hoc signo horti Imperatorii: et in pede altero nimis flexo Medicea statua nihil Cnidium habet, habet statua Petropolitana in pede utroque ad gressum firmo. Lucianus de Cnidia: ἕκ ἂν εἴποι τις ὡς ἠδὺς ὁ γέλως μηρῶ τε καὶ κνήμης ἐπ' εὐθὺ τέταμένης, ἄχει ποδὸς ἠκραιβωμένοι εἰθμοὶ, *dici non potest, quam gratiam habeat et femoris et tibiae in rectum protentae ad pedem usque accurata proportio.* Potius ego Maffeo assentiar, propter Cupidines delphinis in tergo lasciuientes, Venerem eam Genetricem esse.

Venerem aliam ex aere in Museo Regis Prussiae Laurentius Begerus (8) Cnidiam contendit esse. Verum neque hanc hic numus Cnidius secum consistere patitur. Exstat quidem Venus Cnidia in numo Plautillae Augustae extenta sinistra, ut hoc in signo Berolinensi est, nihil tamen prohibet, quin Praxitelem Venerem mamillae admouisse opinemur. Numum Ioannes Harduimus citauit, Ezechiel Spanhemius vero e gaza Regis Galliae produxit. (9) Sed si secundum hunc numum iudicare nos oporteat, putemus Praxitelem Venerem etiam vestem tenuisse appposito vase, ut in numo est,
Tom. IV. T t quem

(7) Alciphron l. 1. epist. 39. (8) Thesauri Brandenburg. p. 268.

(9) De usu et praestantia numismatum t. 11. p. 296.

quem alter numus Cnidius ab Nicolao Haymó publicatus (10) illustrat. Habet enim e regione Veneris Aesculapium, ut vestis Veneris et vasculum illis in numis balnea salutaria Cnidiorum indicauerint. Ita nimirum est: deorum dearumue simulacra non tam accurate in auersis numis ad certa statuarum simulacra effingebant Graeci, ut in aduersis. Isthic enim habitum dei deaeue saepe pro arbitrio mutarunt, aut ad certam quandam actionem finemue quemuis alium accommodauere, ut multis ex numis compertum habemus. Itaque non temere omnes statuæ Veneris, in quibus tot statuarii ingenium ad artem et nequitiam exercuere, pro Cnidia sunt commendandae. Cyrillus Hierosolymitanus (1) gentiles superstitiones recensens: *αἱ μὲν γυναῖκομανεῖς γυμνῆς γυναῖκός ἑδῶλον προσ-αγαθέουοντες προσεκύνησαν διὰ Φαγομένους τὸ πάθος.* Illic quoque cum nescio quam ob notam doctissimus editor Th. Milles de Venere Cnidia loqui censet. Plura exempla proferre, superuacaneae operae fuerit.

Ad postremum, quia duos numos Cnidios supra protuli, dicam tribus verbis de eorum nauibus. In altero cornu copiae Cnidiorum affluentiam a Veneris religione demonstrat, in primo caput leonis et claua Herculem Lacedaemoniamque Cnidiorum originem. Erant enim, ut Herodotus testatur, (2) *Λακεδαμονίων ἀποικίαι.*

De

(10) Thesauri Britannici t. II. tab. XVI. (1) Catechesis (W. P. 49. (2) l. I. c. 174.

DE VARAGIS

T. S. B.

P Rincipio Russi reges ex Varagis habuere. Pul-
 tis iis, Gostomislus Slauiico ex genere princi-
 patum tenuit et intestinis dissidiis infirmum
 et a Varagorum adflictum potentia. Illius
 ex consilio Russi regiam domum ab Varagis reuo-
 carunt: Ruricum, inquam, et fratres. Inde iam
 Varagorum non infrequens memoria in Annalibus
 Russicis, sed tantum amicorum et sociorum nomi-
 nis Ruthenici, quine sub regum Russiae stipendiis
 militarint, aut palatinis officiis sint defuncti. Quod
 nomen fuerint Varagi, ubi coluerint, nemo est,
 qui sic explicuerit, ut illius in sententia penitus
 acquiescam. Sunt ex scriptoribus Ruthenis, quos
 ad manus habeo, qui, quando Ruricum a Varagis
 venisse tradunt, huic loco interferunt, *ex Prussia*
venisse. Hi quidem omnes Ioannis Basilidis Regis
 temporibus fuere, aut postea. Quare Chronogra-
 phus anonymus in synopsi, ut aliquid ad huius sen-
 tentiae honorem adiiceret, *ex Prussia*, scribit,
aliquem Kurfürst (1) (*Churfürst* seu *Electorem*) *et*
Magnum ducem, Ruricum numine accitum esse. Scri-
 psit igitur post A. C. 1612. cum Ioannes Sigis-

T t 2

mun-

(1) Курфюрста,

mundus Elector, Prussiae ducatum domui suae diuinixisset, crediditque, eundem in Prussia statum ante tot secula fuisse. De Prussia sane Ioanni Basilidi Regi id ipsum persuasum fuisse, Paulum Oderbornium et Petrum Petreium auctores habeo. Sed et quaedam istius Regis cum Alberto Duce acta existant, ex quibus tota res et opinionis istius quasi lacerti magis apparent, quae autem aequo animo dissimulare possum, quando opinioni illi alia infinita fere obstant. Matthaeus Praetorius quidem eam gratanter accepit, vocem e Prutenico sermone interpretatus, tamquam si Varagi essent *Vareis*, quasi *compulsi*. Potuisset eodem referre *Wargen* pagum agri Sambiensis veteri rerum celebritate et *Rus* fluvium proxime a Memela. Me vero, ut patriae impense faueo, tamen ille rumor ne similitudine quidem veri suffultus, non delectat. Si quid praeterea est, quod cuiquam in Praetorio possit placere, id ipsum prolata confirmataque sententia mea, displicebit. Et Praetorius vero Prussos veteres cum Slaucarum gentium stirpibus confudit: quod eum dolo malo fecisse, ut Polonis assentaretur, demonstrare possum. Populum Prussicum duobus fere ante Ruricum seculis hac in regione, eundem fuisse, quem postea Equites Teutonici subiugarunt, hoc est, corporis eiusdem cum Lithuanis, Curonis, Lettis, diuersae autem a Slaucis gentibus stirpis, adeo possum confirmare, ut nullius hominis disensionem pertimescam. Quare quod hac in opinio-

(2) In Orbe Gothico l. II. 2. 6.

nione plausibile est maxime, cum Praetorius Rus-
 sos ex sui sanguinis populo principem repetiisse con-
 cludit, id me minime omnium perturbat. Sed
 quidam Rutheni adiiciunt amplius, (3) illum Prus-
 sicum principem Ruricum genus duxisse ab Caesa-
 ris Augusti germano, qui in Prussia fortunas suas
 collocarit. Fabula est, digna istorum temporum
 ingenio, quod vetustis monumentis intemperanter
 abutebatur ad coniecturas suas, coniecturas edebat
 pro certa fama. Vincentius Cadlubco episcopus
 Cracouiensis fundamenta iecit necessitudinis illius
 Augustae domus cum familia regum Polonica *Ko-
 szysko*, quam ante Piaslum ponit. Lesconem ter-
 tium scribit, C. Iulium Caesarem tribus praeliis vi-
 cisse, P. Crassum apud Parthos (nam et Parthis et
 Getis et nescio quibus Transparthanis rex fuit Le-
 sco,) cum omnibus copiis deleuisse: Caesarem eidem
 Iuliam sororem in matrimonium elocasse: dotis
 loco fuisse Bauariam: contra Iuliae a Lescone da-
 tam esse Sambiensem in Prussia prouinciam. Si
 quaeras, a qua coniectura Vincentii ista profecta
 sint, ipse tibi quasi digito monstrat. Lublino an-
 tea Iulium nomen fuisse Vincentius credebat: con-
 fudit enim Iulium Slaucicam ad mare Balthicum
 urbem cum Lublino, propter vocis congruentem
 sonum. Nempe, ut ille credebat, a Iulia: inde
 iam cetera eodem trahenda erant. Stomachum
 haec mouere possunt, cum viscerum omnium do-
 loribus, donec illa tam cruda eiecta fuerint. Alia

(3) Confer Petreium in Chronico Moscouitico parte II. p. 139^{seq.}

via Petrus Teutoburgicus, (4) homo non adeo vanus, Prussicis rebus Romanas admiscuit. C. Caesarem scribit, in Prussia bellum gessisse. Inductus in opinionem illam est, quod de Drusi et Germanici Caesarum expeditionibus in Glessarias insulas legerat. Nam et Erasmmum Stellam Glessariae insulae fefellerunt. Exportari monstrosos hos ingenii partus oportet aliquam desertam in insulam, quia veris historiis pestem portendunt. Mirum tamen est, quam fecundae tales fuerint fabulae. Nam cum ista exstarent apud Polonos de necessitudine Augustae domus et de Romanis in Prussia expeditionibus, iam expedita erat via, simul cum Iulia, tamquam Augusti Caesaris sorore, etiam fratrem aliquem germanum deducendi ab Roma, inde Ruricum illius serum nepotem ex Prussia.

Sigismundus Herbersteinus, (5) cum videret, Varagos a Russis trans mare Balticum poni et partem illius maris, quod inter Ingriam et Finni-
am situm est, *Waretzkoie more*, *Varegium mare* appellari, ab superiori sententia, quam ipse forte primus in Russia disseminavit, tandem alio diuertit animum. Prope Holsatiam *Vagriam* reperiebat, et *Vagros*, teste Adamo Bremensi, Slauonicum populum. Habebat congruentiam nominis, rem leuiculam, nisi firmiter fulcris muniatur. At tamen Bernardus Latomus et Fridericus Chemnitius et qui eos sunt secuti hoc primum omnium po-
 sue-

(4) Historiae Prussicae p. 41. (5) Rerum Moscoviticarum p. 3. seq.

fuere tamquam certum. Et quia inuenerant Ruricum circiter A. C. 840. fuisse, ergo qui tum principes in Vagris et Obotritis floruerint, quae finire. Et cum Vitislai regis filii fuere duo, alter Thrasik, cuius liberi essent noti, alter Godelaibus, cuius liberi non ederentur, huic Ruricum, Treburum et Sinaus transcripserunt. Quod praeter nomen in hac coniectura Herbersteinio placuit, Vagrios Slaunici corporis Russorum necessarios fuisse, id ipsum in controversia poni potest. Nam his Slaucis populis permitti fuere alii, qui cognatione attingerent Prussos et Lithuanos, vt certe Veruli, forte et Vendi. Quidquid Lithuanici illorum in sermone est, vt esse apparet, ab veteri stirpe generis permansit, Slaunica admista sunt ab accolis, per quos cincti et a necessariis suis plane exclusi fuere. Si quis Vagrios his ipsis accensere velit, non satis idoneam video Adami Bremensis auctoritatem, vt nos ab adfensu retineat. Inuenio quidem apud Helmoldum, (6) Vagrios in mari Baltico piraticam exercuisse, vt, si cui liber, nauibus eos deducere possit in Russiam et vel vim eorum atque metum iniicere. At testem habeo Saxonem Grammaticum, (7) Slaunos omnes illo in litore piraticam serius instituisse et perraro adhuc Suenonis Tiuffeskegi regis temporibus, circiter A. C. 985. Quare ne satis quidem apparet, quid commercii his Vagriis cum Russis fuerit.

Mul-

(6) p. 6. ed. Bang. (7) p. 186.

Multa alia in mentem venerunt aduersus superiores sententias, quae fiducia meae opinionis, quam nunc expositurus sum, consulto praetermisi. Aio igitur, Varagos Ruthenicorum scriptorum, fuisse ex Scandinavia Daniaque homines nobiles, socios in bellis et stipendiarios milites Russorum, regum satellites, limitum custodes, rebus etiam civilibus et magistratibus admotos: ab iis deinde in vniuersum omnes Suedos, Gothlandos, Noruagos, Danos dictos fuisse Varagos. Et primum quidem Russici annales quamquam ab Rurico exordiantur, tamen tenuem memoriam admiscent, eum ex superiorum Russiae regum, qui et ipsi Varagi fuerint, profapia existisse, pulsos autem a Gostomiso fuisse hos ex eo sanguine reges. Iam vetustae Suedorum et Noruagorum sagae non ita penitus sunt explodendae, ut, cum Gardarikiae et Holmgardiae, hoc est, Russiae reges ante Ruricum nominant, quamquam multa etiam ex vano hauriunt, earum memoria rerum fide digna sit nulla. Alii loco atque tempori haec edifferere magis conueniet: nunc ex Annalibus Francicis Bertinianis(8) locum apponam cum primis insignem. Ita anonymus ad A. C. 839. Teophilus Imperator Cplitanus *misit cum eis* (cum legatis ad Ludouicum Pium Imp.) *quosdam, qui se, id est, gentem suam, Rhos vocari dicebant: quos rex illorum Chacanus vocabulo, ad se amicitiae, sicut asserabant, caussa direxerat, (sine gubio secundo Borysthene nauibus)*

pe-

(8) Apud Duchesium t. III. p. 195. b.

petens per memoratam epistolam, quatenus benignitate Imperatoris, redeundi facultatem atque auxilium per imperium suum totum habere possent: quoniam itinera, per quae ad eum CPlin venerant, inter barbaras et nimiae feritatis gentes immanissimas habuerant, quibus eos, ne forte periculum inciderent, redire noluit: quorum aduentus causam Imperator (Ludouicus) diligentius inuestigans, comperit, eos gentis esse Sueonum, exploratores potius regni illius (CPlitani) nostrique, quam amicitiae petitores ratus, penes se eousque retinendos iudicauit, quoad veraciter inueniri possit, utrum fideliter eo nec ne peruenerint: idque Theophilo per memoratos legatos suos atque epistolam intimare non distulit et quod eos illius amore libenter susceperit, ac, si fideles inuenirentur et facultas absque illorum periculo in patriam remeandi daretur, cum auxilio remittendos: sin alias, una cum missis nostris ad eius praesentiam dirigendos, ut, quid de talibus fieri deberet, ipse decernendo efficeret. Habes gentem Rosficam ante Ruricum, cuius nominis multo quam annales Russici edunt, antiquioris, auctores Graecos alio loco producam: habes regem tanta maiestate, ut *خاکان* Chakan, seu Imperator et *Αυτοκράτωρ* iam tum diceretur: vides hos legatos Rosficos ab stirpe fuisse Sueonas.

Inde autem ab Rurico, omnia nomina Varagorum in Russicis annalibus conseruata, nullius alterius sermonis magis sunt, quam Suionici, Noruagici, Danici: neque vero obscure et parce, ut me

quis cauillari putet. Videamus primorum ex Varagis regum nomina. Habemus primum omnium *Ruricum*. Cuius id nomen populi est, nisi Scandinauici aut Danici? *Ruricum* regem Daniae quintum et decimum Saxo Sialandensis citat. (9) Is Erico regi, seu regis monacho, in historia Daniae *Rorik*. In serie Runica regum Daniae ab Olao Vormio edita, *Rorek*. In Noruagis celebris est *Hrorekur* seu *Rorekur* Haraldi Pulchricomi filius; (10) eodem tempore rex Heidemarkiae in Vplandia (1) *Hrorekur* et *Rorek* fuit. Et *Rorek*, quem Olaus S. rex Noruagiae vicit. (2) Olaus Verelius sub finem historiae Herraudi et Bosae inter cetera veteris gentis nomina e lapidibus runicis edidit *Rorikr* et *Rurik*. In Germania quoque *Ruricus* archiepiscopus Rothomagensis in privilegio monasterii S. Remigii a synodo Senonensi confirmato. (3) Forte idem nomen, quod apud Germanos fuit *Rugerik* et *Rogerik*. Rurici fratri *Trewur*, *Trubar*, *Trowur* nomen fuit, vt Ruthenicae habent historiae. Saxoni Grammatico (4) in ducibus Ringonis regis Suediae contra Haraldum Hyldetand: *Ivarusque cognominatus Thruwar*. Stephanus Stephanus (5) ex veteri codice Danico: *Iver Truere*. Alterius fratris *Sineus* nomen in septentrionalibus nondum reperi. Fuere autem nomina propemodum infinita: neque satis constat, an hoc a Russis corruptum non fuerit. Apud Saxonem Gram-

ma-

(9) p. 47. (10) Snorro Sturlson in Ynglingorum historia t. I. p. 96. 113. (1) ib. p. 410. 469. (2) ib. t. I. p. 487. (3) Dachezii Spicilegium t. I. p. 595, secundae edit. (4) p. 144. (5) p. 172.

maticum (6) et Ericum regem (7) est rex *Snio*, ab isto nomine non abhorrens.

Mansere nomina Scandinauica etiam in Rurici posteritate et domo. Exemplo est filius *Igor*, vt eius nomen Russi enunciant: nam Constantino Porphyrogenetae est *Ιγγωε Ingor*, Liuthprando Tizinesi, Sigeberto Gemblacensi, Eggehardo Vragiensi, *Inger*. Ita Liuthprandus Cpli pronunciarum audiuerat. Et Russi recte et Graeci, si septentrionales audias. In saxo, quod Henricus Curio in monumentis lapidum Runicorum ex Laurentii Burei schedis edidit: *Sigvidr et Ingvar et Iarlabangi incidi runas curarunt patri suo Inguar et fratri suo Ragnwalt*. Apud Ericum regem et Hermannum Cornerum (8) *Inguar* rex Danorum: idem Saxoni Grammatico (9) *Iuarus*. Apud Snorronem Sturlacum (10) *Tnguar* rex Fiedrundiae: eidem (1) etiam *Iuar*, vt apud Verelium quoque ex runis. Heruorar saga, (2) *Ifuar Vidfarni* et *Ifur*. In Teutonicis quoque Iustus Georgius Schottelius, diligentissimus talium explorator inuenit *Inguer* et *mansionis tutelam* explicuit. Venit mihi hoc loco in mentem Constantini Porphyrogenetae auia. Leo Grammaticus (4) *Ευδοκίαν τὴν Ιγγιρίαν* et *Ευδοκίαν τῆ Ιγγερος* vocauit. Georgius Monachus (5) τῆ

V v 2

Iγ-

(6) p. 157. (7) p. 265. ed. Fabr. (8) p. 482. ed. Eccardi. *Inguar* Olauus Voimius in lexico Runico explicat, *fortem uirum*. (9) p. 176. (10) t. 1. p. 43. (1) p. 98. (2) p. 179. (3) de Lingua Germanica p. 1067. (4) p. 464. 471. (5) In nouis Imperatoribus p. 544.

Ἰγγισος. Simeon Logotheta (6) Ἰγγισος. Michael Glycas (7) et Zonaras (8) τῷ Ἰγκησος. Leontius Byzantius; aut quisquis Basilii Macedonis vitam scripsit, seu magis panegyricum, cum de Basilii nuptiis fatur, *data est ei*, inquit, (9) *in matrimonium ἡ θυγάτηρ τῷ πατρὶ πάντων ἐπέυγενεία καὶ φρονήσει λαλεμένης τότε Ἰγγισος. filia Ingeris, qui tum ante omnes alios ob nobilitatem et prudentiam colebatur.* Cedrenus (10) qui hunc auctorem, fere sequitur, addit τῷ γένει καταγομένης τῶν Μαρτινακίων, *stirpis Martinaceae.* Quam nobilis ille Inger fuerit, viderit Leontius et de Martinaceo genere Cedrenus: nomen utique peregrinum est. Et quidquid visum sit adulatoribus, oportet stirpem eius non nobilem in Graecia fuisse, e qua stirpe Michael Imperator Eudociam, cum ob pulchritudinem et prudentiam deperiret, ducere tamen non est ausus. Malim vero Scandinavici generis fuisse Ingerem, quam alterius: nomen enim Scandinavicum est. Neque ei Scandinavicam nobilitatem adimo, ut fere nobilissimus quisque indidem solitus est petere Byzantium: Graecam non concedo. Et licet Byzantii Inger vel ex illustrissima gente uxorem duxerit Eudociae matrem, tamen ut ait Lithprandus, (1) *Graeci in geneseos nobilitate, non, quae mater, sed quis pater fuerit, inquirebant.*

Ingoris regis Rufforum, ut ad eum redeam,
 fi-

(6) p. 455. (7) p. 297. (8) p. 165. (9) p. 147. (10) p. 565.
 (1) l. V. c. 6.

filius *Suiatoslaus*, nomen plane Slauonicum est, si
 sic, ut Russica monumenta habent, enuncies. At
 Constantinus Porphyrogenneta, Cedrenus, Zonar-
 ras, Ionnes Curopalata, ΣΦενδοθάβον *Sphendo-*
sblauum seu *Suendostlauum* dixerunt, quod videri
 potest hybridum esse, extremo Slauonico, prin-
 cipio Normannico *Suen*, multis in nominibus. Nam
 et componunt Normanni huncce in modum. Ha-
 bemus in Dania *Suenottonem* regem, apud Germa-
 nos *Suendeboldum* et *Suendebordum* Lotharingiae re-
 gem, (2) et *Suenebildin* abbatem Heruordensem.
 (3) Σθλάβης Graeci Constantini Porphyrogennetae
 aetate et postea, dixerunt *Slauos*. Reliquum manet
Suen et *Suendo*, cum exitu ad componendam vo-
 cem idoneo. Non nego, *Suiatoslaum* et *Suendos-*
laum (4) Slauonice et quidem percommode dici
sanctae gloriae virum: sed cum sanctitatis nomen
 populo profano quantum notum fuerit, non apparet,
 potest fieri ut e Normannico sit corruptum. Nam
 et *Vlodimer* nomen, ut nunc Russi enunciant, quam-
 quam Slauonicum (5) videtur esse et commode ex-
 plicari, tamen simili dubitatione incertae originis
 inuoluitur. Slauoni olim *Vladimir* dixerunt, vn-
 de Cedreno Βλαδιμηρης. Dithmaro Merseburgen-
 si, qui id nomen a Polonis pronuciari ipsius ae-
 tate Vladimiri audiebat, et Eggehardo Vragiensi,
Vladimir, *Vladimir*, *Valdemar*. Snorroni Stur-
 laeo (6) *Valldemar*. Sic item auctori *Vilkinæ sagæ*

V v 3

a

(2) Hermannus Cornerus p. 509. 524. (3) ib. p. 149

(4) Святославъ et Съвѣтославъ (5) Владимиръ (6) c. 1. p. 196

a Peringskioldo editae; qui, cum Valdemarum Russiae regem Theodorici Veronenfis aetati immiscet et noua praeterea nomina Prussiae aliarumque regionum eodem traducit, adeo fibulam suam prodit, ut vix nominandus sit nobis. Sicuti *Vlodimir* Slaunicum est, ita *Valdemar* et Normannicum et Teutonicum. Schottelius in Teutonicis nominibus, *syluae praefectum* explicat: quod nobis non placet. Illis enim temporibus *wal* dicebatur, *campus*, in quo *acies hostiles concurrunt*, unde adhuc *wahlstadt*, *sampi* seu *aciei locus*. Poema de amissione terrae sanctae. (7)

do man des tags
Manches stiches vnd flags
Auf den wal het gepflegen.

vbi eo die multi vulnerati sunt et caesi in (wal) aciei campo. Eodem in poemate (8)

Dy cbomen taugenleich
Auf daz wal geflichen.

Hi parati ad pugnam venerunt in (wal) aciei locum.
 Chronicon rhythmicum ducum Brunsvicensium: (9)

Aldar de Keiser Otto bald
Bebilt ds wal vnde den sege

vbi

(7) p. 1528. ed. Ecc. (8) p. 1537. (9) p. 127 ed. Leibn.

ubi mox Otto Caesar obtinuit aciem et victoriam. Inde in Capitularibus Baluzii (10) *walaraupa*, *aciei*, seu, *caesorum in acie spoliatio* et in legibus Aethelredi regis *wealreaf*, apud Verelium *walrusf*. Inde *walballa* septemtrionalium, de quo Ioannes Georgius Keysler diligentissime disputavit: (1) inde *walrus strages*, et Odini nomen *walfader*, *aciei pater* et *waltodur*. Inde *Valpotus* quoque, vetus familia, ex qua primus magister Ordinis Teutonici. Rhythmus de S. Annone Coloniensi (2)

Ci dere burg wili dikki quamin
Di Waltpodin wane Rome,
Di dir oug er dar in lantin
Veste burge habitin
Vurmiz unti Spiri

Martinus Opitius explicat *gewaltboten*, *legatos*, *praesides*, *curatores* ac putat inde esse *walten* et *Vualtarium* in capitulo Karoli M. Malim a *wal* et *pot*. Kero monachus S. Galli: *kipoot*, *praecepit*, *kipot* *praeceptum*. Dicebant autem veteres omnibus in vocibus eius naturae et rationis, non tam *kebot* et *gebot* quam *kbot* et *gbot* vna syllaba, ut Helnetii etiam nunc. Est igitur *Valpot*, *aciei praefectus*: nam illa ipsa familia, cuius genealogiam Conradus Rittershusius nobis dedit, cum olim *Valpoti de Passenbeim* dicerentur, nunc oblitterato isto nomine, dicuntur *Marschalki*, significatione eadem conseruata in no-

(10) c. 1. p. 136. (1) in Antiquitatibus Septemtrionalitibus p. 127. &c. (2) c. 30.

uo nomine. Sic *Valmar*, *Valtmar*, *Valdemar* est *avici equus* seu *bellicosus equus*. Nam, ut Pausanias (3) observavit, *Celtis equum, mar* dici, ita hoc nomen veteri in septemtrione est notissimum. Sed *Vseuolodi* nomen eadem ex familia, quod sane Slavonicum est, Snorro Sturlonides (4) ita inflexit, ut Normannice sonaret *Vifaualldur*. Ad eiusdem domus cognationem pertinet *Oleg*: quod nomen in lapidibus Scandinavicis est *Alak*. Principes Kiouientes *Oscold* et *Dir* Varagos fuisse Russici Chronographi tradunt. *Oscold*, ut Olaus Verelius e runis *Oskael*, apud Snorronem *Askel* (5) et *Afzkell*. In *Dir* nomine haereo. Potest esse proprium ut nauium, ita hominum. In Edda Islandica (6) *Tyr*. In Verelii runicis foeminarum nominibus *Dirva*. Magis tamen inclinat animus, ut credam Russos sequiorum aetatum in altero nomine offendisse: nam *Oscoldum* *Diar Kiouiae* fuisse dictum opinor. Snorro de Asgardo, (7) *vrbs principem habuit nomine Odinum: ibi mos obtinuit, ut duodecim praefecti ceteris eminentiores Diar et Drottnar, hoc est, principes et domini dicti, gererent curam sacrorum et populo ius dicerent*. Et *Oscoldum* eiusmodi regum ante Ruricum praefectum Kiouientem fuisse, ex rebus cum Igore et Olego gestis concludo. Est autem *ديار* *Diar* ea significatione plane Turcicum, videturque nomen hoc dignitatis acceptum a Cozaris, gente Turcica, quae tum inter vtrumque Tanaim et in Cherrhoneso Taurica multum poterat.

Jam

(3) p. 845. (4) t. I. p. 183. (5) t. II, p. 319, ibidem p. 405.
 (6) Mythologia XXIII. (7) t. I. p. 2.

Iam in ducibus Varagis Ingoris et Suendostlauri regum *Suendeldus* et *Suudeldus* ita Scandinavicus est, ut me suppudeat illa in copia exemplum producere. Suendeldi filius aliis *Liutr* : aliis *Biut*. Utrum malis accipe. Olaus Verelius e lapidibus *Liutr* : in qua voce extrema littera, septemtrionalium more et poni potest, et omitti. Fuit sub Suendostlao alter dux, ignotus Russicis monumentis, Cedreno ob virtutem eximie laudatus (8) *Sphagellus*, nomen Scandinavicum, ut certe scio me observasse : at memoria me destituit. Habemus *Rogvolod* Plocensem ducem. *Kniga Stepennaria* : *Rogvolod a Varagis dominatum in Plotzko venerat*. Chronographus Ruthenus : *is erat Knias in Polotzko et заморе trans mare, et in полешескѣ Poletsk et Muru in Turowas sub ditione tenuit*. De his regionibus et locis alias : nunc de nomine huius Varagi. Inscriptio a Ioanne Peringskioldo ex petra Edensi in vita Theodorici regis profertur : *Ragnwaltr fecit exsculpi runas in memoriam Fastvidis matris suae Onemi filiae, quae mortua est in Aidi : sit deus animae eius adiutor : runas exsculpi fecit* (*Ragnwaltr, hwar a Grikianti was lisforungi*) *Ragnwaldus, qui in Graecia erat militum dux et antesignanus*. Ostendam alias, Russiam a septemtrionalibus dictam fuisse Graeciam, atque in iis lapidibus, in quibus Graeciae mentio exstat, caute nos oportere versari, ne ambigua voce fallamur. Est et apud Snorronem (9) *Ragnwaldus Iarlus*, quem Iaroslans rex Vladimiri filius summo in honore ha-

Tom. IV. X x buit.

(8) p. 676. (9) t. 1. p. 516. seq.

buit. Is cum Aldeigoburgo vrbe, *Iarls riki*, Ingigerdis reginae dotalitium tenuit, ex quo adhuc *Careliae* nomen manere mihi videtur. A Snorronone nomen alias *Raugnwaldur* et *Roegnwald* effertur. (10) Ioannes Fridericus Peringskioldus dialecto Suedica expressit: *Ragnwald* et *Ragwald*. Notus *Rognvolodus* Eysteini filius, *Rognwaldus* Einaris, *Rognwaldus* Brusii filius et alii in Orcadensibus Comitibus a, ud Thormodum Torfaeum. Huius Rogvoldi Plocensis filia, *Rogveda* a Chronographo Russo vocatur, *Rozgnieda* a Stepennaiae knigae auctore. Habemus eum in modum in monumento Siltensi apud Olaum Vormium (1) *Rotvidba*. Alioqui *Ragnbilda* Erici Iutlandiae regis filia, Erici Blodoxis regis Noruagorum mater satis nota: *Ragnilta* in monumento Trygveldensi et Bildensi. (2) Apud Igorem regem in exercitu fuere Varagi, cum aduersus CPlin duceret. Legati Igoris in urbem missi memorantur, in quibus est *Карла*, quod quid aliud est, quam *Carolus*? frequens nomen ita, vt antiquum. In monumento Hobroensi: (3) *Thurir lapidem hunc posuit (vsti Karl gudoa) Carolo bono*. Est deinde *Ингелдъ Ingjeld*. *Ingialdus* Naumudaliae rex, *Ingialdus* Starkadi alumnus Daniae rex, *Ingialdus* *Trana*, omnes apud Snorronem. Tum *Φαρλοφα Farlof*. Apud Verelium *Farulf*, in monumento Froelandensi *Herluf*: in Teutonicis credo *Fardulfus* et *Ferdulfus*. Porro *Рулавъ Rulaw*, frequentis-

(10) t. I. p. 82. t. I. p. 542. t. II. p. 339. (1) p. 454. (2) Olauus Vormius in monumentis Danicis p. 112. 475. seq. (3) Olauus Vormius l. V. c. 3.

simum nomen, ut *Hrolf Langom spada*: Iarlus Noruegensis et *Hrolf krake* rex, *Rolfus Rollo* in Orca-
dentibus Torfaei: Saxoni Grammatico *Roluo*. Est
in legatis *Andy Lidu*: ut *Lyd* episcopus Noruegiae
(5) est *Kapub Carn*: ut *Karius* ille Islandus in Or-
cadibus. (6) Est *piapb Riar*: ut *Hroar* seu *Ruar*, rex
Daniae apud Thormodum Torfaeum et Gualtherum
in historia *Hrolfi Krakii* a Torfaeo edita. Sunt de-
nique in legatis *Truan*, *Ruald*, *Flelaw*, *Foft*: Scan-
dinauica omnia. Postquam illa a me scripta sunt,
multa in *Peringskioldi Vplandicis* ceterisque mo-
numentis inueni, quae ad illustranda haec nomina
pertinerent: at me iam ipsum fastidium cepit, ut
quid lectoribus meis futurum sit iudicare queam.
Vnum, sed insigne adiiciam nomen. Russici an-
nales sub *Iaroslao Iacobum Varagum* celebrant. Is
sine dubio *Ingegerdis* reginae frater, *Olai* regis fi-
lius fuit. Nam de eo *Snorro* auctor est: (7) *alius*
etiam ex reginae thoro ei (*Olao* regi *Erici* filio) *na-*
scabatur filius, ipsa feria S. Iacobi memoriae dicata:
bunc, cum sacri baptismatis ritu initiandus esset, Iaco-
bum nominauit episcopus: quod omnino nomen auersa-
bantur Suiones, quod nemo unquam Suionum regum
sic appellatus fuerat. Suionum vero regum nemo?
imo ne alterius quidem seu nobilis hominis seu ple-
bii exemplum apud *Snorronem* exstat. Neque tan-
tummodo *Iacobi*, sed omnia christianae memoriae
nomina, tamquam peregrina, penitus infrequen-
tia in septemtrione fuerunt.

(4) apud *Verinum*, p. 508. (5) *Snorro* t. 11, p. 347. (6) *Tor-*
faeus in *Orcaensi historia* p. 39. (7) tom. 1, p. 592.

Historiographus ineditus tradit, Vladimirus Iaroslai filium ea in classe, in qua contra Constantinum Monomachum Imp. profectus est, magnam Varagorum multitudinem habuisse. Qui Varagi? nempe Cedrenus opinioni nostrae congruenter tradit, ex Scandinavia fortes viros fuisse. (8) Dicitur ei Vladimirus προσεταιρισάμενος καὶ συμμαχικὸν ἔκ ὀλίγων ἀπὸ τῶν κατοικούντων ἐν ταῖς προσαρκτικαῖς τῆς Ὠκεανῆς νήσοις ἔθνων, sibi associasse etiam auxilia non exigua ex gentibus, quae in borealibus Oceani insulis colunt. Notum est, insulam dici Scandinaviam peruetusto errore. Item de Vladimiro Magno Russici annales, eum saepe in exercitu suo magnam Varagorum multitudinem duxisse. Danos eos fuisse, Dithmarus Merseburgensis Vladimiri regis aequalis tradit, (9) qui id ipsum a Polonis et Bohemis cognoscere poterat, ut multa verissime cognouit. *In hac ciuitate Kitawa (lege Kiaua, quae Kiouia est) populi ignota manus, (ingens multitudo) quae, sicut omnis haec prouincia (Russia) ex fugitiuorum seruorum robore confluentium et maxime Danorum, Pecineis (Pacincis) multum se infestantibus, haecenus resistebat. Ne quem hic offendant serui fugitiui. Homo Germanus sui et seculi et populi ingenio iudicabat et praeterea incommode loquebatur. Seruos dicebant lingua sua Tentoni, qui pedibus stipendia mererent, quantumuis nobiles genere et gloria rerum gestarum homines, voce nequaquam, ut Latinum serui nomen est, ignominioso. At fugitiuos cen-*

(8) p. 758. (9) Et ex Dithmaro Eggehardus Vragianensis ad A.C. 1018.

sebat eos, qui alio sub rege stipendia mererent, quod tum in Teutonis erat insolens, ut vel ex Dithmaro in Boleslai Poloni rebus cognoscitur, nisi aliunde nobis constaret. Alii Scandinavis Danisque mores et ea vel maxime quaerendae gloriae materia, si quis nobilis vir apud longinquos populos lauream sibi quaesivisset.

Ex iis quae supra explicui, constitui potest, quae meus incerto auctori in vita Romani Lacapeni Imp. fuerit, (10) cum εἰ Ρῶς, inquit, οἱ καὶ Δρομίται λεγόμενοι, οἱ ἐκ γένους τῶν Φραγγῶν καλεῖσθαι, *Russi, etiam Dromitae dicti, qui e Francorum genere sunt.* Sic etiam Symeon Logotheta. (1) De hoc loco dicam alias commodius. At genus hoc Francicum quo pertinet, nisi ad cognationem regiae domus cum Scandinavis, et ad illam multitudinem Normannorum, Suionum, Danorum, qui inter Russos in dignitatibus et exercitu fuere? Nam Cplitani, ex quo Franci caput extulerunt, totam Germaniam dixerunt Franciam. Quare Constantinus Porphyrogenneta: (2) Φραγγία ἢ καὶ Σαξία. Immo, quemadmodum Eggehardus Vragiensis (3) Germaniam extra fines suos usque ad Tanaim profert, ita Franciam Graeci dicebant, quidquid ad occidentem imperii Byzantii erat. Lithprandus Ticinensis: *residentibus nobis ad mensam*

X x 3

(Im-

(10) p. 262. (1) p. 465. et apud Anselmum Bandurium in Imperio Orientali t. 11. p. 33. (2) de administrando imperio p. 95. (3) p. 226. ed. Ecc.

(Imperator) ex Francis, quo nomine tam Latinos, quam Teutonas comprehendit, ludum habuit. Quae quidem caussa est, quamobrem adhuc apud Turcas plerique omnes Europaei عزى *Esfrengj* Franci nuncupentur. At Turcae se quoque Francos ab stirpe esse gloriantur. Non recens illa opinio est: nam auctor anonymus gestorum dei per Francos, qui belli sacri temporibus fuit: (4) *dicunt se esse de Francorum generatione et quia (quod) nullus homo naturaliter esse debet (sit) miles, nisi Franci et illi (Turcae.)* Nimirum Turcae in Pannonia aliquanto tempore egerunt vicini Francis, ut alias ex Constantino Porphyrogenneta demonstrabo: hinc, opinor, illa eorum gloriarum plena fabula. Quanto magis Francis accensendi fuerunt Suiones, ceterique septemtrionis populi, quorum sermo a Francico non abhorrebat, facinora nihilo minora fuisse. Quos cum viderent inter Russos versari, mirum non est, quod et ipsos Russos nuncuparint Francos. Graecorum exemplo Hungari Russos adhuc *Franciqi nepec*, *Francicum genus* appellant. (5) Quid autem Lithuanis faciemus, qui Russos *Gudas* vocant? (6) Quid? inquam, num *Gothos* dicunt? Quid contra Fennis hisce nostris et Esthonibus fieri volumus, qui Suedos haud aliter vocant, quam *Rosalain*, *Ros populum*? Nempe haec alii loco magis conueniunt. At Liuthprandus Ticinensis (7) *Ruffios*,
quos

(4) p. 7. (5) Albertus Molnar in dictionario Hungarico voce *Rusji* (6) Constantinus Czirnidas in dictionario Lithuanico voce *Rusus*. (7) p. 92. 144.

quos alio nomine Nordmannos vocamus, et iterum, gens quaedam est sub aquilonis parte constituta, quam a qualitate corporis Graeci vocunt Russos, nos vero a positione loci vocamus Nordmannos, aquilonares homines. Video Liuthprandum existimare, nullam aliam causam fuisse, cur Russi a quibusdam dicerentur Nordmanni, quam quod sub borea colerent, ut Gregorius Malatiensis (8) *مالك الإم الشمالية* regna gentium borealium recensens, in iis etiam ponit روس Rus. Attamen, si cum Nordmannico nomine memoriam hanc generis principum Russicorum, stipendiariorum Normannicorum multitudinem, cetera conferamus, videtur eadem Liuthbrando nominis istius prodendi causa existisse, quae a nobis explicata est.

Iam, si Varagi e Scandinavia fuere, quae vis vocis sit consideremus. Olaus Verelius, (9) cum videret, Ioannem Magnum tradere, *Scandiam a nonnullis vocari Vergion*, et isthuc vero interpretari, *luporum insulam*, ita fatus est: *maior tamen in ea non est luporum copia, quam in ceteris Europae regionibus sylvestribus: et illud etiam hic obiter notandum, in veteri lingua non semper notare lupum, sed praedonem etiam et hostem. Olai Trygvonidis saga: han var vargur i veum, hoc est, in sacris latrocinia exercuit: inde Brennevargur, Kaxnauargur, de hominibus maleficis dicitur: exercuere quondam Scandiani continu-*
am

(8) p. 108. (9) Notis in *Heriwarer saga* p. 19.

am seve piraticam, unde *Vargi* et patria eorum *Var-
gon* vel *Varghem* dici potuere. Et quamquam vir
ornatissimus doctissimusque in eo dubitat, annou
potius Ioannes Magnus vitioso Plinii MS. vsus pro
Nerigon ediderit *Vergion* (quod mihi fit verosimil-
limum) tamen colligit se ipse et ad pristinam opi-
nionem rediens, monet: (10) cum *Moscouitae* (Russos
puta eum dicere plebeio errore) *mare Balticum vo-
cent mare Varegum*, teste *Herbersteinio*, credere quis
poterit, et *Sueoniam* ab eis *Varegum* et *Vergiam* ap-
pellari. *Olaus Rudbequius* (1) in *Atlantica* et de
Russorum Varegis et de vocis veriuerbio item vt
Verelius sensit. Haud ita pridem *Aruidus Moller*,
vir amplissimus, cum de *Varegia* (8) ageret, huic
sententiae adsensum quidem praebuit, maluit ta-
men hoc nominis ex *Esthonia* ipsa repetere et *Fen-
nia*, quae praedonum *Suedicorum* excursiones saepe
senserit. Isthic enim *Waras*, furem esse et praed-
onem; et *Warga-meri*, praedonum mare. Et hoc
quidem sic est: etiam *Russi* furem *Bopb Wor* dicunt.
Teutonicae gentes huic vocabulo similia habent,
sed magis atrocitandi significatione, quae vim,
quam furandi, quae fraudem continet. Apud *Volf-
gangum* *Lazium* veteri sermone *Teutonico*, *Vuar-
gur*, latro: *Abrahamus Mylius* (9) a *wurgen*, ne-
care, *wurger*. *Godofredus Guilielmus Leibnitius*
in

(10) In additamentis p. 192. (1) t. 1. p. 518. de quo negotio in-
quit, cum ad *Magnorum Ducum stirpem* ex *Sueonibus* deducendam per-
uenerimus, plura in lucem daturi sumus. (8) in dissertatione de *Va-
regia* (*Wargön*) *Lundini* 1731. p. 21. (9) In *Archaeologo Teutone*
p. 171. (10) p. 145.

in Celticis, (10) *Vargi latrones Aruernis apud Sidonium, idem olim apud Germanos: piratae Normanni etiam Rusfis dicti sunt Varægii. In lege Salica, Vargus est extorris, ciectus, qui bodie bannitus. Veriad Cambri etiam est latro apud Cambdenum. Lex Salica: (1) Si quis corpus iam sepultum effoderit, aut exspoliauerit, wargus fit, hoc est, expulsus de eodem pago. Sic etiam in Ripuariis legibus Baluzii. (2)*

Ne quis hoc loco summis viris turpitudinem nominis obiiciat. Suus cuique populo mos fuit: vetustis Scandinavis ut praedari honori esset, Graecis, ut et latrocinari. Honesta haec nomina fuere et gloriae plena. Sed quia hoc nimis est antiquum et septemtrionalia monumenta a reliquiarum gentium eruditis non ita ut merita sunt, tractantur, visum est nobis rem illam paullo amplius explicandam esse, praesertim, quod vel sic per se ad historiam Ruthenicarum prouinciarum pertinet. Primum omnium satis constat, cum Scandinauiam omnem, tum Daniam, multa minora in regna priscis temporibus diuisam fuisse. In Noruagis primus Haraldus Pulchricomus, ceteris regulis deuictis, post praelium Hafursfiordense A. C. 875. monarchiae statum ad posteros stabilimit. Victi sunt, Orcadalis rex vnus, Trundhemiae reges quatuor, Golar-denses duo, Raumdaliae borealis duo et deinceps alii: nam nomina regulorum omnium recensendo

Tom. IV.

Y y

de-

(1) t. 57. §. 5. (2) tit. 85. 2.

defatigor. Haraldus ad condendam monarchiam, exemplo tam Gormi Daniae regis, quam Erici Upsalensis excitatus est. (3) De Danis auctorem illorum temporum habeo S. Rembertum archiepiscopum Hamburgensem in vita S. Ansharii. (4) Gualdo monachus Corbeiensis : (5)

*Regibus interea Danis iungentibus arma,
Priuatus sceptris Heroildus fraude paternis,
Supplex Augustum rex expetiit Ludouicum,
Eius uti per opem regni repararet honorem.*

In *Knitlinsaga*, (6) recensitis Daniae prouinciis : omnes hae enumeratae prouinciae magrae et populosae unum hodie agnoscunt regem Daniae : ut olim in multa regna erant diuisae. De regibus Suioniae Snorro Sturlaeus, quo viro omni in memoria grauior integriorque auctor, meo quidem sensu et iudicio non existit, sic habet, (7) *Reges Upsalensium absoluta potestate in Suionia eminebant, cum reguli plures ibi dominarentur, ab eo videlicet tempore, quo Odinus in Suionia principatum tenebat: monarchae cum absoluto imperio, usque ad mortem Agni Upsalae residebant: atque tum primum regnum inter fratres diuisum est: post hae: regnum principatusque inter stirpes, pro earum gradibus distribuebantur.* Primus Ingialdus Anundi filius, Upsalensis rex, aliquos eo-

rum

(3) Snorro t. 1. p. 75. 76. (4) p. 54. ed. Fabr. confer Erici regis historiam Daniae p. 266. (5) p. 87. ed. Fabr. ubi pro iungentibus arma, ut legendem censo, hoc nihili est, in eunctibus. (6) p. 35. ed. Vormii. (7) t. 1. p. 43. 45. 51. seq.

rum regum dolo oppressit, deinde alios quoque circumuentos sustulit, numero in vniuersam ad duodecim. Mansere tamen etiam postea quidam minores reges vsque ad Ericum, qui totius Suoniae regno potitus est. Hoc in statu reges multis inter se dissensionibus agitati, atrocia bella gesserunt, quibus indurata septentrionalium populorum fortitudo fuit, immo, vt dicam quod est, efferata. Quare congruenter ad veritatem dixit Olaus Verelius, (8) ea fuisse istius studia aeni, *et armorum usum saepius, quam causam respicerent, neque pacem possent ferre.* Illo animo cum essent, neque tamen semper occasionem cum vicinis digladiandi haberent, piraticam exercendo longinqua petierunt. Erat nauigandi opportunitas summa, non modo in littoribus maris Baltici et occidentalis, sed etiam intra vniuersam Scandinauiam in stagnis et lacubus, vt magis in salo victitarent, quam in agris. Idcirco in nauigationibus tantam artem et facultatem sibi pepererunt, vt omni illo in aeuo qui cum his populis compararentur, essent nulli. Et quamquam Haraldum Pulchricomum primum omnium mirae magnitudinis draconem nauem exaedificasse inuenio, Olaum vero Tryguonidem in primis magnas moles excitasse, tamen omni tempore satis firma et opportuna nauigia habuere, quorum formam in faxis quoque spectamus, praecipue in eo, quod Ioannes Peringkioldus (9) diligentissimus monu-

Y y 2

men-

(8) in Heruorar saga p. 47. (9) In Theoderici vita p. 493. confer Ohter. Halgelandensis et Wulfstani Haethensis nauigationes Saxonice: Latine editae ad calcem vitae Aelfridi regis. Ox. 1678.

mentorū patriae inuestigator nobis pictum dedit. Si nauigationis laudem et fortitudinis gloriam quaeras, quod omni in Europa litus est, quis paene angulus, ut illius gloriae non sit testis? Orcades autem, Scotia, Hibernia, Anglia, Francia, vim illam vel in primis fenserunt. Magnum isthuc quidem esset opus, si quis omnes expeditiones perfequi vellet.

Apud Graecos priscos latrocinari nihil erat aliud, quam militare. Pyrgopolinices more illorum veteri:

*Videtur tempus esse, ut eamus ad forum,
Ut in tabellis quos consignavi hic heri
Latrones, ibus dinumerem stipendium:
Nam rex Seleucus me opere orauit maximo,
Ut sibi latrones cogere et conscriberem.*

Aut quemadmodum Periplectomenes: *an, quia latrocinamini, arbitramini, quiduis licere facere vobis?* De praedonibus Graecis non est necesse ut quidquam interferamus. Eundem in modum apud Septemtrionales fuit. Mos erat, ut alternis operam darent mercaturae et piraticae, (10) et ut

*Confestim posito furore Martis
Post piratica damna, destinaret
Plenas mercibus institor carinas,*

Abutar enim hoc loco Sidonii modulis. Hi piratae
fese

(10) Snorro t. I. p. 263. 264. 274.

sefe vocabant *Wikingar*, vt saepe apud Snorronem (1) et nonnumquam *Cappar*. (2) In Eddae Islandicae secunda parte, *Kappar*, *Kiempur*, *Garpar*, vt Roefenius conuertit, *heroum*, *athletarum*, *pugilum* mentio occurrit. Idem apud Snorronem (3) dicti *Soekongar*, *reges maris*, nullo in terra dominio, perpetuo in mari regnantes. De iis S. Rembertus in vita S. Anscharii. (4) Neque isthuc quidem semper summa libertate: nonnumquam enim alienae potentiae deuincti fuere. Adamus Bremensis: (5) *Lundonae in Sconia aurum est plurimum, quod raptu congeritur piratico: ipsi enim piratae, quos illi Witbingos (puto legendum, Vikingos) appellant, nostri Ascommannos, regi Danico tributum soluant, vt liceat eis praedam exercere a barbaris.* Neque omnes vero idonei ad piraticam exercendam sunt visi, cum, qui praeferox et immanis erat Egil, a fratre idcirco a praedandi societate reiiceretur: *eum enim ingenio festali, indicabat, vt apud exteris nationes baud conduceret.* (6) Vides, piratas non modo ferocitate ad vim faciendam habuisse opus, sed etiam, vt occasio ferebat, ingenio ad mercaturas. Quae enim alibi praedati fuerant, alibi vendebant. Non tantummodo naues inuadebant, sed in litoribus excensione facta circumiectos agros vicosque expilabant. Praedam Freio deo ferebant acceptam, *Frigi scod*, *Freii crumenam* appellantes, vt ex insigni lapide demonstrauit Olaus Verelius.

Y y 3

(7)

(1) Conf. Olam Vormium in monumentis Danicis p. 268. 292.
 (2) Snorro t. 1. p. 27. 29. (3) p. 40. 41. (4) p. 57. 62. (5) p. 56
 (6) Thormodus Torfaeus Historiae Noruagicae parte II. p. 153.

(7) Religiosi medius fidius homines, quorum sacra et caeremonias in insula quadam commemoravit Adamus Bremensis. (8) Praedonum in numero non tantum privati homines nulla publica auctoritate fuere, verum etiam reges regumque liberi. Ruderer filius in historia Runica Hjalmar regis Biarmlandiae et Thulemarkiae, (9) crebro, inquit, in piraticas expeditiones profectus, nominis sui gloriam in tantum auxit, ut in omnibus annalibus, quibus rerum gestarum memoriae describebantur, laudari meruerit. Narrat deinde, ut in Biarmlandiam cum quinque nauibus profectus omnia ferro atque igni vastauerit, praedaeque egerit, donec Vagmarus occurrit, qui tum rex istius regionis erat. Cum defuncto aliquo rege filius succederet, mos erat, ut in solemnium conuiuio compositantes maiorum suorum memoriae bene precarentur, simul vota facerent de piratica expeditione suscipienda. (10) Sin quis priuatus ad haec latrocinia sese accingeret, circa verem praekonis voce voluntarios excibat, ut Haraldus et Gudradus fratres apud Snorronem edicebant: (1) sibi animo propositum esse, aestate iam instante, piraticas suscipere expeditiones in oceanum vel Balticum mare, prouti antea soliti fuerant. Legebat deinde suos praefectos singulis in nauibus, qualis ille *Wikinga waurdur* in Ioannis Peringkioldi lapide fuit (2) Nec patriae finibus abstinabant: quam ob causam Haraldus Pulchricomus rex Noruegiae edicto vetuit, ne quis patriae fines de-

(7) Ad *Heruorar sagu* p. 45. (8) p. 56. (9) ex edit. Georgii Hickefii in *Tesoro linguarum* t. 11. p. 128. (10) Snorro t. 1. p. 245. confer. pag. 46. 48. (1) t. 1. p. 180. (2) l. c. p. 486.

depopularetur. (3) Nihilo minus Rolfo celebris pirata, cum ab (*Ausur vego*) *via seu expeditione orientali* rediret, Vikiam depraedatus est. Haraldus rex eam ob causam Rolfonem frequenti in concilio exulare iussit. Sub hoc Haraldo multi cum primis in Noruegia, qui libertatem dolebant amissam, piraticam instituerunt. Nonnulli tamen ad tuendos portus mercatusque suos, instructis nauibus praedones tantummodo depraedantes, tutum mare praestabant. Ita Thorsteinus Bele et Agantyrus post praelium commissum, inito foedere contra piratas classem adunarunt. Apud Olavum Verelium: (4) *ineunte vere classem triginta navium appararunt, piraticamque in mari egerunt, et circa Suioniam (oc alt hit eu-stra salt) et omnia circum litora orientalia: egerunt autem, piratas et latrones occidendo, colonos autem et mercatores non attingendo.* Nescio cur Verelius *Curlandiam et Prusiam* potissimum explicet, cum, ut non negem, ea quoque litora defensa fuisse, tamen *orientalia litora* magis haec Esthonica vocari soleant, in quibus sedem totius mercaturae septentrionalis fuisse, alio in loco demonstrabo. Saepe numero, ubi excensionem aliquo in litore fecerant, opportuno loco condebant castella, quibus defensi, totam provinciam excursionibus vexare, tum etiam, ut in Orcadibus et Anglia et Francia accidit, pedem figerent totaque regione potirentur. Pleni sunt huiusce memoria rei scriptores illorum temporum Saxones, Franci, Angli. Quare Thor-

gny-

(3) Snorro :. 1. p. 99. (4) In Heruorur saga p. 47.

gnyrus Index in comitiis Vpsalensibus ad Olaum regem, Erici regis filium, apud Snorronem (5) de Erico Emundi filio rege, Olai proauo: *quod in vigore aetatis constitutus, militaribus expeditionibus ut plurimum intentus fuerit, ac quotannis peregre profectus, Finmland, Kyrialand, Eystland et Kurland (oc vyda um austur laund) et porro per Ostrogardiam (seu Russiam, vel potius Esthoniā interiorem) in suam potestatem redegerit: cuius virtutis praeclara adhuc supersint monumenta, castella regiaeque arces eximii operis.* Ita Thorgnyrus ab auo suo sibi narrari recordabatur. Iam cum scriptores Russi testantur ad A. C. 859. *Czudos (seu Esthonos et Fennos) Slaunos et Kriuiczos Varagis tributa soluisse pro quolibet viro po bieloj vjeverizy, (6) hoc eo pertinet.* Obscurum plerisque, quod genus tributi fuerit. Docuit autem me magnus vir, quod esset verissimum. Nam Russicam vocem intercidisse ostendit, conseruatam in Polonica lingua, in qua *Wiewierba* adhuc *sciurus* dicitur: esse deinde sciuros alios albos, alios nigros, denique rufos, itaque mirum non esse, cum Historiographus Russus adiecit *albos*. Idem Historiographus ad A. C. 862 scribit: *a Slaunis Varagos esse eiectos et tributum negatum, deinde per ciuiles turbas petatum a Varagis principem: Ruricum eum fuisse, qui cum fratribus Novogradum venerit.*

Haec

(5) т. I. р. 484. (6) по Ёблон вѣѣриде.

Haec igitur satis speciosa videri possunt: mihi tamen nominis illa notatio non satisfacit. Nam inauditum apud hos piratas nomen est Vargorum. *Vikingar* et *Kappar* et *Soccongar* dicti sunt, ut supra declaravi. *Vargicum* nomen poeticum magis est. Poetae nominibus animantium ferarum delectabantur, ut, cum nauem dicerent *dyr bestiam*, et *baru bestur*, *fluctuum equum*, quod, cum Eddae Islandicae pars altera refert, simul addit, omnia equorum cognomina etiam nauibus tribui. De militibus Haraldii Pulchricomi Hornklofus canens, ait: *quam plurima habuit arma, syluam (varga) lupis strepentes*: (7) exercitum aut castra naualia *syluam*, milites nauales *lupos* dixit. Non autem probabile est, veteres Russos ex poetarum septentrionalium carminibus fortissimorum virorum non sane frequens nomen aucupatos fuisse. Contra fit simillimum vero, ita illos vocitasse, ut sese ipsos appellare audierant. Sensit hoc iam amplissimus vir et ornatissimus, Arnuuidus Moller: eò nomen Vargicum potius ab Esthonicò *Waras* acceptum putauit. Quod, si ita est, ignominiae loco impositum fuit: neque enim Russorum moribus praedari gloriae fuit. Huius autem ignominiae quam causam habuere Russi? Exempla protulimus, cum Varagos infestos sensere: eius generis vnum est praeterea et alterum. At ut amici et socii in bello, ut in officiis et dignitatibus, frequentissime citantur: Reges item suos ex eodem populo repetunt Russi. Et vetustum sane rerum

Tom. IV.

Z z

ista-

(7) Saorro t. 1. p. 98.

istarum auctorem habemus, aequalem Varagorum aetati, et Vladimiri Monomachi, aut qui ex aequali hauserit, Theodosium abbatem, quem bibliotheca Radziuiliana Regiomonte seruat, vnde ἀπόγραφοῦ in Imperatoriam peruenit. Quae cum ita sint, aio, milites Suionas, Normannos, Danos, cum sub signis Russicis stipendia mererent, sese ipsos ita nuncupasse: Russos, aduetos eorum nomine, cuius sententiam non videbant, omnes septemtrionales populos, vnde isti erant profecti, similiter appellasse Varagos. Scribunt autem sic, (8) vt potius pronuntiandum sit nobis, *Variagi*. Hoc nomen est, quod in Snorrone multis locis occurrit, *Vaeringiar*, quasi *defensores et protectores, a waeria, defendere, vel potius a warda, seruare custodire*, vt Verelius iudicauit, (9) dicas. Ioannes Peringskioldus nitide explicuit, *praetorianos milites*. Plerisque autem in locis sermo est de iis, qui in Graecia apud Imperatores Cplitanos fuere: hi igitur sunt tot celebrati monumentis Βάργγροι *Varangi*. Vt in Graecia sese ipsi vocarunt *Varangos*, honorifico nomine: ita iidem in Russia: nam ex Russia in Graeciam venerunt. in Prima Varangorum memoria in Michaelis Paphlagonis Imp. rebus apud Cedrenum post A. C. 1034. Neque tum adhuc magno in honore fuere. Historiographus Russus ad A. M. 6488 A. C. 1080: *Οκτὴν Φαροπόλο, Varagi* (quos paullo ante dixerat Vladimirus ex trans-

(8) Варяги. (9) In indice in Herrauds sagu, voce Hirdmen.

transmarinis locis ad ius suum defendendum adduxisse) nouas res moluntur; postulantes pro singulis incolarum duos Griuenos, eo quod ipsorum opera urbem cepisset: Vladimirus primum unius mensis moram impetrat, donec cuniculos collegisset et cum posthac non haberet, unde solueret, iter in Graeciam ad seruilia Graeci Imperatoris postulantis, id permisit et meliores ex iis per urbes distribuit, reliquis itineris licentiam dedit, legatis ante ad Imperatorem missis, quibus eum monebat, ut, si vellet rebelliones eorum cauere, illos reciperet quidem: sed per diuersas urbes dispergeret, redire vero nullum sineret. Ex Vladimiri consilio Varangis accidisse video. Nam Michael Paphlago, ut Cedrenus testatur, (10) per Thracensium prouinciam dispersos habuit Varangos. Idem in Constantino Monomacho, (1) Michaelem Acoluthum in Iberiam missum tradit, ut τὴς διεσπαρμένους ἐν τῇ Χαλδίᾳ καὶ Ἰβηρίᾳ Βαράγγους ἀγαγῆ, dispersos per Cbaldiam et Iberiam Varangos adduceret. Ioannes Curopalata (2) sub hoc Constantino: σίφες στρατιωτικόν, Βαράγγους αὐτὸς ἢ κατὰ ὄνομάζει διάλεκτος. manus militaris: Varangos vulgus vocat. Post autem officii et fide commeruerunt, ut in palatium alleciti, custodiam corporis Imperatorii susciperent. (3) Nicephoro Botaniatae Imp. fidissimi fuere, cum Alexius Comnenus CPlin obsideret. Quare apud Annam Comnenam Alexii Imp. filiam (4) consiliarii regii: οἱ δὲ γε ἐπὶ τῶν ὤμων τὰ ξίφη κραδαίνοντες, πάτριον παράδοσιν καὶ ὄϊον παρακαταθή-

Z z 2

κην

(10) t. II. p. 735. (1) t. II. p. 789. p. (2) 808. (3) Scylitzeo p. 864. (4) p. 62.

κην τινὰ καὶ κληῖρον τὴν εἰς τὰς Αυτοκράτορας πῖσιν καὶ τὴν τῶν σωμάτων αὐτῶν Φυλακὴν ἄλλος ἐξ ἄλλο διαδεχόμενοι, τὴν πρὸς αὐτὸν πῖσιν ἀκράδαντον διατηροῦσι, καὶ εἰδὲ ψιλὸν πάντως ἀνέξοντα περὶ προδοσίας λόγον. *Varangi qui super humeris secures suspendunt, a parentibus quasi depositum et haereditatem acceperunt fidem in Imperatores et custodiam corporis: fidem, quam veluti alius ab alio traditam manu accepit, incorruptam seruant, et ne quidem tenuem ferent de prodicione mentionem.* Fuere deinceps Alexio Comneno Imp. vtilissimi bello Francico. (5) Codinus in officiis aulae CPlitanae (6) et ad portas sacri cubi- culi excubasse tradit et in triclinio. Stationem habuere in Excubitis (6) et quoties Imperator aliquam in urbem concederet, claves portarum illius urbis Varangorum in manibus fuerunt. (7) Firmis- sima suspectorum custodia sub Varangis, vt Vecci Chartophylacis apud Georgium Pachymerem. (8) Denique thesauros quoque custodiebant, ex quibus ne Palaëologum quidem, tutorem Lascaris Imp. et magnum Ducem, efferre aliquid passi sunt, nisi ce- teris tutoribus consciiis et praesentibus. (9)

Hos Varangos Iacobus Gretserus ad Codinum *quasi Francos*, dici autumavit: in quo facete ad Ioannem Curopalatum Iacobus Goar, (10) *at quasi diuinat Gretserus.* Quid Goar? is vero quasi nimis incaute adsentitur Graecis: Anglos enim edi-

(5) Anna Comnena p. 115. (6) p. 65. (6) Zonaras Tomo II. p. 308. sequ. (7) Cantacuzenus in historia CPlitana l. II. c. 13. (8) p. 257. (9) Pachymeres in Michaele Palaeologō p. 41. (10) p. 58.

dit ab stirpe. Francos non fuisse, concedo: Graeci enim a Francorum corpore stipendiariorum, quos Anna Comnena Νεμίτζης Sclauonico vocabulo nuncupauit, si vim vocis videas, *homines sermonis peregrini, ut intelligi nequeant, καὶ αὐτὸ τῷ-το, βαρβάρης*, a Francis igitur Varangos. diligenter atque saepius distinxerunt auctores Graeci, utpote qui suis sub ducibus et signis militarent. (1) Econtrario non possum inficiari, exstare magno numero Graecos, qui eos Anglis accenseant. Ioannes Cinnamus: (2) ἔθνος δ' ἐστὶ τῷτο Βρεταννικὸν Βασιλεῦσι Ρωμαίων δουλεῖον ἀνέκαθεν, *gens est Britannica a multis temporibus Romanis seruiens Imperatoribus*. Sic Bryennius Caesar, (3) sic Nicetas Choniata, (4) sic credo Georgius Pachymeres, (5) qui eos fere Celtas vocat. Codinus: (6) *ad mensam Imperatoris πολυχρονίζουσι οἱ Βαράγγοι κατὰ τὴν πάτριον γλώσσαν αὐτῶν, ἥτοι Ἰγκληνισί, τὰς πελέκεις αὐτῶν συγκροῦντες κτύπον ἀποτελεῖνται, multos annos precantur Varangi patrio sermone, seu Anglice, secures suas concutientes strepitum edunt*. Anna Comnena (7) autem cum Varangos ex Thule fuisse tradit, incertum reliquit, quam Thulen dicat. Nam veteres eius nomine insulae imperitius sunt vsi, sicuti tesserac addixerunt. Modo illis Scandināuia est integra, modo Noruagia tantum, aliis Anglia, aut Orcadam vna. Credo

Z z 3

ra-

(1) Scylitzes p. 823. alii. (2) l. 1. p. 4. (3) l. 1. c. 20. (4) In Isacio Angelo p. 267. (5) l. c. 41. 257. id. in Andronico p. 45. Ἐξ ἑξ Ἐγκλίων *Ericus ex Anglis*. (6) p. 90. (7) p. 62.

tamen Angliam dicere voluisse Comnenam. Gratanter hoc accepit Vilermus Malmesburiensis. (8) Et Goar quidem hanc vocem in Baronibus Anglis inuenisse sibi est visus. *Baranagium*, inquit, seu *Varnagium*, procerum regni senatus et coetus, vulgo *Parlamentum*: a cuius nobilitate stipendiarii Graecorum Angli, vanam titulorum libidinem Graecanico more sectati, nomen sibi Βαράγγων in curia CPlitana finxerunt et adoptarunt. Isti quasi barones mihi nihilo magis placent, quam Gretseri quasi Franci Goaro. Henricus Spelmannus a Saxonico *farian*, imprecari, execrari, vnde *warinige*, maledictio, *Varangos* vocatos autumat. Non potuit quidquam tamen de Anglis persuaderi Carolo de Fraxinis: Villhardino suo magis assensus est, *Varangos* ex Britannia quidem fuisse, at Danos potius, quam vel Saxonas vel Anglos: qua in opinione consentientem habuit Ordericum Vitalem. Locus est memorabilis in Alberto Aquensi (9) de Alexio Imp. *Is Turcopolos Pincenarios* (Picenacios seu Pazinacitas) *Comanitas*, *Bulgaros arcu doctos et sagitta*, *Danaosque* (Danos) *bipenni-um armatura dimicare peritissimos*, *Gallos* (Francos) *exules*, *exercitum simul conductitium populum diuersi generis contraxit*. Et Saxo Grammaticus (10) cum de Erici Eijegod regis profectioe CPlitana agit: *inter ceteros, qui CPlitanae urbis stipendia merentur, Danicae vocis homines primum militiae gradum*

(8) De gestis Anglorum l. II. c. 13. (9) l. IV. p. 253. (10) p. 227.

*dum obtinent, eorumque custodia rex salutem suam val-
lare consuevit.* Itaque cum ad CPlin adesset, Va-
rangi ab Imperatore potestatem ad eundem regis sui
impetrarunt, quos Ericus graui oratione ad fi-
dem et virtutem et frugalitatem colendam hor-
tatus, magnae admirationi fuit Graecis. Equi-
dem non nego, Danos fuisse Varangos, si mihi
quis concedat, eorum in numero frequentes ex-
stitisse et Suionas et Noruagos. Guilielmus de
Rubruquis, cum A. 1253. praeter Cherfonis Cli-
mata nauigaret, quae custellis erant frequentibus
munita, *isthic*, inquit *erant multi Gothi, quorum
idioma est Teutonicum.* Hoc a nobis Snorro Stur-
laeus, pro sua grauitate et fide, qua Saxonem
multimodis exsuperat, hoc tot monumenta ve-
teris aevi, ipsi denique lapides postulant, quos
vel ex Bureanis schedis inspeximus, vel ex Pe-
ringskioldorum operibus. Illa autem securium Va-
rangicarum memoria, quam supra produximus,
e veteris codicis membranacei pictura, quam ad
Oddonis Monachi Olauum Tryguonidem Verelius
edidit, (1) aliisque monumentis Scandinauicis e-
ximie illustrari potest. Theodoricus Monachus
de Noruegorum et Danorum profectione Hiero-
solymitana et CPlitana: (2) *peractis igitur omni-
bus, quorum gratia viatores nostri aduenerant, cum
honore recedunt, obsequium sibi parantibus nobilissimis
regis curialibus, qui dicuntur Varingae.* Ex Snor-
rone vnum locum adferam, (3) cum tradit Ha-
ral-

(1) *Utt stycke af Konung Olaf Tryggvasons saga, Upsalac 1665.*
(2) c. 27. (3) t. 11. p. 55. seq.

raldum Sigurdi filium ad Iaroslauum regem Rus-
siae adiisse, ab eo autem rege, cum Eilifo Rog-
ualdi Iarli filio, *satellitibus suis praefectum, qui reg-
ni limites tutabantur* : inde Haraldum petiisse
CPlin et a Varangis ducem esse lectum. Nolo
hoc loco plura exempla producere ex Snorro-
ne, in quibus sunt insignia, quae de Sigurdo
Karlshufud et Olao Tryguonide traduntur, qui et
apud Valdemarum regem et apud *Allogiam* regi-
nam, hoc est, apud S. Olgam multum potuere.
Nam haec quibusdam chronologicis difficultatibus
laborant, quas alio tempore dissoluam.

Quid nunc est adeo quod quemquam in no-
stra Varagorum nominis notatione offendat? nisi
quod *Vaeringur* Scandinauicum aliquid in sono ab-
horrens ab altero habere videbitur. Nempe ni-
hil eius est. Primum Scandinauos tum quidem
non *Vaeringur* sed *Varangur* sese appellasse, Grae-
corum illa in voce constantissima consensus, ut
nobis persuadeamus, postulat. Sed illud *n* cum
g septemtrionales inter pronunciandum saepenu-
mero eiiciebant. Id in nomine *Ingar* et *Inguar*
supra obseruauimus. In lapide, quem ad vitam
Theodorici regis Peringskioldus protulit. (4) in-
uenio *Iggur* nomen alioqui Odini in secunda par-
te Eddae Snorronianae. In codice argenteo
Figgr, *briggan* et his similia obseruata sunt Ioanni
Georgio Vuachterio, (5) qui *Fingr* et *bringen*
pro-

(4) p. 473. (5) Miscell. Berolin. Contin. prima p. 42.

pronunciata putat, more Graecorum. Non nego voces eas ipsas esse, quas insignis doctrinae vir indicauit: concedo auctorem huius versionis ita etiam has voces pronuntiasse, ut essent *singr* et *bringen*: credo autem eius aetate etiam eliso *n* reuera dictum fuisse *figr* seu *figgr* et *brigen* seu *briggen*. Et ne Graecorum quidem illam legem constantem fuisse, vel Aristophanis τὸ τίγξ demonstrare potest. Nisi *tio tigr* pronuncies, nihil ad philomelae cantum illa in voce fuit. Igitur pro *Ingur* septentrionales etiam dixerunt *Iggur* et *Igur* quod mihi magis probatur, quam Ioannis Schefferi de hoc nomine opinio, *Iggur* esse *Vigur*. (6) Sic *Ingerdis* est in monumento Hallelandensi *Igerdi*. (7) Sic *Aggathir* et *Angathir*, *Iggue* et *Ingue*, quod Olaus Rudbeckius in Atlantica (8) obseruauit. Sic *Ingibiaern* in runis et *Iggibirn*, *Ingefust* et *Iggifastr*, *Ragnwald* et *Ragwald*. Hunc igitur in modum *Varangi* *Varaggi*, et *Varagi* dici potuere. Sed multo magis hoc licuit Ruthenico populo, qui etiamnum ab *ng*, quo ceterae gentes Slauicae utuntur, abhorrens, multis in vocibus *g* tantummodo pronunciat.

(6) in Vpsalia p. 76. (7) apud Oslum Vormium p. 509.
(8) p. 19.

OBSERVATIONES
ASTRONOMICÆ

ET

PHYSICÆ

IN RVSSIA

INSTITVTAE.

OBSERVATIO DEFECTUS LUNAE

HABITA AB IO. POLENO (TVBO OPTICO

OPTIMAE NOTAE, LONGO PEDES

PARISIENSES SEPTEM) KAL.

DECEMB. 1616CCXXXII.

PATAVII.

Hunc Defectum praecessit hic perturbatio aeris, ac variatio eiusmodi, ut indicanda esse videatur. Tantillum nixit mane: deinde sudum apparuit coelum: duabus ante meridiem horis, coelum erat nubibus obductum: meridie vero coelum iterum sudum: postea nubes aliae: duabus circiter a meridie horis vehemens australis ventus, Cum advesperasceret, cessante australi illo, novus a Septentrionibus debiliior, sed frigidissimus ventus flare coepit; qui tota nocte algidum, praeter anni tempestatem, reddidit aerem.

Temp. Appar.

<i>H.</i>	<i>'</i>	<i>''</i>	
8	43	50	Penumbra diluta.
8	46	0	Penumbra densior.
8	48	56	Vmbra ad Lunae limbum.
8	49	58	Attingit Grimaldum.
8	51	40	Attingit Gassendum.
8	59	49	Attingit Keplerum.
9	2	48	Tegit totum Mare Humororum.
9	6	0	Attingit Copernicum.
9	8	33	Tegit totum Copernicum.

A a a 3

H.

316 OBSERVATIO DEFECTVSLVNAE,

Temp. Appar.

H.	'	"	
9	9	12	Tegit Pitatum.
9	11	26	Attingit Tychonem.
9	22	5	Tegit Platonem.
9	27	10	Attingit Plinium.
9	30	0	Tegit Eudoxum.
9	39	23	Attingit Mare Crisium.
9	46	46	Totalis Imerfio.

Limborum Lunae obscuratio collata cum mediarum partium obscuracione, non prorsus eadem semper apparuit: vbi vero medium vmbrosi coni Luna attingit, tantillo minus obscura visa est: fortassis quia plures ab omni Atmosphaere parte refracti, et ad coni axem tendentes radii, confertiores tunc in Lunam impingerent.

Temp. Appar.

H.	'	"	
11	24	0	Lux pura in Lunae margine.
11	28	48	Grimaldus extra vmbam.
11	35	20	Gassendus extra vmbam.
11	35	50	Medium Mare Humorum discoopertum.
11	43	18	Copernicus emergere coepit.
11	48	10	Pitatus extra vmbam.
11	48	40	Tycho iam emerfit.
11	49	40	Plato emergit totus.
12	21	47	Mare Crisium integrum apparet.
12	24	38	Finis verus: prout reputatum est.

Duratio totius Defectus Lunae H. 3. 35. 42.
CON-

CONTINUATA RELATIO
ECLIPSIVM SATELLITVM IOVIS
PETROPOLI OBSERVATARVM

A
I. N. DE L'ISLE.

1731. N. St.		temp. ver.			
die		H	'	"	
Dec.	6	17	3	5	I mmersio primi, difficulter tubo Catadioptrico observata. Tempus vero duobus horologiis definitum.
1732					
Januar.	4	13	30	56	Immersio Secundi tubo Newtoniano observata, dubia est intra spatium aliquot secundorum. Iupiter non satis clare conspiciebatur, paulo supra horizontem elevatus. Tempus verum consensu duorum horologiorum constabat.
	9	18	33	7	Immersio Quarti, tubo Catadioptrico, Coelo non admodum sereno. Tempus verum duobus horologiis definitum.
	20	25	0		Prouecto iam die, caeteri satellites se oculis subdlexerant, eodem tubo tamen Quarti Satellitis Emergio nonnum observata est.

Ad-

Febr. 22.	13	25	34	Adhuc Primus Satelles proximus immersioni conspiciebatur, cum nebula Iouem oculis eripiebat.	
	13	26	34	Iupiter iterum apparebat quidem, sed Satelles tubo catadioptrico amplius non conspiciebatur, et tempus verum duobus constabat horologiis.	
Mart. 8.	8	22	20	Immersio tertii tubo Newtoniano, ventus observationem tantisper impediebat. Tempus verum duobus horologiis definitum.	
	8	46	23	Emersio primi tubo Catadioptrico dubia intra pauca secunda propter vicinitatem Satellitis a Ioue.	
April. 13.	7	20	30	Statim post Solis occasum cum Iupiter se oculis conspiciendum praeberet tertius Satelles per tubum newtonianum non solum umbram plane reliquerat. Sed etiam pleno splendore fulgebat.	
	20	11	6	52	Emersio tertii tubo Catadioptrico coelo sereno.
	27	15	13	Tertius Satelles forte plurium minorum spatio	

					umbra emerſus erat, quoniam tam clara luce quam coeteri fulgebat. Obſeruatio facta tubo Catadioptrico, obſtante nebula, Ioue paululum ſupra horizontem eleuato, et magno crepuſculo adhuc durante.
Maio	10	12	55	54	Emerſio primi, Coelo ſereno, tubo Catadioptrico facta. Obſeruatio certa.
	26	11	14	5	Emerſio primi tubo 13 pedum, nubibus obſtantibus,
Dec.	24	18	4	30	Immerſio primi tubo 13 pedum. bona.
	1733.				
Feb.	22	13	9	32	Emerſio tertii tubo Catadioptrico. Iupiter horiſonti proximus non diſtincte apparebat.
Mart.	9	13	46	51	Immerſio Secundi, tubo 13 pedum.
	12	14	39	23	Immerſio primi tubo catadioptrico.
	19	16	34	26	Primus Satelles vmbrae Iouis ſe immergens tubo Newtoniano non amplius apparebat. Ceterum nebula obſtabat quominus diminutio eius more ſolito conſpiceretur.

	21	11	2	27	Immersio primi dubia. Ioue horisanti vicino et a ne- bula aliquando tecto.
	28	12	59	46	Immersio primi tubo Newtoniano.
Apr.	4	14	55	38	Immersio primi tubo ca- tadioptrico. Tempus verum vnico horologio definitum.
	6	12	9	46	Immersio tertii tubo Newtoniano.
	13	11	19	50	Immersio primi tubo newtoniano.
	28	10	32	34	Emersio secundi tubo ca- tadioptrico. Obseruatio dif- ficilis propter vicinatem Io- uis et Satellitis, luna quoque plena duobus tantum gradibus a Ioue distante.
Maio	5	13	6	0	Emersio Secundi tubo ca- tadioptrico.
	6	13	44	17	Emersio primi eodem tu- bo.
	15	10	7	50	Emersio primi tubo New- toniano.
			8	2	Tubo 13 pedum.
	30	10	4	16	Emersio Secundi tubo Catadioptrico.
			4	39	Tubo 13 pedum.

ECLIPSIUM SATELLITVM IOVIS 321

Iun.	6	12	39	35	Emerfio fecundi tubo 13 pedum. Iupiter non procul ab horizonte remotus erat, et crepufculum magnum.
	7	10	19	7	Emerfio primi tubo newtoniano.
			19	15	Tubo 13 pedum
	30	10	28	46	Emerfio primi tubo catadioptrico et crepufculo obftante.
1734.					
Mar.	10	14	56	31	Immerfio Secundi tubo 23 pedum. Ioue non admodum fupra horizontem elevato fatellites haud diftincte apparebant.
Iun.	26	11	23	33	Emerfio primi tubo catadioptrico.
			23	47	Tubo 23 pedum. Ventus oftabat.
Iulii	2	11	0	25	Emerfio Secundi tubo Newtoniano.
			0	44	Tubo 23 pedum.
					Crepufculum magnum.

OBSERVATIO LONGITVDINIS
PENDVLI SIMPLICIS FACTA
ARCHANGELOPOLI

A

LVDOVICO DE LISLE DE LA CROYERE
REFERENTE IOS. NIC. DEL'ISLE

QUas frater meus in itinere suo Archangelo-
polim versus fecerat obseruationes Astrono-
micas, longitudinem et latitudinem praecipuorum
locorum Gubernici Archangelopolitani concernen-
tes, eae tomo III Commentariorum Academiae
pro anno 1728 publice propositae sunt. Aliis
obseruationibus Astronomicis et Physicis ab eo per-
actis tomis sequentibus dicatis. Ceterum cum edi-
tio tomi IV Commentariorum in hunc usque diem
differretur, quo frater meus Jam dudum nouum iter
Iusfu Imperatoriae Majestatis per totum Imperii
Rusfici tractum Kamtschatkam usque in se suscepisset
ut ibidem similes obseruationes Astronomicas ha-
beret, obstrictum me video ejus nomine relationem
caeterarum obseruationum Astronomicarum
et Physicarum in primo itinere factarum cum publico
communicare. Initio referam obseruationem lon-
gitudinis penduli simplicis, quae admodum curiosa
et forsitan unica est quae in hunc usque diem in tantâ
poli vicinitate instituta est; quae per consequens
inferuire poterit confirmationi opinionis de aug-
mentatione Longitudinis penduli simplicis polo
propius admoti.

Fra-

Frater meus ante abitum suum regulam ferream cuius longitudo tres pedes cum dimidio, latitudo pollicem cum tribus partibus quartis, et crassitudo quartam pollicis partem aequabat. Aciei huius regulae optime fabrefactae insertae erant minutae quaedam cupri particulae in quibus per ductus leuissimos longitudo dimidiae perticae Gallicae siue 3 pedum Gallicorum, nec non longitudo penduli simplicis Parisiis obseruatae, scilicet 3 ped. $8\frac{1}{2}$ lineae exaratae erant.

Ad mensuras hasce obtinendas adhibuimus pedem Gallicum, ante discesum nostrum e Gallia, cum genuino pede Regio, ad cuius normam obseruationes Parisienses institutae sunt, et qui sollicite in obseruatorio regio seruatur, comparatum.

Sphaerula aenea qua frater meus usus est habebat diametrum $14\frac{1}{2}$ lienearum et erat perfecte Sphaerica, in ejus extremitate annulus qui paululum a superficie globuli distabat affixus erat. Huic sphaerulae circulus leuissimo ductu circumscriptus erat, cuius polus in medio annuli haerebat, ex hoc circulo situs centri sphaerulae cognoscitur, inseruit que mensurando facilius distantiam huius centri a puncto suspensionis nulla habita ratione diametri sphaerulae.

Filum quo sphaerula appensa et cum illa pendulum simplex constituit vulgo Gallice appellatur

(*fil de Pite*) seu filum cannabinum, et paratur ex Aloe. At praefertur hoc filum his in observationibus omnibus filis fericis, quippe quae e pluribus filis tortis constant, ac proinde efficiunt ut pondusculum iis appensum saepius circumuoluatur et longitudo penduli, tempore quo oscillationes eius obseruantur, varietur. Quo autem facilius filum penduli produci aut contrahi possit, utque longitudo semel determinata conseruaretur, faciendam curauimus forcipem ex Aurichalco quae ope cochleae aperiri et claudi potest. Supra forcipem illam axis breuis cylindricus ex aurichalco confectus in situ horizontali positus est, qui circa se ipsum circumuolui potest, cuiusque axis superficiei filum ab una sui extremitate appensum est; hinc voluendo hunc axim pro lubitu filum circumductum contrahitur aut producitur, longitudineque quaesita obtenta forceps cuius pars inferior valde acuminata est, clauditur, huiusque beneficio punctum suspensionis inuariatum et probe distinctum manet.

Tota illa machina suspendendo pendulo inseruens ligno cuidam infixam, quod variis iterum ferreis cochleis instructum ut omnia eo firmiter muro conclauis s. loci in quo observatio illa instituenda est affingi possint, quae quidem conclauia sollicitè claudenda et ab agitatione aeris exterioris defendenda sunt. Notum est insuper quod magno horologio pendulo instructo quod minuta secunda monstret opus sit, et quod tempori solari medio

accommodatum sit, aut ad minimum cognoscatur quantum acceleret vnus diei spatio supra motum medium, vel ab eo deficiat, id quod solummodo ope plurium obseruationum accuratarum solis aut fixarum per plurimos dies institutarum, definiri potest, siquidem exinde cognoscitur an motus horologii oscillatorii vniformis manserit interuallo harum obseruationum.

Horologium illud oscillatorium quod adhibetur in vicinia penduli simplicis positum esse debet, vt eo facilius et accuratius cum illo comparari possit. Tempus his obseruationibus instituendis commodum est verum et autumnale, siquidem his tempestatibus aeris temperies media est, vnde variatio longitudinis mensurae adhibendae evitari potest, namque constat corpora quaecumque solida contrahi per frigus et expandi per calorem. Mensis igitur Maius et Iunius potissimum seligendi sunt eum in finem, siquidem tunc temporis coelum vt plurimum serenum commode inservire poterit horologio oscillatorio tempori medio accommodando.

Omnes istae cautelae plane necessariae circa obseruationes tam subtiles et exquisitas, qualis est longitudo penduli simplicis, obtiterunt quominus frater meus istas Kilduni aut Colae (in locis scilicet borealioribus quo in itinere suo peruenit et vbi illas facere perquam optasset) institueret.

Hacc

Haec observatio ergo solum Archangelopoli mense Aprili anni 1728. cum omnibus conditionibus requisitis ab ipso fieri potuit. Siquidem ibi inuenit domum bene clausam, et coelum per plurimos dies serenum ipsi inseruiebat vt accuratius cognosceret quaenam interesset differentia inter motum horologii oscillatorii et motum medium solis, et determinare valebat regularitatem motus horologii spatio 15 dierum, quo saepenumero oscillationes penduli simplicis cum vibrationibus horologii comparabat.

Horologium a fratre meo in his comparationibus adhibitum pure Hugenianum est, et a suo autore in tractatu de horologio oscillatorio descriptum. Talia et enim horologia bono cum successu in Observatorio Regio Parisiensi etiam num adhibentur, et multum praestant horologiis constructionis disparis ac recentioris, quorum vibrationes ope fusi cuiusdam (gallice *roch et dicti*) peraguntur, quaeque minus commode observationibus astronomicis praesertim in itinere adhiberi possunt.

Postquam itaque frater meus durante toto mense aprilis multas altitudines solis respondententes horis matutinis et Vespertinis quadrante suo adhibito hoc horologio observasset, et ex his altitudinibus aequalibus momentum meridiei et mediae noctis ab horologio monstrandum, correctione necessaria facta pro variatione declinationis intra horas observationum, certior factus est motum horologii oscillatorii satis aequabilem fuisse et 15 secundis horariis 8 horarum spatio a motu medio defecisse.

Interea dum hae peragerentur frater meus praeparauerat pendulum simplex, cui longitudinem praecise eandem

dem quam Lutetiae Parisiorum scil. 3 pedum $8\frac{1}{2}$ linearum dederat, obseruatis quotidie iteratis vicibus quantum vibrationes penduli simplicis accelerarent vel deficerent ab horologii oscillatorii vibrationum numero determinato, quidem qui poterat maximus adhibebatur antea quam pendulum semel agitatum moueri cessaret.

Mouendo pendulum simplex curauit vt vibrationes quam minimae fierent, quod tamen non obstitit quominus per horae dimidium, aut tres quadrantes, imo per integram horam vibrationes numerare possit, antequam motus penduli finiretur: his ita dispositis experientia didicit vibrationes penduli simplicis semper superare numerum vibrationum Horologii oscillatorii, quae quantitas quandoque minor quandoque maior reperiebatur, ex parte e difficultate vibrationes tam exiguas numerandi oriunda.

En tibi obseruationes de quarum certitudine ipsi omnium maxime constabat 20. aprilis vibrationes penduli simplicis 48 minutorum primorum spatio, tribus tantum minutis secundis, supra oscillationes horologii accelerabant, id quod 3 horis, 30 minuta secunda efficit. Sed tum temporis horologium oscillatorium 8 horarum spatio deficiebat 15 minutis secundis a motu medio Solari et per consequens vibrationes penduli simplicis hoc intervallo 3 horarum accelerabant 15 minutis secundis super pendulum motui medio solis accommodatum.

25. Aprilis 34 minutis primis pendulum simplex accelerabat 2 secundis horariis. 26 aprilis autem tribus minutis secundis 52 minutorum primorum spatio.

Ex his obseruationibus diuersis proueniunt 28 minuta secunda pro spatio 8 horarum, sed tum temporis horologium oscillatorium deficiebat 15 minutis secundis cum semisse a motu medio solis, proinde pendulum a fratre adhibitum accelerasset saltem 12 secundis cum semisse spatio 8 horarum cum die vigesimo a prilis 15 minutis secundis accelerasset.






Nolo omnium obseruationum eodem mense factarum mentionem iniicere siquidem acceleratio inde deducta 8 horarum spatio non maior est 15 minutis secundis, nec minor $12\frac{1}{2}$ minutis secundis; hinc uti ex obseruationibus elicitis termini solummodo inferuire debent supputationi longitudinis penduli.

Longitudinem penduli simplicis constat esse in ratione inuerfa radicem quadratarum numeri oscillationum tempore aequali peractarum. Pendulum quo frater utebatur erat 3 pedum $8\frac{1}{2}$ linearum, vel quod idem $440\frac{500}{1000}$ pendulum istud dabit 28815. vel $28812\frac{1}{2}$ vibrationes eo tempore, quo horologium oscillatorium motui medio solis accommodatum saltem 28800 (qui est numerus minorum secundorum quae continentur in 8 horis) hinc longitudo penduli simplicis quae minuta secunda Archangelopoli oscillando dedisset, fuisset ad longitudinem penduli simplicis Parisiis in ratione radicem quadratarum 28800 ad 28815 vel 28800 ad $28812\frac{1}{2}$ inde supputatur longitudinem penduli simplicis Archangelopolis superare longitudinem penduli simplicis Parisini $\frac{115}{1000}$ vnus lineae per primam vel $\frac{96}{1000}$ per secundam suppositionem.

Ista Longitudo penduli simplicis supra determinata, vera esset, si diameter Sphaerulae ad hanc obseruationem vsurpatae, nullam vel prope nullam rationem haberet, ad ipsam penduli longitudinem. Cum vero diameter huius Sphaerulae, aequalis esset quatuordecim lineis cum semisse; hinc, iuxta legem ab Hughenio demonstratam, prius determinata penduli longitudo, augenda est duabus quintis partibus, tertiae proportionalis, ad distantiam puncti suspensionis a centro Sphaerae, et ad Semidiametrum ipsius Sphaerae.

Per Antedicta autem punctum suspensionis distabat a centro Sphaerae lineis $440\frac{500}{1000}$. et radius Sphaerae equabat lineas $7\frac{250}{1000}$. ex his duobus numeris tertia proportionalis elicitur, paulisper excedit $\frac{119}{1000}$ vnus lineae: vsurpabo ergo $\frac{120}{1000}$. pro numero rotundo; huius tertiae proportionalis, cuius duae quintae partes efficiunt 48 millesimas partes vnus lineae, quae adhi debent earundem fractarum partium numeris 115 vel 96 antea deductis, quibus longitudo penduli simplicis Archangelopoli superabat longitudinem penduli simplicis Parisiis obseruatam. vnde consequens est, veram longitudinem penduli simplicis Archangelopolitani Isochroni Pendulo ad Obseruationem vsurpato, excedere longitudinem penduli simplicis Parisini, ad suum 163 vel ad minimum 144 millesimis partibus vnus lineae, quarum fractionum, medium sumendo prodibant, tres vicecimae vnus lineae partes pro iste penduli Archangelopolitani supra Parisinum excessu.

FINIS.










Fig 5




Fig 6




Fig 1




Fig 2





Fig 3













fig: 1.




fig: 2.




fig: 3.





fig: 4.






fig. 1.

m n























fig. 2.
























fig. 1.

















fig. 2.









2.





fig. 2.

5.



fig. 4.




fig. 3.




fig. 1.





fig. 2.




fig. 5.




fig. 4.











fig. 3.













fig. 1.






fig. 5.






fig. 1.






















fig. 5.













B
C
T



















fig: 1. d.
17. pag: 218

Comm. Ac. Sc. Tom. IV. T. XX. p. 218.



§ 18. pag. 219.



fig: 2.
§ 30. pag. 222.




Fig: 1. d.
§ 17. pag: 218



Comm. Ac. Sc. Tom. (V. T. IX. p. 210.

§ 18. pag: 219.



Fig: 2.
§ 30. pag: 222.




fig: 4.
§ 42. pag. 225. C








fig: 5.
§ 50. pag 229.







C
B
A
fig. 1.




fig. 4.







fig. 5.

















in cochleatis



§ 16.
 aaaa Annuli ferri externi
 bbbb Annuli aurichalcei interni
 d. virgachalybea.



Ad Dissertationem de futeis & lopstorum cochlearis

§ 6 pag. 266






fig. 3 § 13. 268



§ 13 p. 268



B

fig. 12. § 28. pag. 273.





fig. 10. § 22.

p. 260.




fig. 11 § 26 p. 272.

fig. 9. § 20. p. 271.





fig. 3. § 17 p. 269

Fig 1 § 6. pag. 266.




fig. 2. § 9 p 267.




fig. 5. § 14 pag. 269.




fig. 7. § 13 p 268




fig. 3 § 13. 268




fig 12. § 28 pag. 273.




fig 6 § 14 p. 269




fig 7. § 15. p. 269.



fig 10. § 22.





fig. 9. § 20. p. 271.



fig. 8. § 17 p. 269







fig. 1.



fig. 2.




fig. 1.



fig. 2.




Comment. IV. ad pag. 283.





Comment. IV. ad pag. 283.



ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚

ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚

ᳵ᳚᳚᳚᳚ gal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gu
ᳵ᳚᳚᳚᳚ Kir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ Kal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ Ku
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gur
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gu
ᳵ᳚᳚᳚᳚ ghar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ ghar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gchal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ ghar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gir

ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚

ᳵ᳚᳚᳚᳚ ngat
ᳵ᳚᳚᳚᳚ ngu
ᳵ᳚᳚᳚᳚ sir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ sat
ᳵ᳚᳚᳚᳚ su
ᳵ᳚᳚᳚᳚ tchar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ tchar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ tchal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ tchin
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dsu
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dchar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dchar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dchal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dchar
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dchar

ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚ | ᳵ᳚᳚᳚᳚

ᳵ᳚᳚᳚᳚ ngir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ gur
ᳵ᳚᳚᳚᳚ ngat
ᳵ᳚᳚᳚᳚ ngu
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzat
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzu
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dal
ᳵ᳚᳚᳚᳚ du
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzir
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzat
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzu
ᳵ᳚᳚᳚᳚ dzchar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
<i>dzahoi</i>		<i>dzahol</i>	<i>dzahin</i>		<i>hoi</i>	<i>hoi</i>		<i>kol</i>	<i>kon</i>		<i>doi</i>	<i>doi</i>

᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
<i>du</i>		<i>dhio</i>	<i>dhioi</i>		<i>dhio</i>	<i>dhio</i>		<i>mi</i>	<i>mi</i>		<i>mi</i>	<i>mi</i>

᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚		᳚᳚᳚	᳚᳚᳚
<i>woi</i>		<i>woi</i>	<i>woi</i>		<i>woi</i>	<i>woi</i>		<i>woi</i>	<i>woi</i>		<i>woi</i>	<i>woi</i>

ਆ ਆ ਆ ਆ | ਆ ਆ ਆ ਆ | ਆ ਆ ਆ ਆ

ਭ ਭ ਭ ਭ | ਭ ਭ ਭ ਭ | ਭ ਭ ਭ ਭ

ਚ ਚ ਚ ਚ | ਚ ਚ ਚ ਚ | ਚ ਚ ਚ ਚ
ch ch ch ch | ch ch ch ch | ch ch ch ch

ਛ ਛ ਛ ਛ | ਛ ਛ ਛ ਛ | ਛ ਛ ਛ ਛ

ਝ ਝ ਝ ਝ | ਝ ਝ ਝ ਝ | ਝ ਝ ਝ ਝ

ਞ ਞ ਞ ਞ | ਞ ਞ ਞ ਞ | ਞ ਞ ਞ ਞ
ch ch ch ch | ch ch ch ch | ch ch ch ch

ਟ ਟ ਟ ਟ | ਟ ਟ ਟ ਟ | ਟ ਟ ਟ ਟ

ਠ ਠ ਠ ਠ | ਠ ਠ ਠ ਠ | ਠ ਠ ਠ ਠ

ਡ ਡ ਡ ਡ | ਡ ਡ ਡ ਡ | ਡ ਡ ਡ ਡ
d d d d | d d d d | d d d d

ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
om	om	om	om	om	om	om	om	om	om
om	om	om	om	om	om	om	om	om	om
om	om	om	om	om	om	om	om	om	om

ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
om	om	om	om
om	om	om	om
om	om	om	om

ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
om	om	om	om
om	om	om	om
om	om	om	om

Devanagaram

रू उ रु ष षं ऊ औ अ.अः क ग प
rū hī hū ie ei a au am ahā kā kā gā gā

ट उ उ मा त स र ल न प र्प ब त
ta tta thā nā ta tū dā dā nā pā pā bā bā

स ह ल र त र तेः

hāsa ha la ttza ra i tihī

II. Balabandu

रा इ ई उ उ री री ली ली ये ये अँ औ अँ
ā ī ī ū ū rī rī lī lī ye ye a' au a'

च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द
hæ tze tze sī sī je thæ thæ dæ dæ næ tte dæ dæ

न ये च ल व कृ ष स ह ळ हृ ॥
næ ie ræ læ næ sæ schæ schæ hæ læ ihschæ

III. Akār Nagari

श्री ग यो मा ई न ः ॥

आ इ ई उ उ रि री लि ली दे टै ओ औ ष
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

च छ ष च नः ट ठ द ढ याः न य द द
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

य र ल वः स ष स टुः न ष ॥
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

दा पु प् प् प् पा प् प् प् प् ॥
51 52 53 54 55 56

पा पु
16 17

I. Devanagaram

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ओ औ ऋः क ग घ ञ
 ā ā ī ī ū ū ṛi ṛi ṛi ṛi ē ē a au am ahā kā kā gā gā
 ङ व बु ङु ङु ङु ट ठ ड ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु
 ṅa śhā śhā dā dā ṅā ta ta tta thā nā ta tū dā dā nā pā pā bā bā
 ङ ङ न ल व र ङ स ह ल र न इ तिः
 ma ja ra la waschā schā sa ha la tta ra i tihī

II. Batabandu

ऊ न मा सो धं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ओ औ ऋः
 ūo na ma ś dhamā ā ī ī ū ū ṛi ṛi ṛi ṛi ē ē o au am
 अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु
 ahā kā khā gā ghā ṅā chā chā jā jā ṅā ṅā ṅā ṅā ṅā ṅā ṅā ṅā ṅā ṅā
 ध न प फ ब म ये च ल व श ष स ह ष्ट ह
 dha na pa pha ba ma ye cha la va sha sha sa hṣṭa ha

III. Akār Nagari

ॐ नमो श्रीगणेशाय नमः ॥

ओ न ङ ङी षः अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ॡ ओ औ ऋः
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 षः क ङ ङी ञ ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 नः प फ ब म ङ ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु
 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 प ङ ङी ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु ङु
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 प ङ ङी ङु ङु
 13 14 15 16 17

AMNH LIBRARY



100127243