

T 7970/2240(2)

CHINESE - JAPANESE LIBRARY
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

宜散 滲泄 燥 辛苦

木瓜 薏苡仁 朮 石斛

萆薢 石菖蒲 茯苓 佐以防風

葛根 寒溼加半夏 五加皮

風溼加獨活 溼熱加黃檗

車前子 木通 甚者加漢防已

脚氣由於溼熱

忌溫燥 溼熱 補氣 復忌破氣 升

哈佛大學哈佛藥劑
圖書館珍藏印

諸藥俱見前

宜清熱 除溼 利小便 甘平 酸寒

苦寒 辛溫 淡滲

黃檗 石斛 麥門冬 木瓜

石菖蒲 薏苡仁 車前子 茯苓

木通 澤瀉 草薺 防已

燥○諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥角弓反張筋攣急不舒舌強不能言二便閉澀口渴口乾

苦皮膚皴揭毛髮脆折津液不生血枯胃槁以致飲食不化噎膈吐食

忌升散 破氣 下 辛燥 大熱 溫

諸藥俱見前

宜潤 益血 辛 甘寒 酸寒 鹹寒

有熱證者宜兼清熱

麥門冬 當歸 地黃 肉蓯蓉

酥 人乳 牛乳 蜜

胡桃	甘菊花	麻仁	胡麻
柏子仁	人參	松實	天門冬
五味子	酸棗仁	白芍藥	蕉漿
蘆根汁	童便	梨汁	韭汁
佐以薑汁			

火○諸熱瞽瘖暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭
 附腫疼酸氣逆上衝禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍
 喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注

閉瘕暴病暴死皆屬於火

忌補斂 升發 閉氣 辛燥 溫熱

諸藥俱見前

宜降折 下 鹹寒 苦寒 辛寒 甘寒

大黃 童便 芒硝 黃芩

黃連 黃檗 連翹 石膏

山梔 玄參 生甘草 知母

天門冬 麥門冬 生地黃 藍汁

虛者宜甘寒鹹寒以滋水不宜用苦寒傷

胃

猝眩仆九竅流血多不治

忌同火

宜服童便

鹽湯

竹瀝

藍汁

梨

生犀角汁

猝心痛

忌同火

宜服山梔

白芍藥

延胡索

生甘草

鹽湯

蘇子

目暴赤腫痛甚見肝實條內忌宜俱同

二便忽閉以利小便為先

忌同火

宜降潤

苦寒

甘寒

辛寒

利竅

大黃

蘇子

生蜜

麻仁

桃仁

石膏

知母

天門冬

麥門冬

黃芩

山梔

滑石

石瀉

猪苓

車前子

木通

海金沙

頭面赤腫

忌同火

宜清熱解毒

發散

苦寒

辛寒

甘寒

鹹寒

甘菊花

鼠黏子

連翹

荆芥

薄荷

蟬蛻

大黃

玄參

石膏

知母

竹葉

生甘草

童溺

忽大渴思水水

忌同火

宜潤

生津液

辛寒

甘寒

鹹寒

石膏

知母

玄參

麥門冬

竹葉

栝樓根

五味子

梨汁

蔗漿

童便

凉水

冰

口乾舌苦

忌宜俱同火

暴痞

忌同火

宜降氣

發音聲

苦

甘寒

辛涼

鹹

寒

蘇子

枇杷葉

貝母

桔梗

百部

竹瀝

梨汁

天門冬

麥門冬

甘草

薄荷

玄參

桑白皮

童便

暴注

忌同火

宜利水

苦寒

酸寒

茯苓

黃連

黃芩

白芍藥

生甘草

葛根

滑石

木通

虛者加人參

蓮肉

白藕豆

躁擾狂越罵詈驚駭

忌同火

宜清鎮

苦寒

辛寒

鹹寒

丹砂

牛黃

黃連

黃芩

山梔

滑石

石膏

知母

童便

大便閉者加大黃下之不行加

芒硝

禁慄如喪神守

忌同火

宜同躁擾狂越

氣逆衝上

忌同火

宜降氣

酸斂

甘寒

苦寒

鹹寒

蘇子

枇杷葉

橘紅

五味子

番降香

山茱萸

白芍藥

麥門冬

石斛

黃蘗

牛膝

桑白皮

童溺

潤瘕瘖瘕

忌同火

宜清熱和肝

酸寒

苦寒

辛寒

甘寒

白芍藥

生甘草

竹葉

玄參

黃連

黃蘗

生地黃

甘菊花

麥門冬

知母

石膏

○雜證門

瘧經曰夏傷於暑秋必痃瘧其證大都多熱多
 寒或熱多寒少或寒多熱少或單熱不寒或單
 寒不熱或先寒後熱或先熱後寒或有汗無汗
 或汗少汗多或自汗盜汗或頭疼骨痛或大渴
 引飲口苦舌乾或嘔吐不思食或煩躁不得眠
 或大便燥結或瀉利或連發或間發或三日發
 或發於陽或發於陰要皆中氣不足脾胃虛弱

暑邪乘虛客之而作雖隨經隨證投藥解散必先清暑益氣調理脾胃為主有食者兼消導奪食有風兼散風有老痰伏飲者兼豁痰逐飲感瘴癘者兼消瘴癘汗多者固表無汗者解表泄利者升發兼利小便便燥者兼益陰潤燥病有陰陽藥分氣血證有緩急治因先後人有虛實法異攻補久而不解必屬於虛氣虛者補氣血虛者補血兩虛者氣血兼補非大補真氣大健

脾胃不得瘳也

忌破氣下

諸藥俱見前

瘳必由於中氣虛破氣則傷中氣邪不得解甚則中滿不思食作泄惡寒口乾惟傷食宜消不同此法
誤下則邪氣陷於內變為滯下或腹滿腫脹嘔惡不思食凡屬破氣下泄藥切戒勿

施

宜清暑益氣 健脾開胃 兼消痰 宜分

臟腑手足六經所見證施治 先清暑熱多

者宜服白虎湯加減

硬石膏 自一兩至四兩 知母 自四錢至二兩 竹葉 自一

至四片 麥門冬 自八錢至三兩 粳米 自二錢至二大撮 病

人素虛或作勞者加人參 自三錢至一兩 ○有痰

加廣橘紅 三錢 竹瀝 一杯 大渴者加栝樓

根 三錢至六錢 ○不渴者用清暑益氣湯 ○兼

飲食停滯者加枳實青皮草果一二劑食

消即止勿多服多服則損中氣其藥俱宜

黃昏煎以井水澄冷須露一宿五更時溫

服蓋瘧乃暑邪為病暑得露則散也

足太陽經屬膀胱其證令人腰痛頭痛頭重寒

從背起先寒後熱焯焯暍暍然熱止汗出難已

或遍身骨痛小便短赤

羌活一錢至三四錢廣陳皮去白五分黃芩二錢前

胡二錢甘草炙五分猪苓一錢知母二錢五分○

若口渴者即兼陽明宜加石膏麥門冬倍

知母渴而汗少或無汗并加葛根○若涉

深秋或入冬無汗宜多加薑皮○因虛而

無汗或汗少者加人參三五錢麥門冬四五錢

佐以薑皮二錢露一宿發日五更溫服○

因虛汗多者加黃耆三四錢桂枝七八分汗止

即去桂枝不可多服○若病人素有熱者

勿服桂枝以芍藥五味子代之○若發於

陰并加當歸○小便短澀或赤者與六一

散二三服○有溼者以猪苓茯苓代滑石

下午服理脾健胃藥

橘紅二錢五分白豆蔻五分白茯苓三錢山查

三錢麥芽炒三錢藿香一錢人參三錢白朮

二錢白芍藥三錢白藕豆三錢○有肺火

者去人參白朮加麥門冬五錢石斛三錢

烏梅肉一枚○停食者必惡食加山查傷

肉食者加黃連紅麴傷穀食者加枳實草

果各七分傷麪食者加炒萊菔子食消即已

不可多服多服則損中氣○胃家素有溼

痰者其證不渴寒多方可用半夏橘紅二

朮大劑與之嘔甚者兼用薑皮

足陽明經屬胃其證發熱頭疼鼻乾渴欲引飲

目眴眴不得眠甚則煩躁畏火光人聲木聲

宜服大劑竹葉石膏湯無汗或汗少不嘔者

可加乾葛二三錢○病人虛而作勞者加人

參○汗多加白朮○痰多加貝母橘紅得

汗即解○寒熱俱甚渴甚汗多寒時指爪

皆紫黯者加桂枝七八分○久而不解屬氣

虛用人參兩許薑皮兩許煎成露一宿五

更溫服○下午服理脾健胃藥如前方加

減亦如之

足少陽經屬膽其證往來寒熱口苦耳聾胸脇痛或嘔

宜服小柴胡湯○渴者去半夏加石膏麥門

冬○肺家有熱者去人參加知母倍門冬

○有痰不渴者本方加貝母三錢至八錢 朮荻

苓各三錢 薑皮一錢至三四錢 ○病人陰虛而有熱

者雖嘔吐忌用半夏生薑誤投則損人津

液令人聲啞宜用竹茹橘皮麥門冬白茯苓

烏梅以代之

○以上三陽經瘧邪客之者其證多熱多渴

亦易得汗藥宜大劑急逐暑邪母使遲留

則病易愈繼以理脾開胃大補真氣茂不

瘳矣邪在三陽藥宜辛寒如石膏知母柴

胡甘寒如葛根麥門冬竹葉粳米苦寒如

黃芩之屬為君乃可以散暑邪除熱渴墜

頭疼兼寒甚者則間用辛溫如薑皮桂枝
 以為嚮導以伏其邪則病易退凡寒甚者
 病因於虛或作勞者亦因於虛皆宜甘溫
 以人參黃耆朮為君佐以辛甘如桂枝薑
 皮之屬脾胃虛弱飲食不消者則補之以
 參朮佐以消導如白豆蔻麥芽砂仁草豆
 蔻枳實橘皮山查之屬在陰分者則以當
 歸牛膝為君佐以薑桂如熱甚而渴者去

薑桂加知母麥門冬竹葉牛膝鼈甲

足厥陰經屬肝其證先寒後熱色蒼蒼然善太
 息甚者狀如欲死或頭疼而渴

宜先服三黃石膏湯加柴胡鼈甲橘皮以祛

暑邪後用當歸 兩許 橘皮 三四錢 鼈甲 四五錢

牛膝 兩許 柴胡 一二錢 濃煎露一宿發日五

更溫服○如熱甚而渴加枯樓根 三四錢 麥

門冬 五六錢 竹葉 一百片 知母 三四錢 鼈甲 五十六錢

○如脾胃薄弱或溏泄去當歸加人參三五錢
○如有肺火不可服參者祇照本方多服自愈○寒多或寒甚指爪青黯者加桂枝薑皮人參

足太陰經屬脾其證先寒後熱或寒多若脾瘧必寒從中起善嘔嘔已乃衰然後發熱熱過汗出乃已熱甚者或渴否則不渴喜火

宜服桂枝湯建中湯○病人虛者以人參薑

皮各兩許濃煎露一宿五更溫服○有痰者

宜加朮橘皮各三錢

足少陰經屬腎其證寒熱俱甚腰痛脊強口渴寒從下起小便短赤

宜先服人參白虎湯加桂枝以祛暑邪後用

鼈甲四五錢牛膝兩許熱甚者加知母麥門冬

各四錢○寒甚者加桂枝錢許○嘔則兼加薑

皮三四錢○如熱甚而嘔者去桂枝薑皮加竹

茹 三錢 人參橘皮 各三錢 用牛膝桂枝者肝腎同一治故也

○瘧病多挾痰以故熱痰須用貝母為君自三錢至八錢竹瀝竹茹栝樓根橘紅白茯苓稱是以佐之甚者可加霞天膏如寒痰發瘧寒多不渴者用半夏白朮橘皮為君多加生薑皮

○瘧病多挾風有風者必用何首烏為君白朮橘皮為臣葛根薑皮羌活以佐之不頭痛者除羌活

○暑邪盛解散不早陷入於裏則變為滯下急投苓連芍藥滑石紅麴甘草佐以葛根升麻柴胡以表裏分消之脾胃薄弱者加人參藊豆蓮肉大劑與之以愈為度滯下若愈瘧亦隨止即不止其熱必輕仍隨經隨證以治之不煩多藥而自止也

又暑熱溼之邪內伏百藥不效者用獨雄丸立愈

○凡勞瘧病人陰不足或作勞或房勞病發於陰或間日一發或三日一發三日一發為病深須以鼈甲牛膝何首烏為君橘皮為佐發於夜而便燥者加當歸脾胃弱者勿加佐以薑皮熱甚勿入大劑與之日三乃差

附錄諸瘧主治

熱多宜

貝母

石膏

麥門冬

橘紅

乾葛

滑石

竹葉

牛膝

知母

黃芩

柴胡

白茯苓

烏梅

何首烏

牡蠣

鼈甲

寒多宜

桂枝

薑皮

人參

二朮

黃耆

當歸

橘紅

半夏

草豆蔻

白豆蔻

炙甘草

汗多宜

人參

白朮

黃耆

秋冬加桂枝

無汗宜

乾葛

柴胡

石膏

羌活

薑皮

人參

蒼朮

瘧母宜

鼈甲

射干

牡蠣

三稜

縮砂蜜

桂

橘皮

青皮

人參

○凡瘧疾多熱久不解者其人必本陰虛法當

益陰除熱非鼈甲牛膝不能除也多寒而久不解者其人必本陽虛非人參白朮黃耆不能除

○按瘧有山嵐瘴氣停痰留飲而發者古方類用常山砒霜等吐之今人誤執其方見瘧輒用不知二藥有大毒損人真氣犯之多致危殆慎之慎之

滯下俗呼痢疾其證腹痛便膿血或赤或白或

赤白相雜或下純血或下紫黑血塊或如豆汁
 或如魚凍或如屋漏水或下純黃積類多裏急
 後重數登圜而不得便小便短赤不利或發熱
 或口渴甚則嘔惡不思食此皆暑溼之邪與飲
 食積滯膠固腸胃而作必先祛暑溼安胃為
 主傷氣分則調氣益氣傷血分則和血補血挾
 瘀血則行血藥雖因證而設要皆以補養胃氣
 為急故其證以噤口痢為最重胃氣一絕則不

可治矣故曰妄穀則昌絕穀則亡俗治多藉口
 迎而奪之之說輕用大黃朴硝及誤用巴豆牽
 牛以致洞泄腸開而斃又有妄投訶子粟殼亞
 芙蓉肉豆蔻收澀之劑以致便閉腹脹或溼熱
 上攻肢節腫脹拘攣痛不可忍難以救療慎之
 慎之

忌破氣 閉氣 收澀 燥 溫熱 鹹寒
 滑膩

諸藥俱見前

宜清熱消積 開胃氣 升 利小便

黃連 黃芩 白芍藥 紅麴

山查 廣橘紅 升麻 葛根

甘草 滑石 蓮肉 白菹豆

烏梅 如胃弱加人參三四錢 蓮子四十粒

橘紅 二錢 升麻 七分 ○如腹痛以黃連 四

錢 白芍藥 三錢 炙甘草 五錢 黃檗 一錢 升

麻 七分 煎服 ○如裏急同上藥加當歸 二

錢 ○如後重甚加檳榔 五錢 枳殼 五錢 木

香汁 七匙 ○如口渴去木香倍滑石 ○如

小便赤澀短少或不利亦倍之 ○赤多倍

烏梅 山查 紅麴 ○白多加吳茱萸 七分 ○

惡心欲嘔即噤口痢多用人參 蓮肉 菹豆

白芍藥以綠色升麻 七分 佐之 ○久痢不

止加肉豆蔻 一錢 人參 三錢 砂仁 一錢 白

茯苓 二錢

○凡滯下非元氣壯實多噉能食之人慎勿輕用大黃巴豆牽牛等下藥

○復有毒痢一證或痧毒內陷下膿血各藥不效者加忍冬藤為君地榆丹砂犀角汁次之

○凡產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參

白芍當歸紅麴升麻益母草炙甘草滑石末

足矣若惡露未盡兼用乳香沒藥各七分炒

砂仁一錢久之自愈血虛可加阿膠三錢

○凡胎前滯下宜用黃芩黃連白芍炙甘草橘紅赤麴枳殼蓮肉畧用升麻未滿七月勿用

滑石

瀉利俗呼泄瀉因於溼

忌溼潤 破氣 下 苦寒 滑利

諸藥俱見前

宜安胃補脾 升 利小便

人參 白茯苓 蓮肉 白扁豆

白朮 車前子 升麻 橘紅

藿香 木瓜 乾葛 炙甘草

白萊菔 虛寒者加肉豆蔻 補骨脂

吳茱萸 虛熱者去白朮加 川黃連

倍芍藥 蓮肉

○暑溼為病則小水短赤或口渴倍用薑炒黃

連為君佐以乾葛升麻○由於感風寒者二

朮吳茱萸砂仁陳皮乾薑紫蘇主之○若由

飲食停滯者兼消導山查麥芽神麴陳皮肉

豆蔻

五疸方書所載五疸酒食大饑後過飽女勞失

治而成然其證必由溼熱傷脾及飲食停滯又

有瘀血發黃一證方所不載分別一誤則藥不

對證多致不救慎之慎之

忌破氣 閉氣 下 鹹 滑利 滯膩

潤 燥熱 有瘀血者兼忌酸寒

諸藥俱見前

宜清熱 利水 除溼 養胃氣 有停滯

者宜消積滯 有瘀血者宜行血

茵陳蒿 黃連 苜蓿 酒疸非此不愈

梔子 紫草 栝樓根 秦艽

黃芩 滑石 車前子 白蘚皮

仙人對坐草 白茯苓 連錢草 一名

蟹鬚草一名九里香取汁入薑汁少許飲之良 ○虛者加人參 ○

停滯者加紅麴橘紅穀麥蘖山查 ○瘀血

加琥珀牡丹皮紅麴紅花桃仁延胡索蒲

黃五靈脂韭 ○元氣壯實者服前藥瘀血

不行可加熟大黃虛者勿用

痰

○由於熱

忌燥 溫熱 補斂 升

諸藥俱見前

宜降 潤 清熱 苦寒 辛寒 佐以鹹

寒

蘇子 橘紅 天門冬 枇杷葉

麥門冬 黃芩 桑白皮 薄荷

百部 栝樓根 栝樓仁 桔梗

貝母 蛤粉 竹瀝 童便

膠固者加霞天膏并用猫兒刺

○由於風寒

忌補斂 溼潤 酸 鹹

諸藥俱見前

宜降氣 辛散

橘紅 蘇子 杏仁 天麻

前胡 半夏 南星 葛根

桑白皮 薄荷 白前 生薑汁

○由於溼

忌潤 鹹 酸 滯膩 發溼

諸藥俱見前

宜健脾 燥溼 辛散 佐以淡滲

人參 二朮 橘紅 半夏

桑白皮 白茯苓 澤瀉

飲如涎而薄者或如涎而稠者伏於胸中及脾胃間或吐酸水苦水黃水綠水或伏而不吐上

支心胸胃脘作痛不可忍按之不得下或發寒熱嘔吐不能飲食

忌宜俱同脾虛證內停飲條

諸氣氣有餘即是火

忌升 閉氣 酸斂 滯膩

諸藥俱見前

虛者宜降 補斂 調 溫 酸 辛 甘

蘇子 枇杷葉 橘紅 麥門冬

蘆根汁 甘蔗 番降香 沉水香

白豆蔻 鬱金 甘草 童便

白芍藥 五味子 因虛極而氣不得行

者加人參

實者宜破散 香燥 辛苦 辛寒

枳殼 青皮 檳榔 厚朴

木香 沉香 香附 烏藥

降香 藿香 縮砂蜜

鬱

忌酸斂 滯膩 補氣 閉氣

諸藥俱見前

屬情抱者宜開發志意 調氣散結 和中

健胛

遠志 貝母 鬱金 石菖蒲

香附 蘇子 橘紅 白豆蔻

木香 蘇合香 縮砂蜜 麥門冬

屬五臟者○木鬱達之宜升吐

升麻 柴胡 川芎 瓜蒂

人參 蘆

火鬱發之宜散

升麻 葛根 柴胡 防風

羌活

土鬱奪之宜下

檳榔 枳實 厚朴 大黃

金鬱泄之宜降

橘紅 蘇子 桑白皮 猪苓

澤瀉 木通 赤小豆 車前子

烏蠶 魚

關格不得大小便為關是熱在丹田也吐逆水
漿不得下為格是寒反在胸中也是陰陽易位
故上下俱病先投辛香通竅下降之藥以治其
上次用下泄苦寒之藥以通二便此急證法難

緩治縱有裏虛通後再補

忌升 補斂 閉氣 酸

諸藥俱見前

宜降下 辛寒 辛溫

沉香 白豆蔻 丁香 蘇子

龍腦香 蘇合香 橘紅 生薑

藿香 次用大黃 黃檗

知母 滑石 木通 車前子

牛膝

治 噦俗呼呃逆久病沉痾而發者屬真氣虛多不

忌破氣 升 散

諸藥俱見前

宜補斂 甘溫 甘寒

人參 黃耆 炙甘草 麥門冬

五味子 益智子 白芍藥 石斛

○傷寒失下而發者

忌補斂 酸 燥熱 滯膩

諸藥俱見前

宜下大小承氣之類便不鞭閉按之腹中和軟未經汗吐者宜辛寒解表白虎湯之類

○氣逆衝上而發者

忌升 補

諸藥俱見前

宜降氣 甘寒 鹹寒

蘇子 橘紅 枇杷葉 竹茹

蘆根汁 麥門冬 童便

○因痰水停膈而發者

忌升 潤 苦寒 甘寒 酸寒

諸藥俱見前

宜降氣 開痰 辛散

橘紅 蘇子 貝母 桑白皮

半夏 旋覆花 生薑 白豆蔻

吐血咯血鼻衄齒衄耳衄舌上出血

忌升提發散 下 破血 補氣 閉氣

破氣 溫熱 辛燥 復忌極苦寒傷胃

諸藥俱見前

宜降氣 清熱 涼血益陰 兼行血 鹹

寒 酸寒 甘寒

蘇子 麥門冬 橘皮 枇杷葉

降香 鬱金 天門冬 沙參

牛膝 阿膠 生地黃 枸杞子

五味子 鼈甲 白芍藥 犀角汁

牡丹皮 青蒿 剪草 白藥子

童便 側柏葉 小蘗 茅根

櫻灰 藕節 當歸 蒲黃

蓄血俗名內傷或積勞或多怒或飽後行房或負重努力或登高墜下或奔逐過急皆致蓄血

其證多發熱其熱類外感而不頭疼不作渴天明少間至午復劇有汗汗多劑頸而還自汗無氣以息目光短不思飲食不得眠二便自利小便或赤大便或泄

忌破氣 復忌補氣 下 苦寒 辛燥

諸藥俱見前

宜行血 辛溫 佐以鹹寒 瘀血行後宜

補血益脾和肝

桃仁 紅藍花 延胡索 桂 有火之人勿用

鬱金 當歸尾 蘇方木 乳香

番降香 沒藥 穿山甲 麝蟲

赤芍藥 五靈脂 蒲黃 紅麴

騏驎竭 韭汁 童便 桃梟

甚者用大黃花蕊石瘀行則止勿過劑如元氣虛脾胃素弱者慎勿輕用大黃如瘀血行後宜生地黃 川續斷 白膠

當歸身 麥門冬 牛膝 白芍藥

炙甘草 酸棗仁 大棗 龍眼肉

枸杞子 山茱萸

頭痛

○挾風寒者

忌補斂

諸藥俱見前

宜辛溫發散

羌活 防風 細辛 荆芥

薄荷 川芎 藁本 升麻

白芷 蔓荊子 生薑 葱白

○挾邪熱者

忌同挾風寒

宜辛寒 苦寒 解散

石膏 薄荷 黃芩酒炒 芽茶

黑豆 烏梅 甘菊花 土茯苓

熱極目昏便燥者加酒蒸大黃

○挾痰者

忌升 補斂 酸甘 滯膩

諸藥俱見前

宜豁痰降氣 辛燥

蘇子 橘紅 貝母 半夏

前胡 竹瀝 朮 天麻

○陰虛者

忌辛熱發散

諸藥俱見前

宜補血益陰 甘寒 酸寒

生地黃 甘菊花 當歸 天門冬

麥門冬 枸杞子 黃檗 白芍藥

忍冬 五味子 烏梅

○眉稜骨痛

忌宜俱同陰虛頭痛

齒痛

忌升 補斂 燥熱 辛溫

諸藥俱見前

宜清熱涼血 苦寒 辛寒 甘寒 鹹寒

麥門冬 生地黃 赤芍藥 牡丹皮

竹葉 知母 黃連 黃芩

黃檗 玄參 石膏 薄荷

蘇子 甘草 童便

上下齟屬胃與大腸火宜石膏 熟大黃

麥門冬 黃芩 黃連 赤芍藥

生地黃 生甘草 青黛 細辛

西瓜皮灰 薄荷 枇杷葉

蘇子 木通

真牙浮動及黑爛屬腎虛有火已見腎虛條

內忌宜俱同

胃脘痛

○因火者

忌補飲 燥熱

諸藥俱見前

宜降 苦寒 甘寒 鹹寒 辛寒

蘇子 橘紅 黃連 山梔

麥門冬 炙甘草 石膏 知母

玄參 童溺

○因寒者

忌破氣 滯膩 苦寒

諸藥俱見前

宜辛溫發散

橘皮 草豆蔻 益智子 丁香

桂 白朮 藿香 白豆蔻

縮砂蜜 吳茱萸 厚朴 香附

乾薑

○因宿食者

忌升 補飲 苦寒

諸藥俱見前

宜消導 兼降氣

山查

橘皮

草果

紅麴

枳實

朮

檳榔

草豆蔻

青皮

厚朴

穀麥蘖

縮砂蜜

因脾胃虛弱以致食停者消導藥中加人

參

○因瘀血者

忌補氣 酸飲

諸藥俱見前

宜辛溫苦溫以行血

桃仁

延胡索

紅麴

紅花

山查肉

牡丹皮

韭菜

通草

番降香

鬱金

肉桂

三稜

童溺

琥珀

菴藺子

牛膝

赤芍藥

○因血虛者按之則痛止

忌破氣 復忌補氣 燥熱 辛溫

諸藥俱見前

宜潤 補斂 甘寒 甘溫

麥門冬 炙甘草 酸棗仁 石斛

白芍藥 生地黃 當歸

○因蟲者

忌補 升 發散 甘

諸藥俱見前

宜殺蟲 苦 酸

錫灰 苦棟根 檳榔 鶴虱

雷丸 使君子 蕪荑 薏苡仁根

大黃 烏梅

○因惱怒者

虛弱人忌破氣 壯實人忌補氣 總忌酸

欽升

諸藥俱見前

宜降氣 辛溫

蘇子

枇杷葉

白豆蔻

番降香

縮砂蜜

木香

橘紅

延胡索

五靈脂

○因痰飲者

忌宜俱見痰飲證下

腹痛

○因於寒

忌苦寒 下利

諸藥俱見前

宜溫中 辛散

白朮

厚朴

乾薑

吳茱萸

桂

炙甘草

木香

縮砂蜜

橘皮

○因於熱火在少腹則絞痛

忌辛熱 香燥 補欵

諸藥俱見前

宜甘 苦寒

山梔仁 麥門冬 石解 白芍藥

甘草 桔梗 黃芩 黃連

滑石 木通 戎鹽

○諸痛不可按屬實

忌補氣 大熱

諸藥俱見前

宜破散 疏利 苦寒

枳實 青皮 檳榔 三稜

滑石 蓬莪茂 木通 大黃 有積滯宜

用無者勿用

○諸痛可按屬虛

忌破氣 破血 下利 發散

諸藥俱見前

宜補氣血 甘溫 酸斂

人參 黃耆 二朮 生地黃

當歸 炙甘草 白芍藥 薯蕷

酸棗仁 五味子

痺拘攣而痛也因風寒溼三者合而成風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺溼氣勝者為着痺

忌下 收斂 酸寒 苦寒 鹹寒

諸藥俱見前

宜辛散 行氣 燥溼 甘溫 淡滲

漆葉 續斷 黃耆 甘草

甘菊花 萆薢 防已 白朮

防風 羌活 獨活 秦艽

牛膝 木瓜 天麻 茯苓

澤瀉 苜蓿 車前子 桑寄生

狗脊 蔓荊實 杜仲 白蘚皮

石斛

細辛

松節

松葉

藁耳

原蠶沙

威靈仙

海風藤

痿屬溼熱經曰治痿獨取陽明

忌破氣 升

辛熱發散

諸藥俱見前

宜大補氣血

清熱除溼

甘寒

甘溫

苦寒 酸寒

人參

黃耆

二朮

炙甘草

生地黃

麥門冬

白芍藥

木瓜

石斛

薏苡仁

黃蘗

茯苓

澤瀉

車前子

木通

黃連

黃芩

交腸其病大小便易位而出或因大怒或因醉飽遂至臟氣乖亂不循常道法當宣吐以開提其氣使闌門清利得司秘別之職則愈矣

忌破氣 燥熱

諸藥俱見前

宜升清降濁 兼補氣 淡滲

升麻 柴胡 蘇子 降香

橘紅 人參 朮 茯苓

澤瀉 猪苓 木通 滑石

車前子

鬼疰尸疰飛尸客忤此係天地陰邪殺厲之氣
乘虛中人或遍身青黯或忽消瘦聲啞面色青

黃不定或忽驚厥目直視手握拳或遍身骨節
疼痛非常

忌破氣 復忌補氣 升 燥熱 酸斂

諸藥俱見前

宜辟惡氣 安神鎮心 辛香發散 金石

鎮墜

牛黃 丹砂 蘇合香 天竺黃

琥珀 沉水香 龍腦香 乳香

安息香 檀香 木香 麝香

真珠 雄黃 鬼臼 龍齒

犀角 金銀箔 虎骨 代赭石

天靈蓋 獾肝 生地黃 苜蒲

志

○婦人門

赤白帶下婦人多憂思鬱怒損傷心脾肝火時發血走不歸經所以多患赤白帶也白帶多是

脾虛蓋肝氣鬱則脾受傷脾傷則溼土之氣下陷是脾精不守不能輸為榮血而下白滑之物矣皆由風木鬱於地中使然耳法當開提肝氣補助脾元宜以補中益氣湯加酸棗仁茯苓山藥黃檗蒼朮麥門冬之類濃煎不時飲之再用六味地黃丸中加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大如豆空心饑時吞下五六錢陰虛火熾加枸杞子五味子黃檗白帶多屬氣虛補氣健

脾治法之要領也

帶下如濃泔而臭穢特甚者溼熱甚也且多有溼痰下墜者宜蒼朮白朮黃檗黃芩茯苓車前子為主佐以升提

帶下如雞子清者脾腎虛極也面色必不華足脛必浮腰腿必酸宜五味子八味丸間用開脾養心之劑如歸脾湯之類陰虛有火宜八味丸

加五味子菟絲子車前子黃檗叔和云崩中

日久為白帶漏下多時骨水枯蓋言崩久氣血虛脫而白滑之物下不止耳此證雖有氣血寒熱之分要歸總屬於虛

赤淋多因於心火肝火時熾不已久而陰血漸虛中氣漸損遂下赤矣治宜養心為主兼以和肝緩中涼血清氣

赤帶久不止則血虛宜膠艾四物湯加便煨牡蠣粉酸棗仁麥門冬

標急而元氣不甚憊者先救其標標急而元氣衰劇者則當本而標之可也

忌破氣 降 溫熱

諸藥俱見前

宜補斂 清熱 辛甘 苦寒 佐以淡滲

生地黃 人參 白芍藥 阿膠

山茱萸 黃蘗 五味子 麥門冬

白膠 枸杞子 續斷 杜仲

牛膝 白茯苓 車前子 澤瀉

蛇床子 香附 補骨脂 牡蠣

艾 二朮

血枯經閉由於脾胃薄弱氣血不生

忌破氣 破血 燥熱 膩膈滑腸 升發

苦寒

諸藥俱見前

宜補脾胃 甘溫 甘平

人參 蓮肉 酸棗仁 白菹豆

甘草 茯苓 薯蕷 橘紅

白芍藥 縮砂蜜 菟絲子 牛膝

牡丹皮 白膠 阿膠 芡實

麥門冬

經行先期為血熱

忌升 補氣 辛溫 燥熱

香附 當歸 烏藥 艾辛 巳上

餘忌藥俱見前

宜涼血清熱 補肝腎 兼降氣 甘寒

酸寒 苦寒

生地黃 牡丹皮 白芍藥 天門冬

麥門冬 枸杞子 杜仲 青蒿

枇杷葉 蘇子 鼈甲 阿膠

黃蘗 黃芩 知母

經行後期為血虛

忌行血 破氣 燥熱 苦寒

諸藥俱見前

宜補肝腎 甘溫 酸溫

熟地黃 薯蕷 人參 菟絲子

山茱萸 杜仲 續斷 阿膠

艾 五味子 當歸 枸杞子

白膠 牛膝

月事過多屬心火盛脾氣弱

忌破氣 降 辛溫 苦寒

諸藥俱見前

宜涼血 斂攝 酸平 甘寒

麥冬 生地 瀉泄 禁用 青蒿 生甘草

牡丹皮 白芍藥 酸棗仁 五味子

崩中屬氣血兩虛有熱

忌破氣 行血 降 溫熱 辛燥 苦寒

諸藥俱見前

宜補氣血 兼清熱 甘溫 甘寒 酸飲

人參 黃耆 生地黃 熟地黃

地榆 芍藥 白膠 阿膠

香附 續斷 甘草 麥門冬

山茱萸 杜仲 五味子 白茅根

蒲黃炒 桑耳灰 側柏葉 艾葉

木耳灰

熱入血室類傷寒或經事適來忽住或屆期不

行忽發大熱口渴或厥但不頭疼為異於傷寒
耳

忌補氣 溫燥 辛燥 收斂 下泄 大

熱 升發

諸藥俱見前

宜行血清熱 甘寒 鹹寒 苦寒

生地黃 牡丹皮 蒲黃 蘇木

牛膝 延胡索 麥門冬 犀角

白芍藥 黃芩

童溺

荆芥穗

如便閉加大黃

種子

內分男女氣虛血虛精寒
血熱火熾精滑因證選用

忌破氣 破血 燥 過用辛熱

諸藥俱見前

宜調氣補血 男子宜固精

桑螵蛸

溫平治男
子精滑

柏實

甘溫治男
子精滑

海狗腎

鹹熱治男
子精寒

魚膠

平治男
子精滑

陽起石

熱治男
子精寒

覆盆子

甘溫治男
子精滑

車前子

鹹寒治男
女火熾

鹿茸

溫鹹治男
子精寒

蓮鬚

甘溫治男
子精滑

巴戟天

溫治男
子精寒

何首烏

苦溫益男
子氣血

牛膝

苦平治男
子血虛陰痿

補骨脂

辛溫治男
子精寒陰弱

沙苑蒺藜

甘平男
子固精益血

白膠

溫平治男
女氣血兩虛精寒

肉蓯蓉

溫酸鹹治男
女血虛精寒

黃蘗

苦寒治男
女火熾

人參

微溫治男
女氣虛脾胃薄弱

麥門冬

甘寒男
女血熱

五味子

酸溫治男
女精滑精寒

山茱萸 酸溫治男女 天門冬 苦寒治男

蓮肉 甘平治男女 熟地黃 甘寒男女

白薇 溫平 當歸 辛溫

白芍藥 酸寒 紫石英 溫女

艾葉 辛溫

妊娠惡阻

忌破氣 升散 燥熱 苦寒 滑腸 膩

膈

諸藥俱見前

宜順氣 甘寒 酸寒

蘇子 橘紅 枇杷葉 白茯苓

麥門冬 蘆根 竹茹 木瓜

白芍藥 竹葉 人參 縮砂蜜

白梅 烏梅

安胎

忌破氣 破血 升散 辛熱 辛燥

諸藥俱見前

八月以後及胎前滯下者方可用枳殼氣
虛者不用

三月以前宜養脾胃四月以後宜壯腰腎補
血益陰順氣總宜清熱

茯苓

麥門冬

薯蕷

人參

芍藥

白朮

橘紅

炙甘草

縮砂蜜

艾葉

杜仲

生地黃

益母草

白膠

阿膠

續斷

黃芩

枸杞子

青蒿子

桑寄生

鯉魚

烏雌雞

葱白

胎漏屬氣血虛有熱

忌宜俱同安胎條

難產

忌破氣

破血

收斂

諸藥俱見前

宜補氣血 滑利 潤

人參 柞樹枝 魚膠 冬葵子

千里馬 白芷梢 牛膝 桂心

當歸 芎藭 益母草 百草霜

石燕 弓弩 麻油 猪脂

酒 生雞子 兔頭 滑石

麝香

預防血暈一腹痛坐草時即用蘇木菊花心者

一兩生地黃一兩降香末二錢水三盃煎一盃
加童便半盃兒墮地即飲之永無惡血衝心之
患房中常打醋炭萬一血暈亦須此藥更以家
寶丹一丸灌下神效○凡婦人氣弱者無氣力
送子出產門須服人參此藥能兼治橫生倒產
世豎不知也○凡臨產交骨不開惟濃煮柞木
枝湯飲之則自開柞木俗名一葉一刺其木枝
榦直上每一葉下必發一刺○胞衣不下用乳

香沒藥末各七分五釐麝香一分芒硝一錢五分研細以酒調服立下飲熱童便以滋藥力更妙

產後諸病

忌破氣 升 汗 噁 下 燥 苦寒

大熱

諸藥俱見前

宜行血 次宜補血清熱 總宜補養肝脾

腎 辛溫 甘寒 酸寒

蘇木 黑豆 鹿角末 紅花

乳香 沒藥 牛膝 炮薑

當歸 脾胃弱者勿用 桃仁 胃弱者禁用

桂 天寒無火之人可用 益母草 澤蘭

乾地黄 續斷 白膠 杜仲

山茱萸 人參 青蒿 麥門冬

白芍藥 五味子

產後少腹痛按之痛甚有結塊名兒枕痛

忌酸飲 補氣 破氣 升 下 汗 燥

諸藥俱見前

宜行血活血散結 兼健脾

延胡索 紅藍花 牡丹皮 蘇方木

山查肉 益母草 蓬莪茂 蒲黃

白膠 當歸 黑豆 生地黃

澤蘭 牛膝 五靈脂 縮砂蜜

橘紅 童便 桃仁 乾薑

痛極加乳香沒藥各六分七分天寒加桂暑月勿

用肺熱有火勿用

產後少腹痛按之即止者屬血虛

忌行血 破氣 汗 吐 下 燥 苦寒

大熱

諸藥俱見前

宜補血 補脾 和肝

乾地黄 白芍藥 當歸 續斷

白膠 阿膠 牛膝 人參

酸棗仁 麥門冬 炙甘草 大棗

薯蕷 橘皮

產後泄瀉

忌消導 滑腸 膩膈 發散 生冷 破

氣 苦寒

諸藥俱見前

宜溫中補氣 健脾開胃

人參 甘草 薯蕷 蓮肉

菹豆 茯苓 白芍藥 橘皮

車前子 肉豆蔻 內熱津液不足者少用

藿香 五味子 補骨脂 內熱火熾者勿用

縮砂蜜

產後發熱或自汗盜汗

忌苦寒 發散 升提 破氣 破血 下

辛燥 大熱 寒滑傷脾

諸藥俱見前

宜補血 涼血 補肝 補心 生津液

兼歛攝實表

乾地黃 炙甘草 白芍藥 五味子

麥門冬 酸棗仁 牡丹皮 童便

青蒿 鼈甲 澤蘭 黑豆

黃耆 人參 肺熱者禁用

產後頭痛由於血虛

忌發散 破血 升提 辛燥 大熱

諸藥俱見前

宜益血 涼血 降 甘溫 甘寒 佐以

酸寒

生地黃 甘菊花 烏梅 麥門冬

蘇子 童便 甘草 當歸

白芍藥 黑豆 五味子 鼈甲

產後發渴由於血虛有熱

忌同產後發熱

宜同產後發熱加蔗漿倍麥門冬五味子

產後氣喘由於氣血兩虛

忌同產後發熱

宜補氣血 潤肺 下降

人參 橘紅 生地黃 天門冬

麥門冬 蘇子 枇杷葉 栝樓仁

栝樓根 童便 五味子 竹茹

產後惡寒由於氣血兩虛

忌同產後發熱

宜補氣血 溫中 甘溫 佐以辛溫

人參 黃耆 炙甘草 乾地黃

龍眼肉 當歸 炮乾薑

產後小便不利或短赤由於腎水真陰不足

忌利小便 餘忌同產後發熱

諸藥俱見前

宜生津液 益陰 補血 涼血 清熱

甘溫 甘寒 酸寒

天門冬 麥門冬 生地黃 枸杞子

山茱萸 白芍藥 車前子 牛膝

五味子 青蒿子 鼈甲 竹葉

產後大便閉結由於血枯內熱

忌補氣 行血 辛熱 燥 下 升 苦

寒

諸藥俱見前

宜益血 涼血 潤燥 滋肝腎 生津液

生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬

五味子 蔗漿 牡丹皮 肉蓯蓉

當歸 麻仁 人乳 蜜

產後不得眠

忌同產後大便閉結

宜補心 降心火 補肝 補脾陰 兼清
內熱

生地黃 麥門冬 茯苓 丹參

沙參 酸棗仁 白芍藥 竹葉

遠志 蓮肉 龍眼肉

產後腹脹由於陰血虛脾陰虛

忌破氣寬中 升提發散 消導 吐下

甘 苦寒 鹹寒 大熱 溫燥 滯膩

諸藥俱見前

宜益脾陰 補脾 和肝 酸寒 收斂

甘溫

白芍藥 酸棗仁 人參 茯苓

石斛 橘皮 薯蕷 五味子

木瓜 蓮實 車前子 芡實

產後惡心欲嘔或吐由於胃虛

忌升提發散 溼潤 滯膩 苦寒 生冷

燥熱

諸藥俱見前

宜降氣

補氣

安胃

酸寒

佐以辛溫

蘇子

枇杷葉

竹茹

人參

橘紅

麥門冬

白芍藥

藿香

石斛

木瓜

白豆蔻

生薑

由於寒倍生薑白豆蔻藿香由於熱倍竹

茹去生薑白豆蔻藿香

下乳汁

漏蘆

狗四足

猪四足

麥門冬

人參

栝樓仁

土瓜根

葵子

猪胰

木通

○小兒門

痘瘡

○血熱證

忌溫補

燥熱

天靈蓋 雞冠血 桑蠹 鮫鯉甲

人齒 官桂 附子 丁香

木香 冰片已上燥熱 餘忌藥俱見前

宜涼血 活血 解毒 甘寒 苦寒

犀角 生地黃 人中黃 紫草

黃連 麥門冬 牡丹皮 白芍藥

童溺 連翹 金銀花 玄參

貝母 蟬蛻 鼠黏子

○虛寒證

忌汗 吐下 苦寒 酸寒

諸藥俱見前

宜辛甘發散 補氣 溫 瘡密者佐以解

毒

人參 紅鉛 黃耆 甘草

桂枝 丁香 當歸胃弱大便不閉者禁用

蓮肉 糯米 大棗 龍眼肉

乾葛 木香 忍冬藤

痧癰此證多有嘔吐者勿治嘔吐但治痧毒則嘔自止况嘔中便有發散之義

忌破氣 溫補 酸斂 燥熱 辛溫 滯

膩

諸藥俱見前

宜清熱透肌 辛寒 甘寒 苦寒

石膏 鼠黏子 赤檉木 即西河柳

知母 甘草 玄參 麥門冬

連翹 薄荷 竹葉 黃連

黃芩 葛根 黃檗 蟬蛻

栝樓根 青黛 蔗漿 貝母

如冬月佐之以辛散 荆芥

麻黃 去節沫蜜酒炒只可用一劑

痧癰者手太陰肺足陽明胃二經之火熱發而為病者也小兒居多大人亦時有之始時氣瘟

疫之類歟其證類多欬嗽多嚏眼中如淚多泄瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏是其候也治法當以清涼發散爲主藥用辛寒甘寒苦寒以升發之惟忌酸收最宜辛散誤施溫補禍不旋踵辛散如荆芥西河柳乾葛石膏鼠黏子麻黃清涼如玄參竹葉栝樓根青黛薄荷甘寒如麥門冬生甘草蔗漿苦寒如黃芩黃連黃檗貝母連翹隨證輕重制劑大小中病則已毋太過焉

痧癘乃肺胃邪熱所致初發時必欬嗽宜清熱透毒不得止嗽癘後欬嗽但用貝母苦梗甘草薄荷栝樓根玄參麥門冬以清餘熱消痰壅則自愈慎勿用五味子等收斂之劑多喘喘者邪熱壅於肺故也慎勿用定喘藥惟應大劑竹葉石膏湯加西河柳兩許玄參薄荷各二錢如冬天寒甚痧毒鬱於內不得透出者加蜜酒炒麻

黃一劑立止凡熱勢盛者卽用白虎湯加西河柳忌用升麻服之必喘多泄瀉慎勿止瀉惟用黃連乾葛升麻甘草則瀉自止癰家不忌瀉瀉則陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義也癰後泄瀉及便膿血皆由熱邪內陷故也大忌止澀惟宜升散仍用升麻甘草乾葛黃連白芍藥白菹豆便膿血則加滑石末必自愈
癰後牙疳最危外用牡黃牛糞尖煨存性研極

細加真片腦一分研勻吹之內用連翹乾葛荆芥穗升麻玄參黃連甘草生地黃水煎加生犀角汁二三十匙調服緩則不可救藥

痧後元氣不復脾胃薄弱者宜用白芍藥炙甘草爲君蓮肉山藥白菹豆麥門冬青黛龍眼肉爲臣多服必漸強慎勿輕用參朮

痧後生瘡不已餘熱未盡故也宜用金銀花荆芥穗連翹玄參甘草懷生地鼈虱胡麻黃連木

通濃煎飲之良痧癘不宜依證施治惟當治本
本者手太陰足陽明二經之邪熱也解其邪熱
則諸證自退矣

嘔吐因傷乳食者

忌升 苦寒

諸藥俱見前

宜溫中 消導

橘皮

縮砂蜜

枳實

厚朴

穀麥蘖 草果

山查

紅麴

半夏

人參

○因寒者

忌破氣

升

苦寒

諸藥俱見前

宜辛熱 溫中

藿香

橘皮

丁香

人參

白朮

生薑

半夏

白豆蔻

○因暑者

忌升 破氣 溫熱

諸藥俱見前

宜清暑 補氣 安胃 兼利小便

黃連 香薷 人參 木瓜

茯苓 竹茹 石斛 橘皮

甘草 白藕豆 麥門冬 白梅

滑石 木通 澤瀉

○有蟲者

忌升 甘

諸藥俱見前

宜酸斂 佐以苦寒

白芍藥 五味子 木瓜 黃連

棟根 烏梅 檳榔 梔子肉

木香 使君子 總之數嘔吐宜安胃

久則宜補氣

泄瀉

總忌破氣 下 滑利 滯膩

諸藥俱見前

○因食者

宜和胃消食

橘皮 草果 紅麴 穀麥蘖

白豆蔻 白朮 山查 白茯苓

肉豆蔻 縮砂蜜

○因溼者

宜燥脾 利水

二朮 橘皮 木瓜 茯苓

澤瀉 車前子 石斛 黃連

薯蕷 猪苓 升麻 葛根

○因暑者

前藥中加人參 蓮肉 白蘊豆

總之當補脾胃兼升兼利小便

急驚

忌補斂 升 燥熱

諸藥俱見前

宜降 清熱 鎮墜 豁痰 和肝

丹砂 琥珀 牛黃 天竺黃

貝母 竹瀝 鈞藤鈎 殭蠶

茯神 犀角 金箔 膽星

真珠 全蝎 龍腦 麝香

白檀香

慢驚多因久吐瀉大病後陰陽兩虛而成

忌破氣 下 升 苦寒 及治急驚藥

諸藥俱見前

宜補脾健胃 和肝益氣 甘溫 酸平

佐以辛熱

人參 黃耆 茯苓 白芍藥

甘草 龍眼肉 酸棗仁 石菖蒲

遠志

麥門冬

茯苓

冬瓜仁

橘紅

疔積

忌破氣

酸斂

燥熱

諸藥俱見前

宜除疔熱

兼消導

苦寒

甘寒

佐以

辛寒辛溫

胡黃連

川黃連

肉豆蔻

穀麥蘖

神麴

山查

木香

橘皮

白蕪荑

使君子

蘆會

白朮

白芙蓉花

五穀蟲

雷丸

青黛

厚朴

諸蟲

忌升 甘

諸藥俱見前

宜殺蟲

酸寒

苦寒

佐以辛寒

檳榔

雷丸

使君子

苦楝根

錫灰

鶴虱

盧會

芍藥

烏梅

黃連

黃芩

牽牛

胎毒

忌補斂

燥熱

辛溫

諸藥俱見前

宜涼血清熱

解毒

兼發散於外

勿從

外治以致熱毒內攻

生地黃

玄參

牡丹皮

黃蘗

黃連

忍冬藤

甘草

連翹

麥門冬

貝母

犀角

荆芥

鼠黏子

牛黃

○外科

癘風

忌破氣

酸斂

燥熱

下

諸藥俱見前

宜涼血 殺蟲 祛風 苦寒 佐以辛寒

辛平

豨薟 天門冬 甘菊花 生地黄

青黛 漆葉 苦參 何首烏

鼈虱胡麻仁 白芷 荆芥

天麻 續斷 羌獨活 半枝蓮

白花蛇 烏梢蛇 皂角刺

癰疽先後發渴

忌升 破氣 辛溫 燥熱 吐下

諸藥俱見前

宜活血 涼血 解毒散結

生地黄 連翹 忍冬藤 白芷

白及 白欵 茜草 紫花地丁

夏枯草 甘菊花 地榆 貝母

鼠黏子 黃檗 栝樓根 乳香

沒藥 芍藥 生菜豆 半枝蓮

白藥子 紅藥子 黃蠟 明礬
已潰者加人參黃耆麥門冬五味子

腫瘍

忌宜俱同癰疽先後發渴更忌當歸

癰疽毒氣攻心發譫語

宜以生菜豆粉丹砂乳香為丸服之

潰瘍

忌閉氣 苦寒 破氣 又忌燥

諸藥俱見前

宜補氣血 甘 酸溫 佐以解毒

人參 紅鉛 胎骨 黃耆

當歸 地黃 芍藥 甘草

白及 白歛 忍冬藤 甘菊花

貝母 薯蕷 大棗 五味子

麥門冬

○散毒 外傳

雄黃

雌黃

粉錫

礬石

龍腦香

松脂

地榆

水銀粉

鐵鏽

白及

白歛

漏蘆

檠木

青箱子

棟實

簡茹

石灰

鐵漿

苦參

菖蒲

槲皮

葵根

柳華

五加皮

梓葉

苧根

紫草

馬鞭草

艾灸

○止痛排膿

外傳

白及

白歛

大黃

乳香

沒藥

丹砂

紅藥子

龍腦

金華

白藥子

麥飯石

米醋

蜜

○去瘀肉

外傳

巴豆膏

輕粉

粉霜

烏梅肉灰

○蝕膿

外傳

蛙竹屑 藺茹 雄黃 白芷
大黃 巴豆 地榆 枯礬

○長肉收口 外傳

仙人杖 燒油 人參 金華 白蠟

黃蠟 血竭 蛙竹屑 枯礬末

黃芩末 珠末 象牙末 鉛丹

紅粉霜 胡粉 芝蔴油 豬蹄湯

疥瘡

忌補飲 溫熱

諸藥俱見前

宜涼血活血 解毒 祛風 汗下

生甘草 辟虺雷 茜草 生地黃

貝母 紫花地丁 白藥子

大黃 金銀花 蒼耳草 連翹

夏枯草 鼠黏子 礬石 內已上 半枝蓮

牛黃 蟾酥 紅藥子 白及

白欵已上內外龍腦

鐵鏞

桑礪

銅青雄黃已上外

瘰癧馬刀瘡附同屬少陽膽經治法亦同

忌補氣 辛熱 酸欵

諸藥俱見前

宜清熱散結 和肝涼膽 苦寒 甘寒

鹹寒 佐以辛寒

連翹 玄參 忍冬藤 紫背天葵

乳香 麝香 夏枯草 鼠黏子

貝母 天明精 沒藥 薄荷

肥皂莢 皂角子 何首烏 柴胡

黃芩 甘草 昆布 牡蠣

鼈甲 栝樓根 惡實 漏蘆

守宮煅 貓頭 天荷葉 映山紅

海藻 海蛤 蘇合油 雄黃

礬石 斑貓 蟾酥 鼈虱胡麻

回燕窩泥

瘦癩

忌宜俱同瘰癧兼宜

薜荔

半夏

文蛤

南星

通草

生薑

痔

有內外
二證

忌破氣

降

燥熱

辛溫

諸藥俱見前

宜涼血

活血

除大腸熱

兼升

去血

過多者宜補血

甘寒

苦寒

酸寒

以辛寒

生地黃

五倍子

黃連

黃芩

白芍藥

地榆

蝟皮

大小蘗

黃蘗

側柏葉

槐實

皂莢灰

熊膽

升麻

鼈甲

紅藍花

龍腦香

茜草

黃耆

赤石脂

猪懸蹄

蛇蛻

榧實

白礬

金銀花 青黛 象牙末 蛙竹屑

牛角鯢 白蠟

通腸漏

忌破氣 下 發散 溫燥 辛熱

諸藥俱見前

宜涼血 清利溼熱 解毒 消漏管 補

氣血 長肉

槐實 黃連 黃芩 青黛

地榆 白及 忍冬藤 半枝蓮

生地黃已上涼血解毒 猪懸蹄 黃牛角鯢

刺蝟皮 蛙竹屑 明礬 金頭蜈蚣

已上消漏管 黃耆 熟地黃 當歸

人參 白芍藥 五味子 牛膝

山藥 枯礬 黃蠟 白蠟

麻皮灰 鉛華 月經布 沒食子

已上補氣血長肉 天明精 地骨皮俱要鮮者

皮硝 文蛤 湯上煎濃

乳巖乳癰內外吹 忌補氣 升 溫補 辛熱 燥 酸斂

諸藥俱見前

宜散結氣 和肝 涼血活血 清熱解毒

貝母 橘葉 連翹 栝樓根

山慈菇 山豆根 蒲公英 紫花地丁

黃連 甘草 柴胡 白芷

青皮 橘皮 牡鼠糞 王不留行

乳香 沒藥 漏蘆 夏枯草

忍冬藤 栝樓仁 頭垢 人爪

鮫鯉甲 半枝蓮 茜根

陰蝕 即下部 蠶瘡

忌同乳巖

宜涼血活血 除熱散毒 苦寒 辛寒

青黛 茜草 苦參 鮮地骨皮

黃檗

小薊

艾葉

馬鞭草

木瓜

牛膝

木通

全蝎外

蛇床子外

橄欖核外

蛙竹屑外

猪脊髓外

青箱子外

膩粉外

官粉外

杏仁外

珠末外

皂角末外

鉛丹外

象牙末外

龍腦香外

白殭蠶外

粉霜外

煙膏外

天靈蓋外

滴乳石外

白蠟外

金磨

忌破氣

閉氣

升散

酸斂

苦寒

利燥

酸寒

諸藥俱見前

宜止血

和血

涼血

甘溫

甘寒

佐

以辛溫

地黃

麤蟲

當歸

續斷

牛膝

甘草

麥門冬

地榆

半夏

茜草

白膠

杜仲

芎藭

乳香

沒藥

艾葉

水楊花

釣樟根

黃荆子

炒黑

王不留行

古錢

自然銅

狗頭骨

黃麻皮灰

蘆竹籜

韭

大小蘄

內并

劉寄奴

花蓋石

內外

騏驎竭

內外

古石灰

外

白蠟

外

降香

外

海螵蛸

外

桑柴灰

外

人骨灰

外

紫檀末

外

三七

外

破傷風

忌同金瘡

宜同金瘡佐以祛風藥如白芷荆芥防風柴

胡之屬

跌撲傷損

忌同金瘡

宜同金瘡有瘀血停滯者宜加行血藥如桃

仁紅花蘇木自然銅廬蟲千年灰古文錢之

屬

踉折挫閃

忌宜俱同金瘡跌撲

火灼

忌燥熱 及寒物塗罨

井泥

冰

凉水

芭蕉根

醋已上寒物塗罨餘忌藥俱見前

宜拔散火毒

辛散

潤

甘寒

辛寒

苦寒

柴胡

葛根

甘草

升麻

黃連

麥門冬

連翹

栝樓根

石膏

黃檗

雞子油

柏白皮

生胡麻

食鹽

豆醬

黃芩

地榆

山梔

外用好酒滿浸傷處溫即易之如遍體被傷用酒滿浸時時易之即不死一方用蜜水潤之一方石灰水和生芝麻油敷治已

爛臭甚者神驗一方用黏米炒黑為末將菜汁調敷神效

漆瘡

宜蟹

茱萸皮

雞子白

杉材

石蟹

漆姑草

葑菜

炒熟
罨上

井中苔萍

神農本草經疏卷之二



