

血虛人四物湯頭疼惡風合羌活散腹痛合芍藥散寒熱而嘔<sub>反</sub>金<sub>反</sub>柴胡散上證全俱合服體氣虛甚加入參

頭疼惡風身熱自汗羌活散合石膏湯血虛者更合四物湯

身熱自汗腹痛石膏湯合芍藥散血虛者更合四物<sub>反</sub>寒熱腹痛柴胡散合芍藥散血虛者更合四物湯

頭疼惡風身熱自汗腹中痛寒熱而嘔<sub>反</sub>羌活散

石膏湯芍藥散柴胡散四藥合和血虛者更合四物湯

大抵羌活散治頭痛惡風石膏湯治身熱自汗芍藥散治腹中痛柴胡散治寒熱而嘔<sub>反</sub>四物湯治血虛四君子治氣虛無汗加葛根木川芎防風自汗加白朮黃耆茯苓有是諸證臨時選用合服不可執一而無權也

○瘡癆發熱要詳看

初發防荆敗毒安

赤水玉函 卷之五  
已潰還湏托裏散

忌投汙劑與涼寒

經曰：諸脉浮數當發熱，而灑淅惡寒。若有痛處，飲食如常，畜積有膿也。又曰：數脉不時，則生惡瘡也。所以惡瘡初生必寒熱交作，不可便以傷寒。治之湏視病人頭面脊背有無瘡頭，若有小紅白膿頭，瘡湏當仔細辨之。凡發背初作只起一小瘡也。不過二三十日，則大發也。若疔瘡初作全與傷寒相似，要當識之也。若一例而發汗，或妄投寒涼之劑，則誤矣。若識其瘡毒，湏濕瘡科治之庶不誤也。若毒氣走散，則難救矣。

初生在表，瘡毒正發，而未潰發熱惡寒，宜防荆敗毒散行涼敗毒散，隨證加減服之。若有涼血止痛草藥，可增入數味，在內和服，亦可取效。速如小薊五爪龍紫金皮金銀花之類，皆可用。如瘡毒已潰，宜托裏解毒湯，隨證加減，或有草藥乾膿散血之劑，亦可增入數味，可也。如小薊川山蜈蚣紫金皮之類是也。

初生未成者，速塞令消散，宜拔毒散。已潰爛者，

用鐵鎗散

○赤膈傷寒

赤膈傷寒，胸膈上

疼痛，赤腫，號為名。

防風敗毒宜加減。

裏實防風通聖靈

夫受傷於寒，變故萬狀，未易熟悟也。然胸膈赤腫疼痛，頭疼發熱惡寒，身躰痛，此非正傷寒，乃類傷寒也。名之赤膈傷寒，宜防荆敗毒散，加瓜萎子、黃連、黃芩、紫金皮、玄參、赤芍、升麻、白芷。有表復有裏，胸膈赤腫疼痛，防風通聖散，加瓜

萎子、黃連、紫金皮。

表證已退，大便燥實，胸膈腫痛，共涼膈解毒，加瓜

萎子、枳壳、桔梗、紫金皮、赤芍、桑枝，又宜稜鍼刺腫處，出益。

半表半裏，胸膈腫痛，柴胡枳桔湯，加瓜萎子、紫

金皮、赤芍、桑枝。

○黃耳傷寒

黃耳傷寒，耳痛詳。

要知風入腎經，散。

不治卒變成危證。

續命防荆敗毒良。

凡耳中策<sub>シテ</sub>痛者皆是風入於腎經也不治流  
入<sub>テ</sub>腎則卒然變惡寒發熱脊強背直如瘡之狀  
曰黃耳傷寒也此不可作正傷寒治乃類傷寒  
法也

治宜小續命去附子加白附子姜黃天麻羌活  
獨活蔓荆子細辛

次用防荆敗毒散加細辛蔓荆子白芷蟬蛻黃  
芩赤芍紫金皮

又法用苦參磨冷水滴入耳中熱則去之再易

又虎耳草取汁滴入耳中

又猴姜根取汁滴入耳中

又苦薄荷土木香擂汁滴入耳中

○解你類傷寒

解你傷寒出內經

寒如不寒熱不熱

四肢骨節苦伶仃  
治法通舒血氣寧

解者肌肉解散你者筋不束骨解散之證似寒  
非寒似熱非熱四肢骨節解散懈惰倦怠煩疼  
飲食不美食不知味俗呼為癆病內經名為解

脩原其因，或傷酒，或中濕，或感冒，風寒，或房事過多，或婦人經水不調，血氣不和，皆能為解。你證與砂病相似，實非真砂病也。治宜先用熱水蘸搭臂膊，而以苧麻刮之，甚者更以鍼刺十宣及委中，出益，或以香油燈照視身背，有紅點處皆烙之，皆能使腠理開通，血氣舒暢，而愈。又宜服蘇合香丸。

砂病類傷寒

壯熱憎寒肢痛酸

嶺南砂病類傷寒

鵝鴨鷄鴨毛糞煅

酒調灰服勝金丹

夫沙病者，嶺南閩廣之地，多有之矣。乃溪毒，砂風水弩射土蟻，短狐鯰鬚之類俱能含砂射入，被其毒者，則憎寒，壯熱，百脉分解，似傷寒初發之狀。彼土人治法，以手捫摸，痛處用角筒，入肉以口吸出其砂，外用大蒜煨搗膏，封貼瘡口，即愈。諸蟲惟鯰鬚最毒，若不早治，十死八九。其毒深入於骨，若鯰鬚之狀，其瘡類乎疔腫，彼地有鵝鴨鷄鴨毛糞，專食已上諸蟲，以此鳥毛糞燒

灰服之及籠此鳥於被毒病者身畔吸之其砂  
間氣自出而病愈也

○搖頭

搖頭直視似煙熏

真病心家已絕根

瘡證反張并口噤

頭中痛者戰而言

頭者諸陽之會陽脉有乖則頭為之搖動然有  
心絕而搖頭者有風盛而搖頭者形證皆不類  
焉陰根於陽根於陰陽互根氣血所以周  
流而無間若心絕則神去而陰竭陽獨無根不

能自主是以頭搖經所謂陽毒留形體如煙熏  
直視搖頭者此也至於太陽發痙則風盛於上  
風主乎動是以頭搖經所謂獨搖頭卒口噤而  
背反張者此也言搖頭中有痛也言則甚痛又  
云裏痛言者為虛不言為實均是搖頭析而分  
之曰實邪曰虛邪曰真邪當明其減否可灸百  
會上星風府其搖即定

○身痒

陰陽虛弱渾身痒

未解桂枝各半靈

風盛防風通聖散

血虛四物入浮萍

陽明反無汗皮中如蟲行以爻虛也木附湯薰

著建中湯

風熱盛身痒發熱無汗口燥舌乾大小便秘澁

防風通聖散加羌活

風證身痒小續命去附子加白附子

血虛身痒四物湯加浮萍養梨防風

未交接而作易病治

新產瘥後未交接

曾與言談起慾心

思慾切心因病復

女勞易病共條尋

夫男子病新瘥未與婦人交接而男子感動其情思其慾事心切而得病者治與女勞復同

人迎氣口脉

左手關前一分為入迎之位九脈緊盛迺傷寒也右手關前一分為氣口之位九脈緊盛迺傷食也若人迎氣口俱緊盛此為夾食傷寒又曰內傷夾外感也

衝陽脉

衝陽脉在足面去指縫陷谷三寸動脈中此陽明胃經之脉動於此夫胃為水穀之本入之所主若胃氣已憊水穀不進穀神以去其脉不動而死也故傷寒勝衝陽者以察胃氣之有無也仲景又謂之跌陽脉

○太谿脉

太谿脉在足內踝後陷中動脈是也此少陰腎經脉動於此蓋腎者乃人身之命蒂真氣之所主然其脉動而不息者真氣在也若真氣以憊腎氣以

絕其脉不動而死雖衝陽有脉而少能進食者亦主死也

○結脉

結者間至而動緩而一止復來者曰結此陰盛之脉凡傷寒脉結代心動悸者炙甘草湯若脉結足冷腹中痛陽氣以微者太建中湯君雜病之脉結者主有老痰食積死血在內為之可治君內無宿積其脉結者此為不相應病發多難治也

○促脉

促者間至而動數而一止復來曰促此陽盛之脉  
凡熱極發班發喘等証皆脉促也雜病則多因怒  
氣傷肝與失畜血在於上焦者皆脉促也大抵促  
脈漸退則生漸加則死矣

### 代脉

代者止也動而歇至不能自還曰代乃真氣以憊  
不可治若結而代者可治非結而獨代者為不可  
治也

或問近世多用藿香正氣散傷寒可用否然此方

宋時所制治內傷脾胃外感寒邪增寒拘急頭  
痛嘔逆胸中滿悶與失傷食傷苓傷濕中暑霍  
亂山嵐瘴氣不伏水土寒熱作瘡並宜增損用  
之乃良方也非正傷寒之藥若病在太陽經頭  
疼發熱骨節疼痛者此方全無相干如妄用之  
先虛正氣逆其經絡雖出汗亦不解此乃無益  
而反有害往誤用之遂至變逆危殆而不救良  
可悲夫凡傷寒發熱脉沉與元氣虛人并夾  
陰傷寒發熱者皆不可用切宜戒之

或問局方十神湯傷寒發散可用否然此湯用升  
麻葛根能解利陽明經瘟疫時氣發散之藥也  
蓋非正傷寒之藥若太陽經傷寒發熱用之則  
引邪入陽明經傳變發班不可勝言也易老云  
太陽病服葛根是引賊破家也要當辨而用之  
或問小柴胡湯近世治傷寒發熱不分阴阳而用  
之何也然柴胡之苦平乃足少陽經傷寒發熱  
之藥解半表半裏之熱除往来寒熱小有日晡  
潮熱也佐以黃芩之苦寒以退熱半夏生姜之

辛以散寒人參太東之甘溫以助正氣解渴生  
津液則阴阳和而邪熱解矣但太阳經之表熱  
陽明經之標熱皆不能解之也如誤用不無害  
乎若夾阴傷寒而亦發熱脉沉足冷者服之立  
至危殆可不慎哉及內虛有寒大使不實脉息  
小弱及婦人新產發熱皆不可用之也

或問大青龍湯仲景治傷寒發熱惡寒煩躁者服  
之可否夫傷寒邪熱在表不得汗出其人則  
躁亂不安身心無如柰何如脉浮緊或浮數者

急用此湯發汗則愈乃仲景之妙法也譬若亢  
熱已極下大雨而涼其理可見也若不曉此理見  
其躁熱投以寒涼之藥為害豈勝言哉若脉不  
浮濶數無惡風惡寒身疼者亦不可用之也如  
誤用其害亦不淺也所以脉證之不明者多不  
敢用

或問明證傷寒用附子湯冷服何也蓋陰極於下  
陽浮在上之治法也余曾治一人傷寒十餘日  
脉息沉細手溫而足冷大便不通面赤嘔煩渴

藥不能下惟喜涼水二三口或西瓜一二塊食  
下良久而復吐出此陰寒於內逼其浮陽失守  
之火聚於胸中上冲咽喉故為面赤嘔煩也遂  
用附子一箇以生姜自然汁和白麵包裹煨熟  
去麵取附子去皮臍切作八片又以人參三錢  
乾姜炮二錢水二中煎取一鍾浸於冷水中待  
藥冷與之即愈此良法也

或問三陽知可解者何以辨之曰太陽知可解者  
頭不痛項不強肢節不痛知表已解也陽明知

可解者無發熱無惡寒無口渴不便難知裏已解也少陽知可解者寒熱移其時早移於晚氣移於血晚移於早血移於氣是邪無可容之地知可解也如寒熱日作不移其時是邪未退也或問太陽禁忌不可犯者何也曰小便不利之是犯本犯本則邪熱入裏不能解此犯之輕也太便不利不可利之是動血動血是犯禁此犯之重也

或問治病必求標本治何標本耶曰假令太陽證

傷寒自外入標本有二說以主言之膀胱為本經絡為標以客邪言之先得者為本後得者為標此標先受之即是本也後入于膀胱本却為標也此乃客邪之標本治當從客之標本如麻黃桂枝治其標羌活藁本治其本也

或問陽明證禁忌不可犯者何也曰不當發汗不當利小便犯之竭其津液則生蓄血證唯當益津液為上以其火就燥也益津液者連鬚蕩荔白是也

或問半表半裏有癥曰邪在榮衛之間謂之半表半裏太陽下明之間少陽居身之半表裏五苓散分阴阳膀胱經之半表裏理中湯治吐瀉上下之半表裏

或問傷寒惡寒傷風惡風理之昭然不可易也緣麻黃湯下止言惡風桂枝湯下反言惡寒者何也曰仲景言傷寒惡寒傷風惡風言之常也桂枝治傷風麻黃治傷寒一定理也今桂枝湯下反言惡寒麻黃湯下止言惡風言之變也然惡

寒者必惡風惡風者未必不惡寒也

或問傷風汗自出桂枝湯以散其邪傷寒無汗麻黃湯以發其汗又言表證未解者用桂枝湯理似相反耶曰傷風汗出腠理自開傷寒已汗後腠理既開故並用桂枝湯以解肌可謂宜矣或問病有身重不能轉側者有身疼不能轉側者何也曰身重不能轉側者下後血虛津液不荣於外也身疼不能轉側者風濕相搏於經而裏無邪也經曰傷寒八九日風濕相搏身体頑疼

不能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者桂枝附子湯主之又曰傷寒八九日下之後胸滿煩驚不便不利譏語一身尽重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之二者頗類皆係不能轉側但有差殊耳

或問發熱惡寒發於陽無熱惡寒發於陰且如傷寒或發熱或未發熱必惡寒體痛二說皆曰惡寒如何辯之曰傷寒或發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆頭痛項強脉浮緊此在陽可發汗若

明証則無頭疼無項強但惡寒而勦脉沉細此在阴可溫裏也

或問傷風自汗與中暍自汗皆相似傷寒無汗與冬溫無汗皆相類敢問如何不同曰傷風不渴中暍即渴傷寒脉浮緊冬溫脉不浮也

或問經言用藥有言可與某湯或言不可與又有言宜某湯及某湯主之凡此數節肯意不同敢問曰傷寒論中一字不苟覈是書片言集字之間當求古人之用意處輕重是非得其至理而

後始可言醫矣所問有言可與某湯或言不可與者此設法藥病也又言宜其湯者此臨證審決也言其湯主之者乃對病施藥也此三者即方法之條目也

或問時人言下不厭遲汗不厭早斯言若何曰凡汗證固宜早仲景謂不避晨夜者此也夫下證湏從宜定奪當急則急當緩則緩安可一槩而論假如陽明病已有可下之理但合面赤其在後之熱尤未歛又如嘔多雖有陽明證謂熱在

上焦未全入府皆言不可妄凡此之類固宜遲也

或問傷寒論中有証同而藥異有藥同而證異皆非愚陋之可知也且如小青龍與小柴胡證皆治嘔而發熱表裏之病大槩彷彿何故二方用藥之不同誠為可疑也曰治病之要當究病源夫傷寒表不解裡熱未甚而渴欲飲水飲不能蓄故作諸證然水寒作病非溫熱不能解故用

小青龍湯發汗散水其水氣內漬則所搏不一故有或為之病因隨證增損以解化之原其理初無裏證自水寒以然也其小柴胡證係傷寒發熱之邪傳裏在乎半裏間熱氣內盛故生或為諸證緣二證雖曰表裏俱病其中寒熱不同故用藥有姜桂柴苓之異尚能循理以推之其事之異同自然明矣更復何疑

或問煩躁不得眠與虛不得眠皆汗下後之餘證夫煩躁以理言則為熱也虛煩者既言虛字非

實熱也何故煩躁反與姜附湯虛煩仍用梔子豉湯二藥天壤之隔其理何如曰煩躁本為熱分晝夜則知陽虛之煩不得眠無間斷故為裏熱經曰下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安静不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱乾姜附子湯退陰復陽其虛煩不得眠若剎者必反覆顛倒心中懊惱梔子豉湯以吐胸中之邪雖一二證俱煩而不得眠却有寒熱之異故不同然

或問經言脉浮而緊法當身痛宜用汗解之又曰  
發汗後身疼痛脉沉遲新加湯主之夫身疼痛  
皆係表邪不盡固宜汗解何故復加人參生姜  
芍藥以益血也曰表邪盛則身疼血虛則身亦  
痛其脉浮緊者邪盛也其脉沉遲者血虛也盛  
者宜損之則安虛者宜益之則愈

或問經言服桂枝湯或下之仍頭項強翕發熱  
無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯  
苓白朮湯主之夫頭項強痛為邪氣仍在表也

雖經汗下而未解猶宜解之何故去桂加茯苓  
白朮是無意於解表也曰此非桂枝證乃屬飲  
家也夫頭項強痛既經汗下而不解心下滿而  
微痛小便不利此為水飲內畜邪不在表故云  
去桂枝加茯苓白朮若得小便利水消腹滿減  
而熱自除則頭項強痛悉愈矣

或問經言結胸証其脉浮大者不可下之則死  
既不可下復作何術以治之曰夫陽沉浮閑沉  
乃結胸不可下之脉浮大心下雖結其表邪尚

多未全結也。若輒下之，重虛其裏，外邪復聚而必死矣。仲景言此為篤戒，使無踵其弊也。其脉既不可攻，當以俟其變，而待其實。假如小結胸證其脈浮滑，按之則痛，故和邪非深結，亦不敢下，無過解除心下之熱耳。

或問病方入胃何為不傳。曰：經言陽明居中土，萬物所歸，無所復傳。註曰：胃為水穀之海，主養四方，四旁有病皆能傳之。於胃入胃則更不復傳。如太陽傳之入胃，則更不傳。陽明陽明傳之入


胃，則更不傳。少陽少陽傳之入胃，則更不傳。三陰已上所言入胃不傳之理，乃聖賢之至論也。或問經言病人無表裡，證發熱七八日，雖脉浮數者，可下之緣，攻下之法湏外無表邪？裏有下證，庶幾可攻。今言無表裡，証况脉更浮數，何故許可下之？然此證此理非僕所知，敢問曰：此非外感，乃內傷也。若外不惡寒，裏無譫語，七八日，消爍津液，乃陽盛陰虛之時，苟不攻之，其熱不已而變生焉。故云脉雖浮數，可下之言，不待脉浮。

而數浮則傷胃，數則動脾。此非本病，特醫之所爲也。仲景之意不外是矣。凡傷寒當下之證，皆從太陽之明可下之邪而入於府也。故下之令不言陽明病而止。云病人無表裏證，此非自表之裏而病也。但為可下，故編于陽明篇中。此章之理，非初學所能備，悉其意也。

或問：六經傷寒，惟少陰與厥明有不治之證。以三經較之，少阴死證尤多，未審其理何如？曰：少阴者，腎也。位居子正，而一阳生於其中，是為復卦。


乃天地之根，宰輔之職，周旋運用，承上使下，一動一靜，莫非腎之功也。病至其經，已至危殆。陰陽兩全，雖弗咎，蓋無陽而陰獨居，故言其死。然乎中之陽氣微弱，凡病則易爲消減，其言死，多於厥陰也。  
不

大宮詹少溪吳馭閣校



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

婦人科赤水玄珠 小引



生々子曰舉全集而僉以赤水玄珠矣又分婦人科爲五卷而引之於首者何蓋術有專工而諸有缺至茲五卷中婦人之症已備而方已陳以婦人科爲專門者缺率五卷而精研其奧則臨症投劑一舉手而

玄珠錯陳矣不亦至易至簡乎故曰婦人  
科赤水業上卷文科者諺之

赤水玄珠婦人門第二十五卷目錄

薛氏校註合宜禁忌元例

調經門

經水或紫或黑論

居經

月經不通

崩

治赤白帶下

熱入血室

寡婦師尼寒熱如瘡

夢與鬼交

心胸嘈雜

赤才子集

二

痃癖疝瘕

脬轉小便不利

小便數

遺尿失禁

終

婦人全書目錄

薛氏校註合宜禁忌凡例

經水或紫或黑論

月經不通

治赤白帶下

熱入血室

寡婦師尼寒熱如瘡

夢與鬼交

心胸嘈雜

調經門

居經

崩

圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

痃癖疝瘕

脬轉小便不利

小便數

遺尿失禁

二卷

小便出血

陰痒

陰瘡

胎前惡阻痰逆

陰腫

陰挺下脫

交接輒血出痛

胎動不安

胎漏下血

妊娠心腹痛

妊娠小腹痛

妊娠數墮胎

墮胎血下不止

過期不產

妊娠吐血衄血

三卷

煩

胎氣上逼

妊娠腰背痛

妊娠心腹脹滿

胎不長

未足月欲產

妊娠欬嗽

妊娠煩躁口乾

風痙子癇

妊娠瘦癰

妊娠鬼胎

妊娠不語

傷寒熱病防損胎

妊娠傷寒

妊娠時氣

過時熱病

熱病胎死腹中

妊娠瘡疾

妊娠泄瀉

下痢黃水

大小便不通

小便不通

名曰轉脬

子淋

妊娠遺尿

妊娠尿血

胎水腫滿

腹內鍾鳴

妊娠癰

臟躁悲傷

滑胎方法

十產論

產難方論

交骨不開產門不閉

下死胎方  
胞衣不出

產難生死脉訣  
產後血暈

產後顛狂  
產後不語

狂言譖語

四卷

產後乍見鬼神

心神驚悸

中風恍惚

虛極生風

虛汗不止

汗多變症

口噤腰背反張

產後中風

四肢筋掣

遍身疼痛

產後腰痛

產後腹痛兒枕痛

產後寒疝腹痛

產後兩脇脹痛

產後血瘕

虛煩發熱

產後血渴

產後乍寒乍熱

產後瘡疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口臭黑鼻衄

月水不通

四肢浮腫

腹痛泄瀉

赤白痢

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大便秘澀

大小便不通

產後遺糞

產後諸淋

小便不禁

小便出血

玉門不閉

乳少或止 婦人繭唇

五卷

耳

雜方

結核方論

赤白遊風

婦人癆疾

鶴膝風

婦人足跟瘡腫

肺癰

乳癰乳岩

紋

新安生生子孫一奎著輯

薛氏校註令宜禁忘尤例

一云丹溪謂白芍藥性寒味酸產後宜忌恐伐生  
之氣若用之於大補湯八珍等湯內以酒拌  
炒用無妨凡屬脾胃虛寒虛弱面色痿黃者俱  
宜酒拌炒用

一通經丸若脾胃無虧暴怒氣逆或生冷所傷陰  
血凝滯月經不通者宜暫用之若脾胃虛弱不

能生血者宜用六君當歸若因脾胃鬱火內耗其血者宜用歸脾湯若因脾肝鬱怒氣血傷而月經不通者宜加味逍遙散

一艾附丸若脾胃虛寒陰血不足氣逆叢熱月經不調或胎氣不成者宜暫用之若肝腎虧損陰虛叢熱月經不調或崩漏帶下或便血吐衄小便淋澁或晡熱內熱寒熱往來或盜汗自汗不時條熱宜用六味地黃丸若兼脾氣不足飲食少思者佐以六君子湯

一四物湯若脾經血燥叢熱或月經不調宜暫用之若因脾經虛熱肝經怒火所致宜四君子佐加味逍遙散若因脾經氣虛血弱晡熱內熱宜用八珍湯加柴胡丹皮若因元氣下陷而致諸症宜補中益氣湯

一人參橘皮湯若胎前氣痞痰滯作嘔不食者宜暫用之若脾胃氣虛胸膈痞脹痰停作嘔飲食少思者宜半夏茯苓湯若因怒動肝火剋制脾土而致前症者宜六君子加柴胡山梔枳殼陳皮

胃虛寒者六君子加木香砂仁內半夏治脾胃虛諸症尤當用

一紫蘇順氣飲若胎動不安元氣無虧者宜暫用之若因脾氣虛弱者宜六君子加紫蘇枳殼薑結傷脾者宜四君子加紫蘇山梔蘿梗薑怒傷肝脾者六君子加紫蘇枳殼

一四物膠艾湯若內熱胎痛下血不止者宜暫用之若因肝經風熱而下血者用防風子芩芍君因肝火血熱宜加味逍遙散若脾經鬱火宜加

味歸脾湯若因肝氣虛陷宜補中益氣湯倍加升麻柴胡若因事下血者宜八珍湯加膠艾一黃芩白朮二味為安胎之藥若脾胃虛熱中氣無虧者宜暫用之凡屬脾胃虛痞飲食少思或泄瀉嘔吐面色痿黃肢脈倦怠者宜六君子湯一達生散若厚味安逸者宜用君麌蕘勞役者不宜用

一妊娠腹痛須驗其面赤舌青者此胎已死用平胃散加朴硝三錢下後隨用八珍大補等

湯調補之若唇口俱青吐出痰沫者子母俱死也若面白俱青者毋死子活產下亦死

一小續命湯若外中風邪腰背反傷筋脈癰癥者宜暫用之若產後失血過多陽火熾盛虛熱生風者宜八珍湯加鈞藤丹皮如不應當用四君子湯加當歸丹皮鈞藤若陽氣脫陷者宜補中益氣湯如不應急加附子氣虛血敗者宜用十全大補湯如不應急加附子亦有生者

一澤蘭湯若產後惡露腹痛胸滿少氣宜用之若

體倦面黃食少少寐而惡露不止宜加味歸脾湯若氣血虛損而惡露上攻先用失笑散後用八珍湯禁用黑神散奪命丹之類

一產後口鼻起黑氣鼻衄者是胃氣虛敗而血滯也急用二味參蘿飲多有生者

○宮人婦婦治驗

一婦人年三十有七早婦居兩腿骨作痛晡熱體倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小

柴胡湯合四物，數劑，肝症頓愈。又用加味逍遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑，血症漸痊。再用加味歸脾湯半餘而安。

一婦，兩腿作痛，或用除濕化痰等藥，遍身作痛，而無定處。此血症也。不信，乃服流氣飲之類，而效。

一放出宮人，年四十餘歲，脣內脰作痛，晡熱口乾，月經不調。此係肝經血少，不能養經絡，而然也。宜加味逍遙散加澤蘭葉五十帖。諸症稍緩，又

以歸脾湯三百餘劑而痊。

一放出宮人，脣腿腫痛，內熱，晡熱惡寒，體倦咳嗽，胸痞，月經過期，而少。彼以為氣毒流注，服清熱理氣之劑，益甚。此肝經瘀血停留，所致。蓋肝經上貫鬲布，脇肋循喉嚨下，循胸內廉，繞陰器抵少腹。主治之法，但當補其既不勝而制其所勝。補者，脾也；制者，肝也。經曰：虛即補之，實則瀉之。此定法也。彼不信，仍服前藥，遂致不起。

婦人症與男子無以異也。所異者，月水胎產崩帶。

等症耳今惟蒐其異與赤繫者集為一門餘雜症治同男子當於雜症門中求之茲不重錄

○調經門

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二十七而天癸至任脈通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣癸謂壬癸之水故云天癸也然衝為血海任主胞胎二脈流通經血漸盈應時而下常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後症相類若經行惱怒勞役則氣血

錯亂經脈不行多致癆瘡等疾若通於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暉脇痛嘔血而瘰癧癰瘍若經血內滲則竅穴淋瀝無已然此六淫外侵而變症百出犯時微若秋毫成患重如山岳可不畏哉

褚澄遺書曰飲食五味養骨髓肌肉毛髮男子為陽之中必有陰之中之數八故一十八而陽精升二十八而陽精溢女子為陰之中必有陽之中之數七故一十七而陰血升二十七而陰血溢皆飲食

五味之實透也方其升也智慮開明齒牙更始  
髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身財手足  
耳目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父  
母者以其精血嘗於父母之身無不歷也是  
以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則  
子一目不肖其父母然雌鳥牝獸無天癸而成  
胎何也烏獸精血往來尾間也精未通而御女  
以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之  
疾陰已瘦而思色以降其精則精不出而內敗

小便澁而為淋精已耗而復竭之則大小便卒  
痛愈痛即愈便愈便即愈痛女人天癸既至十  
年無男子合則不調未踰十年思男子合而不  
調不調則舊血不出新血悞行或漬而入骨或  
變而為腫後雖合而難子合多則滌枯虛人產  
衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

夫血者水穀之精氣也和調五臟洒陳六府男子  
化而為精女人上為乳汁下為經水故雖心主  
血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣

凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然。主子亨方論曰：經者常候也。謂候其一身之陰陽，愆伏知其安危故。每月一至太過不及皆為不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來。其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致故曰血氣和平則樂有子和則陰陽不爭月水以時下也。

薛氏曰：經云脾統血脈藏血。婦人多因恚怒傷肝鬱結傷脾所致。當從二經為主而參以前論治。

產寶方序論曰：大率治病先論其所。全男子調其氣，女人調其血氣。血者人之神也。然婦人以血為基本，苟能謹于調護，則血氣宣行，其神自清。月水為期，血凝成孕。若脾胃虛弱，不能飲食，榮衛不足，月經不行，肌膚黃燥，面無光澤，寒熱腹痛，難於子息，或帶下崩漏，血不流行，則成瘕症。○經水或紫或黑論。

丹溪曰：經水者陰血也。陰必從陽，故其色赤黑。

色也。血為氣之配，氣熱即熱，氣寒即寒。氣升則升，氣降即降。氣凝則凝，氣滯則滯。氣清則清，氣濁即濁。往往見有成塊者，氣之凝也。將行而痛者，氣之滯也。來後作痛者，氣血俱虛也。色淡者亦虛也。而有水濕之也。錯經妄行者，氣之亂也。紫者，氣之熱也。黑者，熱之甚也。令人但見其紫者，黑者作痛者成塊者，率指為風冷而行濕熱之劑，則禍不旋踵矣。良由病原論月水諸病皆曰風冷乘之，宜其相習而成俗也。或曰黑北方。

水色也。紫淡於黑，非冷而何？予曰：經云元則害承，乃制熱甚者必兼永化。所以熱則紫甚，則黑色也。况婦人性熱，而見鄙嗜慾加倍，臟腑厥陽之火無日不起。非熱而何？若曰：風冷必須外得設，或有之。蓋千百一二者也。

○治經水紫黑為熱例

海藏四物芩連湯 治經水如黑豆汁  
四物湯兩 黃芩兩 黃連各一 為末，醋糊為丸

服

冉溪治月水黑口渴倦怠脉不匀似數

黃柏炒黃芩各三錢甘草二錢赤芍藥香附各半錢

右醋糊丸白湯下五六十九

一婦二十歲月水二月不行忽行小腹痛有塊血

紫色白芍白朮陳皮各半錢黃芩川芎

木通各二錢甘草五分右水煎服

一婦氣滯血澁脉不瀉經不調或前或後紫色兩

大腿外廉麻木或時痒而生瘡大便秘滯

火麻仁

桃仁

芍藥各二錢

枳殼

歲靈仙

白朮

歸頭

阿子肉

生地

陳皮各五錢

大黃

錢七

為末粥丸

梧子大

白湯下

五六十九

○調經之劑

局方四物湯 治衝任虛損月水不調脅腹病痛

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

各半錢

水煎服

逍遙散

治血虛煩熱月水不調脅腹脹痛潮熱

咳嗽

錢五

炙甘草分當歸

茯苓

白芍

白朮

柴胡

錢一

右加薄荷葉生薑

水煎服

膠艾湯

治勞傷血氣

衝任虛損月水過多淋漓

鼎人合掌

卷末

不斷

阿膠

炒沙

川芎

炙甘草

各五錢

當歸

艾葉

炒各一錢

熟地

白芍

各二錢

水煎服

溫經湯

婦人血海虛寒月水不利。達臍疼痛。

桂枝桃仁湯萬味桂枝丸皆可用

當歸

川芎

芍藥

桂心

丹皮

莪朶

各五錢

人參

甘草

牛膝

各一錢

水煎服

再溪加味四物湯調經例

經候過而作痛，血氣俱虛也。宜本方對四君子，將來而痛者，血實也。本方加龜仁黃連香附。

經水不及期者，血熱也。本方加黃連。  
過期者，血少也。本方加參术，有痰加半夏陳皮。  
過期紫黑，有塊者，血熱也。必作痛，加香附黃連。  
過期而淡色者，痰多也。芎歸二味入二陳湯。  
紫色成塊者，熱也。本方加黃連柴胡。

肥人不及日數，而多瘀者，乃血虛有熱，本方加  
香附南星半夏黃連白朮。  
瘦人血枯經閉者，本方加龜仁紅花或越鞠丸。  
西物加減調經例

經水微少漸不通手足煩痛肌漸瘦生潮熱脉微數本方去川芎地黃加澤蘭葉三倍甘草半分

經水過多本方去熟地加生地

經行身熱脈數頭昏本方加黃芩柴胡各半兩經行微少或脹或疼四肢疼痛加玄胡沒藥

經候不調心腹疼痛只用芎歸二味名君臣散

元戎加味四物湯

氣充經脉故月事頻併腰下多痛本方加芍藥

經欲行臍腹絞痛本方加玄胡檳榔苦練木香

經水過多本方加黃芩白朮

經水溫少本方加葵花紅花

經水適來適斷或往來寒熱宜先服小柴胡去寒熱後以四物湯和之

簡易當歸散 經候不勻或三四月不行或一月再至或天癸已過期經脈不調 川芎 白芍

川芎 黃芩 白朮各半 山茱萸肉一兩

右為末每服空心溫酒調二錢日三服

寶鑑生地黃丸 治婦人血實厥陰，脉絃而長惡風體倦，下寒下熱，面赤心忪，或時自汗，如傷寒狀，宜服抑陽藥。

生地二兩 柴胡 秦艽 黃芩各半兩 芍藥一兩右為末，蜜丸，梧子大，烏豆湯吞三四十丸，日三服。薑黃散 治血臟久冷，月水不調，臍腹刺痛。當歸 丹皮 玄胡各二錢 芍藥三錢 川芎 紅花桂心 義術各四錢 川姜黃四兩右為末，每服一錢，酒水同煎服。

○理氣之劑

澹寮煮附丸 經候不調，血氣刺痛，腹脹，頭暉惡心，崩漏，帶下，並宜服之。

香附子擦去毛，米醋浸一日

右醋糊為丸，梧子大，每服五十丸，淡醋湯下。

艾附丸 治同前

艾葉四兩 川歸二兩 香附子一斤，照上製為丸，服亦同。嚴氏抑氣散 婦人氣盛，於血交生諸症，頭暉脹滿。

香附四兩 茯神 炙甘草各一錢 陳皮二兩

右為末，每食遠沸湯調下二錢。

正氣天香散 治婦人一切氣氣上壅心心胸攻築，脇肋刺痛，月水不調。台烏藥錢，香附八錢，陳皮 蘆薈各一錢，乾薑半錢，右分二帖水煎服。冉溪治一婦年四十八，因有白帶口渴，月經多初血黑色，後來血淡，倦怠食少，臍上急，白木半錢，紅花豆許，陳皮錢，木通，黃芩各五錢，縮砂一錢，甘草各三錢，枳殼五錢，白芍一錢，水煎吞，保和丸三十九，抑青丸二十九。

經水過多，黃芩炒芍藥炒各一兩，黃柏炒三錢，龜板炙一錢，香附二錢，椿根白皮七錢，酒糊為丸，白湯吞，五六十九。

一婦脉絃而大，不數，形肥，初夏倦怠，月經來時多此，稟受弱氣，不足以攝血，故行多也。黃芪，陳皮各一錢，白术錢，人参五錢，分炙甘草三分，水煎服。四物加熟地當歸湯，治經水少而色和。

四物湯四錢，熟地當歸各一錢。

丹溪抑氣丸，臨經之時腹痛，以四物湯加茺蔚子。

索陳皮丹皮甘草，痛甚以豆淋酒下。痛輕以童便香附入一條芩為丸。

文一 下婦年四十月水不調行時腹痛行後又有三四淋瀝皆穢水口渴面黃倦怠無力 白朮  
歸身尾六錢陳皮七錢黃連三錢木通 黃芪 黃芩  
各二 炙甘草一分八帖水煎吞五靈丸四十粒  
錢桂枝杏仁湯 經前腹痛不可忍 桂枝 茯苓  
生地各二錢 杏仁四錢甘草一錢薑三片棗一枚水煎  
服水煎當歸玄胡索 每一服三十錢薑二片  
水煎稍熱服

本事方 治婦人月經壅滯每發心腹脣疔痛不可忍及治產後惡露不快血上擔心迷悶不省人事氣絕欲死者琥珀散 京三稜 蓬莪木赤芍藥 劉寄奴 牡丹皮 熟地黃 官桂真蒲黃 菊花 當歸各一錢右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳○予家之秘方也若是尋常血氣痛只一

卷之三  
服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥亦宜多合以救人

交加散 治營衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛  
經血諸疾並皆治之 生薑二斤 生地二斤二味製  
白芍藥 當歸 桂心各一兩 紅花炒無惡血不用 沒藥  
另研各半兩 蒲黃陽升炒 玄胡索醋布包用布擦去皮各一兩 沒藥  
右將地黃汁炒生薑滓薑汁炒地黃渣各焙乾  
用諸藥為細末每服三錢溫酒調下 若月經  
不依常蘿木煎酒調下 若腰痛砂糖酒調下

交加地黃丸 治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼  
痛少 生地 老薑各一斤 玄胡 當歸 川芎  
芍藥各二兩 明沒藥 木香各一兩 杞仁去皮尖 人參  
各二兩 香附半斤 右為末先以薑汁浸地黃渣地黃  
汁浸生薑渣晒乾皆以汁盡為度共十一味作  
一處晒乾研為末醋糊為丸空心以薑湯下  
一婦患經血紫黑一月二次行不思食口苦時發  
熱少 麥冬 歸身 白芍 陳皮 白朮各一兩 人參 地黃 茯苓各半斤 木通三錢 生甘草一錢

右分十帖食前熟飲下柳青與點各十五丸  
益母草膏 益母草味結子時採來搗汁熬膏每

用半杯和酒或葷汁調服大治汚血及月經不

調

肥人不及期而多痰者血虛有熱南星白术蒼朮  
黃連香附川芎作丸服

婦人血脉不調往来寒熱狀如勞倦

川歸

川芎 甘草 黃芪 官桂 各一熟地 白术  
白芍 各二柴胡 阿膠 各半 右每服五錢裏一  
錢

枚水煎空心溫服為末白湯調下亦得常服則  
無帶下極調血脉養子宫終身無病

薛氏曰有脾經血燥而經先期者加味道遙散○  
脾經鬱火先期者歸脾湯○肝經怒火而先至  
者加味小柴胡湯○血分有熱而先至者加味  
四物湯○勞後火動補中益氣湯○有脾經血  
虛而後至者入參養榮湯○肝經血少而後至  
者六味地黃丸○氣虛血弱者八珍湯益血生  
于脾土故云脾統血凡血病當用苦甘之劑以

助陽氣而生陰血也

經行脅腹痛甚以龜仁桂枝湯一劑而瘥  
經行腹先痛用局方七氣湯送來復丹局方積氣  
丸療癬癥瘕諸氣亦效

丹參丸

調經養血

金陵一家專製此與四

杜仲丸

兩京甚重此二藥

丹參

淨四兩酒浸一宿日晒乾

大川芎

一兩半

川歸身

酒浸二兩淨

天台烏藥

一兩香附

三兩童便

浸炒七次只用淨末一兩

右為末煉蜜為丸梧子大每空心酒吞七十丸

○經水當止不止

婦人四十九歲已後天癸當往每月却行或過多  
不正乃血熱也宜芩心丸 黃芩心枝條二兩  
米泔浸七日炙乾又浸又炙如此七次為末  
丸梧子大每服七十丸空心溫酒送下日三  
良方曰婦人月水不斷淋瀝腹痛或因勞損氣血  
而傷衝任或因經行而合陰陽以致外邪客於  
胞內滯於血海故也但調養元氣病邪自愈若  
攻其邪則元氣反傷矣

薛氏曰前症若是鬱結傷脾用歸脾湯，憲怒傷肝

逍遙散肝火妄動如味四物湯脾氣虛弱六君子湯元氣下陷補中益氣湯熟傷元氣加麥冬

五味黃柏炒黑

許學士云經脈過期不及腰腹疼痛或七七數盡而月經仍下者宜用簡易當歸散治之方見調

者夫黃芩加桂心一兩

黃芩湯 治經血不止 方出崩

○居經

婦人月水當三旬一至見今三月始一至名曰居經

脉經曰少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒瀆即血不来此為居經三月一來

脉經曰婦人年已五十一旦而清血二三日不正何以治之師曰此婦人前絕生經水不下今反清血此為居經不須治當自止絳水下常五日止者五日愈

○月經不通 出婦人良方

婦人月水不通或因醉飽入房或因勞後過度或因吐血失血傷損肝脾但滋其化源其經自通

大  
卷二十一  
七  
若小便不利。若頭眩痛。腰背作痛。足寒時痛。久而血結于內。變為癥瘕。若血水相併。脾胃虛弱。壅滯不通。變為水腫。若脾氣衰弱。不能制水。水漬肌肉。變為腫滿。當益其津液。大補脾胃。方可保生。

東垣曰。經閉不行。有三婦人。脾胃久虛。形體羸弱。氣血俱衰。而致經水斷絕。不行。或病中消胃熱。善食漸瘦。津液不生。夫經者。血脉津液所化。津液既絕。為熱所燼。肌肉漸瘦。時見渴燥。血海枯

竭。病名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥。熟補益氣血。經自行矣。此症或經適行。而有孕子。亦不安。為胎病者。有矣。

或心包脉洪數躁。作時見大便秘澀。小便雖清。不利。而經水閉絕。不行。乃血海乾枯。宜調血脉。除包絡中火邪。而經自行矣。

或因勞心。心火上行。月事不來者。胞脉閉也。包脈者屬心。而絡于包中。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不來。宜安心補血。瀉火。經自行矣。