



醫學綱目卷之三十

傷寒部

傷寒通論

續傷寒通論

大法

仲凡傷於寒則為病熱熱雖甚不死若兩感于寒而病者

必死 尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其脈上

連風府故頭項痛腰脊強 尺寸俱長者陽明受病也當

二三日發以其脈俠鼻絡于目故身熱目疼鼻乾不得卧

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脇絡

于耳故胃脇痛而耳聾此三經皆受病未入於腑者可汗

而已

尺寸俱沉細者太陰受病也當四五日發以其脈布胃中

絡於噎故腹滿而噎乾 尺寸俱沉者少陰受病也當五

六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

也 云經云一二日少陰者謂初中病時便入少陰不經三陽也 大抵傷寒發于陽則太陽也發于陰則少陰也凡病一

三日前
病傳三
陽宜汗

三日後
病傳三
陰宜下

三日陰陽俱傳日兩感者多死

三日前無陽明少陽注不傳陽

日至今十二三日太陽症不能罷者俱治太陽有初得病便見少陰症者宜攻少陰亦不必先自巨陽蓋寒入太陽即發熱而惡寒入少陰即惡寒而不熱 尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七

若兩感於寒者一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死若三陰三陽五臟六腑皆受病則榮衛不行臟腑不通而死矣

傷寒一日太陽受之脈若靜者為不傳頗欲吐若躁煩脈微急者為欲傳也 傷寒二三日陽明少陽症不見者不傳也

三日後能食不嘔者不傳陰三日脈微小而身溫者欲解

傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

七日傳經盡當病衰

問曰傷寒三日脈浮數而微病人身溫和者何也荅曰此為欲解也以夜半脈浮而解者澌然汗出也脈浮而解者必能食也脈不浮而解者必大汗出也 三日少陽脈小欲已也

論見口苦舌乾

其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九日少陽病衰

耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日

少陰病衰渴止舌乾已而嚏也十二日厥陰病衰囊縮少

腹微下大氣皆去病人精神爽慧也 太陽病頭痛至七日已上自愈者行其經盡故也若欲再傳經者針足陽明

使不傳則愈

七日脈大煩躁者解

六七日脈至皆大煩而口噤不言躁擾者必欲解也論見後條

十三日不減脈沉者危

若過十三日已上不間間廖尺寸陷者大危

更感異氣者變他病

若更感異氣變為他病者當依舊壞症而治之若脈陰陽俱盛重感於寒者變為溫瘧 陽脈浮滑陰脈濡弱者更

遇於風變為風溫 陽脈洪數陰脈實大者遇溫熱變為溫毒為病最重也 陽脈濡弱陰脈弦緊者更遇溫氣變

為溫疫以冬傷於寒發為溫病脈之變症方治如說見後條

凡發汗欲令手足皆周至熱熱然一時間許益佳不可令

如水流漓耳若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得

重發汗也活人云發汗必須如常覆蓋腰已上厚衣覆之

微潤病終不解凡云可發汗而無湯者丸散亦可用要以汗出

為解然不如湯隨症良驗 凡發汗溫服湯藥其方雖言

日一二服若病劇不解當促其服可半日間盡一二服若

與病相值即便有所覺重病者一日一夜當晬時觀之如

服一劑病症猶在故當復作本湯服之至有不肯汗出服

三劑乃解若汗不出者死病也 凡服湯藥發汗中病即

止不必盡劑吐下亦如之

許學士云記一鄉人傷寒身熱大便不通煩渴鬱冒醫者

用巴荳下之頃得溏利宛然如舊予觀之陽明結熱在裏

非大柴胡承氣不可巴荳止去積不能蕩滌邪熱蘊毒亟

進大柴胡等三服得汗而解嘗謂仲景一百一十三方為

丸者有五理中陷胃抵當烏梅麻仁是以理中陷胃抵當

皆大如彈子煮化而服與湯散無異至於麻仁治脾約烏梅治濕蠶皆用小丸以達下部其他逐邪毒破堅癖導淤血潤燥養之類皆憑湯劑未聞用巴荳小丸藥以下邪氣

也既下而病不除不免重以_{大黃芒硝}下之安能無損也哉

欲攻當先表後下

凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣擬欲攻之猶當先解表乃可下之若表已解而內不消大滿大實堅有燥屎者自可除之雖四五日不能為禍也服桂枝湯大汗出脈洪大者復與桂枝湯如前法論見

汗症汗後不罷者再汗

發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗活人云凡發汗病在者三日內可二三汗之令腰已下周遍為度

汗吐下溫針後不解為壞症

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈重針仍不解者此為壞症桂枝不中與也觀其脈症知犯何逆當隨証治之夫病陽多者熱下之則鞭無陽陰強大便鞭者下之則必

下後症

清穀腹滿

診病

脈師持脈病人欠者無病也脈之呻者病也言遲者風也

搖頭言者裏痛也行遲者表強也坐而伏者氣短也坐而

下一脚者腰痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也寸口

諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸乘寒者則為

厥鬱胃不仁以胃無穀氣脾滯不通口急不能言戰而慄

也微脈極細而軟濡脈極軟而沉細而浮細弱脈極軟而沉細

病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言其人躁

擾必欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知脈浮故知

汗出解也若脈和平其人大煩目重臉內際黃者皆為欲

解也

寸關尺同等者當愈

河曰脈病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脈為陰陽

和平雖劇當愈針經禁服篇云寸口人迎兩者相應若引

與喉旁之人迎脈等齊為平人後條云六凡得病厥脈

動數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈症也

脈浮數而微病人身溫和者欲解也論見前條凡病反能飲

水者為欲愈論見腹渴太陰中風脈陽微陰濇而長者為欲

愈論見腹滿少陰中風脈陽微陰浮者欲愈論見厥陰中

風脈微浮者欲愈不浮未愈

太陽病巳至未解見發熱陽明病申至戌解見胃

少陽病寅至辰解見口苦太陰病亥至丑解見腹

少陰病子至寅解見微厥陰病丑至卯解見氣上

問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令日中得病夜半

愈者以陽得陰則解也夜半得病日中愈者以陰得陽則

解也病家人請云病人苦發熱身軀疼痛病人自臥師到

診其脈沉而遲者知其瘥也何以知之表有病者脈當浮

大今反沉遲故知愈也假令病人云腹內卒痛病人自坐

師到脈之浮而大者知其也何以知之若裏有病者脈

當沉而細今脈浮大故知愈也

問曰病有戰而汗出者因得解者何也答曰脈浮而緊按

之反芤此為本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰

以脈浮故當汗出而解也

若脈浮而數按之不芤此人本不虛若欲自解但出汗耳

不發戰也問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脈大

而浮數故知不戰汗出而解也

問曰病有不戰不汗出而解者何也答曰其脈自微此以

能飲水者欲解三陰病脈浮長者欲愈

三陽昼解三陰夜解

昼得夜解夜得昼解

脈浮緊按之芤

當戰而汗解

脈浮大按之不

芤當不戰而汗

解脈微當不戰不

汗而解

汗而解

汗而解

右海藏云戰而後解者太陽也不戰有汗而解者陽明也不戰無汗而解者少陽也

診生死

太陽病未解脈陰陽俱停必先戰慄汗出而解陽微者汗解陰微者下解論見發熱篇凡脈大浮數動滑此名陽也沉

瀦弦弱微此名陰也凡陰病見陽脈者生陽病見陰脈

者死陰陽俱盛大汗出不解者死陰陽俱虛熱不止者

死又診生死詳法並見診法門

服藥正如方法縱意違師不須治之

脈沉為在裏而反發其汗則津液越出大便難表虛裏實

久則譫語也論見譫語脈浮緊者法當身疼痛宜以汗解之

假令尺中遲者不可發汗何以知之以榮氣不足血少故

也活人云先以小建中湯加黃芪如尺脈尚遲再作一劑却服未胡桂枝二越婢一湯其湯分小劑和解之愈

許學士云一鄉人丘生者病傷寒發熱頭疼煩渴脈雖浮

數無力尺以下遲而弱予曰此雖麻黃症而尺遲弱仲景

云尺中遲者榮氣不足血氣微少未可發汗予於建中湯

加當歸黃芪令飲翼日脈尚爾其家煎迫日夜督發汗藥

幾不遜矣予忍之但只用建中調榮而已至五日尺部方

應遂投麻黃湯發一服發狂須臾稍定略睡已中汗矣信

知此事誠難仲景雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧

其表裏虛實待其時日若不循次第暫時得安損虧五臟

以促壽限何足貴哉昔南史載范雲傷寒恐不得預武帝

九錫之慶召徐文伯診視以實懇之曰可使得愈乎文伯

曰便瘥甚易只恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶

可况二年乎文伯以火燒地布桃葉設席置雲於其上頃

刻汗解撲以溫粉翼日果愈雲甚喜文伯曰不足喜也後

二年果卒夫取汗先期尚促壽限况不顧表裏不待時日

禁忌

諸脈沉

及尺脈

遲者忌

汗

便欲速効乎每見病家不柰病未三四晝夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事予故書此為戒

諸脈浮及外實

脈浮大應發汗醫者反下之此為大逆 諸外實者不可

外未解諸虛者忌下

下下之則發微熱脈厥者當臍握熱 諸虛者不可下下

之則大渴求水者易愈惡水者劇 太陽症表未解不可

下下之為逆 論見發熱

諸脈濡弱微澁者忌汗下

脈濡而弱弱反在關濡反在顛微反在上瀯反在下微則

陽氣不足瀯則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩瀯則

無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠 陽微不可下下之

則心下痞鞭 陽微不可下當是復不可下之

諸脈浮數者忌火

脈浮熱甚反灸之此為實以虛治因火而動必咽燥唾吐

微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血

散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也 脈浮

宜汗反用火灸之邪無從出腰以下必重而痺 論見下重

有汗便數飲酒者忌桂枝

桂枝本為解肌若其脈浮緊發熱無汗者不可與也常須

識此勿令悞也 脈浮自汗小便數微惡寒脚攣急忌桂

枝湯攻表 論見厥 酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔以酒

客不喜甘故也

便澹忌梔子誤下諸變症

凡用梔子湯病人舊微澹者不可與服之

若不冝下而便攻之內虛熱入挾熱遂利煩躁諸變不可

勝數輕者困篤重者必死矣 太陽病下之其脈促不結

胃者此為欲解也脈浮者必結胃也脈緊者必咽痛脈弦

者兩脇必拘急脈細數者頭痛未止脈沉緊者必欲嘔脈

沉滑者挾熱利脈浮滑者必下血

續傷寒通論

發熱惡寒身痛

發熱惡寒身痛而脈浮者表証也表証者惡寒是也

脈浮為表

發熱惡熱便硬腹滿脈沉為裡

惡寒者屬太陽宜汗之

成惡寒一切屬表雖裏症悉具而微惡寒者亦是表未解也猶當先解其外候不惡寒為外解乃可攻裏也

不惡寒反惡熱手掌心并腋下濺濺汗出胃中乾燥結聚潮熱大便鞭小便如常腹滿而喘或譫語脈沉而滑者裏症也裏症者內熱是也內熱者屬陽明宜下之 傷寒始

發熱惡寒今汗後不惡寒但倍發熱而躁始脈浮而大今脈洪實或沉數細始惺靜今狂語此為胃實陽盛再汗即死須下之則愈亦有始得病便變陽盛之症須便下之不

可拘以日數更有心胸連腹臍大段痞悶腹中痛坐臥不安胃悶喘急極者亦不問他症便下之若失下則氣血不通四肢便厥醫人不知反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌不可不察也

寒熱往來脇滿脈弦為半表半裡

表裡俱見

成邪之客於表者為寒邪與陽相爭則為寒矣邪之入於裏者為熱邪與陰相爭則為熱矣邪在半表半裏外與陽

爭而為寒內與陰爭而為熱是以往來寒熱邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪半在表半在裡則寒熱亦半矣邪在表者必瀆形以為汗邪在裏者必蕩滌以取利其餘不外不內半表半裏又非發汗之所宜亦非吐下之所對

是當和解則可矣小柴胡為和解之劑也

活傷寒表症當汗裡症當下不易之法也發表攻裡本自不同甘遂神丹不可合飲桂枝承氣安可並進然而假令病人脈浮而大是表症當汗其人發熱煩渴小便赤却當下此是表裡俱見五苓散主之 假令傷寒不大便六七

日頭痛有熱者是裏症當下其人小便清者知不在裏仍在表也當須發汗此是兩症俱見即未可下宜與桂枝湯

假令病人心下滿口不欲食大便鞭脈沉細是裏症當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩症俱見者仲景所謂半在表半在裏也小柴胡主之 假令太陰病表症未除而醫數下之遂挾熱而利不止心下痞鞭仲景謂之表裏不解桂枝人參湯主之 本太陽病醫反下之因爾腹痛是有表復有裡仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃 又云太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃芩湯主之此皆仲景治傷寒有表復有裡之法也

海大柴胡湯治表裡內外俱熱之症治有表者或脈浮或頭痛或惡風或惡寒四症中或有一二尚在者乃十三日過經不解是也治有裡者或譫語或妄語或擲手揚視此皆裡之急者也若欲汗之則裡症已急欲下之則表証尚

在通宜大柴胡湯

無表裡症

傷寒四五日後以至過經無表症又於裡症未可下者皆可用小柴胡隨証加減用之以至十餘日亦可用十餘日外用小柴胡不愈者若大便鞭看症可下則用大柴胡下之以過經其人稍虛當下者用大柴胡湯則穩當恐承氣太緊病人不禁也仲景云六七日目中不了了睛不和無表裡症大便難身微熱此爲實也當下之宜大承氣湯又云病人無表裡症發熱七八日脈雖浮數可用大柴胡下之假令已下脈數不解至六七日不大便者有瘀血也屬抵當湯

百病皆分表裡

治傷寒須分表裡若表裡不分汗下差誤豈爲上工且如均是發熱身熱不渴爲表有熱小柴胡加桂枝主之厥而脈滑爲裡有熱白虎加人參主之均是水氣乾嘔微利發

熱而咳為表有水小青龍加芫花主之体凉表症罷欬而
脇下痛為裡有水十棗湯主之均是惡寒有熱而惡寒者
發於陽也麻黃桂枝小柴胡主之無熱而惡寒者發於陰
也附子四逆主之均是身軀痛脈浮發熱頭痛身體痛者
為表未解麻黃湯主之脈沉自利身體痛者為裏不和四
逆湯主之以此觀之仲景表裏之法甚詳學者宜深究心
也

半表半
裡不同

海半表半裏者有幾夫邪在榮衛之間謂之半表半裏也

太陽陽明之間少陽居身之半表半裏也五苓散分陰陽
膀胱經之半表半裏也理中湯治吐泄上下之半表半裏
也

頭身
熱脈浮
洪為陽

活太陽陽明少陽皆屬陽症也太陽者膀胱也發熱惡寒
頭疼腰痛而脈浮也陽明者胃也不惡寒反惡熱濇瀉汗

出大便秘潮熱而脈長也少陽者膽也口苦咽乾脇下滿
發熱而嘔或往來寒熱而脈弦也麻黃湯大青龍湯桂枝
湯治太陽傷風寒也大柴胡湯調胃承氣湯小承氣湯大
承氣湯治陽明傷寒也小柴胡湯治少陽傷寒也其他藥
皆發汗吐下後症也若陽氣獨盛陰氣暴絕即為陽毒必
發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑如錦紋或下利黃赤脈
洪實或滑促當以酸苦之藥投之令陰氣復而大汗解矣
古人云酸苦涌泄為陰謂苦參大青葶藶苦酒之類皆復
其陰氣也微用苦甚則兼用酸苦折熱復陰若熱極發厥
陽症似陰者學者當以脈別之

吐利厥
陰脈沉
微為陰

太陰少陰厥陰皆屬陰症也何謂太陰症太陰脾之經主
胃膈膜脹何謂少陰症少陰腎之經主脈細心煩但欲寐
或自利而渴何謂厥陰症厥陰肝之經主消渴氣上衝心

心中疼熱饑不欲食食則吐虵下之利不止也三陰中寒
微則理中湯稍厥或中寒下利即乾姜甘草湯大段重者
用四逆湯無脈者用通脈四逆湯若陰氣獨盛陽氣暴絕
則為陰毒其症四肢逆冷臍腹築痛身如被杖脈沉實病
或吐或利當急灸臍下服以辛熱之藥令復陽氣而大汗
解矣古人云辛甘發散為陽謂桂枝甘草乾姜附子之類
能復其陽氣也微用辛甘甚則用辛苦若陰極熱躁陰症
似陽者學者亦當以脈別之

陰症陽
症辨

羅陰症陽症辨

靜江府提刑李君長子年十九歲四月

病傷寒九日醫者作陰症治之與附子理中丸數服其症
增劇別易一醫又作陽症議論差互不敢服藥李君邀予
往視坐間有數人予不欲直言其症但細為分解令自忖
度之凡陽症者身大熱而手足不厥臥則怛然起則有力

不惡寒反惡熱不嘔不瀉渴而飲水煩躁不得眠能食而
多語其脈浮大而數者陽症也凡陰症者身不熱而手足
厥冷惡寒踈臥惡聞人聲或自引衣蓋覆不煩渴不飲食
小便自利大便反快其脈沉細而微遲者陰症也今診其
脈數得六七至其母云夜來叫呼不絕全不睡又喜飲冰
水予聞其言知陽症悉具且三日不見大便宜急下之予
遂以酒煨大黃六錢甘草炙二錢芒硝五錢煎服至夕下
數行燥糞二十餘塊是夜汗大出明日又往視之身涼脈
靜矣予思素問熱論云治之各通其臟腑故仲景述傷寒
論云六經各異傳變不同活人亦云凡治傷寒先須明經
絡其義一也昧者不學經絡不問病源按寸握尺妄意病
症不知邪氣之所在動致顛覆真盲醫哉昔韓子云醫之
病病在少思真理致之言也學者審之

陰症似陽陽症似
陰並見陰陽藏府

部發寒熱
反右条

汗下大
法汗下
但當隨
症不可
拘日數

未滿三日可汗而已滿三日者可泄而已此大略言之
耳凡病人有虛有實邪氣傳受遲速不同豈可拘以日數
仲景云日數雖多但有表症而脈浮者猶宜發汗日數雖
少若有裏症而脈沉者即宜下之正應隨脈治之又況六
氣之邪乘虛之經皆自背得之則入太陽或入少陰自面
感之則入陽明之類不必皆始於太陽也兼寒邪有首尾
止在一經或間傳一二經不可以一理推但視脈與外症
治之此活法也假令有人脈浮頭項強痛發熱而惡寒每
日如此下以日數多少正是太陽經受之其餘經皆倣此
天抵傷寒惟憑脈與外症以汗下之若過日多脈尚大浮
數按之不足者尚責太陽也可發汗而愈若按之實者汗
之必死須下之而愈也若始病脈沉細數外症或腹滿咽

辨傷寒
傷風汗
症不同

乾或口燥舌乾而渴為熱正責屬裏可下之而愈若無此
症表熱脈沉誤下者必死須用麻黃附子甘草麻黃細辛
附子湯少發汗以治之此皆仲景之確論也 傷寒脈浮
而緊身軀拘急惡寒無熱寒多熱少面色慘而不舒腰脊
疼痛手足四末微厥此麻黃症也 傷寒脈浮而緩寸大
而尺弱自汗體熱頭疼惡風寒多熱少其面光而不慘煩
躁手足不冷此桂枝症也

傷寒者脈緊而濇傷風者脈浮而緩傷寒無汗傷風有汗
傷寒畏寒不畏風傷風畏風不畏寒大抵太陽病者必脈
浮發熱惡風惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風
而憎寒也 六經皆有傷風傷寒其症各異太陽脈浮有
汗為中風脈緊無汗為傷寒陽明善饑為中風不食為傷
寒少陽兩耳聾目赤曾滿而煩為中風口苦咽乾目眩為

發汗隨
病輕重

傷寒若三陰傷風無變異形症但四肢煩疼餘症同三陽也 傷風見寒脈者發熱惡風煩躁手足溫而脈反浮緊蓋發熱惡風煩躁手足溫為中風候脈浮緊為傷寒候也 傷寒見風脈者寒多熱少不煩躁手足微厥而脈反浮緩蓋多熱少寒不煩躁手足微厥為傷寒候脈浮緩為中風候也 傷風見寒傷寒見風大青龍症也 傷寒發表須當隨病輕重而汗之故仲景有發汗者有和解者發汗如麻黃湯桂枝湯大青龍湯是也和解如小青龍湯桂枝麻黃各半湯白虎湯桂枝二越婢一湯柴胡桂枝之類是也後人不能深究寒邪淺深藥性緊慢一槩用藥因致天傷其間縱或生全往往汗後虛乏遂至勞復或變成百病淹引歲月卒至不救此皆由汗下過度陰陽並竭血氣羸損以致此禍如遇病輕但當和解之所謂和其

助汗法

榮衛以通津液令其自解可也

丹溪治傷寒表症用補中益氣湯發散海藏用神朮湯白朮湯九味羌活散發散此皆和解之意不使真氣散失也 傷寒連服湯劑而汗不出者如中風法蒸之使溫熱之氣於外迎之無不得汗其法用薪火燒地良久掃去以水洒之取蚕砂栢葉桃葉糠麩皆鋪燒地上可側手厚上鋪席令病人當上臥溫覆之移時汗立至候周身至脚心熱熱乃用溫粉撲之汗止上床最得力者蚕沙栢葉也糠麩乃助其厚多少隨用

術治傷寒汗不出搐脚法用海蛤粉烏頭各二兩川山甲三兩為末酒糊和丸大一寸許捏匾置患人足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室取熱湯浸脚至膝下久則水溫又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以和為

度

攻裡看
熱深淺

活傷寒裡症須看熱氣淺深故仲景有直下之者如大承氣小承氣十棗大柴胡湯是也有微和其胃氣者如調胃承氣湯脾約丸少與小承氣微和之之類是也

金匱虛者十補勿一瀉強實者瀉之虛實等者雖瀉勿大泄之故王叔和序傷寒有承氣之戒

垣治大便燥結用通幽湯潤腸湯丸皆為血氣津液不足者設也

三乘氣
分輕重
不同

藥用大承湯最緊小承湯次之調胃承氣又次之大柴胡湯又次之

海大承氣湯治大實大滿滿則胃腹脹滿狀若合丸大實則不大便也痞滿燥實四症俱備則用之雜病則進退用之

大黃治大實

厚朴治大實

芒硝治燥糞此二味

枳實治痞此二味治無形氣藥也

小承氣湯治痞實而微滿狀若饑人食飽飯腹中無轉矢氣即大承氣湯只去芒硝心下痞大便或通熱甚須可下宜此方 調胃承氣湯治實而不滿者腹如仰瓦腹中有轉矢氣有燥糞不大便而謔語堅實之症宜用之

右已上三法不可差差則無者生之有者遺之假令調胃承氣症用大承氣下之則愈後元氣不復以其氣藥犯之也若大承氣症用調胃承氣下之則愈後神癡不清以其無氣藥也小承氣症若用芒硝下之則或利不止變而成虛矣

三一承
氣湯非
是

垣三一承氣湯辨○實則瀉之人所共知如緩急輕重之劑則臨時消息焉如不惡寒反惡熱發渴謔語腹滿而喘

手足濇然汗出急下之宜大承氣湯如邪未深恐有燥糞少腹痛小承氣湯試之腹中轉矢氣者有燥糞也乃可攻之不轉矢氣者初鞭後溏尚未可攻攻之則腹滿不能食若腹不通止與小承氣湯微和胃氣勿令大泄如發汗不惡寒但實者胃實也當和胃氣調胃承氣湯主之

成大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大甚故于大承氣湯中去芒硝又以結不至堅故減厚朴枳實如不至大堅然邪熱已甚而須攻下者亦未可投大承氣湯必以輕緩之劑攻之于大承氣湯中減厚朴枳實加甘草乃輕緩之劑以調胃也設若大承氣湯症反用調胃承氣湯下之則邪氣不伏小承氣湯症反用大承氣湯下之則過傷正氣而腹滿不能食故有勿大泄之戒此仲景所以分而治之未嘗越聖人之制度後之醫者以

此三藥合而為一旦云通治三藥之症及

一切所傷若如此說與仲景之方甚相背戾

急之音由是紅紫亂失迷惑世人一唱百和使病

其弊將何所咎哉倘有公心審是者當于內經仲景方中

求之責使藥症相對以聖賢之心為心則方之真偽自可

得而知矣

汗下緩急

繁傷寒之法先言表裏及有緩急三陽表當急裏當緩三

陰表當緩裡當急又曰脈浮當汗脈沉當下脈浮汗急而

下緩謂三陽表也脈沉下急而汗緩謂三陰裡也麻黃湯

謂之急麻黃附子細辛湯謂之緩內經云有瀆形以為汗

謂汗之緩裡之表也又云在皮者汗而發之謂汗之急表

之表也急汗者太陽緩汗者少陰是藏府之輸應也假令

附子麻黃細辛湯是少陰症始得發熱脈沉裏和無汗故

漬形為汗今麻黃湯是太陽症頭項痛腰脊強脈浮無汗裏和是也在皮者汗而發之可也經曰治主以緩治客以急此之謂也麻黃湯方見傷寒表裏上條

脈浮有表為表之裡宜急汗

假令得肝脈其外症善繫面青善怒其三部脈俱弦而浮惡寒裡和清便自調麻黃湯內加羌活防風各三錢謂肝主風是膽經受病也大便秘或泄下赤水無數皆裏不和也假令得心脈其外症面赤口乾善笑其尺寸脈俱浮而洪惡寒裡和清便自調麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂心主熱是小腸受病也假令得脾脈其外症面黃善噫善思善味尺寸脈俱浮而緩裡和惡寒麻黃湯內加白朮防風各三錢謂脾主濕是胃經受病也假令得肺脈其外症面白善噎悲愁不樂欲哭其尺寸脈俱浮而濇裡和惡寒麻黃湯內加桂枝生姜各三錢謂肺主燥是大腸

脈浮有裡為表之裡宜緩下

受病也假令得腎脈其外症面黑善恐欠尺寸脈俱沉而裡和惡寒麻黃湯內加附子生姜各三錢謂腎主寒是膀胱受病也

已上五症皆表之表也謂在皮者急汗而發之皆腑受病也表之裏者下之當緩謂隨臟表症外顯尺寸脈俱浮而復有裏症謂發熱飲水便利赤色或洩下赤水其脈浮按之內實或痛麻黃湯方去麻黃杏仁隨臟元加藥同煎分作五服每下一症初一服加大黃五分如邪未盡又加大黃一錢未盡再加大黃一錢半直候邪盡則止此先緩而後急是表之裏宜下之當緩也

麻黃附子細辛湯方見下少陰但欲寐條

假令得肝脈其內症滿悶淋洩便難轉筋其尺寸脈俱沉而弦裏和惡寒肝經受病麻黃附子細辛湯內加羌活防

脈沉有表為裡之表宜緩汗

風各三錢 假令得心脈其內症煩心心痛掌中熱而噦其尺寸脈俱洪沉裏和惡寒心經受病於前湯內加黃芩石膏各三錢 假令得脾脈其內症腹滿脹食不消怠墮嗜卧其尺寸脈俱緩沉裏和惡寒脾經受病加白朮防已各三錢 假令得肺脈其內症喘嗽洒淅寒熱其尺寸脈俱瀼沉裏和惡寒肺經受病加生姜桂枝各三錢 假令得腎脈其內症泄瀉下重足脛寒而逆其尺寸脈俱沉沉裏和惡寒此腎經受病加姜附各三錢

脈沉有裡為裡之裡宜急下

已上五症裡之表也宜瀆形以為汗皆臟受病也裏之裏者下之當急謂隨臟內症已顯尺寸脈俱沉而復有表症謂小便赤大便秘瀉或瀉下赤水或瀉或咳不能飲食不惡風寒發熱引飲其脈俱沉按之內實而痛此謂裡實宜速下之麻黃附子細辛湯內去麻黃隨臟元

加藥同煎分作三服每下一症初一服加大黃三錢邪盡即止如邪未盡第二服加大黃二錢又未盡第三服加大黃一錢此先急而後緩是裡之裡也宜速下之

忌汗症

雲 太陽症非頭痛項強不可發汗 非身熱惡寒不可發汗 非脈浮不可發汗

忌表症

活 其脈微弱或尺脈遲者不可表 其人當汗而衄血者不可表 壞病者不可表 婦人經水適來者不可表 風溫者不可表 濕溫者不可表 虛煩者不可表 病人腹間左右上下有築觸動氣者不可表

壞症變症

曾經發汗若吐若下若溫病仍不解者為壞病 脈尺寸俱浮頭痛身熱常自汗体重其息必喘其形不仁默默但欲眠者為風溫 兩脛逆冷胸腹滿頭目痛苦妄言必多汗者為濕溫 與傷寒症相似但不惡寒身不疼痛脈不

緊者為虛煩 臍上下左右有動氣按之牢若痛者為動氣

誤汗變症

太陽咽乾鼻衄淋漓小便不利皆不當汗已經發汗不得重發如無已上忌症雖經發汗邪氣未盡亦當重發之當汗不汗則生黃其症為風寒所傷陽氣下陷入內而與寒水上行於經絡之間本當發汗以徹其邪醫失汗之故生黃也脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合故生黃也 不當汗而汗為畜血之症燥火也當益津液為上而反汗以亡之其毒擾陽之極則侵陰也故燥血畜于胃中也 當汗而發汗過多腠理開泄汗漏不止故四肢急難以屈伸也

非陽明之本病不可下 陽明本病胃家實故也 非痞

滿燥實不可下 非潮熱發渴不可下 非罵詈親疎不

可下 非脈沉數不可下 非棄衣而走登高而歌如見

鬼狀不可下 脈虛者不可下 惡寒者不可下

活脈浮者不可下 脈虛者不可下 惡寒者不可下

嘔吐者不可下 不轉矢氣者不可下 轉矢氣者 小便

清者不可下 大便堅小便數不可用承氣湯攻之 乃脾

也 大便鞭小便少者未可攻 陽明病自汗出若發汗

小便自利者不可下 宜用蜜煎導之 非

非往來寒熱者不可和 非脇肋急痛者不可和 非

胃滿而嘔者不可和

診可解症

太陽傳陽明其中或有下症陽明症反退而無熱與不

渴却顯少陽症是知可解也 太陽症知可解者為頭不

痛項不强肢節不痛則知表易解也 陽明症知可解者為無發熱惡熱則知裡易解也 少陽知可解者寒熱日

六經病傳

不移時而作邪未退也若用柴胡而移其時早移之于晏
 晏移之于早氣移之于血血移之于氣是邪無可容之地
 知可解也 可解之脈浮而虛不可解之脈浮而實浮而
 虛者只在表浮而實者知已在裏也汗多不解者轉屬陽
 明也 傷寒不頭痛知邪不在經若頭痛知邪在經也
 六陽傳足傳手經則愈 陽中之陰水太陽是也為三陽
 之首能巡經傳亦能越經傳 陽中之陽土陽明是也陽
 明為中州之主主納而不出如太陽傳至此名曰巡經傳
 也 陽中之陽木少陽是也上傳陽明下傳太陰如太陽
 傳至此為越經傳 陰中之陰土太陰是也上傳少陽為
 順下傳少陰為逆如傳少陰為上下傳也如太陽傳太陰
 為悞下傳也 陰中之陽火少陰是也上傳太陰為順下
 傳厥陰為逆如太陽至此乃表傳裏也 陰中之陰木厥

陰是也上傳少陰為實再傳太陰為自安

太陽六傳 太陽者巨陽也為諸陽之首膀胱經病若渴

者自入于本也名曰傳本 太陽傳陽明胃土者名曰巡

經傳為發汗不盡利小便餘邪不盡透入于裏也 太陽

傳少陽膽木者名曰越經傳也為元受病脈浮自汗宜用

麻黃湯而不用故也 太陽傳太陰脾土者名曰悞下傳

為元受病脈緩有汗常用桂枝而反下之所致也當病腹

痛四肢沉重 太陽傳少陰腎水名曰表傳裏為病急當

下而反不攻不發所以傳裡也 太陽傳厥陰肝木者為

陰不至於首惟厥陰與督脈上行太陽相接名巡經得度

傳

有人病傷寒無汗惡風項既屈而且強予曰項強几几
 葛根湯症或問曰何謂几几予曰几几者如几疾屈而強

也謝復古謂病人羸弱須憑几而起候也蓋仲景論中極有難曉處振振欲擗地心中懊憹外氣拂鬱鬱冒不仁膈內拒痛如此之類甚多成無已云几音殊几為短羽鳥不動亦如之非若几案之几而可偃屈也甚得仲景之旨

太陽病

發熱

惡寒

惡風

頭痛

項強

身體痛

太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒 太陽病發熱汗出

惡風脈緩者為中風 太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱

自發陰弱者汗自出啻啻惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴

乾嘔者桂枝湯主之 太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂

枝湯主之 太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗

出欲救邪風者宜桂枝湯 病人臟無他病時發熱自汗

出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯

桂枝湯方

桂枝

芍藥

生姜

甘草

大棗十二枚

右咬咀每服五錢水煎去渣溫服須臾啣熱稀粥一盞

以助藥力令一時許遍身熱熱微汗者佳不可令如水

淋漓若一服便得汗勿再服 或無汗或小便數手足

冷者不可服活人云桂枝麻黃若夏月用加黃芩知母

石膏總不如陶尚文用羌活冲和湯為最穩

右桂枝湯許學士云有人病發熱惡寒自汗脈微弱而

浮三服湯而愈此方在仲景一百十三方內獨冠其首

令人全不用何也仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮

者云至翕翕發熱宜桂枝湯此脈與症仲景說得甚

脈浮緩有汗者為中風宜桂枝湯

明後人看不透所以不敢用也

假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒也尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發汗也此謂元氣受病而然也又曰陽微則惡寒陰微則發熱醫既汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯哉

脈浮緊無汗者為傷寒

麻黃湯主之

湯宜麻黃

麻黃

去節先煮去汗焙二兩

桂枝

二兩

杏仁

七十個去皮尖

右咬咀每服五錢水煎溫服覆取微汗不須歎粥有汗

者勿服

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉潤此為逆也 傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯發之

大青龍湯方

麻黃

去節炮去汗三兩

桂枝

去

石膏

碎

甘草

炙各一兩

生姜

切一兩半

大棗

六枚

杏仁

二十個去皮尖

右咬咀每服五錢水煎溫服取汗為度若汗周身潤止後服未汗可停待相次服盡不欲汗多恐亡陽故也若汗不止用溫粉撲之

溫粉方

白朮

藁本

川芎

白芷

各等分

右研爲細末每末一兩入米粉三兩和勻撲周身止汗
若汗過多恐亡陽遂厥逆惡風煩躁不得眠故宜以此
粉止之

右中風脈當浮緩今反浮緊緩者大青龍症也

活發熱惡風煩躁手足溫爲中風候脈浮緊爲傷寒脈是
中風見寒脈也寒多熱少不煩躁手足微厥爲傷寒候脈
浮緩爲中風脈是傷寒見風脈也蓋脈似桂枝反無汗病
似麻黃反煩躁是也

許學士云仲景治傷寒一則桂枝二則麻黃三則青龍桂
枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見風脈
三者如鼎立人皆能言之而不曉前人處方用藥之意故
醫遂多不用無足恠也且脈緩而浮者中風也故齏齏惡
風泝泝惡寒翕翕發熱仲景以桂枝對之脈浮緊而瀋者

傷寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡寒無汗而喘
仲景以麻黃對之至於中風脈浮緊傷寒脈浮緩仲景皆
以青龍對之何也予嘗深究三首若症候與脈相對無不
應手而愈何以言之風傷衛衛氣也傷寒榮榮血也榮行
脈中衛行脈外風傷衛則風邪干陽陽氣不固發越而爲
汗是以自汗是表虛故仲景用桂枝以發其邪芍藥以和
其血蓋中風則病在脈之外其病稍輕雖同曰發汗特解
肌之藥耳故仲景于桂枝症云令半身熱熱微似有汗不
可如水淋漓病必不除是知中風不可大發汗汗過則反
動榮血邪氣乘虛襲之故病不除也寒傷榮則寒邪入陰
血而榮行脈中者也寒邪居脈中非特榮受病邪自內作
則併與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而熱齒乾
而煩寃仲景以麻黃發其汗又以桂枝甘草助其發散欲

滌除內外之邪榮衛之病爾大抵二藥皆發汗以桂枝則發其衛之邪麻黃并榮與衛治之亦自有淺深也何以驗之仲景桂枝第十九症云病當自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又四十七症云發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出者欲救邪風宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和又第一卷云寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒浮緊者榮衛俱病也麻黃湯中并用桂枝此仲景之言也至於青龍雖治傷風見寒脈傷寒見風脈之病然仲景又云汗出惡風者不可服之服之厥逆便有筋惕肉潤之症故青龍一症尤難用藥須是形症諦當然後可行故王寔夫症止用桂枝麻黃

各半湯治之蓋慎之也

太陽病項強有汗者葛根湯

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

桂枝

葛根各二兩

芍藥

甘草各一兩

生姜一兩

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服覆取汗

無汗者葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

葛根湯方

葛根四兩

麻黃

生姜各三兩

桂枝

芍藥

甘草各二兩

大棗十二枚

右咬咀每服五錢去查溫服覆取微汗為度

太陽病脈微身不痒者宜桂婢

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯

各半湯

桂枝二越婢一湯方

桂枝

芍藥

麻黃去節

甘草各三錢

生姜兩半

石膏一兩半碎

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

脈微身

痒者宜

桂麻各

半湯 太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少又其人

各半湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝兩一

芍藥

生姜

甘草炙

麻黃各半兩去節煮

大棗六枚

杏仁十二粒去皮尖

右咬咀每服五錢水煎溫服

太陽中

賜症

太陽畜

血症

凡仲景稱太陽病者皆表症發熱惡寒頭項強痛也若脈浮大則與症相應宜發汗今見表症而脈反微不與症應故不可發汗但用一二各半湯等和之可也

若太陽中賜發熱惡寒脈微弱手足逆冷而渴者白虎加人參湯方論見中暑

太陽六七日表症仍在脈微而沉反不結胃其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裏故也抵當湯主之

抵當湯方

水蛭炒去子杵

蜚虫各十枚炒去足翅

大黃兩二

桃仁七枚去皮尖

右作一服水一盞煎溫服

太陽病身黃脈沉結小腹鞭小便不利者為無血也小便

自利其人如狂者血症諦也亦抵當湯主之
凡仲景稱太陽症脈沉者皆謂發熱惡寒頭項強痛而
脈反沉也其症兼發狂小腹硬者為畜血此條抵當湯
是也

太陽濕痺

兼關節痛小便不利身黃者為濕痺論見濕痺

太陽症

兼卒口噤背反張者為瘧若無汗惡寒名剛症宜葛根湯

太陽陰症

病發熱頭痛脈反沉若不瘥身軀疼痛當救其裏宜四逆湯方見下利

少陰病但欲寐始得之發熱脈沉者麻黃附子細辛湯論見

欲寐

麻黃附子細辛湯方

麻黃去節 細辛各二兩 附子一枚泡

右咬咀每服五錢水煎溫服

凡仲景稱太陽病不惡寒者皆謂發熱頭項強痛脈浮而反不惡寒也其証兼渴者為溫病兼汗出者為柔症方論見溫病柔症

太陽病不惡寒者即太陽病

傷寒六七日發熱微寒肢節煩疼微嘔心下支結外症未去者柴胡加桂枝湯主之

柴胡加桂枝湯方

柴胡一兩 桂枝 黃芩 人參
芍藥 生姜各半兩 半夏四錢 大棗三枚
甘草炙三錢

右咬咀每服五錢水煎溫服

凡仲景稱表不解者皆謂太陽病發熱惡寒頭項強痛脈浮也蓋病雖屬太陽表症而有裡症兼之者則不言

太陽病但稱表不解也其兼心下支結者此條柴胡桂枝湯是也論見脅痛

兼心下有水氣乾嘔而欬者小青龍也方論見欬兼脇痛手足溫而渴者小柴胡也

兼心下痞者先用桂枝解表後以瀉心攻痞也方論見痞兼下利腹滿脹者先以四逆溫裏

後以桂枝攻表也方論見下利太陽病欲解時從巳至未解

太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解陰脈微者

下之而解若欲下之調胃承氣湯主之下之宜解疑衍文太陽病脈浮緊發熱身無汗自衄者愈

太陽外症未解不可下之下之為逆欲解外者宜桂枝湯主之

海大小調胃三承氣湯必須脈浮頭痛惡風惡寒表症盡罷而反發熱惡熱譫語不大便方可下之若脈浮緊下之

必結胃若脈浮緩下之必痞氣許學士云常記一親戚病傷寒身熱頭痛無汗大便不通

已四五日予訊問之醫者治大黃朴硝等欲下之予曰子姑少待予為視之脈浮緩居密室中自稱甚惡風予曰表

症如此唯大便不通數日腹且不脹別無所苦何遽便下之大抵仲景法須表症罷方可下不爾則邪乘虛而入不

為結胃必為熱利也予作桂枝麻黃各半湯繼以小柴胡藥藥汗出大便亦通而解

仲景云凡傷寒之病多從風寒得之始則表中風寒入裏則不消矣擬欲攻之當先表解乃可下之若表已解而內不消大滿大堅實有燥糞者自可除下之雖四五日不能為碍也若不宜下而便攻之內虛熱入為挾熱自利煩燥之變不可勝數輕者困篤重

太陽欲解候

太陽表未解忌下

者必死矣 原本正文重疊予刪正此段其理甚明大抵風寒入裏不消必有燥糞或大便堅秘須是脈不浮不惡風表症罷乃可下之大便雖四五日不通亦無害若不顧表而下遂為挾熱利也

表裏發熱

表裡發熱症

發熱惡寒脈浮者屬表即太陽症也

方論見前太陽病條

發熱汗

出不惡寒反惡熱者屬裏即陽明症也

方論見陽明白汗

發熱

脈弦細頭痛者屬半表半裡即少陽症也

論見口苦咽乾

發熱

而嘔者小柴胡湯

論見嘔

發熱欬嗽表不解者小青龍湯

發熱而

兼脇痛喜嘔者小柴胡加乾姜五味子湯

方論見欬

發熱而

喘表不解者小青龍去麻黃加杏仁湯兼胃滿者麻黃湯

方論見喘

發熱口渴有屬表者有屬裏者治法方論甚衆

汗後脈浮數者發熱汗解半日許復煩躁脈浮數大者可更發汗宜桂枝湯

方論見煩

汗後發熱惡寒者虛故也不惡寒但惡熱者實也當和胃

氣宜調胃承氣湯 太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者

屬胃也調胃承氣湯主之 海藏云大黃洩實芒硝軟堅甘草和中必燥實堅三症全者可

之用

調胃承氣湯方

大黃

一兩海藏云宜酒浸蓋邪氣居高非酒不到譬如物在高巔人跡所不及則射而取之故用酒

浸引而上之若生用苦洩峻下則遺高分之邪熱所以愈後或目赤或喉閉或頭腫膈上反生熱症矣

甘草

半兩炙海藏云甘以緩之

芒硝

九錢海藏云辛以潤之鹹以軟

右咬咀水一盞煮大黃甘草至七分去渣入芒硝更上火微煮令沸溫服

汗之仍熱

發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而利者大柴胡湯論見

發汗後身灼熱脈浮汗出身重多眠鼻鼾者風溫論見

發汗後仍發熱心悸頭眩身潤動振振欲擗地者宜真武

湯論見汗出熱不去內拘急四肢疼下利厥逆惡寒者

宜四逆湯論見大汗出脈陰陽俱盛不解者死論見

云溫病汗徹復熱而脈燥疾不為汗衰

狂言不能食謂之陰陽交者必死也

下之仍熱

太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而

反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈桂枝

湯主之汗下後仍頭痛發熱心下滿小便不利者桂枝

去桂加茯苓白朮湯論見大下後身熱不去心中結痛

者梔子豉湯主之論見大下後身熱不去微煩者梔子

乾姜湯方論陽明病下之其外有熱手足溫心中懊懣

飢不能食但頭汗出者梔子豉湯論見

通吐發熱

太陽病當惡寒今自汗出不惡寒發熱關脈細數者以陰

吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食三四日吐之

者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致為小逆

發熱脈浮二症

瘥後更熱者小柴胡湯脈浮者以汗解脈沉者以下解論見

復勞

傷寒脈浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

白虎湯方

知母三兩

甘草一兩

粳米合

石膏八兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯論見下利厥

逆汗出熱不去者四逆湯

發熱厥逆二症

少陰病下利清穀厥逆裏寒外熱者通脈四逆湯方論見

身熱手足逆冷而脈虛當夏月發者為中暑論見

發熱下利四症

傷寒表不解乾嘔發熱而咳下利者小青龍去麻黃加芫

花湯論見

太陽與陽明合病必下利其症頭痛腰疼身

熱鼻乾脈浮大而長者宜葛根湯論見

發熱下利服微

遲厥逆者通脈四逆湯

太陽與少陰合病自下利其症

頭寒曾滿往來寒熱脈浮大而弦者宜黃芩湯論見

合病

下利清穀脈沉遲其人面赤微熱而厥者必鬱冒汗出自

解

發熱下利厥逆躁不得卧者死發熱而利汗不止者死

厥逆躁不得汗者死

發熱吐利心下痞硬者大柴胡湯渴者五苓散不渴者理

中湯論並見痞及吐利門

發熱經水適來適斷小柴胡湯刺期門論見發熱脈

數消穀不大便者有瘀血宜抵當湯論見

素病甚者為五十九刺穴見溫病門

太陽病發熱續法

傷寒多由內傷

此篇集丹溪海藏諸賢治傷寒皆以補養兼發散之法實

本經成敗倚仗生於動動而不已則變作及風雨寒熱不

得虛邪不能獨傷人之旨也蓋凡外傷風寒者皆先因動

作煩勞不已而內傷躰虛然後外邪得入故一家之中有

病者有不病者由躰虛則邪入而病躰不虛則邪無隙入

而不病也是故傷寒為病屬內傷者十居八九後學無知

舉世皆謂傷寒無補法但見發熱不分虛實一利下汗而

致天橫者滔滔皆是此實醫門之罪人也今集此法於仲

景之後其應如響使人遵之不犯虛虛實實之戒也

丹溪兼補發散傷寒主乎溫散有卒中天地之寒氣者有口食生冷

之物者故傷寒為病必須身犯寒氣口食寒物者是以從

補中益氣湯加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所
奏其氣必虛只用補中益氣湯中從所見之症出入加減
氣虛甚者少用附子以行參朮之氣補中益氣湯方見治發熱內傷
之病專主東垣內外傷辨甚詳世之病此者為多但有挾
痰挾外邪者鬱熱於內而發者皆以補元氣為主宜看其
所挾而兼用藥

一男子素嗜酒因暴風寒衣薄遂覺倦怠不思飲食半日
至睡後大發遍身疼痛如被杖微惡寒天明診之六脈浮
大按之豁然左為甚予作極虛受風寒治之人參為君黃
芪白朮歸身為臣蒼朮甘草木通乾葛為佐使大劑與之
至五貼後通身汗如雨凡三易被得睡覺來諸症悉除

白朮

陳皮

乾葛

蒼朮

各三錢

人參

川芎

黃芪

歸身

木通

各一錢

甘草

五分

右分三貼水煎服

盧兄年四十九歲自來大便下血脈來沉遲濇面黃神倦
者二年矣九月間因勞倦發熱自服參蘇飲二貼熱退早
起小勞遇寒兩手背與面紫黑昏仆少時却醒身大熱妄
語口乾身痛至不可眠脈之三部不調微帶數重取虛豁
左手大於右手以人參二錢半帶節麻黃黃芪各一錢白
朮二錢當歸五分與三五貼得睡醒來大汗如雨即安兩
日後再發脇痛欬嗽若睡時嗽不作而妄語且微惡寒診
其脈似前而左略帶緊予曰此躰虛再感寒也再以前藥
加半夏茯苓至十餘貼再得大汗而安後身倦不可久坐
不思飲食用補中益氣去涼藥加神麴半夏砂仁五七十
貼而安

一丈夫因勞倦發熱甚倦不可以傷寒治之用

人參錢四 白芍藥 陳皮 當歸各三錢

黃芪二三錢半 蒼朮二錢 木通一錢 甘草少

右分三貼水煎溫服

一丈夫發熱五日倦甚略渴得洪脈不甚數略重則散大

此內傷症也用

白朮二錢 人參 陳皮 柴胡各錢半

黃芪 蒼朮各一錢 木通六分 甘草少

右分二貼水煎服

一丈夫倦甚口乾發熱汗不出用

陳皮三錢 人參 白朮 蒼朮各二錢

乾葛半錢 黃芪 木通各一錢

右分二貼水煎服

一丈夫發熱振矐倦怠口渴

人參 白朮 白芍 柴胡各二錢

陳皮三錢 黃芪一錢 木通半錢 甘草少

右分四貼水煎熱飲

王孺人因辛苦發熱

芍藥五錢 白朮三錢半 人參 當歸各二錢

陳皮一錢 川芎 甘草 木通各錢半

右分四貼水煎溫服

第四女發熱冒風冷

麻黃 人參各五分 蒼朮一錢 甘草少

右水煎服溫

右十方皆補養中氣兼發散之劑

杭州葉君章臘月因齋素中飢而冒寒作勞遂患發熱頭

寒多者
補散加
姜附

痛醫與小柴胡湯遂自汗神昏耳聾目不見物予診其脈大如指似有力熱不退與人參黃芪白朮熟附炙甘草作大劑之一日而汗少二日而熱減半耳微有聞目能視物初用藥至四貼前藥中加蒼朮與兩服再得汗而熱除本日遂去蒼朮附子又與前藥作小劑服三日而安 呂仲修年六十六歲正月間因忍飢胃寒作勞頭疼惡寒發熱骨節皆疼無汗至次日妄語熱愈甚而妄語時止時作熱亦不為十分自服參蘇飲兩貼汗不出又再進一服以衣覆取汗大出而熱不退至第四日子診其脈兩手皆洪數而右為甚此因飢而胃寒加之作勞陽明經雖受寒氣不可攻擊當急以大劑補之以回其虛俟胃氣充實自能出汗而解遂以參芪白朮歸身陳皮炙甘草每貼加熟附子一片一晝夜服五貼至第三日口稍乾言語有次諸症雖

解而熱未退遂去附子加白芍又兩日思食却作肉羹間與之又三日精神全二日許自汗出而熱退診其脈不數洪脈却尚有些洪脈作大脈論年高而誤汗此後必有虛症見又與前藥至次日言我大便自病來不曾更衣今穀道逼痛坐努責狀如不堪醫者必欲投大黃巴菝等劑予謂大便非實秘為是氣因誤汗而虛不得充腹無力可努仍與前補藥以肉粥及菘菘與之一日半煎濃茵椒湯浸下躰方下大便軟塊者五六枚診其脈仍舊大未斂此因氣血未得回復又與前藥兩貼經兩日小便不通少腹下妨悶頗為所苦但仰臥則點滴而出予曰補藥服之未盡於前藥內倍加參芪大劑服兩日小便方利而安 陶明節年十九歲不憚勞動不息農作忽一日因勞倦大發熱而渴恣飲冷泉水數碗次日熱退目不識人言語謬誤自

言肚痛不能轉側飲食不進身戰掉不自持又二日求予
診之兩手濇而大而右爲甚遂於氣海灸三十壯用白朮
二錢黃芪二錢熟附一片陳皮五分與十貼不効又增發
熱微渴餘症仍在却可進二匙稀粥予曰此氣欲利而血
未應也於前藥內去附子加當歸以和血因有熱加人參
一錢半服三十貼而安

海黃芪湯治傷寒兩感拘急三焦氣虛自汗及手足汗出
或手背偏多或肢躄振搖腰腿沉重面赤目紅但欲睡眠
頭面壯熱兩脇熱甚手足自溫兩手心熱自利不渴大便
或難或如常度或口乾咽燥或渴欲飲湯不欲飲水或少
欲飲水嘔噦間作心下滿悶腹中疼痛或時喜笑或時悲
哭或時太息或時語言錯亂疑作謔言狂語者非也神不
守舍耳始得病于寤寐之間或恐悸頭項不甚痛行步只
如舊此陰盛陽虛之故也兩手脈浮沉不一或左或右往
來不定有沉濇弱微弦五種陰脈形狀按之全無力浮之
損小沉之亦損小皆陰脈也宜先緩而後急緩宜用黃芪
湯

黃芪湯方

人參 生姜 黃芩 白茯苓

白朮 白芍藥 甘草 嘔者加藿香

陳皮 甚者加乾姜

右咬咀水煎量症加減多少用之 如大便秘結者調

中丸主之

調中丸方

人參 白朮 白茯苓 乾姜

甘草 各等分

右為末煉蜜丸每兩作十丸或五丸每服一二丸水少許煎服若病急者黃芪湯每服加乾姜一錢大便結者理中丸主之

理中丸方

人參

白朮

乾姜

炮烈熱以生薑代之

甘草

右等分為末煉蜜丸每兩作五丸白湯化下先緩後急也若尤急者無汗宜附子乾姜甘草湯若自汗者宜白朮附子甘草湯量脈症可於四逆湯或真武湯或通脈四逆湯選用之

垣

馮內翰姪櫟年十六病傷寒目赤而煩渴脈七八至醫

欲承氣湯下之已煮熟矣偶東垣從外來馮告之故東垣切脈大駭曰幾殺此兒彼以脈數為熱今脈七至是極熱

也殊不知至真要大論云病有脈從而病反者何岐伯對曰脈至而從按之不鼓諸陽脈皆然此陰盛格陽於外非熱也取姜附來吾以熱因寒用之法治之治藥未就而病者爪甲已青頓服八兩汗漸出而愈

右七法補蕪發散隨所見症加姜附甚者熟附微者乾姜又甚者姜附蕪施皆反治法也

丹

盛孺人年四十歲外冷內熱身疼頭痛倦怠脈虛微瀼

川芎

柴胡

芍藥

各半

羌活

黃柏

各三錢炒

南星

一錢

甘草

分三

右分兩貼生姜三片水煎熱服

沈材妻年五十餘滿身骨節痛半日以後發熱黃昏至半夜却退

蒼朮

陳皮

羌活

各一錢

白朮

錢

熱多者補散加芩栢

木通

炒栢

通草

各五分

右咬咀水煎温服

丁親家於久瘧後暑月涉水又勞苦腿胛痛漸漸渾身痛脇亦痛發熱脈却澹不甚數予曰此勞倦乏力治用

白朮

黃芪

蒼朮

陳皮

各一錢

人參

黃栢

酒炒各五分

木通

各三分

甘草

各二分

右咬咀水煎下龍薈丸

小阿婆午後發熱遍身痛血少月經黑色大便閉用

芍藥

五錢

黃芩

蒼朮

各三錢

黃栢

酒炒

木通

各二錢

右咬咀水煎服

右四方兼補發散隨所見脈症加炒栢龍薈皆正治法也

痰病者補散加消導

陳小娘年二十發熱目閉開口則熱甚渴思水解脈澹而濁溷此食痰也治用

黃芩

甘草

木通

各五分

陳皮

白朮

乾葛

各一錢

黃連

桔梗

各六分

右咬咀水煎下保和丸二二十九

一丈夫因恐發熱心不安用南星白茯苓各五錢朱砂二錢已上為六貼再用

人參

當歸

柴胡

各三錢

黃芩

川芎

木通

各二錢

甘草

紅花

各五分

右分四貼水二盞半入金銀器同煎至一盞去查熱調服

右二方兼補發散隨所見症加食積痰藥

海神木湯治內傷冷飲外感寒邪無汗者

蒼朮制

防風各二兩

甘草一兩

右咬咀加葱白生姜同煎服如太陽症發熱惡寒脈浮而緊者加羌活二錢 如太陽症脈浮緊中帶弦數者是兼少陽也加柴胡二錢 如太陽症脈浮緊中帶洪者是兼陽明也加黃芩二錢 婦人服者加當歸或加木香湯或加藁本湯各二錢 如治吹妳煎成調六一散三五錢神効

神木湯
加減例

又神木湯六氣加減例

加 太陽寒水司天

加羌活桂枝餘歲非時變寒亦加冬亦

加 陽明燥金司天

加白芷升麻餘歲非時變涼濕亦加秋

亦加

少陽相火司天

加黃芩地黃餘歲非時變雨濕亦加夏

亦加

太陰濕土司天

加白朮藁本餘歲非時變熱濕亦加夏

末秋初亦加

少陰君火司天

加細辛獨活餘歲非時變熱亦加春末

夏初亦加

厥陰風水司天

加川芎防風餘歲非時變溫和亦加春

亦加

已上神木湯六氣加減法非止為司天之氣設也至於歲之主氣與月建日時同前應見者皆當隨所見依土例加減之按海藏此論與戴人云病如不是當年氣看與何年運氣同便向此中求妙法方知皆在至真中之歌相表裏實發前人之所未發也蓋海藏此論所謂某氣司天加其藥者治常氣之法也所謂隨所應見加減

者治變氣之法也戴人所謂看與何年同氣求治法者亦治變氣之法也能將二公之法擴充行之則內經運氣之本義燦然矣夫內經論運氣有常氣有變氣常氣者有定紀如其年屬某氣司天當寒其年屬某氣司天當熱是也變氣者無定紀如其年屬某氣司天當寒反變熱當熱反寒是也王氏註文釋以經無定紀之變氣作有定紀之常氣使後學皆以年歲占運氣而其應者十無一二是以人莫之信而其道湮晦久矣二公生於數千百年之後復啓其端而續之與程朱續孔孟不傳之緒同功也今僕謹於海藏逐年司天加藥之後伸餘歲變常之義其意有不盡者以述運氣類註定之同志之士幸究心焉

以白朮代桂枝

白朮湯治內傷冷物外感風寒

汗者

白朮

三兩

防風

二兩

甘草

一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分溫服一日止一二服待二三日漸漸汗少為解

又白朮湯治傷寒上解三陽下安太陰

白朮

如汗之改用蒼朮

防風

各一兩

右咬咀水煎至七分溫服用後方加減 若發熱引飲者加黃芩甘草 頭疼惡風者加羌活散三錢羌活一兩半川芎七錢細辛二錢半去芦 若身熱目痛者加石膏湯四錢石膏二錢知母半兩白芷七錢 腹中痛者加芍藥湯三錢芍藥一兩桂枝半兩 往來寒熱而嘔者加柴胡散三錢柴胡一兩半夏半兩 心下痞者加枳實一錢 若有裏症加大黃一錢量虛實加減之邪去止服

紫古以川芎湯代麻黃以黃芪湯代桂枝

有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔疎雖有汗不當服桂枝宜用黃芪湯和鮮之秋冬汗孔閉雖無汗不當服麻黃宜用川芎湯和鮮之春夏有汗脈微而弱惡風惡寒者乃太陽症秋冬之脈也宜用黃芪湯無汗亦用川芎湯秋冬有汗脈盛而浮發熱惡熱者乃陽明症春夏之脈也宜用黃芪湯無汗亦用川芎湯大抵有汗皆宜黃芪湯有汗則能止之

白朮

黃芪

防風各等分

右咬咀每服五七錢至一兩水煎溫服汗多惡風甚者加桂枝

川芎湯無汗則能發之

川芎

蒼朮

羌活各等分

右咬咀每服五七錢至一兩水煎熱服無汗惡風甚者加麻黃一二錢

法云五臟之脈寸關尺也今止言寸尺陰陽也若陽緩而陰急表和而裏病陰緩而陽急裏和而表病

表症具尺脈遲弱者先補血

本黃芪建中加當歸湯治發熱頭疼脈浮數而尺中遲弱者宜先服此藥補血却與麻黃桂枝輩

黃芪

當歸各兩半

白芍

桂枝

甘草各一兩

右咬咀每服五錢姜三片枣一枚水煎日三夜二服如脈尚沉遲再進一服

有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若未瘥則其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌鮮表神方

九味羌活湯

陶尚節註云不問四時但有頭疼骨節痛發熱惡寒無汗脈浮緊者宜用此湯以代麻黃

為穩當如頭疼發熱惡風自汗脈浮緩者宜用加減冲和湯即羌活湯中減蒼朮加白朮細辛加黃芪是也
羌活一兩半治太陽肢骨痛之主藥也然非無為之
入關節痛者非此不降
防風一兩半治一身盡痛乃卒伍卑賤之下
細辛半兩治少陰
蒼朮雄壯上行之藥能除濕下氣及安
白芷一兩治陽明
甘草一兩能緩裏急調和衆
黃芪一兩治太陰
生地一兩治少陰
川芎一兩治厥陰

已上九味雖為一方然亦不可執執中無權猶執一也
當視其經絡前後左右之不同從其大小輕重之不一
增損用之其効如神用啖咀水煎服若急欲汗者須熱
服以羹粥投之若緩欲汗者溫服而不用湯粥投之
脈浮而不解者先急後緩脈沉而不解者先緩後急九

味羌活湯不獨解利治雜病神効如中風行經者加附
子中風秘澁者加大黃中風拜三氣合痺等症者各隨
一二經絡上下內外寒熱溫涼四時六氣加減補瀉用
之煉蜜丸亦可加生地各半治傷寒兩感如神用豆淋
酒治破傷風

解表維方

保和解四時傷寒混解六經不犯禁忌大白朮湯

白朮 石膏 防風 羌活各三錢

黃芩五錢 白芷半錢 知母七錢 甘草一錢

枳實兩半 細辛三錢

右啖咀每服半兩水煎溫服未解更一服春倍加防風
羌活夏倍加黃芩石膏季夏淫雨倍加白朮白芷秋加
桂五錢冬加桂八錢或一兩

海五積散治陰經傷寒脾胃不和及感寒邪

白茯苓 厚朴 芍藥 當歸

麻黃去節 半夏姜製各三兩 乾姜炮兩 人參

川芎各二兩 甘草兩 白芷四兩 枳殼五兩

陳皮 蒼木新者二兩 舊者十四兩 桔梗十二兩 肉桂一兩

右除枳殼肉桂外餘並為粗末於大鍋內文武火炒令

黃熟不至焦用紙攤在板上候冷入枳殼肉桂末和勻

入磁盒內每服二錢水一盞姜三片同煎服若傷寒蔥

白一莖豈豉七粒同煎連服取汗 若脾胃不和內傷

冷物渾身疼痛頭昏無力胃膈不利飲食不下氣脈不

和四肢覺冷或睡裏虛驚至晚心躁困倦即入鹽少許

同煎 若陰經傷寒手足逆冷及虛汗不止脈細疾面

青而嘔更宜加附子同煎加減多少並在臨時消息之

袖珍方 無人參

參蘇飲治內外感一切發熱主藥又云前胡葛根自能解

肌枳殼陳皮自能寬膈大治中焦滿痞凡有熱不得拘其

所見小兒室女尤宜服之

前胡 枳殼 陳皮 甘草

桔梗 木香各一錢 人參 紫蘇

乾葛 半夏 茯苓各八分

右咬咀每服四錢用水一盞生姜五片東一枚煎服不

拘時若素有痰者候熱退以二陳六君子湯間服

右方治痰飲停積中脘閉塞眩暈嘈煩忪悸嘔逆及痰

飲中人停留關節手脚躡曳口眼歪斜半身不遂食已

則嘔頭疼發熱狀如傷寒者悉治之 一法用此藥三

兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯大治男子婦人

虛勞發熱或五心煩熱并衄血吐血便血及婦人下血

過多致虛熱者並宜服之或因用心太過發虛熱者及往來寒熱者用之神効
柴胡散治邪入經絡體瘦肌熱推陳致新鮮利傷寒時疫中暍伏暑

柴胡兩四 甘草兩一

右咬咀水煎食後熱服此藥冬月可以潤心肺止咳嗽除壅熱春夏可以禦傷寒時氣解毒居常不可缺者且倉卒可以易得長幼皆宜服之

山胃感用帶根蔥煎湯嚼生姜得汗愈

右六方通詳諸表方元氣不虛者服効

第二方熱多者宜服之

第三方寒多者宜服之

第四方痰飲者宜服之

第五六方倉卒宜備之

海治傷寒外症全是下症大熱而脈反細不可下者瀉心

湯主之方見傷寒脈有力者黃連瀉心湯無方者半夏瀉心湯

雲人參散治傷寒汗下後餘熱不退或煩或渴面赤者

人參 山梔 藍葉 甘草

白蘚皮各等分

右咬咀每服五錢水煎服

雜合病 當隨症 治不必 先理感 胃

丹絜矩新書謂有雜合邪者當以雜合法治之譬如惡寒發熱得之感胃明是外合之邪已得浮數之脈而氣口又緊盛明為食所傷病者又倦怠脈重按俱有豁意而胸膈痞滿間引兩脇其脈輕取又似乎弦此又平昔多怒肝邪之所為也細取左尺大細沉弱此又平時房勞之過也治

法宜以感冒一節且放後先視其形色之強弱厚薄且以

補中化食行滯清涼胃火而以姜辣行之則中氣稍回傷滯稍行津液得和通軀得汗外感之邪自解醫者不肯詳審求之只顧表散外邪又不推究兼見之邪脈亦不窮問所得之病因與性情之執着巧施雜合治法將見正氣自虛邪氣愈固皆拙工之過也

發熱惡寒似傷

本發熱惡寒近似傷寒者有五種脈浮而緊其人發熱而

寒者有五

惡寒者傷寒之候也脈浮而數其人發熱惡寒或有痛處是欲為癰癤也脈浮按之反濇其人發熱惡寒或膈實而

嘔吐者此是傷食也脈浮而滑其人發熱惡寒或頭眩而嘔吐此是風痰之症也脈浮而弦其人發熱惡寒或思飲食此是欲化瘧疾也能辨其脈又能驗其症斯無誤矣

發熱惡熱而渴

海傷寒與雜症相似藥不可差 夫傷寒表症發熱惡熱而渴與下雜症同但頭痛身熱目痛鼻乾不得臥白虎主

之乃陽明經病也正陽陽明氣病脈洪大先無形也雜病裏症發熱惡熱而渴但目赤者病臟也手太陰氣不足不能管領陽氣也宜以枸杞生地熟地之類主之脈洪大甚則嘔血先有形也

禁忌

氣病在裏誤用血藥無傷也為安血而益陰也 血病在裏誤用氣藥如白虎湯者非也為瀉肺而損陰也

四辨誤服白虎變症 昔西臺椽葛君瑞二月中病傷寒發熱以白虎湯主之病者面黑如墨本症遂不復見脈沉細小便不禁東垣不知也及診之曰此立夏以前誤服白虎白虎大寒非行經之藥止能寒臟腑不善用之則傷善氣本病曲隱於經絡之間或投以大熱之藥求以去陰邪他症必起非所以救白虎也可用溫藥升陽行經有難者曰白虎大寒非大熱何以救君之症柰何東垣曰病隱

針灸

經絡間陽道不行而本症見矣又何難哉果如其言而愈
大煩熱不止晝夜無度用八關大刺法見赤眼熱無度不
可止宜陷谷出血

密遍身發熱如火狂言妄語氣虛者補手三里氣實者瀉
足三里

獨傷寒胃熱不已 大杼五分 風門五分留 中府乳

三肋間動脈應 缺盆三分

傷寒胃熱不已 中脘瀉 上廉三分 下廉八分 三里

氣衝

傷寒四肢熱不已 雲門三分灸 肩髃 委中 腰膕

在二十一椎節下間宛宛中以挺伏地舒身兩手相重

支額縱四體然後取其穴針入五分留七呼灸七十壯

傷寒熱退後再發熱 風門 合谷 行間 絕骨

惡寒

發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於
病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於

陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

發熱惡寒脈浮屬太陽方論甚眾並見發熱門太陽病條 惡寒脈微而復利者亡血也四逆加人參湯主之王叔和原入霍亂

屬陰症

四逆加人參湯

人參 乾姜 甘草各一兩 附子一枚去皮燬

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

少陰病惡寒身倦而利若利止手足溫者可治利不止手

足逆冷者不可治方論見下利

少陰病惡寒身倦時煩欲去衣被者可治四逆無脈不煩

而躁者死方論見但欲寐

診

惡寒手足逆冷若兼大汗拘急下利四逆湯方論見下利

若兼頭汗心下滿脈沉細大便鞭者小柴胡湯方論見厥

若夏月中暑脈虛而渴背惡寒者白虎加人參湯方論見

若口中和但欲寐者灸之宜附子湯

發汗後惡寒者虛也論見發熱發汗病不解反惡寒者虛故

也芍藥甘草附子湯主之

芍藥甘草附子湯方

芍藥 白朮各二兩 甘草三兩 桂枝四兩

附子一枚炮去皮

右咬咀每服五錢水煎溫服

太陽病下後脈促胃滿者桂枝去芍藥湯主之

桂枝去芍藥湯方

桂枝去皮 生姜各兩半切 甘草一兩炙 大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

若微惡寒者去芍藥加附子湯主之活人云芍藥味酸脈促胃滿恐成結胃故

去芍藥單用辛甘之味發散毒氣也

去芍藥加附子湯方

桂枝 生姜各兩半 甘草一兩 大棗六枚

附子半個去皮炮

右咬咀水煎溫服每服五錢

傷寒汗下後心下痞而惡寒者表未解也先用桂枝湯解

表用大黃黃連瀉心湯攻痞若痞而汗出惡寒者表已解

也附子瀉心湯主之方論見痞

陽明病胃家實若汗多發熱惡寒者表未解也未可與承

氣湯方論見潮熱

傷寒脈浮汗出微惡寒小便數脚挛急者忌服桂枝湯方論

禁忌

厥見

惡寒續法

活大抵大陽病必發熱而惡寒不可過覆衣被及近火氣恐寒熱相搏脈道沉伏愈令病人寒不可遏但去被徹火兼飲以和表之藥自然不惡寒矣若婦人惡寒尤不可近火恐寒氣入腹血室結聚針藥所不能治矣

惡風

發熱惡風為表虛屬太陽病方論見發熱太陽病條發汗後遂汗

漏不止其症似風濕相搏症背惡風汗出小便不利四肢

難屈伸但心下不滿者身不痛用桂枝加附子湯方見自汗

風濕相搏者骨節煩疼掣痛用甘草附子湯方見身熱

惡風項強脇滿手足溫而渴者用小柴胡湯方論見脅痛

惡風續法

惡風惡寒不同

成惡風者見風至則惡矣必居密室之內幃帳之中則坦然自舒惡寒者則不待風而自寒雖身大熱而不欲去衣者是也活人云惡寒者不當風而自憎寒惡風者當風而憎寒也

頭痛

頭痛表裡諸症

發熱頭痛惡風者屬太陽方論見發熱太陽病大便不利六七日

頭痛身熱小便赤者宜承氣湯若小便利者知不在裏仍

在表也宜桂枝湯論見胃實頭痛發熱脈弦細者屬少陽宜

小柴胡湯論見口苦若脈反沉者當救裏宜四逆湯論見發熱

頭痛兼心下痞硬滿痛苦眩冒時如結胃者刺大椎第一

間肺俞肝俞論見項強若下後仍發汗無汗小便不利者桂

枝去桂加茯苓白朮湯方論見項強若表解汗出脅痛乾嘔

者宜十束湯方論見脇痛頭痛乾嘔吐涎沫者用吳茱萸湯

診

表

方論 若表解汗出心下鞭引脇痛者用十束湯 若陽
 見吐 明胃實反無汗而小便利嘔欬手足厥者為寒邪方論見
 頭痛發熱吐利者為霍亂方論見 濕家病身痛發熱
 面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大能食者納藥鼻中則愈
方論見身痛濕痺條

太陽病下之復脈細數者頭痛未止

頭痛續法

丹 一丈夫因浴冷水發熱頭痛脈緊此有寒濕也宜溫藥
 汗之

蒼朮

麻黃

乾葛各錢半

甘草炙

陳皮

川芎各二錢

分二貼服得汗後知病退又與下補藥

芍藥半兩

陳皮

半夏各三錢

白朮

蒼朮

人參

木通各二錢

甘草五分

分四貼姜水煎服

一婦人頭痛發熱而渴

白朮兩半

陳皮

川芎各三錢

乾葛二錢

木通錢半

甘草炙

右分四貼水煎溫服

發散方

若已發汗或未發汗頭痛如破者用連鬚葱白湯

連鬚葱白湯方

蔥白

連鬚切

生姜二兩

右以水二升煮取一升分二次溫服再不止者宜服後
 方

葛根蔥白湯方

葛根

芍藥

知母各半兩

蔥白

川芎 生姜各一兩

右以水三升煎至一升熱服

吐涎方

若非次頭疼曾中滿及發寒熱脈緊而不大者即是膈上有涎宜用瓜蒂末一錢煖水調下吐涎立愈

汗下後頭痛分陰陽

雲傷寒汗下後頭痛起目眩者宜獨活湯

防風 獨活 旋覆花 當歸各七錢

右咬咀姜水同煎服

傷寒熱病後頭痛不止者用石膏川芎湯

石膏 川芎各一兩

右咬咀每服五錢水煎服

六經頭痛治法

海太陽頭痛有汗桂枝湯無汗麻黃湯 陽明頭痛白虎湯

少陽頭痛小柴胡湯 太陰頭痛脈浮桂枝湯脈沉

理中湯 少陰頭痛小柴胡湯 厥陰頭痛外傷本經

枝麻黃各半湯 嘔而微吐苦水者吳茱萸湯

垣太陰頭痛者必有痰也少陰頭痛者足寒而氣逆也蓋

太陰少陰二經雖不至頭然痰與氣逆壅於膈中則頭上

氣不得暢降而為痛也

雲如脈浮而頭痛過在手足太陽刺完骨京骨 如脈浮

而長過在手足陽明刺合谷衝陽 如脈浮而弦過在手

足少陽刺陽池丘墟風府風池此刺頭痛之法也

集傷寒頭痛刺合谷 攢竹

項強

發熱惡風項強者屬太陽方論見發熱太陽病体 項強脇下滿苦

身熱惡風手足溫而渴者小柴胡湯 若下後不能食身

黃小便難者與柴胡湯必反重方論俱見脅痛

太陽與少陽并病頭項強痛或眩冒時如結曾心下痞鞭

針灸

診治

者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎勿發汗如發汗則譫語
脈弦五六日譫語不止當刺期門

太陽與少陽并病心下鞅頭項強而眩者當刺大椎肺俞
慎勿下之宜服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無

汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主
之注云心下滿痛小便利者成結胃小
便不利為停飲故加苓朮以行之

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

芍藥

生姜

茯苓

白朮

各兩半

甘草兩一

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服小便利即愈結胃亦項強

如柔痙狀者大陷胃丸主之

項強卒口禁背反張為痙方論見痙

身體痛

大法

發熱惡寒身軀痛者屬太陽病麻黃湯大青龍湯是也

若兼心下支結者柴胡桂枝湯

若兼下利清穀腹脹者

先以四逆溫裏後以桂枝發表方論見發熱太陽病條

若口脈遲

者血少榮氣不足活人先以黃芪建中湯養其血俟尺脈

回却用柴胡等湯和解之

身體疼痛脈沉發熱頭痛不

瘥者四逆湯方論見發熱

若少陰但欲寐手足寒者附子湯

方論見但欲寐

發汗後身軀痛脈沉遲者桂枝加生芍藥生姜

人參新加湯主之

桂枝

人參各兩半

芍藥

生姜

各二兩

甘草兩一

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

身痛諸症

身軀痛下利方論見下利條

方論見

身軀痛吐利為霍亂方論見吐利條

方論見

身

軀痛手足寒若脈沉但欲寐者附子湯方論見但欲寐

方論見

若大汗

濕痺

出熱不去內拘急自利惡寒者四逆湯方論見下利 若夏月中暑脈虛而渴者白虎加人參湯方論見中暑 身痛如被杖面目青咽痛者為陰毒升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯方論見陰毒 太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之候小便不利便反快但當利其小便活人脈沉細作沉緩 濕家之為病身盡痛發熱而煩身黃如熏可與麻黃加木湯發其汗慎不可以大劑攻之

麻黃加木湯方

麻黃二兩去節

桂枝二兩

甘草一兩炙

杏仁十個去皮尖

白朮四兩

右咬咀先以水煮麻黃去沫入諸藥煎溫服覆取微汗濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中

則愈納鼻藥方見發熱

濕家忌

濕家其人但欲汗出背強欲得被覆向火若下早則噦胃滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒渴欲得水而不能飲則口煩躁也 濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

右濕痺活人書為中濕脈沉細為沉緩小便自利者木附湯小便不利者甘草附子湯五苓散而不及麻黃加木湯并納鼻藥蓋麻黃納鼻皆是表藥而非脈沉緩之劑故也

風濕不得屈伸者甘附

風濕相搏骨節煩疼掣痛不能屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

甘草

白朮各一兩

桂枝二兩

附子一枚

右咬咀水煎温服作四劑活人云身腫者加防風一兩

不能轉側者桂附

傷寒八九日風濕相搏身疼体煩不能轉側不嘔不渴脈浮虛而澹者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝附子湯方

桂枝一兩 附子一枚 甘草六錢 大棗四枚
生姜切一兩

右咬咀每服五錢水煎温服

白朮附子湯方

大便硬小便利者未附

白朮三兩 附子一枚炮 甘草二兩 生姜兩
大棗六枚

右咬咀水三升煮一升分三服温服一服覺身痒半日

許再服三服都盡其人如胃狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

發熱日晡劇者麻黃

病者一身盡疼發熱日晡而劇者多風濕此病傷於汗後當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡湯

薏苡湯方
薏苡仁 麻黃各半兩去節湯泡 甘草一兩

杏仁十枚去皮尖

右咬咀每服四錢水煎温服有微汗者避風

身重汗出者防已

風濕身重脈浮汗出惡風者防已黃芪湯方見身重問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病仍不愈者何也答曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣在故不愈也若治濕風者發其汗但微微自欲汗出者風濕俱去也

風濕

躰痛續法

垣風濕相搏一身盡痛者補中益氣湯加羌活防風升麻
藁本蒼朮治之如病去勿再服以諸風藥損入元氣而益
其病故也

海神朮湯治風濕惡寒脈緊無汗 白朮湯治風濕惡風
脈緩有汗俱見續傷寒發熱條

右二朮湯治風濕又當隨症加減其詳並見瘥條及白
朮神朮二湯後

活杏仁湯療風濕身體疼痛惡風微腫

桂枝二兩

麻黃去節湯泡乾芍藥

天門冬去心各一

兩

生姜兩

杏仁二十五枚去皮尖炒

右咬咀每服五錢水煎溫服

垣麻黃復煎湯治陰室中汗出懶語四肢困倦乏力走疰

疼痛乃下焦伏火不得伸浮而躁熱汗出一身疼痛蓋風
濕相搏也以麻黃發汗漸漸發之在經者亦宜發汗况值
季春之月脈緩而遲尤宜發之令風濕去而陽氣升困倦
乃退血氣俱得生旺也

麻黃

去節用水五盞先煎令沸去沫查再煎至三盞方入下藥

黃芪各二錢

白朮

人參

柴胡根

防風

生地

各五分

甘草三分

羌活

黃柏各一錢

杏仁

三個去皮尖

右咬咀作一服入麻黃湯煎至一盞臨卧服勿飽服

當歸拈痛湯治濕熱為病身體疼痛

方見諸痺門一身盡痛條

風濕

醫學綱目卷之三十一

傷寒部

陽明病

胃實不大便

自汗

不得臥

潮熱

譫語

狂亂

循衣摸牀

渴

嘔

乾嘔

陽明裏証
胃家實

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答

曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽

陽明者發汗利小便胃中燥煩實大便難是也陽明之為

病胃家實也問曰緣何得陽明病答曰太陽病發汗若下

若利小便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內

實大便難者此名陽明病也傷寒脈浮而緩手足自溫

者是為繫在太陽太陽者身當發黃若小便利不能發黃

至七八日大便鞭者為陽明病也陽脈實因發其汗汗

出多者亦為太過太過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也

中風中
寒辨

忌攻

陽明病若能食為中風不能食為中寒 陽明病但頭眩
不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者咽不痛也

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也以
其人本虛故攻其熱必噦也 陽明病脈遲食難用飽飽

則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸下之腹滿如故所以
然者脈遲故也 陽明病欲解時從申至戌止 傷寒嘔

多雖有陽明症不可攻也 陽明病面合赤色不可攻之
攻之必發色黃小便不利也 陽明病心下鞭滿者不可

攻之攻之利遂不止者死利止者愈

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者

胃實有
表者先
解表

知不在裏仍在表也須當發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

陽明病脈浮無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯 陽明

病脇下鞭滿大便不利而嘔舌上白胎者可與小柴胡湯

若上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解

筋痛脈
浮弦宜
和

陽明中風脈弦浮大而短氣腹滿脇下及心痛久按之氣
不通鼻乾不得汗嗜臥一身及面目悉黃小便難有潮熱

時時噦耳前後腫刺之小瘥外不解病過十日脈續浮者

與小柴胡湯脈但浮無餘症者與麻黃湯若不小便腹滿

加噦者不治

口苦脈
浮緊宜
和

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若下
之則腹滿小便難也 許學士云宜小柴胡湯 陽明腹滿脈浮緊口

苦咽乾而喘若發熱汗出不惡寒反惡熱身重者忌發汗

忌加燒針忌下也 論見自汗 陽明病脈浮而緊者必潮熱發

作有時但浮者必盜汗出

右胃家實不大便雖三尺之童亦知可下也殊不知仲

景之法雖有胃實症若表未解及有半表者亦先用桂

胃實表
解無症
者導之
大便硬
者導之

枝柴胡以解外然後視虛實消息之也
陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬
不可攻之當須自欲大便時宜用蜜煎導而通之若土瓜
根及入猪膽汁皆可導之

蜜煎導法

用蜜七合入銅器中微火熬稍凝似飴狀攪之勿令焦
候可丸以手捏作挺子令頭銳大如指長二寸許乘熱
急作之納穀道中用手急捺住欲大便時乃去之 又
猪膽汁方用大猪膽一箇瀉汁和醋少許和勻灌入穀
道中如飯時頃大便自去

便硬無
所苦者
俟之

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心
下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者
此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦

也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散 陽

明病本自汗出醫更重發汗病已瘥尚微煩不了了者此

大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其

小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不

久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不久必大

便也

胃實表
解有証
者隨証
攻之

陽明病潮熱不六便六七日恐有燥糞欲知之法少與小

承氣湯轉矢氣者有燥屎可攻若不轉矢氣者無燥糞不

可攻 方論見 陽明病汗出大便鞭而譫語者宜小承氣

湯 方見 不大便腹滿者宜下之若但遠臍痛者則為燥

屎宜承氣湯 若心下至小腹滿痛者則為結胃宜陷胃

湯 方見 陽明病不吐不下心煩者宜調胃承氣湯 陽

明病發熱汗出此為越熱不能發黃也但頭汗出身無汗

汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏身必發黃茵陳湯主之 小便不利大便乍難乍易有微熱喘胃不臥者宜大承氣湯論見不陽明症其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之方見畜血無表裏症下後脈數不解消穀易飢六七日不大便者有瘀血宜抵當湯 傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯 跌陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便難其脾為約麻仁丸主之

麻仁丸丹溪云氣實而表藥也

麻仁升

芍藥

厚朴去皮黃製

枳實各四兩

杏仁

大黃煨各八兩

右為末蜜和丸如桐子大米飲下二三十丸未知益之每日三服

飲下不

陽明口燥但欲漱水不欲嚥者此必

血脈重則抵當湯

實者宜下

許學士有一士人家病二人皆旬日矣一則身熱無汗大便不通小便如澁神昏而睡診其脈長大而實予用承氣

脈虛者宜導

下之而愈一則陽明白汗大便不通小便利津液少口乾燥其脈亦大而虛作蜜煎三易之下燥糞得溏利而解其

家曰皆陽明不通何以治之異予曰二症雖相似然自汗小便利者不可蕩滌五臟為無津液也然則傷寒大症相似兩症稍有不同宜仔細斟酌正如格局看命雖年月日時皆同而貴賤窮通不相侔者於一時之中有淺深故知不可不謹

實反無汗者

陽明病發多反無汗其身如虫行皮中狀者此久虛故也

虛邪

陽明病反無汗而小便利三日嘔而欬手足厥者必頭

痛若不欬嘔手足不厥者頭不痛論見胃實陽

明病無汗小便利心中懊懣者身必發黃宜茵陳蒿湯

脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日

當劇

脈沉而遲不能食身體重大便鞭名曰陰結也期十四日

當劇

少陰病但欲寐腹脹不大便者承氣湯主之論見但欲寐

胃實續法

傷寒大便不通

期門一云章門照海

已寒丸治陰症服四逆數日不大便躁渴者方見燥條

自汗

成自汗者謂不因發散而自然汗出也

問曰陽明外症云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也

問曰病有得之一日不發熱而惡寒何也答曰雖得之一

日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也問曰惡寒何故自罷

答曰陽明居中土萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自

止此為陽明病也 傷寒轉屬陽明者其人濺然微汗出

也

本太陽初得病時發其汗先出不徹因轉屬陽明也 汗

出身熱不惡寒便鞭譫語者宜承氣湯論見譫語

陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

許有人患傷寒目痛鼻乾不得臥大便不通尺寸脈俱大

已數日一夕汗出予謂速以大柴胡湯下之醫駭曰陽明

自汗津液已涸法當用蜜煎何須苦用下藥予謂日子雖

胃實欲寐者少陰

針灸

陰症

陽明外

證身熱

自汗不

惡寒

急下證

下證

知蜜煎為穩當還用大柴胡湯此仲景不傳之妙公安能知之予力爭竟投大柴胡湯二貼愈仲景論陽明之病多汗者急下之人多謂已是自汗若又下之豈不表裏俱虛又如論少陰云少陰病一二日口乾燥者急下之人多謂病發於陰得之日淺但見乾燥若更下之豈不陰氣愈甚舉此二端則其可疑者不可勝數此仲景之書世人罕能讀也予謂仲景稱急下之者亦猶急當救表急當救裏之說凡稱急者有三變謂纔覺汗未至津液乾燥便速下之則為精捷免致用蜜煎也若胃中識得了了自無可疑若未能了快用之反不若蜜煎之為穩也

和辨症

陽明脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則心憤憤反譫語若加燒針必怵惕躁不得眠若下則胃中空虛客氣動膈心中懊懣舌上胎者

梔子豉湯主之若渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯

主之若脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

脈浮發熱口苦者邪在表脈緊自汗腹滿不惡寒者邪在裏此表裏俱有邪宜和解

陽明欲食小便反不利大便自調其人骨節疼翁翁如有

熱狀奄然發狂澱然汗出而解此水不勝穀氣與汗共并

脈緊則愈

不欲食者痼瘕

陽明病若中寒不能食小便不利手足澱然汗出此欲作

也

似陽明二症

太陽病發熱汗出不惡寒者為柔痙

論見痙

太陽病吐後

汗出不惡寒發熱關上脈細數曰小逆

論見發熱

表裏

汗出身熱不惡寒裏症前條陽明病是也

汗出身熱惡

汗出身熱惡寒

風寒者宜桂枝湯

論見發熱

兼項強痛者桂枝加葛根湯

屬表不項
惡寒屬強
裏

兼骨節煩疼不得屈伸小便不利者甘草附子湯論見
若發汗後遂漏不止惡風者桂枝附子湯論見
後條

若夏月中暑自汗身熱惡寒脈微弱口渴足冷者白虎
加人參湯主之方論見
中暑

汗出湯
不渴

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘草湯主之

汗出心
痞有二
症

汗出心下痞滿有二症其痞按之濡軟不痛而惡寒者宜
附子瀉心湯其痞按之鞭引脇痛而身體不惡寒者宜十
惠湯方論見
痞條

汗後汗
不徹

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢急難以屈
伸者桂枝加附子湯主之

桂枝附子湯

附子製一

桂枝去皮

生薑二兩

甘草炙一

大棗六

右吹咀每服五錢水煎溫服

詎有一人得太陽症因發汗汗不止惡風小便濇足攣而
不伸予診其脈浮而大浮為風大為虛予曰在仲景方中
有兩症大同而小異一則小便難一則小便數用藥少差
即有千里之失仲景第七症云太陽發汗遂漏不止其人
惡風小便難四肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯第十
六症云傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反
以桂枝湯攻表此誤也得之便數咽中乾煩燥吐逆一則
漏風小便難一則自汗小便數或惡風或惡寒病各不同
也予用第七症桂枝加附子湯三啜而汗止佐以甘草芍
藥湯足便得伸

二陽併病太陽病發汗不徹因轉屬陽明續自微汗出不
惡寒其人面赤燥煩短氣不知痛處但坐更發汗則愈論見

面赤

風濕症

發汗已身灼熱者名風濕風溫為病脈浮汗出身重多眠

宜葳蕤湯

論見風溫

胃乾

發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者少少與

之

論見不得眠

動氣

動氣在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為逆難治

見後續條

汗出而喘

汗下後汗出而喘者麻黃杏仁甘草石膏湯

下後利不

止脈促喘而汗出者葛根黃芩黃連湯

論俱見喘

汗出下利

汗出下利熱不去厥逆惡寒者四逆湯

下利清穀者通脈四逆湯

論俱見下利

汗出下利有微熱者

其脈數自愈脈緊未愈

論見下利

六七日後發熱而利其人

汗出不止者死

論見下利

汗出吐利

脈緊反汗出而咽痛吐利者少陰病亡陽

吐利汗出手

足厥冷脈微欲絕者四逆湯

吐利止汗出而厥脈微欲

絕者通脈四逆加猪膽汁湯

方論並見吐利

診

脈陽微而汗出者為自和也汗出多者為太過

陽明汗多而渴者不可與猪苓湯

脈浮自汗若小便數脚攣急

者不可與桂枝湯

自汗續法

陰陽

海太陽自汗桂枝湯

陽明自汗白虎湯

少陰自汗四

逆湯

陽明症身熱目痛鼻乾不得臥不惡寒而自汗或惡熱而

尺寸俱浮者白虎湯主之

傷寒尺寸脈俱長自汗大出

身表如冰石脈傳至于裏細而小及瘧疾但寒不熱其人

動作如故此陽明傳入少陰戊合癸即夫傳婦也白虎加

桂枝主之然脈雖細小當以遲疾別之此症脈疾而非遲故用此法白虎加桂枝湯方見瘧如中暑自汗微惡寒者亦宜服之

活傷寒應發汗而動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗出筋惕肉瞤此為逆難治先服防風白朮牡礪散次服建中湯

防風白朮牡礪散治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

防風

牡礪炒成粉

白朮各等分

右為細末每服二錢以酒調下米飲亦得日二三服汗止後服小建中湯

診

或汗出髮潤與其出如油或大如貫珠着身出而不流皆為不治之症

針灸

集傷寒汗多不止內庭瀉

合谷瀉

復溜瀉

手足汗

二陽併病潮熱譫語而手足漿漿汗出者陽明病短氣腹

滿而手足濇然汗出者俱宜大承氣湯方論見潮熱

陽明病

不能食小便不利手足濇然汗出者胃冷欲作痼瘕必大

便初鞭後溏論見自汗

不得臥

陽明裏

身熱目疼鼻乾不得臥尺寸脈俱長者陽明受病也病人

小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能臥者有燥

屎也宜大承氣湯汗後大汗出煩躁不得眠欲飲水者

少少與之愈論見渴汗下後不得眠若反覆顛倒心中懊

懣者梔子豉湯方論見煩若但晝不得眠夜安靜不嘔不渴

無表症脈沉微無大熱者宜乾薑附子湯論見煩躁

少陰病欲寐二三日後煩心不得臥者黃連阿膠湯主之

論見煩躁

黃連阿膠湯

黃連

阿膠各一兩

黃芩五錢

芍藥一兩

鷄子一箇

右咬咀水二盞煎八分去查納膠消盡又納鷄子黃攪勻溫服日三

少陰病下利欲寐六七日後咳而嘔渴心煩不得眠者宜

猪苓湯論見下利少陰病但欲寐脈沉細不煩五六日變自

利煩躁不寐者死論見不得寐發熱下利厥逆煩躁不得臥

者死論見下利

不得臥續法

虛熱

活傷寒吐下後心煩乏氣日夜不得眠者酸棗仁湯主之

酸棗仁湯

酸棗仁一升

麥門冬去心二合甘草炙二錢半

知母半兩

茯苓

川芎

乾薑各一兩

右咬咀每服四錢水煎服

傷寒大熱乾嘔呻吟錯語不得眠者黃連解毒湯主之

黃連

黃芩

黃柏各半兩

山梔二錢

一方有阿膠二錢

右咬咀每服五錢水煎服如未知再服進粥以此漸瘥

傷寒瘥後虛煩不得眠心中懊憹者烏梅湯主之

梔子

炒半兩

烏梅去核四箇

黃芩

甘草炙各半兩

柴胡一兩

右咬咀每服四錢薑三片豉五十粒煎至七分去查溫服一本有竹葉七片

潮熱

表裏

成潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日一發指時而發者謂之潮熱若日三五發者是即發熱非潮熱也潮熱

屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱

陽明病潮熱大便微鞭可與大承氣湯不鞭者不與之若不大便六七日恐有燥糞欲知之可少與小承氣湯入腹中轉矢氣者此有燥糞乃可攻之若不轉矢氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與之則噦其後發熱者必大便復鞭而少也以小承氣湯和之不轉矢氣者慎不可攻也

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

陽明病
下症

陽明病胃實譫語而潮熱者承氣湯主之

大承氣湯

海藏云厚朴去痞枳實泄滿芒硝軟堅大黃酒浸一兩治不大便地道不通

大黃

酒浸一兩治不大便地道不通

厚朴

二錢姜製治腹

枳實

一枚治心下痞按之良久氣散痛

芒硝

一兩治腹中轉矢氣內有燥屎本草云味辛寒潤燥

右咬咀水二大盞煎枳朴至一大盞下大黃復煎至六分去渣入硝又煎一二沸溫服如未利再作與服以通為度

小承氣湯

海藏云大黃泄實厚朴去痞必痞實全者可用

大黃

酒浸一兩

厚朴

姜製二錢

枳實

炒一

右咬咀同上法煎溫服以利為度不利再服 不大便

舌燥心下滿痛而日晡小有潮熱者宜大陷胃湯論見

陽明病發潮熱大便澹小便自利胸脇滿不去者小柴胡

湯主之

陽明為病胃實是也今便澹而言陽明病者謂陽明外症身熱汗出不惡寒反惡熱之病也

便澹腸
滿弦
浮而潮
熱者宜

陽明中風脈弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗
嗜臥身黃小便難時時噦而潮熱者小柴胡加茯苓主之
傷寒十三日不解胃腸滿而嘔日晡時發潮熱已而微
利此必柴胡症下之而不得利今反利者知醫以丸藥下
之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴
胡加芒硝湯主之

柴胡兩一

黃芩

人參

甘草灸

生姜已上各五錢

半夏湯浸三箇

大棗三枚

芒硝兩一

每服五錢水一盞半煎至八分去渣納芒硝更微沸温服

診

陽明病脈浮緊者必潮熱發作有時

論見胃實有表條

潮熱續法

熱

活冬月陽明朝熱脈浮而緊者發作有時但脈澁者必盜

汗黃芩湯主之方見下利

譫語

陽明實下症

陽明為病胃家實是也胃實則譫語故譫語宜入陽明門
陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承
氣湯一盞腹中轉矢氣者更服一盞若不轉矢氣勿更與
之明日不大便脈反微澁者裏虛也為難治不可更與承
氣湯 陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎
五六枚若能食者但鞭亦宜大承氣湯下之 二陽併病
太陽病罷但發熱手足熱熱汗出大便難而譫語者下之
則愈宜大承氣湯 陽明病其人多汗以津液出胃中燥
大便必鞭鞭則譫語小承氣湯主之若一服譫語止勿更
服

虛實實則虛

汗出譫語者必有燥糞在胃中此為風也須下之必過經

鄭聲

乃可下下之若早語言必亂以表虛裏實故下之則愈宜

大承氣湯夫實則譫語虛則鄭聲鄭重煩煩也只將一句舊言重疊煩言之終日殷勤不換他聲也蓋神有餘則能機變而亂語數數更端神不足則無機變而只守一聲也傷寒四五日脈沉而喘滿沉為在裏而反

發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則譫語成無已謂鄭聲

為鄭衛之聲非是前辨已明

汗後譫語

少陽病發汗後及小便數脚攣急誤與桂枝攻表後若胃

不和譫語者少與調胃承氣湯方論見厥三陽合病腹滿身

重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之

則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之論見身重

汗多亡陽忌下

汗發多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛以

通津液後自愈發汗多又重發汗者亡其陽譫語脈短者

死脈自和者不死 諸逆發汗病微者瘥劇者言亂目眩

者死

形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴脈濇者必譫語弱

者發熱脈浮解之當汗出愈

火後譫語

太陽病火劫汗後身黃小便難身體枯燥頭汗腹滿微喘

或不大便久則譫語論見頭汗 太陽病二日反躁乃熨其背

而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發譫語十餘日振

慄自下利者此為欲解也故其汗從腰已下不得汗欲小

便不得反嘔欲失溲足下惡風大便鞭小便當數而反不

數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故

也 少陽病欬欬而下利譫語小便難者被火氣劫汗故

也吐下汗溫鍼後譫語柴胡湯症罷者此為壞病知犯何

逆以法治之論見壞症

下後煩驚

胃滿譫語若下後煩驚小便不利身重不可轉側者柴胡

加龍骨牡蠣湯主之方論見驚

熱入血室

陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出者刺期門

隨其實瀉之澱然汗出則愈

論見

門

腹滿譫語脈浮緊者刺期

門論見

太

陽少陽併病發汗則譫語脈弦五六日譫語

不止者宜刺期門論見婦人發熱經水適來譫語為熱

入血室若熱除脈遲者身涼胃滿如結胃狀者刺期門若

晝則明了暮則譫語者無犯胃氣及上二焦必自愈活人

以小柴胡湯主之論見婦人傷寒

傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以承氣湯下

之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸

藥下之非其治也若自下利者脈當微厥今反和者此為

內實調胃承氣湯主之若下利譫語者有燥屎也宜小承

氣湯方見潮熱

右下利譫語其曰脈調和而手足和小便利者陽也故

用承氣下之其脈當微厥反少陰但欲寐被火氣劫汗

譫語小便難者陰也故當用補劑和之但欲寐下利譫語俱見下利少

陰條

許有人病傷寒下利身熱神昏多困譫語不得眠或者見

下利便以譫語為陰虛症予曰此亦小承氣症衆駭曰下

利而服小承氣仲景之法乎予曰此仲景之法也仲景云

下利而譫語者有燥糞也屬小承氣湯而得解予嘗讀素

問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少

視其事也帝曰何謂反治岐伯曰塞因塞用通因通用王

冰註云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結復須除以寒下

之結散利止則通因通用也正合於此又何疑焉

診直視譫語喘滿者死下利者亦死 譫語妄言身微熱脈

浮大手足温者生逆冷脈沉細者不過一日死矣

謔語續法

虛 素謔語者氣虛獨言也 全文見註愚用參芪歸朮等劑治謔語得愈有百十數豈可不分虛

實一槩用黃連解毒大 小承氣等湯以治之乎

難脫陽者見鬼 仲景謂亡陽謔語亦此義

氣虛脈 陽者錯 失志者 脈損小

海黃芪湯治傷寒或時悲哭或時嬉笑或時太息或語言 錯亂失次世疑作謔語狂言者非也神不守室耳兩手脈 浮沉不一舉按全無力浮之損小沉之亦損小皆陰脈也

甚者用調中九或理中九 二方並見 發熱下

勞倦謔 語

丹浦江鄭兄年二十歲九月間發熱頭痛妄言見鬼醫與 小柴胡湯數貼熱愈甚予視之形肥而亦帶白却喜筋骨 稍露診其脈弦大而數實脈本不實涼藥所致此因勞倦 成病與温補藥自安遂以參朮為君苓芍為臣黃芪為佐

附子一片為使與二貼而症不減或曰脈既數大狂熱正

又大渴用附子誤矣予曰此虛症而誤投寒涼之藥人肥

而脈左大於右事急矣非加附子參朮焉能有急效再與

一貼乃去附子作大劑與服至五十貼得大汗而愈自後

又補養兩月氣體方始平復 一人五月內患謔語大發

熱肢體不能舉喜冷飲診其脈洪大而數用黃芪茯苓濃

煎如膏却用涼水調與之三四服後病者昏睡如死狀但

顏色不改氣息如常至次早方醒諸症悉退而安 盧兄

汗後再發熱妄言呂仲脩汗後熱不退亦妄言陶明節熱

退後不識人言語謬妄皆用參芪朮歸等補劑而愈信哉

謔語屬虛者十居八九

寒熱

便利肢 脈微

活大小便鞭手足冷脈微細者必鄭聲也當服温藥白通 湯海藏用黃芪加乾薑湯 方見傷寒 發熱下 候輔之脈極沉細

寒 譫語為

外熱內寒肩背胸脇斑出十數點語言狂亂或曰發斑譫語非熱乎予曰非也陽為陰逼上入于肺傳之皮毛故斑出神不守舍故錯語如狂非譫語也肌表雖熱以手按之須臾冷透如水與薑附等藥數日約二十餘兩得大汗而愈後因再發脈又沉遲三四日不大便與理中丸三日內約半斤其病全愈以此知侯公之狂非陽狂之狂乃失神之狂即陰虛也

便秘手足溫脈洪語語為熱

活大便秘小便赤手足溫脈洪數者必譫語也宜用調胃承氣湯

海治老幼及虛人傷寒五六日昏冒言妄小便或淋或澀起臥無度或煩而不得眠並宜白虎湯加山梔一錢

斗治熱病及時疫心躁狂亂奔走狀似癩癩言語不定久不得汗及時疫不知人事者以人中黃不拘多少入確內

用泥封固武火煨半日去火候冷取出於地上以盆蓋一日許研細如麪新汲水調下三錢或未退再服愈人中黃即屎也

狂亂

鎮墜

火劫汗後亡陽心驚狂起臥不安者桂枝去芍藥加蜀漆

牡蠣龍骨救逆湯方論見驚汗家重發汗必恍惚心亂小便

已陰痛與禹餘糧丸方見

下症

小腹滿發狂或身黃者宜抵當湯論見發熱方見畜血

遺尿狂言目反直視者此為腎絕論見大法

狂亂續法

狂而脈實者為實熱

活病人煩躁狂走妄言面赤咽痛脈實潮熱狂語如見鬼

狀此陽毒也治陽毒法見陽毒門表者陽毒并麻湯黑奴丸裏者大黃散

本治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋鵲石散

黃連 寒水石各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草湯候冷調下

雲傷寒心風狂妄者宜防風黃連湯

黃連

大黃

防風

遠志

茯神各半

右為細末每服一兩水煎服

海黃芪湯治傷寒或歌或笑或悲哭謔言妄語方見發熱下

狂而脈虛者為虛熱

陳志仁傷寒狂妄每欲狂走四五人扶捉不定脈虛數用柴胡湯反劇以參芪歸朮甘草陳皮煎湯一服狂定再服

安睡

針灸

集傷寒發熱不識尊卑 曲池 絕骨 百勞 湧泉

甲熱汗不出狂互引癩疾合谷主之

循衣摸床

診治

傷寒若吐若下後不解不大便五六日至十餘日日晡所

發潮熱不惡寒狂語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀼者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止後服 太陽病以火劫發汗陰陽枯竭虛燥或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者可治論見頭汗

許有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩手撮空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得之者十中九死仲景雖有症而無法但云脈弦者生瀼者死已經吐下難以下藥設且救之若大便得通而脈弦者庶可治也與小承氣湯一服而大便利諸疾漸退脈且微弦半月愈或問曰下之而脈弦者生此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮牀惕不安微喘直視脈弦者生瀼者死微者但發熱譫語者承氣湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋

衣領及檢物者肝熱也此症在玉函列於陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪淫于胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也海藏云許學士作尋未疾此論誠當然莫若以為肺熱之邪其人必妄言亂語難經云肺邪入心為譫語

循衣摸牀續法

虛嘗治循衣摸牀者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼調振脈代遂於補劑中畧加桂二分亦振止脈和而愈

渴

病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也論見大便服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎人參湯主之渴欲飲水無表証者太陽陽症罷轉屬陽明也下二條意同皆太陽陽轉屬陽明故渴也服桂枝

湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參湯主之

傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱

時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人

參湯主之王註云若純在表則惡風無時今表裏有熱故時時惡風也傷寒無大熱

口燥渴心煩脈微惡寒者宜白虎加人參湯陽明病脈

浮緊口苦腹滿而喘若下後渴欲飲水口乾舌燥者白虎

人參湯主之

白虎加人參湯

石膏碎四兩知母半兩甘草一兩粳米一合

人參二錢

右咬咀每服五錢水煎溫服

右白虎加人參五條治表渴脈洪小便利者

本有人初病嘔吐俄為醫者下之已七八日而內外發熱

予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下且重虛矣
白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八日不解熱結在
裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相當也蓋始吐者熱在
胃腕而脈至今虛大三投湯而愈仲景既云傷寒若吐下
後七八日不解表裏俱熱者白虎加人參湯主之又云傷
寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎又云脈浮滑此
以表有熱裏有寒白虎加人參湯主之 國朝林億校正
謂張仲景於此表裏自差矣予謂不然大抵白虎能除傷
寒中渴表裏發熱故前後二症或云表裏俱熱或云表熱
裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻黃與葛
根症安可行白虎也林億見所稱表裏不同便謂之差是
亦不思之過也

溫病渴
似陽明

太陽發熱不惡寒而渴者為溫病

論見溫病活人歲時湯
主之發熱不惡寒者以

而有太表解也太陽病者必頭痛身疼
表未解也此表裏兩症皆兼見

渴而下
利者少
陰

渴而下利屬少陰其病但兼欲寐小便白者四逆湯兼咳

嘔不得眠小便不利者猪苓湯兼自利純青色水者大承

氣湯有熱者白頭翁湯

方論見
下利

消渴氣上衝心心疼飢不欲食食則吐蛇若下之則利不

止若欲飲水者少少與之愈

論見氣
上衝心

小便不
利而渴
者太陽

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲得飲水者

少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者

五苓散主之 發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之

陽明病脈浮緊口苦腹滿發熱汗出不惡寒若下後脈浮

發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之

五苓散方

猪苓

去皮
二兩

澤瀉

一兩

白朮

三兩

茯苓

去皮
二兩

桂枝去皮半兩

右咬咀為散每服三錢白湯調下海藏云五苓散當服而不服之穀消水去

形亡必就陽明燥火戊胃發黃故有調胃承氣症不當服而服之是為犯本小便強利津液重亡而成血症輕則抵當湯主之

猪苓湯方

猪苓去皮

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石各半兩

右咬咀每服五錢水煎溫服日三

頭汗者柴胡茵陳

渴而頭汗小便不利兼脇滿往來寒熱者柴胡桂枝乾薑湯兼發黃者茵陳蒿湯論見頭汗

咳嗽者小青龍

表不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽而渴者小青龍湯去

暑渴身熱足冷

半夏加瓜蒌根湯論見

曰虎加人參

及酒黃連主之方見中暑惡寒身熱者症似表也足冷者不可表

表未解刺期門

發熱惡寒腹滿汗出小便利而渴者為肝乘脾刺期門論

表解宜白虎

表解不惡寒而渴者宜白虎湯方論見前陽明

渴而脇滿寒熱

渴而脇滿及往來寒熱其症未經汗者小柴胡去半夏加

人參瓜蒌湯若汗下後者柴胡桂枝乾薑湯詳見脇痛并往來寒熱

渴而心下

渴而心下鞭痛日晡潮熱不大便者為結胃宜大陷胃湯

若但鞭不痛者為痞與瀉心湯不解反渴而小便不利者

宜五苓散詳見結胃痞氣二門

欲飲不渴者文蛤散

病在陽明應汗之反以冷水嚙之灌之其熱益煩肉上粟

起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不瘥與五苓湯論見結胃

文蛤散方

文蛤一兩即海蛤粉也河間丹溪多用之大能治痰

右一味為散沸湯調服方寸匕

渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒論見濕痺

渴不能飲下熱上寒

渴欲飲水水逆者五苓
渴欲飲水者少與之

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

渴欲飲水若太陽發汗後大汗出煩躁不得眠者及厥陰病氣起衝心心疼吐衄者少與之愈論見前條及氣上衝丸得

時氣病至五六日而渴欲飲水不能多不當與之何者以

腹中熱尚少不能消之更與水作病也至七八日大渴欲

飲水者猶當依症與之與之常令不足勿極意也言能飲

一斗與五升若飲而腹滿小便不利若喘若噦不可與之

忽然大汗出是為自愈也活人云凡病非大渴不可飲水若小渴咽乾者少少呷潤之令

其胃中和乃佳

凡得病反能飲水此欲愈也但聞病飲水自愈小渴者亦

強與之飲因成其禍不可復救活人云強飲水致飲停心下滿結喘者當以五苓散

或謂胃湯主之下痢脈弱脈數而渴者自愈論見下利渴而發熱

診

其脈不弦緊而浮弱者汗出愈論見諸語

宜禁

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥與

猪苓湯復利其小便故也

右活人云切戒太陽症無汗而渴者不可與白虎湯陽

明症汗多而渴者不可與猪苓湯然太陽渴終不可與

白虎耶太陽症得汗後脈洪大而渴者方可與之也陽

明渴終不可與五苓散耶陽明症小便不利汗少脈浮

而渴者方可與之也

渴續法

渴而食虛

羅傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用涼藥止

少者和胃已涼

之恐復損胃氣愈不能食也白朮茯苓是也

渴脈極緊不浮宜溫

海秦二母病太陰病三日不解後嘔逆惡心而脈不浮與

之半硫丸二三服不止復與黃芪建中湯脈中極緊無表

裏病胃中大熱發渴引飲皆曰陽症欲飲之水予反與薑
附等藥緊脈反沉細陽猶未生以桂附薑烏之類酒丸與
百丸接之二日中十餘服病人身熱煩躁不寧欲作汗也
又以前丸接之覆以厚衣陽脈方出而作大汗翌日大小
便始通下瘀血一盆如猪肝然用胃風湯加桂附三服血
止其寒甚如此亦世之未見也

少陰渴
脈沉遲
為寒沉
疾為熱
沉細為
虛

少陰症口渴舌乾而渴尺寸脈俱沉沉遲則四逆湯沉疾
則大承氣湯 少陰口渴舌乾而渴身表涼脈沉細而虛
者瀉心湯主之此有形無形藥也

人參湯治傷寒七八日汗後心煩燥渴

人參

黃芩

柴胡

葛根各一兩

山梔

甘草各半兩

右為麤末每服五錢薑棗煎溫服

風濕
中暑
渴治法

活陽毒倍常燥盛大渴者黑奴丸主之方見 風濕加濕

甚者宜瓜蒌湯方見

中暑伏熱累治不瘥其人發渴不

已酒蒸黃連丸主之方見

脈熱病在腎令人渴口乾舌焦黃赤晝夜欲飲水不止腹

大而脹尚不厭飲目無精光者死不治

嘔

嘔不能
食者轉
屬陽明

傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺濺然者是轉屬陽

明也 食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇

者屬上焦也 腹痛欲嘔吐者黃連湯主之方論見

嘔而發熱者小柴胡湯主之 發熱微惡寒肢節煩疼微

嘔心下支結外症未去者柴胡加桂枝湯主之論見 太

陽病發熱惡寒身體痛嘔逆脈緊者名曰傷寒麻黃湯症

論見 發熱 太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯

主之活人云頭疼身熱痛飢熱目疼鼻乾脉浮而長是也

葛根加半夏湯

葛根二錢 麻黃 生薑各一錢半 甘草

芍藥 桂枝各一錢 半夏二錢 大棗二枚

右咬咀以水一斗先煎葛根麻黃減二升去白沫納諸

藥煎取三升溫服一升覆取微汗

嘔而寒熱脇痛

嘔而往來寒熱胸脇苦滿者宜小柴胡若兼下利者乃太陽少陽合病宜黃芩加半夏生薑湯論見往來寒熱及下利

嘔而鬱鬱微煩

太陽過經十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與

大柴胡湯下之愈 太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐

而心中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下

者與調胃承氣湯若不滿者不可與但欲嘔胸中痛微漉

者此非柴胡症以嘔故知極吐下也

本渴而飲水嘔者柴胡不中與也論見脇痛

先渴却嘔屬飲先嘔却渴欲解

先渴却嘔者為水停心下此屬飲家活人云赤茯苓湯主之

嘔而下利

却渴者此為欲解候也金匱云嘔思水者急與之

嘔而厥

陰宜猪苓湯真武湯並見嘔利

嘔而心煩

嘔而脈弱小便利身熱見厥者難治四逆湯主之

忌

後兼欬而渴者宜猪苓湯詳見不

乾嘔發熱

乾嘔發熱兼自汗惡風鼻鳴者桂枝湯兼表不解有水氣

乾嘔

論見胃實

嘔家有癰膿者不

論見大法

而欬者小青龍湯方見發熱

乾嘔脇痛若表解身涼短氣汗出不惡寒者十棗湯若兼

往來寒熱脈沉緊者小柴胡湯論見往來寒熱

乾嘔下利若兼表不解發熱而欬者小青龍湯去麻黃加

芫花湯論見欬若表身涼脇痛短氣汗出者十棗湯論見脇痛

若因下後心下痞硬滿腹中雷鳴日利數行者甘草瀉心

湯論見痞

若脈微厥逆者宜白通湯若用白通湯溫後利不止厥逆

無脈者白通加豬膽汁湯論見下利

乾嘔厥逆若脈微下利者通脈四逆湯白虎加豬膽汁湯

若脈弦遲不利者四逆湯論見吐

乾嘔續法

飲水嘔者有停飲飲水嘔者有停仲渴而飲水嘔者柴胡不中與也宜治膈間有水赤茯苓

湯主之

赤茯苓湯治傷寒嘔噦心下滿胃脘間有停水頭眩心悸

赤茯苓一兩 半夏姜製一兩 橘紅 芎藭各半兩

人參一兩 白朮半兩

右咬咀每服四錢姜五片水煎服

傷寒瘥後嘔者有餘熱在胃脘也竹葉石膏湯加生姜主

之

乾嘔不止為虛海葛根湯治傷寒乾嘔不止

葛根 人參各一兩 茯苓半兩 半夏姜製七錢

白朮半兩 黃芪七錢 麥門冬去心 甘草炙各一兩

右咬咀每服三錢生姜三片棗二枚同煎服

少陽病 口苦咽乾 眩 往來寒熱

脇滿痛 胸痛 耳聾 少陽

病續法

口苦咽乾

少陽病

少陽之為病口苦咽乾目眩也

活人云宜小柴胡湯

耳聾胸滿忌吐下

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐

下則悸而驚

誤吐氣虛者悸誤下血虛者驚

脈弦發熱忌汗

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則

譫語此屬胃家胃和則愈胃不和則煩悸 傷寒三日少

陽脈小者欲已也 少陽欲解時從寅至辰上

口苦咽乾胃實者陽明忌汗下

陽明病腹滿脈浮緊口苦咽乾而喘若其人發熱惡寒誤

下之則腹滿小便難若其人發熱不惡寒反惡熱誤下之

則胃空虛為懊憹誤下之則譫語誤加燒鍼則不得眠

腹滿許學士云宜小柴胡湯

眩

少陽眩

眩而口苦舌乾者屬少陽

論見口苦

眩而心下鞭項強者屬

和項強宜刺

太陽少陽併病當刺大椎肺俞忌汗下

論見項強

陽明眩胃實

眩而胃實若能食不惡寒者中風若飽則頭眩小便難者

穀疸皆屬陽明

論見胃實

汗後眩為虛

太陽發汗後仍發熱心悸頭眩身暈振振欲擗地者真武

湯主之

方論見戰振

誤汗

動氣在左誤汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤

方論見動氣活人云宜小建中

湯 諸逆誤汗而言亂目眩者死

論見諸語

頭眩脈沉緊發

汗則動經身為振振搖

論見戰振

往來寒熱

往來寒熱屬少陽宜小柴胡湯

本太陽病不解轉入少陽者胸下鞭滿乾嘔不能食往來

寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯若已吐下發汗溫

針譫語柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之 傷寒

五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡主之血虛氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食者臟腑相連其病必下邪高病下故使嘔也宜

小柴胡湯

柴胡 兩二

黃芩

人參

甘草 各三錢

半夏 薑製 六錢

右咬咀每服五錢生薑五片棗三枚同煎溫服日三服若胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌實一枚若渴者去半夏加人參三錢括萎根一兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三分若脇下痞硬去大棗加牡蠣一

兩 心下悸小便不利者去黃芩加茯苓一兩 若不渴外有微熱者去人參加桂三分溫覆取微汗愈 若欬者去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑三分 凡柴胡病下之不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解 傷寒中風有柴胡症但見一症便是不必悉具

熱結寒熱者大柴胡湯

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者宜大柴胡湯論見結胃

柴胡 兩二

黃芩

芍藥 各半兩

半夏 製六錢

生薑 兩一

枳實 兩半

大黃 兩一

右咬咀每服五錢加大棗三枚水煎溫服以利為度未利再服

許有人病傷寒心煩喜嘔往來寒熱醫以小柴胡與之不

除予曰脈洪大而實熱結在裏小柴胡安能去之仲景云傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯三服而病除蓋大黃盪滌蘊熱傷寒中要藥王叔和云若不用大黃恐不名柴胡須酒洗生用有力

汗下後胸滿小便閉頭汗心煩往來寒熱者柴胡桂姜湯
傷寒五六日已發汗而復下之胸腹滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也宜柴胡桂枝乾薑湯

柴胡二兩 桂枝 乾薑各半 括萎根

黃芩各一兩 牡蠣 甘草各半兩

右咬咀每服五錢煎溫服微煩再服汗出愈

脈微瀉者亡血
病人脈微而瀉者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着復衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則

發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着復衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故裸其身又陰脈遲瀉故知血亡也

右脈微因大發汗所致故病當惡寒之時雖盛夏亦欲着復衣服瀉因大下所致故病當惡寒後發熱之時雖盛冬亦欲裸其體是皆亡血陽微陰弱不能勝冷勝熱非是盛夏牽延至盛冬也

脇滿痛

少陽脇滿乾嘔往來寒熱者屬少陽方論見往來寒熱

大陽傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參瓜蒌根主之 得病六七日脈沉浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目

及身黃頸項強小便難者與柴胡湯必下重

陽明

本渴而飲水欲嘔者柴胡不可與也食穀者噦王註云不

嘔者屬柴胡症若因水而嘔者水停心下也脇滿胃家實或嘔而舌上白胎

者或脈弦浮大身黃小便難有熱者俱屬陽明症宜小柴

胡湯方論見脇滿潮熱大便溏利者小柴胡湯方論見

表裏

若因下微利而嘔者先以柴胡湯解外後以柴胡加芒硝

湯主之方論見太陽病十日已去脈浮細而嗜臥者外

已解也若胃滿脇痛者與小柴胡湯脈浮者與麻黃湯

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出發

作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡

寒者此表解裏未和也宜

十棗湯

芫花炒

甘遂

大戟各等分

右為細末合和之再入臼中杵二三百下先以水一升

煮肥棗十枚取五六合去渣納藥末強人一錢虛人半

錢單飲棗湯送下平日服若下少病不除者明日更服

加五分利後米粥白養若合下不下令人脹滿遍身浮

腫也昔杜壬問孫兆曰十棗湯畢竟治甚病孫曰治太

陽中風表解裏未和杜曰何以知裏未和孫曰頭痛心

下痞滿脇下痛乾嘔汗出此知裏未和也杜曰公但言

病症而所以裏未和之故要緊總未言也孫曰某嘗於

此未決願聽開論杜曰裏未和者蓋痰與燥氣壅於中

焦故頭疼乾嘔短氣汗出是痰膈也非十棗不治但此

湯不得輕用恐損人於倏忽用藥者慎之

針灸

婦人發熱惡寒經水適來熱除脈遲身涼脇滿如結胃狀

譫語者刺期門論見

診吐下汗後脈微心下痞脇痛氣上衝咽眩冒脈動惕者成痿論見下後脈弦者必兩脇均急論見傷寒大法

脇痛續法

針灸集傷寒脇痛 支溝 陽陵泉

胃滿

少陽滿者柴胡口苦咽乾又耳聾胃滿者屬少陽忌吐下宜柴胡湯論見

合病喘者麻黃太陽陽明合病喘而胃滿者宜麻黃湯論見

少陰滿者猪膚少陰病下利咽痛胃滿心煩者宜猪膚湯方論見

下後滿症太陽病下之脈促胃滿者桂枝去芍藥湯方論見若脈

促不結胃者欲解也論見下後胃滿小便不利若兼煩

驚譫語身重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯方論見若

兼噦而舌胎者為濕痺論見

汗下後煩熱胃中空者梔子豉湯主之論見

痞輕似滿者瓜

病症發熱惡寒加桂枝或自汗但頭不痛項不強胸中痞

胸痛

少陽實胸脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見活人

宜吐症病胃中諸實胃中鬱鬱而痛不能食飲使人按之而反有

涎唾下利十餘行其脈反遲寸口脈微滑此可吐之利則

止

宜下症吐下後溫溫欲吐胃中痛大便溏腹滿而煩者宜調胃承

氣湯論見

耳聾

少陽病胃脇痛耳聾尺寸脈俱弦者少陽受病也論見口苦耳

聾胃滿者少陽中風論見

未持脈時病人手必自冒胃師因教試令欬而不欬此必

兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

少陽病續法

表裏中三法
海辨表裏中三說假令少陽症頭痛往來寒熱脈浮此三症但有其一即為表也口失滋味腹中不和大小便或閉而不通或泄而不調但有其一即為裏也如無上下表裏症餘皆虛熱也是病在其中矣

陽氣毒盛變陽毒

咽痛面赤斑為陽毒仲景但名陽毒主發表
陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛唾膿血五日可治

七日不可治宜

升麻鱉甲湯

升麻二兩

當歸

蜀椒炒去

甘草各一兩

鱉甲

手指大雄黃研半兩

右六味以水四升煮取一升頓服之取汗愈肘後千金

方陽毒升麻湯有桂無鱉甲陰毒用甘草湯無雄黃

陽毒續法

活陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言奔走或見鬼或下利脈浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血五日可治七日不可治

升麻

犀角鎊

射干

黃芩

人參

甘草各等分

右咬咀水煎服食頃再服溫覆手足出汗則解不解重作

後賢更名陽毒傷寒主退陽
陽毒梔子湯治陽毒傷寒發熱百節疼痛

升麻

黃芩

杏仁各二錢

梔子

赤芍各一錢

石膏二錢

知母

大青各一錢

甘草五分 柴胡一分

右咬咀每服半兩薑五片豉百粒同煎

大黃散治陽毒傷寒未解熱在內恍惚如狂

大黃一兩 桂心三分 甘草炙 芒硝

木通 大腹皮各一兩 桃仁二十枚

右咬咀水煎服以利為度

海葛根散治陽毒身熱如火頭痛躁渴咽喉乾痛

葛根七錢 黃芩 大黃醋炒 甘草

山梔 朴硝各半

右咬咀水煎服

活黑奴丸治時行病六七日未得汗脈洪大或數面赤目

痛身體大熱煩躁狂言欲走大渴甚又五六日已上不解

熱在胃中口噤不能言為壞傷寒醫所不治或人精鬼已

竭心下尚煖撥開其口灌藥下咽即活兼治陽毒及發斑

麻黃去節泡 大黃二兩 釜底煤研 黃芩

芒硝 竈突墨研 梁上塵 小麥奴各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大新汲水研下一丸渴者與冷

水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若無汗再服一丸

須微利效小麥奴即小麥未熟時叢中不成麥稔之成

黑勃是也此藥須是病人大渴倍常躁盛者乃可與之

若不渴者服之反為禍耳

水漬法

脈洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤宜以水漬布薄

之疊布數重新水漬之稍按去水搭於背上須臾蒸熱又

漬冷如前薄之仍換新水數十易熱甚者置病人於水中

勢纔退則已亦一良法也

陰陽毒

丹砂丸治傷寒陰陽二毒相伏危惡形症

舶上硫黃

水銀

太陰石

玄精石各一兩

硝石兩半

太陽石一兩

右為末用無油銚子以文武火炒上項藥令勻如灰色研極細生姜自然汁浸炊餅丸如菉豆大每服五丸龍腦生姜蜜水下壓其躁也若陽毒末湯下陰毒白湯下不許於屋底炒

太陰病

腹滿

腹痛

王叔和云元陽明篇

吐與利下三門並附入少陰病蓋此三門之病本屬太陰病因在少陰者反多故附入少陰也

腹滿

太陰病忌下

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結硬 太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

本太陽病醫反下之因小腹滿時痛者屬太陰也桂枝加

芍藥湯主之 大便實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加芍藥湯

桂枝

生薑各一兩半

甘草一兩

芍藥三兩

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

桂枝加大黃湯

桂枝一兩

芍藥一兩半

甘草二兩半

大黃半兩大便秘實痛

者加一兩虛者減五錢

右咬咀大棗三箇生薑四片水煎溫服

太陰病脈弱其人續自便利設當用大黃芍藥者宜減之

以其人胃氣弱易動故也 太陰中風四肢煩疼陽微脈

瀋而長者為欲愈 太陰病欲解時從亥至丑 腹滿時

痛吐利者為太陰 論見前太陰條

腹滿宜
温二症

霍亂吐利頭痛發熱身痛不渴而腹滿者理中丸加附子
主之論見吐利下利腹脹滿身痛者四逆温裏後用桂
枝攻表論見下利

腹滿宜
利二症

噦而腹滿視前後部有不利者利之則愈論見噦 少陰腹
滿脹不大便者宜大承氣湯論見不大便

腹滿宜
和二症

腹滿小便不利身黃者茵陳蒿湯論見黃 若兼脇下痛脈
弦浮大者宜小柴胡湯論見鼻乾

腹滿不
減為實
減復如
故為虛

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯 腹滿時減復
如故此虛寒從下而上也當以温藥和之

腹滿脈
浮四症

太陰病腹滿時痛脈浮者宜桂枝湯論見前太陰條 陽明脈弦
浮大脇痛身黃而腹滿者小柴胡湯論見鼻乾 傷寒腹滿譫

語寸口脈浮而緊此肝乘脾也名曰縱宜刺期門 陽明
病腹滿脈浮緊口苦咽乾而痛若其人發熱惡寒者下之

腹滿脈
遲忌下

則腹滿小便難若其人發熱汗出不惡寒反惡熱者下之
則懊懣汗之則譫語加燒鍼則怵惕不眠論見胃家實註云當和解之

腹滿自
汗四症

三陽合病腹滿身重難轉側譫語遺尿自汗者宜白虎湯
論見合病 傷寒發熱脈濇惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗

汗後腹
滿

出口苦咽燥者忌發汗忌燒鍼忌下論見腹滿脈浮遲條
發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之
厚朴生薑人參甘草半夏湯

厚朴

生薑各二兩

半夏六錢

人參一兩

甘草五錢

吐下後
腹滿

右吡咀每服五錢水煎溫服

下利清穀若發汗必脹滿論見下利

傷寒吐後腹脹滿者與

調胃承氣湯

下後心煩腹滿臥起不安者梔子厚朴湯

論見

極吐下後溫溫欲吐胸痛便澹腹滿而煩者調胃

承氣湯論見

禁忌

不大便六七日少與小承氣湯不轉矢氣者不可攻之攻

之則腹滿不能食論見大便腹滿吐利者忌下論見太陰腹

滿脈浮緊口苦咽乾者忌汗下論見自汗腹滿脈遲者忌

中條

腹滿續法

活若飲食不節寒中陰經胸膈不快腹滿閉塞唇青手足

腹滿脈沉細無

冷脈沉細少情緒或腹痛急作理中湯加青皮每服一二

劑胃即快矣枳實理中丸五積散尤妙 腹脹滿者宜杜

梗半夏湯

桔梗半夏湯治傷寒心腹痞滿時發疼痛

桔梗微炒

半夏薑製

橘紅各一兩

右吡咀每服四錢生薑三片水煎服

脈沉細

海少陰症小便遺瀝大便遺失其人病六七日靜重如山

有力者

目不視體如冰腹脹滿與物則咽不與則不求其脈沉細

而微疾按之有力宜急下之與大承氣湯

腹痛

腹滿痛吐

腹滿而痛吐利者屬太陰宜四逆湯論見腹滿太陰條

頭痛發熱者霍亂

若兼頭痛發熱身痛者屬霍亂 霍亂腹痛不渴者理中

丸加人參論見吐利

腹滿痛不大便 病腹中滿痛者此為實也宜大承氣湯下之 病人不大

為陽實

便五六日繞臍煩疼發作有時者有燥糞故使不大便也

發汗不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯 大下後六七

日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有

宿食故也宜大承氣湯 汗下後不大便而渴日晡潮熱

從心下至小腹鞭滿而痛者宜大陷胃湯 方論見結胃

少陰病腹滿下利若小便不利四肢重痛者真武湯便膿

血者桃花湯若下利清穀手足厥逆脈微欲絕者通脈四

逆湯去蔥白加芍藥

腹滿下利者為陰虛

少陰病腹痛苦四肢逆而不溫者四逆散加附子 方論見欲寐

若手足厥冷脈微欲絕者通脈四逆加芍藥湯 方論見下利

腹痛嘔吐為陽

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者宜

黃連湯

甘草 灸

黃連

乾薑 各三分

大棗 三枚

半夏 兩半

人參

桂枝 各三分

石叟咀水煎服分二服

往來寒熱胃脇滿心煩喜嘔而腹痛者小柴胡去黃芩加

芍藥湯 方見往來寒熱條

傷寒陽脈濇陰脈弦當腹中急痛者先與小建中湯不瘥

者再與小柴胡湯

小建中湯

桂枝 一兩半

甘草 炙一兩

芍藥 三兩

生薑 一兩半

大棗 六枚

膠飴 八兩

右叟咀每服五錢生薑三片同煎至八分去渣下膠飴

兩匙許再煎化服

東垣云芍藥味酸於土中瀉木為君飴糖甘草其溫補脾養胃為臣水挾

木勢亦來海土故脈弦而腹痛肉桂太辛熱佐芍藥以退寒水薑辛溫發散陽氣行於經絡皮毛為使故

建中之名始于此焉

腹痛脈弦濇者建中

診傷寒四五日腹中痛若轉矢氣及少腹滿者此欲自利也

腹痛續法

針灸

雲傷寒邪在三陰內不得交通故為腹痛手足之經皆會於腹如脈弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵如脈沉而腹痛過在足太陰脾少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵如脈沉細而痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三陰交此刺腹痛之法也

腹滿欲吐不吐欲瀉不瀉霍亂

丹乾霍亂此係內有所傷外為邪氣所遏有用吐藥者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜用二陳湯加解散藥如川芎蒼朮防風白芷之類是也

煎鹽湯治乾霍亂蟲蠱毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣用煎鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不盡更復吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治俗人以為田舍淺近之

法鄙而不用守死而已凡有此病即先用之吐訖後詳症脈以加減理中湯治中湯欵緩調之

直薑鹽湯治欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩

生薑半兩切

右同炒色變以水一碗煎溫服病甚加童便一盞

世勝靈丹治乾霍亂腹痛甚者取千年石灰湯泡服

成病有乾霍亂濕霍亂乾霍亂死者多濕霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以出洩雖甚重胃中水穀洩盡則止矣所以死者少及乾霍亂死多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出洩壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死者多矣

無乾嘔霍亂者忽然心腹脹滿絞痛蠱毒煩冤欲吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便致悶絕

六陰
濕熱黃
便不利

傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰當發身黃小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必

自止以脾家實腑穢當去故也
海色如煙薰黃乃濕病也一身盡痛色如橘子黃乃黃病也一身不痛

濕痺者
甘附

取濕家之黃也身黃似薰黃雖黃而色暗不明也熱家之黃也身黃似橘子色甚者勃勃出染着衣正黃如黃栢是其正黃色也色如薰黃一身盡痛發熱者為濕痺若脈沉緩小便不利者甘草附子湯五苓散若脈大頭痛鼻塞者

納藥鼻中則愈矣論見
体痛

濕在上
者納藥
鼻中

予診之脈大而虛鼻塞而煩予曰非濕熱宿穀相搏此乃

頭中寒濕非茵陳五苓不可行也仲景云濕家病身疼痛

發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中初

無病病在頭中寒濕攻鼻故塞納藥鼻中則愈仲景無藥

方此方見外臺刪繁症云治天行熱病蓋通貫臟腑寒濕

沉於骨髓之間或為黃疸宜瓜蒂散即此方也瓜蒂散方
見後黃續

條 又有一舟稍病傷寒發黃鼻痠痛身與目如金色小

便赤而數大便如常或者欲用茵陳五苓予曰非其治也

小便利大便如常則知病不在臟今眼睛鼻頰痛是病在

清道中清道者華蓋肺之經也若下大黃則必腹脹為逆

亦用瓜蒂散先含水次搐之鼻中黃水盡乃愈

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳湯

主之陽明胃家實身無汗但頭汗出小便不利飲水漿發

黃亦茵陳蒿湯主之

陽明熱
頭汗出
者茵陳

茵陳蒿 嫩者一兩 大黃 兩半

山梔 二錢

右哎咀用水三大盞先煎茵陳減半納二味煎熟溫服日三服小便當利如皂莢汁狀色正赤過一宿腹滿減黃從小便中去也

身黃脇痛

身黃脇痛小便難未下者宜柴胡下後者忌柴胡 二法俱見胃脇

汗後身黃

傷寒發汗後而身目俱黃所以然者以寒濕在裏不解故也法不可下當於寒濕中求之 與熏法同

下後身黃

太陽病脈浮數為表未解醫反下之若不結胃但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不利身必發黃 論見結胃活人云茵陳湯主之

陽明病面赤攻之必發熱身黃小便不利 論見胃實 陽明病

黃而腹滿脈遲飽則頭眩小便難者雖下之腹滿如故 論見

腹滿 下後不能食脇下滿痛頸項強小便難而身黃者與

柴胡湯必下重

火後身黃

陽明病被火額上微汗出小便不利者身必發黃 風濕

脈浮汗出身重多眠若被火則微發黃色劇則如驚癇時

瘕瘕 論見風濕 太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣

畜血身黃

流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃 論見頭汗 身黃脈沉結少腹鞭而小便自利其人發狂大便黑者為畜血宜抵當湯 論見畜血

瘀熱身黃

傷寒身黃發熱者梔子黃柏皮湯主之

右哎咀每服五錢水煎溫服

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹湯主之

麻黃 節泡去

連翹根

生薑

甘草 各一兩

赤小豆

梓白皮 生各半升

杏仁 二十粒

大棗 六枚

右咬咀每服五錢用潦水一盞半煎温服麻黃杏仁生薑甘草大棗五味甘草發散表邪為陽也赤小豆連翹梓皮酸苦泄裏為陰也潦水味薄不助陰氣也

右身黃小便自利小腹鞭而狂大便黑者為畜血則宜

抵當湯下之若小便不鞭其人不在大便不黑者雖小

便利非畜血也其為症有三一者梔子柏皮湯二者麻

黃連翹赤小豆湯皆治身黃小便利而身不疼者海藏

所謂乾黃是也三者桂枝附子湯去桂加白朮湯皆治

身黃小便利而一身盡痛者活人所謂中濕是也

汗下燒針後心下痞而胸煩者面色青膚臃難治色微黃

手足温者易治論見

身黃禁忌見前汗後身黃下後身黃條

黃續法

陰

身冷汗出脈沉而黃為

海傷寒病遇太陽太陰司天若下之太過往往變成陰黃

一則寒水太過水來犯土一則土氣不及水來侵之多變

此疾一則茵陳茯苓湯加當歸桂枝二則茵陳橘皮湯加

姜朮半夏三則茵陳附子湯四則茵陳四逆湯五則茵陳

姜附湯六則茵陳吳茱萸湯方見如左 發黃小便不利

煩躁而渴茵陳湯加茯苓猪苓滑石當歸官桂主之韓氏名茵

陳茂發黃煩躁喘嘔不渴茵陳湯加陳皮白朮生姜半

苓湯 發黃四肢遍身冷者茵陳湯加

夏茯苓主之韓氏名茵陳陳皮湯 發黃肢體逆冷腰上自汗茵

附子甘草主之韓氏名茵陳附子湯 發黃冷汗不止

陳湯加附子乾姜甘草主之韓氏名茵陳姜附湯 發黃前服姜附

者茵陳湯加附子乾姜主之韓氏名茵陳附子湯 發黃前服姜附

諸藥未已脈尚遲者茵陳加吳茱萸附子乾姜朮通當歸

主之韓氏名茵陳陳茱萸湯 趙宗顏因下之太過生黃脈沉細遲無

力次第用藥至茵陳附子湯大效 按海藏次第用藥者謂先投韓氏茵陳茯苓湯次投茵

陳陳皮湯又次投茵陳附子湯後趙秀才次第做此
趙秀才因下之早黃病脈寸微尺弱身冷次第用藥至茵
陳四逆湯大效 傷冷中寒脈弱氣虛變為陰黃仲景理
中湯加茵陳服之

便赤能食而黃

茵陳湯治傷寒發黃目赤黃小便赤

茵陳

山梔

柴胡

黃栢蜜炙

黃芩

升麻

龍膽草各半兩

大黃炒一兩

右咬咀水煎空心服以利為度

往來寒熱而黃

海 往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯主之

發汗不徹而黃

衍 一僧傷寒發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈
醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服

五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方
用茵陳梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水

四合煎及二合去查食後溫服以和為度

小便不利而黃

活五苓加茵陳蒿湯治發黃而渴小便不利

茵陳蒿湯

分五苓湯分五

右二劑拌勻每服三錢日三服水調下

鼻寒而黃

又方傷寒欲發黃者急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻

中出黃水甚驗即用茵陳湯調五苓散服之最效

本治頭中濕熱發黃疸瓜蒂散

瓜蒂

二十枚

赤小豆

黍米各十粒

右為細末如大豈大一粒許納鼻中縮入當出黃水慎

不可吹入

結胃痞氣發黃

雲結胃發黃太陽附本也

以結胃法治之

痞氣發黃太陰附本

也治之法

診

活問白虎症亦有身熱煩渴引飲小便不利何以不發黃

之方見不
得臥

腹滿小
便不利
陰病二三日至四五日腹滿小便不利若便膿血者桃花

湯主之
方論見
下利

身重下
利
若四肢重痛下利者真武湯主之
方論見
下利

腹脹咳
嘔而渴
少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承氣湯
方見
潮熱

苓湯主之
少陰病下利至六七日變咳而嘔渴心煩不得眠者猪

診瘥劇

少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自
利復煩躁不得寤寐者死 少陰病六七日息高者死

少陰病脈緊至七八日自利脈緊變暴微厥手足反溫者
欲解也
論見
下利 少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在

膀胱必便血也 口燥咽乾但欲寐
方論見
口燥 欲吐不吐

但欲寐
方論見
吐 吐利但欲寐
方論見
吐 下利但欲寐
方論見
下

利 少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道

出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治 少陰病

四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死 少陰病惡寒

身踈而利手足逆冷者不可治

少陰病四逆其人或欬悸或小便利或腹中痛或泄利

下重者宜

四逆散

甘草炙

枳實

柴胡

芍藥
各等分

右為細末日飲和杳服方寸匕日三服如欬者加五味

子乾薑各五分并主下利 悸者加桂枝五分 小便

不利者加茯苓五分 腹中冷痛者加附子一枚炮令

拆 泄利下重者先以水五升煮薤白三升去渣以散

三方寸匕納湯中煮取一升半分溫再服

除病脈沉欲寐

少陰病手足逆冷其人若下利後重者此條四逆散加薤

白湯若下利脈絕及無脈者通脈四逆湯白通加猪膽汁

湯方論見若身體骨節痛脈沉者宜附子湯 少陰病

脈沉者急溫之宜四逆湯方見 少陰病身體痛手足寒

骨節痛脈沉者附子湯主之 少陰病脈沉發熱者宜前

條麻黃附子細辛湯 少陰病欲解時從子至寅上 少

陰病惡寒而踈時自煩欲去衣被者可治 少陰病下利

止而頭眩時時自冒者死 少陰中風脈陽微陰浮者為

欲愈 少陰病脈細沉數病為在裏不可發汗 少陰病

脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺部弱濇者不可復下

之

陽症脈浮嗜臥

太陽病十日已去脈浮細嗜臥者外已解也胃滿脇痛者

小柴胡湯脈但浮者麻黃湯論見 脈浮汗出多眠若身

重息鼾者風濕方論見 若合目則盜汗出者三陽合病

盜汗方論見

目開欲眠為孤感

狐惑病默默欲眠目不得閉不欲飲食惡聞食臭其面目

乍赤乍黑乍白其聲啞者甘草瀉心湯咽乾者苦參湯

其肛虫蝕雄黃熏之其脈數無熱目赤背黑者當歸赤小

豆散並見狐感條

口燥咽乾

少陰病得之二三日口燥乾者宜下之大承氣湯 少陰

病自利純青色水心下痛口燥乾者宜大承氣湯論見

傷寒無大熱口燥渴背惡寒者白虎加人參湯 陽明病

發熱汗出不惡寒反惡熱若口乾舌燥者白虎加人參湯

方論見渴表解條

太陽病下後不大便日晡潮熱心下滿痛而舌上燥渴者

心滿痛者陷胃

但欲寐而躁者少陰身熱而躁者陽明

宜大陷胃湯

嗽水不咽者血海藏云嗽水不嚥胃

桃仁承氣主之

病人默默欲眠目不能閉起居不安聲啞或咽乾者當作

狐惑治之 咽喉乾燥者不可發汗

咽痛

少陰病二三日咽痛可與甘草湯不瘥桔梗湯 甘草湯

用甘草二兩咬咀每服四錢水煎去查溫服日三服 桔

梗湯用甘草二兩桔梗一兩咬咀每服五錢水煎溫服

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

半夏製 桂枝 甘草炙各等分

右咬咀水煎服少少咽之為散白湯調服方寸匕亦效

日三服仲景法為散調服不咬咀

成甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰寒熱相搏咽

痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛

少陰病咽中生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之

半夏製十枚 鷄子一箇去黃納半夏

右二味納半夏着苦酒以鷄子殼置刀鐮中安火上令

三沸去查少少含咽之不瘥更作三劑

診脈緊當無汗反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復

吐利論見吐利

師曰伏氣之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有

伏氣當須脈之若脈微弱者當喉中痛似傷寒非候痺也

病人云實咽中痛雖爾今復欲下利見後活人續法

咽痛下利兼胃滿者猪膚湯厥逆面赤者通脈四逆湯下

後復厥逆下部脈不至者麻黃升麻湯並見下利

咽痛下利少陰厥陰

面赤斑陽毒咽痛面赤斑斑如錦紋唾膿血五日可治七日不可

治宜升麻鱉甲湯活人云陽毒升麻湯主之論見陽毒條

面青黑陰毒咽痛面目青身痛如被杖五日可治七日不可治升

麻鱉甲去雄黃蜀椒湯活人云陰毒甘草湯主之論見陰毒條

診太陽下後脈緊者必咽痛論見大法陽明病頭眩而欬者必

咽痛若不欬者咽不痛先厥後熱者下利必自止止而

反汗出者其喉為痺發熱無汗者下利必自止若不止者

必便膿血其喉不痺論見下利

忌咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥冷欲得

蹇臥不能自溫咽中閉塞不可下下之則上輕下重水

漿不下臥則欲蹇身急頭眩下利日數十行

咽痛續法

寒伏氣活半夏桂枝甘草湯治伏氣之病謂非時有暴寒中人伏

氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈更微弱先發咽痛似

傷寒非喉痺之病必下利始用半夏桂枝甘草湯主之此

病只二日便瘥古方謂之腎傷寒也次用四逆主之

半夏桂枝甘草湯

半夏湯洗 甘草炙 桂心各等分

右咬咀每服四錢水煎候冷少少細呷之即仲景半夏散及湯但藥

耳

附吐

腹滿時痛而吐者太陰病論見腹滿活人云理中湯主之

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐自利而渴論見下利活人云四逆湯主之

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得

之手足寒脈弦遲者此胃中實不可下也當吐之若膈有

寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯少陰病但欲

腹滿痛而吐太陰不吐但欲寐少陰

臥不煩而吐五日變自利煩躁不得寐者死論見但欲寐

腹痛欲嘔吐者宜黃連湯

腹痛欲嘔吐 乾嘔吐 涎沫頭痛

病解後虛羸少氣欲吐者宜竹葉石膏湯

乾嘔吐涎沫頭痛者宜

吳茱萸湯

吳茱萸湯泡洗

人參三分 生姜一兩

大棗三枚

右咬咀水煎去渣分二服

吐水煩渴

發熱渴欲飲水水入則吐者宜五苓散論見

吐下後

傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾姜黃連黃芩人參湯主之

乾姜 黃連 黃芩 人參各等分

右咬咀水煎溫服

太陽病吐後汗出不惡寒發熱關脈細數欲食冷食朝令

暮吐此為小逆論見發熱

汗後吐

病人脈數為熱當消穀引食而反吐者此因發汗令陽氣

微膈氣虛脈乃數也數而容熱者不能消穀以胃中虛冷

故也 凡服桂枝湯而吐者必吐膿血也註云內熱者服桂枝湯則吐如

酒客之類是也 吐厥逆者甘薑

吐續法

脈煩數渴為熱

活吐有冷熱二症寸口脈數手心熱煩渴而吐以有熱在

胃脘五苓散主之

不飲水為寒

寒多不飲水而吐者理中湯去朮加生姜主之

陰症吐

陰症喘促及吐逆者返陰丹入口便住

誤汗後

大橘皮湯治動氣在下不可發汗發又無汗心煩骨節疼

痛目暈惡寒食則反吐穀不得入先服大橘皮湯吐止後

宜建中湯

陳皮半兩

生薑兩

棗子八枚

甘草兩

人參錢一

竹茹半升

右水三大盞煮取一盞分二服

脚氣吐

病人直患嘔吐而脚弱或疼乃是脚氣當作脚氣治之治

痺

附吐利

吐利無寒熱頭疼為陰

腹滿時痛吐利不渴者太陰病論見腹滿活人云理中湯主之病人脈

陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐

利少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

少陰病吐利手足不逆冷反熱者不死脈不至者灸少

陰七壯少陰病吐利煩躁四逆者死少陰病下利欬

而嘔渴心煩變不得眠者宜猪苓湯論見下利少陰病腹痛

小便不利四肢重痛自下利或嘔者真武去附子加生薑

湯論見下利少陰病下利脈微瀼嘔而汗出者當溫其上灸

之論見欲寒溫其上謂下有寒氣當溫其上以助陽氣也既吐且利小便復利而

大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之王叔和入霍亂篇

和入霍亂篇

太陽與少陽合病頭痛脇痛往來寒熱自利而嘔者黃芩

加半夏生姜湯論見合病發熱汗出不解心中痞鞭嘔吐下

利者宜大柴胡湯論見痞發汗後水漿不得入口者為逆

若更發汗必吐下不止嘔吐而利者名曰霍亂病發

熱頭痛身疼惡寒吐利者此名霍亂自吐下又利止復更

發熱也霍亂頭疼發熱身疼痛熱多飲水者五苓散主

之寒多不飲水者宜

理中湯

吐利有寒熱頭痛為陽

人參 乾姜炮 甘草各一兩 白木一兩

右剉每服四錢水煎去查溫服如寒甚者加乾姜一兩半 渴欲得水者加白木一兩半 臍上築者腎氣動

也去白木加桂枝二兩 吐多者去白木加生姜四兩 下利多者倍用白木 悸者加茯苓二兩 腹滿者

去白木加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許自 溫勿發揭衣被活人云或四肢拘急或轉筋者亦去木加附子

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之 運氣 素土鬱之發民病嘔吐霍亂注下六元正紀篇 太陰所至為

中滿霍亂吐下 右濕土霍亂即仲景五苓散理中丸之類是也

歲土不及風乃大行民病霍亂飧泄氣交變論 右土虛風勝霍亂即羅謙甫桂苓白木散之類是也

熱至則身熱霍亂吐下六元正紀篇 右熱霍亂即活人書香薷散之類是也

針灸 靈足大陰之别名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別 者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則蠱脹

取之所別也經脈篇 氣亂於腸胃則為霍亂取之足太陰 陽明不下取之三里五亂篇東垣云足太陰期門穴也足陽明中皖穴也

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯 惡 寒脈微利止者四逆加人參湯方論見惡寒

身痛者 和 脈微者 溫裏 吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四 逆湯加猪膽汁下之

甘草二兩 乾姜三兩 附子大一枚 猪膽汁半合 右三味咬咀水三盞煎至二盞去查納猪膽汁分作二

次溫服其脈即來

乾嘔下利分陰陽

吐利發汗脈平不煩者以新虛不勝穀氣故也 乾嘔而利兼脇痛而表解者宜十棗湯心下痞鞅而煩者宜甘草瀉心湯兼厥逆脈微者通脈四逆湯白虎加猪膽汁湯詳

乾嘔

診

脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也為未解食自可者為欲解

吐利續法

內經霍亂法附

夏月霍亂為暑

活夏月中暑霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋宜服香薷飲須井底沉極冷頓服之乃效他藥不能救

香薷散治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名為霍亂此皆飽食鱸炙頓啖乳酪酒膠百品無所不食多飲水漿眠睡

冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不散陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已百脈混亂榮衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴

去皮

黃連

薑汁炒

香薷

兩

甘草

半兩

右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃效

羅桂苓白朮散治胃暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍亂吐瀉轉筋急痛腹滿痛悶小兒吐瀉驚風皆宜服此

桂枝

人參

白朮

白茯苓

各半

澤瀉

甘草

石膏

寒水石

各

滑石

二兩

一方有木香藿香葛根各半兩

右為細末每服三錢白湯調下或新汲水生薑湯下亦

得有蒙古百戶昔良海因食酒肉飲潼乳得吐瀉霍亂症從朝至午精神昏憤以困急來告予診視之脈得沉數按之無力所傷之物已出矣卽以新汲水半碗調桂苓白朮散徐徐服之稍得安靜又於墻陰掘地一穴約二尺許貯以新汲水在內攪之待一時澄定名曰地漿用清者一杯再調服之漸漸氣和吐瀉遂止至夜得安翌日微煩渴遂愈却以錢氏白朮散時時服之良愈或問用地漿者何也予曰坤爲地地屬陰土平曰靜順感至陰之氣又於墻陰貯以新汲水以取重陰之氣也陰中之陰能泄陽中之陽霍亂症由暑熱內傷而得之故痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加暑熱七神迷亂非至陰之氣則不能息予用之者此也內經福萬世之書豈不信哉 又提學侍其公年七十九歲六月中

暑毒霍亂吐瀉昏冒終日不知人事夜半請予視之診其脈七八至洪大有力頭熱如火足寒如冰半身不遂牙關緊急予思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行亂於胃中是謂大俛云云亂於腸胃則爲霍亂於是霍亂之名自此而生蓋年高氣弱不任暑氣陽不維陰則瀉陰不維陽則吐陰陽不相維則旣吐且瀉矣前人見寒多以理中湯熱多以五苓散作定法治之今暑氣極盛陽明得時之際况因動而得之中暑明矣非甘辛大寒之劑不能泄其暑熱墜浮煽之火而安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽水水調灌之漸省人事諸症悉去後慎言語節飲食三日以參朮調中湯以意增減服之理其正氣逾十日後方平復

無訶子散治老幼霍亂一服即效

訶子炮去核

甘草炙

厚朴製薑

乾薑炮

神麴炒

草果去壳

良薑炒

茯苓

麥芽炒

陳皮各等分

右為細末每服二錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

聖治霍亂用厚朴薑製火上炙令香為末以新汲水調下二錢七佳

大人參散治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參

厚朴製薑

橘紅各一兩

當歸炒

甘草炙各半兩

右為末每服四錢寒三枚水煎服

丹霍亂內有所傷外有所感

雜方

集吐瀉還用吐以提其氣起吐用二陳湯加減或用樟木煎湯吐亦可

海霍亂症本自胃家或因寒飲或因飲水或傷水毒或感

濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏轉筋攣痛經絡亂行

暴作吐瀉中焦胃氣所主也察其色脈隨經標本此治霍

亂吐瀉之法也

外治霍亂吐下不止者艾一把水三升煮至一升頓服

經霍亂陳皮湯下山荳根末二錢

山霍亂吐瀉用屋下倒掛塵泡湯澄清服之大忌飲食入

腹則死喫水水不妨不可飲熱湯

集吐瀉不止或吐轉多四肢發厥虛風不省人事服此四

肢漸煖神識便省

回陽散用天南星為末每服三錢用大寒三枚同煎至八

分溫服未省再服

霍亂轉筋治法見轉筋門

霍亂後方

羅增損縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多煩躁者尤宜服之

草果

烏梅

甘草

砂仁各四兩

乾葛二兩

右咬咀每服五錢生薑五片同煎以水沉冷以解煩或

溫或熱隨意服

無茯苓澤瀉湯治霍亂吐瀉後煩渴欲飲水

茯苓八兩

澤瀉四兩

甘草炙

桂心各二兩

白朮三兩

右咬咀每服四錢生薑二片同煎食前服一方有小麥

五兩

針灸

世以小竹杖兩手反抱住於脊骨就杖兒上下各點一穴

如先吐先灸上穴先瀉先灸下穴各三百壯百發百中

又霍亂諸法不效者灸大椎 又以鹽納臍中灸二十七壯

立甦

集霍亂吐瀉中脘 天樞 三里 委中

摘又法上脘 三里

甲霍亂泄出不自知先取太谿後取太倉之原 又法巨

關 關衝 支溝 解谿

千又主陰陵泉

東吐利上下俱出藏痺膿血頭重臂痛太白 地機 風

府各五 長強 尺澤各一

甲霍亂泄利期門主之 厥逆霍亂府舍主之

世霍亂手足厥冷灸三陰交七壯

甲霍亂逆氣魚際太白主之 霍亂遺尿失氣三里主之

世病人合面正臥兩手着身以繩橫亘兩肘尖頭依繩下

俠脊兩邊相去各一寸灸三七壯無不驗 霍亂已死但

有煖氣者灸承筋七壯立甦 取法以繩從足拇指圍至後跟一匝捻斷等折一半為度

以此度從足跟貼地量上至膈度極頭處是穴 甲霍亂頸痺不仁承筋主之 千金云主與痲脚痲 暴霍亂僕參主

之 世霍亂遍身轉筋肚痛四肢厥冷欲絕者其脈洪大易治

脈微囊縮舌卷不治

禁忌 霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止

羅潔古老人云霍亂轉筋吐瀉不止其病在中焦陰陽交

而不和發為疼痛此病最急不可與分毫粥飲穀氣入胃

則必死矣

保凡霍亂慎勿與粟米粥湯入胃即死本草云粟米味酸

微寒無毒主養腎氣去脾胃中熱益氣霍亂脾胃極損不

能傳化加粟米豈有能生也邪如吐瀉已多欲住之後宜

以稀粥漸漸補養以遲為妙

下利

自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之宜

四逆湯

甘草一兩 乾姜三錢 附子半箇

右咬咀水煎溫服強人加附子半箇乾姜一兩半

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少

陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便

白以下焦虛有寒不能制水故令色白也 活人云四逆主之 少

陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不能眠者猪苓湯主之

自利而渴屬少陰

陰

少陰病自利清水色純青者心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

孫實大郎患傷寒經十餘日口燥舌乾而渴心中疼自利清水衆醫皆相守但調理耳汗下皆所不敢實氏親故相謂曰傷寒邪氣害人性命甚速安可以不決之疾投不明之醫乎召孫至曰即日不可下明日正當下投小承氣湯遂大便通得睡明日平復衆皆曰此症緣何下之而愈孫曰不深於書徒知有書耳不知書之奧也口燥舌乾而渴豈非少陰症乎少陰症固不可下豈不知少陰一症自利清水心下痛者下之而愈仲景之書明有是說也衆皆欽服
下利欲飲水者以有熱故也宜
白頭翁湯

白頭翁

黃栢

秦皮

黃連

右咬咀水煎去渣溫服不瘥再服

少陰病下利白通湯主之 少陰病二三日不已至四五日腹滿痛小便利或下利或嘔者宜
真武湯

茯苓

芍藥

附子

白朮

方本

右咬咀每服五錢生姜五片煎至八分溫服日三 欬

者加五味子細辛乾姜各一分 小便利者去茯苓

下利者去芍藥加乾姜 嘔者去附子加生姜七片

少陰下利咽痛胃滿心煩者猪膚湯主之用猪膚四兩以

水一盞半煎取一盞去渣加白蜜二合半白粉一合二勺

半熬煮和相得溫服

海藏云猪膚即猪皮

厥利症

大汗利而厥冷者宜四逆湯 少陰病但欲寐下利若兼

手足厥逆者白通加猪膽汁湯通脈四逆湯方論見後厥利兼

便膿血者宜桃花湯方論見後便膿血條少陰病效而下利譫語

者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗故也 少陰

病下利脈微瀉嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸

之溫其上義見前條少陰病下利若利自止惡寒而蹠手足溫

者可治 大汗出熱不去內拘急四肢疼必下利厥逆而

惡寒者四逆湯主之 傷寒六七日大下後寸脈沉而遲

手足厥逆下部脈不至咽喉不利吐膿血泄下不止者為

難治宜

麻黃升麻湯

麻黃去節二兩半升麻二兩

當歸

知母

黃芩

萎蕤各銖

石膏碎

白朮

乾薑

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

甘草各六銖

右咬咀每服五錢水煎溫服相次一炊時又進一服汗

出愈

診

下利脈沉而遲其人面少赤身有微汗下利清穀者必鬱

冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也

凡厥利當不能食今反能食者恐為除中試食以索餅

不發熱者知胃氣尚在必愈也論見後傷寒先厥後發熱

下利者必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱無汗

而利必自止必便膿血便膿血者其喉不痺 下利後脈

絕手足厥冷晡時脈還手足溫者生脈不還者死 下利

手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死 傷

寒發熱下利厥逆躁不得臥者死 傷寒發熱下利至甚

厥不止者死

厥利但欲眠者少陰

少陰病下利脈微與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯後脈暴出者死微續者生

白通湯

乾薑一兩

附子一枚生用

右呔咀每服五錢入葱白二寸同煎溫服

白通加猪膽汁湯

乾薑一分

葱白一莖

附子一枚

童便一分

猪膽筒一

右水一盞煎至五分去渣入童便膽汁相和得所溫服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其病面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之

甘草炙

乾薑各二兩

附子一枚生用

面赤色者加

蔥九莖

腹中痛者去蔥加芍藥二兩

嘔者加

薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

利止脈不

出者去桔梗加人參一兩

右呔咀每服五錢水煎溫服未瘥急更作一劑其脈續

續出者愈

少陰病但欲寐四肢逆而利若下重者四逆散加薤白也

論見厥方見但欲寐

若惡寒身踈者不治欲寐

下利腹脹滿身體疼痛先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯

攻表桂枝湯

傷寒表不解乾嘔發熱欬而下利者此為

水氣宜小青龍去麻黃加芫花湯

方論見欬

太陽與陽明合

病者必自下利葛根湯主之

方見太陽病活人云下利而頭痛腰疼肌熱目赤鼻乾其

脈浮大而長者是其症也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若

嘔者黃芩加半夏生薑湯主之

下利而頭疼胃滿或口苦咽乾或往來寒熱其脈浮

下利有表証為陽

大而弦是也

黃芩湯

黃芩三分

甘草炙

芍藥各二分

大棗二枚

右咬咀水煎溫服若嘔加半夏六錢生姜五片

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘

而汗出者宜

葛根芩連湯

葛根三兩

黃連

黃芩各二兩

甘草炙半兩

右咬咀每服五錢水煎溫服日進二三服

下利清穀脈沉微手足厥逆者為陰宜通脈四逆湯論見前條

脈浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之 傷寒

醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏下後身

疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝

下利清穀 脈沉微 逆屬陰 脈浮不厥屬陽

湯 少陰病下利膿血者桃花湯主之 少陰病二三日

日至四五日腹滿小便不利下利不止便膿血者宜

桃花湯

赤石脂

四兩一半全一半取末

大米二合

乾薑二錢

右水二大盞煮三味米熟去查納赤石脂細末一方寸

七溫服日三愈勿服

診 少陰病下利膿血者可刺 下利便膿血若厥而發熱厥

少熱多者病當愈也論見厥 先厥後發熱無汗者利不止

也論見前條 下利脈數而渴者令自愈設不瘥者必清膿血

以有熱故也 下利寸脈反浮數尺中自濇者必清膿血

下利脈數不解而下利不止者必挾熱而便膿血也論見

畜血

下利譫語若脈微手足厥但欲寐小便難者為陰宜補劑

下利譫語分陰

陽

和之

若脈和手足溫及不欲寐小便利者為陽宜調胃承氣湯

論見語語及前少陰下利欲寐條

脈滑宜下

陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相

尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣

湯 下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承

氣湯 下利脈反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯

脈微宜下

下利脈微者白虎湯也若微瀉嘔而汗出數更衣者當溫

而灸之方論見少陰下利條

下利脈大者虛也以其強下之故也設脈浮革故爾腸鳴

者屬當歸四逆湯主之

下利裏急後重

熱利下重者白頭翁湯主之 四肢逆而泄利下重四逆

散加薤白主之 論見前厥利條

下利身痛

下利身體疼痛若但四肢沉重疼痛小便不利者前條

武湯症也 若四肢疼厥逆惡寒者四逆湯若通身疼痛

者先以四逆湯溫裏後用桂枝攻表也方論見前

下利心下鞅

下利三部脈皆平按之心下鞅者急下之宜大承氣湯

下利後心下痞鞅者此非結熱但胃虛客氣上逆故使鞅

甘草瀉心湯主之論見痞

下利咽痛

下利咽喉痛若兼胃滿者猪膚湯兼厥逆者通脈四逆湯

下利胸痛

若下利不止厥逆下部無力咳唾膿血者麻黃升麻湯方論

並見前條

下後利遂不止利為協熱

下利十餘行胸中痛寸口脈滑者宜吐之則利止論見胃滿

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞅服瀉心湯後以他藥下

之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在

下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者宜利其小便

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂

禹餘糧

各四兩

右剉碎每服五錢水煎溫服不瘥再服

下後心下痞鞭腹中雷鳴乾嘔而利者甘草瀉心湯

方論見痞

下後心下痞鞭表裏不解而利者桂枝人參湯

方論見痞

下利脈促表不解喘汗而利者葛根黃芩黃連湯

方論見前

表凡藥下後潮熱脇滿嘔而利者先用小柴胡湯解外

後以柴胡加芒硝湯

論見潮熱

凡藥下後譫語脈調和小便

利而下利不厥者調胃承氣湯

論見

下後脈大浮革腸

鳴而利者當歸四逆湯

論見前

下後脈數不解者必

便膿血

論見前

下後成陰症厥逆咽不利唾膿而利者

麻黃升麻湯

論見厥

少陰病脈繫至七八日自下利脈暴微手足反溫脈繫反

去者為欲解也雖煩下利必自愈

傷寒脈浮緩手足溫

至七八日忽暴煩下利日十餘行者必自止

論見

發熱

而厥七下利者為難治

傷寒六七日不利便發熱而

利其人汗出不止者死有陰無陽故也

少陰病但欲臥

不煩至五六日忽自利煩躁不得寐者死

論見但欲寐

下利

脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微數者為欲自止雖

發熱不死

下利有微熱而渴脈弱今自愈

下利脈數

而渴者自愈設不瘥者必清膿血

論見

下利脈數有微

熱汗出今自愈設復緊為未解

傷寒下利日十餘行脈

反沉者死

假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中

時一小見脈再舉頭者腎氣也若損脈來至為難治

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

下利續法

齊下寒
大便青
白為寒
臍下熱
大便黃
赤為熱

活寒毒入胃者臍下必寒腹脹滿大便黃白或青黑或下利清穀宜四逆湯理中湯白通加附子湯四逆加薤白散挾熱利者臍下必熱大便赤黃色及腸間津汁垢膩宜黃芩湯白頭翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤石脂湯

三黃熟艾湯治傷寒四日而大下熱利時作白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩 黃連 黃柏 熟艾半雞子大 右咬咀水煎溫服

薤白湯治傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛諸熱悉主之

豆豉半合綿裹 薤白握 山梔七枚 右咬咀用水二升半先將梔子十沸下薤白煎至二升下豉煎取一升二合溫服

赤石脂丸治傷寒熱利

赤石脂兩一 黃連兩一 當歸各二兩 乾姜炮一兩 右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九米飲下日三服

便膿血為濕

濕毒氣盛者下利腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜桃花湯地榆散黃連阿膠散

地榆散治傷寒熱毒不解日晚即壯熱腹痛便利膿血

地榆 犀角屑 黃連炒 葛根各一兩 梔子仁半兩 黃芩兩一 右咬咀每服四錢水一盞入薤白五寸同煎溫服

海阿膠湯治傷寒熱毒入胃下利膿血

黃連炒二兩 山梔半兩 阿膠炒 黃柏各一兩 右咬咀每服四錢水煎服

傷寒汗下後大

雲傷寒汗下後大小便利者腹中痛者宜燥腸丸

小便利
腹痛宜
温

附子炮

龍骨兩

乾姜兩

吳茱萸

粟殼

訶黎皮各半

右為細末酒糊丸如桐子大每服三十九温水下利止

勿服

傷寒汗下後裏急後重下利者宜

七宣丸

大黃兩

桃仁去皮尖木香

檳榔

柴胡

訶子皮

甘草各半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九温水下

傷寒汗下後氣逆利不止者寒也宜

枳實芍藥甘草湯

芍藥

甘草

枳實炒

乾姜炮各半兩

右咬咀每服五錢水煎服

厥陰病

氣上衝心

飢不欲食

吐蚘

虫

厥

少腹滿囊縮

厥陰病

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食食則吐

蚘 厥陰病渴欲飲水者少少與之愈 厥陰中風脈微

浮為欲愈不浮為未愈 厥陰病欲解時從丑至卯上

病如桂枝症頭不痛項不強寸脈微浮胃中痞鞭氣上衝

咽喉不得息者此為曾有寒也當吐之宜

瓜蒂散

瓜蒂炒

赤小豆各一分

右研為細末取一錢用豉一合湯七合先漬之須臾煎

稀糜去渣取汁相和温頓服不吐少少加得快吐乃止

諸亡血虛家不可與服

活瓜蒂散每服一錢七藥下便臥欲吐且恐之良久不吐

脈浮氣上冲咽
喉不得息者為
陽

取三錢七湯二合和服以手指探之便吐不吐復稍增之
以吐為度若吐少病不除明日如前法再吐之不可令人
虛也如藥力過時不吐飲熱湯一升以助藥力吐訖便可
食無更服若服藥過多者飲水解之

奔豚

奔豚氣上衝胃腹痛往來寒熱奔豚湯主之

方見續塊腎積氣條

陰陽易

陰陽易少腹裏急引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼

中生花者宜燒棍散

論見陰陽易

剛瘧

氣上衝胃口噤不得語欲作剛瘧者宜葛根湯

論見瘧

汗後氣上衝

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹

上衝心者灸其核各一壯與

桂枝加桂湯

桂枝二兩芍藥

芍藥

生薑各一兩半

甘草一兩

大棗六枚

右咬咀每服五錢水煎溫服

桂枝加桂以能也

下後氣上衝

動氣發汗則氣上衝正在心端

論見動氣

太陽下後其氣上

衝者可與桂枝湯方用前法若不上衝者不可與之

吐下後氣上衝

傷寒吐下後心下逆滿氣上衝胃頭眩脈沉緊若發汗則

動經身為振搖者茯苓白朮甘草湯

論見戰振方見振搖

傷寒吐

下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝
咽喉眩胃經脈動惕者久而成痿

氣上衝心續法

雜方

活李根湯治氣上衝正在心端

半夏

當歸

芍藥

生薑

茯苓

桂枝

黃芩

甘草

甘李根白皮

各等分

右咬咀每服五錢水煎溫服

飢不欲食

厥厥者陰症

飢不欲食食則吐虵者厥陰病論見氣上冲心手足厥冷脈乍

緊心煩飢不能食者邪在胸中宜瓜蒂散吐之論見厥

汗下後飢不欲食食者陽症

太陽病吐發汗出發熱不惡寒關脈細數腹中飢口不能

食朝暮吐者此為小逆論見發熱陽明病下後心中懊懣飢

不欲食但頭汗出者宜梔子豉湯論見煩

吐虵虫

厥陰吐虵

氣上衝心疼飢不欲食吐虵者厥陰病論見氣上冲靜而復

煩須臾復止得食而嘔又煩吐虵虫者為虵厥宜烏梅丸

方論見厥

病人有寒復發汗胃中冷必吐虵活人云先服理中丸次服烏梅丸

厥

先厥後兩感於寒者三日少陰與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥論見

先執後太陰註云耳聾者少陽厥為熱病囊縮而厥者厥陰病

傷寒一二日至四五日而厥者

必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥

應下之而反發汗者必口傷爛赤成無已云若始得之

手足便厥而不溫者是陰經受邪陽氣不足可用四逆湯

溫之若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經之邪也

四逆散主之必須識此勿令誤也四逆湯方見下利四逆散方見欲寐又當

外症別之予嘗治一中年婦人惡熱身熱而渴脈數細弱

先厥後熱用溫藥反劇後以四逆散兼參朮各半服之厥

愈脈出洪大而痊

手足厥寒脈細欲絕者宜

當歸四逆湯

脈細弱而厥為寒

甘草 通草各六錢 當歸 桂枝

細辛 芍藥各一兩

右咬咀每服五錢入枣子一枚同煎温服

若其人内有久寒者宜當歸四逆加茱萸生薑湯主之於原方内加吳茱萸二兩生薑二兩半 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

脈滑厥者為熱

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之

脈促厥者宜灸

傷寒脈促手足厥逆者可灸之脈經云可灸少陰厥陰主逆 傷寒六

脈暴促者宜吐

七日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰灸而不止者死 病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胃中心中滿而煩飢不

能食者病在胃中當吐之宜瓜蒂散脈緊一作脈結者有理 脈來

數時一止復來曰促脈來緩時一止復來曰結結促二脈

者脈為邪礙而歇止也灸之吐之所以逐去其邪也

脈沉而厥

少陰病身痛手足寒脈沉者宜附子湯論見欲寐 傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細

者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在裏半在表也脈雖沉緊不為少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

本有人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以為陰症予診其脈沉而緊予曰此症誠可疑然大便秘結非虛結也安得為陰脈雖沉而緊為少陰症多是自利未有秘結者此症半在裏半在表投以小柴胡湯得愈仲景稱傷寒五六日頭汗出云云至得屎而解正此之謂也有人難曰脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰不得有汗何也今頭汗出者故知非少陰何以頭汗出便知非少陰症予

曰此一段正是仲景議論處謂四肢冷脈沉緊腹滿全似少陰然大便鞭頭汗出不得為少陰蓋頭者三陽同聚若三陰止督而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈法云心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死心為手少陰腎為足少陰相與為上下惟以意逆志者斯可得之傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

悸而厥

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝

各二錢

生薑

三錢

甘草

炙一錢

右咬咀水煎溫服

悸而四逆吐而厥

少陰病四逆或悸者四逆散加桂枝主之方論見欬寐傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲

攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒針者四逆湯主之

甘草乾姜湯

甘草

四兩

乾姜

二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

芍藥甘草湯

芍藥

甘草

各二兩

右咬咀每服五錢水煎溫服

調胃承氣湯

方見發熱

四逆湯

方見下利

問曰症象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而譫語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰尺寸浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脛攣急症象桂枝因加附子參其間增桂令汗出

附子溫經回陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更飲甘草乾姜湯夜半陽氣還兩足當熱脛尚微拘急重與芍藥甘草湯乃脛伸以承氣湯微澹則止其譫語故知病可愈 少陰病食入則吐復不能吐手足寒脈弦遲者宜吐之論見吐

下利而厥

下利而厥下重者四逆加薤白脈微者通脈四逆湯白通湯溫後無脈者白通加猪膽汁湯汗後拘急者四逆湯下後咽不利者麻黃升麻湯方論見下利

吐利厥為寒

吐利發熱惡寒汗出而厥者屬霍亂宜四逆湯 吐利煩躁欲死而厥者屬少陰宜吳茱萸湯 吐利止脈微欲絕而厥者通脈四逆加猪膽汁湯方論見吐利

渴而厥為暑

中暑口乾而渴治法見中暑門 傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為

為厥者為煩者為

臟厥非為虺厥也虺厥者其人當吐虺今病者靜而復時煩此為臟寒虺上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虺聞食臭出其人當自吐虺虺厥者宜烏梅丸主之

烏梅 七十箇

細辛

附子炮去皮

人參

黃栢

桂枝各一兩

乾薑二兩

黃連四兩

蜀樹炒去汗一兩 當歸

右九味共為細末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸熟杵成泥和藥令相得納臼中加煉蜜杵三千下丸如桐子大食前服十九日三服稍加至二十九日忌生冷滑物等

診

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故為進也 傷寒發熱四日厥反三日厥少熱多其

病當自愈四日至七日熱不除者其後必便膿也 傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能食恐為除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐胃熱來而復去也後三日脈之其熱續在者期之日日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日併前六日亦為九日與厥相應故期之日日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不罷者此為熱氣有餘必發瘡膿也 傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日故知自愈 傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利色白者此熱除也欲得食其病愈若厥而嘔胃膈煩滿者其後必便血 少腹滿痛而為冷結關元 論見少腹痛 少陰四逆惡寒身踈無脈不煩 論見 嘔死 論見

忌

少陰病但厥無汗而強發之必動其血 論見 諸四逆厥者不可汗之諸虛家亦然 傷寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之者死

右厥逆皆忌下惟前條先熱者必厥厥應下之而反發汗者一法宜下忌汗之

厥續法

寒厥

活冷厥者初得病日便四肢逆冷脈沉微而不數足多攣

臥時惡寒或自引衣蓋覆不飲水或下利清穀或清便自調或小便數外症多惺惺而靜脈雖沉實按之遲而弱者

知其為冷厥也四逆湯理中湯通脈四逆湯當歸四逆湯

當歸四逆加茱萸生薑湯白通加猪膽汁湯隨症用之

熱厥

熱厥者初中病必身熱頭痛外別有陽症二三日至四五日方發厥兼熱厥者厥至半日却身熱蓋熱氣深方能發

厥須在二三日後也若微厥却發熱者熱深故也其脈雖伏按之而滑者為裏熱其人或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外症多昏憤者知其熱厥也白虎承氣湯隨症用之

失下變厥

又有下症悉具而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥醫人不識却疑陰厥復進熱藥禍如反掌大抵熱厥須脈沉伏而滑頭上有汗其手雖冷時復指爪溫須便承氣湯下之不可拘忌也

脈沉疾有力宜下沉遲無力宜溫

海厥陰症四肢厥冷爪甲青脈沉疾按之有力者為陽則當下宜大承氣湯如脈沉遲按之無力者為陰則當溫宜四逆湯更須速灸之

天寒症寒宜熱之

羅省椽曹德裕男婦二月初病傷寒八九日請予治之脈得沉細而微四肢逆冷自利腹痛目不欲開兩手常抱掖

下昏昏嗜臥口舌乾燥乃曰前醫留白虎加人參湯可服否予曰白虎雖云治口燥舌乾若只此一句亦未然今此症不可服白虎者有三傷寒症云立夏以前立秋以下不可妄用一也太陽症無汗而渴者不可用二也况病人陰症悉具其時春氣尚寒三也仲景云下利清穀急當救裏宜四逆湯五兩人參一兩生薑十餘片連鬚蔥白九莖水五大盞同煎至三盞去渣分三服一日服之至夜則止手足溫翌日大汗而解繼之以理中湯數服而愈孫真人習業論云凡欲為太醫必須精讀甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經絡三候九部本草藥性仲景叔和並須精熟如此方為太醫不爾猶無目夜遊動致顛殞執此用藥者再思可矣

天熱症熱宜寒

陽症治驗 真定府趙吉夫年三十三至元五月間因勞

之

役飲食失節傷損脾胃時發煩躁而渴又食冷物過度遂病身體困倦頭痛四肢逆冷嘔吐而心下痞醫人不察見其四肢逆冷嘔吐而心下痞乃用桂枝末三錢七熱酒調下仍以綿衣覆之作陰毒傷寒治之須臾汗大出汗後卽加口乾舌澁眼白時紅項強硬肢體不柔和小便淋赤大便秘澁循衣摸床如發狂狀問之則言語錯亂視其舌則赤而欲裂朝輕暮劇凡七八日家人輩悉謂危殆不望生全鄰人吉仲完舉予治之診其脈七八至知其熱证明矣遂用大承氣湯苦辛大寒之劑一兩作一服服之利下三行折其勝勢翌日以黃連解毒湯大苦寒之劑二兩徐徐服之以去其熱三日後病十分中減五六更與白虎加人參湯約半斤服之瀉熱補氣前症皆退戒以慎起居節飲食月餘漸得平復內經曰凡用藥者無失天時無逆氣宜無翼其勝無贊其復是謂至治又云必先歲氣無伐天和當暑氣方盛之時聖人以寒涼急救腎水之原補肺金之不足雖有客寒傷人仲景云用麻黃湯內加黃芩知母石膏之類恐發黃發斑又用桂枝湯之戒况醫以桂末熱酒調服所謂差之毫釐謬以千里逆仲景之治法經云不伐天和不贊其復不翼其勝不失氣宜不然則故疾未已新病復起矣

天熱症
寒宜中
治

用熱遠熱從乎中治 友人劉巨源年六十五歲至正夏月因勞役飲食失節又傷冷飲得疾醫者往往以爲四時症治之不愈逮十日請予治之曰右手三部脈沉細而微太陰症也左手三部脈微浮而弦虛陽在表也大抵陰多而陽少今所苦身體沉重四肢逆冷自利清穀引衣自覆氣難布息懶言語此脾受寒濕中氣不足故也仲景言下

利清穀急當救裏宜四逆湯温之內經有用熱遠熱之戒口乾但嗽水不嚥早晨身涼而肌生粟午後煩躁不欲去衣昏昏睡而面赤隱隱紅斑見於皮膚此表實裏虛故也內虛則外症隨時而變詳內外之症乃飲食勞倦寒傷於脾胃非四時之症明矣治病必察其下今適當大暑之時而得內寒之病以標本論之時為標也病為本也用寒藥則順時而違本用熱藥則從本而逆時此乃寒熱俱傷必當從平中治中治者温之是也遂以錢氏白朮散加升麻就本方加葛根甘草以解其斑少加白朮茯苓以除濕而利小便人參藿香木香和脾胃進飲食咬咀一两煎服再服癘退而利止身温而神出次服異功散治中湯辛温之劑一二服五日得平止藥或曰病雖少愈勿藥可乎予曰藥攻邪也內經曰治病以平為期邪氣既去強之以藥變

身熱而脈者必有汗

証隨起不若以飲食調養待其真氣來復此不藥而藥不治而治之理旬日良愈必察其下者謙甫謂時下之宜也若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而兩手忽無脈或一手無脈者必是有正汗也多用綿衣裹手足令温煖急服五味子湯或兼與麻黃細辛甘草湯之類服之晬時必有大汗而解矣

五味子湯治傷寒喘促脈伏而厥

- 人參一分
- 五味子兩半
- 麥門冬心去
- 杏仁去皮
- 生薑各一分
- 陳皮各一分
- 棗子二枚

右咬咀水煎服

針灸 摘治傷寒手足逆冷 大都一分

傷寒六脈俱無復溜補大回 合谷 中極 支溝寸一
半此穴和 復溜順骨 巨闕三寸 氣衝灸七
脈絕穴

宜忌 活諸手足逆冷皆屬厥陰不可汗下然有須汗須下者謂手足雖逆冷時有溫時手足掌心必煖非正厥逆也當消息之

診 脈病若四肢厥逆脈反浮大而短者死

少腹滿囊縮

脈沉結 囊縮者 厥陰腹 滿肢厥 者膀胱 冷結 尺寸脈微緩者厥陰受病也當六七日發其症少腹煩滿而囊縮論見大法活人元脈沉短囊縮者承氣湯下之病者手足厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷結在膀胱關元也

少腹硬滿小便利者為畜血若兼身黃發狂者抵當湯主之畜血不利者畜血不利者身黃發狂者抵當丸但少腹急結者宜桃花承氣湯

傷寒表不解乾嘔發熱而欬或小便不利少腹滿者小青龍去麻黃加茯苓湯主之論見欬

不大便日晡潮熱從心至少腹鞭滿而痛者宜大陷胃湯

少腹滿囊縮續法

活傷寒六七日煩滿囊縮其脈尺寸俱微緩者足厥陰肝經受病也厥陰病其脈微浮為欲愈不浮為未愈宜小建中湯脈浮緩者必囊不縮外症必發熱惡寒似瘡為欲愈宜桂枝麻黃各半湯若尺寸俱沉短者必是囊縮毒氣入腹宜承氣湯下之大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故

次傳入陰經以陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陽木為微邪也陰主殺故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木至六七日當傳厥陰肝木必移氣克於脾土脾再受邪則五臟六腑皆因而危殆榮衛不通耳聾囊縮不知人而死矣速用承氣湯下之可保五生一死古人云脾熱病則五臟危又土為木賊則死若第六七日傳厥陰脈得微緩微浮為脾胃脈也故知脾氣全不受克邪無

所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

大小便
秘發熱
引飲宜
下大小
便利不
熱不痛
宜溫

海厥陰症者煩滿囊縮大小便不通發熱引飲腹滿尺寸脈微緩煩者火也滿者木也雖不吐虵囊縮但急者亦木也火與木相合四肢厥逆而爪甲青大小便不通地道塞也發熱引飲邪氣在裏宜溫之下之

已上諸症大小便俱通地道不塞不發渴不引飲邪不在裏則宜溫之灸之則裏外相接以復陽氣宜服

正陽散

麝香

一錢細研性辛溫治腹急滿痞風毒

乾薑炮

甘草

灸各二錢半

附子

一兩炮去皮臍味辛鹹溫治風利發瘵腹滿囊縮

皂角

二兩酥炙去皮

弦味
鹹溫

右為細末每服二錢白湯下溫服

回陽丹

硫黃

半兩味酸溫大熱治心腹腫聚邪氣冷癖左脇氣咳上氣脚冷無力

附子

炮半兩

乾姜

炮二錢半

木香

半兩味辛溫療肌中偏寒主氣不足乏精

全蝎

半兩味甘辛治

風一切

葶澄茄

半兩味辛溫治皮風心腹氣脹

吳茱萸

半兩洗炒

味辛溫大熱治中風逐邪諸食不消氣逆利五臟順氣

右為末酒糊丸如桐子大生薑湯下三五十九併二三服以熱投之衣被取汗

陰氣毒盛變陰毒

陰毒之為病面青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之

陰毒續法

活陰毒甘草湯治傷寒時氣初得病一二日便結成陰毒或服藥後六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中

仲景但名陰毒主發表

活人更名陰毒傷寒主退寒

絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細而疾身如被杖咽喉痛五六日可治七日不可治

甘草炙

升麻

當歸各五錢

雄黃二錢

桂枝

去皮五錢

蜀椒

炒去汗併開口者及子二分

鱉甲

酥炙一兩半

右咬咀水煎服如人行五里許更進一服覆取汗毒從汗出汗出即愈若未汗再服

陰毒脈沉細疾

本陰毒本因腎氣虛冷因慾事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而後伏陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上及手背冷汗不止或多煩渴精神恍惚如有所失或可起行不甚覺重診之則六脈俱沉細而疾尺部短小寸口或無六脈俱浮大或沉取之大而不甚疾者非陰症也若服涼藥過多則渴轉甚躁轉急有此症者急服還陽退陰之藥即安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰症不宜發汗如氣正脈大身熱未瘥用藥發汗無妨

始得陰毒

正陽散治傷寒如覺風寒吹着四肢頭目骨節疼痛急服此藥如人行五里許再服連進三服出汗立瘥若患陰毒傷寒入退陰散五分同煎或傷冷傷食頭昏氣滿及心腹諸疾服之無有不效

麻黃去節

陳皮

大黃生

甘草

乾薑

肉桂

芍藥

附子

吳茱萸

半夏製各等分

右咬咀麻黃加一半茱萸減一半同為末每服一錢水一盞姜三片葱一枚煎七分熱服以衣被蓋覆取汗切

須候汗乾去之如是陰毒不可用麻黃免更出汗
退陰散治陰毒傷寒手足逆冷脈沉細頭痛腰重連服三
次小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻陰毒傷
寒咳逆煎一服細細熱呷病止

川烏

乾薑等分

右為麤末炒令轉色放冷再搗為細末每服一錢水一
盞鹽一捻煎至半盞去渣溫服

五勝散治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沉困倦咳嗽鼻塞
不思飲食兼治傷寒夾冷氣并慢陰毒神效

白朮

一兩半

甘草

五味子

石膏

各一兩

乾薑

三兩半

右咬咀每服五錢水一盞入鹽少許同煎服如冷氣相
夾入薑棗煎或治陰毒病入艾葉少許煎服

海白朮散治陰毒傷寒心悶煩躁四肢厥冷

川烏

炮去皮臍

桔梗

附子

炮

白朮

細辛

各一兩

乾姜

炮半兩

右咬咀或末之白湯調下一錢匕

羅正陽丹治陰毒傷寒手足厥冷指甲青色體冷脈沉細
而微神效 用葱蔥四五枝陳蜂房四五箇燒存性為細
末用葱蔥搗和丸如彈子大手心內握定用手帕緊繫
定須更汗出以綿被覆蓋如手心熱甚休教解開如服
藥先服升麻湯五錢連鬚蔥三莖生姜五片水二大盞
煎至一盞去渣溫服被覆取汗則愈

本陰毒漸深候 積陰感於下則微陽消於上故其候四

肢沉重逆冷腹痛轉甚或咽喉不利或心下脹滿結硬躁
渴虛汗不止或時狂言爪甲面色青黑六脈沉細而一息

陰毒漸深爪青面黑

七至以來有此症者速宜於氣海關元二穴灸二三百壯以手足溫煖為效仍服金液丹來甦丹五勝散還陽散退陰散

川烏去皮臍冷水浸七日薄切晒乾紙袋盛之有患
者取研末一大錢入鹽一小錢水一盞煎至七分服壓下陰毒所注如猪血相似未已再進一服效

還陽散治陰毒面青四肢逆冷心躁腹痛

用硫黃末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱一起更看緊慢再服汗出瘥

活返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁頭疼四肢逆冷

硫黃五兩 附子炮去皮臍 乾姜炮 桂心各半兩
硝石另研 太陰玄精石另研各二兩

右用生鐵鈔先鋪玄精末一半次鋪硝石末一半中間下硫黃末又着硝石一半蓋硫黃却以玄精石末蓋上

用小盞合着用三斤炭火燒令得所勿令烟出細研似麩後三味搗羅為末與前藥同研令勻軟飯和丸如桐子大每服十五丸至二十九煎艾湯下頻服汗出為度病重則三十九此方甚驗喘促與吐逆者入口便住又服此藥三五服不退者更於臍下一寸灸之須是晝夜大段不住手灸不限多少壯數灸之艾炷勿令小小則不得力若其人手足冷少腹硬即於臍下兩邊各開一寸各安一道三處齊下火灸之仍與當歸四逆湯併返陰丹亦須頻脹內外通透方得解若遲誤即死矣又若陰症加以少腹不通及陰囊縮入少腹絞痛欲死者更於臍下二寸石門穴急灸之仍須與返陰丹當歸四逆湯加吳茱萸生薑慎勿與尋常利小便冷滑藥火燄散治傷寒惡候

舶上硫黃 黑附子去皮新臘茶為細末各一兩

右為細末先用好酒一升調藥攤入新碗中於火上蕩乾合在瓦上每一碗下燒熟艾一拳大以瓦搯起無令着火直至烟盡候冷即括取研入磁盒內盛每服二錢酒一盞共煎七分有火燄起勿訝傷寒陰毒者四肢冷脈沉細或吐瀉五心煩躁胃中結硬或轉早伏陰在內湯水不得下或無脈先喫一服如吐却更進一服服後心中熱其病已瘥下至臟腑中表未解者渾身壯熱脈氣洪大便宜用發表藥或表解者更不發熱便得眠睡渾身有汗若少有痞結脈實方可用下膈行臟腑藥漸用調和元氣補治脾胃湯散服此藥三服不應者不可治也

陰毒沉困之候與前後漸染之候皆同而更加沉重六

附骨一息八至

脈附骨取之方有按之即無一息八至已上或不可數至此則藥餌難為功矣但於臍下灼火艾如束大三百壯以來手足不和煖者不可治也倘復和煖以前硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來則漸減熱藥而和治之以取瘥也活治陰虛陽脫體冷無脈氣息欲絕不省人事及傷寒陰厥百方不效者用葱以索纏如臂大切去根及葉惟存白長二寸許如大餅樣先以火煏一面令通熱勿令着火乃以熱面熨病人臍上連臍下又以熨斗滿貯火熨之令蔥餅中熱氣鬱入肌肉中須更作三四餅一餅壞不可熨又易一餅良久病人當甦手足温有汗即瘥更服四逆湯以温其內

海治陰症諸藥不效併湯水不下身冷脈絕氣息短不知人用蔥白熨法莫若用醞醋拌麩皮炒熟注布袋中蒸熨

比上法尤速

代灸塗臍膏

附子

馬藟子

蛇床子

吳茱萸

肉桂各等分

右為細末可用白麩一匙藥末一匙生薑自然汁煨成膏攤帛上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其火力可代灸百壯腰痛亦可貼之。一法用丁香萹撥乾薑牡礪燒灰放手心中以唾津調如泥以手掩其陰至煖汗出為度

陰毒傷寒四肢逆冷者用吳茱萸不拘多少為細末溫酒和勻生絹袋盛之熱熨脚心令通暢愈若以湯煎溫藥灑洗以接四肢亦可

本治陰中伏陽破陰丹

硫黃

水銀各一兩

陳皮

青皮各半兩

右將硫黃先入銚子內鎔開次下水銀用鐵杖子打勻令無星傾入黑茶盞內細研入二味用麩糊丸如桐子大每服三十九丸如煩躁冷塩湯下陰症艾湯下良效

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰症也急服金液破陰來復等丹其脈遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰症而見陽脈有可生之理仲景所謂陰病見陽脈者生仍灸氣海丹田百壯手足溫溫陽回得汗而解或問滑沉之狀如何便有生理予曰仲景云翁奄沉名曰滑何謂也沉為純陰翁為正陽陰陽和合故名曰滑古人論脈滑雖曰往來前却流利旋轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字極難曉翁合也言張而復合也故曰翁為正陽沉言忽降而下也故曰沉為正陰方翁而合俄

降而沉奄爲忽忽間仲景論滑脈可謂諦當矣其言皆有法故讀者難曉宜細思之

醫學綱目卷之三十一



