

保赤指南

解毒法 蛇毒 疔毒
外科 疔毒
全身各部 瘰癧

卷之三 疔毒 疔毒 疔毒

婦科
喉科
疔毒
外科
眼科

保赤指南

P.272

12

李 李 chunquan yanjiu

鄧旒樂天著

幻科秘訣

翻刻必究務本藏板

抄書小范
十

敘

且自神農嘗草醫藥始興醫之立方蓋以濟世垂久也古人神而明之非拘守一隅是濟世也宏其傳世也遠樵之北鄉書壇村爲鄧氏世居地也有樂天公者幼讀書業儒兼精虛扁之術迥異平庸延請者踵門如市不擇貧富遠近請必醫醫必愈暮年乃輯其生平得心應手之方分門別類如麻痘諸科雜症等方又繪圖紋

於上顏曰保赤指南車誠濟世之書其傳世也
必矣未及付梓 公卽仙遊 公之曾孫 避
非先生克承先志不欲秘爲家傳迺出而公諸
斯世無論業醫者得之可爲寶筏卽畧識之無
者亦可按圖求駿嗟乎是書名保赤者爲赤子
之病言也名指南車者爲醫赤子者言也使醫
赤子者能通是書而不迷於所往則庶乎亦可
保矣又使推古人如保赤子之意以保天下之

民則億萬人之由赤子來者皆能免其顛連疾
苦咸登仁壽之域也其功詎不偉歟至於公
與先生之懿行宜與斯並傳不朽云

肯

光緒己卯年葭月望後樵川後學葛汝器敬撰

卷之七 婦科

逆經

久無孕

交陽症

赤帶

腹內痞塊

推生應驗

脫衣不下

產後奇症

提經反乳

噎膈反胃

卷之八

內科

閉經

孕婦脇痛

白帶

血崩

勞熱不除

交骨不開

產後癢痛

老婦翻經

久瘡不愈

神驗藥

小腸氣痛

脇痛

黃疸症

瘰癧

押谷瘰

腹痛

老年腰痛

遺血瘋

鼻衄

小便不通

久漏遺精

心氣痛

齒痛

水腫

黃腫

火瘡瘰

絞腸痧痛

疝氣痛

中風不語

吐血

赤白濁

小便血

尿痢痧淋

大便血

腸風下血

痢症

禁口痢

治痢藏身符語

酒痢

卷之九 硬喉

魚膏硬喉

吞針入喉

吞銅錢

諸骨硬喉

木筒鎗喉

穀芒刺喉

中毒門

狗肉毒

獺犬咬毒

蜂刺毒

蜈蚣毒

蛇咬毒

斑蝥毒

諸蠱毒

虫入耳

生附子毒

諸葯毒

水粉毒

鴉片毒

砒礪毒

信石毒

銀銷毒

蕈毒

漆咬毒

狐惑

酒醕死

卷之十 外科

取齒不用鉗

太陽汁

老鼠藥毒

菰毒

河鮑魚毒

魘死

頭生櫻桃

頭生癩瘡

頭瘡潰爛

虻蝦蟊掌

鼠痿瘡

內外喉風

口角疔

腫猴膝

鼻孔疔

点黑痣

交牙風

生痰癍

咽喉腫痛

飯疔

承糧疔

人中疔

對口疔

面生汗癍

左癱右瘓

無名惡疔

背瘡發

緣桷鼠

牛皮癬

天蛇指

膨貓頭

松皮瘡

兩肩生瘡

婦人乳吹

纏腰蛇

鵝掌癬

膨穿掌

膨瘡疔

牛執癬

膝瘡

試虫驗

坐板瘡

膨硬尻

紅蛇旋

紅白瘰

腎囊風

腎海漏

楊梅瘡

婦人裙邊瘡

脛瘡發

足心疔

棠梨泡

黑白癩

腫水疔

沙疥瘡

痔瘡便毒

下疳瘡

取腐肉

挿穿管

升丹口訣

熬膏口傳

竹木鉄釘刺入肉

湯火傷

創刀傷破

石壓破

跌打損傷

跌打斷骨

接骨敷藥

眼科

天行赤眼

風熱侵眼

飛絲入眼

白翳侵睛

胥肉生珠

然氣冲眼

保赤指南車卷之七

十閩邵邑鄧

旒樂天氏編輯

弟

旗鼎台氏

男

焜舉峰氏

全校

婦科

大凡婦科之症雖散見各書論病多設方屢屢紛
紜辯議各逞所長究未見真實效驗予姑不取單舉
其深信至驗得心應手者筆之於編以備急用

婦人逆經

婦人頭面七孔流血或吐血此非險症乃月信逆行
從止焦出急用當歸尾錢叁紅花錢叁京墨磨汁炮服即

婦人閉經

一婦人年廿餘增寒壯熱頭痛腰疼請予往診予按
其脉六部俱無予心着驚以為脫症必矣覽察其形
五官紅活目睛有神指甲紅潤肌膚如常再仔細摸
其脉內實停重按之若木絕無舉動予加詳辯此必

閉候若係脫症六脉既絕內必空虛似按蔥葉斯內
沉實閉候無疑予私問其夫其夫曰平素月信對期
茲則將兩月未能也愚疑其孕予得其情悅曰非孕
也急用

通經活血湯

當歸尾

錢貳

丹皮

錢半

京芥

錢

牛夕

錢

赤芍

錢

生地

錢半

桃仁

錢七

紅花

錢八

只壳

錢

澤蘭

生蒲黃

錢

肉桂

錢六分

兵郎

錢

共煎水飲

一服

如失

婦久魚孕

婦人久不懷孕有生子久不再孕及懷孕不成者當
有多法以女人右手中指節紋一寸反指向上量之
用草一條量至五寸其草削斷令婦人舒足仰卧將
所量草自臍心垂下至草盡處以筆點定此不是穴
復以原草平摺以摺處攢安前點處其草各開兩頭
草盡處是子宮穴按之有脉動各灸三壯如篩抄大
最有奇驗即能生生不息

孕婦脇痛

一婦人每孕七八箇月右脇痛甚百藥無效及胎墮其痛乃止連胎皆然請予往診予用 青柴舒肝湯 青皮小

柴胡 小 白芥子 粉 白雞脚茅 六分 痢水服一劑而痊後孕皆育

交腸症 出素問書中原方茲不及載 子畧加減一二真得奇驗

交腸怪症多屬女人男子少患大便從小便而出小便從大便而痢此症幾載方書却世所罕見惟吾得而治之

一妇人李氏因小產後失血過多未得補養不數月經信而行小便滯塞溲尿經血皆從魄門出月期不調陸續點滴似痢非痢

不思飲食春三月起至秋八月面如土色體瘦如柴諸醫束手
請予往診細詢其由再切其脉兩寸俱遲兩微兩尺浮而濇惟
左關大而芤始知血虧精敗陰陽兩失故不運化以致水道
不分予用蜜製黨參三天生漂朮式當歸身式抱心茯神
四醋炒莪朮八醋炒三棱八川芎汁炒升麻半陳壁土
炒蒼朮小炒黑蒲黃小真白頭翁粉黑山查炭式
甘草稍五上肉桂五皮五磨參還元水為引取新汲
井花水煎每早空心服二劑而愈越一年復發予仍

用本方加高力參五錢四劑而痊二便如常月信如期越一年生一女乃育 以上葯味皆子自經手認真製炒故取勝可必

婦人白帶

肉員方

治婦人白帶

龍骨

三五蓮子

五茯苓

五艾實

五淮山

虛牡

兩

力不用五花猪肉半斤合葯末蒸熟或燂湯亦可不時服即愈

婦人赤帶

丹方 丹參 防丰 炒京芥 阿膠 煨木香 乾姜 白芍

各等分水燻服

婦人痢症

血不止

婦人血崩下小便來血不止或成塊或紫黑或約無効血尽則死急
取嫩新蕊採來陰乾以微火灼乾亦可研末和病婦本身所來之血
半杯再全燒酒半杯調勻温服立時血止真是奇方 薪草 即差也我

邵武七音謂之芽柴三煖為炊者其草初生有曲蕊 醫人
當谷雨時採取極多若無燒酒黃酒亦可
又方 治痢症 岩羊血或陳烏糖 開水充服立効其後用參茸

峻補之劑

又方 禹餘糧醋煨盡 乃赤石脂醋煨盡

共為末沸水炮服

腹內痞塊

婦人腹內有痞塊間非癥瘕在皮裡膜外時大時小
以致經信不勻主生他症取 大薊根六生酒醱一
盃全搗爛敷痞上外以帛帶縛之候一日痞散

經行

又方治婦人積瘀不行腹內成塊或癥瘕痛不可忍

取牛角浪柴根切片全烏雞煮爛食消痞止痛

牛角浪

此柴獨莖少枝皮青其葉對坐葉長似牛舌又名牛舌虧

勞熱不除

一婦人年四十餘癸水將絕痛匠以為孕竟用補血
安胎之劑攻成異症勞熱不除乾咳無休面黃肌瘦
請予往診予按其脉左三部俱虛右寸浮大右關洪
實予知土勝水虧大腸燥結小便澀熱急取牛角浪
根切片壺西猪肉式兩水兩碗煎至一碗去葯其湯

和猪肉並食一服暫減二服小水清大便潤三服其
熱盡除飲食知味

大凡婦女無論胎前產後久咳不止似病非病身弱
無力飲食暫減此婦內必有潮病不自覺屢屢清肺
止咳之味百無一効急取牛角浪楮楮肉食最妙

推生應驗

極利方

當歸

六錢

川芎

參

桃仁

十二粒

川牛夕

式錢

酒炒

紅花

式

炭姜

壹

車前子

兩板

上桂心

酒炒

酒炒

酒炒

保赤指南

甘草 黑棗枝為引水煎服 初生產婦交骨

不開外加急性子壹錢 若胞衣不下本方去

龜板加茯苓茸炒只壳各壹錢 童便一盃參服

及胞衣俱下本方去茯苓只壳紅花前子龜板

不用仍照本方再服數劑龍眼廿四個為引永

無后患 汗出加製北芪 口渴加洋參麥冬

心虛加賀神棗仁 四肢冷痺加附片

保全母子神効奇方

此方端治一切產難未產能安胎臨產能推生
 及孕婦腰痛腹疼小產下血交骨不開橫生逆
 產死胎難產等症今穩婆有以刀割致傷產婦
 言之痛心莫不駭聞患害非測千萬不可茲異
 人傳授此方大有奇驗可保母子俱全萬無一
 失 當歸全酒炒 生黃芪八分 酒炒羌活五分
 姜汁炒紫厚朴七分 酒川芎錢半 京芥穗八分 甘州五分
 陳只壳去穰麩 兔絲酒蒸 川貝母不 艾灰醋炒

酒白芍

式小冬月一介

生姜

式片

水二大鐘煎八分空心

服渣半鐘煎六分臨產隨時服

但以上藥餌

各味俱要揀擇道地者泡製斟酌戩分莫悞如

法服之無不應驗

又單方治難產或橫或倒

急取燕窠泥水四五碗煎

二沸杓起澄清去草泥温服傾刻即產

又方治橫生逆產

吊蘭

敗醬草

枇杷樹取根

共搗汁酒參熱服

敗醬草

俗名黃苦薺

交骨不開

開關丸 治陰戶擁滯蜘蛛網多多叔來捲如繩索約

有指大外用絲綿箔包挿入陰戶內須臾骨開

產快

胞衣不下

丹方 嵩治胞衣不下 朴硝參童便一盃和酒全煎熟

服再加當歸 牛夕更捷

產後瘀痛

取紅莧菜根五六升水二鐘燻八分熱酒參服

又方 嵩治瘀血作痛

灌菜根

又名活葉

取根搗汁日參熱服

又方 治血攻心痛 夏枯草搗汁陳求糖調服

產後奇症

一婦人臨產時服推生藥太早未曾離經用力太過以膏過膜有傷產後陰戶內出葯線一條約二三尺長痛不可忍先飲失笑散數劑仍用老姜三片洗淨不去皮研爛用清油式兩拌勻入鍋內炒熱以油乾焦

為度先用熟絹一段五尺長摺定令穩婆輕輕乘起
肉線使曲曲圈作一圍納在陰戶中再將絹袋兜油
姜稍溫敷肉線上漸冷又炒熱使之常吸姜氣俟一
旦一宿盡收入腹中即安再服失笑散歸芎湯以補
氣血保無他虞

一婦人產後忽然而乳伸長細小如腸直垂過小腹
苦不可言危亡頃臾此名乳懸急用川芎貳斤半當
歸貳觔半將一半剉碎入水濃燻不拘時候多少溫

保赤指南
服餘一半剉作大片放炉内燒熱令病人坐桌内將
炉安置桌下周匝以裙圍住使煙薰向乳前及口鼻
俱吸烟氣一二時辰定能收効 倘未收全功用冷
水磨草麻子搽於頂上百會穴片時盡收

老婦翻經

一方 當歸 側柏 槐花 蘄艾 四味俱醋炒

生地 蒲黃 伏龍肝 共水燂空心服

一婦人年六旬餘忽行經腥臭難聞予治以厚桂切

碎放新磚內上蓋以新瓦周圍以溫火焙乾存性研
細末每服一匙黃酒調下立効

提經返乳仙方

瑞安陳貞白先生傳

婦人生兒未彌百日乳汁淡少而經信太行此方
能取乳汁濃足使經信淡少真是奇聞用大猪蹄
一對燂爛入大栗子四兩鮮蝦一兩搗爛入汁燂
一時其汁化為水濾去滓臨用時合加後味

王不留行

太歲卵

萵苣子

炒甲珠

各壹錢

共為細末入煎藥汁全服令婦乳汁如泉湧
若二八處女服之其乳反上轉血為精緻經乃止
童顏不老修仙之人得之為還元之要品也
太緘卵 出處州其草蔓生周年十二月其藤每
月添一節生一實一年共生十二子至腊全落來
春復生其實若雀卵故名太緘卵

保赤者商車卷之八

十閩邵邑鄧

旒樂天氏編輯

弟

旗鼎台氏

男

焜舉峰氏

仝校

噎膈反胃

三陽結謂之膈蓋足太陽膀胱經水道不行手太陽小腸經津液枯竭足陽明胃經榮衛乾渴以致手陽明大腸焦燥糞結所以飲食拒而不入縱入太倉還

出咽喉則正氣上下不接故呃噎之聲出口間夫人
之腸胃一日一便乃常度也患膈食之人五六日不
便陳物不去新味不納俗醫強分為五膈十噎支派
既多僥喪其實標本不明強弱莫辯是以火裡煨姜
湯中燂桂胡椒末已萼撥繼之丁香末已豆豉代之
雖曰和胃胃本不虛又曰溫脾脾無寒冷此其所以
膈食之病有曠日彌年而不愈也治法當節次微下
陳物去而腸胃潔癥瘕盡則榮衛昌飲食自進矣丹

溪云噎膈之患血虧氣損有熱有痰平胃為先大凡
膈噎反胃嘔吐之症審其氣血虛實或因七情之氣
而成間或因血碍而起氣虛用四君湯血虛用四物
湯如膈痰用二陳湯加減切不可造次用姜附太溫
太燥之劑以傷陰氣孤陽愈盛為害深矣故丹溪多
用牛乳之類以養陰滋血清利為先順氣次之古書
有註虎肚平胃散雞滕藿香飲鯽魚平胃丸糞坑窖
姜此皆難製難取之味急時無求亦不及載予刪取

其易求易便應効可必活人無算者姑細詳之

八仙膏治反胃口燥便結

生藕

生姜

大梨

生蔗

蘿蔔

白果

六味共搗汁去滓再加

竹瀝半鐘 蜂蜜 壺盃

共熬熟去火性服之立効

藍靛湯

治膈氣咽喉噎塞胸喉有物飲食不下如

遍躰生肉鱗能跳躍

藍靛磨水服之能化為

水極捷

蜆殼飲治反胃吐食除心胸痰水

取年深蜆爛壳煨

為灰米飲調下壺錢即愈若無蜆壳蚌壳亦可

化鐵丸

治結腸翻胃兼治蠱脹皮緊如鼓煩悶氣

促坐卧不安飲食頓減手足枯瘦一服立瘥

五靈旨

去砂

青皮

陳皮各壹兩

陳糯米壹合

巴豆

卅五粒
去壳膜

製法先炒五靈旨香透次下青皮

炒至色變再下陳皮共炒至色焦加以糯米巴

豆全炒至黃色取出以紙攤地上去火毒揀却

巴豆不用只番三五粒亦可共研為細末用米

醋浸化蒸餅和丸如棗豆大每服十五丸加至
廿丸用葱湯或茶湯送下如婦人以醋湯或艾
湯送下俱善

又方治反胃多取田螺以水養候螺絲吐出泥將螺
仍放田中將水澄去取泥晒乾每服一錢火酒
送下

膈食秘方 患者朝食暮吐胸脇間若有物硬住作
痛每飽則痛吐則止此有痰也 五靈旨壺兩

飛去砂炒不住手令烟淨去火性研末每用一錢以淡豆豉合研再搗蔗汁薑汁姜汁各一匙和為丸溫酒送下

一噎膈反胃驗顛門脉法以自己右手關脉按於病人印堂指稍向上中指盡處是脉動則一至及十至皆不医動有二三至者雖危可治再驗顛門上赤色一丸如員眼大紅者可治黃者可治白者難治紫黑色者不治

海上仙方治反胃膈食將純黑犬餓三日擇男人無
病者多篋頭垢或兩猪肉一斤分作四塊每塊
劈一小孔入垢五錢煎至黃色與犬食之犬食
卽吐吐出涎與肉俱置新瓦上焙乾為末每服
三厘好酒送下一七見効

鳳凰丹耑治膈食反胃大有竒功

此症嘔逆食不下膈時食時吐或辰至午或自
午至申久停不化仍味吐出或吐清水痰涎蓋

胃中火動而有濕熱生虫所致其中生胃間由
小而大常常遊行胃脘令人作痛難禁吐氣則
令人吐涎沫吞酸躑臭則嘔得食暫止聞香即
動阻滯飲食不能下咽垂飢又作一聞葯氣入
胃則奔走令人急痛吐嘔不止方葯無可療治
惟我此方獨勝活人無算世人罕逢服之虫化
為水或若膿血从大便出屢驗

其虫形如蟹身紅頭烏爪黑肚白大者如蟻小

者如錢形狀怪異此症宜選白毛烏骨雄鷄有
兩三觔重佳籠定取東泝水喂三日已而用以
老火米喂三日畢再取真正烏稍蛇切如指大
與雞食之食盡蛇為度待雞撒出齒色白如銀
収貯焙切為末用蒸爛肥烏梅肉研勻為丸如
梧實大硃砂為衣每服五七丸量老幼虛實加
減服 如無烏稍蛇即捕山中四足小蛇代之
數十條可抵小蛇俗名全管又名毛蛇處處有

之壯者用川椒湯下躰虛老人以燒酒送下十餘次即斷病根愈後宜調理脾胃為上

一人廿餘歲慣以生姜下飯計半月約食十餘斤後數日患一症呃逆上噎聲不住口請醫調治兩月有餘愈醫愈重醫者無措每半夜發暈汗出氣絕請予往診深夜無藥急以結白糖參沸湯灌醒切其脉兩關沉實右尺伏而緊予曰陽明多氣多血今關沉尺伏血竭氣虛必主陰結大

便枯燥胸膈膨滿故呃逆上吐丑時血注肝經
至半夜肝氣勝而土愈受剋故致發暈此理甚
明人所易曉予開一方 薑汁 藕汁 梨汁
竹瀝 童便 蛭蜜 天冬汁 牛乳各一小
酒蒸大黃煎水參服五劑而痊
久瘡不愈

絕瘡方 常山 草蓰 兵郎 大茴各壹錢

梅肉 壹枚 胡椒 十四粒 共煨水未發先服

有久瘧不愈宜灸四花穴用紙一張照病人口
比分寸裁得四方端正中開一小孔用繩一條
左男右女自足躋跟比起牽過前五指頭周圍
匝轉至繩頭相交處剪斷將此繩一頭按在缺
盆一頭從頸項間搭過背後繩頭盡處用筆點
記復將前紙中孔按點處此紙四角是穴各灸
一壯躋實人各灸三壯當發時先灸立截

神驗痧藥

治暑月發痧

鶴虱五錢

蒼朮五錢

丁香錢

當歸 叁錢

茯苓 貳

雄黃 錢貳

分

共研細末 麴酒

醋糊為丸 每服五分 冷水送下

又艸葯方

馬蓼尾 七個

馬家茨尾 七個

黃荆柴尾 七個 共搥一丸 冷水送下 此葯作

丸塞鼻亦可截瘡

久漏遺精

韭子為末 泡老酒 服即効

又丹方

白果 十六個

炒

升

共研末 陸續服 食盡

即愈

小腸氣痛 用雞卵一箇開一小孔取赤蚯蚓七條
入卵內外用茶枯末調酒周圍封固再以濕紙
緊包放火內煨熟剝開去壳嚼食酒送下

心氣痛

孔明行軍散 治心痛 辰砂式分 雄黃式分 枯礬式分

牙硝式分 小寸香式分 冰片式分 青鹽式分 煨乾 瓦上

金箔廿張 萹撥半條 右九味共研細末 磁罐收

貯勿令泄氣 臨用時每壺錢冷湯送下立止

又方治心氣冷痛厥血泡湯服効

人馬平安散

治胃氣虛痛不燒不寒微微冷痛常積
作吐

半夏曲

小半

茯苓

小半

波白叩

小半

吳于

六分

木香

五分

炒廣皮

小半

炭姜

小半

甘艸

六分

共研末水調服或煎水服即愈

脇痛

一人行路多致脇痛氣迫後服野豬血一盃

兩服如失

齒痛

馬錢子包鹽外用紙緦包放火內煨過研末

擦牙根立止

又方 毛芥菜取根切片和瘦猪肉煮食立效

又方 赤地鈴子取根和鷄卵煎水飲效

千金買一笑丹 治齒痛最驗 蜂房 細辛 鹹蒜片

共研末飯為丸塞齒根即止

黃疸症 鳳尾蓮 小茵陳 或瘦猪肉 或兩 共煮淡

食不可放鹽而服立痊

又方 枝子葉 茵陳 扁豆葉 三味加生米共

搗汁溫服効

水腫 面目浮白四肢腫脹光亮皮緊以指按之陷

凹不起小便短縮 朽蘗荷莖多取來陰乾研

末無灰黃酒調服立消

又方治水腫 烏箬片 取根 狗屎粘 取根 五加皮

小茴香 淡竹葉 牽牛子十粒 共搗酒服

發癰腫 遍身浮胖若腫 此症忌食鹽

取大蓼蓬藤生樹上者佳切片酒製乾研末

車前子 龍眼煎水黃酒為引全黍調末服之

立消

又方 匾竹花取根全猪肉煮食効勿鹽

黃腫腹脹 與治黃痧症同 赤小豆 式錢炒熟去壳

研末鯉魚一尾破腹去內脏將赤豆末納入於

鍋內清水燂一炷香為度無灰黃酒吞服忌鹹

押谷瘡 遍身浮腫小便不通小腹實硬玉莖翻旋

若鴨腎樣急採 金櫻子葉 大葉馬蓼葉 按

日加減陳烏糖 黃酒醋 豆豉 萆根

共搗成餅敷小腹 須臾腹內水嚮小便如泉腫
消熱退最驗

火瘡瘰 遍身紅腫身熱如火手不可近命在須臾

急取山枝子根 生台烏 榭叢花根

烏桑子根 四味共煎水溫服

腹痛 楓樹尾七尾 柞樹尾七尾 全煎水服効

傷暑腸痛 黃荊葉 馬夾茨葉各壹錢 搗汁冷服

絞腸痧痛 西茄子尾七尾嚼爛冷水吞下効

老年腰痛 萼葵 小回 共研末酒調空心服

疝氣痛 荔枝核切片炒米仁 桂支 言子

紫荆皮 硼砂 紅內消 共研末酒調服

一大心子痛陰囊縮入一腎大一腎小痛不可忍急

取 葡萄根和鷄卵同燂食即愈

山葡萄俗名鄉儒子

溜血瘋 此症發來醫書少載惟我獨得驗方其見

症也在毛際橫骨處結核一筋紅大从髀直透
內踝至足趾或膝前輔又結一核或右足或左
足或發兩手肩至腕有紅筋抄大痠痛無比以
致增寒壯熱其核將消則血自上退下至脛紅
腫不敢履地萬藥服之不應俟至一月兩月血
瘋出盡其腫自消足皮脫落身熱自除若食引
風之味仍又復發若不早治發至三四回則不
治矣其足木痺紅腫不消永為桐脚又名東瓜

脚此症初發之時一次二次急採梨苑楓取根
梗剉去外面粗皮用裡內青皮剉來切片酒炒
嫩烏骨鷄一隻用繩吊死去毛剉細合柃桃楓
楮爛加遠年陳烏糖為引一劑二劑服之永不
復發 重者其核不散足難伸外用生南星研
末搗酒醱敷之立消

一小兒七齡一夜隨母上床安歇睡至明早不能下
床兩膝曲彎不伸無寒無熱飲食如常別無他

症但脚不便伸則叫痛又不敢扶起坐起亦叫
痛其父母以為犯杀請巫禳解再請予往診切
其脉微遲予即用梨桃楓烹雞加陳烏糖引一
服如失行動照舊

一後生十七八歲忽然一足不便不能伸縮終日卧
床不知所苦約計半月有餘其家請巫求醫往
往無驗復請予往診予曰彼身上又無寒熱惟
足患病不必脉決予有奇方最驗伊父母即解

取梨桃楓照前製炒一兩陳烏
雞燂爛食之食完翌日便覺輕快畧
點地但痛如故予曰此症幾延半月一劑不
能克勝再服一劑可痊伊母曰再無雞可也予
置聲曰舍子足跋一雞何惜強迫之繼又買一
鷄約重十三兩和葯烹爛照前服之其足爽利
如常病者曰多蒙鄧先生神手息全再造瘋症
已除足雖爽利奈膠鬮裡尚存一核若蒜子大

不時作痛未知言否予曰既有核定必起散不散久則復發因取生南星一兩分作兩次搗燒酒而敷全愈行走自如

嗟予見世之跛拐者皆因庸醫之悞瘋症初起得此良劑焉有不痊之理若非爛斷筋跌損骨定不注拐再有一種生來即拐皆因祖上行虧德薄自己前劫惡孽太重此理故然

中風不語

追風散 川烏 丹皮 元胡 牙皂 硃砂

雄黃各等分 共為末 中風氣未絕者 此散吹鼻

男左女右 立刻痰降風落而痊

鼻衄 百草霜研細末 吹鼻孔即止

又丹方 黑梔子五分 黑白芍五分 黑白芷五分

共研末 米湯全醋泡服 即痊

雪梨膏 治慣出鼻血者多 取最妙並治吐血 麥冬 西

生地 兩 生茅根 兩 全藕節 半 雪梨片 冬蜜 半 斤

先將麥冬生地煎濃湯後以三味搗汁和蜜再
熬數沸取起瀝去渣分數服即効

又灸法治鼻血不止取腦後風池穴灸三壯即止蓋
血本藏厥陰因火內迫逆遊肺經從風池穴入
鼻而出茲以燈火灸而阻之亦以火引火之義
吐血 此症匠人最懼不可慢服生冷寒涼之劑恐
致冰血百難救一多服童便極妙

一方

白木耳一兩

一兩

炒乾為末酒調服効

一吐紅幾止咳嗽無声胸前不快多食韭菜最妙莫

放鹽

小便不通 蛇脫一尾燒灰存性泡酒服立驗

赤白濁 紫荊花晒乾酒炒水煎服

小便血 扁柏半黃連半共研末酒調服

又方治血淋神驗 条芩一兩水碗半煎八分空心服

立効

一方治膏淋 羊骨燒灰為末式不臭椿皮煎湯送下

立効 椿木即俗名豹皮樟

蠲痛散治血淋小腹急痛烏賊骨一兩研末端午雄

黃酒噴過 荔枝核五小煨存性 炙香附三

木香三 共研細末陰陽水送下

尿痢瀉淋 匾豆葉一 篇蓄 海金沙藤 三味生

採來味生米十四粒共搗汁溫服立効

大便血 栢側葉一 燒灰為末米飲湯調服二劑立効

又方 砂仁式 研末米飲湯送下

大便出血 菜菔子隨身帶乾沸水煎三分一服如失

腸瘋下血 此症多因酒色過度或多食椒辣火毒

內傷以致腹痛大便常血似痢非痢無冬無夏

發來難調不醫自止紅門不斂點滴不一即取

苦參子 一名鴨胆子 去壳研末全蕎麥粉糊丸

外以龍眼肉包空心水吞下立効 勿經齒

又方 柿餅五箇焙乾加防丰 炒荆芥各三小共

研末分作三服每早滾湯送下

痢症

此症有赤白兩論血氣宜分赤主血熱毒傷

肝白主氣暑火傷肺總不外乎泄熱攻毒而已

時氣亦有兩條一感天時一犯邪祟既感天時

則症候正六脉歸科服藥有應若犯邪祟其脉

難辯或長或短時遲時數至於服藥一劑痊一

劑患醫人故難下手必須有善願相湊

一痢症初起腹內膨脹裡急後重增寒壯熱不問虛

實急用

管子伐楚湯 生軍亦只實小川厚朴亦生牛子半

生黃芩半行茶式刺七厘子小陳蒼米十四粒

水煎溫服 一劑即能變糞否則切其脉寸關

洪實再服一劑可痊 此症脉宜沉細身體健

旺者易治若躄弱脉弦大者難調

痢症葯各性倫參 真珠艸 扁竹草清暑

小青艸清小便八里麻 仙人掌 天香爐

萱艸俱去毒 赤色瓜草止痛 藤茶去毒 初服第

此丸味二服再加本茵藤葉九片牽糞或加楓
樹葉却風以上共研細末米泔水調服李洪標
先生傳屢驗

禁口痢症 嘔吐不入益錫內久寄菖蒲塊磨水服
即止或煎湯飲亦可

敷臍丹 熱盛者取田螺七個麵粉式小射香大人二分
小兒五厘

舁虛者木八子十個麵粉三小射香照前

共搗敷臍上僅敷一時不敢許久

患痢人腹內熱甚手不可近 生地榆磨汁史君子

兜磨汁 二味水調服其熱即解

腹痛不可忍 取杉木尾煎水服 如不應取絲瓜

和烏糖燂食之立止

急痛單方 漆柴葉七個 菝蘇三片 生米七個 共搗

爛吞下即止

痢疾收功方 烏不宿取根 切片微炒水煎服

毒輕者和鷄卵一箇全燂湯及卵並食之立瘥

鳥不宿 一名綉花針又名黃杜鵑又名老鼠茨

久痢無休肚腹不痛毒已解盡氣虛下陷肛門墜下
宜用補中益氣湯加 肉蔻霜 蓮子肉 七箇
姜棗為引水煎服

久痢不止便無膿血四肢怠惰精神不爽食不甘味
不思茶飯此為心脾不足宜服

歸脾湯加 草蔻 肉豆蔻 姜棗 全燻服

痢後四肢發腫面黃肌瘦飲食暫減此因前服寒涼

藥水過多致傷脾胃水停不運流入四肢宜服

四君子湯合五苓散加薏苡仁或水姜皮小半

水煎服

大抵痢後宜溫補者必待赤白已盡方可健脾胃則

壽壅於臆為害甚矣

痢後發腫用五苓散加茯苓神志肉山慈山

杜仲 早皮 茯苓 赤苓皮 木瓜

五加皮 六曲 麥牙 甘州 木通皮

保赤丹
寒水石煨龍眼引
或痢久發腫虛冷者用頂

上肉桂為引

痢後大腸脫出不收用豆椽水薰洗或苦山柴根史
君子根狗屎黏根俱可煎水薰洗洗過再添蜂
蜜以上薰洗如不應再服 補中益氣湯倍加

人參

久痢不止腹無痛口不渴大便溏帶白泡此屬氣虛
宜用四君子湯加艾實 肉豆蔻 姜枣煨服

熱手丹治痢後肢體逆冷附片式不條桂不炙艸不

乾姜不共研末每服一錢沸湯調下

回陽丹治痢後脈沉緊四肢厥冷為傷寒附片式不

乾姜不炙草不肉桂不人參不共研末每服式

錢沸湯送下

痢症收功方 人參 扁豆 白朮 砂仁 白苓

川連 米仁 石蓮肉 淮山 吉更 甘艸

水燻服

痢疾幾愈一月有餘腹內尚有餘痛兜墜 茯苓皮

查肉二味為末水調服立瘥

又方 取日暎柴葉搗爛浸糯米作糲食神効

一痢疾初起潮熱不退用陰陽散加 柴胡 丹皮

黃芩倍加小腹急痛加 吳于 膨脹加烏藥

檳榔 嘔吐加砂仁 作渴加麥冬花粉 舌

上藍胎加羌活

一痢疾初起發丹腫肢體浮脹急取夜合藤隨分

金櫻子尾焙乾共為末龍眼前煎水叅服即消
再取馬夾茨尾插酒服永不復發

一老婦患痢疾赤白並行經予手既瘥奈頑熱不退
幾延兩月婦以為死期迫矣忽一日其子在田
中捉一坭輪烹與食之立捷身康

凡遇天行時氣瘟疫痢症邪祟興殃前來請醫我業
醫者在家堂務先安水碗沉壇以鎮魘祟無論
曉起夜行並無觸犯朱成才先生傳

沉壇藏身法一廳堂住一家一灶僅羅魂一遍若屋
住十灶宜羅魂十遍不可減少 九書諱号用

劍訣寫切記先寫井蓋屋卍四字於水碗內再
寫北斗諱號

霽

寫此北斗諱口中秘唸乾坎艮震巽離坤兌上

元天官中元地官下元水官貪巨祿文廉武破
中天星主北極紫微大帝天尊聖勅寫兌北斗
諱再寫此諱 𠄎 四縱五橫又名九坑士井

號諱元上

靈

號諱元中

澄

號諱元下

潮

號諱陽太

暄

號諱陰太

肅

號再粧七祖

寫完此五諱

號再粧七祖

寫完此五諱

訣羅魂羅起合家大小男女頭中第一魂心中

第二魂足下第三魂三魂連七魄十二及精神

羅在弟子掌中心送去沉毛江內去藏魂口有

金童來送飯夜有五女來送茶 此語口中暗

唸完再打坐訣一把金鐘訣一把

此朱元帥諱號寫大門上把守大門

靈

霽

寫此諱號

把守天門

霽

諱號

凡過橋河攔阻五瘟神寫此

出門看病祝聖藏身秘語

存吾身化吾身吾身不是非凡身張趙二郎是吾
身足騎南蛇高萬丈蛇頭開口食妖精蛇尾珍珠
涼傘蓋吾身手執寶劍滅瘟瘧吾奉

太上老君急急如律令勅 口中秘唸完打張趙二

郎藏身訣一把

到病家入門秘語 心中暗忖口中秘唸

天和合地和合年和合月和合日和合時和合五
盪神和合 打和合訣一把

入病房 打太上老君鉄扇訣一把 看便桶打鉄

鐺片訣蓋桶上 再打五郎神訣一把不聞濁氣

在病家歇睡秘語

入房時心裡暗忖吞天吞地神王打吞魔王神訣
一把鎮守房門 未上床時站在床前口中暗唸

秘傳四句打訣四把唸

上布天羅打天羅訣一把

下張地網打地網訣一把

左安銅爐打銅爐訣一把

右放鐵掌打鐵掌訣一把

訣畢然後上床

上床秘語五句

泥裏宿泥裡眠隔山隔路隔因緣

吾今化作金鯁下湖海五湖四海去藏魂

方初睡時面宜向裡用一手在上一手在下將頭

捧在兩掌中暗想秘語兩句五台山上睡五台

山下眠睡起時不論日夜少不得四句隨口唸

來 口內呵一呵手中搓一搓此處無淨水清淨

娑婆訶

接受病家禮物謝敬宜寫諱號(雷)唸四句

左布南斗 右布七星 平天掃地 掃蕩邪精

病人所服之藥宜寫玉皇諱號淨之

玉皇諱號

雷誦玉

上清真境元始天尊太清真境道德天尊
玉清真境靈寶天尊非年非月此是玉皇

真口訣邪魔見之形自滅

在病家吃茶吮酒三餐膳飯俱唸秘語四句

口為火爐心為火種食鉄鉄化吞石石消

出病家門

打五台山訣一把又三元將軍訣一把

攔截病家大門口回來到中途打回瘟旗訣一把

又張趙二郎勸善大師共訣一把回神

路間或過橋船溝河逢水之處俱宜開河下棧心
竹鉄拐老仙口中秘唸一拐一千里二拐二千里
三拐三千里吾身不是非凡身鉄拐老仙是吾身

手持拐棍身帶葫芦蓬萊山下去蔽身

再發火法唸火庫居戌木生在亥火生在寅兌宮借
柴巽宮借火火旺在午發起天火地火年火月火
日火時火太陽三昧真火天火連天地火連地心
為火種口為火炉舌為火鉗毛為火箭八萬四千
毫毛孔孔出火巽上起強風有口傳吹起火焰
中吾奉 太上老君急急如律令勅遮火有口傳
凡發真火時先宜放却張趙二郎南蛇恐火燒杀

不便 心忖秘語云一拐一千里二拐二千里餘
見前

一 一種酒痢因素飲酒過度致傷內脏不時大便痢

血百葯不効予有經驗名方 廣皮六分蒼朮六分

川朴六分茜草八分甘艸三分朱菘小紅糶小黃酒炖

服

保赤指南車卷之九

十閩邵邑鄧 旒樂天氏編輯

弟 旗鼎台氏

男 規舉峰氏 全校

悞吞魚骨硬喉

威靈仙或草果不烏糖一水酒各半共煎服

吞針入喉

取蝦蟆十数个刺眼泡水咽下即愈

又方蚕豆焙熟全韭菜吃下次日韭包針大便出
又方烏糖和黃土為丸吞下使包鍼亦從大便出
吞銅錢入腹

烏鴨雌取血熱服越日錢從大便出

又方多食核桃與葶薺其錢自化

諸骨硬喉

栗子內薄皮燒灰存性研末吹入即下

又方玉簪花取花或根搗汁以筆醮汁点入喉

骨自化切勿犯齒慎之

煨石銅鉄金銀玉器

砂仁 壺兩 煎湯服之其物自下

木筲鎗喉

鐵斧磨水含下即愈

穀芒刺喉否則喉腫閉塞

鴨籠定以清水灌之少頃將鴨吊膝內吐出涎沫令人含下穀芒自化 螺硬喉亦可全治

中毒門

狗肉毒腹內膨脹

生香附子

錢式赤糶半

生米共

研末酒調服立愈

腹痛加酒曲式个

癩犬咬極毒

斑猫七尾

糯米炒黃色去足翼

正川貝母

炒小

飛活石

三

共研末向東方冷水

送下其毒形從小便出

又方取鳳尾艸和粳米搗汁冷服其毒从大便

出鳳尾艸生澗邊或生山勘或墻下其葉似

側柏無枝蔓

狗咬破爛

桃葉

桃湘

乳香

沒藥

共研末敷効

又方先将鹽茶水洗淨以遠年牛齒末搥効

狂蜂刺毒

多取蚯蚓或蚓菌搥爛敷効

又方匾豆葉

絲瓜葉多取共搥汁敷刷即効

或刺中喉用此汁含下其毒自解

又葛葉和黃土搥敷之立効

蜈蚣咬毒

取野蕓根磨汁敷立効

與蜂毒同治

蛇咬毒

大西奇木名蛇木生南極異方瑣祿耳海

島味苦性平善禦蛇毒或遇蛇將近持此木迎之蛇縮頭而退若被蛇咬嚼此木嚙其汁再以木擦患處其毒立消如失此木又解蟻螫毒

此木又可治瘡疾將發時以淨器磨濃汁一服

即止

瑣祿耳即今之台灣府鹿耳縣是也奇木似桂

長二三丈獨幹無枝頂生蔓其葉彷彿杉竟不知何名今名奇木者以其木生奇也謠曰深谷生奇木虫蛇不放毒山中奇木栽並絕蛇虫來相傳吾中原茂林有一種艸畧似奇木俗名毳天蜈蚣亦禦蛇毒兼却風損

丹方

治蛇咬毒鐵線艸一名紫花地丁又名金鎖匙

先將此草搗汁洗患處以竹片刮洗其毒再將紫羊蹄草全鐵線艸共搗汁服立消將渣敷患

處或日火藥不及其毒脹上心口此劑一服如

湯澆靈

又方

羅慶先生傳驗 治蛇傷毒擁心頭此劑一服腫

消毒鮮 鐵線州 花椒葉 蝦蟆藤即海金沙藤

乞丐碗 紅內消 過青蜈蚣 胡椒草

蕺蕪即魚腥草以上八味俱係艸名共搗汁全米泔

水參温服立愈腫消痛止

中斑猫毒 取黑豆半升煑汁飲之即解

又玉簪花搗水服能解諸虫毒

中諸蠱毒

石菖蒲

焙乾

為末甘州煎湯調下不食

再服以病退為度

又方犀角尖羚羊角二味磨濃汁服立効

凡入有毒之鄉將飲食內先以犀角尖攪拌有
毒否若有毒即白沫辣起無沫即無毒也

丹方療中蠱毒下血如雞肝者或七孔出血晝夜不
已四臟皆損惟心未壞或鼻破待死者急取

桔梗新白者去芦擇味苦者佳不拘多少研末
每服三錢一日三服或口禁不入者敲口灌之
心中當煩須臾自定或酒調服至七日止此散
有益無損多服愈良愈後當製豬肝臙以補之
虫入耳 或虫入耳痛不可忍即以香油灌之即出
中水毒 凡遷徙別地或客遊遐荒各處水土不同
多致生病若傷寒若瘡痞宜未發病之先取舊
鞋底土煎水服應走盡天下永無水毒之患

生附子毒

製附子最宜得法若製不精其毒太甚

令人舌麻喉閉急取萊菔子搗自然汁黃連甘
艸二味燂湯磨犀角濃汁共調服即瘥
或以防風搗汁服亦殺烏頭大毒

諸藥毒

凡諸藥製不合法皆有或誤食毒艸令

人急死但心間暖者可治

防丰一味搗冷水

服効

又方綠豆粉調冷水服亦解

水粉毒 葡萄根 石榴蓋 甘州少許胭脂全煎

參服

又方古菌垣遮牆舊茅或陳稗取來煎水服即解

鴉片毒 南瓜藤多取搗汁服即解冬令無藤即瓜

內黃搗汁亦妙 南瓜又名金瓜

砒礪毒 黑牽牛三粉甘州式共研末殺老鴨取血

調末服砒毒即解服後忌食鹽若得山羊血調

末更佳 又萱草搗汁服亦解

鮮信毒

糞硝三東壁陳土式

菜豆粉五

早禾稈燒

灰粉共為末每服三錢并水調下

又方粘禾稈喂牛餘污者佳多取燒灰淋凍水

服半盛可鮮

又方明礬五

巴豆去壳油

黃土我過

共搗成丸

豆子大每服十丸萱艸燻濃湯送下

又方冬青葉搗水服即吐

又經驗方猪姆尿連服數碗即化

銀銷毒

牙硝加倍

研末調水服

壁言服銷一兩則投硝式而加半

老鼠藥毒

殺新鴨血煖酒參服即解

蕈毒

忍冬藤採來生啖即解

即金艮花藤

菰毒

九食菰中毒雖死心頭溫者可救

多取遠

年舊籬壁下截近泥者佳洗淨煖水服即解

又方燕窠泥為末團棗爛湯調服亦妙

凡一切藥毒草毒砒毒及六畜肉瘴毒此方一服即

安白匾豆去皮研末新汲水調下最捷

若得白匾豆花搗水服更妙

中糞毒

圃者以糞潑菜未經三四日其地有毒

拾菜者犯之手皮必厚痒入骨髓急用白丸燻水洗之立効

漆咬毒

丸熱毒盛者遇漆處遍身紅腫痛痒難言

急取敗醬草燻水浴沐即解俗名苦菁菜

又方木匠匏落杉碎皮煎水沐浴亦可

又古方取螃蟹多捉來搗汁遍身周搽即消

河魴魚毒

其血中人舌麻心悶急死

白茅根搗汁冷服即解

狐惑

凡山中怪魅魘物狐精自古有之人或中其

毒受其迷以致癩狂諸般医治不瘥者當有灸

法宜取兩手拇指兩足大趾俱以軟繩緊縛之

灸三壯四處着艾半在肉半在甲要四處齊燒

一處不燒則不效矣此法神驗

一被魘死及夢魘死皆由平日神氣不足致使眠臥

神不守舍魂不依骸凡患者切不可執燈照之

但向臍中呼其名即醒 又一法齧患人足肺

即大指甲側即醒再用皂角末吹入鼻中亦妙

若經一二更者亦可灸之宜灸太敦穴七壯即

醒 大敦穴在足大趾甲後三毛中灸七壯

一既醒後目赤洋狂糊言燥語取鬼白毒衛茅毒

乳香毒共煽水服 鬼白俗名八角蓮

一魔死幾救醒久不開声急搗韭汁服之即言

凡遇屍喪或玩古廟或神壇歸而暴絕面赤無語名
曰尸症又曰鬼症即中祟之謂也進藥便死宜
移病人東首使主人焚香北面拜之再以火醋
薰鼻可復醒否則七竅迸血而死

子第三姪煌素好外遊時道光甲辰歲經營遠
方是腊月取帳念四晚星夜回家路經四都冷
水坑此坑素出狐精迷害多人煌行至此忽燈
籠燭滅遍地荆榛難以開步煌於是大驚深夜

沉沉無計可施只將褲脫赤身四圍疔尿口中
狂罵但知冷風刺骨惶自以為必死急唸金光
神咒大悲咒心經釋談章枉唸無益不應一時
忖着周易乃包羅天地鬼神莫測吾試唸之復科
搜精神大声明誦六十四卦名自乾為天起唸
至雷風恒燈燭復明大路仍在起身便走口仍
誦唸行至家庭雞唱三矣卧床不起詢究其故
原被狐惑繼以養心湯調治數日乃痊越一年

狐精被獵者所制

千杯不醉方端治酒毒

白葛根

五

菜豆粉

五

卜

三

柿霜

三

共為末蜜丸含在舌下朝飲至暮暮啜

至晚千樽不醉

保赤指南車卷之十

十閩邵邑鄧

旒樂天氏編輯

弟

旗鼎台氏

男

焜舉峰氏

全校

外科

是科之書編煩頁甚何止五車究難備其全驗無過
滿紙騷文令人難看予雖不尚因刪取其自信自驗
者詳之

取齒不用錐

凡人有生鬼牙又有鑿齒又有齒內層復生層
齒者皆不宜之須當取去

玉簪花根

白馬齒

牙硝

鴉片

冰片

五味其研細末抹齒根咳一止其齒自落但勿
犯傍齒

頭生櫻桃

○頂生一瘡若櫻桃大有五色瘡破則腦裂

而死

治宜專飲牛乳十日自消

黃牛乳更佳

一人頂生一疽如鴨卵大

不紅不痛磨肉桂塗效



頂上生疔

紅娘子五小砂黃三小川蚣二条乳香三小生大黃三小赤芍三小共研末香油調敷

太陽汁

○天庭間生一小疔如糯米大作痒抓破血
射不止 急取灶鷄子和沙糖搗爛敷之



一人額角太陽穴生一疔片時滿頭腫起予以
燕窠泥調童便敷患處外以艾灸之一灸如失

頭生禿瘡

禿瘡初起結痂灰白作痒髮落宜用
白三仙丹三錢 硫黃一錢 為末香油
調搽



頭 瘡 潰 爛




頭爛溼淫久不收口宜用掃瘡散
乳香沒藥明黃樟腦胆凡甘艸山
甲共研末麻油調搽

交牙瘋



交牙風生在耳前頰車間腫痛口禁
不論左右男女皆然急用芙蓉花
芙蓉葉死鯽魚焙干
患處即消
三味共研末水調敷

膨蝦蟆掌



蝦蟆掌在耳垂珠下前後腫痛耳
熱不論左右男女皆然急用
生軍三北味小共研末鴨卵青調敷
又方醋浸蛇脫貼効

生痰疱

痰疱生在項前頸後皮裡無形手按之若匾豆大男婦大小皆有或一二顆至四五顆成串初時不痛不痒久不治則發癱矣



活仙散治痰痲羗活五靈仙四法夏四南星四

夏枯五防風四京芥四甘州五川貝四黃芩三

前呼五只壳五共研細末每服五錢水酒調服

白芷膏 白芷 大黃 黃栢 赤小豆 威靈仙

生半夏 生南星 各等分共為末鴨子青調

敷

鼠瘻瘡

鼠瘻據醫宗金鑑論療癰全愚每
逢治法常異療癰毒在外行宜敷
鼠瘻毒從內起宜服



一人犯鼠瘻經年不愈膿出不乾百藥無効醫人以
口吸其膿一日兩次半月而痊

鼠瘻生頸項間初起一瘡久則延生數瘡牽藤成吊
潰爛膿水不乾有經十數年不愈及爛喉而死

烏貓散治鼠瘻初起

首烏貳兩夏枯貳兩烏藥一兩香附二兩

米醋炙七次共為末水酒調服忌飲茶


又方初起時

山茄子葉 野覆盆根 二味共搗敷

之即消

野覆盆 其葉似漆四月花五月實其實似覆盆

又丹方 捉田中泥蛇數條斬去頭尾剥去皮壳洗
淨內脏取肉焦湯洗患處再焦湯飲之三四次
即愈百蛇俱毒惟泥蛇無毒可焦水兩次



咽 喉 腫 痛



喉瘋症多內外不一予所治
驗者概詳之於后

何示...

七

搶舌瘋

搶舌風生喉內近舌根或左或右常飯時忽然
喉生一泡腫塞味不下咽急取冷水灌耳內生
左灌右生右灌左須臾泡破唾出惡血即愈

喉瘋雙單膠並治

硼砂式小明透雄黃分四四六片式分麝香分一硃砂分二

辰砂式厘山豆根式厘真熊胆分一

共研細末吹入喉即落

咽瘡痛爛

苦瓜霜

三不妖面

三不共研極細吹入喉立效

製苦瓜霜法取肥苦瓜一條上開一孔去實入朴硝四兩於瓜內縫綻懸於屋椽下以磁碗承之待瓜中滴下水汁久成霜以竹刀刮下收貯聽用

又丹方

地茶結子時帶子採來隨身帶乾為末吹

喉中即効

地茶

生陰地長三四寸其葉似茶色紫其子赤色

口内生肉毬 或喉間生一血毬臭氣難聞

射香一清水調服三日即効

咽喉生肉塊

喉間生肉重疊腫起不痛多白有竅

常出臭氣宜取橘皮煎湯數服即効

又方 生牛夕磨醋滴喉內數次効

喉瘋外敷藥

七星斬喉劍又名仙人橋生黃柏

生澤蘭 芙蓉葉 三七葉 全生酒糟共搗

敷喉外患處

又方 梨桃楓葉 搗爛敷喉更捷

又方 仙人橋 全黃酒搗汁服 其渣和紫荊皮

末調敷患處

鎖喉瘋 生喉外頸項腫

川烏四小 生南星三小 白芷三小 正藍田三七小

艸烏四小 沒藥三小 赤芍三小 羌活三小

共研末烏糖調敷

碧雪散 治喉風齒痛通用

海金砂 兒茶 硼砂

山豆根 四六 寸香 胆星 細辛 青代
真蘼薄荷 人中白 共研細末吹喉最捷

補

搶舌瘋捷方 陳舊掃帚取芦一管六七寸長一頭
點灼一頭吸喉內薰之片時瘡破血出而愈

飯 疔 毒



此症男女皆有之生在口唇或上
或下其形小如粟痛痒無比若不
早治傾刻面浮喉腫而死其毒太
甚

金樸姑散 白菊花 虎蟬脫 直姜蚕

共研細末陳烏糖調敷疔處即消 又名三仙劍

又方 杖子葉 和尚子葉 山茄子葉

共採來口嚼爛敷効

又方 治口邊疔 捉小蝦蟆一二隻和米飯共搗爛敷

之立効

口角疔



此疔生嘴角如米大令人口禁頰
腫急用母丁香研末和烏糖全鴨
子青調敷患處立効

承漿疔



「嘴喉下地閣上陷中即承漿穴
生一疔如米大

承攬疔若不早治傾刻地閣紅腫頸喉皆肥脹口禁

不言抽手待斃宜用

煨炭

鷓鴣屎白

蟠龍散

左蟠龍

一兩炒黃

血餘燒灰

共為末鷓鴣子青調


救即効 或茶水調亦可重者加燕窠泥一兩

炒黃

研末

左蟠龍

即鷓鴣屎



腫猴膝



喉上一寸兩腮交界間腫起按之內
有核或一核或左右各一核痛不可
忍口禁難言此名腫猴膝

燕窠蟠龍散

燕窠泥炒

左蟠龍炒


敗草

血餘灰


共研末鷄子青調敷即驗

今多不效

倘喉間生瘡此散香油調搽亦效




人中疔



鼻下人中穴生一疔如芥子大痛
不可忍若不早治毒流入喉不治

急取生大蜘蛛放疔上令蛛啜吸其毒蛛飽再換連

換二三其毒自尽再取蜣螂煎湯飲散其餘毒
外再捉蜘蛛搗爛敷患處立効



鼻孔疔




鼻孔内生疔若米大疔上生一毛片
時長出二三寸痛苦難言疔破即流
黃水久則不治急取

滕黃磨汁以燈草醃點入疔上勿犯傍所否則毒流
入咽殺人

又方 衛茅取嫩葦娟曲者佳石塹所生石結勒不
拘多少二味共搗汁滴入鼻內即効

對口疔



此疔據醫宗金鑑名腦疽又名對

口疽生髮際兩項中陷處風池穴是 急取鱧

魚七尾鱧頭和醋醃搗爛敷之即消

點黑痣

養叔箭鏃散

齒落黑痣

硃砂五分

寸香

五分


硃砂五分

全糯米茶水共研成膏敷痣即落
 根深加麩
 灰壺小



何六打...
 十六

面生汗斑



無論男婦面生汗斑小小黑點滿面有久不能愈宜用 水粉兩爐底小硫黃小共研極細末姜和醋搥汁調末搽之即謝

左癱右瘓

面生瘡毒潰爛不乾久難收痊左名癱右
名瘓治宜五寶丹方載后



兩肩生瘡

肩瘡



兩肩生疔宜 木八子 馬金子 共研末

調油搽効

又方舊糯糝燒灰

調油搽効陳
粽乾亦可

無名惡疔瘡

當用灸法獨蒜切一片貼疔上再以艾丸放蒜上
點香燒之艾燒盡即散

又灸法取燕窠泥研末尿調成餅敷疔上再以艾丸
碁子大放餅上燒之如疔痛燒至不痛不痛燒至
痛此法出壽世保元予屢試屢驗萬灸萬痊大有
奇驗

又方治惡疔

白丁香


式不 硃砂

式不 信石

式不 斑猫

式不 去
足翅

胆凡式五倍子半糯米式炒赤小共研細末油調成
膏先以蒜一片菘豆大貼疔上再以此末蓋之
即消最捷



婦人乳吹



初胎孕婦多有膨乳或生下兒
 每夜吮乳解衣及睡熟尚不裹衣其乳頭被
 兒鼻氣所吹以致孔閉乳腫

乳吹初發 取生松毛不拘多少食鹽少許糯飯共搗敷

乳上効

又方 柿皮 楠香 二味共搗敷効

又方 採生蒲公英不拘多少通艸式小和飯共搗

敷患處 或將二味煎水服亦可

歸吉湯散乳風 歸全式小吉更式小銀花式小甘艸

壺式小水酒各半煎服

乳癰潰爛 生大黃壺式小研末 黃蜡式小白蜡式小猪膏

四兩煎出油去渣二蜡放猪油內溶化再下大黃末攪成膏貼患處効

黃連 黃芩 黃柏 黃蘗 黃連 黃芩 黃柏 黃蘗 黃連 黃芩 黃柏 黃蘗

又方 料用蕭公英下餅炙少 黃連 黃芩 黃柏 黃蘗 黃連 黃芩 黃柏 黃蘗

又方

此方係卷 用藥餘年 不詳 命蓋 少許 藥為 共煎

發背瘡




背瘡發似黃蘊一二顆或至數
十顆皮緊痛痒熱

十干烟薰背脊最驗
辰砂 銀珠 山甲 水銀


信石 白蜡 蜈蚣 射香 輕粉 蜂房

共研末和艾茸用粗帛捲成条點烟薰之即効

背脊



纏腰蛇



據醫宗金鑑名纏腰火丹

又俗名蛇串瘡其形似蛇纏腰圍之令人氣急
增寒壯熱速取糞網籬年久者佳取來剝碎火

妒內煨烟薰之即解

又一症陸續見點生腰間名龍痘 又一種龍

蹟 又一種似帶名龍帶急取鳳尾艸搗汁抹

之立効 或取側柏葉搗爛敷患處効

又方

治龍跡瘡


扁豆葉

蜘蛛

扁豆叢生者佳
不拘多少

煎

油搽効



緣桐鼠



緣桐鼠生在手髀肘間內有大

筋動處其形若鼠子初起時宜用甘艸黃柏黃芩枝
子大黃姜黃黃連猫骨各等分共研末敷患處即消

鵝掌癬



鵝掌癬生掌心或左或右其
皮脹起若鵝掌堅厚作痒

丹方治鵝掌癬肥大柚子皮半局田中紫萍不拘多少

茶枯末四兩小便一大鉢先將柚子皮全紫萍

放鐺內水兩碗燂出濃汁取起叅入童便鉢內

再放茶枯末攪勻將病手放鉢內緩緩浸洗至

藥冷為度其効如神 柚子即俗名黃皮大柑子

子治一婦人掌心腫起如鴨卵大痛苦無比以致身

熱不時作寒予教以前方依法浸洗百蒸俱解

又一種掌心疥瘡形似黃廔瘡作痒無比抓破即痛

破而復生生而又破膿水不乾延綿難愈宜用

兵柳一兩燒灰枯凡三小硫黃三小輕粉三小

花椒小右為細末每用三分香油調搽患處不

時掌近鼻孔嗅之使葯氣从鼻孔入其瘡自落

又一種癬毒或生頭面或生背腹四肢其形不一

有牛皮銅錢繡花粉皮治法俱宜取田螺数个

將底打開一孔少傾螺汁自出以杯盛貯其癬

用瓦鋒刮破再用鴨毛塗田螺汁於患處即愈

又方治牛皮癬盧大觀傳人言
爐底 水艮
姜炭 水艮全姜先研爛再加人言爐底共研
成膏先將生烟葉烘燥貼癬上再將藥膏敷烟
葉上外以生烟葉包之三日其癬自沒

膨

穿

掌



穿掌形掌心腫起穿過手背苦

不堪言急取生遠志虛兩煎水

薰之其效如神

天蛇指

指尖腫起似蛇頭疼痛無比急取



吳萸木皮

蜈蚣

大黃

妖面

共研末

以鷄子一箇打開一孔去黃丹白入葯末攪勻
將病指插入鷄子內立効

若爛鱗洞加人言
壺錢

膨

瘰 疔

天



膨瘰疔生在跨

下脾樞橫骨間初起皮下一核大痛筋縮足不

能伸以致增寒壯熱宜用

峻力丹治癩疔神方乳香 沒藥 川烏 艸烏

花椒 白芥子生紅糲 共研細末 用香欖

搗末浸黃酒調敷患處立消 香欖浸水有膠

今婦人以之漿髮

又方

馬齒莧生採來不拘多少 食鹽一撮 共搗敷

患處 體虛者加老姜二片

膨 猫 頭

膝頭腫起曲不敢伸急取梧桐根和生酒醅共搗爛敷効

猫頭癰即膨膝頭



牛 軛 癰



牛軛彎裡

牛軛癰生在膝背兩大筋中窩處即委中穴初
 腫如磐人痛足不伸急取芭蕉根和酒醞搗爛
 敷之立消

松皮瘡

瘡生在外膝踝間結痂如松皮故名之時常膿水不乾痛痒無比若不早治久則成楊梅漏瘡



松皮瘡

矣宜用

張老三仙丹治一切惡瘡聖藥樟腦三小致鉄杓內

上以磁碗蓋之邊縫以麪粉密布或米糠亦可
將鉄杓安爐上用文武火煉至磁碗極熱去爐
火俟杓涼揭開樟腦俱升在碗上篋刀刮下再
加清水黃三仙丹三小共研末收貯聽用 臨
用時取鷄卵一箇去壳香油煽熟甚香取起去
卵不用將油調仙丹以鴨毛攪勻搽瘡處一治

如掃

一松皮瘡搽此丹一度二度如失其傍尚有餘痒仍
要再搽以不痒為痊不然來春復發

又丹方治腫瘡胡先生傳 洋茶水粉五分 冰片三厘

甘石五分 川連貳分 黃柏五分 甘艸五分 共研

細末搗瘡効

又丹方自試驗治脚瘡抓痒不止 猪齒一兩醋炙七次

硃黃四小 共研細末香油調敷患處立効

又方治臙瘡蛇床子五小蒼朮五小樟腦式小共研末麻油調搽

油紙膏治遠年臙瘡及婦人裙邊瘡真麻油四兩

胎髮三四團洗淨焙乾黃蜡三小白蜡八小

象牙三小炒乳香三小末藥三小黃丹四小炒

水粉四小炒黃色狗頭骨四小煨雞內金一局焙干

以上諸藥各研極細末另包先將麻油全胎

段鑊內久熬以煖焦為度取起用絹濾去渣再

放二蜡和油溶化後加以衆藥末一併放下攪
勻其鑊安在炉上以温文火灼之不可用烈火
再取包木香綿紙裁四寸長三寸濶按油上
徐徐挨過使油透紙者可用再挨四張層疊為
一膏及冷時盡乾以油帛包貯候用 臨用時
先將水豆腐切薄片貼瘡上使拔其毒移時又
換換至數次瘡色變白然後以油紙膏貼之外
仍用油紙護之自辰至酉或酉至卯揭下多膏

濃濁以鴨毛抹淨瘡口用茶水洗淨仍將原膏
翻覆貼之一膏可痊二人不可輕棄

試虫驗一瘡瘍潰爛久不收口時流黃水或作痒無
比此必有虫予有單方試之取魚泡葉和飯搗
爛敷患處自已至未或晚至曉揭下其虫盡在
葯上屢試屢驗去盡虫然後方可用葯

魚泡葉又名魚泡圓其艸似千里光其花紫其
汁可以毒魚

婦人裙邊瘡丹方

謝景昌先生傳屢驗

鬼頭兒茶

一兩

水粉

五錢

梅花片

四分


共為細末用竹管篩瘡

上外用隔夜爛茶葉搗爛作餅敷之

臨用末

時先以鹽茶洗淨瘡口

坐板瘡



坐板瘡生兩醫一片

成羶滯濕不乾痛痒難言不能坐褥宜用

五抓丹 嵩治坐板瘡楊裕先生傳 防風 楓子

保赤音南草

卷十外科

三

人言 木鱉子 樟腦 共搗末和猪膏共搗

成膏不時抹之即瘥

又單方 擇一片黃光石洗淨安置潤空地上夜承
露水黎明太陽未出即起溺尿淋石趁煖時將
醫坐於尿石上傾時嘻嘻自在俟石乾即起一
日膿乾翌日再照法坐之即瘥

又方 牛角浪取葉燂水洗効

脛瘡發

謝得升先生傳治脛瘡經驗方
共搗成膏敷患處立愈

脛骨又名螺絲骨

生大黃研蒼蠅數十



膨硬尻



何為硬尻其毒在內生於足

跗下足躋履地着力處初起

時似砂石硬脚微痛愈日愈

大越大越痛不敢沾地此躋

皮厚極難出膿若不早治有

經數月皮爛成坑久難收口

初起微痛時宜取蜣螂数个

和糯飯共搗敷患處極捷

足心疔



足心疔生湧泉正中


形如黑豆硬似鉄釘不敢履地身發寒戰惟喜
飲酒若不早治脛骨若碎髓漸流出急取川
烏頭搗末敷之再取葦子爛濃汁服即痊

紅蛇旋

頭面及身浮腫如蛇狀者急取雨滴墻磚上苔
痕刮之不拘多少用水化擦瘡立消




棠梨疱



遍身發燎疱若棠梨狀每箇出水內有石一片如指
甲大疱落復生抽盡肌肉不治急用 山稜

我朮各五錢 研末酒調吃効

一人遍身生疱若鴿卵大皮薄光亮自下而上將及
喉氣促欲絕予告以茶莖上所生蒼苔煎香油
擦効



紅 白 癩

周身發出屢屢癩疱隱既皮下極痒極癢以手
抓之隨指即起大如碁小如豆頃刻自没片時



又發令人抓不住手

桑桐湯 張元魁先生傳治紅白瘡 桑葉 桐葉

生甘州 三味燂湯黃酒一盃參服 或薰洗

更妙

又方治紅瘡當歸 川芎 苦參 七力 生地

赤芍 白芷 北風 甘州 各等分水燂酒

一盃參服

又單方治紅瘡狀元花取葉搗爛周身擦之即退

又單方治白癩 猪内賸子管二三兩和糯米盪飯吃
効

又方 極痒時用撈魚網擦患處可以禦痒

黑白癩 癩與瘡不全瘡周身屢屢有之癩僅一泡
或多至三四泡生足間或生手間亦未定所形
似水泡皮薄光亮如珠黑癩内含黑水白癩内
含清水初起粟大漸漸大起至二三日如桃大
切不可針破悞破則爛成白成盞久難収功

丹方治白癩爛木皮所生蚊窠坭取來紙捲筒燒烟
薰之二三次水乾即効


入方治黑癩蛇泡草和食鹽共搗敷立消

蛇泡艸蔓地生成串其葉似萱艸其實赤似覆盆
子

腎

囊

瘋



腎囊瘋

陰囊生瘡黃瘟成串形如苦瓜痛痒無比速取

蜂房 黃連 黃柏 黃芩 伏龍肝 輕粉

兒茶 冰片 共研末香油調搽効

腫水



腫水龜

玉莖腫起或青或紫強硬不軟痛不可忍

一方治腫水龜泉州林先生傳

五倍子研末
銹鉄磨

汁調抹立消

一種腎海漏

玉莖蠹起直硬不收流精不禁間或

出針捏之則脆若不速治性命休矣

韭子一兩故紙一兩共研末每服三錢溫湯送下即瘥

沙 疥 瘡



沙疥似麻癩多生胸前缺盆兩手曲池指槎禱腰
等處初時發痒久則成瘡遍身俱患膿水不乾

一掃光治疥如掃妖面 大楓子 木鱉子 水銀

輕粉 硃砂 枯凡 陀僧 黃丹 樟腦

花椒 共搗末和香油熬至花椒焦黑色為度
以綿醮油搽疥無有不驗

又方 治沙疥廈門許先生傳 胡椒 枯凡 生凡

硫黃 菜豆粉 烟葉 共研細末香油調搽

又滌疥方 桃葉 蒼耳葉 千里光 金銀花藤

九節香 共爛水浴洗百瘡不發

楊梅瘡

楊梅瘡又一種天疱瘡形狀多異筆難殫述頭面起泡謂之楊梅泡背胸四肢發瘍東一毬西



一朶謂之楊梅花肛門陰戶結核謂之楊梅核
肘踝瘡爛遠年不愈溼濕不乾腥臭難聞謂之
楊梅漏鼻孔淫爛口角生瘡呼氣腥臭令人勿
近此皆楊梅瘡之兆也急宜治之

四仙膏

治楊梅天泡並宜

胆凡式小

硃式小

水銀式小

全蝎式小 先將胆凡研末次加硃全搗又加
全蝎再搗爛方下水銀唾涎少許搗不住手以
水銀不見星為度臨用時油調抹患處七日立

瘡如結痂當搗去再抹立痊

四聖丹楊梅天疱並治信石 三小用束包外以土塗

火內煨過去棗取信再全硃砂 式小

冰片小共研細末豬腦髓調抹患處神驗

又丹方三仙丹 小朱砂 小朱黃 三分五倍三分

皂凡三分共為末油調抹患處

又丹方治楊梅瘡鳳凰衣 五个 黑棗 五个人言小五

共煨為末油調抹患處重者加黑棗 三个

蒲黃去小

又方 薰楊梅瘡最捷 硃砂 辰砂 硃砂 水銀

樟腦各五分 寸香一分 乳香 沒藥煨去油各五分

艾葉不拘多少搗成絨攤紙上再將前八味藥包於艾絨內捲成條燃起以烟薰鼻口內以甘州汁或菜豆湯噙之熱時又換勿致火毒入內 外以三黃末三紅三仙丹小猪胆汁調敷患處

五虎狼烟薰天疱瘡最捷 硃朱三小 水銀小黃檀小

雄黃小寸香枝共為末燒酒調勻分作五條每

早薰鼻薰至齒浮即止

七郎先鋒炮 治楊梅天疱下疳瘡惡毒等症 硃朱

水銀 鉛各五分 硃砂三分 雄黃或分寸香分

輕粉三分 共研末燒酒作茶点胸前對面薰當

薰時口內先吸冷水水熱再換

堵瓜香 吊薰天疱楊梅水良 五分硃五雄黃五分

錫灰三分寸香分乳香分沒藥分用京香一條
合作紙管薰之立愈

六祖降魔丸

先用薰葯太多以致口破喉裂急含此丸萬病回春

兒茶

小煨

礞砂

三小煨

朱砂

三分

冰片

五厘

水粉

三厘

用麥冬去心全前葯末共搗成丸口含立愈勿
吞下

老君還陽酒 治楊梅天庖下疳 生地三小 熟地三小

黑豆三小

白丑三小

艮花五小

山甲炒三小

山甲炒三小

山甲炒三小

山甲炒三小

山甲炒三小

山甲炒三小

皂尖

三小燒存性

用肥猪肉八兩水四碗煎至


三碗起去猪肉將前葯全肉湯再燂至一碗去

渣分作兩次黃酒參服飲至醉為度其瘡自落

痔瘡便毒

魚口便毒痔瘡三者皆惡病生在肛門兩脣間
男婦因淫慾太甚以致淫毒慾火所凝久則不治

痔瘡便毒



左為魚口右為便毒生近肛門上下則為痔瘡
形狀各異有鼠奶牛乳蜂巢穿腸翻花鼓釘此
等各異其治一也

丹方治魚口便毒

老薑

式兩

牛膠

三兩

共入鍋內熬化

再加麩灰一撮攪勻成膏貼患處

生歸湯治便毒

生地

當歸

乳香

沒藥

花粉

各小半酒水各半煎八分空心服

公王湯治便毒

忍冬藤

公牡長
王不雷行

各等分酒煎服

狀元紅烟福州知縣蘓化龍傳治痔瘡最驗

狀元花

紅鳳仙花

白鳳仙花

三者皆取根煎水薰

即愈

又方崑治一切鼓釘翻花牛乳痔

棉花子三小

正硃磺三小

右二味致新瓦上燒烟薰患處初

薰之時腫痛至次日即愈

當薰時口內噙菜

豆湯以避火毒

龜甲炙穿丸 治一切內外痔瘡無不應驗

烏龜

一箇重一斤

剝開一孔

雄黃

兩蜈蚣尾

枯凡

五

共為末入龜腹內縛緊外以黃土包固

如穉放溫火內煨一宿上以粗糠燃之以酥為

度不可太焦如煨未乾以新瓦焙酥研末再添

後藥

山甲

十四片

黃牛角尖

一個象牙

防風

白芷

當歸

川芎

黃芩

蟬退

黃連

只凡

槐角

地榆

各壹兩共為細末

和煎

鹵末醋打糊為丸赤豆大每服一小白湯送下
一日進二次至三日肛門緊實無妨至四日外
痔根自落內外俱安但一百二十天內絕禁酒
色二字

試孔三槎艸

崑崙穿腸痔漏掛線手法

三槎艸

谷名
鷄脚

艸此草透入漏孔內度其淺深方向又用銀線
兩條一條粗一條細每條長一尺一頭扭作十
字形先將粗線抹香油從穀道進又將細線亦

抹香油再進穀道內以手按定次將三槎艸透
進漏孔內底以銀線側鉤三槎艸從穀道出將
藥線緊繫三槎艸尾隨漏眼入亦從谷道出如
此循環二轉將銀線與草拔去不用再用鉛五
錢托成丸上銳下大上銳處小孔繫墜之當審
人虛實虛者加五錢為度實者加換至八錢為
度聽其自落落後辨其瘡口內尚有餘濁否再
將青龍丹加冰片敷之其濁自尽幾過一二日

後宜生肌收口真珠散敷之立瘥永無後患
如傍有孔宜將龍虎丹作条挿入一二日更
加冰片青龍丹敷一二日仍用生肌收口真珠
散敷之以收全功屢驗如神

伯牙瑤琴線

繫瘡自落

硃砂小

江子仁

小

銅青

五分

砥石

式小

硃砂

小

胆凡

五分

輕粉

五分

共為細末

再用生川烏 生艸烏 生南星 生半夏

川椒各一小 水二碗煎至一碗瀝淨渣再入前

藥末揉勻聽用 再取子花琴線三四尺圈摺

一團外以竹葉包四五重綿線縛定致前葯水

內浸半日再以文火煮至湯乾為度取起必傾

鮮開晒乾以油紙收藏聽用 此線妙不可言

端治一切鼠奶牛乳諸痔五癭六瘡帶小頭大

並以此線繫之至三五七日其瘡自落 更有

初生小兒多生了指丫趾者觸目礙相急以此

線扎之曰漸日緊其指紫黑冰冷輕者七日重

則十四五日患枯自落速取生肌收口真珠散敷之立痊

生肌收口真珠散 端治一切惡瘡潰爛毒氣已尽

反肉尽除但新肉不生久難收口以此散攪患處外以射腦烏龍比天萬應膏貼之一日一換不數日即生肌長肉收口如神

赤石脂 煨一小 白龍骨 煨壺小 真珍珠 六分 不


論顆粒大小以白為佳入豆腐煑數沸

正雲南琥珀六分 清水飛過黃丹六分 輕粉六分

真麝香三分 乳香煨六分 梅花片壹小

共為極細末 磁罐收貯聽用

下疳瘡



下疳瘡

下疳瘡男子五莖潰爛煬蜡燭婦人陰戶痒爛
翻花等症此多是交媾時慾火未盡內留精毒

婦人不潔所致

三仙五指散 耑治下疳瘡 三仙丹 三分 川連 五分

兒茶 壹錢 雄黃 五分 冰片 一分 朱砂 五分 枯凡 三分

共研極細末 搽患處 瘡乾者用油調

三仙五通散 耑治下疳瘡 三仙丹 五厘 馬前子 煨壹分

兒茶 五分 雄黃 煨三分 冰片 五厘 枯凡 三分

共研細末 搽患處

又方 泉州林先生傳 甘石 壹斤 珍珠 三分 胭脂 米八分

沒藥 三分 乳香 三分 兒茶 三分 水片 二分 紅丹 壹小

水粉 一小 共研細末搽患處

又膏耑治下疳瘡珍珠二分 冰片 貳分 水粉 壹兩

硼砂四分 甘石 五小 猪管煨油調成膏臨用時

攤在胭脂上以貼患處

又方治下疳瘡劉師甫先生傳 五倍子 六小 皂角 三小

六月雪 不拘多少 共煨水薰洗 繼以兒茶 壹小

水粉 一小 研末搽之 再用收口方 兒茶 壹小

甘石 小珍珠 五分 琥珀 五分 冰片 三分

共為細末攪之以收全功

子治一人犯下疳瘡玉莖瘍爛其皮自落教以喬麥

粉攪患處半月而痊

青龍丹

此丹出泉州城南大泉澗巷口協元藥行吳奇官所製

水銀 壹兩 鉛 五錢

牙硝 壹兩

皂凡 壹兩

枯凡 先

錢加一小

食鹽 先七小加三小共壹兩

煉丹法先將鉛放鍋內溶化取起乘熱入水礮

於鉛內地鋪厚紙數張將鉛傾厚紙上攤冷
再將牙硝皂凡二味全研細鋪銅器上置火灼
至烟尽汁乾取起石白內搗碎方入溶化水候
鉛枯禁食鹽再搗勻作一包入鍋內平平安穩
中開一小窰以銅碗蓋住碗邊有隙將紙條塞
密用炒鹽兩半煨石羔兩半共為細末米湯調
布罽口封固以火烘乾乃安爐中周圍以炭火
並蓋蓋內安盞盛水八分以武火熬激煉至水

煨即換至三五盞水盡是去離火不用鍋正安
勿做候冷方開丹藥盡升在蓋上收貯磁罐內
隨症聽用

青龍丹所治各症列后

一風毒流注楊梅漏瘡石肉多者只用青龍丹或水
加冰片一分為細末搽瘡口外用射香烏龍比
天膏貼之一日一換即愈石肉少用青龍丹
或水再加珍珠琥珀冰片各壹小照法用立驗

一脫毛痔生在肛門周圍痒痛溼濕先用槐葉煎湯薰洗再單用青龍丹為末攪患處早晚勤洗二三日立痊

下疳瘡用青龍丹壺不加冰片一分為末敷患處外貼烏龍膏更妙須一日一換有膿濕者用甘艸苦參梔子煎湯洗洗後用此丹加珍珠琥珀冰片各三分

一膿瘡久不愈者用青龍丹不加冰片壺分攪上

外貼烏龍膏一日一換即愈

一癰疽發背已潰疔肉多瘡口不收者用青龍丹壺

加冰片不為末摻患處外貼烏龍膏一日一換

立痊 此丹所治諸症効驗如神不可輕視

龍丸丹 此丹所治諸症驗効載后

胆凡五小 皂凡五小 白凡五小 牙硝五小 水銀五小

辰砂四小 製丹口訣將五件共研細末次入水

研再搗勻放鍋內按平中開一小窩以銅盞蓋

住邊用紙塞煨石羔壺而五錢炒鹽壺而五錢
研末調米湯周圍封固烘乾穩安爐中蓋內先
盛水八分始用文火煉至蓋內水略熱即換換
至四甌水足再用略武火煉至蓋內水略熱即
換又換至四甌水足取去離火正安勿動俟冷
方開其丹盡升在蓋上篾竹刮下磁罐收貯聽
用

一楊梅瘡用水調龍虎丹抹患處即効

一治天庖瘡水調丹抹患處即効如神

一楊梅瘡兩口角痒爛百藥不効急用丹調水抹之
必傾即以水浸洗翌日略腫三日立瘥

一凡諸瘡久爛有腐肉紫黑將丹再加黃丹炒至青
色調麪作針挿入腐肉内外用萬應膏貼之今
日巳時貼明日巳時解以對期為度腐肉尽拔
再以青龍丹加冰片敷之三日立瘥

一諸有漏孔久則成穿管者用丹全炒黃丹和麪作

針挿入一對期其管即爛離取淨潔更以青龍
丹加冰片敷之即愈

一面生黑痣有礙相者即以丹水調塗之外用膏藥
封之其痣自化

一無名腫毒膿潰不出此丹調水塗光白凹處外
貼萬應膏不一日腫破膿出仍以膏貼之貼至
膿盡即愈

一癰疽潰爛已久筋斷骨腐痛苦難言此腐骨已露

而不能拔用飛過硃砂炒至青紅色取起全龍
虎丹作針插入敗骨邊一對期腐骨即出急以
小鐵鉗輕輕搖出如知太痛則不敢拔仍以丹
針向骨傍挿入再過一宿至明日以鉗搖之骨
自出矣更用青龍丹壺小冰片分敷之外以
萬應膏貼之一日一換數日間其症如失
大凡此丹除歹肉取腐骨拔穿管去惡毒應効如
神醫者必識其性猛烈但非其症不敢錯用

毒散為先若麻後吐虵因胃虛弱內無穀氣故虵不安從上而出治當理胃安虵為急遲則胃敗不治宜七物散加烏梅主之若麻正沒而吐虵者亦屬胃虛當以理脾養胃為要治用六仙散久為敗症不治

凡麻後自汗者屬陽虛若不急治多成痙病切忌見風宜四物湯治陰抑陽使內熱退其汗自止

凡麻後不食而兼自汗之症俱作真虛甚為難治若亂投藥餌則傳變多端收功難矣切勿依麻初出未

沒可用辛溫解散之劑如果脾熱可用洩黃散斟酌
加減

洩黃散 火香 山梔 石羔 防風 甘草

共為末酒蜜調服

治麻諸方

治蘇散 治麻初熱未明症候 蘓葉 柴胡 黃芩

只壳 茯苓 陳皮 乾葛 半夏 吉夏

甘草 薑葱引

一痰氣流注 藍石 壹分 朱砂 四分 冰片 壹分

珍珠 五厘 琥珀 三分

一無名腫毒 藍石 三分 朱砂 五分 冰片 壹分

珍珠 壹分 琥珀 壹分

一附骨癰疽 藍石 五分 朱砂 三分 冰片 壹分

珍珠 一分 琥珀 一分

一對口瘡發 藍石 五分 朱砂 一分 冰片 三分

珍珠 五厘 琥珀 五分

一魚口便毒

葑石

四分半

朱砂五分
冰片一分

珍珠五厘

琥珀一分

一虛心怔忡

葑石

式小

硃砂

式小

冰片

一分

珍珠六分

琥珀

一小

一楊梅惡瘡以致失陽失鼻

葑石

三分

硃砂

五分

珍珠五厘

冰片

一分

琥珀

一分

失陽者

加仙靈

柴

式小四分

柴

一式分

失鼻者

加仙靈

柴

式小四分

服至

十六日

後方可加以前不可

十六日後方可加以前不可

一結核毒勢重者 藍石八分 略重者五分 輕者三分

朱砂亦然 毒在上者琥珀一分 珍珠五厘

冰片一分 毒在下焦琥珀八厘 珍珠三厘

冰片八分

一腹中受憊口不能言飲食難進者 藍石三分

硃砂二分 冰片六分 珍珠五厘 琥珀一分

一瘡穿肉爛骨出痛不可忍 藍石四分 朱砂五分

冰片八厘

一皮膚如故骨中痛極臥床不起而慢風症治者

葶石五分朱砂三分冰片四厘

一遍身起癬皮膚發裂而慢作厲風治者

葶石二分半朱砂二分

一穀道起牛皮頑癬肌鬆皮破及諸藥無効

葶石六分朱砂六分冰片六厘

一頭面胸背四肢並穀道皮膚紅白而生黑癩

葶石五分朱砂一分冰片五厘

一 下疳瘡 蓋石四分 珍珠五厘 琥珀一分

一 小兒慣生瘡毒而候作別症久不効者

蓋石四分 珍珠五厘 琥珀一分

以上十八症俱係五寶丹最易取効但服時宜土茯苓湯配之不可有失

七寶丹 治無名瘡毒潰爛癰疽去舊生新

水銀壹兩 鉛五小 全入鍋內溶化取起俟冷再加枯凡二小 皂凡一兩 牙硝一兩 白鹽一兩 共研

末置銀鍋內上以銅鍋蓋周圍以煨石羔炒鹽
封固蓋上添冷水八分煉至冷水既熱即換換
至三鐘止去火攤冷刮下磁罐收貯聽用

白玉丹

治惡瘡鼠瘻癰癧諸疔

水銀兩一 牙硝兩一 皂化兩一 枯凡兩一 胆凡三小
升法與七寶全

白三仙丹

治頭瘡疥癬

水銀

牙硝

明凡

各一兩

升法照前

黃三仙丹 治肩瘡惡疥左癱右瘓腫瘡脛癰

滕黃 信石 妖面 各一兩 升法照前

紅三仙丹 治遠年頑瘡流血不乾腐肉不拔

硃朱 血丹 血竭 各一兩 升法照前

神祕萬金膏 草烏 川芎 大黃 各六小 當歸

赤芍 白芷 連翹 白芨 白朮 烏藥

官桂 木鱉子 各八小 槐 柳 桑 桃 各四小

苦參 皂角 各五小 真麻油 貳斤 右各藥剉

末置銀鍋內上以銅鍋蓋周圍以煨石羔炒蓋
封固蓋上添冷水八分煉至冷水既熱即換換
至三鐘止去火攤冷刮下磁罐收貯聽用

白玉丹

治惡瘡鼠瘻癰癧諸痔

水銀兩一牙硝兩一皂花兩一枯花兩一胆凡三小

升法與七寶全

白三仙丹

治頭瘡疥癬

水銀

牙硝

明凡

各一兩

升法照前

黃三仙丹 治肩瘡惡疥左癱右痿腫瘡脛癰

滕黃 信石 妖面 各一兩 升法照前

紅三仙丹 治遠年頑瘡流血不乾腐肉不拔

根朱 血丹 血竭 各一兩 升法照前

神祕萬金膏 草烏 川芎 大黃 各六小 當歸

赤芍 白芷 連翹 白芨 白蔞 烏藥

官桂 木鱉子 各八小 槐 柳 桑 桃 各四小

苦參 皂角 各五小 真麻油 式斤 右各藥剉

散麻油內浸一宿用火熬至焦色以絹濾去渣
不用將油入鍋內以文武火熬至滴水成珠再
下飛過黃丹十二兩先要炒過陸續下勻滴水
成珠不散為度後入乳香沒藥末各四錢攪勻
成膏聽用一方加藜合香式不名萬應金膏
出壽世保元

此膏主治風寒溼氣所侵跌撲閃挫傷損一切疼
痛皆貼患處心腹痛俱貼痛處哮喘咳嗽貼背心

瀉痢貼臍上頭痛眼痛貼太陽穴及治一切無
名腫毒疔疽發背瘡癩濕毒腫瘡始覺時俱貼
患處即消已成亦能猥膿長肉止痛甚効筆難
尽述

玉紅膏

能生肌收口

血竭

小

黃丹

式小

龍骨

乳香

小

沒藥

小

水粉

式小

海螵蛸

八分

輕粉

七分

兒茶

小

黃蜡

小

白蜡

小

冰法

一分

共研細末猪

管煨油壺兩共搗成膏

白雲膏 猥膿生肌止痛收口 水粉 甘石

白蜡 各式兩 乳香 沒藥 各三小 輕粉 五分

冰法 五分 樟腦 三小 茶油 五兩 先將蜡與油放

鍋內溶化後入諸藥末揉勻攪不住手成膏備

用

白雲膏 治金鎗止血收口如神 樟腦 龍骨

黃蜡 水粉 各五錢 猪膏 麻油 各式兩 先將

油蜡共熬化後加龍骨水粉合熬一沸提起再

入樟腦攪勻成膏

白丁香

又名拔疔膏

治惡疔初起此膏貼之立消

白丁香

硃砂

信石

胆凡

斑猫

去足利各式小

倍子

小半

糯米

式小炒赤

共研

細末

油調

成膏

臨用時加獨蒜一片葶豆大貼疔上外以膏蓋

之立消

烏龍膏

生肌

收口

長肉

拔毒

最捷

黃丹

松香

水粉

各一兩

銅青

五分

明礬

小

冰片

三分

共為細末 用雄烏豬取骨煨油 兩半 搥成膏

收入磁罐聽用

千槌青雲膏 惡毒未及 善拔膿 止痛除毒消腫

松香 便製二兩 木鱉子 廿个 銅青 毒兩四小

桃仁 廿个 乳香 小半 沒藥 小半 杏仁 廿

草蘇仁 兩六小 狼毒 五小 紫荆皮 五小

以上諸藥共搥足足 搥至虛干 下方可合用

隔紙膏

癰疽潰爛久難收口 腥臭難聞

樟腦壹小 冰片小半 白蜡小半 三仙小二分

六一散七分 兒茶小 硃砂八分 輕粉八分

水艮小半 共研極細末茶油調成膏用油紙一

張將針多多刺孔貼患處再以膏藥攤油紙上

外又以油紙一張蓋之緊緊扎定一日一換三

日立痊

六合膏 爛脚腫瘡頑癬不問新久並皆治之

水粉小半 黃丹小 輕粉小半 白蜡式小 黃蜡式小

冰床五分

除二蜡餘葯共研末公猪油兩半

和二蜡溶化再與諸葯末共攪勻成膏將油

紙二張用法與隔紙膏全

竹木跌釘刺入肉不出尿浸香菰和桐油共搗敷

之其刺自出

湯火傷採鳳尾蓮研細末香油調敷立効

又方取老鴉色堯焙乾湯傷全生米炒火傷全糯

米炒調香油抹効

又單方 藤茶搗汁敷患處最効

又方治火傷青皂腹下嫩毛如絨者燒灰調油搽之効

湯火傷爛久停膿水 宜取朽腐松樹心燒灰存性研末茶油調敷立効

又巫術治湯火傷心請鬼谷先生急急如律令用冷水一碗寫諱號八字三次

雷魘 雷魘 雷魘 雷魘 雷魘 雷魘 用口

飛木三次於痛處再以鴨毛滴水於患處効

剗刀傷破 漆紫尾或葉搗爛敷患處止血住痛三

日不鮮並無疤痕

石壓破 小范葉搗末酒調敷消腫止痛

跌打損傷 輕者皮膚不壞肌骨微痛即取珍珠花

嫩葉和黃酒醱共搗敷患處立消

跌打傷重者不能開舌急取開舌草搗汁灌之

即開舌然後服藥 開舌草即莖根

鋪地錦 又名血見愁 臭椿葉 又名豹皮樟

牛角液 又名對坐葉 三味和黃酒共搗汁溫服

其渣敷患處一宿如失

又单方 灶鷄不拘多少入礬罐內以火焙乾研末
每用二三厘全熊胆汁攪勻服

跌打重傷腹內血成痞塊以致面黃肌瘦飲食漸減

草麻子 五个去壳 雞卵 一个 二味全茶油煎熟

食之効

跌打斷骨 接骨應驗丹方

上桂心小寸香五分野蒺藜塊八分抱十六天

鷄子一个藍田七三小川牛夕二小紅地龍二小

灶鷄二小共研末酒炮服

接骨救藥 骨碎補式小麩粉小半真豆粉式小

番椒四个冰糖式兩馬鬃一兩錫灰式兩多捉

小蝦蟆子共搗敷患處三月鮮下即愈

凡跌開肘腕以手尽力扯住接好以此藥外敷

用綿絹緊扎三日如故倘打碎筒骨直骨以手
捻定漫漫搵勻以此藥敷患處外用杉皮兩邊
夾好將綿帶緊縛輕者三五日重則七九日即
痊如故

七厘散

射香

一分

冰片

一分

辰砂

一分

乳香

一分

沒藥

一分

紅花

一分

血竭

一分

兒茶

一分

共研細

四分

末磁罐收貯封口勿令洩氣每服七厘燒酒送

下 此方專治金鎗跌打損傷折骨用藥七厘

燒酒冲服又外敷量傷之大小為用如遇列頸
速敷藥未用帛扎住立時止痛止血敷日必愈
此方出軍中向在雲貴兩邊為官得授此方凡
打杖閉毆之案無不應手立痊

眼科

天行赤眼 宜取魚泡葉搗爛先以薄紗幔眼胞再
將葉敷紗上外用綿帶扎之一宿即痊

掃雲湯治赤眼當歸須

赤芍

白菊花

各八分

黃芩

防風各七分 川連 蝉退 煨石羔各五分 生地一

連翹六分 甘艸三分 水煎服

風熱侵眼 蜜蒙花 蔓京子 金銀花 穀精草

蝉退 防風 京芥 各等分 水煎服

光明丹 出一盤珠 治一切風熱侵眼 甘石浮浸 壺兩 童便

珠砂小 硼砂小 輕粉五 冰片三分 射香一分 共研極

細末 點睛上三四次即退

飛絲入眼 用新筆於目運搗取出即捷

贅肉生珠

桑白皮

五倍子

木賊各一小

共燻

水不時洗之立愈

白巖目侵睛潮熱如火

蛇虫

小兒吐
出者佳

地龍

並也赤色
者佳

取來新瓦上文火焙乾共為末再加寸香一字

梅花片

一字全

研極細末點入白腎自退

熬氣冲眼

過路蜈蚣

飛天蜈蚣

穿山蜈蚣

三味俱係草名取來共搗爛先以青紬幔目睛

再將卅葯敷紬上外以青布繫一宿立痊

夜明湯 治雀眼 晝無不見 及晚提灯 不見物

夜明砂 五小 青箱子 五小 共研末 全羊肝蒸服

瞭亮

君子淚 治白翳遮睛 胥肉生珠 最捷 史君子藤以

刀劈半傾 流出湘片 時結成淚 以蜆壳刮來 点

睛上 立刻醫散 胥消瞭亮 加倍

又單方 治熱眼赤痛 以黃帛浸狗尿 貼之最捷