

臨證指南醫案目

卷二

咳嗽

吐血

失音

肺痿

臨證指南醫案卷二

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

邵銘新甫

遺精

陰虛陽動

陳厥後吸短多遺議攝下焦

熟地 四錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 一錢

五味 一錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

茯神 三錢

山藥 二錢

某十四 夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

易動無制。故精不能固。由煩動而泄。當填補下焦。俾精充陽潛。可以圖愈。

熟地 八兩

麥冬 二兩

茯神 二兩

五味 二兩

線膠 四兩

川斛膏 四兩

沙苑 二兩

遠志 一兩

芡實 三兩

湖蓮 三兩

金櫻膏丸

馬一陰虛體質。常有夢泄之疾。養陰佐以潛劑。仍參入通藥可效。六味去丹澤。加湖蓮芡實五味。遠志秋石。

金櫻膏丸

張陰精走泄。陽失依附。上胃為熱。坎水中陽不藏。古人必以厚味填之。介類潛之。乃從陰以引陽。與今人見熱

投涼不同

熟地

龜甲

淡菜

青鹽

茯神

栝子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某^三脉左弦右濡。夢遺咳逆氣急

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實

金櫻膏

加蜜丸每服四五錢淡鹽湯下

楊

脉垂入尺有夢遺精。議填陰攝固其下。

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實

金櫻膏九鹽湯下

劉先患目疾有外邪流淚嘈雜不欲食內鬱勃陽氣過動陰虛

不主攝納春半連次遺泄腰脊酸楚皆肝腎病矣

此症有伏風本不軍味補濕

熟地 龍骨

萸肉

茯神

丹皮

湖蓮

芡實

遠志

某勞損漏瘍大便時澀陰火上升下則遺泄

熟地

龜版

芡實

山藥

女貞

建連

炙草

檀豆皮

某少年頻頻遺精不寐心嘈乃屬腎中有火精得熱而

妄行日後恐有腎消之累

焦黃栢

生地

天冬

茯苓

煨牡蠣

炒山藥

某

脉虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動。精

搖下泄。加以夜坐不靜。養暴寒。再折其陽。身不發熱。時

時驚湯。煩躁。從仲景。下陽肉。稠例。用救逆湯法。必得神

氣凝靜。不致昏瘖。瘖之變。救逆湯去芍。

費。色蒼。脉數。煩心。則遺。陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下

注。此固濟無功。

陰虛濕熱

草薺

黃栢

川連

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

苡仁

吳二病形在腎肝。但得瀉頭中痛微緩。少腹陰囊亦脹。想陰分固虛。而濕熱留着。致腑經之氣無以承流宣化。理固有諸。先泄厥陰鬱熱。兼通腑氣再議。

龍胆草

胡黃連

葶藶

丹皮

茯苓

澤瀉

又聞病原。是臟陰陰精之虧。致陽浮頭痛。兼有遺精。月數發。下虛上實。純以補瀉。決不應病。性不耐丸劑。與通

攝兩用。

既有頭痛必原車症法過刻亦音分法

龜版

秋石

熟地

女貞

遠志

芡實

湖蓮

茯苓

熬膏

錢十一脉右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡蝕

黃柏

知母

熟地

草薺

茯苓

遠志

蜜丸

某

夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷墜自

腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脉皆傷議用通

藥兼理陰氣猪苓湯

又

熟地

五味

茯苓

茯苓

湖蓮

山藥

下損及
中兼治
脾胃

宋二

無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢

治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化

胃納少而遲遲固下必佐健中

人參

桑螵蛸

生龍骨

鎖陽

芡實

熟地

茯神

遠志

金櫻膏丸

華二神傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復謂之

損內經治五臟之損治各不同越人有上損從陽下損

從陰之議然必納穀資生脾胃後天得振始望精氣生

於穀食自秋至今日甚乃裏真無藏當春合泄越生

氣不至漸欲離散從衣精血有形藥餌焉能驟然充長

攻病方法都主客邪以偏治偏閱古東垣丹溪輩於損

不肯復者首宜大進參朮多至數觔謂有形精血難生

皆不知醫理之說

無形元氣須急固耳。况上下交損。當治其中。若得中。甞加穀。繼參。八攝納。填精。斂神之屬。方今春木大泄。萬花盡放。人身應之。此一月中。急挽勿懈矣。

參水膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精。收攝散亡。乃瀆以治脫之法。

又半月來。服桑螵蛸散以固下。參水膏以益中。遺滑得

止。其下關頗有收攝之機。獨是晝夜將寢。心中諸事紛

紛來擾。神傷散越。最難斂聚。且思慮積勞。心脾營血暗

損。血不內涵。神乃孤獨。議用嚴氏濟生歸脾方。使他臟

與氣咸歸於脾。今夏前土旺司令。把握後天。於理最合。
歸脾湯

又

立夏四日。診左脉百至餘。頗有斂聚之意。右關及尺。乳動若革。按臍下過寸。動氣似若穿梭。此關元內空。衝脉失養而震躍不息。此女子胞胎。男子聚精之會也。大凡內損精血形氣。其胃旺納食者。務在滋填。今食減不納。假寐半晌。心煩驚惕。醒而汗自漉。五心熱熾。四肢骨節熱痿。如墮。明是陰精內枯。致陽不交。陰轉枯。轉溼。自下及中至上。前投桑螵蛸散。固瀦精竅。遺滑經月不來。奈寢食不加。後天生氣不醒。膿厚填補。於理難進。卽參

聰明人易
於轉悟若
能刻之如
此自考其
苦必更進
矣

木甘溫益氣又恐益其枯燥宜參生脉以滋三焦晨進
人乳一杯使氣血陰陽引之導之迎夏至一陰來復早
用人乳無用一盞隔湯燉熱服午後畧饑用生脉四君子湯
又一月來雖經反覆參脉症形色生陽頗有根蒂近食
蚕豆滯氣腹中微膨食後口味酸濁是久卧重着脾陽
運動之機尚少而火升心煩動氣汗出遺精雖減於昔
未得平復總是內損已深若調治合宜只要精氣復得
一分便減一分病象長夏脾胃主令培土助納爲要而
精氣散越仍兼攝固之法刻下味酸微膨補脾少佐疎
胃宜晚進其早上另製補攝丸劑益臟真以招納散失

之氣。

晚服

人參

茯苓

白朮

炙草

廣皮

麥冬

五味

神麴

麥芽

炒黃柏

早上

人參

桑螵蛸

白龍骨

淡菴蓉

五味

芡實

茯神

棗仁

金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

又形色有漸復之象較之夏至病去三四但診右脉弦

大尚少冲和左脉細促未靜穀進遲遲有吞酸膈脹寐

中仍欲遺精此中焦之陽宜動則運下焦之陰固則能

守乃一定成法午後服異功散加炒穀芽

右弦胃氣
所以難復

修於此延
細細分別
各必大進

葉氏五次
醫案功過

相半者

晨服 遺症固瀉下焦。乃通套治法。想精關已滑。瀉劑不

能取效。必用滑藥引導。同氣相求。古法有諸。

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麋角膠 白龍骨

生牡蠣 熟地 萸肉 茯神 五味

山藥 芡實 湖蓮 遠志 砂仁

膠髓代蜜丸晨服四錢秋石二分化水下

毛二 長夏暑濕熱鬱。都令脾胃受傷。色黃神倦。氣分自餒。

因有遺泄一症。在盛年陰虛為多。及詢納食未為強旺。

遺發必勞煩而來。脉象非數搏。議以養脾立法。

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨

治病立方
必有妙義
精思一味
靈補後有
留邪之患

心腎兼治

項 脉左弱右弦。色黃食少。腹脹便溏。常有夢遺洩。此非

陰柔瀦膩。可服用煦陽以涵陰。

生虎絲子 覆盆子 蛇床子 五味子 韭子

益智仁煨 補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

丁 陰精走泄。陽不內依。欲寐即醒。心動震悸。所謂氣因

精奪。當養精以固氣。從前煖藥不錯。但不分剛柔為偏

陽。是以見血。莫見血投涼。

龜版去臍削光 桑螵蛸殼 人參 一錢 當歸 一錢

青花龍骨飛 抱木茯神 三錢

姚二始於念萌。不遂其慾。陽下墜而精洩。先夢者心陽注

腎久則精血日損。不充養筋骨為痛。下損及中。食不運化。此非奠地。臑膈以及瀦精可效。妙香散。

許八陰氣走泄遺精。務宜滋填。塞固。今納穀少而不甘。胃

氣既弱。滋膩先妨胃口。議用桑螵蛸散。蜜丸。服三四錢。

戈遺精數年。不但腎關不固。陽明脉絡亦已空乏。欲得

病愈。宜戒慾寧心一年。寒暑更遷。陰陽漸交。用桑螵蛸

散治之。

顧九滑精用陰藥。頓然食減。藥先傷胃。據述夢寐驚狂。精

走無以護神。當固無形矣。

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁

扶神

茯苓

遠志

木香

呂三有夢乃遺。是心有所觸而致。經營操持。皆擾神動心。

說商賈客於外。非關酒色矣。妙香散

命七壯年形質偉然。脉來充虛。述心悸怔。多畏懼。夜寐不

甚寧靜。此陽不易交於陰。過用勞心。使然。用妙香散。

張四形壯脉小。自述心力勞瘁。食減遺精。倣景岳精因氣

而奪。當養氣以充精。理其無形。以固有形。妙香散

支二痰多。塞能食。有夢遺精。醫投疎泄。肺氣消痰。六十

劑不效。問讀書夜坐。陽氣必升。充塞上竅。上盛下衰。寐

則陽直降。而精下注。為遺。用補心丹。

黃^三一真陰損傷而五志中陽上燔喉痛下墜為遺精髓日

耗骨瘦無力必延枯槁而後已藥餌何足久恃

早服補心丹 晚服桑鰾蛸散

胡遺精四年精關久滑不固陰久傷陽氣不入陽蹻穴

夜寤不寐前以鎮攝小效獨心中怔忡不已以桑鰾蛸

散從心腎治

卑^二六有夢遺精是心腎病清心固腎是為成法得以水火

交合病當漸減內傷病從內起豈得與外來六氣混治

熟地 龍骨 遠志 五味 茯神

芡實 建蓮 金櫻膏丸

程 左脉剛堅。火升。神氣欲昏。片刻平復。宛若無病。此皆
勞心。五志之陽動。龍相無制。常有遺泄之狀。先用滋腎
丸三錢。淡鹽湯送。

又 早服補陰丸。晚服三才加炒黃柏砂仁。

又 交霜降。絡中陡然熱蒸。肢節皆麻。火風震動。多因脾
腎液枯。議用二至百補丸意。斑龍二至百補丸加黃柏。
林十診脉細澹。寐則遺精。心熱口渴。不時寒熱。此腎陰內
損。心陽暗熾。補心丹三錢四服。

某 冬令煩倦嗽加。是屬不藏。陽少潛伏。兩足心常冷。平
時先夢而遺。由神馳致精散。必鎮心以安神。猶喜胃強。

納穀若能保養可望漸愈。

桑螵蛸

金櫻子

覆盆子

芡實

遠志

茯神

茯苓

龍骨

湖蓮

煎膏煉蜜收饑時服七八錢

楊十八

冲年遺精。知識太早。難成易虧。真陰不得充長。及壯

盛未有生育。而久遺滑漏。褚氏謂難狀之疾者。蓋病傷

可復。精損難復也。診脉上動尺乳。心動神馳。神馳精散。

草木性偏。焉得見長。務宜斷慾百日。以妙香散桑螵蛸

散方。理心脾以交腎。固腎氣以寧心。早晚並進。百日以

驗之。

腎氣不攝

呂二成婚太早。精血未滿久洩。必關鍵不攝。初則精腐變

濁。久則元精滑溢。精濁之病。巢氏分晰彰著。經言腎虛

氣漫為脹。鹹為腎味。上溢口舌。皆下失攝納之權。

生兔絲子粉 蛇床子 覆盆子 陝沙苑子

家韭子 五味子 鱈魚膠丸

許九脉虛花。應乎失血遺精。先天既薄。更易泄少藏。正褚

氏所云。難狀之疾。冲年須潛心靜處。冀水火自交。可以

精固。莫但圖藥餌。須堅守瞬刻強制之功。

鮮河車膏 九蒸熟地 五味 萸肉

山藥 湖蓮 砂仁 芡實 金櫻膏丸

李五脉小色白。失血遺精屢發。猶喜納穀胃安。封藏固補。

使其藏聚。若再苦寒瀉火。胃傷廢食。坐以待困矣。

熟地

萸肉

五味

覆盆子

河車膏

生兔絲粉

山藥

湖蓮

茯苓

芡實

金櫻膏丸

某 脉左部數有鋒芒。初夏見紅。久遺滑。入夜痰升肋痛。

肝陽上冒。腎弱不攝。固攝助納。必佐涼肝。

熟地

湖蓮

芡實

生白龍骨

茯神

川石斛

兼失血

章

脉數虛。氣衝心熱。嗆咳失血。屢因嗔怒。肝陽升則血

湧墜則精遺。春末土旺。入夏正當發泄。主令暮熱。晨汗。陰陽樞紐失固。議進攝真。其清寒肺藥須忌。

魚鱈膠

生龍骨

桑螵蛸

芡實

茯苓

五味

秋石

調入

陸一肌肉鬆柔。脉小如數。常有夢遺。陰精不固。上年冬令

過溫。溫則腠理反踈。陽動不藏。諸氣皆升。絡血隨氣上

溢。見症如頭面熱。目下肉暈。心悸怔忡。四末汗出。兩足

附腫。常冷不溫。走動數武。卽吸短欲喘。何一非少陰腎

氣失納。陽浮不肯潛伏之徵。况多夢紛擾。由精傷及神

氣。法當味厚填精。質重鎮神。佐酸以收之。甘以緩之。勿

重複之才
十居六七
令人心煩

遺精之法
固不外乎
填精鎮心
本無神妙
方法俗醫
往往用溫
熱及粘膩
等物必至
傷人此老
全不犯此
但此症總

因血以投涼。莫見下寒。輒進燥熱。恪守禁忌以安之。經年冀有成功。所慮冲年志慮未純。貽憂反覆。

水製熟地

人參

秋石拌

白龍骨

炒杞子

五味

炒山藥

茯神

牛膝炭

遺精一症。前賢各有明辨。其義各載本門。茲不復贅。大抵此症。變幻雖多。不越乎有夢無夢。濕熱三者之範圍而已。古人以有夢為心病。無夢為腎病。濕熱為小腸膀胱病。夫精之藏制雖在腎。而精之主宰則在心。其精血下注。濕熱混搖而遺滑者。責在小腸膀胱。故先生於遺精一症。亦不外乎寧心益腎。填精固攝。

由伏邪為
患如火如
瘦如風不
能捷剔餘
邪善以調
和減氣委
曲祛治方
無變病一
味安神填
陰狀多未
盡之禮也

清熱利濕諸法。如腎精虧乏。相火易動。陰虛陽冒。而為遺精者。用厚味填精。介類潛陽。養陰固瀉諸法。如無夢遺精。腎關不固。精竅滑脫而成者。用桑螵蛸散。填陰固攝。及滑瀉互施方法。如有夢而遺。煩勞過度。及脾胃受傷。心腎不交。上下交損而成者。用歸脾湯。妙香散。參朮膏。補心丹等方。心脾腎兼治之法。如陰虛不攝。濕熱下注。而遺滑者。用黃柏草薢黃連蒼澤等。苦泄厥陰鬱熱。兼通腑氣為主。如下虛上實。火風震動。脾腎液枯。而為遺滑者。用二至百補丸。及通掛下焦之法。如龍相交熾。陰精走泄而成者。用三才封

髓丹。滋腎丸。大補陰丸。峻補真陰。承制相火。以瀉陰
中伏熱爲主。又有房勞過度。精竭陽虛。寐則陽陷而
精道不禁。隨觸隨泄。不夢而遺者。當用固精丸。升固
八脈之氣。又有膏粱酒肉。飲醇厚味之人。久之脾胃
釀成濕熱。畱伏陰中。而爲夢泄者。當用劉松石猪肚
丸。清脾胃蘊蓄之濕熱。立法雖爲大備。然臨症之生
心化裁存乎其人耳。鄒滋丸

濕熱

淋濁

某^三二 濕熱下注淋濁當分利

草薺

淡竹葉

瞿麥

赤苓

細木通

扁蓄

某^二八 濕熱下注溺痛淋濁先用分利法

草薺

淡竹葉

木通

赤苓

茵陳

海金沙

魏 脉數垂淋濁愈後再發肛脹便不爽餘滴更盛

草薺

猪苓

澤瀉

白通草

海金沙

晚蚕沙

丹皮

黃栢

又 滯濁下行。痛緩。議養陰通腑。

阿膠

生地

猪苓

澤瀉

山梔

丹皮

毛^三壯盛體豐。當夏令濕熱蒸迫。水穀氣墜。而有淋濁。服

寒涼腹脹。得固瀆無效。皆非腑病治法。子和桂苓飲

又 前用甘露飲。淋濁已止。而頭暈左肢麻木。胃腕腹中

饑則欲痛。咽喉中似有物粘着。咳咯咽飲不解。診脉左

勁右濡。據症是水弱木失滋涵。肝陽化風。過膈遶咽達

巔。木乘胃土。陽明脉衰。不司束筋骨。以利機關。腕腹中

宜清上焦

痛得食則緩者。胃虛求助也。今壯年有此。已屬痲中根。萌。養肝腎之液。以熄虛風。補胃土以充絡脉。務在守常。勿圖速效。可望全好。

製首烏

菴蓉

天冬

杞子

栝子霜

茯神

菊花炭

青鹽

紅棗肉九服四錢

晚服猪肚丸方

某

膏淋濁賦。濕熱居多。然亦有勞傷腎傷。下虛不攝者。

今以酒客。腹中氣墜。便積。苦辛寒分消治。

黃栢

茯苓

萆薢

海金沙

川棟子

青皮

防己

蚕沙

陰虛濕熱

汪 脉左堅八尺。濕熱下墜。淋濁痛。滋腎丸

月二便濁莖痛。滋腎丸三錢

吳四久瘡不愈。已有濕熱。知識太早。陰未生成。早泄。致陽

光易升易降。牙宣齲血。為濁為遺。欲固其陰。先和其陽。

做丹溪大補陰丸。合水陸二仙丹。加牡蠣。金櫻膏丸。

黃 舌白氣短。胸中痛。目暗微淋。乃陰虛於下。氣阻於上。

暫停參劑。早上服都氣丸三錢。晚服威靈丸二錢。

葉八脉數形瘦。素有失血。自覺氣從左升。痰嗽隨之。此皆

積勞。陽氣鼓動。陰弱少制。六味壯水和陽極。是近日便

濁。雖宜清熱。亦必顧其陰體為要。

生地

丹皮

甘草梢

澤瀉

山梔

黑豆皮

某

陰虛濕熱在腑為濁

六味去萸加車前牛膝黃柏

葶藶

某

遺由精竅。淋在溺竅。異出同門。最宜分別。久遺不攝。

是精關不攝為虛。但點滴莖中痛痒。久腹堅滿。此屬淋

閉。乃隧道不通。未可便認為虛。况夏令足趾濕癢。其下

焦先蘊濕熱。熱阻氣不流行。將膀胱撐滿。故令脹堅。議

理足太陽經。五苓散

下焦陽
不流行

某

四淋濁溺短瀝痛。先通陽氣。

草薺 三錢
烏藥 一錢
益智 五分
赤苓 三錢

遠志 四分
琥珀末 五分

心火下陷
蕭 四
一 脉沉淋濁
分清飲加山梔丹皮茯苓猪苓

某 三
淋濁小便不利當清利火腑
導赤散生地用細者

加赤苓瞿麥

黃
心熱下遺於小腸則為淋濁用藥以苦先入心而小腸火腑非苦不通也既已得效宗前議定法

人參
黃柏
川連
生地
茯苓

茯神
丹參
桔梗
石菖蒲

王
淋屬肝胆濁屬心腎心火下陷陰失上承故溺濁不

禁。

人參

川連

生地

茯神

栝子仁

遠志

某氏氣閉成淋

紫苑

枇杷葉

杏仁

降香末

瓜薑皮

鬱金

黑山梔

又 食入痞悶小便淋痛 照前方去紫苑黑梔加苡仁

膀胱熱血淋

某三 小溲短赤帶血 導赤散加琥珀末五分赤茯苓

胡三五 熱入膀胱小溲血淋莖中猶痛非止血所宜議用錢

氏導赤散加知栝以清龍雷

方案重復氣閉可歇

許八血淋。尿管溺出而痛。脉沉實。形色蒼黑。治從腑熱。

蘆薈
山梔
郁李仁
紅花

當歸
酒大黃
龍胆草
丹皮

又血淋未已。用堅陰清熱。

小生地
粉丹皮
黃柏
知母

淡竹葉
山梔非血淋也

精濁全虛
祝五
中年已後。瘦人陰虧有熱。飲酒濕熱下墜。精濁痔血。

皆熱走入陰。則陰不固攝。前方宗丹溪補陰丸。取其介

屬潛陽。苦味堅陰。若用固澇。必致病加。

水製熟地
龜版膠
鹹秋石
天冬

茯苓

黃柏

知母

猪脊筋搗丸

范_二精走濁淋。脊骨生熱。屬陰虛。胃弱勿用膩滯。

龜腹甲心

覆盆子

五味

歸身

鹿角膠

秋石

芡實

金櫻膏丸

腎氣不攝

戈_四脉左細勁。腰痠溺有遺瀝。近日減穀難化。此下焦臟

陰虛餒。漸及中焦腑陽。收納肝腎。勿損胃氣。

熟地

杞子

栢子仁

當歸身

紫衣胡桃

補骨脂

杜仲

茯苓

青鹽

蜜丸

某_六六旬有五。下焦空虛。二便不爽。溺管痠痛。姑與腎氣

湯主治。腎氣湯細絹濾清服

淋濁

六

朱^三六 血淋管痛。腑熱為多。經月來。每溺或大便。其墜下更甚。想陰精既損。腎氣不收故也。

鹹菴蓉

栝子仁

杞子

大茴

牛膝

茯苓

非血淋方也

某 淋濁經年。陽損腰痛畏冷。

熟地

杞子

鹿角膠

巴戟

杜仲

栝子仁

湖蓮

芡實

敗精濁
痰阻竅

葉^二七 淋屬肝胆。濁屬心腎。據述病弱出渾濁如膿。病甚則

多。或因遺泄後濁痛皆平。或遺後痛濁轉甚。想精關之間。必有有形敗精凝阻其竅。故藥中清濕熱通腑。及固

瀉補陰。久餌不效。先議通瘀腐一法。考古方通淋通瘀。用虎杖湯。今世無識此藥。每以杜牛膝代之。

用鮮杜牛膝根水洗淨。搗爛絞汁。大半茶杯。調入真麝香一分許。隔湯燉溫。空心服。只可服三四服。淋通即止。倘日後病發再服。

又淋病主治。而用八正分清。導赤等方。因熱與濕俱屬無形。腑氣爲壅。取淡滲苦寒。濕去熱解。腑通病解。若房勞強忍精血之傷。乃有形敗濁。阻於隧道。故每溺而痛。徒進清濕熱利小便無用者。以溺與精同門異路耳。故虎杖散小效。以麝香入絡通血。杜牛膝亦開通血中敗

濁也

主治淋血為淋之方

韭白汁九製大黃一兩

生白牽牛子一兩

歸鬚五錢

桂枝末

生三錢

炒桃仁二兩

小茴三錢

韭白汁法丸

李

敗精凝髓通瘀痺宣竅已效

生桃仁

杜牛膝

人中白

生黃栢

麝香

二分調入

徐四五

五旬又四勞心陽動陰液日損壯年已有痔瘡腸中

久有濕熱酒性辛溫亦助濕熱熱下注為瘰為淋故初

病投八正五苓踈氣之壅也半年不齊氣病漸入於血

絡。考古方惟虎杖散最宜。虎杖散

張

丹溪謂五淋症濕熱阻竅居多三年前曾有是病月

前舉發竟有血塊窒塞尿管大痛不能溺出想房勞強
忍敗精離位變成污濁糜腐且少腹堅滿大便秘澹臟
氣無權腑氣不用考瀕湖發明篇中有外甥柳喬之病
與此適符今倣其義參入朱南陽法

治赤白淋

兩頭尖

川棟子

韭白

小茴

桂枝

歸尾

沖入杜牛膝根汁

又痛脹皆減滴瀝成淋前投通濁已效只要凝塊全無
便不反覆陰藥呆鈍桂附劫液通陽柔劑爲宜

菴蓉

歸尾

栢子仁

炒遠志

杞子

茯苓

小茴

當加入養血者

馬淋。屬肝胆居多。桂附劫陰。與剛臟不合。診脈沉澀。無力。非五苓八正可投。議用朱南陽法。仍是厥陰本方耳。

老韭根白

兩

兩頭尖

小茴香

川棟子肉

歸鬚

穿山甲末

錢一

徐

由淋痛漸變赤白濁。少年忠此。多有慾心暗動。精離

本宮。腐敗凝阻。溺竅而成。乃有形精血之傷。二年久病。

形消肉減。其損傷已非一臟一腑。然補精充髓。必佐宜

通為是。自能潛心安養。尚堪帶病延年。

熟地

生麋角

茯苓

炒遠志

赤苓

牛膝

某 每溺尿管窒痛。溺後渾濁。敗精阻竅。濕熱內蒸。古方
虎杖散。宣竅通腐甚妙。若去麝香。必不靈效。較諸湯藥
更上一籌矣。

酒煨大黃

炒龍胆草

炒焦黃柏

牽牛子

川楝子

黑山梔

小茴

沉香汁

某 陰精上蒸者壽。陽火下陷者危。血淋久而成形。窒痛
煩心。心火直升。老人陰精已憊。五液化成敗濁。阻竅不
通。欲溺必痛。得泄痛減。即痛則不通。痛隨利緩之謂。故
知栝六味。及歸脾逍遙之屬。愈治愈劇。其守補升補。滋

滯瀉藥。決不中病。用琥珀痛減。乃通血利竅之意。然非久進之方。以不傷陰陽之通潤立方。

生地

益母草

女貞子

阿膠

琥珀

稽豆皮

奇脉滿

顧二

敗精宿於精關。宿腐因溺強出。新者又瘀在裏。經年

累月。精與血並皆枯痛。勢必竭絕成勞。不治。醫藥當以

任督衝帶調理。亦如女人之崩漏帶下。醫者但知八正

分清。以濕熱治。亦有地黃湯益陰瀉陽。總不能走入奇

經。

鹿茸

龜甲

當歸

杞子

茯苓

小茴

鮑魚

夏^六案牘神耗過動天君陽燧直升宜降水火不交陰精

變為腐濁精濁與便濁異路故宜利清解無功數月久

延其病傷已在任督凡八脉奇經醫每棄置不論考孫

真人九法端究其事欲涵陰精不漏意在升固八脉之

氣錄法黍末

方不甚清楚

鹿茸

人參

生兔絲粉

補骨脂

韭子

舶茴香

覆盆子

茯苓

胡桃肉

栢子霜

蒸餅為丸

劉^三脉緩瀉溺後有血或間成塊晨傾溺器必有膠濁粘

臟之物。四肢寒凜。納食如昔。病傷奇脉。

生鹿茸

當歸

杞子

栢子仁

沙苑子

小茴

此非治血脈之方

王五悲憂驚恐。內傷情志。沐浴薰蒸。外泄陽氣。絡中不寧。

血從漏出。蓋衝脉動而諸脉皆動。任脉遂失擔任之司。

下元真氣何以固納。述小便欲出。有滾楚如淋之狀。診

脉微小瀼。最宜理陽通補。用青囊璣龍丸。

淋有五淋之名。濁有精濁便濁之別。數者當察氣分

與血分。精道及水道。確從何來。大凡痛則為淋。不痛

為濁。若因心陽亢而下注者。利其火腑。濕熱甚而不

治淋之法
有通有塞
要當分別
有瘀血積
塞佳溺管
者宜先通
無瘀積而
虛滑者宜
峻補不但
新丸為餅
并外治之
法亦復多
端宜博識
而詳考之
案中並未

宣者徹其泉源。氣陷用升陽之法。管瘀進化結之方。此數端人所易曉也。獨不知厥陰內患。其症最急。少腹遶前陰如刺。小水點滴難通。環陰之脈絡皆痺。氣化機關已息。先生引朱南陽方法。兼參李瀕湖意。用滑利通陽。辛鹹泄急。佐以循經入絡之品。豈非發前人之未發耶。若夫便濁之恙。只在氣虛與濕熱推求。實者宣通水道。虛者調養中州。若虛實兩兼。又有益臆通腑之法。精濁者。蓋因損傷肝腎而致。有精瘀精滑之分。精瘀當先理其離宮腐濁。繼與補腎之治。精滑者。用固補斂攝。倘如不應。當從真炁調之。景岳謂

理其無形。以固有形也。然此症。但知治肝治腎。而不知有治八脉之妙。先生引孫真人九法。升音陽。固精絡。使督任有權。漏卮自已。可見平日若不多讀古書。而臨症焉。知此理。若不經先生講明。予今日亦不知此方妙處。又尿血一症。虛者居多。若有火。亦能作痛。當與血淋同治。倘清之不愈。則端究乎虛。上則主於心脾。下則從乎肝腎。久則亦主於八脉。大約與前症相同。要在認定陰陽耳。

邵新甫

陽痿

爵

徐三脉小數。漉上熱火升。喜食辛酸。爽口。上年因精滑陽痿。用二至百補通填未效。此乃焦勞思慮。爵傷。當從少陽以條暢氣血。

柴胡

薄荷

丹皮

爵金

山梔

神翹

廣皮

茯苓

生姜

心腎不交

仲二

八三旬以內。而陽事不舉。此先天稟弱。心氣不主下交。

於腎。非如老年陽衰。例進溫熱之比。填充髓海。交合心腎宜之。

熟地 雄羊腎 杞子 補骨脂 黃節

遠志 茯苓 胡桃 青鹽 鹿角膠好奇

勞心過度

王五述未育子。向衰莖縮。凡男子下焦先虧。客館辦事曲

運神思。心陽久吸腎陰。用斑龍聚精茸珠合方。

男子以八為數。年逾六旬。而陽事痿者。理所當然也。

若過此猶能生育者。此先天稟厚。所謂陽常有餘也。

若夫少壯及中年患此。則有色慾傷及肝腎而致者。

先生立法。非峻補真元不可。蓋因陽氣既傷。真陰必

損。若純乎剛熱燥瀆之補。必有偏勝之害。身兼血肉

溫潤之品。緩調之。亦有因恐懼而得者。蓋恐則傷腎。

陽痿之病
其症多端
更變難一
非專論數
干言不明
容當詳
茲不復聲

恐則氣下。治宜固腎。稍佐升陽。有因思慮煩勞而成者。則心脾腎兼治。有鬱損生陽者。必從胆治。蓋經云。凡十一臟皆取決於胆。又云。少陽爲樞。若得胆氣展舒。何鬱之有。更有濕熱爲患者。宗筋必弛。縱而不堅。舉治用苦味堅陰。淡滲去濕。濕去熱清。而病退矣。又有陽明虛則宗筋縱。蓋胃爲水穀之海。納食不旺。精氣必虛。况男子外腎其名爲勢。若穀氣不充。欲求其勢之雄壯堅舉。不亦難乎。治惟有通補陽明而已。華

岫雲

汗

衛陽虛

其二脉細自汗。下體怯冷。衛陽式微使然。

黃芪 二錢

熟附子 七分

分熟於木半

炙草 五分

煨姜 一錢

南棗 三錢

朱三脉微汗淋。右脇高突而爽。色痿足冷。不食易飢。食入

即飽。此陽氣大傷。衛不擁護。法當封固。

傷者無注舌人者有也等方詳習意義表

人參

黃芪

製川附子

孫八肉瞶筋惕。心悸汗出。頭痛愈。畏風怕冷。陽虛失護。用

真武湯

欬現汗症
必無汗治
芪附祇能
治陽虛之
汗若陽感
之汗則反
有害

某 勞傷。陽虛汗泄。

老方不注陽虛汗

黃芪 三錢

白朮 二錢

防風 六分

炙草 五分

顧氏 勞力怫怒。心背皆熱。汗出。往時每以和陽治厥陰肝

臟得效。今年春夏。經行病發。且食納頓減。褚氏謂獨陰

無陽。須推異治。通補既臻。小效。不必見熱。投涼。用鎮其

陽以理虛。

人參 七為正方

半夏

茯苓

炙草

牡蠣

小麥

南棗

管衛虛

張五 脉弦大。身熱。時作汗出。良由勞傷營衛所致。經云勞

者温之。

嫩黃芪

三錢

當歸 一錢

桂枝木 一錢

白芍 一錢

炙草

五分

煨姜 一錢

南棗 三錢

某二 脉細弱。自汗體冷。形神疲瘁。知饑少納。肢節痠楚。病

在營衛。當以甘溫。

生黃芪

桂枝末

白芍

炙草

煨姜

南棗

某 汗出寒凜。真氣發泄。痰動風生。用辛甘化風法。

生黃芪

桂枝

炙草

茯苓

防風根

煨姜

南棗

勞傷心神

梅四

案牘積勞

神困食減

五心汗出

非因實熱。乃火與元

胃陰虛

氣勢不兩立。氣泄為熱為汗。當治在無形。以實火宜清。

虛熱宜補耳。議用生脉四君子湯。

當加牡蠣

方 茹素惡腥。陽明胃弱。致厥陰來乘。當丑時澌然汗出。

少寐多夢。

人參

龍骨

茯神

棗仁

炒白芍

炙草

煎藥吞送少涼心苦藥

蒸熟五味子三十粒

又 鎮攝汗止。火升咳嗽。仍屬陰虛。難得充復。育陰滋液。

為治。

熟地炭

人參

炒麥冬

五味

炒萸肉

皆數所忌

川斛

茯神

女貞子

接服瓊玉膏方

汗由心由
於心火不
寧屬熱者
多屬寒者
少今諸方
皆用補陽
治法乃一
偏之見皆
由不知汗
出之液立
何徑也慄
人多矣
亡陽之汗
乃陽氣飛
越下焦空
虛此乃危
急之症非
參附不能

經云陽之汗以天地之雨名之。又云陽加於陰謂之汗。由是推之。是陽熱加於陰。津散於外而為汗也。夫心為主陽之臟。凡五臟六腑表裏之陽皆心主之。以行其變化。故隨其陽氣所在之處。而氣化為津。亦隨其火擾所在之處。而津泄為汗。然有自汗盜汗之別焉。夫汗本乎陰。乃人身之津液所化也。經云汗者心之液。又云腎主五液。故凡汗症未有不由心腎虛而得之者。心之陽虛不能衛外而為固。則外傷而自汗。不分寤寐。不因勞動。不因發散。溼溼然自出。由陰蒸於陽分也。腎之陰虛不能內營而退藏。則內傷而盜

曰陽與自盜等大不相同。醫者全然不知本為之病。貽誤甚多。誤者可嘆。

汗盜汗者。即內經所云寢汗也。睡熟則出。醒則漸收。

由陽蒸於陰分也。故陽虛自汗。治宜補氣以衛外。陰

第以涼心為主。先不知也。

虛盜汗。治當補陰以營內。如氣虛表弱。自汗不止者。

仲景有黃芪建中湯。先賢有玉屏風散。如陰虛有火。

盜汗發熱者。先賢有當歸六黃湯。栝子仁丸。如勞傷。

心神氣熱汗泄者。先生用生脉四君子湯。如營衛虛。

而汗出者。宗仲景黃芪建中湯。及辛甘化風法。如衛

李時珍曰。陽虛也。

陽虛而汗出者。用玉屏風散。芪附湯。真武湯。及甘麥

大棗湯。鎮陽理陰方法。按症施治。一絲不亂。謂之明

醫也。夫復奚愧。鄒滋九

脫

陽脫

陳遺尿。目瞑口開。面亮汗油。陽飛欲脫。無藥力挽。擬參

附湯法。加八童便。圖元真接續耳。

又子丑為陰陽交界之時。更逢霜降。正不相續。後現脫

象。進兩攝陰陽方。參附湯加五味子。

又陽回汗止神甦。無如陰液欲涸。心熱渴飲。姑救胃法。

人參

麥冬

五味

茯神

建蓮

又腎真未全收納。便溺自遺。無如咽燥喉痛。陽雖初回。

陰氣欲盡。難進溫熱之補。大意收攝真陰為治。

以卷共五
乃以似是
而作故病
情反復歷
慮不爽今
特指明之
以之皆者
正需否卷
陽脫者却
無陽也乃
陽氣上越
而不肯附
於陰也故
欲止其汗
必用陰葯
以陰葯之
氣真武湯
在止陽之

人參

麥冬

五味

熟地炭

茯神

遠志炭

菖蒲根

又

胃虛客氣上逆為呃噫痰帶血腥咽中微痛用鎮攝

法

人參

熟地

北味

茯神

青鉛

周

脉革無根左尺如無大汗後寒瘧頭巔痛躁渴不寐

此屬亡陽平昔飲酒少穀回陽辛甘未得必達有乾嘔

格拒之狀真危如朝露矣勉議仲景救逆湯收攝潰散

之陽冀有小安再議治病救逆湯加參附

徐

恰交第七日。軒聲呵欠目瞑煩躁診脉微細而促此

陰陽並虛

祖方必重
用白方此
義頭意今
沈用陽者
已屬一偏
又不知即
用納陰之
荷以致心
法渴飲又
用麥冬五
味以致火
氣入於肺
中尤為大
犯咽燥喉
痛有因來
矣又不知
急清肺胃

皆二氣不相接續。衰脫之徵最速。是清神熄風方法。難以進商。急固根蒂。倣河間地黃飲。

熟地

附子

茯苓

萸肉

杞子

遠志

菖蒲

川斛

黃 腎脉不得上榮。肝風突起。揪旋。呵欠。鼾聲。口噤。汗出。

陰陽不續。危期至速。地黃飲子極是。

熟地炭

萸肉炭

川斛

天冬

淡薤蓉

牛膝炭

五味

遠志

茯神

飲子煎法

凌 脉大不斂。神迷。嚙語。陰陽不相交合。為欲脫之象。救

陰無速功。急急鎮固。陰陽。冀其甦息。

用生脉 炙地補寒 焦呃噎 醒邪火 不降陰氣 不承遂成 思心非覺 可證者 牙現此一 案則此老 亡陽一 亦皆耳 食之終耳 既之名惟 陽氣驟越 陰陽相離

人參

茯神

阿膠

淮小麥

龍骨

牡蠣

又 陰液枯槁。陽氣獨升。心熱驚惕。倏熱汗泄。議用復脉

湯。甘以緩熱。充養五液。復脉去姜桂加牡蠣。

又 胃弱微嘔。暫與養陽明胃津方。

此非脫症

人參

炒麥冬

炒白粳米

茯神

鮮蓮子肉

川斛

又

人參

秋石水拌烘

熟地炭

天冬

麥冬

茯神

鮮生地

又

秋燥上薄。嗽甚微嘔。宜調本兼以清燥。

汗出如油
六脉垂絕
一將急迫
之症方名
為脫至於
病人病深
元氣以敗
病勢垂危
理宜峻補
望不轉機
水則亡病
將死之特
無不忌然
不得名脫
所列諸藥

人參 秋石水 拌烘
麥冬
玉竹
生甘草

南棗
白粳米 非脫症

又 安胃丸 二錢 秋石拌人參湯送

某氏 脉如雀啄 色枯氣促 身重如山 不思納穀 乃氣血大

虛 慮其暴脫 不治之症

人參
生地
阿膠
麥冬

炙草
左牡蠣

又 補攝足三陰

人參
熟地炭
棗仁
扶神

五味
鮮蓮子肉

脫

至

皆是將死
之候不得
入於脫口

固澀即以治
病治病不妨
固澀何必分途

朱氏久損不復真氣失藏交大寒節初之氣厥陰風木主

候肝風乘虛上擾氣升則嘔吐氣降則大便寒則脊內

更甚熱則神煩不寧是申下之真氣杳然恐交春前後

有厥脫變幻擬進鎮逆法去防脫之方

人參

生牡蠣

龍骨

附子

桂枝木

生白芍

炙草

艾

自半月前寒熱兩日色脉愈弱食減寢少神不自持

皆虛脫之象議固之瀉之不及理病

人參

生龍骨

牡蠣

桂枝

炙草

南棗肉

宜加補血芍

脫是病象
死是德名
如下文之
陽脫陰脫
可移為陽
死陰死耶

又 脈神稍安。議足三陰補方。

人參

砂仁末炒熟地

炒黑杞子

茯神

五味

牛膝炭

脫即死也。諸病之死皆謂之脫。蓋人病則陰陽偏勝。偏勝至極即死矣。人之生也。負陰抱陽。又曰陰在內。陽之守也。陽在外。陰之使也。是故陰中有陽。陽中有陰。其陰陽樞紐自有生以至老死。頃刻不離。離則死矣。故古聖先賢。剝著醫籍。百病千方。無非為補偏救弊。和協陰陽。使人得盡其天年而已。夫脫有陰脫陽脫之殊。內經論之最詳。難經又言脫陽者見鬼。脫陰

者目盲。此不過言其脫時之情狀也。明理者須預為
 挽救則可。若至見鬼目盲而治之。已無及矣。今觀先
 生之治法。回陽之中。必佐陰藥。攝陰之內。必兼顧陽
 氣。務使陽潛陰固。庶不致有偏勝之患。至於所脫之
 症不一。如中風眩暈嘔吐喘衄汗多亡陽之類。是陽
 脫也。瀉痢崩漏胎產下多亡陰之類。是陰脫也。痧脹
 乾霍亂痞脹痙厥臟腑窒塞之類。是內閉外脫也。陽
 脫於上。陰脫於下。即人死而魂升魄降之謂也。總之
 陰陽樞紐不脫。病雖重不死。然則陰陽樞紐何在。其
 在於命門歟。華岫雲

脾胃

此篇治法獨得真傳

胃陰虛
不飢不

錢 胃虛少納。土不生金。音低氣餒。當與清補。

納

麥冬

生扁豆

玉竹

生甘草

桑葉

大沙參

王 數年病傷不復。不飢不納。九竅不和。都屬胃病。陽土

喜柔。偏惡剛燥。若四君異功等。竟是治脾之藥。腑宜通

即是補。甘涼濡潤。胃氣下行。則有效驗。

麥冬 一錢

火麻仁 半錢

水炙黑小甘草 五分

生白芍 二錢

臨服入青甘蔗漿一杯

方極靈妙

某二病後胃氣不甦不飢少納姑與清養

鮮省頭草三錢 白大麥仁五錢 新會皮一錢 陳半夏翹一錢

川斛三錢 烏梅五分

某三脉瀉體質陰虧偏熱近日不飢口苦此胃陰有傷和熱內熾古稱邪火不殺穀是也

金石斛 陳半夏翹 生穀芽 廣皮白

陳香豉 塊茯苓

虛肺胃虛 某 理肺養胃進以甘寒

甜杏仁 玉竹 花粉 枇杷葉

川貝 甜水梨汁

某 脉數口渴有痰乃胃陰未旺。

炒麥冬 生白扁豆 生甘草 白粳米

北沙參 川斛

陳十一知飢少納胃陰傷也。

麥冬 川斛 桑葉 扶神 蔗漿

某 胃陽受傷腑病以通為補與守中必致壅逆。

人參 粳米 益智仁 茯苓

廣皮 炒荷葉

某 食穀不化胃無火也。

生白朮 厚樸 新會皮 益智仁

胃陽虛

脾胃

三

茯苓

砂仁

計三陽微痰黑。食入不化。

人參

生益智

桂心

茯苓

廣皮

煨薑

高八脉。奕小帶弦。知飢不欲食。晨起吐痰。是胃陽不足。宜

用外臺茯苓飲。

又 人參

白朮

茯苓

廣皮

半夏

枳實皮

白茯苓

地栗粉

席三脉右濡。臍上過寸有聚氣橫束。幾年來食難用飽。每

三四日一更衣。夫九竅失和。都屬胃病。上腕部位為氣

分清陽失司。故仲景微通陽氣為法。

薤白

瓜蒌汁

半夏

姜汁

川桂枝

鮮葛蒲

某二脈濡自汗。口淡無味。胃陽憊矣。

人參

淡附子

淡乾姜

茯苓

南棗

王脈小右弦。病屬勞倦。飲食不和。醫投柴葛。雜入消導。

升表攻裏。致汗泄三日。腕中不饑。全是胃陽大傷。防有

噦呃厥逆之變。

此方可用參考。

生益智仁

姜汁

半夏

茯苓

丁香

炒黃米

孫長夏熱傷為瘧為痢。都是脾胃受傷。老年氣衰不肯自復。清陽不肯轉旋。腕中不得容納。口味痰吐不清。脉莖右濡瀼。下焦便不通調。九竅不和。都胃病也。此剛補不安。陽土不耐辛熱矣。議宜暹補方。如大半夏湯之類。大半夏湯加川連姜汁。

又 小溫中丸

錢一壯年肌柔色黯。脉小濡瀼。每食過不肯運化。食冷物臍上即痛。色脉參合。病象是胃陽不旺。濁陰易聚。醫知腑陽宜通。自有效驗。

良姜

草果

紅苴蔻

厚樸

脾陽虛

生香附

烏藥

汪

舌灰黃。腕痺不機。形寒怯冷。脾陽式微。不能運布氣

機。非溫通焉能宣達。

半夏

茯苓

廣皮

乾姜

厚樸

葶撥

周十四脉象窒塞。能食少運。便溏。當溫通脾陽。

生白朮

一錢半

茯苓

三錢

益智仁

一錢

淡附子

一錢

乾姜

一錢

葶撥

一錢

又

溫通脾陽頗適。脉象仍然窒塞。照前方再服一劑。如

丸方。當以脾腎同治着想。

吳 酒多穀少。濕勝中虛。腹痛便溏。太陰脾陽少健。

平胃合四苓加穀芽

脾胃陽虛

王_五 素有痰飲。陽氣已微。再加悒鬱傷脾。脾胃運納之陽

愈_十 愈。致食下不化。食已欲瀉。夫脾胃為病。最詳東垣。當

升降法中求之。

人參

白朮

羌活

防風

生益智

廣皮

炙草

木瓜

張_九 食加使。瘡胃醒。脾不運也。方藥當以太陰陽明是課。

異功散加甘松益智

周_四 脈緩弱。腕中痛脹。嘔湧清涎。是脾胃陽微得之積勞。

午後病甚。陽不用事也。大凡脾陽宜動則通。溫補極是。而守中及膩滯皆非。其通腑陽間佐用之。

人參

半夏

茯苓

生益智

生姜汁

淡乾姜

大便不爽間用半硫丸

朱^五陽微食後吞酸

茯苓

四兩

炒半夏

二兩

廣皮

二兩

生於朮

二兩

厚樸

一兩

淡乾姜

一兩

葶澄茄

一兩

淡吳萸

一兩

公丁香

五錢

水法丸

胃濕傷脾

某^二八

脈^八。食下臏脹。大便不爽。水穀之濕內着。脾陽不主。

默運胃腑不能宣達。踈脾降胃。令其升降為要。

金石斛

三錢

厚樸

一錢

枳實皮

一錢

廣皮白

半錢

苦參 一錢

神麩 一錢
半

茯苓皮 三錢

麥芽 一錢
半

陳三厥陰三瘧半年。夏至節交。春木退舍。大寒熱而倏解。

病傷未旺。雨濕蒸逼外臨。內受水穀不運。洞泄之後。而

神倦食減。濕傷脾胃清氣。用東垣清暑益氣主之。

清暑益氣法

脾腎陽虛

洪姬 脈虛瀉弱。面之淖澤。鼻冷肢冷。肌膝麻木。時如寒凜。

微熱欲溺。大便有不化之形。穀食不納。此陽氣大衰。理

進溫補。用附子理中湯。

中氣虛

趙三 氣分本虛。衛少外護。畏風怯冷。冬天大氣主藏。夏季

氣泄外越。此天熱煩倦一因也。是氣分屬陽。故桂附理

陽頗投。攷八味古稱腎氣。有通攝下焦之功。能使水液

不致泛溢。其中陰藥味厚為君。乃陰中之陽藥。施於氣

虛。未為中窾。歷舉益氣法。無出東垣範圍。俾清陽旋轉。

脾胃自強。偏寒偏熱。總有太過不及之弊。補中益氣加

不通 麥冬五味。又 間服四君子湯。

宜三五痛而納食稍安。病在脾絡。因饑餓而得。當養中焦之

營。甘以緩之。是其治法。歸建中湯。

戈 小便短濇。渾濁。大便頻澹。不欲納穀。此傷食惡食也。

當分消土。

生益智

廣皮

茯苓

澤瀉

生白朮

脾胃

三

脾胃論卷之三
炒白芍

炒山查

脾胃之論莫詳於東垣。其所著補中益氣調中益氣升陽益胃等湯。誠補前人之未備。察其立方之意。因以內傷勞倦爲主。又因脾乃太陰濕土。且世人胃陽衰者居多。故用參芪以補中。二朮以溫燥。升柴升下陷之清陽。陳皮木香理中宮之氣滯。脾胃合治。若用之得宜。誠效如桴鼓。蓋東垣之法。不過詳於治脾。而畧於治胃耳。乃後人宗其意者。凡著書立說。竟將脾胃總論。卽以治脾之藥籠統治胃。舉世皆然。今觀葉氏之書。始知脾胃當分析而論。蓋胃屬戊土。脾屬己

名言至論
深得內經
之旨此老
必有傳授
其學不爾
未能如也
深造也

土。戊陽已陰。陰陽之性有別也。脾宜蒸。脾宜通。臟腑
之體用各殊也。若脾陽不足。胃有寒濕。一臟一腑。皆
宜於溫燥升運者。自當恪遵東垣之法。若脾陽不虧。
胃有燥火。則當遵葉氏養胃陰之法。觀其立論云。納
食主胃。運化主脾。脾宜升則健。胃宜降則和。又云。太
陰濕土。得陽始運。陽明陽土。得陰自安。以脾喜剛燥。
胃喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽
氣。其治在脾。此種議論。實超出千古。故凡遇稟質木
火之體。患燥熱之症。或病後熱傷脾胃津液。以致虛
痞不食。舌絳咽乾。煩渴不寐。肌燥焮熱。便不通爽。此

九竅不和都屬胃病也。豈可以芪朮升柴治之乎。故先生必用降胃之法。所謂胃宜降則和者。非用辛開苦降亦非苦寒下奪以損胃氣。不過甘平或甘涼濡潤以養胃陰。則津液來復。使之通降而已矣。此義卽宗內經所謂六腑者傳化物而不藏。以通爲用之理也。今案中所分胃陰虛胃陽虛脾胃陽虛中虛饑傷食傷。其種種治法最易明悉。余不參贅。總之脾胃之病。虛實寒熱宜燥宜潤。固當詳辨。其於升降二字尤爲緊要。蓋脾氣下陷固病。卽使不陷而但不健運已病矣。胃氣上逆固病。卽不上逆而但不通降亦病矣。故

脾胃之治法。與各門相兼者甚多。如嘔吐腫脹泄瀉。便閉不食。胃痛腹痛。木乘土諸門。尤宜並參。互相討論。以明其理可也。華岫雲

發明亦切當

木乘土

此是病不是病從古無此名也假如
火刑金燥傷腎亦可立一病名耶

肝胃

某 肝厥犯胃入膈

半夏

姜汁

杏仁

瓜蒌皮

金鈴子

延胡

香豉

白蘞

鮑三字可入肝風門情懷不適陽氣鬱勃於中變化內風掀旋轉動心悸

流涎麻木悉歸左肢蓋肝為起病之源胃為傳病之所

飲酒中虛便易溏滑議兩和肝胃

桑葉

炒丹皮

天麻

金斛

川貝

地骨皮

木乘土

聖

吳 脉左數右濡。氣塞心痛。養胃平肝。

半夏

茯苓

炒麥冬

栝子仁

川棟子

青橘葉

顧一 脉弦。胃脘痺痛。子後清水泛溢。由少腹湧起。顯是肝

厥胃痛之症。

此是疫胃痛之病。

吳萸 五分

川棟子 一錢

延胡 一錢

茯苓 二錢

桂枝木 五分

高良姜 一錢

某九 脉左弦右濡。中脘痛及少腹。病在肝胃。

川棟子

青皮

生香附

小茴

茯苓

南棗

某三舌白惡心。液沫泛溢。病在肝胃。當通陽泄濁。

吳萸 七分 乾姜 一錢 姜汁 二分 茯苓 三錢 南棗 一枚

任三 八 此情志不遂。肝木之氣逆行犯胃。嘔吐膈脹。開懷談

笑可解。凝滯血藥。乃病之對頭也。

延胡 川棟子 蘇梗 烏藥

香附 此是胸痺之症 紅荳蔻

王三 四 胃脘痛高突而堅。嘔清涎血沫。滴水不能下咽。四肢

冷。肌膚麻木。摸背脊病勢畧緩。此屬肝厥犯胃。

開口吳萸 金鈴子 炒延胡 生香附

高良姜 南山查

某 脉左弦。少寐。氣從左升。泄肝和胃。

生左牡蠣 五錢

川棟子肉 一錢

化州橘紅 一錢

茯苓 三錢 澤瀉 一錢

某 脉緩左弦。晨倦食減。在土旺之候。急調脾胃。

戊巳湯去甘草加穀芽

程五 曲運神機。心多擾動。必形之夢寐。診脉時。手指微震。食納痰多。蓋君相動。主消燥。安穀不充形骸。首宜理陽。明以制厥陰。勿多岐也。

人參

枳實

半夏

茯苓

石菖蒲

某 通補陽明和厥陰。

人參

茯苓

半夏

高良姜

吳萸

生白芍

某^四肝逆犯胃。腕痛腹鳴。氣撐至咽。

川楝子

桂枝木

淡乾姜

川椒

生白芍

吳萸

烏梅

茯苓

程^五操家煩動。嗔怒。都合肝氣易逆。乾嘔味酸。木犯胃土。

風木動。乃晨泄食少。形瘦脉虛。先議安胃和肝。

人參

半夏

茯苓

木瓜

生益智

煨姜

華^二據說氣攻脇脹。春起秋愈。此內應肝木。飽食不和。肝

傳胃矣。

焦白木

半夏

柴胡

枳實

生香附

廣皮

乾荷葉湯泛丸

毛

目微黃。舌黃。煩渴。脇肋板實。呼吸周身牽掣。起於頻

吐食物痰飲。即胸脘痛脹。此肝木犯胃。諸氣奔阻。雖平

昔宜於溫補。今治病宜宣通氣分。

半夏

一錢半

廣皮白

一錢

大杏仁

十粒

白蔻仁

八分

川棟子

一錢

炒延胡

一錢

生姜

五分

土瓜萋皮

一錢

又

心中懊惱噎痛。氣分熱痰未平。用溫胆法。

竹茹

一錢炒黃

炒半夏

一錢

茯苓

一錢半

枳實

一錢

桔梗八分

橘紅一錢

生姜三分

王三癖積是重着有質。今痛升有形。痛解無跡。發於暮夜。衝逆欲嘔不吐。明是厥氣攻胃。由惱怒強食。氣滯紊亂。而成病。發時用河間金鈴子散。兼以宣通陽明凝遏。可愈。

金鈴子

延胡

半夏

瓜蒌皮

山梔

橘紅

秦二面長身瘦。稟乎水火之形。氣阻脘中。食少礙痛。胃口七

為逆。乃氣火獨熾之象。忌用燥熱劫津。治以平肝和胃。

降香

鬱金

山梔

橘紅

枇杷葉

蘇子

川貝母

姜皮

朱^{十五}半百已衰。多因神傷思慮。夏四月大氣發泄。遂加便

澹。長夏暑熱。無有不耗氣分。寒熱之來。乃本氣先怯

而六氣得以乘虛。今不思納穀之因。皆寒熱二氣擾逆

胃脘。清真受戕。所以致困莫甦。不煩不渴。胃陽虛也。凡

醒胃必先制肝。而治胃與脾迥別。古稱胃氣以下行爲

順。區區木甘之守。升柴之升。竟是脾藥。所以鮮克奏效。

人參

茯苓

炒麥冬

大麥仁

木瓜

烏梅

董

病久。正氣已衰。喜熱惡寒爲虛。診得左脉尚盛。病在

肝。但高年非伐肝平肝爲事。議通補胃陽。

人參

茯苓

煨姜

新買皮

炒粳米

炒荷葉蒂

陸三咽屬胃。胃陰不升。但有陽氣薰蒸。致咽燥不成寐。衝六逆心悸。震動如驚。厥陰內風乘胃。虛以上僭。胃脈日虛。肢肌麻木。當用十味溫胆。合秫米湯。通攝兼進。俾肝胃陽和。可以痊愈。

人參

茯苓

棗仁

知母

竹茹

半夏

黃色秫米

又用泄少陽。補太陰法。六君去甘草。加丹皮。桑葉。金

解湯法丸

郭 脉弦。心中熱欲嘔。不思食。大便不爽。乃厥陰肝陽順

乘胃口。陽明脉絡不宣。身體掣痛。當兩和其陽。酸苦泄

熱。少佐微辛。

此方用苦辛酸法最合任旨

川連

桂枝木

生牡蠣

烏梅

生白芍

川棟子

芍 前議肝病入胃。上下格拒。考內經諸痛皆主寒客。但

經年累月久痛。寒必化熱。故六氣都從火化。河間特補

病機一十九條亦然。思初病在氣。必入血。以經脉主

氣。絡脉主血也。此臟腑經絡氣血。須分晰辨明。投劑自

寒必化熱
若淺學之
人不能知
也

方論皆見
卓識

可入穀。更詢初病因驚。夫驚則氣逆。初病肝氣之逆。久則諸氣均逆。而三焦皆受。不特胃當其衝矣。謹陳緩急先後進藥方法。厥陰篇云。氣上撞心。飢不能食。欲嘔。口吐涎沫。夫木既犯胃。胃受尅為虛。仲景謂制木必先安土。恐防久尅難復。議用安胃一法。

川連

川棟子

川椒當補

生白芍

烏梅

淡姜渣

歸鬚

橘紅

內經以攻病尅制曰勝方。補虛益體。須氣味相生曰生方。今胃被肝乘。法當補胃。但胃屬腑陽。凡六腑以通為補。黃連味苦能降。戴元禮云。諸寒藥皆凝瀆。惟

百發百中

木乘土

吳

有黃連不凝瀼。有姜椒歸須氣味之辛。得黃連川棟

之苦。做內經苦與辛合。能降能通。芍藥酸寒。能泄土

中木乘。又能和陰止痛。當歸血中氣藥。辛溫上升。用

鬚力薄。其氣不升。水浸木擊不過能入肝飲五年梅占先春。花發最早。得少陽生氣。

非酸飲之收藥。得連棟苦寒。內經所謂酸苦泄熱也。

以氣與熱俱無形無質。其通逐之法迥異。故辨及之。

又 春分前七日。診右脉虛。弦滯瀼。左脉小。弦勁而數。胃

痛已緩。但常有畏寒。鼓慄。俄頃發熱而解。此肝病先厥

後熱也。不必今歲厥陰司天。春季風木主氣。肝病既久。脾胃

必虛。風木鬱於土宮。營衛二氣未能流暢於經脉。為營

去二方俱
 不中病者
 畏寒甚等
 在當先和
 黃芩

養護衛。此偏熱偏寒。所由來矣。夫木鬱土位。古人制肝
 補脾。升陽散鬱。皆理偏就和為治。勿徒攻補寒熱為調。
 今春半天令漸溫。擬兩和氣血。佐以宣暢少陽太陰。至
 小滿氣煖泄越。必大培脾胃後天。方合歲氣體質調理。
 定春季煎丸二方。

人參

茯苓

廣皮

炙草

當歸

白芍

丹皮

桑葉

姜棗湯法丸

間用
 煎方

人參

廣皮

穀芽

炙草

白芍

黃芩

丹皮

柴胡

卜有年。冬藏不固。春木萌動。人身內應乎肝。水弱木失。

此症屬痰
飲此方不
大

滋榮。陽氣變化內風。乘胃為嘔。攻脇為痛。仲景以消渴
心熱屬厥陰。內經以吐涎沫為肝病。肝居左而病熾偏
右。木犯土位之徵。經旨謂肝為剛臟。非柔不和。閱醫藥
沉桂。莢連。雜以破泄氣分。皆辛辣苦燥。有剛以治剛之
弊。倘忽厥逆。癱瘓。奈何。議鎮陽熄風法。

生牡蠣

阿膠

細生地

丹參

淮小麥

南棗

又 內風陽氣鼓動變幻。皆有形無質。為用太過。前議鹹
苦入陰和陽。佐麥棗以和胃制肝。獲效。蓋肝木肆橫。胃
土必傷。醫治既僻。津血必枯。唇赤舌絳。咽乾。穀味即變。

此症飲而
百大之病

酸膩顯是胃汁受劫。胃陰不復。夫胃為陽明之土。非陰

柔不肯協和。與脾土有別故也。

生牡蠣方不取

阿膠

細生地

小麥

炒麻仁

炒麥冬

炙草

張五脉七小弦。納穀腕中噎噎。自述因乎悒鬱強飲。則知木

火犯土。胃氣不得下行所致。議苦辛泄降法。

黃連

鬱金

香淡豆豉

竹茹

半夏

丹皮

山梔

生姜

又前方泄厥陰通陽明。為衝氣吐涎腕痞不納穀而設。

且便難艱阻。胸脹悶。上下交阻。有年最慮關格。與進退

黃連湯

江晨起腹痛。食穀微滿。是清濁之阻。按脉右虛左弦。不

思飲食。脾胃困頓。都屬虛象。古人培土必先制木。做以

為法。

此症有痰飲不可補

人參

淡吳萸

淡乾姜

炒白芍

茯苓

周五酒熱濕痰。常有年正虛。清氣少旋。遂致結秘。不能容

納。食少。自述多噯。易噦。議從肝胃主治。

半夏

川連

人參

枳實

茯苓

姜汁

常用潤劑

王五噦逆舉發。湯食皆吐。病在胃之上脘。但不知起病之

因由。據云左脇內結癥聚。肝木侮胃。明係情懷憂勞。以致氣鬱結聚。久病至煩。能安鬱。非純補可知。泄厥陰以舒其用。和陽明以利其腑。藥取苦味之降。辛氣宣通矣。

川棟子皮

半夏

川連

姜汁

左牡蠣

淡吳萸

唐痞逆惡心。是肝氣犯胃。食入卧着痛而且脹。夜寐不

安。亦是胃中不和。貴乎平肝養胃。致其復。若見有形衝逆之狀。攻代兢進。有痞滿成脹之患。

川連

神麴

吳萸

川棟子

查肉

鬱金

姚寒熱嘔吐脇脹脘痺大便乾澹不暢古云九竅不和

都屬胃病法當平肝木安胃土更常進人乳姜汁以益

血潤燥宣通午後議用大半夏湯

人參

半夏

茯苓

金石斛

廣皮

菖蒲

胡氏經後寒熱氣衝欲嘔忽又如饑仍不能食視其鼻準

亮欬汗氣短多藥胃傷肝木升逆非上焦表病

炙甘草才不甚以痛

小生地

芝蔴仁

阿膠

麥冬

白芍

牡蠣

又照前方去牡蠣加人參

又衝陽上逆。則煩不得安。仍是陰弱。夫胃是陽主。以陰
爲用。木火無制。都係胃汁之枯。故腸中之垢不行。既知
陰虛。不必強動大便。

人參

鮮生地

火麻仁

天冬

麥冬

炙草

徐氏

經候適來。肢骸若撤。環口肉。潤蠕動。兩踝臂肘常冷。

夫衝脉血下。蹻維脉怯。不用衝隸陽明。厥陰對峙。因驚
肝病。木乘土位。以致胃衰。初則氣升至咽。久則懶食。脘
痞。昔人有治肝不應。當取陽明。陽明不闔。空洞若谷。厥
氣上加。勢必嘔脹吞酸。然陽明胃腑。通補爲宜。剛藥畏

經未之時
而病狀如
少信是血
虛而所服
乘之宜用
血藥

其劫陰少濟以柔藥。法當如是。

人參 二錢

半夏

姜汁炒
三錢

茯苓 三錢

淡附子 七分

白粳米 五錢

木瓜 二錢

胃虛益氣而用人參。非半夏之辛。茯苓之淡。非通劑矣。少少用附子以理胃陽。粳米以理胃陰。得通補兩和。陰陽之義。木瓜之酸。救胃汁以制肝。兼和半夏附子之剛。復此大半夏與附子粳米湯合方。

張氏 肝病犯胃。心痛。乾嘔。不能納食。肢冷泄瀉。腑經陽失。

流展。非虛寒也。金鈴子散加川連烏梅桂枝生姜。

徐氏 屢屢墮胎。下元氣怯。而寒熱久嗽。氣塞填胸。湧吐涎。

沫乃鬱勃嗔怒。肝胆內寄之相火。風木內震不息。犯胃則嘔逆吞酸。乘胸侵咽。必脹悶喉痺。漸漸昏迷欲厥。久延不已。為鬱勞之病。此治嗽清肺。重鎮消痰。越醫越凶。考內經肝病主治三法。無非治用治體。又曰治肝不應當取陽明。蓋陽明胃土。獨當木火之侵侮。所以制其衝逆之威也。是病原治法大畧。安胃丸椒梅湯送。

鮑 媪

風泄已止。胃逆不納食。

人參

川連

烏梅

木瓜

川斛

橘紅

朱 氏

嗔怒動肝。氣逆惡心。胸脇閃動。氣下墜欲便。是中下

二焦損傷不復約束之司失職擬進培土泄木法亦暫時之計

烏梅

乾姜

川連

川椒

人參

茯苓

川棟

生白芍

王氏寡居多鬱宿病在肝。邇日暑邪深入肝病必來犯胃吐疏下利得止不思穀食心中疼熱。仍是肝胃本症。况暑濕多傷氣分。人參輔胃開痞。扶胃有益。幸無忽致疲可也。

人參

川連

半夏

姜汁

枳實

牡蠣

又胃開思食仍以制肝和胃

人參

金石斛

半夏

枳實

茯苓

橘紅

呂氏

季脇之傍是虛里穴今跳躍如梭乃陽明絡空也况

衝脉即血海亦屬陽明所管經行後而病忽變前案申

說已著茲不復贅大凡絡虛通補最宜身前衝氣欲脹

衝脉所主病內經所謂男子內結七疝女子帶下瘕聚

今也痛無形象諒無結聚祇以冷汗跣寒食入惡心鼻

準明環口色青肝胃相對一勝必一負今日議理陽明

之陽佐以宣通奇脉仲景於動氣未見一篇都從陽微起見

做以為法

人參

茯苓

淡熟附子

生蘄艾

桂枝木

炒黑大苗

紫石英

生杜仲

朱氏

上冬用溫通奇經帶止經轉兩月間納穀神安今二

月初二日偶涉頭忽即麻痺乾嘔耳聾隨即昏迷如厥

診脈寸強尺弱食減少口味淡微汗此厥陰之陽化風

乘陽明上犯蒙昧清空法當和陽益胃治之

人參 一錢

茯苓 三錢

炒半夏 一錢

生白芍 一錢

烏梅 七分

小川連 二分

淡生薑 二分

廣皮白 一錢

此厥陰陽明藥也胃腑以通為補故主之以大半夏

湯熱擁於上。故少佐姜連以瀉心。肝為剛臟。參入白芍烏梅以柔之也。

又三月初五日。經水不至。腹中微痛。右脇嚙嚙而動。皆陽明脈絡空虛。衝任無貯。當與期人語通補八絡。

人參 一錢

當歸 二錢

芫蔚子 二錢

香附 一錢醋炒

茯苓 三錢

小茴 一錢

生杜仲 二錢

又照方去芫蔚杜仲加白芍官桂

某氏久有痛經。氣血不甚流暢。驟加暴怒傷肝。少腹衝氣

上犯。逆行於肺為欬。寒熱聲啞。脇中拘急。不飢不納。乃

左升右降。不司轉旋。致失胃氣下行為順之旨。故肝用

宜泄。胃腑宜通。為定例矣。

鈎藤

丹皮

桑葉

半夏麴

茯苓

廣皮白

又 威喜丸

唐

積勞內傷。腕悶脇脹。嘔吐格拒。眩暈不得卧。陽挾內

風暴張。恐其忽然瘳厥。議通胃平肝法。

小川連

姜汁

半夏

牡蠣

川棟子

生白芍

江

拒按為實。患目病來屬肝。痛必多嘔。大便秘瀯。肝病

及胃。當苦辛泄降。少佐酸味。

小川連

生淡乾姜 半夏

枳實

黃芩

生白芍

顧十五陽明脉衰形寒痞飢不食心痛洞泄兼嘔

人參

吳萸

茯苓

半夏

生姜

炒黃粳米

吐嘔吐之祖方

某

勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便瀉風木侮土前方

既效與通補陽明厥陰 大半夏湯去蜜加桃仁栝子

仁當歸姜棗湯法丸

某

脉微小弱是陽氣已衰不必今年太陰司天長夏熱泄氣

分不食不運味變酸苦脾胃先受困也稍涉嗔怒木乘

土中益加不安從東垣培土制木法

人參

廣皮

茯苓

益智

木瓜

淡姜渣

夏

通補陽明開泄厥陰

人參

半夏

茯苓

橘紅

吳萸

白芍

肝脾

汪氏氣滯脾弱

逍遙散加鬱金砂仁末

肝脾胃

席大便未結腹中猶痛食入有欲便之意胃陽未復肝

木因時令尚橫用泄木安土法

人參

木瓜

厚朴

茯苓

益智仁

青皮

江 鎮衝任。溫養下焦頗效。所議治嗽肺藥。寒涼清火。背
謬顯然。

炒黑杞子 淡菴蓉 小茴香拌炒當歸

沙苑 石炭建蓮 茯神 紫石英 煎湯煎藥

又 動怒腕下痛。不飲食。是肝厥犯脾胃。病外生枝。最非

善調之理。理氣皆破泄難用。議進制肝木益胃土一法。

人參 一錢 炒焦白芍 一錢 真伽南香 汁冲五

炒焦烏梅 三分 酸 茯苓 五分 錢切小塊 化橘紅 五分 宣
泄肝陽 甘淡益胃 通緩痛

又 人參 嫩鈎藤 明天麻 化橘紅

炒烏梅肉 茯苓 伽南香

高登百... 水... 上... 蓋

肝胆胃

朱 胃弱痰多。補虛宜通。肝陽易升。左頰赤。佐泄少陽。

人參

炒半夏

茯苓

鈞藤

經霜桑葉

煨姜

南棗

胆脾

范五 脾竅開于舌。舌出流涎。為脾病。尅脾者少陽胆木。以養

脾泄胆治。

人參

於朮

天麻

姜黃

桑葉

丹皮

某 補太陰泄少陽。

人參

茯苓

焦朮

炙草

廣皮

白芍

炒丹皮

桑葉

又 照方去甘草桑葉加木瓜

李^五少陽木火犯太陰之土持齋淡薄中虛熱灼以補脾

和肝為久長調理 四君子加苓芍桑葉丹皮

金 能食遲遲舌紋裂左頤肉腫不喜飲水太陰脾陽鬱

法當補土泄木 此症者必有痰者必不得用燥者

於木 茯苓 新會皮 炙草

煨益智 柴胡 丹皮 白芍

張^二九脈小弱是陽虛體質由鬱勃內動少陽木火木犯太

陰脾土遂致寢食不適法當補土泄木

人參^{一錢} 白朮^{一錢} 半夏^{一錢} 茯苓^{二錢} 甘草^{五分}

水乘土 手

廣皮 一錢
丹皮 三錢
桑葉 一錢
姜 一錢
棗 二錢

肝爲風木之臟。又爲將軍之官。其性急而動。故肝臟之病較之他臟爲多。而於婦女尤甚。肝病必犯土。是侮其所勝也。本臟現症。仲景云。厥陰之爲病。消渴。氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐蚘。下之利不止。又內經所載肝病。難以盡述。大凡其脈必弦。脇或脹。或疼。偏寒偏熱。先厥後熱。若一犯胃。則惡心乾嘔。脘痞不食。吐酸水涎沫。尅脾則腹脹。使或溼或不爽。或冷肌麻。案中治法。有陰陽虛實之殊。畧舉而敘述之。若肝陰胃陰未虧。肝陽亢逆犯胃。先生立法用藥。

則遠柔用剛。泄肝如吳茱椒桂。通胃如半夏姜汁姜
附。加益智枳朴等。則兼運脾陽。中虛必用人參。故大
半夏湯。附子粳米湯。進退黃連湯。瀉心法。治中法。溫
胆等湯是也。若肝陰胃汁已虛。木火熾盛。風陽擾胃。
用藥忌剛。用柔。養肝則阿膠生地白芍麻仁木瓜。養
胃則人參麥冬。知母粳米林米等是也。至於平治之
法。則剛柔寒熱兼用。烏梅丸安胃丸。逍遙散。若四君
六君異功。戊巳。則必加泄肝之品。用桑葉丹皮者。先
生云。桑葉輕清。清泄少陽之氣熱。丹皮苦辛。清泄肝
胆之血熱。用金鈴子散者。川楝苦寒。直泄肝陽。延胡

尚理氣滯血滯之痛。此皆案中綱領也。余另分此一門者。因嘔吐不食。脇脹腕痞等恙。恐醫者但認爲脾胃之病。不知實由肝邪所致。故特爲揭出。以醒後人之目耳。且世人但知風勞臑膈爲四大重症。不知土敗木賊。肝氣日橫。脾胃日敗。延至不救者多矣。可不究心於此哉。

華岫雲

諸案大抵皆胃痺痰滿及夜飲肉蓄之症。治痰痺之方最忌人參。而此症其壯土以制水用者甚多。必有遺病。至於蓄痰症。全不齒及尤屬辨症不清。其中積思巧意中病變頗多。忘得失奈半也。

腫脹

胃陽虛

某五

一食穀不運。臌脹嘔惡。大便不爽。脉弦色黃。此胃陽式。微升降失司使然。法當溫通陽氣。

吳萸 八分

半夏 三錢

葶撥 一錢

淡乾姜 一錢

生姜汁 五分

廣皮白 一錢

陳三診脉右大而緩左如小數促。冬季寒熱身痛汗出即

解。自勞役飢飽嗔怒之後。病勢日加。面浮足腫。呼吸皆

喘。目淚鼻衄。卧着氣衝欲起。食納畱中不運。時序交夏

脾胃主候。觀色脉情形。中滿脹病日來矣。蓋此症屬勞

論極明而
方不中病
本屬難治
面浮足腫
無用人參
之理鎮氣
消痰養榮
利水虛寒
近之

倦致損。初病即在脾胃。東垣云。胃為衛之本。脾乃營之
源。臟腑受病。營衛二氣。晝夜循環失度。為寒為熱。原非
澹和半表半裏之症。斯時若有明眼。必投建中而愈。經
言勞者溫之。損者益之。建中甘溫。令脾胃清陽自立。中
原砥定。無事更遷。仲景亦謂男子脉大為勞。則知內經
仲景東垣垂訓。其規矩準繩。至決且汗泄積勞。都是陽
傷。醫藥辛走劫陽。苦寒敗胃。病人自造。彼彼印中腕不
舒。頃之少腹急痛便秘。其胃陽為苦辛大傷。明甚。又述
咳頻。衝氣必自下上逆。夫衝脉隸於陽明。胃陽傷極。中
乏坐鎮之真氣。衝脉動則諸脉交動。濁陰散漫。上布此

卧着欲起矣。愚非遥指其脹。正合內經濁氣在。則生
臏脹。太陰所至為腹脹相符也。昔有見痰休治痰。見血
休治血。當以病因傳變推求。故辨論若此。

厚朴

杏仁

人參

茯苓

蜜煨姜

南棗

厚朴杏仁。取其能降氣。參苓姜棗取其建立胃中之
清陽。而和營衛也。

脾陽虛

吳二

單脹溺少。溫通頗適。當用大鹹沙丸。一錢二分。八服

某。食下臏脹舌黃。當治脾陽。

生白朮一錢半 廣皮一錢

茯苓三錢

厚朴一錢

腫脹

五九

木瓜 五分 淡附子 七分

徐仁 攻痞變成單脹脾陽傷極難治之症

生白朮 熟附子 茯苓 厚朴 生乾姜

錢 食入腹脹已五十日且痛必有形攻動頭中微痛夫

痞滿屢氣痛不僅屬氣因氣滯二便既通其滯未必在乎腸胃從

太陰脾陽傷以辛溫開泄主之

方無若茂 桂枝 生白芍 淡乾姜 厚樸

又 照方去白芍加生益智仁茯苓

楊五 飲酒聚濕太陰脾陽受傷中單腹脹是濁陰之氣錮

結不宣通二便不爽治以健陽運濕

凡脹必有
 暈邪一味
 溫補是益
 其病也內
 經云諸脹
 腫大皆屬
 於熱不可
 背也

生茅木

草菓

附子

廣皮

厚朴

茯苓

萆撥

猪苓

吳^四食下臃脹便澹不爽肢木不仁此脾陽困頓不能默

運使然溫通中陽為主

白朮 三錢

附子 一錢

炮姜 一錢半

桂枝木 一錢

茯苓 三錢

萆撥 一錢

僧^四俗語云膏梁無厭發癰疽淡泊不堪生腫脹今素有

腕痛氣逆嘔吐漸起腫脹乃太陰脾臟之陽受傷不司

鼓動運行陰土宜溫佐以制木治

生於朮

茯苓

廣皮

椒目

腫脹

卒

久嗽失血
陰氣大傷
宜可燥也

厚朴

益智仁

良姜

某七左脉弦。脹滿不運。便泄不爽。當溫通脾陽。

草果仁去通氣利濕方

茯苓皮三錢

大腹皮三錢

廣皮一錢

青皮一錢

厚朴半錢

木猪苓半錢

椒目五分

吳寒熱傷中。腹微滿。舌白。用治中法。

人參

益智

廣皮

茯苓

澤瀉

金斛

木瓜

周五久嗽四年。後失血。乃久積勞傷。酒肉不忌。濕鬱脾陽。

為脹。問小溲。僅通。大便仍溏。濁陰乘陽。午後夜分尤劇。

生於木

熟附子

二味其病相反

陳十五積勞脾陽傷食下脹足腫。

生白朮

茯苓

熟附子

草菓仁

厚朴

廣皮

某躬耕南畝曝於烈日漬於水土暑濕內蒸為瀉痢邪去正傷臨晚跼腫腹滿乃脾陽已困清氣不司運行濁陰漸爾竊據內經病機諸濕腫滿皆屬於脾

生白朮

草菓

茯苓

厚朴

附子

澤瀉

鄒三九深秋霍亂轉筋必有暴冷傷及脾胃病機一十九條河間皆謂執亦屬偏見愈瀉愈脹豈是實症夫酒客之

濕皆脾胃陽微不運致濕邪凝聚氣壅成脹見脹滿徹
投攻下不究致病之因故曰難調之症

生白朮

草菓

熟附子

厚朴

廣皮

茯苓

脾胃陽虛

陳

四

苦寒多用胃陽久傷右脇痛嘔酸濁皆濁陰上用

辛甘溫中補虛痛減病人述早上腹寬暮夜氣緊微硬

大便不爽有單腹脹之憂

人參

生白朮

茯苓

肉桂

歸身

益智

廣皮

煨姜

趙

五

胸腹脹滿久病痰多

生白朮二兩 茯苓二兩 厚朴一兩 肉桂五錢 姜汁九

本草云厚朴與白朮能治虛脹。倣潔古枳朮之意也。
方不逐積潔古

佐茯苓通胃陽。肉桂入血絡。則病邪可却矣。

楊 脉沉小弦。中年已後。陽氣不足。痰飲水寒。皆令逆。趨

致運納失和。漸有脹滿浮腫。法以辛溫宣通。以本病屬

脾胃耳。

人參一錢 茯苓三錢 白朮一錢 淡附子一錢 姜汁三分

倪二腹與腫。便不爽。腑陽不行。

生益智 茯苓 生穀芽 廣皮

砂仁殼 厚朴

又六腑不通爽。凡濁味食物宜忌。

雞肫皮 麥芽 山查 砂仁 陳香櫟

又脈沉小緩。早食難化。晚食夜脹。大便不爽。此腑陽久傷。不司流行。必以溫藥踈通。忌食閉氣粘葷。

生白朮 附子 厚朴 草菓

茯苓 廣皮白 檳榔汁

虛 腎胃腸 浦四腎氣湯。五苓散。去是法一攝少陰。一通太陽。濁泄瀉通。腹滿

日減。不為錯悞。但虛寒脹病。而用溫補。閱古人調劑。必

是通法。蓋通陽則濁陰不聚。論心方非守補恐中焦易鈍。喻氏謂

能變胃而不受胃變。苟非純剛之藥。曷勝其任。議於暮

夜服玉壺丹五分晨進。

人參 半夏 姜汁 茯苓

枳實 乾姜

陳_二六 老人脾腎陽衰。午後暮夜陰氣用事。食納不適。腸鳴臏脹。時泄。治法初宜剛劑。俾陰濁不僭。陽乃復辟。

人參 一錢半 淡附子 一錢 淡乾姜 八分 茯苓 三錢

炒兔絲 三錢 胡蘆巴 一錢

脾腎陽虛
某_三七 腫脹由足入腹。診脈細軟。不能運穀。當治少陰太陰。此治陽明之陽也。若參入白朮甘草則兼走太陰矣。

生白朮 厚朴 茯苓 淡附子

腫脹 空

淡乾姜

草撥

馬^三六 暮食不化。黎明痲泄。乃內傷卑脹之症。脾腎之陽積

弱。據理當用腎氣丸。

顧^四三 脉微而遲。色衰萎黃。蟹為介屬。鹹寒沉降。凡陽氣不

足者。食之損陽。其致病之由。自試二次矣。久利久泄。古

云無不傷腎。今浮腫漸起自下。是水失火而敗。若非煖

下。徒見泄瀉有紅。為脾胃濕熱。必致中滿敗壞。

見紅非宜

生茅朮

熟地炭

熟附子

淡乾姜

茯苓

車前

某 脾腎虛寒多瀉。由秋冬不愈。春木已動。勢必尅土。腹

滿小便不利。乃腫病之根。若不益火生土。日吃疲藥。焉能却病。

人參

白朮

附子

生益智

兔絲子

茯苓

腎陽虛

姚四據說情懷不適。因嗔怒痰嗽有血。視中年形瘁肉消。

漸漸腹脹跗腫。下午漸甚。陽氣日奪。早服腎氣丸三錢。

晝服五苓散。不宜過荷

殷氏行動氣墜於下。卧着氣擁於上。此跗腫晝甚。頭脹夜甚。

總是中年陽微。最有腹大喘急之事。濟生丸十服

某陽微陰結。腫脹。

腫脹

壺

和肝胃不

附子

苡仁

白朮

木防已

澤瀉

細辛

朱

陽明胃逆厥陰來犯丹溪謂上升之氣自肝而出清

金開氣亦有制木之功能而痛脹稍緩議以溫胆加黃連方

半夏

茯苓

橘紅

枳實

竹茹

川連

生白芍

某二

舌微黃痕逆脘胸悉脹當和肝胃

桂枝木

乾姜

青皮

吳萸

川棟子

炒半夏

秦 兩年初秋發瘍。脉絡氣血不為流行。而腹滿重眩。卧

則頗安。臍左動氣。即則尤甚。吐冷沫。常覺冷氣。身麻語

塞。肝風口熾。踈泄失職。經以肝病吐涎沫。木侮土位。自

多臘脹。丹溪云。自覺冷者。非真冷也。兩次潰瘍之後。剛

燥熱藥。似難進商。議以宣通肝胃為治。有年久恙。責乎

平淡矣。

方不病者用和營衛之方

雲茯苓

錢三

三角胡麻

搗碎滾水洗十次三錢

厚橘紅

錢一

嫩鈎藤

錢一

熟半夏

炒黃一錢半

白旋覆花

錢一

瀘清服一杯 四帖

又 接服大半夏湯

腫脹

肝鬱胃
胃兼濕

熟半夏

炒一錢半 雲苓 小塊五錢

姜汁

調服四分

人參

同煎一錢

方五診脉百至。右緩瀼。左弦勁。始而腸鳴泄氣。由漸腹滿

臍脹。納食幾廢。便難溺少。此皆情懷少曠。清氣不轉。肝

木侵侮胃土。腑陽窒塞。脹滿日甚。據云先因胃脘心下

痛症。氣鬱顯然。非旦晚圖功之象。議河間分消法。

杏仁

厚朴

海金沙

陳香櫟

鬱金

萊菔子

木通

雞肫皮

王三食八不運。脘中臍脹。病由悒鬱。經年不愈。視色黃形

瘦。按脉小而瀼。喜涼飲。欲惡熱。大便未經通調。九竅不

和。皆胃病矣。

川連

雞肫皮

枳實

廣皮

桔梗

瓜蒌實

半夏

萊菔子

鬱金

杏仁

姜汁竹瀝丸

楊_四十_四肝鬱乘胃為脹。經年內結有形。用緩消一法。

生茅朮

雞肫皮

川連

生厚朴

淡姜渣

針砂不敷製

椒目湯法丸

畢 濕熱由腑滯及腸中。大便不爽。食入不適。平昔肝木

易動厥陰不主。踈泄。少腹形脹。無非滯氣之壅。久則凝

瘀日踞。小溫中丸三錢十服

程_三十_三脈右弦。面黃腹滿。按之漉漉有聲。每大便先腹痛。使

腫脹

突

不能乾爽。此胃氣不降。陽氣自滯。由乎嗔怒不息。肝木橫逆。踈泄失司。臍脹之來。皆由乎此。議泄肝通腑。濁宣脹減之義。

杏仁

紫厚朴

猪苓

鬱金

椒目

板榔汁

按服小温中丸

某^五不飢不運。少腹胃脘悉滿。診脉左弦。乃肝木犯胃。二^七腑不主流行。濁陰漸次瀰漫。他日單脹之作。竟有難以杜患者。速速戒惱怒。安閑自在。誠治斯疾之良圖。

小温中丸一錢五分開水送下

夏

夏四月。脾胃主氣。嗔怒怫鬱。無不動肝。肝木侮土。而

極是乃常
出於其戒
何也

脾胃受傷。鬱久氣不轉舒。聚而為熱。乃壯火害氣。宜乎
減食。臏脹矣。當作木土之鬱。調治。桂附助熱。莫地滋滯。
鬱熱益深。是速增其病矣。

鈎藤

丹皮

黑山梔

川連

青皮子

紫厚朴

萊菔子

廣皮白

薄荷梗

又

脹勢已緩。脉來^{前方三動}實。此濕熱猶未盡去。必淡泊食物。

清肅胃口。以清滲利水之劑。服五六日再議。

猪苓

澤瀉

通草

海金沙

金銀花

茯苓皮

黑穉豆皮

又

診脉浮中沉。來去不為流利。氣阻濕鬱。膠痰內着。議

去非大延
之膏可治
當消艾滯

用控涎丹六分緩攻

又服控涎丹大便通而不爽診右脉弦實目黃舌燥中
焦濕熱不行因久病神倦不敢過攻議用丹溪小溫中
丸每服三錢乃泄肝通胃以緩治其脹

謝形神勞煩陽傷腑氣不通疝瘕陰濁從厥陰乘犯陽
明胃爲陰濁蒙閉腸中氣窒日甚年前邪勢頗緩宣絡
可效今閉錮全是濁陰若非辛雄剛劑何以直袞重圍
脹滿日增人力難施矣

生炮川烏頭

生淡川附子

淡乾姜

淡吳萸

川棟子

小茴香

猪胆汁

唐氏紫苑

杏仁

通草

鬱金

黑山梔

又三焦不通。腕痺腹脹。二便皆秘。前方用開手太陰肺。

苦辛潤降。小溲得利。兼進小溫中丸。泄肝平胃。張勢什

戒有五。但間日寒熱復來。必是內鬱之氣。陽不條達。多

寒戰慄。議用四逆散和解。其小溫中丸仍用。

生白芍

枳實 宜用桂枝

柴胡

黃芩

半夏

杏仁

竹茹

生姜

張^姬腹脹。大便不來。得煖氣稍快。乃陽氣不主流行。

蓋六腑屬陽。以通為補。春木地氣來升。土中最畏木乘。

勢猖熾。治當泄木安土。用丹溪小溫中丸。每服三錢。

肝犯胃
陽虛

張氏

用鎮肝逆理胃虛方法。脈形小弱。吐涎沫甚多。仍不
納穀。周身寒凜。四肢微冷。皆胃中無陽。濁上僭躍而為
臌脹。所謂食不得入。是無火也。

人參

吳萸

乾姜

附子

川連

茯苓

木鬱氣
滯血結

十三 噎怒氣血逆亂。右脇不和。夜食噎噫臌脹。乃肝胃病。

治以解鬱宣通氣血。

鈎藤

丹皮

桑葉

生香附

茯苓

神麩

降香末

炒黑查肉

徐 平素肝氣不和。脇肋少腹臌脹。氣血不調。痰飲漸聚。

厥陰陽明同治。

桃仁 延胡 歸尾 小苗 香附

半夏 茯苓 橘紅 神麩

馬三脉實久病瘀熱在血胸不爽小腹墜能食不渴二便
瀦少兩進苦辛宣腑病未能却此屬血病用通幽法

桃仁 郁李仁 歸尾 小苗 紅花

製大黃 桂枝 川棟子

又 晝日氣墜少腹夜卧不覺甚則頭昏胸悶今年五月
初用疎滯繼通三焦續進通幽其墜脹仍若議辛香流

氣法

川棟子

延胡

小茴

黑山梔

青木香

橘核

生香附磨汁法丸

董

初因下血轉痢繼而大便秘艱自左脇下有形漸致

瘕積成痞

脹大堅滿小便自利病在血分久病兩年形瘦氣羸不

敢峻攻若五積成例議用古禹餘糧丸每日一錢

鄭氏

得食腹痛上及心胸下攻少腹甚至筋脹擾於周身

經絡之間大便欲解不通暢此乃腸胃氣阻故痛隨利

并胃瘕積

戒神保丸 一錢

肝脾

張

脉左弦右浮濇始因腕痛貫脇繼則腹大高凸納食

減少難通二便艱濇不爽此乃有年操持繁慮太甚肝

木拂鬱。脾土自困。清濁混淆。脹勢乃成。蓋臟真日瀦。腑陽不運。考古治脹名家。必以通陽為務。若以陰柔藥。微加桂附。凝陰汨濁。豈是良法。議用局方禹糧丸。煖其水臟。攻其穢濁。俟有小效。兼進通陽剛補。是為虛症內傷。脹滿治法。至於攻瀉劫奪。都為有形而設。與無形氣傷之症不同也。局方禹餘糧丸。

肝犯脾
胃

陳

婦

久鬱傷及脾胃之陽。面無華色。納粥欲嘔。大便溏泄。氣陷則跗腫。氣呆則腕悶。有中滿之憂。用治中法。

人參

生益智

煨姜

茯苓

木瓜

炒廣皮

肝脾不和
和夾暑

程女脉數惡心腕脹

炒半夏

廣皮

藿香

黃連一分
煎水拌

茯苓

鬱金

又暑傷脾胃則肝木犯土左腹膨泄瀉

人參

厚朴

廣皮

炒澤瀉

茯苓

木瓜

炙草

炒查肉

又人參

炒柴胡

炒白芍

炒黃芩

茯苓

炙草

生姜

大棗

木火犯土

宋

食八腕脹此屬胃病視色蒼形瘦自述飲酒嘔吐而

得又述耳鳴肉瞶是木火犯中鬱勃病甚議用逍遙減

白朮合左金方

朱^三瘰癧馬^四刀都是肝胆為病。病久延及脾胃。腹滿便瀉。舌黃微渴。非溫補可服。泄木火以疎之。和脾胃以調之。冀其脹勢稍減。

吳萸拌川連

生於朮

川棟子

炒山查

黑山梔

厚朴

青皮

椒目

唐女

氣脹三年。近日跌仆嘔吐。因驚氣火更逆。胸臆填塞。

脹滿。二便皆通。自非質滯。喜涼飲。面起痺癩。從病能篇。

驟脹屬熱。

川連

淡黃芩

半夏

枳實

乾姜

生白芍

鐵鏽汁

肝犯脾
胃陽虛

顏六

今年風木加臨不必太陰陽明不及遂為臌脹小便不利

兩肘皆腫大便瀼瀼治在腑陽用分消湯方

有濕

生於木

茯苓

澤瀉

猪苓

厚朴

椒目

海金沙湯煎

吳

金歲厥陰不必天加臨驚蟄節病腹滿喘促肢腫面浮

寒熱汗出皆木乘土位清陽不得舒展濁氣痞塞僭踞

故泄氣少寬姑擬通腑以泄濁

生於木

茯苓

椒目

紫厚朴

澤瀉

淡薑渣

未^四鬱勃久坐中焦不運寒熱小溲不通腹膨脹滿脈小

而瀉全是腑陽失司與泄木通腑分消法

四苓加椒目厚朴大腹皮青皮

陳

壯盛年歲形消色奪診脈右小促左小弦勁病起上

年秋季腕中卒痛有形梗突病後陡遇驚觸漸次食減

不適食八不運停留上腕腹形脹滿甚則脇肋皆脹四

肢不煖暮夜漸溫大便旬日始通便後必帶血出清早

未食自按臍上氣海有瘕形甚小按之微痛身動飲水

寂然無踪天氣稍冷爪甲色紫細推病屬肝脾氣血不

通則為鬱遏久則陽微瘕結上下不行有若否卦之義

肝脾不和清陽滯結

閱醫藥或消或補總不見效者未知通陽之與耳

薤白 桂枝 瓜蒌仁 生姜

半夏 茯苓

又 薤白汁 桂枝末 瓜蒌實 川棟子皮

半夏 茯苓 歸鬚 桃仁

延胡 姜汁 二汁法丸

某 脹滿跗腫小澀短澇不利便泄不爽當開太陽為主

濕濁滯小澀不行當開太陽

五苓散加椒目

某七 少腹單脹二便通利稍舒顯是腑陽窒痺濁陰凝結

所致前法專治脾陽宜乎不應當開太陽為要

五苓散加椒目

鄭

兩投通裏竅法。痛脹頗減。無如陰陽不分。舌絳煩渴。

不欲納穀。想太陽膀胱不開。陽明胃不司闔。法當仍與

通陽腑為要。但五苓桂朮斷不適用。議用甘露飲意。

此方不外五苓法

猪苓

茯苓

澤瀉

寒水石

椒目

炒橘核

程

今年長夏久熱。熱勝陽氣外泄。水穀運遲。濕自內起。

漸漸浮腫。從下及上。至於喘咳。不能卧息。都是濁水凝

痰。阻遏肺氣下降之司。但小溲不利。太陽氣亦不通調。

此雖陽虛症。若腎氣湯中萸地之酸膩。力難下行矣。

五味其乾
羊同用止
穀之聖者
但於此症
有碍

小兒馬有
治法

茯苓

桂枝末

杏仁

生白芍

乾姜

五味

生牡蠣

澤瀉

馬五

初起胸痺嘔吐。入夏附臍少腹悉腫。食穀不運。瘦短不利。此陽氣式微。水穀之濕內蘊。致升降之機失司。當開太陽。姑走濕邪。

猪苓 三錢

桂枝木 八分

茯苓皮 三錢

澤瀉 一錢

防已 半錢

厚朴 一錢

四帖

耶六

六齡穉年。夏至濕熱外薄。所食水穀之氣。蒸為濕滯。阻遏氣機。脾不轉運。水道不通。腹筭滿脹。幼科但知消導。不曉通腑泄濕。致脾氣大困。泄瀉不分陰陽。參苓之

補。僅救消滌之害。不能却除濕滯。故雖受無益於病。病根都在中宮。泄肝以安胃。分利以通腑。必得小溲頻利。冀有中窾之機。當用末藥以漸消之。

猪苓

澤瀉

海金沙

通草

椒目

吳

平昔濕痰阻氣為喘。茲因過食停滯。陰臟之陽不運。

濕壅三焦。肺氣不降。

陽腑之氣不通。二便不爽。跗腫腹滿。診脈沉弦。猶是水

寒痰滯阻。遏氣分。上下皆不通調。當從三焦分治。頃見

案頭一方。用兔絲子升少陰。吳茱萸泄厥陰。不知作何

解釋。不敢附和。仍用河間分消定議。

大杏仁

萊菔子

猪苓

澤瀉

葶藶子

腫脹

西

厚朴

桑白皮

廣皮

細木通

又三焦分消泄肝通腑二便不爽如昔診脈浮小帶促聞聲呼息不利是氣分在上結阻以致中下不通喘脹要旨開鬼門以取汗潔淨腑以利水無非宣通表裡務在治病源頭據脈症叅詳急急開上為法合金匱風水反登義矣

麻黃

杏仁

石膏

甘草

枳仁

朱初因面腫邪干陽位氣壅不通二便皆少桂附不應即與導滯滯屬有質濕熱無形入肺為喘乘脾為脹六腑開合皆廢便不通爽溺短渾濁時或點滴視其舌絳

喘脹方
 甚合三見
 心思灵巧
 如此等流
 法真可編
 入醫案其
 重復套大
 半可刪

口渴。臍痛背脹。臍病腹滿。史兼倚倒左右。腫脹隨着處
 為其。其濕熱布散三焦。明眼難以決勝矣。經云。從上之
 下者治其上。又云。從上之下。而甚於下者。必先治其上。
 而後治其下。此症逆亂紛更。全無頭緒。其不辨有形無
 形之誤。姑以清肅上焦為先。

飛滑石

半一錢

大杏仁

去皮尖
十粒

生苡仁

三錢

白通草

一錢

鮮枇杷葉

刷淨毛去筋手
內掾奕三錢

茯苓皮

三錢

淡豆豉

半一錢

黑山梔殼

一錢

急火煎五分服

此手太陰肺經藥也。肺氣窒塞。當降不降。杏仁微苦
 則能降。滑石甘涼滲濕解熱。苡仁通草淡而滲氣分。

枇杷葉辛涼能開肺氣。茯苓用皮謂諸皮皆涼。梔豉宜其陳腐鬱結。凡此氣味俱薄為上焦藥。倣齊之才輕可去實之義。

某暴腫氣急。小洩瀦少。此外邪壅肺氣分不通。治當從風水皮水。宜其經隧以能食能寢為佳。勿得誅伐無過之地。

前胡

蜜炙麻黃

牛蒡子

姜皮

紫苑

杏仁

茯苓皮

廣皮

下焦寒
濕流經

王

脾尻微腫。小腿下廉腫甚。乃脾陽不行。病甚於暮。宜

辛香通其經腑之鬱。

生於木 炮川烏 北細辛 茯苓

漢防已 川獨活

又 中滿用餘糧丸獲效得煖下泄濁之力腹脹已去而
脾尻足跗肌肉腫浮夫臟寒生滿病煖水臟之陽培火
生土是法究竟陽未全復四末流行未布前議幽香通
其下焦經脈果得腫減議用加味活絡丹

炮川烏 方不中切 乾地龍 乳香 沒藥 北細辛

桂枝木 用油松節三兩酒水各半煎汁法丸

注 腫自下起脹及心胸遍身肌膚赤癩溺無便滑濕熱

蓄水橫瀆經隧氣機閉塞呻吟喘急濕本陰邪下焦先

濕熱蒸
寒經隧

高登肯有醫案 卷二 腫脹 庚

受醫用桂附芪朮和蘊化熱充斤三焦以致日加凶危

也。此危病也善治法

川通草

半一錢

海金沙

錢五

黃柏皮

半一錢

木猪苓

錢三

生赤豆皮

半一錢

真北細辛

一分

又

前法腫消三四仍以分消

川白通草

猪苓

海金沙

生赤豆皮

葶藶子

茯苓皮

晚蚕沙

又

間日寒戰發熱渴飲此為瘧乃病上加病飲水結聚

以下痛脹不敢用湧吐之法暫與開肺氣壅遏一法

大杏仁

蜜炒麻黃

石膏

此方善謂

句一名言
 此老有時
 與此相背
 不知何故
 腹滿等病
 必須有出
 路古人兼
 以針刺為
 治但其道
 甚微不知
 其理而妄
 針之反有

又濕邪留飲發紅癩胸聚濁痰消渴未已用木防已湯

木防已一錢 石膏三錢 杏仁三錢 苡仁二錢

飛滑石半錢 寒水石半錢 通草煎湯代水

陳進神芎導水丸二日所下皆粘膩黃濁形色余前議

腑氣窒塞水濕粘滯濁攻犯肺為痰嗽水漬脉隧為浮

腫大凡經脉六腑之病總以宣通為是內經云六腑以

通為補今醫不分臟腑經絡必曰參朮是補豈為明理

然肢節足附之濕出路無由必鍼刺以決其流此內外

冀可皆安戊巳丸三錢用二日後再進前藥一服

薛十腹滿下必是瘧三陰都已受傷而周身疥瘡數年不

既。脉絡中必有濕熱。就腹痛泄瀉。腑陽不通。不獨偏熱。偏寒之治。常用四苓散。

濕熱脚氣

倪 姬

猪苓 二錢 茯苓 三錢 澤瀉 一錢 生於木 一錢 椒目 五分
此方全無意義。又於為之。

化。與苦辛先平在土之滿脹。用瀉心法。

川連 黃芩 枳實 半夏

姜汁 杏仁 再加枳即汁尤妙

湯

囊腫腹脹。此屬瘡蠱。

扶苓皮 海金沙 白通草 大腹皮 玳瑁
此非瘡蠱藥法。法當慈通外科。如入連。知。去。銀。花。等。者。必。得。之。矣。

厚朴 廣皮 猪苓 澤瀉

瘡蠱

又 通太陽之裏驅其濁陰已得脹戒嘔緩知身中真陽
向為羣藥大傷議以護陽兼以泄濁法

人參

塊茯苓

生薑

淡附子

厚瀉

又 陰濁盤踞中土清陽蒙閉腹滿臃脹氣逆腹痛皆陽

氣不得宣通濁陰不能下走擬進白通法

此方後知不用此法屬不注無因議也

生乾姜

生炮附子

冲猪胆汁

黃八 傳滯單脹並不渴飲晝則便利不爽夜則小溲畧通

此由氣分鬱滯致中焦不運先用大針砂丸每服一錢

五分煖其水臟以泄濁

某 向有宿痞夏至節一陰來復連次夢遺遂腹形墜大

二便或通或閉。是時右膝癱腫潰瘍。未必非濕熱壅阻。經絡所致。診脈左小弱。右緩大。面色青減。鼻準明亮。納食必腹脹愈加。四肢惡冷。熱自裏升。甚則衄血牙宣。全是身中氣血交結。固非積聚停水之脹。考古人於脹症。以分清氣血為主。止痛務在宣通。要知攻下皆為通腑。溫補乃護陽以宣通。今者單單腹脹。當以脾胃為病藪。太陰不運。陽明愈鈍。議以緩攻一法。此一敗症不治。

川桂枝

錢一

熟大黃

錢一

生白芍

半錢

厚朴

錢一

枳實

錢一

淡生乾姜

錢一

三帖

又診脈細小。右微促。畏寒甚。右脇中氣觸入小腹。着卧

腫脹

堯

卽有形陸著議用局方禹餘糧丸煖水臑以通陽氣

早晚各服一錢流水送八服

又 脉人尺。弦勝於數。元海陽虛。是病之本。肝失疎泄。以致臏脹。是病之標。當朝用玉壺丹。午用疎肝實脾利水。分清太陽太陰之邪。

紫厚朴炒一錢半 縮砂仁炒研一錢 生於朮三錢 猪苓一錢

茯苓塊三錢 澤瀉一錢

又 脉弦數。手足畏冷。心中兀兀。中氣已虛。且服小鍼砂丸。每服八十粒。開水送。二服。以後藥壓之。

生於朮 雲茯苓 廣皮 煎湯一小杯後服

又 脉如瀼。凡陽氣動則遺。右脇汨汨有聲。墜入少腹。可知。腫脹非陽道不利。是陰道實。水穀之濕熱不化也。議用牡蠣澤瀉散。

左牡蠣 四錢 泄濕 澤瀉 半一錢 花粉 半一錢 川桂枝木 五分 通陽

茯苓 三錢 化氣 紫厚朴 一錢 午服

又 脉數實惡水。午後手足畏冷。陽明中虛。水氣聚而為飲也。以苓桂朮甘湯劫飲。牡蠣澤瀉散止遺逐水。

照前方去花粉加生於朮三錢。

中為寒飲

又 手足畏冷。不喜飲水。右脇汨汨有聲。下墜少腹。脉雖數而右大左弦。信是陽明中虛。當用人參熟附生姜溫。

經補虛之法。但因欲回府調理數日。方中未便加減。且用前方。調治太陽太陰。

生於朮 三錢 左牡蠣 生四錢 澤瀉 炒一錢 雲苓 三錢

生益智 四分 桂枝末 四分 炒厚朴 一錢 午後食遠服

朝服小溫中丸五十粒。開水送。仍用三味煎湯壓之。

脾胃氣室不和

楊六 十 味過辛酸。脾胃氣傷。結聚。食入則脹滿。曾服祿石大

黃丸。滯濁既下不愈。病不在乎腸中。前賢治脹治滿。必

曰分消。攻有形不效。自屬氣聚為痕。踈胃宜清。調脾當

暖。此宗前賢立法。

張保立腸
外三焦
膜之間

生茅朮 廣皮 丁香皮 黃栢 草豆蔻

脹滿之為
 病即使心
 慮休屬邪
 靈古人慎
 用補法又
 脹必有濕
 一則有熱
 因往所以
 指為熱症
 今多用溫
 補之藥因
 雖有通利
 之品而臣
 不勝主之
 悞必多細

川黃連 厚朴 茯苓 澤瀉 水法九

腫脹證大約腫本乎水。脹由乎氣。腫分陽水陰水。其
 有因風因濕因氣因熱外來者為有餘。即為陽水。因
 於大病後。因脾肺虛弱不能通調水道。因心火剋金。
 肺不能生腎水。以致小便不利。因腎經陰虧。虛火燥
 肺。金而溺少。悞用行氣分利之劑。漸至喘急痰盛。小
 水短赤。釀成腫證。內發者為不足。即為陰水。若脹病
 之因更多。所脹之位各異。或因濕因鬱因寒因熱。因
 氣因血因痰因積。因虫。皆可為脹。或在臟在腑。在脉
 絡在皮膚。在身之上下。表裡。皆能作脹。更或始因於

腫脹

全

因諸藥恐
愈者少而
不治者多
也
脹滿必有
有形之物
宜後下

寒久鬱為熱。或始為熱中。末傳寒中。且也。脹不必兼
腫。而腫則必兼脹。亦有腫脹同時並至者。其病形變
幻不一。其病機之參伍錯綜。更難叙述。故案中諸症。
有濕在下者。用分利。有濕在上中下者。用分消。有濕
而着裏者。用五苓散。通達膀胱。有濕鬱熱兼者。用半
夏瀉心法。苦辛暹降。有濕熱氣鬱積者。用雞金散。加
減消利並行。有氣血鬱積。夾濕熱之邪。久留而不散
者。用小溫中丸。清理相火。健運中州。有濕熱與水寒
之氣交橫。氣喘溺少。通身腫脹者。用禹餘糧丸。崇土
制水。煖下泄瀉。有寒濕在乎氣分。則用姜附。有寒濕

入於血分則用桂附。有濕上甚爲熱則用麻杏膏。以
等味清肅上焦之氣。有濕下着爲痺則用加味活絡
等劑。宣通下焦之鬱。有藉乎薤白瓜蒌者。滑潤氣機
之痺。結於腹脇也。有藉乎製黃歸尾者。搜逐血沫之
凝滯於經隧也。有藉乎玉壺控涎神保神芎者。視其
或輕或重之痰飲水積而驅之也。此皆未損夫臟氣
而第在腑之上下膜之表裏者也。若有胃陽虛者。參
苓必進。脾陽衰者。朮附必投。更有傷及乎腎者。則又
需加減八味濟生等丸矣。其他如養陽明之大半夏
湯。踈厥陰之逍遙散。蓋由證之牽連而及。是又案中

法外之法也已姚亦陶

是久咳損肺。破碎無聲也。其治法有寒者散寒。有火者清火。有風痰則祛風豁痰。若龍相上炎燥肺者。宜金水同治。若暴中之症。全屬少陰之虛。宜峻補肝腎。或稍兼痰火而治之。其用藥總宜甘潤。而不宜苦燥。斯得之矣。華岫雲

久嗽失音。必由藥誤者。其五味失音之靈丹也。服之久無不失音者。全失其使其人力如虎而走如鳥。半年之後無有不死。若風寒痰火偶失失音者。即不治之愈。但更加以素者五味。則弄假成真。其老茫然也。

肺痿

苦辛散
和傷肺
胃津液

洪

二

三

勞煩經營

陽氣弛張

即冬溫外

因咳嗽

亦是氣泄邪

侵

辛以散邪

苦以降逆

希冀嗽止

而肺欲辛

過辛則正

氣散失

音不能揚

色消吐涎

喉痺是肺痿

難治矣

倣內

經氣味過辛主以甘緩

北沙參

炒麥冬

飴糖

南棗

查

二

脉細心熱

呼吸有音

夜寤不寐

過服發散

氣泄陽傷

為肺痿之病仲景法以胃藥補母救子崇生氣也

金匱麥門冬湯此方不治肺痿

徐四肺痿。頻吐涎沫。食物不下。並不渴飲。豈是實火。津液蕩盡。二便日少。宗仲景甘藥理胃。乃虛則補母。仍佐宣通腕間之扞格。

人參

麥冬

熟半夏

生甘草

白粳米

南棗肉

沉

積勞憂思。固是內傷。冬溫觸入。而為咳嗽。乃氣分先

虛。而邪得外奏。辛散。斯氣分愈泄。滋陰非能安上。咽痛

音啞。虛中邪伏。恰值春暖。陽和脉中。脉外氣機流行。所

以小效旬日者。生陽漸振之象。穀雨暴冷。驟加衛陽。久

弱。不能擁護。致小愈病復。診得脉數而虛。偏大於右寸。

液傷節
虛

口吐涎沫。不能多飲湯水。面色少華。五心多熱。而足皆
浮腫。古人謂金空則鳴。金實則無聲。金破碎亦無聲。是
為肺病顯然。然內傷虛緩為多。虛則補母。胃土是也。肺
痿之病。議宗仲景麥門冬湯。

王十三潰瘍流膿經年。脈細色奪。聲嘶食減。咳嗽喉中梗噎。
皆漏損脂液。陰失內守。陽失外衛。肺痿之病。諒難全好。

人參

黃芪

苡仁

炙草

歸身

白朮

顧六久咳神衰。氣促汗出。此屬肺痿。

黃芪

蜜炙
八兩

生苡仁

二兩

白百合

四兩

炙甘草

一兩

肺痿

金

肺氣
不降
湯

白芨兩四 南棗兩四 水熬膏米飲湯送

肺氣不降咳痰嘔逆

鮮蘆根 桃仁 絲瓜子 苡仁

肺痿一症概屬津枯液燥多由汗下傷正所致夫痿者萎也如草木之萎而不榮為津亡而氣竭也然致痿之因非止一端金匱云或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下之重亡津液故令肺熱乾痿也肺熱乾痿則清肅之令不行水清四布失度脾氣雖散津液上歸於肺而肺不但不能自滋其乾亦不能內灑陳於六腑外輸精於皮毛也

其津液留耗胸中得熱煎熬變為涎沫侵肺作咳止
之不已故乾者自乾唾者自唾愈唾愈乾痿病成
金匱治法貴得其精意大意生胃津潤肺燥補真
以通肺之小管清火熱以復肺之清肅故外臺用
甘草湯在於益肺氣之虛潤肺金之燥千金用甘
湯及生薑甘草湯用參甘以生津化熱薑棗以宣
焦之氣使胸中之陽不滯而陰火自熄也及觀先生
之治肺痿每用甘緩理虛或用仲景甘藥理胃虛則
補母之義可謂得仲景心法矣 鄒時乘