

席湯

水二鍾姜三片枣二枚槌法加石膏末一撮煎之熱服

柴胡雙解散

即小柴胡湯附加減法

足少陽膽經受證耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脉來弦數属半表半裏宜和解此經無出入有三禁不可汗下利也止有小柴胡一湯隨病加減再無別湯

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

芍藥

若只小柴胡湯無芍藥

本經症小便不利加茯苓

脇痛加青皮

本經嘔者入姜汁竹茹

痰多加瓜萋貝母

寒熱似瘧加桂 渴加天花粉知母

齒燥無津液加石膏 嗽者加五味金沸草

壞症加鱉甲

本經症心下飽悶未經下者非結胸乃表邪傳至胸中未入乎腑證雖滿悶尚為在表只消小柴胡加枳椇未効就以本方對小陷胸加枳椇

一服虛煩類傷寒証本方加竹葉炒粳米  
本經與陽明合病本方加葛根芍藥  
婦人熱入血室加當歸紅花

男人熱入血室加生地黃

老婦人傷寒無表証其熱勝者本方加大黃甚  
者加芒硝

水二鍾姜一片棗二枚搗法加生艾汁三匙煎  
之溫服

小柴胡湯證註釋

治太陽病十日已去脉細而嗜卧外雖已解設胸  
滿痛與服之若脉浮者麻黃湯傷寒五六日來  
往寒熱胸脇若痛默々不飲食心煩喜嘔或煩  
而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心悸小  
便不利或不渴身有微熱者此湯主之血氣弱  
腠理開邪氣因與正氣相搏結于胸下邪正分  
爭往來寒熱休作有時默々不飲食臟腑相連  
其痛必下邪高痛下致使嘔也此湯主之服柴  
胡湯已渴者屬陽明以法治之傷寒五六日身

熱惡風頭項強脇下滿手足溫而渴者此湯主  
之傷寒陽脉瀋陰脉弦腹中急痛先與小建中  
湯不差者此湯主之太陽病過經十餘日發汗  
吐下後四五日柴胡湯証仍在者先與小柴胡  
湯嘔不止心下鬱微煩者為未解也與大柴胡  
湯下之則愈婦人中風七八日續得寒熱發作  
有時經水適斷者此為熱入血室其血必結致  
如瘡狀此湯主之傷寒五六日頭汗出微惡寒  
手足冷心下滿不欲食大便硬脉細者為陽微

結必有表復有裏脉沉亦裏也汗出為陽微假  
令純陰結不得復有外症悉入在裏此為半在  
表半在裏也脉雖沉緊不得為少陰病所以然  
者陰不得有汗也今頭汗出故知非少陰可與  
此湯設不了之得尿而解傷寒五六日嘔而發  
熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴胡症在者  
復與小柴胡湯心下痞為逆必蒸蒸而振却發  
熱汗出而解若心下滿而腹痛者此為結胸也  
大陷胸湯主之但滿而不痛者此為痞氣柴胡

不中與之宜半夏瀉心湯已上屬太陰經  
末後五六日嘔而發熱至太陰經一段俱太陰  
證節菴併及者見太陰証柴胡亦有當與不當  
與者

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇不利者  
與此湯陽明病脇下鞅滿不大便而嘔舌上白  
胎皆可與之上焦得通津液得下腎氣因和澀  
然汗出而解陽明中風脉弦浮大而短氣腹部  
滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得卧一

身及目悉黃小便難有潮熱時、噦身前後腫  
刺之少差外不解病過十日脉續浮者此湯主  
之已上屬陽明經太陽病不解轉入少陽脇下  
滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者  
此湯主之若已吐下後發汗溫鍼譎語小柴胡  
湯証罷此為壞証知犯何逆以法治之已上屬  
少陽經嘔而發熱宜服此湯傷寒已後更發熱  
此湯主之若脉浮者以汗解之屬陽易差後勞  
復脉證

欬用先加減法

如胸中煩而不嘔去半夏人參加瓜蒌仁煩者  
熱也嘔者逆氣也令煩而不嘔則熱聚而氣不  
逆邪氣欲漸成實也參甘恐補去之無助熱夏  
味辛散去之以無逆氣也瓜蒌仁苦寒用之以  
通鬱熱于胸中

若渴者去半夏恐燥津液加人參之甘潤瓜蒌  
根之苦潤相合則津液生而渴已也

若腹中痛去黃芩加芍藥寒邪入裏氣不足  
寒邪壅則腹中痛芩苦寒性堅而寒中去之則  
中氣易和芍藥味酸而和中加之則裏氣得通  
而腹痛自愈

如脇下痞鞭去大棗之甘溫恐令滿加牡蠣之  
酸鹹則痞消而鞭軟矣

若心下悸小便不利者去黃芩之苦寒恐蓄水  
浸行加茯苓之甘淡能滲利則津液通矣

若不渴外有微熱去人參微熱恐有表邪加桂  
枝取汗發散表邪也

若欬者去人參大棗生姜加五味子乾姜肺氣  
逆則欬參朮姜甘溫中則肺氣愈逆故去之用  
五味子之酸收歛肺氣乾姜之辛熱以散內之  
寒氣則欬自止若加葛根芍藥治少陽之明合  
病頭畧痛發熱耳聾脇痛或往來寒熱如瘧和  
解散治之和解散即小柴胡湯加減如嘔逆加  
姜九片陳皮一錢如頭痛惡寒加羌活防風各  
一錢寒熱間作加桂枝一錢夏月中暑發熱頭  
痛加黃連一錢春天溫病時行加生地黃川升

麻一錢瘡疾或先寒後熱加川常山尖栝榔半  
錢各要未發時煎服傷寒惡寒頭項強發熱前  
方沖和湯內去細辛蒼朮加白朮二錢

桂枝大黃湯 即桂枝湯加大黃附加減法

治足太陰脾經受症腹滿而痛咽乾而渴手足  
溫脈來沉而有力此因邪熱從陽經傳入陰經

桂枝 芍藥 甘草 大黃 枳實 柴胡

本經腹滿不惡寒而喘者加大腹皮去甘草  
水二鍾姜一片朮二枚槌法臨服入栝榔磨水

三匙熱服

中云看此証不如三承氣湯選用或一日初傳太陰乃可現仲景書或者邪中陰經而留于腹者也不然必外証未全除可也不然此方亦當用在壞証例非本經藥也直說陽症傳來者誤也加味理中飲 即理中湯附加減法

治太陰脾經受証自利不渴手足溫身無熱脉來沉而無力此屬臟寒

乾姜

白朮

人參

甘草

肉桂

陳皮

茯苓

厥陰消渴氣上衝心飢不欲食、即吐衄腹痛大便實者本方加大黃蜜少許利之

本經腹濡滿時減者本方去甘草

本經嘔者入半夏姜汁

本經勑卧沉重利不止少加附子

利後身軀痛者急溫之加附子

自利腹痛者入木香磨姜汁調服和之

水一鍾姜一片棗二枚槌法臨服入炒陳壁土

一匙調服取土氣以助胃氣

茵陳將軍湯 即茵陳湯附加減法

治足太陰脾經腹滿身目發黃小水不利大便實發渴或頭汗劑頸而還脉來沉重者宜用

大黃

茵陳

山梔

甘草

厚朴

黃芩

枳實

大便自調者去大黃厚朴加大腹皮利小便清為効

水二鍾姜一片槌法加灯草一握熱服

真赤飲 即五苓散附加減法

治小水不利小腹滿或下焦蓄熱或引飲過多或小便短赤而渴脉沉數者以利小便為先惟

汗後亡津液與陽明汗多者則以利小便為戒

茯苓

猪苓

澤瀉

桂枝

白朮

甘草

滑石

山梔

中濕身目黃者加茵陳

水結胸證加木通灯心如小水不利而見頭汗出者乃陽脫也此死證



自得病起無熱但狂言煩躁不安精采不與人相當此湯治之

此因熱結膀胱太陽經之裡症也一名太陽本病

水二鍾姜一片灯心二十莖槌法入鹽二字

六一順氣湯 以代大承氣小承氣調胃承氣大

柴胡三乙承氣湯天陷胸等湯之神藥也舉世無人知此奇妙耳秘之莫與俗人言附加減法治傷寒熱邪傳裡大便結實口燥咽乾怕熱譫

語揭衣狂妄揚手擲足斑黃陽厥潮熱自汗胸腹滿硬遠臍疼痛等症悉皆治之

大黃 枳實 厚朴 甘草

黃芩 柴胡 芒硝 芍藥

潮熱自汗譫語發渴揚手擲足揭去衣被狂妄斑黃大便實者俱屬正陽明胃腑病依本方口燥咽乾大便實屬少陰依本方

下利純清心下鞭痛而渴者屬少陰依本方

怕熱發渴譫妄手足乍冷乍溫大便實者陽厥

証屬厥陰依本方舌卷囊縮者難治須急下之  
熱病目不明謂腎水已竭不能照物病已篤矣  
惟宜急下依本方目中不了、即目不明也  
轉屎氣者謂下泄也有燥屎焉當下依本方如  
更衣者止後服不必盡劑不更衣宜再少與大  
便通者愈若結胸証心下鞭痛手不可近燥渴  
譎語大便實者依本方去甘草加甘遂桔梗凡  
傷寒過經及老弱併血氣兩虛之人或婦人產  
後有下症或有下後不解或有表症未除而裏

症又急不得不下者用此湯去芒硝下之即吉  
蓋恐轉藥硝性燥急故有此戒大凡傷寒邪熱  
傳裏結實須看熱氣淺深用藥令之庸俗不分  
當急下可少與宜微和胃氣之論一槩用大黃  
芒硝亂投湯劑下之因茲枉死者多矣余謂傷  
寒之邪傳來非一治之則殊耳病有三焦俱傷  
者則痞滿燥實堅全俱宜大承氣湯厚朴苦溫  
以去痞枳實苦寒以泄滿芒硝鹹寒以潤燥軟  
堅大黃苦寒以泄實去熱病斯愈矣邪在中焦

則有燥實堅三証故用調胃承氣湯以甘草和中芒硝潤燥大黃泄實不用枳朴恐傷上焦虛無氤氳之元氣調胃之名自此立矣上焦受傷則痞而實用小承氣湯枳實厚朴之能除痞大黃之泄實去芒硝不傷下焦血分之真陰謂不伐其根本也若夫大柴胡湯則有表症尚未除而裏症又急不得不下者只得以此湯通表裏而緩治之猶有老弱及血氣兩虛之人亦宜用此故經云轉藥孰緊有芒硝者緊也大承氣最

緊小承氣次之調胃承氣又次之大柴胡又次之其大柴胡加大黃小柴胡加芒硝方為轉藥蓋為病輕者設也仲景又云蕩滌傷寒熱積皆用湯液切禁丸藥不可不知也

右先將水二鍾滾三沸後入藥煎至八分槌法臨服時入鐵銹水三匙調服立効取鐵性沉重之養最能墜熱開結有神此千金不傳之秘

如神白帟湯 即白帟湯附加減法

治身熱渴而有汗不解或經汗過渴不解脉未

微洪

石膏

知母

人參

甘草

山梔

變冬

五味

心煩者加竹茹一團如大渴心煩背惡寒者依本方去山梔加天花粉無渴不可服此藥為大忌

水二鍾姜一片棗一枚槌法加淡竹葉十片

二黃石膏湯

此湯治傷寒後五心煩熱舌燥表裏皆實怫鬱

陽毒發斑黃身如塗朱眼珠如火狂叫欲走十指皮脫六脉洪大滑數燥渴欲死鼻乾面赤齒黃過經不解已成壞症表裏皆熱欲發其汗病熱不退又復下之大便遂頻小便不利亦有錯治溫症而成此症者又八九日已經汗下後脉洪數身壯熱拘急沉重欲治其內由表未解欲發其表則裡症又急趨趨不能措手待斃而已殊不知熱在三焦閉塞經絡津液營衛不通遂成此症又治汗下後三焦生熱脉洪數譏語不

休晝疲喘息鼻時加衄身目俱黃狂叫欲走者  
通用此湯治之有神

石膏

半一兩

黃芩

黃連

黃柏

各七錢

山梔

麻黃

香豉

合二

每服一兩水二鍾姜三片棗二枚槌法入細茶  
一撮煎之熱服 未中病再服

三黃巨勝湯

此湯治陽毒發斑狂亂妄言大渴叫喊目赤脉  
數大便燥實不通上氣喘急舌卷囊縮難治者

權以此湯劫之三黃石膏湯內去麻黃香豉加  
大黃芒硝是也

水二鍾姜一片棗二枚槌法臨服入泥漿清水  
二匙調服即安

冲和靈寶飲 治兩感傷寒起于頭痛惡寒發熱  
口燥舌乾以阳先受病多者先以此湯探之中  
病即愈

羌活

防風

川芎

生地

細辛

黃芩

柴胡

甘草

乾葛

白芷

石膏

水二鍾煨生姜三片枣二枚槌法入黑豆一撮煎之溫服取微汗為愈如不愈表症多而甚急者方可用麻黃葛根為解表如裏多而甚急者先以調胃承氣為攻裏是也

如以陰經自中病發熱下利身疼痛脈沉細無力不渴倦卧昏重者又當先救裏溫之曰陽救急湯是分表裏寒熱而治此其權變大法

古云兩感雖為死証復有可救之理乃用藥先後寒熱之劑及發表攻裡之序不用故枉死者

多矣此方良可

菴仁承氣對子 即菴仁承氣湯附加減法

治熱邪傳裏熱蓄膀胱其人如狂小水自利大便黑小腹滿痛身目黃譎語燥渴為蓄血証脈沉有力宜此湯下盡黑物即愈未服前而血自下者為欲愈不宜服

菴仁 桂枝 芒硝 大黃 芍藥 柴胡

青皮 當歸 甘草 枳實

水二鍾姜三片槌法臨服入蘇木煎汁三是服

消毒清黛飲 治熱邪傳裡：實表虛血熱不散  
熱氣乘于皮膚而為斑也輕則如疹子重則如  
錦紋重甚則斑爛皮膚或本屬陽悞投熱藥或  
當下不下或下後未解皆能致此不可發汗重  
令開泄更加斑爛也然而斑之方萌與蚊迹相  
類發斑多見於胸腹蚊迹只在於手足陽脉洪  
大病人昏憤先紅後赤者斑也脉不洪大病人  
自靜先紅後黃者蚊也其或大便自利短氣拂  
鬱氣短燥屎不通又如菓實腐者盧醫復生不

能施其巧矣凡汗下不解足冷耳聾煩悶咳便  
是發斑之候

黃連 甘草 石膏 知母 柴胡 玄參

生地 山梔 犀角 青黛 人參

水二鍾姜一片棗二枚槌法臨服入苦酒一匙  
大便實者去人參加大黃

生地黃連湯 治鼻衄成流久不止者或熱毒入  
深吐血不止

黃芩 山梔 桔梗 甘草 生地 黃連

柴胡 川芎 芍藥 犀角如無升麻代之

水二鍾 粳二枚 煎八分 槌法 臨服入茅根搗汁 磨京墨調服如無茅根以藕搗汁亦可

外用劫法 水紙搭于鼻冲

加味犀角地黄湯 治煩躁 漱水不下咽者 屬上焦有瘀血

犀角 生地 芍藥 甘草 桔梗 牡丹皮

陳皮 紅花 當歸

水二鍾 姜三片 槌法 臨服入生藕節搗汁三匙

温服

回陽救急湯 即四逆湯附加減法

治寒邪直中 陰經真寒証 初病起無身熱 無頭疼 止則惡寒 四肢厥冷 戰慄 腹疼 吐瀉 不渴 引衣 自蓋 蹇卧 沉重 或手指甲唇青 或口吐涎沫 或至無脉 或脉来沉遲無力

熟附子 乾姜 人參 甘草 白朮 肉桂

陳皮 五味 茯苓 半夏

嘔吐涎沫 或小腹痛 加鹽炒吳茱萸



無脉者加猪胆汁一匙 嘔吐不止加姜汁  
泄瀉不止加升麻黃芪

水二鍾姜三片煎之臨服加麝香三厘調服中  
病以手足溫和即止不得多服多則反加別病  
矣如未止可用前理中飲加減治之無妨

回陽反本湯 治陰盛格陽陰極發躁微渴面赤  
欲坐卧於坭水井中脉来無力或脉全無欲絕  
者 附子 乾姜 甘草 人參 麥門冬  
五味 臘茶 陳皮

面戴阳者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清  
泥漿水二鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取  
汗為効

柴胡百合湯 治瘥後昏沉發熱渴而錯語失神  
及百合勞復等證

柴胡 人參 黃芩 甘草  
知母 百合 生地 陳皮

渴加天花粉 胸中煩熱加山梔 頭微疼加  
羌活川芎 嘔吐加姜汁炒半夏 胸中飽悶

加枳壳桔梗 食復者加枳實黃連甚重大便  
實者加大黃 胸中虛煩加竹茹竹葉 瘧後  
乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加黃連犀角  
咳喘加杏仁百合甚加麻黃 心中驚惕為血  
少加當歸茯神遠志 虛汗加黃芪 脾蹇加  
白朮 腹中雷鳴加煨生姜 勞復時熱不除  
加葶藶烏梅生艾汁  
水二鍾束一枚姜三片槌法加醋炙鱉甲煎之  
溫服

如聖散 治剛柔二瘧頭搖口噤身反張手足掣  
搐頭面赤項強急與瘰癧同此法 羌活  
防風 川芎 白芷 柴胡 芍藥 甘草  
當歸 烏藥 半夏 黃芩 有汗是柔瘧加  
白朮桂枝 無汗是剛瘧加麻黃蒼朮 口噤  
咬牙者如大便秘者入大黃利之  
水二鍾姜三片煎之臨服入姜汁竹瀝溫服  
溫經益元湯 治因汗後太虛頭眩振々然欲擗  
地并肉瞶筋惕及因發汗太多衛虛亡陽汗不

止或下後利不止身疼痛者併皆治之

熟地 人參 白朮 黃芪 甘草 芍藥

當歸 生地 茯苓 陳皮 肉桂 大附子

如飽悶加枳殼去地黃 如瘦人去芍藥有熱

去附子 利不止加炒白朮升麻陳壁土去當

歸地黃 嘔者加姜汁製半夏 瀉者加天花

粉 汗後惡風寒屬表虛去附子肉桂生地加

桂枝膠飴 水二鍾姜三片棗一枚加糯米一

撮槌法煎之溫服

逍遙湯 治有汗傷寒瘥後血氣未平勞動助熱

復還於經絡有因與婦人交接淫慾而復發不

易有病者謂之勞復內交接淫慾而無病人反

得病者謂之陰陽易余曾見舌出數寸而死者

多矣此証最難治必宜此湯

人參 知母 竹青 卵縮腹痛倍加黃連

甘草 滑石 生地 萆根 柴胡 犀角

水二鍾姜三片棗二枚煎之臨服入燒裊襠末

一錢半調服有粘汗出為効不粘汗出再服以

小水利陰頭腫則愈

升陽散火湯 治有患人叉手冒胸尋衣摸牀譎語昏沉不醒人事不可呼為風証而用風藥悞死者多矣蓋汗熱乘于肺金元氣虛不能自主持名曰撮空証小便利者可治小便不利者不可治 人參 當歸 柴胡 芍藥 黃芩 甘草 白朮 麥冬 陳皮 茯苓 有痰加姜製半夏 大便燥實譎語發渴加大黃 泄漏者加升麻炒白朮

水二鍾姜三片枣一枚槌法入金首篩煎之熱服

再造飲 治有患頭疼發熱項脊強惡寒無汗用發汗藥二三劑汗不出者苟不識此不論時令遂以麻黃重藥及火劫取汗悞人死者多矣殊不知陽虛不作汗故有此証名曰無陽証

黃芪 人參 桂枝 甘草 細辛 熟附子 羌活 防風 川芎 煨生姜

夏月加黃芩石膏冬月不加

水二鍾束二枚煎至一鍾槌法加炒芍藥一撮煎三沸溫服

黃龍湯 治有患心下鞭痛下利純清水譎語發渴身熱殊不識此証但見下利便呼為漏底傷寒而便用熱藥止之就如抱薪救火悞人死者多矣殊不知此因熱邪傳裡胃中燥屎結實此利非內寒而利乃逐日自飲湯藥而利也宜急下之名曰結熱利証身有熱者宜用此湯身無熱者用前一順氣湯

大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘草

人參 當歸

年老氣血虛者去芒硝

水二鍾姜三片束二枚煎之後再加桔梗煎一沸熱服

調營養氣湯 即加減補中益氣湯

治有患頭疼身熱惡寒微渴澀然汗出身痛脚腿酸疼沉勸脉空浮而無力不可因見頭疼惡寒發熱便呼為正傷寒而大發其汗所以輕變

重而害人者多矣此勞力內傷氣血外感寒邪  
宜少辛甘溫之劑則愈名曰勞力感寒証故經  
云勞者溫之損者溫之溫能除大熱正此謂也  
有下証者大柴胡湯下之則緩

人參 黃芪 當歸 生地 川芎 柴胡

陳皮 甘草 細辛 羌活 防風 白朮

元氣不足者加升麻少許須知元氣不足者至  
陰之下求其升 口渴加天花粉知母 喘嗽  
加杏仁去升麻 汗不止加芍藥去升麻細辛

胸中煩熱加山梔竹茹 乾嘔加姜汁炒半夏

胸中飽悶加桔梗枳殼去生地甘草黃芪白朮  
少許痰盛者加瓜蒌仁貝母去防風細辛 腹  
痛去芪朮加芍藥乾姜和之 有因血鬱內傷  
腹有痛處或大便黑加菔仁紅花去芍辛羌防  
黃芪白朮甚者加大黃下盡瘀血則愈後去大  
黃調理

水二鍾姜三片棗二枚槌法入葱白二莖煎之  
溫服

導赤各半湯 治患傷寒後心下不鞭腹中不滿  
大小便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中  
獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水稀粥與之  
則嚥不與即不思形如醉人俗不識此而悞人  
者多矣殊不知熱傳手少陰心也心火上而迫  
肺所以神昏名越經証

黃連

山梔

黃芩

滑石

甘州

知母

犀角

茯神

麥冬

人參

水二鍾姜東煎之加灯心一握煎沸熱服

益元湯 治有患身熱頭疼全無不煩便作躁悶  
面赤飲水不得入口不識者呼為熱証而用涼  
藥遂至悞人殊不知元氣虛弱是無根虛火泛  
上名曰戴陽証

熟附子

甘草

乾姜

人參

五味

麥冬

黃連

知母

葱

艾

水二鍾姜一片東二枚相法臨服入童便三匙  
頓冷服

桂苓飲 治有患初得病無熱狂言煩躁不安精

采不與人相當切勿呼為狂發悞用下藥死者  
多矣此因熱結膀胱名如狂証

猪苓 澤瀉 桂枝 甘草 白朮

知母 黃栢 山梔 蘼葉

水二鍾姜三片煎一鍾槌法再加滑石末一錢

煎三沸溫服取微汗為効

當歸活血湯 有患無頭疼無惡寒止則身熱渴

小便利大便黑口出無倫語設如不識呼為熱

証而用涼劑則悞矣殊不知內傳心脾二經使

人昏迷沉重故名挾血如見崇

當歸 赤芍 甘草 紅花 桂心 乾姜

枳壳 生地 人參 柴胡 朮仁

服三帖後去朮仁紅花干姜桂心加白朮茯苓

水二鍾姜一片煎之槌法入酒三匙調服

加味導痰湯 有患憎寒壯熱頭疼昏沉迷悶上

氣喘急口出涎沫庸醫皆作傷寒治之多悞殊

不知此目內傷七情以致痰迷心竅神不守舍

神出舍空則痰生也名曰挾痰如見崇痰症



類傷寒與此同治法

茯苓 半夏 南星 枳實 黃芩 瓜蒌仁

白朮 陳皮 甘草 桔梗 人參 黃連

年力壯盛先用吐痰法後服此湯

水二鍾姜三片棗二枚槌法臨服入竹瀝姜汁  
溫服

加減調中飲 治食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣  
口脈緊盛但身不痛此為異耳經云飲食自倍  
腸胃乃傷輕則消化重即吐下此良法也

蒼朮 厚朴 陳皮 甘州 白朮 山查

神麩 枳實 草菓 黃連 乾姜

腹中疼加菴仁 痛甚大便實熱加大黃下之  
去山查草菓神曲干姜

心中兀：欲吐者與乾霍亂同吐法用滾水一  
碗入鹽一撮皂角末五分探吐

水二鍾姜一片臨服入木香磨汁調服即効  
加減續命湯 治脚氣類傷寒頭疼身熱惡寒支  
節痛便秘嘔逆脚軟屈弱不能轉動但起於脚

膝耳禁用補劑及淋洗

防風

芍藥

白朮

川芎

防已

桂枝

甘草

麻黃

蒼朮

羌活

暑中三陽所患必熱脉來數去附子桂枝麻黃

加黃栢黃芩柴胡

寒中三陰所患必冷脉來

遲加附子

起于濕者脉來弱加牛膝木瓜

起於風者脉來浮加獨活

元氣虛加人參少

許大便實者加大黃

水二鍾姜一片棗二枚灯心二十莖槌法臨服

入姜汁調服

苓連消毒飲

時天行大頭病發熱惡寒頭項腫

痛脉洪取作痰症治之其喉痺者亦照此方治

柴胡

甘草

桔梗

黃芩

川芎

荆芥

黃連

防風

羌活

枳壳

連翹

射干

白芷

先加大黃利去一二次後依本方去大黃加

人參當歸

水二鍾姜三片煎一鍾加鼠粘子一撮再煎一

沸槌法入竹瀝姜汁調服

初起不可用大黃末後不減方可量加

加味六神通解散 治時行三月後謂之晚發頭

痛身熱惡寒脉洪數先用冲和湯不愈後服此

湯

麻黃

甘草

石膏

黃芩

滑石

蒼朮


川芎

羌活

細辛

水二鍾姜三片槌法入豆豉一撮葱白二莖煎之熟服取汁中病即止

終



赤水玄珠第十九卷目錄

藥誤傷人

病人應死証

望色

聞聲

聞音

切脉

發汗止發汗

傷寒可吐

傷寒不可吐

傷寒吐不出

探法

傷寒吐不住止法

傷寒不可下

小便不通燻法

胸膈不寬熨法

妊娠護胎法

傷寒不染病法

用藥寒

溫合宜論

妊娠傷寒禁忌藥


蒸臍法

熨臍法

中寒

傷寒合病

陰毒傷



寒 夾陰傷寒 寒疫 大頭傷寒

食積 中濕類傷寒 痰證類傷寒

瘀血類傷寒 嗽水不欲嚥 晝夜偏劇

心下滿 遺尿 大便自利 驚惕

呃逆 譫語 鄭聲 瘖瘖不言

陰疰似陽 冷結 蛻厥 鬱冒不仁

肉瞶筋惕 肉苛 百合 瘰癧

循衣摸床 舌捲囊縮 瘡後發腫

瘡後遺毒 瘡後發碗頭瘡 瘡後勞復

女勞復 瘡後陰陽易 瘡後虛弱

瘡後昏沉 瘡後飲酒復劇 妊娠傷寒

產後傷寒 不可水 再三汗下熱不退

四肢冷 附四肢沉重四肢不收 結陽

結陰 寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在

骨髓 太陽傳經用藥 內傷似外感始為

熱中病 內傷似外感末傳寒中病 內傷

似外感陽明中熱病 內傷似外感溫熱病

內傷似傷寒 房室傷風 房室傷寒

瘡瘍發熱類傷寒

赤膈傷寒

黃耳傷

寒

解衣類傷寒

砂病類傷寒

搖頭

身痒

未交接而作易病治

人迎氣口脉

衝陽脉

太谿脉

結脉

促脉

代脉

目錄終

赤水玄珠第十九卷

新安生生子孫一奎著輯

藥誤傷人

凡應用小柴胡湯和解誤用承氣湯致身發黃者  
 死中暑作熱病誤用燥劑者死腎虛受寒內逼  
 浮陽之火泛上面赤煩躁身有微熱渴欲飲水  
 不能下咽大便閉或自利小水淡黃或嘔逆或  
 氣短或鄭聲或咽痛狀似陽證醫見面赤煩渴  
 便閉認作陽證誤投寒涼立死陰證身熱面赤

足冷煩躁揭去衣被脉來數大無力不急用加減五積散冷服誤用涼藥者死傷寒汗多用利小便藥者死陽明病潮熱汗多小便因少若利之加喘渴者死濕病若發其汗使人耳聾不知痛處者死病人煩躁自覺甚熱他人以手按其肌膚殊無大熱此為無根失守之火用涼藥者死

病人應死證

頭重視身此天柱骨倒元氣已敗死大便濁氣極臭者死目精正圓者死卵縮入腹脈見離經者死瘡後小便澁有血名曰內外瘡皆黑靨不出膿者死少陰下利止頭眩時々自冒者死熱盛躁急不得汗出是陽脉極死舌上黑胎生芒刺刮不去易生者死夏月可治鼻衄自汗者死胃寒發呃丁香香柿蒂良姜湯調服脉不出加膽汁合生脉散其脉又不出或暴出者皆死

望色

昔肥今瘦主痰大肉脫去主不治平人消瘦主脾

熱眼眵黑主內有痰鼻色青主腹中痛苦冷者死  
鼻色微黑者有水氣鼻色黃主小便難鼻色白者  
屬氣虛鼻色赤者屬肺熱鼻色鮮明者有留飲鼻  
孔乾燥者必衄血鼻色燥如烱煤者是陽毒熱極  
鼻孔冷滑色黑者是陰毒冷極鼻流濁涕者屬風  
熱鼻流清涕者是肺寒鼻孔癰脹者屬肺熱有風  
唇口焦紅者吉唇口焦黑者凶唇口俱腫赤者是  
熱極唇口俱青黑者是寒熱唇口舌胎斷紋者難  
治唇口燥裂者是脾熱唇青舌捲者死唇吻色青

者死環口鰲黑者死口張氣直出者死齒燥無津  
液者是陽明熱極前板齒燥兼脉虛者是中暑齒  
如熱者難治耳色黑枯燥者是腎憊目赤唇焦舌  
黑者屬陽毒目熏黃色暗者屬濕毒目黃兼小便  
利大便黑小腹滿痛者屬畜血目瞑者將欲衄血  
目之白睛黃兼冷無熱不渴脉沉細者屬陰黃兩  
皆黃者病欲愈凡開目見人者屬陽閉目不欲見  
人者屬陰睛昏不識人目反上視睛小瞪目直視  
目邪視目睛正圓戴眼反折眼胞陷下此八者皆



死證目睛微定暫時稍轉動者屬痰目中不了了  
睛不和不明白者此因邪熱結實在內不了了者  
謂見一半目不見一半目是也舌腫者難治舌出  
者死面顴頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒  
治面赤脉數無力此伏陰病其證煩躁引飲虛陽  
上升面赤脉沉細此少陰病外熱內寒陰盛格陽  
宜溫誤用寒涼者死面赤脉弦數此少陽病宜小  
柴胡和解緣面赤々乃陽氣怫鬱在表汗不徹之  
故宜發汗面部通赤色此陽明表證未解不可攻

裏宜解肌面唇青是陰寒極面青兼舌捲囊縮亦  
是陰寒面青兼小腹絞痛是夾陰傷寒面目身黃  
兼小水短澀是濕熱面目身黃兼小腹滿硬痛小  
便利是畜血傷寒面白為無神或汗多或脫血所  
致面白人不宜大汗黑氣在魚尾相牽入太陽者  
死黑氣自人中入口者死黑氣自入耳目鼻舌者  
死面黑人在傷寒內涉虛不宜參朮大補

### 聞聲

聲清聲濁

病邪在表其聲清而響曉病邪入裏

其聲濁而不噤

聲輕聲重 病在陽分其聲前輕後重病在陰分  
其聲前重後輕

聲斷聲續 病邪表淺併有餘陽證其聲續病邪  
入深併內傷不足其聲斷

言壯言怯 外感陽病有餘出言壯厲則寒熱交  
作內傷陰證不足出言懶怯則寒  
熱間作

嘆 嘆是心變動之聲

欠 腎主欠陰氣積下陽氣未足陽引而上陰引

而下陰陽相引故數欠也

噫 噫是心變動之聲是胸中氣不交通寒氣客  
于胃厥逆從上下復出于胃故為噫

噎 噎是腎變動之聲有病發噎是傷風或傷熱  
無病發噎是陽氣和滿於心

吞 吞是脾變動之聲

呃 其聲皆從胃中至胸膈間而為呃有胃中實  
熱失下者有胃中痰飲者有服寒涼藥過多

者有胃中虛冷者

咳是肺變動之聲俗呼為嗽肺為邪平氣逆不下也有肺寒咳者有停食咳者有邪在半表半裏咳者

喘 陰氣實陽氣虛陰氣速陽氣遲陰氣盛陽氣絕故為喘

怒 怒是肝變動之聲

歌 歌是脾變動之聲

哭 哭是肺變動之聲

笑 笑是心變動之聲

太息 憂思則心系急則氣約氣約則不利故太息以伸屈之

錯語 意錯言亂自知言錯邪氣尚輕自不知竟此熱甚正氣衰

呢喃 病邪入輕則睡中發此聲也

聲嘶 肺有風熱

聲啞 聲啞唇口見生瘡是狐惑病有風熱傷心肺而聲啞者少陰病咽中生瘡者有瘡病

口禁者有熱病三四日不得汗出者死

口禁 口禁難言見手足牽搐是風痙口噤不言  
難治陽明病渴欲飲水口噤舌乾白虎加  
人參湯咽乾不可汗

舌哽舌短舌強 病邪入深主難治

口噤咬牙 是風痙

喉中有聲 喉中嚙人有聲者是痰也

卒然無音 寒氣客於厭會則厭不能發不能  
下至其開闔不便故無音

聲如鼻鼾 聲如鼻鼾者難治

久病耳聾 屬氣虛

咽喉不得息 寸脉微浮或沉伏胃中痞鞭氣上

衝此胃中有寒宜吐之

鼻息如鼾睡 屬風溫

耳聾兼脇痛 宜和解寒熱咽而口苦屬少陽

耳聾耳腫耳痛 是少陽風熱

問因

口苦口甜 口苦是膽熱口甜是肝熱

舌乾口燥 是胃家熱極

心下滿 曰下早致滿為痞氣手按拍之有聲又  
更此停水手按則散此虛氣手按鞭痛  
此宿食

喜明喜暗 喜明屬陽元氣實喜暗屬陰元氣虛  
睡向壁向外 向壁屬陰元氣虛向外屬陽元氣

實

病起覺不舒快少情緒否有此證是夾氣傷寒  
病起覺勸卧骨腿酸疼脇痛否有此證是勞力傷

寒要知病在肝經問婦人乳頭縮不縮

耳聾 耳聾邪氣入深難治或兼虛證有少陽證  
不可不知

切生死形狀六經六絕脉

雀啄連來三五啄屋漏半日一點落彈石鞭來尋  
即散搭指散亂真解索魚翔似有亦似無鰈遊靜  
中跳一躍寄語醫家仔細看六脉一見休下藥  
一動一止兩日死兩動一止四日通三動一止六  
日亡四動一止八日事五動一止只十日十動一

止一年去春草生時即死期二十一動二年住清明節後始傾亡三十動一止三年次立秋節後病則危四十動一止四年住小麥一熟是死期五十動一止五年試草枯水寒時死矣此為太素脉  
玄秘

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒

右手脉來空虛左手脉來緊盛是勞力傷寒

左手脉來緊盛右手洪滑或寸脉沉身熱惡寒隱隱頭痛喘咳煩悶胸脇体痛是夾痰傷寒

左手脉來緊瀦右手脉沉數心胸脇下小腹有痛處是血鬱內傷外感

鬼脉 得病之初便譖語或發狂六部無脉大指之下寸口之上有脉動者是

反關脉 如病人六部無脉便不可言其無要在掌後切看脉來動者是

傷寒不可發汗

口燥舌乾者口苦咽乾者咽喉痛者吐血下血者淋血者小便淋瀝者大便瀉利者內傷勞勸者尺

脉微弱者房勞陰虛者夢遺泄精者風濕者濕溫者中暑者瘡漏者

傷寒發汗不出燻法

用發表藥汗不出將蘇葉燒湯以器盛之至於被內兩膝下燻之又法用姜袒綿裹周身擦之其汗自出此良法也

傷寒汗出不住止法

將病人髮披在水盆中足冷于外用炒麩皮糯米粉龍骨牡蠣煨為末和勻周身撲之其汗自止此

良法也

傷寒可吐

胸中懊惱者喉中有痰聲者胸滿鬱微煩者中風寒痰涎擁塞者乾霍亂心腹刺痛欲死者傷寒三四日邪在胃中者脉大胃滿多痰者下利日數行寸口脉滑者寸口脉沉伏或浮滑有痰者

傷寒不可吐

病人元氣虛羸者房勞陰虛者勞倦內傷者胎產崩漏者寸脉虛細弱無力者經水適斷適來者少

陽胆病者

傷寒吐不出探法

用梔子豉湯大瓜蒂散不得吐隨用三山丸合解毒散煎服再不吐將鸞羽在喉中探吐

傷寒吐不住止法

用炒糯米一撮生姜自然汁少許水煎服凡嘔吐止者亦用此二味入各藥中同煎服嘔吐自止如胃實嘔吐不可用

傷寒不可下

六脉虛細者嘔吐者腹中時滿時減者不轉屎氣者少阳膽病者腹如雷鳴者阳明面冷赤色者咽中閉塞者血氣兩虛者内傷勞勩者阴虛勞勩者經水適斷適來者胎前崩漏者小便清白者夾阴面赤者心下鞭者脉雖大無力者

傷寒小便不通燻法

一切小便不利先將麝香半夏填患人臍中上用葱白田螺各搗爛成餅封於臍上用布帶縛住良久下用皂夾燒烟燻入阴中其水竇自通婦人亦



用皂夾煎湯洗玉户立通

### 傷寒胸膈不寬熨法

一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大小結胃痞氣結者俱用生姜搗爛如泥去汁取粗炒熱絹包漸揉熨心胸脇下其滿痛豁然自愈如姜查冷再入姜汁再炒再熨揉之以愈為効惟熱結用冷姜查揉之不可炒熱醫當慎之又有傷寒衄血將解未及或熱極及吐血不及醫不知其證遂用涼藥之劑止住其衄血留結於心胸之分

故滿痛而成血結胸也用加味犀角地黄湯

### 妊娠傷寒護胎治

用井底泥青黛伏龍肝各為末調勻塗於孕婦脛中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

### 到傷寒家不染病法

凡入病家須避其邪氣不使染着為上以雄黃末塗鼻孔行動從客位而入男子病穢氣出於口女子病穢氣出于陰門其相對坐立之間必須識其向背

用藥寒溫合宜論

如麻黃得桂枝則能發汗芍藥得桂枝則能止汗  
黃芪得白朮則止虛汗防風得羌活則治諸風蒼  
朮得羌活則止身痛柴胡得黃芩則寒附子得乾  
姜則熱羌活得川芎則止頭疼川芎得天麻則止  
頭眩乾姜得天花粉則止消渴石膏得知母則止  
渴香薷得扁豆則消暑黃芩得連翹則消毒桑皮  
得蘇子則止喘杏仁得五味則止嗽丁香得柿蒂  
乾姜則止呃乾姜得半夏則止嘔半夏得姜汁則

回痰貝母得瓜蒌則開結痰桔梗得升麻開提血  
氣枳實得黃連則消心下痞枳殼得桔梗能使胃  
中寬知母黃柏得山梔則降火豆豉得山梔治懊  
懣辰砂得酸棗則安神白朮得黃芩則安胎陳皮  
得白朮則補脾人參得五味麥門則生腎水蒼朮  
得香附開鬱結厚朴得腹皮開膨脹草果得山查  
消肉積神曲得麥牙能消食烏梅得乾葛則消酒  
砂仁得枳殼則寬中木香得姜汁則散氣烏梅得  
香附則順氣芍藥得甘草治腹痛吳茱萸得良姜

亦止腹痛乳香得沒藥大止諸痛芥子得青皮治  
脇痛黃芪得大附子則補陽知母黃柏得當歸則  
補陰當歸得生地則生血姜汁磨京墨則止血紅  
花得當歸則活血歸尾得杏仁則破血大黃得芒  
硝則潤下皂莢得麝香則通竅訶子得肉果則止  
瀉木香得枳榔治後重澤瀉得猪苓則能利水殮  
瀉得白朮則能收濕此用藥相得之大端也

妊娠傷寒禁忌藥

玃斑水蛭及蟲

烏頭附子配天雄

野葛水銀并巴莖

牛膝薏苡與蜈蚣

三稜代赭芫花麝

大戟蛇蛻黃雌雄

礞石芒硝牡丹桂

槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草

瞿麥乾姜桃仁通

礪砂乾漆蟹甲爪

地膽茅根都不中

蒸臍法

用麝香半夏皂莢末一字填患者臍中後用生  
姜薄苜貼于臍上放大艾火于姜片上蒸二七  
壯灸關元氣海二十壯熱氣通于內逼於外陰

自退而陽自復矣

### 熨臍法

用葱頭縛一把切去葉留白根切餅二寸許連縛四五餅先將麝香硫黃二字填於臍中放葱餅于臍上以熨斗盛火于餅上熨之餅爛再換餅再熨熱氣入腹以通陽氣如大小便不利以利則止

### 中寒

中寒之邪卒時直中兩經即病如中太陰脾經用

藿香正氣散合理中湯寒甚加附子如寒中少陰腎經用五積散加茱萸寒熱足冷加附子四逆湯寒熱手足甲唇皆青舌卷囊縮脈伏絕者用蒸臍法及大劑姜附溫之不然則死矣

### 傷寒合病

三陽若與三陰合病即是兩感所以三陰無併合例也大抵傷寒二陽經合病必用二陽經藥合治三陽經合病必用三陽經藥合治

### 陰毒傷寒

咽喉不利致毒氣攻心如傷寒時氣得病一二日  
便結成陰毒或服藥後三四日或十餘日變成陰  
毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心之下  
脹滿硬如石短氣不息嘔逆唇青面黑四体如水  
身如被杖其脉沉細而疾或伏絕用陰毒甘草湯  
先進一服如人行十里再進一服取汗出乃愈蓋  
陰毒之氣隨汗而出也五六日可治七日不可治  
如湯藥不受面唇指甲皆青黑色或時鄭聲舌卷  
囊縮煩躁冷汗不止腰背眼痛此皆陰寒毒氣入  
深急用蒸臍法如手足溫煖即止知人事者生灌  
入生姜汁照前用藥不可與涼劑悞服必死

### 夾陰傷寒

陰極發躁用四逆湯合生脉散入辰砂細茶白蜜  
冷服陰利用四逆湯加人參茯苓肉桂肉果砂仁  
木通灯心升麻少許服之虛阳伏阴用加減五積  
散冷服藥服下嗑冷体既消熱性乃發熱因寒用  
也

### 寒疫

寒疫四時皆有之若初起病頭疼發熱增寒拘急  
或吐逆惡心中脘痞滿或飲食停留不化或腹中  
作痛未發熱者宜藿香正氣散加減治之若已發  
熱者十味藟蘇散汗之若身體痛骨節疼發熱者  
羌活沖和湯加蘇葱主之若有汗不得再發汗宜  
加減沖和湯主之若邪熱不解傳入裏變證者宜  
從正傷寒條內治之

### 大頭傷寒

若先發於鼻額紅腫以至兩目盛腫而不開并額  
上面部皆赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口  
乾舌燥咽喉腫痛不利脉來數大者用普濟消毒  
飲主之內實熱盛者用通聖消毒飲若發於耳之  
上下前後并頭角紅腫此屬少陽也或肌熱目瞤  
熱潮熱往來寒熱口苦咽乾目疼脇下滿宜小柴  
胡加天荅粉羌活荊芥連翹荊連主之若發於頭  
上并腦後項下及目後赤腫者此屬太陽也宜荊  
芥敗毒散主之若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻  
者以普濟消毒散外用清涼救苦散敷之治法當

先緩後急則邪伏也先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃虛食少者宜助胃氣候其大便內熱甚以大黃下之拔其毒根此緩之法蓋此毒先腫於鼻額次腫於目又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必膿也普濟消毒飲如無板藍根用大青或青黛虛人脈弱加人參引至毒處加皂角刺胃弱食少加白木橘紅如大便不通加酒浸大黃服後就卧使藥氣上行內熱用荊芥則毒散加酒炒黃芩熱盛加酒炒黃連口渴加天荅粉凡

頭面腫盛目不開鼻塞悶口乾舌燥內外有熱或咽喉腫痛不利或內實大便秘結脈洪數煩渴宜用通聖消毒散不消加牛蒡子玄參或生犀角水姜汁服凡時毒頭面赤腫咽喉噤堵寒水藥不受若臟腑素有積熱發為腫毒疔瘡一切惡瘡紅腫並宜漏蘆湯大便實加大黃芒硝凡雷頭風頭面疔瘡腫痛增寒壯熱四肢拘急狀似傷寒用清震湯治咽喉腫病用綠雲散以細竹管吹入喉中病處

食積

身不痛惡食噯氣作嘔欲吐不出惡心短氣痞滿  
腹脹胃口痛按亦痛

中濕類傷寒

太陽病關節疼痛脈沉細者此名濕痺其人小便  
不利大便反快但當利小便凡濕病頭汗出背強  
欲得被覆向火胸滿小便不利舌上白胎者此丹  
田有熱胸中有寒渴欲得水而不飲則口燥煩也  
若悞下則噦為難治若下之額上汗出微喘小便  
利者死若下利不止者亦死也

痰證類傷寒

如病人目睛微定暫時轉動目如炭煤昔肥今瘦  
喘嗽轉側半難臂痛皆痰證也痰在上部寸口脈  
浮滑痰在中部右關脈滑大痰在下部尺脈洪滑  
或痰飲發寒熱胸滿氣粗語出無倫此夾痰如見  
崇用二陳湯加蘇子枳實芩連瓜蒌貝母桔梗山  
梔前胡姜汁調辰砂溫服

內傷瘀血證發熱狀類傷寒

或被踢打相撲閃胸一時不甦過至半日或一二