


蘭室秘藏



一四三二

五

六

七

八

九


十

十一

十二

十三

十四



叢書集成

初編

主編者  
王雲五

商務印書館發行



蘭室秘藏



3 0649 1679 8

李杲撰

本館叢書集成初編所選  
濟生拔萃及古今醫統正  
脈全書皆收有此書濟生  
僅載醫方盡刪每門通論  
故據醫統本排印

蘭室秘藏目錄

卷上

飲食勞倦門

飲食所傷論

勞倦所傷論

調中益氣湯

交泰丸

木香乾薑枳朮丸

和中丸

消積滯集香丸

黃芪當歸湯

益智和中丸

脾胃虛損論

三黃枳朮丸

蘭室秘藏目錄

寬中喜食無厭丸

木香人參生薑枳朮丸

扶脾丸

檳榔丸

黃芪湯

參朮湯

益胃散

巴豆三稜丸

083  
112  
2:1442

白朮丸

草豆蔻丸

中滿腹脹門

中滿腹脹論

諸腹脹大皆屬於熱論

中滿分消丸

中滿分消湯

廣茂潰堅湯

半夏厚朴湯

破滯氣湯

草豆蔻湯

心腹痞門

消痞丸

失啞丸

黃連消痞丸

消痞湯

葶藶丸

胃脘痛門

草豆蔻丸

神聖復氣湯

麻黃豆蔻丸

酒客病論

葛花解醒湯

半夏枳朮丸

除濕益氣丸

升麻黃連丸

瓜蒂散

消渴門

消渴論

和血益氣湯

生津甘露湯

甘草石膏湯

生津甘露飲子

眼耳鼻門

諸脈者皆屬於目論

內障眼論

芎辛湯

枳朮丸

橘皮枳朮丸

除濕散

上二黃丸

當歸潤燥湯

辛潤緩肌湯

甘露膏

碧天丸

廣大重明湯

選奇湯

羌活退醫膏

復明散

吹雲膏

撥雲湯

圓明內障升麻湯

蔓荊子湯

救苦湯

益陰腎氣丸

當歸龍膽湯

瀉陰火丸

溫衛湯

鹽藥麻黃散

加味滋腎丸

百點膏

神効明目湯

明目細辛湯

助陽和血湯

防風飲子

神効黃芪湯

黃芩黃連湯

歸葵湯

熟乾地黄丸

羌活退醫丸

補陽湯

升陽柴胡湯

圓明膏

療本滋腎丸

退醫膏



卷中

頭痛門

頭痛論

龍膽飲子

羌活退腎湯

麗澤通氣湯

禦寒湯

柴胡聰耳湯

還睛紫金丹

溫肺湯

清空膏

川芎散

碧雲散

清上瀉火湯

細辛散

養神湯

半夏白朮天麻湯

口齒咽喉門

微清膏

白芷散

羌活清空膏

補氣湯

羌活湯

安神湯

口齒論

羌活散

麻黃散

治蟲散

蠟梢散

刷牙藥

當歸龍膽散

細辛散

牢牙散

神功丸

神驗法

嘔吐門

丁香茱萸湯

補肝湯

衄血吐血門

草豆蔻散

麝香散

益智木律散

白牙散

獨聖散

牢牙地黃散

立効散

清胃散

桔梗湯又方

白朮湯

吳茱萸丸

麥門冬飲子

麻黃桂枝湯

三黃補血湯

止衄血法

腰痛門

川羌肉桂湯

破血散疼湯

蒼朮湯

緩筋湯

蒼朮復煎散

婦人門

經閉不行有三論

經漏不止有三論

升陽除濕湯

酒煮當歸丸

人參飲子

黃芪芍藥湯

救脈湯

獨活湯

地龍散

麻黃復煎散

拈痛湯

羌活蒼朮湯

涼血地黃湯

固真丸

烏藥湯

助陽湯

水府丹

丁香膠艾湯

黃芪當歸人參湯

當歸芍藥湯

柴胡調經湯

益胃升陽湯

升陽舉經湯

半產暈用寒涼之藥論

全生活血湯

當歸附子湯

調經補真湯

坐藥龍鹽膏

勝陰丹

迴陽丹

柴胡丁香湯

延胡苦練湯

桂附湯

人參補氣湯

黃芪白朮湯

白朮茯苓湯

增味四物湯

補經固真湯

溫衛補血湯

立効散

四聖散

溫經除濕湯

卷下

補氣升陽和中湯

麻黃桂枝升麻湯

大便結燥門

大便結燥論

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽湯

活血潤燥丸

潤腸湯

小便淋閉門

小便淋閉論

通關丸

清肺飲子

導氣除燥湯

腎疸湯

痔漏門

痔漏論

秦朮白朮丸

秦朮蒼朮湯

七聖丸

秦艽防風湯

秦艽羌活湯

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

龍膽瀉肝湯

清震湯

固真湯

清寬湯

椒粉散

補肝湯

溫腎湯

延胡丁香丸

瀉痢門

訶子皮散

升麻補胃湯

升陽去熱和血湯

益智和中湯

芍藥藥皮丸

和中益胃湯

槐花散

茯苓湯

黃芪補胃湯

升陽除濕湯

人參益胃湯

升麻補胃湯

瘡瘍門

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

黍粘子湯

淨液湯

消腫湯

內托羌活湯

升麻托裏湯

內托黃芪湯

柴胡通經湯

白芷升麻湯

保生救苦散

一上散

聖愈湯

獨聖散

黃芪肉桂柴胡酒煎湯

雜病門

安神丸

硃砂安神丸

補氣湯

當歸補血湯

柴胡升麻湯

火鬱湯

小黃丸

黃芩利膈丸

補益腎肝丸

太陽經嚏藥

麻黃茱萸湯

黃芪湯

除濕補氣湯

參歸湯

升陽湯

自汗門

自汗論

調衛湯

清燥湯

當歸六黃湯

紅豆散

活血通經湯

瀉榮湯

人參益氣湯

導氣湯

補中湯

麻黃蒼朮湯

上清湯

朮桂湯

正氣湯

趁痛丸



退熱湯

天麻黃芪湯

白朮除濕湯

瀉血湯

瑩肌如玉散

小兒門

治驚論

黃芪湯

升陽益血湯

補陽湯

塌氣退黃湯

消痞丸

癍疹論

消毒救苦散

黍粘子湯

解表升麻湯

健步丸

加味四君子湯

洗面藥

面油摩風膏

益黃散

厚腸丸

大蕪荑湯

中滿分消丸

桔梗湯


麻黃柴胡升麻湯

# 蘭室秘藏卷上

## 飲食勞倦門

### 飲食所傷論

陰陽應象論云。水穀之寒熱。感則害人六府。痺論云。陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃乃傷。此乃混言之也。分之爲二。飲也。食也。飲者。水也。無形之氣也。因而大飲。則氣逆形寒。飲冷則傷肺。病則爲喘。咳。爲腫滿。爲水瀉。輕則當發汗利小便。使上下分消其濕。解醒湯。五苓散。生薑半夏枳實白朮之類是也。如重而畜積爲滿者。芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之。此其治也。食者。物也。有形之血也。如生氣通天論云。因而飽食。筋脈橫解。腸澀爲痔。又云。食傷太陰厥陰。寸口大於人迎兩倍三倍者。或嘔吐。或痞滿。或下痢。腸澀。當分寒熱輕重而治之。輕則內消。重則除下。如傷寒物者。半夏神麴乾薑三稜廣朮巴豆之類主之。如傷熱物者。枳實白朮青皮陳皮麥蘖黃連大黃之類主之。亦有宜吐者。陰陽應象論云。在上者因而越之。瓜蒂散之屬主之。然而不可過劑。過劑則反傷腸胃。蓋先因飲食自傷。又加以藥過。故腸胃復傷。而氣不能化。食愈難消矣。漸至羸困。故五常政大論云。大毒治病。十去其六。小毒治病。十去其七。凡毒治病。不可過之。此聖人之深戒也。



不撰

勞倦所傷論

調經篇云。陰虛生內熱。岐伯曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。而胃氣熱。熱氣薰胸中。故內熱。舉痛論云。勞則氣耗。勞則喘且汗出。內外皆越。故氣耗矣。夫喜怒不節。起居不時。有所勞傷。皆損其氣。氣衰則火旺。火旺則乘其脾土。脾主四肢。故因熱無氣以動。懶於語言。動作喘乏。表熱自汗。心煩不安。當病之時。宜安心靜坐。以養其氣。以甘寒瀉其熱火。以酸味收其散氣。以甘溫補其中氣。經言勞者溫之。損者溫之者是也。金匱要略云。平人脈大爲勞。脈極虛亦爲勞矣。夫勞之爲病。其脈浮大。手足煩熱。春夏劇。秋冬差。脈大者。熱邪也。極實者。氣損也。春夏以黃芪建中湯治之。此亦溫之之意也。夫上古聖人飲食有節。起居有常。不妄作勞。形與神俱。百歲乃去。此謂治未病也。今時之人。去聖人久遠。則不然。飲食失節。起居失宜。妄作勞役。形氣俱傷。故病而後藥之。是治其已病也。推其百病之源。皆因飲食勞倦。而胃氣元氣散解。不能滋榮百脈。灌溉臟腑。衛護周身之所致也。故蒼天之氣。貴清靜。陽氣惡煩勞。噫。飲食喜怒之間。寒暑起居之際。可不慎歟。

調中益氣湯

治因飢飽勞役。損傷脾胃。元氣不足。其脈弦洪緩而沉。按之中之下。得時一澀。其證四肢滿悶。肢節疼痛。難以屈伸。身體沉重。煩心不安。忽肥忽瘦。四肢懶倦。口失滋味。腹難舒伸。大小便清利而數。或上飲下便。或大便澀滯。或夏月糞泄。米穀不化。或便後見血。或便見白膿。胸滿短氣。咽膈不通。痰唾稠粘。口

中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安臥不思飲食並皆治之

橘皮如腹中氣不轉運如木香一分如無此證不加

黃蘗酒洗已上各貳分

升麻此一味為上氣不足胃氣與脾氣下流乃補上氣健陰引陽

柴胡已上各參分

人參有嗽者去

炙甘草

蒼朮已上各伍分

黃芪壹錢

如是顯熱躁是下元陰火蒸蒸然發也加生地黃貳分黃蘗參分

如大便虛坐不得或大便了而不了腹中常常逼迫皆是血虛血澀加當歸身參分無此證則去之

如身體沉重雖小便數多亦加茯苓貳分黃蘗參分澤瀉伍分蒼朮壹錢時暫從權而去濕也不可常用

兼足太陰已病其脈亦絡於心中故顯濕熱相合而生煩亂

如胃氣不和加湯洗半夏伍分生薑參片有嗽者加生薑生地黃貳分以製半夏之毒

如痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰脾邪所作也如兼躁熱加黃蘗生地黃各貳分

如無已上證。只服前藥。

右件劉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎去粗。稍熱。食遠服之。寧心絕慮。靜坐少語。藥必為効耳。

如夏月須加白芍藥叁分。

如春月腹中痛尤宜加。

如惡熱而渴。或腹痛者。更加芍藥伍分。生黃芩貳分。

如惡寒腹痛。加中桂叁分。去黃芩。謂之桂枝芍藥湯。亦於前藥中加之。

如冬月腹痛。不可用芍藥。蓋大寒之藥也。只加乾薑貳分。或加半夏伍分。以生薑少許製之。

如秋冬之月。胃脈四道為衝脈所逆。脇下少陽脈二道而反上行。名曰厥逆。其證氣上衝咽不得息。而喘

息有音不得臥。加吳茱萸伍分至壹錢。湯洗去苦。觀厥氣多少而用之。亦於前藥中作一服服之。

如夏月有此證。為大熱也。此病隨四時為寒熱溫涼也。宜以

黃連酒洗。

黃蘗酒浸。

知母酒浸已上各等分。

右為細末。熟湯為丸。如梧桐子大。每服一百丸。或二百丸。白湯送下。空心服。仍多飲熱湯。服畢少時。便

以美食壓之。使不令胃中停留。直至下元。以瀉衝脈之邪也。大抵治飲食勞倦所得之病。乃虛勞七損

證也。常宜以甘溫平之。甘多辛少。是其治也。

寬中喜食無厭丸。一名寬中進食丸。

資形氣喜飲食。

木香 伍分

乾生薑 已上各壹錢

澤瀉

白朮 已上各貳錢

枳實肆錢

半夏柒錢

右為細末湯浸餛飩餅為丸如梧桐子大每服三五十九米湯下食遠。

交泰丸

升陽氣瀉陰火調榮氣進飲食助精神寬腹脇除怠惰嗜臥四肢沉困不收。

乾薑 炮製叁分

肉桂 去皮已上各壹錢

白朮 已上各壹錢

苦練酒 煮

川烏 炮製去皮膚肆錢伍分

青皮

炙甘草 壹錢伍分

檳榔

縮砂仁

草豆蔻仁 伍錢

大麥蘖麵 壹兩炒

巴豆霜 伍分

柴胡 去苗

厚朴 去皮炒叁錢秋冬加柒錢

縮砂仁 已上各壹錢

吳茱萸 湯洗伍錢

人參

白茯苓

橘皮

豬苓 已上各貳錢伍分

神麴 伍錢伍分炒

人參 去苳

小椒 炒去汗子并閉目

白茯苓

知母 肆錢一牛酒炒一牛水洗春夏用秋冬去

皂角 水洗燬去皮

紫苑去苗已上  
各陸錢

黃連去鬚  
減壹錢  
伍分  
秋冬

右除巴豆霜別研外同為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九溫水送下食遠虛實加減

木香人參生薑枳朮丸

開胃進飲食

乾生薑貳錢  
伍分

木香叁錢

人參伍錢

陳皮肆錢

枳實壹兩

白朮壹兩  
伍錢

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三五十九溫水下食前

木香乾薑枳朮丸

破除寒滯氣消寒飲食

木香叁錢

乾薑伍錢

枳實壹兩

白朮壹兩  
伍錢

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服三五十九溫水送下食前

扶脾丸

治脾胃虛寒腹中痛瀉瀉無度飲食不化

乾生薑

肉桂已上各  
伍分

乾薑

霍香

茯苓

訶子皮

大麥蘖炒

和中丸

右為細末。荷葉燒飯為丸。如梧桐子大。每服五十九。白湯送下。食前。

補胃進食。

人參

乾木瓜貳錢

乾生薑

炙甘草叁錢

陳皮已上各壹錢

檳榔丸

破滯氣。消飲食。

炙甘草壹錢

檳榔已上各貳錢

木香

陳皮伍錢

人參

右為細末。湯浸餛餅為丸。如梧桐子大。每服五十九。白湯下。食前。

紅豆已上各壹錢

橘皮

炙甘草

神麴已上各肆錢

白朮

半夏

烏梅肉已上各貳錢



消積滯集香丸

治傷生冷硬物不消。

京三稜

廣茂

青皮

陳皮

丁香皮

益智

川練子

茴香已上各壹兩

巴豆和皮米炒伍錢

右為細末，醋糊為丸，如菉豆大，每服五七丸，溫水生薑湯任下，食前服。

黃芪湯

補胃除濕，和血益血，滋養元氣。

木香氣通去之

藿香葉已上各壹錢

當歸酒洗

陳皮已上各貳錢

人參

澤瀉已上各伍錢

黃芪壹兩

右咬咀，每服五錢，水二大盞，煎至一盞，如欲汗加生薑煎，食遠熱服之。

黃芪當歸湯

治熱上攻頭目，沿身胸背發熱。

當歸身壹錢酒洗

黃芪伍錢

右咬咀。作一服。水二大盞。煎至一盞。食前熱服。  
參朮湯

治脾胃虛弱。元氣不足。四肢沉重。食後昏悶。

黃蘗酒浸。

當歸已上各 貳分。

升麻已上各 參分。

人參

青皮已上各 伍分。

神麩末柒分

蒼朮已上各 壹錢。

黃芪貳錢

右咬咀。都作一服。水二大盞。煎至一盞。食遠服。

益智和中丸李秋合

木香

黃連

黃芪

人參

神麩末

當歸身

陳皮

姜黃已上各 伍分。

桂花壹錢

桂枝壹錢 伍分。

炙甘草貳錢 伍分。

麥蘗叁錢

柴胡

陳皮

炙甘草

生地黄已上各 貳分。

麥門冬

乾生薑

縮砂仁柒分

益智仁貳錢 貳分。

草豆蔻仁肆錢

右為細末。湯浸餛餅為丸。如梧桐子大。每服五十九。白湯下。細嚼亦當。

益胃散

治因服寒藥過多。以致脾胃虛損。胃脘疼痛。

人參

甘草

縮砂仁

厚朴已上各  
貳錢

白豆蔻

姜黃

乾生薑

澤瀉已上各  
參錢

益智仁陸錢

黃芪

陳皮已上各  
柒錢

右為麤末。每服三錢。水二盞。生薑五片。煎至一盞。去粗。食前溫服。

脾胃虛損論

易水張先生常戒不可峻利。食藥下咽。未至藥丸施化。其標皮之力始開。便言快也。所傷之物已去。若更待一兩時辰許。藥盡化開。其藥峻利。必有情性。病去之後。脾胃既損。是真氣元氣敗壞。促人之壽。當時設下一藥。枳實一兩。麩炒黃色為度。白朮二兩。只此二味。荷葉裹燒飯為丸。以白朮甘溫。甘溫補脾胃之元氣。其苦味除胃中之濕熱。利腰臍間血。故先補脾胃之弱。過於枳實剋化之藥一倍。枳實味苦寒。泄心下之痞悶。消化胃中所傷。此一藥下胃。其所傷不能即去。須待一兩時辰許。食則消化。是先補其虛。而後化其所傷。則不峻利矣。當是之時。未悟用荷葉燒飯為丸之理。老年味之始得。可謂奇矣。荷葉之物。中央空。

象震卦之體。震者動也。人感之生足少陽甲膽者風也。生化萬物之根蒂也。內經云。屬端於始。序則不愆。人之飲食入胃。營氣上行。卽少陽甲膽之氣也。其手少陽三焦經。人之元氣也。手足經同法。便是少陽元氣生發也。胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也。異名雖多。止是胃氣上升者也。荷葉之體。生於水土之下。出於污濺之中。非汚所染。挺然獨立。其色青。形乃空。青而象風。木者也。食藥感此氣之化。胃氣何由不上升乎。其主意用此一味爲引用。可謂遠識深慮。合於道者也。更以燒飯和藥。與白朮協力。滋養穀而補令胃厚。再不至內傷。其利廣矣。大矣。若內傷脾胃辛熱之物。酒肉之類。自覺不快。覓藥於醫。醫者亦不問所傷。付之集香丸。小丁香丸。巴豆大熱藥之類。下之。大便下則物去。遺留食之熱性。藥之熱性。重傷元氣。則七神不熾。經云。熱傷氣。正謂此也。其人必無氣以動而熱困。四肢不舉。傳變諸疾。不可勝數。使人真氣自此衰矣。若傷生冷硬物。世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之。隨藥下。所傷去矣。遺留食之寒性。藥之寒性。重瀉其陽。陽去則皮膚筋肉血脈無所倚。便爲虛損之證。論言及此。令人寒心。夫辛辣薄味之藥。無故不可亂服。非止牽牛而已。至真要大論云。五味入口。各先逐其所喜攻。攻者。尅伐瀉也。辛味下咽。先攻瀉肺之五氣。氣者。真氣元氣也。其牽牛之辛辣猛烈。傷人尤甚。飲食所傷腸胃。口當以苦泄其腸胃可也。肺與元氣何罪之有。用牽牛大罪有五。此其一也。況胃主血。所生病爲所傷物者。有形之物也。皆是血病。瀉其氣。其罪二也。且飲食傷之於中焦。止合尅化消導其食。重瀉上焦肺中已虛之氣。其罪三也。食傷腸胃。當塞因塞用。又曰。寒因寒用。枳實大黃苦寒之物。以泄有形是也。反以辛辣牽牛散瀉真氣。大禁四也。

殊不知鍼經有云。外來客邪風寒。傷人五臟。若誤瀉胃氣必死。誤補亦死。其死也無氣以動。故靜。若內傷腸胃而反瀉五臟必死。誤補亦死。其死也陰氣有餘。故躁。今內傷腸胃。是謂六腑不足之病。反瀉上焦虛無肺氣。肺者五臟之一數也。雖不即死。若更旬日之間。必暗損人壽數。謂如人壽應百歲。爲牽牛之類。朝損暮損。其元氣消耗。不得終其天年。但人不覺耳。將爲天年已盡。此乃暗裏折人壽數。故特著此論。并方庶令四海聞而行之。不至天橫耳。此老夫之用心也。胃氣不可不養。復明養胃之理。內經云。安穀者昌。絕穀者亡。水去則榮散。穀消則衛亡。榮散衛亡。神無所依。仲景云。水入於經。其血乃成。穀入於胃。脈道乃行。故血不可不養。胃不可不溫。血養胃溫。榮衛將行。常有天命。穀者身之大柄也。書與周禮皆云。金木水火土穀惟脩。以奉養五臟者也。內傷飲食。固非細事。苟安服食藥而輕生殞命。其可乎哉。黃帝鍼經有說。胃惡熱而喜清冷。大腸惡清冷而喜熱。兩者不和。何以調之。岐伯曰。調此者。食飲衣服。亦欲適寒溫。寒無淒泄。暑無汗。飲食者熱無灼灼。寒無淒淒。寒溫中適。故氣將持。乃不致邪僻也。是必有因用。豈可用俱寒俱熱之藥。倉卒致損。與以刃殺人者何異。內經說內傷者。其氣口脈反大於人迎一倍二倍三倍。分經用藥。又曰。上部有脈。下部無脈。其人當吐不吐者死。如但食不納。惡心欲吐者。不問一倍二倍。不當正與瓜蒂散吐之。但以指或以物探去之。若所傷之物去不盡者。更診其脈。問其所傷。以食藥去之。以應塞因塞用。又謂之塞因塞用。泄而下降。乃應太陰之用。其中更加升發之藥。令其元氣上升。塞因通用。因曲而爲直。何爲曲。內傷胃氣是也。何爲直。因而升發胃氣是也。因其飲食之內傷。而使生氣增益。胃氣完復。此乃因

曲而爲之直也。若分經用藥，其所傷之物，寒熱溫涼，生硬柔輒，所傷不一，難立定一法，只隨所傷之物不同，各立治法。臨時加減用之。其用藥又當問病人從來稟氣盛衰，所傷寒物熱物是喜食之耶，不可服破氣藥。若乘飢困而傷之耶，當益胃氣，或爲人所勉勸強食之，宜損血而益氣也。診其脈候，傷在何臟，可與對病之藥，豈可妄瀉天真元氣，以輕喪身寶乎？且如先食熱物而不傷，繼之以寒物，因後食致前食亦不消化而傷者，當問熱食寒食孰多孰少，斟酌與藥，無不當矣。喻如傷熱物二分，寒物一分，則當用寒藥二分，熱藥一分，相合而與之，則榮衛之氣必得周流，更有或先飲酒而後傷寒冷之食，及傷熱食冷水與冰，如此不等，皆當驗其節次所傷之物，酌量寒熱之劑分數，各各對證與之，無不取効。自忖所定藥方，未敢便謂能盡性藥之理，姑用指迷辯惑耳。

### 三黃枳朮丸

治傷肉濕麵辛辣味厚之物，填塞悶亂不快。

枳實鐵炒伍錢

黃連去鬚酒洗

大黃濕紙裹

神麴炒

橘皮

白朮已上各壹兩

黃芩貳兩

右爲極細末，湯浸餅爲丸，如菉豆一倍大，每服五十九，白湯下。臨時量所傷多少加減服之。

巴豆三稜丸一名木香見現丸。

治傷生冷硬物，心腹滿悶疼痛。

巴豆霜 伍分

木香 貳錢

升麻

柴胡 已上各 參錢

草豆蔻 麵裹用仁 熟

香附子 各伍錢 炒已上

神麴 炒黃 色

石三稜 煨去皮

京三稜 各壹兩 煨已上

右爲細末，湯浸餛餅爲丸，如菉豆一倍大，每服一二十九，溫白湯下，量所傷多少加減服之。

白朮丸

治傷豆粉濕麵油膩之物。

白礬 錢 枯參

黃芩 伍錢

橘皮 柒錢

神麴 炒黃 色

半夏 湯洗 七次

白朮 已上各 壹兩

枳實 炒黃 色 壹兩 壹錢

右爲極細末，湯浸餛餅爲丸，如菉豆大，每服三五十九，白湯下，素食多用乾薑，故加黃芩以瀉之。

草豆蔻丸

治秋冬傷寒冷物，胃脘當心而痛，上支兩脇，咽膈不通。

炒鹽 伍分

乾生薑

青皮

橘皮 已上各 貳錢

麥蘖 麵炒黃 色

生黃芩 冬月 不用

半夏湯洗七次

白朮已上各壹兩

神麴炒已上各伍錢

枳實麸炒貳兩

草豆蔻麴去皮取仁

右為極細末。湯浸餛餅為丸。如棗豆大。每服五十九。白湯下。

### 中滿腹脹門

#### 中滿腹脹論

六元政紀論云。太陰所至為中滿。太陰所至為畜滿。諸濕腫滿。皆屬脾土。論云。脾乃陰中之太陰。同濕土之化。脾濕有餘。腹滿食不化。天為陽為熱。主運化也。地為陰為濕。主長養也。無陽則陰不能生化。故云藏寒生滿病。調經篇云。因飲食勞倦。損傷脾胃。始受熱中。末傳寒中。皆由脾胃之氣虛弱。不能運化精微。而制水穀。聚而不散。而成脹滿。經云。腹滿臍脹。支膈臑脇。下厥上胃。過在太陰陽明。乃寒濕鬱遏也。脈經所謂胃中寒則脹滿者是也。鍼經三卷雜病第八腹滿大便秘。上走胸噎。喘息喝喝然。取足少陰。又云。脹取三陽。三陽者。足太陽寒水為脹。與通評虛實論說腹暴滿。按之不下。取太陽經絡。胃之募也。正同。取者瀉也。經云中滿者瀉之於內者是也。宜以辛熱散之。以苦瀉之。淡滲利之。使上下分消其濕。正如開鬼門。潔淨府。溫衣繆刺其處。是先瀉其血絡。後調其真經。氣血平。陽布神清。此治之正也。或曰。諸脹腹大。皆屬於熱者何也。此乃病機總辭。假令外傷風寒有餘之邪。自表傳裏。寒變為熱。而作胃實腹滿。仲景以大承氣湯治之。亦有膏粱之人。濕熱鬱於內而成脹滿者。此熱脹之謂也。大抵寒脹多而熱脹少。治之者宜詳辨之。



諸腹脹大皆屬於熱論

諸腹脹大皆屬於熱。此乃八益之邪有餘之證。自天外而入。是感風寒之邪傳裏。寒變爲熱。作胃實。日晡潮熱。大渴引飲。譫語。是太陽陽明并大實大滿者。大承氣下之。少陽陽明微滿實者。小承氣下之。泄之則脹已。此之謂也。假令痲瘡爲脹滿。亦有寒脹熱脹。是天之邪氣傷暑而得之。不卽時發。至秋暑氣衰絕而瘡病作矣。知其寒也。局方用交解飲子者是也。內虛不足。寒濕令人中滿。及五臟六腑俱有脹滿。更以脈家寒熱多少較之。胃中寒則脹滿。濁氣在上。則生臘脹。取三陽。三陽者。足太陽膀胱寒水爲脹。腹暴滿。按之不下。取太陽經絡者。胃之募也。正同腹滿臘脹。肢膈胘脇。下厥上冒。過在太陰陽明。胃中寒濕鬱遏也。太陰臘脹。復不利。不欲食。食則嘔。不得臥。按所說寒脹之多如此。中滿治法。當開鬼門。潔淨府。開鬼門者。謂發汗也。潔淨府者。利小便也。中滿者。瀉之於內。謂脾胃有病。當令上下分消其濕。下焦如瀆。氣血自然分化。不待泄滓穢。如或大實大滿。大小便不利。從權以寒熱藥下之。或傷酒濕麵及味厚之物。膏粱之人。或食已便臥。使濕熱之氣不得施化。致令腹脹滿。此脹亦是熱脹。治熱脹分消丸主之。如或多食寒涼。及脾胃久虛之人。胃中寒則脹滿。或藏寒生滿病。以治寒脹中滿分消湯主之。

中滿分消丸

治中滿熱脹。鼓脹。氣脹。水脹。此非寒脹類。

白朮

人參

炙甘草

豬苓皮去黑

乾生薑

橘皮已上各

黃連淨炒

厚朴壹兩

姜黃已上各

砂仁已上各

知母炒肆錢

半夏湯洗七次

白茯苓去皮

澤瀉

黃芩去腐炒夏用

枳實炒已上各伍錢

右除茯苓澤瀉生薑外，共為極細末，入上三味和勻，湯浸餛飩餅為丸，如梧桐子大，每服一百丸，焙熱白湯下，食遠服，量病人大小加減。

中滿分消湯

治中滿寒脹，寒疝，大小便不通，陰躁，足不收，四肢厥逆，食入反出，下虛中滿，腹中寒，心下痞，下焦躁，寒沉厥，奔豚不收。

川烏

人參

生薑

乾薑

半夏

澤瀉

青皮

麻黃

葶澄茄已上各

茯苓

黃連

當歸

柴胡

益智仁

木香

升麻已上各參分

黃芪

吳茱萸

厚朴

草豆蔻仁

黃蘗已上各伍分

右劉如麻豆大都作一服。水二大盞煎至一盞。食前熱服。忌房室酒濕麵生冷及油膩等物。

廣茂潰堅湯

治中滿腹脹。內有積聚。堅硬如石。其形如盤。令人不能坐臥。大小便澀滯。上喘氣促。面色痿黃。通身虛腫。

廣茂

紅花

升麻

吳茱萸已上各貳分

生甘草

柴胡

澤瀉

神麴

青皮

陳皮已上各叁分

厚朴生用

黃芩

黃連

益智仁

草豆蔻仁

當歸梢已上各伍分

半夏柒分

如渴加

葛根肆分

右劉如麻豆大。水二大盞煎至一盞。稍熱服。食遠。忌酒醋濕麵。服二服之後。中滿減半止。有積不消。再

服後藥

半夏厚朴湯

紅花

乾生薑

青皮已上各  
貳分

白茯苓

陳皮

生甘草已上各  
參分

豬苓

厚朴捌分

昆布少許

如渴加

葛根參分

右咬咀作一服。水三盞。煎至一盞。去粗稍熱服。此藥二服之後。前證又減一半。却於前藥中加減服之。  
破滯氣湯一名木香化滯散。

蘇木已上各  
半分

黃連已上各  
壹分

肉桂

澤瀉

生黃芩

京三稜

升麻已上各  
肆分

半夏壹錢

吳茱萸

木香

蒼朮

柴胡

草豆蔻仁

當歸消

神麴一分

桃仁柒箇

破滯氣治心腹滿悶。

炙甘草肆分。

陳皮

白茯苓

人參

木香

白檀

大腹子

桔梗已上各伍分

青皮

姜黃

霍香

白豆蔻仁

砂仁

檳榔

白朮已上各貳錢

右咬咀每服三錢水二盞煎至一盞去粗溫服不拘時。

草豆蔻湯

治腹中虛脹。

澤瀉壹分。

半夏製

黃芪春夏去之

青皮

當歸已上各柒分

木香叁分。

枳實

益智

陳皮已上各陸分

神麴肆分。

草豆蔻仁

甘草已上各伍分

茯苓

右為麤末都作一服水二大盞生薑三片煎至一盞去粗溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥食

遠。

心腹痞悶

消痞悶

治心下痞悶。一切所傷。及積年不愈者。

乾生薑

神麴炒

豬苓貳錢五分

澤瀉

砂仁已上各

半夏湯洗七次

人參已上各

枳實炒

黃芩已上各

姜黃

白朮已上各

右爲細末。湯浸餛餅爲丸。如梧桐子大。每服五七十九至百丸。白湯送下。食遠服。

失啖丸一名枳實消痞丸。

治右關脈弦。心下虛痞。惡食懶倦。開胃進飲食。

乾生薑壹錢

炙甘草

麥蘖麵

白茯苓

白朮已上各

半夏麴

人參已上各

厚朴炙

枳實

黃連已上各伍錢

右為細末湯浸餛餅為丸。梧桐子大。每服五七十九。白湯下。食遠服。

黃連消痞丸

治心下痞滿。壅滯不散。煩熱喘促不安。

澤瀉

姜黃已上各壹錢

炙甘草

茯苓

陳皮伍錢

豬苓已上各伍錢

半夏玖錢

黃連壹兩

右為細末。湯浸餛餅為丸。如梧桐子大。每服五十九。溫湯下。食遠。

消痞湯 一名木香化滯湯

治因憂氣鬱結中脘。腹皮裏微痛。心下痞滿。不思飲食。

枳實炒

當歸梢已上各貳分

生薑

木香已上各叁分

草豆蔻

炙甘草已上各伍分

紅花少許

乾生薑貳錢

白朮已上各叁錢

枳實柒錢

黃芩炒貳兩

陳皮

柴胡肆分

半夏壹錢

右爲纒末作一服水二盞生薑三片煎至一盞食遠服忌酒濕麵  
葶藶丸一名人參順氣飲子

治心下痞胸中不利

半夏洗

厚朴炙

石膏

青皮已上各伍分

當歸身染分

白豆蔻仁

縮砂

茵陳酒製

乾葛已上各壹錢

炙甘草

羌活

黃芩一半酒洗

苦葶藶酒洗炒

人參

柴胡

獨活已上各參錢

右爲細末湯浸餗餅和勻篩子內擦如米大每服二錢臨臥用一口湯下

胃脘痛門

### 草豆蔻丸

治脾胃虛弱而心火乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱寒水旺時子能令母實以致肺金大腸相輔而來剋心乘脾胃此大復讎也經云大勝必大復理之常也故皮毛血脈分肉之間元氣已絕於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛大惡



風寒目時眩不欲開腹中為寒水反乘痰唾沃沫食則反出腹中常痛心胃作痛脇下縮急有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腹中鳴此脾胃虛之至極也胸中氣亂心煩不安而為霍亂之漸咽膈不通極則噎塞有聲喘喝閉塞或於日陽處或於暖室中少緩口吸風寒之氣則復作四肢厥逆身體沉重不能轉側頭不可以回顧小便澀而時躁此藥主之秋冬寒涼大復氣之藥也

神麴末

柴胡詳脇下痛多用之

姜黃已上各肆分

當歸身

青皮已上各陸分

黃芪

人參

益智仁

吳茱萸湯洗焙乾

陳皮

白僵蠶已上各捌分

澤瀉小便數減牛

半夏已上各壹錢洗

甘草生陸分熟陸分

麥蘖麵壹錢伍分炒

草豆蔻仁麴裝燒熟為度壹錢肆分

桃仁染筒湯浸去皮尖

右除桃仁別研如泥餘為細末同研勻湯浸餗餅為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下食遠服

神聖復氣湯

治復氣乘冬足太陽寒水足少陰腎水之旺子能令母實手太陰肺實反來剋土火木受邪腰背胸膈閉塞疼痛善噎口中涎目中泣鼻中流濁涕不止或如息肉不聞香臭欬嗽痰沫上熱如火下寒如冰頭作陣痛目中溜火視物眩暈耳聾耳鳴頭并口鼻大惡風寒喜日晴暖夜臥不安常覺痰塞咽膈不

通口不知味。兩脇縮急而痛。牙齒動搖。不能嚼物。臍腹之間及尻臀足膝。不時寒冷。前陰冷而多汗。行步欹側。起居艱難。麻木風痺。小便數。氣短喘喝。少氣不足以息。遺失無度。及婦人白帶。陰戶中大痛。牽心。面色鰲黑。男子控掣痛。牽心腹。或面色如赭。食少。大小便不調。煩心霍亂。逆氣裏急。腹不能努。或腸鳴。膝下筋急。肩脾大痛。此皆寒水來復。火土之讎也。

乾薑炮。

黑附子炮已上各叁分。

防風

人參

郁李仁另研已上各伍分。

當歸身酒洗

半夏湯洗

升麻已上各

藜本

甘草已上各捌分。

柴胡

羌活已上各壹錢。

白葵花伍朶去心剪碎

右件都作一服。水五大盞。煎至二盞。入黃芪一錢。橘紅五分。草豆蔻仁一錢。麩裏煨熟去皮一錢。同煎至一盞。再入下項藥。黃蘗三分。酒浸。黃連三分。酒浸。枳殼三分。生地黃三分。酒洗。此四味預一日另用新水浸。又以華細辛二分。川芎細末三分。薑荆子三分。作一處浸。此三味并黃蘗等煎。正藥作一大盞。不去粗。入此所浸之藥。再上火同煎至一大盞。去粗熱服。空心。又能治嚙頰。嚙唇舌。舌根強硬等證。如神。忌肉湯。宜食肉。不助經絡中火邪也。大抵腎元與膀胱經中有寒氣不足者。并宜服之。於月生月滿時食。隔三五日一服。如病急。不拘時候。

麻黃豆蔻丸

治客寒犯胃，心胃大痛不可忍。

木香

青皮

紅花

厚朴已上各  
貳分

蘇木叁分

華澄茄肆分

升麻

半夏湯洗

麥蘖麵

縮砂仁

黃芪

白朮

陳皮去白

柴胡

炙甘草

吳茱萸

當歸身已上各  
伍分

益智仁捌分

神麴末貳錢  
炒

麻黃下去節  
叁錢

草豆蔻仁伍錢

右為細末，湯浸餛餅為丸，如梧桐子大，每服五十九丸，白湯下，或細嚼湯下亦可。

酒傷病論

論酒大熱有毒，氣味俱陽，乃無形之物也。若傷之，則止當發散，汗出則愈矣。此最妙法也。其次莫如利小便。二者乃上下分消其濕。何酒病之有。今之酒病者，往往服酒癥丸大熱之藥下之，又有牽牛大黃下之，是無形元氣受病，反下有形陰血，乖悞甚矣。酒性大熱，已傷元氣，而復重瀉之，况亦損腎水真陰，及有形陰血，俱為不足。如此則陰血愈虛，真水愈弱，陽毒之熱大旺，反增其陰火，是謂元氣消亡，七神何依，折人

長命。雖不即死。而虛損之病成矣。金匱要略云。酒疸下之。久久爲黑疸。慎不可犯此戒。不若令上下分消。其濕。當以葛花解醒湯主之。

葛花解醒湯

木香伍分。

白茯苓

乾生薑

蓮花青皮叁錢。

葛花已上各伍錢。

人參去芦。

橘皮已上各壹錢伍分。

神麴炒。

縮砂仁

豬苓去黑皮。

白朮

澤瀉已上各貳錢。

白豆蔻仁

右爲極細末和勻。每服三錢匕。白湯調下。但得微汗。酒病去矣。此蓋不得已而用。豈可恃賴日日飲酒。此藥氣味辛辣。偶因酒病服之。則不損元氣。何者。敵酒病故也。若頻服之。損人天命。

枳朮丸

治痞。消食強胃。

枳實麸炒黃壹兩。

白朮貳兩。

右爲極細末。荷葉裹燒飯爲丸。如菉豆一倍大。每服五十九。白湯下。不拘時候。量所傷多少加減服之。半夏枳朮丸

治因冷物內傷。

半夏湯洗七次壹兩。

枳實鉄炒黃色

白朮已上各貳兩

右三味爲極細末。荷葉裏燒炊飯爲丸。如菉豆一倍大。每服五十九。白湯下。量所傷加減服之。

橘皮枳朮丸

治元氣虛弱。飲食不消。或臟腑不調。心下痞悶。

橘皮

枳實麩炒黃色各壹兩

白朮貳兩

右爲極細末。荷葉裏燒飯爲丸。如菉豆一倍大。每服五十九。白湯下。量所傷加減服之。

除濕益氣丸

治傷濕。麩心腹滿悶。肢體沉重。

紅花叁分。

蘿蔔子炒熟伍錢

枳實鉄炒黃色

黃芩生用。

神麩炒黃色

白朮已上各壹兩

右同爲細末。荷葉裏燒飯爲丸。如菉豆一倍大。每服五十九。白湯下。量所傷加減服之。

除濕散

治傷馬妳子。并牛羊酪水一切冷物。

甘草炙。

紅花已上各貳錢

半夏湯洗七次

乾生薑已上各  
叁錢

車前子

澤瀉已上各  
伍錢

茯苓柒錢

神麴炒黃色  
壹兩

右為極細末。每服三錢匕。白湯調下。食前。

升麻黃連丸

治多食肉口臭。不欲聞其穢惡氣。使左右不得近。

白檀貳錢

生甘草叁錢

蓮花青皮

升麻已上各  
伍錢

生薑取自  
然汁  
黃連去鬚  
壹兩

黃芩去腐酒  
洗貳兩

右為極細末。湯浸餛餅為丸。如彈子大。每服一九。細嚼白湯下。食後。

上二黃丸

治傷熱食痞悶。兀兀欲吐。煩亂不安。

甘草貳錢

升麻

柴胡已上各  
叁錢

黃連酒洗  
壹兩

黃芩貳兩

一方加

枳實伍錢

右爲細末。湯浸餗餅爲丸。如菉豆大。每服五十九。白湯下。食遠。

治傷冷飲者。以五苓散。每服二錢三錢。匕。加生薑煎服之。

治傷食兼傷冷飲者。煎五苓散送半夏枳朮丸。

治傷冷飲不惡寒者。腹中亦不覺寒。惟覺悶。身重食不化者。或小便利。煎去桂五苓散。依前斟酌服之。  
瓜蒂散

上部有脉。下部無脉。其人當吐不吐者死。何謂下部無脉。此謂木鬱也。飲食過飽。填塞胸中。胸中者。太陰之分。野經曰。氣口反大於人迎三倍。食傷太陰。故曰木鬱則達之。吐者是也。

瓜蒂

赤小豆已上各等分

右二味爲極細末。每服二錢匕。溫漿水調下。取吐爲度。若不至。兩手尺脉絕無。不宜使用此藥。恐損元氣。令人胃氣不復。若止是胸中窒塞。悶亂不通。以指探去之。如不得吐者。以物探去之。得吐則已。如食不去。用此藥吐之。解云。盛食填塞於胸中。爲之窒塞。兩寸脉當主事。兩尺脉不見。其理安在。胸中有食。故以吐出之。食者物也。物者坤土也。是足太陰之號也。胸中者肺也。爲物所填。肺者手太陰金也。金主殺伐也。與坤土俱在於上。而旺於天。金能剋木。故肝木生發之氣。伏於地下。非木鬱而何。吐去上焦陰土之物。木得舒暢。則鬱結去矣。食塞於上。脈絕於下。若不明天地之道。無由達此至理。水火者。陰陽之徵兆。天地之別名也。故曰獨陽不生。獨陰不長。天之用在於地下。則萬物生長矣。地之用在於天上。則

萬物收藏矣。此乃天地交而萬物通也。此天地相根之道也。故陽火之根本於地下。陰水之源本於天上。故曰水出高源。故人五臟主有形之物。物者陰也。陰者水也。右三部脈主之。偏見於寸口。食塞其上。是絕五臟之源。源絕則水不下流。兩尺竭絕。此其理也。何疑之有。假令所傷前後不同。以分爲率。傷熱物二分。傷生冷硬物一分。用寒藥三黃丸二停。熱藥巴豆三稜丸一停。合而服之。如熱物傷少而寒物傷多。則寒藥少而熱藥多也。假令夏月大熱之時。傷生冷硬物。當用熱藥巴豆三稜丸治之。須加三黃丸。謂天時不可伐。故加寒藥以順時令。若熱物只用三黃丸。何謂此三黃丸時藥也。假令冬天大寒之時。傷羊肉濕麵等熱物。當用三黃丸治之。須加熱藥少許。草豆蔻丸之類是也。爲引用又爲時藥。經云。必先歲氣。無伐天和。此之謂也。餘皆倣此。

### 消渴門

#### 消渴論

陰陽別論云。二陽結謂之消。脈要精微論云。痺成爲消中。夫二陽者。陽明也。手陽明大腸主津。病消則目黃口乾。是津不足也。足陽明胃主血。熱則消穀善飢。血中伏火。乃血不足也。結者津液不足。結而不潤。皆燥熱爲病也。此因數食甘美而多肥。故其氣上溢。轉爲消渴。治之以蘭。除陳氣也。不可服膏粱芳草石藥。其氣慄悍。能助燥熱也。越人云。邪在六腑。則陽脈不和。陽脈不和。則氣留之。氣留之。則陽脈盛矣。陽脈大盛。則陰氣不得營也。故皮膚肌肉消削是也。經云。凡治消痺。仆繫偏枯痿厥。氣滿發逆。肥貴人。則膏粱之



疾也。岐伯曰：脈實病久可治，脈弦小病久不可治。後分爲三消：高消者舌上赤裂，大渴引飲，逆調論云：心移熱於肺，傳於膈，消者是也。以白虎加人參湯治之。中消者善食而瘦，自汗，大便硬，小便數，叔和云：口乾饒飲水，多食肌亦虛，瘰成消中者是也。以調胃承氣三黃丸治之。下消者煩躁引飲，耳輪焦乾，小便如膏，叔和云：焦煩水易虧，此腎消也。以六味地黃丸治之。總錄所謂末傳能食者必發腦疽背瘡，不能食者必傳中滿鼓脹，皆謂不治之證。潔古老人分而治之，能食而渴者，白虎加人參湯，不能食而渴者，錢氏方白朮散倍加葛根治之。上中既平，不復傳下消矣。前人用藥，厥有旨哉。或曰：末傳瘡疽者，何也？此火邪勝也。其瘡痛甚而不潰，或赤水者是也。經云：有形而不痛，陽之類也；急攻其陽，無攻其陰，治在下焦。元氣得強者生，失強者死。末傳中滿者，何也？以寒治熱，雖方士不能廢其繩墨，而更其道也。然臟腑有遠近，心肺位近，宜制小其服，腎肝位遠，宜制大其服，皆適其至所爲故。如過與不及，皆誅罰無過之地也。如高消中消，制之太急速，過病所久而成中滿之病，正謂上熱未除，中寒復生者也。非藥之罪，失其緩急之制也。處方之制，宜加意焉。

和血益氣湯

治口乾舌乾，小便數，舌上赤脈，此藥生津液，除乾燥，生肌肉。

柴胡

炙甘草

生甘草 此味治口乾舌乾也。

麻黃根 已上各參分。

酒當歸梢 肆分。

酒知母

酒漢防己

酒生地黃柒分

升麻已上各壹錢

紅花少許

羌活已上各伍分

酒黃連捌分治舌上赤脈也

杏仁

石膏陸分治小便赤色

酒黃蘗

桃仁已上各陸箇

當歸潤燥湯

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗溫服忌熱濕麵酒醋等物。

治消渴大便閉澀乾燥結硬兼喜溫飲陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲。

細辛壹分

生甘草

炙甘草

熟地黃已上各叁分

柴胡柒分

黃蘗

知母

石膏

桃仁泥口

當歸身

麻子仁

防風

荊芥穗已上各壹錢

升麻壹錢伍分

紅花少許

杏仁陸箇

小椒叁箇

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服食遠忌辛熱物。

生津甘露湯一名清涼飲子。

治消中能食而瘦。口舌乾。自汗。大便結燥。小便頻數。

升麻肆分。

防風

漢防己

生地黄已上各伍分

柴胡

羌活

黃芪

酒知母

酒龍膽草

石膏

紅花少許

桃仁伍箇

右咬咀。都作一服。水二盞。酒一匙。煎至一盞。稍熱服。食遠。

辛潤緩肌湯一名清神補氣湯

前消渴證。纔愈。止有口乾。腹不能努。此藥主之。

生地黄

細辛已上各壹分

石膏肆分

黃蘗酒製

生甘草

知母已上各伍分

當歸身

荆芥穗

防風已上各壹錢

升麻壹錢伍分

生甘草

當歸身陸分

炙甘草

酒黃芩已上各壹錢

黃蘗已上各壹錢伍分

杏仁拾箇

熟地黄叁分

黃連酒製

柴胡柒分

桃仁

紅花少許

杏仁陸箇

小椒貳箇

右咬咀都作一服。水二大盞。煎至一盞。食遠。稍熱服之。

甘草石膏湯

渴病久愈。又添舌白沫。微腫。咽喉嚙津覺痛。噎腫。時時有渴。喜冷飲。口中白沫如膠。

生地黃

細辛已上各壹分

熟地黃

黃連已上各叁分

甘草伍分

石膏陸分

柴胡柒分

黃蘗

知母

當歸身

桃仁炒去皮尖

荊芥穗

防風已上各壹錢

升麻壹錢伍分

紅花少許

杏仁陸箇

小椒貳箇

右如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。食後溫服。

甘露膏一名閉香飲子

治消渴飲水極甚。善食而瘦。自汗。大便結燥。小便頻數。

半夏貳分  
湯洗

熟甘草

白豆蔻仁

人參

蘭香

升麻

連翹

桔梗已上各五分

生甘草

防風已上各壹錢

酒知母壹錢五分

石膏叁錢

右為極細末湯浸餛餅和勻成劑捻作薄片子日中晒半乾擦碎如米大每服二錢淡生薑湯送下食後

生津甘露飲子

治消渴上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不能下時有腹脹或瀉黃如糜名曰餐泄渾身色黃目睛黃甚四肢痿弱前陰如冰尻髻腰背寒面生鰲色脅下急痛善噉喜怒健忘

霍香貳分

柴胡

黃連

木香已上各叁分

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香已上各伍分

萼澄茄

生甘草

山梔子

白豆蔻仁

白芷

連翹

姜黃已上各壹錢

石膏壹錢貳分

杏仁去皮

酒黃蘗已上各壹錢五分

炙甘草

酒知母

升麻

人參已上各二錢

桔梗叁錢

全蝎二箇去毒

右爲細末。湯浸餛餅。和勻成劑。捻作片子。日中晒半乾。擦碎如黃米大。每服二錢。津唾下。或白湯送下。食遠服。

### 眼耳鼻門

#### 諸脈者皆屬於目論

陰陽應象論云。諸脈者皆屬於目。目得血而能視。五臟六腑精氣皆上注於目。而爲之精。精之窠爲眼。骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲絡。其窠氣之精爲白眼。肌肉之精則爲約束。裏擱筋骨血氣之精。而與脈并爲系。上屬於腦後。出於項中。故邪中於項。因逢其身之虛。其入深則卽隨眼系。入於腦則腦轉。腦轉則引目系急。目系急則目眩以轉矣。邪中其精。其精所中。不相比也。則精散。精散則視歧。故見兩物。目者。五臟六腑之精。榮衛魂魄之所常營也。神氣之所主也。故神勞則魂魄散。志意亂。是故瞳子黑眼。法於陰。白眼赤脈發於陽。故陰陽合傳而爲精明也。目者。心之使也。心者。神之舍也。故神精亂而不轉。卒然見非常之處。精神魂魄散不相得。故曰惑也。夫十二經脈。三百六十五絡。其血氣皆上走於面而走空竅。其清陽氣上散於目而爲精。其氣走於耳而爲聽。因心事煩冗。飲食失節。勞役過度。致脾胃虛弱。心火大盛。則百脈沸騰。血脈逆行。邪害空竅。天明則日月不明矣。夫五臟六腑之精氣。皆稟受於脾。上貫於目。脾者。諸陰之首也。目者。血脈之宗也。故脾虛則五臟之精氣皆失所司。不能歸明於目矣。心者。君火也。主人之神。宜靜而安。相火化行其令。相火者。包絡也。主百脈皆榮於目。旣勞役運動。勢乃妄行。又因邪氣所并。

而損血脈。故諸病生焉。凡醫者不理脾胃。及養血安神。治標不治本。是不明正理也。

內障眼論

凡心包絡之脈。出於心中。以代心君之行事也。與少陽爲表裏。瞳子散大者。少陰心之脈挾目系。厥陰肝之脈連目系。心主火。肝主木。此木火之勢盛也。其味則宜苦宜酸宜涼。大忌辛辣熱物。以助木火之邪也。飲食中常知此理可也。夫辛主散熱則助火。故不可食。諸酸主收心氣。瀉木火也。諸苦瀉火熱則益水也。尤忌食冷水大寒之物。此則能損胃氣不行。則元氣不生。元氣不行。胃氣下流。胸中三焦之火及心火乘於肺上。入腦灼髓。火主散溢。瞳子開大。大熱之物又助火邪。此蓋不可食驗也。藥中云。芫薺子一味辛。及主益睛。辛者是助火也。故去之。乃加黃芩黃連。瀉中焦之火。芩能瀉上焦肺中之火。以酒洗之。乃塞因熱用也。又去青箱子。爲助陽火也。加五味子。以收瞳人開大。且火之與氣。勢不兩立。故內經曰。壯火食氣。氣食少火。少火生氣。壯火散氣。諸酸之物。能助元氣。孫真人云。五月常服五味。助五臟氣。以補西方肺金。法云。以酸補之。以辛瀉之。辛瀉氣則明矣。或曰。藥中有當歸。其味亦辛而甘。其不去者何。此辛甘一味。以其和血之聖藥。況有甘味。又欲以爲鄉導。爲諸藥之使耳。

芎辛湯

治兩眼晝夜隱澀難開。羞明惡日。視物昏暗。赤腫而痛。

細辛貳分。

芎藭

蔓荊子已上各伍分

甘草

白芷已上各壹錢

防風壹錢伍分

右咬咀都作一服。水二盞煎至一盞。臨臥溫服。

碧天丸一名井珠丸。

治目疾累服寒涼藥不愈。兩眼蒸熱如火之熏。赤而不痛。滿目紅絲。血脈貫睛。瞽悶昏暗。羞明畏日。或上下臉赤爛。或冒風沙而內外皆破。洗之神効。

枯白礬貳分

銅礬柒分

瓦粉炒黑壹兩

右先研白礬銅礬令細。旋旋入粉同研勻。熟水和之。共爲一百丸。每用一九。熱湯半盞。浸一二箇時辰。洗至覺微澀爲度。合半時辰許。臨臥洗之。瞑目便睡。一九可洗十遍。再用湯內坐令熱。此藥治其標。若裏實者不宜用。

### 廣大重明湯

治兩目臉赤爛。熱腫疼痛。并稍赤。及眼臉痒痛。抓之至破。眼弦生瘡。目多眵淚。隱澀難開。

龍膽草

防風

生甘草

細辛已上各壹錢

右剉如咀。內甘草不剉。只作一錠。先以水一大碗。半煎龍膽一味。至一半。再入餘三味煎。至少半碗。瀉去粗。用清帶熱洗。以重湯坐令熱。日用五七次。但洗畢合眼一時。去努肉泛長及痒亦驗。



百點膏

張濟氏眼病醫六年，以至遮瞳人，視物不明，有雲氣之狀，因用此藥而効。

蕤仁去皮尖 叁分

當歸身

甘草已上各陸分

防風捌分

黃連揀治貳錢，對如麻豆大，水一大椀，煎至一半入藥

右件對如麻豆大，蕤仁別研如泥，同熬，滴在水中不散，入去沫蜜少許，再熬少時為度，令病人心靜點之，至目中微痛，日用五七次，臨臥點尤疾効，名之曰百點膏，但欲多點，使藥力相繼也。

選奇湯

治眉痛不可忍

炙甘草夏月生用

羌活

防風已上各叁錢

酒黃芩壹錢，冬月不用此一味，如能食熟痛倍加之

右咬咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去粗，食後服之。

神効明目湯

治眼樞緊急，致倒睫拳毛，及上下瞼皆赤爛，睛疼昏暗，晝則冷淚常流，夜則眼澀難開。

細辛貳分

蔓荊子伍分

防風壹錢

葛根壹錢伍分

甘草貳錢

一方加

黃芪壹錢

右咬咀作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱。臨臥服。

羌活退賢膏 一名復明膏

治足太陽寒水膜子遮睛。白翳在上。視物不明。

椒樹東南根貳分。西北根貳分。

藜本

漢防己已上各貳分。

黃連

防風

麻黃節去根。

柴胡

升麻

生地黄已上各叁分。

生甘草肆分。

當歸身陸分。

羌活柒分。

蕤仁陸箇。

右用淨水一大碗。先煎漢防己、黃連、生甘草、當歸、生地黄。煎至一半。下餘藥。再煎至一盞。去粗。入銀石器中。再熬之。有力為度。

明目細辛湯

治兩目發赤微痛。羞明畏日。怯風寒。怕火。眼睫成紐。眵糊多。隱澀難開。眉攢腫悶。鼻塞。涕唾稠粘。大便微硬。

川芎 伍分

生地黄酒製

蔓荊子 已上各陸分

當歸梢

白茯苓

藥木 已上各壹錢

荊芥 壹錢貳分

防風 貳錢

麻黃根

羌活 已上各叁錢

細辛 少許

紅花 少許

椒擗筒

桃仁 貳拾筒

右咬咀分作四服。每服水二盞。煎至一盞。去粗稍熱。臨臥服之。忌酒醋濕麵。

復明散

治內瘡

青皮 叁分

橘皮

川芎

蒼朮 已上各伍分

炙甘草

生地黄

連翹

柴胡 已上各壹錢

黃芪 壹錢伍分

當歸身 貳錢

右剉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗稍熱服之。食後。忌酒醋濕麵辛熱大料物之類。

助陽和血湯

治眼發之後。微有上熱。白睛紅。隱澀難開。睡多眵淚。

蔓荊子 貳分

香白芷 參分

柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身酒洗

防風 已上各伍分

升麻 柒分

右咬咀都作一服。水一盞半。煎至八分。去粗。稍熱服。臨臥避風寒處睡。

吹雲膏

治目中淚。及迎風寒泣。羞明畏日。常欲閉目。喜在暗室。塞其戶牖。醫瘼歲久遮睛。此藥多點神驗。

細辛 壹分

升麻

蕤仁 已上各參分

青皮

連翹

防風 已上各肆分

柴胡 伍分

生甘草

當歸身 已上各陸分

荆芥穗 壹錢 微取 漫汁

生地黄 壹錢 伍分

揀黃連 叁錢

右咬咀。除連翹外。用澄清淨水二椀。先熬餘藥。至半椀。入連翹同熬。至一大盞許。去粗。入銀石器內。文

武火熬。滴入水成珠不散為度。入煉去沫熟蜜少許。熬勻用之。

防風飲子

治倒睫拳毛。

細辛

蔓荊子 已上各叁分

葛根

防風已上各伍分

當歸身柒分半

炙甘草

黃連

人參已上各壹錢

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。食遠服。避風寒。

撥雲湯

戊申六月。徐總管患眼疾。於上眼皮下。出黑白翳兩箇。隱澀難開。兩目緊縮。而無疼痛。兩手寸脈細緊。按之洪大無力。知足太陽膀胱為命門相火。煎熬逆行。作寒水醫。及寒瘼遮睛證。呵欠善悲。健忘噎噴。眵淚。時自淚下。面赤而白。能食。不大便。小便數。而欠上而喘。

黃芪壹分

細辛

生薑

葛根

川芎已上各伍分

柴胡柒分

荊芥穗

藜蘆

生甘草

升麻

當歸身

知母已上各伍錢

羌活

防風

黃蘗已上各壹錢伍分

右咬咀。如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗熱服。食後。

神効黃芪湯

治渾身麻木不仁。或頭面手足肘背。或腿脚麻木不仁。並皆治之。如兩目緊急縮小。及羞明畏日。隱澀。

難開或視物無力。睛痛昏花。手不得近。或自少精光。或目中熱如火。服五六次可効。

蔓荊子壹錢。

陳皮去白伍錢。

人參捌錢。

炙甘草

白芍藥已上各壹兩。

黃芪貳兩。

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。臨臥稍熱服。

如小便淋瀝。加澤瀉伍分。一服止則去。

如有大熱證。每服加酒洗黃蘗叁分。

如麻木不仁。雖有熱不用黃蘗。止加黃芪壹兩。通用三兩也。

如眼縮急。去芍藥。忌酒醋麵大料物。蔥韭蒜辛物。

如麻木甚者。加芍藥壹兩。通用二兩。

圓明內障升麻湯一名沖和養胃湯。

治內障眼得之脾胃元氣衰弱。心火與三焦俱盛。飲食不節。形體勞役。心不得休息。故上為此疾。

乾薑壹錢。

五味子貳錢。

白茯苓叁錢。

防風伍錢。

白芍藥陸錢。

柴胡柒錢。

人參

炙甘草

當歸身酒洗。

白朮

升麻

葛根已上各壹兩。

黃芪

羌活已上各壹兩伍錢

右咬咀每服五七錢水三大盞煎至二大盞入黃芩黃連貳錢同煎數沸去粗煎至一盞熱服食遠

黃芩黃連湯

黃芩酒洗炒

黃連酒洗炒

草龍膽酒洗四次炒四次

生地黃各壹兩已上

右咬咀每服二錢水二盞煎至一盞去粗熱服

蔓荊子湯

治勞役飲食不節內障眼病此方如神効

蔓荊子貳錢伍分

黃蘗酒并炒四遍

白芍藥已上各

炙甘草捌錢

黃芪

人參已上各壹兩

右咬咀每服三錢或五錢水二盞煎至一盞去粗臨臥溫服

歸葵湯一名連翹飲子

治目中溜火惡日與火隱澀難開小角緊視物昏花迎風有淚

柴胡貳分

生甘草

蔓荊子

連翹

生地黃

當歸身

紅葵花

人參已上各參分

黃芪

酒黃芩

防風

羌活已上各伍分

升麻壹錢

右咬咀，每服五錢，水二盞，煎至一盞，去粗，食後溫服。

救苦湯

治眼暴發，赤腫臉高，苦疼不任者。

桔梗

連翹

紅花

細辛已上各壹分

當歸身夏月減半

炙甘草已上各伍分

蒼朮

草龍膽已上各柒分

羌活太陽

升麻陽明

柴胡少陽

防風

藜蘆

黃連已上各壹錢

生地黃

黃藥

黃芩

知母已上各伍分

川芎參錢

右咬咀，每服一兩，水二盞，煎至一盞，去粗，食後溫服。

若苦疼則多用苦寒者，兼治本經之藥，再行加減，如睛昏加知母黃藥一倍。



熟乾地黄丸

治血弱陰虛。不能著心。致心火旺。陽火甚。瞳子散大。少陰為火。君主無為。不行其令。相火代之。兼心包絡之脈。出心系。分為三道。少陽相火之體無形。其用在其中矣。火盛則令母實。乙木肝旺是也。心之脈挾於目系。肝連目系。况手足少陽之脈。同出耳中。至耳上角。斜起於目外眥。風熱之盛。亦從此道而來。上攻頭目。致偏頭腫悶。瞳子散大。視物則花。此目血虛。陰弱故也。法當養血涼血益血。收火之散大。除風之熱。則愈矣。

人參 貳錢

炙甘草

天門冬 湯洗去心

地骨皮

五味子

枳殼 炒

黃連 已上各錢

當歸身 酒洗焙乾

黃芩 已上各錢

生地黃 酒洗柒錢五分

柴胡 捌錢

熟乾地黄 壹兩

益陰腎氣丸

右件同為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服一百丸。茶湯送下。食後日進二服。此壯水之主。以鎮陽光。

澤瀉

茯苓 已上各錢五分

生地黃 酒洗

牡丹皮

山茱萸

當歸梢 酒洗

五味子

乾山藥

柴胡已上各伍錢

熟地黄貳兩

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，硃砂為衣，每服五十九，淡鹽湯下，空心。

羌活退翳丸

治內障右眼小眦青白翳，大眦微顯白翳，腦痛，瞳子散大，上熱惡熱，大便秘澀，小便如常，遇天氣暄熱，頭痛睛脹，可服此藥。翳在大眦，加葛根升麻，翳在小眦，加柴胡羌活，是也。

黑附子炮

寒水石已上各壹錢

酒防己貳錢

知母酒炒

牡丹皮

羌活

川芎已上各叁錢

酒黃蘗

生地黄酒洗炒

丹參

羌蔚子

酒當歸身

柴胡已上各伍錢

熟地黄捌錢

芍藥壹兩叁錢

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，每服五七十九，白湯下，空心，宿食未消，待饑則服之，藥後省語言，以食壓之。

當歸龍膽湯

治眼中白翳

防風

石膏已上各壹錢伍分

柴胡

羌活

五味子

升麻已上各貳錢

甘草

酒黃連

黃芪已上各叁錢

酒黃芩炒

酒黃蘗炒

當歸身酒洗

草龍膽酒洗

芍藥已上各伍錢

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。入酒少許。臨臥熱服。忌言語。

補陽湯

治陽不勝其陰。乃陰盛陽虛。則九竅不通。令青白瞤。見於大眚。及足太陽少陰經中鬱遏。足厥陰肝經氣不得上通於目。故青白瞤。內阻也。當於太陽少陰經中九原之下。以益肝中陽氣。衝天上行。此乃先補其陽。後於足太陽太陰標中。標者。頭也。瀉足厥陰肝經火。下伏於陽中。乃次治也。內經云。陰盛陽虛。則當先補其陽。後瀉其陰。此治法是也。每日清晨。以腹中無宿食。服補陽湯。臨臥服瀉陰丸。若天色變經大寒大風。并勞役預日。飲食不調。精神不足。或氣弱。俱不可服。待體氣和平。天氣如常服之。先補其陽。使陽氣上升。通於肝經之末。利空竅於目矣。

肉桂壹錢去皮

知母炒

當歸身酒洗

生地黃酒炒

白茯苓

澤瀉

陳皮已上各

黃芪

羌活

甘草已上各

右咬咀每服五錢水二盞煎至一大盞去粗空心服之

瀉陰火丸一名連藥益陰丸

石決明存性炒

甘草

防風已上各

黃連酒炒

升陽柴胡湯

右爲細末煉蜜爲丸如菉豆大每服五十九至一百丸茶清下常多服補陽湯少服此藥多則妨飲食

肉桂伍分

防風

陳皮已上各

白芍藥

人參

獨活

柴胡貳兩

羌活

當歸梢

草決明

黃蘗

柴胡去苗壹錢伍分

白茯苓

生地黄酒炒

防風已上各

白朮

熟地黄

獨活

五味子

細黃芩

知母已上各

知母酒炒如大者

澤瀉

椿實酒炒

黃芪

人參

白朮已上各伍錢

甘草梢

當歸身

羌活

熟地黃

獨活

白芍藥已上各壹兩

右剉每服五錢水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠服。

別合一料煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十九茶清下每日與前藥各一服食遠不可飽服。

如天氣熱加五味子叁錢天門冬去心芍藥楮實已上各伍錢

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中流火氣寒血熱冷淚多臍下冷陰汗足痿弱。

陳皮

青皮

黃連

木香已上各叁分

人參

甘草炙

白芷

防風

黃蘗

澤瀉已上各伍分

黃芪

蒼朮

升麻

知母

柴胡

羌活已上各壹錢

當歸身壹錢伍分

右都作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服之。

圓明膏

治勞心過度。飲食失節。乃生內障。及腫子散大。此方收睛圓明。

訶子皮湯紙煨

甘草已上各貳錢

當歸身叁錢

柴胡

生地黃

麻黃去節搗開

黃連已上各伍錢

右七味先以水二椀煎麻黃至一椀。掠去沫。外六味各咬咀如豆大。篩去末入在內同熬。滴水中不散為度。入熟蜜少許再熬。勤點眼。

嗜藥麻黃散

治內外障眼。

麻黃壹兩

當歸身壹錢

右二味同為麤末。炒黑色。入麝香乳香少許。共為細末。含水鼻內嗜之。

療本滋腎丸

黃蘗酒炒

知母酒炒已上各等分

右為細末。滴水為丸。如梧桐子大。每服一百丸至一百五十九。空心鹽白湯下。

加味滋腎丸

肉桂參分

黃連壹錢

姜黃壹錢伍分

苦參參錢

苦葶藶酒炒

石膏勿用

黃蘗酒炒

知母酒炒各伍錢

右為極細末打薄麵糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心服白湯下食壓之

退醫膏

治黑白湯

蕤仁

升麻已上各

連翹

防風

青皮已上各

甘草

柴胡已上各

當歸身陸分

荊芥穗壹錢別浸水半

生地黄壹錢

黃連參錢

右用水一椀入前藥煎至半椀去粗更上火煎至半盞入荊芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻點之

龍膽飲子

治疔眼流膿生疔醫濕熱為病

穀精草

川鬱金

蛇退皮

炙甘草已上各

麻黃壹錢

升麻貳錢

青蛤粉

草龍膽

黃芩炒

羌活已上各  
叁錢

右爲細末每服二錢食後溫茶清調服之。

柴胡聰耳湯

治耳中乾結耳鳴耳聾。

連翹肆錢。

柴胡叁錢。

炙甘草

當歸身

人參已上各  
壹錢

水蛭伍分  
別研炒

麝香少許  
另研

虻蟲叁箇去翅  
足炒另研

右除三味別研外生薑三片水二大盞煎至一盞去粗再下三味上火煎一二沸稍熱服食遠。

羌活退醫湯

治太陽寒水醫膜遮睛不能視物。

羌活壹兩  
伍錢

防風壹兩。

荆芥穗煎成藥  
加之

薄荷葉

藜蘆已上各  
柒錢

酒知母伍錢

黃蘗肆錢。

川芎

當歸身已上  
叁錢

酒生地黄壹錢。

小椒伍分

細辛少許



麻黃貳錢用根

右咬咀每服三錢水二大盞煎至一盞半入荊芥穗再煎至一盞去粗稍熱服食遠忌酒醋濕麵等物

遠睛紫金丹

治目眶歲久赤爛俗呼為赤睛是也當以三稜針刺目眶外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立出瞖膜亦退用手法攀出內瞼向外以針刺之出血

白沙蜜貳拾兩

甘石拾兩燒七遍連水浸拌

黃丹陸兩水飛

揀連參兩小便浸碎為末

南乳香

當歸已上各參錢

烏魚骨貳錢

礪砂小盞內放於瓶口上熏乾

麝香已上各錢

白丁香直者伍分

輕粉壹字

右將白沙蜜於沙石器內慢火去沫下甘石次下丹以柳枝攪次下餘藥以粘手為度作丸如雞頭大每用一九溫水化開洗

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭

黃芪肆錢

蒼朮

羌活

獨活

葛根已上各  
叁錢

川椒

炙甘草貳錢  
白芷已上各  
壹錢

防風

升麻

麻黃不去節  
冬月加

右咬咀。每服五錢。生薑三片。棗二枚。蔥白三寸。同煎至一盞。去粗溫服。食遠。忌一切冷物及風寒涼處。坐臥行立。

溫肺湯

治鼻不聞香臭。眼多眵淚。

丁香貳分

防風

葛根

羌活已上各  
壹錢

升麻

黃芪已上各  
貳錢

麻黃不去節  
肆錢

禦寒湯

右爲麤末。水二盞。蔥白三根。煎至一盞。去粗。食後服。

治寒氣風邪傷於毛皮。令鼻壅塞。欬嗽上喘之證。

黃連

黃蘗

羌活已上各  
貳分

炙甘草

佛耳草

款冬花

白芷

人參

黃芪壹錢

防風已上各

陳皮已上各

升麻

蒼朮柒分

右咬咀。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。食後熱服。

# 蘭室秘藏卷中

## 頭痛門

### 頭痛論

金匱真言論云。東風生於春。病在肝俞。在頸項。故春氣者。病在頭。又諸陽會於頭面。如足太陽膀胱之脈。起於目內眥。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。病衝頭痛。又足少陽膽之脈。起於目銳眥。上抵頭角。病則頭角額痛。夫風從上受之。風寒傷上。邪從外入。客於經絡。令人振寒頭痛。身重惡寒。治在風池風府。調其陰陽。不足則補。有餘則瀉。汗之則愈。此傷寒頭痛也。頭痛耳鳴。九竅不利者。腸胃之所生。乃氣虛頭痛也。心煩頭痛者。病在耳中。過在手巨陽少陰。乃濕熱頭痛也。如氣上不下。頭痛癩疾者。下虛上實也。過在足少陰巨陽。甚則入腎。寒濕頭痛也。如頭半邊痛者。先取手少陽陽明。後取足少陽陽明。此偏頭痛也。有真頭痛者。甚則腦盡痛。手足寒至節。死不治。有厥逆頭痛者。所犯大寒。內至骨髓。髓者以腦為主。腦逆故令頭痛。齒亦痛。凡頭痛皆以風藥治之者。總其大體而言之也。高顛之上。惟風可到。故味之薄者。陰中之陽。乃自地升天者也。然亦有三陰三陽之異。故太陽頭痛惡風。脈浮緊。川芎、羌活、獨活、麻黃之類為主。少陽經頭痛。脈弦細。往來寒熱。柴胡為主。陽明頭痛。自汗發熱。惡寒。脈浮緩。長實者。升麻、葛根、石膏、白芷為主。太陰頭痛。必有痰。體重或腹痛。為痰癖。其脈沉緩。蒼朮、半夏、南星為主。少陰經頭痛。三陰三陽經不流行。

而足寒氣逆為寒厥。其脈沉細。麻黃、附子、細辛為主。厥陰頭項痛。或吐痰沫厥冷。其脈浮緩。吳茱萸湯主之。血虛頭痛。當歸、川芎為主。氣虛頭痛。人參、黃芪為主。氣血俱虛頭痛。調中益氣湯。少加川芎、蔓荊子、細辛。其効如神。白朮、半夏、天麻湯。治痰厥頭痛藥也。青空膏。乃風濕熱頭痛藥也。羌活、附子湯。治厥陰頭痛藥也。如濕氣在頭者。以苦吐之。不可執方而治。先師嘗病頭痛。發時兩頰青黃。暈眩。目不欲開。懶言。身體沉重。兀兀欲吐。潔古曰。此厥陰太陰合病。名曰風痰。以局方玉壺丸治之。更灸俠谿穴。即愈。是知方者體也。法者用也。徒執體而不知用者。弊體用下失。可謂上工矣。

清空膏

治偏正頭痛。年深不愈者。善療風濕熱。口上壅損目及腦痛不止。

川芎 伍錢

柴胡 柒錢

黃連 炒

防風 去芦

羌活 已上各壹兩

炙甘草 伍錢

細挺子黃芩 參兩。去皮。剉。一。半。酒。製。一。半。炒。

右為細末。每服二錢七。於盞內入茶少許。湯調如膏。抹在口內。少用白湯送下。臨臥。

如苦頭痛。每服加細辛 貳分。

如太陰脈緩有痰。名曰痰厥。頭痛。減羌活、防風、川芎、甘草。加半夏 壹兩。

如偏正頭痛。服之不愈。減羌活、防風、川芎一半。加柴胡 壹倍。

如發熱惡熱而渴。此陽明頭痛。只與白虎湯。加好吳白芷。微清膏。

蔓荊子

川芎已上各  
叁分

藁本壹錢。

細辛已上各  
壹分

生甘草

薄荷葉

熟甘草已上  
伍分

右為細末。每服二錢。食後茶清調下。

川芎散

治頭目不清利。

川芎叁分。

柴胡柒分。

羌活

防風

升麻已上各  
壹錢

藁本

生甘草

酒黃連炒

酒黃芩已上各肆  
錢伍分

酒生地黃貳錢

右為細末。每服一錢。或二三錢。食後茶清調下。忌酒濕麵。

白芷散一名鬱金散。

治頭痛。

鬱金壹錢

香白芷

石膏已上各貳錢

薄荷葉

芒硝已上各叁錢

右為極細末。口含水鼻內噀之。

碧雲散

治頭痛。

細辛

鬱金

芒硝已上各壹錢

蔓荊子

川芎已上各貳分

石膏壹錢叁分

青黛壹錢伍分

薄荷葉貳錢

紅豆壹箇

右為極細末。口噀水鼻內噀之。

羌活清空膏

蔓荊子壹錢

黃連叁錢

羌活

防風

甘草已上各肆錢

黃芩壹兩

右為細末。每服一錢。茶清調下。食後臨臥。

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱。常於氣海三里灸之。節次約五七十壯。至年老添熱厥頭痛。雖冬天大寒。猶喜寒。

風其頭痛則愈。微來暖處。或見烟火。其痛復作。五七年不愈。皆灸之過也。

荆芥穗

川芎已上各  
貳分

蔓荆子

當歸身

蒼朮已上各  
叁分

酒黃連

生地黃

藥本

甘草已上各  
伍分

升麻

防風已上各  
柒分

酒黃蘗

炙甘草

黃芪已上各  
壹錢

酒黃芩

酒知母已上各  
錢伍分

羌活叁錢

柴胡伍錢

細辛少許

紅花少許

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱服。食後。

補氣湯

服前藥之後服此藥。

柴胡貳分

升麻叁分

黃芪捌分

當歸身貳錢

炙甘草肆錢

紅花少許

右咬咀。作二服。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱服。食後。

細辛散



治偏正頭痛。

細辛

芍藥已上各伍分

炒黃芩

柴胡貳錢

右為齏末，每服三錢，水一大盞半，煎至一盞，取清，食後服之。

羌活湯

治風熱壅盛，上攻頭目昏眩。

炙甘草柒分

白茯苓

防風

羌活已上各壹兩

右為齏末，每服五錢重，水二大盞，煎至一盞，取清，食後臨臥，通口熱服之。

養神湯

治精神短不得睡，項筋腫急難伸，禁甘溫，宜苦味。

瓦粉已上各貳分

酒黃連

酒黃芩已上各壹錢

生黃芩

川芎已上各柒分

炙甘草壹錢伍分

澤瀉叁錢

酒黃藥已上各伍錢

細黃芩酒洗

酒洗瓜萸根

柴胡柒錢

酒黃連

木香

酒黃芩貳分

白朮

蒼朮

黃連已上各  
伍分

黃芪壹錢

安神湯

右咬咀。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗。稍熱服。不拘時候。

治頭痛頭旋眼黑。

生甘草

柴胡

酒知母已上各  
伍錢

黃芪貳兩

橘皮

人參

川芎已上各  
叁分

麥蘖麵

甘草

柴胡已上各  
壹分

黃蘖

升麻肆分

當歸身

半夏已上各  
柒分

炙甘草已上各  
貳錢

升麻

酒黃蘖

防風貳錢  
伍分

酒生地黃

羌活已上各  
壹兩

右爲麤末。每服五錢。水二大盞。煎至一盞半。加蔓荊子五分。川芎三分。再煎至一盞。去粗。臨臥熱服。

半夏白朮天麻湯

范天賦之內有脾胃證。時顯煩躁。胸中不利。大便不通。而又為寒氣拂鬱。悶亂大作。火不伸故也。疑其有熱。服疎風丸。大便秘。其病不減。恐其藥少。再服七八十九。大便復見兩行。元證不瘳。增以吐逆。食不能停。痰唾稠粘。湧出不止。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促上喘。無力以言。心神顛倒。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。余料前證是胃氣已損。復下兩次。則重虛其胃。而痰厥頭痛作矣。與此藥而治之。

黃蘗酒洗

乾薑參分

澤瀉

白茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮已上各伍分

炒神麴

白朮已上各壹錢

麥蘗麵

半夏湯洗

橘皮已上各壹錢伍分

右咬咀。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗熱服。食前一服而愈。此頭痛苦甚。謂之足太陰痰厥頭痛。非半夏不能療。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能除。黃芪甘溫。瀉火補元氣。實表虛。止自汗。人參甘溫。瀉火補中益氣。二朮俱苦甘溫。除濕補中益氣。澤瀉。茯苓利小便。導濕。橘皮苦溫。益氣調中。升陽。神麴消食。蕩胃中滯氣。大麥麵寬中助胃氣。乾薑辛熱。以滌中寒。黃蘗大苦寒。酒洗。以療冬天少火在泉發躁也。

口齒咽喉門

口齒論

論曰。夫齒者腎之標。口者脾之竅。諸經多有會於口者。其牙齒是手足陽明之所過。上齧隸於坤土。乃足陽明胃之脈貫絡也。止而不動。下齧嚼物。動而不休。手陽明大腸之脈所貫絡也。手陽明惡寒飲而喜熱。足陽明喜寒飲而惡熱。其病不一。牙者腎之標。亦喜寒。寒者堅牢。為病不同。熱甚則齒動。齧斷袒脫。作痛不已。故所治療不同也。有惡熱而作痛者。有惡寒而作痛者。有惡寒惡熱而作痛者。有惡寒飲少熱飲多而作痛者。有惡熱飲少寒飲多而作痛者。有牙齒動搖而作痛者。有齒齧腫起為痛者。有脾胃中有風邪。但覺風而作痛者。又有牙上多為蟲所蝕。其齒缺少而色變。為蟲牙痛者。有胃中氣少。不能於寒袒露。其齒作痛者。有牙齒疼痛。而穢臭之氣不可近者。痛既不一。豈可一藥而盡之哉。

羌活散

治客寒犯腦。風寒濕腦。痛項筋急。牙齒動搖。肉齧袒脫疼痛。

藥本

香白芷

桂枝已上各參分

蒼朮

升麻已上各伍分

當歸身陸分

草豆蔻仁壹錢

羌活壹錢伍分

羊脛骨灰貳錢

麻黃節去根

防風已上各參錢

柴胡伍錢

細辛少許

右爲細末。先用溫水嗽口。淨擦之。其痛立止也。

草豆蔻散

治寒多熱少。牙齒疼痛。

細辛葉

熟地黄已上各伍分

黃連已上各壹錢叁分

右爲細末。同前牙痛處擦之。

麻黃散

治冬寒時分寒濕腦痛。項筋急。牙齒動搖疼痛。

防風

當歸身

升麻

麻黃節不去

細辛少許

防風已上各貳分

當歸陸分

升麻貳錢伍分

藁本已上各叁分

熟地黄已上各陸分

黃連已上各壹錢

草龍膽酒洗

羊脛骨灰

草豆蔻仁

羊脛骨灰

草豆蔻仁

羌活壹錢伍分

生地黄已上貳錢

右爲細末。依前藥法擦之。

熱牙散一名辟香散。

治大熱牙齒瘰露根肉。齧脫血出。齒動欲落。疼痛妨食物餅。反忤熱多。

熟地黃貳分。

益智仁貳分

當歸身

生地黃

麻黃根

酒漢防己

人參已上各叁分

升麻壹錢

草豆蔻

黃連已上各壹錢伍分

羊脛骨皮貳錢

麝香少許

右爲細末。如前藥擦之。

治蟲散一名白芷散。

治大寒犯腦。牙齒疼痛。及蟲痛。胃經濕熱腫痛。

桂枝壹分。

熟地黃貳分。

藥本

白芷已上各叁分

當歸身

益智仁

黃連已上各肆分

羌活伍分。

吳茱萸捌分

草豆蔻

黃芪

升麻已上各壹錢

羊脛骨灰貳錢。

麻黃不去節。叁錢五分

右爲細末同前擦之。

益智木律散

治寒熱牙痛。

木律貳分

羊脛骨灰

菓豆蔻皮壹錢貳分

右爲細末用度如前擦之。

如寒牙痛不用木律。

蠟梢散

治大寒風犯腦牙痛。

白芷

桂枝

藜本

草豆蔻皮壹錢

蠟梢少許

當歸

益智皮

升麻壹錢伍分

當歸身

升麻

黃芪已上各參分

麻黃去節壹錢伍分

黃連已上各肆分

熟地黃已上伍分

柴胡已上各貳分

防風

羌活伍分

羊脛骨灰貳錢伍分

右爲細末，如前法用之。

白牙散

白芷 柒分

羊脛骨灰 貳錢

升麻 壹錢

麝香 少許

石膏 壹錢伍分

右爲細末，先用溫水嗽口，擦之妙。

刷牙藥

麝香 壹分

熟地黃 已上各貳分

草豆蔻皮 伍分

黃連 已上各貳錢

沒石子 叁箇

生地黃

當歸身

升麻 壹錢

白豆蔻

五倍子 壹箇

酒防己

人參 已上各叁分

羊脛骨灰

草豆蔻 已上叁錢

獨聖散

右爲極細末，如前法擦之妙。

治一切牙痛風疔。

北地蒺藜 不以多少，陰乾。



右為細末，每用刷牙，以熱漿水漱牙外，麤末熬漿水刷牙，大有神効，不可具述。

當歸龍膽散

治寒熱停牙痛。

香白芷

當歸梢

羊脛骨灰

生地黄已上各五分

麻黃

草豆蔻皮

草龍膽

升麻

黃連已上各壹錢

右為細末，如前法擦之，神効。

牢牙地黄散

治腦寒痛及牙痛。

藥本貳分

生地黄

熟地黄

羌活

防己

人參已上各叁分

當歸身

益智仁已上各肆分

香白芷

黃芪已上各伍分

羊脛骨灰

吳茱萸

黃連

麻黃已上各壹錢

草豆蔻皮壹錢貳分

升麻壹錢伍分

右爲細末，如前法擦之。

細辛散

治寒邪風邪犯腦，牙齒痛。

柴胡

白芷已上各  
貳分

藜本

草豆蔻伍分

細辛少許

右爲細末，先漱後擦之，佳。

立効散

治牙齒痛不可忍，及頭腦項背微惡寒飲，大惡熱飲，其脈上中下三部，陽虛陰盛，是五臟內盛，六腑陽

道脈微小，小便滑數。

細辛貳分

防風壹錢

右咬咀，都作一服，水一盞，煎至七分，去粗，以匙抄在口中，燥痛處，待少時則止。

防風

桂枝貳分  
半

蒼朮已上各  
叁分

羊脛骨灰

升麻

麻黃去節

當歸身肆分

羌活已上各  
錢伍分

炙甘草叁分

草龍膽肆錢  
酒洗

升麻柒分

如多惡熱飲。更加草龍膽壹錢。此法不定。隨寒熱多少。臨時加減。若更惡風作痛。加草豆蔻黃連已上各五分。勿加草龍膽。

牢牙散

治牙齦肉綻有根。牙疳腫痛。牙動搖欲落。牙齒不長。牙黃口臭。

羌活壹兩。

草龍膽酒洗壹兩伍錢

羊脛骨灰貳兩

升麻肆兩。

右為細末。以紗羅子羅骨灰作微塵末和勻。臥時貼在牙齦上。

清胃散

治因服補胃熱藥。致使上下牙疼痛不可忍。牽引頭腦。滿面發熱。大痛。足陽明之別絡入腦。喜寒惡熱。乃是手陽明經中熱盛而作也。其齒喜冷惡熱。

當歸身

擇細黃連如連不好。更加貳分。夏月倍之。

生地黄酒製已上叁分

牡丹皮伍分

升麻壹錢。

右為細末。都作一服。水一盞半。煎至一盞。去粗。帶冷服之。

神功丸

治多食肉。人口臭不可近。牙齒疳蝕。牙齦肉將脫。牙齒落血不止。

蘭香葉如無，蓋香代之。

木香壹錢，已上各。

生甘草叁錢，已上各。

當歸身

升麻貳錢。

黃連去鬚，擇淨，酒洗，秤。

藿香用葉。

生地黄酒洗。

縮砂仁已上各，伍錢。

右同為細末，湯浸餛餅為丸，如菔豆大，每服一百丸，或加至二百丸，止白湯下，食遠服，兼治血痢及血崩及血下不止，血下褐色或紫色黑色，及腸澼下血，空心服，米湯下，其脈洪大而緩者，及治麻木，厥氣上衝，逆氣上行，忘聞忘見者。

桔梗湯

治咽腫微覺痛，聲破。

當歸身

黃芩已上各，叁分。

甘草壹錢，已上各。

馬勃已上各，壹分。

麻黃伍分，不去節。

桂枝少許。

白殭蠶

桔梗

又方 右為麤末，作一服，水二大盞，煎至一盞，去粗，稍熱服之，食後。

治口瘡久不愈者。

黃蘗不計多少，真者，蜜塗其上，炙黃色。

右爲細末。乾糝瘡上。臨臥。忌醋醬鹽。

神驗法

治口瘡。無問久新。

夜間將二丸以勒緊左右交手揉三五十次。但遇睡覺行之。如此三五度。因濕而生者一夜愈。久病諸般口瘡三二夜愈。如鼻流清涕者。勒之二丸揉之數夜可愈。內經云。膀胱移熱於小腸。膈腸不便。上口爲糜。易老。五苓散與導赤散合而飲之。

嘔吐門

丁香茱萸湯

治嘔吐。噦胃。虛寒所致。

黃蘗叁分

炙甘草

丁香

柴胡

橘皮已上各伍分

升麻柒分

吳茱萸

蒼朮

人參已上各壹錢

當歸身壹錢伍分

草豆蔻仁

黃芪已上各貳錢

右爲麤末。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗。稍熱服。食前。

白朮湯一名茯苓半夏湯

治胃氣虛弱。身重有痰。惡心欲吐。是風邪羈絆於脾胃之間。當先實其脾胃。

炒神麴 貳錢

陳皮

天麻 已上各 參錢

白朮

白茯苓

麥蘖麴 炒黃 色

半夏 已上各 伍錢

右咬咀。每服五錢。水二盞。入生薑五片。同煎至一盞。去粗。稍熱服之。

補肝湯 一名柴胡半夏湯

治素有風證。不敢見風。眼澀頭痛。眼黑。胸中有痰。惡心兀兀欲吐。遇風但覺皮肉緊。手足難舉重物。如居暖室。少出微汗。其證乃減。再或遇風。病即復。

柴胡

升麻

藥本 已上各 伍分

白茯苓 柒分

炒神麴

蒼朮 已上各 壹錢

半夏 貳錢

生薑 拾片

右為麤末。都作一服。水二大盞。煎至一大盞。去粗。稍熱服。

吳茱萸丸 一名木香利膈丸

治寒在膈上。噎塞咽膈不通。

木香

青皮 已上各 貳分

白僵蠶

姜黃

澤瀉

柴胡已上各肆分

當歸身

炙甘草已上各陸分

益智仁

人參

橘皮

升麻

黃芪已上各捌分

半夏壹錢

草豆蔻仁

吳茱萸已上各錢貳分

麥蘖麵壹錢伍分

右爲細末。湯浸餛餅爲丸。如菉豆大。每服二三十丸。溫水送下。勿多飲湯。恐速下。細嚼亦得。

衄血吐血門

麥門冬飲子

治吐血久不愈。以三稜鍼於氣街出血。立愈。

黃芪壹錢

麥門冬

當歸身

生地黄

人參已上各伍分

五味子拾箇

右爲麤末。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗熱服。不拘時。

人參飲子

治脾胃虛弱。氣促氣弱。精神短少。衄血吐血。

麥門冬貳分

人參去芦

當歸身已上各叁分

黃芪

白芍藥

甘草已上各壹錢

五味子伍箇

右為羅末。都作一服。用水二盞。煎至一盞。去粗稍熱服。

一貧者有前證。以前藥投之。愈。繼而至冬天。居曠室中。臥大熱炕。而吐血數次。再來求治。料此病久虛弱。附臍有形。而有火熱在內。上氣不足。陽氣外虛。當補表之陽氣。瀉其裏之虛熱。是其法也。冬天居曠室。衣蓋單薄。是重虛其陽。表有大寒。壅遏裏熱。火邪不得舒伸。故血出於口。憶仲景傷寒論中一證。太陽傷寒。當以麻黃湯發汗。而不與之。遂成衄。卻與麻黃湯立愈。此法相同。予遂用之。

三黃補血湯

治六脈俱大。按之空虛。心面赤。善驚。上熱。乃手少陰心脈也。此氣盛多而亡血。以甘寒鎮墜之劑。大瀉其氣。以墜氣浮。以甘辛口微苦峻補其血。

牡丹皮

黃芪

升麻已上各壹錢

當歸

柴胡已上各壹錢伍分

熟地黃

川芎已上各貳錢

生地黃叁錢

白芍藥伍錢

右咬咀。如麻豆大。每服五錢。水二大盞。煎至一大盞。去粗。稍熱服。食前。

如兩寸脈。乳血在上焦。或衄血。或嘔血。與犀角地黃湯則愈。



救脈湯 一名人參救肺散。

治吐血

甘草

蘇木

陳皮已上各伍分

升麻

柴胡

蒼朮已上各壹錢

當歸梢

熟地黄

白芍藥

黃芪

人參已上各貳錢

右為麤末。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。稍溫。食前服。

麻黃桂枝湯

人參益上無元氣不

麥門冬保肺氣已上各叁分

桂枝以補表虛

當歸身和血養血各伍分

麻黃去根

甘草補其虛

黃芪實表益衛

白芍藥已上各壹錢

五味子伍箇安其脈氣

右以水三盞。先煎麻黃一味。令沸去沫。至二盞。入餘藥。同煎至一盞。去粗。熱服。臨臥。只一服而愈。更不

再作。

黃芪芍藥湯

治鼻衄血多。面黃。眼澀多眵。手麻木。

葛根

羌活已上各伍錢

升麻已上各壹兩

炙甘草貳兩

白芍藥

黃芪叁兩

右咬咀。每服伍錢。水二盞。煎至一盞。食後。

六脈弦細而濇。按之空虛。其色必白。而天不澤者。脫血也。此大寒證。以辛溫補血益血。以甘溫甘熱滑潤之劑以佐之。則愈。此亡血亦傷精氣。

止衄血法

治鼻血久不止。素有熱而暴作者。諸藥無驗。神法以大紙一張。作八摺或十摺。於水內濕置頂中。以熱熨斗熨至二重或三重。紙乾立止。

腰痛門

川芎肉桂湯

丁未冬。曹通甫自河南來。有役人小翟露宿寒濕之地。腰痛不能轉側。兩脇搐急作痛。已經月餘不愈矣。腰痛論中說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛。間有一二證屬少陽膽經外絡脈病。皆去血絡之凝乃愈。其內經有云。冬三月禁不得用鍼。只宜服藥。通其輕絡。破其血絡中敗血。以此藥主之。

酒漢防已

防風已上各叁分

炒神麴

獨活已上各伍分

川芎

柴胡

肉桂

當歸梢

炙甘草

蒼朮已上各壹錢

羌活壹錢伍分

桃仁伍箇去皮尖研如泥

右咬咀都作一服好酒三大盞煎至一大盞去粗稍熱食遠服

獨活湯

治因勞役腰痛如折沉重如山

炙甘草貳錢

羌活

防風

獨活

大黃煨

澤瀉

肉桂已上各叁錢

當歸梢

連翹已上各伍錢

酒漢防己

酒黃蘗已上各壹兩

桃仁叁拾箇

右咬咀每服五錢酒半盞水一大盞半煎至一盞去粗熱服

破血散疼湯

治乘馬損傷跌其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活

防風

中桂已上各壹錢

蘇木壹錢伍分

連翹

當歸梢

柴胡已上各貳錢

水蛭叁錢炒去煙盡別研

麝香少許別研

右件分作二服。每服酒二大盞。水一大盞。除水蛭麝香另研如泥。煎餘藥作一大盞。去粗。上火令稍熱。調二味空心服之。兩服立愈。

地龍散

治腰脊痛。或打撲損傷。從高墜下。惡血在太陽經中。令人腰脊痛。或脛膈臂股中痛不可忍。鼻塞不通。

當歸梢壹分。

中桂

地龍已上各肆分

麻黃伍分。

蘇木陸分

獨活

黃蘗

甘草已上各壹錢

羌活貳錢

桃仁陸箇

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。溫服。食遠。

蒼朮湯

治濕熱腰腿疼痛。

防風風能勝濕

黃蘗已上各壹錢。始得之時。寒化爲熱。除濕止痛。

柴胡貳錢。行經

蒼朮參錢。去濕止痛

右都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。空心服。

麻黃復煎散

治陰室中汗出。懶語。四肢困倦無力。走注疼痛。乃下焦伏火而不得伸。浮而躁熱汗出。一身盡痛。蓋風濕相搏也。以升陽發汗。漸漸發之。火鬱乃濕在經者。亦宜發汗。況正值季春之月。脈緩而遲。尤宜發汗。令風濕去而陽升。以此困倦乃退。氣血俱得生旺也。

白朮

人參

生地黄

柴胡

防風已上各伍分

羌活

黃蘗已上各壹錢

麻黃去節微搗。不令作末。水五大盞。煎令沸。去沫。煎至二盞。入下項藥再煎。

黃芪已上各貳錢

甘草叁錢

杏仁叁箇。去皮。

右咬咀。都作一服。入麻黃湯煎至一盞。臨臥服之。勿令食飽。取漸次有汗則効。

緩筋湯一名羌活湯。

治兩目如火。腫痛。兩足及伏兔筋骨痛。膝少力。身重腰痛。夜惡寒。痰嗽。頸項皆急痛。目外眇。目絲急。食不下。

熟地黄壹分

生甘草

柴胡

紅花

炙甘草

蘇木

獨活已上各貳分

藁本

升麻

黃芩

草豆蔻仁

酒黃蘗

生地黃

當歸身

麻黃已上各參分

羌活參錢

蒼朮伍分

右為麤末。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗。食遠服之。

拈痛湯

治濕熱為病。肩背沉重。肢節疼痛。胸膈不利。

白朮壹錢伍分

人參去芦

苦參酒炒

升麻去芦

葛根

蒼朮已上各貳錢

防風去芦

知母酒洗

澤瀉

黃芩炒

猪苓

當歸身已上各參錢

炙甘草

黃芩酒洗

茵陳酒炒

羌活已上各伍錢

右咬咀。每服一兩。水二大盞。煎至一盞。去粗。食遠服。

蒼朮復煎散

治寒濕相合。腦右痛。惡寒。項筋脊骨強。肩背胛眼痛。膝臏痛無力。行步沉重。

紅花壹分

黃蘗參分

柴胡

藜本

澤瀉

白朮

升麻已上各伍分

羌活壹錢

蒼朮肆兩水二椀煎去粗入藥

右咬咀先煎蒼朮湯二大盞復煎前項藥至一大盞稍熱空心服取微汗為効忌酒濕麵

羌活蒼朮湯

治脚膝無力沉重

炙甘草

黃蘗

草豆蔻

生甘草

葛根已上各伍分

橘皮陸分

柴胡柒分

升麻

獨活

縮砂仁

蒼朮已上各壹錢

防風壹錢伍分

黃芪貳錢

知母貳錢伍分

羌活叁錢

右咬咀分作二服水二大盞煎至一盞去粗空心服

婦人們

經閉不行有三論

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消為息賁者死不治婦人脾胃久虛或形羸氣血俱衰而致經水斷絕不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脈津液所化津液既

絕爲熱所燥。肌肉消瘦。時見渴燥。血海枯竭。病名曰血枯經絕。宜瀉胃之燥熱。補益氣血。經自行矣。此證或經適行而有子。子不安爲胎病者有矣。或心包脈洪數。躁作時見大便秘澀。小便雖清不利。而經水閉絕不行。此乃血海乾枯。宜調血脈。除包絡中火邪。而經自行矣。內經所謂小腸移熱於大腸。爲癥瘕。爲沉脈澀不利。則月事沉滯而不利。故云爲癥瘕爲沉也。或因勞心。心火上行。月事不來。安心和血瀉火。經自行矣。故內經云。月事不來者。胞脈閉也。胞脈者。屬心而絡於胞中。令氣上迫肺心。氣不得下。故月事不來也。

### 經漏不止有三論

陰陽別論云。陰虛陽搏謂之崩。婦人脾胃虛損。致命門脈沉細而數疾。或沉弦而洪大有力。寸關脈亦然。皆由脾胃有虧。下陷於腎。與相火相合。濕熱下迫。經漏不止。其色紫黑。如夏月腐肉之臭。中有白帶者。脈必弦細。寒作於中。中有赤帶者。其脈洪數。疾熱明矣。必腰痛。或臍下痛。臨經欲行。先見寒熱往來。兩脅急縮。兼脾胃證出見。或四肢困熱。心煩不得眠臥。心下急。宜大補脾胃。而升舉血氣。可一服而愈。或人故貴脫勢。人事疎少。或先富後貧。心氣不足。其火大熾。旺於血脈之中。又致脾胃飲食失節。火乘其中。形質肌肉容顏似不病者。此心病者。不行於診。故脾胃飲食不調。其證顯矣。而經水不時而下。或適來適斷。暴下不止。治當先說惡死之言。勸諭令拒死而心不動。以大補氣血之藥。舉養脾胃。微加鎮墜心火之藥。治其心。補陰瀉陽。經自止矣。痿論云。悲哀大甚。則胞絡絕也。陽氣內動。發則心下崩。數洩血也。故本病曰大經



空虛發則肌痺。傳為脈痿。此之謂也。

升陽除濕湯一名調經升麻除濕湯。

治女子漏下惡血。月事不調。或暴崩不止。多下水漿之物。皆由飲食不節。或勞傷形體。或素有心氣不足。困飲食勞倦。致令心火乘脾。其人必怠惰嗜臥。四肢不收。困倦乏力。無氣以動。氣短上氣逆急上衝。其脈緩而弦急。按之洪大。皆中之下得之。脾土受邪也。脾主滋榮周身者也。心主血。血主脈。二者受邪。病皆在脈。脈者血之府也。脈者人之神也。心不主。令包絡代之。故曰心之脈主屬心系。心系者。包絡命門之脈也。主月事。因脾胃虛而心包乘之。故漏下月事不調也。况脾胃為血氣陰陽之根蒂也。當除濕去熱。益風氣上伸以勝其濕。又云。火鬱則發之。

當歸酒洗。

獨活已上各伍分

蔓荊子柒分

防風

炙甘草

升麻

藥本已上各壹錢

柴胡

羌活

蒼朮

黃芪已上各壹錢伍分

右剉如麻豆大。勿令作末。都作一服。以潔淨新汲水三大盞。煎至一大盞。去粗。空心熱服。待少時以早飯壓之。可一服而已。如灸足太陰脾經中血海穴二七壯亦已。此藥乃從權之法。用風勝濕。為胃下陷而氣迫於下。以救其血之暴崩也。併血惡之物住後。必須黃芪。

人參、炙甘草、當歸之類數服以補之。於補氣升陽湯中加以和血藥便是也。若經血惡物下之不絕，尤宜究其根源，治其本經，只益脾胃，退心火之亢，乃治其根蒂也。若遇夏月白帶下脫漏不止，宜用此湯，一服立止。

涼血地黃湯

治婦人血崩，是腎水陰虛，不能鎮守包絡相火，故血走而崩也。

黃芩

荊芥穗

蔓荊子已上各壹分

黃蘗

知母

蘘本

細辛

川芎已上各貳分

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風已上各叁分

生地黃

當歸已上各伍分

甘草壹錢

紅花少許

右咬咀都作一服，水三大盞，煎至一盞，去粗，稍熱，空心服之。

足太陰脾之經，中血海二穴，在膝臚上內膝白肉際二寸中，治女子漏下惡血，月事不調，逆氣腹脹，其脈

緩者是也，灸三壯。

足少陰腎之經，中陰谷二穴，在膝內輔骨後大筋下小筋上，按之應手，屈膝取之，治膝如錐，不得屈伸，舌

縱涎下。煩逆溺難。少腹急引陰痛。股內臑痛。婦人漏血不止。腹脹滿不得息。小便黃如蠶。女子如姪身。可灸二壯。

酒煮當歸丸

治癩疝白帶下。疰脚氣。腰已下如在冰雪中。以火焙炕。重重厚綿衣蓋其上。猶寒冷不任。寒之極也。面白如枯魚之象。肌肉如刀割削。瘦峻之速也。小便不止。與白帶長流而不禁固。自不知覺。面白。目青藍。如菜色。目眈眈無所見。身重如山。行步欹側。不能安地。腿膝枯細。大便難祕。口不能言。無力之極。食不下。心下痞。煩心懊懣。不任其苦。面停垢。背惡寒。小使遺而不知。此上中下三陽真氣俱虛欲竭。噦嘔不止。胃虛之極也。脈沉厥緊而澀。按之空虛。若脈洪大而濇。按之無力。猶為中寒之證。況按之空虛者乎。按之不鼓。是為陰寒。乃氣血俱虛之極也。

茴香 伍錢

黑附子 炮製去皮

良薑 已上各柒錢

當歸 壹兩

右四味剉如麻豆大。以上等好酒一升半同煮。至酒盡焙乾。

炙甘草

苦練 生用

丁香 已上各伍錢

木香

升麻 已上各壹錢

柴胡 貳錢

炒黃鹽

全蠍 已上各參錢

延胡索 肆錢

右與前四味藥同爲細末。酒煮。麪糊爲丸。如梧桐子大。每服五七十九。空心淡醋湯下。忌油膩冷物酒濕麵。

### 固真丸

治白帶久下不止。臍腹冷痛。陰中亦然。目中溜火。視物眊眊然無所見。齒皆惡熱飲痛。須得黃連細末擦之乃止。惟喜乾食。大惡湯飲。此病皆寒濕乘其胞內。故喜乾而惡濕。肝經陰火上溢走於標。故上壅而目中溜火。腎水侵肝而上溢。致目眊眊而無所見。齒惡熱飲者。是陽明經中伏火也。治法當大瀉寒濕。以丸藥治之。故曰寒在下焦。治宜緩。大忌湯散。以酒製白石脂白龍骨以枯其濕。炮乾薑大熱辛瀉寒水。以黃蘗之大寒爲因用。又爲鄉導。故云。古者雖有重罪。不絕人之後。又爲之伏其所主。先其所因之意。又瀉齒中惡熱飲也。以柴胡爲本經之使。以芍藥五分導之。恐辛熱之藥大甚。損其肝經。故微瀉之。以當歸身之辛溫。大和其血脈。此用藥之法備矣。

黃蘗酒洗。

白芍藥已上各五分

柴胡

白石脂已上各壹錢火燒。

白龍骨酒煮日乾

當歸酒洗已上各貳錢

乾薑肆錢炮。

右件除龍骨白石脂水飛研外。同爲細末。水煮。麪糊爲丸。如雞頭仁大。日乾。空心。多用白沸湯下。無令胃中停滯。待少時以早飯壓之。是不令熱藥犯胃。忌生冷硬物酒濕麵。

烏藥湯

治婦人血海疼痛。

當歸

甘草

木香已上各

烏藥壹兩

香附子貳兩

右咬咀。每服五錢。水二大盞。去粗。溫服。食前。

助陽湯 一名升陽燥濕湯。

治白帶下。陰戶中痛。空心而急痛。身黃皮緩。身重如山。陰中如冰。

生黃芩

橘皮已上各

防風

高良薑

乾薑

郁李仁

甘草已上各

柴胡壹錢

白葵花葉朵

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二大盞。煎至一盞。去粗。食前。稍熱服。

水府丹

治婦人久虛積冷。經候不行。癥瘕癖塊。腹中暴痛。面有野黯。黎黑羸瘠。

硃砂紙隔

紅豆已上各

桂心另爲末

木香

乾薑已上各

砂仁貳兩

經煨花藥石研壹兩伍錢

班猫壹百箇去頭翅

生地黃汁

童子小便各壹升

臘月狗膽柒枚

莞蜻叁百箇去頭尾括米壹升炒米黃去米不用

右九味爲細末同三汁熬爲膏和丸如雞頭大硃砂爲衣每服一九溫酒細嚼食前服米飲亦可孕婦不可服。

### 丁香膠艾湯

治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脈二尺俱弦緊洪按之無力其證自覺臍下如冰求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物多間有如屋漏水下時有鮮血右尺脈時微洪也。

熟地黃

白芍藥已上各叁分

川芎

丁香已上各肆分

阿膠陸分

生艾葉壹錢

當歸壹錢貳分

右川芎爲細末當歸酒洗剉熟地黃丁香爲細末艾亦剉都作一服水五大盞先煎五味作一盞零二分去粗入膠再上火煎至一大盞帶熱空心服之。

### 黃芪當歸人參湯

丁未仲冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾損身失血自後一次縮一十日而來今次不止其人窄性急多驚以予料之必因心氣不足飲食不節得之大方曰無到彼診得掌中寒脈沉細而緩間

而沉數。九竅微有不利。四肢無力。上喘氣短促。口鼻氣皆不調。果有心氣不足。脾胃虛弱之證。胃脘當心而痛。左脅下縮急有積。當臍有動氣。腹中鳴。下氣大便難。虛證極多。不能盡錄。擬先治其本。餘證可以皆去。安心定志。鎮墜其經。調和脾胃。大益元氣。補其血脈。令養其神。以大熱之劑。去其冬寒凝在皮膚內。少加生地黃。去命門相火。不令四肢痿弱。

黃連壹分。

生地黃叁分。

連神麴

橘皮

桂枝已上各伍分

草豆蔻仁陸分

黃芪

人參

麻黃不去節已上各壹錢

當歸身壹錢伍分

杏仁伍箇另研如泥

右咬咀。作三服。水二大盞半。煎麻黃。令沸去沫。煎至二盞。入諸藥同煎至一大盞。於巳午之間。食消盡服之。一服立止。其胃脘痛。乃胃上有客寒。與大熱藥。草豆蔻九一十五丸。自湯送下。其痛立止。再與肝之積藥。除其積之根源而愈。

當歸芍藥湯

治婦人經脈漏下不止。其色鮮紅。時值七月。處暑之間。先因勞役。脾胃虛弱。氣短氣逆。自汗不止。身熱悶亂。惡見飲食。非惟不入。亦不思食。沉懶困倦。四肢無力。大便時泄。後再因心氣不足。經脈再下不止。惟覺氣下脫。其元氣逆上全無。惟覺心腹中氣下行。氣短少不能言。是無力以言。非懶語也。此藥主之。

柴胡 貳分

橘皮 白不去

蒼朮 去皮

白朮 貳錢已上各

炙甘草

熟地黄 伍分已上各

當歸身

生地黄 叁分已上各

黃芪 壹錢伍分

白芍藥

柴胡調經湯

右十味咬咀如麻豆大分作二服水二盞半煎至一盞去粗稍熱空心服之

治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨強痛

炙甘草

當歸身

葛根 叁分已上各

獨活

藥本

升麻 伍分已上各

柴胡 柒分

羌活

蒼朮 壹錢已上各

紅花 少許

右剉如麻豆大都作一服水四大盞煎至一盞去粗空心稍熱服取微汗立止

一婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止穀有時不化後血塊暴下并水俱作是前後二陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日見三兩行食罷煩心飲食減少甚至瘦弱東垣老人曰夫聖人治病必本四時升降浮沉之理權變之宜必先歲氣無伐天和無勝無虛遣人天殃無致邪無失正絕人



長命。故仲景云：陽盛陰虛，下之則愈；汗之則死。陰盛陽虛，汗之即愈，下之即死。大抵聖人立法，且如升陽或發散之劑，是助春夏之陽氣，令其上升，乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣，此病是也。當用此法治之。升降浮沉之至理也。天地之氣，以升降浮沉乃從四時。如治病不可逆之，故經云：順天則昌，逆天則亡，可不畏哉。夫人之身，亦有四時天地之氣，不可止認在外，人亦體同天地也。今經漏不止，是前陰之氣血已脫下矣。水泄又數年，是後陰之氣血下陷以脫矣。後陰者，主有形之物也。前陰者，精氣之戶下竭，是病人周身之血氣，常行秋冬之令，陰主殺，此等收藏之病是也。陽生陰長，春夏是也。在人之身，令氣升浮者，穀氣上行是也。既病人周身血氣皆不生，穀氣又不勝，其肌肉消少，是兩儀之氣俱將絕矣。既下元二陰俱脫，血氣將竭，假令當是熱證，今下焦久脫，化爲寒矣。此病久沉久降，寒濕大勝，當急救之。瀉寒以熱，除濕以燥，大升大舉，以助生長，補養氣血，不致偏竭。聖人立治之法，既濕氣大勝，以所勝治之，助甲風木上升是也。故經云：風勝濕，是以所勝平之也。當先調和胃氣，次用白朮之類，以燥其濕而滋元氣，如其不止，後用風藥以勝濕，此便是大舉大升，以助春夏二濕之久陷下之至治也。

益胃升陽湯

血脫益氣，古聖人之法也。先補胃氣，以助生發之氣，故曰陽生陰長，諸甘藥爲之先務，舉世皆以爲補，殊不知甘能生血，此陽生陰長之理也。故先理胃氣，人之身內胃氣爲寶。

柴胡

升麻已上各伍分

炙甘草

當歸身酒洗。

炒神麴已上各錢伍分。

生黃芩少許。

右咬咀。每服二錢。水二大盞。煎至一盞。去粗稍熱服。

如腹中痛。每服加白芍藥叁分。中桂少許。

如渴或口乾。加葛根貳分。不拘時候。

### 升陽陰經湯

治經水不止。如右尺脈按之空虛。是氣血俱脫。大寒之證。經手其脈數疾。舉指弦緊或澀。皆陽脫之證。陰火亦亡。見熱證於口鼻眼。或渴。此皆陰躁陽欲先去也。當溫之舉之升之浮之燥之。此法當大升浮血氣。切補命門之下脫也。

肉桂去皮。盛夏勿用。秋冬用。

細辛陸分。

川芎已上各錢壹。

炙甘草已上各錢伍分。

防風已上各錢貳。

陳皮已上各錢壹。

黃芪貳錢。

人參去芦。有嗽去之。

白朮叁錢。

白芍藥

人參去芦。

獨活根

羌活

白朮

紅花已上各錢伍分。

熟地黃〃

黑附子炮製。去皮。去臍。

藜蘆去土。

當歸

黃芪已上各參錢

柴胡已上各參錢

桃仁拾箇湯浸去皮尖細研

右咬咀每服三錢若病勢順當漸加至五錢每服水三盞煎至一盞空心熱服

半產誤用寒涼之藥論

婦人分免及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包絡者君火相火也。得血則安。亡血則危。火上熾故令人昏冒。火勝其肺。瞑目不省人事。是陰血暴去不能鎮撫也。血已虧損。往往用滑石、甘草、石膏之類。乃辛甘大寒之藥。能瀉氣中之熱。是血虧瀉氣。乃陰虧瀉陽。使二者俱傷。反為不足。虛勞之病。昏迷不省者。上焦心肺之熱也。此無形之熱。用寒涼之藥。驅令下行。豈不知上焦之病。悉屬於表。乃陰證也。汗之則愈。今反下之。幸而不死。暴虧氣血。生命豈能久活。又不知內經有說。病氣不足。宜補不宜瀉。俱瞑目之病。悉屬於陰。宜汗不宜下。又不知傷寒鬱冒。得汗則愈。是禁用寒涼藥也。分免半產。本氣不病。是暴去其血。亡血補血。又何疑焉。補其血則神昌。常時血下降亡。今當補而升。舉之心得血而養。神不昏矣。血若暴下。是秋冬之令大旺。今舉而升之。以助其陽。則目張神不昏迷矣。今立一方。補血養血。生血益陽。以補手足厥陰之不足也。

全生活血湯

紅花參分

蔓荊子

細辛已上各伍分

生地黃夏月多加之

熟地黃已上各壹錢

藁本

川芎已止各壹錢伍分

獨活

當歸身酒洗

升麻已上各叁錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服

當歸附子湯

治臍下冷痛赤白帶下

當歸貳分

升麻已上各伍分

黃蘗少許為引用

右為麤末每服五錢水五盞煎至一盞去粗稍熱服或為細末酒麵糊為丸亦可

調經補真湯

冬後一月微有地泥冰泮其白帶再來陰戶中寒一服立止

獨活

防風

防風諸陽既陷何以知之血下脫故也

炙甘草

葛根已上各貳錢

白芍藥

柴胡去苗

炒鹽叁分

甘草陸分

附子壹錢

乾薑良薑各貳錢

乾薑炮

蒼朮已上各貳分

藥本

麻黃節不去

炙甘草

人參去芦

當歸身

白朮

生黃芩

升麻已上各伍分

黃芪柒分

良薑

澤瀉

羌活已上各壹錢

柴胡肆錢

杏仁貳箇

桂枝少許

白葵花柒朶去萼

右咬咀。除黃芩麻黃各另外。都作一服。先以水三大盞半煎麻黃一味。令沸掠去沫。入餘藥同煎。至一盞零。柒分。再入生黃芩。煎至一盞。空心服之。候一時許。可食早飯。

坐藥龍鹽膏

茴香叁分

枯礬伍分

良薑

當歸梢

酒防己

木通已上各壹錢

丁香

木香

川烏炮已上各壹錢伍分

龍骨

炒鹽

紅豆

肉桂已上各貳錢

厚朴叁錢

延胡索伍錢

全蠍伍箇

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。綿裹留系在外。內丸藥陰戶內。日易之。

勝陰丹

爲水藥力小再取三錢內加行性熱藥項下

柴胡

羌活

枯白礬

甘松

升麻已上各

川烏頭

大椒

三柰子已上各

蒜柒分

破故紙搗分與蒜同

全蠟參筒

麝香少許

右爲細末依前法用

迴陽丹

羌活

全蠟

升麻根

甘松已上各

草烏頭

水蛭炒已上

大椒

三柰子

萆撥

枯礬已上各

柴胡

川烏已上各

炒黃鹽爲必用之藥

破故紙

蒜已上各

蟲蟲二箇去

右爲極細末依前製用臍下覺暖爲効

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲臨經先腰臍痛甚則腹中亦痛經縮三兩日

生地黄貳分

丁香肆分

當歸身

防風

羌活已上各壹錢

柴胡壹錢伍分

全蠍壹箇

右件都作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服

延胡苦煉湯

治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃蘗壹分爲引

延胡索

苦練子已上各貳分

附子炮

肉桂已上各參分

炙甘草伍分

熟地黄壹錢

右都作一服水二大盞煎至一盞食前服

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒

黃蘗爲引

知母已上各伍分

肉桂壹錢

附子參錄

有咬咀都作一服。水二盞煎至一盞。去粗。食遠熱服。

如少食常飽。有時似腹脹。奈悶。加白芍藥伍分。

如不思飲食。加五味子貳拾箇。

如煩惱面上如蟲行。乃胃中元氣極虛。加黃芪壹錢。人參柒分。炙甘草升麻已上各伍分。

人參補氣湯。

治四肢懶倦。自汗無力。

丁香末貳分

生甘草梢

炙甘草已上各叁分

生地黃

白芍藥已上各伍分

熟地黃陸分

人參

防風

羌活

黃蘗

知母

當歸身

升麻已上各柒分

柴胡壹錢

黃芪壹錢伍分

全蠍壹箇

五味子貳拾箇

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞煎至一盞。去粗。空心稍熱服。

黃芪白朮湯



治婦人四肢沉重自汗上至頭際頸而還惡風頭痛躁熱

細辛叁分

吳茱萸

柴胡

升麻已上各壹錢

黃蘗酒洗

炙甘草

五味子叁錢

白朮

黃芪壹兩

右咬咀每服五錢水二大盞生薑五片煎至一盞去粗食前熱服

如腹中痛不決加炙甘草壹錢汗出不止加黃蘗壹錢

白朮茯苓湯

治胃氣弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮

白茯苓

半夏已上各壹兩

炒麴貳錢

麥蘗麵炒伍分

右咬咀每服五錢水二大盞入生薑五片煎至一盞去粗不拘時服

增味四物湯

治婦人血積

當歸

熟地黃

肉桂去皮

川芎

京三稜

廣茂已上各等分

芍藥

乾漆炒燥

補經固真湯

右為麤末。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗。食前稍熱服。

白文舉正室白帶常漏久矣。諸藥不効。診得心包尺脈微。其白帶下流不止。叔和云。崩中日久為白帶。漏下時多。白滑血枯。崩中者。始病血崩。久則血少。復亡其陽。故白滑之物。下流不止。是本經血海將枯。津液復亡。枯乾不能滋養筋骨。以本部行經藥為引用。為使以大辛甘膩之藥。潤其枯燥。而滋益津液。以大辛熱之氣味。藥補其陽道。生其血脈。以苦寒之藥。泄其肺。而救上熱傷氣。以人參補之。以微苦溫之藥。為佐而益元氣。

白葵花去萼研爛肆分

柴胡已上各壹錢

生黃芩壹錢細研

甘草炙

乾薑細末

陳皮留皮五分

郁李仁去皮尖研

人參已上各貳錢

溫衛補血湯

右件除黃芩外。以水三盞。煎至一盞七分。再入黃芩。同煎至一盞。去粗。空心熱服。少時以早飯壓之。

治耳鳴。鼻不聞香臭。口不知穀味。氣不快。四肢困倦。行步欹側。髮脫落。食不下。膝冷。陰汗帶下。喉中呞呞不得臥。口舌益乾。大息頭不可以回顧。項筋緊。脊強痛。頭旋眼黑。頭痛欠噓。

生地黃

白朮

藿香

黃蘗已上各壹分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

橘皮

吳茱萸已上各貳分

當歸身貳分

柴胡

人參

熟甘草

地骨皮已上各叁分

升麻肆分

生甘草伍分

黃芪壹錢貳分

丁香壹箇

桃仁叁箇

葵花柒朶

右咬咀作一服。用水二大盞。煎至一盞。去粗。食前熱服。

立効散

治婦人血崩不止。

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花已上各壹兩

右剉如豆大。白紙裹定泥固。炭火燒灰存性為細末。

如乾血氣。研血竭爲引。好溫酒調服。加輕粉。蜜餞。  
如血崩不止。加麝香爲引。好溫酒調服。

四聖散

治婦人赤白帶下。

川烏炮製

生白礬已上各

紅娘子叁箇

班猫拾箇

煉蜜爲丸。如皂子大。綿裹坐之。

溫經除濕湯

十月霜冷後。四肢無力。乃痿厥濕熱在下焦也。醋心者。是濁氣不下降。欲爲滿也。合眼麻木作者。陽道不行也。惡風寒者。上焦之分。皮膚中氣不行也。開目不麻者。目開助陽道。故陰寒之氣少退也。頭眩暈者。風氣下陷於血分。不得伸越而作也。近火則有之。

黃連壹分

柴胡

葶豆蔻

神麴炒

木香已上各

麻黃節不去

獨活

當歸身

黃蘗已上各

升麻伍分

羌活柒分

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉已上各壹錢

黃芪

橘皮

蒼朮已上各貳錢

白芍藥壹錢

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞食遠服治支節沉重疼痛無力之勝藥也

補氣升陽和中湯

李正臣夫人病診得六脈俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則絕止常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼致不得眠身體皆重時有痰嗽覺胸中常似有痰而不利時煩躁氣短促而喘肌膚充盛飲食不減大小便如常惟畏其麻木不敢合眼為最苦觀其色脈形病相應而不逆內經曰陽盛瞑目而動輕陰病閉目而靜重又云諸脈皆屬於目靈樞經云開目則陽道行陽氣遍布週身閉目則陽道閉而不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木為風三尺之童皆以為然細校之則有區別耳久坐而起亦有麻木為如繩縛之久釋之覺麻作而不敢動良久則自已以此驗之非有風邪乃氣不行主治之當補其肺中之氣則麻木自去矣如經脈中陰火乘其陽分火動於中為麻木也當兼去其陰火則愈矣時痰嗽者秋涼在外在上而作也當以溫劑實其皮毛身重脈緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣益血微瀉陰火與濕通行經脈調其陰陽則已矣非五臟六腑之本有邪也此藥主之

生甘草去腎熱

澤瀉除濕導火

蒼朮除濕補中

當歸身

人參已上各參錢

黃芪伍錢

酒黃蘗除濕火

升麻助行經

草豆蔻仁益陽退外寒已上各壹錢伍分

白朮已上各貳錢

佛耳草

白茯苓除濕導火

柴胡已上各壹錢

橘皮

白芍藥

炙甘草已上各肆錢

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠服之

麻黃桂枝升麻湯

治婦人先患渾身麻木睡覺則少減開目則已而全愈又證已痊又因心中煩惱遍身骨節疼身體沉重飲食減少腹中氣不運轉

木香

半夏

厚朴

炙甘草

茯苓

生薑已上各壹分

陳皮

黑附子

升麻

澤瀉已上各叁分

桂枝

草豆蔻仁

黃蘗已上各貳分

白朮

黃芪

麻黃節不去 人參已上各伍分  
右都作一服。水二盞煎至一盞。去粗食遠服之。

# 蘭室秘藏卷下

## 大便結燥門

### 大便結燥論

金匱真言論云。北方黑色。入通腎。開竅於二陰。藏精於腎。又云。腎主大便。大便難者。取足少陰。夫腎主五液。津液潤則大便如常。若饑飽失節。勞役過度。損傷胃氣。及食辛熱味厚之物。而助火邪。伏於血中。耗散真陰。津液虧少。故大便結燥。然結燥之病不一。有熱燥。有風燥。有陽結。有陰結。又有年老氣虛。津液不足。而結燥者。治法云。腎惡燥。急食辛以潤之。結者散之。如少陰不得大便。以辛潤之。太陰不得大便。以苦泄之。陽結者散之。陰結者溫之。仲景云。小便利而大便硬。不可攻下。以脾約丸潤之。食傷太陰。腹滿而食不化。腹響。然不能大便者。以苦藥泄之。如血燥而不能大便者。以桃仁酒製。大黃通之。風結燥而大便不行者。以麻子仁加大黃利之。如氣澀而大便不通者。以郁李仁。枳實。皂角仁潤之。大抵治病必究其源。不可一概用巴豆。牽牛之類下之。損其津液。燥結愈甚。復下復結。極則以至導引於下而不通。遂成不救。噫。可不慎哉。

### 通幽湯

治大便難。幽門不通。上衝吸門不開。噎塞不便。燥祕氣不得下。治在幽門以辛潤之。



炙甘草

紅花已上各壹分

生地黄

熟地黄已上各伍分

升麻

桃仁泥

當歸身已上各壹錢

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗調檳榔細末五分稍熱食前服之

潤燥湯

升麻

生地黄已上各貳錢

熟地黄

當歸梢

生甘草

大黃煨

桃仁泥

麻仁已上各壹錢

紅花伍分

右除桃仁麻仁另研如泥外到如麻豆大都作一服水二盞入桃仁麻仁泥煎至一盞去粗空心稍熱服

潤腸丸

治脾胃中伏火大便祕澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血祕皆令閉塞也以潤燥和血疎風自然通利矣

桃仁湯浸去皮尖

麻仁已上各壹兩

當歸梢

大黃煨

羌活已上各壹錢

右除桃仁、麻仁另研如泥外，搗爲極細末，煉蜜爲丸。如梧桐子大，每服三五十九，空心白湯下。如病人不大便，爲大便不通而澀，其邪盛者，急加酒洗大黃以利之。

如血燥而大便燥乾者，加桃仁、酒洗大黃。

如風結燥，大便不行者，加麻仁、大黃。

如風濕而大便不行，加煨皂角仁、大黃、秦艽以利之。

如脈澀覺身有氣澀而大便不通者，加郁李仁、大黃，以除氣燥。

如寒陰之病，爲寒結閉而大便不通者，以局方中半硫丸或加煎附子乾薑湯冰冷與之，其病雖陰寒之

證，當服陽藥補之。若大便不通者，亦當十服中與一服藥，微通其大便，不令結閉，乃治之大法。

若病人雖是陰證，或是陰寒之證，其病顯躁，脈實堅，亦宜於陽藥中少加苦寒之藥，以去熱躁，躁止勿加。如陰躁欲坐井中者，其二腎脈按之必虛，或沉細而遲，此易爲辯耳。如有客邪之病，亦當從權加藥以去之。

### 麻黃白朮湯

治大便不通，五日一遍，小便黃赤，渾身腫，面上及腹尤甚，色黃麻木，身重如山，沉困無力，四肢痿軟，不能舉動，喘促唾清水，吐噦痰唾白沫如膠，時躁熱發欲去衣，須臾而過，振寒，項額有時如冰，額寒尤甚，頭旋眼黑，目中溜火，冷淚，鼻不聞香臭，少腹急痛，當臍有動氣，按之堅硬而痛。

青皮去腐

酒黃連已上各壹分

酒黃蘗

橘紅

甘草炙半

升麻已上各貳分

黃芪

人參

桂枝

白朮

厚朴

柴胡

蒼朮

豬苓已上各叁分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉已上各肆分

白豆蔻

炒麴已上各伍分

麻黃不去節伍錢

杏仁肆箇

右咬咀分作二服。水二大盞半。先煎麻黃。令沸去沫。再入諸藥。同煎至一盞。去粗稍熱。食遠服。

此證宿有風濕熱。伏於榮血之中。其木火乘於陽道。為上盛。元氣短少。上喘為陰火傷其氣。四肢痿。在腎水之間。乃所勝之病。今正遇冬寒得時。乘其肝木。又實其母。肺金尅火。凌木。是大勝必有。大復。其證善恐欠多。噎鼻中如有物。不聞香臭。目視眈眈。多悲健忘。少腹急痛。通身黃。腹大脹。面目腫尤甚。食不下。痰唾涕有血。目眇癆。大便不通。並宜此藥治之。

升陽湯 一名升陽瀉濕湯

治膈咽不通。逆氣裏急。大便不行。

青皮

槐子已上各貳分

生地黃

熟地黃

黃蘗已上各  
叁分

當歸身

甘草梢已上各  
肆分

蒼朮伍分

升麻柒分

黃芪壹錢

桃仁拾箇  
另研

右咬咀如麻豆大都作一服。入桃仁泥水二大盞。煎至一盞。去粗。稍熟。食前服。

活血潤燥丸

治大便風祕血祕。常常燥結。

當歸梢壹錢

防風叁錢

大黃濕紙  
裹煨

羌活已上各  
壹兩

皂角仁燒存性。去皮。壹兩伍錢。其性  
得濕則滑。濕滑則燥。結自除。

桃仁貳兩  
另研

麻仁貳兩伍錢  
另研

右除麻仁桃仁另研如泥外。為極細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服五十九。白湯下。三兩服後。須以蘇麻子粥。每日早晚食之。大便日久不能結燥也。以磁器盛之。紙封。無令見風。

潤腸湯

治大腸結燥不通。

生地黃

生甘草已上各  
壹錢

大黃煨

熟地黃

當歸梢

升麻

桃仁

麻仁已上各  
壹錢

紅花叁分

右咬咀。水二盞。煎至一盞。去粗。食遠溫服。

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云。病有關有格。關則不得小便。又云。關無出之謂。皆邪熱爲病也。分在氣在血而治之。以渴與不渴而辨之。如渴而小便不利者。是熱在上焦肺之分。故渴而小便不利也。夫小便者。是足太陽膀胱經所主也。長生於中。申者。西方金也。肺合生水。若肺中有熱。不能生水。是絕其水之源。經云。虛則補其母。宜清肺而滋其化源也。故當從肺之分。助其秋令。水自生焉。又如雨如露如霜。皆從天而降下也。乃陽中之陰。明秋氣自天而降下也。且藥有氣之薄者。乃陽中之陰。是感秋清肅殺之氣而生。可以補肺之不足。淡味滲泄之藥是也。茯苓、澤瀉、琥珀、燈心、通草、車前子、木通、瞿麥、扁蓄之類。以清肺之氣。泄其火。資水之上源也。如不渴而小便不通者。熱在下焦血分。故不渴而大燥。小便不通也。熱閉於下焦者。腎也。膀胱也。乃陰中之陰。陰受熱邪。閉塞其流。易上老云。寒在胸中。遏絕不入。熱在下焦。填塞不便。須用感北方寒水之化。氣味俱陰之藥。以除其熱。泄其閉塞。內經云。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。若服淡滲之藥。其性乃陽中之陰。非純陽之劑。陽無以化。何能補重陰之不足也。須用感地之水運而生。太苦之味。感天之寒藥而生。大寒之氣。此氣味俱陰。乃陰中之陰也。大寒之氣。人稟之生膀胱。寒水之運。人感之生腎。此藥能補腎。

與膀胱受傷中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必伏其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也  
通關丸一名滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分也

黃蘗去皮剉酒洗焙

知母剉酒洗焙乾

肉桂伍分

右爲細末熟水爲丸如梧桐子大每服一百丸空心白湯下頓兩足令藥易下行故也如小便利前陰中如刀刺痛當有惡物下爲驗

清肺飲子

治渴而小便閉澀不利邪熱在上焦氣分

燈心壹分

通草貳分

澤瀉

瞿麥

琥珀已上各伍分

扁蓄

木通已上各柒分

車前子炒壹錢

茯苓去皮貳錢

猪苓去皮叁錢

右爲羅末每服五錢水一盞半煎至一盞稍熱食遠服或局方八正散五苓散亦宜服之  
導氣除燥湯

治小便閉塞不通。乃血澀至氣不通而竅澀也。

茯苓去皮

滑石炒黃已上各貳錢

知母細洗

澤瀉已上各參錢

黃蘗洗肆錢去皮酒

右咬咀。每服五錢。水三盞。煎至一盞。去粗。稍熱。空心服。

如急閉。不拘時服。

腎疸湯

治腎疸目黃。甚至渾身黃。小便赤澀。

羌活

防風

藁木

獨活

柴胡已上各伍分

升麻伍錢

已上治腎疸目黃渾身黃。

白茯苓貳分

澤瀉參分

豬苓肆分

白朮伍分

蒼朮壹錢

已上治小便赤澀。

黃蘗貳分

人參參分

葛根伍分

神麴陸分

甘草參錢

右剉如大豆大，分作二服，水三盞，煎至一盞，去粗，稍熱食前服。

### 痔漏門

#### 痔漏論

內經曰：因而飽食，筋脈橫解，腸澀爲痔。夫大腸庚也，主津，本性燥，清肅殺之氣，本位主收，其所司行津以從足陽明，旺則生化萬物者也。足陽明爲中州之土，若陽衰亦殞殺萬物，故曰：萬物生於土而歸於土者，是也。以手陽明大腸司其化焉，旣在西方，本位爲之害，蜚司殺之府，因飽食行房，忍泄前陰之氣，歸於大腸，木乘火勢而侮燥金，故火就燥也。大便必閉，其疾甚者，當以苦寒瀉火，以辛溫和血潤燥，疎風止痛，是其治也。以秦艸當歸梢和血潤燥，以桃仁潤血，以皂角仁除風燥，以地榆破血，以枳實之苦寒補腎，以下泄胃實，以澤瀉之淡滲，使氣歸於前陰，以補清燥，受胃之濕邪也。白朮之苦甘，以苦補燥氣之不足，其甘味以瀉火而益元氣也，故曰：甘寒泄火，乃假枳實之寒也。古人用藥，爲下焦如瀆，又曰：在下者引而竭之，多爲大便秘澀，以大黃推去之，其津血益不足，以當歸和血及油潤之劑，大便自然輒利矣，宜作剉湯以與之，是下焦有熱，以急治之之法也。以地榆酸苦而壞胃，故宿食消盡，空心作丸服之。

#### 秦艸白朮丸

治痔疾并痔漏有膿血，大便秘硬，而作疼痛不可忍。

秦艸去芦

桃仁湯浸去皮尖

皂角仁燒存性各壹兩



當歸梢酒浸

澤瀉

枳實鉄炒

白朮已上各伍錢

地榆參錢

右爲細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊爲丸如雞頭仁大令藥光滑焙乾每服五七十九白湯下空心服待少時以美饍壓之忌生冷硬物冷水冷菜之類并濕麵酒及辣辛熱大料物之類犯之則藥無驗也

秦朮蒼朮湯

治痔疾若破謂之痔漏大便祕澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也爲病者胃濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也若大便燥結者主病兼受火邪熱結不通也去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦助病爲邪須當破氣藥兼之治法全矣以剉湯與之其効如神

秦朮去苗

桃仁湯浸去皮另研

皂角仁燒存性另研各壹錢

蒼朮製

防風已上各柒分

黃蘗去皮酒洗伍分

當歸梢酒洗

澤瀉已上各叁分

梭身檳榔壹分另研

大黃少許雖大便過澀亦不可多用

右除檳榔桃仁皂角仁三味外餘藥咬咀如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞二分去粗入檳榔等

三味末。再上火煎至一盞。空心熱服。待少時以美饌壓之。不犯胃氣也。服藥日忌生冷硬物及酒濕麵。大料物乾薑之類。犯之則其藥無効。

如有白膿。加白葵花頭五朶。去萼心。青皮半錢。不去白。入正藥中同煎。木香三分為細末。同檳榔等三味。依前煎服。古人治此疾。多以歲月除之。此藥一服則愈。

### 七聖丸

治大腸疼痛不可忍。叔和云。積氣生於脾藏傍。大腸疼痛陣難當。漸交稍瀉三焦火。莫謾多方立紀綱。

羌活 壹兩

郁李仁 湯浸去皮另研壹兩伍錢

大黃 搗錢

檳榔

桂去皮

木香

川芎 已上各伍錢

右除郁李仁另研入外。共為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服三五十九。白湯下。食前。取大便微利。一服而愈。切禁不得多利大便。其痛滋甚。

### 秦艽防風湯

治痔漏。每日大便時發疼痛。如無疼痛者。非痔漏也。此藥主之。

秦艽

防風

當歸身

白朮 已上各壹錢伍分

炙甘草

澤瀉 已上各陸分

黃蘗伍分。

大黃煨。

橘皮已上各參分。

柴胡

升麻已上各貳分。

桃仁參拾箇。

紅花少許。

右剉如麻豆大。都作一服。水三盞。煎至一盞。去粗稍熱。空心服之。避風寒。忌房事酒濕麵大辛熱物。

秦朮羌活湯

治痔漏成塊下垂。不任其癢。

羌活壹錢貳分。

秦朮

黃芪已上各壹錢。

防風柒分。

升麻

炙甘草

麻黃

柴胡已上各伍分。

藁本參分。

細辛少許。

紅花少許。

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。空心服之。忌風寒處大小便。

當歸郁李仁湯

治痔漏。大便硬。努出大腸頭下血。苦痛不能忍。

郁李仁

皂角仁已上各壹錢。

枳實柒分。

秦朮

麻仁

當歸梢

生地黃

澤瀉已上各參分

蒼朮已上各伍分

大黃煨

右剉如麻豆大。除皂角仁別爲末。水三盞。煎至一盞。去粗。入皂角仁末。調空心食前服之。忌如前。  
紅花桃仁湯

治痔漏經年。因而飽食。筋脈橫解。腸澀爲痔。治法當補北方。瀉中央。

黃蘗壹錢伍分

生地黃壹錢

澤瀉捌分

蒼朮陸分

當歸梢

漢防己

防風梢

豬苓已上各伍分

麻黃貳分

紅花半分

桃仁拾箇

右剉如麻豆大。水三盞。煎至一盞。去粗。稍熱。食前服之。忌如前。  
秦芫當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛。

大黃煨肆錢

秦芫

枳實已上各壹錢

澤瀉

當歸梢

皂角仁

白朮已上各伍分

紅花少許

桃仁貳拾箇

右都作一服。水三盞。煎至一盞。去粗。食前熱服。忌如前。

陰痿陰汗門

陰痿陰汗及臊臭論

一富者前陰臊臭。又因連日飲酒。腹中不和。求先師治之。曰。夫前陰者。足厥陰肝之脈絡循陰器出其挺末。凡臭者。心之所主。散入五方為五臭。入肝為臊。此其一也。當於肝經中瀉行間。是治其本。後於心經中瀉少衝。乃治其標。如惡針。當用藥除之。酒者。氣味俱陽。能生裏之濕熱。是風濕熱合於下焦為邪。故經云。下焦如瀆。又云。在下者引而竭之。酒是濕熱之水。亦宜決前陰以去之。

龍膽瀉肝湯

治陰部時復熱痒及臊臭。

柴胡梢

澤瀉已上各壹錢

車前子

木通已上各伍分

生地黄

當歸梢

草龍膽已上各叁分

右剉如麻豆大。都作一服。水三盞。煎至一盞。去粗。空心稍熱服。便以美膳壓之。此藥柴胡入肝為引。用澤瀉、車前子、木通淡滲之味。利小便。亦除臊氣。是名在下者引而竭之。生地黄、草龍膽之苦寒。瀉酒濕熱。更兼車前子之類。以撤肝中邪氣。肝主血。用當歸以滋肝中血不足也。

清震湯

治小便溺黃臊臭淋瀝。兩丸如冰。陰汗浸多。

羌活

酒黃蘗已上各壹錢

升麻

柴胡

蒼朮

黃芩已上各伍分

澤瀉肆分

麻黃根

猪苓

防風已上各參分

炙甘草

當歸身

藜蘆已上各貳分

紅花壹分

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。臨臥服。大忌酒濕麵。

固真湯一名正元湯。

治兩丸冷。前陰痿弱。陰汗如水。小便後有餘滴。尻臀并前陰冷。惡寒而喜熱。膝下亦冷。

升麻

羌活

柴胡已上各壹錢

炙甘草

草龍膽

澤瀉已上各壹錢

黃蘗

知母已上各貳錢

右剉如麻豆大。分作二服。水二盞。煎至一盞。去粗。空心稍熱服。以早飯壓之。

清魂湯一名柴胡勝濕湯。

治兩外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊濕痒臊氣。

柴胡

生甘草

酒黃蘗已上各  
貳錢

升麻

澤瀉已上各  
錢伍分

當歸梢

羌活

麻黃根

漢防己

草龍膽

茯苓已上各  
壹錢

紅花少許

五味子貳拾  
箇

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服忌酒濕麵房事。

椒粉散

治前陰兩丸濕痒痛秋冬甚夏月減。

肉桂貳分

小椒

當歸梢

豬苓已上各  
叁分

蛇床子

黑狗脊已上各  
伍分

麻黃根壹錢

輕粉少許

紅花少許

班貓兩枚

右爲末乾糝上避風寒冷濕處坐臥。

補肝湯

治前陰冰冷，并陰汗，兩脚痿弱無力。

黃芪 柒分

炙甘草 伍分

升麻

猪苓 已上各肆分

白茯苓

葛根

人參 已上各叁分

柴胡

羌活

陳皮

連翹

當歸身

黃蘗 炒

澤瀉

蒼朮

麴末

知母

防風 已上各貳分

溫腎湯

右剉如麻豆大，都作一服。水二大盞，煎至一盞，去粗，空心稍熱服。忌酒濕麵。

治面色痿黃，身黃，脚痿弱無力，陰汗。

柴胡

麻黃根 已上各陸分

白茯苓

白朮

酒黃蘗

猪苓

升麻 已上各壹錢

蒼朮

防風 已上各壹錢伍分

澤瀉 貳錢

右分作二服，每服水二大盞，煎至一盞，去粗，食前稍熱服。一時辰許方食。



延胡丁香丸 一名丁香疝氣丸

治臍下撮急疼痛并周身皆急痛小便頻數及五脈急獨腎脈按之不急皆虛無力名曰腎疝

羌活 叁錢

當歸

茴香 已上各 貳錢

延胡索

麻黃根節

肉桂 已上各 壹錢

丁香

木香

甘草

川烏頭 已上各 伍分

防己 叁分

蠍 拾叁 筒

右爲細末酒煮麵糊爲丸如雞頭大每服五十九空心鹽白湯服

瀉痢門

訶子皮散

癸卯冬白樞判家一老漢面塵脫色神氣特弱病脫肛日久服藥未驗復下赤白膿痢作裏急後重白多赤少不任其苦以求其治曰此非肉食膏粱必多蔬食或飲食不節天氣雖寒衣蓋猶薄不禁而腸頭脫下者寒也真氣不禁形質不收乃血滑脫也此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當以澀去其脫而除其滑微酸之味固氣上收以大熱之劑而除寒補陽以補氣之藥升陽益氣

御米殼 去帶 炒 蜜炒

橘皮 已上各 伍分

乾薑 炮 陸 分

訶子 煨 去核 柒分

右爲細末。都作一服。水二盞。煎至一盞。和粗空心熱服。

升麻補胃湯

治宿有陽明血證。因五月間大熱。喫杏。腸澀下血。啣遠散漫如篩。腰沉沉然。腹中不痛。血色紫黑。病名濕毒腸澀。屬陽明少陽經血證也。

白芍藥壹錢五分

升麻

羌活

黃芪已上各壹錢

生地黃

熟地黃

獨活

牡丹皮

炙甘草

柴胡

防風已上各伍分

當歸身

葛根已上各叁分

肉桂少許

右剉如麻豆大。分作二服。每服水二盞。煎至一盞。去粗。食前稍熱服。

升陽去熱和血湯

治腸澀下血。另作一派。其血啣出有力而遠射。四散如篩。腸中血下行。腹中大作痛。乃陽明氣衝熱毒所作也。當升陽去濕熱和血脈。是其治也。

橘皮貳分

熟地黃

當歸身

蒼朮

秦艽

肉桂已上各叁分

生地黄

牡丹皮

生甘草已上各伍分

升麻柒分

熟甘草

黃芪已上各壹錢

白芍藥壹錢伍分

右咬咀都作一服。水四盞。煎至一盞。去粗。空心稍熱服。立効。

益智和中湯

治腸澀下血。或血色紫黑。腹中痛。腹皮惡寒。右手關脈弦。按之無力。而喜熱物熨之。內寒明矣。

肉桂壹分

桂枝肆分

牡丹皮

柴胡

葛根

益智仁

半夏已上各伍分

當歸身

炙甘草

黃芪

升麻已上各壹錢

白芍藥壹錢伍分

乾薑少許

右爲麤末。都作一服。水三盞。煎至一盞。去粗。食後溫服。

芍藥藥皮丸

治濕熱惡痢。血痢。頻併窘痛。無間膿血。並皆治之。

芍藥

黃蘗已上各壹兩

當歸

黃連已上各伍錢

右爲末飯爲丸如雞頭大每服五七十九食前米飲湯下忌油膩酒濕麵等物  
和中益胃湯

治太陰陽明腹痛大便常泄若不泄卽祕而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛脅下急縮脈緩而洪弦中之下得之按之空虛

蘇木壹分

藁本

益智仁已上各貳分

熟地黃

炙甘草已上各叁分

當歸身肆分

柴胡

升麻已上各伍分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服

槐花散

治腸澼下血濕毒下血

川芎肆分

槐花

青皮

荆芥穗

熟地黃

白朮已上各陸分

當歸身

升麻已上各壹錢

右爲細末每服三錢米飲湯調下食前忌酒濕麵生冷硬物

茯苓湯

治因傷冷飯水泄。一夜走十行。變作白痢。次日其痢赤白。腹中疔痛。減食熱躁。四肢沉困無力。

生黃芩參分

當歸身肆分

肉桂

炙甘草已上各伍分

猪苓

茯苓已上各陸分

澤瀉壹錢

芍藥壹錢伍分

蒼朮

生薑

升麻

柴胡已上各貳錢

右咬咀如麻豆大。分作二服。每服水二盞。煎至一盞。去粗稍熱。食前服之。

黃芪補胃湯

治一日大便三四次。澹而不多。有時作泄。腹中鳴。小便黃。

黃芪

柴胡

當歸身

益智

橘皮已上各參分

升麻陸分

炙甘草貳錢

紅花少許

右咬咀都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱。食前服之。

升陽除濕湯

自下而上者。引而去之。

蒼朮壹錢

防風

澤瀉

陳皮

柴胡

升麻

猪苓

麥蘖麵

羌活

神麴

炙甘草

右都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。空心服之。  
如胃寒腸鳴。加益智仁半夏各伍分。生薑三片。棗一枚。同煎。至非腸鳴不得用。  
人參益胃湯

治頭悶勞動則微痛。不喜飲食。四肢怠惰。躁熱短氣。口不知味。腹鳴。大便微溏。身體昏悶。覺渴。不喜冷物。

黃芪

益智已上各貳分

柴胡

陳皮

紅花少許

甘草

人參

半夏

升麻

當歸梢

黃芩

白朮

蒼朮

右都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱。食前服之。

升麻補胃湯

治因內傷服牽牛大黃食藥泄瀉過多腹中大痛。

甘草柒分。

升麻

柴胡

草豆蔻

黃芪已上各伍分

半夏叁分

當歸身

乾薑已上各貳分

紅花少許

右都作一服。水二盞煎至一盞。去粗稍熱。食遠服之。

瘡瘍門

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石。或在耳下至缺盆中。或肩膊上。或於脅下。皆手足少陽經中。及癰癤遍於頰。或至頰車。堅而不潰。在足陽明經中所出。或二證瘡已破。流膿水。並皆治之。

黃芩開錢酒洗炒一牛

草龍膽酒洗各四退

瓜蒌根剉碎酒洗

黃蘗酒製

酒知母

桔梗

昆布已上各伍錢

柴胡肆錢

炙甘草

京三稜酒洗

廣茂酒洗

連翹已上各叁錢

葛根

白芍藥

當歸梢

黃連已上各  
貳錢

升麻陸分

右咬咀。每服六錢。水二盞。零八分。先浸多半日。煎至一盞。去粗。食後熱服。於臥處伸足在高處。頭低垂。每合一口。作十次嚥。服畢。依常安臥。取藥在膈上停蓄故也。另攢半料作細末。煉蜜爲丸。如菉豆大。每服百餘丸。用此藥湯留一口送下。或加海藻五錢炒亦妙。

升陽調經湯

治癰癧透頸。或至頰車。此皆出足陽明胃經中來。若瘡深遠。隱曲肉底。是足少陰腎經中來。乃戊脾傳於癸腎。是夫傳與妻。俱作塊子。堅硬大小不等。並皆治之。或作丸亦可。

升麻捌錢

葛根

草龍膽酒製

黃芩酒製

廣茂酒洗

京三稜酒洗

炙甘草

黃連酒洗

連翹

桔梗已上各  
伍錢

生黃芩肆錢

當歸梢

芍藥已上各  
參錢

黃蘗酒洗  
貳錢

知母酒洗  
壹兩

右另秤一半作末。煉蜜爲丸。如菉豆大。每服百餘丸。一半作咬咀。每服五錢。若能食。大便硬。可旋加至七八錢。水二盞。先浸半日。煎至一盞。去粗。臨臥熱服。足高去枕仰臥。嚥一口。作十次嚥之。留一口在後。送下丸藥。服畢。其臥如常。



連翹散堅湯

治耳下或至缺盆或肩upper生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀從手足少陽經中來也或生兩脅或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡壹兩 貳錢

草龍膽酒洗 四次

土瓜根酒製 已上壹兩

黃芩酒炒 貳錢 次柒錢

當歸梢

生黃芩

廣茂

京三稜同廣茂 酒炒

連翹

芍藥已上各 伍錢

炙甘草叁錢

黃連酒炒 兩次

蒼朮已上各 貳錢

右另秤一半為細末煉蜜為丸如菉豆大每服百餘丸一半咬咀每服五錢水二盞先浸多半日煎至一盞去粗臨臥熱服去枕仰臥每口作十次嚥之留一口送下丸藥服畢臥如常更以後藥塗之

龍泉散

龍泉粉炒

瓦粉

廣茂

京三稜酒洗 炒

昆布已上各 伍錢

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速

救苦化堅湯

治療癱馬刀挾癭從耳下或耳後下頰至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其癱瘓在頰下或至頰車乃足陽明之經分受心脾之邪而作也今將二證合而治之

黃芪壹錢

護皮毛間腠理虛及活血脈生血亦瘡家聖藥也又能補表實元氣之弱也

人參叁分

補肺氣之藥也如氣短不調及喘者加之

炙甘草伍分

能調中和諸藥瀉火益胃氣亦能去瘡邪

真漏蘆

升麻已上各壹錢

葛根伍分

此三味俱足陽明本經藥也

連翹壹錢

此一味十二經瘡中之藥不可無也能散諸血經氣聚此瘡家之神藥也

牡丹皮叁分

去腸胃中留滯宿血

當歸身

生地黃

熟地黃已上各叁分

此三味諸經中和血生血涼血藥也。

白芍藥參分。

如夏月倍之其味酸其氣寒能補中益肺之虛弱治腹中痛必用之冬寒則不可用。

肉桂貳分。

大辛熱能散結積陰證瘡瘍須當少用之此寒因熱用之意又為寒陰覆蓋其瘡用大辛熱以消浮凍之氣如有煩躁者去之。

柴胡捌分。

功同連翹如瘡不在少陽經則去之。

黍粘子參分。

無腫不用。

羌活壹錢。

獨活

防風已上各伍分。

此三味必關手足太陽證脊痛項強不可迴視腰似折項似拔者是也其防風一味辛溫若瘡在膈已上雖無手足太陽經證亦當用之為能散結去上部風邪病人身拘急者風也。

昆布貳分。

其味大鹹若瘡堅硬結硬者宜用鹹能軟堅。

京三稜煨分貳

廣茂煨分叁

此二味若瘡堅硬甚者用之。如不堅硬勿用。

益智仁貳分

如唾多者胃不和也。或病人吐沫吐食胃上寒者加之。無則去之。

大麥蘖壹錢

治腹中縮急兼能消食補胃。

神麴末炒貳分黃色

爲食不消化故也。

黃連去鬚叁分

以治煩悶。

黃蘗炒叁分

如有熱或腿脚無力加。如有躁煩欲去衣者腎中伏火也。更宜加之。無此證勿用。

厚朴叁錢貳分盪製

如腹脹者加之。無則勿用。

右爲細末。湯浸餅和丸。捻作餅子。日乾。搗如米粒大。每服三錢。白湯下。

如氣不順。加橘皮。甚者加木香少許。量病人虛實。臨時斟酌與之。無令藥多妨其飲食。此治之大法也。

如止在陽明。分爲癰癰者。去柴胡。黍粘子二味。餘皆用之。

如在少陽。分爲馬刀挾瘦者。去獨活。漏蘆。升麻。葛根。更加瞿麥穗三分。

如本人素氣弱。其病勢來時。氣盛而不短促者。不可考其平素。宜作氣盛而從病變之權也。宜加黃芩、黃連、黃蘗、知母、防己之類。視邪氣在上中下三處。

假令在上焦。加黃芩。一半酒洗。在中焦。加黃連。一半酒洗。在下焦。則加酒製黃蘗、知母、防己之類。選而用之。

如本人大便不通。而滋其邪盛者。加酒製大黃以利。

如血燥而大便燥乾者。加桃仁、酒製大黃二味。

如風結燥不行者。加麻仁、大黃。

如風澀而大便不行。加煨皂角仁、大黃、秦芫以利之。

如脈澀覺身有氣澀而大便不通者。加郁李仁、大黃以除氣燥也。

如陰寒之病。爲寒結閉而大便不通。以局方中半硫丸。或加煎附子、乾薑、冰冷與之。大抵用藥之法。不惟瘡瘍一說。諸疾病量人素氣弱者。當去苦寒之藥。多加人參、黃芪、甘草之類。瀉火而先補其元氣。餘皆倣此。

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡。

中桂參分。

炙甘草

柴胡

連翹已上各伍錢

右剉如麻豆大。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗稍熱。食後服之。

黍粘子湯

治耳痛生瘡。

昆布

蒲黃

連翹

黃芩

柴胡

桃仁參筒

當歸梢壹錢伍分

酒黃蘗

黃芩炒

瞿麥穗陸錢

蘇木

草龍膽已上各壹分

生地黃

炙甘草

黃芪已上各參分

紅花少許

黍粘子貳錢

生地黃已上各參錢

酒知母

生甘草

黍粘子

當歸梢

黃連已上各貳分

桔梗參錢

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗稍熱，食後服，忌寒藥，利大便。  
淨液湯一名連翹防風湯。

治皮膚痒，腋下瘡，背上瘡，耳聾耳鳴。

桂枝 貳分。

連翹

生地黄

桔梗

升麻

甘草 已上各 伍分。

當歸梢 柒分。

麻黃

草豆蔻仁

羌活

防風

柴胡

蒼朮 已上各 壹錢。

酒黃芩 壹錢。

紅花 少許。

消腫湯

右剉如麻豆大，都作一服，水二盞，煎至一盞，去粗，食後熱服。

治馬刀瘡。

黍粘子 炒。

黃連 已上各 伍分。

當歸梢

甘草 已上各 壹錢。

瓜蒌根

黃芪 已上各 伍分。

生黃芩

柴胡 已上各 貳錢。

連翹 叁錢。

紅花 少許。

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗稍熱。食後服。忌酒濕麵。  
內托羌活湯

治足太陽經中左右尺脈俱緊。按之無力。尻臀生癰。堅硬。腫痛大作。

肉桂 參分  
連翹  
炙甘草

蒼朮  
橘皮 伍分已上各  
當歸 梢

防風  
藥本 壹錢已上各  
黃芪 壹錢伍分

黃蘗 酒製  
羌活 貳錢已上各

右咬咀。都作一服。水二盞。酒一盞。煎至一盞。去粗稍熱。空心服。以夾衣蓋癰上。使藥力行。罷去蓋之衣。  
升麻托裏湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡。瘡頂陷下。作黑眼子。其脈弦洪。按之細小。

黃蘗 貳分  
肉桂 參分  
黍粘子 伍分

黃芪  
炙甘草  
當歸 身 壹錢已上各

連翹  
升麻  
葛根 錢伍分已上各

右咬咀。都作一服。水一大盞。酒半盞。同煎至一盞。去粗稍熱。食後服。  
內托黃芪湯



賈德茂小男於左大腿近膝股內出附骨癰。不辯肉色。漫腫。皮澤木硬。瘡勢甚大。其左脚乃肝之髀上也。更在足厥陰肝經之分。少侵足太陰脾經之分。其脈左三部細而弦。按之洪緩。微有力。此藥主之。

生地黄壹分。

黃蘗貳分。

肉桂叁分。

羌活伍分。

當歸梢柒分

土瓜根酒製。

柴胡梢已上各壹錢

連翹壹錢叁分

黃芪貳錢。

右咬咀都作一服。酒一盞。水二盞。煎至一盞。去粗。空心熱服。

柴胡通經湯

治小兒項側有瘡。堅而不潰。名曰馬刀瘡。

柴胡

連翹

當歸梢

生甘草

黃芩

黍粘子

京三稜

桔梗已上各貳分

黃連伍分。

紅花少許。

右剉如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗稍熱。食後服。忌苦藥泄大便。

白芷升麻湯

尹老家素貧寒。形志皆苦。於手陽明大腸經分出癰。幼小有癩疔。其臂外皆腫痛。在陽明左右寸脈。皆

短中得之俱弦。按之洪緩有力。此癰得自八風之變。以脈斷之。邪氣在表。其證大小便如故。飲食如常。腹中和。口知味。知不在裏也。不惡風寒。止熱燥。脈不浮。知不在表也。表裏既和。邪氣在經脈之中。內經云。凝於經絡爲瘡癰。其癰出身半已上。故風從上受之。故知是八風之變爲瘡者也。故治其寒邪。調其經脈中血氣。使無凝滯而已。

炙甘草壹分。

升麻

桔梗已上各伍分

白芷柒分。

當歸梢

生地黄已上各壹錢

生黃芩壹錢伍分

酒黃芩

連翹

黃芪已上各貳錢

中桂少許

紅花少許

保生救苦散  
右咬咀。分作二服。酒水各一大盞半。同煎至一盞。去粗稍熱。臨臥服。一服而愈。

治火燒或熱油烙及脫肌肉者。

生寒水石

大黃火煨

黃蘗油炒已上各等分

一上散  
右爲細末。用油調塗之。或乾用此藥塗之。其痛立止。日近完復。永無破傷風之患。

治諸般疥癬必效。

雄黃通明手呵破者

黑狗脊

蛇床子炒

熟硫黃已上各伍錢

寒水石陸錢

班貓拾叁箇去翅足毛研碎

右另研雄黃、硫黃、寒水石如粉。次入班貓和蛇牀子、黑狗脊為細末。同研勻。先洗疥癬。令湯透去痂。油調。手中擦熱。以鼻中臭。三兩次擦上。可一上即愈。

如痛甚及腫滿高起者。加寒水石一倍。

如不苦癢。只加黑狗脊。

如微癢。只加蛇牀子。

如瘡中有蟲。加雄黃。

如喜火炙湯浴者。加硫黃。

聖愈湯

治諸惡瘡。血出多而心煩不安。不得睡眠。亡血故也。以此藥主之。

生地黃

熟地黃

川芎

人參已上各叁分

當歸身

黃芪已上各伍分

右咬咀如麻豆大。都作一服。水二大盞。煎至一盞。去粗稍熱。無時服。

獨聖散

治湯泡破，火燒破，瘡毒疼痛。

生白礬

右爲細末，芝麻油調，掃瘡破處，不拘時候。

黃芪肉桂柴胡酒煎湯

治附骨癰，堅硬漫腫，不辨肉色，行步作痛，按之大痛。

黃芪

當歸梢已上各

柴胡壹分

黍粘子炒

連翹

肉桂壹錢上各

升麻柒分

炙甘草

黃蘗伍分上各

右咬咀，好糯酒一大盞半，水一大盞半，同煎至一大盞，去粗，空心溫服，少時，便以早飯壓之，不致大熱，上攻中上二焦也。

雜病門

安神丸

治心神煩亂怔忡，兀兀欲吐，胸中氣亂而熱，有似懊懣之狀，皆膈上血中伏火，蒸蒸然不安，宜用權衡法，以鎮陰火之浮越，以養上焦之元氣，經云：熱淫所勝，治以甘寒，以苦瀉之，以黃連之苦寒，去心煩除濕熱爲君，以甘草、生地黃之甘寒，瀉火補氣，滋生陰血爲臣，以當歸補血不足，以硃砂納浮留之火，而

安神明也。

黃連壹錢伍分酒洗

硃砂壹錢水飛

酒生地黃

酒當歸身

炙甘草已上各伍分

右件除硃砂水飛外。搗四味為細末。同和勻。湯浸餛餅為丸。如黍米大。每服十五丸。津唾嚥下。食後。

硃砂安神丸

治心煩懊懣。心亂怔忡。上熱胸中氣亂。心下痞悶。食入反出。

硃砂肆錢

黃連伍錢

生甘草貳錢伍分

右為末。湯浸餛餅為丸。如黍米大。每服十丸。食後津唾嚥下。

補氣湯

治皮膚間有麻木。乃肝氣不行故也。

白芍藥

橘皮不去白各壹兩伍錢

炙甘草

黃芪已上各壹兩

澤瀉伍錢

右咬咀。每服一兩。水二盞。煎至一盞。去粗溫服。

當歸補血湯

治婦人肌熱躁熱。目赤面紅。煩渴引飲。晝夜不息。其脈洪大而虛。重按全無。內經曰。脈虛血虛。脈實血

實。又云。血虛發熱。證象白虎。惟脈不長。實爲辯也。若誤服白虎湯必死。此病得之於肌困勞役。

黃芪壹兩。  
當歸身貳錢酒製

右咬咀都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗稍熱。空心服。

### 柴胡升麻湯

治男子婦人四肢發熱。肌熱。筋骨熱。表熱如火燎。以手捫之烙人手。夫四肢者。屬脾土也。熱伏地中。此病多因血虛而得之。又有胃虛過食冷物。鬱遏陽氣於脾土之中。此藥主之。

升麻  
羌活  
白芍藥  
獨活

炙甘草  
柴胡已上各三錢  
人參已上各伍錢

生甘草貳錢  
防風伍錢

右咬咀。每服五錢。水二大盞。煎至一盞。去粗熱服。忌寒冷之物。

### 火鬱湯

治五心煩熱。是火鬱於地中。四肢者。脾土也。心火下陷於脾土之中。鬱而不得伸。故經云。火鬱則發之。

升麻  
葛根  
柴胡

白芍藥已上各壹兩  
防風  
甘草已上各伍錢

右咬咀。每服五錢。水二大盞。入連鬚葱白三寸。煎至一盞。去粗稍熱。不拘時候服。  
小黃丸

化痰涎。和胃氣。除濕。治胸中不利。

黃芩壹兩。

半夏湯製壹

白朮已上各伍錢

陳皮

青皮去白

黃芪已上各叁錢

澤瀉貳錢

乾薑壹錢伍分

右爲末。湯浸餗餅爲丸。如菉豆大。每服五十九。食遠。溫水下。

黃芩利膈丸

除胸中熱。利膈上痰。

生黃芩

炒黃芩已上各壹兩

半夏

黃連

澤瀉已上各伍錢

南星

枳殼

陳皮已上各叁錢

白朮貳錢

白礬伍分

右爲末。湯浸餗餅爲丸。如梧桐子大。每服三五十九。食遠。溫水下。忌酒濕麵。

補益腎肝丸

治目中流火。視物昏花。耳聾耳鳴。困倦乏力。寢汗惡風。行步不正。兩足欹側。臥而多驚。脚膝無力。腰以下消瘦。

柴胡

羌活

生地黃

苦參炒

防己炒已上各伍分

附子

肉桂已上各壹錢

當歸身叁錢

右為細末。熟水為丸。如雞頭仁大。每服五十九。食前溫水下。

大陽經嚏藥

防風貳分

羌活叁分

紅豆貳箇

右為細末。鼻內噤之。

麻黃茱萸湯

治胸中痛。頭痛。食減少。咽隘不利。右寸脈弦急。

麻黃

羌活已上各伍分

吳茱萸

黃芪

升麻已上各叁分

黃芩

當歸

黃蘗

藜蘆已上各貳分

川芎

蔓荊子

柴胡



蒼朮

黃連

半夏已上各壹分

細辛少許

紅花少許

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱服。食後。

黃芪湯

治表虛惡風寒。

黃芪伍錢

甘草叁錢

香白芷貳錢伍分

藁本

升麻已上各貳錢

草豆蔻

橘皮已上各壹錢伍分

麻黃

當歸身已上各壹錢

蓮花青皮柒分

柴胡陸分

黃蘗少許

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。不拘時服。

除濕補氣湯一名清神補氣湯

治兩腿麻木。沉重無力。多汗喜笑。口中涎下。身重如山。語聲不出。若寸脈洪大。

升麻陸錢

蒼朮肆錢

酒黃蘗

柴胡

黃芪已上各叁錢

酒知母

藁本

生甘草

當歸已上各貳錢

五味子

陳皮已上各壹錢伍分

右剉如麻豆大。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。空心服之。待少時。以早飯下之。

參歸湯  
補氣血俱不足。

黃芪柒分

甘草

生地黃已上各伍分

柴胡

草豆蔻仁

升麻已上各肆分

當歸身叁分

熟地黃

人參已上各貳分

益智仁少許

紅花少許

升陽湯  
右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗。食遠服。

治陽躄癱疾。足太陽經寒。恐則氣下行。宜升陽氣。

炙甘草伍錢

麻黃節不去

防風已上各捌錢

羌活壹兩伍錢

右咬咀。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。稍熱。空心服之。

自汗門

自汗論

或問濕之與汗為陰乎為陽乎。曰：西南坤土也。在人則為脾胃也。人之汗猶天地之雨也。陰滋其濕則為霧露為雨也。陰濕下行地之氣也。汗多則亡陽。陽去則陰勝也。甚為寒中。濕勝則音聲如從瓮中出。濕若中水也。相法家有說土音如居深瓮裏。言其壅也。遠也。不出也。以明其濕審矣。又知此二者亦為陰寒也。內經云：氣虛則外寒。雖見熱中。蒸蒸為汗。終傳大寒。知始為熱中。表虛亡陽。不任外寒。終傳寒中。多成痺塞矣。色以候天。脈以候地。形者乃候地之陰陽也。故以脈氣候之。皆有形無形之可見者也。

調衛湯

治濕勝自汗。補衛氣虛弱。表虛不任風寒。

黃芪

麻黃根 已上各壹錢

羌活 柒分

生甘草

當歸梢

生黃芩

半夏 宜製已上各伍分

麥門冬

生地黃 已上各參分

豬苓 貳分

蘇木

紅花 已上各壹分

五味子 柒筒

右剉如麻豆大。都作一服。水二盞。煎至一盞。去粗稍熱服。  
中風證必自汗。不得重發其汗。

清燥湯

治六月七月間濕令大行。子能令母實而熱旺。濕熱相合。必刑庚大腸。寒冷以救之。燥金受濕熱之邪。絕寒水生化之源。源絕則腎虧。痿厥之病大作。腰已下痿。轉攣。不能動。行步不正。兩足欹側。此藥主之。

黃芪壹錢五分

橘皮

白朮

澤瀉已上各五分

人參

白茯苓

升麻已上各參分

炙甘草

麥門冬

當歸身

生地黃

神麴末

猪苓已上各貳分

柴胡

酒黃蘗

黃連

蒼朮已上各壹分

五味子玖個

右剉如麻豆大。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去粗。空心熱服。

當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也。

當歸

生地黃

熟地黃

黃蘗

黃芩

黃連已上各等分

黃芪加一倍

右為麩末。每服五錢。水二盞。煎至一盞。食前服。小兒減半服之。

紅豆散

治頭重如山。此濕氣在頭也。

麻黃根炒錢伍

苦丁香伍分

羌活炒

連翹炒已上各叁分

紅豆拾個

右為細末。鼻內啗之。

治血通經湯

靈壽縣董監軍。癸卯冬大雪時。因事到真定。忽覺有風氣暴至。診候得六脈俱弦甚。按之洪實有力。其證手攣急。大便秘澀。面赤熱。此風寒始至加於身也。四肢者脾也。以風寒之邪傷之。則搐急而攣痺。乃風淫末疾而寒在外也。內經曰。寒則筋攣。正謂此也。本人素飲酒。內有實熱。乘於腸胃之間。故大便秘澀。而面赤熱。內則手足陽明受邪。外則足太陰脾經受風寒之邪。用桂枝甘草以却其寒邪。而緩其急。搗又以黃蘗之苦寒滑。以瀉實而潤燥。急救腎水。用升麻葛根以升陽氣。行手足陽明之經。不令遏絕。更以桂枝辛熱。入手陽明之經。為引用潤燥。復以芍藥甘草專補脾氣。使不受風寒之邪。而退木邪。專益肺金也。加人參以補元氣。為之輔佐。加當歸身去裏急。而和血潤燥。此藥主之。

芍藥伍分

人參

酒黃蘗

升麻

當歸身

桂枝已上各  
貳錢

葛根

炙甘草已上各  
壹錢

瀉榮湯

右剉如麻豆大，都作一服。水二大盞，煎至一盞，熱服。不拘時，令暖房中，近火摩搓其手。

治癘風滿面，連頭極癢，不任。眉毛脫落，先砭其處，令惡氣消盡，後服此藥。

連翹

升麻已上各  
陸分

桔梗伍分

生黃芩

生地黄已上各  
肆分

黃芪

蘇木

黃連

地龍

全蠍

當歸已上各  
叁分

白豆蔻

人參已上各  
貳分

甘草壹分  
半

梧桐淚壹分

麝香少許

桃仁叁個

蜜蟲去翅足  
炒叁箇

水蛭叁個  
令烟盡炒

右剉如麻豆大，除連翹、梧桐淚、白豆蔻另為細末。麝香、蜜蟲、水蛭三味同為細末，都作一服。水二盞，酒一盞，入連翹煎至一盞，去粗，再入白豆蔻二味并麝香等再煎至七分，稍熱，早飯後午前服之。忌酒濕。

麵生冷硬物。

人參益氣湯

治兩手指麻木。四肢困倦。怠惰嗜臥。乃熱傷元氣也。

黃芪 捌錢。

生甘草

人參 已上各

白芍藥 叁錢。

柴胡 伍分。

炙甘草

升麻 已上各 貳錢。

五味子 壹百肆 拾個。

右咬咀。分作四服。每服水二盞。煎至一盞。去粗稍熟。食遠服。

導氣湯

治兩腿麻木沉重。

黃芪 捌錢。

甘草 陸錢。

青皮 肆錢。

升麻

柴胡

當歸 梢

澤瀉 已上各 貳錢。

橘皮 壹錢。

紅花

五味子 壹百貳 拾個。

右咬咀。分作四服。每服水二大盞。煎至一盞。去粗。食前熱服。

補中湯

治面黃汗多。目赤。四肢沉重。減食。腹中時時痛。欬嗽。兩手寸脈短。右手脈弦細兼澀。關脈虛。

升麻

柴胡

當歸已上各  
貳分

神麴炒  
叁分

澤瀉肆分

大麥蘖麵

蒼朮已上各  
伍分

黃芪貳錢  
伍分

炙甘草捌分

紅花少許

五味子貳拾  
個

右咬咀。分作二服。水二盞。煎至一盞。去粗。食遠服。

麻黃蒼朮湯

治秋冬每夜五更嗽。連聲不絕。乃至天曉日高方緩。口苦。兩脅下痛。心下痞悶。臥而多驚。筋攣。肢節疼痛。痰唾涎沫。日晚神昏呵欠。不進飲食。

麻黃捌錢

蒼朮伍錢

黃芪壹錢  
伍分

草豆蔻陸分

柴胡

羌活已上各  
伍分

生甘草

當歸梢

防風已上各  
肆分

炙甘草

黃芩已上各  
叁分

五味子玖個

右咬咀。分作二服。水二盞。煎至一盞。稍熱。臨臥服。

上清湯



清利頭目，寬快胸膈。

人參

蔓荊子已上各五分

防風壹錢

葛根壹錢五分

黃芪叁錢

甘草肆錢

右咬咀，分作二服，水二盞，煎至一盞，去粗，臨臥熱服，以夾衣蓋覆不語，須臾汗出為效。

朮桂湯一名麻黃蒼朮湯

治寒濕所客，身體沉重，胃脘痛，面色痿黃。

蒼朮貳錢

麻黃

炒神麴

橘皮

白茯苓

澤瀉已上各壹錢

桂枝

半夏

草豆蔻仁

豬苓已上各伍分

黃芪叁分

炙甘草貳分

杏仁拾個

右都作一服，水二盞，生薑五片，煎至一盞，去粗，食前熱服。

正氣湯

治盜汗

炒黃蘗

炒知母已上各錢伍分

炙甘草伍分

右爲麤末。作一服。水二盞。煎至一盞。食前溫服。  
趁痛丸

治打撲閃損。腰痛不可忍。

乳香

沒藥各壹錢

白蒿苣子壹兩炒黃

烏梅壹個

白粟米壹錢炒黃

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。細嚼。溫酒空心下。

退熱湯

治表中虛熱。或遇夜則甚。

黃芪壹錢

柴胡柒分

生甘草

黃連酒製

黃芩

芍藥

地骨皮

生地黃去血熱

蒼朮伍分

當歸身

升麻參分

右咬咀。作一服。水二盞。煎至一煎。去粗。食遠溫服。

如身體力困者。加麥門冬、五味子已上各伍分。人參、甘草已上各壹錢。

解表升麻湯

治遍身壯熱骨節疼痛。

升麻

羌活

蒼朮已上各壹錢

防風捌分

柴胡

甘草已上各柒分

當歸

藥本已上各伍分

橘皮叁分

冬加麻黃節不去

春加麻黃去節

右咬咀作一服水二盞煎至一盞去粗溫服後以葱醋湯發之得微汗為效。

天麻黃芪湯

治表有風證因連日酣飲其證復來右口角并眼頗有側視及左手左脚腿麻木疼痛。

天麻

芍藥

神麴炒

羌活肢節不痛去之

茯苓已上各叁分

人參

黃連已上各肆分

當歸伍分

黃芪

甘草

升麻

葛根

黃蘗

蒼朮已上各陸分

澤瀉柒分

柴胡玖分

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去粗食遠溫服或加豬苓陸分。

健步丸

治膝中無力伸而不得屈屈而不能伸腰背腿膝沉重行步艱難

防己酒洗壹兩

羌活

柴胡

滑石炒

炙甘草

瓜蒌根酒洗已上伍錢

澤瀉

防風已上各參錢

苦參酒洗

川烏已上各壹錢

肉桂伍分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九煎愈風湯下空心服

白朮除濕湯

治午後發熱背惡風四肢沉重小便或多或少黃色此藥又治汗後發熱

白朮壹兩

生地黄炒

地骨皮

澤瀉

知母已上各參錢

赤茯苓

人參

炙甘草

柴胡已上各伍錢

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

如小便利減茯苓澤瀉一半

如有刺痛二料藥中加當歸身酒洗柒錢

加味四君子湯

治久癯熱多寒少不止。

白朮

白茯苓

人參

甘草

柴胡

薄荷葉

黃芩已上各等分

右咬咀。每服五錢。水二盞。生薑三片。棗一枚。煎至一盞。去粗。不拘時候服。

瀉血湯

治發熱晝少而夜多。太陽經中尤甚。晝病則在氣。夜病則在血。是足太陽膀胱血中浮熱。微有氣也。既病人太小便如常。知邪氣不在臟腑。是無裏證也。外無惡寒。知邪氣不在表也。有時而發。有時而止。知邪氣不在表不在裏。知在經絡也。夜發多而晝發少。是邪氣下陷之深也。此雜證當從熱入血室而論之。

生地黄酒洗炒

熟地黄

蒲黃

丹參酒炒

當歸酒洗去土

漢防己酒洗炒

柴胡去芦

甘草梢炙

羌活已上各兩

桃仁去皮。湯浸

洗面藥  
右爲麤末。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去粗。空心溫服。

治面有黧黯。或生瘡。或生瘰癧。及粉刺之類。并去皮膚燥癢。去垢膩。潤澤肌膚。

皂角 叁斤。去皮。弦子另搗。

好升麻 捌兩。

楮實子 伍兩。

白芨 壹兩。細切。

甘松 柒錢。

縮砂 連皮。

白丁香 壹分。收。顯月。

三柰子 伍分。已上各。

藜豆 淨。捌合。另搗。

糯米 壹升。貳合。

右爲細末。用之如常。

瑩肌如玉散

白丁香

白芨

白牽牛

白斂 已上各。壹兩。

白芷 柒錢。

當歸 稍。

白蒺藜

升麻 已上各。伍錢。

白茯苓

楮實子 已上各。叁錢。

麻黃 去節。貳錢。

白附子

連翹 已上各。壹錢。伍分。

小椒 壹錢。

右爲細末。用之如常。

面油摩風膏

麻黃

升麻去黑皮

防風已上各貳錢

羌活去皮

當歸身

白芨

白檀已上各壹錢

右用小油半斤。以銀器中熬。綿包定前藥於油中熬之。得所澄淨。去粗。入黃蠟一兩。再熬之為度。

小兒門

治驚論

外物驚。宜鎮心。以黃連安神丸。若氣動所驚。宜寒水石安神丸。大忌防風丸。治風辛溫之藥。必殺人。何也。辛散浮溫熱者。火也。能令母實。助風之氣盛。皆殺人也。因驚而泄青色。先鎮肝。以硃砂之類。勿用寒涼之氣。大禁涼驚丸。風木旺。必克脾胃。當先實其土。後瀉其木。閻孝忠編集錢氏方。以益黃補上。悞矣。其藥有丁香。辛熱助火。火旺土愈虛矣。青橘皮瀉肺金。丁香辛熱。大瀉肺與大腸。脾實當瀉。子令脾胃虛。反更瀉子而助火。重虛其土。殺人無疑矣。其風木旺證。右關脈洪大。掌中熱。腹皮熱。豈可以助火瀉金。如寒水來乘脾土。其病嘔吐。腹痛。瀉痢青白。益黃散。聖藥也。今立一方。先瀉火補金。大補其土。是為神治之法。

黃芪貳錢

人參壹錢

炙甘草伍分

右咬咀作一服。水一大盞。煎至半盞。去粗。食遠服。加白芍藥尤妙。

此三味皆甘溫。能補元氣。甘能瀉火。內經云。熱淫于內。以甘瀉之。以酸收之。白芍藥酸寒。寒能瀉火。酸味能瀉肝。而大補肺金。所補得金土之位。大旺。火虛風木何由而來。尅土。然後瀉風之邪。

夫益黃散理中丸養神丸之類。皆治脾胃寒濕。大盛。神品之藥也。若得脾胃中伏熱火。勞役不足之證。及服熱藥。巴豆之類。胃虛而成慢驚之證。用之必傷人命。夫慢驚風者。皆由久瀉。脾胃虛而生也。錢氏以羌活膏療慢驚風。誤矣。脾虛者。由火邪乘其土位。故曰從後來者為虛邪。火旺能實其木。木旺故來尅土。當於心經中以甘溫補土之源。更於脾土中瀉火以甘寒。更於脾土中補金以酸涼。致脾土中金旺。火衰。風木自虛矣。損食多進藥愈。前藥是也。

### 益黃散

治胃中風熱。

黃芪貳錢。

陳皮去白。

人參壹錢。已上各

芍藥柒分。

生甘草。

熟甘草伍分。已上各

黃連少許。

右為細末。每服二錢。水一盞。煎至五分。食前服。

### 升陽益血湯



二月間有一小兒未滿一百日病腹脹二日大便一度瘦弱身黃色宜升陽氣滋血益血補血利大便

蠟梢貳分

神麴末

升麻已上各參分

當歸

厚朴已上壹錢

桃仁拾個

右都作一服水一大盞煎至半盞去粗食遠熱服

厚腸丸

治小兒失乳以食飼之未有食腸不能化或生腹脹四肢瘦弱或痢色無常

厚朴

青皮已上各貳分

橘紅

半夏

蒼朮

人參已上各參分

枳實

麥蘖麵

神麴末已上各伍分

右為極細末水煮麵糊為丸如麻子大每服二十九溫水送下食前忌飽食

補陽湯

時初冬一小兒二歲大寒證明堂青脈額土青黑腦後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷目中常常淚下仍多膨胸中不利臥而多驚無搖則寒

黃藥

橘皮

葛根

連翹

蠟梢

炙甘草已上各壹分

升麻

黃芪

柴胡已上各

當歸身

麻黃已上各

吳茱萸

生地黃

地龍已上各

右咬咀都作一服。水一大盞半。煎至六分。去粗。乳食後熱服。服藥之後。添喜笑精神。出氣和順。乳食旺。

大蕪荑湯一名梔子茯苓湯。

治黃疳土色為熱為濕。當小便不利。今反利。知黃色為燥。胃經中大熱。髮黃脫落。知膀胱與腎俱受土邪。乃大濕熱之證。鼻下斷作瘡者。上逆行榮氣伏火也。能乳者。胃中有熱也。寒則食不入。喜食土者。胃不足也。面黑色者。為寒為痺。大便青寒褐色。血黑色。熱畜血中。間黃色。腸中有熱。治法當滋榮潤燥。除寒熱致津液。

防風

黃連已上各

黃蘗

炙甘草

麻黃根節不去

羌活已上各

山梔子仁

柴胡

茯苓已上各

當歸肆分

大蕪荑

白朮已上各

右劉如麻豆大。都作一服。用水一大盞半。煎至六分。去粗。食前稍熱服。

場氣退黃湯一名茯苓澤瀉湯。

治小兒面色痿黃腹脹食不能下。

白朮

柴胡已上各半分

升麻壹分

桂枝

麻黃

吳茱萸

厚朴

羌活

草豆蔻

神麴末

蒼朮

澤瀉

白茯苓

猪苓

黃蘗

橘紅已上各貳分

青皮

黃連已上各伍分

杏仁貳個

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗食前溫服。

中滿分消丸

枳實

黃連去鬚

厚朴已上各伍分

生薑

薑黃

猪苓已上各壹錢

橘皮

甘草

白朮已上各伍分

砂仁

澤瀉

茯苓已上各叁錢

半夏肆錢

黃芩壹兩貳錢

右爲細末。湯浸餛餅爲丸。如黍米大。每服三五十九。溫水下。

消痞丸

黃連伍錢。

黃芩貳錢。

厚朴柒分。

薑黃伍分。

乾生薑

人參已上各肆分

甘草叁分。

枳實貳分。

橘皮壹分。

右爲細末。湯浸餛餅爲丸。如黍米大。每服三十九。隨乳下。

斑疹論

夫斑疹始出之證。必先見面燥腮赤。目胞亦赤。呵欠煩悶。乍涼乍熱。欬嗽嚏噴。足稍冷。多睡驚。並瘡疹之證。或生膿胞。或生小紅斑。或生癰疹。此三等不同。何故俱顯上證而後乃出。蓋以上諸證。皆太陽寒水起於右腎之下。煎熬左腎。足太陽膀胱寒水夾脊。逆流上頭下額。逆手太陽丙火不得傳導。逆於面上。故顯是證。蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也。諸斑證皆從寒水逆流而作也。醫者當知此理。乃敢用藥。夫胞者一名赤宮。一名丹田。一名命門。主男子藏精施化。婦人繫胞有孕。俱爲生化之源。非五行也。非水亦非火。此天地之異名也。象坤土之生萬物也。夫人之始生也。血海始淨。一日二日。精勝其血。則爲男子。三日四日。五日。血脈已旺。精不勝血。則爲女子。二物相搏。長生先身謂之神。又謂之精。道釋二門言之。本來面目是也。其子在腹中十月之間。隨母呼吸。呼吸者。陽氣也。而生動作。滋益精氣神。饑則食母血。渴則飲母血。兒

隨日長。皮肉筋骨脈形氣俱足。十月降生。口中尚有惡血。啼聲一發。隨吸而下。此惡血復歸命門胞中。僻於一隅。伏而不發。直至因內傷乳食。濕熱之氣下流。合於腎中。二火交攻。致營氣不從。逆於肉理。惡血乃發。諸癍疹皆出於膀胱壬水。其瘍後聚肉理。歸於陽明。故三番癍始顯之證。皆是太陽壬膀胱尅丙小腸。其始出皆見於面。終歸於陽明肉理。熱化爲膿者也。二火熾甚。反勝寒水。遍身俱出。此皆出從足太陽傳變中來也。當外發寒邪。使令消散。內瀉二火。不令交攻。其中令濕氣上歸。復其本位。可一二服立已。仍令小兒以後再無二番癍出之患。此內經之法。覽者詳之。

消毒救苦散

治癍證悉具。消化便令不出。如已出希者。再不生癍。

防風

羌活

麻黃根

升麻

生地黃

連翹初出者減。出大者加。

酒黃蘗已上各五分。

當歸身

黃連已上各參分。

川芎

藜蘆

柴胡

葛根

酒黃芩

生黃芩

蒼朮已上各貳分。

細辛

生甘草

白朮

陳皮

蘇木

紅花巴上各壹分

吳茱萸半分

右劉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱空心服

夫癍疹出者皆因內傷必出癍營氣逆故也大禁牽牛巴豆食藥宜以半夏枳朮大黃益智仁之類去其泄瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚噓噴眼澀知必出癍也諸大膿泡小水泡癍疹癩三色皆營氣逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸身連翹此定法也

如肺成膿癍先嗽喘或氣高而喘促加人參少加黃芩以瀉伏火而補元氣

如心出小紅癍必先見噤乾驚悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連

如命門出癍疹必先骨疼身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃又加黃蘗諸癍疹皆為陰證瘡須皆因內傷飲食脾胃不足營氣逆行雖大熱內熾陰覆其外治法如前

辯小兒癍證

呵欠

噓噴

睡中發驚

或耳尖冷

眼澀

或辯復食

口熱

或口醋氣

妳辦不消

或腹中痛

如癍證少具其癍未發乃與升麻湯三五錢帶熱服之待身表溫和癍疹已顯服藥乃止如其身涼其癍未出辯得是癍證無間服數直候身表溫和及癍瘡已顯然後乃止只時時與桔梗湯寬胸膈利咽喉

桔梗湯

如癍已出只時時與之快咽喉寬利胸膈

桔梗貳錢

甘草壹錢

右為麤末每服三錢水一大盞煎至六分去粗大溫時時服之不可計服數

如見傷食證又見癍證先與不犯大黃巴豆藥化過再與升麻湯

如食重傷前藥不能過再與犯大黃巴豆藥過

如大便秘行當即便與升麻湯服之恐癍子內陷已後臨時作罪過

如癍子已出稠密身表熱急與下項

黍粘子湯

如癍子已出稠密身表熱急與此藥服之防後青乾黑陷

黍粘子炒香

當歸身酒洗

炙甘草已上各壹錢

柴胡

連翹

黃芪

黃芩已上各壹錢伍分

地骨皮已上各貳錢

右同為麤末。每服二錢。水一大盞。煎至六分。去粗。溫服。腹空。服藥畢。日休與乳食。

麻黃柴胡升麻湯

治小兒寒鬱而喘。喉鳴。腹中鳴。腹滿。鼻流清涕。脈沉急而數。

麻黃

草豆蔻仁

益智仁已上各錢伍分

吳茱萸

厚朴已上各貳分

當歸梢

甘草

柴胡

生黃芩已上各壹分

升麻

神麴

蘇木已上各半分

全蠍貳箇

紅花少許

右剉如麻豆大。分作二服。水一大盞。煎至七分。食遠服。忌風寒。微有汗則效。





三十年四月五日  
駁書店

編主五雲王

編初成集書叢

藏 祕 室 蘭

中華民國二十八年十二月初版

撰 者 李 杲

發 行 人 王 雲 五  
長沙南正路

印 刷 所 商 務 印 書 館

發 行 所 商 務 印 書 館  
各 埠

(本書校對者潘同曾)

G 16110上

必



|     |
|-----|
| 6   |
| 112 |