

大德重校聖濟總錄卷第六十九



吐血門

嘔血

唾血

吐血後虛熱胸中痞口燥

舌上出血

汗血



嘔血

論曰愁憂思慮則傷心悲怒氣逆上而不下則傷肝蓋

論曰愁憂思慮則傷心悲怒氣逆上而不下則傷肝蓋
心主血肝藏血二藏俱傷則血不循經隨氣上逆故因
嘔而血出也內經曰怒則氣上甚則嘔血

治嘔血唾血欬逆氣喘短氣欬冬花丸方煎至一匙去

欬冬花

紫苑

去苗土各參兩

杏仁

湯浸去皮尖炒

豉炒各兩

人參

桂

去蘊皮各半兩

天門冬

去心焙

甘草

炙

蜀椒

去目并合口炒出汗

柏葉

去梗

生乾地黃

焙各

蒸小頭黃耆

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一

丸冷熟水嚼下日三夜三

治傷中胸內急痛欬嗽嘔血時寒時熱小便黃赤澤蘭

湯方

澤蘭葉陸兩

大黃剉炒

遠志去心各壹兩

人參兩

麻人

桑根白皮剉各肆兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓冷服不拘時

治嘔血鬱金散方

鬱金剉

甘草炙剉各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕井華水調下不拘時

治吐血嘔血五靈脂餅子方

五靈脂壹兩

盧會錢

右二味搗研為末滴水和老如雞頭大捏作餅子每

服一餅龍腦漿水化下不拘時

治嘔血吐血及鼻衄血麥門冬汁方

生麥門冬汁

生地黃汁

生藕汁

冷熱水各壹盞

白藥壹兩為末

右五味合和勻每服二盞略煎沸溫服不拘時

治卒嘔血羚羊角飲方

羚羊角兩半

桂壹兩

去麤皮木貳兩

大黃剉炒壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓冷服不拘時

治嘔血不止荆芥飲方

荆芥穗

梔子人

黃芩去黑心

蒲黃各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

冷服不拘時

治嘔血煩滿少氣胸中痛阿膠湯方

阿膠炙令燥

甘草炙各壹兩半

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生地黄汁三

合同煎至七分去滓溫服不拘時

治嘔血荆芥湯方

荆芥穗

右一味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓冷服不拘時

治嘔血比金散方

黃蘗

去麤處蜜炙

右一味搗羅為散每服二錢匕麥門冬熟水調下

治憂患嘔血煩滿少氣胸中痛生地黄湯方

生地黄

斤半

阿膠

炙令燥

甘草

炙各壹兩半

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入大棗二枚擘破煎至七分去滓溫服日三夜一治虛勞內傷寒熱嘔逆出血堅中湯方

芍藥

半夏湯洗

甘草炙各壹兩半

桂去麤皮壹兩

右四味咬咀如麻豆大每服四錢匕以水一盞半入生薑一棗大切棗二枚擘破同煎至八分去滓入飴糖一分再煎令沸放溫服日二夜一

治嘔血伏龍肝湯方

伏龍肝壹兩

生竹筴剉壹升 芍藥

當歸切

黃芩去黑心

芍藥去白

甘草炙各貳兩

生地黄壹斤

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服日三

唾血

論曰邪熱熏於肺則損肺恚怒氣逆傷於肝則損肝肺肝傷動令人唾血如唾中有若紅縷者屬肺如先苦脇下痛而唾鮮血者屬肝可析而治之

治肺氣內傷邪熱熏積欬唾有血紫苑散方

紫苑去苗土

欬冬花

當歸切

桂去麤皮

芎藭

五味子炒

附子炮裂去皮臍

細辛去苗

貝母去心

柏葉炒

白朮

甘草炙

生乾地黃焙

杏人湯浸去皮尖雙

右一十四味搗羅為散每服三錢匕蜜湯調下日三

服不拘時

治肺傷唾血羊肺湯方

鍾乳粉兩

半夏生薑同搗作餅暴乾半兩

桂去麤皮

白石英碎

射干

桃人湯浸去雙尖炒

陳橘皮去白

百部切

五味子炒

款冬花

甘草炙

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

右一十三味麤搗篩每服三錢匕先用水二盞煮羊

肺一兩至一盞去肺入藥末煎取七分去滓溫服日

三夜一

治心肺有熱唾血不止石膏湯方

石膏貳兩

厚朴去麤皮生薑汁炙麻黃去根節

五味子炒壹兩

杏人湯浸去皮尖雙

半夏生薑汁製暴乾半兩小麥洗貳合

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎

至七分去滓空心日午夜臥溫服

治肺傷唾血前胡湯方

前胡去蘆頭

小麥

茅根剉

麥門冬去心

麻黃去節

石膏碎

甘草炙剉各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞人生薑汁生地

黃汁各半合同煎至七分去滓溫服

治憂恚氣逆肝氣不足唾血不止礬石丸方

礬石熬令汁枯

生乾地黄焙

乾薑炮裂

桂去麤皮

皂莢炙剉去皮并子

桔梗炒

附子炮裂去皮臍各壹兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫水下日三

治恚怒傷肝唾血煩滿脇下痛阿膠散方

阿膠炙令燥

甘草炙剉

右二味搗羅為散每服三錢匕以水一盞入生地黃

汁二合煎至七分和滓溫服不拘時候

治肺熱唾血白前湯方

白前

桑根白皮剉

桔梗剉炒

甘草炙剉

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治肺肝內傷卒唾血生地黄飲方

生地黄貳拾兩搗絞取汁

阿膠貳兩每片如兩指大

右二味每以膠一片入地黄汁一盞內飯甑蒸之取出放溫旋服

治憂恚絕傷唾血胸脇疼痛地黄煎方

生地黄汁伍升

右一味於銀石器內慢火煎至三升入白蜜一盞酒一盞再煎至三升每食後溫服半盞

治唾血不止蒲黃散方

蒲黃兩

右一味研細每服三錢匕冷水調下不拘時候吐血後虛熱胸中痞口燥

論曰上焦有邪則傷於藏藏氣傷則吐血人病吐血之後榮衛俱虛陰陽否隔陽氣不降故身體虛熱胸中煩痞而口舌乾也

治吐血後胸中痞痛口燥不喜食補肺湯方

黃耆細剉

桂皮去麤皮

生乾地黄焙

赤茯苓去黑皮

厚朴去麤皮

紫苑去苗土

陳橘皮湯浸去白 當歸切焙 五味子各貳兩

遠志去心 麥門冬去心焙 甘草炙

鍾乳研成粉 白石英研成粉 人參

桑根白皮剉炒各壹兩

右一十六味除別研外麤搗篩再入研藥同和勻每服五錢匕以水一盞半大棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服日二夜一

治心肺壅熱上焦不利吐血胸中痞口乾地黃湯方

生乾地黃焙 地骨皮 赤茯苓去黑皮

甘草炙 大黃濕紙裹煨剉 玄參

黃芩去黑心 當歸切 麥門冬去心焙

麝香取葉 升麻 紫苑去苗

桑根白皮剉各壹兩

右一十三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治吐血後身體虛熱胸中痞隔口舌乾燥茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 黃連去須 生乾地黃焙

梔子人 杏人湯浸去皮尖

黃芩去黑心 大黃剉炒各壹兩 桂皮去黑皮

栝樓根各參分

右九味麤搗篩每服三錢白水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治吐血後胸中痞口乾柏葉散方

柏葉焙

蒲黃各壹兩

木香

烏魚骨去甲

炙

椴皮

各壹兩

雷歸洗切

婦人油髮

與椴皮貳味燒灰各半兩

阿膠壹兩

右入味搗羅為細散每服一錢匕用糯米粥飲入地

黃汁少許煖令溫調下不計時候服

治吐血後虛熱胸中痞口燥鹿角膠散方

鹿角膠炙

阿膠炙

秦朮去苗

糯米炒

烏梅去核炒

甘草各等分

右五味搗羅為細散每服一錢匕糯米飲溫調下早

晚食後臨臥服

治男子婦人吐血後膈上虛熱抵聖湯方米泔隨下不

陰地蕨半

紫河車剉

貫衆去毛

甘草剉各

阿膠壹兩

甘草半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服

治吐血後上脘痞隔虛熱口燥阿膠散方又登隨下不

阿膠炙

生乾地黃焙

黃蘗去麩皮蜜

甘草炙剉 壹分

右四味搗羅為細散每服二錢匕用綿灰蜜湯調下

日三服

治吐血後虛熱胸中痞日乾人參散方取至十分去滓

人參貳兩

阿膠炙燥 壹兩

甘草炙剉 半兩

黃耆細剉 壹兩半

右四味搗羅為細散每服二錢匕溫糯米飲調下不

拘時候

治吐血後虛熱躁渴及解毒茜草丸方米泔盪罇下早

茜草剉

雄黑豆去

甘草炙剉 各等分

右三味搗羅為細末并華水和丸如彈子大每服一

丸溫熱水化下不拘時候

治吐血後虛熱胸中痞口燥鹿角膠散方

鹿角膠炙燥

黃蘗去麤皮蜜炙 各拾兩

杏仁肆拾玖枚湯去皮尖 雙入

炒

右三味搗羅為細散每服一錢匕用溫水調下不拘

時服

治肺藏壅熱吐血心膈煩悶天竺黃散方

天竺黃

人參

側柏葉焙

大黃剉

犀角鎊

黃耆剉

赤茯苓去黑皮

馬兜零焙各半兩

鹿角膠炒煉壹兩

右九味搗羅為散每服一錢匕煖生地黃汁調下不

拘時

舌上出血

論曰心主血在竅為舌若心藏蘊熱則血得熱而妄行或溢於心之竅故有舌上出血之證甚者出如涌泉

治心藏有熱舌上出血如涌泉升麻湯方

升麻剉

茜根剉

小薊根剉各壹兩半

艾葉去梗壹握

煖水石碎參兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分入

生地黄汁一合更煎一二沸去滓溫服

治心藏熱盛舌上出血香參丸方

人參

生蒲黃剉

麥門冬去心

當歸切焙各半兩

甘草炙剉壹分

生乾地黄焙壹兩

右六味搗羅為末鍊蜜丸如小彈子大每服一丸溫

水化下日三四服

治心經煩熱血妄行舌上血出不止寸金散方

新蒲黃參錢匕

新白麩貳錢匕

牛黃研

生龍腦各半錢匕

右四味同研極細生藕汁調下一錢匕食後臨卧服

日二服... 一錢... 分...

治舌上血出不止阿膠散方

阿膠炒 蒲黃炒 黃耆細剉各壹分

右三味搗羅為細散每服一錢匕生地黄汁調下併

二服... 三服...

治心經蘊熱舌上血出及諸失血熟艾湯方

熟艾用糯米半合炒 松黃 栢葉炙兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治舌上出血竅如簪孔紫霜丸方

紫金沙即露峰房頂上實處是研壹兩 盧會研貳錢

貝母去心更煎肆錢

右三味搗研為末鍊蜜和丸如櫻桃大每服一丸水

七分一盞化開煎至五分溫服吐血衄血每服一丸

酒半盞化開服

治舌上忽然血出不止聖金散方

黃蘗子壹兩 青黛壹分

右二味搗研為細散每服一錢匕食後新汲水調下

日二服

治心藏積熱血脉壅盛舌上血出鬱金散方

鬱金兩

當歸切焙半兩

右二味搗羅為散每服一錢匕煎生薑烏梅湯調下

治舌上血出地黃散方

生乾地黃焙乾

鹿角膠炒令燥各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕食後糯米飲調下

治舌上出血不止阿膠湯方

阿膠

炒令燥壹兩搗末

蒲黃兩

右三味合和勻每服二錢匕水一盞煎至六分入生

地黃汁一合更煎一二沸溫服不拘時候

治舌上出血清心散方

刺薊壹握

右一味研絞取汁以酒半盞調服如無生汁只搗乾

者為末冷水調下三錢匕兼治大紐

治心藏熱極舌上出血黃蘗散方

黃蘗

貳兩塗蜜慢火炙焦

右一味搗羅為散每服二錢匕溫糯米飲調下

汗血

論曰內經言藏真通於心血脉之氣行焉又曰肝藏血人臥血歸於肝蓋血雖藏於肝而心則行之也若肝心二藏俱傷於邪故血隨心液為汗而出

治肝心傷邪血汗人參湯方

人參

桂去麤皮

甘草炙

白朮

赤芍藥各壹兩

黃芩去黑心

芎藭

當歸切

淡竹筴各貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治血汗從膚腠出神白散方

人中白

右一味不以多少刮在新瓦上用火逼乾研令極細每服三錢匕入麝香少許溫酒調下

治血汗如聖散方

郁李人去皮尖

右一味研細每服一錢匕研鵝梨汁調下

治血汗鼻衄不斷吹鼻散方

人中白

右一味瓦上焙乾研為細末每以少許吹入鼻中立差

治吐血或汗血尿血竹筴湯方

淡竹筴

人參

芍藥

桔梗炒

生乾地黄焙

當歸切

甘草

桂皮去麤

芎藭各壹兩

右丸味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

前滓不拘時溫服

三

一利其土氣薄其味未新以少指大人鼻中立

人山

能也

六一和

津李

大德重校聖濟總錄卷第六十九

大德重校聖濟總錄卷第七十

鼻衄門

鼻衄

衄不止

大衄

久衄

衄蟻

金匱要略卷之七

鼻衄統論

論曰內經謂脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝木也
土本畏木今脾移熱於肝則是土氣反盛熱往乘木肝
所藏者血其神為魂虛熱勝之故驚而衄也從春至夏
者為太陽衄從秋至冬者為陽明衄巢元方曰寸口微
芤者衄寸脉微苦寒為衄寸脉微弱尺脉澀發熱而弱
為無血必厥其人微嘔夫厥當眩不眩而反頭痛痛為
實下虛上實必衄凡是之類皆其脉也孫思邈曰鼻頭
白者亡血設令微赤非時者死病人色白皆亡血也凡
時行衄不宜斷之如一二升以上恐多者即以龍骨末

大醫方脈論卷之十
鼻衄門
論曰
內經謂
脾移熱
於肝則
為驚衄
蓋脾土
也肝木
也

卷之七

七

吹之凡是之類皆其候也以至左竅血俱出者謂之大
衄膽移熱於腦熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄出血汗者
謂之衄衄治之各有方論

鼻衄

論曰脾移熱於肝則為驚衄蓋木克土者也脾土熱氣
移於肝木則神魂驚而血行不由其道肺主氣開竅於
鼻血隨氣上今既妄行故出於鼻竅而為衄也

治鼻衄伏龍肝湯方

伏龍肝

細辛各半兩

芎藭分

桂皮去盡

白芷

乾薑炮

芍藥

甘草炙

吳茱萸湯浸一宿與大豆同

妙虫豆
各壹兩

右九味廩掄篩每服三錢匕酒一盞煎至七分入生
地黃汁一合更煎一二沸去滓溫服日三

治鼻衄蒲黃散方

蒲黃

栝子人研

當歸切

阿膠炙

椶櫚燒存性研

亂髮灰研各壹錢

右六味搗研為散每服二錢匕生藕節自然汁調下
如肺損吐血用地黃自然汁調下腸風下血用椶櫚
皮煎湯調下婦人帶下艾湯調下

治邪熱上攻鼻衄煩悶比金丸方

鬱金

雪水煮令透切暴乾壹兩

累石英

白石英

白茯苓皮去黑

水銀各壹

黑鉛

半分與水銀同結沙

甘草壹分

龍腦

研半

右八味除沙子外搗研為末用黃牛膽汁和丸如彈

子大每服一九煎甘草湯放冷磨下

治鼻衄睡黃散方

惡質

壹兩

雄黃研

馬牙消研

甘草

半兩

牛黃研壹

右五味搗研為散每服二錢七用豬膽汁與新汲水調下相次便睡微有汗出為効如時氣黃發舌脹咽喉腫及熱極者如前法斟酌多少服

治鼻衄搗鼻方

駝糞

右一味不以多少用新藏餅一箇打開底入糞在內

燒成灰取出研細用麝香少許研勻隨衄血鼻搗之

治鼻衄防已散方

防已

生用

右一味搗羅為細散每服二錢匕新汲水調下老兒

酒調一錢匕服更用熱湯調少許鼻中殫氣佳

治鼻衄烏沙散方

細烟香墨賦

右一味為細散每服一錢匕臘茶清調下

治鼻衄地金湯方

生乾地黄焙 生乾藕節各貳兩

右二味細剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分

去滓食後臨臥溫服

治肺壅鼻衄玉塵散方

白麩 若葉灰各參錢

右二味研令勻分為二服食後并華水調下

治鼻衄吹鼻方

百葉石榴花

右一味搗羅為細末每用小許吹鼻中

治鼻衄割耳方

延胡索

右一味搗羅為末用綿裹割耳內左衄割右右衄割

左右石俱衄則兩耳俱割

治鼻衄貼鼻方

鹿角膠不以少

右一味以沸湯浸軟貼鼻坳上更以醇麪調令稀稠得處若左竅出血則塗右邊右竅出血則塗左邊

治鼻衄貼背膏方

京三稜大者壹枚

右一味以濕紙裹於慢火中煨熟乘熱椎碎搗為細

末醋煮麪糊調貼背第五椎上

治鼻衄剋効湯方

甘草炙

桑耳焙各參

枳殼去穢炒

大黃剉兩炒

麥門冬焙去心

槐實炒各壹兩

白芷

雞蘇葉

百合

黃耆剉

白前

連翹

檳榔剉各壹兩

薑黃貳兩

右一十四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半人生薑三片同煎至八分去滓溫服

治鼻衄方

燒亂髮灰錢壹

人中白錢半

麝香壹字

右三味合研勻吹少許入鼻中立効

又方

羊脛炭皮拍碎炒令通赤壹兩

伏龍肝半

麝香錢壹

右三味細研如粉每服二錢白冷水調下或研小蘗汁調下亦得

治肺積熱極衄血吐血方

黃明膠末壹錢 桑葉末壹錢 伏龍肝末壹錢

右三味研勻為散糯米飲調下口錢七

治鼻衄刺蘗湯方

大蘗根兩壹 相思子兩半

右二味處搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓放

冷服

治鼻衄血蒸白汁方

右以葱白一握搗絞取汁投酒少許點三兩滴入鼻

差

衄不止

論曰榮氣之行常與衛氣相隨則氣與血未嘗相離肝藏血肺主氣榮衛和平則氣血順治若人府藏有熱熱乘血氣血性得熱流溢妄行而肺開竅於鼻故其發為鼻衄鼻衄不止者藏虛血盛故也內經又云脾移熱於肝則為驚衄蓋脾土也肝木也今脾移熱於肝則木不能制土肝藏血其神魂故為驚衄之病

治鼻衄不止紫參湯方

紫參

蒲黃

生地黄各貳兩

黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮

赤芍藥

當歸切焙各壹兩

甘草炙壹兩

阿膠炙

右八味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入阿膠二

片炙令燥同煎至七分去滓溫服不拘時候其發

治鼻衄不止刺薊湯方

刺薊

黃芩去黑心

大黃剉

赤芍藥各參兩

蒲黃貳兩

側柏葉肆兩

生乾地黄焙

甘草炙到各伍兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服逐意以新汲水調下

治鼻衄不止麝香散方

麝香末

滑石末

人中白各半兩

右三味同研為散每服二錢匕熱酒調下

治鼻衄不止厚朴洗方

厚朴去麩皮

瓦礫并沙

白朮

煨糞堆土瓜苗心等分

右三味搗羅為末蜜丸如雞頭大每服三丸葱一握

細切麩一匙鹽半錢同炒黃沸湯點下

治鼻衄不止蒲槐散方

蒲黃土蘇林槐花兩各半

防已

人參各壹分

右四味搗研為散每服一錢匕新水調下食後服

治鼻衄不止天竺黃散方

天竺黃

芎藭各壹分

防已半兩

右三味搗研為散每服一錢匕新汲水調下肺損吐血用藥三錢匕生麩一錢匕水調下並食後服

治鼻衄不止千鍼散方

刺薊土硫黃木賊各壹分

白麩壹錢

右三味搗羅為散每服一錢匕研青蒿心七枚新水

治調下併三服

治鼻衄日夜不止頭痛心煩玉粉散方

石膏研

牡蠣燒研如粉各壹兩

右二味研勻為散每服二錢匕新汲水調下候血滴

間斷時再以水調藥如稀糊滴鼻內

治鼻衄不止雞蘇散方

雞蘇去義

右三味搗羅為散每服二錢匕溫水調下更以雞蘇

葉於新水內揉輒內鼻竅即止水一盞煎至六分不

治鼻衄不止二花散方

治鼻酸石榴花分壹黃蜀葵花錢壹

右二味搗羅為散每服壹錢匕水一盞煎至六分不

拘時候溫服

治鼻衄不止欲死車前散方文南

車前子末蘇合末耳中垢分等

右二味和成搃子塞鼻中立止鼻內

治鼻衄不止柳枝散方

寒食楊柳枝門傍柳者壹兩人參壹分

右二味搗羅為散每服一錢匕新水調下併二服

治鼻衄不止參蓮散方

人參壹錢蓮子心壹分

右二味搗羅為散每服一錢匕新水調下

治衄血不止心神悶亂頭旋欲倒通神散方

亂髮燒灰伏龍肝等分

右二味研為散每服三錢匕新汲水調下

治鼻衄不止栗灰散方

生栗宣州大者柴故

右逐一微利破皮連皮燒存性椀蓋候冷入麝香少

許同研每服三錢匕溫水調下

治鼻衄不止黃藥散方

黃藥子兩壹

右一味搗羅為散每服二錢匕煎阿膠湯調下良久以新汲水調生麩一匙投之

治鼻衄血不止法紙散方

有病人衄血時以紙接血候滴滿紙於紙燈上燒作灰每一張作一服新汲水調下不得令病人知

治鼻衄不止燈心散方

燈心兩焙壹

右一味搗羅為散入丹砂一錢研每服二錢匕米飲調下

治鼻衄不止當歸散方二錢匕以水一盞生薑三片煎

當歸兩切

右一味搗羅為散每服一錢匕米飲調下

治血熱衝肺鼻衄不止蝸牛散方

蝸牛兩乾壹分

烏賊魚骨兩

右三味搗研為散含水一口搗一字入鼻內

治鼻衄血不止吹鼻散方將細心合去蒜麻止

茆花拾

亂髮一團

右三味燒為末研勻每以少許吹鼻內去毒出血

治鼻衄不止諸藥不驗大蒜貼足方

蒜壹枚去皮研細 藥不燥大蒜根去

右二味攤作餅子如錢大厚豆許若左竅出血貼於左脚心下帛繫定右竅即貼右脚心兩竅俱出即俱貼之血止急以溫水洗脚心令去蒜氣

治衄血不止鷄蘇飲方小一口許一平人鼻內

鷄蘇去 白茯苓去 射干各壹兩半

治血白芷去 桔梗半斤 天門冬去心

當歸切焙 大黃炒 甘草各壹兩

桂去 半兩

右一斗味吹咀每服二錢匕以水一盞生薑三片煎

取六分空腹去滓溫服參法 麥門冬去

治鼻衄不止方治衄

五月收刺薊暴乾為散每服三錢匕溫酒調下

治鼻衄不止方治衄

石以玄明粉臨臥冷熱水調下錢匕

又方大鰾香口耳管血出引引蓋血高榮助熱飲用

右取楮葉搗絞取汁一二升旋旋飲之即止

治鼻衄不止方二

糯米無 以升 一大

右一味搗羅為散冷水調下三錢匕

治鼻衄不止欲絕者木蘭子三錢

右取茄花無卽以根代每服一大把細剉水兩碗煎濃至一碗分二服

大衄藥師辨更十一二行或或於之四上

論曰大衄者口耳皆血出是也蓋血爲榮而藏於肝氣爲衛而主於肺肺開竅於鼻三者相爲流通若熱氣乘血而甚則氣血妄行與氣衝錯溢於上竅故鼻衄不已而口耳皆出血也神效清熱散三錢

治大衄不止遠志湯方

遠志去心 天門冬去心 麥門冬去心

阿膠炙

當歸切

藕節洗

甘草炙

大黃炒

芎藭各半

桂皮去

沒藥研

麻黃去

桃核人湯浸去皮尖炒

牡丹皮分

此胡去苗

右一斗五味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓空心溫服

治血妄行九竅皆出服藥不住者南天竺飲方

南天竺草生瞿麥是每指大壹把剉

山梔子參拾枚

生薑壹塊如

大棗去核

甘草炙

燈草如小指

右六味剉入瓷器中水一大椀煮至半椀去滓通口服

治大呷口耳皆血出不止苦參湯方

苦參

剉

黃連去須各

大黃炒

梔子去皮

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生地黃汁一

合煎至七分去滓溫服

治大呷口耳皆出血不止阿膠湯方

阿膠炙

兩

蒲黃半

右五味麤搗篩每服二錢匕水一中盞入生地黃汁

一合煎至六分溫服急以帛繫乳隨呷左右繫之兩

鼻竅俱出則盡繫兩乳不計時候

治鼻衄至一斗并大呷聖効方

白線伍 人中白壹圓如雞

右二物燒為灰研細每服三錢匕溫水調下

治大呷口耳鼻俱出血牡蠣散方式煎散合百散大不

左顧牡蠣燒赤 石膏碎研壹

右二味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下早晨日午

哺時各一服亦可蜜丸如梧桐子大每服三十九酒

下焦各一服亦可蜜水或酥飲之六分服三十次

治大衄不止萊菔酒方取一錢以酒煎服不早服日干

萊菔不拘多

右一味每細剉一合用酒一盞先煎酒令百沸次下

萊菔再煎一兩沸放溫濾去滓頓服本論下

治大衄玉漿散方

人中白干黃大青

右一味每服三錢匕用冷水調下

治九竅出血刺薊飲方取刺薊一兩以酒煎之去滓取汁

刺薊乾者取二錢匕水一中盞入坐煎黃升

右一味每用一握絞取自然汁以酒半盞相和頓服

之如無青汁只搗乾者爲末冷水調下三錢匕

治鼻中及耳皆出血不止黑神散方

白刺蝟皮燒灰存性

人中白半

右二味細研爲散每用少許搗在鼻中

治大衄口鼻出血血上胸心氣急勞熱生肌黃飲方

生地黄兩

黃芩心赤芍藥兩血實升

竹筴各多

蒲黃合大

地骨皮兩

右六味除蒲黃外咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞

半煎至八分去滓溫服食後日二

治大衄不止方 去草瀝翅會卷日二

右以龍骨末用蘆管吹入鼻中立止 去草瀝翅會卷日二

久衄

論曰肝藏血肺主氣今氣與血俱熱故氣溢則血妄行

而為鼻衄衄久不差則面色不榮目昏眩冒 黃滄

治鼻久衄不止桑根白皮丸方 黃滄

桑根白皮 炙

山梔子 去皮

黃芩 去

甘草 炙

羌活 去

防風 去

當歸 切

訶梨勒 煨

胡黃連 各

地骨皮

人參

白茯苓 去

莖胡 去

五割愈

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

前二十九空心食前溫酒下 黃滄 代果藥不差遠蘇葉

治鼻衄久不止諸藥不効榴花散方 黃滄 本開可

石榴花 果

故綿灰 各

人中白 分

右三味同細研更入麝香一錢研勻少吹入鼻中

立止 黃滄 去草瀝翅會卷日二

治鼻衄久不止血餘散方 去草瀝翅會卷日二 水一盞入坐此黃廿一

亂髮灰 錢

人中白 兩

麝香 錢 破磁器

右三味同細研勻每用吹一小豆許入鼻中 黃滄 上乃

治鼻久斂不止阿膠湯方阿膠一小豆指入鼻中

阿膠炙燥 蒲黃乾 麝香研

治右二味麝搗篩每服三錢匕水一盞入生地黃汁二

合同煎至七分去滓溫服

治鼻久斂鉛丹散方人 麝香一錢 海狗少 麝香入鼻中

鉛丹不拘 麝香研 人中白乾

治右一味細研如粉每服錢也發時新汲水調下

治鼻久斂積年或夜臥流涕常數升衆藥不差穀楮葉

汁方一 三和 齒磨盆 牙燥 唾味 八吹 辟味 子大 毒畢

穀楮葉伍柴

治右一味搗振取清日飲一二匙不過四五劑愈

治鼻衄久不止銀粉散方

定州白瓷器研 王蠶水 一盞 半煎 至入 食去

右一味持研為細散每指一刺耳誅入鼻中心

治鼻久斂吹鼻日礬散方黃 黃草白 黃草白

白礬乾 礬乾 礬乾 礬乾

此右一味細研羅為散以少許吹鼻中患 矣

鼻衄下 鼻衄下 鼻衄下 鼻衄下

論曰內經謂膽移熱於膈則辛煩鼻淵傳為鼻衄瞑目

夫血得熱則涌溢得寒則凝泣膈受胃熱循脉而上乃

移於腦蓋陽絡溢則血妄行在鼻為衄在汗空為嘔二者不同皆熱厥血溢之過也今之治衄者專於治血不知血之行留氣為之本猶海水朝夕陰陽之氣使然也明夫經絡逆順則血與氣俱流通而無妄行之患矣
治衄血汗血熱盛所致竹筍湯方

生竹筍真白生地黄切黃芩去黑心

水蒲黃切芍藥切麥門冬去心

右六味廬博篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服服三

治鼻衄汗血黃蘗飲方一二不

大黃切黃芩切黃蘗切生竹筍半

雞蘇兩凝水石兩生竹筍兩

右六味廬博篩每服三錢匕水一盞入生地黄半分

切煎至七分去滓食後臨卧溫服

治衄血汗血白藥散方生

白藥兩生地黄汁合生藕汁壹

生薑汁少許靈同煎

右四味搗白藥為末先煎三物汁合沸每以半盞入

熟水一合白藥末二錢匕攪勻食後溫飲之

治衄血汗血久不止紫參散方

紫參不入黃耆去黑心鬱金

甘草炙路通澤木二錢白通食通歸通滑通

右四味搗羅為散每服三錢匕以生地黃汁半合白

蜜一匙水一盞同煎沸微溫調下日三

治血汗鼻衄不止定命散方主主通主通

丹砂白藥通水銀麝香各通壹通

右三味細研分為三服用新汲水調下

治衄血汗血地黃散方三水一蓋入主黃半合

生乾地黄焙阿膠炙各通兩通蒲黃兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫糯米飲調下不拘

時通服通不通拘

治衄血汗血鬱金散方五水一蓋入主黃半合

鬱金炙甘草炙各通兩通青黛各半通

右三味搗羅為散每服二錢匕用雞子白調下

治衄血汗血消熱結地黃竹筴湯方

生地黃切骨竹筴伍黃芩去心通

不當歸切甘草炙芍藥二蓋通煎通

芎藭各參通桂去薑皮壹通兩通益月下焦黃土塊

如雞通子通大通

右九味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

大豆大者五錢五分小者一升半煎至

治血妄行或衄或嘔獨聖湯方

黃芩

去黑心 伍兩

去心

金日不煎廣土煎

石一味細剉如麻豆大每服七錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服

行於液

黃芩

治熱氣上行切血汗血刺薊湯方

刺薊

各二兩

黃連

須臾

犀角

生乾地黃

各壹

石五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

大醫方要略卷之十

大德重校聖濟總錄卷第七十

大德重校聖濟總錄卷第七十一

積聚門

積聚

肥氣

伏梁

痞氣

息賁

賁豚

積聚統論

論曰積者五藏所生氣之所積名曰積其始發有根本其痛不離其部由陰氣所生也聚者六府所成氣之所聚名曰聚其始發無根本其痛無常處由陽氣所生也然又癥瘕癥結者積聚之異名也證狀不一原其病本大畧相類但從其所得或診其證狀以立名爾且癥者為隱見腹內按之形證可驗也瘕者為痕聚推之流移不定也瘕者僻側在於脇肋結者沉伏結強於內然有得之於食有得之於水有得之於憂思有得之於風寒凡使血氣沉滯留結而為病者治須漸磨潰削使氣血

流通則病可愈矣

積聚

論曰經曰病有積有聚何以別之積者陰氣也聚者陽氣也陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五藏所生聚者六腑所生積之爲病其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚之爲病其始發無根本上下無所留止其病無常處此積聚之別也

治腹內積聚心肋急滿時吐清水不能食時惡寒臆甲

丸方

龍甲

去帶兩兩半

防葵

人參

各兩

前胡

去蘆

桔梗

枳殼

各兩

當歸

切

附子

皮

乾薑

炮

白朮

各兩

檳榔

大黃

剉炒各兩

厚朴

去皮生薑汁炙

食茱萸

各兩

甘草

炙

右一十五味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九溫酒下早晚各一服漸加至三十九

治積聚結實腹滿刺痛泄利不止檳榔湯方

檳榔

細辛

去苗葉各兩

半夏

陳者湯洗

紫蘇

甘草

炙

大黃

剉炒

陳橘皮湯浸去白

生薑切

聚苑去苗

此胡去苗各

附子壹枚炮裂

赤茯苓去黑皮

右一十二味判如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓溫服若有癥瘕癰結加龍甲去裙襖醋炙並

防葵各二兩上氣加桑根白皮判三兩枳殼去瓤麩

炒厚朴去麩皮生薑汁炙各二兩

治五藏積聚癰氣或有墜損腹滿大黃丸方

大黃炒

檳榔煨

桃人去皮尖雙入

參兩

龍甲去裙襖

京三稜煨

乾薑炮

烏頭炮裂去皮桂去麩

吳茱萸陳者湯洗炒

右九味羅八味為末與桃人膏研勻鍊蜜丸如梧

桐子大每服三十九空腹日午夜卧煎橘皮湯下

治五藏寒熱積聚臃脹腸鳴而噫食不作肌膈甚者嘔

逆者傷寒瘧狀已愈令不復發三台丸方

大黃炒

消石研

杏仁去皮尖雙入

葶藶子煨

前胡去虛頭

半夏湯洗

附子炮裂去皮

赤茯苓去黑皮

細辛去苗葉

右九味除研外擣羅為末與消石合人研勻鍊蜜丸

如梧桐子大每服五丸食後米飲下常服令人大便

調和長肌肉去積

治積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足通神丸方

蜀椒去目并閉口炒出汗附子炮裂去皮臍厚朴去蘆皮生薑汁炙

蘇合半夏湯先煮杏仁湯浸去皮尖雙

杏仁湯浸去皮尖雙厚朴去蘆皮生薑汁炙大黃切炒

右八味除研外搗羅爲末與杏仁芒消研勻鍊蜜之

如梧桐子大每服二十九丸米飲下

治積聚煖血海女人諸疾補益桑黃丸方

桑黃斤半牛膝酒浸切兩斤桃人去皮尖雙人

麥藥炒文白朮炒陳麴炒

當歸切大黃剉炒各生地黃拾斤絞

生薑拾斤絞

右十味搗羅七味爲末與桃人膏同入三汁肉拌

勻瓷器盛甑內蒸一日取出焙乾搗羅爲末鍊蜜丸

如梧桐子大每服二十九丸空腹溫酒下漸加至三十

丸

治心腹積聚脹滿繞臍疼痛按之有形寒中有水上氣

女人產後餘病大人風癩小兒驚癇百病烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍菖蒲米泔浸壹宿切焙此胡苗

人參

去

桔梗

炒

黃連

去

厚朴

去

赤茯苓

各

蜀椒

炒

出并

乾薑

炮

桂皮

去

吳茱萸

洗

炒

皂莢

去

右一十三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十

丸空心日午晡時米飲下漸加至十五丸末輪蜜丸

治積聚癖氣不能飲食心肋下滿四肢骨節痠疼盜汗

不絕白朮丸方

白朮

去

黃耆

剉

人參

白

赤茯苓

去

烏頭

炮

乾薑

炮

當歸

炮

甘草

剉

檳榔

剉

牡蠣

熬

芍藥

去

麥門冬

去

細辛

去

前胡

去

龍甲

去

防葵

剉

粟苑

去

桔梗

炒

桂

去

右二十九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九空腹日晚溫酒下漸加至三十丸

治積聚不消累有傷滯食已腹痛飲食不化嘔噦惡心

胸脇眼悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

去

青橘皮

湯

浸

桂

去

剉

吳茱萸湯洗焙乾

礞石醋蒸成霜研末壹錢七

巴豆霜半錢

右六味搗羅四味為細末入礞石巴豆霜拌勻醋煮
麩糊丸如菘豆大每服三丸至五丸早晚食後臨寢
服大便溇利即減丸數

治積聚不消心腹脹滿化氣消積礞石丸方

礞石壹分

沒藥別研

桂去毒

當歸切

烏頭去皮

大黃剉炒各兩

乾漆炒煙

青橘皮去白

芫花別搗末

巴豆去皮心膜

芎藭

京三稜剉

蓬莪菹剉 龍甲剉 雞骨剉 醋半升於銅石器

右一十四味搗羅十味為末用醋醋半升於銅石器

內不芫花礞石巴豆三味慢火熬漸添醋一升即入

十味并沒藥末同熬成膏放冷別入陳麩末一兩半

拌和丸如菘豆大每服三丸至五丸茶酒生薑湯任

治五積氣心腹脹悶噫氣吞酸不思飲食五積丸方

醋石榴兩枚

巴豆和皮

甘遂止人食

大戟

芫花各半

京三稜

大黃

杏仁去皮尖

五靈脂

覆黃

甜葶藶各壹兩

烏梅和核壹兩

右一十二味細剉用水一升煮令水盡炒過勿太焦
搗為細末醋煮麩糊丸如菘豆大每服五丸食後温
飲水下或心煎蠟四煎除吞蠟不思為食五餅式

治一切積滯痰逆惡心霍亂吐瀉腸氣痞滿脇肋積塊

胸膈膨悶嘔噦心忪泄痢不止積氣丸方斷主蠶豆

十代赭石煅臨同研各壹兩 桂去麩木一兩半

礞石研碎 赤茯苓去黑 青橘皮各半兩

胡椒肆拾 巴豆去皮心膜

右八味搗羅四味為末與四味研者和勻酒煮麩糊

丸如梧桐子大每服一丸至三丸食後木香湯下

治積聚留結心腹脹滿胸膈痞悶丁香丸方

丁香 木香 沉香剉末

安息香 乳香淨帛裹用沸湯急滾過研

礞石 丹砂 肉豆蔻去殼

桂皮去麩 京三稜煨 當歸切

陳橘皮去白 檳榔剉 草澄茄各壹

附子炮裂去皮臍分半 巴豆拾粒去皮心臍炒研如膏

右一十六味先將安息香礞石乳香三味細研用少

許酒浸良久別研巴豆丹砂并十一味搗羅為末合

研令勻用前三味酒煮麩糊丸如麻子大常服五丸
至七丸熱水下若氣痛甚即加至十九丸生薑湯下亦
得

取積聚透膜丸方

消石

礞石

各壹分貳味同研勻細銼作
汁用皂子參按旋旋人烟絕

為度放冷研每
料用末參錢

硃砂

乳香

粉霜香

硫黃

膩粉

白丁香

蜜陀僧

京三稜末各壹錢

巴豆

貳拾壹粒去皮心
膜醋煮紫色

右一十一味為末研令勻用棗肉丸如菉豆大每服

七丸至十九煎生薑橘皮湯下小兒皂子湯下

治積聚留滯胸膈痞悶嘔噦吐逆心腹刺痛脇肋脹滿

噫氣吞酸宿食不消痲痺結塊四肢倦怠不思飲食妙

香丸方

檳榔壹分

桂去蟲皮

丹砂研

桃人去皮尖雙入
炒研各半兩

麝香半錢

巴豆貳拾伍粒去皮
心膜研出油

附子炮裂去皮
臍壹兩

右七味搗研為末湯浸炊餅和丸如梧桐子大每服

一丸食後溫木香湯下生薑湯亦得更量虛實加減

治積聚滯氣胸膈痞悶心腹刺痛萬靈丸方

雄黃研 大黃剉 陳橘皮去白

白牽牛末各壹兩 京三稜煨 肉苁蓉酒浸切焙

青橘皮湯浸去白焙 杏人雙去皮尖炒 乾漆炒烟

巴豆去皮心膜出油各半兩 訶梨勒炮去核參分

木香 藿香葉 白朮

天南星炮各壹分 胡椒半

右一十六味搗研為末用薄荷汁煮麩糊丸如菉豆

大傷飲食生薑湯下三丸至五丸傷酒嚼燒生薑下

十丸婦人血氣心痛酒煎當歸調沒藥末一錢匕下

十丸

治五積氣胸膈痞悶腹脹滿宿食不消積氣成塊心

腹疝痛不能飲食大五積丸方宋人大黃膏味次成餅

礞砂 芫花 乾漆炒出煙各壹兩

巴豆半兩去皮心膜研出油 猪牙皂荚去皮子炙

烏頭炮裂去皮臍各參分以上陸味搗羅肆味為末入礞砂巴豆拌勻用米醋參升於銀石器

內慢火熬成膏 大黃蒸熟剉 龍甲去裙襴醋炙

青橘皮湯浸去白焙 京三稜煨 陳麴炒

當歸切焙各壹兩 桂皮去麤皮 木香各參分

右一十四味搗羅八味為末入前膏和丸如菉豆大

每服二丸至三丸茶酒任下如要取積量虛實加減

服法二大至三次茶酒均可服要煩數量宜減氣

治五積氣結面色萎黃心腹疼痛口吐酸水發歇有時

積年不已沉香丸方

沉香剉白散

各半

丁香

各半

木香

各半

礞石壹分

各半

巴豆霜

各半

蓬莪茂剉

各半

桂去粗皮

各半

乾漆炒煙

各半

乾薑炮裂

各半

青橘皮焙去白

各半

京三稜剉

各半

白豆蔻去皮

各半

大黃壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

取右十三味搗研十二味為末入大黃膏和丸如梧

桐子大每服五丸食後臨臥生薑湯下

治五積氣嘔吐酸水心腹脹悶不思飲食才味五積丸

方

沉香剉

各半

青橘皮去白

各半

京三稜剉

各半

甘松各半

各半

薑黃

各半

木香

各半

甘遂炒

各半

芫花醋炒

各半

大戟炒

各半

牽牛子炒

各半

各半

各半

各半

各半

右一十味搗羅為末湯浸炊餅和丸如梧桐子大每

服七丸至十九丸食後臨臥橘皮湯下

治積滯寬利膈脘思飲食消積丸方

牽牛子壹兩

壹兩

青橘皮去白

各半

丁香剉

各半

木香

稻砂研

沉香剉各

檳榔剉

桂去

乾薑剉各

巴豆拾粒去皮膜出油研

右一十味搗研為末鍊蜜和丸如豌豆大每服六丸

至二丸食後臨臥橘皮湯下

治五積六聚血痕氣塊聚散不定及一切氣疾京三稜

煎丸方

京三稜剉

蓬莪茂剉

芫花剉

半夏湯洗去

青橘皮各壹兩 礞石去石

附子炮裂去皮臍

桂生 延胡索剉

大戟膩粉調

乾漆炒烟

豬牙皂莢去皮

五靈脂醋炒香

右一十三味搗研為末用好醋三升入藥三升熬成

膏再入一停和丸如菽豆大每服五丸食後生薑湯

下

治冷積滯氣心胸痞悶冷氣上攻藏府疼痛木香丸方

木香

桂去

京三稜剉

蓬莪茂剉

胡椒炒

青橘皮各壹兩

檳榔剉

訶梨勒剉

大黃剉炒各

白牽牛炒壹兩

未半兩 訶梨勒剉 大黃剉炒各

右一十味搗羅爲末醋煮麩糊丸如棗豆大每服七
九至十九食後生薑湯下

治一切積滯痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣痞滿脇肋積塊
胸膈膨悶嘔噦心疼泄瀉下痢積氣丸方

大戟

龍膽

木香

神香

杏仁

去皮尖雙
人炒研

代赭

赤石脂

水飛研
各壹兩

巴豆

去皮心膜研出
油膏錢壹字

豆大分

右七味搗研爲末合研極細以麩糊丸如梧桐子大

陰乾經十日方可服每服三九至五九木香湯下溫

湯熱水亦得

治食積隱見時作攻心脇病刺疼痛已丑丸方

硝砂

細研湯內飛過
去沙石無取霜

烏頭

生去皮研爲
末壹兩

沉香末

五靈脂末

桂

去

胡椒末

乾薑末

巴豆

去皮
研各半兩

乾漆末

右九味除巴豆外同研勻次入巴豆再研極細取熟

棗肉和作一塊用濕紙裹三五重用紙筋黃土泥固

濟約厚半指許煨乾用熟炭火十斤於乙丑日早漸

進火燒令香爲度以新盆器合候冷取出去泥及焦

紙灰不用搗爛看鞭輭再入熟棗肉和納千餘杵得

所尤如梧桐子大每服三九溫木瓜酒下木瓜湯下
亦得不計時候服如大段癰積塊及諸冷氣病刺疼
痛或泄痢膿血食前服五九至七九看虛實加減
治府藏積聚癥癰氣塊腹多疔痛按或有形肢節煩熱
腰脚痠疼及婦人血癍經候不調赤白帶下等疾溫白

丸方

苡胡去毒

紫苑去毒

吳茱萸湯浸炒

菖蒲

楮梗炒

京三稜炒

赤茯苓去黑皮

人參

黃連去須炒

乾薑炮

桂去毒

蜀椒去目并合口

巴豆去皮心膜

皂莢去皮

龜甲去裙補

烏頭炮裂去

厚朴去蘆皮生

當歸切

烏頭炮裂去

黃者制各

右一十九味搗研為末鍊蜜和搗一千下丸如梧桐
子大每服一二九加至三四九溫酒下利下惡物為

度

治五種積聚成塊木香丸方

木香

訶梨勒炮用

人參

檳榔剉

大黃炒

郁李人生研入

赤茯苓去黑皮

枳殼去穢

芍藥

香湯下風涎薄荷湯下便痢米飲下木下根合蘇

肥氣肺平大胃二式至正式量大小靈實

論曰凡積氣在左脇下如覆杯有頭足名曰肥氣肝之

積也肝藏血故陰多而陽少病為氣積此由肺病傳肝

肝傳脾脾以季夏適王而不受邪氣留於肝故結為積

久不愈令人發欬逆痰瘧連歲不已此陰盛陽虛故也

治久積結癖氣不散左脇下如覆杯咽酸吐水面目萎

黃此名肥氣并女子血痕蓬蘽根湯方

共用蓬蘽根兩貳牡丹皮剉赤芍藥各壹兩

各一桂皮去麤心枳殼去瓢枳實炒檳榔剉熱至一盞

當歸切

生乾地黄焙各壹兩半

生薑去皮切

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服空心日晚各一服

治久積肥氣寒熱痰瘧青蒿湯方

青蒿自然汁

生薑自然汁

童子小便半合

常山剉參

龍甲去裙襴

烏梅肉焙各半兩

甘草炙剉

羌胡去苗

右八味除汁外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至

八分入前三味汁各少許同煎至一大盞去滓食後

臨卧温服

治肝積肥氣久不愈變瘧令人熱多寒少小便赤澁酸棗人丸方

酸棗人用

薏苡人

紫蘇子研

木通剉

黃耆剉

枳殼去炒

升麻

大黃剉

坐拏草

麥門冬去心

木香

赤茯苓去黑皮

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九漸加至三十九煎麥門冬湯下

治肝積氣石韋丸方

石韋拭去

京三稜剉

附子炮裂去

吳茱萸水洗

陳橘皮湯浸

蜀椒去閉口及目炒

右六味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大空腹煎荆芥湯下二十九

治肝積肥氣結鞭不散木香丸方

木香

大黃剉各

龍甲去漆

與大黃同煎醋盡為度焙乾

右三味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九空心食前生薑湯下

伏梁

論曰內經謂病有少腹盛上下左右皆有根名曰伏梁
裏大膿血居腸胃之外不可治治之每切按之至死又
曰人有身體髀股胛皆腫環臍而痛病名伏梁此風根
也夫氣之所聚名曰聚氣之所積名曰積聚陽氣也故
無所留止積陰氣也故有形伏梁心之積也起於臍上
故少腹盛上下左右皆有根裏大膿血居腸胃之外故
環臍而痛此為風水之病故身體髀股皆腫名曰伏梁
以其若梁之隱伏也其證有淺深居臍上為逆以邪氣
之逆上行也居臍下為從以邪氣之順下行也治法不
可動動之為水湯瀉之病故曰論在刺法中
治伏梁積氣鼈甲湯方

鼈甲

去裙襖

京三稜

大腹

芫花

芫花

各隨

當歸

切

芫花

生薑

切

黃芩

桂枝

芍藥

生薑

右九味搗篩每服三錢匕水一盞入木香末半錢

同煎至七分去滓空心溫服日再服

治心積伏梁人參丸方

人參

陳橘皮

枳實

白朮

茯苓

黃連

射于

自然銅

研如粉 金牙

枳殼

知母

當歸

細辛

檳榔

石苜蒲

遠志

赤茯苓

麥門冬

右一十四味除煎研者外搗羅爲末入煎研者藥和

勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九粒心炒生薑

黑豆湯下日再稍加至三十九

治伏梁氣胸下痞滿小便赤澀及驚悸不安夜多夢寐

丹砂丸方

金牙

以上三味同研細

人參

升麻

遠志

麥門冬

生乾地黃

遠志

王而不受

右一十味除研者外搗羅爲末入研者藥拌勻鍊蜜

和丸如梧桐子大每服二十九臨臥煎桑根白皮蕪

湯下

治憂積伏梁氣訶梨勒丸方

訶梨勒

赤茯苓

苳胡

枳殼

羚羊角

黃連

防葵

生薑

黃連

防葵

生薑

黃芩去黑心

大黃剉炒

木通剉

右一十二味搗羅爲末鍊蜜九丸梧桐子大每服十

丸空腹米飲下日再漸加至三十丸以利爲度

治伏梁氣桃奴散方

桃奴壹兩

右一味搗羅爲散每服三錢匕空腹溫酒調下

痞氣

論曰凡積氣在胃脘覆大如盤者脾積也痞結不通故名痞氣此本肝病傳脾脾當傳腎腎以冬適王而不受邪氣留於脾故結爲積久不愈令人四肢不收發爲黃

疸飲食不爲肌膚所以然者脾藏肌肉之氣能與胃行其津液以榮養四肢若爲積氣所留不能榮養故有四肢不收飲食不爲肌膚之證

治脾積痞氣胸脇脹滿氣逆昏悶四肢少力烏頭丸方

烏頭

炮裂去皮

半夏

湯洗去滑粉

大早與食

防風

去

乾薑

枳實

枳實

去

皂莢

去

木香

各壹分

右七味搗羅爲末生薑自然汁爲丸如小豆大早晚用炒生薑湯下七丸至十丸不可多服

治脾積氣累有傷滯食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸

脇脹悶大便秘利不定磨滯充方食不化

木香

青橘皮湯浸去核桂去蘊皮

吳茱萸

湯洗焙乾 礞砂礞石自然代礞石末 礞砂礞石自然代礞石末

巴豆霜

炒半 木香

右六味搗羅四味為末與硃砂巴豆霜同拌勻醋煮

麵糊為丸如菜豆大每服三九加至五九早晚食後

臨寢服大便溏利時減九數服四週少壯氣壯大

治脾積痞氣攻注腰背痛豆蔻湯方

肉豆蔻

去殼 赤茯苓去黑 高良薑養苗

附子

炮裂盡 草豆蔻去殼 藿香葉

陳橘皮

湯浸去白 枳實去殼 枳實去殼

桂

去蘊皮 檳榔殼

右一十味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半入棗五

枚擘生薑一分切碎煎至八分去滓煎服

治脾積冷氣痞結胸滿痰逆四肢怠墮半夏湯方

半夏

陳者湯洗 葶藶紙土炒 麥門冬去心焙

蘆根

剉碎 木香去蘊皮 枳實去殼

右四味搗篩每服三錢匕水一盞入小麥淨淘半

合生薑半棗大切同煎至八分去滓空心日午夜臥

各一如病人瘦弱即加桂心柏子人各二兩

治脾積痞氣泄瀉日夜下痢白膿礬石丸方

礬石燒令枯

訶梨勒各取兩黃連去須十分

木香壹兩

右四味搗羅為末水浸蒸餅濾如糊為丸如梧桐子

大空心食前陳米飲下三十丸以泄止為度

治脾積痞氣微有滑泄不想飲食蕪荑丸方

蕪荑肆兩

陳橘皮湯浸去白焙乾肆兩

附子炮裂去皮莎草根去毛木香壹兩人參壹兩

白朮各壹兩

右六味除橘皮外搗羅為末入橘皮煎按和更入鍊

蜜為丸如梧桐子大空心食前陳米飲下三十丸半

治脾積痞氣大便不通身重少力肢節疼痛牽牛子丸

方

牽牛子壹兩半甘遂半兩京三稜壹兩

陳橘皮湯浸去白焙乾訶梨勒各參分木香壹兩

右六味搗羅為末生薑汁二兩蜜四兩同煎至四兩

按和前藥末為丸如梧桐子大臨臥米飲下三十丸

如不轉加至三十九丸

治脾積痞氣煩渴口乾葛根丸方

葛根炮裂去附子炮裂去薏苡根去

蘆根剉各

糯米餗

薏苡身乾

右五味搗羅爲末入桃膠湯濃煮爲糊和丸如小豆
大食後臨臥燈心枇杷葉煎湯下十九至二十九

治脾積痞氣身黃口乾胸膈滿悶肌瘦減食或時壯熱
脾積丸方

陳倉米

壹合醋浸淘過青橘皮伍拾片醋煮

巴豆

伍拾枚去皮麻絲繫定全味蓬莪茂陸

石三稜壹分

雞爪三稜壹分

蓬莪茂壹枚

京三稜壹分

檳榔貳枚

蓬莪茂壹枚

右八味搗羅爲末取白半麩糊爲丸如棗豆大半

作散每服一錢匕粥飲調下三丸

治脾積痞氣腹脇膨脹心胸痛悶不思飲食平氣丸方

檳榔壹枚

烏梅壹兩壹半

京三稜炮半

青橘皮壹兩焙縮沙壹兩

巴豆去皮心別胡椒半兩

右七味將六味搗羅爲末入巴豆研勻白麩糊和丸
如棗豆大每服三丸溫生薑湯下食後服

治脾積痞氣痰逆惡心腹脇滿悶胸膈噎塞可思飲食

金液丸方

京三稜炮

蓬莪茂陸

白朮

丁香皮

刮去

牽牛子

炒

青橘皮

陳橘皮

並湯浸去白焙

肉豆蔻

大者去殼

檳榔

炮各

乾薑

炮

丁香

硃砂

研各

巴豆

半兩和麩秤去皮研如膏經壓出油盡以不汚紙為度

右一十三味為末攪拌勻用頭醋煮稠麩糊和丸如

菉豆大每服五丸米飲下食後

治脾積痞氣心腹脹滿嘔逆噫酸快氣丸方

檳榔

參攷

木香

壹兩

肉豆蔻

去殼

甘遂

半兩炒黃

大戟

壹分炮

白牽牛

壹兩炒

墨燒

赤醋

沉香

兩

陳橘皮

湯浸去白焙

青橘皮湯浸去原三稜 醃醋入不日令人 兩兩

右一十一味搗羅為末白麩糊為丸如梧桐子大每

服三九食後生薑湯下大破林香 蘇合蘇合 貴齋

治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食勻氣湯方

大腹

兩枚

牽牛子

壹兩半生半熟

高良薑

炮半

白木

蘇合

陳麩

炒

桂

壹兩

麥蘖

炒各壹兩

甘草

兩

郁李入

半生

厚朴

去麩皮壹兩

桂

壹兩

蘇合

壹兩

右二十味麩搗篩每服三錢匕水一盞入生薑二片

一枚學同煎至七分去滓稍熱服日三

治痞氣脇肋滿悶白木湯方

白木

去麤皮塗生

花胡

去生薑切燉乾

桂

去麤皮

厚朴

去麤皮塗生

薑汁炙香熟

桂

去麤皮

葶草

多制

枳榔

剉拾

棘李人

半生

半生

半生

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服微利為度

葶草

半生

枳榔

半生

高良薑

兩

論曰凡積氣在右脇下覆大如杯者肺積也氣上貫衝

息有所妨名曰息責此本心病傳肺肺當傳肝肝以春

適王而不受邪復責於肺故結為積久不已令人洒淅

寒熱喘欬發肺壅所以然者肺主氣外合於皮毛冷肺

氣留積故有寒熱喘欬肺壅之病

治肺積息責氣脹滿欬嗽涕唾膿血桑白皮湯方

桑根白皮

剉

麥門冬

去心焙各

甘草

炙剉各

陳橘皮

湯浸去

白焙

豬牙皂莢

剉炙去

各

煎

去

皮

白

焙

去

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍

碎煎至七分去滓溫服空心晚食前各一

治肺積息責上氣胸滿欬逆枳實湯方

枳實

剉

木香

剉

枳實

剉

木香

剉

枳實

剉

木香

剉

枳實

剉

甘草

湯浸去皮

吳茱萸

湯洗

厚蘆 紙包炒令紫

杏仁

湯浸去皮

蘇合

各半兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一分拍碎

同煎至七分去滓溫服空心食前服之

治肺積息責下氣防已湯方

防已

湯洗

大腹

和皮子用

郁李仁

湯去

大麻人抄

生

覆榔

對兩半

陳橘皮

湯浸去

白

鼠尾桑根白皮

甘草對

訶梨勒

微煨去核

各壹兩

右七味除郁李大麻人外麤搗篩再同搗勻每服三

錢匕入生薑半分拍碎以水二盞煎至八分去滓溫

服空心午時各一以利為度

治肺積息責欬嗽半夏湯方

半夏

湯洗去滑

桑根白皮

細辛

前胡

去蘆頭各

桔梗

湯洗

甘草

對兩半

湯洗

各壹兩

貝母

去心

湯洗

陸胡

湯洗

大參

對兩半

湯洗

各壹兩

訶梨勒

微煨

白朮

各壹兩

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞入棗三枚

擘破生薑半分拍碎煎至七分去滓溫服食後夜臥

各一

湯洗

各壹兩

治肺積息責上氣皂莢丸方

湯洗

各壹兩

湯洗

各壹兩

湯洗

皂莢貳挺不蛀者蘇

桂去蘊皮

乾薑炮

貝母去心

右四味等分搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

日午生薑湯下十五丸加至二十九一匙入棗三枚

治肺積息黃氣上枳實木香丸方

枳實去瓢麩兩

木香去

陳橘皮湯浸去白焙

人參去

海藻水洗去鹹焙

葶藶紙上炒令紫色各壹兩

芍藥去

丁香各參

附子去

右八味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸漸加至三十丸用炒豆煎湯下空心日午夜臥

各一服

賁豚

論曰凡積氣發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時者腎積也腎水乘心其狀賁衝如豚名曰賁豚此本脾病傳腎腎當傳心心以夏適王而不受邪氣留於腎故結為積久不已令人喘逆骨痿少氣所以然者腎藏骨髓之氣若其氣留積不能榮養骨髓故變為骨痿之病

治賁豚氣逆衝心滿悶積榔散方

檳榔剉

訶梨勒吳棗黃陳者湯洗

兩

牽牛子微炒

右四味搗羅為散每服一錢匕童子小便半盞空心

調下不過三服効如患陰陽二毒傷寒及脚氣亦可

服

治積氣不散久伏於臍腹間發似豚狀黃土衝心木香

湯方

木香

桂去鹽皮

赤茯苓去黑皮

檳榔剉

桑根白皮剉各壹

紫蘇莖葉各壹

甘草炙半

陳橘皮湯浸去白

紫蘇莖葉各壹

右八味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半棗大

拍破煎至七分去滓溫服空心日午近晚各一

治腎藏久積成貴豚氣注小腹急疼發即不識人吳茱

萸飲方

吳茱萸湯洗

桃人湯浸去皮尖

黑豆半

附子炮裂去

右三味同炒以黑豆熟為度用童子小便一升浸少

頃煎至六合去滓分三服空心日午夜卧各一

治久積貴豚氣時攻膀胱切痛四味丸方

蜀椒去目及閉 覆香子炒

附子炮裂去

肉苁蓉酒浸切

各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸
空心溫酒下

治腎積頻發小腹急脹疼痛唇口青黑木香硫黃丸方

木香 六合去 硫黃 雷 青橘皮 湯浸去

乾薑 地 桂皮 去 沉香 鑊

肉豆蔻 去 覆香子 炒 附子 炮裂去

銅青 研 檳榔 剉

右一十一味將九味搗羅為末與別研三味和勻搗

研糯米飯為丸如梧桐子大每服十九丸覆香酒下加

至二十九

治腎虛積氣桃人丸方

桃人 湯浸去皮尖雙人炒 木香

桂皮 去 青橘皮 湯浸去 覆香子 炒

乾薑 炮 檳榔 剉

右七味搗羅六味為末入桃人煎丸如梧桐子大每

服十五丸至二十九空心溫酒下

治腎藏久積氣在膀胱虛脹上攻膨滿疔癩覆香子丸

方

覆香子 參兩微炒為末以 附子 炮裂去皮

青橘皮 湯浸去 木香 狼毒

當歸切焙各參分 阿魏壹兩研以酒壹升煎取半

硃砂壹兩半研沸湯化澄熬取霜入阿魏煎中同熬如錫入蘘香煎攪勻

自然銅煨醋淬研各壹兩半

右九味除煎研外搗羅為末同入煎內和搗丸如梧桐子大如鞭入鍊蜜少許每服十五丸至二十九空

心溫酒下

治腎積化氣沉香湯方

沉香 黃耆 人參各參分

懷香子炒 甘草炙 木香

桂去麩皮 烏藥 附子炮裂去皮臍

石斛去根 牛膝酒浸切焙 五味子炒

巴戟天去心 陳橘皮湯浸去白焙 高良薑各半煎生

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑一分拍碎煎至七分去滓溫服空心日午食前各一

治黃豚氣成塊上衝腹脇滿痛懷香檳榔散方

懷香子炒 檳榔剉 京三稜煨

青橘皮湯浸去白切 木香壹分

右五味搗羅為散每服二錢匕熱湯調服不拘時

治黃豚氣上衝心腹三神煎方

桃人去皮尖雙入肆兩湯浸研細取汁參升 京三稜煨剉

簡甲去毒兩

京三味煎

治在三味搗二味為末先煎桃人汁至二升次下藥末不佳手攪良久更入好醋一升同煎如錫以瓷合收每服半匙空心溫酒調下

木香壹

治黃豚氣衝心吸吸短氣發作有時李根皮湯方

李根白皮剝兩半夏湯洗藥偏乾薑

桂去毒皮赤茯苓去黑皮人參

甘草貳兩附子炮裂去皮水一盞薑一

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

正和子始

治黃豚氣上衝胸心迫滿吳茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙半夏湯洗生薑壹斤

人參貳兩甘草貳兩

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治一切風及腎藏黃豚氣上衝心胸悶亂木香散方

木香壹兩青橘皮湯洗去白白芷炒

沉香剝檀香炒桂去粗皮

蓬莪茂炮杉木節各半枳殼炒

木瓜焙各

右一斗味攪雜為散每服二錢匕炒生薑鹽湯調下
治黃豚冷氣上衝昏亂四肢軟弱不收磁石散方

磁石燒研

肉豆蔻去

木香

檳榔剉各

右四味搗研為散每服三錢匕以生葱一莖細切熟

酒投調下至八合止

治黃豚氣從少腹奔衝上心昏亂嘔吐痛甚木香郁李
人充方

木香兩

郁李人

檳榔剉

桂皮 青橘皮去白

附子炮裂去 藜香子炒各

右八味攪雜為末鍊蜜和丸如梧桐子大藜香子或

薄荷酒下二十九一日三服臍下有塊服一月永除

治腎積氣黃豚從少腹上衝心昏亂嘔吐疼痛檳榔丸

方

檳榔壹兩一分 木香微炒 吳茱萸洗

安息香壹分 桂皮 青橘皮去白

右六味攪羅為末以豬膽二十枝水煮如錫和前六

味末搗二千下丸如小豆大每服空心嚼破七丸煖

酒下

治黃豚氣上下攻走疼痛天雄丸方

天雄生去皮

桃人去皮尖

桂去皮

懷香子炒

蜀椒去目并合

乾蠍炒

右六味搗羅爲末用狗裹外腎并膽細切就銀石器

中以無灰酒一升煎成膏入藥末杵丸如梧桐子大

每服二十九空心生薑鹽湯下

治黃豚氣臍腹左右堅鞭橫連如臂若弓弦急痛末香

丸方黃豚氣末香去皮

木香去皮

鱉甲去殼

訶梨勒皮香

桂去皮

吳茱萸湯浸

半炒

牽牛子炒

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫酒下加至四十九

治黃豚氣自少腹上至心下若豚狀腰腹疼痛或衝心

滿悶七氣湯方吹

桂去皮

赤茯苓去皮

高良薑湯洗

訶梨勒皮各

大腹連皮剉

牽牛子炒

吳茱萸湯洗

半炒

右七味搗羅每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服微利兩三行爲度

溫服微利兩三行爲度

溫服微利兩三行爲度

治賁豚氣上衝胸膈壓氣木香丸方

木香 去心 丁香 去心 白豆蔻皮 去心

肉豆蔻 去殼 吳茱萸 醋浸壹宿

沉香 去心 青橘皮 湯去白 麝香 別研

右八味除麝香外搗羅為末入麝香研勻用硃砂煎

豬膽汁和丸如梧桐子大每服溫酒下二十九

治賁豚氣上衝脇肋疔痛七寶丸方

丁香 沉香 硃砂 湯受綿漚澄入陳麴同煎

附子 炮裂去皮 麝香 研 木香 路參二十次

成骨丸諸藥各半兩

右七味除蔥外搗研為末用前煎按和丸如梧桐子大每服十九炒生薑酒或炒生薑黑豆小便下

治腎藏積冷賁豚氣攻少腹疼痛上衝胸脇沉香石斛湯方

沉香 石斛 陳麴 五味子 白朮

人參 赤茯苓 白朮

巴戟天 桂 白朮

芎藭 木香 肉豆蔻

右一十二味廬搗篩每服錢七水一盞薑錢三片

藥三枚擘煎至六分去滓食前熱服

治腎藏氣發動衆人心腹面黑悶欲絕及諸氣實脉喘甚婦人傷冷血氣發攻心等症急撞氣丸方

鉛礮

石亭脂爲末 貳兩

丁香爲末 壹兩

木香爲末 兩

麝香研壹

右五味先將鉛於銚子內慢火炒令乾入石亭脂末急手炒轉莫令焰起以水微噴之慢火再炒令乾傾於淨地坑子內以盞子覆之候冷取出細研如麩次入諸藥相和研之以粟米飯丸如雞頭大每用時研破二九熱酒浸之頓服或汗或下氣或通轉即愈如秘不通每一先入玄明粉半兩如氣滿胸膈服藥皆

吐即以炒豆炒鹽等熨令氣下便服此藥無不驗治積氣不散結伏貴脉發即上衝心胸令人喘逆骨痠少氣木香檳榔散方

木香

檳榔煨

沉香剉

磁石煨醋

訶梨勒去核

檀香子炒

芎藭

白芷炒

牡蠣煨各半兩

桂去麝皮

陳橘皮湯浸去白 焙各參分

石一十一味搗羅爲散每服二錢七炒生薑鹽湯調

下