

新刊  
西學集成

新刊醫學集成卷之十

後學 義烏 何滋 續註

○瘡瘍門一百十一

脈法

集驗

沈實發熱煩躁外無焮赤痛其邪深在裡  
宜先疎通以絕其源浮大數脈腫在外當先托裡恐  
邪入內疎不沉一浮內外証無知其在外當先托裡恐  
脈數身無熱內有焮膿脈數應當發熱而反惡寒若  
有痛處當發其疔若數脈不特見當生惡瘡

腫瘍為虛為風潰瘍為虛宜補

腫瘍為虛為熱虛宜宣熱發毒平壯形實宜下瀉

○

瘍為邪氣盛服藥又不退者難治

消

腫瘍為熱潰瘍為熱為虛為邪氣未退

數

腫瘍為病進為熱數而洪者欲膿

潰瘍為難愈最甚者難治

散

腫瘍為氣不收斂潰瘍為痛未退流滑大散難治

乳

腫瘍為血虛潰瘍為虛為相應

長

腫瘍宜消退之法潰瘍為易愈謂長則氣治也

平

腫瘍為邪盛為欲膿潰瘍為邪氣不退

實

腫瘍為邪氣大盛潰瘍為邪不退實緩器大者為虛

空

腫瘍為痛為欲膿強洪相搏外紫內熱為疽發

也潰瘍為血虛為癰

⑤

腫瘍浮而紫發熱惡寒或有痛處是為癰疽

潰瘍主氣血沉滯為痛為有外寒

⑥

腫瘍為氣實為氣滯潰瘍為血虛為病脈相應

⑦

腫瘍為元氣不足潰瘍為大虛宜補

⑧

腫瘍為虛吸藥漸充者佳

潰瘍若微而少者為虛為病脈相應

⑨

腫瘍為寒為虛尺澀為血少 潰瘍為虛為氣血

不能滋榮於瘡為有外寒

⑩

腫瘍為可治大而緩為虛潰瘍緩而澀者愈以其

病脉相應及胃氣充也

①沉 腫瘍為邪氣深漬瘍為遺毒在內寸沉為胸有痰

②伏 腫瘍為陰中伏陽邪漬瘍為陽伏陰中為內蝕為

流注漫注難治

③虛 腫瘍便宜補而內托潰陽膿既腫宜大補氣血

④弱 腫瘍為元氣不足宜內補托裡宜補

潰瘍為病脉相應宜補

⑤結 腫瘍為邪氣結漬瘍漸勻則愈不調則危

⑥促 腫瘍為熱為病滋漬瘍為熱不減漸促則死

⑦代 腫瘍為氣血散衰元氣損傷漬瘍為元氣竭絕

**癰疽**云癰疽因陰陽相滯而成蓋氣陽也血陰也血行

脈內氣行脈外相並周流寒與濕傳之則凝泣而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得邪而鬱津液稠粘為疾為飲積久滲入脈中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而鬱隊道阻隔或溢或結積久滲出脈外氣為之亂此陽滯於陰也百病皆由於此又不止癰疽而已。因榮氣盛偏助火邪而作從虛而出於經絡也如太陽虛從背而出少陽從鬢陽明從髀而出微熱則痒熱甚則痛血虛則痛甚熱甚則腫甚也諸經惟少陽厥陰所生宜預防之以其多

氣少血也血少而肌肉難長瘡久未合必成死証苟不  
知此處用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵  
癰疽因積毒在臟腑當先助胃壯氣使根本堅固而  
以行經活血藥為佐參以經絡特令使毒氣外發施  
治之早可以內消河間治腫斂于外根益不深形證  
在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵於內急須  
內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如未已再煎  
半料飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及  
煩熱已退却與復煎散使榮衛俱行邪氣不能內傷也  
治法外者以辛涼發之通聖涼膈解毒是也內者以辛

寒下之三黃玉燭散是也如暈經加通經之藥夫邪

氣內蓄腫熱宜射之也氣勝血聚者宜射而泄之

腫瘍內外皆墜宜以托裡表散為主如欲用大黃者宜

戒猛浪之非腫瘍者初發經腫而未出膿者是也

集驗論瘡瘍之法其名有三曰癰曰癤曰疔癰者初

生突起浮赤而無根脚腫見於皮膚間止間一二寸

有少疼痛數日後則微軟薄皮剝起始出清水後自

破膿出如不破用替針九枝毒膏貼之膿出即愈癤

者初生紅腫突起無頭使用火針之即散不散針

侵根脚關三四十發熱惡寒煩渴或不發熱抽掣疼



痛四五日後按之微軟此証毒氣浮淺春夏用防  
風敗毒散加葱頭姜棗煎服秋冬去薑棗葱頭加木  
香身半已上加瓜蒌身半已下宜加射干治早者即  
散或用追毒丸返魂丹復元通氣散微利之膿成用  
鉞針破開或用替針丸咬開又一等皮色不變但畧  
微腫肌肉內痛夜間痛甚發熱惡寒煩渴此熱毒深  
亦名為疽謂其能傷筋脉骨髓也日又按之心中微  
軟膿成後用火焙人開以次大膿外用拔毒乳香膏  
貼之宜服內托之藥和發急用大針於腫硬處針之  
則散疽老初生白粒如粟米大便覺閉痛纏者其痛

應心此疽始發之兆也急用火針於白粒上針開或  
誤觸破或入傷便覺微赤腫痛三四日後不散根脚  
赤暈展開須則看之方見其暈濶狹如濶四五寸左  
右渾身發壯熱微渴瘡上亦熱此疽也用火針於初  
起白粒上刺入一寸餘徑寸之間四邊刺四處便用  
四味紫葛湯淋洗一日夜共五六次洗之洗了以軟  
帛拭乾看疽上或有漸生白粒如黍米或多或少可  
用銀篦兒挑去勿令見血或有少血亦不妨不見血  
尤妙却用毛皮散付之用凉水調大鉄箍散圍貼却  
留瘡口瘡口處用水調正鉄箍散貼之未可用膏藥

如再要洗須先去圍藥令淨然後洗之一次洗一少  
點後頂上漸生白粒有則如前搽之六七日落頭無  
數如蜂房膿不肯出仍淋洗圍貼冬月用玉香蓮翹  
湯大黃一味隨虛實加減夏秋用黃連羌活散春末  
夏初用防風散毒散加葱白薑煎服去之加赤香  
吾形氣實味洪滑有力痛腫攷開壯熱便閉於五利  
大黃湯瀉蘆湯返菴丹造毒丸復元通氣散選一藥  
以通利之若大便瀉便止藥四十歲已前可用之虛  
弱年老之人須有便閉之證須慎之勿令過也磨熟  
暈赤散開圍貼如赤暈收斂却再換鐵線散不用

火針證七八日後中間初起白粒處此竅已潰通內  
大膿可用皮帛撚小帛絰入竅中令透漸漸流出  
可不用針砭如嬰膿透必以大針刺開或周圍四五  
處其竅四邊如蜂房處膿不肯出用正鉄箍散香油  
調貼一證初生白粒誤觸後便覺情懷不舒暢背上  
流重如負五七斤米樣身體煩疼胸膈痞悶而躁飲  
食無味怕聞食氣所謂外如麻裡如瓜者疽毒深惡  
內連肺腑也三五日內皆可用烙於中間左右上下  
令毒氣通暢後膿從諸竅而出五六日不散疽頂生  
白粒如椒者數十後漸生多間有大如蜂房蓮子者

指捺有膿血而不流時有清水流出微腫不突根脚  
紅暈漸漸展開或痒痛或不痛或根脚量紫赤微開  
至七八寸疽不甚熱此證甚重用紫葛湯加水醋一  
盞淋洗可使紅活如法去白拉付老皮散圍大箍散  
瘡口塗正鉄箍散每用前法如得根脚紅暈收頭突  
此藥力到變重為輕如起第一顆頂上白粒雖有膿  
而紅引不透按之尤硬或漸不疼便宜用火烙開透  
若根脚仍舊紫黑瘡反陷下如牛項之皮漸變黑色  
肌骨腐潰恍惚沉重用熬毒乳膏貼四邊仍用大  
鉄箍散圍却用楮蹄湯洗此數項變證必多又宜隨

證調理脉若靈弱便用火料人參當歸濃湯調解毒  
行經之藥凡癰疽必服萬金散夏月用桃紅散服以  
護心君見膿之後當以潰瘍法調理

潰瘍內外皆宜以補接為主如欲用香燥者宜戒虛

虛之夫

潰瘍者已破  
出膿是也

集驗云癰疽既破膿出肉腐當用拔毒膏貼之邪氣  
漸退氣血亦虛脉之洪數漸宜減退當內補托裡必  
使氣血滋榮正氣強盛膿色鮮濃赤腫漸收藥宜補  
氣生血秋冬微加禦風寒之藥十宣散十全大補湯  
中用桂是也氣滯加香附子如毒勢大退氣血未復

多宜用人參當歸黃芪四物湯之類癰疽雖已見膿  
根脚赤暈反展開潤或不痛或大痛此毒氣不退金  
銀白芷散十宣散去厚朴桂倍入參川歸黃芪加忍  
冬藤連翹犀角瓜蒌根消毒之藥春末夏間及秋初  
宜加酒苧黃連黃柏羌活腰已下可去桔梗見膿後  
須以補氣血藥為主解毒藥助之或不宜於補藥者  
宜忍冬丸四圍腫焮要用毫針燒赤刺之約一米深  
紅腫則縮復藥脉得和緩為佳或破後不潰瘡口堅  
硬者風也用蜈蚣散付之或蠱肉不腐用雄黃輕粉  
付之六忌紅腫不退或飲食進少從權且調理脾胃

或煎他證又另議藥治腐肉不知痛痺正黑者可去  
之但不傷四畔好肉及裡面良肉當去外之黑腐者  
下皆去黃白如絮之狀膿肉有紅血絲路又不可動  
此項大膿次日必自脫落庶免傷其良肉若伯刀砭  
三四日必自脫落但用刀去者新肉易長毒氣漸消  
凡腐肉亦有少臭腐敗去後則無變四圍腐者漸  
漸去令淨用長肉膏貼間日用猪蹄湯洗新肉長如  
梅李如石榴子紅活可愛日見堆阜或上有白膜皆  
是吉兆若腐敗去後下面良肉色白而平畧無紋理  
亦不能如米如粟不見生斬之意或膿水清淡或臭



此積毒內連五臟血氣枯竭乃是危症肉不能長氣  
血不榮衛氣不護瘡則風寒着之用北艾黃芪湯洗  
熏洗生肌長肉藥末付之用乳香膏長肉等膏貼之  
或肉雖長起色紫者遺毒也用地榆湯活血散付追  
毒膏貼之即自紅活瘡口漸收仍用長肉膏貼或瘡  
口痒用細茶葱鹽煎湯熱洗或瘡口易收乃氣血中  
熱毒不至分消即便長肉必防流注之患或更迷遠  
口如錢大時恐轉他証危殆凡癰疽瘡口已收但  
嫩未可便去膏藥

外  
要一書惟務紀錄舊方慮酬輕少證俟耳外科

惟東垣癰疽論一書最妙予得之為人所竊今精要

等書盛行而此書不復見惜哉

集見卅溪與  
婁李錄書

內消

集驗云癰疽之證發無定處欲令內消於初起紅腫  
結聚之際施行氣活血解毒消腫之藥是也當審淺  
深大小經絡處所形脈虛實如發於腦背腰項髀膕  
者皆太陽經也宜黃連羌活背連脇處為近少陽宜  
敗毒散形實脈實者宜漏蘆湯五利大黃湯追毒丸  
等疎利之氣宜者參芎為主血虛者當歸人參為主  
佐以消毒之藥隨分野以引經藥行至病所六經分

野上有癰疽其五經各隨本經標本寒溫氣血多少  
以行補瀉惟少陽一經雖曰氣多血少而氣血皆不  
足也治與氣虛血虛同法凡瓜蒌射干山甲金銀花  
蟾酥連翹地丁黍粘子木鱉子之類為內消之藥內  
消丸黃丸九牛膠飲子車釐散柞木飲子返魂丹為  
內消之方衆皆知之殊不知補瀉虛實平治寒溫使  
氣血各得其常則可內消也其外用紫葛湯淋洗及  
用散塗膏貼之者亦使氣血和平而腫熱消退也

內托

癰疽已成血氣虛者邪氣深者邪氣散漫者不能突

起亦難潰膿或破後膿必或膿清稀或堅硬不軟或  
雖得膿而根脚紅腫開大皆氣血虛邪氣盛兼以六  
淫之邪而變生諸證必用內托令其毒熱出於肌表  
則易愈也凡內托之藥以補藥為主活血驅邪之藥  
為臣或以芳香之藥行其鬱滯或加溫熱之藥禦其  
風寒大抵小托裡散十宣散為要藥但用隨時加減  
耳冬月并氣滯之人五香連翹湯虛弱人去大黃素  
不宜於寒涼者小五香湯形脈實膿色稠不可用補  
藥者忍冬丸之類大膿出敗肉去紅腫消當用黃芪  
人參當歸白朮補之令氣血滋茂新肉易長也

灸法

癰疽始發即以艾灸之可使輕淺騎竹馬灸法尤妙

男左女右手以篋一振前齊中指端後至手腕橫紋

四中盡漸為准却以竹一振闊起令病人騎之兩足

不著地姓身正坐前將篋植於竹上以上頭脊骨中

盡處為守兩旁各開一寸灸七壯灸畢宜服乳香

直末豆粉與乳香為末冷水調服之蓋火以暢達按

引鬱毒此從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而

少若身上必痛灸至不痛不痛灸至痛有因灸而死

者蓋虛甚孤陽將絕其脉必浮數而大且鼓精神必

短而昏無以抵當火氣宜其危也按河間灸刺法謂

九瘡瘍須分經絡部分血氣多必諭穴遠近從背出

者當從太陽五穴選用至陰在足小指外側去通谷

在足小指外側束骨在足小指外側崑崙在足外踝

在足小指外側委中在腓骨中也從髁出者當從小陽五穴選

用竅陰在足小指次指夾溪在足小指次指岐臨泣

在足小指次指本節後間陷中陽輔在外踝上四寸輔骨陽陵泉在

下一寸外也從髁出者當從陽明五穴中選用厲兌

在足大指次指內庭在足大指次指陷谷在足大指次

在足大指次指中冲陽在足大指次指解谷在中陽後一寸也

從髁出者則以絕骨一穴在外踝上三寸

一法云灸乃開結破硬之法如錢便當於米粒上著艾火十四五

針路

外科用烙得膿服神仙追毒丸此藥能下積追

壯三日內灸者只成灸瘡而按三日外者其毒漸少  
 宜多灸或灸以著膿則結熱可伸灸膿先潰則毒  
 勢分或成瘻免糜爛不致下陷及壞筋骨傷氣血也所  
 謂灸至不痛者謂著皮肉未壞膿則痛火至著毒處  
 則不痛必令火氣至好肉則痛必令火氣至好肉方  
 止或獨子大蒜切如錢厚置疽頂上用艾炷於上灸  
 之熱則易去以百壯為度或搗姜藍攪湯溫作并子  
 如當三錢厚鋪艾灸之如熱則易新并灸之可散也

毒無取膿之功若血氣壯實則膿自出當以和氣活  
 血藥佐參芪補劑服之其蟻針之法可施於輕少證  
 候吮出惡血若積毒在臟腑者徒竭其血於外無益  
 也一小兒二歲赤疹取七八大蟻吮其血疹消于曰  
 非其治也三日大熱而死

集驗云凡用針烙先察癰疽之淺深及膿未成已成  
高阜而軟者發於血脈腫平而緊者發於肌肉皮色  
不相辨者發於骨髓高阜而淺者用鉞針開之疽始  
生白粒便可消退漸長如蜂窠者尋初起白粒上烙  
及四圍烙四五處如牛項之皮者疽頂平而淺者皆  
宜用火烙針之其針用員針如筋如綿鉞大頭員平  
長六七丁一樣二枚蘸香油於炭火中燒紅於瘡頭  
近下烙之宜斜入向軟處一烙不透再烙必得膿也  
瘡口烙者名曰熟瘡膿水常流下不假按抑用紅藥  
使瘡口不合凡藥紅用帛搨乃新取牛膝根如瘡口



大小畧刮去皮一頭繫綿絲之為最外用拔毒膏貼之癰疽未成烙之可散毒深者不能早消成則膿瘻蝕其膏膜爛筋壞骨下針須要的當若毒深針淺膿不得出毒淺烙深損傷良肉不當其所他處作頭此皆不能愈疾反增痛耳或瘰癧潰久不愈漏瘡經年或通或閉癰疽瘡口不收皆因冷熨不能收斂亦互瘡口內外四畔烙之癰疽正發及膿見後紅腫微開用鉄針燒赤四圍刺之則紅腫隨縮矣

敷貼

外施貼藥亦發表之意新更謂冷藥有神効大氣得

熱則散得冷則歛何謂神效經曰發表不達熱是也  
集驗云癰疽無頭起者用伸青膏靈龜膏或毒膏正  
鉄箍散貼即令消退消膿者用鹽龜膏貼之或用追  
毒膏去膿或用筒子收膿有頭疽瘡每於洗後視赤  
暈潤缺用凉水調大鉄箍散成膏隆冬用温水調如  
人肉溫貼之腫赤盛用生地黃搗汁調貼圍貼之法  
從四畔紅暈處圍貼用皮紙掩上瘡有旋生白粒散  
漫如米如豆者用銀篦尾撥去瘡眼用老皮散付之  
再換新藥付上九熱多則赤嫩腫散熱甚則紫黑外  
寒鬱之亦紫血尾蕪寒則青白大鉄箍散正鉄箍散

乃常用之藥或因風寒熱及穢氣厥弱等証四時寒  
熱不同又宜從權設法熱者宜三黃散熱甚宜三消  
散風者加羌活防風風氣滯者加木香寒鬱加桂枝  
氣觸者宜加香葉熏之腫處脆嫩者去白芨去貼藥  
時看毛下竅中常有汗珠此則血脉疎通熱毒消散  
赤暈漸縮膿潰痛止變逆為順皮毛潤結要依良肉  
但疽頂有些少腐開不用刀剪如藥下不生汗珠腐  
敗必潤必多也膿後圍貼則收散漫潰毒盡隨膿出  
瘡口貼枝為膏藥如膿出不服用此膏藥肉不生  
用金寶膏敗肉去後圍貼則氣血結新肉易長瘡口

用長肉膏敷貼之藥與淋洗藥並行同功

淋洗集錄

淋洗之法每用茶二兩水三升煎取一升半去渣以  
淨綿蘸淋洗之次用軟綿拭乾腫瘍宜紫葛湯一日  
五七次洗之每洗後拭乾視瘡頂上如有白粒如米  
火者盡去之瘡眼付老皮散次用水調大缺箍散圍  
貼四邊紅腫處用正缺箍散水調貼瘡口再洗則先  
去舊藥每一次洗換新藥如前潰瘍用猪蹄湯一日  
一二次洗之仍用大箍散如前圍貼瘡口上用追毒  
拔毒等貼之敗肉去後間二三日一洗之可換長肉

膏貼之瘡發後背腹肢淋洗射之在四肢者濡漬之  
在下部委的若瘡潰之淋洗之功瘡疔初却則宣拔  
邪氣可使消退已成洗之則疎導腠理調血脈探引  
熱毒從內達外易深為淺縮大為小紅腫疔蔓洗之  
則收疔色紫黑洗之紅活去惡氣除風邪逐舊生新  
如瘡口冷滯不收者濃煎北艾湯洗燒松香兔毛熏  
之淋洗之藥可與欬搗散並行同功

追蝕膿毒

集驗

瘡之薄皮剥起癰疔之瘡一紫細瘰癧火針破按之  
後皆可用追蝕破膿之藥癰疔開後瘡口再閉宜用

藥絰以通之或用帛或用髮或用乾稻草葉皆可塗  
搽絰塗以蟾酥礪砂白丁香巴豆寒食面之類或用  
五灰膏隨輕重塗絰用之疽瘡腐敗可用手法去之  
或用金寶膏去之或用雄黃輕粉付之多待數日亦  
自脫落疽破後有蠹肉多出者遠志末酒調塗之則  
漸漸消去如不用五灰膏塗之則消癰疽久流膿  
水不腐不斂氣血不能滋養瘡口滯日漸內浸好肉  
而為靈肉膿水過處漸成膜管如鵝毛管而軟其瘡  
口如魚嘴樣日久不能愈筋爛骨壞用金寶膏或塗  
或絰或封之一日三四次用之不耐痛者一日二次

用之其竅肉膜管消盡以滋潤膏藥貼之

辨膿

用手按之熱則有膿不熱則無膿

集驗云脉紫而數為膿未成紫去但數為膿已成以  
手按上熱者為有膿不熱者為無膿按之牢硬未有  
膿也按之半軟半鞣已有膿也大軟方是膿成也大  
按之痛者膿深也按之不甚痛者未成膿也按之即  
復痛者為有膿也不復痛者無膿也腫垂軟而不痛  
者血瘡也脰腫而黃者水也薄皮剝起者膿淺也皮  
色不變不高阜者膿深也盛者宜藥點破高突者宜

鉞針深者宜終手足指指及乳上宜膿大清方開麻

豆後收節上癰稍覺有膿便用尖破汗則成糜曲之

痰辨腹內難胃腕難人迎乃結喉兩傍逆緊者瘀血

也肺癰始萌可治膿成則難已咳嗽啞如糗米粥者

不治嘔膿不止者不治膿自止者愈腸瘡速臍生瘡

膿從毒出或從膿中出者難愈從大便出者易愈

辨癰

膿出而反痛者虛也宜補之亦有穢氣所觸者宜和

辨之風冷所逼者溫養之疽發深不痛者胃氣大虛

即死肉多而不知疼也因熱而痛者冷以寒涼因寒而痛者藥以溫熱因風而痛



者故其風因濕而病者導其濕燥而痛者潤之惡肉  
 侵潰者引之經絡滯者行之憂鬱者疏之酒飲之墮  
 寒而痛者乳音沒藥止之凡將使膿之膿必非膿  
 作痛而流大出膿疽不可不痛若大痛因風者先  
 形證逆順

眼白睛黑而眼小一逆也不能下食納藥而嘔食不  
 知味二逆也傷痛渴甚三逆也膈項中不便四肢沉  
 重四逆也蓬嘶色脫唇鼻清黑面目四肢浮腫五逆  
 也煩躁時咳腹痛渴甚世利無度小便如淋六逆也  
 膿血大泄熾痛尤甚膿大臭不可近之七逆也喘粗  
 氣短恍惚嗜卧八逆也赤潰先黑陷下面青唇黑便  
 汚九逆也其氣喘痞塞咳嗽身冷自汗瞪目耳聾恍

愾驚悸語言錯亂皆是惡證若動息自率飲食知味  
一順也便利勻調二順也神彩精明語聲清明三順  
也膿潰腫消色鮮不臭四順也體氣和平五順也五  
順見三則吉七逆見四則危俱至則惡之劇矣

不治證

發背腎俞空處肝膈上透膜者死未潰肉陷而青黑  
唇黑便污者死潰喉膿內外相通者死陰入腹者不  
治入囊者死髀深及數者不治數謂深一寸有餘也  
腦上諸陽所聚穴透腦出者在順後一寸三分毒銳  
入喉者死

一伏兔二腓脠三背四五臟脬五項上六腦七髮八  
髀九頤皆癰疽死之地分也

經絡氣血多少

厥陰太陽少氣多血太陰少陰少陽多氣少血陽明  
多氣多血氣多之經可行其氣血多之經可出其血

分癰疽經絡

腦發腎經足

鬢發手經少

背發中經脾經胃

肩手經太陽經

腮脣手經明

腎足經陰

喉任經陽明

臍任經陽明

頤 手足陽明

乳 內陽明 少陽

驛馬 足厥陰

齋 足太陽

腋 手太陰

穿當 腎冲任三脉

腕 手足陽明

腿 表足三陽 裏足三陰

嘔

腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之 一云伏熱在心可降其火 潰瘍

作陰虛治之若年老潰後發嘔者不食者宜參芪白

朮膏峻補隨證加減河間謂瘡瘍嘔者溫氣侵胃也

宜倍白朮

渴

渴 宜倍白朮

癰疽發熱乃氣血兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養血或忍冬九黃芪六一湯

蒲公英化熱毒消惡腫結核有奇功田間路側皆有之  
三四月開黃花似菊味甘解食毒散滯氣可入陽明  
太陰同忍冬藤煎以少酒佐之

皂角刺 治癰疽已破未破能鑽引至潰處

白蠟 稟性堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛

接骨續筋補虛當與合歡皮同用入長肉膏有神効

朽骨 取久疽及痔漏中朽骨用烏骨雞脛骨以砒實

之蓋跟同濟微紅出火毒去紅用骨研細飯丸如黍

米以帚撚送入竅中更以膏藥貼之

精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰  
誠哉是言也若用之於小瘡癰與冬月亦可轉重就  
輕移深於淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐  
以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用  
此不分輕重時令經絡前後如盲人騎瞎馬半夜臨  
深池危哉

加味十全大補湯治癰潰後補氣血進飲食實為切要  
凡膿血出多陰陽兩虛此藥有迴生起死之功但不  
分經絡不載時令但見痛平腫退遂以為安慢不加

省無補接調養之功愈後虛証乃見因而轉成他病者多矣

丹溪治一人質弱愛患右膊外側生核脉浮大弦數重似瀉此愛患傷血宜用補以防變證以人參下竹瀝他工以十宣五香間與後值大風核高大中起紅線過肩側及左脇下急作參膏入芎湯薑汁飲之盡參三斤瘡潰又多與四物湯加參朮芎歸陳皮甘草半夏薑煎服愈。一人面白神勞脇下生一紅腫如桃或教用補劑不信乃用流氣飲十宣散血氣俱憊而死已上二症乃少陽經。一人形瘦膚厚愛患作勞多氣少血之部分也

好色左腿外側腫上一紅腫大如菜醫以大疔實用

承氣二貼下之又一醫用大黃末炒耳卓三貼事去

矣

此乃發余經多氣少口之即也

。一人左絲竹空穴塞以一角如

雞距此少陽經氣多血少者予戒其斷酒肉與毒食

須針灸以開發腫滯他工以大黃硝腦等冷藥貼之

一夜裂開如蚌肉血濺出長尺餘而死此冷藥所逼

熱不得發故也。一士人於背臀腿節次生疽用五

香連翹十宣而愈後脚弱懶語肌起白胥脉洪浮稍

鼓予以極虛處治作參芪歸朮膏以二陳湯化下盡

藥一斤半白胥沒大半呼吸有力其家熾緩自作風



藥治之而死。一老婦形實性急嗜酒胸膈一作生疽  
方五日脉索且溢用大黃細切酒炒為末酒炒人參  
入薑煎調末一錢服少時再服得睡上身汗出而愈  
胎毒一人連年病瘡後生一子三月病右脇下陽明少  
陽之間生一癰甫平右腋下相對又一癰膿血淋漓  
幾死醫以四物湯敗毒散數倍加人參以香附為佐  
犀角為使大料飲乳母二月而愈踰三月忽腹脹生  
赤疹如霞片取剪刀草汁調原蚕砂付隨清又半月  
移脹入囊為腫黃瑩裂開二丸顯露水出以紫蘇葉  
盛夫炭末托之旬餘而合此胎毒證也

東垣治尹老家寒形志皆苦時冬寒於手陽明太陽經  
分出癰第四日稠膿勿少有癩疔其臂外皆腫痛甚  
先腫在陽明脈左右寸皆短中得之皆弦按之洪緩  
有力此癘得自八風之變以脈斷之邪氣在表其證  
大小便如故飲食如常腹中和口知味知不在裡也  
不惡風寒止熱燥脈不浮知不在表也表裡既和邪  
氣在經脈之中也故凝於經絡為瘡癰出身半已上  
故風從上受之故知是八風之變為瘡止經脈之中  
也治其寒邪調和經中血氣更無凝滯則已也

○皆癰

一百十二

中醫辨論  
足太陽經

丹溪云脉數身無熱而反惡寒若有痛處背脊其癰用  
大黃羌活防風甘草節生地黄當歸具母白芷赤芍  
葉皂角刺黃芩作大劑煎服氣虛加參芪瘡潰亦用  
。一人背癰徑尺許穴深而黑急作參芪歸木膏飲  
之三日零以艾湯洗之氣息奄奄然可飲飯每日作  
多肉餽飽大椀與之盡藥膏五斤餽飽三十椀瘡漸  
合蓋肉與餽飽補氣之有益者也。一人背發疽徑  
尺已與五香十宣散數十貼嘔逆不睡素有淋病急  
以參芪歸木膏以牛膝湯入竹瀝飲之淋止思食盡  
藥四斤膿自湧出而愈。一人發背疽得內托十宣

多矣見膿嘔逆發熱又用嘉禾散加丁香時天熱脉  
洪數有力此潰瘍本所忌然形氣實只與竹瀝飲之  
盡藥十五六斤竹百餘竿而安後不戒口味夏月醉  
坐水池中經年餘在牀傍生軟塊二年後成疽自見  
喘息嘔逆如前仍服參芪膏等而安若與十宣其能  
然乎一人形實色黑背生紅腫近髀骨下痛甚脉浮  
數而洪緊正冬月與麻黃桂枝湯加酒栢生附子瓜  
婁子甘草節人參羌活青皮黃芪半夏生薑六帖而  
消。一婦人因無子服神仙聚寶丹背生癩甚危脉  
散大而瀦急以四物湯加煅百餘貼補其陰血幸質

學可救

附方

托裡散

一方 治一切癰疽發背初服即散亦下死血

大黃

甘草

辰砂

血竭

為末酒下

解毒丹

治發背癰疽并金石毒

紫背車螯

大者

鹽泥固濟煨紅出火毒為末甘草膏

九甘草湯下惡物用寒水石煨紅入鷲游中沉井中

臘猪油調付

一方必輕煎之又方以草

清涼膏

治發背

川歸

白芷

木鱉子肉

白芨

黃皮

白銀各一兩半乳香研

賦粉

白膠香少黃丹五香油十右剉前六味煎候黑

色去之入槐柳枝各七寸再煎入丹臨時入下

射干湯

治瘰疬發背諸瘡腫痛脉洪實數者

射干 犀角 升麻 玄參 黃芩

麥門冬 大黃各一兩 山梔半兩 竹葉 芒硝各一

右剉水煎以利為度

。醫難一百十三 此太陽經

醫君小腹之後仕下此陰中之陰也其道遠其位僻

雖曰多血然氣運不到血亦窄來中年後尤慮患此

總有腫痛參之脉證但見虛弱便與滋補血氣可保

終吉

一云切有此便用久  
針刺入三四寸可愈

附立內托羌滑湯 治尻醫生癱堅硬腫痛左右手及

脈但緊按之無力

羌活 防風尾

藥本

肉桂 二分 黃柏 二錢

連翹 炙甘草

歸尾

各一錢 黃芪 半一錢 蒼朮

陳皮 各五分

右作一服酒水煎熟服蓋覆其癰令藥氣行

。附骨疽百十四

丹溪云 皆因久得厚味及酒後飲水得寒故水深入解

樞穴左右積疾相搏而成也 內無云地之燥氣感則

下交之發於下陰者濕也濕必兼寒上氣鬱而成熱  
熱狀若而附骨疽也此

針刺入二三寸深淺之聖隨肉肥瘦體弱刺二三  
 處多則鬱結毒開內熱得以平散也神者膏貼之  
 羌活防風湯以吐氣實者可利之亦宜火燎向下灸  
 去頂治一月或四十五日方潰膿亦宜火燎向下灸  
 其膿不愈用金寶膏紅之以取其朽腐此疽與賊風  
 相類蓋附骨疽者由寒濕折熱伏結而附骨成疽  
 賊風之候由風邪搏於骨節遇衣則痛甚附骨疽痛  
 不能移初發之應骨皮肉微急汗出如肥狀者是也  
 其賊風皮骨不甚熱而索者患寒時復汗出常欲熱  
 裂痛處即戒其附骨疽初時骨痛無形亦寒亦熱而  
 無汗經久不消而潰膿亦亦有緩疽石疽亦與附骨  
 疽相類石疽者但疽腫與皮肉相似若痛而堅硬如  
 石故謂之石疽緩疽者其熱緩慢積日不潰久乃紫  
 黯色皮肉俱爛故曰緩疽此二症皆不傷筋骨惟附  
 骨疽而能蝕筋骨也又附骨疽與白虎飛尸等症亦  
 相類壁節走注不定白虎飛尸痛淺淺之便痛亦懸  
 作膿着骨而生附骨疽者痛深按之無益賊風不  
 久則變為癰曲偏枯治宜引越脾治風之劑則差矣  
 其緩疽石疽二者初覺便宜補虛托裡溫  
 熱之劑以取消矣臨病之際可不辨也



環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼木佐黃柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加條芩  
體虛者加牡牛膝以生甘草為使大料煎入薑汁食  
前飲之痛甚者恐前藥十數貼發不動少加麻黃一  
二貼又不動者恐疽行成急掘城地坎以火煨通紅  
沃以小便赤體坐其中以席圍抱下體使熱氣熏蒸  
腠理開氣血暢而愈。一後生散骨疼以風藥飲酒  
一年手以防風通聖散去硝黃加生犀角淨平與百  
餘貼成一疽近皮羣膿出而愈後六七年其處再癢  
手曰舊病作無能為矣蓋發於新藥之後多得香

肉味若能茹淡遠房尤可生也病膿血四五年沿及  
腰背皆空又三年而死此純乎病熱者。一女子髀  
掘穴生附骨疽在外側臙少陽之分始未悉用五香  
十宣等藥一日惡寒發熱膈滿猶大服五香湯一夕  
喘而死此升散太過陰血已絕孤陽發越於上也。  
一少年天寒極勞散骨痛二月後生疽深入骨邊卧  
二年取剝骨而安此寒搏熱者也

**東垣**治一男子於左大腿邊近膝股內出附骨癰不辨  
肉色漫腫皮澤水硬瘡勢甚大其左腳乃肝之髀上  
也更在足厥陰肝之經少侵足太陰脾經其脉左三

切細而弦按之洪緩微有力用生地黄一分黃栢二  
分肉桂三分羌活五分歸梢八分土瓜根酒柴胡梢  
一錢連翹一錢三分黃芪一錢作一服酒一盞水二  
盞煎至一盞去查空心熱服。一老人年七十因寒  
濕地氣得附骨癢於左腿外足少陽膽經之分微侵  
足陽明分濶六七寸長一小尺堅硬漫腫不變肉色  
皮澤深但行步作痛以指按至骨大痛與藥一貼立  
止再日堅硬而腫消與內托黃芪酒煎湯愈

附方

內托黃芪柴胡湯

東垣

生地黄

黃栢

二分

肉桂

三分

羌滑 五分 歸梢 八分 土瓜根 製 柴胡 梢 各 錢 連翹 半

黃芪 二錢 作一服酒水各一盞煎至一盞空心熱服

內托黃芪酒煎湯 柴胡 半錢 連翹 肉桂

黍粘子 各一錢 歸尾 黃芪 各二錢 升麻 七分 黃柏 五分

甘草 五分 作一服糯酒一盞半煎至一盞空心溫服

少時以勝壓之使不令火熱上攻中上二焦也

集驗云如附骨疽久不愈諸藥不効者骨必朽壞名曰

剝骨用法剖開取去剝骨外用金瘡藥付靈龜膏

貼之即愈剝骨去盡用北艾葉煎湯熏洗兔毛松香

燒烟熏之內用生肌長肉末藥付之外用膏藥貼之

瘰癧馬刀瘤贅巖發冷癭久不愈者金寶膏能朱膏  
追去蠹肉皆可全愈惟漏瘡穿腸者瘡癩已換好肉  
已接但傷補不能盡完尤畧有些少已自不竟為害  
骨爛者須去爛骨令絕能平伏也

防風通聖散加犀角浮萍末去消黃治附骨癰

三生散 治附骨癰漫腫光色

露蜂房蟬退頭髮燒存性 右研細酒下三錢

五灰膏什一宿待惡肉腐以刀去去盡以香油蘸在綿

上紐干覆之待好肉如巖盒狀方可收口收口用龍

骨白斂乳香沒藥等付

○腦項疽百十五

督脉足  
太陽經

東垣治一人因飲酒太過脉沉數腦之下項之上有小  
瘡不痛不痒謂是白瘡慢不加省二日後覺微痛又  
二日腦項麻木腫勢外散熱毒熾發又三日痛大作  
一醫以五香連翹湯又一醫云此疽也然而不可速  
療頃四月可愈果如二子言可畏之甚也乃請明之  
視之談笑如平時且謂瘡固惡保無慮耳且膏梁之  
變不當投五香疽已七八日常先用火攻之策然後  
用藥午後用火艾炷如二核許者攻之至百壯乃痛  
覺次為虜方云是太陽膀胱之經其病逆當反治脉

中得弦緊按之洪大而數且有力必當伏其所主而  
先其所因其始則同其終則異可使破積可使清堅  
使氣和則已必先熾氣無伐天和以時言之可收不  
可汗經典病禁下治當結者散之醎以更之然寒受  
邪而禁針以諸舌寒為君為用甘寒為佐酒熱為因  
用為使以辛溫和血夫辛以散結為臣三辛三甘益  
元氣而和血脉淡滲以燥濕扶持秋令以益氣瀉大  
以入本經之藥以和血且為引用既已通經以為主  
用君用苓連黃柏生地黃知母酒製之本經是滑獨  
滑防風薑本防已當歸連翹以解結黃芪人參甘草

配諸苦寒者三之一多則滋榮氣補土也生甘草瀉  
腎之大補下焦元氣人參陳皮以補胃蘇木當歸尾  
去惡血生地黃歸身補血酒製漢防已除膀胱留熱  
澤瀉助秋去酒之濕熱必以桔梗為舟楫乃不下沉  
服後疽當不痛大折精氣大旺飲啖進形體健一夕  
已減七八矣予疑瘡適透喉邊邀視之驚喜曰瘡平  
矣不五七日作痂遂愈

又見淋門

○內疽百十六

丹溪云皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者  
陰受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而白內非



于腸胃有膜也內有者以其視之不見故名之曰內  
之發則無定處隨所發而命名在內則為發背發腦  
等症在內則為腸胃肺癰等症在內則難明尤宜審察  
一人性急味厚常服熱燥之藥左脇一點痛脉輕弦  
重菀知其痛處有膿作內疽治與四物湯加桔梗香  
附薑煎十餘貼痛處微腫如指大令針之少時屈身  
而膿出與四物調理而安

滄洲翁治一小兒十二歲患內癰腹脹臍突頰銳一醫  
欲刺臍出膿母不許請視之彼曰此兒病癰小腸苟  
舍針臍無他法翁喻之曰臍神關也針刺所當禁矧  
癰舍於內推當以湯先攻之苟如若言必殺是子矣

遂怒而去以透膿散一劑膿自潰繼以十奇湯下善  
應膏丸漸差。一人病傷寒踰月既下而內熱不已  
脇及小腹偏左滿肌肉色不變俚醫以為風矢所中  
膏其手摩之月餘其毒循宗筋流入於睪丸赤腫若  
蠶子請視之關尺皆數滑且芤曰數脈不時見則生  
惡瘡關芤為腸癰以保生膏衣以乳香用消黃作湯  
下之膿如藥者五升許明日再圍餘膿而差

○肺癰肺痿百十七

肺癰先須發表千金云病咳唾膿血其脈數實或口中  
咳胸中隱痛脈反滑數者為肺肺癰其脈緊數為膿

未成緊去但數為膿已成。肺癰乃風傷於衛熱過

於榮血為凝滯蓄結成癰病咳逆上氣濁唾如粥膿

血胸中隱痛金匱云或曰熱在上焦者因咳為肺痿

從嘔吐或從消渴利數又咳服藥下利重亡津液故

得之問曰寸口脈數其人咳口中反有蠶唾沫者得

欬師曰此為肺癰之病若口內辟上燥咳則胸中隱

隱痛脈反滑數此為咳唾膿血脈虛者為肺痿數實

者為肺癰問曰病咳逆脈何寸以知此肺癰當有膿血

吐之則死其脈何類師曰寸口微而數微則為風數

則為熱微則汗出數則惡風寒中於榮衛吸而不出

風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則咳口乾喘滿

咽燥不渴時唾濁沫時上澀寒熱之所過血為凝滯

膿血口燥胸中痛隱上然喘滿不唾末醒鼻時上振

寒吐如米粥寸口脈數而實按之滑者肺癰也。病

乾咳唾中出膿血上氣喘滿而咳寸口數而虛

此肺之毒者  
也

治法

要畧先用小青龍湯一貼以解表之風寒邪氣

然後以亭歷大棗瀉肺湯桔梗湯葦葉湯隨證用之

以取膿此腫瘍之例也終以常宙獨行方名黃昏湯

已破入風者不治或用太乙膏丸服搜風湯吐之

吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散加髮

灰

丹溪治一少婦胸膈間潰一竅膿血與口中所咳相應

而出以參芪當歸加退熱排膿等藥而愈云此因

抱一翁治一人病胸膈壅滿昏不知人予以杏仁薏苡

之劑灌之立甦繼以升麻黃芪桔梗消其膿服之喻  
月而瘳予所以知其病者以陽明脉浮滑陰脉不足  
也浮為風而滑為血聚始由風傷肺故結聚客於肺  
陰脉之不足則過宣逐也諸氣本乎肺肺氣治則出  
入矣宛陳除故行其肺氣而病自已

附方

亭歷大棗瀉肺湯金匱治肺癰喘不得卧

亭歷炒黃打丸大棗肉十二枚先以水三升煮棗取二

升去棗內亭歷煮取一升頓服之先進小青龍三貼

後服此

柑桔湯 治咳胸滿噉如米粥當吐膿血

甘草

桔梗分等

煎服

桔梗湯

治肺癆咳血膿血咽乾多渴大小便赤澀

桔梗

貝母

當歸

瓜蒌仁

枳殼

桑白皮

薏苡仁

防已各一兩

甘草節

杏仁

百合各半

黃芪半一兩

薑水煎大便秘加大黃小便秘

加木通

收斂瘡口止有合歡樹皮即榿也白飲煎飲之

常葉湯

治咳有微熱煩滿胸心甲錯為肺癰此腫癰也

桔梗白散

外治治咳而胸滿脉數振寒咽乾不渴時或濁

唾久吐膿如米粥者為肺癰 桔梗 貝母

巴豆 右末強人服半錢匕 瘦人減之 病在膈上者瀉

出若下多不止飲冷水一杯即止

又方 瓜蒌 當歸 桔梗 貝母

白芷 甘草 等分一方有亭 歷無貝母白芷 右水煎食後服

肺痿 附方

甘草乾薑湯 治肺痿吐涎沫不能咳者其人不可渴必

遺溺小便數所以然者以上虛不能制下故也此為

肺中冷必眩運 甘草 炙四兩 乾薑 二兩 右剉水四升

煮一升半熱服溫覆之若渴者屬消渴

參甘草湯

治肺痿涎唾多温液者

參甘草

右剉水三升煮取一半分三服

生薑甘草湯

治咳嗽涎沫不止燥渴

生薑 半分

甘草

兩四

人參

兩二

大棗

枚十五

分作三服水煎服

桂枝去芍藥加皂角湯

治肺痿

桂枝 兩三 甘草 兩二

大棗

枚十一

皂角

一枚去

皮炙右作三服水煎服

腸

百十八

大腸手腸明 小腸手太陰

丹溪云

作濕熱積治入風難治

千金謂妄治必殺人其病小腹重強按則痛小腹似淋

特特汗出復惡寒身甲錯腹皮急如腫脉數者微有



膿也又云脉洪數已有膿遲緊者未有膿也甚者腹  
脹大轉側有水聲或繞臍生瘡或膿從臍出若膿從  
大便出者易愈或大便膿血問曰羽林婦何以知腸  
有膿師曰脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮  
數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁  
小腹堅滿小便或澀或自汗或惡寒膿為已成設脉  
遲緊則為瘀血血下則安

要畧治以薤白仁附子敗醬散千金以大黃牡丹湯三  
因以薤白湯治之

丹溪治一女腹痛百方不治脉滑數時作熱腹微急曰

痛病脈當沉細今滑數此腸癘也以雲母膏一兩丸  
桐子大以牛皮膠溶入酒中并水下之餉時服下膿  
血安

季生治一人腸中痛甚大便自小便出曰乳脈見於腸  
部此腸癘也以雲母膏作百十九黃芪湯下利膿數  
升愈

附方

薏苡仁附子敗醬散 要畧 薏苡仁 九分 附子 二分 敗醬

為末每方寸匕水二升煎至一升頓服小便當下

大黃牡丹湯 腸癰者小腹腫痞按之即痛如淋小便

似調時上發熱自汗後復惡寒脉遲緊者膿未成可  
下當有血脉洪數者膿已成不可下也 大黃兩

牡丹皮 兩 桃仁 五十枚 瓜子 半升 芒硝 三合

右剉水六升煮取一升下消再煎一二沸服之有

膿下膿無膿下血

白芷升麻湯 治大腸癰 白芷 升麻

桔梗 各一錢 紅花甘草 各五分 黃芩 炒 黃芪 各四錢

生苓 三錢 作二貼酒水各半煎

瑞効丸 治腸癰胃癰 當歸 三錢

枳榔 木鱉子 穿山甲 知母 牡蠣 甲 用

連翹

枳殼

各一兩半 礪碎

琥珀

各一兩 去油

射香

為末酒糊丸桐子大每服十九至三十九

臨卧酒下再服如利動臟腑減丸數大小便有膿血

出者用別藥調治

驗方治小腸癰

連樹葉

冬月取皮亦得

搗爛入薑七片同搗

入白酒汁一大鍾食前溫服

肚癰

九里香草搗碎酒浸取汁服之

又方

蛇頭黃鱗頭地龍頭燒灰酒下即愈

灸法

曲兩肘頭鈺骨灸百壯下膿血而安

○胃脘癰百十九

射干湯 集驗

人迎脉逆而咳嗽膿血榮衛不流熱聚胃口

射干 去毛

枳子

赤茯苓

升麻 一兩

赤芍 一兩

白朮

半兩

右剉水煎入地黃汁一合蜜半合溫服

芍藥甘草湯

升麻湯

並治方見集驗

。乳梗百二十

丹溪論因調養失宜所致蓋乳房陽明所經乳頭厥陰所屬忿怒所逆鬱悶所遏厚味所醱以致厥陰之氣不行故竅閉而汁不通陽明之血沸騰故熱甚而化膿或因乳子膈有滯痰含乳而睡口氣燥熱所吹而生結核初便忍痛揉軟吮令汁透可散否則結成矣

以青皮踈厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節行  
汚濁之血瓜蒌子消腫導毒或加沒藥青橘葉皂角  
刺金銀花當歸或湯或散須以少酒佐之或加艾火  
二三壯於腫處尤妙不可便用針刀

淺者病此深者為岩不岩

○ 妳岩百廿一

妳岩者始有核隱結如驚棋子不痛不痺五七年方成  
瘰初便宜服踈氣行血之藥更須情思如意則可如  
成瘰之後則如岩穴之凹或如人口有唇流清汁赤  
膿胸脇氣攻疼痛用五灰膏金寶膏去其蠹肉生新  
肉漸收斂此疾多生於中年婦人未破者尚可治

療若成瘡終不可治

桐皮湯治疥瘡即前乳擷之方十六味沅氣飲

單黃青皮湯治婦人百不隨意久積憂鬱乳上有核如

碁子狀 青皮 四錢 水煎徐七服之

乳癭百二十二

乳癭丹 蒲公英同忍冬藤入少酒煎服隨飲睡竟已安矣

未潰 青皮瓜蒌桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節煎

已潰 參芪歸芎白芍青皮連翹瓜蒌甘草節煎服

一婦形脉稍實性躁難於後結乳生隱核以單味青皮

湯間以加減四物湯加行經絡之劑服二月而安

一後生作勞受風寒夜發熱左乳痛有核如掌脉細書  
而數此陰滯於陽也詢之已得酒遂以瓜蒌子石膏  
乾葛台芎白芷煅考生薑同研入酒飲之四貼而安

乳癰 附方甘草 木通錢三 青皮 炒 石膏 煨各錢

歸頭 連翹 黃藥子 皂角刺 各半 煎入酒服

又方 石膏 煨 樺皮 燒 瓜蒌仁 甘草節

白芷 蜂房 台芎 香附 葛根

右剉酒薑汁飲

乳癰 脾裂 治乳頭破裂丁膏末付以津潤之



丹溪云囊腫者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將  
 流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不  
 藥可也惟在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊者  
 甚而囊自裂開舉丸懸掛水出以轉炭末付之外  
 紫蘇葉包裹仰臥養之 癰疽入囊者嘗治數人悉  
 以濕熱入肝經施治用補陰佐之雖膿潰皮脫聖丸  
 便毒一百二十四

丹溪云便毒是足厥陰濕氣因勞倦而發一名騶馬疔  
 為病而瘡見於厥陰之經分野其經多血又血在  
 或牛有疥癢而發皆熱濕血聚而成初發有跡利則  
 能清後用乾葛用射干三寸生薑煎食前飲利二三  
 內補之藥則愈

行効射干紫花是紅花者非

一方 破故帛牛旁子炒大黃煨等分為末每兩酒下

已煎成膿 大黃連翹各半 枳實三錢 厚朴

甘草節各二錢 桃仁二十枚 右作三服薑水煎服

一少年玉莖挺長腫而癢皮塌常潤磨服難行方見前陰病門

消毒飲子 附方 治便毒初發三四日可消

皂角刺 金銀花 防風 當歸 大黃

甘草節 瓜蒌仁等分 酒水煎服頻提掣頂中髮立効

破毒飲 治便毒橫痃已成未成隨即消散神効

活石末三錢 班毛去翹足三介 為末分作三服空心一日服

畢少湯送下毒氣從小便中出如小便痛煎車前子  
木通灯草澤瀉頓服即愈

。懸壺百二十五 吳道簡  
後者是

粉草膏 用方 橫紋大甘草 一兩四寸 河水一椀慢火炙

令水盡剉酒煎服或交百餘壯令開或火針針之

。瘰癧百二十六

丹溪云必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食

味之厚腎氣之積曰毒曰風曰熱皆此二端拓引癭

一換須分虛實實者易治虛者可慮以其屬膽經主決

斷有火且氣多血少婦人見此於月經不作寒熱

生稍久轉為潮熱危矣自非斷慾食淡神仙不治也

**治法**

瀉火散結虛則補元氣散十宣實則瀉陰火散三

立効散與瓜蒌散相間服神効

本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脈之

功而經不言觀其性退寒熱虛者可仗實者以行散

之藥佐之外以

化堅湯附方升麻一錢 葛根三錢 漏蘆三味行

牡丹皮三錢去 川歸 生地 熟地三錢和

連翹一錢 黃芪一錢 苟藥二錢 桂一分 柴胡八分

粘子三分 羌活 防風各一錢 獨活五分 昆布二分

廣木 三分 三稜 三分 益智 厚朴 麥芽 一錢

煨栢 三分 人參 陳皮 木香 大黃

右為細末湯浸正餅捻作餅子日乾杵如米每三錢

湯下毋令藥多妨其飲食此治之大法

一法治瘰癧不問癰疽疔毒皆治 蟾酥 射香

雄黃 血竭 輕粉 各一 石灰 新好風化者 木好灰 一斗

淋汁用鉄鍋煎至一椀入前藥末調勻點患處核自

爛以後藥 收 海螵蛸 錢三 赤石脂 兩 共為細末洗淨搽上

血少烏刀瘰癧瘡壯泄 四物加湯炒芍藥牡礪細末

陳皮柴胡甘草黃連 玄參神曲炒桑椹膏 集腋