

遠服

叔方思食調中丸

脾胃久弱飲食不消氣滯胸膈

痞悶嘔逆痰水

白术米泔浸

人參錢

木香五錢

砂仁炒麥芽各一兩

甘草錢四兩

右末陳米糊為

半夏麵炒

治中湯 即理中湯加青皮陳皮  
十香丸 傷飲食胸膈腹疼或氣滯積聚皆可服

甘松炒益智仁炒香附子各四兩京三稜二兩

丸梧子大每服百丸白湯下

枳實半夏湯 即理中湯加青皮陳皮

義术二兩 青皮 陳皮各三兩 砂仁一半 木香

甘草兩

炒一兩

水浸蒸餅糊為丸梧子大每服五

十九姜湯下

枳實半夏湯

枳實

麸

半夏

泡各五錢

姜五片水

二鍾煎服

治心腹膨脹

多食積所致

南星

姜製半夏

製

瓜萎仁各一兩

半

香附童便浸一兩

黃連

姜汁

炒三兩

青蒙石

蝦蘿蔔子炒

連翹

陳皮各五錢

射香少許

右末神麴糊為丸

治因麪內傷發熱頭痛作吐 白术一錢半 白芍

陳皮

蒼术各一錢

茯苓

黃連

人參

甘草

各五分

姜三片

口渴加葛根二錢

楊氏家藏薰蔻橘紅散

溫脾養胃升降陰陽和

三焦化宿食

丁香

木香各兩

一人參

白荳

仁

厚朴姜製

橘紅

神麵

炒乾姜各五錢

半夏麵

甘草

霍香

白术各五錢

每服五七錢姜三片東一枚水煎服

紅丸子·溫脾胃消寒冷食積併治冷瘧

京三稜

莪朮

陳皮

去白

青皮各五斤

乾姜

炮胡椒

各二斤

右末醋煮糊為丸梧子大以礬

紅為衣每服二十丸食後姜湯下

消食化氣香穀丸 醒脾去積順氣化痰

青皮

炒各二兩

陳皮

炒各四兩

蘿蔔子

炒各一兩

木香

三稜

炒各二兩

蓬木

神麵

麥芽

各二兩

枳殼

炒各一兩

半夏

炒各二兩

枳實

炒各一兩

香附子

醋炒各二兩

檳榔

炒各二兩

山楂

炒各二兩

草藥

各二兩

陳倉米

炒一升同巴豆二十粒

黃色去巴豆不用

右末醋糊丸梧子大每服四五十丸漸加至

七十丸食後白湯下

青橘皮散 食過飽痞悶消食化氣醒酒

青橘皮去炒 白葛根一兩砂仁五錢 為細末濃茶

調服

寬中丸 治胸膈痞悶停滯飲食 山楂肉

蒸熟為末丸服

除湿益氣湯 傷濕麪心腹滿悶肢體沉重

枳實炒 麥

白术

黃芩各一兩

蘿蔔子

炒半兩

神曲

紅花一兩

荷葉飯為丸

豆蔻大每服六十九

白湯下

二黃丸 傷熱食痞悶兀欲吐煩亂不安

黃芩二兩

黃連酒炒一兩

升麻

柴胡各三錢

甘草

一錢

枳實炒五錢

餅糊為丸每服七十丸姜湯下

白朮和胃丸 痘久不能食而臟腑或結或癆其

由胃虛弱也常服則和中理氣消瘀去湿熱飲

食

厚朴炒半兩

夏苓各一兩

白朮

一兩

陳皮

八錢

枳榔

枳實各二錢半

木香

一錢

人參

七錢

甘草

各三錢

右末姜汁浸蒸餅糊為丸梧子大每服五十

丸白湯送下

吳梅坡冲和健脾丸 益心開胃健脾寬胸順氣  
進食和中資扶三焦培植五內凡躉欠強盛者  
多服大有益也慎勿以人參見疑膈氣膈食翻  
胃噎食中滿者亦効

白术炒四兩 同参饭二蒸 白茯苓二兩 白豆蔻一兩 山楂肉二兩 陈皮三兩  
白术末 白豆蔻末 同参饭上蒸 白茯苓末 山楂肉二兩 陈皮三兩  
甘草綿紙上炒七錢熟 石斛鹽水洗同蒸 甘草色七錢熟 石斛卷山楂飯上 陈皮兩  
右各自為末麦芽粉打糊為丸每服五十丸白湯下

家傳三因冲和丸 養心扶脾陳肝開胃暢達三  
焦通貫五臟贊坎離有升降之能和表裏無壅  
塞之患利用一元斡旋五內家傳四世之秘也  
歌曰 醫家綱領在三因 多少鑽研那得真  
發出肺肝玄妙處 信乎一決勝千金 人參  
石斛 白荳仁 廣陳皮各為末各一兩 山楂肉末二兩  
已上五味合研勻碗盛碟蓋飯上蒸熟取起待  
冷方開此乃調胃補心接丹田之氣也

遠志甘草湯泡去心取末 一兩 山梔炒焦色取香附童便浸末二兩 香附童便浸半日洗

淨醋炒 三味共研勻如上法蒸熟勿令洩氣乃透暢心胞達膈間之滯氣也

海石

末二兩

蒼朮

末一兩

湘浸洗去浮皮

取末二兩

吳二味如上

法同蒸乃消痰飲而通内外之用也

川芎

末二兩

北柴胡

末一兩

青代

一兩

吳三味和勻

蒸如上法乃疎肝鬱調達者也

夫心為脾母補心則土有力肝為脾賊平賊則土乃和故曰安穀則昌用穀孽取粉打糊為丸梧子大晒乾用益元散五錢水飛過神砂五錢

為衣食後少頃白湯下量人大小輕重丸數服之常用五十丸胃開氣順少覺舒泰則減數服之可與補中益氣湯六君子湯相兼服吳丸不犯炎涼久服無妨平康為度不拘內外諸病服其該科之藥而兼吳丸每日一服則胃和脾壯行諸藥以健成功妙之囑慎毋忽焉

參苓造化糕

人參

二兩虛者

參用

四兩

白茯苓

四兩

乾山藥

芡實

蓮肉

去皮

心炒

苡仁

炒白扁豆

炒各半斤

稭米

打白炒

白糖霜

二升半

右為末磁瓶收貯每用四

五錢白湯隨加白糖霜調服一日三四次以平  
調脾胃又服精神倍加

吐法

瓜蒂散 上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死  
瓜蒂 赤小豆 為末每服一錢七溫漿水調下取吐為度設兩手脉不絕無者不可  
便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞不通以指探去之如不得吐者以物探吐之得吐則已如是食不得去者方用此

藥吐之

攻下之劑

備急丸 療心腹諸疾卒百病 大黃 乾姜

巴豆

去皮各一兩

右擇精品者為末蜜和搗千杵

丸如小豆大每服三丸大小量之若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤厥卒死者以酒或湯服之口噤以物攬開灌之藥一下咽湏更差如未差更與三丸以腹中鳴轉即吐下便愈若口噤湏折齒灌之忌

蘆筍猪肉冷水肥膩之物易水張先生又名  
獨行丸乃急劑也

神妙列仙散 飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強  
跛手足頑麻胃脘疼痛胸膈滿悶肚腹膨脹嘔  
吐瀉痢及酒食停久或一切積聚黃疸熟皰並  
皆治之 沉香 木香 茴香 炒 檳榔 各一  
扁蓄 三錢 大黃 微炒 一兩 麦芽 一兩 瞿麥 五錢

右末每服三五錢五更熱酒調下能飲者多  
飲二三杯不妨仰面卧手入胸前至天明取

下大便如魚腦小便如血効忌生冷硬物葷腥  
惟啖米粥

木香和中丸 和脾胃消宿食利胸膈化痰涎除  
膈熱進飲食 木香 黃芩 青蒙石 枳殼  
檳榔 青皮 橘紅各五錢 白滑石二兩 沉香二  
大黃 一兩 黑牽牛 取頭末二兩 三錢 右末水丸梧子大  
每服五十丸姜湯或茶清下

木香檳榔丸 一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大  
小便結澀不利者 木香 檳榔 青皮 去白

陳皮去白

枳殼

莪术

煨

黃連

黃柏

各一兩

香附

大黃

炒

黑丑

取頭末各三兩

右末水丸

梧子

太每服

六十丸生姜湯下以利為度

枳實導滯丸

傷濕熱之物不得施化痞悶不安

枳苓

黃芩

白朮

黃連

各三錢

澤瀉

二錢

大黃

一兩

枳實

炒

神曲

各五錢

右蒸餅糊丸

菉豆

大每服七十丸

三黃枳术丸

傷食肉溫麵辛辣厚味之物填塞

悶亂

黃芩

二兩

黃連

大黃

煨

神曲

炒

白朮

陳皮

各二兩

枳實

炒五錢

餌餅為丸服如上

海藏神應丸

一切冷物冷水及潼乳酪小腹痛

腸鳴

穀不化

巴豆

杏仁

乾姜

百草霜

各五錢

木香

丁香

各二錢

黃蠟

一兩

先將黃蠟用

醋煮去渣將巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥將蠟再上火入少油溶化入在杏仁等藥內攪勻旋下丁香等藥研勻搓作挺子油紙裹了旋丸每用三五丸食前米飲下

秘方化滯丸 理一切氣化 一切積奪造化有通

塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痼磨之自

消暴積乍留導之立去 丁香去苞

白橘紅 黃連各二錢半 京三稜煨 義术煨各五錢

半夏麵

二錢五分

俱為末

巴豆

去壳滾湯泡過再研開去心膜以瓦器用

好酒煮乾用六錢研細

和前藥末再研入後藥

烏梅肉厚者去核焙乾

醋調畧清慢火熬成膏入前藥

右共和勻以麵糊為丸粟米大

每服五七丸人盛者十九五更陳皮湯下常

服磨積不欲瀉者津液嚥下

停食飽悶枳殼湯下 但有所積物取本物

煎湯冷下 因食吐不止津液嚥下即止

食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下

赤痢甘草湯冷下 白痢乾姜湯冷下

心痛石菖蒲湯下 小腸氣痛茴香酒下

婦人血氣當帰湯下 若欲攻積熟姜湯下

仍加丸數未利再服瀉不止飲冷水一口立

止 小兒量歲數加減服 痘積米飲下

孕婦勿服此藥得熱則行冷則止

丹溪小胃丹

芫化

好醋拌勻過一宿於瓦器上不住手炒至黑色勿令焦

甘遂

濕麵包水浸半日洗晒乾一云水浸冬七

日春秋五日或用

水煮亦可

大戟

水煮一時洗乾各半兩

大黃

濕紙裹煨勿焦焙乾一兩

半黃柏

炒三兩

右末以白朮膏丸蘿蔔子大臨

臥津液吞下或白湯送下取其膈上湿痰熱積以意消息之散利空心服一方加木香

枳榔各五錢餅糊為丸每服七八十九丸

東垣觸飲枳實丸

逐飲消痰導氣清膈

枳實

炒半夏製橘紅各二兩

黑丑

取頭末三兩

右末麵糊為丸每五十丸食後姜湯下如所

食在膈間兀兀欲吐及鬱悶亂以物探吐甚者用瓜蒂散

海藏金露丸

肉傷心痞氣不升降水穀不消

大黃

一兩枳實炒五錢

桔梗

二兩

黑丑

半錢

右末荷葉燒飯丸

每服白湯下三五十丸常

服減半一方姜糊丸

傷狗肉不消心下堅硬或腹脹口乾發熱妄語水

煮蘆根汁飲之

傷魚鱠及生鮓停在胸膈不化必成癰瘕

馬鞭草搗汁飲之 飲生姜汁亦消

橄欖煎湯飲之亦佳

傷豆腐以蘿蔔煮食或用蘿蔔子煎湯飲之消

傷蟹用紫蘇生姜煎湯飲

傷瓜菓以健脾消食之劑內加射香服之立消  
不能食

生生子曰不能食者由脾胃餒弱或病後而脾胃  
之氣未復或痰客中焦以故不思食非心下痞  
滿而惡食也治當補益以開豁之丹溪導痰運

脾之法皆是也下元虛亦令人不思食宋黃山  
谷刀筆手柬載云有將兔絲子淘淨炒乾日服  
數匙酒下服之十日飲食如湯沃雪又有服補  
脾藥不効用二神丸治之愈

羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用尅  
伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食或嗜食  
太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳术丸一服慎勿  
多服昔人有治久瘧後食少汙多先用補劑加  
黃連枳實月餘食反不進汙亦不止因悟謙甫

之言純用補劑又令粥多于藥氣虛甚者加附子一二分佐之

錢氏異功散 治脾胃虛弱難任飲食

人參 白朮 茯苓 粉草 橘紅 木香各等分 加姜枣煎服

二神丸 脾胃虛弱全不思食服補脾藥不効者  
破故帛兩炒四 肉果生兩 右末肥枣四十九枚生  
姜四兩切片煮爛去姜剥去枣核研膏入藥  
末和丸桐子大每三四十丸鹽湯下

### 積聚門

黃帝針經百病始生得三云積者蓋厥氣生足悅  
悅生脅寒脅寒則血脉凝滯凝滯則寒氣上入  
腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚不得散  
日以成積卒然多飲食則腸滿起居不節用力  
過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄  
血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡  
傷則血溢于腸外有寒汁沫與血相搏則并合  
凝聚不得散而成積矣或外傷于寒內傷于憂

怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝  
血蘊聚不散津液凝滯滲著而不去而成積矣  
難經云肝之積名曰肥氣肥氣以季夏戊己日  
得之何以言之肺病傳于肝肝當傳脾脾季夏  
適王者不受邪肝復歟還肺肺不肯受故留  
結為積故知肥氣以季夏戊己日得之心之積  
名曰伏梁云脾之積名曰痞氣云肺之積  
名曰息竇云腎之積名曰奔豚云並見本  
方

滑伯仁曰越人之意蓋以五行之道推其理勢之  
所有者演而成文爾初不必論其感亦不必論  
其還不還與其必然否也請以所勝傳不勝及  
王者不受邪遂晉結為積觀之則不以詞害意  
而思過半矣

論婦人腸覃石瘕

水脹篇云石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣  
客于子門子門閉塞氣不通惡血當瀉不瀉血  
以畱止日以益大狀如懷子月事不以時下皆

生于女子可導而下

寶鑑曰夫膀胱為津液之府氣化則出矣今寒客于子門氣塞不通血壅不流而亟以止之結硬如石是名石瘕也此氣先病而血後病故月事不來則可宣導而下出者也故難經云任之為病其內告結男子為七疝女子為瘕聚此之謂也非大辛之藥不能已可服見覲丹

腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛相搏氣不得營因有所繫痞而內著惡氣乃起瘻肉乃生

其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也

夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳道為事乃肺之府府主衛衛為氣氣得熱則泄寒則凝今寒客於大腸故衛氣不營有所繫止而結瘕在內貼著其延久不已是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣發起瘻肉乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子狀也此氣病而

血未病故月不斷以時下本非妊娠可以共為  
辨矣

劉宗厚曰按此謂石瘕為血壅不流故月事不来  
腸覃為氣聚而濁結成瘕故血未病月水不斷  
而知此二積之異然亦有諸積所致或有病癰  
膿而似此二證者不可不察也

丹溪曰痞塊在中為痰飲在右為食積一云  
痰積在左  
為血塊氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與  
食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬木

桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石醺白朮湯  
吞下 瓦壘子能消血塊次消痰石醺一物有  
痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積 治塊  
當降火消食積食積即痰也 行死血塊塊去  
須大補 凡積病不可用下藥徒損真氣病亦  
不去當用消積藥使之融化則根除矣 凡婦  
人有塊多是血

生生子曰積聚一證難經以其日得積及不受欲  
還之說後人皆難尊信以下諸書雖亦各有發

明終未有能擴其蘊而可為萬世法者近汪子良特揭而辨之乃分表裏邪正臟腑內外曰積曰聚及著治驗數條多有啟悟與丹溪治案可相表裏深有功於難經者而後人得以此取則焉幸亦大矣謹述於左

汪子良曰嘗讀難經積聚之說而疑之雖有及於病情而其說自相矛盾有膠固而難通予慮後學之悞于承用也為之辨論附以積聚常變之法亦有自效於匡救之忠已乎

五十五難曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成積者陰氣也其始發有常處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處又五十六難曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬連年不已以季夏戊己日得之何以言之肺病傳脾脾季夏適旺者不受邪肝復欬還肺肺不肯受故留結為積故知肥氣以季夏成己日得之心之積名曰伏梁起脰上大如臂

上至心下久不愈令人煩心以秋庚辛日得之

何以言之腎病傳心；當傳肺；秋適旺；者不受邪心復欬還腎；不肯受故留結為積故

知伏梁以庚脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如辛日得之

膚以冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾；當受邪脾復欬還肝；不肯受故留結為積故

為積故知痞氣以冬壬癸日得之

肺之積名

曰息竇在右脇下覆大如杯久不已令人酒洒

寒熱喘嗽發肺瘡以春甲乙日得之

何以言之肺當傳肝；以春適旺；者不受邪肺復欬還

心不肯受故留結為積故知息竇以春甲乙

之得腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下或

上或下無時久不已令人喘逆骨痠少氣以夏

丙丁日得之何以言之脾病傳腎；當傳心

肝；不肯受故留結為積故知奔豚以夏丙丁日得之

夫謂積者陰氣也

聚者陽氣也是以血氣分陰陽也殊不知陰血

陽氣也皆能成積但臟腑所主之不同耳心肝

多主于血丹溪所謂在左屬血是也脾肺多主

於氣本文所謂肺積息竇者是也息者氣之息

也是陽氣亦能成積況又曰氣之所積名曰積

與其積陰之說不相合矣又謂積者五臟之所生也聚者六腑之所成也殊不知有形質之物積滯不行則為之積五臟六腑俱有之如仲景所謂熱結膀胱搏血畜積下焦其人如狂小腹滿硬而小便自利抵當湯主之又東垣所謂食積腸胃腹滿卒痛者傭急丸下之是六腑之位亦有其積豈謂積于臟乎至論肝積肥氣夫肥氣者言其皮裏膜外有塊以致皮膚有肥滿之狀所謂癰母是也此肝之外積非肝之內積也

又謂脾積痞氣夫脾居於右脇今積在於心膈之位乃與本文積在本位之說不相合矣又謂腎積貫豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時乃與聚証走動相類與本文積屬陰沉伏之比不相合矣且五臟之積未言所因治何所據又謂肝積於季夏戊己日得之之類其說之失明者自當知之愚謂積伏而有常處其症靜也因於血氣痰食水火之所成聚者對散而言散而無形或集為有象其症動也因於氣虛

不能運行之所致作於腹中者屬內作於皮膚四肢者屬外如血積左脇作痛日輕夜甚其脉沉滯者所謂在左屬血治用芎歸紅花蘇木射香肉桂莪朮之類又有火鬱左脇而痛甚者治用當歸龍會丸之類又有裏熱畜水在於左脇而作痛者如仲景所謂心下痞硬痛引脇下乾嘔短氣汗出不惡寒者十枣湯主之又有食積右脇而作痛者所謂在右屬食丹溪云右脇一條隣起作痛色不紅者此食積也予嘗用補中

益氣湯去陳皮加青皮草果木香之類又有食塊積於右脇而不痛者宜治消導為主如白朮枳實三稜莪朮砂仁吳茱萸之類又有痰飲積於心膻作痛緣食熱辣湯則暫止而脉沉滑治用白螺丸之類又有氣積胸中而為脹痛喘急脉沉者治用紫蘇杏仁之類又有水積胸膈作痛手不可近身涼脉沉緊者治用陷胸湯之類又有濕鬱心膈而為痞滿者治用大消痞丸之類所謂五臟之積者如此又有積于六府之位

者余嘗治一人膈下大痛有塊不移嘔吐不食  
吐兼腹痛此中焦吐也從於積用紫沉丸下之  
而愈又嘗治一人腹中大痛不移緣得大便其  
痛稍減兩尺脉沉弦而濇他醫作房後陰症治  
之弗應余曰據其尺脉陰沉當作陰症治之據  
其大便去後而痛減者此食積也用備急丸下  
之而已又嘗治一婦產後將及一月小腹之傍  
有塊如雞卵作痛日輕夜重嘔吐寒熱此血積  
也治用芎歸肉桂莪朮乳沒琥珀射香之類一

服而塊消諸症悉退又寶鑑云寒氣客於子門  
則氣塞不通血壅不流而疝以止之結硬如石  
是名石瘕見曉丸主之又云清濁之氣結聚腸  
外成如懷妊按之則堅推之則移月事以時下  
名曰腸覃睇露丸又嘗治一婦人經閉三月脅  
下脹痛不移他醫作血積治弗効予曰此氣虛  
不能上升而陷於下也丹溪所謂陽病極於下  
者此也治用人參陳皮而安又嘗治一人臍左  
有塊不痛或時隣起此亦食積也治用白朮三

稜義木砂仁吳茱萸木香神曲糊丸服之外於塊上灸之而消又嘗治一人小腹左邊有塊堅痛不移大便燥結或因惱怒辛勞即作膈痛嘔吐不食諸醫罔効已一年餘余作瘀火治用順氣消痞丸遠志酒炒黃連姜製厚朴各二兩海藻昆布青皮山楂肉神曲蒼朮川芎各一兩玄明粉六兩同牛肉一斤切碎煮熟焙乾同前諸藥為末醋煮蒸餅糊為丸每服二錢空心湯下未及一月而塊消痛止又治一人右脇塊痛用三補丸加梔子蒼朮服至半月而愈所謂六府之積者如此其餘菜菔酒肉寒冷等積可類推焉

腑之積甚者倒倉法治之此皆內積之症治者也又有外積者作于皮膚四肢之位也如瘡疽瘰癧瘻母之類治各從其所宜夫瘡疽屬陽者仙方活命飲之類屬陰者內托復煎湯之類瘰癧未消者破結散之類已破者如神散之類瘻母又名肥氣宜降痰火之劑余嘗治一人瘻後左脇之下皮裏膜外有塊大如掌許用七胰散治之瓦龍子蝦天蓼花子各二兩為末豬胰七箇針孔刺孔同玄明粉四兩煮熟入前二末揭爛焙乾為末每服二錢酒下為丸服亦可服之而効此皆外積之

症治者也且以聚病言之夫內聚者腹中走痛也由於氣虛不能運行故耳余嘗治一人腹中有塊作痛或上或下或有或無此聚也治用人參黃芪白朮當歸枳殼木香之類而止此內聚之症治者也又有外聚者亦由氣衰滯於四肢百節作痛痛作隨腫痛退腫消經曰先痛而後腫者氣傷形也此也治用補氣散邪之劑如人參黃芪白朮為君佐以羌活五加皮薏苡仁之類此外聚之症治者也由是觀之積者由于氣

血痰食水火之所成而有臟腑外內之分也聚者由于氣虛不運之所以致而表裏邪正之別也則常變虛實之治得矣難經之說云乎哉

湯氏三稜散 治積氣肚痛 砂仁 甘草 炒

益智仁

炒去壳

三稜

莪朶

青皮

去穰炒

各等分

右末白湯點下

散聚湯 爾氣積聚狀如癥瘕隨氣上下心腹絞痛攻刺腰脇小腹填脹大小便不利

半夏

檳榔

當歸

各三分

陳皮

杏仁

去皮失炒

桂各二兩 茯苓 甘草 炙附子 炮川芎 枳殼

厚朴 吳茱萸湯洗各一兩 大黃看勢輕重用

每服四錢水煎 大便利者去大黃

大七氣湯 治同上 京三稜 蓬术 陳皮

益志 香附各二兩半 肉桂 霽香 甘草

青皮 桔梗各二兩半 每服五錢水煎

玄胡丸 內消癥瘕氣結虫煩心腹脹痛

玄胡索 川歸 青皮 木香 雄黃飛另研

檳榔 廣木炮各四兩 京三稜炮六兩 右末入雄黃

拌勻糊丸梧子大每服三十丸姜湯下不拘時

木香三稜散

和胃進食消化生冷物心腹刺痛

木香

神麵

炒各一兩

京三稜

炮各二兩

甘草

炙各二兩

廣茂

益志

橘紅

各四兩

右末每二錢入鹽沸湯點服

五食丸

虛實積氣蠱脹積塊水氣年深癥瘕

大戟

去皮

甘遂

生各半兩

牙皂

去皮生各半兩

芫花

醋浸一宿炒黃

胡椒

各二兩

巴豆

去心十箇研半兩

右末入巴豆和

勺糊丸菉豆大每服五七丸氣實者十丸夜卧水一鍾用白米白麵黑豆生菜豬肉各少許煎

至半鍾去渣用湯下藥忌油膩粘滑物

聖散子 遠年積塊及婦人乾血氣

礞砂

麥蘖各六兩

大黃八兩

乾漆過燒

扁蓄

茴香

炒檳榔

各一兩

如婦人乾血氣加川山甲

二兩炮

右細末每三錢溫酒調下仰卧此藥只在心頭至天明大便如魚腸小便赤為驗並無毒

神効小兒用一錢十五以上二錢空心服之更効

荆蓬煎丸

破癰癧消癰塊及冷熱積聚順氣消

食

木香

檳榔

枳殼

青皮

茴香

三稜

各二兩酒浸冬三日夏一日

廣茂

二兩醋浸冬三日夏一日

以去皮

巴豆二十箇同炒

黃色去巴豆不用

右末糊丸如菉豆大

每服三十丸姜湯下

三稜丸 治五穀等積食

陳倉米

一兩巴豆五枚炒焦色去巴豆不用

去殼同陳皮

三稜各

兩砂仁

各二錢

麥芽

木香一錢

右末醋糊丸

菉豆大

每十五丸至二十丸姜湯食遠服

麴孽丸 治熟酒積噫酸脹痛

神麴

麥芽

各二兩

黃連

五錢

同巴豆五粒炒黃色同用

右末沸湯和丸桐子大每五十丸食遠姜湯

送下

一方 治冷酒積 平胃散加丁香砂仁麥芽神  
 麵姜棗、鹽煎服

水積丸

甘遂

一錢為末

以豬槽頭肉一兩細切搗

爛和末作一丸紙裹火煨令香熟取出臨卧嚼  
 細酒嚥下取下病根 若治酒積用棗湯吞下

涎積炒粉丸

積聚涎塊結於心腹乾嘔刺痛

蚌粉

一兩

巴豆

七枚去壳及膜

右二味同炒赤色去巴豆

以醋丸桐子大丸夫臍腹痛炒茴香酒下二十丸婦人血氣姜酒下敗血冲心童便和當

歸酒服常服姜湯下

茶積丸

治茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米

半升同炒

赤色去巴豆

去壳

青皮

陳皮

各二兩

右末醋丸如菉豆大每二十丸食後淡姜湯

下

又方

花椒為末麵糊丸桐子大每二十丸茶湯

任下

茶癥散 治茶積 黃芩 石膏 升麻 等分

為末每三錢砂糖湯調下

鱗甲桃仁煎丸 治諸積

桃仁 泡去皮尖五兩水研漿汁三升

三稜

煨

木香

檳榔

青皮

各一

鱗甲

三

兩

黃

右末將桃仁汁慢火熬二升再加醋一升再熬如糊和藥丸桐子大每服七十丸淡醋湯

下空心食前日二服

晞露丸

感寒氣凝結腸外久為癥瘕疼痛名腸

覃

廣木

三稜

各一

兩

酒

浸用

巴豆

三十

粒

不

乾

漆

炒

川烏

炮

各

五

錢

茴香

炒

青皮

雄黃

各三

川山甲

炮

二

碉砂

研

四

錢

輕粉

一

射香

五

右姜汁糊丸桐子大

每服二三十丸

空心姜

湯下

阿魏丸

諸積聚癰瘍痞塊

山楂

南星

皂角

半夏

同上

麥芽

神麆

黃連

姜炒

各

一

兩

連翹

炒

阿魏

浸醋

瓜萎

貝母

各

五

錢

石礫

風化硝

蘿蔔子

胡黃連

各

二

錢

半

右末姜汁浸餅糊

為丸桐子大每服五十丸姜湯下

見睺丸 婦人石瘕狀如懷子者 大附子

炮

鬼箭羽

紫石英

各三錢

肉桂

玄胡索

澤瀉

木香

各二錢

血竭

水蛭

一錢

炒

檳榔

二錢

桃仁

三十枚炒三稜

五錢

大黃

酒浸一宿

右末酒糊丸桐

子大每三十丸食前

鹽湯或酒下

脾積膏

治諸積神効

雞子

五枚

阿魏

五分

黃蠟

一兩

鍋內一處煎分作十服溫湯空心服諸物不忌設腹痛是積化動十日後當有血大便中

出是其効也

剪紅丸

專治久積有虫者

雷丸

檳榔

三稜

莪术

各一錢

醋

木香

蕪荑

黑丑

狗脊

大黃

史君子

鶴虱

牙皂

錫灰

茵陳

黃丹各等分

為末以茵陳煎湯為丸梧子

大外以黃丹為衣大人每服三錢小兒每用一

錢空心以酒下

福建者以冷茶吞

奇驗方

黑羊肝一副入左顧牡蠣三錢黃蠟一

兩水煮肝爛食肝并湯空心食肝盡即効但不

厭其苦須多服効

敷方 蒜麥麵水調圍硬處內用皮硝葱重重鋪三層以火熨之日三次 外服橘半枳朮丸加莪术

又方 以紅麴為糟將生威靈仙同搗極爛敷之外覺痞塊消即拭去遲恐壞肌膚

熨痞方 吳茱萸三升研碎酒煮熟以布裹熨癥上冷更炒更番熨之癥逐移走熨之消乃止

三仙膏 貼痞氣及積塊

明礬 雄黃 為末先將二兩水糊和成膏貼

患處俟大便如膿下即愈未愈再以二兩和膏貼之即効

七膿散

汪子良論中七  
膿散有毛楞子

只用皮硝七錢每一

錢擦一膿醃七日鐵器上焙乾燥為末又水

紅花子只用七錢無毛楞子

羅太無乾柿丸

取虛實積下膈甚妙

硃砂

飛衣

沒藥

牙皂

去皮子

乾姜

炮

乾漆

炒

三稜

炮

輕粉

青礞石

煅各一錢

巴豆

三十粒去皮

膜醋煮

十水銀一錢鉛一錢

右末和勻飯丸菉豆大

煎柿蒂湯冷下三丸或五丸

有孕婦人勿服

神功助化散 男婦腹中痞塊不拘氣血食積所

成扁蓄 麥芽各五錢

瞿麥穗甘草各五分

木香半錢沉香

神曲各二錢半

大黃兩

右末和勻男以淡竹葉甘草等煎湯及無灰

酒同調服

婦以紅花

燈心當歸等煎湯及

無灰酒同調服

俱酒多於忌油膩動氣之物

及房事一月其藥夜服大小便見惡物為度

此方神妙不可盡述

紅丸子 大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃腹脹氣急不嗜飲食漸成脾虛並宜服之方見傷食

二賢散 進食消積塊 橘紅一斤

甘草

淨一斤

甘草四兩

鹽半兩 用水三四碗從早煮至夜以爛為度水

乾則添日乾為末淡姜湯調下 有塊者加

姜黃半兩 氣滯者加香附二兩俱同前藥  
煮 氣虛者加沉香半兩 噎口痢加蓮肉  
二兩去心俱另入

小三稜煎 食癓酒癖血癥氣塊時發刺痛全不  
思飲食積不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫酢吞酸  
京三稜 蓬术各四兩 芫花一兩去梗葉

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器以炭  
火煨令乾取出稜木將芫花以餘醋炒令微  
焦焙乾為末醋糊丸菉豆大每十五丸姜湯下

猪腰子方 治腹中有塊

猪腰子一雙切薄片木鱉子肉一兩與猪腰片  
相間縛定外用溫紙包火煨熟去紙擂盆肉  
搗如泥入黃連末和丸每二十丸烏梅甘草  
湯下第二服二十五丸三服三十丸漸加至  
以痛為度大便利其塊自消神妙

元戎溫白丸 治心腹積聚久壅痞塊大如杯碗  
黃疸嘔吐滿悶上氣腹脹心下堅結上捨心傍  
及脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆噎膈五種

淋疾九種心疼積食不消成瘡連年不瘥及一切風身躰頑痺不知痛痒或半身不遂眉髮墮落七十二種風三十六種遁尸疰失心憂愁思慮人諸疾斷續不生下淋瀝五邪失心憂愁思慮不樂飲食無味月水不調及一切病有似懷孕羸瘦困弊或歌如鬼所使等症

川烏去皮臍炮  
二兩半 紫菀 菖蒲 柴胡 厚朴製  
吳茱萸 桔梗 鬼筭去弦子炒 茶荳 乾姜炮  
人參 黃連 巴豆去油研炒 桂 蜀椒去目炒各五錢

右末入巴豆令勻蜜丸桐子大每三丸姜湯下食後臨卧服加至五六丸止

肝之積肥氣溫白丸加柴胡川芎治之心之積伏梁溫白丸加菖蒲桃仁黃連治之脾之積痞氣溫白丸加乾姜吳茱萸治之肺之積息貴溫白丸加人參紫菀治之腎之積奔豚溫白丸加丁香茯苓遠志治之

肥氣丸 肝之積在左脇下如覆杯脉弦而細青皮 當歸 蒼朮各一兩半 蛇含石煅醋淬七次

蓬木

三稜

鐵孕粉

各二兩與三稜達木同入醋煮一伏時

右末醋煮米糊丸菉豆大每四十丸當歸酒

送下

伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心溫酒調下桃奴樹上乾桃子是也

正月採經冬不落者

肺喘久不愈為息竇五靈丸

五靈脂

半两

木香

半两

馬兜苓

炒一两

葶藶

右末東、肉丸桐子大每二十丸姜湯下日三本事云肺之積曰息竇在右脇下大如杯令人酒

酒寒熱喘嗽發肺瘡東膏丸

葶藶子

陳皮

桔梗

各等分

右下二味末入葶藶研勻煮肥東、肉和丸桐子大每五七丸米飲下予嘗患停飲久漬肺

經食已必嚏喘覺肺系大急服此良驗

當歸丸 治婦人月經不調血積

當歸

赤芍

川芎

熟地

京三稜

廣茂

各五分

神麌

百草霜

各二錢

半右末酒糊丸桐子大

溫水下

尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五六  
年形已骨立衆皆曰不可為柰其未死何家甚  
貧而大小懸之一日召杜至告杜曰但以濟物  
帛贈杜杜不受曰但服其藥必獲安無以是為  
疑遂示方用沒藥牛膝乾漆當歸各半兩碉砂  
木香水蛭炒紅娘子炒紅花牡丹皮硃砂各一  
分海馬一箇班貓去翹足炒十四箇為末酒醋  
各半升熬為膏每日天明用一皂子大酒醋化

下二月病退六十日漸安果如其言

黑神丸

神曲

茴香

各四

木香

川椒

炒香

丁香

各半

檳榔

四

乾漆

六

兩半生

半熟

用

姜湯

煮半

日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用前  
生熟漆和丸彈子大又用茴香收器中至乾去茴香  
地蔭乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香  
用治腎氣膀胱痃癖及疝墜五膈血崩產後  
諸血漏下赤白並一丸分四服死胎一丸皆  
綿灰酒下若難產炒葵子四十粒杵碎酒煎

下 諸疾不過三服。痃氣十服。膈氣癥癖五服。血瘕三丸。一婦有塊如杯。每發痛不可忍。諸藥莫愈。投此丸三服。一杯塊盡消。終身不復作矣。

沒藥散 治一切血氣躄腹作痛。產後惡露。兒枕痛 血竭 没藥並研細 桂心 當歸 蒲黃 紅花 木香 玄胡索 乾漆炒赤芍各分 右細末。每服二錢。熱酒調下。食前。血塊冲心痛甚者。以大順散三錢。酒調服立止。

牡丹散 婦人久虛羸瘦。血塊走注。心腹疼痛。牡丹皮 玄胡索 桂心 當歸各一兩 牛膝 赤芍藥 莪朢各三 京三稜 半兩

每服三錢。水酒各半盞。煎服。

芍藥湯 治產後諸積。不可攻。宜養。去熱。

芍藥一斤 黃芩 茯苓各六兩

右每服半兩。水煎。日三服。

帝曰：病脇下滿氣逆，二三載不已，是為何病？岐伯曰：病名曰息積。此不妨於食，不可刺灸，祇為導。

引服藥藥不能獨治也

奇病論○王註云氣  
逆息難故名息積也

用息貴法  
治之亦可

磨積丸

胡椒一百粒

木香半錢

全蝎十枚

右末粟米糊丸菉豆大每十五丸陳皮湯下

化氣湯

治息積

木香

砂仁

桂心各二

錢半

甘草炙茴香炒

丁香皮

青皮

陳皮各一

錢半

乾姜

蓬朮各半兩

沉香

胡椒各一

右末每服二錢姜蘇鹽湯調

下婦人醋湯服

肝之積肥氣丸 治積在左脇下如覆杯有頭足  
久不愈令人欬逆瘡瘍連年不已

厚朴半兩

黃連七錢

兩

柴胡二

錢

巴椒四錢

巴霜五分

川烏炮

去皮子一錢

皮膚一錢三分

乾姜五分

皂角

去皮一錢

煨一錢

白茯苓半錢

廣茂炮昆布

人參各二錢

半

甘草三錢

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研巴  
霜旋入和勻煉蜜丸桐子大約服二丸一日  
加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從  
兩丸加服周而復始積減大半勿服 右後

積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃連一錢半若治風癟於一料中加人參茯苓菖蒲各三錢黃連只依春用七錢雖秋冬不減淡醋湯空心服下

加減肥氣丸 治同前仲夏合此

柴胡 厚朴各半 黃連一兩 川椒 甘草各五  
肉桂 川烏各二錢 巴霜六錢 乾姜 人參各半兩  
右細末旋入巴霜研勻煉蜜丸桐子大約服

二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微瀉再從二丸加服空心淡醋湯下大便利秋冬去乾姜半錢加厚朴一倍減黃連一半心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不愈令人心煩 黃連一兩半 人參 厚朴製各半錢 去皮姜  
菖蒲 乾姜 巴霜 川烏炮去皮臍各五分  
右末研已霜旋入和勻煉蜜丸桐子大約服二丸日加一丸漸加至大便溏從二丸加服

食遠淡黃連湯下周而復始即減半勿服秋

冬加厚朴半兩減黃連半兩黃芩不用

鱉甲湯 治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便

不利

鱉甲去裙  
炙黃色三錢

大腹皮

芍藥

當歸

紫胡

生地

各一  
兩

官桂

生姜

切片  
乾各三  
焙

分 每服三錢水一大盞入生姜木香半錢同煎

至八分空心溫服

脾之積痞氣丸在胃脘腹大如盤久不愈令人四

肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴

製半生半炒

黃連

錢

吳茱萸

錢

黃芩

白术

各

錢

白茯苓

另為末

澤瀉

各一錢

巴豆霜

四分

乾姜

炮

縮砂

茵陳

各一錢半

川烏

炮去皮

巴戟川椒

各五分

桂

四

人參

一錢

右末旋入巴霜茯苓和勻煉蜜丸桐

子大初服二丸日加一丸漸加至大便微溏再  
從二丸加服食遠淡甘草湯下周而復始積減

大半勿服

加減痞氣丸 孟秋合此

黃芩

酒炒

益智

吳茱萸

歸尾

橘紅

附子各三 厚朴一錢 黃連酒炒 半夏半錢 紅花各五分

青皮各二錢 廣茂一錢 神麴炒 茯苓半夏 紅花各五分

人參灸 甘草葛根各二錢 巴霜澤鴻

右末蒸餅糊丸桐子大約服二丸日加一丸  
加至大便微溏再從二丸加服淡甘草湯不

宣明白丸治息積脇下氣逆妨悶喘息不便

呼吸引痛不已不可針灸宜導引服藥爾

白朮

枳實

官桂

人參各二兩半

桔梗

陳皮

醋炒

甘草各一錢

為末煉蜜丸桐子大每服二十丸

溫酒下日三服

加減息竇丸

仲夏合此其積為病寒熱喘欬氣

上奔脉瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒

熱相參氣分寒血分熱治宜益元氣洩陰火破

氣消其堅也

川烏

乾姜

桔梗

白豆蔻

各二錢

人參

桂枝各二錢

陳皮

八錢

黃連

三錢

紫苑

厚朴

茯苓

川椒炒去汗

京三稜

天門冬

心去

各一錢半

青皮

紅花少許

巴豆霜

四錢

右末餅糊

為丸桐子大約服二丸日加一丸加至大便

微塘從二丸加服食前姜湯下忌酒麵辛辣  
生冷物

腎之積奔豚丸 發於小腹上至心下若豚狀或  
上下無時久不已令人喘逆骨痠少氣及男子  
內結七疝女子瘕聚帶下 味棟酒者三錢黃連炒五錢  
分 錢白茯苓 澤瀉 菖蒲各二錢 川烏炮各一錢 丁香各五分  
玄胡索半錢 全蝎 附子 獨活各一錢 巴豆

霜

四分

厚朴

七錢

姜桂

三分

右來旋入巴豆霜

茯

苓和勻密丸桐子大服法如前食遠淡鹽湯

下秋冬加厚朴半兩 如積熟堅大先服前  
藥不減於一料中加牡蠣三錢疝帶勿加  
如大積大聚消其大半乃止藥過劑則死  
如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先  
服本臟積藥諸疾自愈是其本也餘積皆然  
如服藥人覺熱加黃連 如服藥人氣短加  
厚朴 如服藥人悶亂減桂

治積要法 許學士云大抵治積或以所惡者攻  
之所喜者誘之則易愈如礪砂水銀治肉積神

麴麥孽治酒積水蛭蟲治血積木香枳榔治氣積甘遂牽牛治水積雄黃膩粉治痰積巴豆礞石治食積各從其類也若用群隊之藥分其勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨時通變也治積當察其所痛以知其病有餘不足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者熱之結者散之客者逐之畱者行之堅者削之強者奪之鹹以柔之苦以瀉之全真氣藥補之

隨其所病而行之卽飲食慎起居和其外可使必已不然適以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難復也可不慎歟

治魚蟹積 香蘇散多加生姜陳皮橄欖煎服  
菓菜積 平胃散加丁香射香為末鹽湯調服  
索粉積 紫蘇濃煎汁加杏仁泥服即消

麴積阿魏丸 滲煎羅葛子湯下

糍糕傷積 酒麴五錢木香一錢為末鹽湯調服

口有酒香是効

治婦人血塊有孕難服峻藥

香附子四兩  
醋煮 桃仁一兩  
皮尖去 海石二兩  
醋煮 白术一兩

神麴糊為丸

奇方 治一切癥瘕積聚

鱉甲一兩  
醋煮 三稜五錢  
炮

白术五錢  
醋煮 青皮

桃仁 紅花 昆布各二錢

右末糊丸梧子大每一錢煎白术湯下

橘紅四錢

治中脘有塊中常跳動

桃仁去皮尖  
二錢

木通一錢 白术八錢

水煎服

治中脘水飲積塊堅大如盤

白术二兩 枳實七枚

分三服水煎

治小兒疳積 大安丸加胡黃連末五錢神麴糊

九黍米大米飲下

丹溪治一人肚左邊帶脇下有塊先吃匾食牛乳者成氣痛又因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石五錢 白术四錢 陳皮

三稜各三錢 蘿蔔子

黃連一錢 連翹各一錢

乾葛二錢 桃仁二十枚 甘草炙半錢

黃芩一錢 分三帖水煎服

一婦脇下有塊大如掌脉濇時作熱此虛中有氣

積先與補虛次與磨積藥

白芍藥

當歸尾

各四錢

白朮

三錢

青皮

川芎

木通

各一錢

甘草

五分

水煎服

磨積藥

三稜

醋煮一錢

青皮

枳實

桃仁

大黃

桂枝

各五錢半

桂枝

一錢海藻

醋煮三錢

神麴糊

為丸梧子大每服五十丸

一人有塊在腸內有痰熱汗不得泄兩脉大而散

軟此挾虛症

三稜

黃連

白朮

連翹

木通

各三錢

人參

二錢

桂

川芎

各一錢

甘草

五分

水煎吞下保和丸

一婦瘧後左脇下有塊小便少

厚朴

紫胡

各二錢

三稜

青皮

木通

各五錢

白朮

六錢

甘草

五分

姜一片水煎服

一人因飽食牛膚豆腐患嘔吐又不節飲食右脇下生一塊漸長大如掌痛發則見痛止則伏脉弦數性急塊上不可按按之愈痛痛則必吐黃酸苦水此是太陰食積濕痰

荔枝核

三枚燒

山梔仁

五枚炒

枳實

十五枚

山查

一枚

九枚

吳茱萸

炒九粒

一方有人參急流水一盞煎沸入生姜汁服四帖止其痛却與消塊藥

消塊藥方

半夏末

六錢皂角六枚水煮取汁拌半夏末晒乾

黃連

炒五錢

石碱

二錢

右末以糖毬膏為丸胡椒大

驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬木各四錢每服五十丸加至七十丸

以利為度

妙應丸丹方見瘧門

酒積方累効

即烏梅丸方出傷飲門

愆義有人病心腹總煩二歲診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黃一劑少刻吐一碗如拇指無目燒之有髮氣乃愈此殺毒虫之驗也

丹溪治食積死血瘀積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩運身熱時作時止

黃連

一兩半吳茱萸益智仁同炒

山梔

炒半兩

川芎

神曲

桃仁

去皮尖

三稜

蓬木

並各半兩醋煮

香附

童便浸

山楂

各二兩

蘿卜子

炒一

白芥

半兩

一方有青皮

半兩

白芥

子炒一  
兩半右麵糊丸

治婦人血塊

牛膝根切焙乾酒煎溫服効

腸覃生於腸外月事時下石瘕生於胞中月事不以時下二病皆似鹽脹並見脹門

產後消血塊

滑石三錢浸藥二錢血竭一錢

右末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末

麵糊丸白湯下陳皮湯下妙

又方 消血塊

香附童便浸桃仁去皮為末醋糊丸

陳無擇云導引法隨意行之皆可愚謂或按摩滿處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以氣通為効

赤水玄珠第十四卷目錄

癲狂癇門

顫振

癆癓

瘡瘍門

不得卧 附多卧

煩躁

健忘