

儒門事親

六

中國醫學大成第五集

通治類

儒門事親

六

上海大東書局印行

曹炳章主編  
中國醫學大成  
親傳

全六冊 實價國幣壹元

中華民國二十五年十一月初版

撰者 金·張從正

校者 明·吳勉學

發行人 沈駿聲  
上海北福建路三三一號

印刷者 大東書局  
上海北福建路三三一號

總發行所 大東書局  
上海福州路三一〇號

分發所  
開封 安慶 常州 無錫 信陽  
南京 北平 天津 濟陽 西安  
長沙 濟南 漢口 梧州 廈門  
徐州 南昌 雲南 杭州 重慶  
汕頭 廣州 衡陽 哈爾濱  
大東書局

( 本 書 校 對 者 章 瑜 )

# 儒門事親

金 睢州 張子和著述  
明 新安 吳勉學校訂

鄞縣 曹章炳圈點

## 卷十五

### 瘡瘍癰腫第一

治螻蛄瘡

良 薑

白 芨

瀝 青

已上各等分

右爲細末。嚼。芝蔴水同熬爲膏。入冷水。共定用緋絹片。火熨斗作膏藥。貼瘡上。

又方 千年石灰。茜根。燒灰。

右爲細末。用水調。雞翎塗上。

水沉金絲膏 貼一切惡瘡。

瀝青

白膠

已上各一兩。

春秋宜用油。

夏宜油蠟二錢半。

冬宜用油蠟四錢。

右件鎔開。油蠟下瀝青白膠。用槐枝攪勻。綿子濾過。入冷水中。扯一千餘遍。如瘡透了。喫數丸作劑。於瘡口填者亦妙。攤紙上貼。勿令火炙。

乳香散 治下疳。

乳香

沒藥

輕粉

黃丹

龍骨

烏魚骨

黃連

黃芩

銅礫

已上各等分。

麝香少許

右為細末。先以溫漿水洗過。貼疔瘡上。

治蛇傷方

右用蒲公英科根。作堊。貼于傷處。用白麵膏藥貼之大效。

紫金丹 治疔瘡。

白礬四兩

黃丹二兩

右用銀石器內鎔礬。作汁下丹。使銀釵子攪之。令紫色成也。用文武火。無令太

過不及。如有瘡先以週圍挑破。上藥用唾津塗上數度。着無令瘡乾。其瘡潰動。取疔出也。兼瘡顏色紅赤為效。如藥末成就。再杵碎。炒令紫色。

治疔瘡

生蜜與隔年葱。一處研成膏。

右先將瘡週迴。用竹鍼刺破。然後用瘡藥於瘡上攤之。用緋絹蓋覆。如人行二十里覺疔出。然後以熱醋湯洗之。

千金托裏散 治一切發背疔瘡。

連翹二錢 黃耆半兩 厚朴二兩 川芎一兩

防風一兩 桔梗一兩 白芷一兩 芍藥一兩

官桂一兩 木香三錢 乳香半兩 當歸半兩

沒藥三錢 甘草一兩 人參半兩

右為細末。每服三錢。用酒一碗。盛煎三沸。和滓溫服。膏子貼之。

二聖散 治諸瘡腫。

黃丹二兩 白礬二兩

右為細末。每服乾摻瘡口上。後用保生錠子。捏作餅子貼之。

保生錠子

巴豆四十九個另研文武火燒熱

輕粉半匣 硃砂二錢

麝香二錢

金脚信二錢

雄黃三錢

右件為末。用黃蠟一兩半。化開藥將和成錠子。冷水浸少時。取出。旋捏作餅子。如錢眼大。將瘡頭撥破。每用貼一餅子。次用神聖膏藥封貼。然後服托裏散。若瘡氣透裏。危者服破棺散。用神聖膏貼之。

神聖膏藥 貼治一切惡瘡。

當歸半兩

沒藥三錢

白芨半錢

乳香三錢

藁本半兩

琥珀半錢

黃丹四兩

木鱉子五個去皮

膽礬一錢

粉霜一錢

黃蠟二兩

白膠三兩

巴豆二十個去皮

槐柳枝各長一把一百二十條

清油一斤

右件一處。先將槐柳枝下油內。煮焦取出。次後下其餘藥物。煮得極焦。亦撈出。却將油澄清。再熬成膏子。用緋絹上攤貼之。

破棺丹

大黃半兩

甘草二兩

荊三稜半兩

山梔子半兩

牽牛末二兩

右為細末。煉蜜為丸。如彈子大。每服半丸。食後酒半盞研化服之。忌冷水。

三聖散 治臙瘡疔瘡。搭手背疽等瘡。

葱白一斤

馬莧一斤

石灰一斤

右三味。濕搗為團。陰乾為細末。貼瘡。如有死肉者。宜先用潰死肉藥。

潰死肉藥方

炊飯尖半兩各三等

一等半兩。入巴豆二個。

一等半兩。入巴豆

一等半兩。入巴豆五個。各搗作白錠子

右先用二巴豆納瘡。如不潰。再用納三巴豆。又不潰。用五巴豆者。更用丹砂炒紅色。摻瘡口。追出清水。其惡肉未盡至。追出赤水。是惡肉盡。更用三聖散貼之。用膏藥傅之。

治臙瘡久不愈者

用川烏頭黃蘗各等分爲末。用唾津調塗紙上貼之。大有效矣。

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之。或爲細末貼之。亦妙。

又方 用臘月中白燒灰。油調塗瘡疥上。

又方 以瓦松不拘多少。陰乾爲末。先用槐枝葱白湯洗之。過摻之。立效。灸瘡久不斂者。更妙。

又方 以蒲公英搗之。貼一切惡瘡諸刺。

替鍼丸 治一切惡瘡。

川烏二錢

草烏二錢

五靈脂二錢

輕粉一分

粉霜一分

又方 加班 蝨二十個去 巴豆二十個去皮用

右將三件爲末。研令勻。次入輕粉粉霜研勻。又入班蝨巴豆。以水調糊爲錠子。

如作散是謂針頭散

懸蔓散 治發背惡瘡。

懸 蕪一個

大 黃一兩

金 銀花一兩

當 歸半兩

皂 角刺一兩

右剉碎。用酒一椀。煎至七分。去滓。溫服。如有頭者。加黍粘子。

治附骨癰。及一切惡瘡。

當 歸半兩

甘 草一兩

山 梔子個十二

木 鱉子一個

右為細末。每服三五錢。冷酒調服之。

治諸惡瘡

白 僵蠶直者

大 黃二味各等分。

右為細末。生薑自然汁。與蜜同和為劑。丸如彈子大。每服一九。細嚼。

治惡瘡死肉銚子

巴 豆一錢去皮油去

五 靈脂半兩

黃 丹二錢飛

加 枯白礬一錢

右為細末。以糊和丸。銚子入瘡內用之。

當歸活血散 治瘡瘍未發出。內痛不可忍。及婦人產前後腹痛。

當 歸二錢

沒 藥半錢

乳 香半錢

白 芍藥三錢

瘡瘍者。加人參、木香、婦人、加赤芍藥。

右為細末。每服一錢。水一中盞煎至七分。和滓溫服。日二服。婦人酒煎。瘡既發。不須用。

熏惡瘡方

紫花地丁一名米布袋收

右取根曬乾。用四個半頭。搗壘成爐子。燒着地丁用絡炆。搗一枚蓋了。使令搗眼內煙出。薰惡瘡。出黃水自愈。

治蛇瘡

用蒲公英科根作泥。貼于傷處。用白膏藥封之。

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣一個 金色自然銅半兩燒紅醋碎研為細末用之 乳香二錢為細末用之

銅錢重半兩者取三文或五文燒紅醋研碎細 金絲水蛭一錢半每個作三截上博去氣道為度

沒藥三錢研細

右為細末。如瘡腫處。津調半錢。塗立止痛。如見得出膿。先用粗藥末少許。小油

少半匙。同打勻。再入少半匙。再打勻。又入前藥接骨散半錢。再都用銀釵子打成膏子。用雞翎掃在瘡腫處。立止痛。天明一宿。自破便效。如打折骨頭并損傷。可用前項接骨散半錢。加馬兜苓末半錢。同好酒一大盞。熱調連滓溫服。如骨折損。立接定不疼。如不折了。喫了藥。立便止住疼痛。此方屢經效驗。不可具述。服藥覷可以食前服。食後服。又外用接骨藥。

陳爛麻根

兩把羊耳

亂

絲者更妙

右取肥松節劈碎。約量多少。先放三兩根於新瓦上。都於上外三味。在上燒着存性。就研爲末。如生。再燒研爲度。後入五靈脂或半兩。如疼。入好乳香少許。和藥如茶褐色爲度。用布條子約纏一遭。先攤小黃米粥勻。上撒上藥末勻。纏定折處。上又用軟帛三五重。上又竹篔子纏。勒得緊慢得中。初三日換上一次。再後五日換一次。又七日再換上一次。無有不接者。

赤龍散 消散一切腫毒。

用野葡萄根。紅者去粗皮爲末。新水調塗腫上。頻掃新水。

便癰方本名血疔

牡蠣

大黃

甘草

以上各半兩

懸

藜一個

右酒浸。露一宿。服之。以利爲度。

又方 冬葵子爲末。酒調下三兩服。

又方 皂角不蛀者。燒過陰乾爲細末。酒調服之。立效。又皂角子七個。水調服之。亦效。

又方 胡桃七個。燒過陰乾。研爲末。酒調服之。不過三服。大效。

又方 生蜜米粉調服。休喫飯。利小便爲度。

治瘡無頭者

蛇退皮於腫處貼之。

又方 皂角刺。燒灰陰乾。

右爲末。每服三錢。酒調嚼。葵菜子三五個。前藥送下。大效。

生肌斂瘡藥

白斂

定粉各等分

黃丹少許

右同爲細末。洗淨瘡口。乾貼之。

治諸瘡水度腫者

生白礬末。水調塗之。自消。

接骨藥

銅

錢

半兩醋浸淬  
焦燒研為末

麝

香少許

木

香一錢

自然銅

一錢

右為極細末。如在上。食後每服三匙頭。嚼丁香一枚。乳香一粒。無灰酒一小盞。在下。食前如不折。其藥反出。服罷。其痛不可當。勿疑。待一日。如骨未接。再服如前。老者十餘日。少者不過五七日。

萬聖神應丹。出箭頭。

葇荳科

一名天仙子。取着一件  
根本枝葉花實全者佳

右於端午日前一日。持不語。尋見葇荳科。言道。先生你却在這裏。那道罷。用柴灰。自東南為頭。圍了。用木楔子。取了根。週迴土。次日端午日未出時。依前持不語。用鑊口一鑊。取出土。用淨水洗了。不令雞犬婦人見。於淨室中。以石臼搗為泥。丸如彈子大。黃丹為衣。以紙袋封了。懸於高處陰乾。如有人着箭。不能出。

者。用緋絹盛此藥。訖。放臍中。用綿裹肚繫了。先用象牙末於瘡口上貼之。後用前藥。如瘡口生合。用刀子利開貼之。

治凍瘡

臘月雀腦子。燒灰研細。小油調。塗凍瘡口上。

又方 以正黃蘗為細末。用乳汁調。塗瘡口上。

又方 以山藥少許。生於新瓦上磨為泥。塗瘡口上。治手足裂。

白芨。不以多少為末。水調。塗裂處。

治面上瘡

用鐵子底黑煤。於小油中。以匙打成膏子。攤在紙上。貼瘡神效。

治金瘡血不止

用白薇末貼之。立止。

善應膏藥

黃丹二斤

南乳香另研

沒藥另研

當歸

木鱉子生用

白欵生用

白礬生用

官桂三寸

杏仁生

白芷以上各一兩

新柳枝各長一斤

右除黃丹乳沒等外。八件用芝麻油五斤。浸一宿。用鐵鍋內煎令黃色。藥不用。次入黃丹鍋內。柳條攪令黃色。方可撥下。用柳枝攪出大煙。入乳沒勻。令冷。傾在瓷盆內。候藥硬。用刀子切作塊。油紙裹。

### 接骨丹

五靈脂一兩

茴香一錢

右二味為細末。另研乳香為細末。於極痛處搽上。用小黃米粥塗了。後用二味藥末搽於上。再用帛子裹了。用木片子纏了。少壯人二日效。老者五六日見效矣。

### 治癰如聖丸

黃蘗

黃芩

黃連

防

風以上各半兩

白僵蠶一兩

全蝎三分

輕粉半錢

右為細末。羊蹄根汁浸。蒸餅為丸。如梧桐子大。每服二三十丸。嚼羊蹄根汁送下。隨病人上下。分食前後。又羊蹄汁塗癰。

治小兒癬雜瘡

白膠香

黃蘗

輕粉

右為細末。羊骨髓調塗癬上。

治瘰癧方

斑蝥去頭足

赤小豆

白僵蠶

苦丁香

白丁香

磨刀泥

右各等分為細末。十歲已上服一錢。二十已上服二錢。五更用新汲水一盞調下。比至辰時見效。女人小便見赤白色。三兩次。男子於大便中見赤色白色為效。當日服白粘粥。不得喫別物。大忌油膩。患三四年者。只一服。七八年者再一服。

玉餅子

治瘰癧。一切惡瘡軟癬。

右用白膠一兩。瓷器內溶開去滓。再於溶開後。以葶麻子六十四個。作泥。入膠內攪勻。入小油半匙。頭柱點水中。試硬軟。添減膠油。如得所。量瘡大小。以緋帛攤膏藥貼之。一膏藥可治三五癬。

又方治瘰癧

小龍肚腸炮一條乾

鱉殼裙襖炮

川練子五個

牡蠣

大黃

牛蒡子燒存性

皂角子五十個

右為細末蒸餅為丸。如菜豆大。每服十五丸。食後艾湯下。日三服。

又方。將臘月貓糞。用新瓦兩個。合在內。外用鹽泥固濟。燒成灰。以小油調。塗瘡

口上。

又方。取小左盤龍。不以多少為末。陳米飯搜和得所。丸如梧桐子大。每服三五

十丸。却用陳米湯送下。

治眉煉頭瘡

小麥不以多少。燒冷黑色。存性為末。以小油調。塗瘡上。

治小兒瘡瘡

羊糞熬湯。洗去痂。用屋懸燥。炒羅為末。以小油塗瘡上。

聖靈丹

治打撲腫痛不可忍者。

乳香

香三錢

烏梅

五個去核細切焙乾為末

白蔞苜子

二兩八錢炒黃搗為末

白米一捻另研細末

右再入乳鉢內。研數百下。煉蜜爲丸。如粟大。細嚼。熱湯下。病在上。食後。在下。食前。

出靨方

右用蕎麥楷一擔。不爛者。燒灰存性。入石炭半斤。同灰一齊過。令火滅。然後以熱水淋灰窩。淋下灰水。用鐵器內煮。以撩起攪成膏子。於靨上點自出。或先以草莖刺破亦可。

又方 桑柴灰石灰。淋汁熬成膏。草莖刺破點。以新水沃之。忌油膩等物。燒燙火方

多年廟上物。與走獸爲末。小油調。塗燒湯火瘡效。

又方 生地黃汁。入小油蠟。同熬成膏。瓷器內盛。用雞翎掃燙處。

又方 培上青苔燒灰。小油調。塗燒燙處。

治燒燙方

生地黃。旋取新者爛搗。取自然汁。入小油黃蠟少許。銀石器中熬成膏子。用雞

翎掃瘡上。

又方 血餘灰。用臘猪脂調塗。

又方 寒水石。燒過為細末。水調塗之。

枯瘡方

砒

硃砂

黃丹

雄黃

粉霜

輕粉

以上各等一錢

斑

蝨生用  
二十個

硃砂一錢

乳香三錢

沒藥一錢

同研為末。粥糊為丸。捏作碁子樣。爆乾。先灸破瘡頂。三炷為則。上以瘡藥餅蓋上。用黃蘗末。以水調貼之。數日。自然乾枯落下。

又方 以銅碌為末。草刺破瘡。摻在上。以膏藥塗之。

治頭面生瘡子。用蛛絲勒瘡子根。三二日。自然退落。

乳香散 貼杖瘡腫痛。

大黃

黃連

黃蘗

黃芩

以上各三錢

乳香另研

沒藥 另研以上

腦子少許

右四味為末。後入三味。冷水調勻。攤於緋絹上。貼杖瘡上。

治疔瘡

馬明退燒灰三錢。輕粉少許。乳香少許。

右研為細末。先以溫漿水洗淨。乾摻之。

治疔瘡久不愈者

海浮石燒紅醋淬數次 金銀花

右海石二停。金銀花一停。同為細末。每服二錢半。如簽茶一般。日用二服。瘡在上。食後在下。食前服。如病一年。服藥半年則愈。

瀉肺湯 治肺癰喘急。坐臥不安。

桑白皮剉燒 甜葶藶隔紙焙各一兩

右二味為粗末。每服三錢。水一盞。煎至六分。去滓。食後溫服。以利為度。

桔梗湯 治肺癰吐膿。

桔梗剉炒一兩半 甘草炙剉半兩

右為粗末。每服六七錢。水二盞。煎至半盞。去滓。空心服。須臾吐膿立愈。

黃蘗散 治鵬窠徼腰等瘡。

黃蘗 白芨

白斂

以上各等分。

黃丹少許

右為細末。涼水調塗。

### 口齒咽喉第二

地龍散 治牙痛。

地龍去土 玄胡索

萹撥

以上各等分

右為細末。每用一字。用綿子裹。隨左右痛。於耳內塞之。大效。

### 牙宣藥

萹撥 胡椒

良薑

乳香另研

麝香 細辛

青鹽

雄黃

以上各等分。

右為細末。先以溫漿水刷淨。後用藥末於痛處擦。追出頑涎。休吐了。嗽數十次。

痛止忌油膩一二日。

仙人散 刷牙

地骨皮二兩酒浸二宿

青鹽一兩

黍粘子半炒

細辛酒浸兩

右為細末。入麝香少許。每用一字。臨臥擦牙。茶酒嗽良久吐出。

又方

石膏

細辛

柳樅

以上各等分。

右為末擦之。

治牙疳

米二停

鹽一停

盆碱

麝香少許

白礬

右相合。水伴勻。紙包裹。燒黑焦為末。貼瘡上立愈。

治牙痛

口噙冰水一口。用大黃末紙撚。隨左右痛處。鼻內任之立止。

又方

韶粉二錢 好硃砂一錢

右為末。每用少許。擦痛處。

又方 好紅豆二錢

花 減少許

右為末。隨牙痛處左右。鼻內嚙之。

又方 華細辛去苗

白茯苓去皮

川升麻

萆撥 青鹽

明石膏

川芎

不蛀皂角去皮弦酥炙黃色

以上各等分。

右為細末。早晚刷牙。溫水嗽之。牙痛處。更上少許。

又方

以巴豆去皮。用針刺於燈焰上。炙令煙出。薰牙痛處。薰三五上。

又方 高良薑一塊

全蝎一隻

右為細末。先用酸漿水嗽牙。次用藥末擦之。流下涎水即愈。

又方治牙疼 花椒研摻牙坑痛立止。

又方 枯白礬熱水漱之。

治走馬咽痺

右用巴豆去皮。以綿子微裹。隨左右塞於鼻中。立透。如左右俱有者。用二枚。

又方

用生白礬研細。塗於綿針上。按於喉中立破。綿針以榆條上用綿纏作棗大是也。

又一法 如左右喉痺。於頂上分左右頭髮。用手挽拔之。剝然有聲。立效。此法年幼時常見鄭六嫂救人甚多。不得其訣。近與子正話及。方得其傳。

又一法 以馬勃吹咽喉中立止。

治喉痺

大黃

朴硝

白僵蠶

右件同爲細末。水煎。量虛實用。以利爲度。

口瘡方

白礬至一兩飛

黃丹一兩炒紅色放下

右二味。爲細末。摻瘡上立愈。

# 目疾證第三

治倒睫拳毛

將川山甲以竹篔子刮去肉。用羊腰窩脂。去皮膜。仍將川山甲於炭上炙令黃色。用脂擦去山甲上。如此數遍。令酥爲末。隨左右眼噙水。鼻內噙一字。一月餘見效。

又方

木鱉子三個 乾炒

木賊一百二

地龍二條 去土

赤龍爪一百二十個 則勾刺針也

右爲細末。摘去倒睫。每日以紙撚蘸藥噙之。一日三五次。

又方

穿山甲炮

地龍去皮

蟬殼

五倍子以上各 等分

右爲細末。如用藥時。先將拳毛摘盡。後用藥一字。隨左右鼻內噙之。次日目下。如線樣微腫是驗也。

貼赤眼

取青泥中蛆。淘淨熬乾為末。赤眼上乾貼之。甚妙。  
貼赤瞎

蘆甘石二兩

蜜陀僧一兩

黃連

朴硝

右方。先將黃連用水熬成汁。入童子小便。再同熬。後下硝。又熬少時。用火煨爐  
甘石紅。黃連汁內碎七次。與蜜陀僧末同為末。臨臥貼之。

貼赤眼

銅碌

輕粉

牙硝

腦

子少許

麝香

右為細末。乾貼之。

截赤眼方

黃連

綠礬

杏子

甘草

銅碌各等分

右為粗末。水煎洗甚效。

碧霞丹 治赤眼暴發。并治赤瞎。

銅 碌 白 土 芒 硝

右件各分爲末。丸如皂子大。每用白湯研化一丸。洗之立效。

汾州郭助教家神聖眼藥

麩 仁 一 兩 金 精 石 二 兩 銀 精 石 二 兩 爐 甘 石 四 兩

赤 石 脂 一 兩 滑 石 二 兩 蜜 陀 僧 二 兩 高 良 薑 三 兩

秦 皮 一 兩 黃 丹 飛 過 兩 銅 碌 三 錢 礪 砂 三 錢

礪 砂 半 錢 乳 香 三 錢 盆 硝 少 用 青 鹽

腦 子 麝 香 少 用 之 井

右用東流水三升。先入麩仁。次下餘味等。白沙蜜一斤。熬至二升。以線絹細濾

過澄清。入前藥攪之。勻點大效。

視星膏

白 沙 蜜 一 斤 揀 去 蜜 滓 蜜 陀 僧 一 兩 金 色 者 研 極 細

新 柳 算 子 四 兩 去 皮 心 半 乾 半 炒

右用臘雪水五升。與蜜溶調入藥。與柳算子同貯於瓷瓶中。以柳木塞瓶口。油

絹封勒。於黑豆鍋中熬。從朝至暮。仍用柳棒閣瓶。防傾側。用文武火另添一鍋。豆水滾下。旋於另鍋中取水添之。熬成。用重綿濾淨。却入瓶中。用井水浸三兩。日埋在雪中更妙。頻點為上。

復明膏 治外障。

白丁香臘月收者尤  
水飛秤八錢

揀黃連 一兩

防風去蘆對一  
指許一兩

新柳枝方一寸  
者三片

右好四味。用新水一升半。雪水更妙。春秋兩三時。冬月一宿。以銀石器內。熬至六分。濾去滓。另用蜜一斤。蜜陀僧研極細末三字。入蜜攪勻另熬。以無漆匙擦點。下蜜中急攪。候沸湯定。一人攪蜜。一人旋又攪藥汁。都下在內攪勻。再熬三兩沸。色稍變。用新綿三兩。重濾去滓。盛器內點眼如常。本方每藥半合。用片腦一麥粒大。不用亦可。

錠子眼藥

黃丹飛一兩

黃蘗去皮半兩

黃連去鬚半兩

枯白礬半兩

爐甘石半兩用  
黃連製

銅礞半兩

硃砂三錢

川烏三錢  
炮

乾薑二錢

蝎梢一錢

信火半錢

乳香少許

沒藥少許

右為細末。入豆粉四兩。澆蜜和就。如大麥許銚子。於眼大皆頭。待藥化淚出為效。

治冷淚目昏

密蒙花

甘菊花

杜蒺藜

石決明

木賊去節

白芍藥

甘草各等分

右為細末。茶清調下一錢。服半月。後加至二錢。

又方 乾薑肥者為末。每用一字。浸湯點洗。

又方 貝母一枚。膩白者。胡椒七粒。為末點之。

單治目昏

荊芥穗

地骨皮

楮實以上各等分

右為細末。煉蜜為丸。桐子大。每服二十九丸。米湯下。

治一切目昏

川椒一斤微炒搗取  
椒紅約取四兩

甘菊花四兩  
末之

生地黄一斤取新者  
并作泥極爛

右將地黃泥與前藥末同和作餅子。透風處陰乾。再為末。以蜜為丸。如梧桐子大。每服三十九。食後茶清送下。

洗眼黃連散

當歸

赤芍藥

黃連

黃

柏各等分

右細剉。以雪水或甜水。濃煎汁熱洗。能治一切風毒赤目。

諸物入眼中

好墨清水研。傾入眼中。良久即出。

點攀睛瘀肉

黃丹一兩二錢  
過飛泣乾

白礬一兩  
內化成汁

右將白礬於銀器內化成汁。入黃丹末在內。以銀匙兒攪勻。更入乳香沒藥各一錢。慢火不住手攪。令枯乾為粉。候冷研極細。熟絹羅過。後入麝條一錢半。血竭二分。麝香少許。輕粉三分。粉霜二分。共研極勻如粉。再以熟絹羅過。細末點之。大有神效。

青金散

芒硝一兩 螺青

沒藥

乳香以上各少許

右為細末。每用少許。鼻內嚙之。

治雀目

真正蛤粉炒黃色細末

右油臘就熱和為丸。如皂子。納於猪腰子中。麻纏。蒸熟食之。可配米粥。

### 頭面風疾第四

治黥風刺方

苦參一斤 紅芍藥

冬旅二味各 玄參一兩

右為末。每用一字。用手洗面上。

猪蹄膏 洗面上黥藥

右用猪蹄一副。刮去黑皮。切作細片。用慢火熬如膏粘。用羅子濾過。再入鍋內。用蜜半盞。又用

白芷

黑豆去皮

瓜蒌一個

白芨

白藜

零陵香

麝香各一

鵝梨二個

右將七味藥為末。同梨入藥一處。再熬。滴水不散方成。以絹濾過。臨臥塗面。次日用漿水洗面。

治面風

益母草灰。麵湯和。燒七遍。洗面用之。

治面黥黑斑點方

白附子一兩

白芨

白藜

蜜陀僧

胡粉

白茯苓以上各分

右為細末。洗淨。臨臥以乳汁調一錢。塗面。但洗光淨。牛乳亦可。

治頭風

苦丁香

川芎

藜蘆各等分

右為細末。噀水。鼻內噤之。

芎黃湯 治頭目眩運。

大黃

荆芥穗

貫芎

防

風以上各

右為粗末。大作劑料。水煎。去滓服之。以利為度。

耳聾方 草麻子五十箇。去皮。

右與熟棗一枚。同搗丸。如棗子大。更入小兒乳汁。就和。每用一九。綿裹。納於聾

耳內。覺熱為度。一日一易。如藥難丸。日中曝乾。

又方 口噙甘草一枚。耳中塞二塊。用綿裹立通。

腦宣方

皂角不蛀者。去皮弦子。蜜炙搥碎。水中揉成濃汁。熬成膏子。鼻內啗之。口中咬

筋。良久涎出為度。

治耳底方

以枯白礬為末。填於耳中。立效。

治鼻中肉螻蛄

赤龍爪

苦丁香以上各

苦葫蘆子不少

麝

香少許

右為末。用紙撚子。點藥末用之。

取臭方

烏魚骨 三錢

枯白礬 三錢

蜜陀僧 一錢

右為末。先用藥水洗臭處。後用藥末擦之。

又方。蜜陀僧不以多少研細。先以漿水洗臭處乾擦。

烏頭藥

細針沙 炒

蕎

麵 炒以上

六 麥亦同

釀醋半升。與前二味打糊。

凡用先使皂角水熱洗淨。時前二味糊稀稠得所。於髭鬚上塗之。均勻。先用荷葉包。次用皮帽裹之。三五時辰。用溫漿水洗了。却收取元針沙。其髭髮淨後。用黑藥塗之。黑藥方。

沒食子

石榴皮

乾荷葉 各一兩以上 五倍子

柯子皮

百藥煎

金絲礬

礬 另研旋 點諸藥

右將七味為細末。炒熟。麵五六匙。入好醋。打麵糊。和藥末。再塗髭鬚。又用荷葉封裹。後用皮帽裹之。三五時間。洗淨甚黑。若更要黑光。用猪膽漿水澤洗。如鴉

翎。

又方

酸石榴

五倍子

芝蔴葉

右同杵碎。用絹袋盛之。於鐵器內水浸。掠髮自黑。

治大頭病兼治喉痺方。歌曰。

人間治疫有仙方。

一兩疆蠶二大黃。

薑汁為丸如彈大。

井花調蜜便清涼。

又法 以砭針刺腫處。出血立效。

治時氣

馬牙硝

寒水石

黍粘子

鬼白

川大黃

鬼箭草等分

腦子少許

右六味為細末。用新井花水一盞。藥末一二錢。入腦子喫。外一半留用。新水得稠。雞翎掃在腫處。有風涼處坐。

### 解利傷寒第五

雙解丸

巴豆六個去皮油 天麻二錢 胭脂少許

右將巴豆天麻為末。滴水丸。如秫米大。胭脂為衣。一日一九。二日二丸。三日三丸。已外不解。先喫冷水一口。後用熱水下。如人行十里。以熱湯投之。

又一法 無藥處可用兩手指相交。緊扣腦後風府穴。向前禮百餘拜。汗出自解。

又一法 適於無藥處。初覺傷寒。傷食。傷酒。傷風。便服太和湯百沸湯。是避風處。

先飲半碗。或以薑汁亦妙。以手揉肚。覺恍惚。更服半碗。又用手揉至恍惚更服。

以至厭飮。心無所容。探吐汗出則已。

不臥散

川芎半兩 石膏七錢 藜蘆半兩去土 甘草半兩生

右為細末。口噙水。鼻內各嚙之。少時。喫白湯半碗。汗出解之。

川芎湯 解利一切傷寒。

川芎 薑本 蒼朮

右三件為細末。沸湯點三錢。須臾。覺嘔逆便解。如不解。再服之。

# 諸腰脚疼痛第六

皂角膏

右用醇酒二大椀。皂角一斤。去皮弦搗碎。熬至一半。沸去滓。再用前汁。入銀石器熬為膏子。隨痛處貼之。

治腰脚疼痛方

天麻

細辛

半

夏以上各

右用絹袋二個。各盛藥三兩。煮熟。咬牙熨痛處。汗出則愈。

牛黃白朮丸 治腰脚濕

黑牽牛

大黃各二兩

白朮一兩

右為細末。滴水丸。桐子大。每服三十九。食前生薑湯下。如要快利。加至百丸。

## 婦人病證第七

如聖丹 治婦人赤白帶下。月經不來。

枯白礬

蛇床子以上各等分

右為末。醋打麵糊丸。如彈子大。以胭脂為衣。綿子裹納於陰戶。如熱極再換。

洗洗丸 療婦人無子。

當歸

熟地黄以上各二兩

玄胡索

澤蘭以上各一兩半

川芎

赤芍藥

白薇

人參

石斛

牡丹皮以上各一兩

右為末。醋糊為丸。每服五十九。桐子大。空心酒下。

當歸散 治月經欲來前後腹痛。

當歸以米醋微炒

玄胡索 生用

沒藥 另研

紅花生用

右為末。溫酒調下二錢服之。

治產婦橫生

草麻子三十個

研爛。婦人頂上剃去髮少許。以上藥塗之。須臾覺腹中提正。便刮去藥。却於脚心塗之。自然順生也。

治血崩。蠶沙。不以多少。

右爲末。每服三五錢。熱酒調下服。

又方。管仲。去鬚剉碎。

或用酒醋煎三錢。煎至七分。去滓。溫服。一服立止。

當歸散。治血崩。

當歸一兩

龍骨燒赤一兩

香附子炒三錢

櫻毛灰半兩

右爲細末。空心。米飲調下三四錢。忌油膩雞豬魚兔等物。

蓮殼散

乾蓮蓬燒灰存性

櫻櫚皮及毛各燒灰以上各半兩

香附子炒三錢

右爲細末。每服三四錢。空心。米飲湯調下服之。

治婦人血枯

川大黃

右爲末。醋熬成膏。就成雞子大。作餅子。酒磨化之。

三分散。治產後虛勞。不進飲食。或大崩後。

白朮

茯苓

黃耆

川芎

芍藥

當歸

熟乾地黄以上各一兩

柴胡

人參

以上各一兩六錢

黃芩

半夏洗切

甘草

炙以上各六錢

右為粗末。每服一兩。水一大盞。煎至半盞。去滓溫服。日二服。

治產後惡物上潮痞結大小便不通

芒硝

蒲黃

細

墨各等分

右為末。用童子小便半盞。水半盞。調下服之。

治婦人產後虛弱和血通經

當歸

焙一兩

芍藥

二兩

香附子三兩炒

右為細末。每服一二錢。米飲調下。服之。無時。

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝

竈底焦土研細

用酒調三五錢。瀉出惡物立止。

治娠婦下痢膿血及咳嗽

白朮

黃芩

當歸

各等分

右為末。每服三五錢。水煎。去滓。食前。加桑皮止嗽。

百花散 治婦人產中欬嗽

黃蘗

桑白皮

用蜜塗慢火炙黃色為度二味各等分

右為細末。每服一二錢。水一盞。入糯米二十粒。同煎至六分。以款冬花燒灰六

錢。攪在藥內同調。溫服之。

治婦人吹妳

以樺皮燒灰存性。熱酒調下三錢。食後服之。

又方

馬明退

燒灰

輕粉

麝香

少許

右為細末。每服二錢。熱酒調下服之。

又方 以皂角燒灰蛤粉和。熱酒將來調數字。下得喉嚨笑呵呵。

又方 以淘米木杓上砂子七個。酒下。以吹篳枝透乳孔甚妙。

### 欬嗽痰涎第八

#### 九仙散

九尖葦麻子葉三錢

飛過白礬二錢

右用猪肉四兩。薄批。碁盤利開。搽藥。二味荷葉裏。文武火煨熟。細嚼。白湯送下。後用乾食壓之。

#### 止嗽散

半

夏洗一兩半湯

枯白礬四兩

右二味為末。生薑打麵糊和丸。桐子大。每服三二十九。空心溫酒送下。

款冬花

佛耳草

甘草

鍾乳

鵝管石

白礬

官桂

井泉石以上各

右為細末。每服三錢。水煎服之。咽一方

三才丸 治嗽。

人參

天門冬去心

熟乾地黄以上各

右為細末。煉蜜為丸。如櫻桃大。含化服之。

三分茶

茶二錢

蜜二兩

蕎麥麵四兩

右以新水一大碗。約打千餘數。連飲之。飲畢良久。下氣不可停。人喘自止。

石膏湯 治熱嗽。

石膏

膏亂文者

人參半兩

甘草半兩

右為末。每服三錢。新水或生薑汁。蜜調下亦可。

三生丸 治嗽。

胡桃仁一兩

生薑皮細切 杏仁一兩

右二味同研為泥。就和作劑。可得十三四丸。臨臥爛嚼一丸。可數服即止。

化痰延壽丹

天麻半兩

枸杞子二兩

白礬生一兩半

夏洗一兩半

乾生薑一兩

人參一兩

右爲細末。好糯酒拌勻如砂糖。用蒸餅劑蒸熟。去皮。杵臼搗四五十杵。便丸。如乾。入酒三點。丸如小豆大。每服三五丸。生薑湯下。

半夏湯 治噦欲死者。

半 夏 洗一兩 生 薑二兩

右二味細切。水二盞。煎至八分。去滓。作二服。食後。

治肺痿喘嗽

漢防己

右爲細末。每服三錢。漿水一盞。同煎至七分。和滓溫服之。

治年高上氣喘促。睡臥難禁。

右蘿蔔子。搗羅爲末。白湯浸調五七錢。食後服之。或炒。或用糖蜜作劑。爲丸服之。

麻黃湯 治因風寒。衣服單薄致嗽。

麻 黃 節 不 去 甘 草 生 用 杏 仁 生 用

右爲粗末。每服三二錢。水煎。食後溫服。

# 心氣疼痛第九

失笑散 治急心痛并男子小腸氣。

五靈脂半兩 蒲黃半兩

右爲末每服三錢。醋半盞煎二沸。再入水半盞。再煎二沸。空心。食前。和滓溫服之。

又方 醋一盞。加生白礬一小塊。如皂子大。同煎至七分。溫服立愈。

又方 高良薑半兩 山梔子半兩 蔚金半兩

又方 以新嫩槐枝一握。切去兩頭。水二盞。煎至一盞。去滓。分作二服。熱服之。

又方 沒藥 乳香 薑黃 玄胡索以上各

右爲末。每服三錢。水煎。食後服之。

# 小腸疝氣第十

## 抽刀散

川練子一兩破四分巴豆三個 茴香一兩鹽炒黃

右為細末。每服三錢。葱白酒調下。空心服之。

治陰痛不可忍

吳茱萸二兩洗七焙乾微炒 檳榔一兩 茴香一兩

右為細末。醋糊為丸。熱酒送下十九。食前服之。

治偏腫

茴香 甘遂

右二味。各等分為末。酒調二錢。食前服之。

又方

巴戟去心 川練炒 茴香炒

各等分為末。溫酒調二錢。服之。

治小兒疝氣腫硬

地龍不去

為末。唾津調塗病處。

治小腸氣痛

全蝎一兩 苗香炒黃兩

右爲細末。醋糊和丸。如梧桐子大。如發時。每服五七十丸。溫酒送下。食前服之。

沒藥 木香 當歸以上各分

右爲末。以刺棘心自然汁爲丸。如梧桐子大。每服五七丸。食前。鹽湯下。

知母 黃蘗以上各分

右剉碎。酒浸透。炒微黃爲末。水丸。梧桐子大。如服藥前一日。休喫夜飯。來日空心。立服米飲湯下一百丸。只用一服效。後喫淡白粥一頓。

蕩疝丹

川練子炒 苗香炒 破故紙炒以上各半兩 黑牽牛二錢

青皮 陳皮以上各三錢 廣茂四錢 木香四錢

右八味爲細末。用好酒打麵糊爲丸。如梧桐子大。空心。食前溫酒下三十丸。

灸疝法 放疝邊豎紋左右交弦灸七壯。

### 腸風下血第十一

神應散 治腸風痔漏。

牛頭角腮一隻酌中者 猪牙皂角七錢 穿山甲四十九片或圓取或一字取之

蝟皮一兩 蛇退皮一條

右五味。鎚碎。盛在小口磁器內。鹽泥固定。日中曝乾。瓶口微露出烟。用文武火燒紅。赤烟微少。取出放冷為細末。如服藥日。先一日臨臥。細嚼胡桃仁半個。如糊。用溫醇糯米酒一盞送下。不語便睡。至次日交五更服藥。驗病年月遠近。或秤三錢。五七錢。用水半大碗。醇糯米酒半大盞。相合熱和藥服之。至辰時再服。又一服。再依前服藥。不須用胡桃仁。久病不過七服。忌油膩魚鱉雞兔猪犬等物。大有神效。

溫白丸 治臟毒下血。

椿根白皮凡引者去粗皮酒浸晒乾服

右爲末。棗肉爲丸。如梧桐子大。每服三五十丸。淡酒送。或酒糊丸。

### 治脫肛痔瘻

胡荽子一升

乳

香少許

粟

糠半升或一升

右先泥成爐子。止留一小眼。可抵肛門大小。不令透煙火熏之。

### 治脫肛

蔓陀羅花子

蓮

殼一對

橡

椀十六

右搗碎。水煎三五沸。入朴硝熱洗。其肛自上。

### 治痔漏下血不止

紫皮蒜十個獨科者妙

大

椒六十個

豆

豉四兩

右搗爛爲泥丸。彈子大。空心細嚼一丸。鹽湯下。日進三服效。

### 治痔漏

白牽牛頭末四兩沒

藥一錢

右同爲細末。如欲服藥。先一日不食晚飯。明日空心。將獾猪精肉四兩。燒令香熟。薄批。摻藥末在內裹之。漸又細嚼。食盡。然後用宿蒸餅壓之。取下膿血爲效。

量病大小虛實。加減服之。忌油膩濕麵酒色。三日外不忌。一服必效。或用淡水煮肉熟。用上法亦可。又云。服前一日。不食午飯并夜飯。明日空心用之。

又方。黑白牽牛一合。炒黃為木。猪肉四兩。切碎炒熟。與藥末攪勻。只作一服用。

新白米飯三二匙。壓之。取下白蟲為效。

又坐藥。黑鯉魚鱗二三甲。以薄編罽裹如棗柱樣納之。痛即止。

淨固丸 治痔漏下血痒痛。

槐花炒 枳殼去穰以各一兩

右為細末。醋糊為丸。如梧桐子大。每服二十九。米飲湯下。空心。食前十服。見效。  
黃連貫衆散 治腸風下血。

黃連 雞冠花 貫衆 大黃

烏梅以上各一兩 甘草三錢炙 枳殼炮 荆芥以上各一兩

右為細末。每服二三錢。溫米飲調服。食前。

槐荆丸 治痔漏。

荆芥槐花等分為末。水煎一大碗。服丸亦可為之。

又方

豆豉炒

槐子炒各等分

右為末。每服一兩。水煎空心下。

熏燻藥

鳳眼草

赤皮葱

椒

三味搗粗。同漿水滾過。坐盆。令熱氣熏痔。但通手灑之。如此不過三次愈矣。

### 小兒病證第十二

治小兒脾疳

蘆薈

使君子以上各等分

右為細末。米飲調下一二錢。服之。

玉筋散 治小兒馬脾風。

甘草煎一付

甘遂末一字

右同油蜜生薑銀釵兒攪。調下後。用冷水半盞。調奪命散。

奪命散 治小兒胸膈喘滿。

檳榔

大黃

黑牽牛

白牽牛

各等分皆生熟

用當之

右為細末。蜜水調服之。

治小兒斑瘡入眼

麩炒蒺藜炙甘草。

羌活防風等分搗。

每服二錢漿水下。

撥雲見日直到老。

治瘡疹黑陷

鐵脚威靈仙炒一錢腦子一分

右為末。用溫水調下服之。取下瘡痂為效。

治小兒黃瘦腹脹

乾雞糞二兩

丁香末一兩

右為末。蒸餅為丸。如小豆大。每服二十丸。米湯下。

黃連散 治小兒頭瘡。

川黃連

黃蘗去粗皮用

草決明

輕粉以上各等分

右為細末。用生小油調藥。於瘡上塗之。立愈。

治斑瘡倒壓方

胡桃一個燒灰存性 乾胭脂三錢

右為末。用胡荽煎酒。調下一錢服之。

又方 人牙燒灰存性。研入麝香少許。每服三錢。溫酒調下。少許服之。不拘時。

又方 小豬兒尾尖。取血三五點。研入腦子少許。新水調下。食後與服之。

又方 人中白。臘月者最佳。通風處。以火煨成煤。水調三五錢。陷者自出。

消毒散 治瘡疹已未出。咽喉腫痛。

牛蒡子二兩炒

甘草半兩剉炒

荆芥一分

右為粗末。每服三錢。水一盞半。煎至七分。去滓溫服。不拘時。

治小兒斑瘡入眼

猪懸蹄甲二兩甘鍋內鹽泥固濟燒焦為末用

蟬殼二兩去土末一兩 羚羊角研為細末

右二味為末。研入羚羊角細末一分。拌勻。每用一字。白日光外兒服半錢。三歲以

上服三錢。新水或溫水調下。日三四服。夜一二服。一年以外。則難治之。

又方 透耳藥

硃砂一錢 粉霜八分

右研為細末。水調少許。用匙杓頭傾一兩。點於耳內中。後用

白菊花

菘豆皮

穀精草

夜明沙

右四味為末。用米泔半碗。熬成去滓。入乾柿十餘個。再同熬。每日喫三兩個。仍飲煮乾柿湯。

又方 治小兒班瘡入眼

硃砂

腦子

水銀

麝香

以上各等分

右四味。研為細末。用水銀調。滴入耳中。

發班藥 珠子七個。研碎。用新水調勻服之。

破傷風邪第十二

陰毒傷寒亦附於此

辰砂奪命丹

鳳凰臺

川烏頭生以上各二錢

麝香少許

硃砂少許

右爲細末。棗肉和爲丸。如彈子大。硃砂爲衣。鰾酒送下。量病人年甲虛實。加減用之。小兒半丸。以吐爲度。不止。以葱白湯解之。

治破傷風

病人耳塞。并爪甲上刮末。唾津調塗瘡口上。立效。無瘡口者難用。

治破傷風

烏稍尾一個

兩頭尖四個

全蝎四個

右三味爲細末。另用石灰五升。柴灰五升。沸湯五升。淋灰水澄清。下藥熬之。鐵鍋器內攪成膏子如稠。用唾津調。先用溫漿水洗淨瘡口。後塗藥。即時藥行。吐黃水一日。以新水嗽口。即愈。

又方

天南星半生半熟

防風去蘆二味各等分

右爲末。清油調塗瘡上。追去黃水爲驗。

又方

白芷生用 草烏頭尖生用去皮 二味等分

右為末。每用半錢。冷酒一盞。入葱白少許。同煎服之。如人行十里。以葱白熱粥投之。汗出立愈。甚者不過二服。

又方 蜈蚣散。

蜈蚣頭 烏頭尖

附子底

蝎梢四味各

右為細末。每用一字。或半字。熱酒調下。如禁了牙關。用此藥幹開灌之。

治陰毒傷寒破傷風

草烏頭七個文武火燒熱去牙頭

麝香半錢

硃砂一錢

右為細末。每服一字。以熱酒調下。食前服之。汗出為度。忌猪兔魚鱉粘穀肉。

治陰毒病者

用芥末。以新水調膏藥。貼臍上。汗出為效。

又方 牡蠣乾薑末。新水調塗。手心握外腎。汗出為效。

諸風疾證第十四

不老丹 治一切諸風常服烏髭駐顏明目延年。

蒼朮 四斤米泔水浸軟竹刀子刮去皮切作片子內一斤用椒三兩去白

一升煮 何首烏 二斤米泔水浸軟竹刀子刮去皮切作片子用瓦

鋪裏二升黑豆三升用炊單復著上用 地骨皮 去粗皮

右件於石臼內搗為細末。後有椹汁搜和。如軟麵劑相似。瓷盆內按平。上更用

椹汁藥上高三指。用紗綿帛覆護之。晝取太陽。夜取太陰。使乾再搗羅為細末。

煉蜜和丸。如梧桐子大。空心溫酒下六十丸。忌五辛之物。

四仙丹

春甲乙採杞葉 夏丙丁採花 秋庚辛採子 冬壬癸採根皮

右為末。以桑椹汁為丸。每服五十丸。茶清酒任下。

起死神應丹 治癱瘓四肢不舉風痺等疾。

麻黃 去根節河水五升熬 白芷 二兩 桑白皮 二兩

蒼朮 去皮 甘松 去土 川芎 三兩 苦參 半

加浮萍 二兩

以上各為細末。用膏子和丸。如彈子大。每服一九。溫酒一盞化下。臨臥服之。微汗出。勿慮。如未安。隔三二日再服。手足即時軟快。及治卒中風邪。涎潮不利。小兒驚風。服之立效。

愈風丹

芍藥

川芎

白僵蠶炒

桔梗

細辛去葉

羌活以上各半兩

麻黃去節

防風去蘆

白芷

天麻

全蝎各一兩

甘草三錢

南星半兩生薑製用

硃砂半兩為衣

為末。煉蜜丸。如彈子大。每服一九。細嚼。茶酒吞下。

香芎散 治偏正頭風。

貫芎

香附子炒

石膏亂紋者良水飛

白芷

甘草

薄荷以上各一兩

一方川烏頭臍皮用之

右為細末。每服二錢。溫酒或茶清調下。服之。

妙功十一丸 治癩。

丁香 木香 沉香 乳香

麝香 荆三稜炮 廣茂炮 黑牽牛微炒

黃連 雷丸炒 鶴虱炒 胡黃連

黃芩 大黃焙 陳皮 青皮

雄黃 熊膽 甘草炙各二錢半 赤小豆三百六

白丁香直尖者三輕粉四錢 巴豆七粒

右二十三味為細末。赤小豆爛煮研泥。同蕎麥打糊。和作十一丸。硃砂為衣。陰乾。服時水浸一宿。化一丸。大便出。隨病各有形狀。取出為驗。或作化一番。不可再服。曾經火炙者不治。遠年愈效。

硃砂滾涎散 治五癩。

硃砂水飛 白礬生用 赤石脂 硝石以上各等分

右同為細末。研蒜膏如丸。菘豆大。每服三十九。食後。荆芥湯下。

又方 末砂。不以多少。水飛研為細末。

右用猪心血浸。蒸餅為丸。如菘豆大。每服二十九。空心。金銀湯下之。

治諸風疥癬及癩

浮萍一兩

荆芥

川芎

甘草

麻黃半兩以上各

或加芍藥

當歸

右為粗末。每服一兩。水一碗。入葱白根豆豉。同煎至一半。無時服。汗出為度。

治癩塗眉法

半夏生用

羊糞燒以上各等分

右為末。生薑自然汁調塗。

五九散 治癩。

地龍去土

蟬殼

白殭蠶

凌霄

全蝎以上各等九個

右同為末。只作一服。熱酒調下。浴室中汗出粘臭氣為效。

苦參散 治癩風。

苦參取頭末二兩

猪肚一個

右以苦參末摻猪肚內。用線縫合。隔宿煮軟。取出洗去元藥。先不喫飯五頓。至

第二日。先飲新水一盞。後將猪肚食之。如吐了。再食之。食罷。待一二時。用肉湯調無憂散五七錢。取出小蟲一二萬。爲效。後用皂角一斤。不蛀者。去皮弦及子。搥碎。用水四碗。煮至一碗。用生絹濾去滓。再入苦參末攪熟。稀麵糊膏子相似。取出放冷。後入餘藥相和。藥附後。

何首烏二兩

防風半兩

芍藥五錢

人參三錢

當歸焙一兩

右爲細末。入皂角膏子爲丸。如桐子大。每服三五十九。溫酒或茶清送下。不拘時候。日進三服。後用苦參荆芥麻黃煎湯洗冷。

### 水腫黃疸第十五

治通身黃腫

瓜蒂焙乾三錢

右爲細末。每用半字。於鼻內吹上。日一度。併吹三日。如不愈。後用黃芩末之。煎湯五錢下。

治蠱氣

取環腸草不以多少曝乾水煎利小便為度。

治黃疸面目遍身如金色

瓜蒂四箇 母丁香一個 黍米九粒

右先搗瓜蒂為末。次入二味同為細末。每用半字。夜臥令病人先噀水一口。兩鼻內各半字。吐了水令病人便睡。至夜或明日取下黃水。旋用熟帛搵了。直候取水定。便服黃連散。病輕者五日。重半月。

黃連散 治黃疸大小便秘澁壅熱。

黃連三兩 川大黃一兩剉碎醋拌炒過用之

黃芩

甘草炙各一兩

右為細末。每服二錢。食後溫水調下。一日三服。

治水腫不利小便。非其法也。故內經云。濕氣在上。以苦吐之。濕氣在下。以苦瀉之。吐瀉後。長服益元散。加海金沙。煎以長流水服之。則愈矣。大忌脚膝上針刺出水。取一時之效。後必死矣。尤忌房室濕麵酒醋鹽味。犯之必死。

木通散 治水腫。

海金沙

舶上茴香

巴戟

大戟

甘遂

芫花

木通

滑石

通草以上各等分

右為細末。每服三錢。以大麥麵和作餅子。如當二錢大。爛嚼。生薑湯送下。

### 下痢泄瀉第十六

治痢

紫苑

桔梗

赤芍藥

白朮以上各等分

右為細末。每服三五錢。細切羊肝拌之。作麵角兒燒服之。後用白湯送下。食前。

治痢

杜蒺藜炒碾為末。酒調下。三兩服。

香豉丸 治痢。

蒜為泥

豉為末

右二味相和作丸。如梧桐子大。米飲湯下。五七十丸。食前服之。

治大人小兒吐瀉腹脹腦膈痞閉

五靈脂

青皮

陳皮

硫黃

芒硝以上各等分

右將硝黃於銚子內。以文武火鎔開。用匙刮聚。自然結成砂子。取出研碎。與前三藥同末。麵糊爲丸。如菉豆大。小兒麻子黃米大。每服二十九。量虛實加減。米飲湯送下。無時。

又方治瀉

車前子不以多少

右爲細末。每服二錢。米飲湯調下服之。水穀分。吐瀉止。

### 諸雜方藥第十七

治消渴

揀黃連二兩入九節者良

右剉如呖咀。以水一碗。煎至半碗。去滓頓服。立止。  
百日還丹

佛茄子

樟柳根以分上各

爲末。枸杞汁和丸。如雞頭大。每服十丸。新水送下。

酒癥丸

巴豆十六個

全蝎十五個

雄黃一塊

白麵五兩

右爲末。滴水丸。如豌豆大。每一丸。如痛飲者二丸。

立應丸 治臟腑泄痢膿血不止。腹中疼痛。

乾薑

另末一兩炮

百草霜一兩

巴豆連皮一兩炒用

杏仁

一兩同巴豆和皮炒黑。色并爲泥。後入霜研用。

右用黃蠟四兩。鎔開蠟。次入前四味。用鐵器攪勻。旋丸桐子大。每服三五丸。甘

草湯下。白痢用乾薑湯下。食前。若水瀉。溫水下。

反胃。黃蘗末。熱酒調三五錢。食後服之。

治小便秘滑數不禁

金剛骨爲末。以好酒調下三錢服之。

又方

白茯苓去黑皮

乾山藥去皮白礬水內蒸過慢火焙乾用之

右二味各等分爲細末。稀米飲調下服之。

治卒淋痛

芫花散三錢

苗

香二錢微黃色

右爲細末。水煎服之。

治趺方

以水調白麵。稀稠得所。糊研上以紙封之。明日便乾。如不會破者。剝去麵便行。

治大便秘 生麻子不以多少。研爛。水調服之。

坐劑 治大便久秘。攻之不透者。用之。

又用蜜不計多少。慢火熬令作劑。稀則粘手。硬則脆。稀稠得所。堪作劑。搓作劑。樣如棗核大。粗如筋。長一寸許。蘸小油。內于肛門中。坐良久自透。有加鹽少許。以素問鹹以軟之。

交加飲子 治久瘧不已。山嵐瘴氣。

肉苳蔻 十一個 裹燒一個 麵草苳蔻二個 用法同

甘草 二寸半 炙用半生

厚朴 二寸 生用一半 生薑汁製 燂過半生半熟

右為末。每服分一半。水一椀。銀石器內。煎至一大盞。去滓溫服。發日。空心。未愈。則再服。

天真丸 補虛損。

佛袈裟。男用女。女用男。以新水四擔。洗盡血水。以酒煮爛為泥。

威靈仙 一兩 當歸 半兩 礞砂 一兩 蓮子肉 炒熟 三兩

乾地黄 酒浸 一兩 廣茂 半兩 甘草 二兩 牡丹皮 一兩

牛膝 酒浸 一兩 木香 半兩 白朮 一兩 白茯苓 一兩

右為細末。與君主同搗羅為細末。酒浸蒸餅為丸。如桐子大。每服三五十九。三進日服。

取雕青

水蛭取陰乾為末。先以白馬汗擦青處。後用白馬汗調藥塗之。

治蝨涎入耳中

右用貓尿灌耳中。立出。取貓尿。用盆盛貓。以生薑擦牙大妙。

又方 黑驢乳灌耳中。亦出。

又方 以濕生蟲研爛。塗於耳邊。自出。

辟穀絕食第十八

辟穀方

大豆五升洗淨蒸三遍去皮為細末

糯米五升淘淨同白茯苓一處蒸熟用之

右將麻仁末一處搗爛如泥。漸入豆黃末。同和勻便團如拳大。再入甑蒸。從初

更着火。至半後夜住火。至寅時出甑。午時曝乾。搗為末服之。以飽為度。不得喫

一切物。用麻子汁下。第一頓。一月不饑。第二頓。四十日不饑。第三頓。一千日不

饑。第四頓。永不饑。顏保日增。氣力加倍。如渴。飲麻仁汁。轉更不渴。滋潤五臟。若

待喫食時分。用葵菜子三合為末。煎湯放冷服之。取其藥如後。初間喫三五日。

大麻子五升湯浸一宿漉出蒸三遍令口開去皮為細末用

白茯苓米五兩去皮同上糯米一處蒸熟為用

白米稀粥湯。少少喫之。三日後。諸般食飲無避忌。此藥大忌欲事。

又方 茯苓餅子。

白茯苓四兩末

頭白麵一二兩

右同調水煎。餅麵稀調。以黃蠟代油。燂成煎餅。蠟可用三兩。飽食一頓。便絕食。至三日。覺難受。三日後。氣力漸生。熟菓芝蔴湯。米飲涼水。微用些。小潤腸胃。無令涸竭。開食時。用葵菜湯。并米飲稀粥。少少服之。

又方 保命丹

人參五兩

麻子仁二兩炒

乾地黄

瓜蒞子炒

菟絲子酒浸以上

生地黃

乾大棗各三兩

大豆黃一升煮

黑附子炮一兩生用

白茯苓

茯神

地骨皮去粗皮

蔓精子煮熟用

杏仁去尖用

麥門冬炒去心用

地膚子蒸七遍

黍米作粉

粳米作粉

白糯米作粉

天門冬去心

車前子蒸

側柏葉煮三遍以上

右同為細末。各揀選精粹者。臘月內合者妙。他時不可合。日月交蝕不可合。如

合時。須揀好日。淨室焚香。志心修合。勿令雞犬婦人見。又將藥末用蠟一斤半。濾去滓。白蜜一斤。共二斤半。一處溶開。和勻。入白杵二千下。微入酥油。丸如梧桐子大。每服十九。服至五日。如來日服藥。隔宿先喫糯米一頓。粳米白麵皆可。次日空心。用糯米粥飲送下。如路行人服。如遇好食。喫不妨。要止便止。如喫些小蒸餅。嚼爛。或乾果子。以助藥力。不喫更妙。忌鹽醋。日後退下藥來。於長流水中洗淨。再服。可百年不饑矣。

儒門事親終

