婦人大全良方

五之六

宋版相

宮内庁書陵部

新編婦人大全良方卷之五

勞瘵紋論第一

夫骨蒸殗殜復連尸疰勞疰虫疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰等皆曰傳尸以疰者注也病自上注下與前人相似故曰疰其變有二十二種或二十六種或九十九種大略令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聳或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或唾膿血如肺痿肺癰狀或復下利羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃疰易傍人乃至滅門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注等謂之三尸及大小附著等證不的知其所苦無處不

松涯文庫藏

惡乃挾諸鬼邪而害人以三因攷之內非七情所忤外非四氣所襲雖若罷乎不內外因索其證多端傳變遷移難以推測故自古及今無此病者十不得一所謂狂骨獺肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效唯喜肯俞崔氏穴（名四花有六穴）若聞早灸之可否幾半晚亦不濟也　病者增寒發熱自汗面白目乾口苦精神不守恐畏不能獨臥其傳在肝病者增寒發熱面黑鼻燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心　病者增寒發熱面青唇黃舌本強不能嚥飲食無味四肢羸瘦吐涎沫其傳在脾　病者增寒發熱面赤鼻白乾燥毛折吟嗽喘急時吐白涎或有血線其傳在肺　病者增寒發熱面黃耳輪焦枯脛骨痛痛小便白濁遺瀝胸痛其傳在腎

二十四種蒸病論

所謂勞蒸者二十四種隨證皆可考尋毛折髮焦脚膚甲錯其蒸在皮　外人覺熱自反惡寒身振瞤劇其蒸在內　髮焦鼻衄或復尿血其蒸在血　身熱煩躁痛如針刺其蒸在脉　爪甲焦枯眼昏兩脇急痛其蒸在筋　脣黑燥大抒酸疼其蒸在骨　背膂疼痛脛骨酸痹其蒸在髓　頭眩熱悶口吐濁涎眼多眵淚其蒸在腦　男子失精女子白淫其蒸在玉房　作寒作熱中脘與膻中煩悶其蒸在三焦　小便赤黃凝濁如膏其蒸在膀

脫 傳道不均或秘或泄腹中雷鳴其蔘在小腸
大腹隱痛右鼻乾疼其蔘在大腸 口鼻乾燥
腹脹睡卧不安白汙出其蔘在胃 口苦耳聾脇
下痛其蔘在膽 裏急後重肛門澁秘其蔘在回
腸 小腹疞痛筋脈縱緩陰器自強其蔘在宗筋
眼昏淚下時復眩暈躁怒不常其蔘在肝 舌
焦黑氣短煩悶洒洒淅淅其蔘在心 唇乾口瘡
胸腹脹悶畏寒不食其蔘在脾 咳嗽喘滿哈痰
吐血声嘶音遠其蔘在肺 耳輪焦拈脚氣酸疼
起居不得其蔘在腎 情想不寧無故泄精白物
緜緜而下其蔘在右腎 心主胞絡心膈噎塞攻
擊疼痛俛仰煩寃其蔘在鼻諸證雖日不同其根
多有出齒其心肺治之不可不絶其根也

神仙秘法

取傳屍勞出服此藥須先擇良日焚香
禱祝令病人設榻西向福德方服即有神効不固
便病人知其藥味及子細

青桑皮 揚柳枝 梅枝
桃枝 已上要取東引者合七莖 葱白七莖
青蒿 一握如無以子代 真安息香 一分去石研
阿魏 一分

右八味除阿魏外用童子小便一升半煮取藥
耗及一半去滓將藥汁化阿魏再煮十數沸去
滓候温作二次調下件藥末
朱砂 半兩 小檳榔 半兩 麝香 半分

右三味研令極細分為二服用前湯便調下五更初一服三點再一服辰時間取下虫遂絶根本若見虫色白者此病必差若黑色則已傳入腎經不可救也服藥後只以淡粥補之並不動元氣效驗無比切須秘之世傳勞虫有靈輕易傳之則傷醫者此說殆醫者秘惜其方不可以授人耳要須密重之則無洩慢天機乃起死還生功同造化鬼神護助自有靈效大凡傳屍勞者必須先服此一藥後十五方隨證治不可以槩用藥調治三五箇月再服此取虫藥則永除根本如取下虫色已黑縱服後藥亦無補也然則能使不傳它人

治心胸積氣作胸痛引兩脇痛昏悶不收音声不清虛热上壅作鼻衄方

赤白皮 三分　　枳殼 木通
子芩　　生乾地黄　　白芍藥
甘草 各半兩

右㕮粗末每服三文重水盞半煎至七分去滓温服食後

治伏尿血在心肺時作衄心胸徹背痛方

白芍藥　　生地黄 三兩別搗碎入　　牡丹皮 各一兩　　生犀屑 半兩

右㕮咀每服半兩水一大盞煎至七分去滓温服

調榮衛消痰血止声音治痰嗽方

川當歸　牡丹皮　白芍藥
子芩　木通　麥門冬
甘草　華陰細辛各半兩　生乾地黄一兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓温服

鷄蘇圓　治虛热昏昌倦怠下虛上壅嗽血衄血

鷄蘇葉半斤　黄耆半兩　甘草
川芎各一分　防風一兩　苦梗半兩
荆芥穗一兩　甘菊苗一分　真腦子半錢
生乾地黄半兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一圓用麥門冬去心煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒热小便赤澁加車前子一分每服一圓煎棗枝湯嚼下日可六七服棗枝剉炒香每用水三盞煎至一盞去滓下藥

防風湯　治勞气食後身疼倦夜間盜汗此病因失血榮衛損也

黄耆一兩　白芍藥　防風各三分
甘草半兩　當歸　生乾地黄各三分

右吹咀每服三錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分去滓温服食前服

温金散　治勞嗽

甘草　黄芩　桑白皮
防風各一兩　杏仁二十七粒製　人參去蘆
茯神各半兩　麥門冬一方

以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯神麥門冬三味同為細末每服二錢水一盞蜜一豆大煎至八分食後温服

治勞嗽有四滿圓極妙方見勞嗽門

桔梗飲子　治心氣不足解勞倦益血

甘草　黄耆
人參去蘆　麥門冬各一兩　青皮半兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分温服

瓜樓湯　治胷痺

枳殼四箇　厚朴　薤白各一兩
瓜樓一箇　桂枝一兩有蘇此二味

右㕮咀水七升煎取四升去滓温服

子芩散　凉心肺解勞除熱便宗衛順血不絶

黄耆一兩　白芍藥　子芩
人參　白茯苓　麥門冬

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三盞薑三片煎至水一盞半入藥末三錢重煎至七分去滓温服

治積氣壅硬作氣噎胸脇引背痛方

白芍藥 半兩　鼈甲 醋炙　枳殼 去穰麩炒

北柴胡 各一兩　甘草　赤茯苓 各半兩

右㕮咀每服三錢水一大盞薑三片棗一箇並至七分去滓温服

治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心胸作痺痛引脇背痛院膈滿悶方

鬼臼　天門冬 去心各一分　巴豆 一分去皮心炒

莽草　不蛀皂角 酥炙各半兩

葉子雄黃 一兩

右為細末煉蜜為圓如小豆大每服一圓漸加至三二圓空心湯水吞下臨卧一服常宜斟酌勿令泄瀉忌鯉魚山猪蘆笋

出声音方

訶子 炮去核　木通 各一兩　甘草 半兩

右㕮咀用水三升煎至升半入生地黃汁一合再煎數沸放温分六服食後日作半料

治咽喉痛方

百藥煎 去星皮　鵬砂　甘草

生白礬 等分

右四味為細末每服一錢食後米飲調細細呷嚥

治肺間邪气胷中積血作痛失音 含化圓方

蛤蚧 一雙去口足炙　訶子 去核　阿膠 炒

麥門冬 去心　北細辛　甘草

生乾地黄各二兩

右為細末煉蜜為圓如雞頭子大食後含化一圓已上諸方辰州李倅景温録示云傳之於五羊大師方侍郎上務下德

治瘵疾得効方

河車圓

治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等疾

河車一枚初生男子者尤良於長流水中湯洗尽血淨入鐺内熟煮以手擘成小片焙乾須在一日内便碾成末若一不乾碾不成末矣按本草云人肉治瘵病胞即衣胞生者尤佳主血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹内諸疾漸漸瘦悴者以五味和之如點鹽餌法與服之勿令病者知亦治天行熱瘧立効胞衣埋地中七八年化成水澄清如真水南方之人以丑草升麻和諸菜服罐盛埋之三五年挽之此為藥服

雪白茯苓半兩　棟參一兩　乾山藥二兩

右為細末麪糊為圓如梧桐子大以少麝香末為衣每服三五十圓未圓未飲温酒鹽湯送下空心服嗽甚者五味子湯下

又方治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧一雙全者酒炙　知母　貝母去心　人參去蘆　甘草　杏仁去皮尖麩炒　枇杷葉去毛炙　鹿角膠炒

右各一兩依方事治淨秤為末每服三錢水一盞入桑白皮並至八分温服日三夜二

補肺湯

治勞嗽

桑白皮　熟地黄各二兩　人參去蘆　紫菀　黄耆　川五味子各一兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分入蜜少許食後温服

又 四君子湯 加秦艽黄蠟煎服尤妙

辰陽李倅云已上藥方乃趙世則傚之次子公瑛並服此乃安傳之仲象屢救人甚驗服藥止可食淡煮猪蹄肉仍復先煮熱肉去乞汁再以白湯熟煮仍忌房勞一切生冷魚腥醎毒醃藏等物無不產血俗合藥及煎藥時忌生人孝子婦人雞犬猫畜見仍勿令病人知用藥味大有功效

養正膏 治傳尸出汗取虫辟邪

鼈甲一兩醋炙 青蒿一握 淡豉三七粒

葱白兩莖 安息香一分研 桃柳棗枝各七莖

桃仁四十九箇去皮尖雙仁 天靈蓋一片酥炙

右十味隔在以水一升浸至五更煎至半升再以童便半升同煎取四合又用擣擲一箇為末麝香一錢匕將所煎藥去滓調下至日高二丈時放温頓服以衣覆出汗審看十指汗出如鵝絲五色臭穢汗出後仍瀉下虫狀色物盡甚者旬日再服永効

猪肚圓 治骨蒸勞唐頰赤氣粗口乾遍身壯熱或多虛汗大腸澁秘小便赤黄飲食全少出博濟方

青蒿 鼈甲醋炙 北柴胡

木香 生乾地黄各一兩

青皮半兩 宣黄連二兩

右為末以猪肚一箇洗淨入藥在內繫定蒸令極軟研如泥為圓如菉豆大湯下十五圓空心

日三服忌濕麪毒物

婦人骨蒸勞方論第二

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰傳尸亦謂殗殢亦稱復連亦名無辜丈夫以疰癖為根女人以血氣為本無問少長多深此病內既傷於臟腑外則損於肌膚日久不瘥遂致羸瘦因服治藥過度則傷於脾脾氣既衰而傳五臟脾初受病或脹或妨遂加洩痢肌肉瘦瘠轉增痞黃四肢無力飲食少味脾既受已次傳於腎腎既受病時時盜汗腰膝冷疼夢鬼交侵小便赤黃腎既受已次傳於心心既受病往往忪悸或喜或嗔兩頰常赤唇色如朱乍熱乍寒神氣不守心既受已次傳於肺肺既受病胸滿短氣唾嗽多唾皮膚甲錯狀如麩片肺既受已次傳於肝肝既受病兩目昏暗脇下妨痛不欲見人常懷怒怒五臟既病漸漸羸瘦即難療也

天靈蓋散 治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即熱兩頰紅色食飲不下心神煩躁

天靈蓋 酥炙　安息香　地骨皮
當歸　山梔子仁　人參 去蘆
貝母 去心　黃連　桃仁 去皮尖雙仁麩炒黃
檳榔 各一兩　鱉甲 醋炙　地柴胡
生乾地黃　赤茯苓　麥門冬 各一兩半
阿魏

右為粗末以童子小便一大盞桃柳枝各七寸薑五片葱白五寸葉四錢煎至七分去滓温服

獺肝圓 治婦人骨蒸勞热體瘦煩疼不欲飲食

獺肝 一具　鱉甲 醋炙　北柴胡 半兩　朱砂　桃仁 去皮尖雙仁麸炒黃　天靈蓋 酥炙　犀角屑　川升麻　地骨皮　知母 各一兩　赤茯苓 三分　黃耆 三分　甘草 半兩　麝香 研一分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大温水下三十圓無時候

黃耆圓 治婦人骨蒸煩热四肢羸瘦疼痛口乾心躁不得眠卧

黃耆　麥門冬 去心　茯神　地柴胡　甘草　生乾地黃 各一兩　酸棗仁 炒　郁李仁　杏仁 去皮尖雙仁麸炒黃　枸杞子　人參 去蘆　黃芩 各三分　百合　枳殼 去穰麸炒　赤芍藥　知母 各半兩　鼈甲 製二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大清粥吞下三十圓無時候

煞鬼圓 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼气伏連 已上出聖惠方

麝香 三分　犀角屑　木香　白朮 各一兩　鬼箭羽　虎頭骨 酥炙　天靈蓋 酥炙　辰砂　桃仁 去皮尖雙仁麸炒黃

雄黃半兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大溫水下二十圓此藥亦辟瘟疫亦可帶之

鼈甲煎 治勞 見專治婦人良

雄鼈一箇重一斤者 杏仁去皮尖雙仁炒 北柴胡 貝母去心 知母各四兩

右除鼈外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將治鼈在中以藥和停圓定上用板子不壓定令鼈在藥內喫酒藥候未日却以慢火煮候酒尽為度却取鼈令患人喫尽次將鼈甲用醋炙黃入在前項諸藥內焙乾為細末用酒煮麪糊圓如梧桐子大用朱飲吞下三十圓無時候日五服

麥前散 治少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心胸煩躁

赤茯苓 當歸 乾漆生 鼈甲醋炙 常山 大黃煨 北柴胡 白朮 生乾地黃 石膏酪一 甘草半兩

右為細末每服二錢水一錢小麥五十粒並至六分食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩

蘇東坡云此黃州吳判官方療骨蒸黃瘦口臭耶熱盜汗極效麥並散甚多此方吳君室之如希世之珍其効可知

箇骨並 治諸虛勞疾羸瘦之力腰背引痛心煩喘

嗽唾膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨胸滿氣促痰多
盜汗髮焦耳鳴皮膚骨热一切五劳七傷骨蒸等
候並皆療治（詩元林先生方）

地骨皮　粉草　北柴胡
前胡　鳥藥　麻黃（不去節）
乾葛　青蒿　菩提
知母　天仙藤　北黃芩（各一兩）
人參　生乾地黃　秦艽
鼈甲（黃者酥炙半兩）

右㕮咀每服三錢以一盞酒一分猪筒骨一並
炙焦方為四服挑柳枝各七寸杏仁五粒去皮
尖搥碎煎至七分去滓温服加烏梅半箇尤妙

（方加當歸白芍藥）

華佗方大靈治傳尸（明日丹方）

雄黃（水香各半兩）　天靈蓋（炙一兩）
輕粉（一分）　鼈甲醋炙（一兩）　兎屎（二兩）

右為末用法酒一大升大黃半兩為末熱膏入
前藥為圓如彈子大朱砂為衣傳尸劳服瘦面
黃嘔吐咳嗽不定先燒安息香令烟出吸之不
嗽非傳尸也不可用此藥若烟入口咳不能禁
止乃傳尸也宜用此藥五更初服勿令人知以
童便共酒一盞化一圓服如人行十里久必吐
出虫狀如煌心細長及寸或如爛瓜李又如蝦
蟇狀各不同未効次日再服以應為度

明月丹 蘇沉良方治諸勞

兎糞四十九枚 硇砂如兎屎大四十九枚

右細研生蜜圓如梧桐子大以丑草半兩碎之水浸一宿取汁三更初下七圓勿令病人知勞藥下後頻看若有虫急打殺以柔火油煎便焦棄危水中三日不下更服須在月望前日服忌見喪服色衣婦人描丈之類後服治勞補氣藥

取差 沉內翰云感愍孫元規藏此方數能治人江陰萬融病勞四體如焚重困一夜夢人心骨皆服月如大盤明爛不可正視逼人之遂差問其名則乃感愍便人遣之樂服之體此丹也始悟向之所夢大治寒熱躁骨熱皆能治療一方有鵬砂等方

解勞生肌進食治血養心 地黃煎圓 有人云甚效 華佗方

生地黃汁 杏仁汁 生薑汁

藕汁各一升 薄荷汁 鵝梨汁各一升

法酒一升 沙蜜四升

右慢火熬成膏入後藥

北柴胡去蘆二兩 木香 人參

茯苓 遠志去心 山藥 柏子仁去皮炒研

秦艽 熟地黃洗焙酒蒸四兩 枳實去皮麩炒 白朮各一兩

苦梗並去蘆各二兩 麝香半兩研

右為末以前膏子和圓如梧桐子大食後甘草湯下二十圓

治骨蒸寒熱名醫錄云睦州楊寺丞有女事鄭迪功女有骨蒸肉热之病時發外寒寒過內热附骨蒸盛之時四肢微瘦之趺腫者其病在五臟六腑之中衆醫不痊因遇處州吳醫看曰請為治之只單用石膏散服之體微涼如故

石膏散 方見靈苑方

真石膏 不以多少研令極細

右新汲水和服方寸匕取身無热為度 外臺秘要本草同

青蒿散 治男子婦人肢體倦疲虛勞寒热 靈苑方

青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日曬乾為末每服二錢烏梅一箇煎至七分溫服

青蒿鱉甲煎圓 治骨蒸勞退热解肌進食 出博濟方

九助鱉甲一箇 地骨皮 桔梗 當歸 杏仁 人參 胡黃連 赤芍藥各一兩 木香各半兩 宣連各一分 官桂 麝香一字 酥蜜各三兩

右十四味同為細末用青蒿一斤童子小便五升好酒一升熬青蒿汁約二升已未搗去青蒿不用入酥蜜再熬成膏令後入藥末搜和為圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下未飲亦得日進三服如秋後合時更入桃柳枝七莖此藥甚

妙

五心煩熱附方 逍遥散秦艽散 方見秦艽第六論 第一

五心煩熱頰赤宜局方

逍遥散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忙頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又瘰疬嗽潮热肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓 白术 当歸去蘆酒浸半日微炒 白芍藥 北柴胡去苗一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎生薑一塊切片薄荷一葉同煎至七分去滓热服無時候

枳殼散 治婦人手足煩热夜卧多汗肌肉黃瘁經候不調四肢煩倦心胸滿悶狀如勞气

枳殼去穰麸炒一兩 半夏麴 赤芍藥各一兩 柴胡 黃芩各一兩半

右為細末每服二錢水一盞生薑一塊擘破棗二枚煎至八分去滓温服候五心煩热及身體壯熱潮热退方續服

婦人血風勞气方論第三

夫婦人血風勞者由气血虛損經候不調或外傷風邪或內挾宿冷致使陰陽不和經終否澁腹中堅痛四肢酸疼月水或斷或來面色萎黃羸瘦又有因產後未滿百日不謹將護臟腑虛損百脉拈

竭遂致劳損之疾也血風劳气身體疼痛頭昏目

人参荊芥散 治婦人血風劳气身體疼痛頭昏目
洪心忙煩倦寒热盜汗煩赤口乾痰嗽胸滿精神
不爽或月水不調臍腹疞痛痃癖塊硬疼痛發歇
或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘁
作起作卧甚則著床

荊芥穗 人参 桂心
生乾地黄 北柴胡 鼈甲醋炙
酸棗仁炒 枳殼製 羚羊角屑别名赤
白术各七錢半 川芎 當歸
防風 甘草名平西
右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片煎至

八分去滓热服無時候日二服常服除一切風
虛劳冷宿疾孕婦休服

鱉甲圓 治婦人血風劳气四肢羸瘦疼痛經脉不
利飲食無味漸加虛困

鱉甲 紫菀 桂心
川芎 防風 川牛膝
當歸 一 秦艽 人参
桃仁 琥珀各一兩 麝香一分
黄耆 赤芍藥 蟲虫製
水蛭製 鬼箭羽 白术
羌活各一分 熟乾地黄兩半
右為細末煉蜜圓如梧桐子大食前温酒吞下

三十圓

琥珀圓 治血風虛勞上熱下注或發動即心中煩燥因之無力不美飲食醋心口瘡月水不調肌肉黃瘠腹痛腸鳴或有氣塊攻衝或時作寒壅頭旋痰逆手足麻痺大宜常服 出博濟方

琥珀　當歸　木香
川芎　防風　檀榔各四分
三稜炮　乾薑炮　桂心各五分
吳白朮洗　茯苓　人參各二分
青皮　附子炮　吳茱萸洗泡炒黑　全蝎炒
柏葉　草豆蔻　赤芍藥
白芷各三分　桃仁去皮尖炒

敗龜醋炙　鱉甲各六分　天麻三分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每日空心酒下二十圓午前近晚更進一服如覺晚近晚不須服如腹內塊積攻築於鱉甲桃仁檳榔三稜各加一倍為妙忌生冷蕓薹菜毒魚等物

香甲散 治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃瘠多困減食遍身疼疼真邪相擊心腹攝疼

木香　乾薑各一分　鱉甲醋炙二兩
牡丹皮　赤芍藥　橘紅
桂心　人參　茯苓
熟地黃　秦艽　茺蔚
白朮　當歸炒　附子炮去皮各一兩

丑草半兩

右為粗末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分去滓搗熟服如煩渴心躁入烏梅一兩同杵為末

地黄煎 治婦人血風勞心忪發热不退出經驗方

生乾地黄　熟乾地黄

右二味等分為細末用生薑自然汁入水相和打糊為圓如梧桐子大每服三十圓用地黄湯下或只茅酒醋湯下亦可食後日三服覺臟腑虛冷早間先服八味圓一服不可諸地黄性冷泪沁懷脾大腎陰虛則發蓋地黄補陰精血也

荊芥散 治血風諸般疾產後並宜服食之服諸疾除去

荊芥　人參兩合半　羌活　大腹子　白茯苓　半夏　附子炮　白芍藥　乾薑

崔腦芎各三兩　桂心　防風　甘草　枳殼　杏仁　乾地黄　北柴胡　本香各半分

當歸　牡丹皮　苦梗　蒲黄　厚朴　款冬花各三分　鼈甲　黄耆各一兩　沉香一分

右為細末每服二錢薑三片棗一枚水一盞並至七分溫服

荊芥煮散 治婦人血海虛冷手足煩疼頰赤口乾背胛勞倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進退血經不調多驚盜汗胸膈不快但是風勞氣冷並皆治之

荊芥穗四兩　地骨皮　柴胡　秦艽
白芷　黃耆酩二兩　當歸
蕺茂　川芎　麥門冬
白茯苓　人參　白芍藥
沉香　海桐皮　枳殼
熟地黃　酸棗仁
木香　甘草
白豆蔻　檳榔各一兩　鱉甲製
右為細末每服二錢薑錢三片烏梅一箇煎至七分無時溫服如極虛去檳榔每日兩服臨卧服尤佳忌生冷動風酥物服有顆塊服之便消

如聖散 治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食無味胷膈不利或產前產後受病並可服之

地柴胡　白茯苓　甘草
熟地黃　人參　當歸各一兩
鱉甲　胡黃連　沉香
知母各半兩　桑寄生　乾葛各三分
右為細末每服二錢水一盞烏梅一箇棗二枚

麥門冬數粒煎至八分無時候

乞力伽散 治血虛肌熱又治小兒脾虛羸熱羸瘦不能飲食

白术　白茯苓　白芍藥各一兩　甘草半兩

右為細末薑棗煎二錢服

油煎散 治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲食日三服

川烏　海桐皮　地骨皮　五加皮　桂心　牡丹皮　陳橘皮　白芍藥　川芎　當歸　烏藥　白芷

蕤蕤等分

右為末每服二錢水一盞入油麻半三四點煎至七分溫服無時候

大效油煎散 治血風勞氣攻疰四肢腰背疼痛嘔逆酸心不思飲食日漸羸瘦面色痞黃手足麻痺血海乏敗服此神效

五加皮　川烏炮　芍藥　海桐皮　牡丹皮各一兩　桂心　乾薑　川芎各半兩

右為細末每服二錢水一盞油浸錢一文同煎至六分溫服常服以油浸二錢煎藥時不可攪喫藥時不可吹局方亦有

油煎散 方見和劑

四白散子 亦妙 見四物湯 治血風劳方

牡丹皮 地骨皮 防風 白芷 里豆 甘草 白芍藥 各一兩 荆芥穗 二兩 川芎 一分

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一箇葱白一寸並至八分温服無時候

香甲散 治熱病後虛劳或四肢倦怠脚手疼痛飲食無味肌膚黃瘦或熱瘧盜汗頭暈虛煩此藥久服駐顏其妙不可具述

鱉甲 三兩醋浸去裙襴炙七次 黃耆 當歸 木香 人參 羌活 川芎 泥香 肉豆蔻 酸棗仁 附子 檳榔 大腹子 各半兩 北柴胡 兩半 厚朴 川牛膝 白茯苓 各一兩 桂心 半兩 奉芫

右㕮咀每服五錢水一盞生薑三片烏梅一箇煎至八分去滓温服日三服空心忌生冷麪食鷄肉鮓醬之類

馬鞭草散 治血風攻透肢體疼痛或覺瘰痒或覺痺麻作寒作熱飲食減味並皆治之 已上出專治婦人方

馬鞭草 去根粗 北柴胡 烏梅肉 各二兩 枳殼 白术

羌活　白芍藥各一兩　秦艽
天台烏藥　麻黃半兩　木香半兩
當歸　川烏炮　甘草各一兩

右為細末每服二錢水一盞生薑二片棗一枚
蔥白二寸煎至七分日午臨卧温服常服無忌
有孕莫服

婦人風虛勞冷方論第四

夫婦人風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫
人將摂復理則血氣調和風寒暑湿不能為害若
勞傷氣血便致虛損則風冷乘虛而干之或客於
経絡或入於腹内其経絡得於冷則氣血凝滯不
能自温於肌膚也腹内得於風冷則脾胃氣弱不
能消於飲食也隨其所傷變成疾病若大腸虛者
則變下利若風冷入於子臓則令藏冷致令無子
若搏於血則涩壅亦令経水不利斷絶不通也

澤蘭散　治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘
急體瘦無力経候不調飲食減少

牡丹皮　赤芍藥　柏子仁
續斷各半兩　麝香一字　澤蘭葉二兩
當歸　延胡索　桂心
附子炮　川牛膝　川芎
桃仁　乾漆炒　琥珀
沒藥　木香各三分

右十七味為細末每服二錢温酒調下

紫石英圓 治婦人風虛勞冷絰候不調四肢羸弱不能飲食

紫石英　熟乾地黄　白石英各二兩　白芍藥　桂心　續斷　木香　當歸　白朮　乾薑　白薇各半兩　川芎　川牛膝　北味子　人參各三分　椒紅炒　附子炮　黄耆各一兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓温酒吞下空心服

婦人冷勞方論第五

夫婦人冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾宿冷致令飲食不消腹内積聚臍下冷痛月候不調骨節疼痛手足無力服膚羸瘦面色痞黄故曰冷勞也

桃仁散 治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢羸瘦不思飲食

木香　訶子　白薑　桃仁　人參各半兩　陳皮　琥珀　桂心各一兩　赤芍藥　延胡索　赤茯苓　川牛膝　當歸　白朮各三分

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗至七分去滓空心温服

木香圓 治婦人冷勞經脉不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加羸瘦

木香　琥珀　吳茱萸炮
當歸　杜丹皮　赤芍藥
三稜　附子炮　延胡索
川芎各三分　乾薑　人參
桂心各半兩　北柴胡　白术
鼈甲醋煮去裙襴炙　厚朴　熟地黄
陳橘皮各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心温酒下

熟乾地黄圓 治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色憔黄四肢無力月候不調少思飲食

乾熟地黄　鼈甲　陳皮各一兩
北五味子　當歸　川芎
桂心各半兩　川牛膝　人參
白芍藥　白术　附子
白茯苓　黄耆各三分　甘草一分

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心温酒下三十圓

硇砂煎圓 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疾痛四肢羸瘦不食

鼈甲醋炙　桃仁去皮尖麸炒　木香
五靈脂去砂石炒　當歸各一兩　硇砂二兩醋一升熬成膏

右為細末用硇砂膏為圓如梧桐子大空心温酒下二十圓

查肝散 治婦人冷勞脾胃虛乏大腸轉洩水穀不化四肢羸瘦口內生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥

北柴胡　縮砂仁　蒔蘿　白术
草撥各二分　白芷　陳皮
胡椒　白薑
山茵陳　人參
木香　紫菀　白芍藥
北細辛　桂心酌半

右為細末以猪肝一具去脂膜切如柳葉片以新汲水洗過入蔥白三寸細切入藥末半兩於銚內以新水二大盞入塩醋少許以瓷椀合煮令水尽空心以意食之喫粥飲下食後良久飲暖酒一盞為妙晚食前再服亦佳

查肝散 治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹痛四肢少力積漸羸瘦

白芍藥　川芎　桔梗
厚朴　桂心各三分　陳皮半兩
白薑　當歸　荊芥穗
蒔蘿　胡椒　蕪荑仁
藁本　紫胡　紫菀酌半兩

右為細末每服半兩以猪肝一具用塩醋葱

白石少許相和如尋常煮熟空心任意食之然
後喫温酒二盞尤佳

大香甲圓散 治婦人血臟風虛冷氣肌肉黄瘦飲
食進退經候不調心腹多脹漸寥如勞補血海調
气

鼈甲醋炙一兩　沉香　柴胡
人參　川芎　羌活
當歸　附子炮去皮　木香
安息香　桔梗　茯苓
藿香葉　陳橘皮　牡丹皮
三稜　厚朴薑汁炙　桂心
桃仁麸炒去皮尖　牛膝去苗各半兩　檳榔

和皮大腹子各一兩
右為細末每服二錢水一盞生薑烏梅各少許
煎至八分温服餘一半更加乾漆炒一分阿魏半分
赤芍藥一分同為末煉蜜圓如梧桐子大空心煎
烏梅地黄湯下二三十圓與散子相間服

新編婦人大全良方卷之五

新編婦人大全良方卷之六

婦人熱勞方論第一

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於气血气血不調臟腑壅滯熱毒積蓄在内不得宣通之所致也其候心神煩躁頰赤頭疼眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思昏沉多卧少起飲食無味舉體痠疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

黄耆散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參　黄芩　當歸各三分
北柴胡去苗平　黄耆　地骨皮

赤茯苓　麥門冬　生地黃
赤芍藥各一兩　甘草一分
右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎六分去滓
温服無時

半夏散 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼
痛或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏　知母　苦梗
人參　赤茯苓　秦艽
赤芍藥　麥門冬　烏梅肉各半兩
鼈甲醋炙　北柴胡　黃耆各一兩
大腹皮三分　甘草一分
右㕮咀每服四大錢水一盞半生薑三片煎
至七分去滓温服無時候

猪肚圓 治婦人热勞羸瘦

北柴胡　赤茯苓　人參
黃耆各一兩　黃連三兩　地骨皮
木香各半兩　桃仁　鼈甲各一兩半
右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪
肚內以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏圓
如梧桐子大食前粥飲下三十圓午食前再服

秦艽散 治血經有热月脉凝滯五心煩倦出婦人經驗方

麥門冬　秦艽各一兩　生地黃
當歸各半兩　地骨皮
蘇木各一分　鬱金

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎
至七分溫服若經脉調不用紅花忌酒與熱物
此方可服一年

婦人客熱方論第二

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實實則生熱虛則受
邪邪熱加人陰陽治熱自相乘也今云客熱者是
體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客
熱其狀上焦胸膈之間虛熱口躁心煩手足壯熱
者是也

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

麥門冬　北柴胡　赤茯苓各一兩
羚羊角屑　赤芍藥　桑白皮

黃耆散 治乾地黃　甘草酩半三
右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去滓
溫服無時候

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑　赤芍藥　地骨皮
紅花　甘草酩半兩　北柴胡一兩
黃耆一兩半　麥門冬　人參
枳殼　赤茯苓各三分
右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片煎七分去
滓無時溫服

黃耆散 治婦人客熱心胸壅悶肢節煩疼不思飲
食

生乾地黄　黄耆各一兩　犀角屑
甘草　瓜蔞子仁　黄芩各半兩
人參　茯神各三分

右為細末每服二錢水一中盞淡竹葉五片煎
至七分温服無時候

婦人寒熱方論第三

經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫
婦人勞傷氣血虛弱令陰陽交爭虛實不調故令
寒熱如瘧也

地骨皮散 治婦人血風氣體虛發歇寒熱

地骨皮　北柴胡各一兩　桑白皮
枳殼　前胡　黄耆各三分

白茯苓散 五加皮　人參
甘草　桂心　白芍藥各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分
去滓温服無時候

生地黄散 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思
飲食

生乾地黄　北柴胡各一兩　桂心
羌活　木香　羚羊角屑
防風各半兩　酸棗仁　黄耆
白芍藥　白朮　當歸
川牛膝
枳殼各三分　白茯苓

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓温服空心

柴胡散 治婦人寒热體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡　黄耆　赤茯苓
白朮 各一兩　人參　地骨皮
枳殼 製　生乾地黄　苦梗
秦白皮　赤芍藥 各三分　鼈甲 各二兩
麦門冬 三兩　甘草 半兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓温服無時候

荆芥散 療時气風温寒熱瘴瘧往来潮热並宜服之

陳皮　麻黄　香附子
甘草 各一兩　荆芥穗　厚朴 各二兩
草果仁　川白芷　桂心 各半兩

右㕮咀每服二錢水一大盞薑三片棗兩枚煎至七分去滓温服無時候

寡婦寒熱如瘧方論第四

論曰寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與楮澄略而論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦猶陰無陽欲男子而不可得是以慽慽成病也易曰天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生孤陽猶陰可乎夫既處閨門慾心萌而不

遂致陰陽交爭作寒作熱有類瘧疾久則為勞又有經閉白帶疾逆頭風膈氣痞悶面黧瘦瘠等證皆寡婦之病診其脉猶肝脉弦出寸口而上魚際究其脉原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

生地黃圓 許學士云有一師尼患惡風體倦作寒作熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇子診視之曰三部無寒邪脉但厥陰肝脉弦長而上魚際宜服柳陰等藥子製此方治之愈

地柴胡 秦艽 黃芩各半兩 生地黃二兩 赤芍藥一兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大烏梅煎湯下三十圓無時候日三服 許學士云嘗讀史記倉公傳載齊北王侍人韓女病腰背痛作寒作熱畏醫皆以為寒熱病也倉公曰病得之欲男子而不可得也何以知欲男子而不可得診其脉肝脉弦出寸口是以知之又有婦人熱入血室寒熱如瘧一證在本卷第十論

婦人惡寒方論第五

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脉必浮數發於陰者宜溫裏脉必沉細又有汗後利後惡寒及皆惡寒已上疾證方治並載百問不復繫引僕嘗治一婦人但惡寒別無他證六脉平靜遂用敗毒散而安此藥能去表中風邪

故也經云惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可過但去被撤火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣

敗毒散 見風方

婦人血風煩悶方論第六

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之搏於血使氣不宣而否滯則生於熱或肢節煩疼口乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

川烏頭圓 治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心煩熱或即頭面浮腫頑麻

川烏頭一斤用好清油鹽各四兩一處於銚內炭火炒不住手攪候製者仍須如桑根色為度逐旋取出竹於新瓦上或不裂者不用裂者則去皮尖臍揀生

五靈脂去土石淨四兩

右為細末更入臼中或乳鉢內研令停後將蒸餅水浸後却瀝去水漸漸入臼中和杵直待圓得即圓如梧桐子大空心溫酒或鹽湯下二十圓忌動風物丈夫風疾亦治

赤芍藥散 治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草各一兩 柴胡一兩半

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚

同煎至七分温服食後臨卧

酸棗仁散 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁

喫食減少

酸棗仁　赤芍藥　當歸

羚羊角屑　赤茯苓　紅花

生地黄各三分　防風　羌活

川牛膝　麦門冬　桂心

川芎　地骨皮　甘草半兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑三片薄荷少許煎

七分温服

當歸散 治婦人血風潮熱

當歸二兩　芍藥　延胡索

木香　桂心半兩　熟地黄一兩　大黄三分蒸

甘草一分

右為細末每服二錢水一盞胭脂一小角子煎

至六分去滓如躁時放冷服細呷清者

婦人血風攻脾不能食方論第七

夫脾象於土脾為中州意智之藏也其肝心肺腎

皆受脾之精气以榮養焉脾與胃為表裏脾主化

穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃气為

本也婦人血气不調臟腑劣損風邪冷气蘊蓄在

内攻於脾胃脾胃既虚為邪所乘則不能推伏五

穀故令不能食也

草豆蔻散 治婦人血風冷气攻脾胃嘔逆不納飲

食

人參一兩　草豆蔻仁麩裹煨　半夏各三分　良薑

白茯苓　白术　縮砂仁　枇杷葉去毛炙

桂心　木香　青皮

甘草各半兩

右為粗末每服三錢水一大盞薑三片煎至七分去滓溫服無時候

神麯圓 治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

白术　附子炮　枳殼製　人參

訶子　桂心　陳皮各一兩

木香　食茱萸泡

右為細末以酒煮神麯末二兩作糊為圓如梧桐子大每服二十圓空心薑湯吞下

椒紅圓 治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷全不入食臍腹多痛體瘦無力

椒紅　沉香　附子炮

莪茂　訶子　當歸

白术各一兩　良薑　白豆蔻仁

丁香各半兩　麝香一分

右為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大空心溫酒下三十圓

進食散 李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人

苦楝　乾薑各半兩

右為細末以酒煮神麯末二兩作糊為圓如梧桐子大每服二十圓空心薑湯吞下

脾胃虛至不入食者呂兩服能食出良方蘇沉攄愚見
此方既有川烏治血風攻脾不食豈無良驗
青皮　陳皮　枳殼　川烏炮去皮尖各一方
良薑　桂心各一方
草豆蔻仁各三箇　訶子五箇
右為細末每服一錢水一盞薑二片煎至七分
温服

婦人夢與鬼交方論第八

夫人稟五行秀氣而生承五藏神氣而養若陰陽
調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝理失
節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪于其正然婦
人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病
也其狀不欲見人如有對憑時猶言笑或時悲泣
是也脉息遲伏或如鳥啄皆鬼邪為病也又脉來
綿綿不知度數而顏色不變此亦是此候也

茯神散　治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語
雜亂
茯神一兩半　茯苓　人參
石菖蒲一兩半　赤小豆半兩
右㕮咀每服三大錢水一盞煎至六分去滓食
前温服

桃仁圓　治婦人與鬼魅交通
辰砂　檳榔　當歸
桃仁各三分　水銀一分棗內研令星盧

麝香　阿魏煨裹　沉香各半

右為細末煉蜜圓如梧桐子大空心桃仁湯吞下十圓

辟瘟丹　治證同前

虎頭骨二兩　朱砂　雄黃

雌黃　鬼臼　皂莢

益夷仁　鬼箭　藜蘆各一兩

右件生為末煉蜜為圓如彈子大囊盛一圓男左女右纏臂上及用一圓當病人尸前燒之一切邪鬼不敢近

大乙神精丹　蘇合香圓皆可用也

婦人傷寒傷風方論第九

論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣口緊成即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通決然汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也

小柴胡湯　主之若行湯遲則熱入胃令津燥中焦上焦不榮成血結胸狀須當針期門也五行相尅以生相扶以出平居之日水常養於木水木相生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜

忘小腹滿小便利屬抵當湯證也傷寒宜下慎之婦人熱入血室可下證也雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先調气婦人先調血此大略之詞耳要和脉緊無汗名傷寒脉緩有汗為傷風熱病脉洪大中暑脉細弱其證一也假如中暍用白虎胃實用承气宜必調血而後行湯邪仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在学者皆可隨病於男子藥證中以意選用也○若姙婦傷寒藥性須凉慎不可行桂枝芊夏桃仁等藥小柴胡去芊夏名黄龍湯蓋為姙婦而去也大抵產前先安胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法○黄帝問婦人重身毒之宗何岐伯曰有故無殞亦無損也大積大聚其可犯衰其太半過其厄○男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書猥仲景所撰而主叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列為一卷雖不足以尽婦人傷寒之詳並可以百問中参用也

桂枝紅花湯

治婦人傷寒發热恶寒四肢拘急口燥舌乾經脉凝滯不得往来宜服

桂枝　芍藥　甘草各三

紅花二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑四片棗二箇煎

至七方去滓温服良久再服汗出而解

黄芩芍藥湯 治婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黄芩　白芍藥　白朮
生乾地黄

右各一両吹咀每服五錢水一盞煎至七分去滓温服寒則加生薑

當帰湯 治婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下

柴胡三両　白朮二両　人参
甘草　赤芍藥　當帰各一両
五味子　木通各半

右吹咀每服半両水一盞半生薑四片棗二枚煎至八分去滓猶熱服

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩燥譫語目赤毒气閉塞不得通宜**瀉心三黄湯**

川大黄　鼠尾黄芩　鴈爪黄連等分

右為粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓温服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉用之餘气

婦人傷寒差後猶有餘气不去謂之遺熱宜**乾地黄湯**

乾地黄一両　大黄　黄連
黄芩　柴胡　白芍藥

甘草 各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服取漐利汗出解

男子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其證裏急腰脊及腹內痛身重宜 燒棍散

用男子棍襠燒灰為末以水調方寸匕服即愈

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘急搐搦如中風狀宜 青竹茹湯

括樓根 二兩 淡青竹茹 半斤

右以水二升半煎取一升二合去滓分作三服

婦人病未平復因有所動小腹急痛腰脊疼四肢不任羸動無力奔熱者宜 當歸白朮湯

桂枝 白朮 當歸 人參 甘草 各二分 芍藥 生薑 半兩 生附子一箇秤作八片名方

右㕮咀以三升煮取一升半去滓通口服一湯盡食頃再服溫覆微汗差

婦人熱入血室方論第十

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦宜 小柴胡湯

婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀宜服小柴

胡湯

柴胡八錢重　黄芩　人參

生乾地黄　甘草各三錢重　半夏二錢重

右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片棗二枚並至八分去滓温服

局方四物湯不用熟地黄只用生乾地黄加北柴胡等分亦服亦療此證

婦人傷寒經脉方未初斷寒热如瘧狂言見鬼宜服乾薑柴胡湯

柴胡四兩　桂枝半兩　栝樓根

牡蠣　乾薑　甘草各一兩

右㕮咀每服五錢水盞半並七分去滓温服初服微煩再服汗出而愈

婦人傷寒血結胸膈掾而痛不可撫近宜海蛤散

婦人血結胸法當針期門仲景無藥方此方疑非仲景然其言有理姑存焉

海蛤　滑石　甘草各二兩　芒硝一兩

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胸膈血散膽中血聚則小腸壅小腸既壅則膽中血不流行宜此方小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈

婦人傷風發热惡寒經水適來得七八日熱除脉遲身凉和胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱入

血室也當刺期門穴隨其實而取之期門穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當刺期門不用行子于法恐纏藏膜引气上但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也

婦人咳嗽方論第十一

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒热風湿所得也肺為四臟之華蓋內統諸臟之气外合於皮毛若為寒热風湿所傷邪气自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脉息辨之其脉浮而弦者起於風濡而弱者起於湿洪而數者起於热遲而涩者起於寒風者散之湿者燥之熱者凉之寒者温之虛者補之未有不安者也

咳嗽用温藥方論第十二初虞世

經曰微寒為嗽寒其為腸澼古人立方治嗽未有不本於温藥如乾薑拄心細辛之屬以寒气入裏

非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬為肺疾又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥气內焚肺金受邪脉數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見發熱咳嗽率用柴胡鼈甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非可為深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯圓委曲調治無為鹵莽致傷人命

治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾 黃耆散

黃耆四兩 甘草二兩

右為細末湯點一二錢服日三 一方甘草一兩黃耆六兩各黃耆六一湯只吹咀水盞服

蛤蚧圓 治婦人咳嗽不止漸成勞气宜服

蛤蚧一對酥炙 紫菀 款冬花

鼈甲炙 童二兩見母 皂莢子仁各一兩炒

杏仁炒去皮尖一兩半

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓淡薑湯吞下

含化圓 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞服此安冠宗爾方

枇杷葉去毛 桑白皮 款冬花

木通 紫菀 杏仁名等方

大黃 煨半

右為細末煉蜜圓如櫻桃大食後夜卧含化一圓

貝母湯 治諸嗽久不差出本事方

貝母生薑汁浸半日 北五味子 黄芩 乾薑熟煮減半 陳皮各一兩 半夏 桂心 北柴胡甄者加一半各 桑白皮半兩 木香 甘草各一分

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七箇去皮尖碎之生薑二片並至七分去滓熱服黄師文云戊申冬有姓蔣者其妻和年嗽製此方授之一投而差以此治諸嗽悉皆愈

定喘湯 治犬支婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎聲胷滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽声重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏麴炮 明阿膠炒 甘草炙各半錢 北五味子 桑白皮 蠶栗殼半兩製 麻黄去節 人參各一分

右㕮咀每服三大錢薑三片烏梅半箇煎至七分去滓漸漸湿服食後臨卧服方同和劑方兩加減不同有效又名清金湯

滄州李官人宅補肺湯 治狀同前

蠶栗殼二兩製 人參 粉草各半兩 陳皮 茯苓 杏仁製 白术 明阿膠炒 北五味子

桑白皮　薏苡仁　紫蘇葉各一

右㕮咀為末每服三大錢水盞半薑三片棗兩枚烏梅半箇煎至一盞臨卧温服僕每用則無效遂加百合貝母去心半夏麻黄冬花各一兩服之良驗

金不換散　治男子女人肺冒虛寒久嗽不已喘促滿悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠年日近一切喘咳痰諸藥不效者並治之

罌粟殼半兩製　杏仁製　甘草各三錢

右㕮咀每服三錢水一盞半薑三片烏梅半箇

前至八分食後臨卧漸漸熱服許元林先生方七卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽不已服諸藥無效漸成勞瘵求余診之六脉濡弱以愚考之此是血弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸等藥治之必愈遂先用古今錄驗橘皮湯空心服藥手摩气湯後用金叙煎熟地黄四當歸四調理得安人治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參薑棗只加北五味子煎服愈

古今錄驗　橘皮湯　療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲上气不得下頭痛方

陳皮　紫菀　麻黄去根

杏仁　當歸　桂心

甘草　黄芩各等分

右㕮咀每服五錢水盞半煎至一盞去滓熱服

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛
凡咳嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣
合於皮毛邪之初傷先客皮毛故咳為肺病五臟
則各以治時受邪六腑則又為五臟所移古人言
肺病難愈而善卒死者肺為嬌藏怕寒而惡熱故
邪氣易傷而難治以其湯散逕過針灸不及故也
十種欬嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳
支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽
鱉嗽飲嗽邪嗽孫真人亦著方治寒毒注嗽者歷
代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經見
意其華佗所謂邪嗽真人所謂注嗽者是也此病
蓋酒色過度勞極傷肺損動經絡其重者咳唾膿
血輕者時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳注
得之或先嘔血而後嗽或先咳嗽漸訖沉羸此則
非特內損肺經又挾邪惡傳疰之氣所以特甚病
之毒害無過此也真人治注嗽通氣圓方用蜈蚣
四節又云夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外臺
方四滿圓治三嗽亦用蜈蚣遇世名公能推原其
旨意率用蛤蚧天靈蓋桃都枝麝香丹砂雄黃安
息香之類以通神明之藥療之高出古人之意矣
又肺中有虫如蚕令人喉痒而咳嗽湯散逕過鍼
灸不及以藥含化虫死即嗽止見張銳方
澤師瘟五嗽一上氣嗽二飲嗽三鱉嗽四冷嗽五

邪嗽

四滿圓

乾薑　桂心　鄧躅花

芎藭　紫菀　芫花根皮各二方

蜈蚣一枚去頭足炙　細辛　甘草炙　半夏洗各一方

鬼督郵　人參

右十二味為細末煉蜜圓如大豆許每服五圓米飲下日三未知加至七八圓服此藥無不差

忌羊肉餳生葱生菜海藻松菜

古今錄驗四滿圓　療五嗽一氣嗽二痺嗽三鱉嗽四邪嗽五注嗽悉療之方

蜈蚣二枚　芫花根五分熬　鄧躅花炮

乾薑　芎藭　桂心各四方

人參　細辛各二方

右為末煉蜜圓如梧桐子大米飲下一十圓日三服加至十五圓忌生葱生菜

喘滿方論第十四

夫喘之為病黃帝問岐伯岐伯對曰夜行則喘出於腎淫氣病肺有所隨恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則著而為病也原疾之由雖曰皆本於肺與氣然感外邪則有太陽證脉浮無汗而喘者宜麻黃湯陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜承氣湯若表邪未

解誤服下利藥不止脉促喘而汗出者宜葛根黄
連黄芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘
若無大热者宜麻黄杏子甘草石膏湯若表邪去
解心下停水發熱而喘或嘔者小青龍湯去麻黄
加杏仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脉息沉細
或寸大尺小或六脉促疾或心下脹滿結硬或冷
汗自出或大便頻數上气喘促或咽喉不利者此
是本气極虛内外挾寒冷所致便陰寒内消陽气
得復則愈宜返陰丹主之已上方並見百問不復録僕且以大
槩而言之諸藏相乘而喘者以杏子散如感寒伏
熱而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆衣發
喘當傷熱肺實而喘足者其狀多有熱證宜洗心

散治水調服若因气字不調痰盛喘促者宜四七
湯兼官局桔梗湯薑煎服若從多而喘者宜千緡
湯橘皮半夏湯若不得卧卧即喘者此由水气逆
行上乘於肺肺得水則浮而開使气不得通流其
脉沉大宜神秘湯肺之積名曰息賁在右脇下大
如杯令人洒淅寒熱喘咳發癰疽宜枣膏圓若上
气喘者神授湯若上盛下弱而喘促者宜蘇子降
气湯吞黑錫丹若尊年之人素未禀賦大厚不任
熱藥者不可輕投丹劑及諸熱藥但以秘傳降气
湯分心气飲論之梗槩不出於此矣若素有脚气
而喘者當作脚气治之又有骨蒸劳喘自有專門
不敢濫及

神秘湯 治水气奔肺而喘無療支飲而喘

陳橘皮 洗去白　紫蘇葉　人參　桑白皮　生薑 等分

右㕮咀每服半兩水並去滓温服

杏子散 治諸藏相乘喘急

杏仁 去皮尖雙仁麸似黄細研如膏　麻黄根 為細末 等分

右和煎橘皮湯調下二錢無時候

千緡湯

齊州半夏 七枚炮裂破之　皂角 去皮炙一寸　甘艸 炙一寸　生薑 如指大

右同以水一椀煮去半頓服沉興宗待制嘗病喘不能卧人扶而坐數日客有見之曰我會如是得良藥一服差我以千緡酬之謂之千緡湯可試為之興宗得湯一服而差

枣膏圓 療息賁

葶藶 研細　陳皮　苦梗 各等分

右後二味為末入葶藶令得煮肥枣肉研為膏和圓如梧子大每服五七圓飲下　許学士云子掌患停飲水積肺經食已必嗟漸喘覺肺系急服此良驗

神授湯 治上气喘急不得卧

橘紅　苦梗　紫蘇　人參　北五味子 等分

右㕮咀每服四錢水一盞並至六分去滓食後

服

九寶湯 治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒室女產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉 紫蘇 大腹皮洗 桂心

麻黃去根節各四錢 桑白皮 杏仁去皮尖 陳橘皮 甘草炙二兩

右㕮咀每服半兩水一盞半薑十片烏梅一箇並至六分去滓溫服食後 有兩浙張大夫病喘二十年每至秋冬輒劇不可坐卧百方不差後得臨平僧法本方服之遂差法本凡病三十年服此藥半年乃絕根本永不復發凡服此藥須久乃差

官局桔梗湯橘皮半夏湯洗心散華蓋散方並見局方下復錢四七湯親方出尾論僕嘗療羅安人年近六十遇秋冬之交上氣喘促不能坐卧六脉洪實服諸藥無效問疾之原少年自川中任所服餌丹砂又恐是丹毒為害遂服洗心散皆無効僕以華蓋散數服而愈謹記之

婦人風疾方論第十五

夫婦人風疾者由臟腑風冷水飲停積在於胷膈所成也人皆有疾少者不能為妨多者成患但胸膈有疾飲漬於五臟則令眼暈亦令頭眩頭痛也

評曰夫疾之為害多因外感五邪五邪者寒暑燥濕風內

傷七氣（七氣者喜怒憂思驚恐恚也）因五邪而得者得風為風疾得寒為寒疾得冷為冷疾得熱為熱疾得暑為暑疾因七氣所傷者多因婦人情性執著不能容忍而有此證豈特只因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕唾身中溫者敗濁變而成疾乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為疾飲此之謂也然有疾涎飲沫四種相類宜子細詳辨調治因風而生疾者宜服三生飲星香飲（方並見第三卷第一論）青州白圓子化疾圓因寒冷而得者宜服阡氣湯黑錫丹養正丹因熱而得者宜服金沸草散柴胡半夏湯因暑而得者消暑圓（並見局方）因氣宇不調鬱結而成者宜服參蘇飲四七湯二陳湯（方見局方）疾在上者以瓜蔕散吐之在下者以控涎丹利之雖曰可吐可下亦要觀人之勇怯察脉之虛實方可投之切記不宜痛擊暴下所以初虞世有金虎碧霞之戒者此也

三生飲　星香飲　參蘇飲（方並見第三卷第一論）

控涎丹（方見第三卷第七論）　養正丹（方見第四卷第四方論）

旋覆花湯　治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花（去蒂）　枇杷葉（去毛炙）　川芎　藿香　桂心

北細辛　前胡　人參（去蘆）

枳殼（去穰麸炒）　半夏（各半兩）　甘草

羌活

羚羊角屑　赤茯苓各三分

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

天南星圓 治婦人風痰心膈壅滯

天南星　白附子並炮　皂莢仁炒黃

半夏麴各一兩　音磬半兩　拍

右為細末以酒煮麵糊圓如梧桐子大每服十圓生薑薄荷湯吞下

又方

半夏　天南星各二兩　肥皂莢五挺剉

生薑三兩

右以水五升一同煮令水盡去皂莢生薑只用半夏南星焙乾為末以酒煮麵糊圓如梧桐子大生薑薄荷湯下七圓

柴胡半夏湯 治疾熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五嗽疾癖

柴胡八兩　半夏三兩半　人參去蘆　甘草　白朮二兩　黃芩　麥門冬各三兩

右㕮咀每服五錢水盞半薑五片棗一枚煎至八分去滓服

金沸草散 治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋緊急時發寒熱皆類傷風

荊芥穗 半兩　半夏　甘草

北細辛 各二兩　赤茯苓一兩　前胡

旋覆花 各三兩

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗一枚
並至六分熱服未知再服局方有麻黃赤芍為
末無細辛茯苓

瓜蔕散 療病如挂枝證頭不痛項不強寸脉微浮
胷中痞鞕气上衝喉咽不得息者此為胸中有痰
也當吐之宜服此

瓜蔕 炒黃　赤小豆 各半兩

右為細末取一錢匕豉一合湯七合先漬之復
更煮作豉糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少
加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之脉微大忌今人

大半夏湯 吐 治痰飲及脾胃不和

半夏

右㕮咀作一服每遇膈間有寒痰以水二盞煎
至一盞去滓臨卧溫呷如有熱痰加炙甘草一
分如脾胃不和去甘草加陳橘皮一分同煎此
即二陳湯加減得理

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之气結成痰涎狀如
破絮或如梅核在咽喉之間咳不出唾不下此七
气所為也或中脘痞滿气不舒快或痰涎壅盛上
气喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之婦
人情性執著不能寬解多被七气所傷遂致气填

胸膈或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絶產婦尤多此證宜服此劑間以香附子藥久服取効切不可謂榮衞耗氣且謂新產氣血俱虛不肯多服用之効驗不可具述

半夏五兩　厚朴三兩　茯苓四兩　紫蘇葉二兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片棗一箇煎至六分去滓無服無時候若因思憂過當小便白濁用此藥吞青州白圓子極妙

婦人心胸嘈雜方論第十六

夫心胸嘈雜婦人多有此證原疾之由多是疾也皆血液淚汗變成或云是血嘈今人多用猪餘血炒而食之則愈詳其此理是以血導血歸原爾恰如以塩梅下涎之義不若用許學士旋覆花湯治心腹中脫痰水冷氣心下汪津嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇助急腹滿痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉遲弦細是其證也

旋覆花湯方

旋覆花　北細辛　橘紅
桂心　人參　甘草
苦梗　白芍藥　半夏各半兩
赤茯苓三分

右㕮咀每服四錢水盞半薑七片棗五枚至八分去滓溫服

局方治忍阻半夏茯苓湯亦妙方見第十二卷第三論

新編婦人大全良方卷之六

中医药在线