

衛生寶鑑卷第十八

婦人門

調經順氣

加減四物湯治胎前產後腹痛及月事不調或亡血去多或至露不下婦人一切疾證

當飯

白芍 熟地黃

川芎 各二兩

石叻咀每服四錢水一觔半煎至八分去粗帶熟服無時

用進二三服辛帶薑乳服至臘如虛弱者至一月止

加減法

弘前殿聖官
江氏藏書記

松坡圖書印



右劉每服二錢水一火煎燒生薑一塊切破薄芎少許同煎至七分去粗熱服不拘時候
溫經湯治衝任虛損月候不調

阿膠炒

當歸

川芎

人參

肉桂

甘草

芍藥

牡丹皮各二兩

半夏二兩半

麥門冬五兩半

吳茱萸三兩

食前

右劉每服伍錢水一觥半生薑三片煎至八分熱服空心

躁熱

黃芪二兩

人參

白朮各半兩

黃蘗酒製

羌活

甘草各二錢

柴胡

升麻各一錢

當歸一錢半

川芎

吳茱萸各伍分

細辛三分

五味子三拾角

汗出不止加黃蘗半錢腹中不快加炙甘草一錢

右十三味吹咀每服伍錢水二觥生薑五片煎至一觥去

粗稍熱服食前

異方油煎散治婦人血瓜勞氣攻症四肢腰背疼痛嘔吐惡心

不思飲食日漸瘦弱面色痿黃十脚麻痺血海冷敗
常用油浸五七文錢煎菜用

川烏頭炮黃

白芍藥

五加皮

牡丹皮

海桐皮等分

右五味為末每服二錢水一觥油浸開通錢一文煎至六

分去粗溫服日三服不拘時

治血丹治衝任不足下焦人寒臍腹痛月事不勻或來多不

斷或過期不來或崩中去血或帶下不止面色萎黃肌肉瘦

痺肢體沉重背脇脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒

並宜服之

排石

去皮尖趁
炒微黃色

虎杖

桑葉黃

湯浸七遍
焙乾微炒

當飯

杜仲

去麋皮
剉炒

栝子仁炒

附子

炮去皮膽

木香

山茱萸去核

延胡索酒浸

安息香各二兩搗碎入好酒新醴

乾薑炮

肉桂

牡丹皮去粗皮

黃芪

去蘆

艾葉

微炒

澤蘭葉各二斤干

肉蓯蓉

酒浸焙

厚朴

去裏皮薑汁洗令熟各伍斤

右為細末以前安息香入白起同煮作糊和丸如梧桐

子大每服三十丸食前以溫酒下醋湯亦得

滋血湯治婦人血熱氣虛經候澀滯不通致便血聚肢體麻木

肌熱生瘡渾身疼痛將成癩不可妄服他藥但宜以此滋
養運利大便證至前滋益湯同可互觀之

馬鞭草

刺苿櫟 各四兩

牡丹皮 一兩

赤芍藥

枳殼 去穢麩炒

肉桂 去麩皮

常飯

去苗炒

川芎 各二兩

右麩散每服四錢烏梅一箇水二錢煎一餲去粗食前空
心且四五服有此證服至半月或一月經脉自通百病皆

除神效

增頂四物湯治婦人血積

當飯

川芎

熟地黃

芍藥

廣茂

桂

三稜

乾漆炒

右八味等分粗末每三錢水二餲煎一餲食前補熱服
當婦人治婦人經血不調血積證

當歸

赤芍藥

廣茂

熟地黃

京三稜

神麩

百草霜

各二分半

右八味為末酒糊丸如桐子大每服三十九丸溫水送下
食前溫酒亦得

玄明苦練湯治臍下冷撮瘧陰內大寒

甘中... 肉桂... 附子... 各三分

玄明... 苦練子... 熟地黄... 各一分

右以咀八黃藥二分為引用却作一服水四錢煎至一錢
去粗稍熱服空心食前

師尼寡婦吳千妻妾之治

昔宋楮澄療師尼寡婦別製方者蓋有謂也此二種鰥居獨陸
無怙慾心萌而多不遂是以臥臥交辛尔寒尔熱全類溫瘧久
則為勞嘗讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱
眾醫皆為寒熱病治之不瘥倉公曰此病得之欲男子不可得
也假曰何以知欲男子不可得倉公曰診其脉肝脉弦出寸口

是以知文蓋男子以精為主婦人以血為主男子精盛以思室
婦人血盛以懷胎夫肝探血者也是厥臥肝脉弦出寸口上魚
際則臥盛可知矣故知楮澄之言信有謂矣
通經丸婦人室七月水不調疼痛或成血疲

桂心 烏頭 桃仁

當歸 廣茂 干姜 炮

胡椒 妙出 大黃 根 青皮 去白各等分

及右丸味為末每一兩用四錢以米醋熬成膏或餘菜六錢

土... 白中... 下可丸則丸如桐子大每服二... 九淡醋湯

送下加至三十九溫酒亦得一婦人血氣凝滯痛數服便

如

生地黃丸許學士治之尾患風休伏氣寒其面赤
或時自汗是時疲氣大行醫見其寒然像傷寒治之用大小
柴胡湯雜進數日病急予子治之診視之曰三部無
但厥臥法長而上魚際宜服抑臥等茶治之故予製此方

生地黃二兩

柴胡

秦艽

黃芩各半兩

芍藥二兩

右為細末蜜丸如桐子大每服三十九丸用烏梅湯吞下日

三服不拘時

熱地黃丸治婦人月經不調每行數日不止無有白帶斬人瘦

痔飲食少味累年無子

熱地黃

山茱萸

白蘞

干姜

代赭

白芍

厚朴

白僵蚕

右丸味為末煉蜜丸如梧子大每服四五丸酒下食前

日三服

熱入血室證治并方

許學士治一婦人病傷寒熱過夜則見鬼狀所患六七日忽
然昏寐逆響如引鋸牙關緊急眼目不知人病勢危困予視
之曰得病之初曾值月庭米子洪家去徑水方來而病作而徑

遂止得一二日寤寤熱盡雖靜而夜有鬼祟從昨日来不有人
至予曰此乃熱入血室證仲景云婦人中風發熱惡寒經水適
來晝則明子暮則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室予
製以小柴胡湯加生地黃三服而熱除不行而自解矣又一婦
人患熱入血室證醫者不識用補血調氣血藥治之數日遂成
血結皆或勸用前藥予曰小柴胡用已遲不可行也無已則有
一馬可刺期門而矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或者
向熱入血室而為而成結皆也予曰邪氣傳入經絡與正氣相
搏上下流行遇經水適來適斷邪氣乘虛入於血室血為邪所
迫上入肝經肝受邪則讖語而見鬼復入膈中則血結於胸中

何以言之婦人平居水養木血養肝方不受孕則下之以芩月
水既泄則中畜之以養胎及已產則上壅之以為乳汁皆血一
也今邪逐血歸於肝徑乘於膈中結於乳下故予觸之則痛
非茶可及故當刺期門也

小柴胡加地黃湯方亦治產後惡露方來忽然斷絕治人書海

蛤散亦治錄于后

小柴胡湯方 婦人參香附子 小半夏 雞內金 足其詳

黃芩 半兩 日十次 生地黃 各七分

右味咀每服五錢水二盞生薑五片香子一錢煎至一錢

每服去根溫服不換時 治有潮熱之病 亦下血

海蛤散治婦人傷寒血結胃膈揉之痛不可近

海蛤 滑石 甘草 各二兩

右為末每服二錢雞子清調下小便利血散行更与桂枝
红花湯發其汗則愈

半夏茯苓湯治妊娠惡阻

陳皮 桔梗 旋覆花
人參 甘草 白芍藥
川芎 各半兩 亦茯苓 熟地黄 各三分

半夏 二兩一分

右十味到每服五錢水一觥半生姜四片同煎至八分稍
熱服食前次服茯苓丸即痰水消除便能食

茯苓丸治妊娠阻病

芎根 枳實 炒 白朮 各二兩

人參 干姜 赤茯苓

肉桂 陳皮 半夏 湯泡七次 各一兩

右十味為細末蜜丸梧子大每服三十丸溫米飲空心下

食前服

保安白朮散治妊娠傷寒安胎但覺頭疼發熱三二服使效

白朮

白朮 黃芩 等分新用土炒令香

右為末每服三錢水一臈生姜三片枣子二枚煎至七分

溫服

安胎阿散治妊娠傷寒

阿膠炒

桑寄生

白朮

人參

白茯苓去皮等分

右為細末每服二錢煎糯米飲湯調下與時

安胎白朮散補氣衛養胎氣治妊娠宿有食冷胎痿不長或失

將理傷胎多墮

白朮

川芎各四分

蜀椒炒出汗去毒

杜蛭三分

右為末每服二錢溫酒調下空心食前

吳茱萸湯治妊娠傷胎數落而不結實或冷或熱

黃芪

川芎各二兩

吳茱萸

半兩湯泡

右為末每服二錢溫酒調下空心食前忌生冷果實

前胡湯治妊娠傷寒頭疼壯熱腹節煩疾

前胡

石膏各三分

大青四分

黃芩五分 知母一分 梔子仁各四分

右為以胆每服四錢水一錢半甜竹茹一塊葱白二寸煎至八分去滓溫服無時

黃龍湯治妊娠傷寒壯熱頭疼嘔逆不欲飲食腹下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入肥宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞傷餘熱未除

柴胡一分

人參

甘草炙

黃芩各一分

右以胆每服五錢水一錢半煎至七分去滓溫服無時
保安散治妊娠因有所傷胎動疼痛不止不可忍及血崩不止連皮箝砂不以多少一味炒黑去皮為末二錢溫酒一

錢調下若覺腹中熱胎已安矣

立聖散治妊娠下血不止

雞肝二箇酒一打煮熟共食之八散

赤茯苓散治妊娠小便不利及水腫酒人惡寒動轉筋痛

赤茯苓法及

葵子

各半

酒下

右為末每服二錢新汲水調下無時
犀角散治妊娠婦人產前諸疔熱困倦時昏眩

棟木

川羌活

山梔

青黛

冰芽

吳白芷

茯苓去皮各等分

右為粗末每服五錢水一觥

姜三片竹葉五七片煎

至八分去粗溫服食遠

大韋散治妊娠下痢赤白及泄瀉疼痛重死者

黑豆二斗

甘草一斤

粟殼二箇去頂蒂
半生半炒

右為粗末作一服水一觥半生姜三片煎至七分去粗溫

服食前神効

火龍散治妊娠心氣痛

艾葉末

鹽炒

川練子炒

茴香

炒各半兩

右為粗末每服二錢水一觥煎至七分去粗溫服不拘時

聖酒方治妊娠腰痛如折

大豆一味半兩以清酒一觥煎至七分去粗溫服食前

獨聖散治妊娠小便不通

蔓荊子為末每服二錢濃煎葱白湯調下食前日三服

萬應丸治妊娠胎動不安及產後小兒痛不可忍

知母一味去皮炒為末每服一丸清酒

一觥化下食前

雞產

催生丹

麝香別研一字

乳香別研一字

母丁香

取末一分

免腦髓 服月重黃腰研

右拌白以兔腦和丸如雞頭樣大臥乾用油紙密封貼每服一丸溫水下即時產下隨男左女右手中握茱丸出是

驗

榆白皮散治臨產驚動太早產時未至穢露先下致使胎胞乾

燥臨產艱難或曾因漏胎去血並宜服之

冬葵子

榆白皮

瞿麥 各二兩

木通 半兩

大麻仁 去壳

牛膝 酒浸各三分

石六味劉每服五錢水一觥半煎至八分溫服不以時
獨勝散治產難

當歸

川芎 各等分

右劉每服五錢水一觥半煎至八分去粗稍熱服不拘時
犀角飲子治產後亡津液虛損時自汗出乾熱齒唇口乾燥

犀角

麥門冬 各二兩

白朮 各半兩

柴胡 二兩

地骨皮

枳殼 麸炒

甘草 炙

生地黃

當歸

棟參

茯苓 去皮

芩麥

黃芪 各七分

右十三味為粗末每服三錢水一觥半淨小麦七十粒姜
三片煎至七分去粗溫服食前

牡丹皮散治產後寒熱胎下疼痛燥躁神效

牡丹皮 地骨皮 天白烏茶

海桐皮 青皮 陳皮各半兩

右為末入研了沒藥二錢半再羅過每服二錢水一錢煎至七分如寒多熱服熱多寒服食前日三服忌生冷硬滯

醋物

枳殼丸治產後大小便滯

木香 枳殼 麥炒 麻仁炒黃

大黃 各二兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫水送下食後

飲食不化亦宜服之

通和湯治婦人乳癰疼痛不可忍者

穿山甲 炮黃 川木通 各二兩 剉 自然銅 半兩 醋淬七次

右為末每服二錢熱酒調下食遠服之

鍼法治乳癰腫痛諸藥不能止痛者三里穴鍼八五分其痛立

止如神穴在膝下斷外廉筋間拳足取之

涌泉散治婦人因氣味汁絕少

瞿麥穗 麥門冬 去心 王不留行

紫龍骨 穿山甲 炮黃 等分

石五味為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹少許投某

用木梳左右乳上梳三十未梳一日三服食前服三次美
湯投三次梳乳

勝金丹治婦人吹妳極百効

百薑霜一味今梳上髮之垢也不以多少用無根水丸
如桐子大每服三丸倒流水送下食後病左乳左卧右
乳右卧温覆出汗倒流水法取水傾屋上流下是

腸胃石痕論治并方

黃帝鍼經水脹篇云腸胃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛相
搏衛氣不得榮因有所繫痲而內著惡氣乃起瘰肉乃生其始
生者大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之

則堅推之則移月事以時下此其候也夫腸者大腸也胃者延
也大腸以傳道為事乃肺之府也肺主衛氣為氣得是則池渴
冷則凝今寒客於大腸故衛氣不榮有所繫止而結痲在內貼
著其延久不已是名腸胃也氣散則清氣聚則濁結為痲聚所
以惡氣發起瘰肉乃生少漸益大至期而鼓其脹則如懷子之
狀也此氣病而血未病故用事不漸應時而下本非胎娠可以
此為辨矣

肺露九治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為痲痲時作疼痛
腰不得伸

廣茂 二面到

京三稜 二面到
並酒浸

乾漆 五不洗去腥炒同煮

川烏 五斤

礞石 一斤

香皮 三斤

雄黃 另研三斤

茴香 三斤 煨炒

川山甲 三斤 炮

輕粉 一斤 另研

麝香 半斤 另研

巴豆 三十箇 去皮切開

右除研藥外將巴豆炒三稜廣茂二味深黃色去巴豆不用共為末入研藥勻生薑汁打糊丸如桐子大每服二十丸至三十九薑湯送下酒亦得空心食前

木香通氣散治寒氣結癖腹大堅滿痛不可忍

木香

枳殼炒

京三稜 炮各半兩

厚朴 高姜製

枳實 麩炒

甘中 炙各三斤

干姜 炮

蓬朮 炮各三斤

右八味為末每服三錢淡生薑湯調下食前

黃帝鍼經水脹篇云石瘕痾如歧伯曰石瘕生於胞中寒氣客

於子門子門閉塞使氣不通惡血當泻而不泄衄以當止日久

益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之夫勝

脫為津液之府氣化則能出焉今寒客於子門則氣必塞而不

通血壅而不流衄以當止結硬如石是名石瘕也此病先氣病

而後血病故月事不來則可宣導而下出者也維經云任之為

痛其內苦結男子生七疝女子為瘕聚此之謂也非大辛之劑

不能已也可服見喎丸

見喎丸治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚堅大久不消者

附子 四兩地 去皮肺

澤瀉

木香 各二兩

水蛭 一分炒烟盡

大黃 二兩到用酒同三棧浸一宿焙

箭羽 各三斤

肉桂

檳榔

京三稜 五兩到

桃仁 三十箇浸去 皮尖起炒研

玄胡索

血竭 一兩半另研

肉桂 各三斤

右十三味除血竭桃仁外同為末入研二味和勻用元
酒浸菜酒打糊丸如桐子大每服三十九淡醋湯送下食前
溫酒亦得

和血通經湯治婦人室女受寒月事不來血積結堅硬如石

當歸 一斤 京三稜 炮金五斤 廣茂 炮四斤

木香 各三斤 熟地黄 各三斤 肉桂 各三斤

紅花 各三斤 貫衆 各三斤 蘇木 各三斤

血竭 下另研

右十味除血竭外同為細末和勻每服三錢熱酒一椀調
下食前忌生冷及當風大小便

和血通經丸治婦人徑水凝滯不行腰背膈肢疼痛漸成血瘕

芍藥 二兩 木香 各三斤 當歸 各三斤

肉桂 各三斤 乾漆 炒煙盡 五異脂 各三斤

大黃 各半兩 水蛭 炒二兩半 廣茂 半兩

黃虫 三十箇去 頭足起炒 桃仁 二十箇浸去皮尖

右為末醋糊丸如桐子大每服二十九丸醋湯送下温酒亦得食前日進一服

木香研砂丸治婦人疝瘕積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食不消久不差者

丁香

木香

硃砂研

干漆炒烟盡

細墨

大黃剉炒

附子炮

官桂

乳香研

廣茂炮

青皮

京三稜

沒藥研

巴豆霜減牛

猪牙皂角炙去皮弦

干姜炮各等分

右十六味除另研外同為末以好醋一升化開硃砂去了担銀石蓋內慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏下煎藥末丸如麻子大每服三十丸温酒送下量虛實加減大便利為度

血極膏治婦人乾血氣不可不用也此藥是婦人經水之仙藥也

大黃一兩為末用醴醋一升熬成膏丸如雞頭大每服

一丸熱酒化開臨臥温服大便利一二行後紅脈自下

一方治經候閉塞不行亦治乾血氣

斑猫二十箇 糯米炒 七批仁五十箇 炒 大黃半兩

為末糊丸如桐子大溫酒下五丸是者十九空心服

一法加黃蠶半斤碎水蛭一分

溫服大便利一二行後紅脈自下此藥是婦人經水之仙

藥不可不用

官桂

良姜 各等分

右為末每服二錢乳香酒調下熱服無時

崩漏帶下

膠艾湯治衝任虛損月水過多及妊娠胎動不安腹痛下墜

阿膠 炒

川芎

甘中炙 各二兩

當歸

艾葉 炒各三兩

白芍藥

熟地黄 各四兩

右剉每服五錢水一觥酒六分煎至八分去粗稍熱服空

心食前日三服甚者連夜併服

伏龍肝散治經血崩下

伏龍肝

赤石脂 各二兩

熟地黄

艾葉 微炒各三兩

甘中

肉桂 各半兩

當歸

干姜 各三分

川芎 三兩

麥門冬隔紙煎五錢水一觥半入鹽五指煎取清

○右十味對每服五錢水一觥半入棗三筒碎破煎至七分食前溫服

丁香膠艾湯治崩漏走下不止蓋心氣不足勞役過度及飲食不節所得經隔少時其脈二尺俱弦緊而洪按之無力其證自覺臍下如冰求厚衣被以覆其寒白帶之物多向有惡露水下時有鮮血不止右尺時洪微也屋漏水暴下多者夫如屋漏水者黑物多而赤物少合而成也急弦脈見是寒多洪脈時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脈時出者命門包絡之火少也

阿膠 六分炮

當歸身 二兩

生艾末 一分

川芎 四分

丁香末 四分

熟地黄 四分

白芍 三分

右七味以咀作一服水五觥先煎五味條一觥二分去粗八阿膠再煎至一觥空心食前熱服

茶調經湯治經水不止鮮紅頂節急脊骨強腦痛可思飲食

羌活

蒼朮 各一分

柴胡 七分

藁本

獨活

升麻 各五分

當歸

葛根 各三分

甘草 二分

紅花 少許

右十味咀作一服水四觥煎至一觥去粗空心補熱服

聚微汗立止
涼血地黄湯治婦人血崩不止腎水既虛不能鎮守包絡相火
故血走而崩也

柴胡 防瓜 各三分 黃蘗

知母 黃連 藜蘆

川芎 升麻 羌活 各二分

生地黄 當歸尾 各五分 黃芩

細辛 甘草 炙 荆芥穗

蔓荊子 各一分 紅花 少許

右十七味以咀作一服水二觔煎至一觔去粗稍煎服空

心食前

益胃升陽湯治血脫益氣故聖人之良法也補胃氣以助生發
之氣故曰陽生隊長用諸甘劑為之先務奉世皆以為補氣
殊不知甘能生血此隊長之理也故先理胃氣人之身
肉穀氣為寶

白朮 三錢 黃芪 廿中 炙冬二不

人參 一兩半 陳皮 當歸身 各一分

炒麩 一兩半 柴胡 升麻

生黃芩 各半分春夏少加秋冬去之

右十味以咀每服三錢或五錢視食加減如喫食少已

定三錢內更減之不可令勝食氣每服水二錢煎至一錢去粗稍熱服無時

黃芩夏月每服中少加秋冬去之

如腹中痛每服加芍藥三分去皮中桂少許

如渴或口乾加葛根二分二分者一分作十分內二分

升陽舉經湯治經水不止右尺脈按之空虛是氣血俱脫也是大寒之證輕手按之脈數疾舉指弦緊或瀉皆陽脫證脈火亦亡若見熱證於口鼻眼兼之或渴此皆脈躁欲先去也當溫之舉之升之淳之燥之此法當大升淳血氣而切補命門之下脫也

黃芪

白朮

當歸身冬三分

柴胡

藁本

防風

羌活各二分

獨活一分

川芎

地黃

白芍

甘中炙

人參各一分

細辛六分

黑附子炮去皮臍五分

肉桂五分夏月不用

桃仁十枚湯浸去皮尖

紅花少許

右十八味每服三錢若病勢稍緩當漸々加之至半以咀兩止每服水三錢煎至一錢去粗空心食前稍熱服

備金散治婦人血崩不止

香附四兩炒

當歸尾炒用尾

五靈脂一兩炒

右為末每服五錢醋調空心服立效
寸金散治婦人子腸下不收

蛇床子

韶胞

葫芦色

紫梢花

各等分

南星

右四味為末每服五七錢用水半碗淋洗之三二遍為效
又方仔祁散

仔祁散

全蝎不以多少為末口噙水鼻內噓之立效

加減四物湯治婦人冷熱不調臥臥不分大小便相反

右用四物湯五錢加益原散二錢半水酒各一錢煎至八

分去相空心溫服

酒煮當歸丸治癩疔白帶下症脚氣腰以下如在水雪中以火

焙重

厚綿衣蓋其上猶寒冷不任此寒之極也面白如枯

魚之象肌肉如刀刮削瘦之峻速也小便不止與白帶常流

不禁固自不知覺面白目青如藍菜色目脈久無所見身重

如山行步欹側不能安地腿脚枯細大便秘難口不能言無

力之極食飲不下心下痞煩心中懊憹不任其苦面停垢背

惡寒此上中下三焦真氣俱虛欲渴吧噦不止胃虛之極也

其脉沉厥緊而澁按之空虛若脉洪大而澁按之無力猶為

中寒泥按之空虛者平服此茶忌濕麩油臘生冷毒物

當歸 一两
良姜 七片
黑附子 炮七分

右對如麻豆大以好酒一升半同煮酒乾為度炭火上焙乾為細末後入

玄明 四分
全蝎 三枚
柴胡 二分
木香
黃蘗 炒
升麻 各一分

丁香
甘中
苦練 各五分生用

右為末与前四味末和勻酒糊丸如桐子大每服五七十丸淡醋湯送下空心食前

升秋燥濕湯治白帶下厥戶痛控心而急痛氣黃皮膚燥身重

如山前厥中如冰冷

柴胡 一分
白葵花 二分
防風

良姜
郁李仁
甘中 各一分

干姜
生黃芩
橘皮 各半分

右丸味以咀分作二服水二觥煎至一觥去粗食前稍然服少頃以美饍壓之

當歸附子湯治赤白帶下膝下冷痛

當歸 二分
附子
干姜

良姜 各一分
柴胡 七分
升麻

蝎梢
甘中 各五分
炒鹽 三分

黃蘗 少許為引用

右十味為粗末每服五錢水五錢煎至一錢去粗稍煎服
或為末酒糊丸亦得

桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大畏

肉桂一分

附子三分

黃芩生

知母各半分

不思飲食加五味子

三十兩

煩燥面上麻如虫行乃胃中元氣極虛加

黃芪

人參各七分

甘中參三分

升麻五分

右以咀都作一服水二錢煎至一錢稍熱服食遠

白芍藥散治婦人赤白帶下腹痛疼服畢月見效

白芍二兩

干姜炮半兩

右貳件同為粗末炒黃色碾為細末每服二錢空心溫米
飲湯調下至晚又服

火龍丹治婦人二氣不和赤白帶下

白礬 枯四兩

蛇床子炒三兩

右為末醋糊丸如雞頭大乾臙脂為衣綿裹內臥中

灸婦人崩漏及諸疾

血海二穴乃足太陽脾經在膝臙上肉際白肉際二寸甲主七
子漏下惡血月事不調逆氣脈脹其脈緩者是也可灸三壯

陰谷二穴乃足少陰腎之經在足內輔骨後大筋下小筋上按
之應手屈膝取之主女子如娠脈赤白帶下婦人漏血不止
腹脹滿不得息小便黃如蠶及治膝痛如錐刺不得屈伸古
縱涎下煨逆溺難小腹急引腰痛股內痠痛

會阴一穴在兩阴間主女子不月可灸三壯

氣衝二穴在婦來下臍籠上一寸動脈應手宛々中主婦人月
水不利難產于上衝心痛不得息可灸七壯炷如小麦大
水泉二穴在內踝下主婦人月事不利々即刺心下滿目眩暈
不能遠視脈中痛可灸五壯

氣海一穴在臍下一寸五分主婦人月事不調帶下崩中因產

惡露不止統臍疔痛

帶脉二穴在脊腰下一寸八分隨者宛々中灸七壯主婦人不

月及不調勻赤白帶下氣轉連背引痛不可忍

氣門二穴在臍下三寸兩傍各三寸灸五十壯治婦人產後惡
露不止及諸淋炷如小麦大

石關二穴在心下二寸兩傍各五寸灸五十壯主產後兩腋急
痛不可忍

陰交一穴在臍下一寸主女子月事不調帶下及產後惡露不

止統臍冷疼灸百壯

關元一穴在臍下三寸主婦人帶下瘕瘕因產惡露不止新產

絕下徑冷可灸百壯
足下廉二穴在膝下三寸脣外廉而筋內拳足取之主乳癰喉
痺肝腫足跗不收可灸三壯
美瘰一穴在唇下令五壯主婦人卒口喋語言不出風痲之疾
凡婦人產後氣血俱虛灸臍下一寸至四寸各百壯姪如大妻
大元氣自生

中氣不足治驗

伏庵劉尚書弟五子太常少卿叔謙之內李氏中統三年春欲
歸寧父母不得惜動於中又因勞役四肢困倦躁熱息寒時作
疼痛不欲食即嘔吐氣弱短促息便昏臥醫作傷寒治之解

表發汗次日傳變又以大小柴胡之類治之至十餘日之後病
證愈劇主家云前弟無效莫非他病否醫曰此傷寒六經傳變
至再經傳盡當得汗而愈翌日見爪甲微青黑色足經至腰如
冰冷目止視而靦不轉暗咽啞不利小脘冷氣上衝心而痛吧
吐不止氣息欲絕召予治之予診其脈沉細而微不見傷寒之
證此乃中氣不足妄作傷寒治之發表攻裏中氣愈損壞證明
矣太夫人注下避席曰病固危困君盡心救治予以幸熱之茶
以啖一而作一服至夜茶熟而不能飲續灌下一口飲至半
夜稍有呻吟芝身休漸溫忽索粥飲至旦食粥兩次又煎壹
服投之至日高衆醫皆至診之曰脈生證回矣衆喜而退後越

三日太夫人曰病人大便不利或以用脾約丸潤之可乎予曰
前證用大辛熱之劑陽生臥退而愈若以大黃之劑下之恐寒
不轉生他證衆以為不然遂用脾約丸二十九丸潤之至夜下
利而行翌日面色微青精神困弱吧吐復作予再以辛起前某
溫之而愈矣故名曰
溫中益氣湯

附子炮去皮膽

干姜炮各五分

草薹寇

甘中炙各三分

益智仁

白芍藥

丁香

藿香

白朮各二小

人參

陳皮

吳茱萸各二分

當歸一分

右十三味以咀每服五錢水二觥煎至一觥去粗溫服食
前病勢大者服一兩重

論曰內經云寒淫於內治以辛熱佐以苦甘溫附子干姜
大辛熱助陽退陰故以為君丁香藿香薹寇益智藥草
熱溫中止吐用以為臣人參當歸白朮陳皮白芍藥炙甘
草苦甘溫補中益氣和血脉協力用以為佐使矣

膜眼治驗

范郎中夫人中統五年八月二十日先因勞役飲食失節加之
憂思氣結病心脈脹滿且食則嘔暮不能食兩腋刺痛診其脈

弦而油黃帝鍼經五亂篇云清氣在厥濁氣在厥亂於膏中是以大悅內經曰清氣在下則生飧泄濁氣在上則生腹脹此陰臥返作病之逆從也至夜瀉厥之氣當降而不降腹脹尤甚又云臟寒生滿病大抵厥主運化飲食僥勞損傷脾胃厥氣不能運化精微聚而不散故為脹滿先灸中脘穴乃胃之募引胃中生發之氣上行次慶

蒼朮

吳茱萸

各上下湯洗

木香

厚朴蒸製

陳皮

薑屑

各上下湯洗

常扁

益智仁

白茯苓去皮

澤瀉

柴胡

青皮

半夏湯泡

升麻

單豈菴

各上下湯洗

右十五味以咀作一服水二觥煎至一觥去粗稍熱服食前忌生冷硬物及怒氣數日良愈

論曰內經云留者行之結者散之以柴胡升麻苦干行少

臥天明二經散清氣運行臥分故以為君生姜半夏豆

蔻益智辛甘大溫消散大寒故以為臣厚朴木香蒼朮青

皮辛苦大溫通順滯氣當扁陳皮人參辛甘溫調和柴藜

滋養中氣濁氣不降以苦泄之吳茱萸苦熱泄之者也氣

薄者散中之味茯苓甘中澤瀉鹹平氣薄引導瀉陰之

氣自天而下故以為佐使也氣味相合散之泄之上之下之使
清濁之氣各安其位也

疝氣治驗

趙運使夫人年五十八歲於至元甲戌三月中病臍腹冷疼相
引膝下痛不可忍及復劇亂不得安卧予以當歸四逆湯主之
先灸中庭穴

當歸四逆湯治臍腹冷痛相引腰膝而痛

當歸尾七分

附子炮

官桂

茴香炒

柴胡各五分

芍藥四分

茯苓

玄胡索

肉桂子 各三分酒煮

黃葵子四十粒或墨或朱為衣無灰酒下

黃葵子炒七木粒

研爛酒服治君急

若也臨色雜產時

免得全家俱啼泣

黑神散治產後瘀血作病及血暈

黑豆炒羊升
去皮

當歸

干地黄

肉桂

干姜

甘草

芍藥

蒲黃各四兩

右八味為末每服二錢酒半

釵童便半釵同煎調下急急

不拘時連進三服

下死胎

當歸四逆湯

桂 二分

麝香當門子 一箇

右同研細酒服 漢史如牛推下此之小銀等 菜不損血氣

產後扶持榮衛

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損及產後勞傷腹中疴痛少

腹拘急痛引腰背時自汗出

當歸 四兩

肉桂 三兩

甘草 二兩

白芍藥 六兩

右四味切每服五錢水一觥半生薑五片棗一枚同煎至

八分去粗熱服空心食前

芎藭湯治胎前產後一切去血過多

澤瀉 二分

右十味哎咀作一服水二觥半煎至一觥去粗溫服空心食前數服而愈

論曰雜經云任之為病內結七疝此寒積所致也內經云

寒淫於內治以辛熱佐以苦溫以附子官桂甘辛大熱助

臥退臥用以為君玄胡茴香辛溫下焦虛寒當歸辛溫除

和血止痛故以為巨芍藥之酸寒補中焦之氣又防熱藥

損其肝溫澤瀉平按苓甘平去膀胱中留垢川練子若

寒酒煮之止痛又為引用乃在下者引而竭之之意也紫

胡苦平衍其本經故以為使也

中庭一穴在臍中下一寸六分陷者中任脉气所聚可灸五壮
鍼入三分或灸二七壮三七壮無妨

衛生寶鑑卷之十八

衛生寶鑑卷之十九
小兒時氣溫疫外傷風寒

升麻葛根湯治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼

升麻

甘草

白芍藥 各十四

葛根

十五兩

右四味剉碎每服三錢水一觥半煎八分稍熱服不以時
日二三服

惺々散治小兒瓜熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目赤多睡咳嗽
喘麓鼻塞清涕

人參

細辛

瓜蒌根

茯苓

白朮

桔梗 各五分

右七味為末每服一錢水一小觥分薄荷三葉同煎至四

分溫服如要和氣入生姜煎服不以時口一法加防瓜川

芎各一分同煎

人參生犀散解小兒時氣寒瘧咳嗽疾逆喘滿心松驚悸臍

或必或溼調胃進食又生一切瓜瓠服尋常涼承即溼而減

食者 錢氏方

前胡 七分

杏仁 去皮尖炒

桔梗 各五分

人參 三分

甘草 二分

右為粗末每服二錢水一觥煎至六分去粗溫服食後

大青膏治傷瓜吐瀉身溫涼熱 已謂是也應服多少逐方說不盡並隨時以意加減之錢氏方

天麻 一分

白附 一分

青黛 一分

蝎尾 去毒半錢

天竺黃 一字

烏梢蛇肉 酒浸焙末半分

麝香 一字

硃砂 一字

右再研細和勻生蜜和成膏每服半皂角子大至一皂子大

月中兒粳米大同牛黃膏溫薄芎水化壹處服之五歲以

上同甘露散服之

天麻防瓜丸治一切驚瓜身壯熱多睡驚悸手足抽掣痰涎

不利及瓜溫邪熱

乾蝎炒 白僵天炒 天麻

防瓜一 人參各 硃砂各

雄黄 麝香 甘中各

牛黄一

右十味為末蜜丸梧子大每服一丸至二丸薄荷湯化下
不以時

塗頤法治傷寒 錢氏方

麝香研一字 牛黄末一字 青黛末一字

蜈蚣末半字 蝎尾去毒炒末半字 薄荷半字

右同研勻熟棗肉刮成膏新綿上塗勻貼頤上四方可出

浴休法 錢氏方
一指許火上炙手熱頻熨百日裏內外兒可用此塗

青黛三分 天麻末二分 烏梢肉 酒浸焙末三分

蝎尾去毒炒 硃砂研各半分 白礬三分

麝香一字

右七味同研勻入白礬末三錢和勻每用三錢水三碗桃
枝一握并葉五七枚同煎十沸溫熱得所浴之勿浴背上

紫霜丸治 哺失節痛滯不化脊膈痞滿嘔吐惡心或大便酸
臭乳食不消

代赭石醋淬細研 赤石脂各一兩 杏仁去皮尖炒別研五十枚

巴豆 去皮心出油炒研三粒

右為末和勻湯浸餅丸如黃米大兒生三十日外可服
一丸一歲至三歲可服二丸至三丸皂角子煎湯送下米
飲亦得微利為度未利再服更量虛實加減

消積丸 錢氏方

砂仁 十二个

巴豆 二箇去心膜出油

右為末糊丸如黍米大三歲以上三五丸以下二三丸温
水送下無時

厚腸丸治小兒失乳以食飼之未有食腸不能克化而生腹脹

四肢瘦弱或病色無常

蒼朮 三分炒 神麩 五分炒

橘皮 去白 半夏 湯洗

人參 厚朴 姜製

右為末糊丸如麻子大每服二十九丸温水送下食前忌飽

食

五臟熱及肌熱

泻青丸治肝熱生風一名泻肝丸若斑後眼有眵膜亦可服湯
使同微利為度 錢氏方

當歸

山芎

草龍膽

羌活

山桅仁

川大黃 濕紙裹煨

防風 各等分

右為末煉蜜丸如鷄頭大每服一丸至二丸煎竹葉湯同

砂糖化下

錢氏導赤散治大人小兒小便赤澀脬下滿痛

木通

生甘中

生干地黄

各等分

右以咀每服三錢水一觥竹葉少許同煎至六分溫服不

以時

浮黃散治脾熱目黃口不吃乳

一名浮脾散錢氏方

甘中

灸三兩

石膏

半兩

山桅仁

一兩

防風

四兩

藿香

七分

右剉用蜜酒微炒香為細末每服一錢至二錢水一觥煎

至五分溫服清汁無時

浮白散治肺熱盛

一名浮肺散錢氏方桑白皮地骨皮一兩

桑白皮

炒黃三兩

地骨皮

一兩

甘中

灸半兩

右為末每服二錢水一中觥粳米百粒煎至六分食後溫

服之

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱 錢氏方

人參

知母

赤茯苓 去皮

柴胡

甘中 灸

地骨皮

半夏 湯泡七次各等分

右七味為末每服二錢水一觥生姜三片煎至六分去粗

溫服食後量大小加減

生犀散治小兒骨蒸肌熱瘡瘳瘰癧赤口乾日晚潮熱夜有盜汗

五心煩熱 錢氏方

生犀 錢末二分

地骨皮

赤芍藥

柴胡

干葛 各二兩

甘中 炙羊兩

右為粗末每服一二錢水一觥煎至七分去粗食後溫服

大小加減

雲岐子論宣風瀉白散

雲岐子云錢氏用宣風散三味俱無治風之藥惟有治風之名
合加防風一味譬如用軍先鋒辨證以大便瀉洩為熱大便散
中有結以宣風散下太過為寒各認其寒熱而再詳合用兼耳
瀉白散三味亦無瀉肺之理合加黃連一味為瀉肺是也內經
云肺苦氣上逆急食苦以瀉之由是錢氏自言兼煎入臟君臣
藥是包藏其法而言之也

喘促背痺

奪命散治肺脹喘滿背高氣急兩眼扇動陷下作坑兩鼻竅張
悶亂嗽渴聲啞不鳴痰涎潮壅若不急治死在旦夕

川大黃

白牽牛

黑牽牛 各二兩 羊生羊燕

大橫柳 一筒

右為末三歲兒服二錢冷漿水調下涎多加臈粉少許利

下涎為度出楊氏極濟方

無價散治凡熱喘促糾亂不安

辰砂 二分半

麝粉 半分

甘遂 一分半 麝微者煇

右為末每服一字溫水少許滴下小油一點抄茶在上沉
下去脚以漿水灌之立效如神

閻孝忠辨急慢驚風

小兒急慢驚風者古無之惟曰厥厥痲所謂急慢驚者後世名
耳正如赤白痢之類是也厥動而速故厥病曰急驚厥靜而

緩故厥病曰慢驚此厥厥虛寒熱之別治之不可悞也急驚
由有熱者即生凡又或因驚而發則目為連劄潮涎搐搦身
與口中氣皆熱及其發定或睡起即了如故此急驚證也當
其搐勢漸減時與鎮心治熱之劑一二服候驚勢已定須更以
茶下其痰熱利下痰熱心神安寧即愈慢驚得於大病之餘吐
涎之後或悞取轉致脾胃虛損凡疳積之似搐而不甚搐此名
痲癡似搐而精神慢四肢與口中氣皆冷口中露睛或胃痛而
啼哭如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也

索古老人辨急慢驚風

急驚疎證小兒咳嗽痰熱積於胃腸屬少陽諸膽腑受病也謂

此即生風或因聞大驚而依認東方震到得火氣而發搐火本
不動熾瀆風而動當用利驚丸與導亦散浮音凡地黃丸搐止
服安神丸

慢驚秋證小兒吐瀉病久脾胃虛損大便下痢當去脾胃尚風
先以宣瓜散導之後用史君子丸益黃散其痢即止若不早治
即成慢驚癡瘖者似搐而不甚搐脾胃虛損致被肝木所乘屬
諸臟受病也用溫補羌活膏主之

急驚

利驚丸 錢氏方

天竺黃 二分

青黛

輕粉 各一分

黑牽牛

去頭末半分
二方用半分

右同研勻煉蜜丸如豌豆大一歲兒一丸薄奇溫水化下

食後服

地黃丸治腎虛 錢氏方

熟地黃

山藥

山茱萸 各肆錢

白茯苓 去皮

澤瀉

牡丹皮 各叁錢

右陸味為末煉蜜丸如桐子大參歲已下壹貳丸或參丸
溫水化下食前服

安神丸治心虛疴熱面黃頰赤壯熱驚啼 錢氏方

山藥

麥門冬 志

白馬牙硝

甘草

白茯苓 去皮

寒水石 研各半兩

珠砂 壹兩研

龍腦 一字七

右為末煉蜜丸如雞頭大每服半丸砂糖水化下不拘時

妙香丸治小兒驚癇

巴豆

三百二十五粒 去皮 心腰炒熟研如粉

牛黃 別研

龍腦 別研

膩粉 研

麝香 研各三兩

辰砂 九兩

金箔 九十片

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉令勻為丸每兩作三十丸小兒驚癇急慢驚風涎潮搐搦蜜湯下兼豆

大二丸

小抱龍丸治小兒傷風瘟疫身熱昏眩氣喘喘滿痰實塵嗽及

驚風潮搐中暑

天竺黃 一兩

雄黃 二兩

辰砂

麝香 各半兩

天南星 四兩 臘月 臘牛膽 中 陰乾 百日

右為末煮甘中膏子和丸如皂子大每服一丸溫水化下

一法用漿水或新水浸南星三日候透軟煮三五沸取出

乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末八兩日

草一兩半拍破用水二椀浸一宿慢火煮至半碗去粗漸

漸酒入天南星末慢研之令甘中水浸八餘茶亦治室女

白帶伏暑用鹽少許細磨一二丸新水送下 亦載錢氏方

鎮肝凡治小兒急驚瓜日直上視潮搐昏亂不省人事是肝經
瓜批也

當歸

天竺黃 研

生地黄

川芎

竹葉

龍膽草 去芦

防瓜

川大黃 煨

川羌活 各等分

右丸味為末煉蜜丸如雞頭大每服二丸砂糖水化下無
時大人服鎮肝丸三五丸次服天麻散

天麻散治小兒急慢驚瓜其效如神及大人中瓜涎盛半身不
遂言語難不省人事

半夏 七不

老生姜

白茯苓 去皮

白朮 各三錢

甘中 灸三錢

天麻 二錢半

右剉用水一觔磁器內同煮水乾焙為末每服一錢半生
姜枣湯調下無時大人三錢

灸法治小兒急驚瓜前頂一穴在百會前一寸若不愈須灸眉
頭兩處及鼻下人中一穴各三壯炷如小麦大

慢驚

宣風散

錢氏方檳榔用二箇

甘中 灸

橘皮 各半兩

牽牛 四兩半 生半砂

檳榔 二錢

右為末二三歲兒每服半錢蜜湯調下年已上者一錢食

前服慢驚既謂吐瀉病人脾胃虛損復用悍悍之藥以未穩當

史君子丸治小兒五疳脾胃不和心腹滿時復疔疼不進飲食

史君子 一兩

厚朴 去皮製

陳皮 去白

川芎 各一分

右為末煉蜜丸如皂角子大三歲以上一丸以下半丸陳

米飲化下大治小兒腹痛

羌活膏治脾胃虛肝氣熱盛而生風或取轉過多或吐瀉後為

慢驚者用無不效

錢氏方有防風無乾薑

天麻 一兩

人參

羌活 去節

川芎

赤茯苓 去皮

白附子

炮各半兩

沉香

木香

母丁香

藿香

肉豆蔻 各三分

麻黃 去節

干葛

一本有防風無乾薑

川附子

炮去皮脂各二分

真珠末

麝香 研

牛黃 研各一分半

雄黃 研

辰砂 研各二分

乾蝎 炒去毒

白僵蚕 炒去絲

白花蛇

酒浸焙各一分

輕粉 一字研

龍腦

半字研

右同為末入研茶和勻煉蜜和成劑施丸如大豆大每服

一二丸食後煎薄芎湯化下或麥門冬湯亦得實熱急驚

勿服性溫故也

釣藤飲子治吐瀉脾胃氣弱虛風慢驚錢氏方

人參 蟬殼 蝎尾

麻黃 去毒 防瓜 去毒 白僵蚕 炒

天麻 各半兩 麝香 一分 鈎藤 三分

甘中炙 川芎 各半

右為末每服二錢水一椀煎至六分溫服量大小加減寒

多者加附子末半錢無時

異攻散溫中和氣治吐利不思食凡治小兒虛冷病先與數服

以正具氣 錢氏方小兒

人參 五片 茯苓 五片 白朮

甘中炙 陳皮 各等分

右為細末每服二錢水一椀生薑二片棗子二箇煎至七

分音食前溫服量多啜身之

大人小兒口噤穿關不用服諸藥不效者此藥用之立開以生

天南星末一錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁

搽於左右大牙根上擦之便開神效

灸慢驚風及疳疔撮口癩痢疔疔驚癇等疾

小兒慢驚風灸足澤穴各七壯在肘中橫紋約上動脈中炷如

小麥大

初生小兒膈風撮了灸然谷穴三壯在內踝前起大骨下陷中

小兒鍼入三分不宜見血立效

小兒癩癩瘰癧脊強互相引灸長強穴三十壯在脊底端跌地
時取之得熱灸之灸三壯在內關神效大骨下節中

小兒癩癩驚凡目眩灸神庭一穴七壯在鼻直入髮際五分

小兒風癩先曲手指如教物乃發也灸鼻柱去髮際宛中灸

三壯炷如小麦太師八絲口癩癩灸癩癩灸

小兒驚癩先驚怖啼叫乃發也後灸項上旋毛中三壯及耳後

青絲脈炷如小麦太師八絲口癩癩灸癩癩灸

大入小兒癩積疳瘦 兩眼睛不效者如用之左癩癩

燒青丸治小兒食癩乳癩每日午後發寒熱咳嗽服下結硬並

皆治之 錄感方 每服二錢 小兒癩癩 二錢 小兒癩癩 二錢 煎至十

玄精石 燒赤

輕粉 各一分

粉霜

硃砂 各半分

石先將硃砂研細入三味研勻更入寒食麵一錢半研勻
滴水和成餅并用麩裹了慢火內煨黃取出去麩將菜餅
再研為細末滴水和丸如黃米大一歲五丸二歲十九丸
臥溫漿水送下至天明取下惡物是效如不下漸加丸數
如妳癩末消盡隔三兩日又一服癩消盡為度

三稜煎丸治小兒食飲過多痞悶疼痛食不消化久而成癩也
此菜專治婦人血積血塊

廣茂 犀角者 三稜 二味溫熱煨合為末各一兩

大黃 去皮八兩為末

右將大黃銀石器內炒好醋漬令平慢火熬可以二味為丸如麻子大或菽豆大每服十九至二十九食後溫水送下虛實加減大人如桐子大每服四十九

青礬石丸治小兒疳癖

硫黃 三斤

青礬石

五靈脂

錒底墨

各一斤半

白丁香

一斤去立

右為末米飯為丸如菽豆大捻作餅子每服三十餅子溫水送下食前

■鼈甲猪肚丸治癖積發熱

柴胡 一斤

黃連

鼈甲

九助者醋煮黃色各七斤

枳實 麩炒

木香

青皮

各半斤

右入乾青蒿七錢同為末以粽猪肚一箇去脂盛菜蒸熟同搗和為丸如桐子大每服一二十丸煎人參湯送下食後

尅效聖餅子治癖積

陳皮

去白丁兩

巴豆

一百箇去殼切目陳皮炒黃色去巴豆

香附子 炒去毛

廣茂 炮

京三稜

炮各半兩

右為末糊丸如菽豆大捻作餅子每服三十餅子溫水送

下

廣茂化癍丸治乳食不消心腹脹滿壯熱喘鹿吐痰逆腸鳴
瀉利米穀不化完出下痢赤白腹痛裏重及食癩乳癍疔氣
痞氣並皆治

硃砂 研水飛 當歸 炒 代赭石 醋燒淨

枳殼 麸炒 廣茂 炮 京三稜 地各半兩

麝香 研 巴豆霜 各一分 木香 一分

右為末入研菜白糊丸如麻子大十歲兒二丸溫米湯送

下食後量虛實大小加減

橘皮丸治癍積堅硬不消

陳橘皮 二錢 巴豆 半兩去皮

善治 七十一
黃白 二
小 紫 紫

右將橘皮剉碎以巴豆同炒令重黃色煉去巴豆不用只
搗陳皮為末軟爛飯研為丸如菽豆大每服二十九用姜
湯送下食前量兒歲數旋丸大小加減

廣茂潰堅丸治小兒癍積肢脹滿發熱咳嗽喘促可思飲食

木香 青皮 陳皮

廣茂 烏梅 京三稜 各一分

大椒 巴豆 去核各半兩

右八味為末糊丸如麻子大每服五七丸溫米飲送下食

遠量小兒大小為丸加減服

聖效透肌散治小兒癍食癍時發寒熱咳嗽腹下堅硬結塊

聖藥 桑皮 研末 雄黃 研末

粉霜 研末 疾黎 當歸

小 硃砂 研末 味 豆蔻 川山甲 地各 七 分

輕粉 一字 半 研 海金砂 一字

右十一味除研葉外餘揀淨為末入研葉和勻令將獨料
蒜去皮研如泥入頭醋和如稀糊調葉如膏約瘰癧大小
攤在紙上貼病處用新綿一葉覆之以三擔緊繫待一二
時辰覺疼痛無妨只待口鼻內蒜香為度其效不可具述
瘰消為度趙黃姑十三歲瘰癧甚大以至危篤予以此貼
之得效如神

中脫子定章門并定專治小兒瘰癧氣久不消森中脫從髑髏
取病鬼四指頭是章門在大橫骨外直膈季股端側臥曲上

足拳臂取之各灸七壯膈後脊中灸二十七壯高講師用委經驗

脾俞二穴治小兒股下瀰瀉癩体重四肢木曠瘰癧積聚腹痛

不嗜食痰瘰寒熱又治腹脹引背食飲多漸令黃瘦在第十

一椎下兩旁相去各一寸五分可灸七壯若黃疽者可灸三

壯

瘰癧積治驗

真定總管董公長孫年十一歲病瘰癧積在股下硬如覆手肚大
青筋發熱肌熱咳嗽自汗日晡愈惡瘰癧臭惡宜露血四肢

困倦飲食減與病甚危萬百熱醫劉仲安先生治之約五日可
愈先予沉香海金砂丸一服方在溫中再服兩劑而行衆日全塌
氣丸服之十日復以沉香海金砂丸再利之又令服塌氣丸如
此互換服至月餘其癖減半未及百日良愈近年多有此疾愈
之者多錄之以救將來之病者也

塌氣丸治中滿下虛單腹脹滿虛損者類黃麩各三斤

陳皮各三斤 蘿蔔子炒各半兩 木香各三斤

胡椒各三斤 草豆蔻去皮 青皮各三斤

蝎梢去毒 右為末每服糊丸如桐子大三十丸米飲下食後日三服

中

白粥百日重者一羊小兒丸如麻子大桑白皮湯下十九
日三服大人丸如桐子大每服四十九丸如陰囊洪腫水冷
用滄蘆乾姜白麵為末各三錢水和膏子攤紙上塗小兒
陰囊上

疝瘦

丹砂丸治小兒五疳八痢

麝香各研

硃砂研

青黛各三斤

丁香各

肉豆蔻一枚

淡食子一枚

右用乾大蝦蟨二箇去頭足酥炙黃同為末糊丸菴豆大

每服三十丸米飲下空心服

神效豈蔻丸治小兒脾疳瘦弱或泄利無度

神麴炒

豈蔻炒各半兩

肉豈蔻

起裏煨三冬

黃連半兩

芦薈二冬半研

史君子十箇去皮

右為末搗猪膽汁丸如黍米大或桐子大每服二三十丸

米飲送下空心食前

芦薈丸治小兒脾疳瘦弱面色痿

芦薈

蟾酥

麝香

硃砂

黃連

檳榔

鶴虱

史君子

肉豆蔻

各等分

右為末糊丸如菡萏大每服三十九溫水送下空心食前

肥兒丸治小兒蒸熱腹脹滿面色痿黃飲食遲化大小便不

調

麥蘖炒

川黃連

大蕪荑

神麴炒

胡黃連

各半反

右為末搗猪膽汁丸如麻子大米飲送下三十九食前乳

母忌酒麵生冷

橘連丸治疳瘦久服消食和氣長肌肉錢氏方

陳皮一反

黃連

一兩半去漬連米泔浸宿宿丸內

右為末另研麝香半錢和勻用猪膽七箇分蒸入膽內漿

水煮候臨熟時以針微刺破以熟為度取出粟米丸如菡

每服十粒至二十粒米飲下量大小加減之

黃帝瘠小兒疳瘦臃腫體瘦渴飲形容瘦瘁諸方不差者尾翠

骨上二寸陷中灸三壯炷如小麥大岐伯去蕭三伏內用柳

水浴孩兒五午時灸之當自灸之後用帛子扶見有疳出隨

汗出此法神効不可具述

章門二穴治小兒身羸瘦黃脈脹四肢懈惰背脊不舉依前

禹謫師灸癰處取之

咳嗽

辰破半夏丸治小兒肺壅痰實欬喘急背膈痞滿心松煩悶

辰破辰破半夏辰破丸辰破

五靈脂各兩

葶藶各兩

蘇子各兩

杏仁各半兩

半夏各半兩

右為末薑汁煮麩糊為丸如小麻子大每服五七丸淡薑

湯下食後

潤肺散治小兒寒壅相交肺氣不利欬喘喘急語聲不出痰涎

壅塞背膈煩滿鼻塞清涕咽乾痛

貝母

杏仁各三兩

麻黃去根節

人參各二兩

阿膠各三兩

桔梗各半兩

陳皮一分

甘草一兩

各二兩

右粗末每服一錢水八分煎至五分去粗濕服食後

人參半五丸治肺胃受冷欬喘氣急背膈痞滿喉中呀呷吐

入涎沫乳食不咽

半夏 厚朴 丁香 各四錢

陳皮 大參 細辛 各二兩

右為末姜汁糊丸麻子大三歲兒每服二十九丸姜湯下食

後服量兒大小加減

塗唇膏治襁褓小兒咳嗽吐乳久不愈

石燕子 一味為末每用一捻蜜少許調塗兒唇上日三

五次不拘你食前後

吐利痢疾

丁香散治胃虛氣逆嘔吐不止

立於人參 半兩 丁香 各一分

右為末每服一錢水半觔煎五七沸入乳汁少許去粗稍

熱服不以時

玉露散治小兒吐瀉 一名甘露散 錢氏方

石膏 寒水石 各半斤 甘草 生一分

右為末每服一字或半分一匙溫湯調下食後立復已後

立秋已前宜用餘月不可用

益黃散治小兒脾胃虛弱肢痛泄痢 一名補脾散

丁香 陳皮 各一分

訶子 青皮 各一分

右為細末每服一錢水七分煎至五六分食前服

豆蔻散治吐利腹脹煩渴小便少

肉豆蔻 丁香 各五分 桂府滑石 三分

船上硫黃 一方

右為末每服一字至半錢米飲湯調下無時

白木丁香散治小兒吐利不止煩渴小便少

白木 丁香 各一分 船上硫黃

肉豆蔻 各三分 人參 二分 桂府滑石 二分

右為末大人每服二錢小兒一錢溫米飯調下食前服

立效散治一十六般凡治熱吐不止累經效

日川甜硝 桂府滑石末 各三分

右二味研勻每服半錢漿水少許生油一兩點打勻同調

服極者三服必愈大人每服一分忌生魚果實

玉液散治小兒嘔逆吐利霍亂不安煩躁不得卧及腹脹小便

赤煩渴胸亂或傷寒癘病

丁香 一分 藿香 半分 桂府滑石 四分

右為末每服一錢清泔水半觔調下冷服大人霍亂吐利

水打臘茶清下三錢立效

如聖丸治冷熱疴瀉

胡黃連 川黃連 白薑 黃芩

史君于各五

麝香半斤各研

乾蝦蟆

在菌到酒蒸成膏

右為末牛蝦蟆膏弓為丸如麻豆大每服一二九人參湯

下二三歲兒六七丸以上十九十五丸

中庭一宅治小兒吐雜汁矣一壯在腫中亮菲六寸簡中炷如

小麦大

黃連

白附子

荳蔻香連丸治泄瀉不掬寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴切痛

此方用之如神

黃連

南木香

茵豆蔻

右為末粟米飯丸如米粒大每服半匙至二匙杵米飯下

日夜各四五服食前

白附子香連丸治腸胃氣虛暴傷乳哺令熱相雜下痢赤白裏

急後重腹中撮痛日夜頻併乳食減少錢氏方

木香

黃連

白附子

右為末粟米飯丸如粟豆大或黍米大每服十九至二三

十九食前清米湯送下日夜各四五服

小香連丸治冷熱肢痛水穀痢滑腸錢氏方

黃連

木香

呵子肉

右為末粟米飯丸如粟豆大每服半丸至三五十

丸食前頓服之

沒食子丸治泄瀉白痢及癉痢滑腸肢痛錢氏方

治斑後小兒眼在翳膜煎竹葉湯同砂糖化下浮青丸三九微
許利考度

白菊花散治疹豆瘡後眼内生翳膜者病淺二十日見效深者

一月必效一日喫三服

白菊花 藜豆皮 穀精草 去根各等分

黃連散治小兒眉癬

將柿去蒂核食之無時

黃連散治小兒眉癬

黃連 大黃 黃芩 各等分

蜜陀僧 百葉煎 輕粉 少許言不對藥無

右為極細末每用不以多少油蜜調搽神效此山有木工

則度之

瀝青膏治小兒粘瘡

黃蠟 瀝青各一兩 園荖子 各八分

黃丹 各三分

右為末小油三兩熬搽不須洗

絳玉散治小兒頭上并身上濕疔時復痒痛皮膚層濕爛久不可

黃丹 炒紅二兩重 藜豆粉 炒黃三兩重

右為末清油調雞翎掃於瘡上後搽勝金散覆之大有神

效

勝金散

右膏

右考末先搽了絳至散後不以多少覆之神效不傳

千金膏治腸結如神一名蜈蚣又治多日諸般惡瘡

歷青 四兩

黃蠟 三兩

散綠 三斤研

先用小油三兩熬溫入歷青黃蠟化開攪勻入散綠取下
火攪勻濾入水中磁器內收之每用時將茶入水捻作餅
打緋綿上貼之

軟青膏治一切凡熱瘡又治小兒頭瘡

歷青

黃蠟

脂麻油各十兩

巴豆 十四箇

右先將歷青麻油黃蠟熬成汁次入巴豆不佳手攪候巴

豆焦黑去巴豆不用次入膩粉二錢再攪極勻放冷傳瘡

上神良

羊蹄散治小兒頑癬久不差

白礬 羊兩

羊蹄根 四兩剉

右二味爛研入米醋小半釵同搽不住搽之候覺癬極痒
至痛即止隔日洗去再搽

麝香散治小兒口疳唇齒齦損鼻爛

硃砂

麝香

少許

右各研細和勻先以帛抹口每用藥許付之應是口齒疳
瘡皆可用不可噴子嗽子只是此人耳用之無有不效大

人用一字

小兒季夏身熱痿黃治驗不詳
一 小兒身體蒸熱背膈煩滿皮膚如潰橋之黃眼中白睛亦黃
筋骨痿弱不能行立此由季夏之熱加以濕冷而蒸熱薄於經
絡入於骨髓使臟氣不平故脾逆乘心濕熱相合而成此疾也
蓋心火實則身體蒸熱背膈煩滿脾濕勝則皮膚如潰橋之黃
有餘之氣必乘已所勝而侮右勝是腎肝受邪而筋骨痿弱不
能行立內經言脾熱者色黃而肉蠕動又言濕熱成痿信哉

言也此所謂子能令母實則泻其子也若脾土退其本位腎
水得復心火自平矣又內經曰治痿獨取於陽明正謂此也予
用加減泻黃散主之
加減泻黃散方此茶退脾土復腎水降心火

黃連

茵陳 各五分

黃蘗

黃芩 各四分

茯苓

梔子 各三分

澤泻 各分

右以咀部作一服水一大觔煎至六分去粗稍熱服食前
一服減半待五日再服而良愈
論曰內經云主位之主其泻以苦又出脾苦濕意食苦以

燥之故用黃連茵陳之苦寒除濕熱為君腎欲堅急食苦
以堅之故以黃蘗之苦辛寒強筋骨為臣濕熱成煩以苦
浮之故以黃芩梔子之苦寒止煩除滿為佐濕滯於內以
淡泄之故以茯苓澤瀉之甘淡利小便導濕熱為使也

黃蘗 黃芩 梔子 茯苓 澤瀉

黃連 茵陳 苦參 白朮 蒼朮 羌活 獨活 防風 秦艽 桂枝 芍藥 甘草 大黃 芒硝 枳實 厚朴 木香 砂仁 豆蔻 胡椒 丁香 肉桂 附子 干姜 白朮 蒼朮 羌活 獨活 防風 秦艽 桂枝 芍藥 甘草 大黃 芒硝 枳實 厚朴 木香 砂仁 豆蔻 胡椒 丁香 肉桂 附子 干姜

衛生寶鑑卷第十九

