

外科大成卷之四

太醫院御醫燕越祁坤廣生甫

輯著

不分部位小疵部

此皆小症不可紊亂於大毒之內故另分之

無名腫毒

無名腫毒者以其隨處而生不按穴次不可以命名也皆由風邪寒熱客於經絡之所致但其因風邪內作者則無頭無根因氣血相搏者則有頭有根因風寒而成者則腫堅而色白因熱毒而成者則腫嫩而色赤治法有表症者散之有裏症者下之

外兼敷貼等藥總不外乎首卷腫瘍之例並宜參

考

灸曲池穴甚効

穴見首卷灸門

漏蘆湯

治癰疽疔腫不問陰陽初起者及初潰紅腫尚未

消盡者並濕爛疥瘡等毒

漏蘆

一錢五分

紫花

地丁

荆芥

當歸

連翹

薄荷

白芷

升麻

各一錢

麻黃

三錢

大黃

二錢

生甘草

四分

水二鍾煎八分食遠熱服蓋取微汗渣再煎温

服次日麻黃用二錢大黃用錢半甘草用六分溫
服第三日則麻黃大黃甘草各用一錢溫服如其
紅腫尚未消盡照第三日方再三二服無不愈者
是方也如不欲汗則麻黃少用溫服之如大便不
實及不欲下者則少用大黃不用亦可隨病上下
在食前食後服如便毒服利藥正氣傷皮厚未
穿者服此一汗不硬而穿

飛騰神駿膏

治癰疽腫毒瘰癧鼠瘡

麻黃

去節淨用一助

杏仁

炮去皮尖砂鉢內研如泥人末再研澄去濁脚

防風

去芦 四兩

地骨皮

去骨 四兩

甘草

四兩

燈草

一把 大

黑鉛

一塊

木别子肉

十四箇

頭髮

一大團 洗淨

共入大銅鍋內入水二桶炭火煎減半取汁渣再

煎二次絹濾淨并一處復將燈草頭髮黑鉛同汁

煎至成膏去此三味再煎稠收確內香甜久貯不

壞每服三錢熱酒調服隨飲至醉為度蓋卧出汗

避風一日次日食猪蹄補之 此方於初起時及

將潰時服之神驗

軍門立効散

治癰疽諸毒對口附骨疽等

皂角刺

三錢炒
熱入

乳香

五七分炒
香化再入

天花粉

三錢

甘草節

一寸長
九箇

川椒

三十粒

黃酒二鍾煎一鍾溫服未成者即散已成者即破

已潰者不宜服

一用皂刺

三錢

乳香

七分

花粉

一兩

甘草節

二錢

炒製如法酒煎服治紅腫焮痛便秘者甚捷

壺公妙劑散

一切諸乳香便毒筋骨疼痛不問新久悉皆神驗

川山甲

炒

葫蘆巴

槐花

黑丑

頭末

當歸

等分

爲末每服五錢用溫酒調成塊挑入口內隨用溫酒送下隨飲幾盃以助藥力

榮衛返魂湯

赤芍

木通

白芷

何首烏

枳殼

烏藥

當歸

各一錢

小茴香

五分

甘草

三分

水一鍾酒一鍾煎八分溫服

初起堅硬如石者加川芎麻黃獨活葱頭水煎熱

服出汗胃寒生痰者加半夏鬱熱生痰者加

桔梗久不愈食少色痿者涼藥太過也去木通減

當歸倍加陳皮厚朴甚者再加白豆寇 肺癰壯
癰內癰等症倍加忍冬藤此藤治內癰之神藥也
補加大附子利用酒大黃 隧痰失道陽少陰多
者加升麻以除其寒 久潰無膿時流薄血壞肉
如絮努肉如突者宜之外用枯礬朴硝末滲之忌
用刀針蝕藥

老弱者患于上部去木通恐導虛下元氣血盛者
減當歸多能生血恐再結不已泄瀉者先服蠟礬
丸米湯下瀉止再服 腰痛經年不愈者加草薢
武胡索

脚氣加欖榔木瓜川山甲 熱痰咳嗽加紫蘓

疝氣嘔逆加水香 此藥救壞症活死肌洵患於

未萌之前拔毒於既愈之後扶胃本而不傷元氣

更不分經絡但漫腫堅硬不紅不痛者用之悉驗

托裏溫經湯

治寒覆皮毛鬱遏經絡熱伏榮中不得伸越聚赤
腫痛惡寒發熱或相引肢體疼痛者

麻黃 防風 蒼朮 白芷

升麻 葛根 人參 當歸

白芍 甘草

再服去麻黃防風加牛旁子連翹

麻黃苦溫防風辛溫發散者也升麻苦平葛根其
平專陽明解肌者也血留則痛歸芷辛溫破血散
滯濕盛則腫蒼朮苦溫瀉溼裏之邪參草甘溫白
芍酸寒調中托裏水煎熱服蓋臥之使陽氣伸而
汗出其腫自消去麻防加旁翹其痛自止

加減瓜婁散

治內癰腦疽背腋諸毒瘰癧便毒乳疽乳岩等症
未成者即消已成者速潰

大瓜婁

一箇子多者佳少者用二箇杵爛

當歸 三錢

沒藥 二錢

乳香 一錢

甘草 三錢

金銀花 五錢

生薑 五錢

用無灰酒二碗煎一碗服

將潰者加皂角刺五

錢乳癰腦疽加蒲公英土貝母各五錢潰後用

參芪補之

滌風散 熨風腫痛疼

羌活

防風

白芷

吳萸

細辛

官桂

芫花

當歸

芍藥 各五錢

為粗末赤皮葱 連鬚切 用醱醋拌勻炒熱帛包於

瘡上敷之稍冷易之以痛止為率

移險散

南星

白芫

草烏

黃栢

各二兩

文蛤

炒一兩

為末調如糊隨血圍匝如墻壁可移險處就不險

處

南星

白芫

白斂

白芷

貝母

等分

水調此藥敷前圍藥之內提起內毒制之有理

葫蘆化毒丹

治一切腫毒熱癰

大黃

黃栢

遠志

等分

為末用猪胆汁和成錠雄黃為衣陰乾用時以米醋磨如墨以鷲翎蘸藥頻塗患處

醒肌膏

治腫毒惡瘡及風氣腫疼鶴膝風冷濕痛腰痛脚

氣痛婦人產後受風經絡冷痛

廣膠

四兩用葱薑取汁各一碗
浸膠過宿文火煎膠化人

硫黃

末一兩

草烏

末一兩

菝粉

一兩

薑粉

一兩

煎成膏再加

蟬酥

一錢

麝香

四分

乳香

二錢

沒藥

二錢

各末和勻頓滾水內刷絹帛上貼之以熱鞋底熨

之俟痛止變麻木則歿肌活矣 一刷皮紙上用

時隨大小剪貼熨之宜與首卷牛膠蒸法參考

取薑葱粉法

葱薑各杵汁三二碗薄鋪磁器內晒乾成粉

滲雪膏

治一切風熱攻注頭面四肢腫痛

朴硝二升於臘月中入新瓦罐內冲熱水令滿

攪勻掛簷下俟硝滲出罐外陸續收之用

人乳調敷

端龍膏

敷一切腫毒對口乳癰便毒紅腫焮痛者

不問未成已成悉驗

鮮鱒魚

大者一尾

鮮山藥

如魚長一條去皮

先將魚入石柏內杵爛次入山藥再杵如泥量

加冰片和勻攤敷腫處綿紙蓋之黃酒潤之

凡腫毒已成者如純陽症則孔似蜂窩用貝葉膏貼之日換七八次善能止痛呼膿生肌完口更無粘連之苦 半陽半陰症者則漫腫無頭微紅微熱用紺珠膏貼周圍腫處中留頂塗玄珠膏再以黑膏蓋之則餘腫自消膿從孔出內服托裏之劑

純陰症者內服辛熱大補之劑外用神妙拔根方

以疎其毒

已上諸方俱見首卷

丹毒

丹毒者爲肌表忽然變赤如丹塗之狀也經曰少陰

司天客勝則丹疹外發及爲丹燦然二症亦有紅
白乾濕痒痛之殊故用藥則分表裏補瀉之異如
色赤而乾發熱作痛者爲丹毒屬肝心之火宜化
班解毒湯 色白而濕爛流黃水痒痛不時者爲
風丹屬脾肺濕熱宜除濕胃苓湯 痒而搔之起

塊成餅成片皮色不變者爲冷膜故天陰則劇風
中亦劇晴煖則滅身暖則瘡由風邪外襲熱鬱於
肌膚也宜藿香正氣散發之外以枳殼煎湯浴之
忌用風藥 再如丹毒山胃氣虛極致令虛火遊
行於外者又宜補以降之用人參

五錢

當歸白朮

各一

錢五分 水煎服之 又如女子十五歲而經脉未通

者多發丹疹此由血有風熱乘之也治宜涼血虛則補之慎投風藥

化斑解毒湯 治三焦風熱上攻致生火丹延及遍

身而作痒痛

玄參

知母

石膏

黃連

牛旁子

人中黃

升麻

連翹

各一錢

甘草

五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分服

除濕胃苓湯

治脾肺濕熱致生火丹作爛疼痛者

防風

蒼朮

白朮

赤茯苓

陳皮

厚朴

猪苓

枝子

木通

澤瀉

滑石

各一錢

薄桂

甘草

各二分

水二鍾燈心二十根煎八分服

藿香正氣散

治冷膜由風寒外襲者

藿香

白朮

白芷

桔梗

紫蘇

陳皮

半夏

大腹皮

茯苓

厚朴

甘草

水二鍾生薑三片紅棗二箇煎八分服

芸薹菜方 治丹毒

芸薹菜于一兩黃酒一鍾和研濾去渣煎四五沸温服之 一杵芸薹菜葉敷之乾者為末水

調敷之

柏葉散 治丹毒痒痛并効

側柏

炒黃

黃栢

大黃

各五錢

赤豆

三錢

蚯蚓糞

韭菜田內者佳五錢

輕粉

三錢

為末新汲水調敷

一搗大蒜厚塗之乾則

易之

赤白遊風

遊風者為肌膚倏然焮赤腫痛遊走無定由風熱壅

滯榮衛不宜則善行而數變矣較之丹毒只紅腫起粟而不走故與遊風爲異耳其風熱者則色赤宜小柴胡湯加防風連翹清之內熱甚者紫雪散下之腫勢甚者砭之風寒者則色白宜荆防敗毒散散之再血熱者四物湯加柴胡枝子丹皮胃虛者補中益氣湯加防風羌活肝腎虛熱者宜加味逍遙散六味地黃丸以滋化源則火自息風自定痒自止矣悞用祛風辛熱之藥復傷元氣則客風內淫血隨火化反爲難治赤腫遊人腹者不治宜與小兒赤遊風門參考 有因過飲燒酒而得者

飲冷米醋一二杯卽解此又是似而非也宜細辨之

荆防敗毒散

補中益氣湯

六味地黃丸

俱見首卷

加味道遙散

小柴胡湯

俱見癩癧門

癩疹

癩疹者生小粒鑿於皮膚之中增寒發熱遍身搔痒

經云勞汗當風薄為鬱乃癩瘞熱微色赤熱甚色

黑由痰熱在肺治宜清肺降痰解表如消毒飲子

有可下者大柴胡湯虛者補中益氣湯或總以加

味羌活散治之 疹屬少陰君火班則無頭焮腫

於外屬少陽相火自吐自利身溫身涼者吉忌整

涼藥首尾慎下若便閉者微利之故凡癰疹瘙痒
疔瘡丹毒等症皆宜涼血潤燥如加味逍遙散加
味小柴胡湯慎用風藥復傷元氣反致筋攣若愈
後肌生白屑搔之如帛所隔者氣血虛也十全大

補湯 或炙油池穴

見灸門

加味羌活湯

治風寒暑濕外搏肌膚發爲癰疹增寒發熱遍
身搔痒或赤或白甚則心迷悶亂口苦咽乾

羌活

前胡

各一兩

人參

桔梗

甘草

炙

枳殼

川芎

天麻

茯苓 各五錢 蟬蛻 去頭 薄荷 各三錢

右為末每服三四錢生薑三片水一鍾煎七分

去渣溫服

羽液膏 治斑疹風痒不止

白礬 五兩 童便 一升 黃酒 三合

合煎如稀糊以棉帛蘸藥擦之立消

補中益氣湯 俱見首卷 十全大補湯 俱見首卷

加味小柴胡湯 加味逍遙散 俱見癩瘡門

諸痒

諸瘡痛痒皆屬於火又云風盛則痒蓋為風者火之

標也凡風熱客於皮膚作痒起粟者治宜疎風如
換肌丸苦參丸等若風熱內淫血虛作痒者又當
涼血潤燥如逍遙散柴胡湯之類也

神仙換肌丸 治皮膚風熱如蚤虱叮咬痒不可忍

蟬蜋焙 姜蚕焙 防風 片苓酒炒

何首烏各一兩 枝子酒炒 白芷八錢 荆穗七錢

羌活七錢 地膚子五錢

右為末酒糊為丸菜豆大每服三二十九茶清送下

苦參丸 治風疹遍身痒痛難忍癢多不寐者

苦參一兩 為末用皂角二兩

古雪堂藏板

水一升揉濾取汁石器煎成膏和九桐子大每服二十九丸溫水送下

四生丸 治渾身麻痒或麻痺不仁或生癩疹或外
賺血風頑瘡骨節痛不能履

地龍 去土 姜蚕 炒 白附子 五靈脂

草烏 去皮尖 炮等分

為末米糊丸桐子大每服三四十九丸茶清送下

二味消毒散 治遍身起癩作痒用此乾擦之自止

明礬 一兩 雄黃 五分 共為末

遍身痒如虫行者用鹽一斗水一石煎七斗澄

清洗之三五次愈

用茵陳煎濃汁洗之

加味通聖散

治風餅風丹作痒

防風

川芎

當歸

白芍

白朮

甘草

連翹

薄荷

枝子

桔梗

麻黃

石膏

滑石

荆芥

黃芩

朴硝

大黃

蟬蜋

枳殼

用水二鍾煎八分熱服

一用鹿角磨酒熱服煎鳳仙花科洗之

蛇床子湯

狼毒膏

俱見腎囊風

三因四生散 見腎藏風瘡

羽液膏 見癩疹

諸痛

諸痛之為症也有各門之所未備其立方也有各門之所未載今彙之於一以便採用庶無遺失

蒼朮復煎散 治寒濕相合腦痛惡寒心煩腹悶脉

沉而遲項背腰脊髀骨脛膝等痛

蒼朮 四兩水二碗煎二鍾去渣入 黃柏 三錢 羌活

柴胡 升麻 藁本 白朮

澤瀉 各五分 紅花 少許

再煎至一鍾服

蠲痛無憂散

治一切腫毒痛筋骨痛頭風痛風寒

濕痺遍身疼痛脚氣痛風及大麻風等症

蒼朮

米泔水
浸焙

半夏

薑汁
浸焙

川山甲

陳上
炒

川烏

黑豆酒煮
去皮尖

草烏

生薑
汁煮

苦食

蘇油
焯浮

當歸

酒
洗

甘草

各一
兩

麻黃

三
兩

葳靈仙

一
兩

鬧楊花

醋浸炒
黃色四兩

各製為末和勻每服五七分至一錢無灰酒調

服再飲以醉為度蓋臥出汗立驗避風

尋痛丸 治遍身走注疼痛并一切腫毒疼痛

五靈脂

草烏

炮

杏仁

各一
兩

沉香

木香

各五
錢

麝香

一
錢

右爲末酒糊爲丸桐子大每服二十九溫黃酒送下如治腫毒杏仁易桃仁沉木易乳沒各等分燒酒下

桑皮飲 治皮膚痛不可以手按者

桑白皮二錢 乾葛 柴胡 黃芩

玄參各一錢 地骨皮 大門冬 麥門冬各一錢五分

木通 甘草各五分

用水二鍾生薑三片葱頭一箇煎一鍾熱服出微汗

槐花散 治皮膚痛雖蒼蠅飛上卽痛者

槐花炒 爲末每服三錢溫黃酒調服

魚鱧散 治遍身酸軟作痛者腰痛

魚鱧 四兩香 油燻黃 為末每服五錢温黃酒送下

歲靈仙桂湯 治產後經風痛不可忍并痢後風

歲靈仙 肉桂 木香 乳香

沒藥 各二錢 水二鍾煎八分服

六合散 治一切腰疼

羌活 獨活 大茴香 小茴香

杜仲 當歸 各二錢

用黃酒一碗浸露一宿次早空心去渣温服立

愈 一用紅姑娘一箇炙乾令焦為末黃酒下

驚實散 治脇痛疝氣痛

驚眼枳實 焙

小茴香 炒

各為末等分和勻每服二錢用小黑豆同艾葉

炒熟沖黃酒於內去渣調前末藥食前服之立止

不龜手膏 治冬月手背裂痛

猪脂油 四兩入 白蠟 二兩溶化離火加 白芷

升麻 一錢 猪牙皂 一錢 丁香 五分 麝香 二分

為細末入前油蠟內和勻先用葱湯洗手淨拭

乾烘手熱取前膏一塊於手心內搓之令手掌

油潤去藥則雙手於火上烘之搓之以油乾為

度則裂痛立愈更且滋潤肌膚勝裂口藥多矣
大麻瘋

大麻瘋癘也由水枯火盛乘天地肅殺之氣所致
形雖見於皮毛瘋毒積於臟腑上而下者爲順下
而上者爲逆漸來可治頓發難醫必先麻木不仁
次發紅班再次浮腫破爛無膿再久之熱濕生虫
攻蛀臟腑如虫蝕肝則眉落虫蝕心則目損虫蝕
脾則唇反虫蝕肺則聲嘶虫蝕腎則耳鳴足底穿
爲之五敗又皮死麻木不仁肉死割截不痛血死
內潰成瘡筋死指節脫落骨死鼻梁崩塌爲之五

不治夫瘋之中人也必從虛入故須絕情慾必壅
 滯經絡故須食清淡必先麻痺故須用疏通如麻
 黃桂枝之類是也今則初以紺珠丹汗之次以蘆
 薈丸清熱殺虫通用神應養真丹加白花蛇等分
 久服可愈然諸痺諸瘡不得舍六味丸八味丸六
 君子湯十全大補湯補中益氣湯等以培補之

再造丹 治大麻瘋

生漆

松香

各半斤和勻
盛瓦盆內入

大蟹

七隻如小
者倍之此

盆一箇埋半截於土內日晒之以柳枝攪之
夜則蓋之二十一日俱化成水取起聽用

雄黃

半斤飛
七次

蛇蝎

七條

川烏

草烏

俱薑汁
浸炮

人參

天麻 各二兩

右為末用蟹漆汁為丸聽用

初用麻黃蘇葉

各半斤

防風荆芥

各四兩

煎湯一桶沐浴浸洗換新

衣服丸藥

三錢

黃酒送下再飲至醉蓋臥出汗汗

乾脫去衣於空地焚之另換新衣至午再服

三錢

酒下至醉用夏枯草蒸熱鋪蓆下臥之不取汗

次日沐浴服藥至醉鋪夏枯草臥照前將舊衣

舊草取出焚之如此七日其病盡出如豆如瘡

再服一七瘡俱脫殼五七日全瘥真至聖藥也

終身忌螃蟹并狗肉

再造散 治大麻瘋眉落腳爛底穿者

苦參

八兩羊油炒

乾漆

一兩

甘草

五錢

川山甲

炒二兩

右為末每服五分用鮮蟹二隻杵爛取汁加酒調服日進二服至十日則長肉生骨

梧桐葉散

臭梧桐葉同捲的陰乾為末初服七分每日加一分至錢四分為率又每日退一分至七分為率俱用無灰酒調服避風初一服則小便如油至四服渾身骨响至八服汗出如泉冷至十二服麻木處有紅點則知痛痒至十五日發班如

雲片以磁鋒斫出黑血仍用梧桐葉末摻之愈
忌食鹽醬母猪牛羊燒酒麪食房勞一切發物
白茅藤酒 治大痲瘋并三十六種瘋

白茅藤根於石栢內杵粉每用粉四兩糯米

半蒸飯做酒或每酒一升用藥三兩煮服以醉為度

何首烏酒

何首烏四兩 生地 熟地 歸身

歸尾 川山甲 蝦蟆各一兩 川烏

草烏 五加皮 松針 側柏各四錢

用黃酒一斗同入罈內封固重湯煮三炷香埋

開七日時時服之令醺醺然作汗避風

加減地黃丸 治大麻瘋將愈服此以培元氣

熟地四兩 山藥 山萸 茯苓

丹皮 五加皮 杜仲 牛膝

金銀花 遠志各二兩 猪腎四箇 紫河車一具

共末煉蜜為丸梧子大每服百丸空心淡鹽湯送下

紺珠丹見腫瘍 蘆薈丸見疔瘡

神應養真丹見股部

癩瘋

癩瘋亦由犯肅殺之氣所致有烏癩白癩之殊蓋烏

者皮毛變黑痒如虫行或如癢疹結核手足頑麻
針刺不痛脚如拘肘如縛眼見物如垂絲心常恐
佈言語及食時出氣而鳴若白者皮色變白四肢
頑疼肉如針刺手足緩縱背脊拘急鼻生息肉瞳
生白沫目暗聲嘶身熱心煩爲異耳

希莨膏丸

治癩瘋作痒及癰瘡

希莨草杵汁煎膏和希莨草末爲丸每服三錢
黃酒送下老弱者用人參蘇木煎膏量用數匙

和酒送丸藥

松漆丸

治癩瘋麻瘋紫雲瘋

漆樹頭

瓦焙四兩

松節

醋炒九次一兩五錢

皂角刺

燒酒炒九次兩

各為末和勻酒糊丸胡椒大每服錢許早晚二服茶清送下七日見效藥盡自愈

二聖不老丹

治癩瘋麻瘋眉髮脫落

側柏葉

酒浸九蒸晒

白松香

煮煉九次等分

右為末煉蜜為丸梧子大每服二錢每日三服蜜湯送下

大黑神膏 治諸癩遍身生瘡及多膿血

川烏

川芎

升麻

防已

黃栢

黃連

藜蘆

各五錢

巴豆

杏仁 各十 亂髮 雞子大 猪脂 二斤煎藥以髮道

雄黃 雌黃 胡粉 白礬 各末

松脂 雞子大一圓

右為末入油內攪勻收磁器內先以熱鹽湯洗

淨次搽藥日三次勿令入口

搜瘋順氣丸

治三十六種瘋七十二般氣瘋氣脚氣惡瘡下

注上熱下虛腰腿疼痛四肢無力一應男婦老

幼不問虛實並宜常服潤三焦和五臟調腸胃

除風濕療癱瘓言語蹇澁理腸風便血除根

大黃酒浸九蒸晒五兩 火麻仁微火焙去殼 獨活

郁李仁滾水浸去皮 枳殼炒 枳榔

車前子炒 兔絲子酒煮 山藥

牛膝酒浸 山茱萸去核酒浸各二兩加 羌活一兩

右為末煉蜜為丸梧子大每服二十九茶酒任

下早晚各一服

癰瘍瘋

癰瘍瘋生於頸項胸腋之間 其色紫而點點相連且無痛痒若

白駿瘋形如雲片為異耳

葳靈仙散 治癰瘋囊瘋紫雲瘋頭瘋歷節瘋破傷

瘋皮膚瘋痒及疥癬癩癰腫毒

葳靈仙

酒拌九蒸九晒

為末每服二錢酒下或米糊為丸服惟忌茶麪

松漆丸

希簽膏丸

搜瘋順氣丸

俱見癩瘋

白駁瘋

白駁瘋

生於頸面延及遍體

其色駁白亦無痛痒形如雲片宜

先利患處至燥痛取鰵魚脂敷之三上自効內服

浮萍丸蒼耳膏等或可奏効

浮萍丸

治一切瘋麻瘋頭瘋癩瘋瘋疹此藥味辛

氣寒輕清入肺達膚出汗與麻黃同功

浮萍

取紫背大者置篋墊上安水盆上晒乾

為未煉蜜為丸彈子大用豆淋酒下 豆淋酒

法黑豆半升炒煙起沖入好酒三升浸一周時

去豆取酒送藥

蒼耳膏 治諸瘋瘋濕四肢拘攣一切瘡疹

蒼耳鮮者連根帶葉取五七十觔洗淨切碎入

大鍋內煮爛取汁絹濾過再熬成膏磁罐盛之

用時以桑木匙挑一匙於口內噙之然後用黃

酒送下有回生之功服後於有瘋處出小瘡如

豆粒此瘋毒出也刺破出汁盡自愈

紫白癩瘋

癩瘋

俗名汗斑也

紫因血滯白因氣滯皆由熱體被瘋濕

所侵留於腠理搔之起皮而不痛此從外來治宜

汗之如紺珠丹松漆丸浮萍蒼耳之類再灸夾白

穴擦八葳靈散自當護効非若白駿瘋之難療也

八葳靈散 治擦紫白癩瘋

大附子

一錢

川烏

草烏

各一錢

雄黃

硃砂

各五分

紅砒

四分

硫黃

三分

麝香

二分

共為細末用雞子清調稀漿小麻布手巾二條

陰乾用河水薑汁米醋三味和一處以藥手巾
蘸濕擦患處待行動汗出時擦之夏月治由佳
灸夾白穴法 先以墨塗兩乳頭次令兩手直伸夾
之染黑處是穴灸二七壯或針刺出血亦愈

浮萍茯苓丸 治紫白癩瘋

浮萍一 茯苓半

右為末煉蜜為丸梧子大每服三二錢黃酒下

紺珠丹 見腫瘍 松漆丸 見癩瘋

蒼耳膏 見白駁瘋

諸瘡

諸瘡者以其隨處而生不按穴次不可以命名也書云諸瘡痛痒皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土是由濕熱相合潰敗肌膚而成瘡也然有淺深表裏之異治有汗下補瀉之宜如瘡在皮膚者則當因其輕而揚之汗之浴之以散膚腠之邪外以殺虫潤燥等藥敷之瘡在肌肉者則當因其重而滅之清之涼之以瀉經絡之熱外以化膿生肌等膏燻之瘡在巔頂者則當因其上而射之用寒涼藥以酒浸之灸之更以風藥升而上之外以殺虫解熱等藥敷之明此三者其於治瘡思過半矣

救苦黃芪散 治一切惡瘡端午日合尤佳

黃芪

當歸

芍藥

天花粉

甘草

各一兩五錢

金銀花

二兩

瓜蒌

一對

熟地

量用

皂角刺

為引

右為粗末磁罐密收之每服五錢用無灰酒一
升或酒水各半入瓶內封口重湯煮藥氣透出
為度取出澄清飲之

洗諸瘡藥方

一二兩枯礬四兩椒半觔野菊一觔硝七分分開

煎數滾一日一換洗二遭淫濕疥癩頑賺癰膿

血風瘡一槩拋 一用苦參大腹皮水煎洗

碧石螺膏

貝葉膏

俱見首卷

翻花瘡

翻花瘡

瘡口內肉突出翻如菌翻如葷也

且無痛苦由潰瘍血燥生

風所致損流鮮血久則虛人治宜滋肝補血益氣

培元如逍遙散歸脾湯之類外摻貴金散或烏梅

煨灰敷之或馬齒莧煨灰猪脂調敷甚者用銅綠

鉛粉等分香油調敷

一人患穿踝疽形翻突如剖破石榴但其色紅而

不艷余以銀針於肉珠上遍刺之流紫黑血共約

久利大成 卷之四
碗許隨以玄珠膏塗之黑膏蓋之次日縮小大半
又如前刺三日三刺消完方露瘡口內服大補湯
丸以培元氣外搽生肌藥方能收口

逍遙散

歸脾湯

貴金散

俱見癰門

玄珠膏

生肌散

貝葉膏

俱見首卷

疥瘡

疥者微疾也亦從臟腑而生然必先出於手何則疥

云吾不根而生不母而成稟陰陽氣育濕熱化形

蓋手掌乃太陰濕土所主手心屬太陽相火所司

此無情而化有情如腐草為螢朽麥為蝶之意也

其形有五如多痒少痛爲重疥屬肝宜蘆薈丸火
鬱者逍遙散煨赤細粒爲砂疥屬心宜涼膈散犀
角飲子久則酒蒸黃連丸黃泡脹痛爲濕疥卽膿
疥屬脾宜蒼朮膏升麻和氣飲膿清色淡不腫爲
水疥屬腎宜六味地黃丸加味道逍遙散碎粒搽之
起皮爲乾疥屬肺宜搜風順氣丸久則天門冬膏
蜜湯下 諸疥宜灸曲池穴間使穴各二七壯
疥生於頭面胸背者氣血虛也十全大補湯加金銀
花何首烏牛旁子則胸背之瘡先愈便利熱渴脾
肺虛熱也竹葉黃芪湯飲冷作痛脾熱也清熱消

毒飲體倦食少脾虛也補中益氣湯晡熱內熱及
寒熱者肝虛也加味逍遙散六味地黃丸盜汗少
寐脾鬱也加味歸脾湯逍遙散地黃丸發熱盜汗
腎虛也六味地黃丸

犀角飲子 治心經細粒砂疥

犀角屑 石菖蒲 木通 玄參

赤芍 甘菊花 甘草 赤小豆炒

用水二中生薑三片煎八分服

酒蒸黃連丸 治砂疥

黃連十二兩用酒五鍾煮乾

爲末米糊爲丸梧子大每服一二錢滾白水下

蒼朮膏 治膿濕疥

南蒼朮十觔切片砂鍋內水煮減半取汁再加
水煮如前以朮無味爲度并水一處用小鍋再
煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜜四兩空心
滾白湯調服

升麻和氣飲 治膿疥及熱腫脹痛大便閉者

升麻

葛根

蒼朮

桔梗

各一錢五分

陳皮

枳殼

茯苓

白芷

當歸

赤芍

各一錢

乾薑

甘草

各五分

大黃用量 生薑三片水煎食遠熱服

加味補中益氣湯 治膿疥而無完膚者

黃芪二錢 人參 白朮 當歸各一錢五分

粉草一錢 陳皮七分 柴胡 升麻各五分

蒼朮一錢 防風 玄參各八分 黃連

黃芩 黃柏各五分

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食遠溫服

涼血四物湯 治膿疥寒熱腫脹作痛者血虛也

當歸 川芎 赤芍 生地

蘇木 連翹 黃連 防風各一錢

甘草 五 水二鍾煎八分食遠服

黃芪化毒湯 治乾疥搔痒見血無膿者

黃芪 生五錢 連翹 二錢 防風 當歸

何首烏 白蒺藜 各一錢 水煎服能化毒生膿

如日久不乾再加白木 二錢 茯苓 一錢 以燥之

蒼朮湯 薰洗膿窠等疥

南蒼朮片 一斤 水一鍋煎至八分去渣取汁浸洗

久之次取渣置炭火於斗內加朮於火上焚之

以手架斗上薰之上以綿帛蓋之勿令泄氣 立驗

薰疥方

核桃

一箇油者更佳
劈兩半取仁加

膠棗肉

一箇

水銀

二分

研勻入

殼內合口糊紙條封縫一層用時取紅炭置爐

內將藥桃安火上不住撥轉令桃殼遍黑火將

入內時將爐入被內令患者曲膝駕被薰之以

絹帛護陰囊塞被頭露頭面候煙盡取出次日

其疥更盛由內毒盡發於外也避風二日照前

再薰一箇則瘡結痂陸續脫愈至重者不過三箇

薰疥餅子

銀硃

三錢

桑木炭

五錢

紅棗肉

二十箇

共搗如泥

分六丸晒乾每用一丸薰被

又方

水銀一錢

芸香一兩

紅棗肉二十箇 細茶末一錢

共研勻分六餅每早用爐盛炭火入藥一餅薰被至晚去爐臥之三日三餅十日全愈如無芸香好安息香二十枝代之

合掌丸

大楓子肉六錢

油核桃肉六錢

水銀四錢

天麻子肉二十粒

番打蔴末一錢

樟腦六錢

枯礬一錢

細茶末二錢

射香一分

苦食生用四箇研末

共搗為丸彈子大搽如常法

如疥多取一二

丸入滾水內化開用絹帛蘸洗三二次甚佳

疥靈丹 治五疥八癬經久不愈者

大楓子肉

一兩五錢

油核桃仁

二十箇

杏仁

二兩

川椒

末五錢

木鱉子肉

一兩五錢

水銀

二錢

樟腦

七錢

枯礬

五錢

豬脂油

一塊

共搗干杵如泥聽用須搔破搽之

臭靈丹

搽乾疥立効如膿疥桃破搽之微痛三

次愈

硫黃

末一兩

油核桃

一兩

水銀

一錢

生豬脂油

一兩

搗勻任川

烏頭黃爛瘡

雷丸

二十箇

大楓子

五箇

杏仁

五箇

蛇床子

二錢

硫黃一錢

蒲黃

川椒

枯礬各一錢

右為末用猪胆汁調敷

硫黃錠子

治一切疥癬及坐板等瘡

硫黃

溶化碎配內九次每用一兩配

白砒

五分

檀腦

一錢

黑鉛

一錢化投入

水銀

一錢

共研勻欲紅色加硃砂

一錢

欲黑色加百草霜

一錢

再研勻火化傾入銅盆內成片以刀界成塊收

用用時取一塊以香油磨濃塗之

製衣法

治小兒遍體生瘡

真柏油化塗舊絹衣上與兒穿之次日重出別

以油衣換之以虫盡爲度

煮衣法

阿魏

二錢

川椒

三錢

苦參

甘草節

荆芥穗

各五錢

入絹袋內水煮數十滾取小兒着體衣入內浸之陰乾着之三日一換

一用藁本煎湯浴兒浣衣

解薰藥砒藥等毒法 凡中是毒則陰囊腫脹裂痛

不可忍者用黃泥水洗之塗之

一用雞子清一箇加香油三分之一打百十下

令勻以鷺翎蘸掃患處其冷如冰其痛立止及

治湯火傷火藥傷多製塗之神妙莫測諸藥不

蘆薈丸

見疔瘡門

加味歸脾湯

逍遙散

見癩癧門

涼膈散

見咽喉門

搜風順氣丸

見癩癧門

六味地黃丸

十全大補湯

竹葉黃芪湯

清熱消毒散

補中益氣湯

俱見主治諸方門

諸癩

癩發於肺之瘋毒若癩則屬於脾之濕熱矣總不外

乎風熱濕重四者相合而成其形有六搔之起屑

者為乾癬有汁水者為濕癬不知痛痒者為風癬

卽頑癬堅厚如牛領之皮者爲牛皮癬白點相連者爲馬皮癬輪廓全無縱橫不定者爲刀癬戴院使云瘡有惡瘡癬有頑癬疥有疥癩嗜膚煩擾不當專用外敷必須內宣其毒方可除根然體虛者忌投風燥之藥復傷元氣如發痒時勿以指搔取葶蔴線繃緊於痒處刮之雖破而血出無妨常用此法則虫隨線下取虫淨癬自愈矣誠勿藥之奇方也或發痒時用針刺百餘下出盡毒血隨用鹽湯浸洗內服表散之藥出汗除根經云濕淫於內其血不可不砭至於敷抹之藥如芍藥藜蘆或草

烏白芨或甘草芫花每用一反加輕粉兒茶酒調
搽之如掃世稱川槿皮癬之聖藥也且難得真者
須用露水磨塗今人用泉水故多罔效諸癬宜炎
間使穴

吹花癬生於面初起痞癩作痒漸成緝瘡女子多有
之由風熱積鬱久之恐變風疰治宜清心火除肺
風外以羽白散搽之

逸風瘡生則遍身作痒狀如癬疥此由風氣逸於皮
膚也治宜汗之久之恐變風癩風癬

復煎散

當歸

川芎

生地

玄參

羌活

荆穗

各一錢

葱白

三根

淡豆豉

五十六粒

共一劑外用浮萍四兩水煎湯二碗去渣入藥再煎至一碗熱服出汗避風

清熱消風散

苦參

酒浸九蒸曬炒黃二錢

金銀花

蟬蟻

去土炒

全蝎

炒

皂角刺

猪牙皂

荆芥穗

防風

各一錢

葱白

七根

水酒各一鍾煎一鍾熱服忌發物

加味八珍湯 治風癰痒如虫行

人參

白朮

茯苓

甘草

當歸

川芎

白芍

生地

防風

白芷

姜蚕

白蘚皮

桂枝

少用

麻黃

少用

葱白三根生薑三片水二鍾煎八分服有虫者

兼服蠟礬丸

烏朮丸 治諸癰久不愈者

蒼朮

八兩為末用生薑十二兩取汁加童便并米酒

當歸

二兩

草烏

四兩為末用葱白四兩取汁拌烏成餅陰乾

白芷

四兩

共為末酒打糊為丸梧子大每服五十九

酒水下

四聖不老丹

血燥者宜此再兼服六味地黃丸

松香

為末水煮香沉為度傾入冷水內如式七次用十兩茯苓

甘菊

梧子仁

各四兩

共為末煉蜜為丸梧子大每服八十丸空心鹽

湯下或酒下

二合丸

治身面一切惡癬

苦參

酒浸炒淨

白蒺藜

去刺酒泡炒黃淨末四兩

黑丑

炒取頭末二兩

共一處和勻外用皂角

一斤去弦用

河水浸揉取濃

汁砂鍋內煎成膏和藥為丸或少加蜂蜜梧子

大每服二錢酒水任下

洗癬方

藜蘆

苦參 各二兩
五錢

草烏

皮硝

槐枝

名三
錢

水八碗煎六碗去渣再入

雄黃

末

雌黃

末各一
錢五分

先薰後洗以不痒為度少時再洗數次可愈

又歌云苦參鐵線透骨草椒艾川烏茶葉幫地骨
七椿俱半兩蛤硝三倍水煎湯

蜀契花洗方

回回蜀契根莖枝葉俱用或鮮或乾取三二科

切碎水煎露一宿煎熱薰洗

白硃砂散 治頑癬并驚掌瘋

硃砂

雄黃

象皮

煨

硼砂

各一錢

蟬酥

五分

白硃砂

煨二錢

右爲細末用真生桐油調搽患處以火烘之痒止爲度遍身頑癬如癩者燒猪糞薰之烘之鷺掌瘋燒鴿糞薰之烘之

朱橘元青露

治一切癬

陳皮

二錢

元青

三十箇卽班毛也

燒酒

半斤

共入瓶內浸三七日取汁搽癬上頻塗勿令乾

以患處覺熱痛為則隨起白泡破流清水水乾
結薄皮三二日脫愈甚者三二次除根不

馬蹄膏 治一切癰

白馬蹄

煨存性

為末預取馬齒莧梓爛加水煎成

膏調前末搽之

一用鮮絲瓜葉於患處搽之

羽白散

治面上吹花癰并錢癰

白礬

半生半熟

為末黃酒調化以鷄翎蘸掃患處

甚者枯礬末

二兩朝腦

一錢

為末醋調敷

一用葛條燒灰存性為末燈窩油調敷

一先抓破取穀樹汁搽之

瘰

瘰者瘡癰也大如酸棗赤腫而有膿血宜羊角散服之葫蘆化毒丹塗之

羊角散 治瘰及癩毒赤班

羊角連內骨燒存性為末每服三錢黃酒調服

葫蘆化毒丹

見腫毒門

癰

癰者先如水泡作瘰次變膿泡作瘰經云汗出見風

乃生瘰癰由肺熱脾濕所致宜涼血消風散

涼血消風散

治熱瘡癩子瘡疥癩疹赤斑

當歸

生地

知母

石膏

苦參

牛旁子

蟬腿

胡麻

防風

荆芥

蒼朮

木通

甘草

各五分

水二鍾煎八分服

洗藥白金散

虎杖

豌豆

甘草

各四錢

水煎淋洗水冷拭乾以滑石粉摻之令遍

次日即驗

棗葉可煎洗

朴硝可冲洗

驚黃散

瘞癩作痒抓之損後作痛者

菜豆粉

兩一錢五

黃柏

錢三

輕粉

錢二

爲末撲之

瘡癰

瘡癰者狀如藤豆搔之成瘡由汗出見風所致宜秦

芎湯黑龍丸服之二參湯洗之

秦芎湯

治瘡癰

秦芎

一錢五分

麻黃

防風

升麻

枳殼

犀角鎊

生勞子

黃芩

玄參

甘草

各一錢

水一鍾煎八分服

治瘡癰上攻頭面者

京墨

羌活

薄荷葉

蔓荊子

獨活

各一兩

川芎

甘草

炙

荊芥穗

防風

南星

薑製

草烏

生

姜蚕

炒

白芷

白附子

炮

枝子

川烏

炮去

各一兩

右為末煉蜜丸一錢重每用一丸細嚼茶酒

下

洗藥二參湯

洗瘡癰

丹參

苦參

各四兩

蛇床子

生三兩

水一斗煎七升去渣薰洗

二味消毒散

見首卷敷貼門

浸淫瘡

浸淫瘡者轉廣有汁多起於心經曰歲火太盛甚則身熱而肌膚浸淫仲景云從口流向四肢者順反此者逆治同痊癩外搽青蛤粉

青蛤散

見面部小疵

天炮瘡

天炮瘡者初起白色燎漿水泡小如芡實大如棋子

涎及遍身疼痛難忍由肺受暑熱穢氣伏結而成

故又名肺疽宜香薷飲再上體多風熱解毒瀉心

湯下體多濕熱清脾甘露飲外以石珍散毒氣入

囊者不治

香薷飲 治伏暑

香薷

厚朴

薑汁炒

白扁豆

炒

黃連

薑汁炒

水煎冷服 脈虛氣虛者加人參麥冬五味子

解毒瀉心湯 入心經火旺酷暑時臨致生天炮

黃連

牛旁子

防風

荊芥

黃芩

枝子

知母

石膏

滑石

玄參

各一錢

木通

甘草

各五分

水二鍾 燈心二十根 煎八分服

清脾甘露飲

治脾經濕熱下體多生者

白朮

蒼朮

赤苓

澤瀉

茵陳

枝子

麥冬

黃芩

生地

枳殼

連翹

玄明粉

甘草

等分

水二鍾燈心竹葉各二十煎八分服

石珍散 治天炮日久爛痛膿水淋漓者

石膏

煨

輕粉

各一兩

青黛

黃栢

各三錢

右為末先用甘草湯洗淨摻之痛止

火赤瘡

火赤瘡初起赤色燎漿膿泡黃水浸淫痛如火燎宜

清肌解毒湯服之清涼汁塗之

清肌解毒湯 治火赤瘡

犀角 牛旁子 荆芥 黃芩

甘草 葛根 枝子 黃連

黃栢 知母 花粉 赤芍

水二鍾煎八分服

清涼汁 塗火赤瘡

黃連 黃芩 黃栢 枝子

薄荷 桔梗 枳殼 甘草 各五錢

水煎數沸濾去渣入冰片 三分 射香 二分 研末和入

以鷺翎蘸掃患處

寒瘡

寒瘡形如貓眼有光彩而無膿血多生身面冬則近脛由

脾經濕熱所致先服金蟬解毒丸次服清肌滲濕湯多食雞魚蒜韭忌用鮎魚蝦蟹

清肌滲濕湯

蒼朮

厚朴

陳皮

甘草

白朮

白芷

升麻

柴胡

黃連

枝子

澤瀉

木通

用水二鍾生薑三片燈心二十根煎八分服

魚脊瘡

魚脊瘡

初生小泡如魚脊

久則潰流黃水由臟冷督脈經虛

宜托裏消毒散

見首卷

骨痠瘡

骨痠瘡

初生如粟如豆漸生如梅如李

血不出膿不生癩不止久則

涎及遍身治如疔法

紅絲瘡

紅絲瘡

肌膚有紅絲貫串

痒痛不常由心經積熱所致治如

紅絲疔法

天蛇瘡

天蛇瘡肌膚似癩非癩由草中花蜘蛛螫傷仍被露水所瘡

所致宜秦芫湯

秦芫湯 秦芫一味煎湯飲之

風疔血疔

風疔形如風癰破流黃水遍體浸淫由風濕客於谷道也

搽如聖膏

用蒜油斤半

當歸錢五

巴豆仁錢三

燻柿去渣入

黃蠟兩三

溶化離火將凝入輕粉錢二和勻之

血疔

形如紫疥

痒痛多血由風熱閉塞腠理也宜清肌湯

濕湯

見前寒瘡

白疔

白疔膚如疹疥色日而蛇風由風邪客於皮膚血燥

不能榮養所致宜搜風順氣丸神應養真丹加白

蛇之類

搜風順氣丸

見癩風門

神應養真丹

見股部

漆瘡

漆瘡

初時發痒形如癢疹

次則頭面虛腫遍體破爛流水作痛

似癩甚則寒熱交作由新漆辛熱有毒入之秉質

有偏腠理不密感其氣而生也宜服化班解毒湯

再杵生蠟冲酒濾去渣飲之已潰成瘡流水處用

生柳葉三觔水煎洗之或乾荷葉一觔煎湯洗之
或白礬四五兩水化浸洗之其未破處發紅班作
痒者用二味消毒散搽之

化班解毒湯

見丹毒門

二味消毒散

見首卷敷貼門

血箭

血箭 由心火熾盛逼血從毛孔中射出也急用龍

眼殼半箇烙平盛金墨汁覆於患處扎緊過三五

日方可去之內用藤油三二兩好酒和服或用生

薑汁飲之立愈次服清心涼血等藥如失血過多

者寥

黃芪補血湯

治失血過多筋無榮養四肢拘攣口禁如瘞者

黃芪

兩一

當歸

五錢如挾風兼破傷風者歸芪等分加

羌活

防風

各一錢

荆芥穗

一錢五分

俱水煎服

血瘧

血瘧者初起色紅如瘧漸大如豆指之流血不止由

肝經鬱火血熱所致用枯藥拈去其瘧次以生肌

散收口內熱甚者服清肝涼血等藥

跌撲損傷

脉經曰顛朴內有血則腹脹滿脉堅强者生小弱者

或跌撲不分十二經絡血必歸肝雷於脇下痛其
則必自汗汗由風化也治則先逐惡血通經絡次
和血止痛然後調氣養血補益胃氣自能護効

如腹痛按之痛甚者瘀也下之下而痛不止按之
仍痛者瘀未盡也復元活血湯調之腹痛按之不
痛者血氣傷也四物湯加參芪白朮補而和之

用大黃等藥血不下反胸脹氣喘者宜順其氣用
肉桂木香等分
二錢酒服卽下黑血及前所服之藥而

蘇弱者用下藥亦加木香肉桂同煎借其熱以
行其氣然服行氣藥反胸痞氣促食少體倦及色

黯膿清者形氣虛也補之 胸腹脹痛大便不通
喘咳吐血者瘀滯也當歸導滯湯通之 下而胸
腹反痛者肝血傷也四君子湯加芍歸補之 下
而發熱陰血傷也四物湯加參朮補之 下而惡
寒陽氣傷也十全大補湯補之 下而欲嘔胃氣
傷也六君子湯加當歸補之 下而泄瀉脾腎傷
也六君子湯加肉果破故紙補之 下後手足冷
昏憤出汗陽氣虛寒也參附湯溫之 吐瀉肢冷
甲青者虛寒甚也參附湯倍用之 若口禁撒手
遺尿唇青痰盛體冷者虛極之壞症也投大劑參

附湯多有得生者

脉浮緊發寒熱身體痛者挾外邪也治宜發散春用
五積散香蘇飲夏用香蘇飲秋用正氣散冬用和
解散再宜隨症加減

患處或諸竅出血者肝火也加味逍遙散中氣不足
血無所附者補中益氣湯元氣內脫不能攝血者
獨參湯加炮薑如不應加附子血蘊於內而嘔血
者四物湯加芩柴傷重昏憤者雖有瘀血切不可
下急以獨參湯補之花蓋石散化之恐因瀉

而凶陽也

凡損傷勞碌怒氣腹脹悞服大黃等藥者傷陽絡則

爲吐血衄血尿血便血等症傷陰絡則爲血塊血
積肌肉青黯此臟腑虧損經脈失職急補脾肺亦
有得生者但恐患者不悟此理不用此法惜哉

凡傷重氣絕不語者以熱童便灌之不問壯弱及瘀
血有無并膈脹作痛發熱煩燥口乾者服之絕勝
他藥有推陳致新之功神効莫測打血藥內加之
立驗 上部傷者再加韭汁 迷悶者烏金丸用
紅花酒加童便化服

骨斷皮破者藥宜水煎皮不破者藥宜酒煎然必加
童便以活其瘀純用酒煎反能作脹同損藥服反

能澁秘 酒用無灰酒
不論赤白

跌撲停瘀先利二便不可待秘恐成重疾然下之大

過則脉愈堅大妄為瘀滯而更下之因而天折者多矣

損傷忌服草藥服之所生之骨必大不能入柙

自然銅雖有接骨之功其性燥宜量用傷輕者勿

用 無名異為末酒服能散毒血於四肢 跌損

不可無乳沒惟降真香可代亦可代血竭 腫痛

乃血瘀所致用熱藥煎湯淋洗 瘀腫不消者砭

之否則愈後遇天陰作痛 忌梨并生冷恐凝血

忌食牛肉則痛不止 忌火灸忌見風

肚破脂出孔小者以手劈去其脂不可復人人則爲
害骨斷筋連者不急剪去其筋則浸好肉爲不治
腸出者令患者手搭醫者之肩隨其左右收起用大
麥煮粥取湯洗腸淨以麻油抹手并瘡口卽吹通
關散取噤令腸自入用桑皮搓線以雞血塗之再
以花蓋石散摻之縫須縫裏皮留外皮開口塗雞
血搽生肌等藥如腸損以燈照之有氣射出者不
陰囊破者塗雞子黃油摻金毛狗脊毛以紫蘇葉煎
湯洗之內服止痛藥有瘀者用破血藥
齒傷動者用蒺藜根燒存性搯之久用自牢

眼科受傷青黑腫痛者用紫金皮

用童便浸七日晒乾餘處傷者不必

製與生地分等為末茶湯調敷

腰傷作痛諸藥罔效者白芍赤芍葳靈仙乳香沒藥等分為末酒服即減

慈救散 治跌撲骨折至死但胸前有暖氣者亦效

山查八錢

通草三錢

降香末

川山甲

丹皮各二錢

赤芍

香附酒炒

紅曲

陳皮

麥牙炒各一錢

當歸八分

青皮

紅花各七分

桔梗五分

乳香痛加

沒藥各一錢

用水三碗煎一碗服

玉靈丹 治跌打損傷

香附

蘇子

各四兩

蘇木

羅蔔子

桃仁

當歸

降香

紅花

枳實

青皮

各一兩

沉香

木香

官桂

各五錢

乳香

沒藥

藿香

陳皮

檳榔

蓬朮

白豆蔻

各三錢

各為末和勻用童便黃酒黑砂糖各一碗合一

處煎如膏和藥為丸彈子大每服一九黃酒化

下或用赤砂糖湯化下

復元活血湯

治墜下脇痛

柴胡一錢五分 當歸二錢 川山甲炒 瓜蒌仁

紅花各七分 桃仁十七箇 甘草五分 大黃三錢

水二分酒一分煎一鍾食遠服以利為度

五加四靈散 治跌撲損傷

五加皮 骨碎補 川續斷 葳靈仁各三錢五分

陳酒二碗煎一碗服

五加三皮散

五加皮二兩 桂皮一兩 綿皮一錢五分 良薑五錢

砂仁五錢 如骨碎加丹皮一兩 乳香

沒藥 血竭各一錢