

丹溪附餘三種

醫
酒
學
發
明

二酉堂梓



醫學發明方目錄

吳棗莢丸 氣石 交通

消痞丸 心下

本草十劑

乳香神應散 止痛

紫金丹 骨

調中順氣丸 帶痞

木香順氣湯 服

加減瀉白散 瀉

三奇湯 痰嗽

利膈丸 痰喘 效驗

黃耆補中湯

傷元活血湯 墮墜

當歸導滯散 墮墜

聖靈丹 止痛

沉香導氣丸 痞

沉香交泰丸 脚

神祕湯

補中益氣湯 倦



朱砂安神丸鎮固

人參益肺散氣鬱

草苳薏丸心痛

丁香練實丸癩疔

茴香練實丸疔

托裏榮衛湯瘡

續命子丸虛腫

六香楊氣丸腹脹

道滯通經湯脾濕

薑附湯寒禁

用藥如減法

通氣防風湯太

白木附子湯寒中

天台烏藥散疔

川練子散疔

沉香海金沙丸脾

海金沙散脾濕

廣茂瀆堅湯積

赤茯苓丸脾濕

沉香桂附丸



十全大補湯補弱

中滿分消湯寒脹

加減二陳湯吐

參蘇溫肺湯寒嗽

清肺飲子開小便

補腎益肝丸困王

地黃丸腎虛

離珠丸虛冷

八味丸腎氣虛

潤腸湯燥結

中滿分消丸熱脹

藿香安胃散嘔吐

人參平肺散肺癆

滋腎丸熱閉不渴

還少丹補

水芝丸補

三才封髓丹益腎水

天真丹下焦虛

通幽湯幽門不通

當歸拈痛湯脚氣



羌活道滯湯脚氣

除濕丹温腫

枳實大黃湯脚腫

疎風湯中風

大羌活愈風湯風

半夏温肺湯痰冷嗽

紫蘇飲子脾寒

雙和散補血氣

五和相干

與結導飲丸痞悶

除風湯淋瀝

小續命湯中風

三化湯治風燥

大秦芎湯中風

丁香半夏丸停飲

巴戟丸腎虛

附子温中丸温胃

醫學發明藥目錄終



医家發明卷一

新安吳勉學校

膈咽不通並四時換氣用藥法

黃帝鍼經云胃病者腹膜脹胃腕當心而痛上支兩
脇膈咽不通食飲不下取三里夫咽者璣物之門
戶也膈者上焦胸中心肺之分野不通者升降
氣上不得交又云清氣在下則生飧泄泄黃如糜
米穀不化者是也濁氣在上則生膈脹腹中膜滿
不得大便或大便難或先結後溏皆是也濁氣在
上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而



反在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是
陰欠之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也
此皆氣衝之火逆胃之脉反上而作者也清氣在
下則生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而營
經也因飲食失節勞役形體心火乘於土位胃氣
弱而下陷于陰中故米穀入而不得升反降而為
飧泄也膈咽之間文通之氣不得表裏者皆衝脉
上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通
飲食不下取三里者是也鍼經云清濁相于亂於
腎中是為大惋惋者感也氣不交通最為急證不

急去之諸線生矣聖人治此有要法陽氣不足陰
氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發後
陽分而後瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經
脈去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有
噎有塞塞者五藏之所生陰也血也噎者六府之
所生陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今
四氣用藥並治法于後

冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗
內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬
乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之

母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者
 善嚏鼻涕清涕寒甚出濁涕嚏不止比常
 風寒小便數而欠或上飲下便色清而多夫便不
 調夜寒無寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為噎
 沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者

吳茱萸丸主之

吳茱萸 草豆蔻仁各一分 橘皮

益智仁 人參 黃芪 升麻各八分

澤瀉 白殭蚕 薑黃 柴胡各四分

當歸身 炙甘草各六分 木香二分



青皮分三

大麥蘖五

半夏一錢

半夏一錢

右件為細末湯浸蒸餅為丸如葶豆大細嚼二十丸白湯送下無時

夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天助正氣而挫其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中如梗甚者前證俱作治法當從時利膈丸泄肺火以黃芪補中湯送下如兩足痿厥行步惛然欹側欲倒臂膈如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃芪人參甘草白



医药大学图书馆版

木蒼木澤瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎丸
一百五十九丸六七月之間濕熱之令大行氣短不
能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食未下
以上件白木蒼米等湯送下消痞丸五七
當審而用之

利膈丸主胸中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香七錢

檳榔七錢

厚朴姜製二兩

人參

藿香葉

當歸

炙甘草

枳實炒各三兩

大黃

酒浸焙秤二兩

右為細末滴水和丸或少用蒸餅亦可如梧子大



每服三五十丸食後諸飲下

消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連去鬚煉淨炒六錢

黃芩刮黃色六錢

姜黃 白木酪

人參 四錢

炙甘草 錢

縮砂仁 錢

枳實麸炒黃色牛兩

橘皮炒黃色錢

乾生姜 錢

半夏湯洗七次四錢

炒黃芩 錢

一方加澤瀉厚朴各三錢

猪苓 三錢

右為極細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七
十九至百丸白湯送下食後服

黃芪補中湯



黃芪 錢一

人參 錢一

炙甘草

白朮

蒼水

橘皮 各半

澤瀉

猪苓

茯苓 各三分

右吹咀都作一服水二盞煎至一盞去滓大溫

下上件九藥

本草十劑

宜可以去壅姜橘之屬是也此大畧言之蓋外感六

經之邪欲傳入裏三陰尚實而不受逆邪氣於胃

中室塞不通而成喘或嘔所謂壅也仲景云嘔多

雖有陽明證不可攻之此乾瀉者乎 三陰者 故單



用生姜宜散必愈若嘔者有聲而有物邪在胃系
未深入胃中以生姜橘皮治之或以藿香丁香按
夏亦此之類被之必愈此天分氣分虛無痰一脈
所受今乃窒塞仲景謂膈之上屬上焦悉屬於表
或有形質之物因而越之則可若氣壅則不可
者吐也亦無下之理破氣藥也辛瀉氣若陰虛穢氣述上窒塞
嘔噦不足之病此地道不通也止當用生地黃當
歸桃仁紅花之類和血涼血潤血蒸用甘藥以補
其氣微加大黃芒硝以通其閉大便利邪氣去則
氣逆嘔噦自不見幸復有胃中虛熱穀氣大虛發

而為嘔噦者俾得五穀之陰以和之或食或飲

嘔噦皆止則嘔噦自止且如小兒其後餘熱不遺

不收歛大便不行一謂血燥則當以陰藥治之因

而補之用清涼飲子通利大便而瀉其熱也

云涼風至而草木實夫清涼飲子乃秋風微熱之

劑傷寒家邪入於裏日晡潮熱大渴引飲諱語躁

狂不大便是謂胃實乃可攻之夫胃氣為濕熱所

傷以承氣湯瀉其上實元氣乃得周流承氣之名

於此見矣今哀世人以苦瀉火故備陳之除熱瀉

火非其寒不可以苦寒瀉火非徒無益而以害之



故諒諄及此至如孫真人言生疆嘔家之聖藥請
上焦氣壅表實而言之非以瀉氣而言之也

右脾胃虛弱穀氣不行榮衛下流清氣不上留中閉

塞惟益胃推揚穀氣而已不宜瀉也若妄以瀉氣

瀉血藥下之下之則轉增閉塞疼痛或變作結胃

復下其膈由此致危者多矣鍼經說阿欠噦喘穰

寒噫噎彈涕淚出大息涎下耳中鳴自齧舌煩唇

視生病者補之此十二邪者皆奇邪之走空竅者

也凡邪之所在皆為不足宜補而不宜瀉空竅者

胃之清氣能通也胃氣虛則穀氣不上行是氣路

六



不利經云蕪泉王英者津液之道路也津液不上
胃中氣路不開亦令人噦勿作外實以空藥生寒
之類瀉其壅滯蓋肺氣已虛而反瀉之是重瀉其
氣必胸中如刀割之痛與正結胸無異亦
外用藥之際可不慎哉

通可以去滯通草防已之屬是也防已大苦寒能瀉
血中大熱之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者
皆可瀉血滯豈止防已而已通草甘淡能助西方
秋氣下降利小便而瀉氣滯也小便氣化若熱絕
津液之源於肺經源絕則寒水斷流故膀胱受濕



熱津液癰閉約縮小便不通宜以此治之其脉右寸洪緩而數左尺亦然其證胸中煩熱口燥舌乾咽嗑亦乾大渴引飲小便淋瀝或閉塞不通脛肢脚熱此通草主之凡與通草同者茯苓澤瀉通草猪苓琥珀藜麥車前子之類皆可以參泄利其滯也此雖泄氣滯小便不利於肺中有所未盡爾麥苦寓長安有王善夫病小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極脚腿堅脹破裂出黃水雙睛凸出晝夜不得眠飲食不下痛苦不可名狀其親戚輩求治病人始病不渴近添嘔噦所服治中滿

利小便之藥甚多細思素問云無陽者陰無以生
無陰者陽無以化膀胱津液之府氣化乃能出矣
此病小便癃閉是無陰陽氣不化者也凡利小便
之藥皆淡味滲泄為陽止是氣藥謂稟西方燥金
之化自天降地是陽中之陰非北方寒水陰中之
陰所化者也此蓋奉養太過膏梁積熱損北方之
陰腎水不足膀胱腎之室久而乾涸小便不化火
又逆上而為嘔噦非膈上所主也獨為關非格病
也潔古曰熱在下焦填塞不便是治關格之法今
病者內關外格之證悉具死在旦夕且治下焦乃

可愈遠處以稟北方之寒水所化大苦與氣味者

黃蘗

知母醑二酒洗之以肉桂為之

所謂寒因熱用者也同為極細末煎熟水為丸

梧子大焙乾空腹令以沸湯下二百丸少時來報

藥服須與如刀刺前陰火燒之痛溺如瀑泉湧出

即且盡濕牀不成流顧盼之間腫脹消散故因說

之或曰防已之性若何曰防已大苦寒能泄血中

之濕熱通血中之滯塞補陰瀉陽助秋冬瀉春夏

藥也此之於人則險而健者也險健之小人幸災

樂禍遇風塵之警則首為亂階然而見善亦喜逢



惡亦怒如善用之亦可以敵兇暴之人保險固之
地此膜眩之藥聖人有所存而不廢耳大抵固之
真則可惡下咽則令人身心為之煩亂飲食湯之
減少至於十二經有濕熱壅塞不通及治疔疔脚
氣除膀胱積熱而庇其基本非此藥不可真行逢
之仙藥無可代之者復有不可用者數事若遇飲
食勞倦陰虛生內熱元氣穀氣已虧之病以防已
泄大便則重亡其血此不可用一也如人大渴引
飲是熱在上焦肺經氣分宜淡滲之此不可用二
也若人以病津液不行上焦虛渴宜補以人參葛

根之甘溫用若寒之劑則速危此不可用三也若
下焦有濕熱流入十二經致二陰不通然後可
而用之耳

可以去弱人參羊肉之屬是也夫人參之甘溫能
補氣之虛羊肉之甘熱能補血之虛羊肉有形之
物也能補有形肌肉之氣凡氣味與人參羊肉同
者皆可以補之故云屬也人參補氣羊肉補形形
氣者有無之象也以大言之具天地兩儀者也以
小言之則人之陰陽氣血也以之養生則莫重於
斯以天地物類論之則形者坤土也人之脾胃也



乃生長萬物也地欲靜靜則萬物安坤元一正之
 土亘古不遷者也耕種之土乃五行運用者也
 之有時春耕是也若冬時動之令天地閉藏者地
 地氣凝聚者散精氣竭絕萬化不安亦如人之勞
 役形體則大病生焉故曰不妄作勞則形體靜
 時若勞役妄作則百脉浮張血脈沸騰精氣竭絕
 則九竅閉塞衛氣散解夫以人參甘草之類治其
 已病曷若救其未病為拔本塞源之計哉內經云
 心閑少欲飲食有節起居有常減其思慮省語養
 氣庶幾於道何病之有如或不慎病形已彰若能



調其脾胃使榮氣旺清氣上升則四藏各得其所
以氣論之天地人三焦之氣各異損其脾者益其
氣損其脾胃調其飲食適其寒溫黃芪之甘溫能
補皮毛之氣人參之甘溫能補肺之氣甘草之甘
溫能補脾胃之中經營之氣肺主諸氣氣旺則精
自生形自盛血氣以平故曰陽生則陰長此之謂
也血不自生須得生陽氣之藥血自旺矣是陽主
生也若陰虛單補血血無由而生無陽故也仲景
以人參為補血藥其以此歟乃補氣補血之大畧
也



洩可以去閉葶藶大黃之屬是也此二味皆大苦寒
氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以洩陽分肺
中之閉也亦能洩大便為體輕象陽故也大黃之
苦寒能走而不守洩血閉也血閉者謂胃中凝滯
有形之物閉塞者也陽明病胃家實是也日晡潮
熱大渴躁作有形之熱故洩其大便使通和汗出
而愈其一則治血病洩大便一則洩氣閉利小便
若經絡中及皮毛分肉間但有疼痛一概用牽牛
大黃下之乖戾甚矣通則不痛痛則不通痛隨利
減當通其經絡則疼痛去也如輕可以去實麻黃

葛根之屬是也。謂如頭痛當以細辛川芎之類通之。則無所疑滯。即痛隨利減也。臂痛有六道經絡。究其痛在何經絡之閉。以行本經行其氣。血氣流通利則愈矣。若表上諸疼痛便下之。則不可當。詳細而辨之也。

輕可以去實。麻黃葛根之屬是也。夫六淫有餘之邪。客於陽分皮毛之間。腠理閉拒。謂之實也。實者榮衛氣血不行之謂也。宜以輕利開腠理。致津液。通氣也。皮毛經絡寒邪之實去矣。故二藥之體輕清。成象象氣之輕浮也。寒邪為實。輕可以去之。然大



同而小異蓋麻黃微苦為陰之陽可入足太陽寒

水之經其經循背下行本寒而又受外寒汗出為

愈當以發之葛根味甘溫可以發足陽明經次之

經身已前所受寒邪也非正發汗之藥謂陽明藥

發汗利小便但解去經絡肌肉間寒邪則氣和汗

自出矣麻黃耑發汗去皮毛氣分寒邪葛根和解

血分寒邪乃一陰一陽能洩表實不能瀉裏實若

飲食勞倦雜病自汗表虛之證認作有餘使用麻

黃發之汗大出則表益虛此善不知表虛宜補其

亡陽用其自汗秋冬用桂枝春夏用黃芪代之黃



芪者能治虛勞自汗陽明標病者也陽明胃主自汗小便數若以人參甘草之類補之脾胃實脾胃實則衛氣行衛氣行則表自實表既實自汗何由而出清氣上行雖發泄亦止矣此治其本也若根雖為和解之藥亦不可用用之則重虛其表仲景所論內外不足自汗之證大禁發汗利小便若已經發汗寒邪未去雖發汗數多不可禁也寒邪已去重發其汗則脫人元氣若多汗小便赤澁不得利小便為汗奪津液故也汗家不得重發汗小便多不得發汗汗多不得利小便小便多不得重利



小便聖人所以切禁此者為津液乃氣血之基本也一云亡陽一云脫血病人重發汗重利小便必脫元氣七神無依則必危困矣因辨麻黃葛根之宜禁故兼及之

中風同從高墜下

夫從高墜下惡血留於內不分十二經絡聖人俱作風中肝經留於脇下以中風瘵之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經之傷必留於脇下血肝主血故也痛甚則必有自汗但人有汗出皆為風證諸痛皆屬於肝木既敗血凝泣從其屬於



肝也從高墜下逆其上行之血氣非肝而何非傷風無汗既自汗必是化也以破血行經之藥治之傷元沽血湯治從高墜下惡血留於脇下及疼痛可忍

柴胡半兩

萸根

當歸錢三

紅花

甘草

山甲

二錢各

大黃

酒浸一兩

桃仁

酒浸去皮尖

開

去尖

黃帝鍼經云有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上

而不行下于脇則傷肝肝胆之經俱行於脇下經

屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸和血



脉又急者痛也甘草緩其急亦能生新血地甘生腸
生陰長故也為臣川山甲瓜蒌根桃仁紅花破血
潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為之使氣味
和合氣血各有所歸痛自去矣

右件除桃仁外挫如麻豈大每服一兩水一盞半
酒半盞同煮至七分去滓大溫服之食前以利為
度得利痛咸不盡服

孔香神應散治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛

乳香

沒藥

雄黑豆

桑白皮

獨科藥子各一兩

破故紙二兩炒香



右為細末每服半兩醋一盞於砂石器內煎至六分入麝香少許去滓溫服

當歸導滯散治落馬墜車打撲損傷瘀血大便不通

紅腫青黯疼痛昏悶畜血內壅欲死

川大黃兩一 川當歸分一 麝香少

右三味除麝香另研外為極細末研勻每服三錢

熱酒一盞調下食前內瘀血去或骨節折疼痛不

可忍以定痛接骨紫金丹治之

紫金丹

川烏頭炮 草烏頭炮 各一兩 五靈脂



木鱉子去殼 骨碎補

葳靈仙

金毛狗脊

自然銅醋煅七

防風

地龍去土

烏藥

青皮白去

陳皮去

茴香

黑牽牛 各半錢

乳香

沒藥

紅娘子

麝香各二錢半

禹餘糧石醋炒

右為細末醋麪糊為丸如梧子大每服十九至三

十九溫酒調下病在上食後病在下食前

聖靈丹治打撲損傷及傷折疼痛不可忍者

乳香半

烏梅去核 蒿苳子

一大盞沙黃 取二兩入錢

白冰化



左為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九細嚼

酒送下喫了一伏時不痛如痛再服

允衛氣留於腹中積滯不行脉弦急及腹皮急筋痛

不得常所支脇胃中滿喘呼逆息者

調中順氣丸治三焦痞滯水飲停積脇下虛痛或時

刺痛

木香

白芷薤仁

青皮洗

陳皮洗

京三稜洗各一兩

大腹子

半夏洗

各二兩

縮砂仁

檳榔

沉香各半兩



右為細末水糊為丸如梧子大每服三十九漸加
至五十九丸煎陳皮湯下

沉香導氣散治一切氣不升降脇肋刺痛胃脘

沉香

檳榔 錫礬 人參

訶子肉

大腹皮

剉炒各半兩

烏藥

麥蘖

白朮

神麴

厚朴

紫蘇葉

香附

炒一兩半

紅皮

炙甘草

京三稜

炮

廣茂

益智仁

右為極細末每服二錢食前沸湯點服

清氣在下則生痰泄瀉濁氣在上則生膈脹此陰陽反



作病之逆從也飲食失節則為肺又濕熱亦為肺
右關脉洪緩而沉弦脉浮於上是風濕熱三脉合
而為病也是脾胃之令不行陰火亢甚乘於脾胃
故膈咽不通致濁陰之氣不得下降而大便乾燥
不行胃之濕與客陰之火俱在其中則脹作使心
門通利泄其陰火精其燥血生益新血則大便不
閉吸門亦不受邪濁陰得下歸地也經云中滿者
泄之於內此法是也

木香順氣湯治濁氣在上則生臌脹

木香三分厚朴

姜製青皮白

陳皮

益智仁

白茯苓去皮澤瀉

乾生姜

半夏湯洗

吳茱萸湯洗各二分

當歸五分

升麻

柴胡各一分 草豆蔻麩異洗去三分

蒼朮泔浸三分

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓大溫

服食前忌生冷硬物及怒經云留者行之結者散

之以柴胡升麻苦平行少陽陽明二經發散清氣

運行陽分為君以生姜半夏草豆蔻仁益智仁

辛甘大熱消散中塞為臣厚朴木香蒼朮青皮

苦辛大溫通順滯當歸人參陳皮空溫甘調和



榮衛滋養中氣濁氣不降以苦泄

吳茱萸苦

熱泄之者也氣之薄者陽中之陰茯苓甘平澤瀉鹹平氣薄引導瀉陰之氣自天而下故以為泄瀉味相合散之泄之上之下之使清濁之氣各安其位也 范天駭夫人先因勞役飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿且食則不能暮食兩脇刺痛診其脈弦而細至夜濁陰之氣當降而不降臍脹尤甚大抵陽主運化飲食勞倦損傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃中生發之氣上行陽道又以前藥助

之使濁陰之氣自此而降矣

沉香交泰丸治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸

以為臍脹

沉香

白木

陳皮

去白各三錢

枳實

其炒去穢

吳茱萸

湯洗

白茯苓

去白各

澤瀉

當歸

洗

木香

青皮

去白各三錢

大黃

酒浸一兩

厚朴

姜製半兩

右件各揀淨同為細末湯浸蒸餅為丸如梧子六

每服五十九至七八十九丸溫白湯下食前微利即

止



嘔欬氣喘

所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣

無所依從故嘔欬上氣喘也

加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮兩地骨皮錢甘草錢陳皮

青皮白五味子人參去苳各半兩

白茯苓三錢

右件藥咀每服四錢水一盞半八粳米十粒同煎

至一盞去滓大溫服食後

神祕湯治病人不得卧臥則喘者水氣逆上乘于肺



肺得水而浮而使氣不通流其脉沉大宜此治之

橘皮洗 生薑

紫蘇葉 人參

桑白皮剉炒各半兩

木香 白茯苓去土

右咬咀以水三升煎至一升去滓大温分三服

加減三奇湯治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗去芦半兩 半夏湯洗七錢 陳皮去白 甘草

青皮去白 人參去芦各半兩 杏仁研三錢

五味子錢四 加些紫蘇葉桑白皮各半兩

右咬咀每服四錢水一大盞生姜三片煎至一盞

去滓大温服食後



飲食勞倦論

古之至人窮於陰陽之化究乎生死之際所著內經
悉言人以胃氣為本人受水穀之氣以生所謂清
氣營氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫
胃為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾
氣散精上歸於肺通詞水道下輸膀胱水精四布
五經並行合於四時五藏陰陽揆度以為常也苟
飲食失節寒濕不適則脾胃乃傷又喜怒憂恐損
耗元氣既脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火
者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火



伐之相火下焦包人之火元氣之賊也火與元氣
木兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎肝陰
火得乘其土位故脾胃之證始得之則氣高而喘
身熱而煩其脉洪大而頭痛或渴不止其皮膚濡不
任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘而煩熱
為頭痛為渴而脉洪脾胃之氣下流使穀氣不得
升浮是春生之令不行則無陽以護其榮衛故不
任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然
而外感風寒所得之證頗同而實異內傷脾胃乃
傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外為有餘有餘

者瀉之傷其內為不足不足者補之之皆瀉也溫之和之調內傷不足之證苟誤認作之養之之類皆補也感有餘之病而反瀉之則虛其虛也實實虛虛不足而補有餘如此死者醫殺之耳然則奈何且惟當以辛甘溫之劑補其中而升其陽甘寒以其其火則愈美勞者溫之損者溫之溫能除大執忌苦寒之藥瀉其土耳今立

補中益氣湯主之

黃芪

五分病甚勞役

當歸身

二錢酒焙乾或日乾以和血脈

人參

去苦三錢有刺去之

白朮

三分以調中氣



柴胡

二分引清氣上行少陽之經

炙甘草五升

麻二分引胃氣上騰

復其本位便是行春升之令

橘川

三分以不滯氣又能益元氣得諸甘藥及

可若獨用

一方加白芍藥黃蘗紅花

一右件咬阻都作一服水二盞煎至一盞去粗大溫

服食遠

夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其

次肺氣受邪須用黃芪最多甘草人參次之脾胃

一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不

令目汗損其元氣上喘氣短人參以補之心火乘

脾須炙甘草之甘以瀉火熱而補脾胃中元氣若



脾胃急痛並大虛腹皮急縮者最宜多用急者緩
之昏中清氣在下必加升麻柴胡以引之引黃芪
甘草上升能補衛氣之散解以緩帶脉之縮急
味苦平味薄者陰中之陽而引清氣上升也黃芪
人參甘草三味皆甘溫為主凡脾胃虛乃必用之
藥氣亂於胸為清濁相干用去白橘皮以理之
能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛為用也口乾
嗌乾者加葛根脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其
生發之氣榮血大虧管氣不營陰火熾盛是血中
伏火日漸煎熬血氣日減心色與心主血血減則

心無所養致使心亂而煩病名曰恍惚者心惑而
煩悶不安也故加辛溫甘溫之劑生陽陽生則陰
長或曰甘溫何能生血云仲景之法血虛以人參
補之陽旺則能生陰血更加當歸和之又宜加黃
藥以按腎水能瀉陰中之伏火如煩猶不止少加
生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以
朱砂安神丸鎮固之則愈

朱砂

半兩另研水飛陰乾

黃連

去鬚揀淨酒洗秤六錢

炙甘草五錢半

生地黃二錢半

當歸去芦二錢半

右件四味為細末另研朱砂冰飛如塵陰乾為衣
湯浸蒸餅為丸如黍米大每服十五丸津唾臨
食後熱淫所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦
寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉
火補氣滋生陰血為臣當歸補其血之不足朱砂
納浮溜之火而安神明也

四時用藥加減法

長夏濕土客邪大旺加蒼朮白朮澤瀉上下分消其
濕熱之氣濕熱大勝主食不消故食減不知穀味
則加麩以消加五味子麥門冬助人參瀉火益其

肺氣助秋損也在三伏中為聖藥

填塞咽喉陽氣不得出病名曰塞陰氣不得降病名

曰噎噎塞迎逆於咽喉胸膈之間令諸經周身陽

氣不行令人口閉目瞪氣欲絕者何也清氣在陰

濁氣在陽清濁相干亂於胸中是為大惋夏月加

青皮陳皮益智黃柏泄陰火之上逆或以消痞丸

滋腎丸各七八十丸則愈冬月加吳茱萸大熱去

辛苦之味以瀉陰寒之氣則愈食不消則加炒麴

空心納前食消盡服之待少時

以美膳壓之不令胃中停留也食不下乃胸中有

寒胃上有寒或氣寒澁滯加青皮陳皮木香此三

味為定法

冬月加益智仁草豆蔻仁夏月加炒黃芩黃連枳實
加檳榔草豆蔻仁紅砂仁白豆蔻仁如春初猶寒
夏少加辛熱之劑以補春氣之不足為風藥之佐
益智草豆蔻可也

冬月咳嗽者加不去節麻黃五分如秋涼亦加如春
月天溫只加佛耳草欬冬花各三分若痰嗽久病
肺中伏火者去人參防痰嗽增益智耳然調和陰陽
血氣之際甘溫為必用之藥 脈洪大蕪見執證
少加黃芩黃連生地黃甘草 脈緩顛沉因息墮



無方者濕勝也加蒼朮澤瀉人參白茯苓五味子

脉澁氣滯澁者加當歸身木香天門冬青陳皮

覺寒者加桂枝黃芪不足病雖見熱證須加

痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏

分生薑三二分若更煩亂如腹中或周身有刺痛

皆血澁不足加當歸身脇下急或痛甚加柴胡

甘草人參腹中氣上逆者衝脉逆也加以黃芩

三分黃連二分以瀉之多唾或唾白沫胃中

停痰也加益智仁如氣少不足以息服正藥二三

服舊氣短促此膈上及及表間有寒所遏當引陽

氣上升則愈多加羌活獨活升麻柴胡藁本之
黃芪倍之捫之而肌熱者表證也只服正藥一
服微汗則已 躁熱作蒸蒸而執者腎間伏火故
上騰也加黃柏生地黃各三分 腳膝痠轉行步
乏力或痛乃腎肝伏熱少加黃柏空心服如不愈
更加漢防已五分別愈使腳膝中氣力湧出矣
脉緩有痰而痞加半夏黃連 脉弦四肢滿悶便
難而心下痞加黃連柴胡甘草 大便秘燥心下
痞加黃連桃仁少加大黃當歸身 心下痞痞悶
者加白芍藥黃連 心下痞腹脹加五味子白芍



藥縮砂仁如天寒少加乾薑或肉桂 心下痞覺
中寒加附子黃連 心下痞加黃連生薑橘皮各
月加黃連木香藿香藥 能食而心下痞加黃連
五分只實三分 胸中氣滯加去白青皮 溢痛
頰腫脈洪大面赤者加黃芩桔梗甘草 耳鳴目
黃頰頰腫頰肩腫肘臂外後薦痛面赤脈洪大者
以羌活防風甘草藁本以通其經血加黃芩黃連
消其腫人參黃芪益元氣而瀉火邪如脈緊面白
喜噦或面色惡者皆寒也亦羌活等四味中加之
當瀉足太陽也不用羌藥 小便遺失肺金虛也

宜安臥養氣以黃芪人參之類補之不愈是有熱也加黃栢生地黃切禁勞役 卧而多驚小便極澀者邪在少陽厥陰亦宜太陽經所加之藥更添柴胡半錢如淋加澤瀉半錢以下焦風寒合病也 腎肝之病同一治為俱在下焦非風藥行經則不可乃畏客邪之濕熱也宜升舉發散以除之 頭痛加蔓荊子半錢痛甚加川芎二分頂痛腦痛加藁本三分若苦頭痛加細辛二分諸頭痛併用此四味足矣 臍下痛者加熟地黃三分不已者大寒也其寒從傳變中來加肉桂三分徧問內經少



腹痛皆寒非傷寒痲陰之證也仲景以麻當湯丸主之乃血結下焦

身脊疼痛及身重者濕也以五苓散主之如

風濕相搏一身盡痛加羌活防風各五分升麻柴

胡各五分藁本蒼朮各一錢所以然者為風濕也

能勝濕故另作一服與之肩背痛汗出小便數

而欠者風熱乘肺肺氣鬱甚也當瀉風熱則愈以

人參益肺散主之

柴胡

升麻

黃芪各錢

羌活

防風

人參

甘草

陳皮各五分

藁本三

青皮

夷朮

白豆蔻仁各

右咳吐者作一服水二盞煎至一盞去滓温服食

後如面色白脫色氣短者不可服

肩背痛不可廻顧者此乎太陽氣鬱而不行以風

散之脊痛項強腰似折項似板者此足太陽經不

通行以

通氣防風湯主之

羌活

獨活各一錢

藁本

防風

甘草

各五

川芎

蔓荊子

各三錢

右以咀都作一服水二盞煎至一盞去滓温服空

心如身重腰沉沉然經中有寒濕也更加酒炒漢



防已五分輕者附子重者川烏頭 腹中痛不惡

寒加黃芩芍藥 腹中痛惡寒而脉弦者小建中

湯如脉沉細者理中湯之類主之 腹痛在裏者

時加半夏益智草豆蔻之類

胃脘當心而痛氣欲絕者胃虛之極也俗言心痛以

專荳蔻丸主之

草豆蔻 一錢四分 燒畏 情熱去皮 膠月

吳茱萸 湯洗去 苦 煎

益智仁 陳皮

白殭蚕

黃芪

人參 各入 生甘草

炙甘草

當歸身

青皮 各入 神麩末

薑黃 各四

桃仁 去皮 尖湯



澤瀉數減半

半夏湯洗七次一尔

大麥蘖炒黃錢半

柴胡四分詳腹下痛多少用之

右一十八味除桃仁另研如泥外為極細末同研

勻湯浸蒸餅為丸如梧子大每服三十九丸熱白湯

送下食遠旋斟酌多少用之

夫脾胃之證始則熱中終則寒中陰盛生內寒厥氣

上逆寒氣積於胸中是腎水反來侮土此所謂勝

者妄行也作中滿腹脹作涎作清涕或多瀰足下

痛不能任身屈地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作

陰陰而痛或妄見鬼狀夢亡人腰背脾眼腰脊皆



丁養練實丸治男子七亦痛不可忍婦人痕聚帶下

皆任脉所主陰經也乃腎肝受病治法同歸於

當歸去芦判附子炮製去皮川練子制茴香炒

右四味各一兩到碎以好酒三升同煮酒盡為度

焙乾作細末每秤藥末一兩再入一頃藥

丁香各二錢木香各二錢全蝎十三箇玄胡二兩

右四味同為細末入在前項當歸等藥末內拌和

酒糊煮丸如梧子大每服三十九至一百丸温酒

送下空心食前凡疝氣帶下者皆屬於風全蝎治

風之聖藥茴香川練子入小腸經當歸玄胡乃和



血止痛疝氣蒂下皆積寒和入小腸之間故以附
子佐之丁香木香為引導也

天台烏藥散

天台烏藥

木香

茴香炒

青反去白良

姜炒各半 檳榔劉三

川練子射

巴豆粒七十

右八味先以巴豆微打破同練子用麩炒候黑色

荳麩不用外為細末每服一錢溫酒送下疼甚者

炒生薑熟酒下亦得

茴香練實丸



川練子炒茴香

山茱萸

食茱萸

吳茱萸湯洗青皮去

陳皮

馬蔞花炒

芫花略

右為極細末醋糊為丸如梧子大每服三十丸温

酒送下食前量人虛實加減丸數以利為驗

川苦練散

木香一兩為一兩末易

茴香揀淨一兩鹽一匙一處

川練子一兩

及與川練子一處炒黃去豆

右件為極細末每服二錢温酒一盞調下空腹大

抵此疾因虛得之不可以虛而驟用補藥邪之所



南京中醫藥大學圖書館藏書

奏其氣必虛留而不去其病則實故必先滌所蓄
之邪然後補之是以諸方多借巴莖氣者蓋為此

瀉之則脹已汗之則瘡已

東南二方者在人則為丙小腸熱甲胆風小腸便通

皆居其下其性炎上其瘡外有六經之形謬內無

便溺之阻臍飲食如故清便日調知不在裏非疽

瘡也止癰癰也小則為癰大則為癰其邪所受於

下風濕之地氣自外來侵加於身者也矣經云營

氣不從逆於肉理乃生癰腫諸痛痒瘡皆屈心之

比瘡自外而入則內小腸左遷入於胆作痛而非



庫也此三方皆主血為病必痛此元氣不足者
氣逆行其瘡初出未有傳變在於肌丙之上皮在
之間只於風熱六經所行經絡地分出矣宜瀉
用濕熱鬱者只知陰覆其陽則汜也此宜發汗
乃濕熱鬱其手足少陽致血脉凝逆使榮衛周身
元氣消弱也其風熱鬱滯於下其面色必赫赤而
腫微黯色更夫青理風木之性上衝顏必忿色而
其人多怒其瘡之色亦赫赤腫硬微帶黯色其瘡
之形勢亦奮然高起結硬而作痛也其脉上在左
手左手主表左寸外洪緩左關洪緩而弦是客邪



任於血脉之上皮膚之間宜急發其汗而通其榮
衛則邪氣去也以
托裏榮衛湯主之

黃芪兩

柴胡

連翹各二錢

羌活

防風

當歸身

生地黄各錢半

炙甘草

人參各錢二

蒼朮各錢三

紅花

桂枝各半兩

右改咀都作一服水酒各一大盞同煎至一盞去

滓大溫服

沉香海金砂丸治一切積聚一溫腫脹肚大青筋



瘦惡證

沉香錢一

海金砂半錢

輕粉錢一

牽牛頭末一兩

右各秤分兩司的細末研獨科蒜如泥為丸如
子大每服三十九或五十九煎百沸燈心通真湯
送不空腹食前量大小虛實加減丸數取利為驗
續隨子丸治通身虛腫喘悶不決

人參 漢防已 赤茯苓 麩蒸 木香

板柳各半兩 續隨子 海金砂 另炒

苦葶藶四兩 昏隔炒



右為細末裹肉為丸如梧子大每服二三十丸
桑根白皮湯送下

海金砂散治脾濕太過通身腫滿喘不得卧腹脹如

鼓

牽牛一兩半半生半炒

甘遂

海金砂各半

右為細末每服二錢煎倒流水一盞調下食前得
宣利止後服

太陰所至為蓄滿中滿霍亂吐下

木香檨氣丸治中滿腹脹下虛虛損者

陳皮去

蘿蔔子炒各

胡椒



木香

草豆蔻去毒 錢半

青皮去毒 錢

蝟尾去毒 一錢半

右為細末水糊為丸桐子大每服三十九溫米飲
送下食後忌服白粥百日重者一年小兒麻子大
桑白皮湯送下十九白三服大人梧子大四升丸
如陰囊洪腫水冷次用倉鹽乾姜白麩白三錢水
和交攤紙上塗用

廣茂清堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人
坐卧不能大小便並滯上喘氣促面色痿黃通身
虛腫



厚朴

黄芩

草豆蔻

益智仁

當歸

各五分

黃連

六分

半夏

化

廣茂

紅花

吳茱萸

升麻

各二分
生甘草

柴胡

澤瀉

神麴

青皮

橘皮

各三分
如渴加葛根四分

右咬咀都依一服水二盞先浸少時煎至一盞去

滓大温服食前

導滯通經湯治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮

腫

陳皮

桑白皮

白朮

木香



一 茯苓去破風時 霖雨時加慳瀉半

右以咀銀服半兩水二盞煎至一盞去滓大濕服

食前

赤茯苓丸治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣

通小便赤澁

葶藶兩

防己兩

赤茯苓兩

木香兩

右件為細末棗肉為丸如梧子大每服三十九煎

桑白皮湯送下食前

諸脉按之無力所生病證并治法

六脉中之下得弦細而瀉按之無力腹中時痛心胃

六脉中之下得弦細而瀉按之無力腹中時痛心胃



北京中医药大学图书馆版

控畢陰陰而痛或大便泄瀉鼻不聞香臭清濁滿
不止目中泣出喘喝痰嗽唾出白沫腰沉沉痛
項背胸皆時作痛目中流火口鼻惡寒時頭痛目
眩苦振寒不止或嗽或吐或嘔或噦則發躁熱蒸
而熱如坐甑中必得去衣居寒處或飲寒水則便
過其振寒復至氣短促胸中滿悶而痛必有膈咽
不通欲絕之狀甚則目瞪聲聞於外而衄涕涎痰
大作方過其發躁須臾而已振寒復至或百白而
不澤者血脫也悲愁不樂情慘慘意悲悲健忘或
善疑問出此風熱大損氣水燥金之復也如六脉



細弦而澹按之空虛此大寒證亦傷精氣以辛甘
溫甘熱滑潤之劑以瀉西方北方則愈

薑附湯治中寒口噤四肢強直失音不語或卒然暈

倒口吐涎沫狀如鼻風手足厥冷或復煩燥熱者

陰證傷寒大便自利而發熱者

乾薑

二兩另為粗末

附子

一兩生用去皮脂細切

大田薑

附子

右和勻每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

或慮此藥太燥却以附子理中湯相繼服餌姜附

本治傷寒經下之後又復發汗內外俱虛身無大

熱晝則煩燥夜則安靜不嘔不渴六脉沉伏並宜



服此不知脈者更須審之熱治中脫虛寒久積痰
水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆 一方附子湯
以生用者各白通湯加白朮倍之甘草減半各生
附白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹滿身重手足緩
縱皸皸自汗失音不語便利不禁 一方用薑附
湯加麻黃白朮人參甘草等分各附子麻黃湯治
中寒濕昏暈緩弱腰背強急口眼喎斜語聲渾濁
心腹膜脹氣上喘急不能轉動更宜審而用之

沉香桂附丸

沉香

附子

炮去

乾姜

炮

良薑

炮



官桂去

茴香炒

川烏炮

頭炮 子炮 如豆大再炒

用 令黃

吳茱萸湯

去 苦洗

右各一兩為細末用好醋煮麩糊為丸如梧子大

每服五七十丸熟米飲送下空腹食前日進三服

忌生冷硬物

十全大補湯

人參

肉桂

川芎

熟地黃

茯苓去

白朮

甘草

黃耆

當歸去

白芍藥

右件一十味剉為釐末每服二錢水一盞入生姜



三片棗二枚同煎至七分去滓溫服不拘時

諸腹脹大皆屬於熱

諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之

外而人是感風寒之和傳裏寒變為熱作實

晞潮熱大渴引飲譫語是太陽陽明並大實

者大承氣下之少陽陽明微滿實者小承氣下之

泄之則脹已此之謂也假令痲瘡為脹滿亦有寒

脹執脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋

暑氣衰絕而瘡病作矣知其寒也局方用交解飲

子者是也內虛不足寒濕令人中滿及五藏六府



俱有脹滿更以脉家寒熱多少較之胃中寒則脹滿濁氣在上則生脹腹脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿腹脹支高脇脇下厥上胃過在大陰陽明胃中寒濕鬱遏也大陰腹脹後不和不欲食食則嘔不得卧按所說寒脹之多如此也滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其氣下焦如瀆氣血自然分化不待泄瀉瀝如或大實大滿大小便不利從權以寒



醫學卷之六
十六

熱藥下之或傷酒濕麪及味厚之物膏粱之人或
食已便即使濕熱之氣不得施化致令腹脹滿此
脹亦是熱脹治熱脹分消丸主之
如或飲食寒
涼及脾胃久虛之人胃中寒則脹滿或寒注滿
病以治寒脹中滿分消湯主之
病勢大小用藥
輕重臨時加減不敢少越耳

中滿分消丸治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹不治
寒脹

黃芩 去病剉 炒半兩

薑黃

白朮

人參 去蘆

炙甘草

猪苓 去黑皮

黃連炒半兩

白茯苓皮細石

乾生姜各二錢

枳實麸炒

半夏湯浸七次各半兩

厚朴姜製一兩

知母剉炒

澤瀉錢三

陳皮

右細礮茯苓澤瀉生姜各各為末另秤外共為極

細末秤入土三夫和勺水浸煮餅為丸如梧子大

每服一百丸焙熱白湯送下

寒因熱用故培熱服之

食遠量

病人虛實加減

中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足

不收四服厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下

痞下架躁寒沉厥奔豚不收並宜服之



益智仁

半夏

茯苓

木香

升麻

各三

川烏頭

澤瀉

人參

青皮

當歸

生薑

麻黃

柴胡

乾姜

葶澄茄

黃連

黃芪

吳茱萸

葶豆蔻

厚朴

黃精

五分使藥又為熱因寒用

右件劉如麻豆大翻作一服水二大盞煎至一盞

去滓大溫服食前大忌房勞酒濕麪生冷硬物

諸嘔吐酸皆屬於熱

霍香安胃散治胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熟



藿香

丁香

人參

橘皮

右件四味為細末每服二錢水一盞生姜三片同

煎至七分和滓冷服食前

加減三陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸

或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

並宜服之

丁香

一兩

半夏

橘紅

各五兩

茯苓

三兩

炙甘草

半兩

右以咀每服四錢水一盞半生姜七片烏梅一箇

煎至六分去粗熱服不拘時候治痞疾加草豆蔻



一兩半麩髮燒熟用

諸痿喘嘔今立熟喘寒喘二方

人參平肺散治心火形肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎

壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

桑白皮一兩知母七錢

炙甘草

地骨皮二兩

五味子二兩

茯苓

青皮

人參各四錢

陳皮半兩

去白

天門冬四錢

去心

右件吹咀水二盞煎至一盞去滓溫服食後如熟

甚加

黃芩四錢

柴蘇葉

半夏先各



參蘇溫肺湯治形寒飲冷傷肺喘嗽煩心胎滿氣不
得動暢

人參

紫蘇葉

甘草各半兩

肉桂

五味子

木香各四錢

陳反去

白木各六錢

桑白皮

半夏製

白茯苓去皮各半兩

桑白皮

右為麤末每服半兩水一盞半生薑三片同煎至

八分去滓大溫服食後如冬寒每服中加不去煎

麻黃五分先洗去沫下諸藥

諸脈有關有格有覆有溢

滋腎丸治不渴而小便閉邪熱在血分也

滋腎丸治不渴而小便閉邪熱在血分也



黃栢三兩細剉酒拌陰乾理

知母二兩酒浸陰乾理

肉桂錢一

右上一二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下
焦火也桂與火邪同體故曰寒因熱用九諸病在
下焦皆不渴也熱水為丸百沸湯送下
清肺飲子治渴而小便閉邪熱在氣分也

茯苓去皮

猪苓去皮

白木各錢三澤瀉

琥珀

藜蘆

桂各五

燈心分一

木通分

車前子錢二

通草分二

篇蓄分



石為極細末每服半兩水一盞半煎至一盞帶熱服或判如麻豆大作湯煎服亦可局方中八正散仲景五苓散亦宜用

損其腎者益其精

賢者兩枚右為命門相火左為腎水同質而異事也夫損者當損何藏而治之形不足者溫之以氣精不足者補之以味氣化精生味和形長無陰則陽無以化當以味補腎真陰之虛而瀉其火邪以封髓丹滋腎丸地黃丸之類是也陰本既固陽氣自生化成精髓若相火陽精不足宜用辛溫之劑世



之用辛熱之藥者治寒甚之病非補腎精也

還少丹大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓

衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥

牛膝酒浸

宿焙乾

遠志

山茱萸

白茯苓

五味子

巴戟酒浸

去心

石菖蒲

肉蓯蓉

酒浸一宿切焙乾

枳實各一兩

枸杞一兩半

杜仲

去皮姜汁并酒合塗炙熟

舶上茴香

各一兩

熟地黄一兩半

右為細末煉蜜同棗肉為丸如梧子大每服三十

丸溫酒或鹽湯送下日三服食前五日覺有力十

日精神爽半月氣力頗壯二十日日明一月夜思
飲食冬月手足常暖筋骨壯盛如熱加山梔
一兩心氣不寧加麥冬一兩心法少精神加五味子
一兩陽弱加續斷一兩常服齒堅永無瘡疔婦人
服之暖子宮姿容悅澤

補益腎肝丸治目中溜火視物昏花耳聾耳鳴困倦
乏力寢汗憎風行步不正兩足酸側卧而多驚脚
膝無力腰已下消瘦

柴胡

羌活

生地黄炒 苦參

防已

炒各半兩 附子炮

肉桂各錢

當歸身錢三



北京大學圖書館藏

右件為細末熟水為丸如雞頭大每服四十九丸

水下食前

水芝丸

蓮實去皮不以多少用好酒浸一宿入

內用水煮熟取出焙乾

右為極細末酒糊為丸如雞頭大每服五七十九

溫酒送下食前

上部有脈下部無脈其人當吐食傷太陰也

瓜蒂散

瓜蒂

赤小豆 各等分



右二味為細末每服二錢七溫滾水調下取生為度

地黃丸治腎氣虛久新焦悴寢汗發熱五藏衰弱

弱虛煩骨蒸痿弱下血

乾山藥 山茱萸 各四錢

牡丹皮 白茯苓 各三錢

澤瀉

熟地黃

右為末煉蜜為丸如桐子大每服五十九丸溫水送

下空心

才封髓丹降心火益腎水

天門冬 去心 熟地黃 人參 去芦各半兩



黃栢兩 縮砂仁半

甘草七錢

右件為細末水糊為丸如梧桐大每服五十丸用

菴蓉半兩切作片子酒一大盞浸一宿次日更三

四沸去滓送下前丸子空心

離珠丹又名神丹治下焦陽虛臍腹冷痛足胫寒而逆

杜仲三兩 草薢二兩

訶子五錢

鼈骨一兩

破故紙炒三兩

朱砂一錢

胡桃一百二十箇 去隔皮

縮砂仁半兩 巴戟酒浸去心二兩

右件為細末酒糊為丸如梧子大朱砂為衣每服

二十九丸空心鹽湯溫酒下



大真丹治下焦陽虛

沉香

巴戟

酒浸

茴香

去鹽

炒

革薺

酒浸

胡蘆巴

炒

破故紙

炒

杜仲

炒

牽牛

鹽炒

香

琥珀

略

肉桂

兩

右十味為細末

用元浸藥酒打麩糊為丸

如梧子

大每服五十丸至七八十丸空心溫酒下

八味丸治腎氣虛之下元冷憊臍腹疼痛夜多旋溺

脚膝緩弱肢體倦怠面色痿黃或黧黑及虛勞不

足渴欲飲水腰重疼痛少腹急痛小便不利並宜

服之



熟地黄兩八 山藥

山茱萸名四

肉桂去皮 牡丹皮

澤瀉

白茯苓去皮

附子兩二

右件為細末煉蜜為丸如梧子大每服五十丸至七十丸溫酒送下鹽湯亦得空腹食前婦人淡醋湯下

陽事多痿不振用全方然夏減桂附一半春秋三

停減疾去精走全減 桂附 血虛陰衰熟地為君

精滑山茱萸為君小便或多或少或赤黃白茯苓

為君小便更淋瀝瀉瀉為君心虛腸胃問積熱



盛心氣不足牡丹皮為君皮膚燥澀乾山藥為臣
已上但言為君者其分兩用乾地黄分兩其乾地
黃卻依立為君分兩同

通幽湯

幽門不通土衝吸門不開噎塞不便

當歸身 升麻 桃仁 泥子 各一錢

生地黄 熟地黄 各五錢 紅花

炙甘草 各一錢 右咬咀水煎服食前

潤腸湯治大腸燥結不通

升麻 當歸尾 生甘草 煨大黃



桃仁

麻仁

熟地黄錢

生地黄錢 紅花分

右件剉如麻豆大都作一服水三盞先拌藥湯煎至一盞去滓帶熱服食前

脚氣論

夫脚氣之疾實水濕之所為也蓋濕之害人皮肉筋脉而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自肉而致其治法自應不同南方之疾北方之疾自內而致者也南方地下水寒其清濕之氣中於人必自足始北方之人常食醃乳又飲之無節且童



北京中醫藥大學圖書館藏

乳之為物其形質則水也酒醴亦然人之水穀入
 胃胃氣蒸騰其氣與味宜之於經絡化之為氣血
 苟元氣不充胃氣本弱飲食自倍脾胃乃傷其氣
 與味不得宣暢旁通水濕之性潤下而致之也
 當歸拈痛湯治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重骨痛
 不利及遍身疼痛下痊於足脛腫痛不可忍

羌活酒洗

人參去蘆

苦參酒洗

升麻

葛根

蒼朮各二錢

炙甘草

黃芩酒洗

茵陳葉酒炒各半兩

防風去蘆

當歸身

猪苓各三錢

知母酒洗

黃芩炒

澤瀉

猪苓各三錢



白木半一錢

右咬咀如麻豆大每服一兩水二大盞半先以水

拌濕候少時煎至一大盞去滓溫服空心食前每

少時以美膳壓之臨卧一服不須齋壓

羌活導滯湯治脚氣初發一身盡疼或肢節腫痛便

溺阻隔以此藥導之後以當歸拈痛湯除之

羌活

獨活

各半

大黃

酒煨

防已

當歸

各三錢

枳實

炒

右件咬咀如麻豆大每服秤五錢或七錢水二盞

煎至一盞去滓溫服以微利則已量虛實加減



開結導引丸治飲食不消心下痞悶

橘皮 白木 澤瀉 茯苓各一

麥蘖麩一兩 乾生姜 青皮各半 炒麩一兩

枳實二兩半 半夏湯洗七次一兩

如有積塊加巴豆霜一錢半

右件為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服三五

十丸至七十九丸温水下食遠

除濕丹治諸濕客傳腰膝重痛足脛浮腫

枳榔 甘遂 威靈仙 赤芍藥

葶藶各二 乳香 沒藥各一兩



牽牛兩

大戟兩

三陳皮兩

去

右為末麩糊為丸如梧子大每服五十九至七八

十九溫水下食前得更衣止後服如服藥前後忌

酒三日藥後亦忌濕食二兩日食溫淡粥補胃丸

傳...

淋瀝脚氣除濕湯內受濕氣不能外達淋瀝開導泄

越其邪

威靈仙

防風去

荆芥穗

當歸去

地骨皮

薊蕪葉

升麻去

白芍藥去皮各

右件各剉細末水二斗煮至一斗五升去滓熱藥



洪無時

枳實大黃湯治脚氣腫痛

羌活半錢當歸身錢枳實一錢大黃各五

右剉如麻豆大都作一服水二大盞半煎至一盞

去滓大温服空心下利一兩行痛止

中風有三

內經曰人之氣以天地之疾風名之故中風者非外

來風邪乃木氣病也凡人年逾四旬氣衰者多有

此疾壯歲之除無有也若肥盛則間有之亦形盛

氣衰如此治法和藏府通經絡便是治風然輕重



有三中血脉則口眼喎邪亦有賊風襲虛傷之者
也中府則肢廢中藏則性念危急此三者治各不
同如中血脉外有六經之形證則從小續命湯加
減及踈風湯治之中府內有便溺之阻隔宜生化
湯或局方中麻仁丸通利外無六經之形證內無
便溺之阻隔宜養血通氣大秦芫湯羌活愈風湯
治之中藏痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血
脉中府之病初不宜用龍麝牛黃為麝香治脾入
肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨
髓如油入麪莫之能出又不可一概用大戟芫芫

甘遂瀉大便損其陰血真氣愈虛方列于後

小續命湯

麻黃去節

人參去

黃芩去

芍藥

炙甘草

川芎

杏仁炒去

防己

官桂碎

防風一兩

附子炮去

細剉

右除附子杏仁外搗為麩末後入二味令勻每服

五錢水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓稍熱

服食前

始治中風不審六經之形證加減雖治與不治無異

也開則灑然寒閉則熱而悶知暴中風抑宜先以



加減續命湯隨病治之中風無汗惡寒宜

麻黃續命湯

麻黃

防風

杏仁

依本方加一倍宜鍼太陽經至陰出血崑崙舉勝

中風有汗惡風桂枝續命湯

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜鍼風府此二證太陽中風也

中風身熱無汗不惡寒日虎續命湯

石膏

知母

加一料中各二兩

甘草

依本方加一倍



中風身熱有汗不惡風葛根續命湯

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽

明之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明

中風也

中風無汗身涼附子續命湯

附子

加一

甘草

加三

乾薑

加一

宜鍼隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風

也

中風有汗無熱桂附續命湯



桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜鍼太谿此一證少陰經中風也

無此四證六經混殺繫於少陽厥陰或肢節痲痛或

麻木不仁宜

羌活連翹續命湯

小續命

酌羌活

兩連翹

右古之續命混殺無經令立分經治療又分各經

鍼刺無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其經

少陽之經絕骨灸以引其熱此通經引熱是鍼灸

同象治法之大體也



踈風湯治半身不遂或肢體痲痺筋骨疼痛

麻黃去節

益智仁

杏仁

炒去灰

炙甘草

升麻

各五兩

右件改咀每服一兩水一小碗煎至六分去滓

服脚踏熱水葫蘆以大汗出去葫蘆冬月不可

中風外有六經之形證先以加減續命隨證治之

有便溺之阻隔復以

三化湯導之

厚朴

大黃

枳實

羌活

右料麻葢大每服三兩水三升煎至一升半終日



服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈
風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或
氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也
之清濁自分榮衛自和矣

羌活愈風湯療腎肝虛筋骨弱語言難精神昏憤及
治風濕內弱者是風熱體重也或瘦而一肢偏枯
或肥而半身不遂或恐而健忘喜已多思思忘之
道皆精不足也故心亂則百病生靜則萬病息是
說此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活

甘草炙

防風桂

黃芪桂

UNIVERSITY OF CHINA



中國醫藥大學圖書館

蔓荆子

川芎

細辛去苗

枳殼去穢

人參去芦

地骨皮去大骨

麻黃去根

知母去皮

甘菊

薄荷去枝

枸杞

當歸去芦

獨活

白芷

杜仲炒去絲

秦艽去芦

柴胡去苗

半夏湯洗姜製

厚朴製

熟地黃

防己已上各

芍藥去皮

黃芩去腐

白茯苓去皮各

石膏

生地黃

蒼木各四兩

官桂一兩

前胡一兩

右到每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇

天陰加生薑之片粥服空心一服臨卧再煎滓服



俱要食遠空心一服喫下二丹丸為之重劑臨臥
喫下四白丸為之輕劑立其法是動以安神靜以
清肺

假令一氣而微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩

作四服每服加生姜五七片空心服之以粥投之

微汗則佳 如一句之通利用愈風湯三兩大

與一兩亦勻作四服如前煎臨臥服之得利為妙

常服之藥不可失四時之輔如望春大寒之後

加半夏二兩柴胡二兩通四兩人參二兩通四兩

謂也 奪少陽之氣也



望夏之月半加石膏二兩通六兩黃芩二兩通五兩知母二兩通四兩謂迎而奪陽明之氣也

季夏之月加防已二兩通四兩白朮二兩茯苓二兩

兩通五兩謂勝脾土之濕也

初秋大暑之後加厚朴二兩通四兩藿香二兩桂

一兩通二兩謂迎而奪太陰之氣也

霜降之後望冬加附子一兩官桂一兩當歸二兩

通四兩謂勝少陰之氣也

二丹丸四白丸方在後衛生寶鑑內附


得春減冬所加藥四時加減類此此藥具七情六



慾四氣無使五藏偏勝反不動於榮衛如風秘則
 服之永不燥結如久瀉則服之能自調適初覺風
 氣便能服此藥及新方中大麻六一料相為表裏
 治未病之聖藥也及已病者更宜常服無間男女
 婦人小兒風癘急慢驚風等病服之神効如神利
 四時傷寒隨四時加減法服之

中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱
 不能養於筋故手足不能運化舌強不能言宜養
 血而筋自榮也當以

大秦茺湯主之



秦艽

石膏

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黄

熟地黄

白茯苓

略一

細辛

兩

右劉每服一兩水二盞煎至一盞去滓濕服無筋如遇天陰加生薑七八片如心下痞每服一兩內加枳實一錢同煎

肺寒則面白生痰喘欬噎

半夏溫肺湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜

醫學

卷三



腸鳴多唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此
胃氣虛冷所致其脉沉弦細遲

細辛

橘皮

桂心

人參

旋覆

甘草

桔梗

芍藥

半夏

各半

赤茯苓

生姜

棗

右為麤末每服四錢水一盞半生薑七片煎至八
分去滓溫服食後

丁香半夏丸治心下停飲冷痰頭目眩暈睡卧口中

多涎

栝榔

丁香

半夏

細辛



南京中醫藥大學圖書館藏

乾薑

人參略

右為細末生薑麴糊為丸如梧子大每服三十丸
生薑湯下日三

紫蘇飲子治脾肺虛寒痰涎欬嗽

紫蘇葉

桑白皮

青皮

五味子

杏仁

麻黃

甘草

陳皮略

人參

半夏

湯洗各三錢

右咬咀每服半兩水二盞生薑三片煎至七分去

滓溫服

肺病面白而不澤則為氣脫血脫津脫液脫



精脫神

巴戟丸治肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充越

進美飲食

五味子

川巴戟心去肉蓯蓉

人參

菟絲子

熟地黃 覆盆子

白木

益智仁炒

骨碎補洗去

白龍骨

茴香

牡蠣各等分

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九空心

食前米飲送下此藥補精氣止汗

雙和散補益血氣治虛勞少力



黃芪

熟地黃

當歸

川芎

白芍藥三兩

官桂

甘草各三

人參錢三

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片肥棗二枚

煎至八分去滓溫服大病之後虛勞氣乏者以此

調治皆驗溫而有補

附子溫中丸治脾胃順氣化痰嘔吐噎膈留飲腸鳴

濕冷泄注辟寒養正氣

附子

乾姜

白朮

肉桂

炙甘草名半

良姜錢七



右為細末煉蜜為丸一兩作十丸每服一丸細嚼
生姜橘皮湯送下米飲亦得食前

五邪相干

謂賊實微
虛正也

假令肝病其實邪風熱相合風性急火搖動煩極旋
轉其脉弦而緊洪風熱發狂宜

芎黃湯

芎藭 活

川芎

天黃

各二兩

甘草

半兩

一效同

右吹咀每服半兩水二盞煎至六分去滓溫服

虛邪風寒相合木慮腎恐拘急自汗其脉弦緊而沉

仲景云風感太陽移證在太陽經中桂枝加附子



湯主之

賊邪風燥相合血虛筋縮皮膚皴揭脉眩浮而瀉

景云血虛筋急桂枝加括蕪湯主之

微邪風濕相合體重節痛藏府洞泄脉弦長而緩

景云身體疼痛下痢清穀急當救裏四逆湯主之

正邪中風目眩頭重叫怒不吐脉弦緊而長仲景云

甚則如癰為瘧真羌活湯本草云羌活主瘧主癰

防風黃芩為佐小兒為癰大人為瘧

假令心病實邪熱濕相合憤憤心煩熱蒸不眠脾

經絡於心經起於心心脾經相接故為濕熱脈浮



大而緩足大陰寄證在手太陽宜梔豉湯若病加

厚朴枳實 虛邪熱風相合妄聽妄聞耳聾聲啞

與三焦之經同出於耳銅人云刺關衝出血瀉之

溝脉浮大而弦初小柴胡湯後大柴胡湯此證是

太陽與少陽為病前客後主也 賊邪熱寒相


胆惕心懸如饑神怯恐怖足少陰與手厥陰相接

水中心經守邪故神怯怖耳脈大而沉濡亦在太

陽經中內經曰心虛則熱收於內黃連附子瀉心

湯主之法云熱多寒少以為佐矣如寒多熱少加

附子乾姜左之 微邪熱燥相合過飲歌樂實為



熱燥俗言暢飲也病人日快活快活是有聲於歌
樂也以意思漿是無聲歌樂也脉洪大而瀉白處
湯主之喘則加人參 正邪熱也晚陽見鬼躁擾
狂起脉洪實一呼四至是八至脉也小承氣湯主
之謂復不堅大也

假令脾病

實邪濕燥相合胃中燥屎腹滿堅痛其

脈緩而長瀉是正陽陽明證也調胃承氣湯主之

虛邪濕熱相合熱陷胃中腸癖下血脉中緩大

黃黃連解毒湯主之

賊邪濕風相合嘔逆脇痛

往來寒熱脉緩而弦長小柴胡湯主之

微邪濕



寒相合濕與寒交寒來求濕身黃而不熱體重而
不渴謂之寒濕其脉緩沉而滑朮附湯主之如小
便不利者加茯苓 正邪濕自病腹滿時痛手足
自溫其脉沉澹而長虛痛桂枝加芍藥湯主之
痛桂枝加大黃湯

假令肺病實邪燥寒相合毛聳皮涼溲多而清其

脉短澹而沉此證如秋冬宜八味丸若春夏宜地

黃丸 虛邪燥濕相合微喘而痞便難而痰其脉

浮澹而緩枳實理中丸主之如喘甚加人參若便

難加大香黃芩各半錢為極細末煎下理中丸



賊邪燥熱相合鼻窒靴衄血溢血泄其脉瀉而浮
大甚者槐仁冰氣湯微者犀角地黄湯極者抵當
湯微極抵當丸 微邪燥風相合皮著甲補血虛
氣虛二藏俱虛先血後氣其脉浮瀉而弦 人本氣
血藥主之 正邪燥創病其氣奔鬱皆屬於肺諸
燥有聲其脉浮瀉而短列諸嗽藥選而用之
假令腎病 實邪寒風相合藏不藏散下利純清其
脉沉滑而弦仲景云少陰證口燥咽乾下利純清
大承氣湯主之脉沉弦而遲四肢逆冷者宜四逆
湯等 虛邪寒清相合腎唾多呻瀉漸寒清無寐

經言燥化清其脉沉實而澹酸棗仁湯主之
邪寒濕相合腎為胃關關閉水溢關閉不利水在
胃為腫在肺為喘及變諸證也其脉沉緩而大仲
景云大病差後腰下有水氣者牡礪澤瀉湯主之
微邪寒熱相合膀胱熱鬱津液枯少其脉沉濡
而大內經曰水少乾涸也猪苓湯主之 正邪寒
自病寒忿用藏黑痺經沉其脉沉濡而滑黑痺天
麻丸如證同脉異微者府病也甚者藏病也

淹疾瘧病

肝病 面青脉弦皮急多青則痛形盛胸脇痛耳聾

口苦舌乾往來寒熱而嘔已上是形盛當和之以
小柴胡湯也如形表骨搖而不能安於地此乃筋
筋治之以羌活湯本草云羌活為君也瘧證以
少陽如久者發為瘵瘵宜以鑱鍼刺絕骨穴復以
小柴胡湯治之

心病 面赤脉洪身熱赤多則熱暴病壯熱惡寒麻
黃加知母石膏黃芩湯主之此證如不發汗久不
愈為瘵也淹疾頰腫面赤身熱脉洪緊而消瘦婦
人則七血男子則失精

脾病 面黃脉緩皮膚亦緩黃多則熱形盛依傷寒



說是為濕溫其脈陽浮而弱陰小而急治在太陰
 濕溫自汗白虎湯加蒼朮主之如久不愈為溫病
 重暈白虎加桂枝主之淹病肉消食少無力故曰
 熱消肌肉宜以養血涼藥內經曰血生肉
 肺病 面白皮濇脉亦濇多白則寒暴病濇痒氣虛
 麻黃加桂枝令少汗出也傷寒論曰夏傷於暑汗
 不得出為痒若久不全為風瘧形衷面白脉濇皮
 膚亦濇形羸氣弱形淹衛氣不足

腎病

面黑身涼脉沉而滑多黑則痺暴病形冷惡

寒三焦傷也治之以薑附湯或四逆湯久不愈為



瘡暴氣衝上吐食夜發俗呼謂之夜瘡太陽經桂
枝證形衰淹疾黑癯羸瘦風痺痿厥不能行也

百病在氣在血

夫百病晝則增劇遇夜安靜是陽病有餘乃氣病而
血不病也 百病夜則增劇晝則安靜是陰病有
餘乃血病而氣不病也 晝則發熱夜則安靜是
陽氣自旺於陽分也 晝則安然夜則發熱煩燥
是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室 晝則發
熱煩燥夜亦發熱煩燥是重陽無陰也當亟瀉其
陽變補其陰 夜則惡寒晝則安靜是陰血有旺



於陰分也 夜則惡寒晝亦惡寒是重陰無陽也
當亟瀉其陰峻補其陽 夜則安靜晝則惡寒是
陰氣上溢於陽中也

夫五藏有邪各有身熱其壯各異以手捫摸有三法
以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血
脉也重按之至筋骨之分則熱蒸手極甚輕手則
小熱是邪在筋骨之間也輕手捫之不熱重加力
以按之不熱不輕不重按之而熱是在筋骨之上
皮毛血脉之下乃熱在肌肉也此為二法以三黃
丸通治之細分之為五等



肺熱者輕手乃得但微按全無是營營然見於皮
毛之上日西尤甚乃皮毛之熱其證必見喘欬灑
淅寒熱輕者瀉白散重者宜涼膈散白虎湯

皮散
心熱者心主血脉微按至皮膚之下肌肉之下輕
手乃得微按至皮毛之下則熱少加力按之則全
不熱是熱在血脉也日中太甚乃心之熱也其證
煩心心痛掌中熱而噦宜黃連瀉心湯導赤散朱
砂安神丸清涼飲子
脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕



不重在輕手重手之間熱在肌肉遇夜尤甚證必
怠惰嗜卧四肢不收無氣以動宜瀉黃散

肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱實
郊間尤甚其脉弦四肢滿悶便難轉筋多怒多驚
四肢困熱筋痿不能起于牀宜瀉青丸柴胡飲子
腎熱者輕手重手俱不熱如重手按至骨分其熱
蒸手如火其人骨蘇蘇如虫蝕其骨困熱不任亦
不能起于牀宜滋腎丸六味地黄丸

治病必須求責

假令治病無問傷寒畜血結胸癰黃等諸證并一切

辨證等各當於六經中求責之謂如黃證或頭痛
腰脊強惡寒即有太陽證也或身執目痛鼻乾不
得卧即有陽明證也餘皆倣此



南京中醫藥大學
南京中醫藥大學圖書館藏

終

四
官
生
石
印

五



Vertical text columns, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page.



三才圖會

卷之四



活癩機要

二酉堂梓



活法機要目錄

世瀉門

黃芩芍藥湯

芍藥湯

防風湯

蒼朮

漿水

芍藥

芍藥

厲風

大黃湯

白朮苦酒湯

白芍藥湯

芍藥

芍藥

芍藥

芍藥湯



破浮風

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

破浮風

羌活湯

二聖散

白朮防風湯

大芎黃湯

防風湯

左龍湯

養血當歸地黃湯

羌活丸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

升麻湯

胎產證

黃龍湯

半夏湯

秦苴湯

防風湯

血風湯

沒藥散

四物湯

當歸散惡核下下

二黃散

增損柴胡湯

荆芥散

三分散

血運血結四物湯

加減四物湯

紅花散崩

生地黄散血吐



五去幾更

二

麥門冬飲子

頭風證

苦練丸

衛生湯

大頭風證

黃芩黃連甘草湯

黑白散

瘧證

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

熱證

地黃丸

防風當歸飲子



金花丸

當歸承氣湯

白虎湯

眼證

散熱飲子

四物龍膽湯

洗眼藥

消渴證

黃連膏

腫脹證

涼膈散

半黃膏
熱人
血

地黃湯

點眼藥

噴藥

八味丸



海沙揚興
合目錄

水腫方

倉瘍證

內疎黃連湯

當歸黃耆湯

復元通氣散

赤芍藥散

冰霜散

五黃散

截疳散

平肌散

內托復煎散

內消升麻湯

五香湯

桃紅散

乳香散

花藥石散

生肌散

碧霞木子



用藥加減例

迴瘡金銀花散

雄黃散

癰癧證

桑椹膏

通翹湯

瞿麥飲子

咳嗽證

利膈丸

欬氣丸

虛損證

四君子湯

和血八物湯

十全散

牛膝丸



黑地黃丸

八味丸

地黃丸

吐證

桔梗湯

木香散

厚朴丸

心痛證

金鈴子散

萸黃丸

厚朴丸

藁本湯

木附湯

疝證

酒煮當歸丸

苦練丸

活法機要目錄終



泄痢證

新安吳中珩楚白校正

臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱也是知寒少熱
 多故曰暴泄泄陰久泄泄陽溲有便膿血知氣行
 而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥是
 為輕劑治法宜補宜泄宜止宜和和則芍藥湯止
 則訶子湯有暴下無聲身冷自汗小便清利大便
 不禁氣難喘息脈微嘔吐急以重藥溫之藥水散
 是也後重則宜下腹痛則宜和身重者除濕脈弦



者去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥
溫之風邪內縮宜汗之驚澹為痢當溫之在表者
發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表
熱者內疎之小便澁者分利之盛者和之去者送
之過者止之除濕則白朮茯苓安脾則芍藥桂枝
血則黃連當歸宣通其氣則檳榔木香如泄痢而
嘔上焦則生薑橘皮中焦則芍藥當歸桂枝苓下
焦則治以輕熱甚以重熱藥若四肢懶倦小便少
或不利大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮茯
苓芍藥三味水煎服如發熱惡寒腹不痛加黃芩

無主如未見膿而惡寒乃大陰欲傳少陰也加黃
連為主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如
見血加黃連為主桂當歸佐之如煩燥或先便血
膿後血或發熱或惡寒泚黃連不能止上部血也
如惡寒脈沉或白腰痛或血臍下痛泚黃芩不能
止此中部血也如惡寒脈沉衄血後便泚地榆
能止下部血也唯脈浮大者不可下

黃芩芍藥湯

字在實錄
泄痢脘下

大黃湯治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無
度久不愈者

舌去幾

二

句



六黃兩

右剉細好酒二大盞同浸半日許煎至一盞去
大黃不用將酒分二服頓服之如未止再服以利
為度復芍藥湯和之痢止再服黃芩芍藥湯和之
以徹其毒也

芍藥湯方在寶鑑內
痢疾條下

白朮黃耆湯服前藥痢疾雖除更宜此和之

白朮兩一 黃耆錢七 甘草錢三 一方無黃耆用

黃芩兩一

右以咀均作三服水煎服清



防風芍藥湯治泄痢飧泄身熱脈弦腹痛而滿及頭

痛微汗

防風

芍藥

黃芩

右以咀每服半兩或一兩水煎

白朮芍藥湯治水陰脾經受濕水泄注下體重微滿

因弱無力不欲飲食暴瀉無數水穀不化宜此

之

白朮

芍藥

甘草

右剉每服一兩水煎

蒼朮芍藥湯治痢疾痛甚者



蒼朮雨

芍藥雨

黃芩

肉桂雨

右剉每服一兩水煎

訶子散如腹痛漸已泄下微少宜止之

訶子皮熱雨半

木香雨

黃連

炙甘草名三錢

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯謂下如止之

不已宜歸而送之也訶子散內加厚朴一兩竭

其邪氣也

水散治暴泄如水周身汗出身上盡冷脈微而弱

氣少不能語甚者在加生此謂急病



半斤 附子 炮

乾生薑

炙甘草

肉桂 酪半 良薑 二錢

右為細末每服三五錢漿水二盞煎至半

和率熱

服

黃連湯治大便後下而腹中不痛者謂之泄毒亦下

黃連 當歸 酪半 炙甘草 一錢

右吹咀每服五錢水煎

芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下

血

芍藥 黃連

當歸 酪半 大黃 錢



淡味桂枝炙甘草錢一

右以咀每張五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一錢服之

導氣湯治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥兩一 當歸兩半 大黃仁錢 黃連錢一

黃芩半錢 木香 檳榔各一

右為末每服半兩水煎

加減平胃散世方在續鑑內

地榆芍藥湯治泄痢膿血乃至脫肛

蒼朮兩八 地榆兩二 卷柏兩三 芍藥兩三



右咬咀每服一兩水煎病退止

五泄之病胃小腸大痕三證皆以清涼飲子主之

壯自止厥冷證加甘草以緩之少陰證裏急後重

故加大黃又有太陰陽明二證當進退大承氣湯

主之太陰證不能食也當先補而後泄之乃進藥

津也先煎厚朴半兩製水煎二三服後未已謂有

宿食不消又加枳實二錢同煎二三服泄又未已

如稍進食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄止佳

藥如泄未止為腸胃有久塵垢滑粘加芒硝半合

宿垢去盡則愈也陽明證能食是也當先泄而後



補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水煎服如利
過泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一半再煎
服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃與枳實
厚朴湯又煎三兩服如腹滿退泄亦自愈後服厚
朴湯數服則已

癘風證

癘風者禁氣熱附其氣不清鼻柱壞而色敗皮膚湯
潰風寒客於脈而不去故名癘風又曰風俗曰
癘治法刺肌肉百日汗出百日凡二百日鬚眉生
而止先樺皮散從少至多服五七日灸承漿六七

壯氣癰愈再發再愈三灸之後服二聖散泄熱
血之風邪戒房室三年病愈

樺皮散治肺臟風毒遍身瘡疥及癩疹瘙痒成疔

上風刺粉刺

樺皮

四兩反荆芥穗

杏仁

二兩去皮尖用水一

仲也木

炙甘草

枳殼

四兩去穢用片火炒

若件除杏仁外餘藥為末將杏仁另研與諸藥和

勻磁合內放之每服三錢食後溫水調下

聖散治大風癘疾將皂角刺一二斤燒灰研細煎

大黃半兩調下二錢早服樺皮散中煎升麻湯下

舌法

六



瀉青丸晚服二聖散此數等之藥皆為緩疎泄血
中之風熱也

七聖丸七宣丸皆治風塵邪熱潤利大腸中風風痲
癩風大便秘澁皆可服之

破傷風證

夫風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛
毒弗能為害故破傷風者通於表裏分別陰陽同
傷寒證治人知有發表不知有攻裏和解此汗下
和三法也諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡敗不合
者風邪亦能外入於瘡為破傷風之候諸瘡上灸



南京中医药大学图书馆藏

及瘡着白痴瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易為鬱
結熱甚則生風也故表脈浮而無力太陽也在表
宜汗脈長而有力陽明也在裏宜下脈浮而弦少
者少陽也半在表半在裏宜和解若明此三法而
治不中病者未之有也

羌活防風湯治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

地榆

細辛
略二

右咬咀每服五錢水煎量緊慢加減用之熱則加



大黃三兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過熱其
更加黃芩二兩

白朮防風湯若服前藥過有自汗者

白朮

黃耆 防風 二

石咬咀每服五七錢水煎

破傷風藏府秘小便赤用熱藥自汗不休故知無
寒也宜速下之先用芫黃湯三二服後用大芫黃
湯下之

芫黃湯

川芎

黃芩

甘草



南京中醫藥大學圖書館藏

右吹阻水煎

大芎黃湯

川芎 羌活 黃芩 大黃

右吹阻水煎

羌活湯治半在表半在裏

羌活 菊花 麻黃 川芎

白茯苓 防風 石膏 大前胡

黃芩 蔓荊子 細辛 甘草

枳殼一兩 薄荷 白芷各半

右吹阻生薑同煎日三服



南京中醫藥大學圖書館版權所有

防風湯治破傷風同傷寒表證未傳入裏宜急服此

藥

防風

羌活

獨活

川芎 芍藥

右咬咀水煎服後宜調蜈蚣散大效

蜈蚣散

蜈蚣

對一

魚

鱖半兩

左盤龍

半兩炒

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺直轉入裏當服左龍丸服之漸漸看大便硬軟加巴

荳霜

左龍丸治直視在裏者



南京中醫藥大學圖書館藏

左盤龍炒

白殭蚕炒 魚鱉

雄黃一錢 硃砂一錢

同為細末燒餅為丸桐子大每服十五丸溫酒下如裏證不已當於左龍丸內一半末加木呂管霜半錢燒餅為丸桐子大同左龍丸一處每服如丸一丸漸加服至利為度若利後更服後藥若痛瘕不已亦宜服後藥羌活湯也

羌活湯

羌活


獨活

地榆

防風 酪

石咬咀水煎如有熱加黃芩有涎加半夏若病日

舌去幾裏



久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血為度

養血當歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁木

防風

白芷

細辛

右為魚末水煎服

頭風證

肝經風盛木自搖動梳頭有雪皮乃肺之證也謂肺
主皮毛實則泄青丸主之虛則消風散主之

雷頭風證

夫雷頭風者震卦主之諸藥不效為與證不相對也



升麻湯

蒼木兩

荷葉

右為細末每服半兩水煎或燒荷葉一箇研細用
前藥調服亦可

胎產證

婦人童幼至天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆
從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之
病從厥陰經無犯胃氣及上二焦謂之三禁不可
汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證
利大便則脈數而已動於脾利小便則內止津液
胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而



寒熱止矣如發渴則白虎氣弱則黃耆血刺痛而
和以當歸腹中疼而加之芍藥大抵產病天行從
增損柴胡雜證從增損四物宜詳察脈證而用之
產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯
二黃散治婦人有孕胎漏

生地黄 熟地黄 各等分

右為細末煎白朮枳殼湯調下

半夏湯治胎衣不下或子死腹中或子衝上而昏悶

或血暴下及胎乾不能產者

半夏翹半 肉桂七錢 桃仁三十箇
炒去尖



大黃兩

方為細末先服四物湯三兩服次服半夏湯生薑

同煎

增損柴胡湯治產後經水適斷感於異證手足攣攣

咬牙昏冒繫屬上焦

柴胡錢八

黃芩錢四

人參錢三

甘草炒

石膏各四錢

知母錢二

黃耆兩二

半夏錢三

右為散末每服半兩生薑棗同煎

素死湯前證已去次服此以去其風邪

秦芫錢八

芍藥兩半

柴胡錢八

防風



黃芩錢各四人參

半夏錢各三炙甘草錢四

右為愈末水煎

荆芥散二三日後經水復行前證俱退宜此

小柴胡湯一料加荆芥穗五錢枳殼炒

右為愈末同小柴胡煎法

防風湯三二日後宜正脾胃之氣兼除風邪

蒼朮兩四防風兩三當歸兩一羌活兩一

右為愈末水煎

三分散治瘧後日久虛勞鍼灸小藥俱不效者

川芎 熟地黃 當歸 芍藥



白木 茯苓 黃耆 一兩

柴胡 人參 各一兩 黃芩

半夏 甘草 各六錢

右為鎗末水煎服清

血風湯治產諸風痠無力

秦艽 羌活 防風

川芎 芍藥 當歸 地黃

白朮 茯苓 各等 加半夏 黃耆

右為細末一半為丸棟蜜如桐子大一半為散温

潤調下丸藥五七十九丸



治血運血結或聚於胃中或偏於少腹或運於脇肋
四物湯四兩倍當歸川芎鬼箭紅花玄胡各一
回為麩末如四物煎服清調

沒藥散服之

黃虫

去羽足一錢微炒

水蛭

二錢麩炒

沒藥

一錢

右為細末煎前藥調服血下痛止只服前藥
加減四物湯治產後頭痛血虛氣弱痰癖寒厥皆令

頭痛

羌活

川芎

防風

香附子炒各

一兩



細辛半兩炙甘草 當歸醇半石膏四兩

熟地黄兩香白芷半兩

蒼朮一兩

右為僮末每服一兩水煎

如有汗者是氣弱頭

痛也前方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎

頭痛痰癖者加半夏三兩茯苓一兩半生薑煎

如熱厥頭痛加白芷三兩石膏三兩知母一兩半

如寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑煎

四物湯治諸變證效加幟元

紅花散治婦人產後血昏血明月事不調遠年乾血

氣皆治之

方去幾裏

左

尚



乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花

蒲黃炒 鱉

右為細末每服半兩酒煎和滓溫服如胎衣不

下別未榆白皮煎湯調下半兩立效

當歸散治婦人惡物不下

當歸 芫花炒

右為細末酒調三錢 又一方好墨醋滓末之小

便酒調下

治胎衣不下 蛇退皮炒 焦細末酒調下如胎衣在腹

另碾榆白皮末同煎服立下



生地黄散諸見血無寒衄血下血吐血溺血皆屬於

熱

生地黄

熟地黄

枸杞子

地骨皮

天門冬

黃耆

芍藥

甘草

黃芩

名

右為龜末每服一兩水煎脈微身涼惡風每一兩

加桂米錢

麥門冬飲子治衄血不止

麥門冬

生地黄

右剉每服一兩水煎

又衄血先朱砂蛤粉

次木



香黃連 大便結下之大黃芒硝甘草生地黃
澹欖梔子黃芩黃連可選而用之

帶下證

赤者熱入小腸白者熱入大腸其本濕熱窵結子
不散故為赤白帶下也窵屈也結也屈滯而病
不散先以十棗湯下之後服苦練丸大玄胡散調
下之熱去濕除病自愈也來月事不來先服降心
火之劑後服局方中五神丸後以衛生湯治膠養
血氣可也

苦練丸治赤白帶下



苦練浸酒

茴香沙

當歸各等

右為細末酒糊丸如桐子大每服五十九空

酒

下

衛生湯

白芍藥

當歸

二黃

甘草

兩

右為細末水煎空心服

如虛者加入參一兩

大頭風證

夫大頭風證者足陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之也多在少陽或在陽明或在太陽視其腫勢在何部分隨經取之濕熱為腫木盛為痛此邪見



北京中醫藥大學圖書館版權所有

於頭多在前耳後先出治之大不宜藥速速則過其
病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病是會
外而之內者是血病况頭部分受邪見於無形迹
之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上者無形
之部分既着無形無所不至若用重劑速下過其
病難已雖無緩藥若急服之或食前或頓服皆失
緩體則藥不能得除病當徐徐浸清無形之邪也
或藥性味形體據象皆要不離緩體是也且後
急者謂緩劑已瀉邪氣入於中是到陰部染於有
形質之所若不速去則損陰也此終治却為客邪

當急去之是治客以急也 且治主當緩者謂陽

邪在上陰邪在下若急治之不能解紛而益亂也

治客以急者謂陽分受陰邪陰分受陽邪此客

氣急除云之也

假令少陽陽明為病少陽為邪出於耳前後也陽

明為邪者有大腫也先以黃芩黃連甘草湯通炒

過剉煎少少不住服或劑畢再用煨黍粘子新瓦

上炒香同大黃煎成去滓內芒硝俱各等分亦時

時呷之無令飲食在十得微利及邪氣已只服前

藥如不已再同前次第服之取大便利邪氣則止



如陽明渴者加石膏如少陽渴者加瓜蒌根

陽明行經升脉芍藥葛根甘草太陽行經羌活

防風之類大黃麻黃桂枝芍藥甘草

黑白散治大頭風如神方在後

消毒丸在實鑑內附大頭風決心黃芩黃連甘草

瘧疾證治陽明熱少則微泄出飲耳前刺出

夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺者近而暴傷之重者

遠而疾瘧瘧者久瘧也是知夏傷於暑濕熱閉藏

而不能發泄于外邪氣內行至秋而發為瘧也何

經受之隨其動而取之有中三陽者有中三陰者



南京中醫藥大學圖書館

經中邪氣其證各殊同傷寒治之也五藏皆有瘧
其治各異在太陽經謂之風瘧治多汗之在陽
經謂之熱瘧治多下之在少陽經謂之風熱瘧治
多和之在陰經則不分三經總謂之濕瘧當從太
陰經論之

桂枝羌活湯治瘧疾處暑前發頭痛項強脈浮惡寒
有汗

桂枝

羌活

防風

甘草各半

右為僉末水煎

如吐者加半夏麩等分

麻黃羌活湯治瘧病頭痛項強脈浮惡風無汗者



活活

麻黃節去

羌活

防風

甘草各半

右為僉末水煎

如吐者加半夏麴等分

麻黃桂枝湯治發瘧如前證而夜發者

麻黃

一兩去節

炙甘草三錢黃芩兩半

桂枝二錢

桃仁

三十箇去皮尖

右為末水煎桃仁散血緩肝夜發乃陰經有邪此

湯散血中風寒也

桂枝黃芩湯治瘧服藥寒熱轉甚者知太陽陽明少

陽二陽合病也宜此和之

甘草

黃芩

人參

各半

半夏

四錢



柴胡二錢 石膏

知母 各半 桂枝 二錢

右為愈末水煎 從卯至午時發者宜大柴胡湯

下之 從午至酉發者知其邪氣在內也宜大承氣湯

氣湯下之 從酉至子時發者以承氣湯下之微利後更以

其邪氣在血也宜桃仁承氣湯下之微利後更以

小柴胡湯制其邪氣可也

熱證

有表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴

發而為熱者乃久不宣通而致也有服濕藥而為

熱者有惡寒戰慄而熱者蓋諸熱之屬心火之象

也治法小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之
其熱之氣則汗發之發之不盡則逆制之制之不
盡求其屬以衰之苦者以治五藏五藏屬陰而居
於內辛者以治六府六府屬陽而在於外故內者
下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈

地黄丸 方在前發
明內附

如煩渴發熱虛煩蒸病空心服之食後服防風
當歸飲子

柴胡

人參

黃芩

葛根

滑石

石膏

當歸

防風兩各半

右為麤末生薑同煎

如痰實欬嗽加半夏

金花丸治大便黃米穀完出驚悸溺血淋閉

血有汗頭痛積熱肺痿

黃連

黃蘗

黃芩

山梔子

杏仁

右為細末滴水為丸桐子六溫水下

如大便秘結

實加大黃自利不用大黃如中外有熱者作散

剉服名解毒湯如腹滿嘔吐欲作利者解毒湯

內加半夏茯苓厚朴各三錢生薑同煎如白膿

下痢後重者加大黃三錢



海狗補腎

涼膈散

方在難知內附

加減于後

若咽嗑不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩刺藜棘

半兩 若欬而嘔者加半夏半兩生薑煎

切嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩

者加滑石四兩茯苓一兩

當歸承氣湯治熱攻於上不利於下腸狂奔走罵詈

不避親疎

大黃

當歸各一甘草

芒硝

右以咀生薑

大黃膏治熱入血室發狂下認人者



牛黃 朱砂

鬱金

丹皮 鎔

腦子 甘草 鎔

右為細末煉蜜為丸如皂子大新水化下

治表熱惡寒而渴陽明證白虎湯也 若膚如火燎

而熱以手取之不甚熱為肺熱也日沾赤燥或

引飲獨黃芩一味主之 若兩脇下肌熱脈浮弦

者柴胡飲子主之 若脇肋熱或一身盡熱者或

日捕肌熱者皆為血熱也四順飲子主之 若夜

發熱主行陰及血熱也四順飲子桃仁承氣選而

用 若晝則明夜則譫語四順飲子證 若

若晝則明夜則譫語四順飲子證 若



發熱雖無脇熱亦為勞熱證
度氣藥也大抵宜柴胡飲子
度血藥也大抵宜四順飲子

晝則行陽二十五
夜則行陰二十五

眼證

眼之為病在府則為表當除風散熱在藏則為裏
養血安神藥發者為表而易治久病者在裏而難
愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸
婦人則熟乾地黄丸主之
治眼暴赤暴腫散熱飲子

防風

羌活

黃芩

黃連



黃右咬咀水煎食後溫服 如大便秘瀉加大黃

兩如痛甚者加當歸地黃各一兩

如煩燥不

得眠睡加梔子一兩

地黃湯治眼久病昏澁因發而久不愈丸

其防風中黃芩

黃連

地黃當歸

茯苓

右為籩末水煎

四物龍膽湯治目暴發方在元戎日

點眼藥則有驍光膏方在後別

洗眼藥則有夜光膏方在賢

暗藥方在後雜



消渴證

消渴之疾三焦受病也有上消有消中亦有消腎上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利如其燥在上焦也治宜流濕以潤其燥

消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知其熱在中焦也宜下之

消腎者初發為膏淋謂淋下如膏滲之狀至病成而面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養血以肅清分其清濁而自愈也

黃連膏



黃連末一觔生地黃自然汁山口蓮花藕汁牛乳

汁各一觔

右將汁熬成膏子剉黃連末為丸桐子大每服三

十九丸少呷溫水送下日進十服渴病立止

八味丸治消腎方在發

腫脹證助內附

五臟六腑皆有脹經云平治權衡去其死陳剉開鬼門

潔淨府乎治權衡者察脈之浮沉也去苑陳剉者

疎滌腸胃也開鬼門者發汗也潔淨府者利小便

也蠱脹之病治以雞屎醴酒調服水脹之病當開



南京中醫藥大學圖書館藏

鬼門決潔淨府也

治水腫痿聒去頭尾與葡七心間研露七日曝乾
未淡酒調下暑月用佳

又方棗一斛鍋內入水上有四指脣大戟并根煎盡
之遍盆合之煮熟為度去大戟不用旋旋喫無時
盡棗決愈神效

瘡瘍證

瘡瘍者火之屬須分內外以治其本若其脈沉實當
先疎其內以絕其源也其脈浮大當先托去畏恐邪
氣入內也有內外之中者邪氣至盛遏絕紅絲絡故

發癰腫此因失托裏及失疎通又失和榮衛也治
瘡之大要須明托裏疎通行榮衛之三法內之
者其脈沉實發熱煩燥外無焮赤痛深於肉其邪
氣深矣故先疎通臟腑以絕其源外之內者其脈
浮數焮腫在外形證外顯惡邪氣極而內行故先
托裏也內外之中者外無焮惡之氣內亦臟腑宜
通知其在經當和榮衛也用此三法之後雖未差
必無憂證亦可使邪氣峻減而易痊愈

內疎黃連湯治嘔哕心逆發熱而煩脈沉而實腫硬

木悶而皮肉不變色根繫深大病遠在內臟腑



澁當急急疎利之

黃連

山梔子

芍藥

當歸

檳榔

木香

薄荷

連翹

黃芩

桔梗

甘草

各

右為末水煎先喫一二服次後加大黃一錢再服

加二錢以利為度如有熱證止服黃連湯大便

秘澁則加大黃如覺無熱證煎後藥復煎散時

時服之如無熱證及大便不秘澁止服復煎散稍

有熱證却服黃連湯秘則加大黃如此內外皆通

榮衛和調則經絡自不遏絕矣



中藥大學圖書館藏書

內托復前散治腫癩於外根繫不深形證在表其所
多浮痛在皮內和氣盛而必侵於內須急內托
救其裏也

地骨皮

黃耆

防風

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

人參

甘草

當歸

防己

桂枝

柳桂

淡味半兩

加不損自費也

芍藥

防己

桂枝

右咬咀先煎蒼朮一觔用水五升煎至三升去蒼

朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作

三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前



煎十二味藥滓服之此除濕散鬱熱使胃氣和平
如或未已再作料服之若夫便秘及煩熱少腹滿
連湯如微利煩熱已退却服復煎散半料如此使
榮衛俱行邪氣不能自侵也
當歸黃耆湯治瘡瘍臟腑已行如痛不可忍者

當歸

黃耆

地黃

川芎

地骨皮

芍藥各等

右咬咀水煎

如發熱加黃芩

如煩躁不能

臥者加枳子

如嘔則是濕氣侵胃倍加白朮

內消升麻湯右治血氣狀實若患癰疽大小便不通



升麻

大黃

各二兩

黃芩

半兩

枳實

炒

當歸

芍藥

各半兩

炙甘草

右咬咀水煎食前服

復元通氣散治諸氣滯耳聾腹癰便癰瘡疽

痛消腫

青皮

陳皮

各四兩

甘草

三兩生熟各半

川山甲

炮

括萎根

各二兩

加金銀花

連翹

各一兩

右為細末熱酒調下

五香湯治毒氣入腹托裏若有異證於內加減

舌去幾矣

十五



汗出機要

木香

沉香

乳香醋一

香三錢

右為細末水煎空心服

嘔者去麝加藿香薄荷

兩渴者加人參一兩

赤芍藥散治一切疔瘡癰疽初覺增寒疼痛

金銀花

赤芍藥醋半

大黃七錢

瓜蒌大者一校當歸

甘草

枳實各三錢

右為籠末木酒各半煎

桃紅散飲露生肌定血辟風邪

滑石研

乳香

輕粉各錢

小荳粉



寒水石燒 兩

一方取小荳粉為定粉一兩

右為極細末乾貼

冰霜散治火燒皮爛大痛

寒冰石生 牡蠣燒

朴硝

青黛兩

輕粉錢一

右為細末新水或油調塗立止

乳香散治杖瘡神效

乳香

沒藥錢三

自然銅半兩

醋十 燒

茴香錢四

當歸兩半

右為細末每服半兩温酒調下



五黃散治杖瘡定痛

黃丹

黃連

黃芩

黃蘗

大黃

乳香

等分

右為細末新水調成膏用緋絹帛上攤貼

花藥石散治一切金瘡狗咬楊婦人敗血無血毒

心血運胎死胎衣不下至死者以童便調下一錢

取下惡物神效

硫黃

明淨者四兩

右二味拌勻用紙筋和膠泥回濟瓦觀子一箇入

藥內密泥封口了焙乾安在四方溥上溥上書入



版權所有

用炭一秤圍燒自巳午時從下生火直至經宿火
盡又經宿觀冷取研極細磁盒內盛用
截瘡散治年深疔瘦瘡

黃連兩半

白斂

白芨

黃丹略

輕粉錢一

龍腦

麝香略五分

蜜佗僧兩一

右為細末和勻乾糝或維上以膏貼之

生肌散

寒水石剉

滑石略一

烏魚骨

龍骨

定粉

蜜佗僧

白礬灰

乾咽脂略半



右為極細末乾摻用之

平肌散治諸瘡久不斂

蜜佗僧

花藥石

赤 物同

白龍

乳香

輕粉

黃丹

黃連

右為極細末和勻乾摻

碧霞挺子治惡瘡透了不覺疼痛者

銅礞

硃砂

瞻酥

右為細末燒飯和作麥櫟挺子每用刺不覺痛者

須刺血出方紙葉在內以膏貼之

用藥加減



如發背疔腫膿潰前後虛而頭痛於托裏藥內加五

味子 恍惚不安加人參茯神 虛而發熱者加

地黃括萎根 潮熱者加柴胡地骨皮

子加知母赤小豆 虛煩者加枸杞天門冬

利者加厚朴 膿多者加當歸川芎 痛甚者加

芍藥乳香 肌肉遲生者加白斂官桂 有風邪

者加獨活防風 心驚悸者加丹砂 口白日動

者加羌活細辛 嘔逆者加丁香藿香葉 痰多

者加半夏陳皮

迴瘡金銀花敢治瘡瘍痛甚則色變紫黑者



金銀花

連枝藥

黃芪

兩四

甘草

兩一

右以咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯煮
兩時辰取出去滓頓服之

雄黃散治瘡有惡肉不能去

雄黃

一錢

巴豆

去皮

右二味再同研如泥入乳香沒藥各少許再研勻
細少上惡肉自去矣

瘰癧證

夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳十

車及頤頷或在口下連缺盆皆謂之瘰癧或在胃



南京中醫藥大學圖書館藏書

及胃之側或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之

治結核前後耳有之或耳下頷下有之皆癩癧也

樞二到極熟黑色者以布裂取自然汁不犯銅鐵

以文武火慢熬作薄膏子每日白沸湯點

後日三服

專翹湯治馬刀

連翹

瞿麥花研

大黃三

甘草

右吹咀水煎服後十餘日可於臨泣穴灸三七壯

服五六今日方效在他經者又一方服大黃木通



五兩知只一作毋五兩雄黃七分檳榔半兩減甘草
不用同前藥為細末熱水調下三五錢服之

瞿麥飲子

連翹斤一

瞿麥穗斤半

右為籠末水煎臨臥服此藥經效多不能速驗宜
待歲月之从除也

欬嗽證

欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有
痰脾濕動而為痰也欬嗽是有痰而有聲蓋因傷
於肺氣而欬動於脾濕因欬而為嗽也治欬嗽者



治痰為先治痰者下氣為上是以南星半夏勝其
痰而能食者大承氣湯微下之痰而不能食者厚
朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小胡
汭湯治加石膏一兩知母半兩用之冬月嗽而寒
熱者謂之寒嗽小青龍丸杏仁服之蜜煎生薑湯
蜜煎橘皮湯燒生薑胡桃皆治無痰而嗽者此為
大例更當隨時隨證加減之

利膈丸 方在續

欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

郁李仁 青皮皀 陳皮皀 續榔

木香

杏仁去皮馬兜苳炒人參

廣茂

當歸

澤瀉

茯苓

苦葶藶

炒 銘

防已兩

牽牛

取

兩

右為細末生薑汁麵糊為丸桐子大生薑湯下

治欬嗽諸方在家珍內并寶鑑內者更宜選而用之

虛損證

虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰

盛故損則自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則

不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損則自下

而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上

而損者一損損於肺故皮聚而毛落二損損於心
故血脈虛弱不能榮於臟腑婦人則月水不通
損損於胃故飲食不為肌膚也自下而損者一損
損於腎故骨痠不能起於牀二損損於肝故筋緩
不能自收持三損損於脾故飲食不能消也
也心肺損則色燁肝腎損則形痿脾胃損則穀不化

治肺損皮聚而毛落宜益氣四君子湯

方在前附

治心肺虛損皮聚而毛放血脈虛損婦人月水愆期

宜益氣和血八物湯

方在前附



治心肺損及胃損飲食不為肌膚宜益氣和血調飲

食十全散方在前元

治腎肝損骨痿不能起于牀宜益精筋緩不能自收

宜緩中

丸

牛膝酒浸 草薢 杜仲剉 菴蓂酒浸

兔絲子 防風 兩蘆巴炒 肉桂剉

破故紙 沙苑白蒺藜

右等分為細末酒煮猪腰子為丸每服五七十九

空心溫酒下如腰痛不起者服之甚效



南京中醫藥大學圖書館藏

治陽盛陰虛肝腎不足房室虛損少精勞力而多黃
黃而無常色宜榮血養腎

地黃丸

其藥

木一斤浸熟地黃斤乾薑春七錢

秋七錢

冬夏

各半

兩

右為細末蒸棗肉為丸桐子大每服五七十九至

百丸諸飲下若加五味子為腎氣丸述類象形

如陽盛陰虛心肺不足及男子婦人面

無血色食少嗜臥肢體困倦宜八味丸方在內

如形體瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月宜地

黃丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸



治病久虛弱厭厭不能食和申丸防論申

吐證

吐證有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃

通於天氣主內而不出中焦在中腕上通天氣下

通地氣主腐熟水穀下焦在臍下通於地氣主

而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也

其脈浮而洪其證食已暴吐渴欲飲水大便結燥

氣上衝而胃發痛其治當降氣和中中焦吐者皆

從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脈浮

而弦其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當



以小毒藥去其積穢榔木香和其氣下焦吐者皆
從於寒地道也其脈沉而遲其證朝食暮吐暮食
朝吐小便清利大便秘而不通治法當以毒藥通
其秘塞溫其寒氣大便秘通復以中焦藥和之不
令大便秘結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先和中
桔梗湯

桔梗

白木

半夏

陳皮

白茯苓

枳實

厚朴

砂

右咬咀水煎取清調木香散二錢隔夜空腹服之



後氣漸下吐漸止然後去木香散加芍藥二兩黃
者一兩半每一料中即算加之如大便燥結食
不盡下以大承氣湯去硝微下之少利再服芍藥
補之如大便復結依前再微下之

木香散

木香

檳榔各等分

右為細末前藥調服

厚朴丸主翻胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾

其藥味即與萬病紫苑丸同

方在附元

其加減

子后

春夏再加黃連

兩

秋冬再加厚朴

兩



如治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓
各一兩半 如治風癰不愈者依春秋加減外更
加人參菖蒲茯苓各一兩半 如失精者加菖蒲
白茯苓為輔 如肝之積加柴胡蜀椒為輔 如
心之積加黃連人參為輔 如脾之積加吳茱萸
乾薑為輔 如腎之積加菖蒲茯苓為輔 秋冬
久瀉不止加黃連茯苓

心痛證

諸心痛者皆少陰厥陰氣上衝也 有熱厥心痛者身
熱足寒痛甚則煩燥而吐額自汗出知其熱也其

秋冬

脈浮大而洪當灸大谿及崑崙謂表裏俱瀉之是
 謂熱病汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也
 灸畢服金鈴子散則愈痛止服枳朮丸去其餘邪
 也有大實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或
 秘久而法悶心胷高起按之愈痛不能飲食急以
 葶黃丸利之利後以葦朮湯去其邪也有寒厥心
 痛者手足逆而通身冷汗出便溺清利或大便利
 而不渴氣微刃弱急以朮附湯溫之寒厥暴痛非
 从病也朝發暮死急當救之是知久病無寒暴兩
 非熱也



金鈴子散治熱厥心痛或發或止久不愈者

金鈴子

玄胡索

各兩

右為二末每服二三錢酒調下溫湯亦得

治大實心痛二藥

厚朴九同紫苑九

在元戎方內

煮黃丸

方在內傷證

治大實心痛大便已利宜藁本湯止其痛也

藁本

兩半

茶本

兩

右為麤末水煎服清

治寒厥暴痛脈微氣弱宜朮附湯溫之

方在雲岐脈論內明

疝證



男子七疝婦人癥聚帶下皆任脈所主陰經也腎肝

受病治法同歸於

酒煮當歸丸

當歸剉

附子炮

苦練子剉

茴香略

右剉以酒三升同煮酒盡為度焙乾作細末

丁香

木香

金蠟

附玄

胡索

雨

右同為細末與前藥一處拌勻酒糊為丸每服三

五十丸至百丸空心溫酒下凡疝氣帶下皆屬於

風全蠟治風之聖藥補香苦練皆入小腸故以附

子佐之丁香木香則導為用也



治奔豚及小腹痛不可忍者苦練丸

苦練

茴香各一

黑附子一兩

炮去皮

右用酒二升二酒盡為度曝乾或陰乾搗為極細

末每兩葉未入

全蝎十八

玄胡索半

丁香十五

右共為細末酒糊為丸桐子大每服百丸空心酒

下如痛甚煎當歸入酒下大效



終