

卷六

耳目

產後癥瘕

鼻

牙咽喉

痧疹

熱入血室

幼科要畧

瘡瘍

調經

淋帶

崩漏

胎前

增補臨證指南醫案

上海文益書
局印行



臨證指南醫案卷六

古吳葉 桂天士先生著

錫山華南田岫雲全較

耳

某溫邪上鬱耳聾右脹 薄荷

馬勃

桔梗此當外治

連翹

杏仁

通草

某二先起咳嗽。繼而耳聰脹痛延綿百日不愈。此體質陰虧觸入風溫未經清理外因傷及陰分。少陽相火陡起故

入暮厥痛劇當先清降再議育陰 苦丁茶 鮮荷葉 金銀花 生薑五皮 川貝母 鮮荷葉梗 益元散

某氏風溫發熱左耳後腫痛

乾荷葉 苦丁茶

馬勃

連翹

杏仁

黑梔皮

畢三壯年脈來小促數自春月風溫咳嗽繼以兩耳失聰據述苔黃滋陰不動是不明虛實經絡矣內經以春病在頭膏梁之質厚味酒醴助上痰火固非治腎治肝可效每晚卧時服茶調散一錢

又鮮荷葉汁

羚羊角

石膏末

連翹

元參

鮮荷葉

牛蒡子

午服

葉火風侵竅耳聲 連翹

薄荷

甘菊

淡黃芩

苦丁茶

黑山梔

顧二暑邪鬱閉耳失聰

鮮荷葉

鮮菊花葉

苦丁茶

夏枯草

蔓荆子

連翹

淡黃芩

黑山梔

某八左耳聰痛舌白脈數

體質陰虛

挾受暑風

上焦氣熱

宜用辛涼輕藥

鮮荷葉

苦丁茶

夏枯草花

黑山梔皮

某五暑熱上鬱耳聰作張

咳嗆當清氣熱

杏仁

連翹

淡竹葉

川貝

白沙沙

黑山梔

空頭重耳聰張目微赤

少陽相火上鬱

以辛涼清解上焦

連翹

羚羊角

薄荷梗

丹皮

桑葉

某風木之鬱耳聰欲閉

連翹

羚羊角

薄荷梗

苦丁茶

夏枯草花

黑山梔皮

小生香附

倪十因大聲喊叫至右耳失聰想外觸驚氣內應肝膽

膽脈絡耳震動其火風之威亦能鬱而阻塞治在少陽

忌食腥

青蒿葉

青菊葉

薄荷梗

連翹

鮮荷葉汁

苦丁茶

汪耳聰喫秋形體日瘦

男子真陰未充

虛陽易升乘竅

書云膽絡脈附耳

先議清少陽鬱熱

以左耳為甚故也

桑葉

桑葉

丹皮

連翹

黑山梔

青蒿汁

象貝母

膽火
上鬱

暑

風溫
上鬱

暑

增

增古今方略

古今方略

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

印

增

增古今方略

古今方略

耳

耳

耳

耳

耳

耳

耳

印

心附
膽火
上炎

鬱傷

丁 腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。心腎兩虧。肝陽亢逆。故陰精走渡。陽不內依。是以耳鳴時閉。但病在心腎。其原實由於鬱。鬱則肝陽獨亢。令膽火上炎。清晨服丸藥以補心腎。午服湯藥以清少陽。以膽經亦絡於耳也。

水煮熟地兩

麥冬兩半

龍板兩

牡蠣兩半

白芍兩

北味兩半

建連兩

磁石兩

茯神兩半

沉香五錢

辰砂五錢

為丸

生甘草四分

赤芍半錢

防已

旗
夏枯草錢二

丹皮錢

生地錢三

女貞子錢三

赤芍半錢

山梔一錢

生甘草四分

氣閉
腎虛

桃三錢

十氣閉耳鳴

鮮荷葉

杏仁

厚朴

廣皮

木通

連翹

金三下虛耳鳴失聰

磁石六味去萸加川斛龜甲遠志

龜板

銷陽

牛膝

遠志

茯神

磁石

萸肉

金三下虛耳鳴失聰

磁石六味去萸加川斛龜甲遠志

龜板

銷陽

牛膝

遠志

茯神

磁石

金三下虛耳鳴失聰

磁石六味去萸加川斛龜甲遠志

龜板

銷陽

牛膝

遠志

茯神

磁石

六味加龜甲五味遠志

腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。膽絡脈附於耳。體虛失聰。治在心腎。邪干竅。治在膽經。蓋耳為清空之竅。清陽文會流行之所。一受風熱火鬱之邪。與水良火實。腎虛氣厥者。皆能失聰。故先生治法。不越乎通陽鎮陰。益腎補心。清膽等法。使清靜靈明之氣。上走空竅而聽斯聰矣。如溫邪暑熱。火風侵竅。而為耳聾痛脹者。用連翹。山梔。薄荷。竹葉。滑石。銀花。輕可去實之法。輕清泄降為主。如少陽相火上鬱。耳聾脹脹者。用鮮荷葉。苦丁茶。青菊葉。夏枯草。蔓荆子。黑山梔。羚羊角。丹皮。辛涼味薄之藥。清少陽鬱熱。兼清氣熱為主。如心腎兩虧。肝陽亢逆。與內風上旋蒙蔽。而為耳鳴暴聾者。用熟地。磁石。龜甲。沉香。二冬。牛膝。銷陽。秋石。山萸。白芍。味厚質重之藥。壯水制陽。填陰鎮逆。佐以酸味入陰。誠以和陽為主。因症施治。從虛從實。直如庖丁之導氣矣。鄙時乘

耳聾之法

端然大段。不過清上。雖下二條案中。極極當。至於外治之法。及虛寒等症。則不可不知也。

風溫
燥熱

某風溫上鬱。目赤脈左弦。當用辛以散之。桑葉

夏枯草

連翹

草決明

赤芍

生香附

連翹丹皮

望月砂

生香附

連翹山梔

山梔

桑葉

生甘草

赤芍皮

桑豆皮

穡豆皮

桑葉

冬桑葉

生甘草

赤芍皮

桑豆皮

穡豆皮

桑葉

青芍葉

苦丁茶

桑皮

桑葉

苦丁茶

桑皮

肝陰

某三脈澑細。左目痛。淚熱。翳。此肝陰內虧。厥陽上越所致。冬桑葉錢。炒枸杞錢。小胡麻錢。望月砂三錢。

製首烏錢。石決明具。黃菊花錢。稽豆皮錢。

某三目痛無光。○製首烏六兩。枸杞子二兩。柏子仁兩。細生地兩。石決明兩。小胡麻兩。望月砂三兩。

刺蒺藜兩。冬桑葉兩。黃菊花兩。用稽豆皮八兩。穀精珠二兩。煎濃汁泛丸。每服五錢。開水送下。

某背張目昏。心中嘈雜。當治肝腎。

熟地六兩。枸杞子兩。桑椹子二兩。沙苑兩。

石決明兩。

茯神二兩。

加蜜丸。早上開水送四錢。

某三脈澑。背痛。右目當風。多淚。當治肝腎。

熟地兩。枸杞子兩。桑椹子二兩。沙苑兩。

石決明兩。

茯神二兩。

抄錄眼科
通食治以
諸多識非
批書之體

致成外障。譬之鏡受污垢。必當濯磨。須用點藥。若但服藥。必不能愈。至於內障之症。但宜服藥。倘用點藥。徒傷其氣。必無益而有損。更當知目眚白珠屬陽。故苦寒藥則可。瞳子黑睛屬陰。故夜痛點苦寒藥則反劇。是外治之治。亦當以陰陽區別也。若夫偏正頭風屬氣虛。而者朝重暮輕。血虛。而者朝輕暮重。亦有外感內因之別。此症當以補養正氣為主。略兼治表。倘槩以風熱而論。專以表散。最易損目。更有肝陰虧耗。木火上炎。頭痛惡心。眉棱骨痛。不欲飯食。眼胞紅腫。睛珠刺痛。眵如膿。白睛如劄。目珠上竄不下。不得睡。牀甚至難頂。腦後如破如裂。此內發之風也。夫肝屬木。木主風。熱盛化風。其體必本陰虧。男子或有遺精。白濁。腸風痔下。血等疾。女子或犯淋帶崩漏諸症。此係陰傷陽升。內風沸起。大忌發散。宜用育陰熄風柔肝滋腎等法。或可救十中之四五。凡羌活防風川芎細辛。澤本升麻等藥皆不可用。倘或失治。必致膏肓低陷。青黃牒出。致成痼疾。而不可救。專是科者。不可不留意焉。葉先生雖非眼科專科。觀其案內諸法。真補前賢之未備。較之慣用苦寒升散。及概用點藥者。不啻如霄壤之殊矣。學者當細心而參玩之。

眼科自有專家。其現症各有主治之方。案中雖未必切中。然清淡和平。無苦寒溫補等。辨反勝于近日文名為眼科者。醫理苟明。則無不通矣。若欲深求。則有專門之書任。

清邪流氣。乃一法也。無方。
鮑十兩。三年。鼻塞。不聞。清涕。由口嗰出。而氣窒仍然。大凡頭面諸竅。皆清陽之會。通行之所。就外邪來襲。亦必霧露無質清邪。邪鬱既久。氣血失其流暢。進藥攻治。必不效驗。欲治其病。須查手太陰。自少商穴起。莫若以藥外治。施鍼刺以泄邪。

徐十四頭面諸竅。皆清陽遊行之所。邪處於中。則為堵塞。陽氣不司流行。必畏寒形頰。內痺必鬱而成熟。有鼻柱軌衄矣。論理當用通聖散。遠處江外。倉猝就診。不可輕投。用輕可去實。苦丁茶。乾荷葉邊。葛根子。連翹心。飛滑石。白芷。不成方。

毛叶熱壅肺氣。失降。鼻柱塗瘻。宜外治。知母。水梨肉。川貝母。水煎膏。

梅酸降滋填鼻。潤止得寐。用虎督法。減當歸陳皮。加天冬。淡菜膠。晝晡丸。

沈氏素有痰火。氣逆。春令地中陽升。木火化風。上引巔頂。腦熱。由清竅以泄。越耳鳴。鼻漏甚於左者。春應肝膽。氣火自左而升也。宜清熱散鬱。辛涼達於頭而主治。羚羊角。黑山梔。苦丁茶。青葙葉。飛滑石。

鼻塞
肺氣
熱
脣熱
鼻漏

清邪
點藥
肝氣

於溼火熱毒蘊結牙床須分上下二齒辨明手足陽明及少陰之異又審其專科而任之華玉堂

風火喉

陸風火上鬱項腫咽喉痛薄荷連翹

射干牛蒡子馬勃菜菔

馬勃射干杏仁

菜菔

杏仁

肺燥熱

邵風火上鬱因痛頭脹宜用辛涼西瓜翠衣

滑石連翹桑葉生菜豆皮

川貝母

川貝母

川貝母

鐵闊上受

王二勞傷恐有瘀血進辛潤宣血初服身痛繼漸平復但喉間堅硬而呼吸飲食仍不覺其苦眼白仍帶黃議清肺

中氣熱治百部大沙參鮮枇杷葉

活水蘆根川貝

地骨皮南花粉苡仁

徐六老勞咽疼生雞子白皮

桔梗根鬚砂糖水洗刮北沙參錢

炒麥冬三錢

川石斛錢

生甘草三分

川貝母

川貝母

川貝母

川貝母

楊未病陰氣走泄為虛濁上受則實咽喉腫痺上竅邪蒙日暮昏煩陰傷日熾肌膚柔白氣分不足醫藥雖

宜涼解清上但不可犯及中下連翹鬱金馬勃牛蒡子竹葉心黑山梔

杏仁橘紅

桔紅

桔紅

桔紅

桔紅

桔紅

桔紅

氣分

又孫九腎液不收肝陽上越頭脹流涕咽喉微痛緩其急耳此症必喉中有細癰成不

細生地天冬阿膠生雞子黃元參心

桔梗根鬚

桔梗

桔梗

桔梗

桔梗

桔梗

桔梗

陰虛火衰

陳七陰陽交虛營衛欹斜為忽冷忽熱周身骸骨皆痛百脈皆損秋半天氣已降身中氣反泄越汗出喉瘡陽不入於陰致自為動搏耳夫咽喉之患久則喉瘡喉宣妨阻受納最不易治從少陰咽喉例用猪膚湯旬日喉痛得緩

撲滅必身中陰陽協和方息此草木無情難效耳從仲景少陰咽喉用猪膚湯主之

對症轉方

又陰涸於下。陽熾於上。為少陰疾痛。力損怯之末傳矣。用猪膚甘涼益火。有情之屬而效。今肉腫消爛殆盡。下焦易冷。髓空極矣。何暇以瘦軟為理。

治病無育不兼顧者議滑濁之補味鹹入腎可也。

牛骨髓四兩。羊骨髓四兩。猪骨髓四兩。麋角膠四兩。用建連五兩。山藥五兩。芡實二兩。同搗丸。

金匱

二

臟液不充。陽氣虛風鼓動。病起喉辣心寒。頻頻舉發。多因勞怒。用內經甘緩一法。

人參

一

萸肉炭

一

白芍

一

火甘草

一

茯神

一

小麥

一

又

復脈湯去桂

一

又

復脈湯去桂

一

內經云

一

陰一陽結謂之喉痺。

一

陰者手少陰君火。心之脈氣也。

一

一陽者手少陽相火。三焦之脈氣也。

一

二經之脈并絡於喉。故氣熱則內結。結甚則腫脹。脹甚則不通而死矣。

一

即今之所謂喉癰喉風喉蛾等類是也。

一

夫推原十二經。惟足太陽別下項。其餘皆奏咽喉。然內經獨言一陰一陽結為喉痺者。何也。蓋以君相二火獨勝。則熱且痛也。愚歷致咽喉湯方。皆用辛散鹹軟。去風痰解熱毒為主。如元參升麻湯。聖濟透關散。及玉鑰匙如聖散。普濟消毒飲子。皆急於治標。而援於治本。恐緩則傷人。故以治標為急耳。又嘗考仲景傷寒論。咽喉生瘡等症。每用甘草桔梗半夏散。及湯為主。一為少陰水虧不能上濟君火。以致咽喉生瘡。不能出聲。故以半夏之辛滑。佐雞子清利要通聲。使以苦酒入陰。劫涎飲瘡。桂枝解肌。由經脈而出肌表。悉從太陽開發。熟緩中。使其陰陽協和而後愈。是固本而兼治標者也。如風火上鬱。陰虧脈數而為咽痛者。先生又有辛涼清上諸法。如咽喉緊痙。氣熱而為咽痛者。又有清肺中氣熱一法。如情志鬱勃。相火上炎而為咽痛者。則又有降氣開濁一法。如腎液不收。肝陽上越而為咽痛者。宗仲景

猪膚湯法。鄙滋九

凡病屬於經絡臟腑者。皆煎丸之所能治。一屬形體。乃九竅則屬有形之病。貴有邪氣凝結之處。樂入胃中。不過氣到耳。安能去凝結之邪。故煎丸之功。不過居其半耳。若欲速效。必用外治之法。可以應手而愈。博考方書。庶求秘法。自能得之。此老尚未知之也。故其治有形諸病。皆非所長。又外治之法。上古所以鮮聞。因其用針灸之術。通神入妙。何必外治。此則外治之最者也。後世針法。不傳於是。乎以藥代針。而多外治之法。若針灸既廢。而文必需外治之法。亦不講。則天下之病。即使用藥。當能愈其半耳。其外症。亦醫道之一大閑也。後之學者。須知之。

(瘡瘍)

楊九瘡瘍四肢偏多。長夏入秋。懶倦欲眠。乾咳無痰。頗知味所納已少。此陽明胃陰。因熱致耗。即熱傷元氣之徵。當與甘藥養胃陰以供肺。加金匱麥門冬湯。去半夏。加黃芪皮。

吳八脈不浮大。淮關外風初起。右掌二指已不屈伸。頭面身半以上常有瘡泡之形。此乃陽明脈絡內留溼熱。若非

薦氣吸人定然食物中毒。姑與宣解緩攻。連翹、犀角、赤芍、酒煨大黃、荆芥、片菖黃。壅前方辛涼入血。先升後降。已得小效。今製清脈絡雍熱。藉酒力以引導。通後營衛。亦一法也。

銀花、連翹、犀角、生大黃、荆芥、丹皮、黃芩。川芎、當歸、澤蘭、羚羊角、大豆黃卷用無灰酒十助浸營以熄內風。殊利溼熱。以肅隧道。辛辣腥鮮勿進。尚可緩以計功。

製首烏、鮮生地、柏子仁、川斛、黑櫟豆皮、虎骨、蠶沙、黃柏、草薢、熬膏。

吳瘡瘍之後。溼熱未去。壅阻隧道。水穀下咽亦化為痰。中焦受病。故不知飢餓。痰氣上干。漸至喘悶矣。但服藥四十劑。純是破氣消冠。胃陽受傷。痰氣愈不得去矣。

半夏、茯苓、紫老薑、炒粳米。又瘡瘍大發。營衛行動於脈中脈外。可免腹滿之累矣。第殺食尚未安適。猶是苦劣多進之故。胃陽未復。仍以通

調利溼主之。

半夏

苡仁

金石

茯苓

澤鴻

秦十五久熱。瘡瘍五六。環口燥裂。漏瀉革痛。鮮生地。

熟首烏

丹皮

丹參

茺蔚子

銀花

地丁

紫草

共熬膏

王血熱風動膚癰。荆芥、防風、地膚子、赤芍。

銀花

小生地

木通

甘草

張四初因嘔吐。是肝胃不和致病。故辛香剛燥愈劇。然久病必入血絡。熱則久瘡不愈矣。木火皆令燥液易飢易

飽。間有嘔逆。斯胃病仍在。凡呆滯藥味。皆非對症。

三角胡麻

冬桑葉

生首烏

杏仁

鬱金

佩蘭葉

自然膏

楊五身瘦久瘡。血分有熱。精通之年最宜安養。脈象非有病。

生首烏

丹皮

丹皮

生白芍

蜜丸早服

細生地

地骨皮

金銀花

兩

丹皮

生白芍

兩

生甘草

蜜丸早服

細生地

地骨皮

有何力量

王三脈來濁浮。久瘡變幻未罷。是衛陽疏証。不耐寒暄。初受客邪不解。混處氣血。浸淫僅在陽分。肌腠之患。議升舉。

一法氣壯斯風溼盡驅。

人參 生黃芩 川芎 當歸 防風 瘢蠶 蟬蜕 炙草 生薑 大棗

蔣四真瘡口瘡。尿黃膚熱。冬瓜皮

苡仁 不去病

鄒三瘦因於溼。久而變熱。壅於經隧。變現瘡疾疥癬。已釀風溼之毒。混在氣血之中。邪正混處。搜逐難驅。四肢為甚。

姑從陽明升降法。連翹 赤芍 白僵蠶

白鮮皮 防風 升麻 滑石 酒浸大黃

汪氏風熱既久未解。化成瘡痍。當以和血驅風。當歸

赤芍 川芎 夏枯草花 牛蒡子 製瘻蠶

金頭嶺熱癥。未能泄邪。此身熱皆成膿之象。辛涼兼理氣血可愈。連翹

犀角 銀花 丹皮 元參 生甘草

某風熱毒閉項後腫。竹葉 滑石 蘆根 牛蒡 馬勃 薄荷葉 黑山梔 連翹

川貝 生甘草

王疔毒咯血失血。都是暑入陰傷。竹葉心 元參心 鮮生地 黑櫞豆皮 夏冬 知母

元參 青蒿葉

屠居三秋創半年未愈。瘻堅硬痛癟。鬱火成熟。腑經病可冀其愈。夏枯草

病不中 香附 茶芩 茲仁 丹皮

康氏頭項結核。腹脹足腫。肝木犯中。痰氣凝滯。夏枯草

澤瀉 半夏炒

厚樸半 橘紅半 神龜半 生香附一兩水磨汗泛丸

連翹

某氣鬱痰核。夏枯草 生香附 丹皮 山梔

連翹

王附脈左數右長。頭項結廬。時衄 生地半 丹皮半

犀角半 生夏枯草半 生鈎藤半

黑山梔半 土貝母半 生薄荷錢

生夏枯草半 生鈎藤半

陳躁急善怒。氣火結壅。燼筋為痛。熱鬱化風。氣阻痺塞。則腹鳴院脹。苟非開懷歡暢。不能向安。

土貝母 山梔 瓜萎皮 白芥子 海藻 夏枯草 昆布

鬱金 桔紅

沈氏肝氣鬱遏宿痞乳癰。川棟子 夏枯草 薄荷梗 丹皮 黑山梔 瓜萎皮 青橘葉 香附汁

劉氏乳房為少陽脈絡經行之所。此經血氣皆少。由情懷失暢。而氣血鬱滯。有形而痛。當治在絡。恐年歲日加竟成

沈瘤非癰腫之症。乳岩之以脈不浮數。在寒熱辨之。柴胡

不去病 夏枯草 歸身 白芍 川貝 茶芩 甘草

某氏乳房結核。是少陽之結。此經絡氣血皆薄。攻之非易。恐虛羸有年。釀為瘍症耳。

流注

孫

青蒿

香附

橘葉

青菊葉

丹皮

澤蘭

鬱金

當歸鬚

暑瘡

延綿之是治在少陽陽明。小生香。夏枯草。鮮菊花。薄荷梗。黑山梔。鈎藤。

丹皮。鬱金。

連翹。滑石。寒水石。銀花。

杏仁。連翹。黃柏。防己。

廣皮。薑皮。茯苓皮。連皮杏仁。

桂枝木。澤鴉。大腹皮。

連翹。滑石。寒水石。銀花。

丹皮。鬱金。

連翹。滑石。寒水石。銀花。

丹皮。鬱金。

陳脈左數實。血絡有熱。暑風溼氣外加。遂發疹塊。壅腫搔癢。是屬暑瘡。內侵肺胃。有煙火之變。昨用宣肺解毒。雖與暑邪無益。然亦無害。若加黃芩。又屬相反。大凡熱氣蒙閉。清潤都令神昏。當以牛黃清心丸。清痰氣之阻。使其宣開。況暑門中大有是法。與解毒勿悖矣。

季初病溼熱在經。久則深熱入絡。膿瘍日多未已。漸至筋骨熱痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則瘻。數年宿病。勿事速攻。犀角。連翹心。元參。丹參。野赤豆皮。細生地。薑黃。桑枝。牛服。夜服蒺藜丸。

某瘡瘍服涼藥。陽傷氣阻。脫悶不運。腹脹最怕。瘡毒內閉。急宜通陽。

厚樸。廣皮。薑皮。茯苓皮。連皮杏仁。

桂枝木。澤鴉。大腹皮。

顧五脈微小。潰瘍半月。餘腫未消。膿水清稀。浮腫汗出。嘔惡惡食。此胃陽虛敗。灑毒內攻。欲脫。夫陽失煦。則陰液不承。元氣微。則毒愈滯。漫清解苦寒。究竟斬伐生陽。議甘溫胃受培植其本。莫危者復振。余非瘡醫。按色脈以推其理耳。加桂理中湯。非瘡科方人詳。

桃核瀉瘍。久不癒。氣血耗盡。中宮營液枯涸。氣不旋轉。得湯飲則疫涎上湧。勢如噎膈。况久恙若是。藥餌難挽。勉擬

方。人參。炒參。代赭石。

化橘紅。

砂參。冬

人參。方。不咸。

人參。炒參。代赭石。

化橘紅。

胡納食主胃。運化主脾。臟瘍痛潰。卧床不得舒展。臟腑氣機呆鈍。何疑。外科守定成方。芪術歸地。不能補托氣血。

反雍滯於裏。出納之權失。且是症乃水飲溼氣下垂而致結於足厥陰辛陽明之界。若溼熱不為盡驅。藉補托

以冀生機。養貳害焉。能濟事。

金石斛錢五

槐米錢半

金銀花錢三

茯苓錢半

晚蠶沙錢一

寒水石錢二

二

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

徐營傷心脉。熱食無味。此傷痛大虛。當調其中。人參。歸身。炒白芍。木瓜。熟朮。廣皮。茯神。炙草。

某膿血去多。痛猶未息。胃傷不嗜。故口無味。左關尺細弱無力。正虛之著。據理進藥。仍宜補托。

人參

熟地 玉竹

柏子仁

歸身

丹參

茯神

棗仁

遠志

某

人參

熟地

玉竹

柏子仁

歸身

丹參

茯神

棗仁

遠志

瘡漏

某

人參

熟地

柏子仁

歸身

丹參

茯神

棗仁

遠志

肝癰

曹

因瘍漏過進寒涼藥引發

逐議兩和方法

人參

熟地

柏子仁

歸身

丹參

茯神

棗仁

遠志

瘡漏

顧

潰瘍不合

成漏脂液

人參

同前

炒烏梅肉

炒黑川椒

枝苓

生淡蜜

炒質皮

白芍

炒菟絲子

白芍

炒菟絲子

白芍

炒菟絲子

白芍

瘡漏

王

久損漏傷胃減腹痛

誠用戊己湯

人參

同前

炒黑川椒

枝苓

生淡蜜

炒質皮

白芍

炒菟絲子

白芍

炒菟絲子

白芍

炒菟絲子

白芍

瘡漏

某

壯熱旬日周身筋脈牽掣

少腹堅硬小便淋漓忽冷忽熱欲暖臘血刀

腸癰為病做孫真人牡丹皮大黃湯主之

戴九痔瘡下血溼熱居多今色袁微顯是虛寒無速效法則當補脾胃因痔瘡猶痛腫勢尚存佐以淡滲通腑

生於木

生菟絲粉

生桑芽

生象牙木

生白朮

中和處處
此正因非
無把柄耳

專家則非
脉數者不
宜用桂枝
連中陽為
脈近而設
景有明設

帶脉

急血

後期

喘肺

氣虛

肝犯

胃

肝脾

鬱傷

張九經

調經

生。迨至胃氣一敗。則變症蜂起矣。又有指稱以毒攻毒秘方。類取毒藥金就丹丸。隨症亂投。希冀取效於目前。不顧贻禍於後日。及問其經絡部位。症之順逆。概屬茫然。此殆下工之不如也。至於外治之法。陽科尤當究心。若其人好學深思。博聞廣記。隨在留心。一有所聞。即筆之於書。更能廣博醫籍。搜採古法。海上實有單方家傳。宣無神祕。其所製敷貼丹膏。俱臨症歷試。百治百驗。能隨手應效者。即上工遇之。亦當為之遜一籌矣。華玉堂

凡治病必有專家。一切丸散外治等法。一有不備。即不能建愈。理雖同而法各別。如政治外症。不可不分有一番功夫也。

二經先期色變。脅脇刺痛無定所。晨泄不爽利。從來不生育。由情懷少歡悅。多愁悶。鬱則周行之氣血不通。而脈絡間亦致間歇蒙痹。例以通劑。川芎當歸肉桂。桂則有火。味不宜生。艾小茴有香附此。味不必用。茯苓生香附。並有單方。家傳。宣無神祕。其所製敷貼丹膏。俱臨症歷試。百治百驗。能隨手應效者。即上工遇之。亦當為之遜一籌矣。華玉堂

張九經

調經

三久。久嗽。久背寒。農汗。右卧咳甚。經事日遲。脈和數而虛。設減不飲食。此情志鬱傷。延成損怯。此症難治。非清寒肺藥所宜。

黃芪桂枝白芍

火草南棗

鈎糖

桃二久

桂枝

白芍

火草

南棗

鈎糖

秦二氣衝心痛嘔涎

桂枝

白芍

火草

又諸恙未減。腹但痛不墜。逍遙散白朮甘草加鬱金香附神龜。

許十八經明寒熱便溏腹痛。加味道逍遙散去山梔。

某血虛內熱。壅不至。加味道逍遙散去木。

某經遲腹痛。風疹絡血不算。久鬱成熱。法當通利。涼膈去芒硝。加丹皮亦可。

猿九奇脈下損挫。逕腹痛。先用當歸建中湯續商八脈治法。

歸建中湯

又久嗽過勞寒熱。歸芪建中去蜜。

謝三十能食不運。瘕泄。經事愆期。少腹中乾涸而痛。下焦麻痺。衝心嘔逆。腹鳴心辣。八脉奇經交病。

人參。茯苓。艾葉。製香附。淡從客。淡骨脂。

王一脈右緩左濶。經水色淡。後期嘔吐痰水。食物畢咽三載餘不孕。此久鬱凝痰滯。氣務宜宣通。從陽明厥陰立法。

人參。河車膠。熟地砂仁製。歸身。

半夏。廣皮。茯苓。厚朴。茅丸。淡吳萸。小香附。山楂肉。薑汁法丸。

又二月中用辛溫宣散方。瘦於自下。胸次寬。嘔逆緩。今喜暖食惡寒。經遲至五十餘日。來必色淡且少。議用溫食。

衛仕栽培生氣方法。八珍去花草地加小茴。肉桂。斬父。香附。紫石英。河車膠丸。

朱六經水一月兩至。或幾月不和。五年來不孕。育下焦肢體常冷。

是衛仕脈損無有貯蓄。益腎肝土之。

程三十三年不孕育。其中幻病非一。病人述經期遲至來期預先三日。周身筋骨脈絡。掣疾楚。不得舒。展凡女人。

月水諸絡之血。必彙集血海而下。血海者。即衝脈也。男子藏精。女子繫胞。不平經不調。衝脈病也。腹為陰。陰虛生

熱。肢背為陽。陽虛生寒。究竟全是由後不復之虛損。感見病治病之誤。有終身不孕淹淹之累。肝血陰虛木火內。

寄古人溫養下焦。必左涼肝堅陰。勿執經後期為氣滯。投破氣剛藥劫陰。

朱經云。陽維為病。苦寒熱。上年水雪甚少。冬失其藏。春半潮溼。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。入

脉。緣乎肝腎一身綱維。不必云八脈。八脈之末固之。司陰弱內熱。陽微外寒矣。脊背常痛。經事愆期。血海漸涸久。

用血藥。尚當服。河車膠。生地。枸杞。沙苑。生杜仲。白薇。山楂。黃柏。白花益母草。

此舉理明。謂造

肝虛
奇脈

朱經云。陽維為病。苦寒熱。上年水雪甚少。冬失其藏。春半潮溼。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。入

脉。緣乎肝腎一身綱維。不必云八脈。八脈之末固之。司陰弱內熱。陽微外寒矣。脊背常痛。經事愆期。血海漸涸久。

此舉理明。謂造

朱經云。陽維為病。苦寒熱。上年水雪甚少。冬失其藏。春半潮溼。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。入

脉。緣乎肝腎一身綱維。不必云八脈。八脈之末固之。司陰弱內熱。陽微外寒矣。脊背常痛。經事愆期。血海漸涸久。

此舉理明。謂造

朱經云。陽維為病。苦寒熱。上年水雪甚少。冬失其藏。春半潮溼。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。入

脉。緣乎肝腎一身綱維。不必云八脈。八脈之末固之。司陰弱內熱。陽微外寒矣。脊背常痛。經事愆期。血海漸涸久。

此舉理明。謂造

牛膝

茯苓

紅棗新火湯法丸

氣分

朱

脈數右肩痛。瘡經不調。經來氣攻觸。皆性躁氣分有熱。

細子芩

白芍

黑山梔

鉤藤

茯苓

當歸鬚

香附

茺蔚子

桑枝

朱酸濁入裏。氣血呆鈍。痛自心胸。脹及少腹。昔經行三日。今四日猶未已。為凝濁所致。痛脹何疑。請內經遺意。以平勝酸主治。但辛氣最易入表。當求其宣絡者宜之。

韭白汁

桃仁

延胡

小茴

當歸鬚

川棟子

丹皮

橘葉

老薑白汁

食酸

津滯

經閉

木火鬱熱

王八

苦辛泄降。

胸脅脹悶已舒。

此散血皆肝膽氣火上逆。

必經來可安。

南山楂

桃仁

黑山梔

降香末

朱當節令呵欠煩倦。

秋深進食微有惡心。

起至今月事不來。

夫衝任血海皆屬陽明主司。

見症胃弱此陰柔臟

滯當停以理胃陽為務。

人參

半夏麵

廣皮白

川斛

老薑白汁

朱某

某三經閉兩月。

脘痺嘔惡。

此氣窒不宣。

胃陽凝鈍使然。

當用和中為主。

半夏麵

老蘇梗

茯苓

廣皮

川斛

朱某

某夏令寒熱經阻少腹痛脹。

血結洞瀉不爽。

乃內傷氣血不和。

兼有時令濕邪。

朱某

某脈數經閉腹脹足腫。

此為水病。

名為血分。

朱某

某脈數經閉腹脹足腫。

此為水病。

名為血分。

朱某

某脈數經閉腹脹足腫。

此為水病。

名為血分。

朱某

某脈數形疲咳經閉半年。

已經食減便溏浮腫無消通經之理。

扶持中土望其加緩。

朱某

某脈數經停四月。

腹滿尻髀足肢盡腫食納脹悶不化大便溏濁不實。

女科認為胎氣恐未必然。

方書謂先經斷而後

經停四月。

腹滿尻髀足肢盡腫食納脹悶不化大便溏濁不實。

陰虛者，其人瘦弱，口渴，心煩，夜寐不寧，舌紅無苔，脈細數。此屬陰虛火旺之症。

補氣而病日加，增服入冬無所。法可應機，因生月每次服半丸，冀通其經，脾氣血漫言治病。

徐二經水久不來寒熱喉痛痺等症難取效清阿膠丸雞子湯送

董脈數色奪久收經閉寒從背起熱過無汗此非瘧邪由乎陰陽並損營衛循行失

熟矣正屬血庫成等為難治脾阻氣分務宜宣通生鹿角川桂枝木當歸桑枝各四錢草薢二服○禁用己虧

中二先因土且鑿以五木頭乾亥土延未艮威微區面重多卒乃汗陽七風定數不見危勞丙營台興

四
附

王西色映白牋來

嗽見熱多投清肺寒涼生氣藥

尼少^十年形色衰瘦。側眼咳血。天柱骨垂。經水已閉。皆不治見姙。

其一承吳共之。委以平日人所不及。或以爲局中頗無內眞。或勞大老。或喜青丸台。或古風重口。或更于加發舉。行酒

集朋徒不為善，則口升以誣其友。三惡氣才，才而不知，不知而不知，其口誣善，不為善者，

可調攝

程九乾血勞病百脈枯槁漸不

益母丸早晚服一三錢

某管虛寒。熱咳血經閉。

夏三月熟糉。派宋立教。嘗

顧一淳熟於用兵，其將軍也。初，美索不達米亞有兵，其將軍也。初，美索不達米亞有兵，其將軍也。

桂枝 分三
白芍 半
阿胶 羊
生地 錢
吳草 分
麥冬 半
大棗 仁半
人參 一錢半
甘草 一錢半

朱文冲年天登未至表

雄烏骨雞
生地

諸藥全可擗。用冰煎十二次。其烏雞去毛及翅足。另以童便一碗。青蒿汁四碗。

加入前藥汁收膏入阿膠收燉服五錢

與男子同
治經帶之
疾

婦人之疾
陰經帶之
全屬衝任治衝任
養血全古無立方無藥
不以益氣者業未得變化蓋中大段亦能說先
養血為主而未能說先傳授也

張

十七歲天癸不至。咳嗽失血乃倒經重症。先以順氣導血。

鬱金

鉤藤

丹皮

蘇子

炒山楂

黑山梔

炒牛膝

生白芍

天冬

鮮生地

炒山楂

又
震動氣衝咳鳴失血

雞子黃

阿膠

鮮生地

天冬

白芍

丹參

調入琥珀末三分

脈細數腹痛營熱經不通。人參 天冬 鮮生地 白芍 丹參 調入琥珀末三分。
易曰乾道成男坤道成女。女子屬陰以血為主。故女科治法首重調經。經常也。如潮汐之有信。如月之盈虧。不愆其期。故曰經水。又曰月事。又曰月信。內經云太衝脈盛。月事以時下。景岳云。衝為五臟六腑之海。臟腑之血皆歸衝脈。可見衝脈為月經之本也。然血氣之化由於水穀。水穀盛則血氣亦盛。水穀衰則血氣亦衰。是水穀之海。又在陽明。可見衝脈之血。又總由陽明水穀所化。而陽明胃氣又為衝脈之本也。故月經之本所重在衝脈。所重在胃氣。所重在心脾。生化之源耳。心主血。脾統血。肝藏血。凡傷心傷脾傷肝者。均能為經脈之病。內經曰二陽之病。發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。其傳為息。貢者死不治。不得隱曲。言情欲不遂而病發心脾也。風消者。發熱消瘦。胃主飢肉也。息貢者。喘息上奔。胃氣上逆也。此雖言病。發心脾而實重在胃氣。因心為胃之母。胃為脾之腑也。內經又曰。有病胸脇支滿者。妨於食病。至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四肢清目眩。時時前後病。名血枯。此得之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來也。治之以四烏鰲骨一釐。茹二物。并合之丸。以雀卵大如小豆。以五丸為後飯。飲以鮑魚汁。利腸中及傷肝也。此段經文全重在氣竭肝傷四字。為通節之綱旨。胸脇肝部也。支滿肝病也。妨於食木邪凌土也。病則先聞腥臊臭。脾喜芳香。令脾土為木邪凌虐。病則先聞腥臊。乃肝之旺氣也。出清液。脾虛不能數化水精也。先唾血。脾傷不能統運營血也。四肢清陽衰不能傍達四末也。目眩陽不充。而水上溢於經也。前後血陰受傷。而血內溢於絡也。血補助陽。能調子臟精血。以五丸為後飯者。先藥後飯。使藥徐行下焦。力貴專功。五丸不為少也。飲以鮑魚汁利腸。和肝傷取其真機之味。佐烏鰲骨而辟宿積之血也。金匱要略言。調經之法甚詳。後世如黃節齋薛立齋。

諸賢論症透徹用方精切俱可為程式茲不具贅今觀葉先生案奇經八脈固屬扼要其次最重調肝因女子以肝為先天陰性凝結易於拂鬱則氣帶血亦滯木病必妨土故次重脾胃餘則血虛者養之血熱者涼之血瘀者通之氣滞者疏之氣弱者補之其不治之症直言以告之誠一代之良工女科之明鑑學者當奉為典型更能參考內經仲景及諸賢案語自然學業日進登峯造極矣秦天一

溫邪
傷陰

淋帶

溫邪劫陰帶下火升胸膈小數生地阿膠牡蠣川斛小麥茯苓

某

陽明脈虛手麻足冷身動帶下如注用通攝方人參桂枝木桑螵蛸生杜仲歸身茯苓

又

胸中似冷熱飲乃爽照前方法去杜仲加白芍炮薑

陳七

色蒼脈數是陰不足心中泛濫即頭暉腹痛經水仍來兼有帶下肝陽內擾風木乘土法當酸以和陽鹹苦堅

陰

生白芍

細生地清阿膠牡蠣

桔梗皮

黃柏

川斷

湖蓮

蔣

烏骨雞生地阿膠牡蠣天冬白芍白薇杜仲

桂枝生沙苑遠志當歸鹿角霜杞子

伏苓

此方不切病

桂枝

帶淋日久脂液垂涸奇脈俱傷營衛亦偏內風自動則中焦氣全浮腫腹脹為寒為熱矣暫以鹹緩和陰

蔣

阿膠牡蠣從容柏子霜都李仁

桂枝

桔梗皮

黃柏

川斷

湖蓮

袁

古光亦頭脹身熱帶下如注此五液走泄陽浮熟蒸當用攝劑若與鹿角霜沙苑仍是升舉動陽則無效矣

熟地炭

阿膠芡實茯苓

桂枝

桔梗皮

黃柏

川斷

湖蓮

吳

崩帶淋漓陰從下走量殷汗出陽從上冒逢殺雨暴雨山身中陰陽不相接續怕延虛脫成寒時為劇肝腎病治

人參

阿膠生龍骨五味茯神生牡蠣

桂枝

桔梗皮

黃柏

川斷

湖蓮

又

熙前方去阿膠山藥加桑螵蛸萸肉炭

阿膠

生龍骨五味茯神生牡蠣

桂枝

桔梗皮

黃柏

川斷

湖蓮

又

血液去則臟陰失守神不內附致目中妄見非鬼祟也當先鎮陽神為主若驟用陰藥則有妨胃納矣

吳

崩帶淋漓陰從下走量殷汗出陽從上冒逢殺雨暴雨山身中陰陽不相接續怕延虛脫成寒時為劇肝腎病治

人參

阿膠生龍骨五味茯神生牡蠣

桂枝

桔梗皮

黃柏

川斷

湖蓮

又

血液去則臟陰失守神不內附致目中妄見非鬼祟也當先鎮陽神為主若驟用陰藥則有妨胃納矣

龍骨

五味

茯苓

芡實

建蓮肉

當用心經藥

虛奇脈

人參

龍骨

五味

茯苓

芡實

建蓮肉

又 淋帶黃白未淨。更心慄汗出。

人參

炒枸杞

五味

茯苓

芡實

湖蓮肉

某二脉左經。前用通補據述痛起。得按痛緩入脉空虛昭然。捨此補養。恐反增劇矣。

當歸

烏賊骨

紫石英

杜仲

杞子

柏子仁

沙苑

茯神

某女科病多倍於男子。而胎產調經為主要。淋帶瘕泄。奇脈虛空。腰背脊脅牽掣。似墜而熱。氣反升於上。從左而起。女人以肝為先天也。醫人不曉八脈之理。但指其虛。剛如桂附。柔如地味。皆非奇經治法。先以震靈丹固之。每服一錢五分。

又 淋帶瘕泄。諸液耗必陰傷。此參附薑桂劫陰不效。而脾地陰柔亦不能效。蓋脈隧氣散不攝。陰藥沉降。徒擾其滑耳。必引之收之。固之震靈丹意通則達下。濡則固下。惟其不受偏寒偏熱。是法效靈矣。後方常用。

人參

鹿角霜

桑螵蛸

炒杞子

茯神

火草

分

五

九

人參

炒黑小茴

炒黑遠志

晚服炒香

二錢

五

方

陰陽並虛

某

枸杞子炒黑 鹿角霜 歸身 菓絲子炒香 生杜仲 炒菟子 茯苓 補骨脂鹽水煎淡
少腹拘急 大便燥硬 淋帶赤白此屬液涸

人參 中焦之氣歸身 炒杞子 河車 當歸 柏子仁 都李仁 補骨脂鹽水煎淡
肉蓯蓉

又 淋帶年久少腹拘急脹痛溲不爽大便艱澑得泄氣則脹寬食物少納脫中不降必撫摩始下此病久臟陰弱

陽皆傷熱藥難受以通陽固陰兼之

服早人參此病宜通中焦之氣歸身 炒杞子 茯苓 梅草 河車 蔥服震靈丹二十粒

帶下者由濕痰流注於帶脈而下濁液故曰帶下婦女多有之亦者屬熱兼實兼火治之白者屬濕兼虛兼痰治之年久不止補脾腎兼升提大抵寒人多火肥人多痰最要分辨白帶白濁白淫三種三者相似而迥然各別白帶者時常流出清冷稠粘此下元虛損也白濁者濁隨小便而來渾濁如泔此胃中濁氣滲入膀胱也白淫者常在小便之後而來亦不多此男精不攝滑而自出也至於淋症由腎虛膀胱積熱所致腎虛則小便數膀胱熱則小便澑淋有氣血砂膏勞五者之殊皆屬濕熱氣淋為病小便澑滯常有餘瀝不盡血淋為病過熱即發甚則溺血痛者為血淋不痛者為尿血砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止是也膏淋為病溺濁如膏敗精結者為砂精結散者為膏又煮海為鹽之義勞淋遇勞即發痛引氣衝大約帶病為女子有之淋濁男女俱有景岳云婦人淋帶其因有六一心旌搖心火不靜而帶下者先當清火而殊砂安神九清心連子飲之類若無邪火但心虛帶下宜秘元煎人參丸茯苓丸之類一愁事過度滑泄不固而帶下者宜秘元煎苓朮菟絲丸濟生固精丸之類一人事不暢精道通而為濁為帶者初且威喜丸久宜固陰煎之類一濕熱下流而為濁帶脈必滑數煩渴多熱宜保陰煎加味逍遙散若熱甚兼淋而亦者宜龍膽瀉肝湯一元氣虛而帶下者宜壽脾煎七福飲十全大補湯若陽氣虛寒脈微澑腹痛多寒宜加薑附家韭子丸一脾腎氣虛下陷多帶者宜歸脾湯補中益氣湯之類以上淋帶辨症論治彷彿已備語云然恐繡出從君看莫把金針度與人若求金針暗度全憑葉案搜尋

鬱損

徐三肝脾鬱損血崩

人參逍遙散去柴胡芍藥加桑螵蛸杜仲

當用血藥

赤石脂 餘糧石

某經漏不止久風飧泄

味變清

人參

旋苓 木瓜

炒烏梅

柏子仁

火草

青蒿根

淡黃芩

澤蘭

樗根皮

接服斑龍丸

龜脈數寒熱汗出腹脇痛病起經漏崩漏之後

大創其法
不一學者也

白芍

淮小麥

災草

南棗

旋神

炒沙苑

炒杞子

炒歸身

桂心

知母

蜜丸

肝脾虛

胃虛

營虛

陰虛

燥熱

奇虛

滯

血海空虛

崩漏之疾

宜用填補

大劑其法

當歸

白芍

知母

蜜丸

衝任

胃虛

筋痛

輕藥不能治重病

柏子仁

細生地

生黃芪

火草

青蒿根

淡黃芩

澤蘭

樗根皮

接服斑龍丸

接服烏賊魚骨丸

桂心

來

崩漏兩年先有帶下

始而半月發病今夏季每交申酉

其漏必至

思下午為陽中之陰

陰虛陽動

衝脈任脈皆

動下無限防約束

天奇經肝腎主司為多

而衝脈隸於陽明

陽明久虛脈不固攝

有開無合矣

醫但以濁劑固

夕苟安未及按經論病宜毫無一效

海螵蛸

鮑魚

茜草

生菟絲子

石殼廣蓮肉

接服烏賊魚骨丸

紫英石

羊肉腎

青鹽

筋痛

顧

身體虛崩淋不

止筋掣痛

不能行

從容

枸杞

柏子仁

旋神

川斛

接服烏賊魚骨丸

桂心

炮薑

紫英石

桂心

衝任二脈損傷

經漏經年不痊

形瘦膚乾冷

由陰氣走乎陽位

益氣以培生陽

溫攝以固下真

人參

鹿角霜

歸身

新艾炭

茯神

炮薑

紫英石

桂心

知母

蜜丸

陰虛

衛任

陽虛

筋痛

崩漏

久崩宜溫

久崩宜清

以血去陰耳

張

固補

衝任涼肝寧血丸

人參

生地

阿膠

白芍

旋苓

鹿角霜

歸身

新艾炭

茯神

炮薑

桂心

蜜丸

張

四經漏十二年

五液皆涸

衝任不用

冬令稍安

夏季病加

心搖動

腹中熱腰膝跗骨皆熱

此皆枯槁日著

方謂暴

崩漏如少可加熟山藥搗漿為丸

早服四錢

參湯送晚服二錢

兩

二

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩

沈天癸當止之年。經來淋漓不斷。乃陰衰陽動。入秋深夜寐甚少。汗泄四肢胸臆。大衝脈隸於陽明。其氣行乎身前。陽明脈空。陽越衛疎。陰火升舉。富宗丹溪補陰丸或虎潛丸之屬。久病投湯太過。恐妨胃耳。每早服丹溪補

陰丸四錢。十服。

黃長齋有平脾胃久虛。瘧由四末必犯中宮。血海隸於陽明。苦味辛散。皆傷胃氣。雖天癸久絕。病邪藥味擾動血絡。是為暴崩欲脫。閱醫童便阿膠味鹹潤滑。大便溏濕。宜且潤下。即熟地五味補飲。陰液咽湯停院。嘔吐淨澈。膩酸濁之藥下焦。未得其益。院中先已受戕。議以仲景理中湯。血脫有益氣之法。不切坤土。陽和旋轉。喜其中流。砥柱倘得知味。納穀是為轉機。重症之尤勿得忽視理中湯。

某停經三月。下漏成塊。小腹膨痛。議通和奇脈。

鹿角霜

生杜仲

桂枝木

生沙苑

當歸

茯苓

紅棗

文

羅二病屬下焦。肝腎內損。延及衝任。奇脈遂至經漏。淋漓。腰脊痠痛。脈絡交空。有終身不得孕育之事。

製熟地

砂仁製

河車膠

當歸

白芍

人參

茯苓

於术

火草

蕲艾炭

香附

小茴

紫英石

陳十五旬。歲經漏如崩懶。以白帶綿。昔形充今瘦損。當年飲酒濕勝。大便久滯。自病經年。病乾不爽。夜熱多汗。

四肢資冷。氣短腹鳴。上噫氣下泄。氣脛足跗酸楚無力。食物日減。不知其味。此陽明脈衰。厥陰風木。由乎血去液

傷。衝任交擾。內風旋轉。而為風消之變。病在手太陰。故令人延金匱。謂絡熱則癰矣。無此

相處不人參

黃氏

扶神

牡蠣

小麥

瀝清人參湯收

張外冷。內熱食過。如飢脅燥裂渴飲。下漏。漏多則陰虛陽亢。便溏不實。不可寒潤。

生地炭

阿膠

炒白芍

湖蓮

樗根皮

小麥

新父炭

胡心痛如飢。口吐膩涎。渴寐。值經來甚多。因驚動肝陽化內風。欲散之。蒙治以鹹苦。佐以微辛。使陰人和陽。

阿膠

桂枝

生雞子黃

生地

大冬

生白芍

茯神

新父炭

陰虛

桂枝

川棟子殼

小川連翹

川芎

當歸

入而進柔潤清補。頗投詢知病由於悲哀煩勞。調理向愈。繼因日病服苦辛寒散太過。遂經漏淋帶。年前七八日始淨。今則兩旬而止。此奇脈內之。前議非訛。據述周身裏現癰瘍暗癰。搔癢不甯。想脂液久滲。陰不內營。陽氣浮越。衛少固。客氣外乘。凡六淫客邪。無有不從熱化。內經以瘡痍諸病皆屬於火。然內症為急。正不必以肌腠見病為治。刻下兩三日間。又值經至之期。議進固脈實下。佐以東垣濫陰火意。經至之先用此方。龜甲心真阿膠。人參。桑螵蛸。生白龍骨。旱蓮草。茯神。知母。早上服。

又當經行。周身寒凜。腰痠腹脹。並當有白疹大發。議用固氣和血方。

非

參

熟地

阿膠

川芎

當歸

白芍

南山楂

斬艾

早上服

又經來腹墜腰痠。發現肌痿有風。鼻孔且竅。背微想陰血下注。必陽氣鼓動。內風沸起。風非外來。乃陽之化氣耳。昨

因經至。用脾父四物湯和補固經。今午診脈右大而澀。左小數中。有堅疾如丸之象。潤乎液枯風動。初定烏鵲丸。當進切其早上湯藥。凡氣味之辛烈去雖為補劑。勿取動陽耗液也。早上服。

人參 生地 天冬 阿膠 生白芍 文貞子 旱蓮膏 地榆 早上服

又兩日早進清補柔劑。夕用通固下焦衝任。是月經來甚少。起居頗安。與先哲云。暴崩當溫瀆。亦非久漏宜宣通。若合符節矣。連次候脈必小弱為少安。則知陽動不息。內風必旋。於丸半守歸父。半溫守則氣泄。半則陽動。皆不知變化之旨。坐失機宜耳。余未能久候。馬有經年經月之病。驟期速愈。故丸藥創自內經。七方之一世多渺忽。實出軒岐秘奧。再識理陰熄風。早用諒不致悞。擬長夏調理二法。

晚服烏鵲丸三錢。晨進養肝陰和陽熄風以安胃。蓋衝脉即血海。隸於陽明胃脉。乃做經首立法方。

人參 阿膠 白芍 生地 旱蓮膏 文貞子 桑寄生 鹽秋石 細子芩 三角胡麻

又此番經後帶下仍有久漏。奇脈少固。前案由說已著。丸劑當司通攝衝任。恪守定然必效。但外來寒暄易禦。內因勞嘔難調。余諱諱相告者為此。

人參 生地 阿膠 白芍 祛神 女貞子 旱蓮草 小黑櫻豆皮 早上服

初十日

又

日晚煩冗。陽動氣升。頭額震痛。經再下注。更定鎮攝。一法久後亦可備用。

人參

生地

阿膠

生牡蠣

天冬

黑殼建蓮

龜甲心

又

人參

生地

阿膠

生牡蠣

天冬

黑殼建蓮

龜甲心

虛停經半載。雨水節後。忽然暴崩。交春分節血止。黃白淋漓。自下寒則周身拘束。熱時煩燥。口乾。肺至天明。汗出乃止。寐必身麻。如蟲行。四肢骨節皆痛。蓋血既大去。衝任之脉傷損。而為寒為熱。陰損及乎陽位。參書云。崩中日久。為白帶漏下。多時骨髓枯。由脂液蕩盡。致形骸枯槁。延為廢疾矣。天熱氣煥。所當謹慎。

烏鵲骨

阿膠

生地

生白芍

茜草

小參

陽虛

程

暴冷陽微。後崩

附子理中湯

崩。如山冢草崩。言其血之橫决莫制也。漏如漏卮。難塞。言其血之漫無關防也。經云。陰在內。陽之守也。氣得之以和。神得之以安。毛髮得之以潤。經絡得之以行。身形之中。不可斯須離也。去血過多。則諸病叢生矣。原其致病之由。有因衝任不能攝血者。有因肝不藏血者。有因脾不統血者。有因熱在下焦。迫血妄行者。有因元氣大虛。不能收斂其血者。又有瘀血內阻。新血不能歸經而下者。醫者依此類推。倣葉氏用筆靈活。於崩漏治法無餘蘊矣。秦天一

崩漏必用補血大劑而兼黑色之藥。大概輕劑不能中病。

胎前

惡阻

秦氏

方

某

細子芩

蘇梗

砂仁

白芍

熟白朮

當歸

青蘭湯法丸

生白芍

生薑

肝氣

細條芩

生白芍

川棟子

瓜萎皮

半夏麪

橘紅

竹茹

生薑

滑胎

程氏

六二

殞胎

三月

是肝虛

殞胎多在育養血熱也

熱傷

錢三上。年夏產過月經轉。今經停四個月。左脉弦滑流動。乃為妊娠。此氣急胎痞。咳嗽。熱氣上乘。迫肺之微形肉日。

瘦。熱能燼陰耗氣。議清金平氣勿碍於下。

熟傷
桑葉 川貝 桔梗 廣皮 黑山梔 地骨皮 茯苓 甘草 川芎 白芍 川芎 桑寄生

桑葉

川貝

桔梗

廣皮

黑山梔

地骨皮 茯苓 甘草

楊 血液僅僅養胎。春陽升舉。上焦易燥。喉嚨心嘈。皆液虧陽亢。

鮮生地

茯神

白扁豆

元參心

川斛

胃虛
咳逆

謝。始而熱入陰傷。少腹痛。溺不爽。秋暑再傷。霍亂繼起。今不飢不食。全屬胃病。况懷妊五月。胎氣正吸脾胃真氣。

津液重傷。致令咳逆。

人參 知母

炒麥冬

木瓜

蓮子肉

茯神

此病宜清胃氣

熱邪
傷陰

金 懷妊五月得熱病。久傷陰液。身中陽氣有升無降。耳竅失聰。便難眠。渴。議用仲景復脈法。以生津液。

炎甘草 人參

生地炭

阿膠

天冬

麥冬 生白芍

麻仁

某

懷妊百日。丙丁養胎。胎熱從亥時升。耳前亦痛。刺痛。當養陰制火。

科方 不是女

細生地

茯神

生白芍

建蓮

桑葉

某 脍右虛左弦。身麻肢冷。胎冲脹悶。五六月當脾胃司胎。厥陰內風暗動。不飢吞酸。全屬中虛。

人參

枳殼

半夏

桔梗

胸篋

白茯苓

胡

懷妊六月。陽明司胎。門動絡脈環跳痛。連腰督最防胎氣。

歸身

桂枝木

炒杞子

火草

羊脛骨 不入藥

白茯苓

氣逆壅熱

於上。齦腫喉痺。胸悶腹脹。七月太陰司胎。法宜宣化清上。

川貝

牛蒡子

連翹

蘇梗

杏仁

花粉

菊花

橘紅

橘紅

汪

娠八月。胎動不安。脘悶不飢。宜涼血調氣。可以安適。

黃芩 知母

橘紅

當歸

砂仁

肝風

熱型

上焦氣滯。熱動絡脉。胎動不安。脘悶不飢。宜涼血調氣。可以安適。

妊娠八月。形寒氣逆。神煩倦無寐。刀肝陽乘中之徵。擬進熄風和陽法。

砂仁

句句名言
得此真說
然有時竟
與之相反
不知何故

肺陰
熱傷

又

黃芩

當歸

生白芍

生杜鵑

橘紅

茯神

黑穧豆皮

白芍

女貞子

茯神

黑穧豆皮

王先寒後熱。咳嗆是春月風溫肺病。風為陽邪。溫漸變熱。客氣著人。即日時氣懷妊。九月足少陰腎脈養胎。養胎上受熱氣。肺痺喘急。消渴。胸滿。便溺不爽。皆肺與大腸為表裏之經。症狀若繪矣。乞歸半溫參丸。守補肉桂沉香。卒熱皆胎前心用致大熱煩悶。勢屬危殆。議以清肺之急。潤肺之燥。保胎得涼則安。去病身安自為不補之補。古

人先治其實者邪也。

泡淡黃芩

知母

鮮生地

花粉

阿膠

天冬

又喘熱減半。四肢微冷。腹中不和。胎氣有上冲之慮。昨進清潤之方。熱熱有汗。可見半燥耗血。便是助熱令煩渴既止。問初病由。悲憤驚恐之傷。養肝陰滋腎液為治。穩保胎元。病體可調。

復脈去桂。麻薑棗加天冬。知母子芩。

朱脉右濇小數。左弦促納食脘脹。常有甘酸濁味。微嘔吐清涎。旬朝始一更衣。仍不通。詢知病起情懷抑鬱。由氣化熱。如內經五志過極。皆從火化。熟懷妊惡阻。按徐之才逐月安養。亦在足少陽經。正取清鬱熟養胎。況肝膽相火內寄。非涼劑無以和平。古人治病。以偏救偏。勿畏虛以胎患。

金石斛

黑山梔

茯苓

半夏

橘紅

竹茹

枳實

時邪

某

惡阻本欲

心厭食

今夾時邪

頭痛耳熱

當先清熱

竹葉

連翹

生甘草

黃芩

花粉

蘇梗

吐瀉

周

病中懷妊

泄瀉

焦尤

炒白芍

炒黃芩

炒黃芩

炒廣皮

附子

人參

於尤

茯苓

白芍

陽熱

火炎

寒邪

泄瀉

營虛

某

懷妊若患時症。古人重在保胎。今者喜燥惡寒。人之壞論也。計則厥痛。墜微便痛。遠腹暖胎。須避絆傷。以及奇脉。方不切病。非方也。

鹿角霜

淡旋谷

炒杞子

柏子仁

當歸

炒沙苑

炒大茴

茯苓

上吐下瀉

宣宜溫補

況胎前火

平日持論

大相背矣

固護胎元

諸症俱減。惟心嘈覺甚。陰火上升。營虛之徵。

必有邪氣

宣宜溫補

況胎前火

平日持論

大相背矣

固護胎元

諸症俱減。惟心嘈覺甚。陰火上升。營虛之徵。

矣。又有句句名言。得此真說。然有時竟與之相反。不知何故。

矣。

胎前

上海文益書局印

人參 桑寄生 熟地者 宜生 阿膠 緜灰 煎藥 條芩 白芍 當歸 茯苓 香附
某 懷孕廁帶半月。胃陰既虧。陽氣上逆。咽中阻。飲水欲嚥。舌尖紅赤。津液已耗。燥補燥劫。恐陰愈傷。而胎元不保。
議益胃和陽。生津治之。熟地 烏梅 白芍 山藥 建蓮 茯苓 用川石斛煎湯代水。

桂硝黃等劑。必加四物。是治病保胎第一要法。
方不切病又無治瘉之藥 小生地 無治瘉之藥 白芍 阿膠 無治瘉之藥 知母 黃芩 青蒿根
潘 血夜襲胎。尚且不固。心中如飢空洞。食不能納。况又戰慄嘔逆。凡內外搖動。都是動胎。從來有胎而病外感。麻

桂硝黃等劑。必加四物。是治病保胎第一要法。
方不切病又無治瘉之藥 小生地 無治瘉之藥 白芍 阿膠 無治瘉之藥 知母 黃芩 青蒿根
王 又 臨卦下病。膿血色紫。形濃熱伏陰。分議用白頭翁湯阿膠當加

某 苦味見效。知溫熱動血。以小其製為劑可全功矣。黃芩 黃柏 炒銀花 茯苓 澤鴻 炒山楂
某 胎漏鼻衄。發疹而喘。不成方 淡黃芩 真阿膠 青蒿根

又 照前方去熟地。加炮薑熟水 炒白芍 炙草 廣皮 熟地炭 炒砂仁末

人參 熟地 炒歸身 炒白芍 炙草 廣皮 熟地炭 炒砂仁末

某 三月胎漏。固下益氣。人參 熟地 阿膠 白芍 炙草 砂仁 父炭
華 血下。殼胎未下。濁氣擾動。嘔噃。逆腹滿少腹硬。二便窒塞不通。此皆有形有質之阻。若不急為攻治。濁瘀上冒。必致敗壞。倣子和玉燭散意。

程懷妊八月。子腫腹漸墮。正氣虛弱。補劑必須理氣。預為臨產之算。
人參 茯苓 大腹皮 蘇梗 砂仁末

易曰。大哉乾元。萬物資始。此言氣之始也。人得父母之氣。以生氣生

子腫 脣胎 不下 腹滿少腹硬

川芎 當歸 芒硝 必與大黃同用 茅蔚子 大腹皮 青皮 黑豆皮 調回生丹

朱方亦清 無大出入 無非婦科 未到處求之

之 富更博求

說得大遠
此題君之浮談也

此老無匹
有一二高見
惜不全

新產惡露於滯

體虛兼瘀

欽

產後

形即稟此乾坤之氣也。兩儀既兆。五行斯彰。故天一生水。水屬腎。腎臟先生地。一生大火屬心。心又次生天。三生木。木屬肝。肝又次生地。四生金。金屬肺。肺又次生天。五生土。土屬脾。脾又次生天。既以五行生五臟。而仁義禮智信之五德亦即寓於其中。朱夫子所云。天以陰陽五行化生萬物。氣以成形。而理亦賦焉。此之謂也。因此古人文重胎教。無所以端其本也。而今不復講矣。然六淫之感。七情之傷。惟婦童氣有強弱。小兒胎元有靜躁。故安胎之法。不可不詳。如惡阻胎淋胎量胎腫胎懸及漏胎等症。古人言之甚晰。故不具贅。今閱葉先生案。胎前大約以涼血順氣為主。而肝脾胃三經尤為所重。因肝藏血。血以護胎。肝血失榮。胎無以蔭矣。肝主升。肝氣橫逆。胎亦上衝矣。胎氣聚於脾。如寄生之托於包裹。寫與女蘿之施於松柏。脾氣過虛。胎無所附。墮胎難免矣。至於胃為水穀之海。壯婦全賴水穀之精華。以養身護胎。故胃氣如兵家之餉道。不容一刻稍緩也。其餘有邪則去邪。有火則治火。陰虛則清。滋陽虛則溫補。隨機應變。無所執著。學者更能引而伸之。觸類而通之。安胎之法。可一以貫之。無餘謳矣。奉天

初產汗出眩暈胸痞腹痛宜通惡露。

炒山楂

延胡

鬱金

赤芍

炒牛膝

香附

童便冲

益母草湯代水

程又

腹痛少緩但胸痞痰多治從上焦

炒山楂

鬱金

丹參

橘紅

炒川貝

甜花粉

衝脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚故奇脈之結實者

古人必用苦辛和芳香以通脈絡

其虛者必辛甘溫補佐以流行脈絡務在氣血調和病必全愈

今產後體虛兼瘀而痛法當益體攻病日期已多緩治為宜

生地丹皮琥珀末調入

此苦辛偶方如丹皮以通外琥珀以通內所以取效

又回生丹取乎醋煮大黃一味約入病所不礙無痛之所故亦效二法皆入絡藥

又小生地歸黃紅花郁李仁柏子仁茯神又照前方去紅花郁李仁加澤蘭

某二惡露淋漓痛由腰起攻及少腹此督帶空虛奇經氣阻妄疑奇經為病通因一法為古聖賢之定例

醫書

當歸

查肉炭

炒丹皮

澤蘭

川斷

製首烏

唐產後驟脫參附急救。只可是挽陽固氣方法。但損在陰分。其頭面汗出煩渴。乃陽氣上冒。凡聞泄則畏陽。半熱則傷陰。俱非新產鬱胃之治道。嘗讀仲景書。明本草意。為是擬方於後。亦非杜撰也。

生左杜鵑錢

生地錢

上阿膠錢

炒黑豆肉錢

茺蔚子錢

吳新產陰氣下泄。陽氣上冒。日晡至亥。陽明胃裏。厥陰肝橫。肝血無藏。氣衝擾膈。致心下格拒。氣扞脅中。神亂昏譫。若惡寒衝心。則死矣。馬有天明再醒之理。輕者亦能漸復。亦必不碍。回生丹酸苦直達下焦。血分用過不應。諒非瘀脾。想初由汗淋發熱。凡外感風邪。邪帶汗解。此孰昏亂。即仲景之新產鬱胃也。倘失治。必四肢牽掣如驚。似風癇則危。議從亡陽汗出證語。例用救逆法。生龍骨三錢。生牡蠣三錢。桂枝五錢。淮小麥一百錢。火甘草三分。南棗二錢。再當加血藥

又氣從湧泉小腹中直冲胸臆而心下痛。顛暈神迷。此肝腎內怯。無以收納自固。每假寐必魂魄飛越。驚恐畏懼。必非一端。故逆法鎮陽順應。但少補虛。寧神益之固之耳。

^{正當加血藥}人參錢 龍齒三錢 藿仁三錢

茯神錢

炒黑杞子錢

黑殼建蓮五錢

紫石英一兩

橘瓣

又人參錢 人參錢 龍齒三錢 藿仁三錢 茯神錢 桑螵蛸錢

炒黑遠志五錢

用紫石英煎湯煎藥

又昨午憂悲真怒。大便後。陡然頭暉。繼以嘔逆。胸痞止心洞嘈雜。仍不能食。子夜寒戰。鼓慄。寅刻津津微熱。神昏妄見。顛痛乳張。腹鳴短氣。阿欠似乎歎息之聲。此乃下元根蒂未堅。偶觸心機。諸陽神飛旋動舞。仲景論先厥逆知飢不能食。乾嘔列於厥陰篇中。蓋危病初效。未沾水穀精華。則胃土大虛。中無砥柱。俾厥陰風木之威橫衝震盪。一如釋典混沌劫於地水。大風卒來莫禦矣。當此醫藥全以護陽固陰。但血舍耗涸剛猛。及滋膩總在難施之例。無服理病存體為要。

人參錢 熟附子錢 川桂枝木錢 炮薑炭錢

火黑甘草五錢

茯苓三錢

又此產後陰虛瘧疾。鼻燥喉燥舌乾。脫瘖不飢。大便窒塞不通。乃陽明津枯。不上供。肺下少滋。腸風陽游行。面腫耳聾。仲景謂陰氣先絕。陽氣獨發。後人以飲食消息取義。甘寒則知辛溫逐瘀之謂。

達次用
加而為移轉
能用血分
內風及散
能知陰將
絕而不用
血藥也

人參

炒麥冬

棗仁

烏梅肉

蜜水炒黃知母

敗血
經絡為

又

酸味泄肝胃氣乃降。大便通後汗大出。心中刺痛皆營液內耗。陽氣衝突。仲景三病之鬱冒見端矣。雖嘔吐咯。

火草

麥冬

生白芍

火草

無苦燥耗氣之理。人參

阿膠

生地

丹參

浮小麥

黑稽豆皮

火草

吳產後鬱冒。汗出潮熱腹痛。炒生地

炒山楂

丹參

茯神

浮小麥

黑稽豆皮

火草

及變為瘍症。議用文加散。小生地。生薑。車前。牛膝。五靈脂。炒查肉。調入琥珀末一錢。今惡露未清。重鎮酸斂。均為暫忌。議和血調血為穩。

歸鬚

炒桃仁

延胡

炒查肉

官桂

桂枝

香附

桂心

廣皮

火草

又人參

當歸

白芍

炙草

茯神

香附

桂心

廣皮

火草

小茴

程

脈濡。惡露紫黑。痛處緊按稍緩。此屬絡虛。治在衝。以辛甘理陽。

炒歸身

肉桂

當辨其有無火氣

伏苓

小茴

杜仲

火草

桂心

又人參

脈濡空大。營絡虛冷。

人參

炒歸身

伏苓

小茴

杜仲

火草

桂心

又人參

脈濡空大。營絡虛冷。

人參

當歸身

伏苓

小茴

杜仲

火草

桂心

又人參

脈濡空大。營絡虛冷。

人參

當歸身

伏苓

小茴

杜仲

火草

桂心

許

產後陰虛。

肝動灼喉。

乾咳晚則頭暈。

人參

當歸身

伏苓

小茴

杜仲

火草

阿膠

細生地

天冬

小麥

川斛

茯神

宜略加風藥

琥珀末

火草

桂心

又人參

坐蓐過勞。

肝風陽氣動。

面浮氣短。

腹脹。

惡露未清。

不可膩滯。

須防癰厥。

人參

細生地

小生地

丹參

澤蘭

茯神

黑櫟豆皮

琥珀末

火草

桂心

又人參

坐蓐過勞。

肝風陽氣動。

面浮氣短。

腹脹。

惡露未清。

不可膩滯。

須防癰厥。

人參

細生地

阿膠

雞子黃

細生地

生牡蠣

丹參

茯神

黑櫟豆皮

琥珀末

火草

桂心

某

產後下焦陰虧。

奇竢不固。

陽浮升。

風動則飧泄。

嘈雜液損。

必消渴骨熱。

治在肝腎。

靜藥固攝。

湖蓮

火草

五味

芡實

山藥

旱蓮

女貞

陰虛

陽泄

某

新產後陰分大虛

汗出胸痞

潮熱陽浮

衛不固

雖瘦多咳頻

忌用苦辛表散

恐久延暮勞耳

炒生地

炒麥冬

生扁豆

火草

金石斛

丹參

茯神

甘蔗漿

血虛

某

產後身痛少腹滿

查肉

川芎

醋炒

延胡

醋炒

澤蘭

丹皮

艾葉

小茴

香附

醋炒

茯苓

益母膏丸

寒帶

某

產後身痛少腹滿

又

當歸

桂心

茴香

香附

紫石英

茯苓

羊肉膠丸

氣血

寒帶

某

產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

孫

養血之品炒黑查肉

大黑豆皮

大腹皮誠

生香附

茯苓

澤瀉

白花益母草煎湯代水

陰虛

寒帶

某

產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

凌

腹脹氣滯久瀉

產後五日

於虎

厚朴

茯苓

澤瀉

南山查

氣血

寒帶

某

產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

交

一歲四氣之文

夏季發泄為甚

凡夏至一陰初復

未久充盈恰當產期

為陰氣未充先泄

暑熱乘隙內侵

正和

陰虛

寒帶

某

產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

項

腹脹氣滯久瀉

產後五日

於虎

厚朴

茯苓

澤瀉

南山查

陰虛

寒帶

某

產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

項

腹脹氣滯久瀉

產後五日

於虎

厚朴

茯苓

澤瀉

南山查

陰虛

寒帶

某

產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

項

腹脹氣滯久瀉

產後五日

於虎

厚朴

茯苓

澤瀉

南山查

陰虛

寒帶

某

產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

於虎

厚朴

茯苓

澤瀉

南山查

延胡

白花益母草煎湯代水

解不可發汗。脈補

青蒿梗 柴胡之品 淡黃芩

丹皮

鬱金

花粉

川貝

杏仁

橘紅

陽虛
欲脫

又脈緩熱止病減之。蒙但古已未淨大便未通。產後大虛。不敢推瀉。勿進葷膾。恐滯蒸化熱。粥粥養胃。以滋清潤。
燥便通更識補虛。生首烏。麻仁。麥冬。麥水炒知母。

某濁陰上逆。惡心不食。冷汗煩燥。最防暴脫不可。但救惡露滯滿而專瀉氣攻血也。此乃亡陰之東不得誤認亡陽輕用薑附

人參

乾薑

附子

澤瀉

入童便

宣退論及標末

人參

人尿

豬膽汁

製附子

人尿

黑殼建蓮

蘇子

花粉

產後
陰虛
陽浮

某脈無神。倦怠。汗出。刀陽氣走泄。利保陰氣不守。產後見症是屬重虛。深恐節間暴脫。而寒熱胸痞腹痛。
又恐是七

某五產後體加驚恐。陽上督冒為厥。左肢麻木。耳竅失廻。皆陽挾內風。混入清竅。以上實下虛。鎮陽填陰。味厚質靜

之藥。

熟地

龜甲心

天冬

萸肉

五味

磁石

茯苓

黑殼建蓮

阿膠

人尿

猪膽汁

製附子

人尿

黑殼建蓮

衝任

徐

柔陽之藥

熟地

阿膠

炒杞子

茯苓

南花炭

生白芍

柏子仁

小茴

茯神

生左牡蠣

荷包

河車

鹿角霜

虛氣上逆
脹痛

又

衝脈逆則諸脈皆動。天明晴和少安。由陰分虛及陽分可徵。前法包舉大氣溫養。是為絡方。日來春升略

當歸

從容

紫石英

茯苓

河車

鹿角霜

陰虛
風陽

二背寒心熱

在左故養肝是議

天明汗出乃涼。產後兩三月。若此此屬下焦真陰已虧。漸擾陽位。二氣交乘。並非客症。

頭暈耳鳴心悸寒熱後必濱內風震動當與靜樂六月二十日

人參

火草

白芍

麥冬

炒生地

炒烏梅

炒烏梅

又前法酸甘益陰和陽諸病皆減然此恙是產後下焦百脈空乏謂之募損填隙固體為正治緣穀食未加沉膩恐防胃口加餐可用丸藥初三

人參

火草

阿膠

生地

麥冬

又照前方加桂枝木茯苓南棗熟地水製人參阿膠萸肉遠志炭山藥茯神建蓮烏骨雞膏丸初一至而衝任奇脈不振須臟陰沖旺脈中得以游溢耳。

又產後部屬下焦先損百脈空隙時序夏秋天暖發泄加病此扶陽益陰得效今諸症向愈寢食已安獨經水未至而衝任奇脈不振須臟陰沖旺脈中得以游溢耳。

酸味之品總非治病之藥惟病後或可用耳

熟地

阿膠

五味

萸肉

北沙參

茯神

黑櫟豆皮

秋石二分調入

陳

心寒

熱時

作經

歲不

產且

產病

後起

陽維

為病

明矣

歸桂枝湯

陳

心寒

熱時

作經

歲不

產且

產病

後起

陽維

郭

毗連

後下

元陰

分先

傷而奇經八脈

皆麗於下

肝腎怯不

固八脈咸失職司

經首謂陽維脈病

苦寒熱陰脈病

苦心痛

下損及胃

食物日減

然產傷

先傷真陰

已用桂附之剛

此等藥為入奇經之藥

溫煦陰中之陽能入奇經者宜

之

人參

鹿茸

此所謂奇

藥也

紫石英

當歸

補骨脂

當歸

茯苓

桂枝木

茯苓

桂枝木

茯苓

陳

一

座後兩月

腰痛牽引

小腹冷汗不食

當歸

羊肉

小茴

桂枝木

茯苓

紫石英

當歸

桂枝木

茯苓

沈

產後

勁急

氣血皆逆

痛嘔不卧

俛不能仰

面冷肢冷

口鼻氣寒

痛必自下衝上

此屬病瘕飲痛

沈

淡吳萸

韭白

兩頭尖

川棟子

桂枝木

茯苓

桂枝木

茯苓

吳

六

一座後百日

內右脇下少腹

痛堅脹空無血

氣來於中

有結聚癰疽之累

延及變成脹滿

經水不轉

成大

陸

產後

都深入陰

氣血膠結

遂有癰疽之形

身體僵

僂乃奇脈綱維不用

充形通絡可效

倣仲景當歸羊肉湯意

胞損
營衛
兼虛

歸身
蓀客

杞子
小茴
茯苓

小茴
紫石英

茯苓
羊肉膠丸

生沙苑
萸肉炭

炒黃柏
沙苑

炒黃柏
茯神

馮四
二產後兩月。汗出身痛。歸芪建中湯。

余產後機不復。心悸欲區。遇寒腹痛。先議進和營衛。繼當補攝。歸桂枝湯加茯苓、吳三。胃痛三月不止。茹素面黃。產後吞酸少食。中焦陽憊。豈宜再加攻泄。與辛補血絡方。

桃仁

歸鬚

公丁香皮

川桂枝

半夏

茯苓

某

見象

人參錢

杞子炒焦

歸身錢

牛膝鹽水炒

巴戟天錢

浙江黃甘菊花炭分

茯苓半錢

生白龍骨

兩

某產虛下焦起病。久則延胃。不飢不食。乃陰損及陽。陽明脈空。厥陰風動。掀旋而頭痛面浮。肢冷指麻。皆亡血家

九。人參二兩

茯苓二兩

萸肉二兩

五味半

杞子炒

桑螵蛸殼

鹽水煮

生白龍骨

兩

浙江黃菊花

火炭

蜜丸早服四錢

開水送

楊一自幼作勞。即患頭眩。加之刮痧。一月之內必發數次。前歲產後體甚不健。右耳日夜响。鳴。即頭眩。神色衰。每

晉黃舌白。帶下。手冷腳腫。脈右大。是陽明空氣泄不固。緩下溫中主之。

人參兩

桑螵蛸三兩

鹿角霜半

淡旋容半

炒杞子二兩

柏子霜半

茯苓半兩

紫石英兩

醋飛

白龍骨半

紅棗四兩

薑父五錢

水煮搗丸服

四錢

某胃痛欲嘔。肢冷痛引腰背。產後病發更甚。

不切病。此乃胎

瘡舊症也。

當歸

炒沙苑

炒黑杞子

炒黑小茴

鹿角霜

生精羊肉煎服

人參

非凡方

鹿茸

生杜仲

炒杞子

當歸

鹿角霜

沙苑

小茴

羊腰子蒸熟搗丸

陰浮虛

經漏

胃虛

下焦

寒

某產後

虛

溼

瘀

方

九。

人參另研

茯苓蒸

蜜丸

炒黑

五味半

杞子炒

桑螵蛸殼

鹽水煮

生白龍骨

兩

某產後

虛

溼

瘀

人參

鹿茸

都是衝任奇脈內怯。最有崩漏勞損淹縕之處。但固補實下。須通奇經者。宜之。

增編登旨

奇脈

虛

溼

瘀

方

九。

人參兩

白龍骨兩

紅棗四兩

薑父五錢

水煮搗丸服

四錢

某產後

虛

溼

瘀

人參

鹿茸

生杜仲

炒杞子

當歸

鹿角霜

沙苑

小茴

羊腰子蒸熟搗丸

前方復入涼肝益陰配陽。是兩固法則。

桑螵蛸

人參

扶苓

生杜仲

沙苑

芡實

湖蓮

陳

座後百脈空隙腰脊痛漏淋

桑螵蛸

龍骨

淡旋

炒杞子

扶苓

沙苑

紫石英

熟地炭

當歸

桂枝

五味

扶苓

柏子仁

沙苑

生杜仲

川斷

少血藥

桑螵蛸

鹿角霜

龍骨

淡旋

炒杞子

扶苓

沙苑

紫石英

熟地炭

當歸

桂枝

五味

扶苓

柏子仁

沙苑

生杜仲

川斷

虛寒
痰泄

吳

閑病原產後陰虛液虧加以平時嗔怒陽氣暴升格

血不寧竒空衝任少

脈帶淋暗泄等症

是溫養之義非溫熱之謂

人參

河車

麋草

鹿角霜

炒鬼絲

生杜仲

炒杞子

熟白朮

淡骨脂

扶苓

蒸餅九

減食先調脾胃即和營衛法

人參建中湯

某

易飢易怒腹悶氣墜

未和氣知飢不進食自胎前至今兩月不愈竝非客邪用固攝升陽

虛寒
中虛

楊

瘍泄起於產後三年方愈下損已極經水幾月一至來必畏冷如病竝經衝任空下焦畏冷食冷則渴心中

疼熱緩下溫經主之

人參

鹿角霜

炒鬼絲

生杜仲

炒杞子

熟白朮

淡骨脂

扶苓

蒸餅九

金人經後即背寒不熱逾月不愈嗽痰有血

自秋令產尊屢屢若傷風咳嗽正月至殺減而產後不復是下虛形寒

減食先調脾胃即和營衛法

人參建中湯

督任

潘

胎前水溢浮腫喘滿不得卧

余用開太陽膀胱獲效既產浮腫自然漸退

女科不明產後下虛常以破氣寬脹

百日來腹大且滿按之則痛此皆氣散滯漫

丸藥人補晝守中益助其鈍

氣血凝滯經候不來為難治之病議腎

氣湯假藥成炭

過取其氣之通勿令味濁兼調琥珀末

以調其血潘倣古法中之所有兆杜撰也

陽虛

桂七味加車前牛膝炒炭水洗煎臨服調入琥珀末

徐六產後九年

心中脹甚

則濁肌浮足腫食減過半

凡脹必有端

產後先傷在下用薛氏濟生丸三錢十服

九年仍

名產後

桂七味加車前牛膝炒炭水洗煎臨服調入琥珀末

病則傷寒後九年亦可名傷寒後病矣。是
非美話。凡產後過百日而起者。不作產後看。

某產後血去過多下焦衝任虛踰腫脹形寒面黃脈濶當用溫養。

鹿角霜

補骨脂

紫石英

茯苓

桂心

炒黑小茴分

熟附子

胡蘆巴

良薑

炒黑茴香

茯苓

廣木香

炒黑回香

桂心

炒黑小茴分

朱四脈微弱形無華色據說病起產後食減吐濶是下焦不復中焦又傷漸加浮腫脹滿倏忽平皆下焦厥逆上

衛也下虛於產後剛劑難以耑任是病之不易取效者在此

淡旋谷

炒黑杞子

當歸

小茴

茯苓

沙苑

又濟生腎氣丸一兩二錢

某五產後未滿百日胸膈骨節收引四肢肌肉麻木浮腫脹脹早輕夜重食減畏寒便溏脈得右遲左弦先與理中

健陽驅濶人參

炮薑

淡附子

焦白朮

枳實

茯苓

范病

脹起於產後下焦失傷濶陰犯中不可以脹滿為實症夫腑陽不通腎氣散漫吸氣不入息音和喘此身動

便喘非外客之邪干肺春半濕氣外侵而腫頸項結核曾以夏枯菊葉半解得效乃一時暴邪治法至於本病之

腹滿洞泄跗腫未經調理且張勢侵晨至午頗減日暮黃昏脹形漸甚中焦陽微已見一斑愚見脹滿在中而病

根在下仲景於產後失調郁從下虛起見文科湯藥一方殊屬不解思平居咽乾喉痺牙宣肝腎真陰下虧不

敢剛藥宣通做薛氏腎氣法減泄肝和牛膝肉桂之辛不致劫陰仍可通陽為法

六味去萸加芍藥附子牡蠣炒炭煎

又小滿節古云痛隨利減今便利仍痛非是實症肝失調暢當理用以益水母不取芍藥之和陰加當歸小茴香

拌炒焦黑以通肝臟脈絡之陽又辛散益腎也照前方去萸加菖蒲拌炒當歸

某產後脹不愈顯是下虛肝腎氣不收攝亦有瘀血不下者形寒痞悶食少瘦多脈細內消治從陰分非分和攻消者濟

生腎氣丸沉香汁沖開水送

接服金匱腎氣丸

王 脹滿六年。產後小愈。今脹勢復甚。兼脫肛淋症。大腿熱如滾水。潑食入臍中作痛。議治其脹。

小溫中丸。三錢六服。

傅 風勝為腫濕。甚生熱。乃經脈為病。但產後百日。精神未復。不可過劫。

羚羊角 木防己 片薑黃 川桂枝

大杏仁 沔仁

方 產後腹大。半年不愈。近日有形衝突。腸如刀攬。據述坐蓐。產血去盈斗。而腹形即已脹滿。想八脈不用。腎氣

散越不收。非瘀血精氣為病。議用大全方。烏雞煎丸。

古方極多。烏骨雞人參。蒼朮。附子。烏藥。肉桂。陳皮。草果。紅花。海桐皮。黃芪。白朮。

蓬朮。川烏。延胡。白芍。木香。肉果。琥珀。丹皮。

蜜丸 即以雞擣去毛頭。嘴爪。腸雜將藥放雞肚內。貯砂鍋中。以好酒一斗同煮。令乾去雞骨。以油單盛焙。令乾為末。

范 衡任傷督帶損。皆由產時勞憊。理難復元。固擣下真。兼理奇脈。治非背誤。但腹滿膨痛。若徒固補。不以通調。恐

滋脹腫大。意陽宜通。陰宜固。已舉形骸。和養脈絡。乃正治方法。病樣多端。紛紜縷治難以立方矣。

人參 鮮河車膠 淡從蓉 砂仁製熟地 鹿角霜 歸身 茯苓 紫石英

某 小茴香 羊腰子

產後下虛。血病為多。今腹中痞脹。減食不適。全是一氣分之恙。但調氣寬中。勿動下焦為穩。

香附 神龜

朱 苏梗 白蔻仁

茯苓

桔梗

四產後冬月右腿浮腫。按之自冷。若論敗血。亦有一年。

後而

成者

半年已成癰瘍。針刺泄氣。其痛反加。此乃衝任先虛。蹻

維脈不為用。溫養下元。須通脈絡。然取效急遲。恪守可望却病。

終屬有期

不可徒補。

從容

鹿角霜

當歸

肉桂

小茴

牛膝

茯苓

桔梗

鹿角膠溶酒蜜丸

某 產後必病陰虛。可知兩足跗中筋掣。至夜痛。不耐走趨。當溫養肝腎。以筋骨。但食後腹中痞阻。按之澁澁有聲。

手麻脹痛。

心煩耳目昏眩。

究是陽氣不主流行。痰飲內聚之象。處方難以兼攝。議用分治法。

奇脈。虛腎。虛氣。不攝。腫。氣。不攝。腫。

肝腎。虛寒。痰。氣。不攝。腫。

氣。補。陰。寒。滯。痰。

中焦藥日中服 桂苓六君子竹瀝薑汁法丸 下焦藥侵晨服從四斤丸金剛丸參寫

旋容 牛膝 虎骨 生杜仲粉 天麻 木瓜 草薢 蜜丸

程

脈沉咳喘浮腫鼻塞黑唇古赤渴飲則脹急大便解而不爽此秋風燥化上傷肺氣壅不降水設湯飲之溼痺散漫三焦皆累閉塞告危矣 桂枝木 杏仁 生白芍 石羔 旋容 灸草 乾薑 五味

陳

三夏李生暮秋月熱病半年來不寐不便無皮毛焦落之象是痰飲為氣所阻以致升降失常乃痺之基也議宣肺以通腸 紫苑 銀杏仁蜜 亦非真方枳殼錢 桔梗錢 瓜蒌皮錢 鐵金錢 陸背寒夜卧氣衝砍坐乃下元虛之厥濁飲邪皆令上泛胎前僅僅支撐產後變症蜂起奈何庸庸者流泄肺翼其嗽緩宜乎藥增病勢矣 桂枝 茯苓 灸草 五味 淡乾薑

許

嘯喘屬肺虛喘屬脾產後下虛最多痰飲易於上泛喘嗽食減有浮腫脹滿不得卧之憂不可小視

王

全方未

生白芍 乾薑 五味

通草

大豆黃卷

成安

蘆根

苡仁

木防己

茯苓

又

淡滲通泄氣分肺壅得開而卧再宗前議 通草

成安

蘆根

苡仁

大豆黃卷

木防己

茯苓

又

過投絕症凝寒重藥致濕聚阻痰內投通泄氣分已效再用煖胃滌飲法

半夏

薑汁

黍米

茯苓

某

脈小左弦咳逆脫悶小便不利大便溏濁不思納穀暖氣臭穢此皆胎前氣上逆衝濁得盤踞膈間肺失清肅

建澤漏

茯苓

苡仁

木防己

茯苓

沈

產後未復加以暑熱上干暑必傷氣上焦先受頭脹微微區恐脫悶不曉飢飽暮熱早涼汗泄不已經水連至

熱迫血絡妄動蓋陰虛是本病而暑熱係客氣清上勿得曉下便是理邪勿混亂首鼠致延奪損不復矣

此老欲學
漢人住此
未明古方
之意

尚出諸醫
方是此老
之上不可
以道里計
但有時遇
等病仍能
用不可想
知何故學
亦有入時
地

肺歸膈
熱濁

風溫客肺
飲邪

痰飲

上逆

痰飲

阻氣

不寐

不便

下虛

飲濁

痰飲

桂苓六君子竹瀝薑汁法丸

桂枝木

杏仁

生白芍

石羔

旋容

炙草

乾薑

五味

桂枝

茯苓

炙草

五味

桂枝

木防己

茯苓

桂枝

桂枝

暑傷
上焦
氣分

不火
風心
營熱

尋勞

卷竹葉 生地 炒川貝 連翹心 元參 地骨皮
袁二神識不甚靈慧。陡然狂亂入井。夫暴病痰火風為多。今診視色脈。產後未滿百日。多驚怕。五味皆變。厥陰肝木順乘陽明。古稱一陰一陽變亂為癆。先以清心胞解。營熱食進。便通再酌調理。

犀角

妙可師方甚靈 生地

菖蒲

元參心

羚羊角

鬱金

竹葉心

連翹心

又 復脉湯去參益桂

桂枝

生地

菖蒲

元參心

羚羊角

鬱金

竹葉心

連翹心

某五產後不復元。仍自乳撫育。損不能復。即是尋勞。速斷乳藥力可扶。凡產必下焦先損。必以形質血氣之屬。莫以心熱。再用寒涼伐其生氣。人參 當歸 沙苑 杜仲 補骨脂 約苓 羊肉腎二枚

沈時。熱屬上焦。病逾時自解。緣體質素薄。長夏坐蓐。不但肝腎陰傷。諸氣皆為發泄。陰不主懸陽。衝脈上冲。而心熱骨痿。總是陰虧不肯復元。久久延成損症。此與清潤治肺之咳無預法。宜填補下焦。攝之固之。迎養秋收冬藏。胃納有加。庶乎漸安。鮮紫河車 人參 真秋石 約神 水煮熟地 歸身 五味 茗實 山藥

生羯羊肉膠共河車膠二共和丸

姚士面少華色。脈似數。按之芤濇。產後三年。從未經來。腹中有形。升逆則痛。肩背映脇。半痛難忍。嘔吐都是涎沫。著枕氣衝欲坐。食減便溏。身動語言喘急。此乃尋勞。損極不復。諒非草木可以圖倅。由下焦元海少振驚恐。餽弱衝脈。動斯脈動。擬益元氣。充形骸。佐重鎮以理怯。護持體質之義。非治病方藥矣。

人參

方不中病

杞子

白龍骨

茯苓

紫石英

羊肉

鄒二產後成勞損。先傷下焦。血分寒熱。數發不止。奇經八脈俱傷。欲嘔不飢。肝腎及胃。有形凝痕。議柔劑。溫通補下。

人參

當歸

小茴香炒

茯苓

沙苑

淡蓀荳

杞子

鹿角霜

生紫石英

汪產後百日寒熱。消渴心痛惡食。澹瀉。此尋勞派源已屬病沉難治。擬酸甘化陰扶胃。望其小安而已。

人參

烏梅

火草

赤石脂

木瓜

茯神

炒粳米

張二產後下虛。厥氣上衝犯胃。食入嘔張。脈絡日空。營衛兩怯。寒熱汗泄。淹滯為尋勞之病。最難調治。

淡吳萸分

桂枝分

茯苓錢

炮薑分

炒木瓜錢

南棗

賦
痛不
宜酸

黃產後	陡然驚恐。陰虧陽上逆。血湧吐痰。胸背脇下大痛。乃八脈空乏之徵。尊勞重症。延綿最難全。仔謹鎮固一法。	熟地炭	炒杞子	五味	紫石英	茯神	牛膝炭
又	脈少欬痛止。血緩仍用鎮納。熟地炒杞子五味。茯神阿膠。熟地杞子五味桂圓。茯神建蓮。救膏人參湯送服。	又	小產三日。脈數頭痛。腕痞。小腹墜痛。欲脫。此屬鬱冒。	顧	連翹鬱金汁丹皮鉤藤茯苓炒山楂益母草湯煎	又	脈少欬痛止。血緩仍用鎮納。熟地炒杞子五味桂圓。茯神建蓮。救膏人參湯送服。
某	二小產後惡露淋漓。營血內虧。厥陽由是鼓動。頭暉耳鳴。心中洞然。病在下焦矣。	朱	脈小半產一日。舌白頻頻。嘔吐青綠水汁。延沫左肢浮腫。神迷如寐。此胃陽大虛。肝風內泛。欲脫之象急護。	某	二小產後惡露淋漓。營血內虧。厥陽由是鼓動。頭暉耳鳴。心中洞然。病在下焦矣。	朱	脈小半產一日。舌白頻頻。嘔吐青綠水汁。延沫左肢浮腫。神迷如寐。此胃陽大虛。肝風內泛。欲脫之象急護。
人參	淡附子熟於丸炮薑	人參	淡附子熟於丸炮薑	人參	淡附子熟於丸炮薑	人參	淡附子熟於丸炮薑
九	形畏寒凜凜忽然。轟然腰膝墜脹。帶下汗出。由半產下焦之損致八脉失其擁護。少腹不和通攝脈絡治之。	陳	懷妊三月。小產半年不復。寒從背起。熱起心胸。經水後期不來。帶下脈脈不斷。脊督腰牌痿墜酸疼。膝骨跗脰易冷無力。由衝任督帶傷損致陰陽離隔不用。調治非法有終身不肯孕育之累。	鹿角霜	炒當歸杜仲兔絲子小茴香桂枝	鹿角霜	炒當歸杜仲兔絲子小茴香桂枝
帶	盧琳奇脈固成癩不升	盧琳奇脈固成癩不升	盧琳奇脈固成癩不升	帶	盧琳奇脈固成癩不升	帶	盧琳奇脈固成癩不升

補正言才

卷之二

下受風溫

上年小產下虛不復。冬令藏聚未固。春夏陽升。風溫乘虛上受。清寡不利耳。失聰。鼻多塞。咽燥痰稠。悉見上焦不清。究竟下虛是本病。議食後用清裏。早上用錢納。青菊葉錢。羚羊骨一錢。黑梔皮錢。連翹心錢。

元參心錢。苦丁茶錢。磁石六味加龜膠北味。

久鳴延虛痛。而後濁氣弱不司運行。病因小產而來。法當中下兩調。

程

久鳴延虛痛。而後濁氣弱不司運行。病因小產而來。法當中下兩調。

人參

炒鬼絲子

木香

茯苓

炒白芍

炒補骨脂

細生地

陽氣虛久漏

暮勞

汪

小產後氣衝結瘕。是奇經八脈損傷。謂病尚有形。僉從瘀血施治。半年來肌肉大消。內熱咯痰帶血。食過院下。輒云腹痛。蓋產後下焦真陰大虧。攻瘀清熱。氣味苦辛。是重虛其虛。藥先入胃。既不中病。先壯胃口。致令飲食廢矣。陰虛成熱。經訓灼然。以胃口傷殘。難與滋潤之藥。此症延成暮勞。必得飲食漸和。方有調病之理。見病治病。害。豈可再循前轍。議肝胃兩和方法。

小茴七分同當歸合炒

葉石英

五錢先煎

生薑入藥

炒黑杞子

三錢

雲茯神

柏子仁

錢

生沙苑

錢

焦當歸

錢

生沙苑

錢

集當歸

錢

細生地

某

三次兩月胎漏而下。是厥陰失養。脈數又大。腹痛惡露未盡。

柏子仁

炒查肉

丹皮

澤蘭葉

細生地

調人琥珀末

倪

小產半月頤安。忽然腰腹大痛。或攢膝跗足底。或引脇肋肩胛。甚至湯飲藥餌。嘔吐無存。脈去液傷。終空風動。

昔賢謂按之痛緩屬虛。勿道諸痛為實。

柏子仁

炒查肉

丹皮

澤蘭葉

細生地

調人琥珀末

又

往常經候不調。乃厥經為痛。

葱白丸

細生地

調人琥珀末

生白芍

細生地

調人琥珀末

生白芍

細生地

調人琥珀末

生白芍

細生地

調人琥珀末

生白芍

方之重複

近來信醫。慢信產後醫。凡產後服藥。地氣。孤陰。等。不用炮薑。雖石陽。

金匱要略云。新產婦人有三病。一者病鬱。二者病鬱。三者大便難。新產血虛多汗。出善中風。故令瘡。亡血。復汗。寒多。故令鬱。亡津液。胃燥。故大便難。心典云。血虛汗出。筋脈失養。風入而益其勁。此筋病也。亡陰血虛。陽氣遂破。而寒復鬱之。則頭眩而目瞀。此神病也。胃藏津液。而滲灌諸陽。亡津液。胃燥。則大腸失其潤。而大便難。此液病也。三者不同。其亡血傷津財。一故皆為產後所有之病。即此推之。凡產後血虛等諸症。可心領而神會矣。張璐玉云。產後元氣虧損。惡露未盡。上攻。眼花頭暈。或心下滿悶。神昏口噤。或痰涎壅盛者。急用熟童

蓋竹柏仲景亦不染用而世之庸醫反以病其陰而滅其火無不立斃我見甚多矣此絕無光澤是當學有淵源惟善用人參而少用血藥消瘀清胃之法尚未見分則有到也胎產之後總由管足大腹不論必有邪氣無非風寒之氣主其去來消疾除作法皆從變化不推此故也

陽經陰經陽蹻何難推主之請教

使主之。或血下多而量少。或神昏煩亂者。乃歸湯加人參澤蘭童便兼補而散之。又敗血上衝有三。或歌舞談笑或怒罵坐卧甚則踰牆上屋。此敗血衝心。多死。用花蕊石散。或琥珀黑龍丹。如雖悶亂。不致顛狂者。失笑散。加鬱金。若飽悶嘔惡。腹滿脹痛者。此敗血衝胃。五積散。或平胃加薑桂。不應。送來復丹。嘔逆腹脹。血化為水者。金匱下瘀血湯。若面赤嘔逆。砍死。或喘急者。此敗血衝肺。人參蘇木。甚則加芒硝滌湯。之大抵衝心者十難救一。衝胃者五死五生。衝肺者十全一二。又產後口鼻起黑色。而鼻衄者。是胃氣虛敗而血滯也。多用人參蘇木。表邪不得不解。既有火邪。不得不清。既有內傷停滯。不得不開通消導。不可偏執。如產後外感風寒。頭痛身熱。便實中滿。脈緊數。洪大有力。此表邪實症也。又火盛者必熱渴煩躁。或便結腹脹。口鼻舌焦黑。酷喜冷飲。眼胞。屎。尿。溺。亦脈洪滑。此內熱實症也。又或因產過食。至停蓄不散。此內傷實症也。又或鬱怒動肝。胸脇脹痛。大便不利。脈弦滑。此氣逆實症也。又或惡露未盡。瘀血上冲。心腹脹滿。疼痛拒按。大便難小便利。此血熱實症也。遇此等實症。若用大補。是養虎為患。誤矣。以上四家之論。俱屬產後治病扼要處。學者當細心體察。再參觀葉先生醫案。更能博考。臺灣以治產後諸病。易如反掌。矣。否則如眇能視。不足以有明也。如跛能履。不能與於行也。烏得稱司命哉。泰天一婦人善病。而病由產後者為更多。亦為更劇。產後氣血大虧。內而七情。外而六氣。稍有感触。即足致病。使治之失宜。為患莫測。朱丹溪曰。產後以大補氣血為主。雖有他症。以末治之。此語固為產後之宗旨。而症實多端。論其常。未盡其變也。醫者惟辨乎脈候。以明内外之因。審乎陰陽。以別虛實之異。病根遂徹。而施治自效。慎毋以逐瘀為子事。亦毋以溫補為守經。今觀先生案中。凡內因之實症。未常不用攻治之劑。然如熱厥。昏亂。有似惡露衝心者。先生則曰陰氣下泄。陽氣上冒。從亡陽汗出。證類例為救逆法。如少腹冲任。蓋八脈麗於下。產後陰分一傷。而八脈自失所司。溫補鎮攝。在所必先。無奈世人罕知。即有一二講論者。終屬影晳模糊。惟先生於奇經之法條分縷析。盡得精微。如衝脈為病。用紫石英以為治。鎮逆任脈為病。用龜板。

治本病
如河家一
方以治百
病者庶不
得以醫目

營氣格
結症

以為靜攝。督脈為病。用鹿角以為溫煦。帶脈為病。用當歸以為宣補。凡用奇經之藥。無不如芥投針。若夫外因
為病者。風溫入肺。用荳蔻湯。甘寒淡滲。以通肺氣。遇寒腹痛。用當歸桂枝湯。辛甘化陽。以和營。偏暑濕土干。則
陰虛是本病。暑熱是客。氣清上勿致礙下。便是理邪。如濕傷脾陽。而飲邪阻氣。用苦溫淡滲之品。澤尤湯治之。
熟茶化燥。而胃阻腸痺。用首烏麻仁參女花粉。清滋潤燥之劑。治之。熱來陰虛而入營中。則忌表散清利。惟育
陰可以除熱。更如邪入營絡。而成癰症。不得發汗。脈補當以輕清和解為主要。之先生於內因之症。一尋源
探本。非同俗手。漫謂補虛。於外因之端種種審變。權不以座後自為刑林。惟讀書多而胸具靈機。故於丹溪
本末二字。尤為神化無迹。此所謂知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮也。案中諸症甚多。學者果能
悟焉。則一以貫之矣。

葉商年

張

久病在絡。營中之氣。結聚成瘕。始而夜發。繼而晝夜俱痛。陰陽兩傷。偏閑醫藥。未嘗說及絡病。便難治。香燥

煩忌。青葱管。

新鋒

當歸鬚。

桃仁。

生鹿角。

柏子仁。

朱

六

辛潤通絡。

成形瘀濁。

吐出

然淤

必下

行

為順。

上瀉雖安。

恐其復聚。

仍宜緩通。

以去瘀生新為治。

無取沉降。

急

攻謂怒勢。

多令人傷陽耳。

當歸

桃仁。

羌活子。

製瘡藥。

生鹿角。

茯苓。

香附。

葱白。

周十三瘕聚結。左肢節寒冷。病在奇脈。以辛香治絡。

鹿角霜

桂枝木

當歸

小茴

茯苓

香附

葱白

龜脈症向安。辛甘化風方法非謬。據云。痛時少腹滿脹。其有形瘀瘕。狀亦略小。法宜益營之中。再佐通泄其氣。古
稱通則不痛耳。

人參

當歸

肉桂

吳萸

小茴

茯苓

青葱管。

欽疝瘕少腹痛。當歸。

生薑

羊肉

桂枝

小茴

茯苓

青附。

又瘕痛已止。當和營理虛。

歸身

紫石英

白芍酒炒

小茴

淡旋谷

肉桂

朱十四瘕腹痛有形。用柔溫辛補。當歸。

生薑

紫石英

白芍酒炒

小茴

淡旋谷

肉桂

九方用養營去戾。木桂合杞圓膏。

經氣
經脈
經絡

某

右脇攻痛作脹。應時而發。是濁陰氣聚成瘕。絡脈病也。議溫通營絡。

當歸

三錢 小茴

炒焦一錢 上肉桂

錢青葱管十

譚 痘聚有形。高突。痛在胃脘心下。或至界腰少腹。重按既久。痛勢稍定。經水後期。色多黃白。此皆衝脈為病。絡虛則脹。氣阻則痛。非辛香何以入絡。苦溫可以通降。

延胡

川棟 香附

鬱金

茯苓

降香汁

羌蔚子

炒山楂

烏藥

人 痘聚癰結。痛脹。食得食不下。痛甚。今月經阻不至。帶淋甚多。病由衝任脈絡擾及肝胃之逆亂。若不宣暢經通。日久延為癰疾矣。

炒桃仁

當歸鬱

延胡

川棟子

青皮

小茴

吳萸

紫降香

青葱管

柳 四絡血不注衝脈。並謂則經阻氣攻入絡。聚而為瘕。乃痛。衝脈是陽明屬隸痛升於右脹。及中脘作嘔。清涎濁沫。

操家煩怒犯胃。莫如肝。世肝正救胃。

金鈴子

炒延胡

蓬莪朢

青橘葉

半夏

厚朴

薑汁

伏苓

又葱白九二錢。艾葉湯送

某 脣下瘕形漸大。氣塞至心胸。及咽喉。飲不解渴。遂氣攻至背部。經水百餘日不來。小溲得利。大便不爽。氣滯血瘀。皆因情志易鬱。肝膽相火內灼。衝脈之血欲涸。丹溪謂氣有餘便是火。口甜食後唇用苦李清降。

胡黃連

八分 山梔仁

錢半 南山楂

三錢 薤白

雞肫皮

不落水去垢五錢

化膩回生丹

半丸

陸 六經阻半年。腹形漸大。痛不拒按。溲短便通。據形色脈象。不是用通經丸者。下氣還攻於絡。有形若癰瘕。炒枯腎氣湯。

繆 脈弦左搏。數年胃痛不痊。發時手不可按。脇中拘急。少腹左側素有瘕聚之形。氣自下焦衝起。為脹為嘔。此乃驚憂嗔怒致動肝木。乘其中土。胃傷失降。脈絡逆併。痛勢甚甚。初起或理氣獲效。久發中衰。手香乳燥。脾胃不勝。

克伐矣。議疎肝木安土為法。冀其漸緩。再酌後法。

川棟子

川連

乾薑

桂枝

當歸

川椒

生白芍

烏梅

又 少腹疝瘕多年。衝起散漫。胃脘兩脇痛甚。坎壘平前。用安胃泄肝頗效。但下焦至陰足跗發癰熱。水久留濕熱。瘀留經脈絡中。交病。若非宣通氣血壅遏。恐非至理。

桃仁

柏子仁

川芎

當歸

小茴

小香附

茯苓

山梔

薑炒汁

為末用青葱管百莖加水一杯取汁法丸。

某十數年左脇聚癰發作必嘔吐涎沫酸苦濁水宿不成寐便閉怒濁始於悒鬱病由肝失暢達木必傳土胃氣受

侮病久入絡氣血兼有緩圖為宜急攻必變張病生牡蠣

川棟子肉延胡桃仁半夏

茯苓

橘紅

白芥子川連

吳萸

香附汁蜜汁法丸

趙

脈小身不發熱非時氣也凡經水之至必由衝脈而始下此脈胃經所管醫藥消導寒涼不能中病反傷胃口

致衝脈上冲犯胃為嘔攻胸痞塞升竅則昏厥經言衝脈為病男子內疝女子瘕聚今小腹有形兼有動氣其病

顯然夫曰聚皆奇經中不司宣暢流通之義豈不知絡脈治法所謂愈尤愈窮矣

鹿角霜

淡旋容炒當歸炒小茴生杜仲

茯苓

用紫石英一兩煎湯煎藥

蔣

七天癸將止之年小腹厥陰部位起瘕動則滿腹脹痛形堅或時脊頸掣痛必有瘀血筋吐出此起於鬱傷久

則液枯氣結內風陽氣煩蒸則心熱痞結咽阻已屬痼疾治必無效倘腹大中滿則劇矣

牡蠣

病不切生地

阿膠

小胡麻

茯苓

橘豆皮

沈

四肢冷腹痛有形為瘕久滯當歸黑小茴炒

上肉桂山楂炒

茯苓

炒豆皮

林

又冷病有瘕遇冷則嘔吳萸炒小茴延胡

川棟子生牡蠣

桂枝木

生白芍

青皮

某

脘中瘕聚川棟子延胡

吳萸分五

青皮分

良薑錢

茯苓錢

程

又少腹瘕聚攻逆身熱或噫或濁氣下泄則諸恙悉舒憐怒病發厥陰肝木鬱遏不疏顯露一班

川棟子錢

小茴五分

生牡蠣

桂枝木

生白芍錢

又

聚氣疝瘕大使不爽必腹中疼痛當通腑經氣分

慈白丸二錢五分紅棗湯送

青皮錢

又

做朱砂意以濁攻濁

韭白根五錢

兩頭尖百

炒香橘核錢

小茴香分

金鉢子肉錢

肝逆犯胃奇絡虛端寒滯嘔瀉陽升張痛

案中方論
平正清切論
無副燥但冠
削等弊但冠
而不可破活也
多有形之疾但
者古人言此則全
法必不可守等
少見及恐全之病

九
當歸 橘紅 香附
少陽補太陰方。
生地 鱷甲 澤蘭膏
川棟子 瓜萎皮 香附汁 延胡 生牡蠣
瓜萎皮 香附汁 生牡蠣 橘紅 香豉
腑陽之流暢水穀之氣不主游溢痕屬氣凝結爲血結由無形
脹病必至矣俗有痞散成蟲之說可以治此病之戒律
兩一 當歸鬚一 山甲片一 小茴香三 桂枝木錢三
減半當此年犯乾血夢慮。
當歸 南山查 白芍
覆者疑也。藏氣結聚無形成段。推之而可易。昔有七歲入痘心

初病寒熱半年經水不來少腹已有瘕形食又減半當此年犯乾血勞虛
焦丸 茯苓 廣皮 香附 當歸 南山查
夫癥者徵也。血食凝阻有形可徵一定而不移。假者假也。臟氣結聚無形
說終屬強分名目。不若有形無形之辨為明的也。二症病在肝脾而胃與之
再究其氣血之偏勝。氣虛則補中以行氣。氣滯則開鬱以宣通。血衰則養
瘀瘕之大略。古方甚多而忽白丸烏雞前丸尤為神效。瘀瘕之外更有痘瘡
詳茲不必贅。今參先生方案如營傷氣阻者於益營之中佐通泄其氣。如血
入絡通降又如肝胃兩病者以泄肝救胃。肝胃脾同病者則扶土制木。肝腎
血痪絡逆失和者平香培理其血病由衝任擾及肝胃之逆亂者仍從肝
靈機法取藥不妄投。總之治癥瘕之要用攻法宜緩且曲用補法忌濫忌口。
則究中氣陰邪之衰旺。吞酸吐水必兼剛柔液枯腸結當祖滋營再辨脈象

夫癥者微也。血食凝阻有形可徵。一定而不移。瘕者假也。臟氣結聚無形成假。推之而可動。昔有七癥八瘕之說。終屬強分名目。不若有形無形之辨為明的也。二癥病在肝脾。而胃與八脈亦與有責。治之之法。即從諸經再究其氣血之偏勝。氣虛則補中以行氣。氣滯則開鬱以宣通。血衰則養營以通絡。血瘀則入絡以攻瘻。此治癥瘕之大略。古方甚多。而葱白丸烏雞前丸尤為神效。癥瘕之外。更有痃癖腸覃石瘕等症。古人論之已詳。茲不必贅。今參先生方案。如營傷氣阻者。於益營之中。佐通泄其氣。如絡虛則脈氣阻則痛者。以辛香苦溫。入絡通降。又如肝胃兩病者。以泄肝救胃。肝胃脾同病者。則扶土卦木。肝臟之氣獨鬱不宣者。辛香苦治於氣。血婢絡逆失和者。辛香苦理其血。病由衝任擾及肝胃之逆亂者。仍從肝胃兩經主治。以球降溫通。凡此悉靈機法眼。藥不妄投。總之治癥瘕之要用。攻法宜緩。宜曲用。補法忌濫。忌呆。上逆則想肝臟衝病之源頭。下壅則究中氣陰邪之衰旺。吞酸吐水必兼剛柔。藥液枯腸結。當祖營。再辨脈象之神力。形色之枯澤。致病之因由。

則治法自然無誤矣。襄商年

內陷邪
發癰

沈氏溫邪初發經水即至。寒熱耳聾。乾呕煩渴。飲見症已屬熱入血室。前醫見咳嗽脈數舌白。為溫邪在肺。辛涼輕劑而煩渴愈甚。拙見熱深十三日不解。不獨氣分受病。况體質素虛。面色黯淡。恐其邪陷血厥。三日前已經發五液暗耗。內風拗旋。豈得視為渺小之恙。議用玉女煎兩清氣血邪熱。此清涼劑更不合。仍有救陰之能。

玉女煎加竹葉心武火煎五分。

又

脈數色黯。舌上轉紅。寒熱消渴俱緩。前主兩清氣血。伏邪已得效驗。

大凡體質素虛驅邪及半。必兼護養元氣。

仍佐清邪腹痛便溏和陰是急服前方而有效。必非熱入血室。蓋經來而寒熱等症不止。不

白芍

火草

人參

炒麥冬

炒生地

蓄血

吳氏熱病十七日。脈右長左沉。古痿飲冷。心煩熱。神氣忽清忽亂。經來三日。病患血舍內之熱氣。乘空而陷。當以療

熱在裏論病。但病已至危。此是從蓄血如狂例。

細生地 丹皮 製大黃 炒桃仁

澤蘭

人中白

復脈湯大薑桂

又 脈右數左虛。臨晚微寒熱。

復脈湯大薑桂

此紫胡對症為千古一定之成法。舍此俱為邪說。然胡湯為主方。此之于千家主方。不一用。故知此方。亦非良方。惟仲景聲聲告戒。視如仇敵。令人不

用。湯直人海。蛤桃仁之治。昏狂甚。進牛黃膏。調入清氣化結之前。再觀案中有兩解氣血端蒸之玉女法。熟甚陰。

也斷不能除。凡治病最通。醫近時之只有名。外工物則減。有入味附人者。若略能知此。則可。論者悉知此。皆陳言耳。若略能知此。則可。論者悉知此。皆陳言耳。

傷有育陰養氣之復脈法。又有護陰降熱之緩攻法。先聖後賢其治總條分縷析學者審症製方。慎毋拘泥乎此。凡病之如我疾從此自不致。何再犯也。

柴胡一法也

諸人承版邵新甫

幼科要略

按穢保小兒體屬純陽所患熱病最多。世俗醫者固知謂六氣之邪皆從火化。飲食停留鬱蒸變熱驚恐內迫五志動極昏陽。奈今時治法初則發散解肌以退表熱。仍混入消導繼用清熱苦降或兼下奪。再令病家禁絕乳食。每致胃氣索然。內風來乘變見驚癇。告斃甚多。附記世俗通套之方藥於左不可不知不足取法。

防風

荆芥 葛根 前胡 桔梗 木通 赤芍

麥芽

枳殼 神曲 鋤藤 夏佐香薷冬佐麻黃羌活

兩三日熱不解

柴胡 黃連 黃芩 山梔 連翹 薄荷 葛根 木通

鉤藤

厚朴 枳實 瓜萎實 凡劑必用大黃未

四五日不解。但言食滯未盡表裏不和。總以柴芩小陷胸若嘔逆煩渴用竹茹黃連半夏苦梗多喘促即用葶苈杏仁蘇子薑子膽星貝母甚者加牛黃此皆食法所當戒也。屢清消不愈便無方法苟不變驚必曰骨蒸孩勞所用藥餌不分氣血陰陽但知見症施治如早涼暮熱必用

地骨皮

丹皮 生地 元參 甘草 北沙參 石斛

杏仁

貝母 桔紅 膽星 桔梗

其鉤藤石斛茯苓殼芽之屬每劑必用總之取無故疲藥待其自愈倘有變症希冀掩飾而已

今有此人已為良醫而失矣

愚按嬰兒肌肉柔脆不耐風寒六腑五臟氣弱乳汁難化內外二因之病身多然有非風寒竟致外感不慎已屬內傷其故何歟嘗思人之乳交之中春夏地氣之升秋冬天令之降呼出入與時消息間有機濁吸入即是三焦受邪過暴原直行中道必發熱煩燥倘幼醫但執前藥表散消導清火通便病輕或有倖成病重必然頭癟錢仲陽云嘗復不可近穢保小兒余言非無據矣四十年來治效頗多略述其概云

夫春溫夏熱秋涼冬寒四時之序也春應溫而反大寒夏應熱而反大涼秋應涼而反大熱冬應寒而反大溫皆不

知此等變常要熟用之

味則前後不一可輕用以從之

不外此等變常要熟用之

則前後不一可輕用以從之

印

補臨證指南醫案

卷六

伏氣

溫風

得宜不對
症則用之
有害不必
錄出奉承
反啟後人
疑之也

名言

皆正論也

正之乘氣也。病自外感治從陽分。若因口鼻受氣未必恰在足太陽經矣。大凡吸入之邪首先犯肺。發熱咳嗽。口鼻均入之邪。先上繼中。咳喘必兼嘔逆。腹脹雖因外邪。亦是表中之裏。設示世醫發散陽經。雖汗不解。幼稚質薄。神怯。日期多延。病變錯綜。茲以四氣常法列左。

伏氣

春溫一症。由冬令收藏未固。昔人以冬寒內伏。藏於少陰。入春發於少陽。以春木內應肝膽也。寒邪深伏。已經化熱。昔賢以黃芩湯為主方。苦寒直清裏熱。熱伏於陰。苦味堅陰。乃正治也。知溫邪忌散。不與暴感門同法。若因外邪先受引動。在裏伏熱。必先新涼以解新邪。繼進苦寒以清裏熱。况熱乃無形之氣。幼醫多用消滯攻治。有形胃汁。先涸陰液劫盡者多矣。

備用方 黃芩湯

葱豉湯

新邪引動伏邪

涼膈散

清心涼膈散

風溫

春溫者。春月受風。其氣已溫。謂春氣病在頭。治在上焦。肺位最高。邪必先傷。此手太陰氣分先病。失治則入手厥陰心胞絡。血分亦傷。蓋足經順傳。如太陽傳陽明。人皆知之。肺病失治。逆傳心胞絡。未必幼科多不知者。俗醫見人身熱喘。不知肺病在上之旨。妄投荆防柴葛。加入枳朴杏蘇。葛子。查苓薑皮之屬。輒云解肌消食。此亦有見痰喘。便用大黃礞石滾痰丸。大便數行。上熱愈結。幼稚穀少。胃薄。表裏苦辛化燥。胃汁已傷。復用大黃大苦沉降丸藥。致脾胃陽和傷極。陡變瘡癆。莫救者多矣。

按此症。風溫肺病。治在上焦。大風溫。春溫忌汗。初病投劑。宜用辛涼。若雜入消導發散。不但與肺病無涉。劫盡胃汁。肺之津液上供頭目。清氣徒為熱氣薰蒸。甚如煤目瞑。或上竄無淚。或熱深肢厥。狂躁渴澇。胸高氣促。皆是肺氣不宣化之徵。斯時若以肺藥少加一味清降。使藥力不致直趨腸中。而上竅可開。諸竅自爽。無如城市庸醫。僉六結胸。皆用連翹紫枳苦寒。直降。致閉塞愈甚。告覽甚多。

按此症初因發熱喘。故首用辛涼清肅上焦。如薄荷連翹牛蒡。女貞桑葉沙參梔皮裏皮花粉。若色蒼熱勝煩渴。渴用石膏竹葉。辛寒清散。痧症亦當宗此。若日數漸多。邪不得解。答連涼膈。亦可選用。至熱邪逆傳入體中。神昏目瞑。鼻竅無涕。諸竅欲閉。其勢危急。必用至寶丹。或牛黃清心丸。病減後餘熱。只甘寒清養。曾陰足矣。

大順散
治暑月傷寒之方也
何得過之

備用方

葦莖湯

清心涼膈散

涼膈散

瀉白散

(夏熱)

蓼慈大棗湯

白虎湯

清心牛黃丸

竹葉石膏湯

喻氏清燥救肺湯

夏為熱病。然夏至已前。時令未為大熱。經以先夏至病溫。後夏至病暑。溫邪前已申明暑熱一症。幼醫易曉。是暑發自陽明。古人以白虎湯為主方。後賢劉河間創議。迥出諸家。謂溫熱時邪當分三焦。投藥以苦辛寒為主。若拘六經分症。並無分。仍是傷寒治法。致悞多矣。蓋傷寒外受之寒。必先從汗解。半溫散邪。是已口鼻吸入之寒。即為中寒陰病。亦不盡然。治當溫裏。分三陰見症施治。若夫暑病。耑方甚少。皆因前人略於暑詳於寒耳。考古知。蓋暑暍經之因。暑病無傳變之法。方亦不必多。而潔古以動靜分中暑中熱。各具至理。茲不槩述。論幼科病暑。熱夾雜別病。有諸而時下。不外發散消導。加入香薷一味。或六一散一服。考本草。香薷辛溫。發汗能泄暑水。夏熱氣閉。無汗渴飲停水。香薷必佐杏仁以杏仁苦降泄氣。大順散取義。若此。非治暑之力矣。雖不得長夏濕令暑必兼濕。暑傷氣分。濕亦傷陽。胃汁大受劫爛。變病由此甚多。發泄司令。裏真自虛。張鳳達云。暑病首用辛涼。繼用甘寒。再用酸泄。酸飲不必用下。可稱要言不煩矣。然幼科因暑熱蔓延。變生他病。茲摘其槩。

受熱厥逆

夏令受熱。昏迷若驚。此為暑厥。即熱氣閉塞孔竅所致。其邪入絡。與中絡同法。牛黃丸。至寶丹。芳香利穀。可效神甦。以後。用清涼血分。如連翹心竹葉心。立參細生地。鮮生地。二冬之屬。此症初起大忌。風藥初病者。熟傷氣。竹葉石膏湯。亦不或清肺輕劑。大凡熱深厥深。四肢逆冷。但看面垢齒燥。二便不通。或濁不爽。為是大忌。悞認傷寒也。

(疳)

幼兒斷乳。食。值夏月脾胃主氣。易於肚膨泄。濁頭熱。手足心熱。形體日瘦。或煩渴喜食。漸成五疳積聚。當審體之強弱。病之新久。有餘者當疏胃清熱。食入糞色白。或不化。當健脾佐消導。清熱。或濕熱內鬱。蟲積腹痛。導滯驅蟲。微下之。最緩調用肥兒丸之屬。

(口疳)

夏秋熟小兒泄瀉或初愈未愈。滿口皆生瘡。有阻塞咽喉致危者。此皆在裏。濕生熱。熟氣蒸灼。津液不升。濕熱偏傷。氣分治在上焦。總須外治或佐淡滲。世俗常刮西瓜翠衣。治瘡取其輕揚滲利也。

(脹)

夏季濕熱鬱蒸。脾胃氣弱。水穀之氣不運。溫着內蘊為熱。漸至浮腫腹脹。小水不利。治之非法。水濕久瀆。逆行犯肺。必生咳嗽喘促。甚則坐不得卧。俯不能仰。危期速矣。大凡喘必生脹。脹必生喘。方書以先喘後脹者。治在肺。先脹後喘者。治在脾亦定論也。金匱有風水皮水石水正水黃汁。以分表裏之治。河間有三焦分消子和有磨積逐水。皆有學義。學者不可不潛心體認。難以槩述。閱近代世俗。論水濕喘脹之症。以內經開鬼門取汗為表治。分利小便。潔淨府為裏。治首病能篇。謂諸濕腫滿皆屬於脾。以健脾燥濕為樞。治之不效。技窮束手矣。不知凡病皆本乎陰陽。通表利小便。乃宣經氣利肺氣。是陽病治法。暖水臟溫脾腎。補方以驅水。是陰病治法。治肺腎以輕陽。上治脾必佐溫通。若陰陽表裏乖違。臟真日滿。陰陽不運。亦必作脹。治以通陽。乃可奏績。如局方禹餘糧丸。甚至三焦交阻。必用分消。腸胃窒塞。必用下。傖然不得與傷寒實熱同例。擅投硝磺枳朴。擾動陰血。若太陰脾臟飲濕。阻氣溫之補之。不應。欲用下法。少少甘遂為丸可。峻其治實。選用方法備採。備用方。等葛根大棗湯。

子和桂苓湯

禹功

茯苓防已湯

中滿分消湯

小青龍丸

木防已湯

附記一徐姓小兒單脹數月。功科百治無功。僉用肥兒丸。萬安散。磨積丸。綠華丸。雞肫藥俱不效。余謂氣分不效。宜治血絡。所謂絡瘀則脹也。用歸蘋桃仁延胡山甲蟻蠍。廣蟲靈脂山楂之類為丸。雖屬血積亦不宜用蟲類十日全愈。

(吐瀉霍亂)

吐瀉一症。幼兒脾胃受傷。陡變驚搐。最多。皆是疾寒若是不正。穢氣觸入。或口食寒冷。食用正氣散六和湯五積散之類。正氣受傷。肢冷。呃。嘔。吐。自利。即用錢氏益黃散。有痰用星附六君子湯。理中湯等。倘熱氣深伏。煩渴引飲。嘔逆者。連香飲。苦連竹茹半夏橘皮湯。熱閉神昏。用至寶丹。寒閉用來復丹。

(食瓜果泄瀉)

古人治瘧
謂中藥用
此之獨不
用紫草次
之即瘳矣
夏止七亦
不用半夏
歷古相傳
之定法收效
於輕重由
此一端可見
立心不可

瘧年夏月食瓜果水寒之溫着於脾胃令人泄濁其寒濕積聚未能運化熱氣必用辛溫香散之氣古方中消瓜果之積以丁香肉桂或用麝香今七香餅治瘧亦祖此意其平胃散胃苓湯亦可用。

(瘧)

瘧因暑發居多方書雖有疾食寒熱瘧之互易幼瘧之瘧都因脾胃受病然氣怯神弱初病驚癇厥逆為多在夏秋之時斷不可認為驚癇太方瘧症須分十二經與欬症相等若幼科庸俗但以小柴胡去參或香薷葛根之屬不知柴胡動肝除葛根竭胃汁致變屢矣此說何來此老於身與柴胡為仇何也幼科純陽暑為熱氣症必熱多煩渴邪自肺受者桂枝白虎湯二進必愈其有冷食不適有足太陽脾病具症初用正氣或用辛溫如草果生薑半夏之屬方書謂草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之熱瘧久色奪舌白汗多餒弱必用四獸飲陰虛內熱必用驚甲首烏知母便漸瘳者忌用人蔘營傷寒勝加桂薑擬初由未瘧日用藥於左

初病暑風濕熱瘧藥何人名為瘧下米飯是也何以治寒熱半胡是也令服瘧疾藥偏不及寒熱恐不免發出柴胡耳脫瘧間枳殼桔梗杏仁厚朴二味喘重則用石膏口渴用花粉煩渴用竹葉石膏湯熱甚則用黃芩黃連山梔

夏季身痛風濕毛防半溫宜忌宜用木防已桑沙

暑熱邪傷初在氣分日多不解漸入血分反渴不多飲食舌綠亦黃不膏知不應必用血藥涼佐清氣熱一味足矣

輕則用青蒿

丹皮汗多淡竹葉

若熱久痞結瀉心湯選用

木通亦能發汗

牽牛角

竹葉心

玄參

鮮生地

細生地

又夏月熱久人血最多蓄血一症言語昏狂看法以小便清長者大便必黑為是桃仁承氣湯為要藥幼瘧瘧久面腫脹脹泄不欲食或囊腫或趺腫必用東垣益氣以升陽升麻不可輕用也倘脾陽消滯前方不應用理中湯或錢氏益黃散得效二三日須投五苓散一二日再與異功參苓白朮散之類必全好徐忠可註金匱有云幼兒未進穀食者患瘧久不止用冰糖濃湯余試果驗瘧多用烏梅以酸泄不安土之意用常山草果乃劫其太陰之寒兼治以常山極走使一邪不相伴之謂用人參生薑日露薑飲一以固元一以散邪取通神明去穢惡之氣亦一異方

總之久瘧氣餒凡壯膽氣皆可此瘧未必有瘧鬼又恐邪既久深入血分或結瘧母繁甲煎大設用煎方活血通絡可矣

痢

此症乃因攻下之後正氣本虛陽氣欲脫故爾得效病實症而用此方則大失矣余言一概如此老之罪人也

痢疾一症古稱滯下。蓋裏有滯濁而後下也。但滯在氣滯在血。令傷熱傷而滯非。今人以滯為食。但以消食併令禁忌飲食而已。夫瘧痢皆起夏秋。都因濕熱鬱蒸以致脾胃水穀不運。濕熱灼氣血為粘膩。先痛後痢。痢後不爽。若偶食瓜果水寒即病。未必即變為熱。先宜辛溫疎利之劑。若膿血幾十行。病痛後重。初用宣通驅熱。如芩連大黃。必加甘草以緩之。非如傷寒真堅須用芒硝鹹以堅直走破泄至陰。此不過苦能勝濕。寒以逐熱。足可却病。古云行血則便。腹越導利則後重。除行血涼血如丹皮桃仁延胡黑查歸尾紅花之屬。道氣如木香枳榔青皮枳朴廣皮之屬。世俗通食不過如此。蓋瘧傷於經。猶可延擇。痢關于臟。慎治必危。診之大法。光明體質強弱。肌色蒼嫩。更詢起居致病原因。初病體堅症實。前法可遵。久病氣餒神衰。雖有腹痛後重。亦宜詳審。不可槩以攻精清脊施治。聊附記一治驗備者。

施姓子年七歲七月二十三日天久雨陰晦遂發泄濁數次。越日腹痛下痢紅白。延幼科二人調治五六日。至初二日。余診之。嘔逆不食。下痢無度。都是血水。其腹痛晝夜無寧刻。兩脈俱細。右渴欲歇。坐次甚。聞聲乃大恚氣。令其勿進。施云。有一醫在。王先生一商何如。余唯之。入書室索方一醫曰。下利已。采全無精。若非攻蕩去積。無別法可投。余曰。肢冷下血液七八日。痛不飲水。望面色枯白。中極氣黯。脈形細弱。按之不鼓。明是冷濕中於太陰。仲景太陰之法。不不用下。乃急煎人參炙草炮姜歸芍陳皮少佐肉桂二劑。垢滯得下。痛劇大減。繼以歸芍吳功散。參苓白朮散半斤。安。噤口不納水穀。下利都因熱升濁攻。必用大苦如芩連石蓮清熱。人參補胃。益氣熱氣一開。即能進食。人參同生熟之藥用後熱之藥宜。蠶蠅爛頻進二三口。小兒休息久。則變為晝後下血。最難速愈。有因氣弱下陷者。補中益氣。虛寒飲食不化者。錢氏並黃散。濕熱未淨氣分延虛者。清暑益氣湯。胃脾喜食者。豆寒清熱。更節飲食。須善調經月。久瀉久痢。必傷及腎。以腎司二便。也必肛門後墮不已。與初病濕熱裏急下重不同。治以攝陰液或佐疎補。久則純與攝納。亦有外治法。小兒熱病最多者。以體屬純陽。六氣皆人。氣血皆化為熱也。飲食不化蘊蒸於裏。亦從熱化矣。然有解表已復熱

攻裏熱已復熱利小便愈後復熱養陰必清熱亦不除者。張季明謂元氣無所歸者。陽浮則條熱矣。六神湯主之。

秋燥

秋深初涼。辨年發熱咳。狀證似春月風溫症。但溫乃漸熱之稱。涼即漸冷之意。春月為病。猶久藏固密之餘。秋令感傷。恰值夏熱發泄之後。其體質之虛實不同。但溫自上受燥。自上傷理亦相等。均是肺氣受病。世人誤認暴感風寒。混投三陽發散津劫。殊甚。喘急告危。若果暴涼。外束身熱。痰嗽只宜急攻湯。或蘇梗前胡杏仁枳桔之屬。僅一二劑亦可。更有粗工。亦知熱病與。瀉白散加芩連之屬。不知愈苦。助燥必增他變。當以辛涼甘潤之方。兼燥自平而愈。慎勿用苦燥劫燥胃汁。秋燥一症。氣分先受。治肺為急。若延綿數十日之久。病必入血分。又非輕浮肺藥可醫。須審體質。症端古謂治病當活潑。地如盤走珠耳。

翁仲子方數月。秋燥。朝熱。咳嗽如瘧。幼科用發散藥二日不效。忙令禁乳。更醫用瀉白散。更加芩連。二日晝夜煩熱。而不咳。下痢粘膩。藥後竟痢。藥水延余診之。余曰。辨年以乳食為命。當少。食則胃虛。氣餽。肺氣更不爽矣。與玉竹甘草炒廣皮竹葉心一劑。熱緩繼與香梗木南紫廣告甘草沙參二錢。與乳少進。合夜抱勿倒。三日全愈。

冬寒

深秋入冬。暴冷折陽。外感發熱。頭痛身痛。嘔惡。必從太陽。若渴能飲水者。畏熱見症。即非純以表散。傷寒每以風傷衛。用桂枝法。寒傷營。用麻黃法。小兒肌疎易汗。難任麻桂。辛溫表外太陽。治用輕則紫蘇防風一味。身痛用羌活。然不過一劑。傷風症亦肺病為多。前杏枳桔之屬。辛勝即是汗藥。其禁。或湯方通用要。方。若股冷寒。戰。嘔吐。自廁。或身無熱。即從中寒裏症。三陰須分。但小兒科太陰中寒最多。厥陰間有。若冬令應寒。氣候溫煖。當藏反泄。即能致病。名曰冬溫。溫為欲熱之鄉。非寒症得汗而解。若涉表邪。一二裏熱。必兼七八。是癰疹丹痧。非徒風寒。或外受之邪。與裏邪相薄。亦令鬱於經絡。或飲臨厚味。裏熱熾烈。而胃氣不與營分相和。或不正直。內侵。即有腹痛下痢諸症。其治法。按症必以裏症為主。稍兼清散。有諸設用。辛溫。禍不旋踵矣。至於痧症時癰。須分四氣也。

（看三關法）

滑氏云。小兒三歲已內。看男左女右手。虎口三節曰三關。紋色紫熱。紅傷寒。青驚風。白肝病。黃色淡紅。乃平常小恙。

其筋紋宜藏不宜暴露。若見黑色則為危險。再脈紋見下截風關為輕。中截氣關為重。上截命關為尤重耳。直

透二關為大危。

痧疹 痘子 吳音

疹 北音 丹

病屬陽腑經邪。初起必從表治。症見頭痛喘急。咳嗽氣粗。嘔惡。一日二日即發者輕。三五日者重。陽病七日外隱伏不透邪反內攻。喘不止。必腹痛脹。秘悶危矣。治法宜苦辛清熱涼膈去硝黃。

方書謂足陽明胃疹如雲佈密或大顆如痘但無根盤。方書謂手太陰肺疹但有點粒無片字者用辛散解肌。冬月無汗壯熱喘急用麻杏。如華蓋散。三拗湯。夏月無汗用辛涼解肌葛根前胡薄荷防風香薷生姜枳橘木通之屬古人以表邪口渴即加葛根以其升陽明胃津熱甚煩渴用石膏辛寒解肌無汗忌用。

凡瘡疹辛涼為宜。連翹半涼翹散衆草能升能清最利幼科能解小兒六經諸熱。

春令發痧從風溫濕。夏季從暑風暑必兼熱。秋季從熱燥燥氣。冬月從風寒。

此是秘訣

當用清潔專重氣味
外邪之法

此老闆葉首列之但終當深知其病各育農本草亦

身熱不除致咽喉齦腐急腹脹下痢不食煩燥昏沉竟以告斃者皆屬裏證不清致變須分三焦受邪孰多或兼別病累痒須細體認。上焦藥用辛涼 中焦藥用苦辛寒 下焦藥用酸寒。上焦藥氣味宜以輕肺主氣皮毛屬肺之合。外邪宜辛勝裏甚宜苦勝。若不煩渴病日多邪鬱不清可淡滲以洩氣分。

中焦藥承火在中為陽明燥化多氣多血用藥氣味苦寒為宜。若日多胃津消燥苦則助燥劫津甘寒宜用。○下焦藥鹹苦為主。若熱毒下注成痢不必鹹以更堅。但取苦味堅陰燥濕。

古人以痧為經腑之病忌溫燥澆補所謂痘喜溫暖疹喜清涼也。然常有氣弱體虛表散寒涼非法。淹灌成損法。但陰陽為多。救陰必扶持胃津氣衰者亦有之。急當益氣擇年陽虛純剛之藥忘用幼科方書歌括曰赤疹遇

清涼而消白疹得溫緩而解此溫字即後人酒釀檉木粗草紙木棉紗之屬不是此雖不可不知然近年用者多無益。痧疳濕盛熱蒸口舌咽喉膿食若不速治有穿腮破爛咽喉端促告斃矣。治之宜早。外治亦另有耑方。

其普若徒知之經本草得之則其氣味別

終無生見也

小兒外治

之法最多

庸醫惟知

此二家

痘症因時

而變不但

醫代不同

隔數十年

亦有小變

大黃最不胡氏輒投汗下

松江東地多宗秦鏡明

京口江寧咸推管裡保亦

吾蘇志道翁仲仁金鏡錄可謂家喻

戶曉者其取長在首不在乎治

看法精確有可以前知之巧妙後之翟氏聶氏深以氣血盈虧解毒化毒分晰開

揚錢陳底蘊超出諸家因分別太多讀者目眩心憤

不若翁仲仁寫甚悅口也然眼目之功須宗翁氏而案治講

究參之諸家可矣姑舉看法

大凡發熱三日而後見癰是其常即以熱勢參詳見症定其吉凶翁仲仁金鏡

錄甚明茲不復贅其未刻急行補入傷寒邪由外入痘子熱從內起但時邪引動而出與傷寒兩途
週歲小兒初熱即現驚搐昏迷之狀最多世俗謂驚痘最好此言未必皆然方書云先驚後痘者先痘後驚者死頻頻驚厥最多悶痘蓋痘由腎至肝至心脾及肺自裏至外自深及淺未發之前痘熱先已內動目現水晶光芒腎熱也水生火而入心火生土而入脾土生金而入肺其先天痘毒從陰以達陽全藉身中元氣領載宣可先用惡藥傷元充長以化毒為漿心臟厚衰老而始結痂毒已外洩元氣內返斯無變症週歲已內身小元弱常有熱一日即出亦有憤痘但須看神氣靜躁熱勢輕重見點徐徐而出既出即長熱緩安乳便是好症若神氣雖安熱亦不盛痘點雖不多形赤色鈍或作頭項足落脈觸不束筋骨皆由氣血不足毒氣不能外發之故隱隱歎息或短氣如喘或嘔或瀉最多悶痘

若三二日間痘苗已長色亦頗好竟夜終日煩躁不止最防隱處發疔及發斑夾疹等症

一發熱煩躁標點雖見熱躁愈加細詢無忽再參兼症為六氣鬱遏者從時氣治為內傷停滯者從裏症治亦有表裏兩解治亦有下奪者但下法寒涼之中必須活血理氣防其凝滯水伏

初起必三次而出熱止即齊其膿黑亦有陸續發出者須看顏色靈活生氣噴烈轉機變化為要兼形辨症治法用藥表藥活血疏肌次則涼血解毒實熱便閉者微下之虛弱氣怯者忌進疎解寒涼間有虛寒弱隕初發身不能於內外者兼症非明此乃痘中不能

(痘)

痧痢乃熱毒內陷與傷寒協熱邪盡則痢止同法忌升提忌補濫輕則分利宜通重則苦寒解毒

(痘)

大熱四肢皆冷。吐乳瀉乳。痘黑不長。聞聲慙慚欲絕。望色慘淡無形。恰在一朝間。余見程氏女年甫生。齒佈痘極多。痘形粟色淡白。前症送見近地。幼科僉用荆防芳蠍紅花。查肉木通。胡荽。芥尖之屬。方雖寫而示以醫。危延余診視。余曰。毒重氣虛。法在不治。但身無熱。見症虛寒。不因薦氣表邪。馬用表藥。考萬氏始終以脾胃為主。以理中湯加丁桂與服。一劑肢暖嘔止。前症皆虛寒之體。此等藥其效如神。再服利緩。痘起。再用參歸鹿茸二服。以錢氏異功散而愈。凡看痘先論兒體。強弱辨肌色。如色白多氣虛。色蒼多血熱。形容虛有宿病。或渴乳肌柔白嫩者。痘必鮮明。蒼黑皮粗者。色必暗晦。羸瘦病質。色燥形枯。必須辨依期長養內症安和。病軀出痘。即平常無奇。亦難調理。歌訣云。形體羸瘦骨如柴。肌肉枯焦神思衰。遍體鋪排如此痘。縱能舉足亦堪嗟。

一初見腰痛足弱不能起立者死。此毒伏於腎。

一初見腹脹胸高續增喘者死。

一初見目睛無神。或暗無光。或黑白高低。皆屬繫閑症。

一初見痘煩躁不止。即防疔斑疔必現於隱處。多死。

一初見痘不續。發斑色深紫漸變黃黑。六日內死。

一初見痘紫斑漸起痘反隱伏此名紫斑白閑。

一初見痘斑間雜。若似酒硃點墨必死。

已上皆論初見看法。以定凶危。發齊熱退後。皆無諸惡症。翁仲仁云。三日四日痘出當齊。點至足心。勢方安靜。若論幼小之兒。氣血易過。常有未及三日而發齊者。年長之體。四日已外。猶有贈發者。痘子稀少。數不盈百。不必點至足心。仲仁大意謂發齊安靜無惡變症。然須辨明痘形。痘形是何等色。身體強壯。痘屬上中。方可許其無慮。倘幼小弱質。或病後。或帶別病。而後佈痘。未可見痘好。浪許。再以冬夏氣候審詳。可以自知無誤。

今世用方 初見宜解肌疏表通食法

十六味

荆芥

四日不用

防風

三日不用

前胡

三日不用

牛蒡

四日不用

紫草

便得忌

本通

紅花

甘草

赤芍

天蠶

查肉

川芎

連翹

桔梗

廣皮

蠍蟬

三四日不用

方書中未見點用升麻葛根湯此是開宗第一方。今人不用伍氏方法。見點忌升麻。後人謂葛根表疏亦忌此輕揚升表。

通壅築。若裏症急須兩解。伍氏方。二日羌防透肌湯。今人不用。恐其辛溫氣雄也。二日壯熱氣促。煩渴便秘。痘粒不發。翁仲仁云。若非風寒壅遏。定是氣虛不振。愚謂近世佈痘。每盛發於君相風木燥金司令。蓋非火不發也。火鬱發之。升陽散火是

已但前痘若裏熱甚重煎灼脂液苟非苦寒下奪佐以升表不能用也。貴建中方頗為中的。石膏 大黃
連翹 赤芍 青皮 腹痛用 薑肉 花粉 紫草 木通 丹皮 入血 幸角 辛涼 通血 前胡枳殼湯 四順清涼飲

凡寒涼清火解毒必佐活血疏暢恐凝滯氣血也。實熱便祕通用涼膈通聖前胡枳殼湯四順清涼飲
痘四日發是伍氏遵古方用牛蒡熟末三分用荸薺汁酒釀燉熱調少臨服刺人生雞冠血十餘滴與服毒輕者
即起光潤之色世醫宗之

發齊已四五日用涼血解毒湯藥伍氏名四聖飲非扁鵲原方

生地

純是涼血之品

連翹

銀花

紅花

甘草

天蠅

桔梗

紫草

便滑用

血熱加丹皮

幸角

火盛加

黃連

石膏

羚羊角

有斑加金汁

元參

頭面不起加川芎

雞冠血

咽喉痛加射干

元參

山豆根

狂亂躁

擾加地龍汗

毒重加

猪尾

血水片

量兒大

近世涼血解毒多用地丁

銀花湯煎藥

凡有痘初起要根盤其痘易長綻倘尖瘦不肥多險成漿之後務要根盤即化一線圈紅緊附頂滿滾圓是為
毒化若頂陷頂破根盤點殖其毒與血氣交凝實宜攻虛宜補

實火宜清攻不宜早首末火色大赤痘形色濕潤方可攻托否則搔擦立至乾剝毒陷不治

虛有血虛氣虛之分血虛為熱氣虛為寒但虛熱與實熱不同虛熱用滋清方藥

痘頂屬氣根盤屬血氣領血載毒係煅化漿凡體強質實者多火以清涼之劑火解漿成候補則癰癰者壅也。
其氣虛血弱色必淡白形不雄偉或頂陷或皮皺內症則惡心少食便溏年少未進穀食者腸胃薄劣最多虛症
七日以來元氣用事不能勝毒使之外出多有內陷致變者余最究甚是症調之應手取效魏氏保元湯蟲氏參
歸鹿草湯陳氏木香異功散腸滑不禁用七味豆蔻丸白朮散理中湯多獲奇效甚者必用三服

大凡兒肌白嫩者多虛症蒼黑者多實火雖為大槩亦屬至要白嫩發痘色必鮮豔勿謂便是喜痘蒼黑發痘色
必晦昧勿便許為之總以神氣安靜顏色日換形象漸長便吉

六七日伍氏內托散

生黃芪 甘草 陳皮 川芎 當歸 白糯米 防風 天虫 角刺 銀花
血熱者不用黃芪歸 表疎者去天虫角刺 血熱仍用丹皮地黃紫草連翹羚羊豬尾雞冠雞鳴散散表
之藥 保元湯 人參 黃芪 矢草 加川芎當歸名芎歸保元 虛寒加肉桂 升頂加鹿草

氣滌正氣加廣皮厚朴

鴻加不香肉果

質弱加坎炁河車

嘔逆加丁香厚朴

參歸鹿茸湯

人參當歸

鹿茸

黃芪

龍眼肉

羨草

木香散

人參木香

丁香大腹皮

桂心青皮

訶子牛夏

甘草前胡赤茯苓

異功散

人參木香官桂

廣皮當歸

茯苓丁香白朮

附子肉桂

厚朴牛夏

荳蔻丸

肉果木香砂仁

枯礬訶子

龍骨赤石脂

白朮散

四君加藿香木香

七八九日頻用清涼痘火色既退漿不能透或有半漿頂有箬笠之形不克充灌今人多用桑蠅漿生用難冠血生用同酒漿和服倘攻起少項後呆滯者須用補託

伍氏攻發藥用老人牙齦研極細加麝香少許每服二三分名黑靈丹

右天蠅乃殊表風藥

山甲乃攻經隧風藥一味為末酒漿服曰獨勝散

凡蟲蟻皆攻無血者走氣有血者走血飛者升地行者降凡漿足聲音啞者不妨驟喘疾升者大忌翁仲仁云挫

喉聲嘶漿行飽滿亦無妨蓋痘漿因熱氣以煉成必升騰以達頭面肺爲最高熱上蒸迫肺先受損是以聲出不揚倘喘急扶肚擡胸乃火毒歸肺必不治矣

火毒歸肺幼科每用珠子牛黃膏連之屬多不效余遵孫真人

葦莖湯或仲景草薢太麻湯間有效者肺氣壅遏苦寒直下已過病所故無效

方書以六七日已前寒戰屬肺六七日已後咬牙屬胃熱六七日已後咬牙屬血虛亦屬寒論

八九日瘡塊咬牙痘不起漿或灰白或涸危險極矣速速溫補亦可望生翁仲仁云塌陷咬牙便實聲清猶

可治聲清則上無熱壅瘡聚便實則腑陽未至盡洩所以溫補得效耳木香散異功散

八九日順痘漿色蒼黃毒氣迷化亦云垂成須謹防蘿持搔損流膿裂血倘正氣大泄毒從虛陷常有不治之患

斯時須嚼伴毋勿解使加鑿乾結肌肉完固便是全功若痘已破碎聲不啞者毒不陷也無妨

伍氏方用芍藥湯炒白芍

苡仁茯苓地骨皮

銀花百合

山藥建蓮

十一二日漸次成痂之際極好之症必有咳嗽或夜暮身熱世俗幼科僉云毒氣未盡聚投苦寒多有胃感發食

已過病所
喉中痰足
聲亦高
須參之

釀成痘勞童怯者。吾嘗論痘。自腎臟骨髓之中。由肝主筋心主血脈脾主肌肉肺主皮毛。從內之外毒乃涣釋收疤之時。真氣歸裏。肺合皮毛。是為未傳。處位高體清肅。從前灌脹成加蒸迫之氣。受虧已極。氣泄為咳矣。况投利濕下注藥而結痂。其上焦已經轉燥。若毒仍留伏焉。能收瘧也。斷然也。再論幼科。陽常有餘陰未克長佈。痘至於結痂。一身脂液大損。其陰氣告匱可知。故暮夜屬陰時為煩為熱者。正內經云陰虛生內熱也。昔西郊吳氏女年甫四歲。痘係順症。幼科調治至漿滿成痂之日。忽然煩燥夜熱不寐。晨起安然。醫用保元及錢氏五味異功加芍藥與服。熱躁益加。又更一醫。曰毒氣未盡。方悞補之。故用桑蠶漿。暨涼解藥。服後躁熱甚而添泄濁。邀余視之。觀漿痂形色。詢平素起居時日。當午即用六味地黃湯。一服而安。兵之服。所謂養此二條人多忽而不究。故辨及之。

旬朝後。啜大法以甘寒生津。胃藥。蕉漿。麥冬。沙參。菜豆皮。地骨皮。甘草。玉竹。甜杏仁。

解餘毒藥全以不傷胃氣為主。若用芩連。必須酒製。翟聾二氏辨之詳矣。平和無奇。斷不敗事。如三豆飲之屬。若

金銀花一味。本草稱解毒不寒。余見脾胃虛弱者。多服即瀉。伍氏用連翹飲子。亦取平和。痘毒癰癟熱症。十

有七八虛寒。十有二三。甚至骨出腐敗。亦有愈者。但外科大忌。用火煉升藥。其診省之法。亦如瘡毒須分陰陽耳。

痘瘡濕盛生熱。強者用苦寒清降。以苦能去濕也。若阻咽廢食。以及穿腮破爛者。難治。

年長出痘。男女慾火已動。其初即現膝痛腰痠。咽喉室痛欲閉。苦辛寒藥必不效驗。宜甘鹹寒滋水制火。佐以解毒。六七日來。痛勢日緩。聾氏有參參清補方。余每用錢氏六味加龜膠元參秋石。獲效者甚多。若漿不肯起。頻吐粘涎者。山凡惡痘。山危瞬刻。如諸悶症。不過三五日。已發而縮。其危最速。總在七日內。再若蒙頭鎖喉懸鏡。蹉跎蠶窠。蚕種等為十惡症。今人未嘗齒及。如此等痘。治之無益。徒招怨尤。更有糖沙夾班。十朝危期。又根枝雖好。佈於歲內。幼小之兒。必入九風波不治。半漿毒陷之變。必斃於一二四之期。若能食者。十救一二。痘至八九旬日外無漿。則裏毒不化。必倉噬搔癢。痰潮不食。眼開條欵。難以盡言。危期速矣。常有忽然連串片片之痘。裂水形如松脂桃膠外露。轉眼堆聚。內症漸安。變山轉吉。更有旬朝內外乾板涸如焦鍋巴狀毫無生氣。忽從地角承漿。諸處裂縫流臭水。漸升頭額。堆腫高厚。若糊臉。名曰發臭毒池。即當補托。遲則氣脫。

小兒倉猝驟然驚搐古曰陽癇從熱症治古人用涼膈散為主方。

按急驚屬陽熱病用涼膈以清膈間無形之熱膈上邪熱逼近膻中絡閉則危殆矣此宣通乃一定之法然必詢病因察時候治之幼科以疾熱風驚四治猶可說也吾鄉有耑科立方鈎藤連翹不通薄荷前胡枳殼桔梗加入表散消食多不效驗驚為七情內應平肝肝病發驚駭不強火熾其病動不能靜且火內寄肝膽火病來必迅速後世龍奮參連必加冰麝硝黃取其苦寒直降鹹苦走下辛香通裏竅之閉也如牛黃丸至寶丹紫雪皆可選用凡熱邪塞竅神迷昏憤者做此鈎藤丹皮之屬僅泄少陽膽熱與急驚暴熱內閉之症無益若火熱劫爛血液苦寒鹹寒不中與也宜用牽角地黃湯之屬方書有鎮墜金石之藥有攻風劫痰之藥雖非常用不可不考

驚與厥皆逆亂之象仲景云蛔厥都從驚恐得之未見凡吐蛔腹痛嘔惡明是肝木犯胃幼醫亂治束手告斂余宗仲景法每效慢驚古稱癇其治法急培脾胃理中湯為主方煩卦有疾嘔吐用南星白附子六君子湯聲音不出閉竅如竹瀝薑汁菖蒲根鬱金之屬

是病皆他病致變其因非一有過飢禁食氣傷有峻藥強灌傷胃有暴吐暴瀉脾胃兩敗其症面青胱白身無熱雖熱不甚短氣骨瘦昏倦如寐皆溫補治之惟嘔逆不受乳食溫補反佐薑連連理湯錢氏益黃散

錢氏異功散

產過自愈者實有此事理不可解。年五疳猶大方之五勞雖方書有五臟之分是症夏令為多固從脾胃蓋小兒乳食雜進運化不及初斷乳後果腥雜進氣傷滯聚致熱蒸於裏肌肉消瘦腹大肢細名曰丁奚或善食或不嗜食或渴飲無度或便瀉白色久延不已多致凶危且忌生冷腥肥凝滯治法初用清熱和中分利次則疎補佐運常有繼病治之無效待姪婦不盡然却竟有此病

夏季霍亂吐瀉通用藿香正氣散水瀉宜分利四苓散寒加薑桂熱用芩連

腹痛宜疎氣調氣用木香青皮有滯加炒杏肉厚朴重則加茱萸子枳榔

吐瀉後能食便反秘結者愈不能食神怯色痿者防慢驚治法調中溫中若有餘熱煩渴甘寒或甘酸救津故木

小兒為孕
婦所抱則
生繼病雖
不盡然却
竟有此病

心之酸制暑通用要藥

春溫風溫

春月暴暖忽冷。先受溫邪。繼為冷束。咳嗽痰喘最多。辛解忌溫。只用一劑。大忌絕殺。若甚者。宜晝夜堅抱勿倒三四日。夫輕為咳。重為喘。急則鼻掀胸挺。

春溫皆冬季伏邪。詳於大方諸書。幼科亦有伏邪。治從大方。然暴感為多。如頭痛惡寒。發熱喘促。鼻塞身重。脈浮無汗。原可表散。春令溫舒。辛溫宜少用。陽經表藥最忌混亂。至若身熱咳嗽有痰之症。只宜肺藥。辛解瀉白散加前胡。牛蒡。薄荷之屬。消食藥只宜一二味。若二便俱通者。消食少用。須辨表裏上中下。何者為急。施治。

春季溫暖。風溫極多。溫變熱最速。若發散風寒。消食劫傷津液。變症不速。初起咳嗽喘促。通行用薄荷。

連翹

象貝 牛蒡 花粉

桔梗 沙參 木通 枳殼

橘紅 桑皮 甘草

山梔

泄濁不用

蘇子

濁氣不用

表解熱不清。用黃芩。

連翹 紫皮 花粉 地骨皮

川貝 知母 山梔

裏熱不清。早上涼。晚暮熱。即當清解。血分久則滋。清養陰。苦熱陷神昏。瘡升喘促。急用牛黃丸。至寶丹之屬。按風溫乃肺先受邪。遂逆傳心胞治。在上焦。不與清胃攻下同法。吾鄉幼科當此初投發散消食。不應改用柴芩公裏枳實川連。再下奪不應。多致危殆。皆因不明手經之病耳。

若寒痰阻閉。亦有喘急。胸高不可與前法用三白吐之。或妙香丸。

暑熱

暑邪必挾濕。狀如外感風寒。忌用柴葛羌防。如肌表熱無汗。辛涼輕劑無誤。香薷辛溫氣升。熱伏易吐。佐苦降。如杏仁川連黃芩。則不吐。宣通上焦。如杏仁連翹薄荷竹葉。暑熱深入。伏熱煩渴。白虎湯六一散。暑邪首用辛涼。繼用甘寒。後用酸泄飲津。不必用下。

暑病頭脹如蒙。皆濕盛生熱。白虎竹葉。酒濕食滯。加辛溫通裏。

小兒發熱。最多變蒸之熱。頭緒煩不能載。詳於巢氏病源矣。然春溫夏熱。秋涼冬寒。四季中傷為病。當按時論治。其內傷飲食。台法不宜混入表藥。消滯宜用丸藥。潔古東垣已詳述。

補

卷六

病疹

痘

三三

辨疹

辨痘

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

辨

袁 辨疹 温邪疾。喉氣喘。肚脹。四日不解。防發砂。連翹。山梔。牛蒡。杏仁。石膏。

留肺。熱邪。內陷。滲邪。毒火。毒消。風疹。見點。瘡。痘。疹。

汪 辨疹 炒將退熱。未去肺氣。不清。咳逆無痰。前胡。桑皮。杏仁。橘紅。桔梗。木通。蘇子。象貝。某溫邪發痧。不透。毒內陷。深藏。上薰肺。為喘下攻腸。則利皆冬溫火化之症。經云火淫於內。治以苦寒。幼科不究病本。不明藥中氣味。愈治愈劇。至此凶危。川連。黃芩。飛滑石。炒銀花。連翹。甘草。丹皮。地骨皮。

蔣喘為肺病。張乃肝病。因時疫寒熱未解。熱邪內陷所致。王先生用苦辛酸法極通。然浮腫腹痛未減。得非經腑

之濕熱留著。敗木所忌。石膏。杏仁。大豆苗卷。通草。苡仁。連翹。

艾 辨疹 痘退後。伸吟不肯出聲。涕淚皆無。昏蒙撤腫。乃毒火未經清解。上竅漸閉。氣促痰鳴。猶是溫邪客氣。至此自當

清解務盡。其神色自和。奈何以畏虛滋肺邪火愈熾矣。川連。元參。杏仁。甘草。黃芩。連翹。桔梗。銀花。

王癰後及暮加喉痛。咳。元參。犀角。鮮生地。連翹。花粉。丹皮。

鄒咽痛。鼻塞。脣腫。自利。風溫熱化。發於上焦。熱熾。宜辛涼微苦以泄降。

連翹

黃芩

元參

通草

桔梗

譚六溫邪時癟觸目口鼻。穢迷。遊行三焦。而為麻疹。目赤。鼻燥。吐蛔。渴津津汗出。而喘渴欲飲。當與半黃寒。劉河

間法。世俗不知僉曰發所。但以荆防蠅殼升提火得風膈。燭烈莫遏。津劫至變矣。涼膈去硝黃。加石膏牛蒡。亦

張三手足煩熱。時發赤塊。菉豆殼。捲心竹葉。

痘

瘡

疹

痘

瘡

疹

痘

瘡

疹

痘

瘡

疹

痘

瘡

疹

痘

瘡

疹

痘

瘡

疹

程見點。若隱若現。神倦不寧。或如悶。伏表裏俱不宣暢。雙解固宜。再佐以芳香搜逐。使蘊伏之毒透發為主。紫雪

周熱閉心包絡中。目痏口開。舌縮兩手撮空發瘧。渴通便濇。血分太傷。九日險期。按法圖倖。急與紫雪丹一錢。開

水調緩緩下用茶飄。倘得神甦。痘方有生機。

又神醒舌絳。苔音縮。渴飲不已。心胞熱閉難開。而在裏脂液已涸。古人以心熱消渴。多係臟陰現症。不可攻奪明矣。鮮生地。竹葉心。元參。和母。銀花露。金汁。先用紫雪一錢。