

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第四八冊



魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB66/02

四庫全書存目叢書·子部四八

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 43.125 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四八冊目次

子部·醫家類

醫案五卷附諸家贈詩文一卷

〔明〕孫一奎輯
中國科學院圖書館藏明萬曆孫泰來等刻本

一

折肱漫錄六卷

〔明〕黃承昊撰
中國科學院圖書館藏明崇禎刻本

二〇五

鍼灸聚英四卷

〔明〕高武撰
中國中醫研究院圖書館藏明嘉靖十六年陶師文刻本

二五五

鍼灸節要三卷

〔明〕高武撰
中國中醫研究院圖書館藏明嘉靖十六年陶師文刻本

四〇一

簡明醫殼八卷

〔明〕孫志宏撰
中國中醫研究院圖書館藏明崇禎三年刻本

四五七

醫案五卷附諸家贈詩文一卷

〔明〕孫一奎輯

中國科學院圖書館藏明萬曆孫泰來等刻本

附《四庫全書總目·孫氏醫案

五卷》提要

孫君醫者... 出方首... 變者不廢... 謂譜與圖... 意則在矣... 皆古所稱... 化諸人載... 人不朽計... 而知意也... 於時者多... 其傳又或... 不用夫豈...

獲之虫未必灼有定見推陸之舟
不無異於古今與則遺案與用案
者均失其意矣新安孫君東宿以
醫著名既刻有赤水玄珠醫旨緒
餘諸書其子濟孺復集君所常治
症以為案余觀其書巧發而奇中

序

二

用意甚精誠有得乎倉扁元化之
遺借有良史如子長承祚輩其必
有采焉可知也然余猶冀之人師
君之意毋泥君之案庶無推舟於
陸乎則君之案不獨濟其所已濟
者矣

賜進士出身中順大夫太常寺少
卿唐鶴徵撰

序

三

生生子醫案序

周禮姬公治書也醫方技耳而列之天官
冢宰以何說哉蓋天生之者也天能生之
不能使有生者盡尊其生則生之權於
是乎窮所以斡旋生理而佐化育所不逮
者不得不寄於醫之代天者也故炎帝也
而本艸軒岐也而靈素伊尹也而湯液皆
承天好生之德而立天下萬世民物之命
顧天所以生之者惟是陰陽動靜之氣變
化順逆之機燥濕虛實之宜而長桑家生
生之方皆原於是苟識不能探其玄且不
能達天而惡能代天善乎孫思邈之言曰

不知易者不足以言太醫也新安有生、
子又垣者博學典籍剖生剋如列眉固已
登瀛洛之堂諸如柱下檀林全生脫生之
旨靡不收為鼓吹之用以故獨觀妙竅而
診治之奇駕和扁而軼其上有敵三吳間
舊矣余每見徐太史檢老輒嘖、生、子
生、子云余竊私心嚮往追戊戌南還適
有天幸值孫君起吳宮詹疾見其囊中宛
歎若發意又有神物索之果得醫旨緒餘
赤水玄珠二書展卷讀之命門右腎之辨
詳而確也十二經三焦之說暢而明也緣
症投劑之方精而當也而尤精於相火一

經夫火者天以之生物人以此生身此生
生之大者也論者不翅聚訟有認陰火為
相火者矣有以五志之火為相火者有以
龍雷之火為相火又分天火為相火人火
為君火者矣夫地二生火天七成之陰亦
為主何言相也指五志則混君相其失也
序
禱言龍雷則專肝腎其失也偏分天人則
隔君相其失也又支離決裂惟心一動而
萬火奔馳心君也十二經中包絡三焦相
也君至尊居中主火之令相守位列外稟
火之命所謂君行意相行令者也經不云
乎君火以名相火以位君相之名羨誠千

古未護之奇也斯論出而孫君生之意
始與火傳而不蓋者乎聞其生平臨症彈
精研慮如梓人之削鑿非譽巧拙不以間
如文人之承調天地萬物不以易圭匕之
授得心應手而又隨診定方緣方立案筆
之於帙以為後日參考地彙為六卷名歷
序
七
驗醫案余方傾注一日其季君濟孺甫出
以示余曰此家君終身苦心也不肖兄弟
得付殺青公生之意于天下萬世微先
生一言為重余受而翻閱見其認症又合
色脉問動止聆音聲嘗飲食投劑則按寒
暑回虛實定君臣佐使之宜協七方十劑

之妙誠可羽翼素難與緒餘玄珠並行於
世亦鼎足之奇也天有生、之權而生、
子代之天有生、之理而生、子洩之於
以列天官何忝焉今以春秌高不能跋涉
其季君濟孺甫紹明其家學於荆、之老
稚生死而骨肉醫濟孺是賴是生、之機

序

九

相禪於不窮矣余雅重其人掇拾三書大
旨獨詳相火之論弁於簡端以發明其生
生之心云

歲在己亥

賜進士第中順大夫奉

勅整飭貴州思石道兼撫苗夷按察司按

察副使路雲龍頓首序



序

九

刻生生子醫案序

余閱生生子醫案益知其本體
圓融真機流暢功德廣運無盡
無邊也何者天地以生生為大
德人含靈而參覆載者以生生
為真機脫若逐境附物障蔽靈

序

十

源則德虧而機塞將人我山高
聖凡海濶徒為宇宙一餘贅焉
爾文垣性成竒穎脩葆精深照
體獨立物我皆如往侍門牆與
談名理當下了悟軒透玄關妙
本全彰精光昭徹以彼正覺詮

契軒岐故能洽靈秘於心源融

素難於方寸驅彼離朱明索罔

象高超名相迥出古今冲虛一

念徧滿十方直可媿休和緩踵

美越人又何論張季王劉彥脩

櫻寧輩也始鑄醫旨繼刻玄珠

序

十

余謂其真蒞前指之金鑰正後

學之南車茲又舉生平已試之

成效授之剞劂示人人而傳在

世計文垣刊布豈市名高其博

愛公心謂一人所濟者狹不若

使人人濟之者著也譬彼日輪

高揭明晦同光河源分透遐邇
並潤其心生生不息者將與天
壤同敝乎余撫卷而三嘆賞

郡人潘士蒸去華甫撰

序

十二

刻生生子孫文垣醫案序

穆林稱之不朽曰太上立德其次立功
其次立言其論固矣嘗試思之則有說
焉夏乎太上不可及也其所謂次者豈
必勛樹國家伐勦彞鼎而後謂功有能
起疲瘵澤蒼生即功也豈必典謨訓誥

序

十三

定保明徵而後謂言闡理寔覺來茲
即言也析之而究之一也何也夫底蹟
之謂功舉其蹟而紀之冊功忘言也脩
詞之謂言據其辭而措之行言忘功
也庸詎知功不可為言言不可為功
乎孔門弟子獨顏閔以善言德行稱

出獨見而著醫旨輯試方而成玄珠命
門有圖相火有辨三焦包絡有說十二
經名義無不精詳發群賢未有之論
破千古未決之疑治言述之古不為
襲舊治法酌之已不為師心江左之顯
貴隱約間右窮櫛鬢惟文垣是賴此
序
之為功直一手一足之烈哉所全活者
多矣不可不謂之功今茲復造諸摺
紳文學之請以歷驗之成案板之與醫
旨玄珠並行於世三書言旨鑿之可
法謂之立言非溢美矣夫以治之奇
中者成之案緣其著之論者施之

六以得于心而見之行此非功其言合
一之徵乎孫文垣氏習儒駸有偽聲
矣以尊人病痺迺徙孔孟而拜軒岐淫
事之始即念業不以出乎衆為心曷時
而能出乎衆哉衆醫衆矣吾不願淫
衆而卑之執方為也彼夫人之承綢若
撮之者何以故專一故也於是墮肢體
黠聰明解心釋神而大同乎溟滓用能
妙契素靈機洽倉扁下而張李王朱之
屬靡不咀英獵華而融會其神髓因以
得于心者運之治察脉辨症輟應手
而奏奇功聲名鬱勃起吳越間矣已


行功言立矣即未能望太上之閭與
謂之尚德哉若人非耶文垣其志可
以不朽哉余故知其心於濟人而又
嘉其志于公物用次數言以弁之
首云

文林即知將樂事眷弟汪文璧

序

其六

升圖甫撰



族叔生生子醫案小序

族味生、扶靈素之秘挾其術而周
遊江左治輟奇中聲稱鬱勃起吳越
間揆厥繇蓋臨症彈思務以己之精
神通於患者之精神對病投劑匪苟
然嘗試漫為也即舉冊而筆其症跡

序

其七

治法以為後之參考計積三十餘年
案牘篋笥諸摺紳往、欲授梓人以
公三下叔願自視歔然不欲自炫而
至矣見所譜公屢書督成之謂君昭
敏理真鑄鑄古今著論可羽翼軒岐
而覺後學仁者以博愛為公君生平

仁心為質而亟濟人布其法之已試者傳之後所濟不尤奢乎若梓工余則指俸任之無預君也不佞燁因從旁贊之曰古人成一家言類藏之名山以托不朽味於載籍未有之病機與衆人望之而卻走者皆得手應心

序

六

起之即以天下後世為藏室何不可者柰何磴々乎持已見而重遠諸薦紳之請也春秋且逾者何清難俟與其徒著之冊而托之空言孰若身親見人習而見諸行事者之為實哉味始因余言而翻然首肯迺其二子泰

來朋來欣々色喜々此不肖兄弟子職所當盡者曷敢以瑣瑣溷潘大夫暨諸公為用眩眩僅得十之二三以付剞劂不佞獲從事校閱作而言曰嘗讀史司馬子長傳太倉令高矣第叙其察病之精而治法未詳近猶名

序

五

公傳世醫文接子長之統古矣而論症與治似有差池今生々子所記歷驗之案色脉病形較若指掌綠病立方確如金石脩詞或未入二公之室迺成案則鑿々乎補前賢之未備為後來之金鍼也世之從事此業者服

而習之其有益於民生非渺小矣亦
亦可托之不朽哉不佞次其銀梓之
由如此觀者認之

族姪燁元素頓首

二十

孫氏醫案序

孫長公東宿先生蚤業醫名江以南
邑國逢迎結轍相望長公常為醫首
錄餘數十卷懸之國門已考前言搜
往牒為赤水玄珠數百卷遞行于世
醫家者便為而長公意不但已太矣

序

世

公之傳倉公靈扁也于病者主名症
候脉理藥物詳焉蓋其重哉由今而
考之則病不必讎脉藥不必讎病方
亦不必讎藥豈古今氣運之異南北
風土之殊其礙戾而賅格者然乎哉
不佞早業醫日治病拊脉之息以踵

也。咬咀之精以春也。毋敢安庸而輕自用。尚切則精神通病者。佐使則損益。準先民語。功效毋能居十。令語註誤。毋敢措一失。乃今踰耆而指使老矣。概其生平而畢藉之。其人可考而原其脉。可按而覆其方。可悉而教民。

序

世二

命亦大矣。豈嫌伐一時事。不以生後人而失當世。嗟乎長公之用心良勤且篤矣。夫醫家上軒岐而下四氏。比之儒術。六經有家。其難均倍。業者終如祇事剽竊。甚或師心自任。倣古者而托無能。其不及于殆者。幾希何所。

病之為不徵也。病之木症。無刻變化。日久与病俱而後無病。視病以藥用而後無藥。故偃立而白首在門。貌榮而却視。反走彼其按圖而坐。索執方而莽求。其不及於殆者。幾希何。病之病不習也。長公故由傳德醫。

序

世三

軒岐四氏之書。窮二酉而徼千古章。櫛句比表。契心通足。則吾能徵之。殆每間然。舞象而醫手之拊人。脉多于握七箸。咬咀之積。若丘陵然。以病者霍然已。不病者霍然已。不習無不利。于長公何多耶。余常法長公。

從子元素叙醫有以法餘而多其操
原乃今所籍則成案矣語有之醫者
意也得法者亡法案于何醫夫匠氏
規矩宮室所先漁獵筌蹄魚兔是獲
夫非所可案者哉閔睢鱗趾之意周
官攸行皆此類耳是案行詎惟長公
之功醫家与法醫家之功天下者俱
不淺也不習為吏視已成事殆謂是
乎元素躍然曰余從父之覈案也不
知者以為任德施也知者以為博名
高也知者哉生之心為養生主
子得之矣乃屬剞劂載之首簡以布

海內

養生程洵巨源父拜撰

應龍刻

醫案三吳治驗一卷目錄

萬曆龍飛二年吳小峰小川目疾一

萬曆甲戌沈中丞案二

張孝廉後渠大頭疫三

吳江孫行人痛風有發明四

鄭都諫公子痘有發明五

張文學子心病虛弱有發明六

大宗伯董潯陽翁脾胃疾有發明七

董龍山夫人便血八

三吳目錄 八一卷

馬厨瘡痢併發有發明九

吳肖峰令政腰痛有發明十

大光祿龐太夫人寒熱頭痛飽悶十一

光祿公痰火脇痛有發明十二

張思軒夫人心痺有發明十三

馬迪庵公內傷腹脹大小便不利有發明十四

潘大司馬腸風十五

馬鳳林內子隱疾有發明十六

舜田臧公氣虛中滿十七

金谿令君臧老夫人頭疫有發明十八

潘見所公半身不遂有發明十九

見所公白濁有發明二十

凌夫人孕二十一

金元岩令眷產後痢二十二

沈別駕夫人產後發熱有發明二十三

吳太夫人白帶二十四

吳北海令政經行四肢蠱又發現紅紫二十五

周芻王白濁二十六

三吳目錄 八一卷

竹匠婦妊娠吐血胸腹脹痛有發明二十七

李妓夢遺咳嗽二十八

金妓時疫二十九

曹鑑胸膈不暢三十

李發痛風三十一

沈別駕門下老僕三陽合病有發明三十二

蔡中林內人陽明少陽合病有發明三十三

吳九宜先生早晨泄瀉三十四

沈大官左膝腫痛不能起止三十五

沈繼庵下痢脫肛 內人乾霍亂 三十五

沈晴岳先生五更耳鳴 三十六

潘景宇內人頭痛作瀉 三十七

臧六老上吐血下瀉血 三十八

臧氏婦臍邊痛下痢紅白 三十九

丁耀川令堂吐血左髖肛門互換作痛 四十

丁文學令姊暈厥 四十一

金良美咳嗽吐紅潮熱右脇不能卧 四十二

倪五娘子口眼歪邪 四十三

王祖泉令政頭痛惡寒汗出如兩 四十四

温巽橋子婦滯下 四十五

温一渠內人血虛咳嗽 四十六

温巽橋二令媳產後右脇脹痛白帶如膿 四十七

温天衢病目吐血 四十八

張二娘子孕七月嘔吐不止 四十九

王敬泉內眷痰嗽腹脹 五十

温南溪內人大便秘結 五十一

陳春野公令愛丁美痘症 五十二

三吳目錄 八一卷

潘敬空令媳血下筋膜如手大者一二桶 五十三

張懷赤公早晨洩瀉下元虛寒 五十四

臧七房二老夫人痢 五十五

蔡樂川令眷頭痛如破 五十六

周蘆汀廼眷胃脘痛 五十七

田

醫案一卷

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人余煌

子泰來

朋來

全閱梓

三吳治驗

萬曆龍飛二年。小春月予始遊茗之東雙林。於時族兄吉泉之友吳小峰。與其弟小川。俱病目。專科者愈治愈重。其目始紅腫。次加大太陽痛。繼則

三吳一卷

十一

白星翳叠出。予不以目科名。而識者稱予大方。因謀於吉泉曰。醫以通變為良。昔秦越人過邯鄲。聞貴婦人。則為帶下醫。過雒陽。聞周人愛老人。則為耳目痺醫。聞東宿君國手也。必能隨俗為變。願一言去吾兄弟目疾。吉泉邀予。余曰。嘉

地。毋遂。胗其脉。小峰之脉濡而緩大。兩目血縷

直貫瞳人。薄暮則疼。小川之脉皆洪大。鼓指。黑

珠有浮翳。瘻隱澁難開。大小便皆不利。故於小

峰用補。先以清肝散與之。夏枯草五錢。香附四

錢。甘草一錢五分。細茶五分。以徹其痛。藥兩進

而痛止。繼用人參白茯苓熟地黃枸杞子桂心

牛膝破故紙白芍藜牡丹皮。服八日而愈。於小

川用瀉。內用瀉肝湯。及當歸龍會丸。外用象牙

冰片為末點之。七日全愈。其尊君我峰翁喜詣

三吳一卷

二

予曰。二日均病。年同齒。染同時。諸醫同治而同不愈。先生一補一瀉。而二病均愈。何哉。余曰。此陰陽虛實之辨也。經云。實者正治。虛者從治。令姪之症。惟厥陰肝火熾盛。肝嘗有餘。有餘者瀉之。正治也。即君下虛。又為怒所激。怒則火起於肝。肝為藏血之地。故血絲貫瞳人。而薄暮作痛。方用夏枯草香附為君。疏其肝氣。經云。肝苦急。急食甘以緩之。故用甘草為臣。茶能清頭目。用以為使。先為去此痛。經又云。水流濕。火就燥。故

復用甘溫補其下元之虛。俾火得歸原。此從治也。若用苦寒降火之劑。不惟血凝而痛加。抑且激其火而使愈熾矣。我峰聞之。語人曰。孫君本陰陽而治寒熱。是用易為醫也。故補者補效。攻者攻效。語曰。不知易者不可以為太醫。孫君神於易。而於醫乎何有。願於吾茗懸一壺也。余哂之。謂昔韓伯休且不欲人間知其名。余又何壺之可懸哉。

萬曆甲戌。其年自仲秋徂冬。瘡子盛行。三月內。予

三吳一卷

三

所治男婦嬰孩共七十二人。茗之望族沈最著。大中丞觀頤公當考功時。幼君瘡。喘嗽不寧。鼓啞發熱。洩瀉。斑紫不斂。予以小無比散愈之。夫人姓。腹痛昏厥者五日。名醫如高陳二公者。沈姻婭。無巨細悉任之。亦不能措手。予至診之。兩手脉皆洪大。法當下。眾僉以姓難之。予曰。經云。有故無殞。亦無殞也。姓已九月將解。即胎動奚傷。若當下不下。不獨其痛難忍。而變且不測。考功是予言而請藥。予即用小承氣湯加蘓梗砂

仁下之而安。考功偶冒風。頭痛倦怠。發寒熱如瘧。脉浮絃而數。予曰。此小柴胡湯症也。一劑而瘧考功請告家居者二十年。篤好方書。予初之茗。茗人未知予。考功聞予。亟欲識之。謂予治病甚奇。又與予論傷寒。痘疹胎產皆中窾。深然之。語人曰。良相良醫等爾。如孫君所詣。即千金不足為其重。特譔醫說書於冊。以不朽。孫君云。二張孝廉後渠。丁年患大頭瘰。頭大如斗。不見項。唇垂及乳。色如紫肝。昏憤不知人事。見者駭而走。

三吳一卷

四

其年疫甚。瘡人畏傳染。至廢吊慶。張與考功公子同受春秋於會稽陶春源所。陶邀予診之。其脉皆浮絃而數。初以柴胡一兩。黃芩玄參各三錢。薄荷連翹葛根各二錢。甘草一錢。服三劑。寒熱退。絃脉減。但洪大。予知其傳於陽明也。改以貫衆一兩。葛根天荅粉各三錢。甘草一錢。黑豆四十九粒。一劑腫消其半。再劑全消。漿粒不入口者二十一日。再與小柴胡湯兩劑。服之。始納乾糕如指者兩條。次日進粥而漸平矣。丁酉秋

關報捷三

吳江孫質庵老先生。行人時患痛癢。兩手自肩顛及曲池。以至手梢。兩足自膝及跟尻。腫痛更甚。痛處熱。飲食少。請告南還。而伏蓐者三年。里有吳君九宜者。沈考功西席也。見予起後渠疾。因語行人逆予。診其脉皆絃細而數。面青肌瘦。大小腿肉皆削。予與言。此病得之稟氣弱。下虛多。內以傷其陰也。在燕地又多寒。經云。氣主煦之。血主濡之。今陰血虛。則筋失養。故營不營於中。

三具一卷

五

氣為寒束。百骸拘攣。故衛不衛於外。營衛不行。故肢節腫而痛。痛而熱。病名周痺是也。治當養血舒筋。濕潤燥。使經絡通暢。則腫消熱退。而痛止矣。痛止即以大補陰血之劑。實其下元。則腿肉復生。稍愈之後。願加珍重。年餘始可出戶。行人聞而喜曰。果如公言。是起白骨而肉之也。吾即未藥。病侶半去。惟公命劑。予先以五加皮。蒼朮。黃柏。蒼耳子。當歸。紅荅。以仁羌活。防風。秦艽。紫荊皮。服之二十劑。而筋漸舒。腫漸消。痛減。

大半。更以生地。龜板。牛膝。蒼朮。黃柏。晚蚕。沙。蒼

耳子。以仁海桐皮。當歸。秦艽。三十劑。而腫痛全減。行人公益喜。予曰。病加於小愈。公下元虛憊。非歲月不能充實。古謂難足而易敗者。陰也。須痛戒酒色。自培本根。斯飲藥有効。而沉疴可除。據公六脉。輕清流利。官必腰金。願葆真以竅之。萬毋自輕。來春氣和。可北上也。乃用僂茅為君。枸杞子。牛膝。鹿角膠。虎骨。人參。為臣。熟地。黃黃。朽。晚蚕。沙。茯苓。蒼耳子。為佐。桂心。秦艽。澤瀉。為

三具一卷

六

使。蜜丸。服百日。腿肉長完。精神復舊。又喜語予曰。貧官何以稱報。撰次公濟人澤物盛德。於沈考功冊後。以彰盛美云。後十年。行人官至江西

副憲四

鄭都諫春寰公。長君。四歲患痘。稠密煩燥。醫者星羅。皆以為熱盛不退。形枯色紫。頂有焦勢。症逆必不可為。將辭去。予至。細觀之。見西太陽圓淨。神氣蒼厚。謂當急為涼血解毒。用赤芍藥。生地。黃各三錢。紫草二錢。連翹。黃芩。貝母。山查。六通。

各一錢。蟬退、甘草各五分。藥成劑，而衆止之曰：「虜要清涼，痘要溫，故博愛心，鑑以保元湯為良。吾儕將劑而進之，乃公獨主寒涼，保元之謂何？」予曰：「用藥貴對症，保元湯良矣，必血活熱清而後可用。今血熱毒盛而用溫劑，是火熾添油也。衆曰：「若慮毒未解，吾若醇法甚佳，用桑葉雞冠血酒調服之，痘即立起，而慎氏王氏茅氏皆若上專門名家，亦以為言。予曰：「此法亦可用於清解之後。」經曰：「諸痛癢瘍皆屬心火，火未退而用

三吳一卷

七

是以毒攻毒，其勢愈熾，予故欲先清解而後保元也。惟楚銅壁山人黃桂峰者，治痘高手也，獨語鄭公曰：「孫公之劑，寔與症對，衆論皆膠固不達變者，第恐清解之劑用遲一日爾。」試煎服之，以觀其後。鄭公命僕速煎，衆猶持議曰：「如必服此劑，亦當揀去貝母、山查，鄭公聽其減去。至夜子始聞，隨語桂峰曰：「減去二味，恐七八日後不能無心症。」桂峰曰：「何以故？」予曰：「此痘內傷外感，俱未清楚，今帶熱而出，故其腹猶膨脹，去貝母

恐搶喉，去山查恐洩瀉。七八日痘毒出盡，腹內空虛，變從虛出，諸君素以痘專科，何不慮及此？其夜服藥後，即嗒然而睡。天明痘色明潤，焦頂盡退，血亦漸活，惟嘔噦搶喉，衆又以昨日之劑太寒所致。予曰：「此火毒未盡徹也，宜進竹茹湯，而慎雲峰怫然曰：「吾家世世業痘，年亦七十有五，曾未見治痘用竹茹者。」春寰公令弟樂津公，檢痘疹全書，用竹茹者以正，慎語塞，悻然而去。藥進而噦止。至八日果洩瀉發痒，予以保元湯

三吳一卷

八

加白朮以治瀉，大加何首烏以止痒，一帖而痒止。至十四日，天庭兩額皆回漿作靨，惟兩頤漿未回，洩瀉不止。予因偶出北門半日，歸見其口開項軟，手足痘氣盡癘，腹又作脹，已成內攻，舉家啼泣。予亦茫然，不遑為計。嘆息出門，樂津公把而送之，少間揖別而聞衣間瘴臭，語樂津曰：「公聞臭乎？」曰：「聞。」予曰：「佯有生意，亟還起之。」予思兩頤乃腎經部位，獨不回漿者，腎元虛也，峻補腎元，庶可使活。先以紫河車一錢，用酒漿調服。

固其元氣服後即睡繼以人參一兩黃芪免絲子各三錢作大劑服之一日夜服人參一兩八錢黃桂峰是夜自松江還時已四鼓亟叩門而入鄭語之變且告之服藥黃曰諒吾看作何狀見其結靨之下復灌一線黃漿贈瘡盡起桂峰曰萬全矣非孫公不能起此病桂峰由此益昵予出必聯舟歸則同榻相印正者三年鄭公感予而作序以贈親書孫憲副公冊後識不忘也

三吳一卷

九

張文學子心二尹可泉公長君也自知醫弱冠病吳下名醫皆診之僉曰療治久不効子心亦自分必死督家人具秘器已沐浴衣襪衣而卧正寢斷粒絕藥者二日可泉聞予治其高第張星岳之孀奇因訪予曰病心痺而尸寢洩旬者能起之誰不嘖嘖稱公高手吾子病且革幸憐而診之予至診其脉左寸短弱右關畧絃餘皆洪大其症咳嗽下午熱從兩足心起漸至頭面夜半乃退面色青形羸氣促多夢遺交睫卧床襠

三吳一卷

十

奄奄一息耳時則七月初旬也診畢語可泉公曰郎君病可治不宜豫凶器也可泉公曰諸醫僉謂火起九泉者十不救一大肉盡削者死咳嗽加汗者死脉不為汗衰者死又當此鏹石流金之候又恐肺金將絕脉子亦自謂無生理先生何言可治也予曰汗多者孤陽幾於飛越也可泉公曰飛越亦死候也予曰幾者將成未成之辭也症雖危其色其聲音其脉尚有生意終不可以一凶而廢三善兩顧不赤心火未焚也聲音不啞肺金未痿也耳輪不焦腎水未涸也相書云面青者憂疑不決左寸短者心神不足閔畧絃者謀為不遂夫心者萬事萬化之主內經曰主明則下安主不明則十二官危又肝主謀為胆主決斷謀為不決故色青症與色與脉皆非察也蓋郎君志願高而不遂其欲殆心病非腎病也經曰色脉相得者生子故謂郎君之病可起也病者聞言明目語其父曰吾今猶寐者初寤矣從來未有此論沁吾心脾也吾病由

星士許決科於癸酉。是年子落第而同窓者中。故怏怏至此。先生得吾心於色脉。神矣。此言可當藥石。謹拜命。予為定方。煎方名調肝益神湯。以人參、酸棗、仁龍骨為君。丹參、石斛、貝母、麥冬、五味子為臣。山梔、香附為佐。服二十帖而病起。九方則大龜板、熟地、黃枸杞子、人參、麥冬、五味、茯苓、蜜丸服三月。而精神健。肌肉完。次年生女。可泉公。茗中名士。奇子治而延譽。聞於大宗伯。董潯陽公。宗伯交驩余者。由可泉公始也。六

三吳一卷

十一

大宗伯董潯老。年六十七。有脾胃疾。翁以過啖瓜菓而胃脘脹痛。時當處暑也。延予治。診其脉。寸關絃緊。觀其色。神藏氣固。翁門下蔣虹橋沈樂閒者。多藝人也。翁素親信二公。詰予曰。症脉何如。予曰。症脉雖胃腹脹痛。然易瘳也。二公曰。翁生平不能素食。食輟瀉。今不如葷者半月。燕居好奕。好看書。好作詩文。即盛暑。亦手一編不言倦。日永亦不瞌。今不親筆硯者月餘。不櫛沐者七日。它一切無所事事。倦極矣。諸名家如沈竹

亭沈春宇金樗丘者。劑備嘗之。無益也。而公何言易。予曰。諸公不過用二陳平胃加山查、麦芽等消導劑耳。與症何涉。蓋翁傷於瓜菓。而為寒濕滯勝。經云。寒濕所勝。治以辛溫。然瓜菓非射香、肉桂不能消。此諸公所以不能愈翁疾也。予以高良姜、香附各一兩為君。肉桂五錢為臣。射香一錢為佐。每服二錢。酒調下之。藥入腹。胃次便寬。再而知餓。三服而中櫛。交接賓客如未病者。翁語沈蔣曰。孫君所見所養。度越諸人。若是

三吳一卷

十二

往聞治張氏子氣絕兩日而能活之。今於活吾病。益信誠臨菑鬻國之遺。特書一軸。以彰其高。因以紀一時之良遇云。七

大宗伯即君董龍山公夫人。為憲副茅鹿門公女。年三十五。而病便血。日二三下。腹不疼。諸醫診治者三年不效。予診之。左脉沉澁。右脉濁出。關外診不應病。予竊謂血既久下。且當益其氣而升提之。以探其症。迺用補中益氣湯加阿膠、地榆、側柏葉。服八劑。血不下者半月。彼自喜病愈。

矣。偶因勞而血復下。因索前藥。予語龍山公曰：夫人之病必有瘀血積於經隧。前藥因右脉滿。關難憑。故以升提兼補。兼溢者以探虛實耳。今得病情。法當下而除其根也。龍山公曰：三年間便血雖一日二三下。而月汛之期不爽。每行且五日。如此尚有瘀血停蓄耶？予曰：此子因其日下月至。而知其必有瘀血停蓄也。經云：不塞不流。不行不止。今之瘀實由塞之行也。不可再溢。古人治痢必先下之。亦此意也。公曰：明日試卜。

三真一卷

十一

之。予曰：卜以決疑。不疑何卜。公隨以語夫人。夫人曰：孫先生非誤人者。識見往。又出尋常。宜惟命。蓋夫人讀書能文。聰明謀斷。不啻丈夫。故言下便能了悟。即用菴仁承氣湯加丹參、五靈脂、荷葉蒂、水煎夜服之。五更下黑瘀血半桶。其日血竟不來。復令人索下藥。予曰：姑以理脾藥養之。病根已動。踈五日而再下未晚也。至期復用下劑。又下黑瘀如前者半。繼以補中益氣湯參苓白朮散調理全愈。

八

大宗伯董涑老門下有馬厨者。七月初旬病。病二十餘日愈劇而勢甚獮。時宗伯對余。奕正酣。而蔣虹橋沈樂閒報曰：馬厨危在旦夕。宗伯聳之。推枰嘆息曰：吾命。吾命。予叩其故。語曰：能厨者不下二十人。獨此厨適。吾意將恃之以怡晚節。今病不可起。奈何？予詰何病。翁顧蔣沈曰：第詳道其狀。蔣沈述其症。大發寒熱。寒至不憚入灶。熱至不憚下井。痢魚紅白。日夜八十餘行。腹痛惡心。汗多。神氣倦甚。究其脉。曰：脉不吉。下痢。

三真一卷

十四

脉洪大者死。細微者生。今洪大。逆也。予曰：痢固忌洪大。寒熱亦非細微所宜。其中必有故。二公曰：幸一往決之。涑翁不可。謂何可以細人而勞長者。予曰：醫寄人生死。何論巨細。矧事翁之人。猶不可坐視不救也。涑翁欣然。握余手偕行。至宅後橋。余入門。同居數十家。皆執香拱立以伺。診其脉。察其症。果如蔣沈所言。其面色微紅。汗淋。下。予究病所由起。渠謂過客衆。厨間燥熱。食瓜果菱藕過多。晚又過飲御內。而寢於樓簷。

之下。次日即寒熱腹痛。因而痢。雖得其病情。尚未驅通。一治法。因沉思之。不覺行至橋。而得老猶立而疾。予見予無姓名。知病重。遂置不問。如前握余手而回。蔣沈謂予可治否。予曰。微者先生寵靈。偶有一得。迺背水陣也。人參白朮石膏滑石各五錢。知母炮姜各三錢。大附子炙甘草各二錢。作一大劑煎之。蔣沈將問予。澤翁即命近侍煎於其側。不欲蔣沈問也。熟則付飲之。飲訖即睡。老先生曰。服後何狀為佳。予曰。倘得

三卷一

十五

一睡。則陰陽始和。和則汗可斂。而寒熱嘔惡可止也。蔣沈曰。聞已睡矣。明日已刻。二公鼓掌來言。夜來痢減半。汗吐全無。脉亦斂矣。再用人參石膏白朮芍藥滑石各三錢。炮姜肉桂知母各二錢。炙甘草附子各一錢。服後瘡止。痢又減半。飲食漸進。神氣漸轉。改用白芍藥酒炒五錢。人參白朮滑石各二錢。甘草陳皮炮姜肉桂各一錢。三劑而痢全止。飲食加。漸就安矣。蔣沈問曰。公寒熱均投。此為何症。而劑何名也。予笑曰。

此滑公所謂混沏湯也。溲老又問。予對曰。經云。夏傷於暑。秋必瘧痢。白虎湯益元散。皆解暑之劑。瓜葉寒涼。傷其中氣。酒後御色。損其下元。附子理中湯。正所以溫中補下者。內經又云。實者邪氣實也。故以白虎湯益元散應之。虛者正氣虛也。故以理中湯應之。若以寒熱均用為疑。而張仲景附子甘草瀉心湯。既用大黃黃連。又用乾姜附子。此何說哉。蓋假對假真對真也。溲翁躍然喜曰。先生惟是。故能起垂斃之人而生之。

三卷一

十六

余詩冊中臨菑號國之談。非虛語矣。九
吳江吳太僕長君肖峰令政。太宗伯董溲老次女也。患咳嗽體倦多汗腹痛。呻吟不絕。口者半月。吳江之醫不効。訪遠近名最著者。如姑蘓盛氏後湖王氏后山震澤沈氏竹亭。先後遍治之。而痛愈加。予適寓茗城龍山。公邀予乘快舫魚程而進。至則診其脉。左手三五不調。右手沉絃。面色青。而息甚微。腹中漉漉有聲。予因問。上年夏月曾病否。肖峰曰。曾頭痛。體倦多汗。動止無力。

不能親事。但不咳嗽。不腹痛。今五月初。病如上
 年。而市醫謂傷風所致。用參蘓飲表之。始咳嗽。
 沈為其清嗽。則加腹痛。王與盛謂通則不痛。以
 沉香滾痰丸下之。則勢懣而不可支。予方殫思。
 謂此迺注夏病。仲景謂春夏劇。秋冬瘥者是也。
 而龍山公詰問。注夏何為咳嗽。予曰。原不咳嗽。
 由參蘓飲而咳嗽也。汗多又重發汗。肺金受傷。
 故燥而嗽。何為腹痛。予曰。原不腹痛。因治嗽而
 寒其中氣。腹故痛也。後事者。又不究其因寒而
 痛。乃謂通則不痛。而用寒涼滾痰之劑。重傷其
 中氣。不思五月。六陽之氣皆散於外。汗而又汗。
 汗多則亡陽。夏至一陰將萌。腹中尚虛。虛而復下。
 下多則亡陰。陰陽俱亡。不憊何待。予欲酌一方
 以起之。恐從事者。又將議其後。龍山促之。乃用
 酒炒白芍藥五錢。甘草黃芪各三錢。桂枝二錢。
 大棗二枚。水煎。臨服加粘糖一合。吳下諸公果
 群然。又辨龍山公曰。不必辨。病者望此。以甦其
 生。速煎飲之。飲訖而睡。自己至申不醒。先事者

皆搖首。命僕急携藥囊將去。且語龍山公曰。奪
 令妹之速者。孫君也。本草云。夏不用桂。伐天和
 也。諸痛不補助。邪氣也。故一飲而不醒。吾儕行
 矣。龍山公以其言語余。因詰病者之熟睡。予曰。
 所喜者。以其睡也。睡則陰氣生。陰生則汗可斂。
 痛可止也。假令藥不對症。安得有此。又詰所投
 之劑何名。予曰。此仲景小建中湯也。出金櫃要
 畧。蓋建者立也。中者陽明所主。今腹痛如縛。帶
 脉急縮也。東垣治例。腹痛以芍藥為君。惡寒而
 痛。加桂。甘草緩帶脉之急。縮。用以為臣。經曰。急
 者緩之。面青脉絃。肝氣盛也。肝屬木。木盛則脾
 土受制。而又誤下。因傷之極。故痛之猛也。經云。
 木得桂而枯。佐以黃芪。伐肝補脾。又能斂汗。止
 痛。此建中之所由名也。語未竟。內報病者醒。而
 索粥。予曰。與之穀氣。進則有本矣。粥後又睡。至
 天明。腹全不痛。惟稍咳嗽。加五味子。麥門冬。魚
 治注夏而全瘳。馬龍山公述病之始末。劑之藥
 味。報大宗伯宗伯公致書於予曰。足下以四味

之常藥振不起之危病名震三吳聲溢兩浙昔
宋景濂為朱丹溪立傳吾固不敏幸先生以所
治節條付之俾序以傳於後俾工是術者有所
藉手予憮然語龍山公曰何修而得老先生寵
幸之深也第令妹被尅伐太過陰陽俱亡今病
雖愈而脉絃不退猶可為慮幸叮寧戒暴怒節
飲食謝去人事恬澹多補庶可永年不然亥月
陰極陽生恐不能保無患也慎之慎之後至期
與肖峰齟齬怒而絕藥果以凶聞若人多子之

二具一卷

十九

直與先見云十

大光祿龐公子遠吳江人也其太夫人病頭痛惡
寒背高憊且痛時發寒熱吳醫王后山者有時
名吳人最所篤信延治五日不瘥聞予居吳禮
致為治診其脉右滑大左浮絃而數問服何劑
光祿公曰不識而有藥在予視之偶失言曰左
矣時有西席項姓者聞言而厲聲曰此三吳最
名士也渠發劑而有議者輒面唾之幸不在尔
予笑曰渠是而議者非則當唾人渠非而議者

是自唾且不暇何暇唾人四物湯玄胡索牡丹
皮香附子養血調經劑也太夫人七十餘矣而
有經可調哉投劑之左由生平守常套而不知
因人因症隨俗為變也項子曰此何症予曰仲
景有云頭痛惡寒外感病也浮絃而數胃高憊
痛少陽脉症具在右脉滑飲食滯而為痰彼用
當歸地黃芍藥皆滯痰閉氣之味內傷何由得
消外感何由得出此症只宜用柴胡湯合平胃
散一二帖可瘳也項猶有言光祿公曰勿辨飲

三具一卷

二十

藥而涇渭明矣一飲而寒熱除再飲而胃高泰
光祿喜曰奇公名不虛附矣予私問項子何極
譽王光祿曰項初受業於王未睹大方而獨是
其師說多見其識之不廣也十一

光祿公後有事於庄所值中秋乘酒步月失足一
跌扶起便脅痛不能立晝夜不寧行血散血活
血之劑一日三進閱三月服二百餘帖痛不少
減因迎予治診之脉左絃右滑數予曰此痰火
症也公曰否賤軀雖肥生平未嘗有痰徒以遭

跌積瘀血於脅間作痛爾予曰據脈實痰火也。痰在經絡間不在肺故不咳嗽而亦不上出脉。書云滑為痰絃為飲予據脉而認痰火如痰血。脉必沉伏或芤或濇也面色亦必帶黃前請君以瘀血治者皆狗公言不以色脉為據且多服峻厲剋伐破堅之劑無效此非瘀血之積明矣。公欣然請藥即用大瓜萹帶殼者二枚重二兩研碎枳實甘草前胡各一錢貝母二錢與四帖公以為少予曰愚見猶以為多此症服此一二

三吳一卷

十一

劑可瘳又即報我為製補益之藥可也公得藥一更矣仍煎服五更腹中漉又有聲天明大瀉一二次皆痰無血痛減大半再服又下痰數碗許痛全止隨能挺立三服腹中不復有聲亦不瀉蓋前由痰積瀉也今無痰故不瀉公曰望聞問切四者醫之要務人人皆著之口吻而先生獨見之行事即予母子之疾先有事者皆吳之名流徵先生吾殆撞壁矣何能還轅而生哉吾於是益服先生之高十二

惟曾三尹張思軒公與潘少保印川公皆受室於施氏稱聯襟云施故富家而張公夫人賢慧治家勤篤為人精潔周致以產多而氣血憊又以婚嫁繁而費用不支積憂年將五十因病心癆發則董厥小水短澀胃鬲痛不可忍煩躁乾噦惡內蒸熱氣膈又上騰肌削骨立月汛不止茗城時輩有認為氣怯者有認為鬲食者皆束手無措尸寢浹旬漿粒不入口者五日凶具備而待斃舉家計無所之惟神是禱予適在潘府逆

二吳一卷

十二

予診之脉左絃大右滑大而數脰畢予曰可生也病挽云諸逆吐酸皆屬於火諸風掉眩皆屬於木法當調肝清熱開鬱安神諸醫群然目攝而背譚曰書云骨蒸肉脫者死形瘦脉大胃中多氣者死絕穀食者死孫君獨許其生果藥王再世哉予若不聞而檢藥以進竹茹滑石各三錢白芫菴仁七分半夏麩橘紅姜連茯苓各一錢甘草五分水煎令一口口嚥之服畢噦止暈定次日用溫膽湯調辰砂益元散三錢服之胃

禹頰開，漸進飲食。小水通長，煩躁盡滅，駸駸然安。無事。後用逍遙散六君子湯加黃連香附。三越月而肌肉全，精神如舊。若人駭然曰：能起此病，信藥王矣。子三

馬二尹迪庵公年五十五，以掃墓而過食鰻肉捲餅，心腹脹痛，市醫不知用吐，而遽用硝黃下之，大便不行，脹痛愈增。繼至者，又用木香檳榔丸，繼又有下以小承氣湯者，有下以大承氣湯者，十日多，脹痛益甚，飲食粒不能進，大便並不行。二吳一卷

小水亦僅點滴，後醫又以大黃芒硝多服不行，謂非白餅子不可。服五日而脹痛尤加，又謂非備急丸不可。服三日脹痛益不可當，又用甘遂芫荽大戟牽牛之屬，服三日，不惟大便不行，并小便點滴亦無矣。脹不可言，衆醫大叫稱恠，自三月初二日起，至是念二日矣。有名士王南野者，用灸法，灸中脘三十餘壯，毫不為動。因斷其越三日為念五戌時，當棄人間。迪老四子皆逢掖，聞言涕泗。時有張太學懷赤者，迪老甥也，見

子起張思軒夫人疾，喻亟請子。子至，觀其色蒼黑，神藏不露，聲音亮，惟腹大如覆箕，不能反側。診其脉，兩手皆滑大，兩尺尤有力，究其受病之源，查其歷服之藥，子駭然以為未聞且見也。因思一治法，先用六君子湯加木香砂仁，參朮俱用二錢，乃傍有錢小松者，自稱家世受醫，見劑亟之。子曰：非若所知也。彼猶喋喋詰子，謂人言中滿者，瀉之於內，大小便利者，當先利大小便。然歟。子曰：非人言。素問云云也。又云：諸痛不

得用參朮，蒼黑之人尤忌。先生既知素問，奈何不用通而用塞也。予愀然不答。顧迪老諸子言曰：錢君拘儒常見，何能起尊君病。尊君非中滿鼓脹症內傷也，當始傷時，猶在上高，法當用吐。素問云：在上者因而越之是也。不用吐而用下藥以傷其脾，脾氣傷則失運動之職，是以愈下愈傷，愈傷愈脹，不思脾氣傷而神不為用，藥不能行。又以峻厲之味益下之，是遵何說也。子因脾傷，故用六君子湯以醒其脾，木香砂仁助

其運動。再用吐法。吐出前藥。予劑非治尊君之病。治諸君藥也。予初欲為諸君諱。何錢君激予。而使暴其短哉。且予不慮大便不行。獨慮行之不止也。錢又謬言。急則治標。今法用盡。不能使一行。何以不止為慮。予曰。君試思。常人能服硝黃幾何。服芫莖白餅子幾何。今硝黃服過五斤。芫莖白餅之屬。服過五六兩。又加甘遂牽牛芫荇大戟。至悍至急之劑。幸而大便未行。藥性未動。尚可為計。若一行。而諸藥性動。譬瓶水底漏。其中能蓄點滴哉。危矣。錢又詰迪。老多服下藥。而大便不行何也。予曰。此易知之。始為食傷。繼為藥傷。所傷在上中二焦。下元未損。故兩尺脉尚有神氣。難經曰。人有兩尺。如樹之有根也。內經曰。腎者胃之閔。蓋腎主大便。觀其色蒼黑。神藏氣固。皆由根本未動。賴此猶可為也。服藥後腹中大痛。予知其藥力已動。改用人參蘆防風蘆升麻桔梗各三錢。水煎服之。少頃用鷲翎探喉中令吐之。前服藥物。一湧而出。十數碗。病者

以手加額曰。目前光矣。此已時也。予曰。酉時大便必行。可預買人參數斤。以備不虞。至午進至寶丹一帖。以溫中氣。未申間。腹中汨汨有聲。濁氣下滾。頃刻間。腹寬數寸。至晚大便行一次。小水畧通。予即用人參白朮各五錢。炮姜三錢。茯苓二錢。木香甘草各五分。陳皮一錢。令急煎服。四鼓又大便一次。小水繼至。脹痛漸減。次日大便瀉十次。餘因以前理中湯劑為丸。與煎劑兼補。脹脹全消。飲食漸進。共瀉七十二日。服人參二斤餘。若人聞以補收功。群然異之。而錢小松始帖然心服曰。奇哉。奇哉。人多用攻。孫君獨用補。人多用下。孫君獨用吐。由見之真。而所投者確也。醫可易言哉。今而後。知孫君之高矣。十四。潘大司馬公嘗有腸風之疾。八月丁祭。學博餽鹿血。食之而血暴下。致予治。用槐角子五錢。黃連枳殼地榆貫衆各三錢。一服而止。大司馬善其方。書之粘壁間。遇有便血者。輒依方藥之。無不立愈。喜甚。鼓腹謂諸子曰。往而姨之疾。族醫無

不言必死。孫君獨能生之。神哉。進乎技矣。予曰。昔扁鵲有言。予非能生死人也。此當自生者。越人使之起耳。予何能。亦張安人當自生也。大司馬公由是益重予。病無巨細。悉任之。而予亦得盡其術云。十五

三兵一卷
迪老之子鳳林。見予起乃翁疾。乘間語曰。內子包有隱疾。每月汛行。子戶傍輟生一腫毒。脹而不痛。過三五日以銀簪燒紅針破。出白膿。蓋餘而消。不必貼膏藥。而生肉。無疤痕。初間用針刺。近

二七
只以指搗之。膿即出。但汛行即發。或上下左右而無定所。第不離子戶也。于今八年。內外科歷治不效。且致不孕。先生學博而思超。幸為籌之。予沉思兩日而悟曰。此中焦濕痰隨經水下流。壅於子戶也。經下而痰凝。故化為膿。以原非毒。故不痛。用白螺螯壳火煨存性為君。南星半夏為臣。柴胡甘草為佐。麵糊為丸。令早晚服之。未終劑而汛行不腫。次年生女。

舜田臧公。吳車駕湧瀾公岳也。年將六旬。為人多

怒多愁。胃膈否脹。飲食少時。醫治以平胃散。枳木丸。香砂丸。不效。復以檳榔三稜莪朮之類。日消之。而大便溏瀉。兩足跟踝皆浮腫。漸及兩手背。醫又以其手足浮腫。而認為黃胖者。以針砂丸與之。腫益加。面色黃且黑。自二月醫至八月。身重不能動止。又有以水腫治者。車駕公雅善予。因延診之。脉沉而濡弱。予曰。此氣虛中滿症也。法當溫補。兼升提。庶清陽升。則大便可實。濁陰降。則胃膈自寬。以人參白朮各三錢。炮姜回

三兵一卷
二
陽陳皮各一錢。茯苓黃芪各二錢。澤瀉升麻肉桂蒼朮防風各七分。三十帖而安。客有疑而詰予曰。此症諸家非消導。則淡滲。而先生獨以溫補收功。腹中積而為滿。為腫者。從何道而去也。予曰。脹滿非腫滿比也。故治不同。腫滿由脾虛不能攝水。水滲皮膚。遍身光腫。今脹滿者。先因中虛。以致皮脹。外堅中空。腹皮脹緊象鼓。故俗名鼓脹。蓋由氣虛。以成中滿。若氣不虛。何中滿之有。氣虛為本。中滿為標。是以治先溫補。使脾

氣健運則清濁始分。清濁分而脹斯愈也。十七

金谿令淨涵臧公。尊堂太夫人。以季春眉壽。連看

戲文二十餘本。且多食魚腥蝦蟹。偶發寒熱。三

日不退。第四日左耳前後及頰車皆紅腫。第五

日右邊亦腫。第六日腫及滿頭。紅大如斗。眼合

無縫。昏憤不知人事。謔語若有邪祟。粒米不進

者八日。舉家驚惶。逆予為治。診其脉六部皆洪

長而數。予曰。此大頭疫也。即以貫衆石膏各六

錢。紫胡葛根各三錢。赤芍藥天荖粉各二錢。甘

三吳一卷

二十九

草一錢。黑豆四十九粒。水煎服之。日進二帖。脉

始減半。第九日方進粥飲半盂。前藥除石膏。又

四帖而安。是俊也。人皆為予危之。謂八十之尊

年。八日之絕粒。頭大如斗。體熱如燔炭。昏憤謔

語。乃不去而治。何冥行不知止如此。而其婿閔

懷海亦言。病勢如此。吾心亦危疑。見先生安閑

而甘寢食。賴以少慰。予曰。此疾為陽明少陽二

經熱壅而然。夫陽明多氣多血之經也。以高年

故不敢用硝黃。惟投以輕清解散之劑。使因微

汗而解。症脉相對。雖重可生。假如人言。以高年

病危而棄不治。豈惟非醫之存心。於病家相托

之意亦孤矣。可乎哉。十八

丙申夏。見所潘公。謁予於海陽邑。即時霽。淡旬。邑

市水漲。公至。予驚問曰。公貴倨也者。何堪此。公

曰。與君間者濶矣。且先君服闋。秋當北上。不卜

補任南北。謁求一診。他何計。予究何疾。公曰。無

弟年甫踰疆。微覺陽痿。次早診畢。語其隨行俞

金二子曰。公脉上盛下虛。上盛為痰。與下虛

為精元弱。切宜戒色慎怒。劑宜清上補下。不然

三年內。恐中風不免。蓋由痰生熱。熱生風也。識

之。識之。乃為立方別去。公亦未暇製服。公次年

八月。往返武林。不無勞怒。又屆中秋。連宵酒色。

平常色後。輒用鹿角膠三錢。人參一錢。酒送下。

以連宵有犯。乃用鹿角膠五錢。人參三錢。空心

服之。十七日薄暮。偶與社友談詩。筵間左手陡

然顛動。把捉不住。隨歸房。左手重不能舉。十八

日早。左邊半體手足皆不為用矣。亟令人逆予。

三吳一卷

三十

予適在前坵吳宅。及至公驚喜交集曰。君何先見若此也。先少保患在左體不遂者三年而致不佞。今亦左體。其風水致然歟。第先少保年七十餘。不佞四十有七。先少保不能遇先生。不佞賴有先生。或可企無恙也。予始觀面色赤。口微啞。向右唇麻。手足解拽。已成癱瘓。其脉左絃大。右滑大。先用烏藥順氣散一帖。服後昏睡半日。醒覺面更加赤。啞亦稍加。知痰盛使然。即以二陳湯加全蝎。姜蚕。天麻。黃芩。石菖蒲。紅芍。秦

三卷一卷

三二

尤。水煎。臨服加竹瀝一小酒盃。生薑汁五茶匙。一日兩進。晚更與活絡丹。服至第六日。手指稍頭畧能運動。足可倚棹而立。予喜曰。机動矣。改用歸芍六君子湯加紅芍。鉤藤。天麻。竹瀝。姜汁。服二十帖。行可二十步矣。手指先麻木。不知痛癢。至是能執物。繼用天麻丸。兼服全鹿丸。調理百日。病去十之九。次年二月北上。補任永清。公以病後能戒色。斷酒。自知培養。故藥功獲奏。此症予歷治歷効者。良由先為疏通經絡。活血調

氣然後以補劑收功。惟經絡疏通。宿痰磨去。新痰不生。何疾不瘳。此治類中風之法也。十九

見所公弱冠隨尊君大司馬印老治河居北。患白濁。精淫淫下。自北地山東濰揚鎮江及江右三吳諸名家醫藥三年不効。癸酉冬。禮予診之。其脉兩寸短弱。兩關滑。兩尺洪滑。觀其人襟期瀟灑。出塵而神色閑雅。真翩翩佳公子也。一接見便就暈。而信余請藥。予曰。公疾易愈。第待來春之仲一劑可瘳。而今時不可公固請曰。先生大

三卷一卷

三二

方而善拯人之急。以大方而治小疾。試可立効。何待來年。予曰。非秘其術不售也。素問有云。升降浮沉必順之。又曰。天時不可伐。公脉為濕痰下流症也。經曰。治痰必先理氣。而脉書亦謂洪大而見於尺部者。陽乘於陰也。法當從陰引陽。今冬令為閉藏之候。冬之閉藏。寔為來春發生根本。天人一理。若不顧天時而強用升提之法。是逆天時。而洩元氣。根本既竭。來春何以發生。故素問曰。必先歲氣。毋伐天和。必養必和。待其

來復公疾本小而歷治三年不効者良由諸醫不知脉不識病不按時也公聞言唯唯乃尊君所遣之醫踵接治竟無効至春分而逆予以白螺獅壳火煨四兩為君牡蠣二兩為臣半夏葛根柴胡苦參各一兩為佐黃柏一兩為使麵糊為丸名曰端本丸令早晚服之不終劑而全愈公復書曰賤疾果如先生言今勿藥也向歷治三年不効竊謂天下無藥服端本丸而愈又信天下有藥矣二十

三卷

三三

經過期不行者五日諸醫皆以經期作痛為調經不効而繹老召予診左寸洪滑兩尺皆滑數左尺之外更有神氣予喜而語繹老曰經閉非病孕也產必男繹老雅信予因究其說予曰滑非經閉之脉左尺尤有神氣是以知產必男也繹老謂果孕矣索發熱腹痛何予曰何傷氣虛血熱耳以安胎飲加減調理即安也用人參白朮白芍藥為君川芎當歸為臣香附柴胡蘇梗

條苓甘草為佐四帖腹痛減熱除至期果生子繹老德予而多推穀云二十一

金文學元岩之眷產後兩日腹痛下痢純紅腸鳴三越月時當孟秋而脉皆軟弱用佛手散加減以治川芎三錢當歸五錢艾葉炮姜各一錢桂心五分酒炒白芍藥二錢連進三帖而疾減半後因食新菱新粟又連為怒氣所激日晡暈厥以生薑湯灌甦腹脅大痛手不可近用二陳湯加香附砂仁桂皮炮姜與之痛亦不減且胃聶

三卷

三四

脹甚自以手探喉中吐出菱粟痛稍定以頃復痛又用手探吐吐後瀉三四次而元氣脫矣脉皆散亂如解索狀神氣憊而恍惚循衣摸床病勢危急用人參白朮各五錢酒炒白芍藥二錢砂仁炮姜肉桂甘草各一錢急煎進之痛乃稍定精神清仍瀉二次次日復進前藥痛減瀉止加白朮又四帖而飲食進精神勃勃興起矣此因初痢時醫者不以產後為重徒以治痢苦寒之劑傷其中氣又為菱粟生冷所損中氣益壞

然也。治可不慎哉。二十二

沈三石別駕公夫人嚴產三日而腹不暢。南潯女科陳姓者為下之。大瀉五六次。遂發熱惡心。又用溫膽湯止吐。小柴胡退熱。服四日。熱吐四日。粒米不進亦四日。又進八珍湯加童便。服後昏憤。耳聾。眼合。口渴。腸鳴。眼胞上下及手足背皆有虛浮。因逆予治。診其六脉皆數。時五月初二日也。予曰。脉書云。數脉所主。其邪為熱。其症為虛。法當以十全大補湯加炮姜進之。夜半稍清。

三真一卷

三五

爽。進粥一盃。始開目言語。次日午時。以承值者倦而藥不相接。且言語太多。復昏昧不知人事。初四日。以人參白朮各三錢。炮姜茯苓陳皮各一錢。甘草五分。煎服訖。體微汗。遍身痲痺。熱退而神爽。下午又藥不接。又動怒。昏昧復如前。六脉散亂無倫。狀如解索。痲痺沒而虛極矣。亟以人參白朮各五錢。炙甘草炮姜大附子各一錢。連進二帖。是夜熱寢。唯呼吸之息尚促。初六日脉反微。下午發熱不退。環跳穴邊發一毒如碗。

大紅腫微痛。夫人父嚴翁。與陳女科交譜之曰。

向之發熱惡心。皆此所致。由附子乾姜溫補誤也。須急用寒涼解毒之劑。予正色而諭。以理曰。此乃胃中虛火遊行。無制大虛之症。非毒也。若作毒治。而用寒涼。速其死。內經云。壯者氣行則愈。怯者着而成病。惟大補庶可萬全。三石翁然予言。急煎附子理中湯進之。日夕兩帖。參朮皆用七錢。服後痲痺復出。毒散無踪。熱亦退。沾沾喜矣。復以人參白朮散調理而全。安。皆由產

三真一卷

三六

後誤用下藥。致變百出。噫。唏。彼不達變之專科。其可任哉。二十三

誥封吳太夫人者。車駕湧瀾。公母也。年餘六十。久患白帶。歷治不效。變為白崩。遂予治之。診得右寸滑。左寸短弱。兩關濡。兩尺皆軟弱。予曰。據脉心腎俱不足。而中焦有濕。脉經云。崩中日久為白帶。漏下多時。骨木枯。今白物下多。氣血日敗。法常燥脾。兼補心腎。以既濟丹補其心腎。以斷下丸燥中宮之濕。則萬全矣。服果不終劑而愈。

既濟丹方 鹿角霜 當歸 白茯苓各二兩 石

菖蒲 遠志各一兩 龍骨 白石脂各一兩 益

智仁錢五 乾山藥打糊為丸。梧桐子大。空心白

湯下七八十九。

斷下九方。頭二蚕沙炒三兩 黃荊子炒二兩 海螵

蛸磨去甲 樗根 白皮各一兩 麩糊為丸。下午白

湯送下六十九。二十四

吳北海太學令政。每月經行期之前。四肢羸又發塊紅紫脹痛。不思飲食。胃脘亦常痛。經水多不

三吳一卷

三七

及期診其脉兩手皆駛。以症脉忝之。肝脾二經

有鬱火也。蓋肝主怒。脾主思。多思多怒。隱而不

發。鬱滯於中。故臨經累又發。經腫於四肢也。以

柴胡 川芎 香附 烏藥 白芍藥 青皮

丹參 玄胡索 鬱金 酒炒黃連 山梔子

治之而愈。二十五

吳之清客周芻玉者。豪放不拘。人言有晉人風。酒後益恣。而好男色。因患白濁。吳醫有以補中益氣湯升提者。有以六味地黃丸補陰者。有以五

苓散六一散滲利者。有為降火者。有為溫補者。

不效。又以草頭藥亂進之。肌瘦如削。膝軟如痿。

患有年所矣。因紹介吳太學北海而謁余。懇為

治之。診其脉右寸關皆數。予曰。皆由酒後不檢

所致也。中宮多濕。多痰積而為熱。流於下部。故

濁物淫淫而下。久不愈矣。與以加味端本丸服

之而瘳。白蠟獅虎四兩。牡蠣苦參葛根黃柏各

二兩。陳皮半夏茯苓各一兩。甘草五錢。麩糊為

丸。令早晚白湯下三錢。二十六

三吳一卷

三八

丁酉夏。予寓雒城。顧鄉官宅。其門下竹匠婦懷妊

五月而患心痛。究其所由起。謂由失足墜樓也。

始教飲韭菜汁一盞而痛隨止。其夫又從它醫

購藥二帖歸令煎服。服既。心復痛。吐鮮血盈盆。

曾問冲又上抵。疼不可言。危在頃刻。竹匠告急

予僕孫安。安怜之。懇予診治。六脉皆洪大。汗出

如雨。喘息不相續。其婦樓居低小。予令亟移居

樓下。隨與益元散五錢。令用紫蘊湯調服。又囑

之曰。今夜若睡。聽其自醒。切勿驚動。汗止即甦

也。服後果睡至曉。汗斂而胃鬲不痛。喘息亦定。再與固胎飲一帖。煎服而全安矣。先是鄰醫診其脉。謂吐血之脉宜沉細。今反洪大。而汗出喘息不休。危在今夜。及病起。來詢余曰。姓嬭不得汗。不得下。不得利。小便。是謂三禁。昨日之劑。悉犯之。而反獲効。何哉。予曰。醫貴審症。蓋嬭之患。非內病。汗以棲居低小。當酷暑而熱逼故也。汗血去而胎失養。故仲仲上拒。喘息不續。移樓下以避暑氣。蓋元散為解暑之聖藥。而紫蘊又安。

一六一卷

三九

胎下氣之妙品。氣下則血歸原。而病痊矣。此對症之藥。法出王海藏醫壘元戎中。四血飲是也。特諸君檢閱不徧。即檢閱亦不知為胎產之治。余何能不過融會前人之法。用之而不膠焉耳。鄰醫俛首唯唯而退。二十七

壬申秋仲。予東遊攜李。而王松泉吳小峯偕行。小峯語予。中秋至矣。此間一妓李姓者。行第七。殊可人意。須訪之。晚令佐酒。至則見其態度果澹雅風致。坐以頃。連咳兩聲。小峯究其病。曰。偶耳。

小峯謂毋誑。孫公知人生死。不帝扁鵲。可求一診。診之。兩寸短滿。兩尺洪滑。關絃。予未語而小峯問脉。予曰。脉甚恠。公可問經行否。曰。行僅一日。亦僅點滴。予曰。此脉在良家主。齋遺。若不宜有也。妓曰。良然。即御客時。亦或遺。遺則冷汗。淫淫。體倦而不能支。小峯為請藥。予曰。姑置之。小峯問何故。予曰。金木相勝。心神無主。法當不治。小峯謂人尚無恙。何得便至於此。予曰。絃為春令。當金旺之時。猶然猖獗。設在卯月。木旺火相。

一六一卷

四十

肺金枯痿。水之上源已竭。且腎脉洪滑。妓以慾勝陰血。既虧。淫火愈熾。書云。陰虛則病。陰絕則死。今已咳嗽。其兆見矣。可治乎。次年二月果死。二十八

有老妓金姓者。其嫂三月患頭痛。身熱口渴。水瀉不止。身重不能反側。日漸昏沉。耳聾眼合。夢多亂語。嘉秀醫者。歷試不効。視為必死。予適吳江歸。便道過攜李。訪南溪吉泉二兄。吉泉兄以是症見詢。且言諸醫有以補中益氣湯進者。有以

附子理中湯進者。二藥已煎成未服。幸弟至。七為診之。六脉洪大。觀其色。內紅外黑。口唇乾燥。舌心黑胎。不知人事。予曰。此疫症也。法當清解。急以小白湯進之。猶可生也。若附子理中湯。殺之耳。安可用。南溪兄問。小白何湯也。予曰。小柴胡白虎湯。合而一之是也。南溪兄謂洩瀉昏沉。如此。恐石膏不可用也。予曰。此挾熱下利。但使清陽上升。則瀉止熱退。而神氣自清也。服訖。夜半。神氣甦醒。惟小水不利。熱渴不退。予思仲景法。謂渴而身熱不退。小水不利者。當利其小便。乃以辰砂六一散一兩。燈心湯調服之。兩帖而瘳。南溪兄曰。死生信乎命也。弟頃刻不至。必服理中湯。此婦不為泉下人哉。二十九

脉即斷不治何也。予曰。其脉兩寸洪滑搏指。而關微絃。兩尺微弱。難經所謂溢脉也。九月深秋。木彫零時也。不宜絃大。大則上盛下虛。至二月木旺。木能生火。火木性皆上升不下。下無真陰以相濟。是有陽無陰。有升無降。內經曰。出入廢則神机化滅。升降息則氣力孤危。是以斷曹子二月當嘔吐而死也。三十

嘉善之妓李雙號素琴。體雖肥而性冲澹。態度閒雅。端重歌調。倡家推其擅場。與子邑程芹溪處厚。患痛風自二月起。至仲冬。諸治不效。鴛母慳毒。遂視為痼疾。不為治。而芹溪固懇予診之。六脉大而無力。手足肢節腫痛。兩跨亦痛。不能起止。肌肉消其半。日僅進粥二椀。月汛兩月一行。甚少。予曰。此行痺也。芹溪問病可治否。予笑而應曰。君能娶予。能治之。芹溪曰。嫁娶乃風月中套語。公長者。乃亦此言。予曰。觀此子雖墮風塵。寔有良家風度。予故怜之。且君斷絃未續。而彼有心於君。或天緣也。芹溪曰。誠吾素願。恐鴛母

高其價而難與言。予謂乘其病而盟之，易與耳。芹溪以予言為然，乞為治之。以人參、白朮、改仁各三錢，當歸、枸杞、杜仲、龜板、蒼耳子各二錢，晚蚕沙、秦艽、防風各一錢，大附子、甘草、桂枝、黃柏各五分，十帖而痛止腫消。改用歸芍六君子加改仁、丹參、紅朮、石斛、紫荊皮三十帖而全愈。芹溪娶之，善持家，舉族稱賢，而亦羨予知人焉。三十一

沈別駕翁有老僕，頭痛遍身骨節痛，面色黑，發熱。三五卷

口渴，胃脘膨脹，飲食七日不入。復感寒人，皆危之。予診其脉，左絃數，右洪大，以藿香、蒼朮、防風、葛根、白芷、紫蘊、甘草、陳皮、大腹皮、麦芽、枳實，服後胃脘稍寬，熱與痛更甚。改以麻黃、葛根、柴胡各二錢，石膏、滑石各三錢，紫蘊、葉白、芷、蒼朮各一錢，甘草五分，姜三片，服後大汗出而熱痛皆除。惟口渴，又以白芍、藥當歸、石膏、知母、柴胡、黃芩、麥冬、葛根、陳皮煎服，全愈。別駕翁喜，詰予曰：老僕病甚重，無不謂其必死，先生三日起之，此

何症，而何湯劑飲之使起也。予曰：此三陽合病，先為飲食所傷，予故先用藿香正氣湯加消導之劑治其本，又以六神通解散加助表之藥治其標。病雖重，年雖高，喜其色脉相對，故投以對症之藥，易愈也。翁曰：在先生然耳。若它人，輕者且重，況重者乎。吾未見其能起也。三十二

蔡中林文學內人，發熱口渴，舌上燥裂，小腹痛，嘔吐，藥食不能入者七日。諸醫之技殫矣，皆視為不食而不可為。吳我峰翁固邀予診。右寸脉絕。

不應指，關沉滑有力。左手絃數。予曰：此陽明少陽合病，邪熱壅於上焦也。非禹食法當解散，數劑可愈。無恐。以軟柴胡、石膏各五錢，半夏、麩枳實、黃芩、黃連、葛根、竹茹、人參各二錢，姜三片，煎服。藥納而不吐，五更下黑糞數塊，熱痛減半。次日仍與前藥，右寸脉至是亦起，粥始進。改用小柴胡加橘紅、竹茹、葛根，服三帖而全安。三十三

吳九宜先生，每早晨腹痛洩瀉者半年，糞色青，腹

膨脝人皆認為脾腎洩也。為矣。關元三十壯。服
 補脾腎之藥皆不效。自亦知醫。謂其尺寸俱無
 脈。惟兩關沉滑。大以為憂。以人言洩。久而六脈
 將絕也。予為診之曰。君無憂。此中焦食積。痰洩
 也。積膠於中。故尺寸脈隱伏不見。法當下去其
 積。諸公用補謬矣。渠謂敢下耶。予曰。何傷。素問
 云。有故無殞。亦無殞也。若不乘時。久則元氣愈
 弱。再下難矣。以丹溪保和丸二錢。加倍急。九三
 粒。五更服之。已刻下稠積半桶。脹痛隨愈。次日

亦止。改用蒼朮蒼耳子五加皮。改仁當歸。枸杞
 子。杜仲。丹參。黃柏。烏藥。葉。酒糊為丸。調理月餘
 步履如故。三十五

沈繼庵先生下痢十二日。腹痛。脫肛。後重。噯氣不
 知飢。一友用補中益氣。加白芍藥。腹痛愈。加後
 重亦甚。予脈之。右關滑大。搏指曰。此積滯固結
 腸胃間。故後重。脫肛也。當為推蕩。以其素弱。多
 鬱。不敢以為調氣。而兼消導。木香山查。檳榔。枳
 實。川芎。白芍。藥。黃。連。黃。芩。秦。朮。服後。稍寬。次日

用七傷丸二帖全愈。○其內人患發熱頭痛。遍
 身痛。乾嘔。口渴。胃脹。悶。坐卧不安。醫與以參
 蘓飲。乾嘔愈甚。又加煩躁。予診之。右手洪大。倍
 於左。左浮數。予曰。乾霍亂症也。與以藿香正氣
 散。咸去白朮。桔梗。加白扁豆。香薷。一帖吐止。食
 進。遍身痛除。惟口渴。額痛未除。小水不利。以石
 膏。香薷。滑石。各五錢。橘紅。藿香。葛根。各二錢。檳
 榔。木瓜。各一錢。甘草五分。姜三片。一帖而愈。三

沈晴岳先生五更耳鳴腹不舒暢稍勞則烘然熱自汗脉右關滑大有力左脉和緩原為當風眠卧而得素來上焦有痰火午後過勞或受餓大作眩暈冷汗津津再不敢動稍動則嘔吐此皆痰火所致蓋無痰不作暈也先與藿香正氣散一帖以去表裏之邪繼與温膽湯加天麻服後眩暈嘔吐皆止次日診之右關脉仍滑此中焦愈積痰飲膠固已久卒難動搖姑以二陳湯加枳實黃連滑石天荅粉天麻竹茹調理後以當

二卷一卷

四七

歸龍會九加牛胆南星青礞石凡數帖全愈

十七

潘景宇內人後半夜不睡面黃肌瘦兩太陽及眉稜骨痛大便糖稍勞動則體熱四肢無力其脉左寸洪滑自春至秋皆然此由脾虛肝心二經火盛然也先用四君子加酒連柴胡白扁豆澤瀉滑石調理夜與錢仲陽安神丸數粒燈心湯送下服八日得睡兩太陽亦不痛繼用六君子加黃芪秦艽柴胡澤瀉當歸白芍藥黃芩全安

二十八

臧六老上吐血下瀉血胃脘背心皆脹原從怒觸又火肉所傷故發熱而渴醫者皆作陰虛火動而為滋陰降火胃背愈脹血來更多予診之兩關俱洪滑有力謂曰此肝脾二經有餘症也作陰虛治左矣內經曰怒傷肝甚則嘔血并下洩胃背脹痛瘀血使然脾為大肉所傷故不能統血今誤用地黃麥冬黃柏知母等劑是以脾益傷而上焦瘀血愈滯也惟調氣健脾兼之消導

三吳一卷

四八

則萬全矣六老曰人皆謂勞怯故發熱吐紅血上吐陽絡傷也血下行陰絡傷也陰陽俱傷法當不治公獨認非陰虛何也予曰脉書云脉數無力者陰虛也今脉固非陰虛書又曰凡陰虛之熱發於申酉戌間夜半而退明日猶是如潮信然以下午乃陰分主事故曰陰虛潮熱也今熱不分晝夜而症亦非陰虛故曰作陰虛治者在也六老聞言大喜曰公誠見垣一方者幸惠一七以生之即與山查香附枳實調氣消導為

君丹參丹皮桃仁滑石茅根化瘀血為臣黃連
蘆根解大肉之熱為佐四帖胃背寬血吐止惟
腹中不舒仍以前藥同丹溪保和丸與之四帖
大便下極臭黑糞半桶寢食俱安矣三十九

有減氏之婦原以有痰火服降火之藥過多至秋
痰積因令氣下行而滯於大腸臍邊有硬塊按
之甚痛痢下紅白八日下惟點滴日夜二十餘
行腹痛潮熱口渴小便不利大便裏急後重飲
食不進身重不能轉側予診之喜左脉皆有神

三卷

四九

氣即從劉守真之法行血則便膿自愈調氣則
後重自除治之用白芍藥滑石桃仁為君當歸
為臣木香檳榔山查酒苓酒連枳殼為佐服下
大便稍流利腹中稍寬舒次日仍與前藥則滯
下大行痢減大半第三日用芍藥當歸滑石桃
仁炙甘草酒連木香與保和丸全服下午大便
行上午所服丸藥隨糞而下乃知積滯已盡諸
症悉減惟臍邊痛未全止以仲景小建中湯加
當歸木香服之而安四十

丁耀川文學令堂年四十四常患胃脘痛嬌居十
五年日茹蔬素其年七月觸於怒吐血梳許不
數日平矣九月又怒而吐血如前加腹痛至次
年二月忽裏急後重肛門大疼小便短澁出惟
點滴痛不可言腰與小腹之熱如滾湯浥者日
惟仰卧不能側一側則左跨并腿作痛兩跨原
有痛小便疼則肛門之痛減肛門疼則小便之
痛亦減肛門以疼之故不能坐遇驚恐則下愈
墜而疼經不行者兩月往常經來時腰腹必痛

三卷

五十

下紫黑血塊甚多今又白帶如注口渴通宵不
寐不思飲食多怒面與手足發虛浮喉中梗梗
有痰肌肉半消診之脉僅四至兩寸軟弱右關
滑左關絃兩尺濡據脉上焦氣血不足中焦有
痰下焦氣凝血滯鬱而為火蓋下焦之疾肝腎
所攝腰跨肝之所經而二便乃腎之所主也據
症面與手足虛浮則脾氣甚弱飲食不思則胃
氣不充不寐由過於憂愁思慮而心血不足總
為七情所傷故內經云二陽之病發心脾女

子得之則不月。此病近之。且值火令。當權之。候誠可慮也。所幸者脉尚不數。聲音清亮。尤可措手。因先為開鬱清熱。調達肝氣。保過夏令。後再為驟補陰血。必戒絕怒氣。使血得循經。而病可痊。不然則倉扁亦難奏功矣。初投當歸龍薈丸。以徹下部之熱。繼以四物湯。龍胆草黃柏知母。柴胡澤蘭葉煎。吞滋腎丸。連服四日。腰與小腹之熱始退。後以香礬石膏龍胆草挑仁滑石杜牛膝甘草梢。煎柴胡煎。吞滋腎丸。大小便痛全

三異一卷

五一

減四十一

丁文學長令姊。常患暈厥吐痰。梳許乃甦。一月三五發。後又口渴。五更倒飽。腸鳴腹疼。洩瀉。小水短滿。咳嗽。余脉之。兩寸濡弱。兩關滑大。此中焦痰積所致也。先與二陳湯。加蒼朮山查麥芽。以健脾胃。去濕為臣。以白芍藥止痛為君。以滑石澤瀉引濕熱從小便出為佐。黃芩為禪佐。十帖。二陰之痛俱止。改以六味地黃丸。加黃柏知母牛膝服之。全安。四十二

有金良美者。年十八。患咳嗽吐紅。下午潮熱。夢遺

市醫進四物湯。加天麥門冬。黃柏知母之類。治半年。反加左脅脹疼。不能側卧。聲音漸啞。飲食輒惡。心。肌肉大削。六脉俱數。醫告技窮。因就予治。觀其面色白。又隱隱有青氣。夾之。兩足痿弱。無力。予語之曰。此症氣虛血熱。而肝脉甚絃。絃則木氣太旺。脾土受虧。不能統血。殆始怒氣所觸。繼為寒涼之劑。所傷。以致飲食惡。心。肌肉瘦削。書云。脾胃一虛。肺氣先絕。以肺金不足。則肝

三異一卷

五二

木愈不能制濁痰。痰血凝於肺。竅故咳嗽聲啞。滯於肝。故左脇不能貼席。而卧。病勢危矣。喜在青年。猶可措手。因急用人參二錢。鱉甲五錢。為君。白朮白芍陳皮茯苓通草貝母各一錢。為臣。甘草牡丹皮各七分。為佐。桔梗五分。為使。二十帖。潮熱止。咳嗽減大半。三十帖。聲音開亮。左脇亦能貼席。而卧。後以大造丸。調理全安矣。乃囑之曰。病愈。雖可喜。而絃脉未退。須切忌怒氣及勞心勞力之事。庶幾可保無虞。苟不守予言。而

勞怒相觸血來必不能禦戒之防之此後精神日王肌體豐肥六年無事一日遇事拂意大怒而又結算勞心則血如泉湧頃刻盈盆上唇黑腫汗出淋漓急請予診脉亂無倫診畢渠語近侍欲大解予曰此死徵也陰陽乖離矣辭而出未離門而氣絕父母哭謝予曰始守翁訓苟活六年一旦不戒遂如翁所料死生雖命亦不自慎致之其為人也量窄而繫於財因記此以戒世之重財輕生者四十三

三其一卷

五三

倪五娘子以中風暈厥之後口眼歪邪左脚右手不能屈伸口渴小水不利兩頰紫出語艱澁問之則期期而對不問默然亦不思飲食行年五十矣諸醫不効予治始與涼葛散加石菖蒲遠志煎湯化錢氏安神丸二顆服之其夜大便四行次日神氣遂清口眼半正惟車類尚駸未能開聲細察形氣佝弱也即與六君子湯加麥門冬滑石天荅粉石菖蒲遠志當歸薄荷服後神思大清爽能自坐不須人扶語言亦稍利改以

六君子湯加麥冬天荅粉石菖蒲當歸五加皮
薏苡仁紅荅天麻十帖全愈矣四十四

王祖泉令改患頭疼夜熱洒浙惡寒汗淋漓如兩上身熱下身寒渴不思飲遍身痠腹有一塊大如拳硬如石腸鳴小水短少飲食俱廢脉則右關滑左絃數究所由起謂大怒後即傷於食市醫皆以地黃門冬荅連黃柏之劑治之熱愈甚脾氣大虛予治用平胃散加山查麥芽砂仁香附木香川芎枳實連進四帖中氣稍能運動而

三其一卷

五四

夜熱如前再與補中益氣湯寒熱俱退矣而腹痛裏急後重予知其積滯將行也乃與白六神丸而腹痛後重皆除改進以參苓白朮散加香附烏梅山查服之病良已四十五

溫巽橋子婦吳車駕湧瀾公長女也發熱惡心小腹痛煎為怒後進食困而成積左腳酸痛已十日矣南潯有陳女科始作瘟疫療治嘔噦益加又作瘡治粒米不能進變為滯下裏急後重一日夜三十餘行陳技窮而辭去且言曰非不盡

心犯逆症也。下痢身涼者生，身熱者死。脉沉細者生，洪大者死。今身熱脉大，而又噤口，何可為哉？因請予治。脉之兩手皆滑大，尺部尤搏指。予曰：症非逆，誤認為疫為瘡。治者逆也。雖多日不食，而尺脉搏指，內經云：在下者引而竭之。法從下，可生也。即與當歸龍會丸一錢五分服下。去稠積半盆，痛減大半，不食者十四日。至此始進粥一甌，但胃滿仍飽悶，不知餓。又與紅六神丸二錢，胃滿舒而小腹軟，惟兩跨痛，小腹覺冷。用

三六一卷

五五

熟磚熨之。子戶中白物綿又下。小水短瀆，改用五苓散加白芷、小茴香、白鷄冠、荊柴胡服之。至夜滿腹作疼，亟以五靈脂醋炒為末，酒糊為丸三錢，白湯送下。通宵安寢。次日精神清健，飲食大進。小水通利矣。而獨白物仍下。再用香附炒黑存性、枯礬各一兩，麵糊為丸，每空心益母草煎湯送下二錢，不終劑而白物無，病全愈矣。專科報然稱奇而服，錄其案驗而去。四十六

溫一渠內人。平素血虛咳嗽。近為飲食所傷，不知

飢餓。專科作陰虛治。而胃滿愈脹。予脉之右關滑大，左手軟弱。法當先健脾胃，消去飲食，然後治嗽。若為滋陰降火，不惟咳嗽無功，恐脾胃轉傷。腹脹瀉洩，變將不測何也。脾胃喜溫而惡寒也。即以二陳湯加山查、麥芽、枳實、白朮、川芎、香附與之。一劑而胃滿寬，再劑而飲食進。繼用桑白皮、地骨皮、甘草、陳皮、貝母、瓜蒌仁、馬兜鈴、桔梗、紫苑十帖而咳嗽脫然矣。四十七

三六一卷

五六

溫巽橋二令媳產後五十餘日，右脇脹痛，手不可近，赤白帶多，下如膿，發熱，大便燥結。予曰：此惡露未盡，瘀血化為膿。治宜急也。嘗見數婦有此病，而不識治，積而成毒，有成腸癰者，有內成腫毒潰從腰俞出者，皆以不知治法，則瘀血無從出故也。急用澤蘭、葉山查、子五靈脂消惡露為君，川芎當歸、茯苓、白芷為臣，益母草為佐，香附、青皮為使。外與當歸龍會丸潤大便，使熱從大便去。服後次日腹脇皆寬，痛亦盡止。又因食葷與鷄子，復作疼，但不如前之甚。隨與保和丸用

山查煎湯送下三錢而痛愈矣。四十八

溫天衢氏。冬月病目。醫為發散太過。至春間吐血

枕餘。及夏下午潮熱。咳嗽。胃高脹疼。早晨冷汗

淋漓。大便澹。一日兩行。飲食少。肌肉消十之七

脉數。據症脉。法在不治里中。諸長老以其素行

端厚。群然懇子措劑。予以衆懇不能辭。乃用瀉

白散加五味子。白芍藥。貝母。馬兜鈴。服下。其夜

帖然而卧。不嗽。惟大便澹。前藥加白扁豆。山慈

茯苓。汗亦漸止。復與瀉白散加石斛。馬兜鈴。貝

三共一卷

五七

母陳皮。薏苡仁。白芍藥。山藥。五味子。桔梗。調理

三月而全。四十九

張二娘子。姪七月而嘔吐不止。氣壅咳嗽。胃與兩

脇皆脹。不能伏枕。予先與金苓丸二服。以止吐

服下。立應。繼與大腹皮。陳皮。枳殼。半夏。甘草。竹

茹。茯苓。旋覆花。前胡。紫苑。黃芩。生姜。服二帖。氣

平。嗽止。安然睡矣。五十

金苓丸者。雄黃一錢。五分。半夏一兩。枳榔二

錢。姜汁浸蒸餅糊為丸。是也。

王敬泉內春。患咳嗽。腹飽脹。洩瀉。腸鳴。裏急後重。

發熱。口臭。鼻之氣如火。塞以六君子湯。加山查。麥

芽。柴胡。秦艽。青蒿。白芍藥。益智仁。與香連丸。兼

服。兩劑。氣舒。嗽減。大便結實。鼻仍塞。前方加川

芎。減白芍藥而安。五十一

溫南溪內人。居常大便秘結。面赤。不思飲食。頭時

眩暈。診其脉。右關尺滑。大有力。此痰火症也。用

瓜蒌四錢。為君。滑石三錢。枳實二錢。半夏一錢。

三共一卷

五八

半。為臣。蘿蔔子。姜黃。各一錢。為佐。兩帖。愈矣。又

教以或遇大便秘結。每服當歸龍會丸。加牛胆

南星一錢。立應。五十二

陳春野。孝廉。二令愛。患丁癩。疔。四肢浮腫。以布

袋。丸與大安丸同服。則大瀉。用參苓白朮散。加

澤瀉。山查。麥芽。瀉亦不止。神氣大弱。穀粒不入

口。小水不利。大便一日仍三五次。積滯未除。改

以參苓白朮散。加肉蓯與服。瀉稍止。食粥一盞。

下午因食紅棗。數枚。夜分痰忽起。其勢甚危。急

與蘊合丸服之。而愈。再以參苓白朮散。加石菖

蒲藿香炮姜肉菓調理全安 五十三

潘敬堃令媳原因經水不行醫投安胎之劑越七月經水忽大行內有血塊筋膜如手大者一二桶昏冒困憊為劇逆予治其脉右關洪滑左寸洪數兩尺皆洪大病形夜分咬牙亂語手心熱口噤時手足皆冷心頭脹悶不快面色青始諸醫皆謂難治予曰無恐此濁痰流滯血海以誤服安胎之劑益加其滯夫血去多故神魂無依痰迷心竅故神昏語亂急為調氣開痰安神養

三吳一卷

五九

血可生也即以溫膽湯加石菖蒲酒芥天麻酸棗仁丹參與服其夜子丑時咬牙亂語皆減半次日仍與前藥每帖加竹茹五錢臨睡又與黑虎丹數粒諸症悉去而愈敬堃問曰藉高手病痊矣而每發於夜半何也予曰此心包絡與膽經有痰熱故每至其時而發單治此兩經痰既消而神魂俱安也敬堃曰善 五十四
上舍張懷赤每早晨腸鳴瀉一二度晚間瀉一度年四十二且未有子予診之尺十短弱右關滑

大予謂此中焦有濕痰君相二火皆不足故有此症以六君子湯加破故紙桂心益智仁肉苳菟煎服瀉遂減半又以前藥加杜仲為丸服之而愈次年生子 五十五

臧七房二老夫人年六十八患痢痢後過食熟菱與腐湯以致大便滑洩不固飲湯水徑直下不停胃膈否悶語言無力舌乾口燥生瘡噤津液則喉疼元氣大虛而熱皆虛火所致且長素二十餘年又當痢後益知非有餘之症也脉又尺

三吳一卷

六十

寸俱弱兩關滑大內經云清氣在下必生食洩濁氣在上必生膈脹此之謂也法當提清降濁補助元氣用四君子湯加葛根白芍藥黃連清虛熱止燥渴為君桔梗輔佐葛根升提清氣為臣陳皮麦芽降其濁氣以消胃膈否悶為佐加烏梅為使上使生津下使止瀉連服二劑尺寸之脉稍起飲食亦得停腹駸駸然始有生氣仍以前方加白扁豆神麩打糊為丸調理而安 五十六

蔡樂川令眷患頭痛。痛如物破。髮根稍動則痛延滿頭。暈倒不省人事。踰半時乃甦。遍身亦作疼。胃滿飽悶。飲湯水停。兩間不下。先一日吐清水數次。細虫三條。原為怒起。今或惡風或惡熱。口或渴或不渴。大便秘。脉則六部皆滑。大有力。予曰。此痰厥頭痛症也。先以藿香正氣散止其吐。繼以牛黃丸黑虎丹清其人事。頭仍疼甚。又以天麻葉本各三錢。半夏二錢。陳皮白芷薄荷麻黃生姜葱白煎服。得少汗而頭痛少止。至晚再服之。五更痛止大半。而人事未全清。予謂此中焦痰盛。非下不可。乃用半夏五錢。巴霜一分。麵糊為丸。每服三十丸。生姜湯送下。下午大便秘。三次。皆稠粘痰積也。由此飲食少進。餘症差可。惟遍身仍畧疼。改用二陳湯加前胡石膏葉本薄荷枳壳黃芩石菖蒲調理而安。五十七

周蓋汀乃眷患胃脘痛。手心熱。嘔吐不食者四日。晝夜叫痛不輟聲。脉則兩手皆滑數。予謂當以清熱止痛為先。故先與清熱止痛末藥二錢令

二卷一卷

六十一

服之不一飯頃痛遂止而睡。家人皆色喜。予曰。未也。此火暫息耳。其中痰積甚固。不乘時而下之。勢必再作。因與總管丸三錢。服下。腹中微痛。再服二錢。又睡至天明乃寤。而腹痛亦止。大便下痰積甚多。次日以二陳湯加枳實姜黃香附山梔黃連與之。服後胃脘之痛全止。惟小腹畧覺膨脹。予謂其痰積未盡也。再與總管丸三錢。夜服之。天明又行一次。痰積之下如前。而胃脘之痛亦絕不發矣。五十八

二卷

六十二

醫案三吳治驗二卷目錄

王文川令郎內傷發黃一有發明

施涇陽先生內人痰火二

屠侍軒尊眷產昏憤不知人事三

屠學恒迺眷產後作瀉四

周鑑泉令政傷寒謔語五

滅顧渚老先生西耳揪痒六

王南崗咳嗽氣湧七

張桃津迺政小產後臍下痛八

陳光祿五更胸膈脹九

溧水令君夫人五更倒飽洩瀉十

李悅參夫人腹痛謔語如狂鼻衄有發明十一

吳仲峰脾洩十二

張後溪令孫瘡疥發腫十三

張五橋夫人喘嗽十四

方東楚脊骨痛牽引胸腹皆痛十五

張淨宇發熱腹痛瀉瀉嘔吐十六

張近川胃脘痛十七

閔文川公肛生一毒膿潰不收口十八

李古愚胸膈飽悶大便溏泄十九

姚惠參夜多洩瀉二十

姚老夫人右手疼二十一

一僕時疫頭痛發熱二十二

一僕時疫頭痛如破二十三

一僕時疫嘔吐煩躁口渴二十四

馬鳳陽咳嗽內熱二十五

倪二南內人小水不禁二十六

嚴柱史令媳腹中有塊疼痛二十七

陳鹿塘脹風臟毒大便燥結二十八

張道南內人腹痛二十九

張道南尊堂膈上痰飲痞而惡三十

馬迪庵內人奇痰症三十一

董老夫人眩暈三十二

張裕參惡寒發呃三十三

嚴老夫人胸膈痞悶三十四

王谷泉頭眩洩瀉汗出不止三十五

方東望兩脇痛 三十六

一婦懷孕內熱咳嗽 三十七

一婦心痛唇紅虫症 三十八

倪二南內人小產小腹疼痛暈厥 三十九

倪少南右頰車浮腫疼痛 四十

倪少南內人經行如崩頭暈 四十一

高仰山內痔血裏急後重 四十二

姚娘子小腹疼 四十三

張五橋先生令政痰喘咳嗽 四十四

徐文學三泉令即右脇脹痛 四十五

王祖泉乃眷遍身痛 四十五

費少垣乃眷孕痰喘胎逆 四十六

費一吾令政孕子淋 四十七

六娘子遍身痛汗大出昏昏如醉 四十八

八娘子頭痛咳嗽痰多有血 四十九

姚弁山內人胸脇痛 五十

李坦渠令子室咳嗽心痛腰疼 五十一

周衡宇咯血痰火作痞 五十二

方守腰膝痠痛 五十三

鄭耆元頭痛內熱 五十四

徐老夫人胸膈痞悶 五十五

張麗川咳嗽多痰糞門發癢 五十六

陳仰山內人小產二月而血大下 五十七

張溪亭乃眷喉中梗梗有肉如炙嚮 五十八

張溪亭令媳夢亡過祖母打其背 五十九

陳茂之勞倦色慾傷寒 六十

陳五山胃脘痛 六十一

吳小峰酒積作痛 六十二

沈大叅痰飲痞滿 六十三

王敬泉胸膈飽悶頭暈作吐 六十四

張二官傷寒 六十五

大司馬令媳產後暈厥發狂 六十六

孝廉臧茗泉瘡後作痢 六十七

包繼可先生令眷孕而發瘡 六十八

吳比部公子病眼有發明 六十九

丘太守令侄筋痿有發明 七十

一書辦下治七十一

魚憲令媳怒後夜卧不安七十二

老夫人夜來臍腹痛甚七十三

丁春元令即瘡母七十四

孫令君令媳產後謔語發熱洩瀉七十五

吳來星先生楊梅毒有發明

潘見所老先生小盛疥積有發明

凌絳翁痰火吐紅喘嗽七十八

周鳳亭濕熱壅滯發熱煩躁有發明

周采石濕熱生痰痞悶八十

又令孫女龜背八十一

閔蜃樓虛損咳嗽令脊痛風奇疾有發明

金寄間令堂痢而胸膈膨脹八十三

徐中宇之婦汗出如兩昏又憤又胸膈要人足踹

金達泉令政孕三月而痢赤白八十五

金元岩赤白痢八十六

金達泉瘡痢交作八十七

金寄間少陽陽明合病為瘡八十八

淮陰胡少泉令即夢遺令愛發熱咳嗽又友人瘡疾八十九

吳氏婦隱疾有發明

潘之婦腸癰九十一

王德泉臟毒下血九十二

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人余煌

子 泰來

朋來

全閱梓

三吳治驗

王文川令郎原傷飲食，又傷於冷菱等物，遍身發黃，眼如金色，夜發熱，天明則退，腹痛不可近，號叫通宵。市醫因其黃而曰胡苟真矣，眾議以

三吳二卷

草頭藥進，予至，急止之，曰：向以草藥誤其母，復欲誤其子乎？蓋脾胃喜溫惡寒，且此症之食積釀成，而黃為濕熱所致，法當健脾，用溫暖之劑下之，濕熱去而黃自退。草頭藥性多寒，用之是損脾土而益其疾也。可用哉！即以保和丸一錢，入僞急丸五分，作一次服之，必順瀉一次。又少頃連下三次，積物所下甚多，腹痛盡止。再與調中丸服一月，不但一身之黃盡退，而步履輕捷如飛。其父喜曰：神不誤我，問其故，曰：始議進

草頭藥者十九，而孫君獨叱其非，余不能決而決於神神允孫君，服果有效，而吳我峰小樓等曰：亦孫君之藥神爾，設無孫君神，雖靈何所顯哉！眾拊掌而嘍。

知涇陽先生內人年五十八，左脇有瘰癧，必升至咽間，即脹悶，不知人事，遍身皆脹，不能臥。小水赤澀，其脈兩寸關洪滑，六部皆數，予謂此痰火症也。痰生熱，熱生風，故每發人事不知，爾乃與牛黃清心涼葛丸同黑虎丹服之，夜遂得睡。

三吳一卷

二

事亦安靜，再以二陳湯加滑石竹茹，鬱金，薄荷，黃芩，前胡，加燈心，生姜煎服，全安矣。屠侍軒尊眷，產一日而觸於怒，大便洩瀉，昏憤，不省人事，大熱氣促，汗多，眾醫謂產後脈不宜大，今脈大而左手且散亂，又汗出喘促，法在不治。予曰：固然，書云：醫而不起者有矣，未有不藥而起者也。且不藥而視其死，與藥而或一置生者，孰優？予試之，亞與人參五錢，白朮三錢，炙甘草一錢，五分，炮姜二錢，肉蓯蓉六分，五味子七分，煎

服其初遂稍睡。予竊喜補而得睡其陰陽和矣。次早脉果稍收。欬喘促亦緩。大便前半夜瀉三次。五更啜粥半盂。小便通利。大有生意也。再以人參阿膠固元氣。定喘為君。白朮炮姜補脾為臣。澤蘭葉退產後之熱。五味子欬神止汗。肉蓯止瀉為佐。甘草和中為使。五帖而安。三

屠學恒先生乃眷以產後欠補。養而精神疲困。脾胃亦弱。腹中間作痛。作瀉。脉兩手皆濡軟無力。以六君子湯加藿香砂仁香附蒼朮澤瀉調理而安。四

三兵二卷

三

周鑑泉令政。病傷寒。發熱譫語。口渴咳嗽。胃脘痛。洩瀉嘔吐。遍身發斑。診之六脉洪滑。予曰。此少陽陽明合病之症。勢亦重矣。急以升麻葛根湯加滑石五味子進之。服後汗大出。下午即退涼。而譫語止。晚進柴苓湯加五味子滑石。其夜瀉止。神思始清。次日左脉已和。右脉亦稍收。欬予喜曰。可無恙也。改用白芍藥為君。陳皮柴胡酒芩五味子牡蠣滑石茯苓澤瀉白朮服四帖而

瘡可五

大國博臧顧渚先生病。兩耳掀痒。唇燥舌乾。咳。吐濃痰。脉左稍浮。絃右洪滑。此胃中痰火流入肺經鬱積。久而生熱生風也。先以總管丸。其痰。又與黑虎丹祛其風熱。繼以天荅粉薄荷鬱金葛根白藥子甘草黃連連翹蟬退煎服而安。六

王南崗咳嗽氣湧不能伏枕。吐痰不已。下午微熱。胃高膨脹。不知飽餓。口乾舌上白胎厚。小水短少。大便裏急後重。間有紫黑血。脉右關洪滑。左手濡。據脉症。胃中有瘀血痰積。而肺氣亦虛也。法當先補而後瀉。以人參白朮白芍藥柴胡黃連陳皮半夏五味子桔梗與三帖。後察其肺脉已旺。乃與總管丸下之。去黑血屑極多。諸症悉減。再與紅六神丸調理而痊。七

三兵二卷

四

張挑津乃政原有小便癃閉之症。又小產後三日。臍下作疼。夜分發熱。口渴。大便溏。日三四度。完與補中益氣湯加玄胡索澤蘭葉牡丹皮服之。

連進三帖。大便實矣。惟小便頻數。滴瀝不斷。一日夜二十餘次。夜分尤多。精神甚憊。脉雖五至。不甚充指。此血虛有熱而氣亦滯也。濕熱在氣分。故口中渴。血虛故膝下痛。法當峻補其陰。而添滲其陽。以熟地黃三錢。黃柏一錢。補陰為君。草薢去濕熱為臣。薤麥穗澤瀉淡滲為佐。烏藥調氣。甘草為使。服下。臍痛全止。小便其夜亦不起。連進三帖。病脫然矣。

陳光祿松栞翁長厚君子也。而存心博愛。常五更

李真上卷

五

胃滿脹疼。三吳名家遍延而治。寒熱溫涼藥味。備嘗。竟無一効。禮子診之。右寸軟弱。左平。兩尺亦弱。予曰。此肺腎二經之不足也。補而飲之。可無恙矣。以補骨脂。山茱萸。人參各三兩。鹿角膠。鹿角霜各五兩。杜仲。巴戟。白茯苓。車前子各一兩。五錢。乾山藥二兩。鹿角膠酒化為丸。空心淡鹽湯送下。又以御米壳去筋。膜蜜水炒三兩。訶子。麵煨去核一兩。陳皮一兩半。煉蜜為丸。五更枕上白湯送下一錢。服一月。病不再發。翁由是

交予極驩也。及見予玄珠稿。大稱快。語曰。醫家凡得一方。輒自秘以為高。君獨欲公諸人。是有意於壽蒼生者。亟付剞劂。予當助梓。因手錄予百餘方。製丸散以施。而亦無人德我之望。九

溧水令君吳湧瀾公尊夫人。每五更倒飽。必瀉一次。腹常作脹。間亦痛。脉兩手寸關洪滑。兩尺沉伏。予曰。此腸胃中有食積痰飲也。乃與總管丸三錢。生姜湯送下。大便雖行。不甚順利。又以神效香連丸和之。外用滑石甘草木香枳壳山查

李真上卷

六

陳皮白芍藥酒連調理而安。

李悅齋先生夫人。胃脇大腹作疼。謔語如狂。寅卯辰三時稍輕。午後及夜痛甚。晝夜不眠。飲食不進者十八日。究其故。原有痰火與頭疼牙疼之疾。又因經行三日。後頭疼發寒熱。醫以瘡治。因大惡熱。三四人交扇之。而兩手浸冷水中。口陰水而不嚥。鼻有微衄。又常自悲自哭。日以多哭而腫。痛時。即壁上亦欲飛去。劇則咬人。小水直下。不固。喉梗梗。吞藥不下。脉則左絃數。右關洪

滑予曰。此熱入血室症也。誤服治瘡剛燥之劑而動痰火。以致標本交作。諸人猶謂熱入血室。當夜間譫語如狂。如見鬼。何至胸脇疼劇。咬人也。予曰。仲景云。經水適來。適止得疾。皆作熱入血室治之。治全少陽。而以小柴胡湯為主。加涼血活血之藥。此古人成法可守也。痛極咬人者。乃胃虛。垂行求食而不得。故喉中梗梗然也。即以小柴胡湯加桃仁丹皮而譫語減。次日以安蛇湯與服而疼隨止。飲食進。遂駁駁有生意。十一

三吳二卷

七

吳仲峰先生邀予診時。為仲秋初二日也。六部皆沉微。而左尤甚。隱隱如珠絲之細。症則原以腸風去血。過服寒涼。致傷脾胃。自春至秋。脾洩不愈。日夜十二三行。面色黃白。帶青。兩頤浮腫。四肢亦浮。小水不能獨利。利必與大便並行。腸鳴。四肢冷。口不渴。飲食大減。口唇齟肉皆白。其為人。也多憂思。夫四肢者。脾之所主。清冷為陽氣不充。兩頤乃腎經部位。浮腫益見腎氣之不足也。脈沉微。與面色黃腫。皆屬於濕。書云。諸濕腫

滿皆屬脾土。合脈症觀之。由脾虛不運。積濕而然。虛寒明矣。病至此勢亦甚危。第形症相符。色脈相應。又能受補。庶幾可生也。法當大溫補。升提。以東垣益胃升陽滲濕湯。加減調理。人參三錢。白朮五錢。黃耆二錢。茯苓益智仁蒼朮澤瀉各一錢。大附子五分。炮姜炙甘草升麻防風各五分。連服八帖。諸症悉減。乃囑之曰。病雖暫愈。宜戒生冷憂思。庶服藥有效。切勿輕犯。犯之非藥石可回也。翁曰。諾。敢不唯命。十二

三吳二卷

八

張後溪先生令孫。遍身瘡疥浮腫。腫自足背起。漸腫上大腿。今且至腹。大便洩瀉。發熱不得安寢。此風濕之症。當令與時遠之。候治從開鬼門。潔淨府二法。使清陽升。則瀉可止。小水利。則浮腫可消。上下分去其濕之意也。蒼朮一錢。薏苡仁桑白皮各三錢。青蒿防風升麻柴胡各五錢。大腹皮五加皮赤茯苓澤瀉各六分。八帖全安。十三

府佐張五橋先生夫人患喘嗽。夜分氣壅。不能仰

卧。體素弱。脉右滑大。左細弱。每咳嗽必連連。或
十聲。痰不易出。甚至作吐。以東垣人參平肺散
加減治之。四日而愈。人參桑白皮地骨皮青皮
茯苓五味子知母滑石麦芽天麻粳米甘草。水
煎服。夜與白丸子。十四

方東楚患脊骨痛。牽引胃腹皆疼。舌上黃胎甚厚。
脉沉滑而數。先與川芎羌活炙甘草蒼朮姜黃
防風藜本枳壳枳椇胡服之。服後背脊痛減。
腹仍痛。與木香枳椇姜黃香附青皮酒連大

姜柴胡川芎服之。腹痛稍減。腰疼甚。知其痰積
下行。欲去而不能也。即以木香枳椇九下之。連
行三四次。舌上黃胎始退。腹痛全止。脉亦軟弱。
改以人參當歸白芍甘草茯苓陳皮白芥子香
附柴胡青皮白朮調理而安。十五

張淨字文學發熱腹疼洩瀉口渴嘔吐不止。時
有認寒者有認熱者有認傷食者。予至診之。三
此時痰瀉也。以二陳湯倍白朮加青蒿葛根酒
苓白芍藥猪苓澤瀉滑石。一劑而安。十六

張一尹近川翁始以內傷外感過服發散消導之
劑致胃脘當心而痛。六脉皆絃而弱。此法當補
而斂之也。白芍藥酒炒五錢。炙甘草三錢。桂枝
一錢半。香附一錢。大棗三枚。粉糖一合。煎服一
帖而瘳。十七

閔文川先生。肚上生一腫毒。月餘膿潰矣。但稍動
則出鮮血不止。大便結燥。胃弱飽脹。飲食不思。
脉兩寸短弱。關絃。尺洪滑。此氣虛血熱。陷於下
部。法宜補而升提也。者不然。痔漏將作。可慮也。

黃耆二錢。歸身地榆槐花枳壳各一錢。升麻
芫各七分。荆芥穗五分。甘草三分。服後胃弱實
惟口苦甚。前方加酒連連翹各五分而愈。十八
李古愚先生。每食後即大便。腹皮稍脹急。胸膈飽
悶。醫與參朮則痞悶愈甚。小水清而長。予脉之
左寸滑。右寸滑。按之如黄豆大。且鼓指。關尺之
脉皆絃小。左尺脉遲。迨有神氣。據脉乃積痰鬱
滯於肺。莫能出。以致大便之氣不固也。法當
丹溪治乃叔用吐。吐去上焦痰積。而大便自實。

矣。先用苦梗蘿蔔子各三錢。白芷仁橘紅山梔仁各一錢。川芎五分。生姜三片。葱三根。水煎服之。取吐。服後半時許。惡心。吐出清痰。心惡之勢雖有。乃痰積膠固。猶不易出。又以蘿蔔子一合。搗漿水。加蜂蜜與半碗飲之。始吐出膠痰二椀。餘。平日每小水。則大便並行。吐後小水始能獨利。連行三四次。而胸腹寬舒。初亦以吐為懼。至是豁然稱快。大便五日不行。始以予言為不謬也。再以二陳湯加白朮旋覆苓麥芽調理而全。

可矣。十九

姚惠齋先生夜多洩瀉。必三五次。甚且十數次。小腹時作疼。按亦疼。口不渴。小便長。醫半年不愈。予診之。左寸滑。餘五部皆濡弱。此陽氣大虛。虛中有寒也。治當溫補下元。兼之升舉。人參一錢半。黃耆白朮各二錢。白芍藥酒炒三錢。大附子五分。肉桂一錢。杜仲補骨脂各一錢半。升麻防風各七分。姜朮煎服。其夜大便減半。次早雖瀉。俱是白積如生豆汁狀。小腹痛止。再診之。右

脉稍起。連服四帖。而瘳。翁喜言曰。抱病半年。藥無虛日。今收功於四劑。何速哉。認病真而投劑確也。敢不銘心。二十

大京兆姚畫老夫人。年幾七十。右手疼不能上頭。醫者皆以痛風治不効。益加口渴煩躁。請予診之。右手脉浮滑。左平。予謂此濕痰生熱。熱生風也。治宜化痰清熱。煎流動經絡。可瘳也。二陳湯位加歲靈仙酒苓白姜蚕秦芩四劑。而病去如脫。二十一

一僕發熱。頭疼。口渴。腹疼。小便赤。大便瀉。日夜不睡者六日。予診之。曰。據脉汗後浮數。熱尚不減。乃痰症也。以滑石三錢。青蒿葛根白芷片苓各一錢半。炙甘草升麻各五分。一帖即得睡。熱減大半。頭痛全除。惟小水赤。頭暈。脚膝無力。此病後血虛之故。以四物湯加青蒿酒苓蒼朮仁服之而安。二十二

一僕病與前類。而身如火燎。頭痛如破。大便不瀉。小水赤。口渴。鼻乾。不得眠。胸膈膨脹。腹飢不能

食六脉絃而數用竹葉石膏湯加知母枳壳白芷葛根大加青蒿一帖而熱痛減半胸膈亦寬惟口渴小水短濇睡卧不安又與化瘟丹三錢井水化下渴止稍得睡頭暈脚軟喘急與四物湯加青蒿酒苓薏苡仁木瓜服之全安二十三

三吳二卷

十三

之味且五月火令當權之疫當以甘寒之劑治之何可以辛熱香竄者益其火而枯其津也其勢危矣此皆不知因時達變惟習常膠故以誤人者用急投人參白虎湯加竹茹葛根青蒿升麻一帖而熱除再帖而頭痛止諸症盡去後連治數人多如此類何也此天行之疫故一方見之治多先以甘寒清解之劑投之熱退即以四物湯以補陰血稍加清熱之劑而青蒿之功居多此固一時自得之愚用錄之以告同志老使

知治法當隨時俗為變而常套不可不脫也
十四

馬鳳陽文學五月患咳嗽內熱額上多汗惡風脉左絃數右滑數予曰據絃數為陰虛滑為有痰不亟調治恐成虛怯以白芍藥川歸茯苓五味子白朮甘草陳皮貝母天荅粉酒苓麥冬知母桑白皮十帖諸症皆瘳七月復瘳間日一發寒熱相半寒熱亦俱極渴甚上身汗多以石膏五錢人參黃耆白芍藥麥冬知母各二錢柴胡三

三吳二卷

十四

錢桂枝甘草陳皮貝母各一錢竹葉三十片一帖而愈二十五

倪二南先生內人小水不禁一日二十餘起脉右寸洪而有力左寸虛右尺沉微此心腎不交之症也以當歸遠志丹參牡丹皮桑螵蛸人參山茱萸益智仁黃柏知母為丸服之五日而安後凡遇辛苦則發以此服之立効二十六
枉史嚴印老長媳少司空沈鏡老女也患腹痛有小塊藹又然腹覺冷甚兩寸關皆滑數而尺皆

沉微此脾氣弱而飲食不消。又當秋令濕淫之候不利亦瀉宜預防。與白朮蒼朮茯苓甘草白朮杏仁香半夏陳皮澤瀉煎服。其夜果瀉一度。次早又瀉一度。小腹仍疼不少減。且裏急後重。蓋其稟賦素虛。當補中兼消兼利。白芍藥三錢。桂心一錢。甘草人參茯苓澤瀉陳皮白朮各八分。升麻葛根各六分。服後脉皆軟弱不滑。瀉塊亦消。改以人參黃芪白朮白芍藥各二錢。炙甘草陳皮澤瀉葛根柴胡茯苓各一錢。調理而全。

三異二卷

二十七

十五

新市陳鹿塘先生原有腸風臟毒之症。大便燥結。數日不能一行。痛苦殊甚。此胃寒腸熱之症。其脉兩寸皆數。兩關皆絃而無力。兩尺洪滑。而左尤甚。診畢。渠告予曰。病數年。百醫不效。望生難矣。聞公治多奇中。真一奇而生之。實再造之恩也。予憐其苦。而俛想久之。因思李東垣有云。大腸屬金也。今治腸胃相兼之疾。必寒非寒。而

熱非灼灼。始可乃詳酌一方。專以腸風臟毒之藥為君主。外以養血之劑。使之不傷胃氣。蓋藥先入胃。而後傳入大腸。入胃時。裹藥未化。及入大腸。則裹藥化。而君藥始見。庶幾兩不相妨。亦假道滅虜之策也。因以大黄酒浸九蒸九晒者二兩。槐花三兩。木耳二兩。郁李仁皂角子象牙屑條芩各一兩。血餘灰升麻荆芥穗各五錢。為末。煉蜜為丸。赤豆大。外以四物湯加蒲黃各一兩。為衣。米湯送下。空心及下午各服二錢。服

三異二卷

十六

此果然血止。而大便不燥。飲食日加。鹿塘大喜。曰。古稱用藥如用兵。奇止相生。鮮有不克敵者。其公之謂乎。二十八

張道南先生內人。以飲食忤於氣。因腹痛。不飲食五日矣。逆予診之。兩寸關絃。尺滑。予曰。此上焦氣虛。下有鬱滯也。以姜黃青皮為君。山查枳榔當歸杏仁烏藥枳殼為臣。柴胡木香為佐。吳茱萸為使。服後氣稍順。然後用葱二斤。煎湯浴洗腰腹。即將熟葱擦摩腰腹。使氣通透。洗畢即安。

卧少頃其夜大便通先下皆黑硬結塊後皆水
此積滯行而正氣虛也以建中湯加山查茯苓
澤瀉柴胡香附姜連調攝之而痊二十九

張道南先生尊堂老夫人以勞倦致早晨高上有
痰痞而惡心每食熱物目中即出泪脉右寸關
皆滑左寸短弱此心血不足而肺胃有痰也以
六子湯加麥芽白豆仁旋覆蒼治之而愈

馬迪庵先生內人原以飲食過傷又為風寒外襲
醫以內傷外感治之後復至五更發熱唇燥胸
中衝跳不已手足皆冷脉兩寸俱滑數予謂此
奇痰症也以小陷胃湯加白芍藥蘿蔔子前胡
酒苓二帖次早大便行下鮑虫八條胸中即不
衝跳但覺力怯再診之西寸減半尺脉稍起以
二陳湯加白朮白芍藥酒苓調理後四帖加當
歸而全愈三十一

大宗伯董潯老夫人常眩暈手指及肢節作脹脉
右寸軟弱關滑左脉絃長直上魚際兩尺皆弱
此亢而不下之脉難經所謂木行乘金之候也

總由未生育而肝經之血未破內經云諸風
掉眩皆屬肝木兼有痰火治當養金平木培土
化痰以白朮半夏天麻湯正與此對服兩帖而
眩暈平再與六君子湯加天麻白姜參以治其
暈加白芍藥以瀉肝麥門冬人參以補肺金麥
芽枳實神麩蒼朮以健脾使宿痰去而新痰不
生少用黃柏二分為使引熱下行令不再發三
十二

張裕齋惡寒痰多作呃胃脘不寬兩寸俱短弱關
洪大尺濇此上焦氣虛中焦有痰下元不實也
法當清中補下不然後將有中風之患二陳湯
加白苳仁香附藿香以開胃氣白芥子蘿蔔子
杏仁以降痰而潤大便兩帖諸症悉去乃錄八
味腎氣丸方與之令自調理三十三

大柱史嚴印基夫人年近六十色嬌居十年餘以
孀居而食長素其婿張懷赤善予語曰外母近
鼻塞大便瀉胸膈不暢醫者下之益甚予曰王
海藏有云雜病酒積下之早必成痞滿所當慎

也。用拉子診之。兩寸沉弱。關絃大。兩尺亦弱。予
曰。此陽氣甚弱。脾氣大虛。不當下而誤下之。故
鼻作塞而胸痞悶也。用蒼朮川芎桂枝白芷防
風桔梗以疎風而升陽氣。白荳仁蘿蔔子寬胸
利膈。麥芽以助脾氣。服後鼻不塞而胸猶痞。復
用東垣木香化滯湯。加吳茱萸乾姜而安。乃囑
之曰。病雖漸愈。第陽氣虛。脾氣弱。不宜久食素
恐中氣不充。防作中滿。謹識之。三十四
王谷泉大便作瀉。上身熱耳中壅塞頭眩暈胸膈

三吳二卷

十九

不寬口渴痰多咳嗽六脉俱濡弱汗大出此正
氣大虛或由尅伐太過所致當以補養為先。人
參白朮白芍藥酒炒各四錢柴胡石菖蒲陳皮
各一錢炙甘草五分澤瀉茯苓各一錢而服而
神清膈寬脾健惟汗不斂眩暈未除再與人參
白朮黃耆酒炒白芍藥各二錢炙甘草五分大
附子五分桂枝三分澤瀉一錢而愈。三十五
方東塾兩脇痛上壅至胸發熱飲食不進脉左手
沉而絃數乃積氣也右手滑痰飲也關脉濡弱

脾氣不充也。據症或觸於怒故痛之暴耳。治當
先去積熱消痰氣然後用補。瓜蒌仁六錢枳壳
姜連半夏各一錢半白芥子一錢牡蠣二錢炙
甘草五分柴胡一錢五分二帖諸症盡去飲食
進矣然恐其復發也與當歸龍會丸使行之以
刈其根服下果行二次。三十六
一婦人懷妊七月內熱咳嗽胸膈飽悶以條芩二
錢瓜蒌仁白芍藥紫苑貝母桑白皮各一錢甘
草三分枳壳熟蘓梗知母陳皮各七分二帖而

三吳二卷

二十

愈。三十七
一婦人心痛唇紅痛則大發熱頭疼少頃出汗脉
大小不一予曰此虫痛之症痛吐白沫可徵也
檳榔川椒各二錢杏仁一錢五分石菖蒲一錢
烏梅七个炮姜草豆仁陳皮各五分山梔仁一
錢一進而痛減半再進而痛全除。三十八
倪二南內人小產後小腹痛夜分作熱作暈予曰
此氣血虛而惡露未盡也川芎一錢半當歸三
錢澤蘭益母草香附丹參各一錢人參七分荆

芥穗五分。山查桂皮各一錢。一帖而小腹痛止。再帖而熱暈悉除。三十九

倪少南右頰車浮腫而疼。直衝太陽。大發寒熱。兩

手寸關俱洪。大有力。此陽明經風熱。文扇所致。

以軟石膏三錢。白芷升麻各一錢。葛根二錢。生

熟甘草一錢。薄荷山梔子牡丹皮連翹各七分。

天荅粉貫衆各一錢半。兩帖腫痛全消。四十

倪少南內人經行如崩。勢不可遏。頭暈眼昏。脉右

寸極軟弱。左近駛。此氣虛血熱之候。由氣虛而

血不固也。仲景云。血脫益氣。特用人參黃耆各

三錢。白朮二錢。粉草五分。荆芥穗蒲黃側柏葉

姜炭各一錢。三帖全瘳。四十一

高仰山內人。痔血。裏急後重。飲食入腹。大便即行。

晝夜行五六度。五更咳嗽。喉中痰响。肌肉脫。口

作渴。由服痔科涼血之藥。過多致脾虛不能統

血也。脉六部皆軟弱無力。以四君子湯加荆芥

穗秦艽陳皮炮姜四帖。而飲食進。血全止。嗽定

而睡寧。後減炮姜。倍加何首烏。又四帖。而數年

不發矣。四十二

姚娘子小腹疼。飲食及藥入腹皆疼。疼來遍身無

力。此由血崩而致。宜急治之。人參黃耆各二錢。

白朮一錢。茯苓陳皮各八分。白芍藥貫衆各一

錢。姜炭荆芥穗蓮蓬壳炭燒各三分。煎服而安。四十三

張五橋先生令政。鄭都諫春寰公令姊也。痰喘不

能伏枕。且咳嗽甚。則吐痰涎。梳餘乃止。以旋覆

苓湯為主治之。旋覆苓紫菀子各一錢。半夏一

三長二卷

錢五分。厚朴桂皮粉草各三分。茯苓陳皮桑白

皮葶藶子各八分。姜三片。水煎服。臨卧以養正

丹二十粒。白湯送下。兩帖。痰喘喘各減十之七。

乃去葶藶子。加白芥子蘿蔔子。二帖而瘳。四十四

徐文學三泉先生令郎。每下午發熱。直至天明。夜

熱更甚。右脇脹痛。咳嗽吊疼。坐卧俱疼。醫以瘡

治罔效。延及二十餘日。熱不能退。後醫謂為虛

熱。投以參朮為主。痛益增。逆予診之。左絃大。右

滑大搏指。予曰。內經云。左右者。陰陽之道路。據
脉肝胆之失。為痰所疑。必勉強作文。過思不決。
木火之性。不得通達。鬱而為痰。夜甚者。肝邪實
也。初治。只當通調肝氣。一劑。可瘳。誤以為瘡。燥
動其火。補以參朮。閉塞其氣。書云。體若燔炭。汗
出而散。今汗不出。舌上之胎。已沉香色。熱之極
矣。設不急治。立見凶危。乃以仲景小陷胸湯為
主。大瓜蒌一兩。黃連三錢。半夏二錢。前胡青
皮各一錢。水煎飲之。夜服。當歸龍會丸。微下之。

三共二卷

二十

諸公猶爭之曰。病久而食不進。精神狼狽。若此
寧可下乎。予曰。經云。肝常有餘。且脉亦為有餘。
故有餘者。瀉之前時。誤認為虛。投補左矣。豈容
再誤哉。服後。夜半痛止。熱退。兩帖全安。四十五
王祖泉乃眷。朝飯後稍寒。惡風發熱。遍身疼痛。汗
大出不止。口中熱。腹中不知餓。小水短。六脉皆
瀰。以白芍藥五錢。白朮二錢。桂皮黃芩各一錢。
甘草八分。二帖而汗止。寒熱除。減去白朮。加當
歸而遍身痛止。四十六

費少垣乃眷。姪已九月。痰多喘嗽。胎氣上逆。眼撐

不起。兩太陽微疼。予曰。此子懸症。蕪痰火也。以
大紫蘊飲為主。絕服一帖。逆即不逆。胸膈頓寬。
惟喘嗽不止。與七製化痰丸而安。四十七

費一吾先生令政。姪已四月。夜不能睡。小便淋瀝。
痰嗽內熱。脉右關滑。左寸微弱。兩手皆數。與橘
紅貝母片苓黃連茯苓澤瀉枳殼蘊梗前胡水
煎服之。其夜即能安寢。次日再以四君子湯加
當歸香附貝母陳皮條苓紫蘊梗前胡調理足

三共二卷

二十四

月而產一子。四十八

今弟媳六娘子。遍身痛發熱。汗大出。昏昏如醉。卧
不能起。兩寸脉短弱。兩手皆數。而無力。此勞倦
之餘。故汗大走也。黃耆三錢。白芍四錢。粉草一
錢五分。桂皮八分。當歸一錢。石斛二錢。一帖熱
除。痛汗皆止。惟倦而不能起。仍以前方加人參
陳皮兩帖而痊。四十九

文八娘子。頭痛咳嗽。痰多有血。夜分發熱。喉中常
作血腥。每經水行。必腹中先痛。三日用香附壯

丹皮滑石甘草桃仁川芎當歸柴胡白芍山梔
子茅根八帖而瘳。五十

姚弁山老先生內人。自上年十月左足不能履地。至十二月產後。忽好三日。復不能動。時常胸脇作痛。素多痰火。而治者卒以四物湯天麥門冬為主。間服獨參湯。服將弥年。而病如故。予診之。兩寸脉俱洪滑。而數夜分發熱。此係濕痰凝滯。補塞太重。故遷延不脫。乃以二陳湯加蒼朮黃柏葳靈仙五加皮生地黃白芥子白芍藥當歸。三吳二卷

兩帖胸脇痛止熱除。再加蒼以仁八帖。而足能舉步矣。五十一

李坦渠老先生令子室。十月發寒熱起。一日一發。咳嗽心痛腰亦痛。至次年正月十七日。始間日一發。肌肉大瘦喉疼。汗出如雨。白帶如注。飲食減少。百試而汗不止。延予為診。其脉右手軟弱。左手散亂。此汗多而脉不斂。病勢至此。危之甚矣。書云。火熱但瘡。此病之謂歟。以黃耆二錢。白芍一錢五分。粉草阿膠各一錢。鱉甲三錢。桂枝

五分。烏梅一箇。水煎服。其夜汗止。次早診之。左脉已斂。神氣亦回。前方加何首烏石斛牡蠣。其日寒熱亦不發。飲食稍加。駸然有幽谷回春之象。五十二

大學周衡宇先生。吳江瀾溪人。犬冢宰白川公之令孫也。近來咯血色紫。胃中痰火素盛。壅於胸膈。作痞作疼。痰與瘀血挾而為熱。脉左寸洪大。右寸關皆滑。兩手盡數。此有餘之候。總管九四錢。再以滑石桃仁各三錢。山查二錢。枳壳梔子。三吳二卷

貝母紅卷丹皮各一錢。茅根五錢。水煎服之。次日大便行三次。痰積極多。內帶瘀血。改以山梔子紫苑丹皮各一錢。滑石三錢。桃仁一錢五分。小蘗三錢。茅根五錢。水煎。加重便一酒盃。三帖全安。五十三

大參張公分守。杭嘉湖道。因喪夫人。衙中亡者八口。心中惶。因凌絳翁交厚。而禮予為診。在寸脉短。關絃。右關滑。兩尺亦絃。據脉心血不足。中焦有痰。流於下部。凝於經絡。以故腰膝痠疼。居

常背心作脹頭多眩暈。夜睡多汗。先時諸醫悉投風劑。非所宜也。予以陳皮白芍藥木瓜牛膝五加皮以仁黃栢酒苓甘草生地當歸葳靈仙調理十劑諸症悉愈。五十四

大都諫鄭春寰老先生為春元時。頭痛內熱。入夜尤甚。汗出如流。通宵不止。小水短赤。舌上黃胎。右脇脹疼。先與桂枝白虎湯一帖。解其內熱。飲去浮汗。再與白芥子一錢。瓜蒌仁四錢。枳實姜黃。又連各八分。水煎服。外與當歸龍會丸一錢。

三吳二卷

二七

五分下之。而脇痛安。五十五

大叅徐天目老夫人。胸膈痞悶。不思飲食。咳嗽多痰。或時惡心。上焦頭目俱不清利。向來長素。兩寸關滑大如莖。兩尺沉微。痰失症也。二陳湯加酒苓薄荷前胡枳殼蒼朮香附鬱金川芎調理而安。五十六

張麗川咳嗽多痰。面青潮熱。肌瘦性躁。而多自用。以數考不利。又成疾。又新婚之後。飲食不節。脉之右關滑大。餘部皆無神氣。且冀門已發癢。

瘡潰流膿血。予曰。此陽病極而下也。法在不治。果不逾月而下。五十七

陳仰山先生內人。小產後二月而血大下。白沫如注。五更洩瀉。至虛浮。下午身熱口渴。面色青黃。脉右手豁大近。左手濡弱。據此大虛之候。血海尚有瘀血不盡。以致新血不得歸源。稍動氣即下。如崩。蓋脾乃統血之經。虛則不能約束。且面浮食少。脾虛劇矣。急宜溫補。勞或可為。人參白朮各二錢。姜炭粉草各五分。茯苓六分。香附八

三吳二卷

二八

分。丹參炒過一錢。水煎服。四帖而瀉止。再以人參白朮各二錢。茯苓丹參黃耆蒲黃各一錢。姜炭澤蘭葉粉草各五分。調理全愈。五十八

張溪亭乃春喉中梗梗有肉如炙。嚙吞之不下。吐之不出。鼻塞頭運耳常啾。不安汗出如雨。心驚胆怯。不敢出門。稍見風即遍身疼。小腹時疼。小水淋澀而疼。脉兩寸皆短。兩關滑大。右關尤搏指。此梅核氣症也。以半夏四錢。厚朴一錢。紫蘇葉一錢。伍分。茯苓一錢。三分。姜三片。水煎食。

後服。每用此湯調理多效。五十九

溪亭子室姪已七月。產見亡過。祖母揮拳背打一下。驚醒即覺胎動不安。血已下。大小便皆急。腰與小腹脹疼者五日。此亦事之奇也。逆予為治。兩寸脉俱短弱。此上焦元氣大虛。當驟補之。人參阿膠黃耆白朮各二錢。當歸白芍條芩杜仲各一錢。砂仁香附各五分。芎根嫩皮三錢。葱白六錢。一劑而血止。兩劑諸症悉除。而神漸安。四帖後減去芎根葱白。調理旬日。足月而產一女。

三異一書
六十

二十九

陳茂之。勞倦之後。勉強色慾。精竭而血繼至。續感風寒。發熱頭痛。胸膈飽悶。始從太陽而傳至少陽。胸脇痛而耳聾。嘔逆口苦咳嗽。六脉俱絃數。此少陽症也。以小柴胡湯加枳殼桔梗竹茹而嘔逆止。熱退。因進粥。早復熱。口渴。小便不利。大便一日夜六七次。所行皆清水。日晡熱甚。舌上黃胎。昏沉。振顫。此食復之候。書云。渴而小便不利者。當先利其小便。以猪苓湯為主。猪苓澤瀉

各二錢。滑石三錢。赤茯苓一錢。柴胡八分。升麻

木通各五分。連進二帖。小便利而大便實。但熱不退。以六神通解散一帖。其夜熱仍不退。次早診之。左脉不絃數矣。兩寸脉虛。以故服藥無汗。口渴漱水而不欲嚥。咽熱。此邪傳陽明。經不急。涼血。必作鼻衄。病勢至此。可謂極惡矣。投黃芩芍藥湯。合生脉散。以止嗽渴。用葛根湯以解肌。熱白芍藥三錢。葛根升麻黃芩各一錢。人參一錢五分。麥冬滑石各三錢。甘草五味子各五分。

三異一書

三十

烏梅一枚。急煎二帖。飲之。日中大便下燥糞十數枚。始得微汗。就得睡矣。晚進粥一盃。夜卧安。六十一

陳五山。胃脘疼。醫作勞倦治。不効。又醫作寒氣治。而用剛燥痛轉極。又醫以巴豆丸下之。大瀉皆水。亦無積滯之物。痛雖稍減。然面有虛浮。胸痞足腫。又張醫以人參白朮各二錢。大補脾胃。則痰嗽氣逆。上膈熱甚。喉乾乾燥。右脇不能貼席。大便一日二三行。因向被巴豆丸瀉起。迄今七

日猶瀉不止。飲食大減。延予為治。診兩寸濡弱。兩關滑。兩尺洪大。予曰。據症原起於鬱火。亂投湯劑。大推大撤。以致加重。若平平治之。自當尋愈。二陳湯加姜連枳實。姜黃桔梗。蘿蔔子。前胡一帖。而熱嗽除。右脇亦可貼席。再劑而飲食進。大便實。其晚又為怒氣所加。痰嗽脇痛如舊。且多煩躁。改用橘紅貝母瓜萋茯苓山梔子。前胡青皮甘草桑白皮。蘿蔔子。水煎飲之。而平。六十一

三卷二卷

三一

吳小峰年五十。未有子。素有酒積作痰。晌午即瀉。所下多稠粘之物。腹痛之疾。年已久矣。治當清潔中焦。分濕熱。兼養脾。法用白滑石三兩。粉草兩。菓各五錢。白芍藥酒炒一兩。五錢。木香三錢。紅麴四錢。神麴糊為丸。每早晚白湯送下二錢。服未竟而疾除。始舉一子。六十三

沈大叅玉陽老先生。中焦有食積。痰飲而作痞滯。以故大便了而不了。間或作脹。予脈之。兩寸短弱。關滑。兩尺沉滑有力。予曰。脾胃經有濕痰。盈

而為熱。但清其中宮。使清陽升。濁陰降。而氣血自旺。此不補之補也。以二陳湯加枳實酒連酒。芩滑石姜黃木香乾葛山查。兩劑而愈。六十四

王敬泉。頭暈且痛。起則倒仆。胸膈脹悶如繩束縛。嘔吐而食飲皆不得入。六脈俱瀉。此痰飲挾木火之勢。而作暈也。先以濟生竹茹湯而吐不止。且煩躁發餽發熱。再與蘆根湯。連進二椀。氣餽稍定。再以吳茱萸一兩為末。以鷄子清調塗兩足心。引火下行。外用二陳湯加姜汁炒黃芩黃

三卷二卷

三十一

連旋覆。老枇杷葉丁香白芷仁。換柳葉胡水煎服之。服後熱退。大便亦行。頭暈嘔吐皆止。惟胃脘有一塊作疼。仍與前藥兩劑。而塊亦消。六十五

張二官。發熱頭痛。口渴。大便秘結。三日未行。脈洪大。此陽明少陽二經之症。用大柴胡湯行三五次。所下者皆黑糞。夜出臭汗。次日清爽。惟額上仍熱。用白虎湯加葛根天荖粉。因食粥太早。復發熱咳嗽。口渴殊甚。且惡心。用小柴胡加枳實

山梔子麥芽次日渴不可當改以白虎湯加麥
門冬天荅粉外與辰砂益元散以井水調下五
錢熱始退渴始定不虞夜睡失蓋復受寒邪天
明又大發熱不知人事急用小柴胡湯加升麻
葛根前胡薄荷進之而汗出熱退神思大瘳四
肢皆冷語言懶倦且咳嗽以生脉散加石斛百
合大棗白芍藥服後咳嗽尋止精神日加飲食
進而向安矣六十六

大司馬滿印川第三令子室尚書蔣公孫女也年
三吳二卷

二十五體素弱語言端謹因難產傷力繼以生
女拂意後又女死悲戚即時暈厥醒而神思昧
味手足瘳瘳目作上視予更後始至因瘳瘳不
能診脉細詢之自女落地惡露絕無比有女醫
在旁乃昔所親信者時與人參大嚼及獨參湯
并粥亂進參與粥皆壅塞膈上下以故神昏
瘳瘳不已也予教以手於喉中探而吐之喜其
隨手吐出痰飲粥藥盈盆瘳瘳方定乃與川芎
山查澤蘭葉陳皮半夏茯苓香附進之稍得睡

予亦出中堂就寢不虞女醫又私與補藥二帖
子丑時陡然狂亂如降神之狀口中亂語云我
是觀音大士降壇所言皆儒雅官話問答如流
聲甚壯厲殊無產後不足之態生平不諳漢聲
至是出語如生成者人皆異之目為神附禳禱
百般予獨諍之語諸左右曰此惡露不盡乃蓄
血如見鬼之症非真有神佛相附也徐以正言
叱之即緘默繼以清魂散加滑石童便與之至
天明小水乃行狂亂皆定迨予出房少頃詎知

三吳二卷

女醫意欲要功又不知與何藥服之少刻狂亂
如前再與川芎一錢五分當歸四錢澤蘭葉益
母草各一錢臨服加童便連飲二帖不効予逆
思之胸中必有餘痰作滯前劑中無佐使之品
改藥力不行也即用前劑大加山查與之惡露
雖行神思即靜嗣後稍睡少時手足微動或自
以手掌其面或自以手搥其胸昏亂不息診其
脉近虛早間面紅而光申酉時面色白此血行
火退故脉虛而當補矣與人參川芎澤蘭葉各

一錢當歸山查各二錢茯苓陳皮各八分捲荷葉一片煎熟調琥珀末子五分服下半時許噉氣二聲予喜曰此清陽升而濁陰降矣自茲安靜夜中惡露微行大便亦利乃索粥飲問其昨日漢聲何來荅曰不知也諸君始信蓄血如見鬼之言為不誣昔秦越人有言曰病有六不治信巫不信醫一不治也古稱用藥如用兵以郭子儀之英明而以魚朝恩監之便不成功予固非郭令公之儔彼女醫之誤則又有過於魚朝

三吳二卷

五五

恩矣噫寧不慎哉六十七

孝廉臧茗泉老先生脉左絃數右寸弱關大至則滑右尺微原以瘡後復傷飲食大便瀉而變痢一日夜雖只五五行皆積滯無甚其腹痛後重難安午未後發熱至天明始退此其傷於暑而秋為瘡癩也其熱仍瘡之餘邪當先解熱然後以補劑投之則大便自愈矣與神授香連丸一服服訖腹中腸鳴須臾大便秘行且較前更多方有糞下改以白芍藥四錢澤瀉黃連各一錢滑石

二錢粉草桂皮木香各四分山查七分兩日後乃與補中益氣湯加木香黃連白芍藥調理半月潮熱大便皆愈六十八

包繼可先生令眷孕三月而瘡疾發先寒後熱胸膈大脹疼口渴湯水入即吐譫語無汗胎氣上衝而成子懸脉皆絃大以川芎紫胡黃芩知母甘草橘紅紫蘊枳壳砂仁水煎服之吐止痛除六十九

三吳二卷

五六

一張氏婦年纔二十一其夫延予診之左寸關短弱尺滑右寸亦滑關濡弱尺沉微診畢問予曰脉何如予曰心神脾志皆大不足肺經有痰夫曰不然乃有身也予曰左寸短弱如此安得有孕夫曰已七十日矣予俛思久之問渠曰曾經孕育否夫曰已經二次今乃三也予問二產皆足月否男耶女也夫曰實不敢諱始產僅九個月手足面目完全而水火不分變肉一片生下亦無啼聲抱起已身冷矣細檢之乃知其無水火也次亦九個月產下又無啼聲看時口中無

舌。二胎之異不知何故。聞先生能細心察人病。特祈審之。予方悟前二胎之不完者。由心脾二經不足所致也。今左寸右關之脈可見矣。迺為籌思一方。專以補心血為主。令其多服。以百帖為率。酸棗仁遠志茯神各一錢。白朮二錢。白芍藥當歸枸杞子各一錢五分。甘草五分。生地黃八分。艾絮二分。龍眼肉五枚。水煎服。足月而產一子。次年又有身。不以前事為意。至九個月。產下形體俱具。外有脂膜一片。包其面耳口鼻。

三卷二卷

三七

皆見。但不能去此脂膜。產下即歿。因思上年之子。為藥之力也。因子久不至。若其家以予方粘於壁間。一覺有身。即照方服之。後生二子一女。里中以此方為補天手云。六十九

癸巳仲夏。吳比部鳳麓父母。以次君絃臺先生眼目紅痛。恐學道按臨。速於取效。乃聽眼科醫寒涼而治。兩越月無驗。又眼科視之曰。目疾不宜多用寒涼。恐冰其血。以人參五錢。枸杞子一兩。悉溫補之劑。凡用人參枸杞子五六斤矣。目腫

如禿。絕不能開。又專科語之曰。紅腫而痛。明是熱症。誤服溫補。反助其熱。寧不益腫。顧其勢。即百寒涼。亦不易瘳。捷徑無如用下。此釜底抽薪法也。絃臺惟求速效。一聽下之。用大黃。茫硝。枳壳。作大劑。下五六次。而飲食日減。惡心畏風。則不能出房門矣。又專門謂前劑欠當。大瀉之後。正合補也。又聽補之一補。而目腫如舊。又有眼科云。目疾熱症多。寒症少。只當滋補腎水。水升則火自降。火降而目疾斯愈矣。用是以滋陰降

三卷二卷

三八

火之劑。為恃。終數服。而精滑不禁。一夜夢遺一二次。神氣大脫。揆補則目腫痛。用降則精元滑脫。屢試屢如是。諸醫無策。悉謝而退。乃修書命使自淮陰之海陽。懇祝令君。紹介徵予為治。予始以遠為懼。祝再四。為渠言。予亦素為渠重。義不得以遠為辭。乃介行李嚮往。至即診之。左寸脈甚短。右寸大而無力。左關絃弱。右滑。兩尺亦滑。予見其坐在帳中。畧不敢見風。問其日食幾何。荅曰。三次計二椀許。葷醒絕不能用。予曰。夜

卧安否。答曰：迨來甚苦於睡，總合目即夢覺可畏。或被虎蛇交咬，或有鬼來勾攝，或落橋墜井，或與人爭鬪而負，猛然驚悟，冷汗淋漓，四肢癱軟，不能動轉。少頃乃定。今幸公不遠千里而臨足，徵素雅。予曰：足下始無大恙，只緣大推大搬，以致狼狽。若是彼專科者，不足恃也。經謂五臟精華皆上注於目，今專科局局然守其死法，安知五臟盈虛陰陽消長，隨時出入哉！以愚管見，但平平治之，易與耳。據足下之脉，心神脾志互

三吳二卷

三九

相不足，肝胆之火鬱而不散，致生目痺。今為補養心脾，壯其神志，則飲食日加，寢卧安穩，而精元有守，神水盈溢，何目痺之不愈哉！絃墨曰：善惟先生命劑，乃以歸脾湯減去黃耆、木香，加丹參而補心脾，以大安丸專助脾胃而磨穀食，俾新痰不生，則氣血可繼日而旺矣。後五日而飲食加，十日而夢覺必尋能出戶，不畏風日，半月而肌肉生，目可觀，奕津津然，而有萬全之兆。不虞專門張氏子復至，以白眼藥日頻點之。一日

凡七八次，從此復不能開，臉肉風粟生滿，適于有南都之往，卒為所誤。後幸有李少塘，打去風粟，眼始能開。李雖手法精熟，然於軒岐間奧，尚亦未窺藩籬。予後自南都至，見左目雖愈，右目終成內障。予故曰：彼專科者，不足恃也。豈虛語哉！七十

立太守鎮山翁令姪淮陰人也。丁年患兩手筋攣，指掉不能屈伸，臂肉瘦削，體瘠面白，寢食大減。市中諸友調治無驗，乃任京口諸名家療之。半

三吳二卷

四十

羊肉更消色更瘁。聞予在吳比部衙中，敦予為治。診其脉六部俱絃重，按稍駛，診竟扣其受病之源。太守公曰：自上年冬，疫偶發，寒熱筋骨疼痛，迨於仲春，寒熱雖退，而筋骨之疼不減。服藥無虛日，甚之日三四進，肉漸消去，指掉不隨，似有加於往昔醫之來者。一曰風，二曰風，三四五六皆曰風，即十數輩，又莫不皆曰風者。竭技盡方，卒無一應。奄奄床第，絕不知為何病。予對公曰：此筋痿症也。乃少年不謹，慾而受風濕，邪氣

乘虛而入。醫者不察天時，不分六經，禁而汗之。仲景治風濕之法，但使微汗津津，則風濕盡去。若汗大出，則風去而濕存，由是血氣俱虛。經云：陽氣者，精則養神，柔則養筋。虛則筋無所養，漸成痿弱，乃不足之疾。故陳無擇、朱丹溪、劉宗厚皆謂諸痿切不可作風治，誤則成痼疾。公聞言愕然曰：服風藥幾二百劑矣，願今已痼，柰之何？予對曰：令姪青年，猶可圖也。公曰：用何法？予曰：法當大補氣血。經云：氣主煦之，血主濡之。氣血

三異二卷

四一

旺，則筋柔而軟。由是乃可以束骨而利機關也。抑何掉之有哉？病者聞言大喜曰：聆先生詳病之源，治法之畧，雖未服藥，已覺沉疴去體矣。即請劑。予以五加皮、薏以仁、紅朮、人參、鹿角膠、龜板、虎骨、當歸、丹參、地黃、骨碎、補蒼耳子之類。服兩月，肌肉漸生，飲食大進，兩手指掉亦平復。七十一

一書辦年過五十，糟酒縱慾，無憚忽患下消之症。一日夜小便二十餘度，清白而長，味甘且甜，必頃

凝結如脂，色有油光。治半年不驗。腰膝已下皆軟弱，載身不起，飲食減半，神色大瘁。脈之六部大而無力。書云：脈至而從，按之不鼓，諸陽皆然。法當溫補下焦，以熟地黃六兩為君，鹿角霜、山茱萸各四兩、桑螵蛸、鹿角膠、人參、白茯苓、枸杞子、遠志、兔絲子、懷山藥各三兩為臣。益智仁一兩為佐。大附子、桂心各七錢，為使。煉蜜為丸。梧桐子大，每早晚淡鹽湯送下七八十九，不終劑而愈。或曰：凡云消者，皆熱症也。始公具方人多

三異二卷

四二

議之。今果以溫補成功，此何故哉？予曰：病由下元不足，無氣升騰於上，故渴而多飲，以飲多小便亦多也。今大補下元，使陽氣充盛，薰蒸於上，口自不乾。譬之釜蓋，釜雖有水，若底下無火，則水炁不得上升。釜蓋乾而不潤，必釜底有火，則釜中水氣升騰，薰蒸於上，蓋終濕潤不乾也。予已詳著醫旨緒餘中，茲不多贅。七十二

愈。憲韓約全老先生令子室，每怒動則夜臥不安，如見鬼魅，小便淋瀝，今又大便秘結，腹中疼痛。

腰跨脹墜如生產狀坐卧不安因痛而脉多不應指此肝經鬱火所致法當通利以杏仁菀仁各三錢柏樹根皮山梔仁青皮各一錢枳榔五分枳壳八分水煎服之必頃大便通痛脹隨減

七十三

愈憲韓約色老先生夫人向來夜分臍腹疼極甚必用炒鹽耐之兩時久乃止次日必頭痛兩太陽如箍遍身亦疼此上盛下虛症也先用柴胡川芎粉草酒連薄荷天麻橘紅茯苓半夏蔓荊

三吳二卷

四三

子水煎服數帖頭痛全止惟咳嗽胸前畧痛兩寸脉浮滑兩尺弱再用鹿角霜鹿角膠補骨脂遠志枸杞子金鈴子香附子煉蜜為丸梧桐子大每空心及下午食前淡鹽湯送下七八十九而瘳七十四

孝廉丁震瀾夫令郎緣二歲瘳母上壅咳嗽每午後發熱至子丑時乃退終日啼哭不止鴛口白脣神氣大弱痘後遍身瘡疥未愈多方治之不効有灸之者有刺之者有以膏藥貼之者種種

施之全然不應予曰乳下嬰孩臟腑薄脆不可亂攻亂補參着足以增其嗽矣刺適以驚其神安能取効予教以白朮鱉甲各一錢五分青蒿麥芽陳皮各八分烏梅一枚貝母知母各六分甘草三分八帖全愈七十五

武進令君孫康宇公子室減位宇夫女也年十六初產女艱苦二日偶感風邪繼食麵餅時師不察竟以參朮投之即大熱譫語口渴汗出如洗氣喘洩瀉瀉皆黃水無糞一日夜不計遍數小

三吳二卷

四四

水短少飲食不進症甚危惡時當六月初旬女科見熱不除乃投黃芩芍藥黃連寒涼之劑諸症更甚又以參朮大劑肉果乾姜等止瀉一日計用人參二兩四錢瀉益頻熱益劇喘汗轉加譫語不徹口醫各縛手辭謝曰書云汗出如油喘而不休死症也又汗出而熱不退瀉而熱不止且譫語神昏產後而脉洪大法皆犯逆無生路矣惟附子理中湯庶微倖於萬一適予為顧太守肖溪公廷至即過為一診六脉亂而無緒

七八至。獨右關堅硬。疇久之。因思暑月汗出
 乃常事。但風邪麵食。瘀血皆未消。燔補劑太驟。
 書云。蓄血如見鬼。治當消瘀血。麵食解其暑氣。
 猶可圖生。勿遽棄也。有臧玉宇者。位宇堂兄也。
 醫有雅致。深以予言為然。而速予措劑。予曰。劑
 憑症發。難拘常套。不常之症。須用不常之藥。乃
 用益元散六錢。鮮暑氣清熱為君。仲景云。渴而
 小便不利者。當先利其小便。况水瀉。尤當用之
 為君也。以糖毬子三錢為臣。紅麴澤蘭葉各一
 錢五分。消瘀血。安魂為佐。香附一錢五分為裨
 佐。橘紅半夏。麩茯苓。乃統理脾氣為使。京三稜
 五分。消前參朮。決其壅滯為先峰。水煎飲之。飲
 下即稍睡。謔語竟止。連進二劑。其晚大便減半。
 次日仍用前劑飲之。其夜熱大減。大便只二次。
 有黃糞矣。惡露畧行。黑血數枚。又次日診之。脉
 始有緒。神亦收斂。進粥一盞。大有生意。前方減
 去京三稜。紅麴。加白扁豆。其夜大便一次。所下
 皆黑糞。從此熱盡退。大便亦實。改用四君子湯。

加益元散。青蒿。香附。白扁豆。酒炒。白芍。藥炮。姜
 調理而平。七十六
 吳東星上舍。辰州太守公長君也。冒暑赴南。罷試
 落第歸。而快快。因成瘡。自八月中旬。延至十月。
 瘡雖止。而腰痛白濁。日夜咳嗽。肌肉大消。藥劑
 亂投。認為風者。以羌活防風續斷等發散。認為
 虛者。以六味地黃丸為補。認為火者。以芩連梔
 子黃栢知母天荅粉生地黃瀉其火。認為半虛
 半實者。投以獨活寄生湯。認為寒者。以大附子
 肉桂鹿角膠參朮溫補之。痛劇欲死。叫撼四鄰。
 予脉之。左絃細。右滑大。俱六至。口渴眼赤。予知
 其昔患楊梅瘡。餘毒尚伏。經絡適因瘡後。氣血
 不足。舊毒感動。故痛而暴也。以當歸芍藥甘草
 半膝鈎藤。以仁木通白蘚皮。用土茯苓四兩煎
 湯代水煎。前藥服下。而痛止。咳嗽亦除。脉緩其
 半。連服數劑。大効。精神漸復。乃起。而督工視事。
 冬至日。為酒興鼓舞。縱慾無忌。次日腰如束縛。
 足面亦疼。左眼赤。小水短。足底有火從兩膝直

冲其上。痛不可言。予以當歸、鈎藤、甘草、白芍藥、牛膝、以仁石斛、紅朮、生地、黃柏、調理三日。症已守定。畧無進退。適大雪寒凍。殊甚。有女醫為渠宅所親信者。因其大便燥結。一日夜服玄明粉一兩五錢。大便且不行。而腰痛愈猛。兩足攣縮。氣息奄奄。一語而三換氣。面青慘。渠自覺危急。廼喚內人及弟叔。囑其後事。天明予至。診之。六脉俱伏。痛使然也。扣其由。乃知服玄明粉所致。予曰。症雖熱。便雖燥。但公病不在腸胃。而在經

三吳一卷

四七

絡筋骨間。徒瀉腸胃。無益也。且冬月陽氣閉藏。誤瀉則陽氣虧乏。來春無發生根本矣。今四肢拘縮。腰膝痛劇者。由日來天令寒極。經絡凝澁也。寒主收斂。法當溫散寒邪之標。使痛定。然後復治其本。庶可保全。乃用桂枝、心杜、仲灸、甘草、蒼朮、破故紙、五加皮、連與、二劑。痛定而四肢柔和。飲食始進。予知渠宅素喜速効。予適有荆溪之往。廼宣言曰。且下之疾在經絡。顧今天令嚴寒。幸寧耐以俟春和。為足下拔去病根。渠宅不以

予言為然。廼用張雲溪調理。予亦讚張之可守。蓋張氏藥用養血清熱。雖不去病。亦不害事。迨二月。太守公歸。廼改用沈春宇。沈揣渠必以酒色而致陰虛。廼純用滋陰降火之劑。以為旬日可奏功也。及調治月餘。畧無影响。予從荆溪歸。而謁渠。為三月初旬也。渠聞予至。即以沈藥呈予。且語予。公許春和。拔除病根。此其時也。予知太守公方篤信沈。隨以溫語慰渠。曰。沈公名士也。可使彼展盡底蘊。沈又調理半月。以無功而

三吳一卷

四八

行。沈去。予再以煨腎散進。大瀉五六度。四肢冰冷。舉家大恐。以予瀉之為非也。予曰。病從此日減矣。夫奚憂。後進理脾藥。服數帖。神氣始轉。腰膝柔和。可下床舉數步矣。方始信。而問予曰。人皆以補為治。公何得病源之真。於三月之前。先已預定。節節如公語也。予曰。此楊梅瘡餘毒。伏於經絡。豈補劑所能去哉。予故先為疎通濕熱。然後以補劑收功。則無反覆之患。後仍以葳靈膠末子二錢。入猪腰子內煨熟食之。又瀉一二

度病根盡拔。改用仁當歸生熟地黃白芍藥
牛膝黃柏丹參龜板調理全安。七十七

潘見所老先生有一小盛价。年可十六七。發熱。於
午後城中周友以為陰虛。而為滋陰降火。服三
十餘劑。熱益加。且腹中漸脹。面色清白。仍以六
味地黃丸加黃柏知母麥冬五味子之類。又三
十劑。而腹大如斗。堅如石。飲食大減。髮黃成穗。
額顛光亮。口渴不可言。兩腿大肉消盡。眼大。面
肉皆消。肌膚枯燥。如松樹皮奄奄一骷髏耳。予

三吳二卷

四九

觀其目之神。尚五分存。欲為治劑。潘公問下諸
人語予曰。形症如是。死在目下。尚可服藥乎。予
曰。症非死候。為用藥者誤耳。譬之樹木。若根本
壞。而枝葉枯焦。非力可生。今焦枯乃斧斤傷其
枝葉。而根本仍在也。設灌溉有方。猶可再生。安
可遽棄。予以神授丹。日用一丸。煮猪肉四兩飼
之。十日腹軟其半。熱亦消其半。神色漸好。潘見
老詰予曰。此何症。公能肉枯骨如此之神。予曰。
此瘵積症也。彼誤認為腎虛。而用補陰之藥。是

以滯益滯。腹為得不大不堅。公曰。彼純用寒而
熱愈熾。君用非寒而熱反退。此何說焉。予曰。此
熱廼濕熱。由脾虛所致。補陰之劑皆濕類。蓋脾
屬土。惡濕喜燥。今以大薑會丸肥兒丸調理一
月。可全瘵矣。公曰善。微先生。此僕已為泉下物
矣。七十八

三吳二卷

五十

以司空凌絳泉翁。年已古稀。原有痰火之疾。因正
月上旬為令孫大婚過勞。偶占風寒。內熱咳嗽
痰中有血。血多而痰少。痰堅不易出。鼻流清水
舌生芒刺。色焦黃。語言強硬不清。大小便不利
喘急不能睡。亦不能仰。惟坐高椅。椅前安棹。棹
上安枕。日惟額伏枕上而已。市醫環治半月不
瘳。敦予診之。兩手脈浮而洪。兩關滑大。有力。知
其內有積熱痰火。為風邪所悶。且為怒氣所加。
故血上逆。議者以高年見紅。脈大發熱為懼。予
曰。此有餘症。諸公認為陰虛。而為滋陰降火。故
不瘳。法當先驅中焦痰火。積熱。然後以地黃補
血等劑收功。斯不失先後着也。翁以予言為然。

用瓜蒌石膏各三錢。橘紅半夏。麩桑白皮。前胡。杏仁。酒苓。紫蘇子。水煎。臨服加入蘿蔔汁一小酒盞。一劑而血止。次日診之。脉仍浮而洪大。尚惡寒。予曰。古云。傷風必惡風。傷寒必惡寒。此其常也。只因先時失於清散。表中之熱未徹。竟用滋陰之劑。又加重便收斂。降下太速。以致風寒鬱而不散。故熱愈甚也。改以定喘湯一劑。而喘急減。半再劑。熱退而不惡寒。復為疹之。兩手浮體已無。惟兩關之脉甚鼓。指此中焦痰積膠固。

三吳二卷

五一

已久不可不因其時而疎導之。以清中九全當歸龍會丸共二錢進之。其夜大便所下稠粘穢積甚多。予憶朱丹溪有云。凡哮喘火盛者。以白虎湯加黃連枳實有功。此法正絳翁對腔劑也。與十劑外。以清中九全雙玉丸夜服調理而安。

七十九

周鳳亭公年五十有八。正月腸風下血。又飲食過傷。犬吐而朱友以枸杞地黃膏一斤進之。不知此公肝氣素盛。中焦原有痰積。且多思傷脾。又

值卯木正旺之月。投以地黃枸杞。適以滋其濕而益滯其痰耳。由是飲食減。必肌肉日消。腹中痞滯。又吳友以歸脾湯進之。詎知濕熱未除。先用溫補。是以油撲火勢成燎原。以致大便燥結。口乾舌燥。據巳午未三時中焦蒸蒸發熱煩悶。酉時而退。此皆濕熱壅滯於脾無疑矣。且面色黃中帶黑。下午足面有浮氣。皆是濕熱傷脾之徵。法宜清肅。中焦徹去。濕熱則飲食自加。而新痰不生。宿痰磨去。庶五穀精華不生痰而生血。

三吳二卷

五一

矣。血充則精神長而肌肉可復。且秋來無瘡痢之患。公曰。清肅中焦。當用何劑。予曰。二陳湯加薏以仁。酒炒白芍藥。麥芽。以養脾而消痰。以枳實黃連。瀉痞而去熱。以青蒿。分利陰陽。而消其黃葛根。升引清陽之氣。使肌熱清而口渴可止矣。當服十劑。公曰。先生之方善。但枳實黃連恐體虛者不足以當之。予曰。惟此二味。適可以去公之病根。舍是則不効。緣中焦有餘之疾。非此不能去。亦非它藥所能代。公半信半疑。服四劑。

而諸疾皆愈。公遽中止。不復服完。至七月。盡果發痢疾。而以木香檳榔丸下去。稠積甚多。迺追悔予言而延之診。予教以前方。仍服十劑。夜以丹溪保和丸調理。則永無瘡痢之患矣。八十

今即采石先生中焦濕熱。生痰否悶。五更倒飽。且下午兩服。或膝下筋脉抽掣疼痛。時常噉氣。面色帶黃。間常遺。予以清氣大安化痰丸。及猪肚丸二方調治。而安猪肚丸用白朮五兩。苦參酒炒二兩。牡蠣煨過三兩為末。將雄猪肚子一

三吳二卷

五三

具摘去油。甘草湯洗過。將藥裝入肚中。縫其口。飯中蒸極爛為度。搗極勻為丸。此方極健。脾去濕熱固精丸也。清氣大安化痰丸。用白朮四兩。橘紅半。夏山查各三兩。黃芩黃連俱生。姜汁炒各一兩。五錢。枳實瓜萸仁各二兩。白芥子蘿蔔子各炒一兩。姜黃碱水煮乾一兩。青黛五錢。麦芽取麩打糊為丸。菜豆大。每食後及夜。茶送下。二錢。八十一

令孫女纔六歲。忽發寒熱。一日過後。腰脊中命門

穴間骨節腫一塊。如大饅頭之狀。高三四寸。自此不能平身而立。絕不能下地走動。如此者。半年。人皆以為龜背痼疾。莫能措一法。即如幼科治龜背古方。治之亦不効。予曰。此非龜背。蓋龜背在上。今在下部。必初年乳母放在地上坐。早

之過。此時筋骨未堅。坐久而背曲。因受風邪。初不覺其漸入骨節間。而生癢。涎致令骨節脹滿。而大不急治之。必成痼疾。今起未久。可用萬靈黑虎比天膏貼之。外再以晚蚕沙醋洗炒熱絹

三吳二卷

五四

片包定於膏上帶熱熨之。一夜熨一次。再以葳靈僊為君。五加皮烏藥紅荊防風獨活。水煎服之。一月而消。其半骨節柔軟。不復腫硬。便能下地行走如初矣。人皆以為神奇。此後三箇月。蓋不能行。問之足膝痠軟。載身不起。故不能行。予知其病去而下元虛也。用杜仲晚蚕沙五加皮。薏以仁當歸人參牛膝獨活。蒼耳子。佛手。水煎服二十劑。行動如故。八十二

閱文學。屢樓患虛損咳嗽。晝輕夜重。乃政丁氏長

興富翁女也。軀甚肥。性甚躁。患痛風。手不能沐。櫛足不能履地。凡痛處畧腫。呻吟喊叫。比有朱遠。公氏為時推重。夫婦倚朱治者七越月。纖毫不減。吳九宜翁。廼舉予治。至其家。屢樓大兄岳樓。旦暮與偕。胗畢。語岳樓曰。令弟之症。雖易見功。然非百日不能斷根。丁氏症。十日便可刈其根。但恐不能盡吾劑。奈何。岳樓曰。何謂也。予曰。令弟咳嗽。由肺火未清。誤服參朮太過。而然。但為清肺利肺。咳可立止。止後以補心安神之劑。

三吳二卷

五五

養之。則萬全矣。藥用麥門冬。桑白皮。白藥子。貝母。桔梗。甘草。黃芩。枳壳。十帖。咳嗽全止。惟心血不足。神不固精。以酸束仁。遠志。麥冬。蓮蓉。心丹。參調養百日。果能出戶肄業。丁症。廼濕痰凝滯。經絡作痛。朱公作血虛。而投以地黃芍藥。當歸。人參。牛膝之類。宜其痛愈加。而病愈久也。今必須燥濕流動之劑。疎決一番。庶經絡通暢。雖不服補劑。而五穀精華。足以自充。但疎決之劑。不能止痛。恐其不予信而中止也。岳樓曰。先生既

已言明。惟命是聽。用二陳湯加烏藥。葉蒼朮。僵蠶。海桐皮。南星。服至五帖。果不憚而欲止藥。岳樓曰。孫君已先言十帖見功。今過半。何不勉強。而使功虧一篑哉。又服一帖而止。百般強之。不從。廼揚言曰。請醫療痛。而反加痛。吾何藥為。後四劑。斷斷乎不敢奉命矣。時已申刻。予知其富家嬌態。亦不強服。隨以芫荽醋炒過三分。海金沙一分為末。白湯調下。至晚瀉一次。下稠痰半盆。足痛減大半。稍能動止。初更後。吾輩酒猶未

三吳二卷

五六

散。忽報云。腹中大痛。促予進看。行至後堂。內中入出而止。曰。病者卒矣。不勞進看。予曰。此必痛厥。非長逝也。烏可不進一看。至即冷汗淋漓。兀坐溺器。面青息斷。執而胗之。手冷如冰。但六脉俱在。惟沉伏耳。知其為痛極使然。用生姜湯灌之。而甦。徐語近侍女使曰。適來腹中痛甚耳。後火光灑出。肛門如焚。大响一聲。不知瀉下何物。衆看之。廼血。鱖一條。長六寸。濶半寸餘。鱖目俱在。盆中尚能遊動。衆皆悚駭。岳樓問曰。此鱖下

可好否。予應之曰。此充物也。得下豈不好。但丁
症實由痰作。予特為行痰。初不知其有虫。如是
第藥中有芫荇。迺殺虫之物。故偶中。亦令弟之
福也。次日手足皆能動。仍以二陳湯加以仁紅
荅五加皮四帖。脫然如故。閱宅以予不矜功而
益重予。八十四

金寄閒令堂。暑月患痢。小腹窘迫。胸膈膨脹。口舌
焦渴。右寸關脉洪滑。左脉絃。迺氣鬱食積。脾也。
先與木香檳榔丸開而下之。微利一二度。因口

三吳二卷

五七

渴食西瓜一片。即惡心而吐。昨日大便利後。胸
膈寬快。就進飯一椀。致腹飽悶。兀兀欲吐。所吐
皆痰涎。迺以溫膽湯加減治之。半夏四錢。枳實
一錢五分。竹茹二錢。橘紅茯苓各一錢。甘草五
分。姜連八分。生薑五片。水煎服之。一飲而胸膈
舒暢。便能就枕而睡。惡心頓無。痢亦尋止。八十

徐中宇之婦。汗出如雨。昏昏憤憤。兩手無所着落。
胸膈入足。喘之不少。放少放即昏憤益甚。氣促

不能以息。稍近風則嘔惡。暈厥。與九龍鎮心丹
一丸服下。即稍定。必間則又發。始知胸膈中有
物作痛。痛湯水難入。即藥僅能吞一口。多則
非能嚥下。延外。蘊合香花與之。暈厥尋止。心痛
始明。昨日六脉俱伏。今早六部俱見。惟左寸短
濡。知其痛為瘀血也。用玄胡索桃仁丹皮丹參
青皮當歸香附。其夜仍暈厥一次。由其痛極。而
然亦與玄胡丹皮桃仁丹參香附青皮烏梅人
參貝母桂枝赤芍藥服此。痛減大半。迺自云心

三吳二卷

五八

虛有熱頭眩。加山梔仁。居常多夢交之症。近更
甚。以其心虛故也。人參石斛丹參貝母當歸白
芍藥酸棗仁酒連香附調理全安。八十六

金文學達泉先生令政。暑月患痢。赤白。一日夜三
十餘度。後重腿急。口渴。小腹痛。孕已三月。幸而
腰不痛。右手脉絃。左脉滑。與白芍藥三錢。黃連
黃芩當歸陳皮香附各一錢。桂皮木香各五分。
水煎服。外與香連丸服下。後重稍輕。因進飯太
早。其夜仍十數度。次早胗之。右絃減半。前煎煎

成吞女金丹一帖，痢減大半。六脉已和，但軟弱。此氣血不足，宜從補養。用八珍湯加陳皮香附阿膠條芩一帖全安。凡孕婦痢疾後重稍輕，腹痛稍減，獨痢不止，必須補養血氣為主。加調氣之劑為佐，庶可保胎。斯亦丹溪虛回而痢自止之意也。八十七

金元岩文學，下午發熱，痢下紅多白少。一日夜七十餘度，後重下墜，飲食不思。左脉細數，右脉滑。此陰虛之候，詢知三日前曾夢遺，續得痢疾。陰

三五二卷

五九

虛明矣。但滑脉主食積，法當先補後攻。迺與小建中湯一帖，白芍藥三錢，桂枝七分，粉草酒連酒苓各八分，當歸一錢，棗即五分。水煎飲之。夜半復診，脉稍克指，改與枳殼三錢，桃仁一錢，當歸四錢，煎熟吞木香枳殼丸一錢五分。至天明大便瀉三次，則見糞矣。次日午進飯，又食火肉。隨即大便頻，併後重如前。與山查枳朮丸一服，不効。再為診之。六部皆虛軟無力，獨右關滑。此進肉飯太早，脾弱不能消磨，宜健脾氣。無為升

舉人參黃耆各二錢，白朮一錢，升麻三錢，防風藿香炮姜粉草各五分，白芍藥一錢半，茯苓八分。連進二帖，痢減而後重寬。因食狗肉過多，復傷脾氣。前方加砂仁山查調理全愈。八十八

金文學達泉先生，因食肝白腸內傷，續又冒風，就成瘡痢。日夜四十餘度，小腹痛甚，每登廁汗出如雨。下迫後重，小水澀痛，頭疼，口渴，下午發熱。天明始退。左脉浮絃而數，右軟弱，中部稍滑。此內傷飲食，外感風邪，瘡痢併作。法當速治，否則

三五二卷

六十

深秋陽氣潛藏，和因陷下，未易療也。迺先與柴苓湯一劑，小便即清，不痛。瘡發時，寒多熱少，晚與人參敗毒散，加減人參乾葛防風桂枝粉草茯苓枳殼各五分，柴胡白芍藥各一錢。水煎飲之。次日頭痛痢疾俱減，夜纒起三次，改與補中益氣湯加酒苓桂枝白芍藥，其夜瘡止。但微熱，再改胃風湯。人參白朮桂皮各二錢，白芍藥四錢，當歸一錢五分，茯苓川芎各八分。酒苓酒連各一錢，炮姜二分，地榆五分。服後寒熱珍迹，夜

起一次。已是真糞。前方減去桂枝。再三劑而中。稀出戶矣。八十九

金寄圃先生。七月既望。患頭痛。口渴。汗大洩。不飲。嘔惡發寒。熱。間日一發。而發於陽日。迺為脗之。兩寸洪大有力。左浮絃而數。右脉稍軟。亦絃長。此必陽與陽明合併為瘡。以紫葛解肌湯主之。紫胡葛根各二錢。白芍藥石膏各三錢。粉草桂枝各五分。知母一錢。姜三片。水煎飲之。次早左脉稍退。迺與補陰鱉血何首烏丸截之。又與黃

三吳二卷

六一

蒼芍藥湯一帖。以防作痢。白芍藥石膏黃蒼各三錢。桂枝五分。知母粉草各一錢。紫胡七分。姜三片。煎服後。加人參七分。瘡竟全止。而向安矣。九十

淮陰胡少泉翁。麗水縣三尹也。令郎年弱冠。患夢遺。百治不應。體倦而氣弱。食少而汗多。四肢痠軟。頭眩。肌熱。將成瘵疾。知予在理。刑吳比部衙中。敦予為治。其脉兩寸短。左寸尤甚。餘部滑數。予曰。即君之脉。心氣大弱。蓋心者神之舍。神者

精之主。神旺始能固精。今遺不禁。由神弱不能固攝其精。致多妄洩。時近端陽。諸症叢集。迺無注夏病也。法當養心安神。庶不成瘵。翁曰。然。前此諸公。每為滋陰降火。多不見功。徒見損脾減食。今先生主以養神。願以先生是聽。迺與人參黃蒼石蓮子酸棗仁蓮荅心石菖蒲遠志當歸補心安神為君。俾精固汗歛。經曰。汗者心之液。汗多則心血愈虛。故佐以甘草白朮黃柏麥門冬五味子。兼治注夏。使飲食加而四肢壯。緩而圖之。可萬全矣。藥進甚妥。竟以此方調理。果精固神全。肌熱盡退。又令愛及笄。頭痛微熱。經水愆期。日多咳嗽。食漸減。肌漸消。口渴。睡卧不寧。喉中血腥。四肢不勞而疲。體不動而汗。六脉絃而且數。左關長出寸口。予以逍遙散加石斛丹參牡丹皮酸棗仁山梔子麥門冬調理而瘳。又一文學。貧士也。忘其姓氏。與胡少泉翁為碩交。有奇疾。兩足不痠不痛。每行動絕不聽其所用。或扭於左而又墜於右。或扭於右而又墜於左。

三吳二卷

六一

之玄而行，不能一步步正走，此亦目之稀覯，竟不識為河疾，書無所考，予臆度之，由筋軟不能束骨所致，故行動則偏斜扭墜也。夫筋者，肝之所主，肝屬木，木縱不收，宜益金以制之，用人參黃耆白芍藥以補肺金，意以仁虎骨龜板杜仲以壯筋骨，以鉄華粉專制肝木，煉蜜為丸，早晚服之。別後三載，族姪理問公敬亭南還，道出淮陰，胡少泉寄語云：向者鉄粉所愈之疾，淮人極以為奇，遠邇敦錄，其方布傳，以頌自恨貧儒，弗

三吳二卷

六五

能致一芹為謝，旦暮額手南斗以識不忘云。九十一

一吳氏頗有隱疾，其夫訪於予，三造門而三不言，怩恍而去，後又至，未言而面先赭，予因詰之曰：諸來詣予者，皆謂予能為人決疑瘥急也，今子來者四，必有疑于中，疑而不露一語，雖百來而疑終不可決，疾終不可去矣，且盈天地間，恠事甚多，非聖智所能盡識，然亦非聖智不能通瘥也，彼折肱錄醫說醫鑿等集，恠症蝟毛，假非明

哲決而治之，何以擴後人之聞見也。其夫迺俛首徐應曰：言之無任主臣，先生長者，即言之諒無哂。山婦子戶中突生一物，初長可三寸，今則五寸許矣，狀如堅筋，色赤，大可拱把，脹而且痛，不便起止，憎寒，壯熱，寢食俱減，羞澁于言，每求自盡，聞先生能為人決疑瘥恠，不啻扁華，特相訪而祈一決。予曰：疾成幾年，對曰：將百日。予曰：蓋凡所謂恠者，耳目無所聞，觀書籍無所註載，今所言者，迺陰挺症也，書有所徵，奚足言恠。夫

三吳二卷

六四

曰：陰挺何自而生，何法而治，幾何月日而可愈也。可無妨于生育否。予曰：子戶屬厥陰肝經，肝屬木，肝有濕熱，故生陰挺，猶木有濕熱而生葷，然法當以龍胆瀉肝湯及蝟皮散，當歸黃芩牡蠣蝟皮赤芍藥為末，每用二錢，空心米飲調下，即而治之，犬計月餘，可消釋也。奚生育之有妨哉。其夫合手頂禮於地曰：願如藥王言，敢微一料，隨按法措劑，畀之而去。甫三月，來報云：前疾果如所言，消釋無痕，茲為汛期一月不至，敢問

予曰此有身也。夫曰疾纔愈未必即能受身恐防他疾。予曰前恙迺肝經有餘之疾。肝為血海。書云女人血盛則懷胎。據血盛行當先期。今汛踰期實孕耳。匪病也。後果足月而產一子。九十

前坵一染匠之婦腹痛兩月矣。或以為寒為熱為氣為虛為食積為虫。逆嘗試之轉加。一醫與膏藥如斗大者一個滿腹貼之。痛益劇。迺揭去膏藥。即粘牢不可起火。慰油調百計不能脫分寸。

三吳二卷

六五

如生在肉上相類無可奈何。知予在吳鄉官宅中。迺買舟就予。胗及抵吳門。轎口匠偕迺母迺姑四人。儘力扶挽。絕不能動。移一步。屨上環視如堵。莫不語。匠曰病勢若此。時刻難抵。固迺強其起而欲污吾轎口。耶匠迺止。婦舟中起而懇予為治。至舟中見其面色蒼黑。及伸手求胗。皮膚燥若老松樹皮之狀。六脉皆洪。數問其腹中之痛何在。匠即為解衣露腹。指其痛所。始知膏藥粘牢之故。此甚希覲。叩其不能舉步之由。婦

曰非力弱不能行。迺左脚不可動。動即痛。應於心。是以一步不能舉也。予俛思若色若脉皆非死候。胡治而益劇也。此必腸癰。左脚莫能舉。是其微也。與管衛返魂湯。加金銀朮為君。與四帖酒水各一碗煎服。一帖痛稍減。二帖下臭。脹半桶。痛全減。腹上膏藥不須手揭。自脫而下。由熱去而膏脫也。四帖完。其婦同匠詣吳宅拜謝。予并求善後之方。吳宅見之一族皆驚。九十三

三吳二卷

六六

五祖泉大便裏急後重。腹痛。日夜下紫黑稠粘。三四十度。市中凡有名者。雷同痢治。自秋歷冬。三越月不瘳。形色瘦瘁。匙筯厭舉。即勉強。僅一盞而止。眼闔懶開。悉以為不治。棄去。訪予脉之。六部濡弱。觀其所下之色甚晦。如芋苗汁之狀。予曰觀此色非痢。迺臟毒下血症。醫說中人參。檉皮散。正此對腔劑也。即製與之。其夜果減半。終劑全愈。方以人參。檉根。白皮各二兩為末。每空心米飲調服二錢。忌肉汁。生菜。魚腥。九十四

癸巳秋仲。南都大司馬袁洪溪老先生以魚署工

部都察院操江印。日衝暑往來各衙門而經畧其政事。致發熱燥渴。因鮮燥渴而過食冰浸瓜梨新藕。遂成洩瀉。小水短少。醫以胃苓湯加滑石木通車前子利之而瀉止。大便又因之結燥。艱澀不堪。廼用潤腸丸。復瀉不止。又進以前通利之劑。瀉雖止。而小水竟不得流通。直遂。臍下脹急。立起解之。則點滴不出。卧則流之不竭。以頻取夜壺。致通宵不得寐也。治半月餘而精神削。寢食廢。聞予寓崔勳部衙而徵予治。初見即告以受病之源。又謂都城諸醫俱不識為何症。將認為癆。則立解時點滴不出。認為秘。卧則涓涓而流。謂為脾約。大便又不結燥。謂氣虛下陷。心血不足。而補中益氣湯與安神丸服過十晝夜。無益。雅聞先生高手。願一診以決之。探其脉。兩寸短弱。關緩大。兩尺洪大。語之曰。此餘暑未解。而司馬素善飲。濕熱流於下部也。今已下午。恐診之未準。俟明早細察而再定方。公曰。延頸吾子久矣。適所言近。願亟求一劑飲之。微夜

問一睡。予不得已。以益元散三錢煎香薷湯進之。畧無進退。次早復診。六脉如昨。予思之而恍然悟。又語之曰。此症尿窳不對也。司馬曰。各出何書。予曰。內經云。膀胱者。脬之室也。脬中濕熱。下墜。故立解。而窳不對。小水因不得出。卧則尿不下。墜而尿滲出。膀胱亦以窳不對。小水雖涓涓而流。亦不能通達直遂。故了而不了也。治惟提補上中二焦元氣。兼清下焦濕熱。斯得矣。又有一法。今氣虛下陷已久。一兩劑未能取效。安得伏枕而睡。且此不寐。非心血不足之故。因着心防閑小便之了。而不了。而不敢寐也。暫將舊衣或布襯於席上。不必防而任其流出。又免取夜器而勞動其神。自然熟睡矣。以補中益氣湯提補上中二焦之元氣。加黃柏知母祛下焦之濕熱。夫清陽升。則濁陰自降。脬無濕熱。則不下墜。窳可對。而病可瘳矣。司馬忻然。請藥。夜如法視之。果啞然一睡。相忘其尿之出不出也。次早視視布雖濕而不甚。以久不闔目。得此一睡。神

氣頓回。胸臆爽快。如未病者。調理四日而病全安。司馬大喜而欲留久住。緣漕運李公相延之。亟弗克也。差大馬舡鼓吹送予阡闕而還。九十五

崔百原公者。河南人也。年餘四十矣。而為南敷部。即患右脇痛。右手足筋骨俱痛。艱於舉動者三月。諸醫作偏風治之不効。馳書邑大夫。祝公徵予治。予至視其色蒼。其神固。性多躁急。診其脉左絃數。右滑數。時當仲秋。予曰。此濕痰風熱為

三吳二卷

六九

痺也。脉之滑為痰。絃為風。數為熱。蓋濕生痰。痰生熱。熱壅經絡。傷其營衛。變為風也。公曰。君何以治。予曰。痰在經絡。雖不害事。然非假歲月不能愈也。隨與二陳湯加鈎藤。蒼耳子。薏以仁。紅朮。五加皮。秦朮。芫蕪。靈仙。黃芩。竹瀝。姜汁。飲之數日。手足之痛稍減。而脇痛如舊。再加鬱金。川芎。白芥子。痛俱稍安。予以赴漕運。李公召而行。速勸公請假。緩治。因囑其慎怒。內觀以需藥力。公曰。內觀何為主。予曰。正心。公曰。儒以正心為脩

身先務。每苦工夫無下手處。予曰。正之為義。一止而已。止於一。則靜定而妄念不生。宋儒所謂主靜。又曰。看喜怒哀樂未發以前。作何氣象。釋氏之止觀。老子之了得一。萬事畢。皆此義也。孟子所謂有事勿正。勿忘。勿助長。是其工夫節度也。公曰。吾知止矣。遂上疏請告。予錄前方畀之。北歸。如法調養。半年而病根盡除。九十六

醫案新都治驗三卷目錄

瓊兄內傷飲食外感風邪一

程龍坵翁每行動即作熱發渴嘔惡腰與環跳穴

常痛二

汪松崗原傷於酒夜分發熱咳嗽咯血三

族妹經不行者八十日每飲食入腹即疼痛吐出

逆止四

孫華野喉痛頰車腫五

顯兄每辛苦及酒多則咯血數口六

新都目錄 卷一

吳遂兄濕熱發黃七

族侄明之痰火上逆大吐痰沫因而嘔血一涌數

梳有發明

族嫂程氏肺癰九

侄媳葉氏身面四肢浮腫十

族侄孫伍仲善飲好內小便血淋疼痛令脊吐

紅發熱十一

亮卿令愛右目紅腫十二

太學少竹眼紅腫脹十三

一僕婦產後惡露不盡腹中作痛十四

程好吾令孫右耳後生毒腫痛十五

華岳令堂右手臂肢節脹痛十六

程西峰令眷血痢十七

程七護兄臍腹右邊疼痛小水不利嘔吐不進食

程社貴兄醉後御色次早胃脘痛極十九

汪松崗令眷左脇痛咳嗽內熱二十

贊皇令堂產後左脇痛甚二十一

許少峰中風先兆二十二

新都目錄 卷二

朱宅女眷熱入血室二十三

孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡病多夢鬼二十四

愛泉陽風咳嗽聲啞右邊不能貼席二十五

侄婦戴氏有妊五月忽血大下午後發熱二十六

靈岳迺眷胃脘疼痛頭暈舌麻二十七

吳人峰先生內人兩脇脹急痛拒胃脘二十八

陳鈇兄內人產後腹痛發熱下痢膿血二十九

程石洲迺眷因產難子死憂悶小腹有塊作痛復

因多食圓眼脹益大脹堅如石大如斗氣促不

安有發明
三十

程姬年八旬頭暈脚軟大便溏洩小水淋瀝三十

程道吾先生令政夜覺而驚時常暈厥三十二

一僕婦瘟疫以勞食復作三十三

程方塘年六十四風癱不能步者三載腿肉盡消

汪有吾癰三日一發發於夜三十五

汪東之夫七月初旬虛陽口瘡有發明
令眷姪

中咳嗽三十六

吳東渠癰後虛憊三十八

吳西源令眷以艱子多鬱多思肌肉盡削皮膚燥

搗通身生瘡體如火燎三十九

談嫂程氏環跳穴滯腫痛寒熱并發不能動止四十

恒守瘡後遭跌環跳脫出不能復收四十一

侄孫女周歲發慢驚四十二

程以湖以飲生酒面浮胸脹四十三

吳斗一原有腸風又感風邪發熱多痰腹痛下痢

侄孫二水體甚肥胖患溫瘧症四十五

甚興張錫泉先生左脇皮裏膜外疼痛四十六

族侄雲岳患偏墜臍腹腰俞脹痛四十七

一婦幼齡感風寒致成鼻淵四十八

程兩峰瘀血發黃吐出穢惡如爛猪肺狀大便色

如墨有發明 四十九

予表嫂小產後腹痛暈厥五十

陳士美傷寒熱症瀉底有發明 五十一

程松逸兄酒疸五十二

仲諫患跨馬癰有發明 五十三

一婦咳嗽痰中有紅五十四

周佃侄春溫鼻衄寒戰五十五

汪氏婦腹脹如斗五十六

仲登陽症侶陰有發明 五十七

汪希明性躁痰火咳嗽吐紅五十八

祝弘吾潮熱咳嗽汗流不止五十九

汪宥翁老年勞倦感冒胸膈大熱而痞六十

汪鍊兄內人經水熬黑血塊不止六十一

程相如令政姪發寒熱六十二

余文台壯年咳嗽吐紅六十三

即伯成女經行而浴感冒大發寒熱嘔吐煩躁六

金氏婦血崩後四肢浮腫六十五

張雲門令即囊癰六十六

朱宅內眷懷妊受驚而成子懸六十七

有發明

頭鄰泉女吐血潮熱六十八

汪思石令堂怒後暈厥六十九

僅孫君實遍身筋骨疼如虎噬七十

葉子黑內人疫後虛憊七十一

孫如亭令政右眼眦突生白泡二寸餘嘔吐咳嗽

新發目錄 六三卷 五

吳勉全腹痛欲死有發明七十三

黃願全內子產未弥月醉犯房事血來如山崩七十四

程心章兄類腮紅腫七十五

程六十喘後發腫七十六

程七護夫發熱背痛伏梁積塊下痢紅白七十七

程孺人黃氏春溫過時熱病七十八

程有望孺人月汛當止不止七十九

上舍近洲胸脇脹痛八十

黃源全先生內人吐血洩瀉發喘有八十一

孫合溪翁八旬而發寒熱咳嗽汗出不止飢餓油

聲八十二

茅蕪方叔度令嫂汪氏脹滿八十三

吳天威大便癰有八十四

文貴者時疫漏底發熱譫語有八十五

鍾澤程夢奎孺人哭子過傷因發寒熱有八十六

歛潛口汪召南大令即壘脹有八十七

岩鎮鄭景南大痰飲積塊跳動不止有八十八

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人 余煌

徐景奇

子 泰來

朋來

全閱梓

新都治驗

瓊兄內傷飲食外感風邪。洒淅惡寒。發熱煩躁。不寧。已經表汗瀉吐之後。小水短赤。口渴腹中疼。

新都三卷

夜不能睡。耳聾氣塞。神魂不安。懊懷不已。予脉之。兩寸滑大。左關絃。右關滑。兩尺皆絃。皆七至。據此。廼少陽陽明兩經合病。仲景云。渴而小便不利者。當利其小便。先與柴苓湯。加竹茹進之。耳稍聰。稍得睡。熱仍不退。聞食氣即嘔。以濟生竹茹湯。加人參。麥冬。黃連。外與辰砂六一散。三錢。服後神稍清。手足心仍熱。用竹葉石膏湯。而熱亦不退。且懊懷殊甚。合目即譫語。按仲景請傷寒汗吐下後懊懷不得眠者。熱在心胸之間。

宜輕瀉之。以梔子豉豉湯主之。服後晚間仍不

得眠。兩耳氣塞難當。改以小柴胡湯。合白虎湯

進之。即得睡。睡中汗出二次。耳頓通利。因進食

早。又發熱口渴。舌上黃胎。此陽明餘熱復萌。乃

用石膏七錢。甘草一錢。知母三錢。黃連一錢。五

分。百合竹茹各一錢。竹葉三十片。急進而熱全

退。始得獲安。

程龍坵翁。每行動即作熱。發渴嘔惡。腰與環跳常

痛。脉左沉細。右寸滑。關尺濡弱。此上焦有痰火。

新都三卷

下焦有濕熱。治當流濕舒筋。然後施補。先用以

仁三錢。蒼朮。葳靈仙。牛膝。黃栢。烏藥。葉紫。荆皮。

各一錢。紅苓。桂皮。防己。各五分。水煎服。外以鹿

茸。虎骨。晚蚕。沙仙。茅黃。栢龜。板蒼朮。牛膝。杜仲。

蜜丸服之而安。

汪松崗翁。原傷於酒。夜分有熱。咳嗽咯血。不思飲

食。左脇氣不調。左寸脉芤。關澁。尺弱。右寸短。關

滑。此胃中痰火正旺。氣血俱虛。宜先清胃保肺。

然後大補。麥冬。知母。寒水石。甘草。紫苑。人參。牡

丹皮白芍藥當歸貝母桑白皮煎服一帖紅仍
未止加側柏葉茅根四帖而紅止過後四月又
為怒氣所傷血又動左不能睡飛仁滑石紅苓
當歸人參貝母山梔仁甘草香附青皮牡丹皮
煎服而安予囑渠令子曰寄語令堂諸凡得意
事可與尊翁知之如不得意者切不可使之聞
也蓋肝為藏血之所况血去多肝火剛燥心主
不足內經云主不明則十二官危不可不謹防
之且左不得眠肝脹可知予甚為尊翁慮後三

新都三卷

三

年果為怒復乃命使迎予予固辭謝曰向曾訂
囑今病之來非不佞所堪任也不逾旬而歿二
族妹經不行者八十日每飲食入腹即疼痛必盡
吐出乃止居常亦吐酸水上焦熱下焦寒大便
半月始一行食飲不進者四十日六脉皆數左
滑右軟弱妹能事者以其夫多病且不諳世故
由是悒悒病從思慮而得恐成膈症今大便燥
結吐酸乃膈之徵急宜拂慮庶藥有功先與丁
薑丸一粒而吐止繼用溫膽湯加大腹皮姜連

痛吐全安改以二陳湯加香附條芩山梔仁丹
參砂仁調理兩月經行大便始潤而膈症斯不
作矣四

孫華野脉沉絃而數喉痛頰車腫兩大陽作脹疼
遍身皆脹痛增寒發熱乃痰火上壅而變風熱
將欲作毒也宜急治之薄荷甘草升麻白芷石
膏枳壳天荅粉桔梗大力子連翹玄參一帖而
愈五

顯兄每辛苦及酒多則咯血數口脉兩寸皆短弱

新都三卷

四

關尺洪數此胃中有痰火而下焦有陰火由壯
年酒色所傷故耳以丹參滑石各三錢白芍藥
二錢麥冬貝母薤仁紫苑牡丹皮各一錢當歸
七分甘草五分煎服而安六
歎邑吳遂兄木商也在吳興年七十因胃兩勞力
汗出又以冷水澡浴因而發熱口渴心與背互
相脹疼小水長而赤舌上黃胎夜不得卧眼目
如金皮膚盡黃吳興之醫見之遠走不敢措劑
謂其年高不宜與病讚勸回家乃敢訪予治診

得左脉浮數。右濡弱。两手皆有七至。予曰。此濕熱發黃症也。病雖重。年雖高。有是症。當有是藥。母用倉惶。乃以柴胡三錢。酒芍葛根。青蒿香薷。天荅粉各一錢。人參七分。粉草五分。進二帖。既得微汗。即能睡。次早熱退。其平。舌胎稍淡。潤不焦燥矣。胸膈餘熱。作煩。身黃如舊。以竹茹青蒿葛根各一錢。人參麥門冬。天荅粉。知母各八分。白芍藥六分。二帖。熱退。食進。精神陡長。後與補中益氣湯。加青蒿。麥門冬。天荅粉。十帖。而眼目肌膚之黃盡釋然矣。吳興諸公。悉服其精當。各錄方而傳。七

族姪文學明之。以作文過勞。痰火上逆。大吐痰沫。因而嘔血。一涌數碗。昏暈汗出。奄奄而卧。畧不敢動。稍動即嘔吐。而血隨出。色鮮紅。飲食湯水皆不敢入。入即吐。而眩運。血即隨之。里有琴君程聞野氏為之診。駭而走曰。血如涌泉。體熱脉大。眩運而藥食難入。侶無佳兆。乃速予治。予診視畢。語其乃兄勉之曰。可生也。何舉家張惶若

此勉之。以程言告予。予曰。看症要圖活。勿拘泥。據經云。心主血。肝藏血。又曰。怒則氣上。又曰。脉虛身熱。得之傷暑。今左脉絃大。右脉虛大。明之不獨作文勞。心動火。且亦被怒傷肝。抑又為暑所逼。以致木火上升。眩運作吐。經曰。諸風掉眩。皆屬肝木。諸嘔吐逆。皆屬於火。又諸動屬火。內為木火。工衝外為暑氣。所迫故吐。而汗多。血隨吐出也。醫貴識病。有是病。則有是藥。予持以白丸子三錢。解其暑氣。清其痰。飲抑其衝逆。則吐可止。吐止氣平。則血自能歸經。服後果啞然而睡。醒則吐止。食進。眩暈尋已。繼用滑石香薷各三錢。甘草五分。黃連白扁豆各一錢。五分。竹茹一錢。四帖全安。

從嫂程氏。年近五十。患咳嗽。吐臭膿血。一日夜一梳餘。發熱晝輕夜重。肌肉大瘦。六脉浮而洪滑。且數。人皆謂吐血。身熱脉大。法在不治。予曰。此非吐血比也。此係釀酒傷肺。又為怒氣所觸。痰血濁痰。滯於肺之氣竅。無從而出。久之化而為

膿成肺癰也。治宜開肺竅，活血化痰，使膿盡。當自愈也。諸人治之二年不效，予教以白芨、薏仁各三錢，牡丹皮、桔梗、茜根、歸尾、山梔子、貝母、白芍藥各一錢，甘草、葶藶子各五分，三十帖全愈。後壽七十三，以它病而終。此疾再不復發。九族姪媳，葉氏年三十，身面四肢浮腫，漸而入腹，腹大不可言，眼泡腫而無縫，飲食大減，小水不利，此氣滯水脹也。以大腹皮、茯苓皮、姜黃、蒼朮、厚朴、澤瀉、木香、烏藥、陳皮服四劑，而眼目能開，飲食稍進，即為食傷而復腫，予改用七傷丸調理全安。

新都三卷

七

族侄孫伍仲，立年善飲，好內小，便血淋，疼痛，予以滑石、甘草梢、海金沙、琥珀、山梔子、青蒿、茅草根煎膏為丸，梧桐子大，每空心及食前燈心湯送下三錢，不終劑而愈。後五年，因子遲，服補下元藥過多，血淋又發，小便中痛極，立而不能解，必蹲下如婦女小解樣，始能解出，皆大血塊，每行一二碗餘。如是者半月，諸通利清熱之劑靡不

遍嘗不應，脉俱洪數，予以五靈脂、蒲黃、甘草梢各二錢，小薊、龍牙草各三錢，水煎，空心服二帖，而痛減，半血仍舊，改用鬻麥、山梔子、甘草各二錢，茅根、杜牛膝、連葉車前草各三錢，生地、黃芩、胡黃柏、木通各一錢，四帖痛全減，血全止。惟小便了而不了，六脉亦和緩，不似前矣。後以人參、葛根、青蒿、白朮、茯苓、甘草、白芍藥、升麻、黃柏、知母調理萬全。

新都三卷

八

令春辰州太守石峰公女也，吐紅發熱，經水二十日一行，或一月行二次，白帶且多，胸膈飽脹，脉洪數，以丹參、生地、山梔子、白芍藥、小薊、鹿角膠、水煎，臨服加入童便一酒盃，二十劑而瘳。十二亮，知令愛右目紅腫，如腹中飽，眼乃能開，飢則眼不能開，此瘳積虛寒症也。以夏枯草二錢，甘草、穀精草各一錢，香附一錢，伍分煎服四帖而安。

十三

侄孫少竹，大學生也，眼紅腫脹，余雲谷以苦寒治時疾之劑與之，眼愈腫，且增兩太陽痛，前中

再加石膏。不惟眼腫不消。頭痛不止。且令遍身
脹悶。寢食俱廢。予為脈之絃大而無力。乃用蔓
刺子桑白皮柴胡香附夏枯草甘草芽茶一帖
而痛定。兩帖腫消。四帖全瘳。十四

一僕頗產後惡露不盡。腹中作痛。且胃風咳嗽。嘔
吐頭暈。脚麻木。不知痛痒。亦不能轉側。與糖棗
子紫蘇旋覆花烏藥五靈脂茯苓川芎當歸澤
蘭葉玄胡索加砂糖煎服。而痛止。再進惡露行。
咳嗽嘔吐皆愈。十五

新都三卷

九

上舍程好吾公。令孫右耳後生一毒。腫痛遍身。生
大泡。瘡增寒發熱。與金銀花當歸尾甘草赤芍
連翹姜黍大力子玄參兩劑而消。十六

華岳令堂年五十餘。向來小水短少。今則右背益
匙骨邊一點痛。夜尤痛。已經半月。醫治不效。展
轉加劇。即於右邊手臂肢節皆脹痛。筋皆暴起。
肌肉上生紅點。子脈兩手皆滑數。右尺軟弱。乃
溫熱傷筋而成痛痺。以東垣舒經湯為主。羌活
升麻薤仁麻黃紅芍當歸防風甘草獨活椿苓

黃栢防已知母黃連。兩帖痛減腫消。再亦不發。
十七

由溪程兩峰丈內人。患血痢。裏急後重。嘔吐不納。
殺兩寸脈洪大。以竹茹溫膽湯加姜連滑石橘
紅酒苓水煎服二帖。大便結實。膿血皆止。惟後
重與枳壳當歸芍藥生地桃仁條苓甘草滑石
酒連。四帖全安。十八

新都三卷

十

由溪程七護兄。臍腹右邊疼痛。小水短少。大便四
日未行。嘔吐不能進食。舌上白胎。面青手冷。勢
甚危急。脈之左沉伏。右滑大有力。予曰。此痰格
中。焦氣閉下。焦故大小便秘。而不利氣逆。嘔吐
也不急治。即無救矣。與相樹東行根皮二錢。滑
石三錢。薤仁青皮枳實枳椇。即各一錢。水煎服之。
夜半吐出膠痰碗餘。大便未行。痛亦不減。次日
改用玄胡索五錢。水煎服。調下玄明粉三錢。
辰刻服。下午刻痛減大半。未刻大便始行。右脈
平。而左脈起。美覺體倦無力。以生脈散加甘草
山梔仁黃栢芍藥以仁陳皮調理如故。十九

由溪程社貴兄先醉酒後御色次早四肢冷胃院

痛極脉僅四至先醫以鬱火為治投以寒涼痛

更增極三日前所食西瓜仍吐出不化乃翁以

為陰症傷寒欲用附子理中湯不決遂予治之

予觀其面色青慘叫痛而聲不揚坐卧煩亂予

曰此霍亂無魘厥症也先當止痛安魘後理霍

亂可免死也遲則誤事矣急用五靈脂醋炒三

錢蒼朮一錢五分烏梅三枚川椒炮姜桂心各

五分水煎飲下痛減大半下午以大腹皮藿香

半夏陳皮山查五靈脂茯苓兩帖全安二十

汪松崗令眷左脇疼咳嗽內熱每咳則脇下吊痛

寢食大減與青皮香附甘草芍藥訶子山梔子

貝母茯苓柴胡菴仁滑石人參水煎飲之熱除

痛減二十

文學贊皇令堂產後左脇痛甚咳嗽痰不易出內

熱氣壅不能伏枕予以瓜萸仁六錢桑白皮紫

蘓子杏仁半夏桔梗枳壳各一錢水煎服之而

氣壅定嗽漸減除外與保和丸及七製化痰丸

新都三卷

十一

而安二十二

許少峰胃中有痰肝胆經有鬱火心血不足面色

黑而枯燥肢節疼痛健忘精神恍惚內熱將有

中風之兆左寸細數關絃數右關重按滑而尺

弱治宜清肝胆之鬱火而養心神消胃中之痰

涎而生氣血使神帥氣氣帥血氣血周流經絡

無壅則諸疾不期愈而自愈矣何中風之有哉

用石菖蒲黃連白茯苓半夏酸棗仁天麻橘紅

各一兩牛胆南星三兩白姜蚤青黛木香各五

錢柴胡七錢五分竹瀝生姜汁打神麩糊為丸

菴荳大每食後及夜茶湯任下二錢一日二三

次服完神氣大健肢節皆舒面色開而手足輕

健種又皆瘳少峰曰吾生平服藥少効不期此

方之神若是不惟自服有功即諸親友有痰火

者服之莫不響應二十三

朱宅女眷經水行一月不止每黃昏先寒後熱遍

身疼痛胸前脹悶不通必欲大喊叫嘶用手於

喉中幹而吐出痰涎乃寬今且渴甚此痰飲瘧

新都三卷

十二

疾。今飲食不進。夜如見鬼者。乃熱入血室也。用小柴胡湯加生地黃丹皮陳皮菝仁。兩帖後。以白朮三錢。何首烏二錢。陳皮麥芽各一錢。烏梅一枚。生姜三片。水煎服之。而寒熱止。諸症皆安。二十四

孫熙宇。肢節腫痛。痰多嘔惡。胸中氣不暢。逆語言。亦不清利。夜夢皆亡人野鬼。追陪情神慘惡。驚恐不安。且汗多不止。飲食減三之二。遠近名家醫治逾月。不應。敦予為治。診其脈。左手甚弱。汗

新都三卷

十三

多故也。右手滑大。痰飲濕熱而然。法當補飲。前醫皆作風治。而用疎散洩。其元神將成。柔痊。予以人參。姜門冬。五味子。白芍藥。當歸。以仁陳皮。石斛。木瓜。甘草。白朮。桂枝。服此。汗大斂。而神思稍清。吐亦止矣。惟飲食不思。夜夢與亡人同遊。為惡耳。改用人參。黃耆。枸杞子。以仁白朮。各一錢五分。當歸。遠志。茯苓。木瓜。陳皮。各一錢。甘草五分。水二鍾。入雄猪心血一枚。煎作八分飲之。四帖。乃能睡。始夢生人。不復夢亡人矣。二十五

愛泉上年十月。因傷風咳嗽。即時斂。啞。繼聞父喪。

過憂。右邊不能貼席而睡。醫以滋陰降火之劑治之。半年肌肉大削。大便秘澀。飲食減。必咳嗽。斂啞有加。喉且疼痛。迎予為治。診得六脈俱絃。數。此憂傷肺。思傷脾症也。危急甚矣。以白朮。茯苓。陳皮。粉草。以仁。桔梗。柴胡。桑白皮。酒炒。白芍藥。澤瀉。麥芽。山查。煎服。二日。再以荆芥。桔梗。玄參。甘草。茯苓。白芍。酒連。扁豆。山藥。山查。木通。服此。而右邊可睡矣。改用參。苓。白朮。散加白芍藥。

新都三卷

十四

烏梅。訶子。酒連。山查。調理而愈。二十六
侄婦戴氏。有孕已五月矣。忽血大下。午後發。六脈俱數。左寸滑大。右關搏指。左關軟弱。予以白芍藥。二錢。生地。阿膠。人參。蒲黃。各一錢。柴胡。香附。地榆。荆芥。穗。各七分。甘草五分。煎服。午後發寒熱。每夜凡三次。頭痛。惡心。腹中塊硬。所下血塊甚多。心下怯力。此虛無疑也。以補中益氣湯。加阿膠。炮姜。白芍藥。烏梅。煎服。下午右眼白珠。發一白泡。光腫下垂。而面亦腫。此虛火遊行無

制之症。其夜大發寒熱。指爪皆黑。唇白。汗大出。腹中作痛。牽引兩乳皆痛。仍以補中益氣湯加阿膠白芍藥桂枝五味子麥冬。服後熱退。汗止。渴除。神氣稍定。乃有生意。次日咳嗽而胎墮。即以獨參湯繼服。其夜腸鳴。瀉二次。以人參白朮各三錢。炙甘草一錢五分。炮姜一錢。桂心茯苓各五分。陳皮七分。蓮子大棗煎服。後因咳嗽。以四君子加炮姜五味子紫苑調理而愈。二十七

新都三卷

十五

背心亦脹。內熱而外惡寒。必厚被蓋覆。得微汗。廼解。二陳湯加桔梗杏仁桑白皮枳殼青皮白芥子蘿蔔子酒茶煎服。兩帖。舌竟不麻。晚因食鷄過多。鬲上氣滯。二陳湯加蘿蔔子枳實山查川芎香附酒連調理全愈。二十八

碗和之。名曰陰陽湯。用此調玄明粉一錢五分。服之。不惟不吐。痛減半矣。必頃大便秘行二次。因食豆腐及粥太早。而痛復萌。唇臉皆紅。此必有虫。故如是也。與白芍藥桂枝粉草烏梅荖椒五靈脂杏仁水煎。痛定其大半。再與蒼朮厚朴山查枳實茯苓玄胡索香附一帖全止。但心背皮膚外疼。不能着蓆而睡。以川芎當歸白朮厚朴大腹皮粉草茯苓香附陳皮半夏調養全愈。二十九

新都三卷

十六

陳鉄兄內人。產後腹痛發熱。下痢膿血。裏急後重。川芎二錢。當歸三錢。茯苓乾姜肉桂山查陳皮酒炒白芍藥白朮各一錢。粉草五分。一帖而腹痛止。痢輕。後重亦除。惟發寒熱多汗。改用人參白芍藥桂枝粉草川芎當歸白朮茯苓香附陳皮山查再劑。而諸症如釋。三十

程石洲乃眷。因產難子。死憂悶。小腹有塊。作痛。下午發熱。不思飲食。次早診之。脉右大於左者三倍。且數。與芎歸湯加糖毬子澤蘭葉肉桂。次日

下午腹脹痛詰之。响午食圓眼一斤矣。從此小腹漸脹。卷三日未行。早晨鼻衄。夜間極熱。口渴。脉大無緒。勢甚危急。用川芎當歸紅荅桃仁青皮枳即莪朮山查水煎。調玄明粉二錢服。後大便稍行。結糞二枚。安而就寢。醒後進粥稍多。又復脹痛。腹大如斗。堅如石。氣促不安。勢危至此。亦已極矣。與五靈脂糖黍子各四錢。凌帶各二錢。赤芍藥一錢。服後大便通。腹軟氣定。始可進粥。漸育生氣。但脉仍鼓指。此腹中積滯尚多。不可不因其時而驅去也。用糖黍子大黃各三錢。飛仁二錢。桂心紅荅各五分。炙甘草七分。水煎。臨服調玄明粉一錢五分。其夜下黑糞四次。熱始退。上腹雖消。臍下仍大。仍以桃仁承氣加山查滑石紅荅煎飲之。五更大便行。臍腹脹又漸減。後與積塊丸調理全消。是役也。女流只知女科專門為仗。故前發熱脹痛之時。彼專門不察虛實。即以常套十全大補湯投之。詎知圓眼肉初入腹之時。不覺以頃。漸又脹關。故腹

亦因之而脹也。且其味甘。尤能作滯。復加地黃參朮寧不塞其塞哉。由是而成大滿大堅之症。內經謂中滿者。瀉之於內。良以此。夫彼亦泥乎丹溪產後須當大補氣血之說也。三十一程宅一老姬。年八十餘。常頭暈脚軟。擗載上身不起。行須人扶。否則眩暈跌仆。大便溏洩。小水淋瀝。此下元虛憊所致。以人參黃芪白朮。薏仁各二錢。山茱萸杜仲茯苓各一錢。陳皮山藥粉草各八分。八帖而愈。三十二文學程道吾先生。令眷夜為夢魘所驚。時常暈厥。精神恍惚。一日三五發。咳嗽面色青。不思飲食。日惟啖牛肉脯數塊而已。時師屢治無功。吳渤海視為寒痰作厥。投以附子肉桂而厥尤加。逆予為治。於左脉絃。右脉滑。兩寸稍短。道吾先令眷二皆卒於瘵。知其為傳屍瘵症也。不易治之。迺權以壯神補養之劑。消息調理。俟飲食進。胃氣轉。始可用正治之法。姑用人參茯苓栢子仁石菖蒲遠志丹參當歸石斛。以補養神氣。以陳

皮貝母甘草紫苑化痰治嗽服半月而無進退
迺為製太上渾元丹藥用紫河車一具辰砂釐
甲犀角各一兩鹿角膠紫苑石英石斛各八錢沉
香乳香安息香茯苓紫苑牛膝人參各五錢射
香五分煉蜜為丸赤豆大每早晚鹽湯或酒送
下三十六丸又製霹靂出獵丹藥用牛黃狗寶
阿魏安息各一錢虎頭骨五錢啄木鳥一隻獺
爪一枚敗鼓心破皮三錢射香五分天靈蓋一
箇煉蜜為丸雄黃三錢為末每五更空心葱白

新都三卷

十九

湯送下五分三五日服一次與太上渾元丹相
兼服總服半月精神頓異不似前時恍惚矣但
小腹左邊一點疼前前藥中加白芍藥一錢服
之一月精神大好暈厥再不發矣次年生一女
其宅療疾從此再亦不傳三十三

一僕婦年三十患瘟疫一月餘矣非勞復即食復
今則發熱咳嗽胸脇疼耳聾口渴大便七八日
不行不知人事迺與柴胡石膏各三錢瓜萸桔
梗枳壳各一錢五分黃芩前胡各一錢天荅粉

八分甘草五分黃連八分急煎服之人事稍清
因大便不行次日以大柴胡湯下之又次日大
便雖行熱仍不退改以柴胡二錢白芍藥黃芩
麥門冬各一錢天荅粉茯苓甘草各六分四帖
而愈三十四

新都三卷

二十

秦軍程方塘翁年六十四向以強胤服溫補下元
藥太多冬月下身著單袴立溪邊督工受寒致
筋骨疼痛肩并缺盆脚膝跟踝手肘掌後及骨
節動處皆紅腫而痛卧床褥三年吳中溪視為
虛而用虎潛丸吳渤海視為寒而用大附子肉
桂鹿茸徐東臯認為濕周鵬認為血虛張甲認
為風李乙認為歷節百治不瘳腿間大肉盡消
惟各骨節處腫大而疼予適在程道吾宅迺逆
予診之其脉絃濡有力知其為濕熱痰火被寒
氣凝滯固滯經絡也節為藥劑不對故病日加
所取者目中精神尚在胃氣仍未全損但小水
解下以瓦盆盛之少刻則澄結為砂色紅而濁
兩膝下及脚指皆生大瘡瘡靨如靴釘狀此皆

平昔服溫補春方所致病雖久年雖高猶為有餘之疾不可因高年疾癩棄不治也。迺特為先驅逐經絡中凝滯然後健脾消痰俾新痰不生。氣血日長。最後以補劑收功。斯得矣。翁生平好補畏攻。故遺門者皆務迎合。予獨反之。以新取。葳靈仙一斤。裝新竹筒中。入燒酒二斤。塞筒口。刮去筒外青皮。重湯煮三炷。官香為度。取出葳靈仙晒乾。為末。用竹瀝打糊。為丸。梧桐子大。每早晚酒送下一錢。一日服二次。五日後大便瀉。

新都三卷

二十

出稠粘痰積半桶。腫痛消去大半。改以人參石斛。蒼朮黃柏。以仁蒼耳子牛膝烏藥葉。薑板紅。蒼犀角。屑木通煎服二十帖。又用前末藥服三日。又下痰積如前之半。仍以前煎藥服半月。又將末藥服三日。腹中痰漸少。乃為製丸藥。以虎骨晚蚕沙。蒼朮黃柏丹參杜牛膝。莖葉以仁紅。心五加皮。蒼耳子。龜板酒打麵糊。為丸。梧桐子大。每空心白湯送下七八十九外。以丹溪保和丸食後服。半年全愈。腿肉復完。步履如故。三十

五

汪省吾暮秋患瘧。三日一次。發於夜。迨次年仲春。猶不能止。遍身疼。頭疼。背脊疼。百治不應。即灸亦僅止得一日。次日仍發。面色青。肌肉瘦。以症叅之。邪在足太陽經。用麻黃一錢。五分人參。桂枝。白芍藥粉。草知母各一錢。陳皮貝母各七分。姜枣煎服。諸疼減半。而瘧未止。以何首烏白朮各五錢。青蒿一錢。烏梅一箇。陳皮二錢。生姜三片。水煎。臨發日五更服。尋常以六君子湯加

新都三卷

三二

黃耆柴胡五味子烏梅草果調理而愈。三十六汪東之丈七月初旬。自浙歸。連日與客手譚過勞。口中生瘡。醫以香薷飲。清胃湯。瀉黃湯。三黃丸。黃連解毒湯。白虎湯。涼膈散。凡治上焦熱症之劑。竭寒涼而進之者。十一日矣。口瘡日甚。一日不但飲食不進。即藥亦難下咽。因瘡延及於喉也。逆予為診。其脉六部俱豁大無力。診罷。有外科陳氏者。自稱喉舌專門。銜其口。瘡敷藥之。妙予曰。汝試為口中一洗。看是何狀。總開口見涎。

沫迷漫不能得見肉色。陳以荊芥湯洗而引之。攪出稠涎一二椀餘傾於地上。偶有二鷄爭啄之。二雞立斃。其毒何如此。亦疾之奇者。予囑陳曰。汝用藥只可吹入喉中。切不可敷其舌。必俟喉中全好。然後敷舌。待舌好。再敷口唇。甚毋得槩敷。恐毒無出路。反攻入喉。極為悞事。陳曰。諾。予對乃翁曰。令郎之疾。廼虛陽口瘡也。翁曰。當用何劑。予曰。附子理中湯煎熟待冷。飲之。可救。如它藥不能立功。翁曰。瘡乃熱症。况上身已熱。

新都子卷

三

又天時酷暑大熱之劑。其敢進乎。予曰。此陰盛格陽之症。初未嘗如此。因服寒涼過劑。激之使然。爾翁不省其兩足膝下皆冷乎。翁用手探足下果冷。乃欣然聽用人參白朮各三錢。大附子炮姜炙甘草各一錢。水煎冷與之。服後即甦。睡達旦。次早便能食粥。半盞足。膝下漸暖。藥仍如前。早飯後予與二三友散步山溪。午刻歸來。乃見舉家大慟於地。見予至。哭語予曰。不可為矣。本是熱病。誤服熱藥。今舌腫大。塞滿口中。不能

言語。死在頃刻。柰何柰何。予駭然應曰。安得有是不祥語也。今晨診脉與昨不二。適往返不過二時許。何倏爾有此大變乎。待予再診決之。及診六脉漸斂。較昨大有神氣。面色亦和。獨舌脹大。予心知為陳寒涼敷藥所致也。迺詰陳曰。我別後可用敷藥否。陳點首曰。已二次矣。予撫翁及諸人曰。無慟。立看予為翁消之。急取官桂研末五錢。用生姜自然汁調塗舌上。純塗上。但見眼泪雙流。鼻中涕出口內涎垂。舌頓消去。語近

新都三卷

四

侍曰。我無事矣。諸環侍者。男婦不下二十。皆面面相覷。以為神奇。予曰。可即取粥與食。使壓之。庶虛火不再升。適舌脹滿者。乃敷藥寒涼。閉其毒氣。毒無從出。故作脹耳。桂皮乃辛熱之物。又以姜汁調塗。取辛散之義也。諸人皆服其論。三十七

東之夫令眷姪已六月。為傷風咳嗽。腹中弔痰。痰壅喉音不清。頭且眩運。脉左滑數。右寸弱。關滑左尺有力。右尺弱。予以人參白朮陳皮貝母茯苓

苓桔梗桑白皮紫蘊粉草黃芩前胡四帖而病全愈三十八

吳東渠年五十有七。因上年患瘡。胸痞作脹。肌肉大削。因連服攻剋太重。脾胃敗壞。膝及跟踝皆浮腫。遍身發熱。口渴。小便短赤。舌上黃胎。舌心焦煤。乾燥。誤服寒涼。大便連瀉五六次。目不能開。手足無力。倦於言語。予診之。六部俱浮大。按之豁然空虛。飲食不進。此中氣大虛。元神俱脫。可畏之甚。即以人參白朮茯苓甘草木香葛根

新都三卷

二五

酒炒白芍藥水煎服之。連進二帖。始能開目。漸出聲。言語後。以六君子湯去半夏加葛根白扁豆山藥養香以仁白芍藥石斛調理而愈。二十九

吳西源令眷因未有子。多鬱多思。肌肉漸瘦。皮膚燥揭。遍身生瘡。體如火燎。胸膈脹痛。而應於背。咳嗽不住口。醫治十越月。愈以為瘵疾不可治。知予在程方塘宅中。迺遊予治。診得右寸關俱滑大有力。左絃數。予以瓜蒌仁四錢。蘿蔔子貝

母枳壳調氣化痰。開鬱為君。桑白皮葶藶子黃芩瀉肺火為臣。甘草前胡為使。三十帖全愈。仍以千金化痰丸調理。向來年又至冬月。則咳嗽痰喘不能睡。自此後遇冬月痰喘再不復發。四十

族嫂程氏環跳穴邊腫痛。增寒發熱。不能動止。寢食俱廢。頭重惡心。上身熱。下身冷。天明乃退。口乾。舌上白胎甚厚。以柴胡防風桂枝解其寒熱。以蒼朮黃柏五加皮菴朮赤芍藥治其痛。木通

新都三卷

二六

利其濕熱。且引火下行。甘草調和諸藥。使各得職。一帖而痛止大半。再進寒熱除。三帖痛全減。去改以小柴胡湯加牡丹枳壳桔梗二帖而舌胎脫然。四十一

上舍恒宇先生原因生楊梅瘡後。偶遭一跌。環跳脫出。不能復入。窠臼疼痛殊甚。兩足因長短不齊。予思不能復入。窠臼者。以瘀血流入窠臼。占滿故竅。致骨不得復入也。今但消去瘀血。必以行氣活血之劑為主。以下行嚮導之劑佐之。庶

可復原用陳年窖中磚瓦洗淨煨過四兩生地
杜牛膝骨碎補丹參赤芍各一兩五錢自然銅
三兩蒲黃車前子蘊木各一兩鹿角二兩玄明
粉五錢各為末以茅草根一斤紅荅四兩煎膏
拌酒前藥再以煉蜜為丸梧桐子大每空心及
食前酒送下八九十九未服此藥之先病足長
二寸餘服此丸藥後只差半寸設再製久服必
能全惜渠素畏藥中道而止故功虧一篑也
豈可嘆哉四十一

新刻一卷

二七

族姪孫女一週歲時發慢驚眼開手拳目不動移
脚指微動先自顛門後遍身如火喉中痰聲口
中痰沫腹脹放屁大便亦行先以牛黃丸蘊合
香丸進之不効及各治驚治痰等藥與之皆不
受即從痰沫流出用通關散吹入鼻中亦不作
嚏自申時至戌時猶不能醒面色素青而白氣
稟其弱因婢者抱而偶失跌受驚發熱此驚氣
乘虛而入在法已無生路但不忍坐視姑以人
參三錢生姜自然汁拌炒煎湯頻又用匙挑入

口中初一三四匙皆不受後又與五六匙偶能
入一二匙下喉便覺痰聲稍緩因此頻又與之
十匙之中有二三匙入腹矣喉中氣轉目便能
動始有生意再以六君子湯加天麻石菖蒲姜
歪澤瀉薄荷煎服至鷄鳴時乃畧啼一二聲方
識吮乳次日咳嗽語聲不出小水短少以辰砂
益元散一錢用灯心湯調下熱退聲出惟嗽不
盡止改以四君子湯加陳皮五味子麥門冬桑
白皮桔梗杏仁薄荷一帖全愈四十三

新刻一卷

二八

程以湖因飲生酒食硬乾豆腐以致次日面上浮
腫胸中作脹今經半年腹中腸鳴四肢浮腫兩
腿及陰囊皆腫口乾大小便俱不利年四十六
矣夜臥氣喘膝下冷先以人參蒼朮陳皮蘿蔔
子半夏麩葛根厚朴枳實破故紙大附子茯苓
煎服二帖氣喘稍定腹中仍鳴加白苳仁白芥
子桑白皮小水頗利浮腫漸消四十四
吳斗一夫歛溪南人也八月初旬自新都往湖州
途次偶感風邪發熱多痰且又腹痛下痢裏急

後重原有腸風下血之疾。又以舊年乃翁痢疾發熱。幸於湖州心甚恐怖。予脉之。兩關滑大有力。尺寸俱不足。乃以白芍藥一半。生一半。酒炒五錢。止痛為君。當歸活血。酒連酒。芩柴胡。桔梗。清熱升提。陽氣為臣。枳殼。槐花。兼治腸風。為佐。益元散。木香。以實大腸。山查。以消瘀血。調肝安脾。為裨佐。一帖。熱減。半痢稍輕。次日仍用前藥。外與丹溪保和丸。調理五日。而出戶。四十五。侄孫二水。年三十。體甚肥胖。夏月常浸在溪中。野

新都三卷

二九

於松陰之下。至八月大發寒熱。於已午間。至天明乃退。不能起床。飲食亦不進。嘔吐黃苦胆汁。胸膈脹悶。舌上乾燥。生茫刺。沉香色。強硬不能言語。必含冷水。漱之。始能說一句。若再語。三語必三噦水。而後可。惟西瓜。新藕。是啖。先發寒熱之日。吐血一口。今則大便下血。症甚危惡。且咳嗽。此溫瘧症也。由醫失解散。遽用黃耆。以閉邪氣。致成大禍。今法當清解。止吐。俾飲食進。然後庶可保其生也。柴胡。知母。各三錢。石膏。十錢。葛

根二錢。橘紅。竹茹。各一錢。伍分。酒。芩。枳。實。各三錢。甘草。貝母。各五分。水煎服之。三帖而吐止。改用二陳湯。加柴胡。枳實。黃芩。黃連。天。芍。粉。薑。甲。白木。何首烏。調理而愈。迺囑其不可食葷。食葷早恐復發也。四十六

堪輿張錫泉先生。患左脇皮裏膜外疼痛。有惡寒發熱之狀。以白芥子一錢。五分。川芎。柴胡。桔梗。各一錢。桂枝。甘草。各五分。水煎飲之。當愈其半。次日以八珍湯。加青皮。為君。木香。為佐。柴胡。為

新都三卷

二九

使一帖全愈。四十七。族侄雲岳。患偏墜。臍腹腰俞俱脹而痛。左關脉絃大。鼓指。用小茴香。甘草。蒼朮。益智。仁。防風。各五分。荔枝。核。橘。核。糖。麩。子。柴胡。各一錢。山。梔。子。青。皮。各七分。服後其痛如舊。脉且轉數。恐作癰。急為解毒。瓜。蒞。五錢。當歸。甘草。節。金。銀。花。各一錢。連。翹。柴。胡。青。皮。各七分。水煎服之。癰。疔。腫。消。因食雞魚太早。次日臍腹又作脹痛。發熱。不能眠。昨日囊消。後絃脉盡退。今復絃矣。改以山查

瓜蓼各二錢金銀荖柴胡連翹各八分甘草節黃連當歸各五分青皮七分兩帖而愈四十八一婦時方妙齡表虛易感風寒致成鼻淵流涕不止便覺頭暈兩太陽常作疼且多噴嚏脉之兩寸洪大用秦艽酒苓桑白皮馬兜鈴各八分白芍一錢滑石石膏各二錢枳殼蔓荊子各五分甘草三分四帖涕止病愈四十九

程兩峰夫偶與乃侄稍有介蒂其晚飲於侄家歸覺腹中脹滿嘔噦不寧次日眼珠面色皆黃惡

新都二卷

三一

寒發熱時當仲秋正瘡痲為癘之候醫作瘡治五心加熱下午潮熱煩躁但嘔不嘔且鼻衄腹痛大便黑如墨吐出黑血如爛猪肺者然約攪餘有謂所吐之物如此大便之黑又如彼但有中蠱之象心疑乃侄毒之也正欲與乃侄爭辯子仲子泰來適在渠宅徐語渠諸郎君曰尊翁症尚可起顧不為救症而務與人鬪何舍重而圖輕耶渠家素不急子仍迓所親信者率相視之見目珠如金面若薰橘腹大如斗其中有塊

大如楮堅如石兩足下皆浮腫四肢且冷小水赤飲食不思莫不面面相覷辭而不藥舉家聞言通宵號泣惟欲攘臂爭鬪仲子泰來又語之曰家君固不敏其知識量不出諸公下昨自華陽歸迓而胗之當必有說舉家忻然敦予求胗其脉左澁右滑予曰據滑脉主痰飲澁主有瘀血也今所吐所下皆瘀之徵斷非蠱也使得早從事曷有此猜忌此號泣哉兩峰曰吾生平頗謹疾瘵自何致予曰內經云怒則傷肝甚則嘔

新都二卷

三一

血不嘔則積積而瘀於經隧滿而溢也兩峰曰若謂從怒而致則此語恰當吾病源矣敢請劑予用當歸尾三錢赤芍藥牡丹皮川芎各一錢五分玄胡索五靈脂菴仁各一錢滑石茜根各二錢水煎飲之所下黑物甚多腹中仍痛塊猶未軟前方再加青皮山查酒蒸大黃服之大便行三次黑瘀及痰不計其數從此腹漸寬塊漸豁面色稍轉而黃日退飲食津又有加四肢微溫有生氣矣惟兩足浮腫不消改用六君子湯

加炮姜苗根滑石青蒿調理而黑糞全無一月精神復舊里中謂予此後匪獨認病投劑為足稱且俾二宅釋猜疑排忿爭其雅誼尤足重也

五十

予有表嫂小產後腹痛暈厥冷汗淋淋遍身麻木心怔怔動左脉絕不應指虛極故也以當歸三錢川芎一錢五分人參荆芥穗燈火燒存性各一錢益母草澤蘭葉各八分甘草五分水煎飲之腹痛減惟怔怔不寧以四君子湯倍加黃芪

新都三卷

三三

為君當歸香附益母草為臣川芎為佐炮姜為使兩劑而安五十一

陳士美孤子也年弱冠由夢遺後患頭疼發熱時值仲夏醫治不瘳凡市中有名者率延致轉治轉熱反加水瀉口渴日夜不得眠者旬日衆視為危時有俞氏者用參耆白朮為其飲汗止瀉而汗瀉愈劇呻吟不間晝夜勺粒不入口咳嗽胸痞躁悶不寧又四日矣渠親邵瓊林交予因况邵逆予為治診其脉左絃長右洪大俱七至

舌脈傳黃龍若火燦神昏氣促予曰此仲景傷寒微瀉也邪在陽明少陽二經其危不啻風中

瀉無渣滓治轉劇也幸予至設遲一日大事去矣兩石膏五錢柴胡知母各三錢炙甘草白芍藥枳實桔梗黃芩天荅粉各一錢粳米一撮急煎飲之夜半熱稍退神稍靜脉之仍數甚繼以前劑進天明乃得睡覺而熱退神清瀉止兩寬惟口尚渴再用紫胡一錢五分白芍藥麥門

新都三卷

三四

冬知母各一錢石膏三錢甘草五味子各五分人參七分服之舌潤渴止餘熱盡退粥飲始入漸向安矣次日忽兩足指前一截痛如犬啣不能耐以野藜握入明礬四兩煎湯薰洗痛勢稍緩又以薏以仁三錢木瓜二錢黃栢牛膝各一錢漢防已三分一帖而愈後又乾咳嗽晝夜不住口喉且疼胸脹而體畧熱此為誤服參朮太早之過用馬兜鈴百部御米壳各用蜜水製過一錢五味子甘草各五分百合二錢四帖而

愈五十二

程松遂兄患酒痲遍身皆黃尿如糞汁眼若金裝汗出沾衣如染胸膈痞滿口不知味四肢疲軟脉濡而數以四苓散加厚朴陳皮糖穉子麥芽葛根倍加青蒿水煎臨服加萱草根自然汁一小酒杯四帖其黃渙然脫去五十三

太學岐原門下幹人名仲諫者患跨馬瘡大發寒熱紅腫疼痛嘔惡不納飲食外科醫月餘腫痛日加飲食日減肌肉日消精神大憊不能起止新都三卷

岐原邀予脉之六部數而無力形氣殊不勝息時有專科唐氏為渠調劑將進予詰何劑唐曰真人活命飲也曾服四劑今始加大黃予復詰曰前此何劑唐曰敗毒散黃連解毒湯予曉之曰此皆治初起有餘之疾據今症乃氣血大不足者法當大補托而出之庶保終吉唐曰凡痛為實痒為虛今痛正盛脉正數飲食且不進大補必加飽悶飲食何由進熱毒何由出也予正色語之曰素問云數脉所主其邪為熱其症為虛

今痛極者皆由寒涼敗毒之劑傷脾胃凝滯血故飲食減而痛增也又以敗毒之劑進是病之爾安望服出而全其生乎唐曰補劑迨膿潰之後或因膿清而後用之今膿未出安可謂虛而補之吾為專門不敢任其責予顧岐原曰生死在此一劑不可不慎彼謂膿未出無補理彼排膿內托散十全大補湯非外科急劑乎大拒凡病寧使有餘後欲剝之廼為易易今狼狽若此再株守成法剝削後何以措手岐原曰井蛙之

新都三卷

三六

見豈知有天惟叔命劑子用黃耆三錢人參二錢川芎當歸各一錢白芷官桂甘草防風各五分急煎飲之一帖痛止而精神回飲食進再劑而膿潰十帖肉生能動止矣唐廼拊膺噴又語同列曰今而後知補劑能出膿而加食也吾儕外科當永識此以為法則五十四

婦咳嗽痰中有紅大便一日五六度惡心飲食極難下膈緣下膈腹中即不安立時欲瀉必盡瀉出乃止肌肉消瘦下午發熱熱將發時四肢

先麻兩足膝皆戰搖兩寸關脈滑數兩尺沉細
此虛中有食積痰飲之候也脈雖數午後雖發
熱不敢輕用寒涼特為溫補下元庶關門有守
瀉可止也山茱萸兔絲子人參破故紙杜仲山
藥茯苓澤瀉桂心砂仁服下甚安四劑後下體
不戰搖矣但飲食腹中微疼即欲登廁前方減
去山茱萸加白朮肉果木香八帖愈五十五

族煙煌春溫後忽鼻衄寒戰小水不利舌上焦黃
目珠極紅六脈伏而不見舉室惶又予曰此作

新都三卷 三七

汗之兆由熱極使然也因先時汗未透徹陽明
餘熱在經迫血上行越出鼻竅故有此症以石
膏滑石生地黃升麻赤芍藥牡丹皮麥門冬天
花粉甘草煎而服之汗出如兩直至兩蹠舌潤
而胎盡退衄亦止目珠色淡脈乃漸出改用人
參麥門冬五味子白芍藥甘草知母黃芩紫胡
竹葉石膏服下大便三五次遂愈亦始行積
積大轉於食亦漸進

此汪氏婦對河程明一也二也三也紅不行者

半載腹大如斗堅如石時或作痛里醫蓋技以
治月餘弗瘳乃舉徵友為翼又治月餘腹轉脹
急小水淋漓不通乃徵予治孫仲閣法而用溫
補下元之劑則脈急欲裂自經求畫文學南瀛
憐之薦予診其脈兩關洪滑鼓指按之不下迺
有餘之候也症雖重机可生詢其致病之源由
乃始治家費而過儉其母極事姑息常令女童
袖熱鷄牛古之類私授之因慙食冷物積而漸
成鼓脹前任事者並不察病源不審脈候誤作

新都三卷 三八

氣虛中滿治之脹而欲裂宜其然也乃用積塊
九三下之而脹消積去後以丹溪保和丸調養
一月而愈積塊九列赤水玄珠第五卷垂蠱後
五十七
族侄孫仲登因與堂兄構訟城中方歸時值二月
末旬醉後房事二起而小溲隨即臍下作痛水
瀉腸鳴一日十數度發熱頭痛里醫進理中湯
一帖反加嘔逆煩躁口渴敢予診之左脈絛大
右洪大俱七至飲食不能下咽晝夜不得睡面

赤唇燥舌上黃胎深厚。診畢。語予曰。我房失後陰症傷寒也。小腹痛且漏底。幸叔祖救之。予嘆而應曰。以子所言。決為陰症。以子指下辨之。當是春溫陽症也。且外症亦陽。烏得為有房事而遽以理中進之乎。族中相知者。交為予言。渠病的屬陰症。故嘔吐水瀉。不可因其面赤。便認為陽。顛戴陽症。與此近。但幸加察之。吾輩正擬於理中湯內。再加大附子肉桂。庶可保全。予極言不可。仲景有云。桂枝下咽。陽盛則斃。况附子理

新都三卷

三九

中者。手陰陽寒熱之間。辨之不真。生死反掌耳。茲當舍症而從脉也。以溫胆湯加姜汁炒黃連。柴胡乾葛。與二帖。囑令當夜飲盡。俾明日不它傳也。予別後。渠一服而嘔逆止。餘症悉在。詰朝予診。竟如渠曰。夜來二藥必未服完。不然。何兩手之脉。洪大搏指如是。僉曰。因有竹茹黃連。恐非房失後所宜。故僅服一。予曰。不服黃連。致熱轉劇。今日非石膏不能已。乃與白虎湯加竹茹。而劑。臨別。囑渠曰。今症非昨日可比。用石膏者。

豈得已哉。設常用不用。使經中之熱傳入於腑。非大黃不能瘳。切勿失時。誤事。詎知別後。又有惑之者。仍只服一帖。瀉即隨止。餘小腹之痛。具在。次日予診。畢。語渠曰。昨臨行時。囑之再三。何乃又不服完。今脉洪長。堅硬。邪已入腑。柰何。柰何。對曰。衆謂石膏太寒。恐小腹加痛。實只服一帖而已。予曰。懼服石膏。今且服大黃矣。皆失時。誤事之過。周金人銘云。寒又不減。炎柰何。其斯之謂歟。思非桃仁承氣湯不可。乃靚面煎服。

新都三卷

四十

連飲二劑。下極黑燥糞五六枚。痛熱俱減。再為診之。六脉皆緩弱。迨是病方盡去。改以四君子湯加白芍藥黃連香附。調養數日而愈。五十八汪希明竹山。夫長君也。年弱冠。性多躁。素有痰火。舊曾吐紅。張醫用收澁之劑太早。以致痰與瘀血。滯滯經絡。釀成癆根。恬不知覺。且為炙肺。俞音音。撼動前疾。止澁無功。滋陰作壅。咳不能睡。又誤作風邪。而投發散風劑。不思火盛得風。其勢愈熾。血從口鼻噴出。勢如泉湧。延予為治。六

即洪數自熱而煩。又時當三伏，內外之火夾攻，縱體質剛勁，寧能堪此銷鑠哉？予思非釜底抽薪之法，難奪其上湧之勢，乃以三製大黃三錢，石膏五錢，黃連苗根滑石各二錢，牡丹皮一錢，急煎飲之。大便微行二次，血來少，緩即用石膏滑石冬青子各三錢，旱蓮草苗根各二錢，黃連山梔子貝母各一錢，甘草五分，茅草根五錢煎服，血乃全止。三日後大便結燥，火又上逆，咳嗽連聲，左關脈絃勁，右關洪滑，與當歸龍會丸下之，而咳始緩。改以瓜蒌仁苗根各一錢，五分貝母旱蓮草麥門冬各一錢，白芍藥二錢，黃連黃芩各七分，青皮甘草各三分，仍加茅根。後每遇大便燥結，即進龍會丸。迹此調理，三月大定，半載全瘳。書云病有六不灸，火盛者不灸，此由誤灸，幾於不保，故特識之，以為好灸者龜鑒。

五十九

德興文學祝弘吾公，祝令君叔祖也。在休衙，偶有陰陽之患，子午潮熱，咳嗽痰多，汗流不止，胸膈

不暢，大便燥結，動作喘乏，口渴，以貝母知母瓜蒌仁桑白皮各一錢，枳殼黃連麥門冬各八分，桔梗柴胡前胡各五分，甘草三分，五味子十一粒，服下。五更微汗，熱退十之七，惟痰嗽喘之，改用瓜蒌仁二錢，餘如前，外以七製化痰丸夜服，熱盡退，渠甚喜，以為自是以往，可勿藥矣。予曰：未也。據脈絃數，不減，恐防作癰。公未為然。予適東行半月，書報癰作，咳嗽轉加，所出皆黃粘老痰。予曰：書云無痰不作癰，仍用前方，倍加柴胡。

貝母冬加烏梅一介，四劑霍然。良已，公曰：翁之視痰，應若桴鼓。古云：智者不治已病，治未病。吾於翁言微之，廼以是備言祝令公。祝令公喜曰：孫君匪獨得岐黃正脈，其雅誼足稱叔祖。尚未前聞，予當賦詩，以贈於景欣然。十書若干律，以授余。其詩附後第六卷。

素封汪宥翁，年八十有一，因勞倦感冒，胸膈大熱，而痞口渴，舌上胎白如敷粉，咳嗽夜不能寐，此必陽症也。柴胡一錢，枳殼枳殼竹茹各八

分酒連酒苓天荅粉各七分甘草四分姜三片
服下乃得睡口仍渴痰仍嗽前方加半夏麴夜
與二母丸治其熱嗽而愈六十一

汪鍊兄內人經水久不止內有紫黑血塊今則胃
脘胸腹皆痛王戶且腫手足皆冷絕不知餓臍
腹之下有一塊堅如鉄脉左數右沉澁此血癥
症也用糖棗子五錢玄胡索五靈脂香附麦芽
青皮各一錢水煎服夜即痛減其半手足漸溫
後加丹參川芎蒲黃益母草當歸四帖而痛全

新都三卷

四三

正王戶亦消再四帖而經調六十二

程相如夫令政孕四月頭疼遍身皆痛腰痛更甚
惡寒發熱咳嗽口渴六脉浮數呂小柴胡湯加
防風羌活葛根姜棗煎服夜忽大發寒戰繼而
發熱五更又發戰告急於予予曰此作汗之兆
俄而汗出口渴頭疼身熱皆減惟胸膈脹悶此
胎氣上逼而為子懸以大紫蘓飲與之紫蘓人
參白朮茯苓甘草當歸陳皮大腹皮川芎白芍
藥服後身冷而汗出不止胸腹脹痛急呂奪命

丹進服下嗒然而睡覺則痛止脹消始能進食
身溫汗止駸駸向安奪命丹用白茯苓牡丹皮
桃仁白芍藥桂枝醋水煎服止痛如神六十三

余文台壯年咳嗽吐紅腹中常痛夜多口渴夢遺
背心作脹兩手脉短弱兩關絃大左尺弱右尺
滑大心血不足中焦有痰積兩間有瘀血陰分
有淫火乃先為清肅上焦用山梔仁牡丹皮丹
參茯苓甘草貝母橘紅益元散服十帖背脹漸
消惟咳不止改用黃芩杏仁半夏麴益元散黃

新都三卷

四四

連瓜蒌仁甘草十帖而嗽止惟腹疼不除再呂
遇德丹全丹溪保和丸進之大便下稠積痰多
甚後呂人參白茯苓白芍藥紫苑知母麥門冬
甘草當歸五味子調理而愈六十四

邵伯成夫大令愛經水適行洗浴後感冒風邪誤
服人參補劑大發寒熱嘔吐煩躁隨即口噤心
煩不安循衣摸床時當仲夏之晦予謂上焦有
痰因誤補故阻滯其氣道而然與加味溫膽湯
半夏四錢橘紅二錢白茯苓枳實竹茹麥門冬

名一錢益元散三錢生薑三片水煎飲之一帖而安後稍勞復頭疼痰火上衝背脹腰痛以紫胡薄荷甘草枳殼桔梗酒芍桑皮半夏麥門冬山梔仁茯苓生薑調養全愈六十五

金氏婦蘊雙泉之親媽也舊秋患崩中愈後方百日時值上巳因洗浴受風邪外寒而束內熱前移心脹四肢腫痛面有浮氣惡寒發熱呵欠不時大小便欲行不行口內常甜六脉浮大而數以柴胡熟蘊麻黃桔梗枳殼大腹皮厚朴酒芍

新都三卷

四五

姜黃服下夜得微汗胸腹稍安四肢仍脹再加蘿蔔子進之覺煩躁且醋心改用二陳湯加香附大腹皮桑白皮姜連枳殼山梔子各八分益元散二錢意以仁三錢吳茱萸三分服下四肢消半面氣全消覺腰疼噉氣胸膈噎辣用六君子湯加薏以仁姜連厚朴知母澤瀉鬱金砂仁枳實調養半月四肢悉平嗜睡尋愈六十六
文學張雲門三令郎丁年偶發寒熱右脇有一塊降起疼痛手不可近下午至夜尤甚額顱手心

皆熱脉右關洪滑兩尺尤有力日夜不得睡迺

做推氣散例姜黃桔梗川芎各一錢伍分枳實

二錢白芍藥一錢粉草五分姜朮煎服外與當

歸龍會丸其夜大便秘行一次頗得睡三更後先

發寒戰徐熱至五鼓微汗而脇疼寒熱悉減再

診之左脉畧絃舌有黃白厚胎兩脇重按微疼

大便燥結不行以小柴胡湯減半夏倍加瓜蒌

蠶甲牡蠣脇疼全瘳畢丸畧硬痛彼自以為無

恙矣予語渠姐夫徐仲子偉曰病先起脇下顧

新都三卷

四六

脇下為肝之經後及畢丸硬疼其畢丸亦肝之地此餘熱未盡微故也而彼已厭藥以小愈為全安不出淡旬必有奇疾徐仲子曰奇者若何予曰此君性急好勝倘勉強作文過勞而發增寒壯熱非瘡即囊癰也予倘東行子宜識之別後半月果因作文夜發寒熱囊漸腫大其熱如失及子至診之六部皆數兩尺且近於洪知其膿已成必潰而後已彼心甚恐予曰無傷湯與耳意以意前這魂湯加金銀荅為君兩帖而膿

清再加人參。又兩帖而肌生。十日全愈。方用何首烏、赤芍藥、當歸、小茴香、甘草、節木、通金、銀、蒼貝母、枳殼、白芷。水與酒共煎服之。此方加獨活治流注。尤神。六十七

朱宅內眷。孕已八月。因送殯受驚。胸膈悶。嘔逆不入食。城中時師認為外感。為之發散。嘔無愈。劇舉家恐胎有動。延予診視。兩寸脈皆洪滑。兩尺弱。此亢上不下之候。胸膈脹者。蓋由子懸而然。此一劑可瘳也。夫曰胎婦難任。峻劑。觀其嘔

新都三卷

四七

惡之狀。脹悶之勢。時刻不抵。一劑曷愈。予曰。請試之。與溫胆湯加姜汁炒黃連。大腹皮。水煎成。送下姜汁益元丸。果一帖而嘔止。再寬。即能進食。午後酣寢。貼然若未始有病者。其夫訝曰。溫膽湯何神若此。幸詳其義。予曰。胎孕之症。重在足少陽。足少陽者。膽也。病起於驚。氣逆痰隨。胎氣上逼。故脈亢上不下。在難經為溢候。由木火之性。上而不下。經曰。上部有脈。下部無脈。其人當吐。不吐者死。予故云。一劑可愈也。方名溫膽

者。此溫字非溫暖之溫。延溫存之溫。黃連竹茹清其肝膽之火。全白茯苓而安心神。益元丸壓其痰火下行。火下行而胎因之亦安矣。筠臯公曰。先生認症真。故投劑確。非神乎。藥神乎。用也。六十八

胡鄰泉令愛。及笄後。患吐血。每吐碗餘。下午倦怠。夜分潮熱。嘔吐不食。大便秘結。時師視為陰虛火動。投以滋陰之劑。反加飽悶。背心脹痛。予診其脈。兩寸洪大。兩尺弱。知其有瘀血凝滯。以致

新都三卷

四八

新血不得歸經。故滿而溢也。法當消瘀為主。用白芍藥、枳殼、前胡、益元散、桃仁、紅荅、牡丹皮、山梔子、貝母。水煎。臨服入蘿蔔汁一小酒杯。服後嘔吐如舊。大便仍秘。乃以龍會丸通之。更以石膏三錢、橘紅、半夏、麩、姜、連、茜、根、竹、茹、黃、連、枳、殼。各一錢。白茯苓八分。甘草三分。服後大便行三次。吐止。食進。後用二陳湯加滑石、丹參、丹皮、茜根、白芍藥、香附。二十劑後。經行熱退。背脹悉愈。從此經調。血不上逆。六十九

汪思石令堂年可五旬大怒後小鮮。然。厥。口。禁牙關不省人事。以蘇合香丸灌之。兩匙。左手右足疼痛不能舉動。用二陳湯加酒苓五加皮秦艽石菖蒲防風蒼以仁紫荆皮四帖而愈。七十

族姪孫君實。壯年患遍身筋骨疼痛。肢節腫痛。其痛極狀如虎嘴。大小便起止非三五人不能扶。諸痛處熱如火。燉。食飲不入。呻吟床褥。已經二候。有以疎風之劑投者不應。又以乳香沒藥活

新都三卷

四九

血止痛之劑投者亦不應。延子診治。六脉浮緊而數。子曰此周痺也。勢甚惡。俗名白虎慙節。風。濕熱所致。丹溪云。腫。屬。濕。痛。屬。火。火。性。速。故。痛。暴。猛。若。此。以。生。地。黃。紅。苳。酒。苓。酒。連。酒。栝。秦。芫。防。風。羌。活。獨。活。海。桐。皮。威。靈。仙。甘。草。四。劑。而。痛。減。大。半。再。加。赤。芍。藥。當。歸。蒼。耳。子。薏。以。仁。減。去。獨。活。秦。芫。又。八。劑。全。愈。七十一

葉子黑內人。患瘰醫為其汗。為其下。整技不能起。屍寢者已浹旬。家事窶乏。亦不能復。聊醫鄰人。

觀其狀。以生死在須臾間。群然發。意。料。飲。助。其。頤。飲。之。需。予。聞。為。之。診。六。部。俱。微。弱。不。充。指。右。關。稍。滑。精。神。昏。憊。僅。一。息。奄。奄。四。肢。冷。厥。口。渴。予。診。畢。語。諸。鄰。曰。據。症。甚。危。據。脉。邪。已。盡。退。惟。虛。憊。而。神。氣。弱。非。大。補。不。能。也。諸。君。苟。能。以。眩。殯。者。助。其。市。人。參。庶。幾。可。起。死。而。還。之。生。也。

諸君既憐其死。寧不以異其生乎。予非毫有希。覬。願。渠。力。不。贖。願。與。諸。君。共。圓。滿。好。生。善。果。耳。諸。鄰。固。有。善。心。激。於。余。言。益。忻。然。相。語。曰。惟。先

新都三卷

五十

生命。即以六君子湯加歸芍補氣血而化痰滯。以。麥。門。冬。五。味。子。復。脉。通。心。而。生。津。液。以。桂。枝。溫。其。四。體。午。刻。進。藥。晡。刻。四。肢。漸。暖。精。神。渙。發。尚。無。力。開。聲。改。以。生。脉。湯。加。遠。志。歸。芍。以。仁。山。藥。調。理。而。愈。諸。鄰。人。大。快。七十二

孫如亭令政年過四十。眼偶赤腫。兩太陽疼痛。大便不行者三日。平時汛期一月僅二日。今行四日。猶且未止。里有開化余雲谷者。自謂眼科捷手。醫治踰候。腫赤不消。而右眼內眦突生一白。

泡垂與鼻齊大二寸餘。余見而駭走以為奇症。莫能措劑。又見其嘔吐眩暈伏於枕上。畧不敢動。稍動則眩愈極吐愈急。疑其變南不治。予為診之。兩寸關脈俱滑大有力。兩尺沉微。予曰。此中焦有痰。肝胆有火。必為怒氣所觸。而然內經云。諸風掉眩皆屬肝木。諸逆衝上皆屬於火。蓋無痰不作運也。眼眦白泡。迴火性急。怒氣加之。氣聚於絡。上而不下。故直脹出眼外也。古壯士一怒而目眦刺。與白泡脹出眦外理同。肝為血海。故血亦來不止。治當抑其肝木。清鎮痰火。則諸症自瘳。先用姜汁益元丸壓其痰火。以止其吐。再以二陳湯加酒連酒芩天麻滑石吳茱萸竹茹枳實煎飲一帖。吐止運定頭稍能動。改用二陳湯加芩連藪精草夏枯草香附子吳茱萸。黃蘗以仁。兩劑赤腫消。白泡斂。四劑全愈。血海亦淨。從是後不發。七十四

吳勉齋年近五十。有腹痛疾。或作或止。性極急。多躁多怒。今痛在當臍。不問晝夜。市里醫者為下

之。已五日。大便雖瀉。痛則尤甚。飲食不進。手足清冷。形神俱倦。脈僅四至。重按則伏。而有九。此由攻剋太過。寒涼傷脾。脾虛則中氣不運。積反凝滯。以故大便雖瀉。而積不行。痛終不減也。治當建立中氣為主。中氣一回。痛當立止。先與王海藏五神丸二錢。滾水送下。以止其痛。此丸補接元氣。安和五臟。升降陰陽。極有神應。故名五神丸。步出醫禮元再用小建中湯調肝養脾。蓋脾下迴肝經部位。惟此湯迴對症劑也。白芍酒炒三錢。炙甘草一錢五分。桂心一錢。加香附一錢。生姜三片。水煎服。午牌進藥。未牌已報痛止。因其夜進粥太頻。且食鴨汁。撼動餘積。腹又作痛。且加脹悶。面有浮氣。裏急後重。與四平丸而漸定。外以二陳湯加香附砂仁蒼朮厚朴山查。腹中始覺寬快。三日無恙。又縱恣口腹。大啖肥甘。糕粽肉鷄之類。不能不止。腹中大痛。時刻難存。欲吐則食已下。渴欲瀉則食尚未入腸。自喊叫云。可取木香枳即九。大承氣湯急與我下之。

雖死無憾。予諭之曰：據痛雖甚，腹則不堅，願今日適屆冬節，禮曰：先王於至日閉關，安靜以養。微陽曷敢以大寒峻劑而汨天和乎？設不得已，只須相樹東行根上白皮一錢，長流水煎飲之，一服可愈也。夜已二鼓，覓而煎服，天明瀉三五行，痛減大半，仍與小建中湯和之，痛又旋減。惟臍下尚不脫然，常又以熱手重慰之，大便欲行，及至廁則又不解，知其血少而氣不調，用熟地三錢，白芍一錢，杏仁二錢，烏藥一錢，木香五分，水煎飲既下，黑糞甚多，十年腹痛沉疴，從此再不復萌。此後勉益常語人曰：吾得孫公五神丸，相根皮，小建中湯三法，不啻脫胎換骨，數年來，豈惟飲食增加，即步履輕便，捷若少壯，皆孫君賜也。親友有求其三法者，畀而服之，捷若桴鼓。彼家謂予殆三生夙緣云。七十五

黃願全內子，產未彌月，醉犯房事，血來如崩，執不可遏，發熱頭暈，大小便俱熱，六脉洪大，以竹茹、蒲黃、白芍藥各一錢，香附、茯苓、側柏葉、青蒿各

七分，甘草炮姜艾葉各三分，血止大半，腰腹脹，下午麻黃龍閣改以川芎五分，常服後破，故紙、蒲黃、香附各八分，姜炭、甘草各一分，陳皮七分，人參一錢，服此血全止，腰痛亦愈。七十六

程心章，臍腮紅腫，嘔惡發熱，不能進食，下午煩躁，口苦，夜不能睡，六脉洪大，此俗名鬻癰，是也。迺少陽陽明二經之症，法當清解，以紫胡貫衆各二錢，乾葛、竹茹、半夏、麩各一錢，黃連、枳殼各七分，甘草四分，一帖而瘰，其半再服，腫消食進而安睡矣。七十七

程六十者，原有喘嗽，今腫發於面，四肢俱浮，大便溏，小水少，時多怔忡，此痰飲症也，以旋覆花、湯加桑白皮、薏以仁主之，旋覆花、桑白皮各一錢，半夏、人參、橘紅、茯苓各七分，厚朴五分，桂心、甘草各三分，薏以仁一錢五分，生薑三片，水煎服，一劑而怔忡除，四劑喘腫俱消。七十八

程七，護夫發熱背痛，起於傷酒，醫治三月，反加重，急後重，瀉下紅白稠粘，中脘有塊，自鳩尾骨直

硬至臍如橫梁狀小水少且澁一日僅進粥二
盞卧不能起纔立起即後重下墜腹中隱隱痛
與積塊丸消之連與二日所下血屑甚多外與
滑石三錢當歸二錢桃仁川芎白芍藥枳實山
查各一錢酒苓酒連各八分木香六分升麻五
分連進四帖塊軟腹寬再以丹溪保和丸煎服
一月而消其六飲食大加紅白俱無塊痛破勢
雖云稍可然其根尚未易刈素多縱性飲啖無
忌每每為飲食所礙病久而中氣虛弱難任峻

新都三卷

五五

劑迺與六君子湯加香附山查滑石紅麩木香
酒連調理而全迺囑之曰足下西構危疾皆縱
恣所致不佞彈力盡技為足下拯之非易易也
固三生之緣有在幸無為再悞邵子謂爽口物
作疾快心事為殃足下其鑒諸七十九
程孺人黃氏予之內親也發熱頭痛遍身如燬口
渴譁語飲食不進先已迎程文峰氏療之認為
痛風正授以蠟丸及辛溫之劑進之予適至為
之診六部絃而洪數視其舌皆沉香焦燥法刺

深厚神漸昏沉迺語之曰此春溫過時熱病也
法宜清解彼視為痛風而用辛溫是謂如火益
熱適足以戕生非衛生也方和宇氏亦以予言
為是迺用石膏五錢知母麥冬各三錢竹茹甘
草黃連各一錢生姜三片一帖而神清再帖汗
津津出始能言熱解食進又西帖一身輕快自
能坐立再用薏以仁麥門冬白扁豆甘草黃連
白芍藥香薷白茯苓調養而愈六十

新都三卷

五六

程有望孺人年踰五十月汛當止不止來且甚多
遍身皆疼手足牽扯而痛牙疼經年不愈此氣
虛血熱症也白芍藥二錢當歸八分人參七分
蒲黃五靈脂炒黑側柏葉各一錢五分甘草姜
炭各三分四帖諸症悉減惟牙痛尚存改用石
膏一錢五分人參石斛當歸各八分地黃白芍
藥各一錢黃連升麻各七分白芷甘草各三分
再四帖牙疼亦愈八十一
上合近洲予族中至厚姪孫也性拓落豪放不羈
夏仲在苕與諸友泛舟遊於碧浪之間興至即

百觥不辭亦以是終為酒困也。嘔惡體熱胸脇脹悶腹中疼痛大便秘結飲食大減茗之名醫如楊調元者橋梓悉方治之已三月或愈或否延至深秋肌瘦神瘁日進未僅二合胸脇脹腹中痛漠然畧無所減憊然而不可支兩足皆有浮氣歸謀於予左脉沉絃而數右関結實大如碧豆因詰其在若所服之劑荅曰彼謂姪孫稟薄肌脆宜當理脾向服多理脾之劑予曰否子所苦者胸脇脹悶腹中疼痛大便秘結其累大矣理脾曷可以去此哉適足以益病耳經曰塞者通之又曰通則不痛其治此病之謂歟迺取當歸龍會丸三下之大便行五六度又與酒連酒苓青蒿姜黃枳即青皮半夏葛根飲之豁然焦鬲通達呼吸開利惟頭畧運足上浮未去前方再加滑石茯苓意以仁山查與調中丸兼服半月全愈近洲喜曰人皆謂我症係中滿今不滿者叔公力也敢不德欵予警之曰吾聞君子之於身也兢兢焉不敢輕父母之遺體無伐天

和則疾疾不作無反天常則哉害不逢遊伯玉嘗言行年五十而知四十九年之非况新愈後尤當痛懲庶保遐齡區區毋足恃也別未五年予在宜興聞訃果以傷酒而卒噫惜哉八十二甲午秋仲下旬黃源金先生以中饋病急謁予於市貌甚慘步立慄然語其症怔怔言溢於吻不勝其憂執族醫尺一白予云病自仲夏吐血二椀餘初以苓連枝葉生地芍藥大寒之劑投之一帖而止未幾則咳嗽徹晝夜後師謂咳自吐血後當從滋陰降火之治逾兩月盡其法而罔效反加喘促洩瀉辰巳二時發熱煩躁師告技窮謂喘咳迺火刑肺金洩瀉迺脾胃已憊保脾則火愈熾而喘咳增加滋陰則洩瀉綿綿而元氣下脫經書所記嗽而下洩上喘者死此症之謂也係無可柰何矣語竟泪潛潛下予觀其忡忡之狀心不覺惕然動也市去渠宅五里許即步去一視觀其面青喘促擗肩顛項息息連身而倒脇背俱疼日夜不得伏枕脉之左澁右寸

閱清火。膠畢。顧金兄猶泪盈背。予撫其背曰。毋
 泪尚可生也。適徐仲子同視。詰予曰。症若此。夫
 子曰可生。何也。予曰。是非汝所知也。第觀予治。
 俟奏功。當語汝。遂以紫苑。茜根。牡丹皮。桃仁。益
 元散。桑白皮。茯苓。桔梗。瓜蒌。仁桂枝。白朮。水煎。
 臨服加薑菜汁。半酒杯。服後背脇痛止。瀉減半。
 迺得睡。但咳而聲啞不除。次以杏仁。桔梗。紫苑。
 甘草。白朮。五味子。瓜蒌。乾姜。款冬。苓。半夏。麴。通
 草。水煎。前服後聲漸開。瀉全止。惟嗽尚多。再
 以仁白芍。牡丹皮。水煎。後以丹溪治嗽吐方。用
 瀉白散。加青皮。人參。白茯苓。五味子。調理全愈。
 次年誕一子。是役也。徐仲子之功居多。蓋金為
 徐仲子友也。徐仲子治疾多奇中。迺篤信予而
 推轂之。初投劑。人多置議。仲子獨贊之曰。其必
 有見也。人人辟易。彼許可生。安得不望生哉。故
 金任之不貳。功成。余明甫查仲修問予曰。病起
 於吐紅。發熱煩躁。喘咳。皆是火邪。前後之師。滿

陰降火藥。法亦未爽。然而病轉增劇。其故何也。
 予荅曰。醫不難於用藥。而難於認病。余明甫查
 仲修曰。市人議先生治疾多不循方。每每師心。
 金之役人。皆市為火症。而用寒涼。先生獨用溫。
 熱。雖成功。小子竊為先生恐。予曰。病原於火。其
 勢之劇。以治之太峻。致然。夫血之初來。勢如湧
 泉。安能一吐遂盡。必有餘血。伏於經絡。思不及
 此。而以大寒之劑一帖而止。夫大寒之劑。豈能
 止血。適以凝其血耳。血凝經絡。滯於氣道。氣滯
 血凝。日甚一日。氣滯又復生痰。痰與瘀血兩滯。
 經絡則肺氣不利。故咳嗽聲啞。不加察而為消
 痰。化痰導血歸經。又以滋陰苦寒之劑施之。則
 痰瘀愈凝。而氣道愈不利也。久則胃寒脾弱。反
 增洩瀉。晝夜喘促不能卧矣。書云。上熱未除。中
 寒復生。而為陰盛格陽之症。故咳而嘔吐。予故
 始以桂枝乾姜之類。溫其胃。以桃仁。薑汁。丹皮。
 茜根之類。活其血。而消其瘀。故喘止而瀉除。東
 垣曰。脾胃喜溫而惡寒。信不欺也。古謂藥不貴

新都三卷

執方而貴合宜方即兵家之陣圖匠氏之規矩也。圖可授人而不能授人。匠可授人規矩而不能授人巧。此岳武穆對宗晉守云運用之妙存乎一心也。予遊方之外亦不失方之內。惟不失方竊謂知方知方合法豈區區能哉。觀古人治虛怯之疾即不治之症亦能延之三五載。迺今治虛怯者不半載而竟殞逝。猶駕言曰。殆今之天元運氣使然。故人多不壽。愚謂天元運氣則人人皆如是。夫何予母八十有六。予父踰八

六一

寒而非陰虛之火而又認其喘為瘀血也。予曰。脈與症皆可考。脈經云。溢為氣滯。氣滯則血凝。盛吐之後大寒之藥一帖而止。其未盡之餘血為寒涼所凝滯于氣道為喘。書云。從前者為本。從後來者為標。茲用活血消瘀之劑治其本。以溫熱暖胃之劑治其標。故瀉止而喘定也。若夫陰虛火動之脈。迺細數之候。今脈滑大非陰虛之脈。陰虛喘嗽之症。潮熱於夜。兩頰皆紅。今熱在辰巳陽分。而面色帶青。由是知其非陰虛之火。迺誤用寒涼激其火而上行也。經曰。水流濕火就燥。中氣既寒火愈不能下矣。正如雨驟雷烈則電光之火愈熾。日出而電光自息也。且陰虛火動火起九泉。皆自足下湧泉穴起。以漸上升。今膝下冷而上身熱。兩尺脈又弱。蓋由咳而氣升。經曰。形寒飲冷則傷肺。肺氣為寒藥壅遏不得下降。故咳而吐酸。丹溪纂要云。陰氣在下。陽氣在上。喘咳嘔吐。瀉白散加人參。後苓五味子青皮。故不從河間而用諸嘔吐。屬

新都三卷

六一

於火之治。况今歲次甲午為濕土司運。八月建酉。水土衰敗之時。內經曰。母遠時。母代化。且脾惡濕。濕多則瀉。濕則生痰。前後之師。不考運氣。月令一槩。而用滋陰降火之劑。助濕生痰。安望其疾之愈也。丹溪纂要云。實脾土。燥脾濕。是治痰之本也。遵而用之。如鼓應桴。予故曰。醫不難於用藥。而難於認病。存以也。八十三

痰。姪合溪年當八旬。春初偶為寒襲。發熱咳嗽。醫與芳散。即汗出不止。既既連聲。勺粒不入。醫

新都三卷

六十五

憤絃旬。汗日加。既日甚。延予診之。六部浮大無力。重按三五不調。六七至一止。右關近滑。胗畢。語嗣君敬所曰。尊翁由勞倦。表虛感邪。脉故浮大。無力。法當從東垣補中益氣湯。一二劑可瘳也。醫迺妄為表散。致汗漏神疲。昏憤發既。高年值此。寧不殆乎。即可微倖圖安。亦不過千日養耳。敬所勃然俛而對曰。上已後為家君壽期。不虞搆疾。羸憊若此。苟保百日。俾救水之心。庶幾少盡。叔祖之賜多矣。若千日又出於望外也。予

即以六君子湯加竹茹柿蒂以止既。再加酸棗仁石斛以斂汗。一進熱退既定。再進汗止食入。三進需需然精神長矣。迺減去竹茹柿蒂。加當歸。半月全安。先是祝令君謂渠有耆德。請為介賓。以疾辭不及赴。迨季春令君聞渠壽。即援例賜一級寵。以冠帶扁額。用彰 恩典。光於鄉閭。後果三年而卒。八十四

孝廉方叔度令嫂汪氏。年甫三旬。患脹滿。諸名家或補或消。或分利。或溫或寒。悉為整理一番。束

新都三卷

六十四

手而去。舉家惶惶。無所適從。叔度曰。聞孫仲閣昔患此。衆亦束手。比得孫生生者。治而起之。衆皆歛衽。欽服。仲閣伯仲適在館中。聞諮訪之。即發書介予。隨紹嚮往。診得左脉絃大。右滑大。予曰。此李東垣木香化滯湯症也。病從憂思而起。合如法按治。可保終吉。叔度喜曰。曩從事諸公。悉云不治。先生謂可保終吉。此故倉公有言。拙者疑殆。良工取焉。是也。幸先生早為措劑。予即照本方發四帖。服訖。腹果寬。其丰。繼以人參消

痞湯。琥珀調中丸。調理二月全瘳。叔度信子從
此始。每按予於諸相知。多有奇中。卒為通家
之好。八十五

臨溪吳天威。夫年七十有三。容即遠歸。偶墜馬。跌
傷左脇。作痛。隨治而愈。後半年。忽左脇腫痛。增
寒作。勢止極。銀里中諸公有認濕痰者。有認
風氣者。有認濕熱者。總罔效。聞歛外科洪氏能
且識雜病。遂以為治。居數日。視為疝氣。率杖蕩
枝核。大小茴香。川練子橘核之類。痛不可當。
新都三卷 六五

迺欲引繩自絕。諸子百般慰解。洪迺辭去。竟不
知為何疾也。其婿汪開之。予之表弟也。邀予診
之。六脉浮而洪數。左尺尤甚。驗其痛處。紅腫光
浮如範。撫之烙手。予曰。此便瘻也。洪係外科專
門。胡獨忽此。蓋渠素慎重。見患者年高。烏敢認
為便瘻。治哉。此殆千慮一失。毋足恠。諸君聞
予言。皆駭然。詰予曰。家嚴不御色者十載。顧安
得此。願先生再思。予曰。此非近色而得。審屬
足厥陰肝經。肝為血海。迺昔時墜馬。惡血滯之

未盡。瘀蓄經絡。無門可出。化而為膿。由年高氣
虛。又被香燥尅伐太過。不能潰而即出。故散漫
浮腫。觀其色。青中隱黑。膿已成腐。必須外用鏡
針。引而出之。內用千金託裏。庶可排膿生肉。但
予生平心慈。不能用針。子弟警吾。外科良手。可
延而決之。至即以鏡針深入寸餘。出青黑膿五
六椀許。臭穢難近。即語諸君曰。使早決三日
可免一月之苦。今即日大補之。非百日不能痊。
此俗名石米瘡也。諸君及患者見膿色如是。
新都三卷 六

始信予言不爽。急以請劑。予迺用內託十宣散。
參芪每帖三錢。後加至五錢。一日兩進。兩越月。
膿盡肉滿而愈。一市稱奇。八十六
文貴者。善為族文學。岐原出入子母者也。寓長興
邸中。病發熱。晝夜不止。口渴。齒燥。鼻乾。舌胎黃
厚。不得眠。服藥不効。予適至雒城。岐原邀診之。
脉俱洪數。嘔惡。胸膈痞澁。小水短而赤。大便下
皆清水。予以石膏七錢。知母五錢。甘草一錢。
柴胡五錢。葛根三錢。黃芩二錢。枳殼。桔梗。竹茹

各一錢連進三帖。嘔惡止。胸膈寬熱仍未退。無汗。瀉未止也。時有問予者。謂胡不用柴苓湯而退熱止瀉也。服石膏故益瀉耳。予戲之曰。子廼三脚貓耶。能認此為何症。而用柴苓湯也。仍以柴胡石膏各七錢為君。葛根知母各五錢為臣。黃芩甘草各一錢為佐。生姜五片。速進二帖。汗則津津然。出熱退瀉止。口不渴而眠矣。予因它往。雷藥三劑而囑之曰。胃氣初回。勢必思食。宜謹慎不可多進。若多則餘熱復作。必成食復治。

新都三卷

六七

將費手也。慎之慎之。後五日。果以食不慎而復病。予又至。熱較前為重。且加懊懣。夜譫語。如見鬼狀。口大渴。齒燥。舌焦黑。有芒刺。執危甚急。以前方加枳實梔子各三錢。淡豆豉二錢煎飲之。二帖。懊懣止。餘症猶然。夜更甚。前方減去豆豉。加黃連麥冬生地白芍。一日二帖。舌以井水生姜擦去黑胎。用蜜調玄明粉塗之。而胎去矣。服三日。始得微汗。諸症盡減。再四叮嚀。慎飲食。調理半月而全。岐原問曰。人始皆認此症為瀉底。

新都三卷

六八

傷寒謂叔。不用柴苓湯。退熱止瀉。而用石膏為非。廼竟以石膏收功。何也。予曰。此問甚善。蓋醫者認症。此症廼少陽陽明合病也。柴胡白虎湯。葛根為二經對症之藥。服之可解肌熱。止口渴。若柴苓湯為太陽少陽合病之劑。內有五苓散。廼太陽經之裏藥。症非太陽。曷敢用之。且其內有人參白朮肉桂。皆助熱發燥之味。誤投則必發斑。其齒燥。舌乾而焦黑。又何敢用茯苓澤瀉。猪苓利之。仗益下其津液耶。古人謂以傷寒為大病。不察症而誤投。則生死立見。傷寒論有言。不得汗不得下。不得利。小便。是謂三禁。故曰少陽陽明不從標本。從手中治。小柴胡白虎湯中。治劑也。人徒見其大便作瀉。為瀉底。不察瀉皆清水。無糟粕者。為熱極所致。症廼春溫時疫也。但為發散。使清氣上升。而微存汗瀉。當自止。此瀉豈五苓散所能止哉。止則悞事。岐原曰。夜重如見鬼者。何以故。予曰。熱入血室故也。岐原曰。男子亦有血室乎。予曰。血室男婦同之。衝任一

脉為血之海。二脉附於陽明。今病廼陽明之熱。遺入血海也。故加生地白芍而効。余治傷寒。用柴葛解肌湯及柴胡白虎湯。而熱不解者。加此二味。則熱無不退。汗無不出矣。且下午與夜。又陰分主事。欲解血海之熱。必投此二味。以收其功。此亦予一得之愚也。岐原曰。善。願記之以詔後來。八十七

鍾澤有程慶奎孺人者。年將五十。僅一子。念一歲而歿於痘。旦夕哭之。哀且彌月。攬鏡自鑑曰。何

新都三卷

六九

子死而形色不瘁如此。因持鉄如意鏗其胸。絕粒斷漿。肌容日瘁。時為初秋。寒熱交作。嘔噦悞懷。遍身疼。夫為過延。診視却藥不飲。諸醫百策。聞警拒而不聽。媳與孫跪而懇。姻族就而諭。其不納者。若罔聞也。惟合睫以待死。已而作色語。其夫曰。病若此。汝曷不延名醫一決生死乎。夫曰。所延皆名士。病者曰。昔常聞程方塘叅軍患瘋三年而起者誰。曰。孫君。又問吳西源孺人病燥揭痰喘三年。與程道吾內眷勞瘁疊感。誰為

起之。夫荅如前。病者曰。何不請孫君決我生死。夫聞言。物色徵予。五日而後至。則薄暮矣。病者猶疑為誕也。私至三家訪予狀。皆曰。魁然長髯者也。詰朝覲面。診之。畢則問曰。何日死。予應曰。病勢危。去死不遠。病者喟然嘆曰。死不足惜。第九華山香愿未了為恨耳。予曰。孺人大愿不思。何須以此小愿為孜孜也。孺人曰。無大愿。予曰。人之脩短有數。今年之痘死者不可勝計。令嗣之死亦數也。然有二孫可承宗祧。孺人能忍哀

新都三卷

七十

撫孫使其成立。娶婦以蕃後胤。令嗣雖死。猶不死也。而孺人亦有令名。若不此之思。憂傷以殞。夫君必娶。娶必少。年。繼室生子。則必厚其子。而薄孺人之孫。晚娘晚爺之誑。獨不聞之耶。孺人萬金之家。使令孫不得其所。令嗣九泉之下。恐不能無憾。孺人憂死何益也。愿孰大於此者。予故謂未之思耳。孺人試思之。誰輕誰重。當自辨也。語畢。憮然曰。先生言至此。吾如寐者得醒矣。願病勢去死不遠。何能得如吾愿。予曰。所謂近

者病也。非脉也。脉左絃細。右關滑。故發熱。嘔嘔。延秋來瘧。症非死脉也。若如前執拗不服藥。不進飲食。書謂絕穀者亡。殆非虛語。孺人誠聽予言。以二孫為念。以大體為重。予以活血養血之劑。而治其傷損。以小柴胡加竹茹滑石。以和陰陽。而止其嘔噦。不一月而可無恙矣。奚憂哉。果從予言。而進食服藥。調理五日。寒熱嘔噦皆止。後以丹參劉寄奴各三錢為臣。五加皮五錢為君。香附一錢為佐。入四物煎服。果一月而

新部三卷

七二

全可矣。程孺人病起而聞者皆曰。七發起太子之病。觀於孫君益信。八十八

歎。潛口汪召南令郎。年十四。患蠱脹。大如覆箕。經醫三十餘人。見症皆駭而走。獨市之幼科汪養直者。調理數數見效。第此子溺於養。縱口腹不守戒忌。病多反復。一日語召南曰。即君之症。非休之孫生生者不能成功。召南曰。聞此公多游吳浙縉紳間。何可以月日致也。養直曰。歸矣。吾有妹適羅田為方與石丘嫂也。舊歲患症如

蠱。治經彌歲無功。生子立全之。吾推穀孫君者。豈有他腸。為即君也。召南即宛羅田。延予。予至。日已晡矣。觀病者腹脹大極。青筋縷縷如蚯蚓。大上自胸膈至上腕而止。惟喜其不下現也。臍平。四肢面目皆浮大。兩足胫骨上各裂開。大出清水。一日間數為更衣。被陰囊光腫如泡。淫淫滲濕。發寒熱。脉以手腫不能取。必推開其腫下。指重按浮而六至。予曰。症可謂重之極矣。僅可恃者目瞳子有神。餘皆險惡。將何以治。

新部三卷

七二

養直知予至。亟過相陪。宣言曰。病重不必言。引領先生久矣。幸為投劑。生死無憾。予曰。且先為理表。若表徹。稍得微汗。使肺氣少利。則小水可通。召南喜而亟請藥。廼用紫蘊葉蘊子陳皮麻黃各一錢。桑白皮八分。防風杏仁各七分。炙甘草桂枝各三分。生姜三片。水煎服之。五更廼有微汗。次早面上氣稍消。胸膈青筋皆退。餘症雖仍舊。枳桔則可生矣。仍投前藥。次日腹與四肢皆有縐紋。惟小水未利。廼改用破故紙蒼朮赤

茯苓澤瀉桑白皮赤小豆桂心木香二帖而小水利驟駁已有生意。延以飲食過度大傾作瀉。又以四君子湯加以仁破故紙澤瀉山查砂仁調理而全安。此症予閱歷者不下數十。然青筋未有如此之粗。足脰出水有之。未有出水腹如鮎魚口之大。而取効亦未有如此之速。蓋此子體未破而真全。故症雖重而收功速也。數十人間有五六不能成功者。由其縱恣恣情。不守禁忌。非藥之罪也。召南昆仲見人談醫。錄以不佞

為稱首。予咲曰。君得無到處逢人說項斯有耶。迺汪養直亦醫道中白眉。迺不收功於後。病者不忌口過耳於養直何尤。養直不矜已之功。亦不佞人之功。所謂忠厚長者非耶。

岩鎮鄭景南。大病卅年餘。百治不効。昔體豐腴。今瘦骨立。飲食少進。新都名士皆辭不治。其家聞昔年方士榮孺人。盡症時師亦皆辭去。予為起之。因徵予治。時則六月望也。診其脉。左絃大。右關滑大。兩尺俱無。惡心。腹瘦削。狀如仰瓦。腸鳴

如雷。晝夜不住。小水不利。肌膚及眼珠色若黃金。腹中有塊如櫟。動跳不止。足膝以下皆冷。飲食不入。予詳思其病機。昔肥而今瘦者。痰也。形雖瘦而目炯炯有神。先以五飲湯姑試之。以觀其勢。再為加減。因用旋覆苓八分。破故紙一錢。肉桂三分。白朮茯苓澤瀉陳皮半夏各八分。生姜三片。水煎服之。二帖。惡心腸鳴皆止。次早飲食稍進。舉家欣喜。色喜。令岳程鍾山公於子為石交。聞病有却意。心殊異之。不知為予。因而過訪。見予。拊掌大叫。稱快曰。吾固知是公也。指其甥而語之。此即所嘗與尔曹言者。聞久為西吳縉紳。返晉。不意今歸。誠吾婿之幸也。相與談對。兩日而別。別之時。景南飲食稍加。小水利。肌膚面目黃氣退。漸日生機。不虞逾半月。為拂意事。所激而怒。復以痰。不思飲食。家人驚惶無措。亟請予診。兩寸滑。左關絃勁。搏指。右關亦滑大。有力。兩尺沉微。予語之曰。病甚重。脉非前比。且不敢以萬全許。第盡吾心爾。病以藥力而回。君

之福也。時為七月之朔。予因雷視七日。日進一劑。劑以人參陳皮半夏茯苓赤附白荳仁黃連旋覆苓麥芽甘草與服。服三日惡心止。大便秘稠痰下。其中間有瘀血。此皆大怒所致。故經云怒則傷肝。甚則嘔血。并下洩。上吐亦或有紅點。子在痰中吐出。是其徵也。後改用六君子湯加麥芽黃連枇杷葉白扁豆調理。病勢駁駁向安。腹中如櫟之塊亦漸消去。大僅如指耳。肌肉亦生。能下榻舉足以步。市上之人稱奇。九後聞

又於此類發癩癰外科以藥點漬服與公敗毒藥辛莫能收口而終傷哉

七五

後聞

醫案新都治驗四卷目錄

- 孫子元瘡後沐浴鼻出紅涕面足浮腫 一
- 一婦食積痰飲瘀血流於下部左跨臍腹脹痛 二
- 恒宇令堂右肩筋搐腫痛 三
- 孫君錫頭痛胸背脹飲食作吐咳嗽 四
- 孫尔嘉內人三姓而三小產 五
- 孫徽垣內人咳唾紅痰 六
- 戴萬奇丈中痰後兩手足不能動 七
- 族學人內眷頭痛玉戶撮急肛門逼迫遍身皆疼 一
- 梓林兄內眷右手痛風小水頻迫 九
- 一婦經閉三月洩瀉嘈雜吐酸 十
- 程氏婦下午喉痛痰多暈厥 十一
- 汪錕兄時疫熱病汗出不止 十二
- 何明吾時疫食復不省人事循衣摸床 十三
- 孫元素春溫食復發斑 十四
- 孫安飢勞感疫食復發斑 十五
- 一人喉痛夜卧氣壅面足浮腫 十六
- 何洗心虛寒腎洩 十七

程相孺人鼻衄後眩暈嘈雜嘔吐清水十八
 孫君孝春溫誤作陰虛治十九
 一僕婦頭疼喉痛咳嗽嘔惡胸膈作脹二十
 族侄婦范氏乳癰二十一
 表侄女黃氏姪七月患血痢二十二
 程氏婦小產後患赤痢二十三
 孫竹楚受暑作吐又傷酒麵身黃成疸二十四
 程菊泉暑月喘嗽二十五
 程應禎兄咳吐紅痰胸背脹痛眩暈二十六
 新都日錄四卷
 虛山內人胸脇脹痛五更嘈雜二十七
 一婦暑月小便不利玉戶腫大便血二十八
 弟婦戴氏臍腹痛白帶如注裏急後重下痢赤白二十九
 族弟應童胃腕當心而痛三十
 弟淑南三陽合病暑症三十一
 一富婦轉脬三十二
 文約孺人八十三胃腕疼痛三十三
 應童弟三陽瘡三十四
 程好吾春溫三十五

程氏婦屍從子戶出三十六
 蔡子應童之弟十月發三陽瘡三十七
 吳中岳孺人疫後壞症三十八
 鮑子五保時疫耳聾洩瀉三十九
 僕子孫守中麻後咳嗽無痰唇厚聲啞四十
 僕子得貴春溫頭痛四十一
 元素侄令政春溫後經水適止四十二
 朱氏子天送時疾頭疼身若燔炭四十三
 朱桃源內人胃腕痛常苦夢遺經水一月兩至四十四
 新都日錄四卷
 桂亭大兄痰積瘀血作痛四十五
 熊二官疫後食復四十六
 堂弟東里內子咳嗽吐紅四十七
 程竹坡內人年六十瘧疫昏憤四十八
 程內眷新寡七日染疫適值夢洩神昏譫語四十九
 太學從明滯下純血五十
 查少川喘後腫脹五十一
 夏益吾肢節腫痛手足灣痛腫尤甚五十二
 初陽侄內人肺癰五十二

仲木內人氣喘作脹五十四

侄孫女十歲大便脫肛鼻中出血五十五

唐岩祈患痢赤白腹脹氣喘四肢冷陰囊腫五十六

侄婿程東山患休息痢下皆紫血五十七

陳氏婦腸鳴腹痛合目汗出下午潮熱五十八

九德侄耳鳴五十九

陳覺宇上盛下虛合目亂語痰火吼喘六十

程紹溪中年患鶴膝風六十一

堂嫂程氏喉間有物如嚮吟之不出嚥之不下六十二

一婦產後咳嗽發熱咳出之痰色黑而臭六十三

表嫂孀居二十年右癱不能舉動神情恍惚亂言六十四

多悲泣六十四

桂亭大兄墜轎後腰脇脹痛六十五

堂嫂王氏吐紫黑血塊足跟痲腫痒痛六十六

堂婦程氏妊五月痢下膿血六十七

嫂汪氏頭痛遍身痛痢下赤白六十八

仲闇氣虛中滿六十九

朱懷竹楊梅毒氣內攻上迫於肺將成肺癰下流

陰囊囊潰見子七十

查良本令春每飲食悉從背後而下七十一

後溪大兄孺人戴氏患血痢七十二

邵敬圃迺春胃脘痛七十三

蘓望臺患瘡七十四

汪氏姬寒痰壅滯七十五

徐容兄子筋痿七十六

邵老封君手足麻而無力七十七

程某父迺即痢後風七十八

葉潤心心鬲嘈雜好啖肉尤好雞腹太痛虫症也七十九

程相如令政孕七月患痢八十

程曉山中風先兆迺即麻後痺症八十一

一婦疫後虛寒八十二

從獻長郎七歲患痢後成痺八十三

侄孫子忠痢下紅膿如爛魚腸腹大痛日夜百次八十四

元素內人雙胎難產八十五

仰馬兄患嘔吐所出皆如爛猪肺八十六

許卓峰上吐血下瀉血咳嗽聲啞八十七

族嫂汪氏患痢赤白嘔吐痰涎粒米不入口者兩

月八十八

邵來儀夫令眷咳吐紅痰如桃杏膿色八十九

程玄祖兄春温食復僵寢如屍九十

汪即兄虫痛九十一

查景川氣虛瘡疥九十二

程玉吾內人孕七月內吹九十三

一黃氏婦受身是月發癩九十四

吳見南令即心脾痛九又令即八歲疳積虫痛九

新都目錄

卷四

六

侄女八歲腹高於胸咳嗽嘔吐甚則噴血九十七

從兄錮年五旬左脇痛手足抽搐不能步履九十八

小童上達脾虛發腫九十九

族侄良詮血痢腹痛百有發明

一婦胸膈有痰大便洩瀉大發寒熱百一

從弟婦程氏右脇痛不能睡背心疼胸膈作梗痰

中有血百二

黃懷虛原患吐血又咳嗽嘔吐左脇不能着席百三

一族姊年六十咳嗽口渴常吐涎虫百四

侄婦戴氏心痛徹背背痛徹心一發必七日百五

老僕來興痰火上壅胸脇背心脹痛百六

一婦生女不生子多思多鬱小便秘而不通轉脘

症也百七治奇

崑池太學內人牙痛一晚暈厥三次百八

一僕婦產難子宮墜出戶外半月不救百九治奇

侄孫媳程氏體肥經閉者八年百十

黃成八官早起行路眼見邪火二團滾滾夫被驚

新都目錄

卷四

七

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人 余煌

徐景奇

子 泰來

朋來

全閱梓

新印治驗

孫文舉子元素多瘡疥。近因沐浴。鼻涕出紅。面足浮腫。汗多。左脉大而有力。右寸亦大。據脉多思。

新都四卷

而氣不暢。以葛根大腹皮厚朴赤茯苓香蒿澤瀉白木等。全斗麻木通滑石黃芩水煎飲之。

瀉瀉。惟宜紅酒。在口。且渴。以白芍藥。

研。全斗。五。二。山。桂。子。參。白。

酒。全斗。五。二。山。桂。子。參。白。

酒。全斗。五。二。山。桂。子。參。白。

酒。全斗。五。二。山。桂。子。參。白。

酒。全斗。五。二。山。桂。子。參。白。

酒。全斗。五。二。山。桂。子。參。白。

酒。全斗。五。二。山。桂。子。參。白。

陰之經。挾鬱火而痛。恐成腸瘕。與神効。小婁散。

一帖。半夜後痛即減半。汗亦尋止。次日診之。數

脉稍退。小腹堅如石。按之且痛。再與前藥。其痛

環跳穴亦作痛。直至於膝。小腹稍軟。小便仍痛。

大便亦未通利。仍與前藥。每帖用大瓜。婁二。終

加牡丹皮。莪朮。五靈脂。金銀朮。服下大便利。而

熱退痛止。小水亦長。諸症悉平。

不學恒宇姪令堂。仲春右肩筋搐腫痛。夜尤甚。次

日痛連胛下出膈。入曲池。且洒淅寒熱。以二陳

湯加南星酒芩白姜蚕羌活秦艽靈靈。服後

至于丑時痛乃減半。而筋不搐矣。紅腫畧消。次

日減去南星加當歸川芎。其夜肩痛又遞減。但

一夜不睡。口乾舌硬。用川芎當歸防風秦艽甘

草葳靈仙白姜蚕酒芩白芍藥。服此熱全退。痛

全減。飲食始進。以人參川芎白芍當歸甘草秦

艽姜蚕防風陳皮調理良安。

族姪孫君錫頭痛。胸背脹。飲食下。大便吐。咳嗽不

住口。痰濁如膿。大便結燥。脉之獨右寸洪大。以

新都四卷

二

二陳湯加竹茹滑石石膏酒連麥冬連進四劑
夜與益元丸兼服而嗽吐俱止惟痰濁如膿色
且腥氣觸人此將欲作肺癰改用牡丹皮麥門
冬山梔子甘草貝母枳殼桑白皮紫苑知母當
歸生地黃桔梗四帖全安四

姪孫爾嘉內人三孕而三小產六脉滑數迺氣虛
血熱也由其熱故多滑下因其血頻下心甚恐
怖終日偃卧畧不敢起身稍起血即大下與生
地黃白芍藥白朮地榆桑寄生續斷甘草升麻
新都四卷

椿根白皮黃栢條芩服之而血三日不來惟白
帶綿又下過五日後因有不得已事起身稍勞
血又大下予謂血滑已久如水行舊路若不溢
之必不能止又思血海甚熱亦肝風所致防風
子芩丸正與病對宜製與之又製白芍藥六兩
側栢葉條芩各三兩防風椿根白皮各二兩蜜
丸服之從此血止胎安足月而產一子此後連
產三子並無胎漏之患後遇胎漏通用此法莫
不良已附告同志以便取用五

鴻臚薇垣姪內人喉中揪痒咳唾紅痰兩寸關洪
大內熱生瘡山梔子小蘗生地牡丹皮滑石青
皮麥門冬甘草黃連瓜蒌水煎飲之而血止嗽
除後遇勞心即咳嗽喉中血腥總由上焦熱盛
而然以枇杷葉山梔子生地白芍藥甘草牡丹
皮地動蜂天荅粉滑石紫苑常服三五劑兩月
而安六

戴萬奇夫中痰後而右手不能伸動與之牛胆南
星陳皮茯苓甘草天麻姜蚕黃連木通石菖蒲
新都四卷

防已服後手稍能動惟左邊頭痛喉舌俱痛大
便秘結三日一行又與川芎荊芥玄參桔梗柴
胡酒芩蔓荊子甘草杏仁枳殼水煎飲之諸症
悉減但下午體倦右邊頭微痛後又為怒氣所
觸舌掉不言頭復大痛與連翹甘草山梔子薄
荷石菖蒲遠志木通麥門冬五味子白芍藥黃
栢調理而愈七

沈卿文學內人頭痛遍身痛前後心兩乳皆脹玉
戶撮急肛門逼迫大便三日未行口乾因大拂

意事而起。下午發熱，伴瘡，惡心煩躁不寧。而時當盛暑，迺怒氣傷肝，挾暑熱而然。以石膏三錢，青皮柴胡枳殼各一錢，半夏麩黃芩各八分，甘草桔梗各五分。夜與當歸龍會丸下之。大小便皆利，熱退而諸症悉減。惟畧惡心，與青脾飲兩帖全安。

梓林兄令眷右手痛風，小水頻迫，起身稍遲，即出不禁，是有浮氣。年過六十，右寸關脈濡弱，左手和，此脾虛停濕之症。近且咳嗽，用六君子湯加

新都四卷

五

蒼朮石菖蒲遠志大附子晚蚕沙倍加，薏仁緩治而平。

九

一婦經不行者三月，大便瀉，腹脹嘈雜，吐酸水，時下白帶，常惡心，自以為有孕，予脈之候，非有孕，迺脾經有濕熱，心經有瘀血症也。與二陳湯加白木澤瀉猪苓酒連木通吳茱萸滑石麦芽山查，瀉止腹寬，經行，腰腹作痛，以川芎三錢當歸五錢，香附丹參菝仁各一錢，水煎服之。經雖行，口中吐出黑血水甚多，且亦有如膿者，改用四

物湯加牡丹皮丹參桃仁紅苓山梔滑石調理西月而痊。

十

姪婦程氏，下午喉痛，近來痰多，暈厥一日二三發，頭痛面赤，素未生育。左脈絃大，右寸關滑大有，以荆芥薄荷甘草桔梗玄參姜蚕柴胡枳殼竹茹貝母水煎飲之。連進二帖，其夜得睡，惟背脹怔忡，痰猶不清，面多熱，用黃芩枳殼甘草桑白皮地骨皮天花粉玄參前胡半夏麩橘紅山梔仁調養而平。

新都四卷

六

汪銀兄時疫熱病，被發汗過度，熱留胸中，煩燥不止，嘔惡不安，汗竟不斂，口且渴，脈之獨西關洪大，此陽明之熱尚在。當以白虎生脈湯為主。石膏五錢，知母三錢，人參白芍藥甘草石斛各一錢，麥門冬二錢，五味子十五粒，急煎飲之而熱退。繼以益元丸服之而吐亦安。

十二

何明吾時疫食復，大便不通，嘔惡內熱，昏憤不省人事，或作夢語，循衣摸床，此熱在心，色絡經，以竹茹麥冬知母山梔各一錢，陳皮半夏麩酸棗

仁枳實各八分。甘草三分。服之。至夜半。人事稍清。餘熱未散。用石膏三錢。知母二錢。竹茹。麥門冬。生酸棗仁。各一錢。天荅粉。陳皮。各七分。枳實。麥芽。半夏。麩。各六分。水煎。飲之。下午大便行而熱退。諸症悉愈。十三

疾。疑元素春溫。頭痛發熱。左脉絃大。右洪大。以小柴胡合白虎湯二帖而愈。迺為食復發。斑色紫。神昏。人事不省。身重不能轉動。即水火皆不自知。合目。鼾睡。形如醉人。面赤發熱。舌胎外黃。內

黑。皆有芒刺。三日後。予至。脉之六部俱浮洪。以二黃石膏湯加枳實。鱉甲。進之。稍得微汗。大便如有真糞。次日。總開目。言語乃進。粥一盞。改以小柴胡湯加山梔。枳實。鱉甲。白芍。藥調理而愈。十四

僕子孫安。空晨出門。途次食麵三椀。飢勞感疫。因麵內傷。表裏皆熱。及至績溪街中。昏悶。譫語。頭痛。身疼。腹痛。醫不察。為勞倦感疫。遽以遇仙丹下之。大便瀉三四十行。邪因陷下。而為挾熱下

利之候。急歸視之。舌沉香色。額疼。口乾。燥渴。煩悶。昏又憤。又脉左絃數。右洪數。但不克指。知為誤下壞症。以柴胡石膏各三錢。白芍藥。黃芩。竹葉。葛根。各一錢。天荅粉。甘草。各五分。山梔子。枳實。各七分。葱白。五莖。水煎。服之。後半夜。吐衄一。遂乃稍得睡。次早大便猶瀉二次。嘔吐酸水。腹痛。改用小柴胡加滑石。竹茹。夜熱甚。與綠瓜汁一碗。飲既。神頓清爽。少頃。藥力過時。煩熱如前。再與綠瓜汁一大椀。進之。即大發。戰予謂此

戰非寒戰。乃作汗之徵耳。不移時。汗果出。而熱猶然。憶活人書云。再三汗下。熱不退。以人參。白虎湯。加蒼朮一錢。如神。迹此。再加玄參。升麻。柴胡。白芍。藥。黃連。飲後。身上之斑。先發者。熱後發者。紅中。夜後乃得睡。而熱散。斑尋退去。腹中微疼。腸鳴。口渴。右脉尚滑。左脉已和。再與竹葉石膏湯。加白芍。藥。蒼朮。服後。睡安。腹仍微痛。用柴胡。芍藥。各一錢。人參。酒荅。陳皮。半夏。各六分。甘草三分。烏梅一枚。服此。腹痛漸減。精神。又長

天惟兩膊痛不能轉動此大病後汗多而筋失
養之故宜當補益人參黃芪白芍藥桑寄生枸
杞子薏以仁桂心牛膝熟地黃水煎服後加木
瓜黃栢當歸減去桂心調養而痊十五

一人喉疼夜卧氣壅不能伏枕痰嗽不出遍身生
瘡面足皆浮夜間發熱睡醒多出冷汗此由脾
經有濕熱水氣不利而然薏以仁欵冬荅陳皮
貝母前胡蘿蔔子桔梗桑白皮茯苓甘草服此
喘嗽大定乃得伏枕惟下體腫脹不消且膚皮

新都四卷

九

緊硬小水黃動作則頭眩用大腹皮茯苓皮陳
皮桑白皮五加皮生姜皮木瓜姜黃四劑而消
十六

善易數者何洗心每飲食稍冷體弱或稀必作脹
瀉理脾之劑歷試不瘳就予診之左三部皆濡
弱右寸亦然關滑尺沉微此下元虛寒所致法
當溫補以補骨脂杜仲兔絲子各二錢山茱萸
肉人參山藥各一錢白茯苓澤瀉各八分肉果
五分數劑而愈十七

程湘孺人孫氏鼻衄後眩運嘈嘔吐清水夜卧
不安腹中飢而食不下由脾虛肝胆有鬱火
也人參黃連白朮扁豆甘草陳皮半夏竹茹
茯苓石膏水煎調養而平十八

姪君孝後溪兄次子也三月患頭項痛腰脊強遍
身如被杖臍腹亦痛口渴不寐飲食不進六脉
浮數吳醫以為陰虛為滋陰降火三投而三劇
反加嘔惡又與疎通熱尤不退下午煩亂延方
和宇夫視之以為外感擬進人參敗毒湯吳爭

新都四卷

十

之謂陰虛體弱難再汗仍用四物湯加紫胡葛
根薄荷黃芩知母而熱如焚神且昏冒矣予時
遠出促歸診之六脉浮絃而數鼓指語之曰此
春溫症也方診良是因復加內傷以故病劇滋
陰之劑壅而作滯且引邪入於陰分宜乎熱加
而躁悶也法當清解兼消可愈無傷以一陳湯
加羌活柴胡防風麦芽山查服下得微汗熱退
其半惟下午作潮大便未行腰臍之痛不止用
小柴胡湯加葛根白芍黃連山查飲下

熱又少退大便已行腰膈之痛亦隨減去但不知
知餓再以柴胡甘草青皮枳實麥芽知母黃芩
白芍藥諸症悉平惟覺體倦乏力加人參白扁
豆薏以仁減去柴胡青皮調養而痊十九

一僕婦頭疼喉嚨痛咳嗽嘔惡吐痰胸膈作脹經
水適來身熱口乾此少陽經痰火癰也用柴胡
為君半夏白芍藥竹茹為臣芎藭根天谷粉橘紅
桑白皮黃芩知母為佐甘草桔梗為使一帖微
汗而熱散痛除惟痰嗽不轉小水短濇柴胡知

新都四卷

十一

母竹茹麥冬各八分白芍藥一錢滑石三錢黃
芩貝母桔梗各七分五味子十二粒甘草三分
一帖而瘳二十

族侄婦范氏大叅晞老女也素有痰涎胸膈痞脹
近因乳腫大發寒熱欲成癰毒以加味神效瓜
萸散二帖寒熱雖退而腫不消用貝母白芷為
臣瓜萸為君赤芍藥當歸連翹為佐青皮甘草
柴胡為使痛雖減而腫仍不消脉之近數知已
成膿乃與內托十宣散加金銀花蒲公英兩帖

而膿潰因脚上生瘡而有浮氣前方去蒲公英
金銀花加薏以仁蒼耳子調理全安二十一

表姪女黃氏孕已七月患赤痢腹痛後重體素弱
舉家甚憂以白芍藥三錢條芩一錢伍分白木
地榆各八分甘草三分二帖而愈後五日報云
因稍勞痢又復來教以當歸三錢川芎一錢半
真阿膠二錢艾葉三分一帖全瘳二十二
一程氏婦吾孫門女也小產後二十日矣患赤痢
一日十餘次怯寒惡食小腹脹痛脘之右寸滑

新都四卷

十二

大知其虛中有熱憶其惡露未盡故小腹脹痛
專科泥丹溪產後大補氣血之語祭施之因而
作痢乃翁曰病尚怯寒何云有熱予曰書云惡
寒非寒明是熱症由熱極而作水也飲藥後當
自知之以白芍藥當歸滑石為君桃仁酒芩酒
連為臣木香桂皮枳即為佐青皮為使服下果
去臭黑瘀血甚多小腹頓寬惟口乾小水必惡
心怕飲食體倦仍裏急後重人參川芎白芍藥
各一錢當歸一錢五分酒連陳皮各六分木香

二分。外與清六丸。服下熱除。痢減十之八矣。但大便不實。惡心虛弱。以四君子湯加酒炒白芍藥。陳皮木香肉果酒連當歸養之而平。二十三
孫竹塹。浙歸。途次受暑。又為酒麪所傷。因而作吐。胸膈痞悶。時師以消導之劑。燥動脾火。口渴嘈雜。躁亂不寧。目珠如金。一身盡黃。已成疸症。脘獨右寸脉滑大有力。先以溫胆湯倍加香薷滑石。芎根解暑。止吐為君。黃連麥門冬清熱止渴。為臣。使濕熱散而黃自瘳也。連與三帖。吐止食

新都四卷

十三

進黃亦定矣。再與五苓散加青蒿芎根滑石黃連枳實八劑而黃釋然。二十四
程菊泉。暑月患喘嗽。咳連聲。濃痰滾滾。行動則喘促不寧。夜分口渴。胸膈脹悶。兩寸脉滑而數。兩關絃。此肺有宿痰。膽有鬱火。內經云。火鬱發之。又云。風寒外束者。可發。用紫蘇子半夏麩杏仁各一錢。石膏二錢。款冬。桑白皮各八分。桔梗。枳殼各五分。麻黃三分。服下無進退。改以杏仁。陳皮。人參。貝母。款冬。麥門冬。各七分。意以

仁一錢五分。桔梗知母各五分。五味子十一粒。桑白皮一錢。陳皮六分。服下痰減大半。胸膈仍不舒。口仍乾。脚仍熱。前方減去款冬。桑白皮。加枳殼。葶藶子。兩帖全安。二十五

程應禎。兄胸膈背心時常脹疼。頭眩暈。脚軟弱。手指痛。咳吐紅痰。脘其脉左關絃大。右寸關滑大。予謂此食飽後感於怒。老痰瘀血積在上焦。宜其胸背脹疼而熱壅也。治當清化上焦。使新痰不生。宿痰磨去。則萬全矣。如落時套。用地黃山

新都四卷

十四

茱萸等滋陰降火之劑。是以滯益滯。則熱無由去。痰無由消。而痰益增不去也。病者聞言。諤然曰。未見公時。業已服過一月久矣。疑其飲食損而熱尋加。胸背痛脹。迨長哉。予曰。今反轍幸早耳。再遲則敗事。亟以青皮枳殼陳皮快其氣。而疎其壅滯。蓋痰隨氣行也。貝母桑白皮以消餘痰。而清其嗽。牡丹皮滑石桃仁消其瘀血。山梔仁開鬱清熱。白芍藥伐肝補脾。甘草調和諸性。緩而理之。當見其去。去甚也。別後半月。復書

報云。胸背之脹減三之二。血已十日止矣。痰如舊。改以山梔仁。牡丹皮。丹參。赤芍。藥桃仁。各八分。滑石三錢。五靈脂當歸尾各一錢。半夏麩青皮各六分。諸症悉去。獨足心熱。再以黃柏知母以仁牛膝甘草白芍藥茯苓陳皮貝母石斛牡丹皮調之如初。二十六

虛山內人。胸脇脹痛。五更嘈雜。每一嘈雜。則痛發更甚。左寸關脈洪滑。右關亦然。此肝胆有鬱火。胃中有膠痰。迺有餘之疾。內經云。木鬱則達之。新都四卷 十五

蓋木火之性。貴乎疎通。當以龍會丸條而達之。顧痛則不通。通之則不痛也。服龍會丸一錢五分。大便行一次。痛隨殫迹。惟穀不開。以陳皮柴胡貝母茯苓甘草白芍藥酒苓香附杏仁桔梗調之而安。二十七

婦當暑月。小便不利而痛。玉戶腫。且又便血發熱。左脈絃數。右寸短弱。此肺氣不足。肝火太熾。蓋肝為血海。肝又主小便。玉戶為肝經所絡之地。治當疎決肝經壅塞。俾氣暢。則新血得以歸。

經熱解。則小水可不痛。而腫亦可消矣。以滑石三錢。藥桃仁當歸白芍藥各一錢。柴胡黃連入參各八分。川芎六分。甘草桂皮白芷各三分。四劑而病如失。二十八

族弟婦戴氏。腹中痛。多在臍腹。白帶如注。四肢痠疼。大便裏急後重。已成赤白痢矣。脈之兩寸關俱滑數。尺亦數。以白芍藥當歸黃連黃芩木香枳殼桂皮甘草滑石桃仁桔梗一劑而紅止。惟小水短澀。下午發熱。大便一日夜仍四行。改用新都四卷 十六

白芍藥當歸白木陳皮滑石甘草茯苓厚朴酒連酒苓桔梗柴胡木香飲下。諸症悉愈。惟頭痛腰疼。再以桂心當歸白芍藥白木茯苓甘草酒苓酒連破故紙木通黃柏煎服全安。二十九

族弟應童。胃脘當心而痛。手不可近。疑有瘀血使然。玄胡五靈脂牡丹皮滑石川芎當歸甘草桃仁桔梗香附水煎臨服加韭菜汁一小酒杯。其夜痛止。得睡。飲食亦進。惟大便下墜。逼迫不安。此瘀血已動。欲下行也。前劑減去韭菜汁一帖。

全安 三十

子弟淑南額痛遍身疼口乾舌胎黃厚左脉浮太
六部俱數時當仲秋初旬以小柴胡合白虎湯
加羌活熱仍不退下午用六神通解散以葱湯
調服三錢熱稍退至半夜後又復熱額疼頂巔
尤甚舌根黃且焦黑小水赤痛煩躁不眠遍身
又痛此三陽合病暑症也次日以小柴胡大加
石膏為君藥本白芷竹葉梗米生姜大棗少頃
汗大出至足熱始盡退猶煩躁不眠仍以小柴

新都四卷

十七

胡湯加桂枝山梔子竹茹竹葉飲下煩躁寧而
得睡餘熱悉平精神爽而向安矣 三十一

一富家婦當仲秋大小便秘者三日市師以芭豆
丸二帖大便瀉而小便愈秘脹悶臍突二寸餘
前陰脹裂不能坐卧啼泣呻吟欲求自盡此轉
脾病也柏樹東行根皮一寸滑石三錢玄胡索
桃仁當歸覆麥各一錢水煎臨服入韭菜汁半
杯服後食頃而小便稍行玉戶痛甚小便非極
用力努之則不能出改用升麻桔梗枳壳玄胡

震煎成調玄明粉二錢乃提清降濁之意服後
大小便俱行始不脹急次日報云每大小便來
時腹中先痛有淡血水小便短再以丹參丹皮
當歸白芍藥甘草青皮香附玄胡茯苓山梔子
山查兩帖各症良安 三十一

孫文約孺人年八十有三胃脘疼痛手不可近腹
中飢而飲食不能下兩寸關脉滑大兩尺沉弱
此血虛氣滯症也先與積氣丸一服而痛減半
再用生白芍藥山梔子五靈脂各一錢酒炒白

新都四卷

十八

芍藥二錢粉草山查香附各八分一帖全安 三
十三

應童族弟三陰瘧發於子午卯酉日已四越月矣
每發於夜熱多寒少左脉微絃右關滑大以二
陳湯加柴胡黃栢川芎當歸黃連兩帖而熱稍
輕飲食不進四肢懶倦脾氣大虛白朮何首烏
各三錢鱉甲二錢青皮七分烏梅一個一帖而
截 三十四

太學程好吾個儻博洽士也季春患西太陽痛胸

脇稍疼。口渴大便水瀉。左脉浮絃而數。中按有力。右關滑大。予曰。春溫症也。柴胡前胡葛根粉草青皮黃芩知母桔梗半夏麩石膏。半夜後得微汗。因起大便。感風續又發熱。依然口渴。更覺煩躁。石膏三錢。知母柴胡各二錢。葛根黃芩各一錢。粉草桔梗各五分。竹葉二十片。兩進而汗出熱解。諸症悉平。四肢尚倦。口微乾。語言乏力。以生脉湯加薏以仁石斛甘草白芍藥黃芩調養如初。三十五

新都四卷

十九

令媳長卿之婦。腹中微疼。經行不流利。喉痛。四肢麻木作戰。不知飢餓。右脉洪大如菀豆。以川芎香附麦芽山查烏梅粉草桔梗酒苓防風荆芥白木茯苓。四劑而安。次月經水大行。十日不止。以黃耆阿膠蒲黃各一錢。白芍藥二錢。粉草三分。一帖而止。此後但覺濁氣下墜。屁涎子戶中出。以補中益氣湯加酒炒黃連調養而平。三十六

族子應章之弟。十月發三陰瘡。至次年仲春未止。

每發於辰戌丑未日。午後寒多熱少。夜有盜汗。左脉軟弱。右關尺絃數有力。用白芍藥當歸各一錢。白木二錢。柴胡川芎粉草砂仁桂枝酒苓各三分。生姜三片。水煎服。再以何首烏白木鱉甲各三錢。柴胡一錢。青皮酒苓甘草各五分。烏梅一個。生姜三片。水煎。臨發日五更服之。兩帖而止。後半月下身大生瘡癩。以東坡四神丹調理而痊。三十七

新都四卷

二十

油潭吳中岳孺人。先感風邪。後傷飲食。發熱頭疼。腹中作脹。醫與芑豆丸瀉之。而熱不減。後醫又以大黃重瀉之。而熱亦如初。再後醫謂瀉而熱不退者為虛。大用參耆白木補之。補經四日。神氣昏沉。不知人事。乃敢予診。左脉絃數。右關尺沉數有力。舌尖沉香色。舌根焦黑。芒刺。語言含舌不清。扣前服藥。始知妄下妄補。不思飢饉之餘。痰氣為屬。誤成壞症。危而且殆。姑以知母柴胡各三錢。石膏六錢。枳實天苓粉各五分。粉草黃芩麥冬各一錢。山梔子生地黃各七分。人參

六分。竹葉三十片。生薑三片。水煎飲之。中夜後
人事稍清。微有汗。舌稍柔和。語言已不啞。舌
駭然有生氣矣。次日前方減去地黃。加白芍藥。
舌心焦黑盡退。諸症十減其七。但大便五日未
行。遍身尚痛。咳嗽與七製化痰丸二帖。再以石
膏二錢。麥冬貝母各一錢。前胡枳實黃芩梔子
各六分。甘草三分。桑白皮八分。煎服而安。三十

鮑子五保時疫耳聾。體有熱。口乾。大便五日不行。
新都四卷

人事不清。竹葉黃芩柴胡半夏麩甘草枳壳天
芩粉知母煎服而熱渴更甚。大便行而瀉。手攣
縮不能伸。且發呃。或又咳嗽。改以柴胡石膏竹
茹人參甘草麥冬半夏麩橘紅黃芩黃連一帖
而呃止瀉除。諸症悉罷而安。睡矣。三十九

僕子孫守。以中麻咳嗽。無痰。上唇厚腫體熱。大便
燥。聲啞。以麥門冬知母瓜蒌仁甘草白芍藥桑
白皮地骨皮石斛枳壳五味子。服後嗽減其七。
廼減去瓜蒌枳壳。以其大便已溏。加生地黃當

歸薏以仁調理而安。四十

僕子得貴。春溫頭痛。體熱面赤。舌心焦燥。以石膏
柴胡葛根甘草黃芩知母天芩粉白芍藥。服之
而舌不焦黑矣。進粥太早。半夜後又復發熱。中
腕硬痛。與大柴胡湯一帖。汗出津津。大便行二
次。腹痛不止。乃以小承氣湯調下。玄明粉一錢。
大便又行二次。熱不退。而痛全減。旋作臭。改
以石膏牡丹皮生地黃山梔子甘草升麻黃芩
赤芍藥。一帖而熱散。嘔止。四十一

新都四卷

元素姪令政。春溫後。經水適止。餘熱不退。口中甚
渴。胸脇痛。而耳重。脉左絃數。右滑大而數。小柴
胡加石膏知母桔梗枳壳葛根瓜蒌半夏麩服
下而熱渴如舊。改用柴胡二錢。人參甘草天芩
粉黃芩各七分。白芍藥紅芍當歸牡丹皮知母
各八分。調理而瘳。四十二

朱氏子天送。時疾頭疼。身若燔炭。口渴氣促。申酉
刻熱潮更甚。舌心焦黑。遍體紫斑。語言啞。舌不
清。時多發呃。耳聾。先治者。誤進藿香止氣散。而

加嘔逆水瀉。又醫以柴苓湯。嘔益甚。熱轉增劇。迎予為診。六脉俱洪數。此少陽陽明合病之疾。以石膏五錢。知母柴胡各三錢。黃芩一錢五分。半夏麩麥門冬。竹茹橘紅。葛根各一錢。粉草枳實各五分。服下熱退其七。舌不燥矣。再以柴胡半夏麩白芍藥竹茹各一錢。石膏三錢。麥門冬知母一錢五分。黃連甘草人參各五分。水煎飲之。而斑退。諸症悉平。四十三

朱桃源內人。胃脘痠。年五十有二。經水尚行不止。新都四卷

一月且二至。每至十餘日不淨。白帶淫淫下。常苦夢遺。近又眩暈。先與積氣丸一帖。以止胃脘之痛。再以太遙散加石蓮子蓮心五倍子煉蜜為丸。每早晚白湯送下二錢。夢遺竟絕。四十四

桂亭兄。壯年原有濕熱痰積。年逾艾。偶墜轎。跌傷背脇。專科以草藥敷貼於外。內以藥酒攻之。而愈。越十五年。左脇痛。手不可近。左脉絃數。堅勁搏指。小腹亦痛。知為舊痰及痰積作祟。以青皮

赤芍藥黃連當歸尾各一錢。桃仁一錢五分。大黃二錢。滑石三錢。水煎服。調玄明粉一錢。服下吐出痰涎。餘大便。僅行一次。而左跨及腿膝皆痛。夜睡不安。由小脘痛甚之故。此痰物欲行而未能也。再與大黃當歸尾紅芍牡丹皮赤芍藥各一錢。桃仁二錢。滑石三錢。青皮八分。調玄明粉一錢。再下之。大便行三次。皆沉香色稠粘痰物。腹痛雖除。跨痛仍在。用乳香沒藥歸尾紅芍各一錢。桃仁滑石各三錢。大黃二錢。川山

新都四卷

二四

甲丹參各一錢五分。服後大便行四次。所下皆紫黑如筋膜者。不可勝計。諸病悉減。因食鷄湯牛肉。臍腹又痛。裏急後重。此餘積未盡。欲再下之。舉家驚怖。謂六旬已外之年。已下數次。恐脾弱不能再下。予曰。醫貴認病。何以年齒數下拘哉。今藥力到而積已動矣。破竹之勢。可迎刃而解。若失時姑息。恐它日滋蔓。欲下難動也。行後而補。庶無反顧之憂。大兄然之。以紅芍桃仁當歸尾赤芍藥山梔仁玄胡索牡丹皮川山甲滑

石煎調玄明粉下二次。紫黑痰物如前之半。腿跨小腹痛則俱釋。次日用人參茯苓白芍藥粉草陳皮山查桂心當歸半夏調養半月。精神步履飲啖一如舊矣。四十五

江右熊二官。疫後食復額痛口渴。謔語神昏面青。舌黑。鼻中停灰。不省人事。小水短少。勢已危急。以小柴胡湯減去半夏。加石膏。知母。當歸。山梔。子。豆豉。枳實。急與服之。一飲便得微汗。熱退大半。次日以柴胡滑石甘草知母石膏人參桔梗。

新都四卷

二十五

黃芩天荅粉與之。舌黑始退。人事乃清。飲食纔進。霍然生矣。四十六

堂弟東里內子咳嗽吐紅。發熱頭眩脚膝乏力。先已服滋陰降火十數劑不愈。飲食漸少。精神漸羸。懇予治之。兩寸脉蕪。又如貫珠。兩尺俱軟弱。此上溢下虛之候。上盛者痰與瘀血也。下虛者腎陰弱也。且生平好飲。不無助熱。法當先清上焦。化去瘀血宿痰。然後以養陰藥收功。則病根可刈。癆瘵可免也。用貝母枳殼桑白皮清肺化

痰滑石桃仁牡丹皮小蘗滑除瘀血。山梔子甘草白芍藥養血以祛餘熱。三帖後紅漸稀。少前後心始不脹痛。惟痰嗽不止。大便結燥。減去滑石桃仁。加瓜蒌黃芩紫苑調養而平。四十七

由溪程竹坡孺人。年過六十。為疫所染。頭疼口渴。舌胎前黃燥。後紫黑。身熱沉重。人事昏憤。語言錯亂。小水短澀。嘔逆煩躁。合目不開。謔語不輒。口耳聾。胸脇痛。時五月初旬也。迎予為診。左浮而絛數。右洪長而數。胗畢。仲君清夷問曰。何症。

新都四卷

二十六

予曰。此熱病類也。清夷曰。因體熱便名熱病乎。予曰。否。否。仲景謂春溫過時為熱病。矧茲又為熱癘也。邪在陽明。少陽二經。又問曰。可生乎。予曰。脉症對。可生也。此症遠邇染延甚夥。不足恠。清夷曰。適方和字亦云。少陽陽明二經之病。二公所見既同。乞確一方為幸。予與和字胗多符合。即以柴胡石膏為君。知母枳殼。冬天花粉。竹茹為臣。黃連為佐。甘草枳殼。桔梗為使。連進兩帖。丑刻微汗。熱退神清。不虞即進葷粥。下午

又復大熱。譫語昏沉。舉家驚怖。予曰：此食後也。即以小柴胡湯加山梔子枳實淡豆豉。釐甲四劑。復得汗。熱從散去。神頓清爽。仍口渴煩躁。以生脉湯加黃連香薷竹茹竹葉而安。四十八。

程家內眷。葳溪汪氏女也。乃夫歿於疫癘。新寡七日。疫即及之。大熱頭疼口渴。胸脇併痛。醫與小柴胡湯。夜忽夢夫交洩而覺。冷汗淫淫。四肢如解。畧不能動。神昏譫語。面如土色。舌若焦煤。強硬。迺予診之。六脉沉絃而數。大小便俱秘。此亦

新都四卷

二十七

陰陽易類也。疫後有是危已極矣。予以生脉湯加柴胡黃芩桂枝甘草水煎成。將乃夫昔穿舊袴襠。燒灰調下。兩劑而神醒。體溫汗斂。舌始柔和。焦亦漸退。次日仍以前方加酸棗仁竹茹。四肢始能運動。乃飲粥湯。僅一子。甫十歲。一女甫十四。繼被疫困。均以六神通解散汗之而安。妯娌及婢輩六人。皆六神通解散瘰之。舉家德予以為再造。再造。四十九。

族姪太學從明。夏初由容。即患瀉下。調半瘥而歸。

新都四卷

二十六

因食隔宿猪首而復。裏急後重。晝夜三四十度。日漸沉困。口渴。胸膈焦辣。手心熱。腹微痛。小水少。每解時。先乾噦。嘔惡。汗出飛飛。下皆稠粘。紫黑血無糞。彼素知醫。且慎重。不輕服人藥。敷予診之。脉左沉絃。右滑數。面色外黑內黃。飲食不入。肛門辣疼。予以渠原稟薄弱。今遠歸途。次不能無勞。不敢踈下。姑以胃風湯加黃連與二帖。不効。腹稍加脹。渠叮予曰：古云無積不成痢。積勢膠固。切勿用補。無以體素弱為疑。予曰：諾。改用黃芩芍藥湯。三劑無進退。迺私語渠姪元亮曰：令伯之症。實實虛虛。熱熱寒寒。寔不易治。且穀食禁口不入。乾噦可慮。須得明哲參治。元亮從容言之。欲得方古。堪為翼。諸相契及內眷。迺相讚言。太學不從曰：吾豈不重命而吝費哉。顧新都之醫。無如叔最明。吾之交。無如叔最厚。舍叔安所倚。元亮曰：叔祖善矣。能用人之長。得一雋商確。可無後慮。太學佛然曰：知莫貴於知心。吾知其心久矣。專任勿疑也。予知渠信任堅。

若金石益加研究。圖欲先開胃口。使新穀食將宿穢壓出。或補或攻。視緩急以為方畧。迺背囑元亮曰。令伯非人參不可。幸且勿露。俾予得以盡技。元亮曰。諾。迺倣朱丹溪法。用人參黃連各二錢煎濃細細呷之。但得一呷下咽。胃口便開。噦惡即止。蓋胃口虛熱衝上為噦也。其日用之丸應之。覺小水不利。又以清六丸應之。裏急後重。以參朮加芩連木香枳。即滑石桃仁應之。人

新都西卷

二九

參皆背加。太學不知也。渠每診必叮予曰。日來疾稍平。叔之力也。幸勿遽補。恐廢前功。予曰。如教。詎知人參已服過十日。計二兩許矣。此後脉僅四至。軟而無力。憶丹溪云。虛回而痢自止。又云。氣虛甚者。非附子不能行。參耆迺以胃風湯加黃耆附子姜炭四劑。而血全無。後重亦止。惟大便瀉而不實。所下俱黃糞。渠知積滯已盡。始欲理脾。用參苓白朮散服十日。便仍不實。迺問予曰。補脾而瀉不止。柰何。予曰。據脉迺下元虛

寒殆腎淺。非脾淺也。溫補下元。則固矣。蓋腎者胃之關。初不敢用下劑者。慮有今日也。教以兔絲子破故紙杜仲山茱萸人參大附子白茯苓澤瀉四帖全瘳。里中稱太學能知人。而予不負所任也。五十

查少川公。年四十三。夙有哮喘疾。每發則遍身如燎。氣賁賁上騰。息息短促。喉中痰聲。响若湯沸。經七晝夜。汗而漸平。居常嗜飲。通宵不輟。醉後縱慾。不避風寒。族中有教以石膏麻黃杏仁枳

新都西卷

三十

壳細茶各一兩。作大劑飲之。名曰五虎湯。喘至即以此禦之。隨飲而止。屢發屢進。應若桴鼓。公喜甚。詩為保命丹。寓大通一月。邑中麻黃石膏為之。缺市。詎知情慾無窮。胃中冲和有限。三年之間。飲五虎者。殆不可以數計。而胃中之冲和者。亦不知損之何若也。因而腹大若覆箕。兩腿光腫如柱。內外癩疥。瘡中清水。涓涓流之。不竭。晝夜腥氣逼人。不能伏枕。而卧者五越月。自儀楊醫起。聞京口之醫如何。如張者最良。遍延治

之彌月。卒無一驗。又舍京口。抵姑蘇。歷嘉杭。凡有名者悉迎療之。而勢益劇。昇回至岩鎮。鎮醫檀名者吳與方也。先詣吳。吳駭辭不治。就方。方診視久之。曰。公疾非常。必得非常人。廼可已。公曰。先生世家大方。昔在西淮。且人人引領。願得先生一盼為快。何我棄而使需非常人也。今世非常人。舍先生其誰。方曰。嘻。公貴邑孫生生者。名動三吳。今歸不出。亟迎治之。或可無恙。公扣孫生生居何里。狀何若。方書予姓氏里居與之。

新都四卷

三一

歸即懇程公山氏紹介。迺予時長至後一日也。至則見公坐高椅之上。氣高而喘。身熱而煩。覆以綿被。足納火箱。前後左右。環火五盆。首戴絨帽。帽外籠以貂套。套外仍束一帕。鼻用絨套籠之。門設重幔。猶凜凜怯寒。診其脉。浮大無力。睇其色。白中隱青。徐問公曰。惡寒身熱。從何時起。公曰。十日。予曰。據色據脉。予已得其概矣。公歷數府名家。認為何症。擬何湯劑。請詳述之。公曰。衆論落落不一。先生學博。見真。願惟命。予曰。公

疾。迺氣虛中滿。法當溫補。下元人徒知利小水。不知小水不利者。由下焦之氣不充。不能滲從。膀胱故道而行。若利之急。則汎濫而橫流。肌膚下。於陰囊甚。則脹裂崩塌而出。若使下焦壯盛。則小水自通。譬之既炊釜底。水火交旺。甑中之氣自然蒸騰。若霧若露。內經曰。上焦開發。宣五穀味。薰身充膚。澤毛。若霧露之灌溉。是謂氣。故曰。上焦如霧也。清陽升。則濁陰降。降下則為小水。故曰。下焦如瀆也。瀆者水也。言下焦為決水。

新都四卷

三一

之官。水道出焉者。是也。人之汗。即此霧露之氣。小水即降下之氣。蓋氣者水之母。由氣化而為水。故又曰。氣化則能出矣。融衆理而觀之。總由下焦元氣壯盛。斯能升降變化。清陽升。濁陰降。即地天交之泰。陽不升。陰不降。即天地不交之否。否者塞也。此脹滿之所由生也。公之疾。起於五虎湯。致臟寒。生滿病也。公曰。善。吾廼今始知致病之源。第近來身熱手熱。鬲內焦辣。而外惡寒。竟不解。孰為熱。孰為寒也。予曰。仲景云。傷寒

必惡寒。由寒邪在表而然。合先散之。胸膈焦辣者。迺陰盛格陽。虛陽之火。被寒氣驅逼上行。非真熱也。經云。水流濕。火就燥。但得下元一溫。熱自下行。公曰。然。唯先生命劑。予以紫蘓馬蹄華炙甘草防風白豆仁蒼朮陳皮人參羌活生薑一帖。而得微汗。悉徹去環列之火。僅存足底一盆。首上所覆之帕亦去。獨鼻寒如初。迺用防風黃耆二兩煎湯置器中。令薰其鼻。飯頃而止。一日凡三薰。次日鼻套亦除。嘔惡不止。用人參溫

新都四卷

三三

膽湯加丁香進之。一帖而止。又謂鯉魚能利水。一日盡二斤半。夜脹極。迺告急於予。予曰。病執如是。固迺縱恣若此。等閑之劑。曷能消釋。沉思久之。以平胃散一兩。入椒攪肉一兩。水煎飲之。兩劑而定。獨腹脹小水不利。不能伏枕為苦。迺以附子理中湯加砂仁補骨脂赤小豆桂心。連進四帖。小水畧長。繼以尊重丸。日三服之。每服五丸。五日後。小水通利。可貼席而睡。守此調理。腹脹漸消。兩月大平。三月而公出市。市中人信

子寔從公始。五十一

夏益吾。肢節腫痛。手足灣痛。腫尤甚。不能動止。凡腫處皆紅熱。先起於左手右足。五日後。又傳於左足右手。此行痺症也。且喘咳。氣湧不能睡。左脉浮數。中按絃。右滑數。內濕熱。風痰壅遏。經絡而然。以茅山蒼朮姜黃以仁歲靈僊秦朮知母桑白皮黃柏酒苓麻黃水煎服下。而右手腫消痛減。夜服七製化痰丸而嗽止。迺得睡。再劑。兩足灣消其半。左手經渠列缺穴邊腫痛殊甚。用

新都四卷

三四

以仁蒼朮秦朮甘草天荅粉五加皮石斛前胡枳殼歲靈僊當歸旋服旋愈。五十二
初陽姪迺政。先時咳嗽。諸治無功。且嗽急則吐。用碧玉散二錢。白湯調下立止。後半年復咳嗽。胸背隱隱疼痛。身常內熱。咳出桃荅膿。不可勝計。腥穢之氣甚惡。右脇并乳脹痛。脉洪數。大便燥。肌瘦骨立。此肺癆症也。用貝母茜根白芍藥各一錢。知母麥門冬山梔子紫菀各八分。桑白皮當歸牡丹皮杏仁各七分。薏以仁一錢五分。其

草葶各五分。水煎服之。服此甚安。但要常服。若一缺藥。其疾便發。據此肺竅中痰積痰血尚多。未能即去。宜緩圖之。書云。俟膿去盡。當自愈也。愚謂丹溪雖有此言。亦不可回執。設不以藥消化之。必俟其膿自盡。恐歲月深而有他變。且中年之人。何能當此。莫若清熱潤肺。消痰化痰。久而服之。或早愈也。方黃吳諸公。謂久咳傷肺。每每投補。屢被紊之。每補必增熱。加痛。加咳。而膿轉多。予曉之曰。諸公之意。誠良。其如病加何。

新龍四卷

三五

是姑息之謂也。古人不務姑息。惟以去病為安。夫姑息可以養病。非所以去病也。獨汪無懷然予言。守予法。二年良愈。肌長如初。五十三

族姪仲木內人。賢淑婦也。不育多鬱。腹脹。左脇不能側卧。亦不能仰卧。仰側卧。即氣湧。每午夜背心作脹。氣喘。吐痰發熱。必起坐。令人指摩。久之始定。面有浮氣。右寸關脉滑大。有力。此氣鬱食積痰飲症也。蓋憂思傷脾。思則脾氣結。氣結不行。則五穀之津液皆凝聚為痰。故喘急作脹。先

與定喘湯二帖。而無進退。繼用核桃肉五錢。杏仁三錢。人參桑白皮各七分。水煎服之。氣喘迺定。惟腹中脹急。改用橘紅半夏麩木香白芷仁。鬱金蘿蔔子姜連香附茯苓四劑。大便痰積隨下。腹脹尋消而愈。五十四

族姪孫女年甫十歲。大便脫肛。鼻中時常出血。夜夢咬牙。肚熱面黃。將成疳症。以山查青蒿枳實升麻酒連滑石各一兩。甘草蘆薈乾蟾各五錢。俱為末。神麩糊為丸。一料全愈。五十五

新龍四卷

三六

唐岩祈首秋患痢赤白。延至次年春分不愈。腹中作脹。不知餓。每行動則氣喘。四陽之末皆冷。陰囊腫大。便日夜十數行。而肌肉甚瘦。小水短少。飲食減半。面黃。兩跗腫大及踝。與平胃散加酒連猪苓澤瀉升麻防風酒炒白芍藥蕙以仁。外與香連丸合益元丸相兼服。四日而痢止。迺知餓而加食。精神爽快。再四劑。兩跗陰囊之腫皆消。惟咳嗽。用薏以仁酒炒白芍藥粉草澤瀉杏仁桑白皮陳皮姜連茯苓姜黃葛根蘿蔔子二

帖而嗽除。但體乏力。與六君子湯加補骨脂。薏以仁滑石紅麴酒炒白芍藥桔梗麥芽調養半月而全瘳。五十六

姪婚程東山仲夏患休息痢。所下皆紫血。腹痛。迨

清明猶不愈。醫藥倍嘗。體倦肌瘦。或三五日一

發。或七八日一發。發必三日廼止。予為診之。左

濡而右滑。據脉有瘀血痰積。近來小水不利。姑

用四君子湯加滑石江麴陳皮山查澤瀉升麻。

服後微覺有熱。改以四君子湯加滑石桃仁紅

新都四卷

三七

麴酒連神氣稍旺。脾氣始回。廼用番鴨胆三錢

下之。果去紫黑血塊。及如敗魚腸者半桶。從此

痛除痢止。次日以六君子湯去半夏加酒炒白

芍藥山查紅麴滑石桃仁升麻調之。報云胸膈

作脹。恐積滯未盡。而服參朮。欲再下之。予為再

診。兩寸短弱。兩尺洪大。前日滑濡。二脉俱無。此

陽虛下陷之候。宜當大升大補。以六君子湯大

加黃耆為君。酒炒芍藥為臣。升麻桔梗為使。服

此胸膈寬快。精神亦好。惟肛門熱。前方加酒連。

減半夏。脫然平安。五十七

陳氏婦。腸鳴腹痛。大便溏瀉。合目即汗出。下午潮

熱。醫謂潮熱盜汗。廼虛怯之症。加之洩瀉。脾氣

壞矣。視為不治。挽予診之。右脉濡數。左脉洪數。

予曰。此鬱火痰積症也。蓋憂傷脾。思傷脾。飲食

因而化。積而生痰。故腹痛溏瀉。但理中焦。消

去痰積。可瘳也。以四君子湯加半夏麴滑石紅

麴。麥芽以仁酒炒白芍藥酒炒黃連牡蠣桔梗

八帖。而病去如釋。五十八

新都四卷

三八

九德姪耳鳴。氣築築然閉而不通。鼻塞不利。口不

知味。痰多而鬲熱不清。脉左浮而絃大。右滑太

俱數。內經云。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生

也。此由胃中痰火上壅。熱極生風。廼以蔓荊子

升麻木通赤茯苓桑白皮麥門冬生地黃前胡

甘菊荅赤芍藥甘草石膏生薑三片。東子一椀

水煎飲之。四帖。左絃雖減半。而症尚如前。再用

甘菊荅橘紅半夏麴茯苓甘草知母白芍藥酒

荅麻黃石膏桑白皮桔梗加薑朮。又四帖。而諸

症悉平。後以六君子加酒連熟胡川芎白芍麥
門冬升麻兩帖飲食亦其味矣。五十九

陳魯字夫常山縣人也。年四十有三。體肥。患痰火
十年多矣。每月必一發。或勞心過度則二發。吐
痰身熱。吼喘。飲食不進。不能倒頭而睡。合目則
乳語。面赤頭痛。遍身痰氣。走動牽扯作痛。必俟
吐出痰後則耳始不鳴。目始不泪。素服風痰藥
南星半夏之類不効。後服參耆則亦僅止四五
個月。診其脉兩寸洪滑。兩尺沉微。殆上盛下虛。

新都四卷

三九

之候。法當清上補下。以橘紅貝母茯苓甘草桔
梗杏仁前胡鈎藤天麻酒芍枳殼水煎服之。夜
進七製化痰丸。再以八味丸加人參麥門冬五
味子。空心服之。半年而瘳。六十

程紹溪中年患鶴膝風症。兩腿及腳肚內外腫肉
盡削。獨兩膝腫大。迺酒後縱飲所致。經治蘓松
嘉湖杭嚴六府。視為痼疾。且四肢膿疥連片。濕
爛臃腫。臭惡難近。自分必死。家人以渠病久。醫
藥破家。今則衣食不祗。無門求生矣。渠有親為

子鄰家。偶言及渠病之異。家道之窘。子聞惻然
鄰素知子不以。窘異為憚。懇為一肴。子携仲子

素來同往。令渠沐手。診之。左寸關浮數。右寸短
弱。兩尺沉微。此氣虛血熱之候。法當大補氣血。
壯其筋骨。猶可冀生。病者聞言。命家人子媳羅
拜於地。請藥。子曰。病勢已痼。非百日不見功。蓋
補血無速効。日浸月潤。漸而濡之。關節通利。骨
正筋柔。腿肉自生。初以龜板以仁各三錢。蒼耳
子五加皮頭二蠶沙節節香各一錢。當歸人參

新都四卷

四十

黃耆蒼朮杜仲黃柏各八分。紅苓五分。水煎服
之。十劑而瘡疥漸稀。精神稍長。再以薏仁五
加皮龜板各二錢。節香蒼耳子地黃丹參蒼
朮黃柏何首烏各一錢。人參當歸各八分。紅苓
木通各五分。三十帖。足可倚杖而行。腿肉漸生。
瘡疥盡愈。膝腫消去。其六後以虎潛丸加鹿角
膠何首烏金毛狗脊節香牛膝。用龜板膠為
丸。服三越月。腿肉復完。出之茗上。茗人噴噴稱
奇。悉錄其方以布。六十

予堂嫂程氏喉間有物如嚙啗之不出嚙之不下梗梗不安腹中痛且瀉年五十有八矣迺梅核氣症也腹痛迺新疾以二陳湯加旋覆蒼白木香附熟蘓桂皮厚朴澤瀉四劑腹痛仍在瀉亦不止迺用胃苓湯加麥芽砂仁香附二帖痛止瀉瘳仍用二陳湯加厚朴桂皮熟蘓旋覆蒼細辛人參煎服四帖而喉中病去如失六十二

一婦先傷風發熱咳嗽二日迺分婉熱尚未退又食鷄汁肉等太蚤咳嗽發熱愈盛已八日矣胸

新都內卷

四一

高脹痛頭痛口渴大便秘咳出之痰色黑而臭小水短少脇下扯痛氣逆而喘不得卧左脇不能着席汗出不止症甚危急予以瓜萋五錢熟蘓子一錢枳壳酒苓各六分前胡桔梗各五分粉草三分生姜三片水煎飲之胸膈之痛減半氣喘稍定次日再進前藥大使用蜜束導之熱盡退痛盡減諸症尋愈六十三
表嫂孀居二十年矣右癱不能舉動不出門者三年今則神情恍惚口亂言常悲泣詰其故答曰

自亦不知為何故也胗之兩寸脉短滿以石菖蒲遠志當歸茯苓人參黃耆白朮大附子既蠶沙陳皮粉草服四帖精神較好於前但悲泣如舊夜更泣予思仲景大棗小麥湯正與此對即與服之兩帖而瘳方用大棗十二枚小麥一合大甘草炙過三寸水煎飲之此憂傷肺臟臟寒故多泣也六十四

桂亭大兄原因墜轎跌傷腰脇脹痛不能轉側咳嗽弔痛用三製大黃二錢桃仁一錢五分杏仁

新都四卷

四二

紅蒼天荅粉各一錢穿山甲八分甘草五分水煎服之兩帖而大便行繼以五加皮紅蒼川芎當歸生地黃白芍藥丹參甘草桃仁穿山甲柴胡煎四劑飲之而痛大定後因過食葷腥喘嗽腰痛右肩背墜痛素有濕熱痰積以葳靈僊熟蘓子枳實酒苓半夏麴瓜萋仁甘草陳皮姜黃防風羌活服後腸鳴坐則重墜此痰積已動欲行而不可得也與穿山甲當歸尾紅蒼杏仁枳壳大黃蘿蔔子川芎莪朮青皮服後大便所下

稠積穢瘀甚多。痛隨減去。以保和丸調理而安。

六十五

堂嫂王氏。兩寸脉洪大。右關滑大。五六月間必吐。

紫黑血塊。足跟焮腫。痺痛。時流黃水。與牡丹皮。山梔子。玄參。甘草。白芍藥。當歸。陳皮。滑石。桃仁。

四劑而愈。六十六

族弟婦程氏。姓已五月。痢下膿血。裏急後重。腰重。

墜難當。以白芍當歸。木香。砂仁。條芩。酒連。酒芍。藥。

陳皮煎服。夜仍痛。痢三次。次日大便所下如爛。

新都西卷

四三

魚腸者甚多。夜半忽兩足。脚底前半節紅腫。疼。

痛難安。此厥陰肝經虛胎氣下墜也。當補氣血。

以川芎當歸。人參。白朮。熟蘓。茯苓。甘草。枳。即服。

下。夜半痛止。即得睡矣。左脚咯痛。丹以人參。熟。

蘓。川芎。當歸。白芍。甘草。陳皮。茯苓。白朮。熟蘓。加白芍。

服後左脚痛亦全減。多服。益氣湯。加白芍。

此藥茯苓調補而胎亦安。六十七

凌波汪氏。谷寒。公熱。頭疼。偏身痛。眼珠疼。小腹痛。

裡急後重。赤白膿血。日及三十餘度。口渴。此瘡。

痢並作也。以柴胡。葛根。甘草。青蒿。枳殼。酒芍。酒。

連當歸。白芍。桂枝。防風。羌活。川芎。水煎服之。外。

與神授香連丸。其夜痢減十之九。但遍身尚疼。

略惡寒。不發熱。頭暈而已。改以川芎。川歸。白。

芍。木香。桂皮。陳皮。酒連。酒芍。調理三日全安。六。

十八

仲閣姪孫。赴府考試。過食牛麵。且勞苦。因而發瘡。

城中醫瘡半月。形神俱瘦。瘡愈而腹大如箕矣。

健所黃夫人。仲閣岳母也。凡名家逆為延。至率。

新都西卷

四四

認瘡後腹脹。其中必有瘡母為祟也。諸消痞藥。

嘗之不効。又以五皮飲利之。不應。將議攻下。而。

予適至。觀其色黃。口渴。小水短澀。腹脹不可言。

足膝之下。腫大不能行。兩腿腫連陰囊。氣壅不。

能卧。飲食絕少。脉纒四至。大而不欬。予曰。此真。

氣虛中滿症也。法當溫補下元。而兼理脾病。猶。

可愈。若攻下。是殺之也。渠父與予厚。今官河壩。

予安得不為渠任其重哉。顧欵友所用之劑。延。

阜角。候郎。三。我。木。美。黃。葶。子。木。通。枳。實。青。

皮厚朴山梔大黃牽牛黃連等皆破敵有餘之品。見之且駭然。但黃夫人薦來之醫。又不能拒。正躊躇間。幸渠迺伯溪亭公。知予心。率謝歛醫。而一任予治。予即以人參白朮各三錢。炙甘草五分。大附子炮乾。姜桂心各一錢。破故紙二錢。桑白皮砂仁茯苓澤瀉各八分。水煎飲之。其夜小水稍利。喘急稍緩。連飲五日。腹稍寬。皮作縞。因食猪肚子太蚤。依舊作脹。前方人參白朮加作五錢。再加陳皮八分。又二十劑而腹消其大。

新都四卷

四五

半。迺能伏枕而卧。始能移步行動。改以參苓白朮散加破故紙肉桂調養而安。溪亭公問曰。腹脹如此。口渴如此。小水短濇如此。諸人悉認為熱。為有餘。迺今以溫補收功。何也。予曰。公不觀古人以氣虛中滿。名鼓脹耶。由氣虛所以成中滿。謾氣不虛。何中滿之有哉。且鼓者外皮堅緊。而內空無物。若復瀉之。真元脫矣。安能復生。故惟有補而已。口渴小水少者。皆元氣虛弱。不能轉運清氣。不上升。故口渴。濁氣不下降。故無小。

便。迺天地不交之否。竊特補其下元。俾水火充實。陽氣上騰。濁氣下降。中氣運動。而諸疾皆瘳也。六十九

朱懷竹。壯年客外不謹。而生楊梅瘡。恐人知之。又欲回家。迺求速愈。每日用藥外燻。燻而不效。用藥水頻洗。洗而不瘳。迺以末藥點之。一日凡服煎藥三帖。如斯兩月。不惟瘡不能瘳。毒且趕入內。在下則肛脫二寸餘。周匝瘡滿如葷。弗克收入。因而不能行坐。在上則毒入於肺。喘咳氣湧。

新都四卷

四六

胸膈脹悶。不能仰卧。內熱而外惡寒。寢食俱廢。合目即譫語。陰囊疔瘡。紅腫脹痛。兩足瘡延腫大。精神恍惚。軟床昇歸。迺兄少竹。逆予為診。六脉俱洪大。而數。語少竹曰。病至重。幸壯年。猶可治也。今予尚未可付藥。俟彼胸中瘀血毒物出後。迺可服。否則彼以予藥動血。而反致疑。顧城中諸友。鮮有識此病者。一誤則大事去矣。慎之慎之。少竹素信予。固請予藥。而不與其服。懷竹見予不發藥。迺延張程二公為治。晌午服藥。晡

刻大發喘咳。吐出紫黑血塊如膿之類。梳餘滿房腥穢不可近。懷竹心慌。少竹耐之曰。毋恐。孫君先已預言汝胸中脹悶者由燻藥逼毒入內。上迫於肺。痰與瘀血壅遏肺竅。將欲成膿。故喘咳不能伏枕。脈洪大而數。從可知也。必俟吐後。乘而消之。極易為力。今果如孫君言。孫君藥具在。急煎飲之。藥用牡丹皮。桑白皮。白蘚皮。木通。前胡。枳殼。桔梗。甘草。杏仁。以仁葶藶子。服後大便裏急後重者二十餘次。所下黑紫膿血甚。

新都四卷

四七

多喘咳稍定。痰紅稍淡。二三劑。迺能伏枕而睡。改用白芍當歸白蘚皮甘草貝母黃連金銀苓阜角子以仁。麥冬木通連飲二帖。足上跟踝瘡腫漸消。其夜陰囊出臭膿血。二梳許。次早診之。兩尺脈不洪大矣。仍用前劑加丹參。又二帖。陰囊結靨甚厚。橫裂一縫。三日後。隨縫連皮落下。約重五六兩。厚可半寸。色如猪肝。洞見兩陰子。系一光薄白胞。令人駭然。此亦亘千古稀見者。舉家謂陰囊。迺致命之所。且未有子。余爛去。即

使復好。亦不能育子矣。環哭甚悲。予諭之曰。此毒去也。而真元不傷。吾能使其生肉如故。亦不妨於生育。母過慮焉。舉家將信將疑。予即用紅粉霜加生肌末藥敷上。一日三次。並不作痛。膿水立乾。外以人參當歸酒炒。白芍白芷甘草白蘚皮阜角子以仁。何首烏調理一月。囊肌全生。諸症悉愈。迺今日用土茯苓猪肉各半。飭同煮極爛。將肉入醬盪如常。嚙食之。湯當茶飲。脫然全瘳。次年生女。七十。

新都四卷

四八

查良本兄令眷。怒後偶食魚頭。骨梗於喉中。即以饅頭棕肉等壓之。骨雖下。便覺胸膈不快。又服消骨藥兩日。迨今迺七日矣。胸膈脹痛殊甚。飲食悉從背後而下。惡寒發熱六脉絃數。予思骨梗之後。用硬物壓之。傷其胃腕。必有瘀血停蓄。膈間將食管逼在背後。故飲食覺從背後下也。今但消去瘀血。使食管復原。胸膈之痛可瘳矣。藥以五靈脂為君。山查玄胡索桃仁枳殼為臣。赤芍藥牡丹皮香附山梔仁為佐。紫胡石菖蒲

為使水煎臨服入韭菜汁一酒杯飲之。其夜胸
膈寬快。大便瀉一次。痛減大半。飲食迺從右邊
而下。右邊胸喉稍痛。吞物甚艱。苦吐出痰皆血
腥氣。改以山梔赤芍藥歸尾桃仁劉寄奴五靈
脂牡丹皮穿山甲煎入韭菜汁服之。兩帖全瘳。
七十一

後溪大兄孺人戴氏。勤篤嚴謹人也。秋患痢。所下
皆血。及屋漏水。內有血子如赤小豆者。不可計
數。晝夜五六十行。果急後重。噦惡不住。穀者五

新都四卷

四九

日。予以劉守真芍藥湯與三劑而病無進退。適
後溪兄在浙。姪女輩素信醫。博黃氏為女科專
門。延而治之。授以芩連枳壳枳榔山梔地榆黃
栢滑石之類。服已五日。始雖噦惡。一日尚有梳
粥。今則粒米不能進。腹痛轉加。必用重物壓之。
迺稍定。神思昏弱。卧不能起。下午發熱。女科仍
以前劑加青皮枳實。姪孫爾嘉持藥見予曰。家
姑酷信黃醫為專門。今已任事五日。較前精神
大瘳。叔翁為祖父至交。寧無一語啟愚乎。予曰。

新都四卷

五十

吾非不言。欲詆黃。恐為妬婦之口。今子來。予可
胥之。六脉滑大無力。胥畢。慌語爾嘉曰。事急可
速令人促迺祖歸。否則令姑女流。不諳醫藥。吾
安能施其巧。比有西席汪帶川聞之。決爾嘉曰。
此事極要調停。番黃醫以女女流心。黃發之劑。
問而不進。以東宿之劑作黃劑進之。內外無猜。
則安矣。予然其言。以人參白朮酒炒白芍各三
錢。炙甘草一錢。半炮姜肉桂各一錢。白茯苓陳
皮各八分。砂仁五分。大棗二枚。水煎飲之。噦惡
減半。其夜痢減十之五。惟腹痛不甚。減次早胥
之。脉稍歛。黃醫以為渠功。大言自矜。藥仍以芩
連之類。予仍以前劑再加黃耆。其日下午始納
粥。一茶盞。腹痛漸減。又次晨。黃醫胥視。見夜來
痢減其七。益揚揚得志。語左右曰。寒家業醫五
代。但此大病。亦不多見。自以為非彼。亦無能治
也。爾嘉詰曰。瘡痢亦尋常耳。何以為大。黃曰。丹
溪云。下痢身涼者生。身熱者死。下痢純血者死。
脉洪大者死。如屋漏水者半死。半生。今皆犯之。

新都四卷

五一

故云云也。爾嘉曰：然則今日當用何劑？黃曰：劑已投病，仍當確守前方，何敢輕改？爾嘉咲而點首，復向予求劑。予以理中湯倍加酒炒白芍藥，以肉桂佐之，腹痛身熱悉愈。痢十去九矣。後溪兄亦浙回，爾嘉述病源以黃方予，方呈看。後溪唏噓嘆息，迺辭謝黃而詰予曰：人言下赤痢者熱，噦惡者熱，又身熱脉大，吾弟何獨認為寒？而用此大熱之劑成功，曷故哉？予曰：此虛虛實實之處，極能誤人。尊嫂之熱，非真，有餘之熱，迺內有虛寒，逼其虛火上，行故噦惡潮熱耳。脉大而無力，仍作虛看，且向服寒涼不效，當自知警也。後溪兄曰：微弟幾敗迺事矣。七十二

邵敬園令春常胃脘痛，由氣鬱而起，近以產後下痢紅白，而胃脘之疼不止，汗多，六脉滑大無力。法當收斂，以小建中湯為主，白芍藥酒炒四錢，炙甘草一錢半，桂皮五靈脂醋炒各一錢，香附糖麩子各八分，水煎飲之，痛減，汗未全斂。次日前方加御米壳醋炒過一錢，兩帖全止。七十

新都四卷

五二

蘓文學望臺患瘡，一日一發，先寒後熱，熱多寒少，胸膈痞悶，口渴，小便溷濁，腥臊不可近，醫五越月不效，面黃肌瘦，飲食減，少喘息，呻吟，精神疲憊，起須人扶。迺敦予治，脉得沉絃而數。公問曰：是瘡否？予曰：是公曰：吾聞之，真病不治，治之無功，蓋真者死候也。瘡殆常病，不過寒熱虛實表裏諸名家曾認為表症者，麻黃羌活紫胡等汗之矣，有認為裏症者，大紫胡湯輩下之矣，有認為痰飲者，常山訊石吐之矣，有認為虛寒者，附子理中湯入參服過三劑矣，有認為實熱，用白虎湯枳實青皮枳即草菓消之矣，盡法備嘗，絕無一應，瘡豈亦有真而卒至於死耶？言訖，淚潛潛下。予曰：觀公色脉，瘡將發矣，不暇辯，第飲予藥不死也。以紫胡滑石各五錢為君，鱉甲三錢為臣，黃連知母各一錢為佐，枳實甘草各五分，黑豆四十九粒為使，水煎，送下昆布鱉甲丸，申刻瘡至，成初便止，公喜曰：向者瘡發未申，夜半尚不能止，即止猶倦，怠懶言，適飲先生藥，不兩時

而止。止便能言。先生之功也。予曰：偶耳。今日服藥已晏。明日五更。幸早服之。服訖。竟日不發。又次日。前方加入參、白朮。小水腥臊之氣已無。精神陡長。公又喜曰：兩日無苦。先生之功也。予曰：偶然耳。公曰：嘻。吾瘡幾半載。休歛之名。公莫不歷試。卒無影响。先生一舉奏奇。有而不居。蓋見所養。不審湯名。何劑。乞指示之。以詔將來。予曰：公何以名為哉。老子曰：無名天地之始。矧醫亦道也。即道亦是強名。醫貴識病。苟識病。一二三

新都四卷

五三

品。便能成劑。立功。經云：約方如約囊。又曰：方以類聚。方憑病立。苟不識病。即盡本草一千六百五十六品。併而服之。未見其益也。瘡固常疾。治亦不易。仲景有言曰：治瘡當分六經。予謂即六經之中。又各有寒熱虛實。陰陽在焉。是六六而三十六也。即三十六之中。又有挾痰、挾食、挾氣者。稟弱者。曷能枚舉。人與天地。陰陽一致。天地變化。無窮。人身災患不一。豈拘拘一百一十三方。三百九十七瀉所能殫哉。王節齋曰：古人因

病以立方。非立方以待病也。斯言深得軒岐立方大意。然予今日所用之劑。和劑也。仲景謂汗吐下後而邪熱不減者。是為壞症。以小柴胡湯加鱉甲治之。予特倣仲景小柴胡例。加益元散。徹邪熱。從小便中出。鱉甲雖治壞症。又能截瘡。公曰：噫。嘻。前此諸公看病。不過曰寒曰熱曰虛實而已。未嘗有此。賤論誠空谷足音也。吾聞先生從祝令君潘去華。葦六邑會中。討究理致。又曾覽先生序大易。發序翼飛。迺知先生融三教

新都四卷

五四

而萃於醫先生之醫。得之於性命竅中。故能全人性命也。有如此。七十四
一汪氏姬。寒痰壅滯於背。胸脇腹皆脹痛。小水頻數。先與女金丹以治胸脇之痛。以二陳湯加益智仁。香附。白芥子。青皮。紫胡。蒼朮。桂枝。一帖而小水減半。次日以白豆仁。易益智仁。以枳壳。易青皮。再加川芎。桔梗。開提清氣。諸脹痛悉減。七十五

大塘徐公諱客者。其子弱冠。肌肉瘦削。尻膝腫大。

手肘肩頸皆腫。腫處皆痛而發熱。時醫有作風
 治者。有作濕痰治者。有作鶴膝鼓槌風治者。愈
 治愈重。伏床蓐。奄奄一息耳。舉家窘皇而決之
 著。操者釋策曰。易象可不死。天醫上卦。弟遠在
 東方。相去百里而遙。迎而治之。無恙也。因訪予
 而迎之治。予診其脉。六部皆絃。觀其色青而白。
 飲食少。時當長至。予曰。此筋痿症也。書云。諸痿
 皆不可作風治。病勢幾危者。以前藥皆風劑耳。
 風能傷血。血枯則筋愈失養。况絃脉迺肝木所
 主。獲前而至。是肝有餘而脾土受敵。脾為所侮。
 宜飲食少。肌肉削而執將危也。內經曰。諸痿獨
 取於陽明為治。陽明者。腸胃也。法當滋補腸
 胃。俾飲食日加。五臟六腑有所稟受。營衛流行。
 氣煦血濡。調養至春。淑氣司令。君火主事之時。
 宗筋潤而機關可利也。病者年雖少。而能聞言
 相信。懇予為治。予立方五加皮以仁其草。蒼耳
 子。枸杞子。田陽人參。杜仲。黃柏。黃芪。防風。服五
 十劑。而精神壯。腰背健。飲食加。惟間或夢遺。則

為減去杜仲。而加遠志當歸三十帖。而全安矣。
 此余初發之治也。七十六
 邵都諫老封君思翁。年過古稀。右手足麻而無力。
 不為運用。足不良於行。以六君子湯加川芎當
 歸以仁。大附子鹿角膠黃耆桂枝。兩劑便能步
 履。四劑手足強健。每隆冬必服十數劑。則精神
 加。飲食美。睡卧亦安。翁喜語曰。吾得君方。服之
 可不杖。君劑當我几杖乎。嘻。七十七
 太塘程巢父文學廼郎。謫萬里者。年十五。夏月患
 痢。族醫為治。彌月。痢並而筋骨腫痛。痛處發熱。
 晝輕夜重。肌肉消。飲食少。煩躁。醫者以白虎膠
 節風治之。病劇而形削骨立矣。又有作鶴膝鼓
 槌風治者。法愈更。而病愈甚。其家有程松谷者。
 博洽嘉聞。君子也。為巢父族大父。以余在西吳。
 治多奇中。命巢父迎予。予至診之。脉皆細澀。曰。
 此痢後風也。蓋由治痢不善。以致寒濕穢痰。凝
 滯經絡。日久氣血為痛所傷。此症虛虛實實。極
 難認。而措藥不易。欲補虛。則腫愈劇。欲疎通。則

痛愈甚。惟局方大防風湯可愈此疾也。防風熟地黃著人參白芍當歸杜仲各一錢。白朮一錢五分。羌活牛膝甘草回陽各五分。川芎七分。加姜三片。水煎服。服三十帖而愈。

按局方云。痢後脚緩痛不良於行者。名曰痢風。或兩脚腫痛。足脛枯腊者。名曰鶴膝風。併一切麻痺痿軟風濕挾虛之候。服之其効如神。余故用之。亦謂治氣血兩虛。挾風氣而成痿廢者爾。非謂可併治初起有餘之疾也。七

新都四卷

十八

五七

葉潤。至年近四十。心曠嘈雜。好啖肉。尤好鷄。一日不能缺。缺即身浮力倦。神魂無措。必急得肉。迺已。見則大嚼。及入腹。腹又大痛。痛極則吐酸水。稠涎。然後定。稍定又思肉啖也。其痛苦之態。喊叫之厲。難狀。見者酸鼻。而潤至則甘心焉。市人咸以為崇。或有諭之者曰。古云與其好肉而受痛。孰若絕肉以無楚也。久病脾虛。肉入難化。故使作痛。此婦人女子且知之。汝丈夫獨不慎。何

哉。潤至曰。吾豈不知絕肉之為愈也。蓋痛雖甚。尚能噉。若嘈雜。則遍身淫淫。蕪蕪。左右無可柰。何。手足無所把握。頃刻不能自存。有近於死。不能熬。急需肉少甦。吾豈縱口求痛哉。不得已也。迺翁延予為診。六脉大小不等。觀其色。唇紅。臉黃。予曰。據色脉。迺虫症。非崇也。予能拯之。先與雄黃丸一服。不瘳。改以膩粉五分。史君子未一錢。用鷄子打餅。五更空心飼之。辰刻下長。蛻十條。內有二大者。長尺有咫。自首貫尾皆紅。下午

新都四卷

五八

又下小虫百餘。自此再不喜肉。而嘈雜良愈。七

十九

程相如。夫令政鄭氏。孕踰七月。因食冷。患痢。所下皆白膿。腹痛後重。小水不利。兩關脉滑數。以艾葉砂仁白芍藥白朮厚朴澤瀉滑石甘草與之。痢如舊。小水仍不通利。夜更痢頻。改用當歸白芍藥各二錢。益母草酒連酒芍各一錢。滑石三錢。枳壳七分。木香甘草各三分。艾葉二分。兩帖而安。十

太塘程曉山，程松谷從弟也。客湖州，年四十，懸弧之日，湖中親友舉賀，徵妓行酒，宴樂月餘。一日，忽言曰：「近覺兩手小指及無名指，掉硬不舒，亦不為用，口角一邊常牽扯引動，幸為胗之。」六脉皆滑大而數，浮而不欬，其體肥，其面色蒼紫。予曰：「據脉滑大為痰，數為熱，浮為風，蓋濕生痰，痰生熱，熱生風也。君善飲，故多濕，近又荒於色，故真陰竭而脉浮，此手指不舒，口角牽扯，中風之症已兆也。所喜面色蒼紫，其神藏雖病，猶可治。」

新都四卷

五九

切宜戒酒色，以自保愛，為立一方，以二陳湯加滑石為君，苓連為臣，健脾消痰，徹濕熱，從小便出，加胆星、天麻以定其風，用竹瀝、姜汁三拌三曬，仍以竹瀝打糊為丸，取竹瀝引諸藥入經絡，化痰，外又以天麻丸滋補其筋骨，標本兩治。服二料，幾半年，不惟病痊，且至十年無恙。迨行年五十，湖之賀者如舊，召妓宴樂者亦如舊，其酒嗜音荒淫，而忘其舊之致疾也。手指口角牽引掉硬尤甚，月餘中風，右體癱瘓矣。癱瘓俗所謂半身不遂也。

歸而逆予胗之，脉皆洪大不欬，汗多不收，呼吸氣促。予曰：「此下虛上竭之候，蓋腎虛不能納氣歸原，故汗出如油，喘而不休，雖和緩無能為矣。」閱二十日而卒。八十一。

程曉山中風歸，而逆予胗時，其子僅七歲，中麻。呼為瘡子，姑一月餘矣，發熱如故，咳嗽聲啞，肌削骨立，頭髮盡禿，衆醫束手，舉家亦墮泪而已。余以胗曉山見之，曰：「舉家驚惶，謂此兒不保耶。」此痺症，痺因麻後虛熱而發，以大薑會丸治之。

新都四卷

六十

可獲萬全。君家初不問予者，謂予非幼科專門也。不知此持大方家餘事爾，為製藥服之，藥未盡而病瘳。松谷君語其鄉人曰：「東宿公見病而決死生，治病而隨俗為變，一秦越人也。孫真人後身非耶？」予聞之而三謝不敏。八十二。

去予舍二里許，地名曰前坑口。一婦人清明前十日發熱，頭痛，醫者以九味羌活湯、十神湯進之，不効，而又加口渴，舌黑如煤，更一醫，以如神白虎湯、竹葉石膏湯進之，亦不効，而加洩瀉不止。

人事昏沉四肢厥冷呼吸氣微米粒不進者十
四日其家為具含歛而待斃適子掃祖墓而近
其家其子聞之即告急於子懇為一脗其脉細
如珠絲予曰此疫症也合理中生脉二湯飲之
連進二服夜半神氣稍甦飲粥湯半盞次早六
脉漸見予喜語其子曰可保無事書云脉絕微
續者生仍以前藥與之至晚瀉止口不渴舌心
焦燥退精神清爽駭向安矣再用人參白朮
各五錢炮姜炙甘草各二錢半麥門冬三錢五
味子十五粒水煎不拘時服不數日而全愈八
十三

新柳四卷

六一

族太學從獻長郎七歲時患痢紅白稠粘而紅更
多飲食少形氣弱于時太學應南都試其兄從
明雅知予因逆予視視畢予曰此不可以尋常
治治也法當補從明曰語云無積不成痢故法
先推今不下而遽用補積何從去予曰足下論
者常也治病貴先察症古人有先攻後補有先
補後攻者因症投劑不膠於常也今形瘦體弱

面色青稟受大不足者飲食又少予故用補欲
使寧有餘即不如意猶可措手若拘常法下之
倘有變將奈之何從明是予而索藥即以四君
子湯加歸芍黃連山查與服三帖而病無進退
婦道間有議予非幼科專門令更請夏氏夏至
即語予先不下而用補以致遷延如是夏曰幸
不下若下今不可為叩其故曰丹溪云大孔如
竹筒者不治今肛門有竹筒狀豈可下然亦不
必補香連丸六一散可愈耳三服而痢愈頻其
痛愈甚又加惡心而神氣憊又更請汪恒春汪
至亦以香連丸黃芩芍藥湯與之痢下日夜不
可以數計飲食不入口婦道信耳謂二氏有時
名故逆迎之獨從明持議復逆予予往觀其形
神大非昔比知中氣虛極非理中湯不可用人
參白朮各二錢五分酒炒白芍藥白茯苓各一
錢炙甘草炮姜各八分肉桂三分四帖痢即減
半前方減其半料又六帖而飲食進痢亦止稠
粘雖無而血水日夜仍三五行肌肉亦未生子

新柳四卷

六一

思其故必痺疾從虛而動用如聖九以治痺病則全瘳矣。八十四

族姪孫子忠患痢於湖之東雙林腹大疾日夜行百餘次下皆紅膿狀若腐爛魚腸絕無糞痰而喊叫聲震中外由孟穉飢飽後倡家縱慾而得也一病即伏枕已十日餘矣予時寓雒城相去百里外渠叔少喏邀予往視診其脉皆緩大無力始用芎歸各五錢加人參白芍藥桂心木香黃連服四日不效改用膠艾湯亦不效大孔狀

新都四卷

六三

如竹筒物食而下不變色猶原物予思之此脾經為寒濕所傷脾不聚血故也非附子理中湯加肉桂肉蓯不可進五六帖痢始減半飲食稍進但所下穢惡仍若前狀亦無糞渠父仲珪家居聞報即徧訪徽之名家僉囑以切勿用補魚程而抵苕城微虞番款因詢近用何劑微虞曰聞用附子理中湯人參每帖三錢仲珪駭而墮篋亟馳見予潛然泪下言曰姪五旬僅此一子症危如此倘不測後將何望予曰郎君陰過奏

復何憂亦以侄只此子故殫心力相扶也仲珪曰離家而徽之名公俱囑以勿輕用補侄故魚程而來竟以補收功非叔幾於誤事吾見自今以往之年皆叔之賜侄父子何以報効予曰治疾如救焚醫家分內事矧屬在宗鄰且無德我之望又何望報第雒城之約不可失若况李鍾泉邀兵軍齋代視數日俾予得踐雒城之約庶兩盡矣而吳子疑而辭曰病者危在旦夕何孫公欲自脫手而愚我被惡聲也予聞而哂之曰

新都四卷

六四

見何鄙哉丹溪有言虛田而痢自止病者再五日可脫然矣予亦暫留即以東垣和中勝濕湯與之服七日即衣冠出市報謝四鄰吳見之而悔李鍾泉斬之曰孫公欲成爾名爾欲自沒沒也悔之何補吳繇是改容相敬令其弟遊予門彼亦納交予而稱莫逆子忠之始病也其友李鍾泉重交誼日夕省候督其僕事湯藥毋許離蛙步所下穢物腥臭不可聞皆用漆布拭之晝夜用數十觔悉其滯浣了無難色兩月如一日

也此友亦今時所希觀者因併記之以著其高
八十五

余侄元素內人季夏難產夜過半亟叩予門起而
問之為產者急矣曰然作何狀曰產已及戶不
能下用力則胸膈間有物上衝痛不可忍予思
少頃曰此必雙胎胎已分而一上一下也及戶
者在下欲產在上者以用力而上衝惟上衝胸
膈故痛也執亦險矣迺諸書如產寶良方胎產
須知與各大方家俱未論及將何以處因詳思

新都四卷

六五

其治法偶悟必安上而下始用力產也即取益
元散一兩與之令以熱蘓湯送下囑必如法飲
藥入腹而胸膈痛止不逾時產二女母亦無恙
予仲子泰來問曰益元散非產科急劑何能取
效如是予曰熱蘓安胎下氣滑石滑以利竅亦
催生之良品蓋醫者意也予亦以意裁處之耳
此法方書無載故記之以備專女科者采而用
焉八十六

有邵兄而諱馬者年五十患嘔吐吐物如爛猪肺

狀胸背脹市上諸醫皆以翻胃治之不效而反
加潮熱煩躁飲食不入口歛醫謂肺壞辭去不
治延予治之診其脉兩寸滑數左關尺澁予曰
此瘀血痰飲症也非肺壞果若肺壞聲音當啞
今聲亮而獨胸背作脹痰飲明矣此症殆
繇酒後怒發所致蓋肝藏血脾統血酒傷脾怒
傷肝以故不能藏不能統血隨氣上積於胸膈
必吐出而脹斯寬也法當消瘀血調氣化痰氣
調瘀消則新血始得歸經大本端而病根可除

新都四卷

六六

矣迺為立方滑石三錢甘草五分茜根二錢小
蘗一錢五分桃仁貝母歸尾香附各一錢山梔
仁枳壳桑白皮各八分服十帖而全安八十七
卓峰者多酒多怒人也上吐血下洩血咳嗽聲
啞族醫皆以為痰辭去不治迎予診之其脉左
關絃大右寸下半指鬱鬱如薏以予狀予曰此
有餘症也作痰治者非客有辨之者謂此症人
皆認為痰而先生獨謂非痰然何以失血而聲
啞也予曰其為人也好酒酒屬濕熱而助火生

痰。火性炎上。迫肺不降。積而生痰。壅於肺。竅。肺屬金。主聲。書云。金空則鳴。金壅塞而不通。故啞。此痰壅之啞。非肺痿之啞也。其性又多怒。內經曰。怒則傷肝。甚則嘔血并下洩。蓋血隨氣行。氣妄動。血隨之亦妄動而不歸原。故上吐而下洩。法宜清熱開鬱。化痰導血。歸原。不半月而病可瘳也。若認為瘵。而以地黃。天麥。門冬。牛膝。山茱萸之類。將甚其塞。而益其熱。聲音何由而開。血隨氣行。氣不清。血又何得歸原哉。諸君試觀之。

新都四卷

六七

予用滑石青蒿解酒熱為君。貝母鬱金山梔仁香附開鬱為臣。杏仁桔梗同貝母化痰為佐。丹皮丹參小薊甘草導血歸原為使。服十帖。血果歸原。又以貝母一兩。童便浸一日為末。柿霜等分。時時抄舌上化下。五日而聲音開。曉矣。計期不出半月。八十八

族嫂鈞孺人。年六旬。孀居已十餘年。患痢赤白俱下。腹微痛。晝夜二十餘次。嘔吐痰涎。粒米不入。口者兩月。日惟用薄白酒打鷄蛋茶飲之。肌肉

盡削。諸藥不効。予歸診之。六脉滑數。知濕熱痰火所致。以二陳湯加益元散。姜汁炒黃連。黃芩。服幾四十帖。而嘔止痢瘳。其病亦幾危矣。予為治者。恃其神存。惟神存。雖形氣不足。不食。猶可不死。此亦醫者當察也。八十九

新都四卷

六八

邵來儀。夫令眷。咳吐紅痰。或如桃杏膿色。前後心稍脹疼。兩寸脉洪滑。此痰血痰火鬱滯肺之氣道。而欲成肺癆也。治當調氣化痰。魚消痰血。清利肺金。以山梔子。牡丹皮。貝母。桑白皮。赤芍藥。麥門冬。各一錢。白滑石。三錢。茅草根。五錢。小薊。二錢。甘草。五分。枳殼。八分。四帖而瘳。九十

程玄祖兄。春瘟。食復。人事昏沉。內熱口渴。舌如焦燥。脇痛耳聾。身熱如火。僵硬不能轉動。死寢者十日。口中喃喃。蓋夢語也。城中時疫正盛。親友咸不弔慶。予為脉之。左絃數。右洪大而數。以紫胡石膏各五錢。黃芩。知母。葛根。各二錢。山梔子。枳實。各三錢。甘草。五分。連飲三劑。額上微汗。腹中雷鳴。其夜大便瀉三次。皆清水。熱仍不退。次

早脉之。右寸稍軟。前方加人參七分。又二帖而汗出熱退。身仍僵。口仍渴。耳仍聾。瀉亦不止。汗亦不收。四肢如冰。勺粒不進者已十三日。人皆以為死矣。予獨不忍棄。以人參、麥門冬、白芍藥、石斛各一錢。五味子十一粒。當歸八分。桂枝三分。黃柏、甘草各五分。後再診之。左脉已弱。咳嗽人事漸爽。粥飲稍進。迺能開目發聲。瀉已止。頗可轉身。終有生氣。後以四物湯加以仁、甘草、陳皮、白朮、石斛、百合、貝母。調理一月全瘳。九十一

新都四卷

六九

汪郎兄腹痛。嘔吐不止。城中諸友畢力醫治不痊。予為脉之。早晚大小緩急不一。知其為虫痛也。以乾姜、枳、即蒼朮各一錢。五靈脂三錢。烏梅三個。川椒三分。水煎飲之。痛吐立止。九十二
查景川兄遍身癩瘡。紅而微痒。諸君以白芷、蘇、芥、升麻、葛根、玄參、甘草、石斛、酒、苓、甘草與之。不愈。又謂為風熱。以玄參、蟬退、赤芍、藥、羌活、防風、甘草、生地、當歸、升麻、蒼耳子、連翹、服之。食類減。遍身發瘡。痛痒不可言。予脉之。兩手俱緩弱。

以六君子湯減去半夏。加白扁豆、砂仁。以仁山藥、藿香、黃耆一飲。而飲食進。四帖而痛痒除。十帖瘡疥如蛻。九十三

程王吾內人。姓已。七月乳忽紅腫而痛。洒浙惡寒發熱。而成內吹。以大瓜、萋、四錢為君。當歸尾二錢為臣。甘草、節、蒲公、公英、貝母、連翹各一錢二分。為佐。青皮、柴胡各八分。橘葉五片為使。水煎飲之。兩劑而瘳。此方治驗不可勝數。緣婦女怒鬱肝經為多。故瓜、萋、甘草為緩肝之劑。貝母開鬱。

新都四卷

七十

連翹、蒲公、英、解毒、柴胡、青皮、調氣、橘葉、引經。當歸、活血。血活氣調。毒解熱散。而腫痛消釋也。若將成膿。可加白芷。九十四
一黃氏婦。青年初姓。已及彌月。忽午夜口中啾啾。目作上視。角弓反張。裸程不暇羞恥。口眼偏邪。昏憤不知人事。問之不能言。對舉家悚駭。予曰。此風痰為怒所動。而成子癇。當從雲箕子。葛根湯。加大腹皮。一兩劑可愈也。方以葛根、貝母、丹皮、防風、川芎、當歸、茯苓、桂心、澤瀉、甘草各二錢。

獨活石膏人參各四錢水煎飲之而甦

按貝母令人易產未臨月者用升麻代之九十五

吳見南令郎心脾痛因勞倦而致每痛必得可口之物壓之立止兩腿生瘡右脉滑左脉弱以白芍藥三錢甘草一錢五分白芍藜胡麻各一

錢當歸黃柏各八分石菖蒲白茯苓各六分四

劑而痛止仍用小建中湯減去桂枝加黃柏蒼耳子白芍藜何首烏煉蜜為丸服之瘡亦尋愈

新都四卷

九十六

七二

又令郎八歲原有疳積重痛因幼科攻剋太過脾

氣不足面色青以啟脾丸為主藥用人參白朮

茯苓甘草白芍藥山查澤瀉薏以仁白扁豆史

君子薑薑雞脫皮以神麴糊為丸一料而瘳九

十七

族侄女年甫八歲腹高於胸發熱面紅咳嗽嘔吐

甚則連血噴出右關脉滑大有力此風熱羈絆

於脾肺之間而然以滑石二錢枇杷葉一錢表

芽天麻半夏麴各八分枳實枳殼防風青皮各

五分水煎服之熱退嗽定吐亦良瘳九十八

從兄鎔年近五十左脇痛手足抽搐不能步履兩

手脉俱軟弱用當歸白芍藥木瓜石斛蒼耳子

枸杞子各一錢薏以仁二錢人參牛膝各七分

陳皮白芥子各六分紅苓三分水煎飲之其夜

大便下黑血二升迺得睡痛搐俱緩改用人參

當歸白芍藥各一錢二分薏以仁四錢牛膝木

瓜石斛各八分紅苓酒苓各五分其夜大便仍

新都四卷

七二

有黑物從此精神和好寢食俱安後五日因為

怒忤且加食傷右手左足大搐左足大腿疼痛

縮而難伸伸則痛甚左脇極痛小水短用山查

青皮防已人參半夏麴陳皮以仁川芎蒼耳子

杜仲石斛以瓜萸為君服下左脇痛止右手亦

不搐矣惟左大腿內股筋痛一搐則膝抵於口

此亦事之異者因改以人參當歸薏以仁甘草

黃柏白芍藥鈎藤牛膝木通山梔子諸痛搐悉

愈口亦不渴後只以此法調理五日隨能縱步

出戶九十九

一小童上達年十六忽面大腫足亦微腫喘息不安此脾虛濕氣壅盛所致酒苓桑白皮防風葶麻子陳皮羌活升麻甘草澤瀉白朮此上下分消法也服後腫熱稍退但正氣甚虛以六君子湯加麥芽澤瀉調理而安一日因多飲食且感風寒痰涌吐逆見鬼面掉手足角弓反張唇口色黑熱極危急此癘症也以胆星半夏天麻僵蚕橘紅炙甘草枳實麥芽白朮紫蘊子杏仁煎

新都四卷

七三

胡白茯苓姜三片水煎飲之一劑而愈此後再不復發一百

族侄良詮患血痢腹痛裏急後重時師治以香連丸黃芩芍藥湯不愈腹反增痛面赤唇紅有侶塗硃喊叫之聲四舍悚駭比有太學寧字者仁心為質人也憐其家貧莫砥拉予為診六脉洪大伏於床間兩眼泪而不能言太學會其意語予曰症誠急彼以後事無措而難於言予曰諾吾能起之以生熟白芍藥六錢生熟甘草二錢

乾姜肉桂各一錢木香五分寒二枚水煎飲之

飲竟啞焉而卧太學心疑歸囑家奴曰倘有急扣門可即報我及明見無動靜迺令人覘病者何若復曰夜來痛減十之五痛減十之七早間已啜粥半盞矣太學喜而叩予曰渠面赤唇紅脉大所下皆血症皆屬熱叔迺復投熱劑吾甚恐一夜不能寐迺今疾已減半生有望焉不卜今日用何劑予曰比昨劑差小耳方仍昨也太學曰吾惑矣何視熱為寒耶予曰君知脉大為

新都四卷

七四

熱不知大而無力迺虛寒也面赤唇紅由中寒而火不能下陰盛格陽之症設是真熱腹痛其人體仰而舒寒則引而伏所下血色帶晦均是假熱寒症明矣前劑果再進而全瘳太學復書報予曰昨聞虛實真假之論非飲上池水者不能道也幸註之以詔後世一百一

一婦年三十二大發寒熱胸膈有痰大便洩瀉以二陳湯加白朮桂枝白芍藥柴胡酒苓一帖而止後因怒早晨又復發熱吐血一盞口渴汗多

脉甚數。陳皮知母紫胡杏仁丹皮酒苓白木人參烏梅青皮檳榔水煎服之。用此調理數脉漸退。惟左脉尚絃寒熱已止。喉中痰聲已定。後又因將息失宜。兩脇疼痰多嗽不易出。脉較前不甚數。以瓜蒌仁一錢半。貝母白芥子各一錢。蘿蔔子菴仁滑石牡丹皮香附山梔子各七分。青皮赤芍藥甘草各四分。煎服。血絕不來。嗽熱寢息而安。一百二

從弟婦程氏。右脇痛不能睡。背心疼。下午潮熱。胸

新龍四卷

七五

鬲作梗。痰中有血。大便秘。用大黃以韭菜汁蘆菔汁芩根汁各和勻。將大黃拌濕炒乾。再拌再炒。如此三次。以黑為度。三錢。瓜蒌仁二錢。貝母當歸山梔子牡丹皮各一錢。青皮前胡川山甲各六分。甘草三分。水煎飲之。凡三帖而瘳。再亦不發。一百三

黃懷虛咳嗽嘔吐。不知饑餓。氣逆不調。不得仰臥。左脇亦不能着席。唇曾吐紅。近又傷食。先以丹溪保和丸進之。繼以穀芽橘紅白朮枳實半夏

麴甘草蘿蔔子茯苓杏仁桑白皮將養而安。一百四

一族姊年近六十。咳嗽口渴。常吐蛇虫。用前胡知母天竺粉白芍藥當歸甘草陳皮桔梗烏梅桑白皮煎服。諸症悉止。後半年。膝灣紅腫作痛。大便秘。黃柏當歸生地紅芍葳靈僂羌活蒼耳子五加皮防風以仁。四劑全瘳。一百五

族侄婦戴氏。兩寸脉滑大。兩尺沉微。心痛徹背。背痛徹心。甚則必探吐其食。廼已。近來每一痛必

新龍四卷

七六

七日。僅進白水。粒食不能進。進則吐而痛更加。七日後痛漸已。如此者十七年所矣。始則一年兩發。又一年六七發。今則一月一發。以積氣丸治之。不終劑而斷根。一百六

老僕來興。咳嗽胸脇背心脹痛如刀。及所刺發熱。口渴。諸治不瘳。脉浮而數。此風寒鼓激痰火上湧而然。以前胡麻黃紫蘇子散風邪為臣。以瓜蒌仁治痰火為君。橘紅半夏旋覆苓杏仁為佐。枳壳桔梗甘草為使。兩劑而平。一百七

一婦生女不生子。多思多鬱。小便秘而通脹悶。不安者二日。欽醫汪氏。以備急丸進之。謂大便行。小水自利也。詎意大便行後。而小水點滴不通。脹悶益急。時刻不能存。將欲自盡。家人急予為治。予詢之曰。近來經水行否。荅曰。行過十日矣。小腹腫大。如一大西瓜之硬。自大便瀉後。疲困不足以息。執若燃眉。予曰。此轉脬病也。不急治則危矣。以補中益氣湯。臨服入韭菜汁一小酒杯。服訖。選有力婦人進房。令患者橫卧床間。

新和四卷

七七

力婦以患者兩脚膝灣架於肩上。將患者下身虛空提起。搖擺數四。俾尿脬倒上。徐徐放下。患者去衣不及。小便箭射而出。熱如湯。黑如墨。頃刻盈盆。小腹立消而愈。後遇數人。不拘男婦。皆以此法治之而安。一百八

崑池太學內人。患牙痛。一晚暈厥三次。次日兩腮紅腫。痛不可支。且洒浙惡寒。寢食廢。以清胃湯加石膏為君。白芷為臣。連翹為佐。北細辛為使。飲下。痛頓釋。然如風滅燈之速。外以明礬為末。

大五倍子一枚。將礬裝入。以滿為率。炭火上炙焦。以礬紅枯為末。不時擦牙痛處。牙痛立止。此方多効。百九

一僕婦因產難。而于宮墜出戶外。半月不收。艱於坐卧。家貧不能求藥。憂恐成痼。鄰姬為訪之。專門黃醫博氏。教之曰。此易事也。只須補中益氣湯一百帖。每帖要人參三錢。計二劑。可收也。迺夫聞言。即大伸舌謝之曰。僕家朝傭暮食。無隔宿之儲。既生蛛網者。半越月矣。安有人參二劑可服也。惟命是俟耳。姬復向予言之。且告以醫博氏之治。予改語姬曰。審如彼言。貧家則盡矣。命矣。又奚醫為。此必產時受寒。血凝滯。不能斂而收入。症雖名陰脫。未必盡由氣虛下脫也。觀其善食。而大小便如常可知矣。予有一法。價廉而功捷。三五日可瘳也。用未經水石灰餘一塊。重二三觔者。又以韭菜二三觔煎湯。置盆中。將灰餘投入。灰開湯沸。看沸聲盡。迺瀝去灰。帶熱坐於盆上。先薰後洗。即以熱韭菜於患處揉擲。

新和四卷

七八

可服也。惟命是俟耳。姬復向予言之。且告以醫博氏之治。予改語姬曰。審如彼言。貧家則盡矣。命矣。又奚醫為。此必產時受寒。血凝滯。不能斂而收入。症雖名陰脫。未必盡由氣虛下脫也。觀其善食。而大小便如常可知矣。予有一法。價廉而功捷。三五日可瘳也。用未經水石灰餘一塊。重二三觔者。又以韭菜二三觔煎湯。置盆中。將灰餘投入。灰開湯沸。看沸聲盡。迺瀝去灰。帶熱坐於盆上。先薰後洗。即以熱韭菜於患處揉擲。

蓋石灰能散寒消血。葦菜亦行氣消血。一日洗一次。如法洗之。初極爽快。洗三日。果消軟收。入此子臆度之方。初不期捷效。如是。里中聞之。咸謂此方合命。名曰賽百帖人參湯云。一百十族任孫媳程氏。雙桂翁女也。年甫三旬。產曾五胎。今則經閉不行者八年。肌肉則豐肥於昔。飲食又倍加於昔。精采則艷羨於昔。腹柔不堅。略無所謂病者。獨經閉不行。不生育耳。專科率用四物湯。玄胡索。牡丹皮。諸通調之劑。計服千餘帖。

新龍四卷

七九

矣。又如三稜蓬朮乾漆桃仁蕪木之類。莫不樂嘗。罔有一應。訪子為診。六脉緩大有力。子曰。此脾濕生痰。脂滿子宮。徒行血活血破血無益也。法宜調氣消痰。燥濕熔脂。俾使清瘦。庶新飲食不復生痰。不助肥脂。復為經水。經不期行而自行矣。若彼專科者。流局局然。養血活血破血。而欲望其經行。不亦難乎。蓋前劑皆滋濕生痰之味。非有濕痰者所宜。而肥人尤不宜用也。迺為訂一方。以平胃散加滑石桃仁黃連姜黃丹參。

南星半夏作丸劑服之。半年而經行。次年生一子。後又連生一子一女。一百一十一

熊成八官。江右南昌人也。早起行路。忽見邪火二團。滾滾而來。犬驚駭。次日腹中膨滿。漸成脹滿。面白皮薄。兩手瘦削。兩足皆有浮氣。按之窅然不起。行動氣促。形神俱弱。醫謂神弱氣促。面白肌瘦。胸腹青筋。縷縷如貫索。小水清長。形症如此。脾虛所致。以參苓白朮散投之。十日。堵然如鼓。中有一塊。巍巍突出。堅若鉄石。臍已平滿。勺粒不入。醫者復診。與渠決曰。若疾法在不治。蓋早圖歸。毋作異鄉鬼也。病者聞言。泪簌簌下。熊東溪憐而懇。予為診。脉沉絃有力。診竟。語渠曰。審脉驗症。非氣虛中滿候也。前補太驟。適有助長。顧今要兩途。遙即歸。恐未能時刻可到。即到又未必遇良手。治稍異。則大事去矣。予有一藥。尚可冀生。東溪力為之請。以琥珀中丸。日二進之。一進甚甘。再進稱快。十日腹漸寬。塊漸熔。半月塊盡消去。青筋俱歛。改以平胃散加蘿蔔。

新龍四卷

八十

子 48-168

子姜黃以仁砂仁木香調養一月。飲食大加。帖然安寢。兩足之浮亦并消釋。十一

從侄中叔太學。以暑月赴南雍。一日轉班出。索茶飲。飲輒逆流。左鼻出。茶入腹者十之三。當迺白下。名家調理者盡其人。幾一月。不惟飲茶水為然。食粥與飯亦多從鼻出。太學生平喜精潔。日與交游。皆縉紳達掖。遂以疾自慚。因告假圖治。聞京口多名醫。買舟訪之。如何。如張如團。無不謁治。然愈服藥愈病。漸加惡心。頭暈。肌肉削。四

新都四卷

肢無力。心益惴惴。亟歸就予治。予診畢。因叩所見。諸名公認何症。投何劑。中叔曰。諸君皆謂此疾。拔籍無載。治法無稽。徒端度為胃火。謂諸逆上衝。皆屬於火。故投劑非黃連解毒。即三黃石膏。梔子黃柏。知母天荖粉葛根之屬。任亦以初到白下。苦酒因酒動火。理或為然。聽其治而不違。它計也。予曰。治病貴辨明經絡。與經絡之出納。虛實明藏象。察經度。究竟夫病機病能。此扁鵲所以隨俗為變也。何常拘拘守方書哉。內經

新都四卷

有云。咽喉者。水穀之道路也。喉嚨者。氣之所以上下者也。頰頰者。分氣之所洩也。人之鼻淵涕。出不收者。頰頰不開也。子之症亦頰頰不開之類。爾頰頰不開。故氣上而不下。會厭弱而不能揜其氣喉。夫鼻與氣喉相通。惟不揜。故飲食逆從鼻竅而出。不見常人偶氣逆而飲食自噴嚏。出乎。即其例也。且右脉緩弱無力。氣虛明矣。內經云。形寒飲冷則傷肺。又曰。脾胃喜溫而惡寒。又云。視聰明而清涼。香臭辨而溫暖。子多服寒

涼。此所以惡心頭暈肌消也。予但為溫補。蓋肺屬金。而主氣。金氣旺。則收斂下降。氣下降。則飲食從氣下矣。以六君子湯加葶藶桑白皮。杏仁沉香。一進而執緩。三進而止大半。七劑而全安。以此症舊無載。故筆之以俟後人采焉。十一
程達庵四媳戴氏。產半月而腿疼。迎專科診視。曰。虛。投以八珍湯。服十日。疼益甚。予赴邑侯之召。道經其廬。達庵趨問。產後半月而腿疼。何症也。予曰。兩腿皆疼。獨一疼也。達庵曰。右腿疼。予問

疼處熱否。曰熱。予謂切不可認虛認風。此產後敗血凝滯。血海流於經絡。不急治則血無從出。久必化膿成毒。或為腸癰。今腿痛是其徵也。達庵默然而別。復迎專科。又曰風也。但丹溪有云。產後須當大補氣血。雖有它症。以末治之。投以十全大補湯。痛轉劇。大發寒熱。小腹近髀果紅腫出膿。外科又為生肌。收口太蚤。致腰俞復發。一毒腫痛寒熱如初。十日後。大潰膿而不收口。精神委頓。肌肉陡削。飲食不進。惡心怯寒。奄奄一息。爾外科曰不可為也。專科曰余但治胎前產後。今為腫毒所壞。皆辭去而不下藥。達庵始悔不聽予言。以致悞事。因急予。予往視六脉濡大無力。瘡口流清水而無膿。予曰執棘矣。不暇治疾。速為保脾。蓋五臟六腑皆籍脾土。以為養。然非大劑人參附子不可。始以人參白朮各五錢。甘草乾姜大附子各一錢。黃耆三錢。白芷桂心各五分。以其能排膿止疼也。外科猶然。曰白朮作膿。恐不可服。予曰膿不死人。飲食不入

口則死人也。急進之。四帖而神氣回。飲食進。諸症悉減。瘡口成膿。予語之曰生矣。改用參苓白朮散。調理一月而安。達庵叩予曰公何預知必為腫毒當急治也。予曰內經所謂臟象又云現症腿疼而熱。症已現矣。生於產後。非敗血所致。而何於時急為疎通。不晉經絡。何毒之有。專科不察而補。是益其毒而助之潰也。外科不審虛實強弱。槩以毒治之。奈何不使患者幾危哉。達庵曰專科之不足恃也如此。夫雖然不如此。無以見公之高矣。十四百一

醫案宜興治驗五卷目錄

徐學士檢老患腸風下血數桶後委頓而右脇極

痛有發明

吳儀制主政尚卿先生患肺經痰火症更兼鼻衄

宜興令君宋太夫人病胸膈脹痛予於左部俱散

氣無緒兩尺無神預斷不治三

吳官磨少溪先生以酒積致胃脘疼又加腰眼足

跟肢節皆疼四

宜興令君胡太夫人七十二脾洩十五年不愈又

宜興目錄

五卷

一

加吐紅咳嗽多痰痰不易出有發明

曹同府東崗先生患右脇痛予以脉知其傷風傷

食所致六

宜興令君胡鏡陽公上焦浮熱胃中食積痰飲又

因勞心動火頭面瘡癩作疼七

吳鴻源先生咳嗽口乾腹中如火滾動不思飲食

右脇痛八

吳鶴洲先生太夫人八十六原有痰火大便日三

四行夜兩起腸鳴臍腹膨脹脉三四至一止七

八至一止入皆不治予獨起之九

吳鶴洲如夫人胃脘痛百治不効目為怪疾予作

肝脾相勝之症治而愈十

曹宜崗常憂遺予語以神志不足又疝氣嘈雜食

硬喉中作梗十一

吳荆樵文學疝氣半年兩跨結核硬痛十二

吳鶴洲先生中焦有痰肺氣不足發瘧熱多寒少

口渴小水不利體倦頭痛十三

吳雪舫先生左脇下紅塊大如鷄子傍有小菩蕾

宜興目錄

五卷

二

作疼予作肝膽二經有熱毒治而愈十四

吳孝漁球泉先生心血不足胃中有痰下元陽氣

不充十五

吳思椿胸膈脹痛痰有紫色痰血十六

吳雙泉公病陽亢陰微之候上盛下虛十七

李寅齋先生患血淋小水艱澀難出發痛不可言

二年不愈十八

徐熙宇文學內眷前後心痛耳鳴眩暈嘔逆吐酸

四肢痠軟十九

湯簡庵封君素善飲致發腸風且心腎不交二十

吳仰玄先生患胃脘痛徹於背痛時冷汗如雨

杭芝崗文學酒後近內行採戰之法致成血淋二

吳中翰漢源先生腸風下血腹中微痛二十三

吳大柱史安節公脾肺二經有痰火中焦有濕熱

流於膀胱為淋濁二十四

吳宮磨少溪翁有酒積而頻傷怒致右脇之火衝

上作痛耳鳴眩暈大便艱滯二十五

吳孝漁球泉公內人痢疾後感寒而經至發熱口

車輿目錄

五卷

三

渴遍身疼等症二十六

吳西雲先生庶母筋骨無力不能起止將成痿症

蔣近思令即脇痛氣促胸滿喉疼痰有血屑下午

潮熱二十八

徐學士檢老正月食新蒜炒肉而又冒風寒咳嗽

喉疼聲啞有發明二十九

萬蕭庵先生令即發熱旬日口渴舌乾色如沉香

太宗伯萬履老夫人石脇痛咳嗽喉乾間吐紅腸

鳴洩瀉三十一

白仰雲先生令眷觸怒暈厥手足冷汗如雨氣息

微閉門合目靜坐一時始甦三十二

吳心逸先生之使患勞倦傷寒三十三

吳文學霽陽先生以積學勞心而心肺之神不足

宜與令君胡鏡陽公夫人患陰虛陽搏之候三十四

太史徐檢老向苦癩疔而妨生育有發明三十六

吳宮磨少溪翁以長君秋捷受賀過勞而傷飲食

吳別駕勉齋翁體豐腴連跌而口眼歪邪左手足

不能動三十七

車輿目錄

五卷

四

少冢宰徐檢老以賀壽而腎生痔瘡有發明三十九

宮磨吳少翁患痢赤白兼下裏急後重四十有發明

減少庚年五十飲食不順利喉管中梗而難下四十一

明新安生生子孫一奎文垣甫輯

門人 徐景奇

子 恭來 全閱梓

宜興治驗

學士徐檢老體豐厚善飲致有腸風計下血不下數桶因而委頓已卯仲冬右脇極疼痛上至耳

宜興五卷

後夜分尤甚左右不能轉動轉動則痛甚飲食減面色青閉目汗出如雨濕透衣被故不敢合睫而睡族醫皆投以香附青皮及辛散之劑痛愈甚汗愈多面愈青逆予診之兩寸短弱左關絃而搏指右關沉滑六脉皆近七至予曰據痛在少陽經分野始必動於怒木火之性上而不下故上衝耳後而皆痛也夜痛甚者蓋夜屬肝氣用事內經云司疎洩者肝也邪在肝膽故闔目汗即大出中焦原有濕痰法當調肝清熱解

毒為主魚利小便不可遽止汗而使邪無出路

今脉太數如遽斂汗是逆其木火之性不惟痛加且將發腫毒而害非淺矣內經云膏粱之變足生大疔當預防之公曰何為斂劑而謂不宜予曰當歸六黃湯內有地黄當歸黃芪皆滯痰閉氣之味桔梗亦非所宜書曰下虛者及怒氣上升者皆不可用故當慎也因以柴胡黃連為君白芍甘草天荅粉為臣紅荅連翹為佐龍膽草為使服後汗雖仍舊痛即減三之一不妨睡

宜興五卷

二

矣次日仍用前藥痛又減半第三日又服左右轉動如常飲食亦加予未至公已先迎姑蘓盛氏盛公幼時密友也家世受醫公初不急予日引領期盛到可刈枯剝朽也盛至診畢遂詰曾用何劑公出予發劑示盛盛大叫稱謬謂當隆冬之候汗多如此陽氣大洩何敢以柴胡為君喉中痰既未清又何不用桔梗當歸六黃湯前賢已試之藥置而不用是舍紀律而務野戰也即取六黃湯加桔梗以進公雅信盛迺傾心以

從速煎服之。未逾時而舊病隨作。色色加惡。左右復不能轉動。自戌而至子丑。苦不能支。有內侍語之曰。服孫君藥。雖未全可。亦已去泰去甚。彼曾言二藥不可用。何為輕犯而受此苦。宜急取孫君藥煎飲下。即伏枕。軒軒達旦始寤。命使速予至。而扣予曰。人言隆冬汗出不當用柴胡。而公用為君。何旨。予曰。膽與肝為表裏。肝膽之火鬱而不發。故痛極而汗。汗出而痛減者。是火從汗出。蓋汗迺邪出之門也。予故曰。汗不

直與五卷

三

可飲。本草云。柴胡瀉肝膽火。而以黃連佐之。內經云。木鬱則達。火鬱則發。言當順其性而利導之。執則易克。古人治火之法。輕則止治。重則從其性而升之者。以此蓋醫貴通變。如陰虛火動而汗出者。內無有有餘邪。故以六黃湯飲而降之。常治法也。今內有有餘邪。未出。遽飲降之。邪無從出。執必成毒。故變常而從治者。使邪有出路。木火之性不逆。則毒不成。而痛可減也。公曰。善哉。孫君之劑。奇正相生。不下孫武子兵法。何

直與五卷

申

輕以無紀律議之。願投劑而奏凱也。予曰。公數日後。瘡瘍大發。兩跨且有與塊作痛。此毒出之徵。公于時無恐。改用柴胡白芍甘草丹參苦參茯苓藴麥車前子黃柏金銀花連翹。服三日而痛全減。汗全收。左右不難轉動矣。踰日。公謂肌膚痒甚。藹藹然。似癩疹。豈瘡出與。欲以藥浴之。可乎。予曰。可。再三日。兩跨果發與塊。如棋子大者數枚。且痛。予業已製蠟礬丸以待。至是投服之。瘡果遍身大發。兩腿為甚。一月餘而瘡公始信予防毒之言。不謬。披懷交驩。且作序識勝期。與終身不替云。

吳儀制主政尚卿先生柱史安節公公子也。弱冠時病鼻塞。不能噴者四年。且衄寒月更甚。口渴咽喉邊有痰核。脉之右寸關洪滑。予曰。此肺經痰火症也。與前胡秦芫葛根薄荷石膏天荅粉玄參貝母山梔子甘草白藥子桔梗丹皮四帖而衄止。夜與牛黃三清丸數粒。噲之。鼻氣即通。利能嗅。噲未旬日全愈。先生初年績學。心專志

一不知寒暑致有寒衄疾又萬曆己卯庚辰罷
邑試皆首選如此者再而皆不得籍名學宮益
鬱然不適子時把臂語之曰先生何以一儒冠
為汲汲據脉科甲當不在尊君下即館中二友
亦金馬客也依愚見史先登公次之吳又次之
日後當以斯言為左券毋相忌後三公先後登
第一如予言萬曆戊戌春余應吳官詹召公暨
史王老不與前言皆為子讓玄珠序而紀其事
以見一時良遇云二

宜興五卷

五

宜興宋令君山東人也太夫人年五十餘病胸膈
脹痛予時寓吳官詹家而繩庵安節二公皆宋
公年友因二公而逆予胗太夫人脉右寸關洪
滑彈指如黃豆大左三部散亂無緒如解索狀
兩尺絕無神氣予不得其受病之源而宋公亦
不以病源告卒然問曰脉為何症予曰據左脉
為虛弱久病右脉侶又為飲食所傷必病小愈
而又傷反覆之疾也其執亦危宋公聞言危迺
拂其意貌侶不恭予見其貌即辭出至後堂有

各佐貳及學博余公在焉余公予鄉人也素亦
知醫問曰症候何如予曰不治渠謂前胗者皆
無難色公何云然予曰兩尺無神如樹無根此
難經所云也左脉散亂右脉如豆大彈指不旬
日當見果後七日而卒邑中鄉先生士民相傳
謂予能預決死生云三

宜興五卷
官詹吳少溪先生有酒積常患胃脘疼近又腰眼
足跟肢節皆痛予謂此皆由濕熱傷筋脾肺痰
火所致法宜清肅中宮消痰去濕俾經絡流通

宜興五卷

六

筋骨自不疼矣切不可作風痛而用風劑公極
然之用二陳湯加葳靈像蒼朮黃柏五加皮枳
實葛根山梔子進之肢節痛減改用清氣化痰
丸加瓦楞子蒼朮枳實姜黃用竹瀝神麴打糊
為丸調理而安四

宜興令君胡鏡陽公尊堂太夫人年七十二脾溲
十五年不愈近加吐紅咳嗽痰多痰亦不易出
申酉時潮熱胸膈壅塞不能就枕飲食大減且
惡風終日坐幔中諸醫謂發熱吐紅法當寒涼

脾洩多年。氣虛老羸。法當溫補。二病矛盾。難於
 投劑。又謂身熱脉大。血家所忌。益束手無能為
 計。皆辭去。且歸咎于長橋上拆屋。致止堂不利。
 以是前丁宋二公。接跡憂去。邑中洶洶。因延予
 治。診得兩手脉皆浮而洪數。亦皆帶滑。予曰。據
 脉洪數為熱。滑為痰。浮為風。邪在表。以傷風故
 惡風。仲景曰。當汗不汗。必作衄症。法當清解。可
 無恙也。公以諸醫二病矛盾之說為問。予曰。此
 暗於先後者也。夫脾洩已久。未嘗為害。新病熱
 宜興五卷
 熾宜當速去。所謂急則治其標也。俟邪去之後
 補脾未晚。且潮熱為風邪所致之熱。而非陰虛
 火動之熱。血迴當汗。不汗之血。亦非陰虛火動
 之血。內經云。奪血者無汗。奪汗者無血。當汗不
 汗。邪鼓血動。但得表解。熱退血自止耳。公憮然
 曰。噫。嘻。疇昔老母過錢塘。遇風濤受驚。因發熱
 咳嗽。血出痰多。今以公言質之。誠由風邪起病
 也。願以藥進。予用紫菀子前胡麻黃薄荷解表
 為君。枳殼桔梗桑白皮瓜萹紫苑貝母消痰。治

嗽為臣。酒苓甘草
 熱退胸膈不壅。嗽
 日減麻黃加白茯苓
 嗽又減半。從是不
 壳。加薏以仁調理
 曹同府東崗先生。右
 由外傷風內傷食
 肥面青。寢食俱廢
 子桂皮香附治其
 宜興五卷
 仁陳皮半夏瓜萹
 除脇痛減十之七
 宜興令君鏡陽先生
 飲。平常好食熱物
 有紅。又因勞心動
 右滑數。以玄參石
 荖粉連翹貝母各
 帖。瘡疔皆愈。再以
 木丸與服。半月

吳鶴洲先生咳嗽口乾腹中如火滾動不知飽餓亦不思飲食右脇痛脉右滑數左絃數此中焦有痰積也先以總管丸去其痰而後養脾服後大便下稠粘黃糜甚多小水如血此熱下行也繼以保和丸理脾消餘痰又使新飲食不生痰也外呂橘紅貝母天荖粉桔梗酒芩知母葛根甘草滑石服之其咳嗽亦除八

吳鶴洲先生太夫人年八十六素有痰火大便一日三四行一夜兩起腸鳴臍腹膨脹脉三四至

宜興五卷

九

一止或七八至一止諸醫不知溫補妄以平胃散加黃連山查白芍一切苦寒之劑投之尅伐太過因致腹疼顧不咎其誤但謂年高而脉數至是為凶兆辭去不治逆予診之予曰據脉書云脉緩而止曰結數而止曰促今結脉非凶脉也由寒濕之痰凝滯所致法當溫補下元俾火得以生土所謂虛則補其母者當無恙矣鶴洲公曰壽筭何如予曰兩尺迢迢有神壽徵也即百年猶未艾以補骨脂白朮各三錢為君杜

二錢為臣白茯苓澤瀉陳皮甘草各一錢為佐肉豆蔻益智仁各五分為使四帖大便實惟腸鳴未止減肉豆蔻加炮姜五分而安壽果至九十有八九

吳鶴洲如夫人病胃脘痛醫有認為虫者有認為火者又有認為痰為氣為食為虛為血為寒者諸說紛紛百治不效群然指為怪疾請予診西手大而無力皆六至予曰豈怪耶肝脾相勝之症耳東垣治例腹痛以芍藥為君惡熱而痛加

宜興五卷

十

黃柏效此法則治當萬全矣白芍四錢一半生一半酒炒伐肝補脾為君大甘草二錢一半炙一半生緩肝養脾為臣山查為佐炒黑山梔仁五靈脂各一錢止痛為使三帖而病愈鶴洲公喜曰君真能用藥神而降病恠者也十曾宜崗常多憂遺予曰此神志不足也又有症氣近加嘈雜食硬物喉中梗作疼予謂病有緩急則治有先後咽喉之症非急先而何初為清肅上焦次為補養神志俾神旺而精有主可不妄

清熱以下部之劑治其山清蒲山焦用六君
干湯加滑石酒連批把葉蘆朮香附吳茱萸
四帖重雜止喉中寬舒再以猪肚丸補其神志
遠志石菖蒲石蓮子韭菜子黃連貝母各二兩
白朮五兩枸杞子白茯苓各一兩為末入雄猪
肚內飯中蒸熟搗為丸梧桐子大硃砂為末每
晚燈心湯送下二錢治疝九橘核昆布各四兩
川椒山梔子炒黑山查核各二兩紫胡小茴香
各一兩哺鷄子壳煨三兩麵糊為丸空心白湯
宜與五卷 十一

或酒送下三錢不終劑而瘳 十一
吳荊樵文學愷悌君子也左關尺脉甚絃疝氣半
年兩跨結核硬痛予以平疝丸消之海藻昆布
橘核各酒醋炒四兩玄胡索山梔子仁山查核
小茴香紫胡各一兩龍胆草酒炒五錢醋打麵
糊為丸梧桐子大空心酒下三錢服一月而消
十二

吳鶴洲先生中焦有痰肺氣不足瘡一日一發熱
多寒少口渴小水不利倦怠頭疼脉左絃大右

寸短弱關尺滑大以石膏知母黃耆同柴苓湯
煎服服後腹作瀉前方去石膏知母邪熱減夫
半惟僅潮熱而口渴甚改以人參芎根知母麥
門冬柴胡陳皮甘草白木鱉甲五更服之而愈
十三

吳雪舫先生左脇下紅塊大如鷄子傍有小菩藹
作疼左脉絃大而數右滑大而數蓋由生平嗜
博炙以致肝胆二經有熱毒也用大瓜萋一枚
白芍三錢當歸甘草貝母各一錢連進三帖瘳
宜與五卷 十二

臧其半脇下紅成一小癩以解毒早故硬塊潛
消大毒不成也仍當為活血清熱再用白芍三
錢當歸一錢半金銀花甘草各一錢大瓜萋一
枚連翹山梔仁各八分紅花紫胡各五分四帖
而愈 十四

吳孝廉球泉先生心血不足胃中有痰下元陽氣
不充脉六部皆弱惟右關滑以遠志枸杞子各
四兩巴戟兔絲子破故紙山茱萸各二兩五味
子白茯苓人參各一兩煉蜜為丸空心淡鹽湯

送下三錢外以固陽鎖真丹助之龍齒益智仁
各一兩黃柏二兩辰砂甘草蓮心各五錢
實粉打糊為丸梧桐子大每夜灯心湯送下一
錢五分極能固精十五

李思椿患胸膈脹痛痰中有紫色瘀血其原有酒
積鬱火也脉兩寸短關滑兩手皆數先與紅六
神丸服之繼與山梔酒連鬱金香附橘紅茯苓
半夏麩甘草滑石紫蘘子服後胸膈稍寬仍以
山梔仁貝母益元散各二兩牡丹皮黃連橘紅

宜興年卷

十一

各一兩半白茯苓一兩紫蘘子鬱金紅麩各五
錢茜根三兩神麩打糊為丸每早晚白湯送下
二錢調理而愈十六

吳雙泉公兩寸脉洪大兩關滑兩尺沉微此陽亢
陰微之候上盛而下虛也上盛者痰與火下虛
者腎經真陰不足也法當清上補下上清則頭
目清利耳鳴眩暈之症可除下實則腰膝不痠
筋骨強健清上用清中丸貝母橘紅枳實海石
山查茯苓白芥子黃連黃芩滑石青黛神麩為

充食後茶送下二錢補下用既濟丹辰砂磁石
各一兩熟生地四兩黃柏知母兔絲子栝子仁
各二兩牛膝枸杞子白茯苓各一兩半煉蜜為
丸梧桐子大空心淡鹽湯送下八九十九十七

李寅齋先生患血淋幾二年不愈每發十餘日小
水艱澁難出竅痛不可言將發必先面熱牙疼
後則血淋前數日飲湯水欲溫和再二日欲熱
又二日非冷如水者不可燥渴之甚令速汲井
水連飲二三碗猶以為未足未發時大便燥結

宜興年卷

十四

四五日一行發則瀉而不實脉左寸短弱關絃
大右寸下半指與關皆滑大兩尺俱洪大據此
中焦有痰肝經有瘀血也向服滋陰降火及淡
滲利竅之劑皆無效且年六十有三病已久血
去多何可不兼補治當去瘀生新提清降濁用
四物湯加杜牛膝補新血滑石桃仁消其瘀血
枳實貝母以化痰山梔仁以降火紫胡升提清
氣二十帖而諸症漸減再以滑石黃柏知母各
一兩琥珀小茴香桂心各一錢半玄明粉三錢

海金沙沒藥各五錢茅根汁熬膏為丸每服一錢空心及晚茅根湯送下而愈十八

徐熙字文學內眷常患前後心痛每痛必面赤手心熱耳鳴眩暈即飲白湯亦停高間不下且作酸嘔逆出皆酸水五七日方止四肢痠軟無力氣逆上噯迺其常也兩手脉皆沉數左絃此上焦有痰飲故也先以二陳湯加瓦楞子滑石吳茱萸姜連前胡只壳竹茹香附大腹皮服後以橘紅半夏滑石各二兩為臣白螺蛸壳煨過

宜興五卷

十五

四兩為君茯苓姜連各一兩半為佐旋覆花一兩吳茱萸三錢為使麩糊為丸每服三錢調理而愈十九

湯簡菴封君血分熱甚以善飲致腸風且心腎不交予以四物湯加酸枣仁側柏葉槐花連翹煉蜜為丸服之頓愈二十

吳仰玄先生患胃脘痛痛則徹於背以手重按之少止痛時冷汗如雨脉溢此氣虛而痛也以小建中湯加御米壳服之而愈二十一

杭芝崗文學酒後近內每行三峰採戰對景忘情之法致成血淋自仲夏至歲杪未愈便下或紅或紫中有塊如筋膜狀或如蕪木汁色間有小黑子三五日一發或勞心或勞力或久立坐亦發訪醫問道百治不效以吳中書漢源公交善

予治之觀其色白而青肌肉削甚診其脉左寸沉弱關尺絃細右寸畧滑據此必肺經有濁痰肝經有瘀血總由酒後竭力縱慾淫火交煽精離故道不識澄心調氣攝精歸源之法以至

宜興五卷

十六

凝滯經絡流於溺道故新血行至被阻塞而成淋濁也三五日一至者科盈滿溢故耳先與丹參加茅根濃煎服小便解後以瓦器盛之以項即成金色黃砂迺用腎氣丸加琥珀海金沙黃柏以杜牛膝連葉搗汁熬膏為丸調理外以川芎三錢當歸七錢杜牛膝草根煎服臨發時用滑石甘草梢桃仁海金沙麝香為末以韭菜汁藕汁調服去其凝精敗血則新血始得歸源而病根可除矣三月全愈二十二

吳中翰漢源先生腸風下血腹中微痛脉左寸
右關滑兩尺絃大以地榆槐花枳壳各三錢荆
芥穗秦艽青蒿葛根各一錢半黃連二錢兩劑
而愈。二十三

大柱史吳安節公脾肺二經有痰火中焦有濕熱
流於膀胱為淋濁溲之前作痛小便了而不了
脉左寸短弱關絃大右寸關滑兩尺洪大六部
皆數法當先清上中二焦痰火然後提清降濁
庶日後筋骨無疼痛之患先與草薢分清飲加
宜興五卷十七

山梔黃栢滑石服之淋濁減半改以二陳湯加
山梔黃栢滑石螺螄壳木通以去濕熱而消中
焦之痰再加柴胡升麻桔梗以提清氣四帖而
愈。二十四

吳宮詹少溪翁原有酒積且頻傷於怒致右脇之
火衝上作疼耳鳴眩暈大便艱澀脉右寸關滑
數左絃數以當歸龍會九加牛胆南星治之而
愈。二十五

吳孝廉球泉公內人痢疾後感寒文月水適至大

發熱口渴遍身疼胸膈悶煩躁頭微疼耳亦
聾大便瀉舌上白胎脉七八至亂而無序此三
陽合病春溫症也時師悞以為瀉底傷寒不治
予曰病已危醫而不起者有矣未有不醫而起
者也且投三陽藥服之挑察微應再相時而動
以柴胡三錢葛根白芍藥各二錢枳實桔梗酒
苓竹茹各一錢天荅粉八分炙甘草桂枝各五
分服後但覺遍身冷如水面與四肢尤甚六脉
俱無舉家及醫者皆嘆為物故矣予獨曰非死

宜興五卷十八
候也蓋夜半陰極陽生執欲作汗譬之天將雨
而六合皆陰球泉疑信相半而諸醫聞之皆笑
去四鼓後果戰而汗出衣被皆濕四肢體面漸
溫神思清爽且索粥舉家欣欣以為再生次日
惟耳尚聾腹中大响脉近六至改以柴荅湯加
烏梅兩帖而愈。二十六

吳西雲先生庶母筋骨無力不能起止將成痿症
工熱下寒易為驚恐小腹左邊疼以玄胡索五
靈脂陳皮半夏附青皮白芍藥茯苓山梔子

煎服小腹痛減惟小水頻數改用青蒿山梔子以仁白芍藥甘草薑麥服後熱退小水不頻數獨胸膈微痛夜不欲睡再以當歸白芍藥山梔子香附柴胡陳皮甘草茯苓青蒿調理全愈二十七

蔣近思令即脇痛氣促胸滿喉疼痰中有血屑下午潮熱口渴頭重指梢冷服滋陰降火之劑不効且紅愈多痰咳不出請予診之右寸關滑大左尺亦大予謂此肺經有瘀血濁痰壅而為熱

宜興五卷

十九

也治當先清化不當先滋補以瓜蒌仁三錢紅荖紫苑丹皮枳殼各一錢滑石二錢甘草五分前胡青蒿水煎服加重便一小酒杯兩帖而熱退血止惟咳嗽未除胸膈不寬再以瓜蒌陳皮貝母蘇薑子馬兜鈴白茯苓甘草紫苑滑石杏仁調理而愈二十八

徐學士檢老以正月食新蒜炒肉又冒風寒因咳嗽喉疼聲啞翁原有痰火又為外邪所束不得發越以致此治當潤肺清熱化痰調氣以祛其

本無散邪解表以治其標庶乎喉痛可除聲音可開亮矣先與瓜蒌仁橘紅桔梗薄荷貝母桑白皮地骨皮葛根桔梗前胡甘草四帖復以滾痰丸同七製化痰丸兩帖夜服諸症除而聲且亮矣此釜底抽薪法也二十九

萬肅庵先生令即發熱十一日口渴舌心色若沉香且甚乾燥額上熱極兩脇亦熱耳微聾曾未有汗亦已下二次熱不少除小水絕少神昏足冷飲食不思市醫投窮迺告急於予予診之左

宜興五卷

三十

脈中按數而有力右脈軟弱據症為陽明少陽并病也當以柴葛湯清徹其熱者汗有無再當機而處柴胡五錢葛根三錢白芍藥石膏各二錢人參升麻天荖粉各一錢粉草七分水煎服之次早診數脈稍緩熱稍退舌齒仍乾小水利神思尚昏沉改用柴胡粉草天荖粉黃芩人參白木茯苓滑石木通澤瀉下午又覺微熱面赤額上痛且重即以益元散三錢服之大便行一次溏而色黃熱仍甚面仍赤服前藥後小水

去二次再診之。寸關脈將和。兩尺尚洪。大廼知邪熱在下。焦惟利之而已。再與辰砂益元散五錢。口渴稍止。齒下盤雖潤。上盤仍燥。神思昏沉。睡而不醒。睛彩不與人相當。又知熱在心包絡也。宜用陶節庵導赤散二帖。而神清。惟小水尚欠利。以四苓散加酒連麥芽木通煎服。再二帖而諸症悉退。飲食且進矣。三十

大宗伯萬履庵老先生夫人。右脇下疼。咳嗽喉乾。間亦吐紅。或一碗。或半椀。腸鳴洩瀉。年六十外。宜興五卷

宜興五卷

二一

石因頭風。瘵目。性急躁。左脈絃數。右滑數。以瓜萹仁二錢。黃連前胡桔梗枳殼橘紅貝母白茯苓各八分。甘草五分服之。次日紅仍不止。惟脇疼減半。改用山梔仁牡丹皮香附貝母甘草瓜萹煎死滑石水煎服。方欲覓真鬱金。苦不能得。唐凝庵老先生廼夫人婿也。偶至聞之。應教曰。有取磨三分用煎藥飲之。兩帖而紅止痛。廖。十一

曰仰雲先生令春。每觸怒即暈厥。必閉門合目靜

坐。不番一人在房。手足皆冷。汗出如兩。氣息俱微。越一時許。甦如常。原以頸生癰。瘰。多服女醫草頭藥。及專科用斑貓等毒。因而脾胃損。元氣虧也。年三十八。曾未生育。每日令二婢不住手敲兩腿。俟其熟睡。廼已。不然則睡不安。晚至二更後始睡。夜半心多驚跳不止。指甲皆無血色。經將行。小腹先疼。二日色紫。有塊。諸病雖如是。而肌肉飲食。却如無事。人百治不效。慕予而請診之。兩寸短弱。左關大而有力。右關滑。左尺滑。宜興五卷

宜興五卷

二二

右尺沉微。據脈肺氣虛。肝木實。胃中有痰之症也。用六君子湯加丹參酒連青皮。外與珠母丸及獨活湯。二方調理而安。二方出醫學綱目。十二

吳心逸先生之使。患額疼。口大渴。身大熱。汗多。胸膈痞惡。心昏沉。先與柴苓湯加枳殼桔梗熟減大半。次日以六君子湯加黃芩白芍藥當歸調攝而愈。蓋勞倦傷寒。以致虛極。而邪未散。故宜先散而後補也。三十三

吳文學霽陽先生篤志士也。以積學勞心。又有星士以已卯決科許者。其星士前許歷歷有驗。至期瘡發。不能終場。遂心憂而成顛狂。日間或悲或歌。或鼓掌。或頓足。甚則罵詈不避親疎貴賤。迺叔邀予視之。面白而青。脉兩寸短弱。關絃右關滑。兩尺平。予謂兩寸脉既短弱。此心肺之神不足。志願高而不遂。其欲鬱結。不舒津液。生痰而不生血。又攻痰。尅伐太過。心神愈不得養。故昏亂而無所攝持。內經云。主不明則十二官危。

宜興五卷

二三

按此則治宜補養收斂心神而兼之清痰可萬全也。用酸棗仁人參茯神小草丹參當歸以補心安神。黃連竹茹以清肝胆之火。玄參佐之外以龍齒珍珠鈴羊角牛黃胆星天麻青黛辰砂全蝎冰片黃連甘草膏為丸。金箔為衣。調理而愈。

三十四

宜興令君胡鏡陽老先生夫人夜間熱口渴。經行過十日復行。小腹痛。兩寸關短弱。兩尺洪滑。予診畢。語曰。此內經所謂陰虛陽搏之候也。可預

防之。以川芎當歸條芩蒲黃白芍側柏葉生地荆芥進之。下午熱甚。口中氣如火噴。血下如傾。內有紫塊。小腹仍痛。迺用川芎二錢。當歸四錢。地榆香附各一錢半。黃芩一錢。蓮蓬壳一枚。燒灰煎服。兩帖而止。

三十五

太史徐檢老向為癩疝所苦。而妨生育。辛巳孟秋。有江右陳嶺泉者。以是症為專科。寓蕪錫。翁延而治。謂將爛藥煮竹片夾陰囊。俾囊爛。見子。又以爛藥點開腎子。使其中蓄積臭水潰出。然後

宜興五卷

二四

用生肌藥長肉。收功。翁以此治與道中諸友商之。無有勸者。而謀於予。予曰。翁疾非常。則治當非常。治也。陳能為翁治於外。予當佐陳補於內。內外兼治。必可成功。翁因子言而決用陳。是時予有湖州之役。而陳用其術。治一月。囊爛子開。洞見水泡。第不能使泡破。水出也。由是胸中氣滿。汗出如流。終夜不寐。飲食減三之二。面青肌肉瘦其半。形氣弱而大便艱澀。腰腎俱痛。苦不可殫述。將令人急予。予適自湖州至。荆溪主

吳少溪公家。翁時社門謝客。聞予至大喜。而促予診脉。兩寸軟弱。右尺大。右關滑。予診畢。曰。向許佐陳治內。今其時也。比陳技已竭。而水不得出。翁又難於痛。業已用收口藥矣。予曰。無傷。痛由元氣虛憊。而汗亦因痛來。汗去多。則心血不足。心血不足。則神失養。故不寐。脾胃為痛所傷。故飲食減。今只大補血氣。不惟痛止。疾除。即水泡亦可出也。陳謂用補收口生肌。或可使泡出水。或未必然。予曰。三日後當自見。翁曰。補甚善。

宜興五卷

二五

素生平不能服參。何。予曰。翁體非昔比也。脉症皆可服。又何憂。迺用人參黃耆各三錢。當歸白芍石斛各一錢五分。陳皮貝母紅荅粉草各八分。飲下即睡。次早汗飲。且索粥。胸膈頓寬。連服兩日。痛減大半。飲食頓加。精神亦爽。迺陳恐予奪功。私譖之曰。孫君之藥雖善。但非外科所急。服之恐生肌收口後。而水終不得出也。翁謂必如何而後可。陳曰。當於前藥加羌活防風白芷。速志減去石斛。則外內兩得矣。翁然其說。且服

其藥。飲未半。而痛立至。汗立出。頭熱如火。氣二上升。夜竟不寐。種種病復矣。亟索予劑。予知陳之忌而行譖也。迺宣言曰。予寔佐尔成功耳。尔何自敗尔。知翁之痛乎。元氣虛而毒藥凝滯。故補而助之。活動其血。則毒藥自行。藥行則泡可潰。水方可出。翁之謝尔。已有成議。予雅善翁。來者為義。非為利也。鄙見與尋常較不牟矣。陳聞言而語塞。亦以投劑無功。遂乘机而聽予治。仍用前方。加酸枣仁枸杞子皂角刺各一錢。兩帖

宜興五卷

二六

而泡潰。出臭水五六椀。囊隨消瘡。陳拊掌曰。今而後知用補之神。其老先生之福也。太史受補自此始。三十六
丁酉冬。宮詹少溪吳公。年七十二。以長君秋闈之捷。應酬賀者過勞。過飲。又傷於大肉。市醫絜用消導之劑。投之。漠如也。反加內熱。常州張氏。荆溪縉紳。大家恃為鎖鑰者。至則謂公高年。過勞消劑峻。而致內熱。用補可愈也。因投人參。則右脇脹痛。晝夜難支。張又謂補法不差。惟少行氣

之味。故無功耳。於前藥加木香砂仁辛熱止痛之劑。蓋嘔吐不止。脹痛轉劇。而大便燥結。張不自咎。不認病而誤投。迺遍語縉紳相知曰。吳少翁。老年鬲食。非其所宜。丹溪復生。無能為也。必翁聞予在茗而急予治。予兼程而往。至則錯之念一日也。診其脈。左絃右滑。兩手皆數。且搏指諦視其色。神藏氣固。惟肌肉略瘦。手心甚熱。予曰。此內傷症。非鬲食症也。公曰。諸君言吐而大便燥結。食不得下。非鬲而何。予曰否。公原不熱。不痛又不吐。由誤飲藥而使然耳。書云。通則不痛。痛則不通。大便既燥。而用補非也。經曰。食不得入。是有火也。尤用辛熱。非之非也。以是而治。譬之以油救火。益令其熾爾。予見與諸醫不恠也。即與琥珀調中丸一帖。其夜脇痛稍緩。次早診之。脈仍如前。予決謂非通不可。即以龍會丸與調中丸兼服之。五日內。下黑糞十五六次。諸症悉減。飲食大進。改以保和丸調中丸調理。念七日。公即能中櫛。元旦命庖人治酒。榜人臧舟。

二十七

拉予泛於南門。持觴為予壽曰。與兄別者十六年。不憚勞涉險。而赴吾急。自今以後之齒。皆兄之賜也。敢不銘心。為驩竟日。至穀日。予迺別而復之茗。三十七

別駕吳勉齋翁。體豐腴。嗜炮炙。任性縱慾。年六十。七。極躁急。一日跌傷其齒。恬不為意。閱三日復跌。亦不為意。復跌之。次日晚。左手足忽不能動。口眼歪邪。陸懷南先生。公通家友也。即往診之。語公諸郎曰。此中風也。治不可緩。急取牛黃丸。進之。諸郎皆有名。博士弟子。延予為治。診其脈。左洪大。右緩大。觀其色蒼黑。神昏。鼻呼。呼長而吸短。呼至口。氣嘔。嘔出不能回。終日僵卧如醉。人不能動。陸曰。此非半身不遂乎。予曰。症候甚惡。不特半身不遂也。半身不遂者。中風已過之疾。其勢仍緩。亦有十餘年無恙者。今纏病。執便若此。迺中風之漸。方來且不可測。陸重厚長者。所詣亦精。聞予言。當下了然。即與予商確用藥。始以六君子湯加全蝎。姜蚕。天麻。與之。兩日。神

二十八

氣仍未清。猶昏睡。猶呼吸。口邊嘔。然。間作吐。粒米尚不進。前藥再加竹茹。又兩日。神始甦。欲言而舌難掉。嘔。不能出諸口。前藥又加石菖蒲。遠志。紅苓。始能進粥數口。日計亦可茶甌許。夜與正舌散同前藥飲之。又三日。能坐。粥亦頗加。惟言尚蹇澁。欲言以筆代口。寫我左手甚痛。大小便艱少。又用四君子加陳皮竹茹當歸芍藥紅苓鈎藤天麻。服三日。神思大好。飲食日加。以是方調理。弥月。手痛減。稍能動。足稍能伸。

宜興五卷

二九

扶起能坐。且能自按譜鋪牌。語言十分清。至八九。駭。有萬全之望。惟大便有七八日。或十餘日。始一行。予曰。此血少之故。補養久。當自全。幸無它用。而速害。公常自言。吾疾痼痰在。曷間何能得一吐為快。此醫家有授之言也。予曰。公脉大虛。非餘痰為害。况今以補養而漸安。此其明驗。何敢輕試一吐。願寧耐靜。俟毋涉險為也。此戊戌九月念五。予以是日。別往茗城。別不及旬。公復傾心。而任張甲。張大言曰。公病可吐。蚤吐

蚤愈。諸即君始信予言。持議不可。彼曰。公病痰也。不可不吐。吐後而補。可全瘳。而無後患。不然必成痼疾。公欲速効。決意吐之。諸即君不能阻。一吐而煩躁。猶曰。吐不快耳。須大吐始可。再吐而神昏氣促。汗出如雨。立時就殂。可嘆可嘆。三十八。

少冢宰徐檢老。以萬曆丁酉三月初旬。往賀長興。臧老夫人眉壽而發寒熱。臂近肛。硬處生一毒。紅腫而痛。坐卧為艱。因歸荆溪。訪治外科。即以

宜興五卷

三十

鏢針點開。搗藥線於內。塗以爛藥。使膿血急潰。又於瘡口上。以生肌藥敷之。使易收口。可受謝而去。未半月。其傍之硬處。又紅腫痛。寒熱交作。幾於成膿。以前醫有功。遂復延之。至則又以向者之法治之。受謝而去。迺醫通患。通針而通搗藥。計其患者凡八遍。計其醫之更者。如張如魯如馮凡八人。有陳外科者。則總其中。而受謝獨多。其時則丁酉三月。至戊戌八月。幾年半矣。於時予赴吳。少溪翁召。因知翁在葦。亟往謁於卧

榻間翁見予至悲喜交集備陳其歷病之由針
 刀之苦伏枕歲月之深輒為痛心予聞之亦為
 酸鼻諦觀其色則青慘脰其脉皆濡弱把其手
 足則冷如冰問其飲食減平日之六究其所服
 之藥則視角黃栢生地涼血解毒之類予駭然
 而語翁曰此痔瘡非痔漏也痔漏當用掛線以
 五灰膏點之可愈今腫硬無定處離肛門且遠
 况其初有無硬塊硬塊由搽藥凝滯中來諺云
 剝肉做瘡者非耶假令非翁稟氣厚胃氣壯安
 能六十以外之年而當此剝削哉初只可大補
 氣血即有毒只宜托出一膿而愈未成者使活
 動消散不復生毒此王道之治不勝於針刀萬
 萬諸君之治如避影者不知息陰而急趨以求
 避則影益速而氣促救矣自殆之道也翁初不
 逆予者以非外科至聽予之論幡然有悟又見
 玄珠集有外科二卷益信予之善外科而聽予
 治予即以十全大補湯進之四帖而飲食加手
 足暖大便艱澁百方潤而不能行者今亦通利

而肛門如不知也諸外科猶嘵嘵議補非是予
 極言排之翁惟予為聽予以何首烏四西人參
 枸杞子黃耆當歸熟地各二西視角秦艽各一
 西蜜丸服之不終劑其腫處少出膿而全瘳傍
 亦不生硬塊益信向之硬塊為搽藥之毒所致
 也翁喜為謹曰予病非孫君諸外科視我疾為
 金穴其取寧有已耶呵呵三十九
 信唇吳少翁患痢赤白兼下裏急後重市醫治半
 月後重不除飲食漸減最苦者下午發熱嘔吐
 迺遣使往荅招予予聞狀心怖即涉險而過大
 湖一晝夜而至荆溪翁卧榻已二十日觀其色
 唇紅面赤聽其聲微弱不揚但一西語氣即不
 接續下午潮熱至丑方退形神俱弱脰其脉兩
 手俱大而無力右關略滑予曰據此迺虛實實
 實之候不足中之有餘也治當補養兼清兼消
 緩以治之庶可無恙公深然之以四君子湯加
 白芍藥黃連山查滑石陳皮柴胡兩帖而潮熱
 除嘔吐止去柴胡因口渴不止加葛根六劑而

飲食漸進血亦止。惟白膿不除。改用人參白朮各二錢。白茯苓白芍藥當歸神麴各一錢。酒連陳皮澤瀉各七分。滑石山查各一錢半。外以九劑消息盈虛調養半月。則神氣回而飲食大進。肌肉漸生矣。少冢宰檢翁問曰。諸醫先謂老年痢非所宜。又嘔吐飲食不進者。謂之噤口。且身熱脈大為痢所忌。公不旬日而收功。豈諸醫稱審之忌皆幻妄哉。予曰。諸君所言皆至言也。第非因時制宜耳。愚見以脾胃廼五臟六府之君。

宜興五卷

三五

廩。故曰納穀者昌。又曰人身之內。穀氣為寶。子姑舍痢不治。而先開胃口。俾進飲食。使新糲粕將宿穢壓下。若見糞則後重除。而痢易愈也。然又相其机宜。若食入而腹脹作痛。又量執畧與疎通通後。或氣虛下墜。又因執而畧與升提。大抵以理脾胃開胃進飲食為先。此亦遠交近攻之策。日雖多功可萬全矣。斯僕一得之愚。屢試而屢驗也者。設不先開胃口。不審老弱不揣緩急。一槩治痢。雖有得。未必無失。豈勝笑哉。公曰善。

四十一

減少庚年五十。每飲食胸膈不順利。覺喉管中梗梗宛轉難下。大便燥結。內熱肌肉漸瘦。醫與五香連翹湯。五鬲丁香散。諸治膈之劑。嘗試之不效。時予方有事於先塚。久未遠出。減則不遠千里而就予治。觀其色蒼黑。目中神炯炯不眊。惟氣促骨立。予知其有机心人也。其脈左絃大。右滑大。予謂之曰。據脈廼謀而不決。氣鬱成火。脾志不舒。致成痰涎。因而血少便燥。內熱肌消。張

宜興五卷

三四

鷄峰有言。鬲廼神思間病。即是推之。子當減思慮。斷色欲。薄滋味。絕妄想。俾神思清淨。然後服藥有功。不然。世無大丹。而草根木石。何足恃哉。子既速來。予敢不以肝鬲相照。茲酌一方。頗妥。歸即製服。但毋輕示人。恐見未精者。妄為加減。敗廼事矣。慎之慎之。減曰。謹如教。其方用桂府滑石六兩。炙甘草一兩。真北白芥子。蘿蔔子。射干。連翹子。各一兩半。辰砂五錢。以竹茹四兩煎湯打饅頭糊為丸。菜豆大。每食後及夜用燈心

湯送下一錢半。一日三服。終劑而病如失。四十

醫案小引

生。子曰醫案者何。蓋診治有成。効劑有成。灑曰紀之於冊。俾人可據而用之。如老吏斷獄。爰書一定。而不可移易也。醫家有案。夥矣。或寐察數語。而灑不備。或帶悅其辭。而於治法無當。何案之與。有嘗竊慨焉。余雖舉生平所偶中者。筆之。著其症。詳其脉。備述其治。灑與藥之。君臣佐使。令之寒暑溫涼。色之青紅黑白。悉次而畢。錄者固以識余臨病不

苟投劑不妄以一得之愚就正有道亦以俾我後人工是業者一展卷間較若指掌可尋而從事矣此予之意也觀者諗之

引

二

醫案凡例

一 是集不以症彙而以地彙者以治之先後為次第也欲觀者易於檢閱故以各症病名先註於目錄之下

一 是集每症只蒐其可為定式者錄之為成案而於症同治同者刪之不錄懼繁也

一 是集有姓氏有名號者此據實以錄之而不列名號姓氏者以其人當之諱或婦女之隱疾不可不諱故不敢以薄道自處爾

凡例

一 家君治奇中者多而積稿頗富皆以年久而啣於虫鼠今之梓僅十之二三聊以識家君之苦心也同志者加目於此亦可以槩其生平

一 是集所載有方語有俚語有誇說不遜語皆病家一時激獎之談故并書之非不肖兄弟敢為誕而張皇也觀者鑒之

一 目錄之下有發明二字者或發明其症或發明其治或發明其時令或發明其經旨或發

明其性情或其人偏迷不從治理而罕譬曲
喻誘掖款動之者故著於目錄以便觀者亦
以識家君因時為變之一班也

一家君生平為縉紳鉅閥學士通人相延致而
折簡相報者甚夥迺以歲久而僅什一於千
百爾因檢附之梓以徵一時之良遇

凡例

二

孫東宿先生小像



像

孫東宿先生像贊

炯然其眸飄然其髯是常入龍宮而探石函耶
隆冬不寒曰三秀草滄海可田思邈不老

吳郡太史檢庵徐顯卿題

君貌昂藏君心孔良龐眉美髯玉質金相威
儀挹之而神采煥發談吐纏之而道術彰彰
蒐岐軒之秘而洩其心髓補張朱之闕而訂
其雌黃撥玄珠于赤水蜚玉屑于青縑緒餘
渺論醫案流芳十三篇不待專美晉春秋安

能擅場是用儒紳傾仰久矣懿范垂光

將樂大令表弟汪文璧題

諸縉紳名家贈文

贈太醫東宿孫君序

蓋士君子有濟世之心者必託經世之術以運之遇不遇無論也何也得時而駕則宇內之休戚利害隱然共之視其患若切於身之疾痛疴瘵不措之安全不止此士君子之心得位以行之者也不幸不獲遇澤不及物而心不得施有志君子往往懷其道而隱於醫故是昔人謂濟人利物無位者不能惟醫以救死扶生為功故

序

業之者可以推不忍之心及於物而於道有益有味乎其言之也然醫豈易言哉吾聞其宗旨自內經本草以來書之藏於有司者一百七十九家非博通鉅儒超悟上哲顯攻其業何能探討洞明其陰陽寒熱靜燥虛實消息盈縮之奧而措之行事夫人之待命於醫生死攸係廼以未諳淺薄者嘗試之其不賊人之命者幾希醫以濟人至於賊人可不畏耶此醫之所以難言也余頃多病謁告山居嘗嘆濟物之衷未措於

用顧思延醫以求濟其身然而醫之良者苦不一遇也廼壬申秋仲吳君柳溪譚新安海陽有孫君東宿者醫可謂稱良矣余亟請而相印證之耳其論瀕瀕乎素難之旨而表裏夫張劉孫李丹溪伯仁諸家其視余疾也未投藥先譚余之經絡色脉機能與受病之自即勿藥而余病爽然若失及詳察其端方之度沉著之思淵淵之闡奧則杳焉莫竟其涯非所謂深於道而隱於醫者耶余因詰之曰神農嘗百草先天而命

八序

上

之藥黃帝岐伯後天而著之經此天以神授聖以神符不可及矣嗣後若和扁華佗淳于意仲景思邈河間東垣朱滑莫不簞耒化機制人命於掌上術亦神也何今之事是業者不能踵其芳躅耶抑世代之不同也孫君勃然曰古今人非不相及用心殊爾宋儒有言古之仕者為入今之仕者為己不佞亦謂古之醫者為人今之醫者為己道不同而受病一也夫士君子之視天下與吾身血脉相通天下病若痼瘵之切

身天下安則愜然而無恨雖以道為藥石者其濟宋以醫為道術者其濟狹其心一也故古之醫也以救死扶生為心其業專而用方也慎專則精而造詣入室慎則審而投藥奏功此和扁諸名家所以悉臻秘妙稱神奇今之醫則異是也將以市利非以濟人黃岐以來諸書非不剽竊以資口說迺其心則寔胡越一膜視天下率以利之盈詘為心之重輕人之濟與否若與吾術不相關此何以比古人而接其芳躅哉不佞

序

三

奎何能造古賢哲之闡奧第無愧於此心爾余聞而喟然嘆曰孫君克是心而行是術其將大有裨於時矣雖隱而亦顯也因次其語而歸之爰以訂夫業是術者是為序

皆

萬曆癸酉中穉日吳江孫質庵從龍敬書於符丸草堂

贈太醫孫君東宿序

夫人間世操生死之柄者在上有兵官刑官而在於下者有醫然一獄之決即不得其平非旦夕死也必省於恤刑讞於大理罪當然後議死非若醫之傷人在呼吸間也將不知兵三軍之命懸於呼吸然兵不常用非若醫之日視疾也故醫之責為尤重神農嘗草木軒轅岐伯作內經彼皆所謂醒神賢哲也然必身親為之誠重人命也醫果小道乎哉後世若東垣若仲景若

序

四

丹溪櫻寧諸人其術雖不逮和緩倉扁然其心專用生人為務故所治輒有功古今稱良迺若輒近之醫其心本不務生人惟借其名以罔利生平於軒岐之書未一觸目其臨病不能察人陰陽寒熱虛實之變而命藥閣於君臣位使之宜用方書之活套僥倖於一生以斬人之利而患者之安危畧不芥蒂於心人死則歸怨於天命之不可為嗟乎嗟乎其兵人而不割及者耶其操藥餌以行賈者耶若而人皆新安孫君東

宿所羞者矣孫君術高而心務生人余雅聞其名尚未識會見子痘迎群醫診視平時皆稱專門者至此人人縛手顧余曰不可為矣奈何余因悲泣而孫君適至撫我曰無為若狀可生也遂授藥諸醫或目味之或駭異之竟起死而迴之生症屢變亦屢更劑莫不奇中諸醫慚而退自後家人有疾輒迎孫君治亦莫不奇中者余竊觀其治疾也食不甘夜不卧沉思以求病之自翻閱素難諸書以稽治之方其心之務於生

序

五

人也如此亦無論富貴困乏而此心無不周洽也其處季世而存上古賢醒之心者耶問語余曰少遊括蒼遇一道士與譚數日兩相驩也因授異方一編是時以少年喜遊間僅錄其半還之今悔恨無及矣與靈醫之遇長桑君不相類哉雖然孫君之心務生人即不道士遇其術固且良矣 肯

萬曆丙子六月六日歸安鄭明選侯升甫頓首拜 譔

醫說贈孫君東宿

昔韓愈論大道以為原遠而未益分故子夏之後流為莊周夫道猶菽粟也豈以久而美稗乎哉余念非道之救也求焉而失其原者救也醫之為道也亦然醫自神農黃帝岐伯開其先和扁倉公繼其緒其所以究草木金石之味明陰陽寒暑之變察盈虛消息之候辨浮沉遲縮之宜而著之書者由其心欲使天下萬世措痼癘於安全迴天瘡於綿永而贊化育之所未逮也

序

六

道何宏遠而心何仁愛哉胡今世事此業者不若是也高者拘泥方書詭焉以自矜卑者竊人殘喘溷焉以規利視聖神之教大謬戾矣無恠乎記禮者卑其術不得與士齒也新安孫君東宿挾醫道而遊西吳余初未之識也秋日病風始一遇之繼而見病疹婦病姪獲與朝夕處焉余私視之其遠覽之識慈祥愷弟之心殆思挾聖賢之秘密拯斯世之痼瘵者乎其深於道者乎何也余見其不疏節於賢士大夫而亦不驕

色於傭夫野老其爭致於閭右豪閥而亦不辭召於窮櫛節屋或肆談名理或雅歌投壺或射覆角奕或六博歡呼苟有間即正襟危峙而黠然思戚然念默又然潛究也徐叩之則曰治某疾求其症而未得也或曰貧無力者需我以生而未及赴也或又曰強有力者籠我以利而不以禮致也既切然於眴視調燮之餘而又能脫然於執利得喪之外世之業者皆失其原而流於偽孫君獨臻其妙而衍其傳孫君其深於道

序

七

非耶或曰孫君少業儒以不就而思其次因業醫余曰此以跡論未得其心也孫君心存濟物託之醫以行其所欲故名奎而別號東宿夫奎木神也為春為仁為愛知其名則知其心矣孫君將儲一己之精神以康濟斯世而禪天地於太蘇乎不然吾又不敢謂知孫君也孫君聞而嘆之曰斯言豈知余哉醫道亦昭昭矣因葺其說而貽之并以告業是術者毋失而流於偽萬曆紀元端陽日大中丞歸安沈桐頓首拜書

贈孫太醫東宿先生序

余齒甫及幼無祿先母見倍時夏六月也是年
月嘉平遂事繼母以冲齡未開禮教因失愛焉
洎長即盡禮善事終莫能得父母心而承其驩
因出五湖授童子書不受妻子之養者三百有
七日宵晝驚怖號泣饒寒困苦遂成脾疾每一
勞神一飽餓一寒暑氣鬱即發發則胃若剗剗
四肢百骸痲甲不能展尺寸已則流兩脇間脹
急朴之若鼗鼓不堪撫摩客春雪大如掌新安

序

八

孫從周君為余社友携觴峴山上興劇賦四十
韻浮太白炙酥餅故態復萌而大嚼不知其勞
也果甫曙遂發日惟以悶目為快百醫皆藥以
香燥痛益甚間一醫輔以山梔雖少有生氣然
亦不能起也東宿君為從周諸父聞而視之曰
此心脾肝三火熾結不可解急瀉之且曰木為
智慧官可達不可伐伐則損智余笑曰惟求瘥
即純魚甘心違恤其它二越月始能中櫛東宿
君知余貧不受一錢終日與論名理或六經子

史言皆昭徹無齟齬嘗自言曰凡存心愛人者

固無不愛而榮獨先之又曰王者簡拔士庶賢

者優焉君執獨人也而又賢王者之所亟也醫

存王者吾何忍於君哉余曰狂生可稱賢耶君

曰狂非賢仲尼何思余曰孤臣孽子古人稱為

疾疾余不得於親而疆年病脾信疾疾人也智

愚惟係於君余請嘗試之君曰吾將成君之德

慧術智矣因援筆書之以志孫君恩德

萬曆丙子季春之吉吳興紅蓼灘人鳳岡孫梧楨

序

九

晉拜書

新安東宿孫君贈行篇什序

夫醫仁術也君子每寄之以行其不忍之心者也欲行不忍之心故於病者當軫其念而存亡生死之矣夫何世之業是術者不挾之以矜人即借之以罔利視人之疾疾若與已不相關術雖仁而心則忍矣東宿孫君不然君新安名閥性曠朗超異於古人之言無不讀讀無不得古人之神髓而消融其糟粕也頃自海陽而來雪上延君之舟啣艦而至余企而慕者幾年始得

序

十

遇遇而覩其儀容偷然塵俗外人也及見其診視病之且亟者詳察沉思必求其故而後投劑劑板輒効始而病家專門名家環左右各擅其奇各逞其說君畧不為顧惟以病者為兢兢已而揖衆嘆曰藥求濟人不求濟談空談不如見之行事之為真也時有干時譽而濫冠帶者厲色而遽言諱之君漠然不與校而病起矣復曰多士久留此為覲功而受糈也吾一旦而收之非人情哉拂袖而去人益重之而我吳上大夫

爭相欣慕曰之人也之德也其寄之醫而行不忍人之心者也此非族醫之矜人而罔利者也所至皆禮為上賓今於君之行而各為篇什以贈藻之家多德君已有贈矣而又為之序云

西吳懷玉潘玄藻拜撰

序

諸縉紳名家贈詩

贈太醫東宿孫君二首

此日孫思邈醫功更有神嘗遊五岳遍視見一垣人采藥山雲裏投丹江水濱短轅時出市隨路擁車塵

恠尔有僊風翩翩到雲東能行洗臟術共識美髯公方授臨菑里穀騰號國中文園今病渴何以潤衰翁

東宿君嘗徧遊天下尋名師者十餘人受禁

詩

十二

方者不可勝數來吾嘗上有氣絕一兩日者能活之往往著奇效故句有臨菑號國之語云

潯陽山人董份

太白山頭綴紫霞馴龍只愛聖童家翠微宮裡動清問夜勅昭儀促駕麻

曾逐僊人飲上池至今衿袖尚淋漓相如茂苑如相識不乞金莖露一卮

塵尾風清拂美髯博山雲裏譯楞嚴藥王尔是

前身在深院雲卷畫捲簾

紫藟岩頭雲不開黃庭榻下繡烟苔松濤忽湧

山風勁知是山君賣杏回

採藥歸來月滿筐碧桃朱杏對蒼蒼竭來勾滿

慙僊吏却向安期問禁方

萬曆壬辰冬日海陽令祝世祿為孫生賦

觀我生觀梅也非易之所謂觀我生也生生子

山居十九市遊十一子令休時生生子携手軸

索書為書舊作山居陰歸之已而過汪虞卿虞

詩

十三

卿為作梅歲丙申過白門訪鄭侯升侯升因見

虞卿所寫梅為書見梅舊作二首而生生子愴

然有感於其尊人之夢蓋生生子尊人夢見萬

樹梅花慶破而生生子因改號曰見梅夫虞

卿之畫偶然也侯升以虞卿之畫而書其宿構

見梅二詩又偶然也初不知生生子之生之兆

如是而事之相符神之相召若為生生子命之

者偶然之後又復偶然良不偶然是冬之杪雪

大如掌生生子顧予空閣丐予一題其端題曰

觀我生易曰觀我生又曰生生之謂易予之所
題觀我生觀梅也非易之觀我生也而亦未必
非易之觀我生也

萬曆丙申嘉平月望日祝世祿呵筆書于金陵之
梧竹居

周官建醫瘍歲杪考其成此典今廢閣醫術遂
已盲我生百年骨沉綿故相嬰新安有孫君籍
籍揚休聲用藥中紀律動如穰苴兵問君焉所
學歷歷談平生十五好任俠擊劍技頗精廣州

逢異人謂此不足營懷中出一書禁方世所驚
親口授秘密不肯道姓名當時長桑君毋迺重
降英自茲暢真訣遊吳還適荆活人以萬數力
與造化爭迺知廣福利不在居公卿平時多感
慨見君生百情

右作書侶 東宿先生 鄭明選

荆南白岳任逍遙藥肆歲名不可招氣王侶常
餐沆瀣丹成寧獨比瓊瑤種成蘭蕙盈堦砌探
得儂方出海潮倘遇倭倭借尔去好將松實進

神光

小詩送東宿先生

徐顯卿

海陽聞孫君蚤住天都山幽覓軒皇竈丹砂鍊
九還初還今已就亦可回衰顏沈痾無勞針砭
治起死渾如反掌易懸壺大半在西吳年来到
處稱神異市門日日盈高軒雕龍琢玉多贈言
貧乏往往不責報好生之心若大造君乎君乎
思邈知前身寧忘水府龍宮春有方三十授君
非世有散入千金為我一一言其真

詩

十五

東宿遊方之外已久余思其人而未見今山
甫道其術之神異而索一歌贈走筆成此數
韻它日相逢嘗上此其在券耳

十嶽山人王仲房

幽人雅業企東垣列宿東方寄一椽桂子吹香
邀月上杏巷飛雨得春先已知思邈源流遠能
繼長桑厚澤綿試看問醫人有意早隨初日到
門前

文肇社為 東宿孫君賦

曾遇桑君飲上池名雷千古得玄滋當年原脰
能知政此日還丹可濟時碧眼自應登玉笈青
英俄復駐松姿憐余瘦骨堪雲卧遲尔陽和發
隱芝

右侶東宿先生

潘若鏡

守價知何意專門自不同書探鴻寶死法用淳
于公適國人爭禮承家業轉工更聞喉舌譽新
滿漢庭中

服食書無悞刀圭不易尋爾作三折手誰解六

詩

十六

通心犬舐燒丹竈人依種杏林因喚劉子政強
欲煉黃金

臧晉叔

贈族弟東宿高乎

太白山中嘯白雲雲空霧閣終氤氳神龍馱得
方猶秘毒虎園將昂尚焚鍾乳何時懸玉洞石
函此日啟金文回生霜雪都靈異老稚環門為
壽君

族兄昆西良璧

喜孫君東宿至金陵席上為長歌贈之

老夫晝寢鈴索鳴叩門者誰白馬生思君急欲
見君面遽起不待衣冠迎鄰家昨送石播酒顧
問中厨復何有樹上露鷄不費錢市頭霜蟹初
入手鍾山嶂既撲入青潭水空虛蘆滿汀江城
寒色樹爛爛山閣雨意雲冥冥我且為君陰君
當和我一曲綠綺琴君但為我飲我自卧君三
尺珊瑚枕長安一月報五至萬事紛紜不得意
北關上書遠素心南山看獵真高計今日何日
逢好客大白可以澆胸臆仰天大笑淳于生何
必遺簪墜珥傾一石

詩

十七

贈孫東宿先生一首

司諫吳興鄭明選侯升甫題

孫君董儂流杏株號一五神樓活少君橋井浦
時雨漫誇識秦良願言涿西土返哉上昇日從
容咲玄補

贈孫東宿先生一首

西吳潘玄心著

君子重道義貧賤非驕人折肱不折腰宏道無
所親賢名聞諸侯超然氣緊新感子故意長區
區藥石因南國從此去東野仰參辰

西吳潘玄藻題

贈孫君東宿一首

孫公奇術諸侯聞不羨舍客長桑君杏林漫紀
上昇績橋井但澤東臯耘古聞醫國從此見世
間視色徒紛紛勸君莫滯旌陽鶴萬民東望止
如雲

詩

十八

西吳潘玄藻題

勝日茗溪望湖光片片霞乘流唯一葉浩蕩興
無涯費椽壺中術董僊門外苓條桑樂風土况
得養生家

萬曆甲戌始夏余遊茗嘗偶遇孫東宿醫國高手

走筆以贈

吳下杜大中

贈東宿孫先生國醫

紫髯碧眼新安客十載仙都煮丹液一片輕帆
掛太湖旋將大藥回殘疾人言君藥能駐顏指

顧便覺陽春還何處公卿不倒徒不妨筑獨干
空山我聞醫和足醫國滿目瘡瘼廢耕織天上
絲綸有鉅公調元未識馮誰力由來用藥未病
先肯隨下乘扶顛連因君翹首望廊廟何人三
策陳堯天

山陰射堂張道

贈孫君東宿

恒心一點起沉疴到處啣恩意若何門外願番
三尺地年來種杏較前多

詩

十九

吳龍陳爾見題

此道古誰傳粵泰乙小子君乘東維來飲飲上
池水術名亞相良心醉軒皇旨都門一懸壺居
人兢搖指生生有此君病病皆能起

東海傳龍方南天稱藥王造化無遺秘燮理祇
尋常徙心更置慮剝腹以滌腸授道安期生種
束如瓜丸賣杏不收穀青細滿琳琅

華山野睡客長駕九龍遊道逢孫思邈含咲輸
青眸著書十萬言色色振前修白日誰驚座清

麓爾上流何時凌一葉僊仙望斗牛

人緣君起色世属我醒心長技胡相偶昊蒼各有任所美太上者不與俗浮沉堯李媚春芬松桂鬱秋林雅意離言說臨風遍玉琴

余遊海陽以侄子紳得孫君東宿高品玩其書非徒諸無且者流進於易矣因索言為贈爰賦四章大都前賞識而未則心期有在耳

九龍山人陳履祥

杏林何處蒼如綺滄海龍方世餘幾當今國手

詩

詩

稱者誰先生岷向東南起紫髯飄颻神仙姿讀書萬卷窮玄旨窓間著論翼軒岐玉匱青囊差足擬竒骨昂藏自不羈振袂飄然山復水藉不敲聞儒俠間到處賢豪爭倒屣迹時隱迹居城中請藥門前紛錯趾刀圭起死十八九儻非壺公即薊子長篇短賦多贈言出示珠璣數百紙我病經年眼不開今日見君輒有喜吁嗟乎今日見君輒有喜乞君神術一洗眼中塵與滓白日青天復此始

四岳汪元英

采真尋市隱念爾此遊名日月壺中世烟霞物外情絃琴青礪響煮石白雲生更愛蘓門嘯時聞鸞鳳聲

海陽城中遇孫東宿道大因其高邁也賦此

以贈

陳昭祥少明

白嶽真人曾降神梅谷萬樹兆君身遊名女子偏知姓罷市壺中别有春自昔上池傳訣秘于今赤水得珠新恠來好事爭題詠點破生生夢

詩

詩

裡因

生生子有觀我生手卷為祝無功鄭侯升題出生時竒兆余既系以觀梅雜詩復賦此為贈

陽羨澈如吳正志

東宿丈見過賦贈

一別寧云濶驩然道故知如何雙鬢色不侶十年時玄圃先栽杏黃山獨采芝因君探秘訣更與白雲期

故鄭姚弘道

諸縉紳名家尺牘

潘見所老先生寄

不肖垂殘餘息迺至有此時者足下再生之也且小兒又蒙乳劑小女舍親俱賴國手此生此德其何以報之佳刻已成恨未一徹其妙醫案不肯自留為足下廣傳以壽天下蒼生俾與岐黃靈扁共傳不朽藉是以報足下百一定不悞小費也尚容圖之

文湘南老先生寄

尺牘

三二

別東宿二十六年矣時時在念以君之高今世無兩也又竊計彼此各天不得再見昨忽蒙惠誠三生幸矣迺鄙人有西河之感委頓几榻間閣者遂以例辭睽吾良晤次早即令人奉訪而僊舟遙發類教竟寥寥焉惋恨何如洎讀尊著該洽詳妙寔古人肘後之論不朽之業令人羨仰第世無司馬子長不能為太倉公立傳然此自足濟世垂久不待後有子雲也茲以陸承湖有茗溪便聊附寸楮用酬高情僕今年政七十

原缺

孫氏醫案五卷 浙江巡撫採進本

明孫泰來孫明來同編二人皆休寧孫一奎之子是編即所輯一奎醫案也凡三吳治驗一卷新都治驗二卷宜興治驗一卷不分證而分地蓋以治之先後為次一奎深究醫理其議論多見於赤水元珠醫旨緒餘皆已著錄是編宗旨具載二書之中且旁文多於正論亦為冗漫蓋大意主於標榜醫名而不主於發揮醫理也

折肱漫錄六卷

〔明〕黃承昊撰

中國科學院圖書館藏明崇禎刻本

附《四庫全書總目·折肱漫錄》
六卷《提要》

折肱漫錄小引

古人云不爲良相則爲良醫意在濟世也予少病羸微羅一二十年備嘗諸苦少不知醫多悞藥苦遺彌甚當茹荼時苦極而悔悔極而悵悵恍恍幾瀕於死私自矢曰吾病得愈吾年得老必揭此以告同患者使毋蹈予之覆轍有所苦隨筆記之久而成帙迨後病得漸瘥更得致身雲路碌碌世緣未暇問此且念吾年未老閱歷未深恐識見尙有悞以悞人姑筭而藏之今

小引

一

歸田無事年已六十矣閱歷深識見定矣庶可災梨以告同患乎乃搜故箠所存而益以近記題曰折肱漫錄蓋取三折肱成良醫之義一曰養神一曰養形一曰醫藥非身所親歷口所親嘗口所親覩都不敢混載以欺人蓋予生平凡方書所載之症十患四五本草所載之藥亦十嘗四五夫豈勦陳言拾道聽以侈觀覽者予官雖不甚顯而宦轍所到必孜孜以利濟爲事今梓是編亦一片婆心亦使上不能爲良相而頗

存良相之心下不能為良醫而略明良醫之道

云爾

崇禎乙亥菊月朥樂白道人黃承吳題於樂白

軒

小引

二

折肱漫錄總目

橋李黃承吳履素撰 門人諸子較訂

卷一

養神篇

卷二

養形篇上

卷三

養形篇下 飲食

折肱漫錄

總目

一

卷四

醫藥篇一 總論 卒中 脾胃 腹痛 虛損

卷五

醫藥篇二 遺精 痲痺 感冒 痰鬱 瘧疾 雜治

卷六

醫藥篇三 品藥

折肱漫錄總目終

折肱漫錄卷一

梅李黃承昊履素撰

養神篇

南嶽慧思禪師患四肢緩弱不能行步自念曰病從業生業從心起心源無起外境何狀病業與身都如雲影如是觀已顛倒想滅輕安如故養生者先養神次養形養神莫要於恬澹虛無病安從生傷神莫大於憂思慮試觀多憂多慮之人飲食不為肌膚則知養神當先於養形也明矣于弱冠

折肱漫錄

卷一

患痰中縷血精神未損也此亦未遂傷生者醫家及方書皆有此病重而難治之說予惑之朝夕懷憂竟至神氣盡耗病乃日深病深憂愈甚憂甚病益深神魂夢寐若在桎梏中而莫可解脫迨後至於神魂飛越如日坐陰冰世界益不死者幾希耳正病苦中忽值先學士之大故哀戚之餘頓忘其身憂為哀奪另成一番世界而向來稟曰遂拔病以稍蘇已酉登賢書鬱氣大暢而神乃漸王丙辰通籍京闈氣益暢而神益充得延殘喘以迄於今

始信神為形君不可使傷養生者慎之

養神之道莫備乎南華經莊首揚逍遙遊而次之以齊物論蓋所造未到齊物處即欲強為逍遙而不可得真能遺生死同得喪而後一切境界不足以為其神自然無往而非逍遙矣所云泰山崩而色不變麋鹿游而目不瞬養到恁麼田地豈是易事佛家言平等心無分別正與漆園齊物之意相同世間種種愛憎取舍紛紜膠膠皆從一念分別而起此念一空何等清淨自在

折肱漫錄

卷一

二

人世樂情較淺而苦味覺深處樂境之人少而處苦境之人多當極得意時樂亦不過如是而憂或夾帶其間惟處憂患之境則滋味實實不堪故人以過喜而得疾者甚罕而以憂成病者比比皆是樂莊有言人之生也與憂俱生信夫雖然苦樂無常境得失無定形秀才進學喜不了尚書不陞惱不了有常境耶墨翁之失馬宋人之產犢有定形耶知足常足樂自己取貪得無厭苦自己招愚人認妄為真智者觀世如夢人處苦境時望彼境以

爲至樂及到彼境則相習以爲固然久之又成苦境矣相通而上在在皆然諺云別人騎馬我騎驢仔細思量我不如回頭只一看又有挑脚漢比上不足比下有餘人能常作如是觀則無人而不自得矣彼營營戚戚至死不休者雖富甲海內位極人臣我何以定其苦樂之倪哉

子病中多僻偶陳眉公過禾先學士命予請教眉公曰神者伸也人神好伸而惡鬱鬱則傷神爲害非淺尼父二論首揭悅樂佛家般若經首稱自在

折肱漫錄

卷一

三

莊生著南華首標逍遙遊吾人心體原自活潑何可因形以損神損形得獨存乎予聞之爽然人之心一涉於有即屬六陰用事存之於虛無卽屬元陽用事人能常虛常無則陽和冲布於一身養生之善物也

老子曰我有大患爲我有身我若無身我有何慮故聖人外其身而身存後其身而身先所言無身者有身而忘其身卽外其身之謂也予少病以愛身念重故憂病滋深病迺膠纏而不可解若得老

氏外身之法豈至受此二十年苦楚莊子云以瓦注者巧以鈎注者拙以金注者昏則得失太重而心神惑亂也養生者慎勿視爲金注則幾乎全矣內經云以酒爲漿以妄爲常以人房以欲竭其精以耗散其真以欲旬承醉以人房言而酒在其中矣以耗旬單承以妄爲常言以妄爲常者一切世緣盡同夢幻皆是虛妄愚人認以爲真常而萬般執着不惜耗心耗力以徇之致使天真散失故曰以耗散其真

折肱漫錄

卷一

四

有此形體故有此病苦病者形之爲也然六邪之中人也形受之氣味之藥物能治之七情之傷人也亦形受之而七情之起則錄於心意識故其爲病有難盡以藥石治者如經言怒可勝思悲可勝怒之類以無形治無形以相尅取相生自有無窮妙義予病時憂鬱傷神百藥不救幸得致身雲路以喜開憂而痼疾遂瘳此豈藥石之所能治哉蓋憂毘於陰喜毘於陽太陽一照則陰霧潛消理固然也

予少不知道故無法遣憂以境逆得憂必俟境順以開之借使境不終順將遂以憂死乎殊不知憂原無定一切惟心所造心見以爲憂卽成憂境而不可解只緣見地不超無人自縛昔有僧求解脫於祖師師曰誰縛汝僧於言下大悟子官中州有一關心事竟成憂境病復發予此時已略知慕道毅然追究憂從何起卽以慧劍劈破身世兩忘覓憂處已不可得病陡然解散迺知境原不累心心自累於境耳竺乾氏之教養生家不可不究心也

折肱漫錄

卷一

五

素位而行不願乎外居易以俟命無入而不得自是一生安樂法

萬事付之命則無憂百爲斷以理斯寡惑憂惑不累其心則天君泰然百骸順適矣

智者心能轉境凡夫心因境轉吾人所造未深不得借境以爲怡神悅性之具如避塵勞而棲幽靜遠城市而處山林寄情於竹石博趣於琴書者如此類皆不可少者

坐水邊林下塵世可忘步芳徑閒庭情懷自逸鳥

啼花落且開病裏幽襟酒冽茶香共享閒中清福乘興作文勿求工而刻意隨心閒卷勿程限以疲神自是人生樂事頗與病者相宜

世上四民誰不役役塵勞終日無暇晷惟病者不得不閒趁此閒中日月暫離火宅煎熬想之亦自足樂

良友清談差堪解寂瑤琴獨理亦足忘懷

七情傷人憂愁最深惱怒最烈憂能遏絕生機大傷陽氣怒則肝火必盛傷本經之血且木來尅土

折肱漫錄

卷一

六

及傷脾經故人怒氣太盛則手足皆冷手足屬脾則尅土之故也然遺憂懲念人皆知之而憂終不可遣念終不可懲人相我相兀然在前安能強制此非有大學問大見解人未易言此蓋憂怒皆妄識所造之妄形若不見可憂憂從何來不見可怒怒從何發要識下手工夫全在克己做起做到無我地位則憂怒合下斬根矣

莊子云忘腰帶之適也忘足履之適也予謂忘形神之適也然有意於忘斯不忘矣惟忘忘者得之

人生無病卽是福無事卽是樂福不自知其福惟
有病乃慕無病之真福也樂不自知其樂惟有事
乃慕無事之真樂也

吾人處世以事應事因物付物過而不留於心體
原無累惟着一有我之念則愛憎是非趨避委曲
之情紛然於虛明之宇矣至於好名好利好色好
聲一切有所耽嗜則太清之天滓穢不淺佛家生
死輪迴之根端不出此

未來之事莫預慮既去之事莫留念現在之事據

析眩漫錄

卷一

七

理應之而不以利害惕心得失櫻念如此則神常
覺清淨事常覺簡少蓋終日擾人方寸憧憧役役
不得休息者不過此三種念頭掃滌不開耳天下
本無事我心本清淨庸人自擾之

心主血養血莫先於養心心之不養而多鬱多思
多疑多慮卽口餌良藥亦何益之有

人生憂患之根每起於愛戀愛生故憂死愛達故
憂窮愛得故憂失若能斷愛根則憂根自斷矣

人身之精氣如油神如火若火太旺則油易乾神

不用則精氣易竭

一葉蔽目不見耶山一豆塞耳不聞雷霆一念執
迷不知萬境博奕迹酒色迷財利迷勝心迷以至
功名迷生死迷迷之大小不同其爲迷則一也
約無悔靜無尤所以涉世亦所以養身

多一語不如少一語生一事不如省一事

怒之根每起於不恕薄望人厚責已怒根永絕矣
無怒自無怨故聖人以爲遠怨

神清氣爽日朗風恬明臆淨几神遊於載籍之間

析眩漫錄

卷一

八

不傳攀緣五欲惡境趣孰多焉

韻趣幽遐之事病者可以怡情紛華靡麗之場病
者不宜廁足

嘗讀莊子臧穀忘羊篇列子樵人捕鹿篇不覺嗒
焉喪我

彈琴寫字可以攝心種竹栽花可以忘俗

寡欲則心清心清則欲寡

漆園論養神之道全在能忘故前後反覆寓言大
都在遺生死齊得喪一切皆忘而神斯全矣科目

之榮至狀元而極官爵之貴至宰相而極歷數古
今狀元宰相已覺車載斗量其泯滅無聞者多矣
卽有聲施來禳者亦同歸於幻耳使我有生後名
不如生前一杯酒晉人之語可爲至言

易曰樂天知命故不憂孔子得之不得曰有命君
子所可冀其力者見在之義至於命之所在天實
主之得而或以失失而或以得失馬亡羊誰爲定
境豈可有所堅執而不舍卽使用盡心機而所虞
在此或所失在彼欲其一一如吾筭必無之理也

折肱漫錄

卷一

九

當如浮萍風絮順其自至一毫不着吾心方爲妙
境

養其內者虎食其外養其外者病攻其內命之所
限無所逃於天地之間而能造命乎而能衡命乎
知此則種種綢繆悉化爲寒灰矣

禪家云山河大地一切皆幻昧者必以爲實有是
物焉得爲幻不悟知有山河者是誰知有大地者
是誰我以爲有故有也我以爲無卽無矣可見種
種萬有悉出心造如開眼見世界合眼世界在何

處天下山川都會不知多少曾見的便認以爲有
那不見的原在緣何吾心中沒有他心中無便是
無了但世人知得某處某處所以尚妄認以爲有
耳彼六合之外人所不知不識者便以爲無安知
彼之視此不猶此之視彼乎信乎皆知識所造也
吾輩涉獵書史者於古今興衰之跡較若指掌村
夫俗子有不識漢唐爲何物者夫知有漢唐故有
漢唐不知漢唐漢唐何在天下事大約如是矣此
非妄言也惟有我在所以有天下苟無我天下於

折肱漫錄

卷一

十

何有此實理也聖人之道如日中天世人悖謬聖
人恬然至於榮辱得喪之間爲庸俗所詆笑便不
勝愧汗皆緣識見卑陋使然彼輩瓢陋巷敝裘而
耕緇袍而立者必爲當年非笑而勢焰赫赫之徒
人且方趨之如鶩孰知百世而後自有定論哉讀
書君子當常作如是觀

天下之人無窮極處順境者曾幾何至於事事如
意稱全福者更無幾矣此問氣所鍾莫存妄想但
當隨境而安彼林林總總拂意愁苦者莫知紀極

造化豈獨困哉常作如是觀則胸次廣矣

自公侯以至乞丐所處各不同而不如意之事各亦有之當沉迷惡境不知解脫此時光景何分於公侯何分於乞丐其苦同也一能知足則鼠飲鷄巢各愜其分雖乞人野史執不白以爲至得哉又如販夫販婦一朝得百金至樂矣而千金之產忽廢其半便不勝其苦夫百金至於五百金多少甚明一何以樂一何以苦非特是也卽一人之身修至千金則喜致而脩廢則愁苦復萬狀夫千金原

析肱漫錄

卷一

十一

非我有也致而廢之譬如始之不致也奈何不思致者之爲樂而竟知廢者之可憂是故以平地視高山不勝仰止之思以高山視高山猶然平地也達者須合下勘破淨穢一如養生家亦當常作是觀知止知足時將不如我者巧白寬解將所處見在之境一切得意的時時慶幸所取於造物者已多一切不如意的置之度外且任其自然無以自苦落得自討便宜

方尺之路下臨深谷必戰栗而難渡使其措足有

不墜者幾希若下臨咫尺之平地則跳而躍之如康莊矣如種嘉卉但時其大旱則灌之害之甚者則去之木自長矣若終日修別灌漑反致苦損故養生者過慎亦非所宜

人世種種執着者緣有我所以牽係不舍夫我未生時我在何處造化一點網緼偶鍾而生此我也奈何妄認爲我堅牢不破逃却一生蓋人之所以迷戀不舍者吾知之矣爲世境之紛華爲父母之愛妻子之情朋友之契而不忍棄耶假如天地不

析肱漫錄

卷一

十二

生得我或生而幼穉則世界交情父母妻子原非我有也吾生如寄耳安得妄生執着故曰生吾順事沒吾寧也人生但當隨分盡所當爲卽境逍遙看得世上種種皆非吾有如貸人之物寓人之室便戒多少掛累

人生世上那管得許多那好得許多那能使人人說好那能使人不說吾不是只要做事十分不差心上無愧便了聖人也只說得一箇寡悔可見此處只可信之已不可強之人此道明白心中便得

寬平快活

疑能生病人有以弓影成病者心之所注無所不疑故道家內視久久成胎卽相思者中亦有物不化昔一女子見一客商泊舟樓下兩相顧戀女子竟成病以死燒之胸前有物堅不可破其中有光如山川林木之狀父母以爲怪留之後商過舊所詢之則已歿矣商念舊情訪知其故與渠父母求視之則宛然如向日倚樓對商種種境界也不禁淚落滴入此物中卽化爲灰可見心能造境種種

析肱漫錄

卷一

圭

病苦半皆心造當常作如是觀吾人處世竟爲是非毀譽所困所以心神再不得舒快夫天下有真是有真非所可自信者吾但處其是而反求無愧則毀可也譽可也所毀而出於上理當順受吾卽無非亦當引罪非惟無損於我反足以彰我之德鍊性之資進德之地端在於此至於村愚下賤有所加於我如同犬吠直付之一笑耳又何較焉况是者未必是非者未必非同歸於幻試思人之背毀我者不知凡幾當其不知恬然也抑或知之卽

爲按劍由此觀之妄而已矣

世人大病只是自家不肯認差所以多替多怒夫自責自修一件美事自家以爲不是有何不妙而必以客氣爭勝也天下雄心客氣都是資稟中大病不曾將學問工夫磨鍊一番所以如此却原是一家受苦故聖人賢人學問首稱孝弟實力於孝弟者雄銳之氣一些也用不着可以養性情可以變氣質可以消愾忿久久從事則聖賢與我爲獨知之契六經之語言言卽証也文章自然高妙

析肱漫錄

卷一

西

常見蟻戰伏尸數萬起而嘆曰而爭名乎爭利乎以自懼此苦也達人之視世亦猶是矣吾人未有靜定工夫一人靜坐反致此心外游而紛紛莫禁此謂坐馳不若與一二知己清談雅聚亦怡神養心之法也

列子引楊朱之言曰太古之事滅矣孰誌之哉三皇之事若存若亡五帝之事或隱或顯億不識一當身之事或聞或見萬不識一目前之事或存或廢千不識一太古至於今日年數固不可勝紀但

伏羲以來三十餘萬歲賢愚好醜成敗是非無不
消滅但遲速之間耳矜一時之毀譽以焦苦其神
形要死後數百年中餘名豈足潤枯骨何生之樂
哉三復斯言令人名心頓喪

折肱漫錄卷一終

折肱漫錄

卷一

五

折肱漫錄卷二

養形篇上

人身中精氣雖分陰陽然真陰真陽原有互根之
妙相生之理天下未有真陽而陰精不足之
人亦未有陰精充滿而元陽不壯者但燥熱之陽
乃能傷陰沉寒之陰乃能傷陽經固有少火壯火
之別則陰可類推矣至若飲食藥物之陰陽積聚
積熱必能傷氣傷精又不可不慎陰陽均不可偏
然凡人調攝則助陽必兼助陰陽譬則火也陰譬
則油也火有氣有形而無質油則純以質用矣氣
非形質則無所附麗厚其形質元氣乃充故如螢
者此火燎原者亦此火火原無衰旺因所附以爲
衰旺吾人日用飲食總是補之以味總是補其精
精補則氣自足若舍形下之器別無形上之道
補虛助弱用藥概須溫和久服自能奏功乃無留
害如知母黃柏之屬太寒傷氣桂附之屬太熱傷
精卽有陰虛勞瘵亦宜投以清和之劑若折以苦
寒火未必退脾家元氣先傷卽有陽虛怯弱亦宜

折肱漫錄

卷二

一

佐以溫養之方若助以辛熱少火未生壯火先灼養生者慎之

人身如天地和煦則春和燥則秋春氣融融故能生物秋氣肅肅故能殺物明乎生殺之機者可與論養生

心爲一身之宰脾爲萬物之母養心養脾攝生最要

王節齋云涼風寒露霧濕氣體弱者常須避之汗出及脫衣去襪之時莫當風取涼最易感冒惱怒

折肱漫錄

卷二

二

尤忌之酒後亦忌當風取涼脫巾襪後使用手多磨擦令毛竅閉爲妙法子生平確守此忌蓋氣血本虛之人又以不憶招外邪再傷其氣血大非所宜耳

予病時俗人相慰云常病大仙予時笑以爲迂後見強壯者忽登鬼籙而多病者或得綿延始信恒言却有所懼而冰兢故得失相反如此予當年筮病以有所懼而冰兢故得失相反如此予當年筮病得否之九五曰其亡其亡繫於苞桑意正與此合

慎之時義大矣哉

頻浴亦非病者所宜能耗元氣

予生平有滿奮之畏然有時衝風行路雖大風不感有時坐卧閒居偶微風竟病予深維其故蓋行路時精神勇往向前我氣勝故風不能入坐卧時精神懶散則勝理疎故風得襲之耳風中尤不可睡睡卽勝理開邪最易入也

予中氣爲悞藥所傷遂覺虛弱不能耐飢丁巳歲隨同邑鄉大夫謁上臺談三邑田糧事日盱不了

折肱漫錄

卷二

三

予受飢一時中氣虛怯倦怠自汗服補中益氣湯數十劑中氣方稍稍復然自此益不能耐飢予每出必以乾糧從而對客多不便食予乃製補脾藥爲大丸日攜之囊中偶值飢不得食卽服數丸腹便果予歷宦途幾二十載而脾胃不受病者賴此藥之功

體弱人每事當知所節節慾節勞節飲食此其大要予瞻云傷生之事非一而好色者必死人當好色情濃時特提死之一字敵之可得衰減凡用心

用力及用目耳一切事稍覺其勞即便却去以節省之稍息再勞庶不至受病若待病而後調之費力多而取效難矣失飢飽能脾胃迺傷養生家行言未飢先食稍飽即止此是保脾胃良法然世途中人安能如此愜適但常存此心便不至於大飢大飽以傷天和矣

醉之爲害不可勝言其於節慾更須戒醉醉後最易犯慾內經言醉以入房養生大忌能致百病蓋醉裏乾坤另一光景生平謹凜頃刻恣肆尊生一

折肱漫錄

卷一

四

念遠置度外故攝養家切忌縱飲

凡人患膿癩癩子雖曰濕曰熱曰氣血不和畢竟還是氣血有餘故少年人多患此子弱冠前亦然及病以後永無此患想血氣不旺之因也至若癰疽之乘則有所以致之有因心懷鬱結者有因好飲火酒喜炙烤者有因陰血枯涸者不可不慎其因昔王損菴先生曾對予言人參養榮湯若人終身服之可永免癰疽之患蓋以能調和氣血也忍冬藤時時釀酒服之亦可以解

古人言毋以脾胃熱冷物毋以脾胃軟硬物毋以脾胃熟生物可謂至言

暑月勞役於暑中及炎房逼淺受暑而病者名中暑其避暑納涼於深林大厦之間而病者名中暑攝養家於三伏之候但居於寬敞稍涼之處使不至中暈即已切不可因熱貪涼處於陰寒之地以爲快暑中勞役非人情所樂此必出於不得已然名利與此身亦須稍分輕重至於過涼拍疾乃所自取於人何尤

折肱漫錄

卷二

五

四時偶遇怪風切須謹避內經所言厲風殆謂此內經論風之爲害獨詳要知避風亦是攝養家要事古云避風如避箭避色如避仇真藥石之言也風固宜防露尤須避風屬陽露屬陰陰氣中人最易得疾故夏月不宜久坐露下納涼秋來多致患瀉每日將昏時即有露氣其氣能直透房樞故夜臥須關窗而後睡次日體自舒健

諺云早飯要早中飯要飽夜飯要少語語皆格論空腹莫多言最能傷氣中午必須飯飯必滿量而

止則神氣自旺晚餐微酣不可過醉亦不可過飽
自然神清氣爽

予少年血氣不足十日九病自慮不能老幸延殘
喘以迄於今中丞給諫兩兄生平精神大旺竟年
不滿花甲蓋予以病萬分加意葆攝所以得全其
生兩兄役世法中藥餌調攝以有所恃而促其
算予病原因於色後來極其節忍膝理虛不禁風
坐臥必於屏風處不敢肆覺飢即食覺寒即衣覺
暖即減覺勞即息不敢強力以作生平藥餌無一

折肱漫錄

卷二

本

日較初未知醫藥頗有悞後識岐黃妙理大得其
益居官甚有得於調攝上鑒兩兄皆以勞心政務
得疾而殞故未老即掛冠予之重養生也蓋如此
晉侯求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也
是謂近女色疾如蠱非鬼非食惑以喪志公曰女
不可近乎對曰節之而引樂以爲喻謂五降之後
不容彈矣於是乎有煩手淫聲酒埋心耳物亦如
之至於頹乃舍也已無以生疾又以六淫配六疾
曰陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫

惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱惑
之疾今君不節不時能無及此要知女色不能絕
必須節之淫則犯而人皆知女爲陰不知其外
陰而內陽交門亦有取於其陰之說故好色最能
傷陰以其熱也凡人獨宿善寤自有一種清明之
氣日與婦女作緣便覺志氣昏憤故謂之惑疾子
產聘晉問疾叔向問焉子產謂君子有四時朝以
聽政晝以訪問夕以修令內以安身於是乎節宣
其氣勿使有所壅閉湫底以露其體今母乃一之

折肱漫錄

卷二

七

則生疾矣蓋壹與節相反壹則耽於女色而聽政
訪問諸務俱廢安得無疾然則吾人應酬交際小
勞其身不惟以了世法亦所以節宣其氣而養生
調性之道也無論一於好內者之必生疾即一於
去門清淨家尊老氏守中之說大都心息相依以
神御氣而守之之處言人人殊有主臍下一寸三
分者有主臍上一寸三分者有主臍內一寸三分
者有主性門腦頂者有主極陰毛際上空穴者總

不如臍上一寸三分之說爲正此是中宮心腎交
通處試一凝神其際使氣渾身和緩此其驗也
州武弁越効忠節七十精神強旺提戈上陣猶
同少年傳予一法則守眉心此從來無人道及者
每疑神其區卽黃清曰津生此亦可異則此法或
秘傳也此君與流賊草草可惜

別家之術有損無益除非鍊習其心如所謂枯木
倚寒巖三冬無煖氣然後可如此地位豈凡夫所
可到而顧浪言採藥哉色心一動金水暗消非徒

折肱漫錄

卷二

八

無益而又害之此病家所宜切戒者也丙申歲有
一老人到禾自稱一百二十餘歲卽昔之王越先
大夫邀住碩覽堂者累月其人狀貌雄偉乃言社
日所生皮紅髮白果似高年形像耶之亦無他秘
訣惟有搗糶之法未必果佳又極贊茯苓附二
味丸方爲延年之藥此方本草綱目中載之又每
戒人勿坐冷石葱有兩了者勿食啖飯以白米爲
佳

王聖俞會心言有云伐天和以成就世事辟猶割

肉飾俎刺血染裳然究竟成就亦歸虛幻徒自伐
其天和而已語有之寧可疎慵乘物議莫將性命
當人情此二言可書座右

幽靜之趣最宜於山居然孱弱之軀卽山居亦有
不宜處山中多嵐濕雲霧之氣久處能傷脾胃予
官延平署在山麓是春患脾胃泄小便黃澁之症胸
膈不舒飲食頓減近年借隱茗上之妙喜亦在山
麓所患復如是俱服八味丸補中益氣湯間服清
暑益氣湯而痊若多服分利之劑則悞矣

折肱漫錄

卷二

九

人身中惟心腎不交百病生焉造化至春天氣下
降地氣上升是成三陽泰卦而萬物萌生人若心
火太炎則天氣不降矣腎氣不盛則地氣不升矣
是爲否精氣何從生心君火也火性炎上故念一
起卽火炎念若滅卽火息吾人有一時無念者乎
此火所以日炎而水所以日潤也若常常止念靜
觀則心氣自降心氣常降則腎氣自漸生而還泰
象矣朱大復先生教人心常放下目亦向下上者
降則下者自升亦交心腎之法也

母見卵中辭最初中生目而後有首以及於身目雖
窳於肝而瞳原屬腎此天一生水之義也人之機
神盡在目故目疾犯色光乃不復此立竿見影不
可不慎

古人分一身之氣爲三焦予親驗之而信予初患
下氣虛覺丹田無物者然繼患中氣虛覺中宮無
物者然或有時中虛而下否有時下虛而中否有
時用消導破氣之藥則中氣頓陷於下覺中虛而
下反實乃知氣有分屬固如斯其有界限也

折肱漫錄

卷二

十

酒色同爲伐性斧斤戒色固難戒酒尤不易予葆
攝甚嚴却遠幃幙動經歲時獨是斜陽掛樹暝色
入牕思歡伯甚急非此便覺無聊乃知遠色猶易
斷酒極難郭子云三日不飲酒覺形神不復和若
能少飲養血壯氣未嘗不益人其如相知晤對舉
盞忘懷有不酌耐不休者可奈何予生平頗善攝
生獨苦不能戒酒

人設醴以誘猩猩猩猩明知而故犯人笑其愚吾
儕亦明知過飲傷人而每至酌耐而不覺其異於

猩猩者幾何予竊見多飲酒而少食穀者往往不
壽尤非所宜

凡人形體壯偉不慎酒色多有卒中之症而每得
之於勞怒勞則元氣頓虛而虛火暴熾怒屬肝木
經云歲木太過風氣流行風木一類故怒則肝火
熾而風即隨之也又憂懼亦能致此病子姪中錫
在燕時適值彼時多事憂懼兼以多欲竟卒中而
亡年止四十七耳予患指麻時彼亦患指麻皆以
此病爲憂予以慎病得延彼以不慎不免耳

折肱漫錄

卷二

十一

鬱怒傷肝尤甚蓋鬱則火內遏肝血燥而大風發
多致卒中之症故廣識平情養性要務

丹溪云腎主閉藏肝火疎泄二臟俱有相火而其
系上屬於心心爲君火爲物所感則易於動心動
則相火翕然而隨雖不交合其精亦暗耗矣故童
子未室亦有暗耗之症又精血篇云男子精未滿
而遇女以通其精則五臟有不满之處異日有難
狀之容疾治法亦兼用益氣湯六味丸二藥爲童
子者何不安心靜守數年以儲一生受用而甘虛

喪此先一元真炁耶亦愚甚矣

養生者貴開發其生機生機一發則源源不窮此謂溶於不涸之府生機有二使此心常自怡適而不以憂鬱窒其生機一也助養脾土以滋化源則四臟都有生機二也若不知此機括雖曰服補益良劑所補曾幾何

丹溪云天地以五行衰旺更迭而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午為火太旺火為肺金之夫火旺則金衰六月屬未土太旺土為水之夫土旺則水衰况腎水常藉肺金為母以補其不足古人於夏月必獨而淡味保養金水二臟經曰冬藏精者春不病溫十月屬亥十一月屬子正火氣潛藏之候必養其本然之真而為來春發生之本若於此時不恣欲以自殘至春升之際根本壯實何病之可言哉要之冬夏二季壯年宜寡慾老年宜絕慾斯為攝生之道

內經云腎有久病者可寅時向東南凝神不亂思不閉氣不息七遍以引頸嚙氣順之如咽甚硬物

折肱漫錄

卷二

三

如此七遍後餌舌下津納氣自是玄門要領後世千門百竅總不能出此範圍

內經云暑當與汗皆出勿止又云夏暑汗不出者秋成風瘧要知盛暑汗出乃時令使然非泄氣散液之比常於暑夜卧閉牕汗出淋漓次日反健若卧於涼處次日必倦即此可知故盛暑避於陰涼之地雖一時快意必至成疾雖然若奔趨名利酷暑蒸熾以致大汗不止者其泄氣傷生又不可同日道矣

折肱漫錄

卷三

三

折肱漫錄卷三

養形篇下 飲食

飲食但取益人毋求爽口本草須常考訂毋食病體相妨之物予脾胃素弱平生不多食瓜果生冷雖佳品在列未嘗染臙油膩多亦不敢食一切難消之物俱兢兢慎之故能似此殘喘縱口腹之愆而不自惜其身不可謂智

凡炙煨煎炒病家最忌助火銷陰損人不淺即平人亦不宜食腫毒牙疼諸症半因於是

折肱漫錄 卷三

北方人以麵為命食麵方飽而有力食米即弱則麵乃大補益人之穀但本草言其擁熱少動風氣則亦不宜多食者至若南方麵更為助濕所宜禁食者也

北方釀酒原非蒸釀皆以黍米為之黍氣薄味清初飲似清冽然味薄易醒不至如南酒之動火生痰也

酒能少飲益人甚多一過飲至醉則傷人不淺多少之間損益霄壤

河豚魚最發病攝養家尤不宜食

酒與茶雜飲能致酒積予見人多雜飲獨予守戒甚嚴北人稟厚與南人大不同常見北人於暑月以冰為命飲之自謂有益冰與茶酒相兼雜下而脾胃不傷南人寓北者罕見有此

牛乳同酒飲此常事耳薛立齋云酒不可與乳同飲豈指人乳言耶然兩者同飲亦往往見之想不知應忌耳

予每遇冬月常以熱酒飲乳酪已酉在南都有方

折肱漫錄 卷三

士令予以牛乳下丸藥原不言與酒同飲予不耐麴氣急呼酒飲之乳下喉未全到胃遇酒即凝膈上遂苦痞悶有妨飲食消導俱無效大是可憂予精思之此乃乳滓質凝於胸前而不化酥者乳之精華取酥與消導藥同飲當得去此碍膈之物遂如法治之果一服即消物理相制之妙如此

人皆指西瓜能辟暑生冷中不甚忌之殊不知暑中奔走後覺胸中熱氣填塞浸冷食之信可辟暑若晏坐高堂日以為常供則有損脾胃秋來瘡痂

防

生薑秋不宜食洩氣損壽元益秋味辛辛乃秋之本味故忌之

枸杞葉作茶啜治消渴強陰解麪毒何不以代茶桑椹曬乾蜜丸服開關利竅通血脈安神聰耳明日又絞汁熬稀膏蜜調服能去火毒解金石燥熱止消渴本草著其功效如此人何不多取而服之耶採桑條作寸斷炒黃色煎湯可以代茶最益人

折肱漫錄

卷三

三

五加皮本草原言取皮用今人多摘其芽此未可

解

胡椒大熱本草言多服損肺走氣又能發癰疽大損陰氣所當戒

飲茶宜熱冷則聚痰多飲則少睡久服則消脂茶味最清香令人嗜飲然虛弱人止宜候渴而飲適可而止若亦欲慕清客之名勉強飲啜所損脾胃不序云釋滯消壅一日之利暫佳損氣侵精終身之累斯大此可為嗜茶者之戒

橙皮多食傷肝氣不宜與猪肉同食發頭旋惡心

蓮子生食微動氣乾食作悶鮮蓮亦不宜多食終

是生冷惟煮食養神予時食此不輟和米煮粥禁

精泄清心治腰痛止痢磨作飯令肢體強健生食

須去心否則恐成霍亂

藕煮食最益人同蜜食令人臃腹肥不生諸虫秋

間予以此作蔬下酒

菱性冷不可多食煮食則不冷然作悶不益人本

草言冷臟損陽氣痿陰飲熱酒可解熱食作悶亦

折肱漫錄

卷三

四

用酒消

栗能益腎然生食發氣熱食滯氣惟風乾者佳枇

杷能潤五臟然多食發熱生痰

甘蔗共酒食發痰亦傷脾

沙糖與鯽魚同食成疔虫與葵菜同食生流澀與

笋同食不消成血瘕

龍眼肉本草言其補益心脾功與人參並聞華亭

陸平泉宗伯年幾及百平日常食龍眼不輟口予

少年多食此果老來食之齒齟痛以是不能食但

常服龍眼膏

柿不可與鱒同食此人所知也本草言紅柿忌與

醇酒飲易醉人且患心痛至死席間常設紅柿多

同酒食此下可不知

乾柿氣平不寒食之無害

石榴味酸性滯能戀膈成痰不宜食

胡桃甘溫能補然動風痰助腎火

白菓多食動風作痰小兒食之發驚本草言如食

一千令人少亡此果儘可不食

折肱漫錄

卷三

五

楊梅性雖熱亦有消食下酒之功

榛子大有益人宜食

梨性流利下行雖能消痰止咳多啖令人寒中血

與脾虛者忌食

丹溪云飴糖大發濕中之熱以其甘能滋濕濕以

助熱也

本草云麻油煎煉餅食與火無異齒痛及脾疾人

切不可食

世人皆言糯米補人考之本草云主溫中令人多

熱久食令人身軟發心悸又云多食令人多睡發

風動氣則不如粳米多矣

大豆性本平炒食則熱作酸則冷作腐則寒而動

氣煮汁則涼而解熱毒

黑小豆即俗名馬料豆最益人

赤豆利水透津久服虛人

菜豆肉平而皮寒脾弱人亦不相宜花能解酒

蠶豆雖發氣而能調榮衛

醋切忌與蛤同食

折肱漫錄

卷三

六

白萊菔大能下氣耗血消食較之藥物更迅厲中

氣虛者切不可食予常受其害煮食又多停膈間

成溢飲之症總非佳品其子更甚有推墻倒壁之

功

葱白通陽發散更勝於他藥氣虛人勿服予常受

其害能令頭汗津津不止且動火不宜輕用韭大

益人五月勿食與牛肉同煮食生寸白虫同蜜糖

食殺人此易犯者謹識之

胡蒜生嗽傷肝氣損日久食傷脾肺引痰養生者

節慎之

茄子性冷多食損人白茄蒂與何首烏陰乾用白茄蒂七板同何首烏各等分煎服治對口瘡芹菜

蕁菜性冷而滑不可多食不可與醋同噉令人骨

痿瘰疫病後食之多死

經霜冬瓜皮同皮硝煎湯洗痔極效如無冬瓜白

萊蕪代之此予所親試而效者

井華水平旦時未曾打動第一汲者與諸水異其

折肱漫錄

卷三

七

功廣補陰虛清頭目蓋天一真氣浮結水面而未

開以造酒醋亦不壞

秋露水清金降火予曾取以釀酒其鮮甘之味難

以名狀

脾弱人宜飲河水得土氣乃佳不宜久飲山泉氣

寒傷脾

人乳雖養血妙品然滑腸脾弱人亦不宜多服牛

乳以熱酒點服味甚佳有言其補益者有言其助

痰者想少飲則益多則助痰理或然也

羊肉補益之功至與黃芪同然性易凝結脾弱人

真火衰微薰蒸力少難於消化不食為穩

犬肉助火興陽陰虛火動者不宜食其肉較豕頗

覺難化不宜炙食令人渴同蒜食損人

猪肉性熱助火生痰不宜多食小兒尤宜戒之

猪腰子性冷久食令人少子冬月不可食損真氣

兼發虛壅

兔肉不可多食傷元氣絕血脉損房事不可同薑

橘食不可同白雞肉食兔死合眼者勿食二月食

折肱漫錄

卷三

八

之傷神

麋肉多食能動人痼疾

食戒云雞具五色者食之致狂六指立雞白頭家

雞及雞死爪不伸者凡雞無故暴死者食之並傷

人合水雞食作道尸和魚汁食成心痲又不可合

胡蒜及李子食不可合犬肝腎食不可合芥菜蒸

食有風疾者不可食雄雞

雞子和葱食短氣同鼈食損人

雉久食令人瘦發痼疾不可合胡桃蕎麥香薑木

耳等食自死瓜不伸者食之殺人春夏不宜食
午日勿食此禽益少損多食者慎之

綠頭鴨白眼者食之殺人忌與雞肉同食

鴨卵帶氣灰食即無妨

野鴨不可與木耳胡桃同食

鷓能動濕疽病與水腫忌食俗云能動風鷓子雖

補中益氣勿多食

麻雀不可和李子食亦忌與醬食

鴿肉能減藥力服藥人不可食

折肱漫錄

卷三

九

七月不宜食生蜜恐暴霍亂

多食蜆發嗽冷氣消腎

髓肉合鳥雞食成瘕合雞子食殺人合莧食生瘕

合芥子食發惡疾三足者赤足者腹下有十字王

字五字形者頭足不縮者目凹陷者腹下紅有蛇

紋者及生旱地者俱有毒不可食中其毒者藍汁

可解

鱗性冷傷脾胃多食發風疾未經霜者有毒足斑

目赤獨螯獨目或兩目相向腹下有毛腹中有骨

六足四足者並有毒不可食中其毒者或蒜東瓜
黑豆紫蘇煎飲並可解

蟛蜞傷脾不宜食 蟛音蓬

淡菜雖益人然多食亦令人目閉頭暈

鯽魚雖益人然多食亦能動火忌與猪肉同食又

忌犯天門冬同芥菜食成水腫同沙糖食成疔虫

忌同猪肝雞肉食二三月忌食頭

天行病後忌食鹽又忌食鯉再犯即死有宿瘕者

勿食鯉亦忌天門冬治鯉須去黑血及脊上兩筋

折肱漫錄

卷三

十

有毒悞中者浮萍可解鯉魚子不可同猪脾食鯉

魚鮮不可同豆霍食

患疔痢者不可食魴魚

有瘡者忌食黑魚令人白癩

鱗性大温多食令人霍亂亦動風氣

青魚忌與葵藿胡荽同食亦忌蒼木

鱸魚不可與乳酪同食

鰻鱺水行昂頭者有毒

蝦不宜多食發瘡動風又無鬚蝦及煮色白腹下

通黑者並有毒作鮮能毒人

食餽飽過飽飲餽飽原汁即消食一切肉過飽飲
熟食店中所儲原汁亦可消食蓋店中所儲汁以
之煮肉一滾即爛故店家珍重此汁而藏之以此
消肉有至理焉凡食某物過多停滯者即燒此物
成灰存性服之即消有人食乾柿過多欲死食以
柿霜即愈市上索粉中多雜以小粉食其地傷者
飲以黃漿立消予向以酥消牛乳之停總此一理
耳

折肱漫錄

卷三

十一

申立渚司馬云吳中何公良俊之父年百餘歲問
以服食調養之法何云別無他法惟每晨食糯米
圓子而已世俗多言糯米補益人攷之本草又言
其性熱不可多食久食是未可解

曾覽高氏尊生八賸註萱草花苗皆可作蔬食于
葉者食之殺人予向戒不食後見北路所種多子
葉者心疑之予家園中有千葉花人多采食之絕
無恙予因諦審之此花地瘦即單葉地肥即變千
葉原非兩種高氏之言蓋承訛非親試也

卷三
尾終

折肱漫錄卷四

醫藥篇一

虛損

總論 卒中 脾胃 腹痛

內經云氣口獨為五藏主又曰胃為水穀之海六
府之大原也故人生以胃氣為本善養生者毋輕
傷胃氣苦寒之藥不可多服致損化源丹溪發陽
常有餘陰常不足之論於虛勞潮熱盜汗等症立
方以四物湯加知母黃柏治之經謂內熱未除寒
中復起正犯斯禁前賢闢之已詳東垣立論則以
折肱漫錄 卷四 一
人之一身脾胃為主而持制補中益氣湯以垂後
世我 朝薛立齋紹而述之動輒以此湯為前茅
遇陰虛之症則謂陰虛乃足三陰虛尤當補脾陰
為主亦用此湯以滋化源化源者何蓋補脾土以
滋肺金使金能生水水足木自平而心火自降又
佐以六味地黃丸以溫存肝腎發前賢所未發開
千古之聾瞶功莫大焉夫李朱二賢各有所長未
敢輕為軒輊然以區區管窺蠡測則謂造化生物
惟此春溫之氣鳴子以火溫而維蠶種以人懷而

育陽春一轉草木甲析惟此溫和故也盛暑則萬物焦隆冬則萬物萎秋氣清肅萬物以潤彼大寒大熱之藥猶之盛夏隆冬而清涼之劑則秋金之令也獨此甘溫之品取之育之可使生機勃發而清腔皆春東垣信有卓議若用寒藥補陰則胃氣先傷五臟皆無生氣常見遵丹溪之法以治勞症往往脾敗以至不救不能不歸咎於丹溪之作俑予少年多悞後確守立齋之法得延殘喘以迄於今

折肱漫錄

卷四

二

藥者人生之大利害也不遇良醫不如不藥不藥而悞也悞藥而悞也亦悔然不藥之悔小悞藥之悔大

病者所忌自酒色勞役飲食及一切例禁外所大忌者有二認病爲真終朝侘傺一也求速効而輕用醫藥二也予病中守戒甚嚴獨此二者以是久而不痊慎之哉

子輿氏曰盡信書則不如無書在岐黃家尤甚蓋見解不同識古今不同還在智者神而明之若執

書以治疾爲悞滋多或因書以生憂反受其害予所親試者如盛稱枳朮丸之能健脾胃可常服也而反以傷脾如言玉屏風散之能禦風寒也而反以開腠理如侈口希發丸之能延年也而反以耗精神如謂痰中縷血之最重難治也火起九泉之下之百不救一也予少年患此憂不可言而尙延殘喘雖予之能慎疾勤服藥得免於死而方書不足盡信大概如此矣

王節齋遵丹溪之旨立補陰丸方論以治勞症世

折股漫錄

卷四

三

上依法醫治百無一効反致胃氣傷損而殞命者多矣薛立齋王宇泰兩先生力辨其非可爲大有功於民命夫陽常有餘陰常不足其論固是而必抑陽以扶陰則其見謬矣曷言之天地間之理陽自先乎陰陽生則陰長故天包乎地外月借日之光以爲光晝動夜靜君令臣其夫倡婦隨大易之理每每扶陽而抑陰修仙之道必期純陽而後已陽之貴於世也久矣須知陽原該有餘陰原該不足乃欲以陰沉之藥抑陽而扶陰陽消而陰能獨

長平哉相傳丹溪之書多雜以贗本故頗有謬處
或者其然

薛立齋之論陰虛發前賢之所未發其謂陰虛乃
足三陰虛也足三陰者足太陰脾足少陰腎足厥
陰肝也而脾屬土尤為至陰而生血故陰虛者脾
虛也補陰宜自補脾始大凡足三陰虛多因飲食
勞役以致腎不能生肝肝不能生火而害脾土不
能滋化但補脾土則土生金金生水木得平而自
相生矣先生治一人飲食失宜患暈熱口乾體倦

折肱漫錄

卷四

四

小便赤瀉兩腿酸痛令服補中益氣湯彼不信而
服四物湯知母黃柏之劑變症百出後仍服甘溫
等藥而愈蓋脾稟於胃故用甘溫之劑以生發胃
中元氣而除大熱顧乃反服苦寒復傷脾血耶若
前症果屬腎經陰虛亦因腎經陽虛不能生陰耳
經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云虛
則補其母當用補中益氣六味地黃以補其母尤
不宜用苦寒之藥世以脾虛悞為腎虛輒用黃柏
知母之類反傷胃中生氣害人多矣

立齋云若人少有老態不耐寒暑不勝勞役四時
迭病皆因少時氣血方長而勞心虧損或精血未
滿而御女過傷故其見症難以悉狀此精氣不足
但滋化源其病自痊又若飲食勞役七情失宜以
致諸症亦當治以前法設或六淫所侵而致諸症
亦因真氣內虛而外邪乘襲尤當固胃氣為至蓋
胃為五臟之根本故黃柏知母不宜輕用恐復傷
胃氣也凡雜症屬內因乃形氣病氣俱不足當補
不當瀉傷寒雖屬外因亦宜分其表裡虛實治者
折肱漫錄

卷四

五

審之先生此論提綱挈領滋化源固胃氣二語真
醫雜病者之龜鑑也經云安穀則昌人之有生也
先天元氣全賴後天之穀氣以助之故脾胃不傷
即有他病猶可調治若脾胃壞飲食少本根之地
既搖則雜症蜂起而難為力矣故切脈先看胃氣
有胃氣則生無則死養病家第一先須於脾胃上
着力每治他病切須照顧脾胃不可一意攻伐忘
其本根于自恨年少不知醫受累已多故特揭此
以告患者

薛立齋先生治虛勞諸症大概以補中益氣湯六味地黃丸二藥兼服取效最爲純王妙理但王者必世後仁此藥亦須歲時方効若服之三四月輒以爲無大効而置之則謬矣予初病時亦曾遵此法以自藥一兩月未見効遂爾易方醫藥亂投幾殆比受苦二十年後來畢竟以此收功悔之無及王節齋極言陰虛之症不可服人參服人參過多者不治人參爲中和之妙藥雖云補氣佐以血藥亦能補血者何得概禁勿服予初守此戒凡遇肺

折肱漫錄

卷四

六

火衝激痰涎壅盛輒禁參朮不入口而服清涼之劑殊不効後讀他書有悟即痰盛喉腥亦服參朮不輟究竟不見助火而肺氣旋清始知肺中實火方忌人參若虛火非參不治土爲金母虛則補其母故服參朮等藥而痰火反愈妙理昭然王氏之言悞人不淺予生平善病方書所載之症候十患其五本草所載之藥品亦十嘗其五於病之情狀藥之利害知之已深今年六十餘矣而後知治病必以脾胃爲

本東垣立齋之書養生家當奉爲著蔡者也至於脾土補之不應則求端於其母而補命門之真火以生之立齋之論尤精

方書言治病者裏其大半而止不可過也則反傷元氣大凡以藥攻病者去其大半即宜養正氣而佐以祛邪正氣充則邪氣自盡若必欲盡去其邪而後補正將正氣與邪氣俱盡而補之難爲力矣予少不知此理每爲人言所悞王節齋論治痰謂中焦之痰胃亦賴其所養難以盡去去盡則胃

折肱漫錄

卷四

七

虛而難治亦同此理常聞庸醫有祛邪務盡之語大是悞人玉機微義其議論多精妙處亦醫書之上乘也腠理虛爲陽虛爲表虛爲衛虛人身中清陽之氣上升達表所以固皮毛而實腠理謂之衛氣衛氣象天天包地外一氣之所攝持猶衛氣包護一身而使內者不出外者不入故衛得其養則陽氣自覺常充汗少泄風邪自不能中內經云陽密乃固陽密即腠理密矣此氣蓋本於胃而至於肺故衛充

即胃充肺虛即衛虛益氣湯以甘溫養胃中生發之二元氣以升柴提下陷之清陽清陽上升衛氣自實汗不斂而自固矣又謂胃氣一虛肺氣先絕汗乃大泄故先以參朮培其脾使土王金生則滕理自密而汗乃戢蓋養胃助脾即所以補肺之母而充固衛氣無他法也若陽氣虛甚而津脫不止者前湯不能取効須加熟附子以固其陽陽固衛氣斯復矣要知畏風多汗易於感冒等症總皆陽氣不足所致也

折肱漫錄

卷四

人

立齋云凡人元氣素弱或因起居失宜或因飲食勞倦或因用心太過致遺精白濁自汗盜汗或內熱晡熱潮熱發熱或口乾作渴喉痛舌裂或乳脹脹脇肋作痛或頭頸時痛眩暈目花或心神不寧寤而不寐或小便赤澀莖中作痛或便溺餘滴臍腹陰冷或形容不充肢體畏寒或鼻氣短促或更有一切熱症皆是無根虛火但服十全大補湯固其根本諸症自息若攻其風熱則悞矣此千古格言不可不察

沉香化氣丸最爲猛烈無經不傷無臟不損不可輕用者

倒倉之法不宜施於老弱曾聞有以倒倉而不起者

陰絡傷則下血陽絡傷則吐血悞服攻積之藥故傷陰絡悞服破氣之藥故傷陽絡

予當夏令時患小便黃濇短少時值秋冬又患小便頻多而利予總聽之不治亦無大害古人云凡

老人小便短少便是病進之兆亦未必盡然

折肱漫錄

卷四

九

王節齋亦醫家名手但所著明醫雜著議論多偏薛立齋每條下一註脚而梓行於世蓋恐後人悞信貽害不淺故特爲剖析其是非其有功於世也大矣

王節齋論東垣用藥如韓信將兵多多益善丹溪不過能將十萬故不敢効其多一公醫品原自徑庭况丹溪之書所傳失真故遵其法以治病多至悞人學醫者其察之

立齋曰異法方宜論云東南之域卑下濕熱其人

滕理疎通汗液妄泄陽氣內虛故宜食椒薑辛熱之物以助其陽西北之域高峻風寒其人滕理微密汗液內固陽氣充實不宜食椒薑辛熱之物反益其陽昔東坡先生仕黃州其民疫癘流行先生以聖散子治之甚效蓋其地卑濕四時鬱熱滕理疎通陽氣虛寒是以相宜西北疫癘民用之死者接踵風寒各別治法不同不可不知也

立齋云王太僕先生曰大寒而甚熱之不熱是無火也大熱而甚寒之不寒是無水也晝見夜伏夜

折肱漫錄

卷四

十

見晝止不時而動是無火也大抵病熱作渴飲冷便秘此屬真熱或惡寒發熱引衣踈卧或四肢逆冷大便清利此屬真寒或躁擾狂越欲入水中不欲近衣此病屬虛乃外假熱而內真寒也故虛勞發熱之症治以寒藥而反甚者此也由此觀之則熱症常少而寒症常多芩連梔柏等藥豈宜輕用無火者益火之源以消陰翳八味丸是也無水者壯水之至以鎮陽光六味丸是也此治法之大畧也

臨川陳先生云醫風先醫血血行風自滅蓋肝藏血而主風又肝氣為陽為火肝血為陰為木若肝火王則肝血必虛故凡風病多因肝經風火為患常推五臟相勝相生以益其血經云腎藏精而主骨故腎虛則骨中熱或湧泉穴或兩脛兩足內熱多患骨痠以致不起屬足三陰虧損之虛熱耳滋其化源庶可保其生

立齋云針灸各有所忌經曰形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺之刺之則重不足重不

折肱漫錄

卷四

十一

足則陰陽俱竭血氣俱盡老者絕滅壯者不復矣東垣曰脈浮數而發熱咽乾面赤時渴者皆熱在外也不可灸灸之災害立至俱不可不慎予父子母子兄皆以卒中不起父母病時予醫理未透予兄病時予在燕京皆隨俗先進牛黃青心丸延到時師皆用祛風化痰之劑絕無一効及聞立齋醫案治王車駕卒中昏憤口眼喎斜痰氣上湧咽喉有聲六脈沉伏此真氣虛而風邪所乘以三生飲一兩加人參一兩煎服即甦即五不治症

用前藥亦有得生者夫前飲乃行經絡治寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許駕驅其邪而補助真氣否則不惟無益適足以收矣觀先哲用芪附參附等湯其義可見即立齋先生之言要知牛黃丸乃香放通經之藥亦宜用人參兩許煎湯調服方可若單服則真氣愈散矣竟以不知醫而誤用可勝痛恨為人子者不可不知醫信夫雖然前條治法以施於中風中寒諸症妙矣又有虛火衝逆熱痰壅塞以致昏愒顛仆者狀類中

折肱漫錄

卷四

三

風恐附子非所宜服立齋治王進士勞役失於調養忽然昏憤謂是元氣虛火妄發挾痰而作急灌童便神思漸興更用參芪各五錢芎歸各三錢玄參柴胡山梔炙草各一錢服之稍定察其形倦甚又以十全大補湯加門冬五味治之而安予從弟履中年方強仕以勞心憂鬱而得斯症痰升遺溺眼斜視逾時不醒竟類中風亦灌以童便而甦此等症候皆火挾痰而作又非三生飲所可治者并薑湯亦不相宜也同一卒然昏憤而所因不同須

審而治之

海寧陳月坡云凡卒中者不宜雜飲以湯即薑湯亦不可與飲食便亂經脈陳有刺穴法甚妙先學士葵陽公年近六十精神正王苦瘍候信友人草方服大黃下之遂致精神頓衰肌肉盡削調理半載竟不可復後又患泄瀉遂得前症立齋治法正相宜恨不早究心此書尤恨時師何無一人讀此書而皆貿貿也

折肱漫錄

卷四

三

風自火出故熱則生風試觀天道每遇伊鬱之極則發大風必然之理故中風之症多生於內熱若血凉水足風自何生六味丸益氣湯所以當常服也風不必皆外感常從內生不可不知薛立齋治風症亦間用愈風丹然佐以八珍湯六味丸非單服前丹也凡人精神極壯實者偶患痰厥可服牛黃丸友人屠伯尚忽然痰壅不能語服牛黃丸立愈予姊丈周公美一日忽神呆目怒頃之痰湧手揚足擲有類中風不服藥次日自愈此等稟賦百無一二

凡人脾胃氣虛而飲食難消者必以參朮爲主治而少佐以消導初服頗覺迷悶後必得漸爽若專治其食則愈消愈虛而食愈不消矣此與治痰同理蓋治病必窮其本見病治瘵豈爲良醫

乙巳之夏予患中脘痛既而泄瀉偶遇姑蘇一名醫令診之驚曰脾胃久傷不治將滯下予體素弱憚服攻剋之劑因此醫有盛名一時惑之遂服枳實黃連厚朴山查木通等藥數劑又服枳朮丸一月以致脾胃大傷是秋遂溘洩不止漸覺飲食難

折肱漫錄

卷四

丙

化痞悶倒飽深自悔恨服參朮等藥及八味丸十餘年始得愈然而中氣終不如故苦不耐飢稍飢則中氣大虛其憊不可狀凡山查等消導之物入口即虛脾胃之不可妄攻如此方書極言枳朮丸之妙孰知白朮雖多不能勝枳實之迅利予友胡孝輅刺史亦悞服枳朮丸而大病可見此丸斷非健脾之藥或飲食停滯偶一二服則可耳參朮膏補脾之功最大人不能多飲食者多服此膏能令飲食大進予長子寅錫服此甚驗

予生平飲食喜熱而畏冷係中氣虛寒常服六君子湯加炮薑氣滯更加木香甚効

凡人脾病服補土藥不効即宜服八味丸以補其母予服此甚効許學士云有人全不進飲食補脾藥不効予授以二神丸服之頗能進食治法虛則補其母不能食者戊己虛也火乃土之母故以破故紙補腎爲癸水以肉苳蔻厚腸胃爲戊土戊癸化火同爲補土母之藥再加木香以順其氣使之斡旋空虛倉廩自能受物凡人腎氣怯弱真陽衰

折肱漫錄

卷四

圭

虛坎水不溫不能上蒸脾土是以飲食不進或食而作脹大腑溘泄譬諸鼎釜之中置諸水穀下無火力終日米不熟黃魯直常記服兔絲子淘淨酒浸曝乾日挑數匙以酒下之十日外飲嗽如湯沃雪服二神丸兔絲子與服八味丸同一理是千古不易之妙法嚴用和云古人謂補腎不如補脾予謂補脾不如補腎腎氣若壯丹田火盛上蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣立齋云凡停食泄瀉之症若食已消而泄未已宜

用異功散以補脾胃如不應用補中益氣湯升發陽氣凡泄利色黃脾土虧損真氣下陷必用前湯加木香肉豆蔻溫補如不應當補其母宜八味凡又叅之瘧疾門有云凡停食症宜用六君子湯加枳實厚朴若食已消而不愈用六君子湯立齋治停食泄瀉等症必以參朮助正氣而佐以消導庶不傷元氣真為良法子見時師治泄瀉未有不以消導分利為常法者陰損人元氣而人不知亦可歎也又考王節齋云凡泄瀉病悞服參芪等甘溫

折肱漫錄 卷四 去

之藥則病不能愈而或變為黃疸蓋泄屬濕甘溫之藥能生濕熱故反助病邪久則濕熱甚而為疸也即立齋醫案中亦言李少宰泄瀉悞服參芪變為黃疸然則泄瀉初起益氣湯所宜禁者歷考立齋治泄瀉大都用六君子加木香神麴等藥蓋六君子無黃芪當歸而又加苦泄之藥自非甘溫比耳
子脾胃本虛往時悞服消尅之藥頓覺中氣下陷胃脘中空空然神氣倦怠虛汗不止手足不溫大

便亦無氣推送急服益氣湯等藥連服十餘劑中氣乃漸復消尅之藥不可輕服也如此俗有以食消食之法以飯肉等所傷之物燒灰存性為未用酒或陳皮湯下之頗効此物似不甚傷脾可用王宇泰先生準繩中亦曾載之又有以酒藥燒灰服者便覺傷脾更有服生酒藥者最為峻厲不宜用立齋云大凡食積痞塊症為有形所謂邪氣勝則實真氣奪則虛惟當養正則邪積自除矣雖云堅者削之客者除之若胃氣未虛元氣尚實乃可用

折肱漫錄 卷四 去

攻削或病久虛羸或元氣素弱者但當固本為主而佐以消治不然反致痞滿不食而益其病矣玉機微義之論治積痰同此見是千古格言不可忽也予在臨江時悞服厚朴傷中氣之後偶食大肉一塊遂覺停滯時中氣正虛不敢加山查等藥考本草食大肉不消煮蘆根汁飲之可消予如法煎飲覺右脇下微痛次日大痛殊不可解自是日甚一日坐卧皆妨反側痛如刀刺右脇下按之有物如雞子方書言右脇痛屬食積痰積有謂須攻治

者有謂不宜攻必須助正以消邪者時有醫主攻
治謂不治將成痞塊予不以爲然確守助正之說
當痛極時不敢服藥靜以守之俟痛小定氣雖痞
即州六君子加木香等行氣之藥以漸調之竟得
痊可若誤信攻伐不知死所矣

脾胃好煖而惡寒脾虛必宜溫煖之藥予內人少
患脾有冷痰時患嘔吐不止服藟麥五蒸丹數
丸遂不復發予近患脾不和不時溏泄服參朮兩
三月不効服胡與辰金鉛一丸肛門頻欲漸調而愈

折肱漫錄 卷四 六

月安妥家庵中有一比丘尼久患脾疾甚殆肛門
不收穢水任出服金鉛一丸肛門頻欲漸調而愈
其神効有如此者故知脾病之宜於溫煖也胡乃
儀徵人

病之初起用芍藥湯而加大黃以蕩滌其滯此常
法也然稟質有強弱歲運亦有不同概服大黃常
有至隕命不可不慎

脾胃爲五臟之本餌朮不宜獨後於人參以朮一
兩佐參五錢煎膏最能補中氣近有以朮二斤佐

陳皮半斤煎膏服之亦妙予餌朮常不輟計一歲
所服可得五六斤參則僅一斤許耳

時師見小便不利大便不實多用茯苓澤瀉等淡
滲之藥不以爲意立齋每謂淡滲導損腸氣反益
其病而兢兢乎慎之絕不用以治此症識見超出
等夷吾人不宜輕忽淡滲之劑而頻服之也

傷飲食者醫多妄下使清氣下陷則濁氣不得降
反生脹脹故東垣治以補中益氣湯所以升舉其
下陷之清氣則濁氣自降不治而愈也

折肱漫錄 卷四 七

立齋論傷食不消若傷性熱之物用二陳湯加黃
連山查若傷濕麪等物用二陳加神麪麥芽若傷
米食用六君子加穀朮傷麪食者六君子加麥朮
傷肉食者六君子加山查傷魚腥者六君子倍加

陳皮傷角黍炊飯者六君子倍加酒麪若食已消
而泄未愈者此脾胃受傷也單服六君子湯若飲
食減少或食而難化者屬脾胃虛寒加炮薑木香

肉果不應加五味子吳茱萸補骨脂若脾胃虛寒
者服八味丸否則多患脾虛中滿之症其神麪麥

芽雖取戊土以腐熟水穀然麥牙一味子常以治
婦人喪子乳房脹痛欲成癰者用一二兩炒熟煎
服即消其破血散氣可知矣丹溪云麥芽消腎婦
人良方云神麴善下胎皆尅伐之劑不宜輕用
立齋云凡久瀉脾虛飲食難化之症多由泛用消
食利水之劑損其真陰元氣不能自至持遂成久
泄若非益氣湯四神丸滋其本源後必胸痞腹脹
小便淋瀝多致不起

痛無補法自古記之然立齋治唐儀部腹痛面色

折股漫錄

卷四

三

黃中見青左關弦長右關弦緊用益氣湯加半夏
木香而愈治李儀部腹痛面色黃中見青兼赤肝
脉弦緊用益氣湯加山梔而愈蓋木本尅土土衰
則木愈勝而乘之故脾病多受肝累然察色須審
黃乃脾色青乃肝色黃中見青乃爲木乘土兼赤
則是土又生火矣故用山梔以清之益氣湯本不
宜於治痛加半夏木香等藥則補而不壅矣此先
生妙手非他人所及
大凡腹滿痛按之不痛爲虛痛者爲實按此症須

細察虛實虛則用立齋之治法實則當守痛無補
法之戒至若霍亂腹痛候飲米湯即死屢屢見之
不可不慎也

予少患下元氣虛不能多言稍不戒所得病不可
狀丹田若無物者甚則夜半陰極之時陽氣欲脫
手足厥冷汗大洩一交子丑氣乃漸復此係腎陽
衰弱之候常服溫腎之藥於滋陰料中多用兔絲
子枸杞子肉蓯蓉五味子鹿茸紫河車之屬遂得
漸愈前症因目病悞服黃連丸頓劇要知陽衰之

折肱漫錄

卷四

三

症寒藥所最忌如知母黃柏之屬最傷胃中生發
之氣即平人亦不宜多服者又本草云升麻川芎
下虛人忌服予服四物湯川芎稍多服補中益氣
湯失加人參皆頓覺下虛前病陡發藥之響應如
此
予自廿四歲患下元虛怯中年大受其累終日以
三緘爲戒至四十後漸充老年反無此苦豈壯年
氣反不足耶抑老來得力於服藥之久耶予弱冠
患傷風不遠牀第每晨起即鼻重流涕竟日痰不

絕口留連月餘遂見痰中縷血遺害無窮諺云傷風不醒結成勞蓋金水二藏情關子母金傷則不能生水子瀉則其母愈虛水不能制火火乘金而金益敗此勞嗽之症所由成耳信乎傷風雖小病最不可不慎者故補脾保肺乃養生家第一義而肺病極宜斷色慾相關相應撻於影響

予臨場慮不耐風寒合玉屏風散服之反自汗津津不止蓋防風與黃芪各等分之謬也本草云黃芪得防風其功愈大用黃芪七分配防風三分斯

折肱漫錄

卷四

三

得之矣

予弱冠患痰中縷血憂惶特甚治以清痰涼血之藥殊不效以憂病日進面熱而手冷喉膩而口乾兩背不舒夜作微熱幾成瘵症就醫吳門醫者投以芩連之劑甫兩服忽然手冷過肘足冷過膝陡覺鼻中出冷氣神魂飄忽如從高橋下墜陰陰然莫測所止之狀亟呼薑酒飲之速煎人參湯加薑服之神稍定延名醫張蓮水診之云無害平調之可矣勿以寒藥傷而遽服熱藥也治以八物湯

加天麻子遵服二三十劑神氣雖稍寧然自此陽氣頓衰三冬必以火自隨而慘慘漸瀝之象幾無生人之樂矣予後閱方書云鬱火之症最忌寒涼犯之當死于本以憂鬱成此火症竟犯此忌不死幸耳初以陰虛致疾到此則陰陽兩虛乃大服溫補氣血之藥及紫河車紅鉛秋石之屬病乃稍瘥縷血之症十餘年間不時乍發後來置之度外不復省視竟爾相忘予親友人患此症者頗多俱未見天折要知此症亦非難治之症也

折肱漫錄

卷四

三

此熱是火不時發熱是無火火衰而浮火不歸源故反致發熱

立齋云凡人飲食起居失宜見一切火症悉屬內真寒而外假熱故肚腹喜煖口畏冷物此乃形氣病氣俱屬不足法當純補元氣為善內傷症似外感一時難辨立齋以腹喜煖口畏冷物二者別之最為良法

心為君火可以水折可以涼治相火為龍火不可以直折當從其性而治之故世間之火可以水滅

至於龍雷之火及火井之火見水則熾得火則滅此亦絕可異事而有妙理存焉蓋真陽虛耗故火不歸源而變爲假熱之症此必用桂附等佐補藥引火歸源而後游行之火始伏乃信此理微妙世醫少知

又有腎陰虛陽無所附而發於外亦見假熱之症王太僕云大熱而甚寒之不寒是無水也當峻補其陰用加減八味丸大料多加肉桂以恣飲之陰虛而用肉桂者寒因熱用之意也大凡以熱藥治

折肱漫錄

卷四

齋

寒症以寒藥治熱症一時格拒不入故用一味引而從之其理至妙有熱藥冷飲寒藥熱飲之法亦即此意

大凡勞心好色者久則陰虛火盛若入房而驟病者多屬陽虛火衰

勞則發熱無時此係氣血俱虛之症但補其虛不宜治其熱此予所經患者

丹溪醫案有人足熱不可加綿自誇吐實丹溪云此陰虛也不治將痿其人不信年近四十患痿而

死又云人有熱氣從臍下起者此名陰火又有從湧泉穴起入腹者此爲火起九泉之下百不救一予久病後患左腎常熱年餘忽覺足熱其火遊移不定或發於足面或發於足心或發於兩腿雖不至如所云起自足心衝入腹內然大概相類此症不勝憂疑據丹溪治法須用四物湯加知母黃柏等劑予向忌寒涼不敢依此治法仍用溫煖之藥竟無大害蓋腎熱足熱其爲陰虛水少此不待智者知之但治以寒涼非徒無益而又害之惟用補

折肱漫錄

卷四

齋

腎養血之藥而以煖藥引經則以火伏火其火自平此即龍火井火見火則滅之義予此病十年方愈後亦間發惟能堅信確守無欲速之心如法調治與病相忘久而自去若遵丹溪之法以求速效此時墓木已拱矣謹揭以告同患

面赤吐痰多是虛火不可作實治予少時患面熱手冷喉膩多痰夜熱謬認爲火症不服溫補之藥以是久而不愈

折肱漫錄卷五

醫藥篇二

遺精 癆瘵 感冒 痰

鬱 癩 雜治

夢遺之症其因不同治亦罕效此病患之者甚多非必盡因於色慾過度以致滑泄大半起於心腎不交凡人用心太過則火亢而上火亢則水不升而心腎不交矣士子讀書過勞功名心急者多有此病其心一散則火降水升既濟而病將自愈凡病起於心大都非藥石之所能療先大夫少年極

折肱漫錄

卷五

一

苦此病蓋用功過苦名心太急所致每臨場則愈頻陽事少着物即遺若無可奈將床席俱穿一大孔以臥使其無着是科發解武林居停邀其親戚女客飲喜酒相率觀解元公書室則床席有大孔皆莫解其故以為笑談一自發解後夢泄便希及登第後則愈希矣予少年亦苦此迨登第後頓希漸老愈減于是益信此病關心不可獨責于腎而心病非藥石所能療也故治遺少良方

不夢而遺謂之遺精予年三十二曾患之龜頭時

有精微微流出晝夜常然予初時驚懼特甚人身中幾許精血而堪此涓涓不絕乎醫之高明者慰予無害但毋服澁藥予病以慢服附子得之知是火症勸予涼補而勿熱補仍服六味丸加沙苑蒺藜兔絲子及炒黃柏少許等藥將此病付之度外莫真諸懷如常將理凡兩年而始全愈龍骨牡蠣等藥從未入口蓋人身中惟氣血周流斯快暢豈可澁之使滯雖得暫效貽害實深患者審之予初有懼心及兩年間應酬如常絕無倦態豈此精與

折肱漫錄

卷五

二

交媾之元精不同故無大害耶

肌肉蠕動方書亦指為風薛立齋獨玉氣血虛熱不作風治此論高出等夷予向患指麻時亦見此症但補氣血不治其風故不受其害

予四十七歲忽患小指麻軟時作時止每夏愈而冬甚素聞指麻當防中風因講求預防之法有言宜祛風化痰者其說大謬有言宜順氣活血者謂氣行則痰自消血活則風自滅其言近是及讀薛氏醫案治蔣州判中滿吐痰頭暈指麻先生云中

滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭暈者脾氣不能升也指麻者脾氣不能周也遂以補中益氣湯加茯苓半夏以補肝土用八味地黃丸以補土母而愈後惑於乾坤生意方云凡人手指麻軟三年後有中風之疾可服撲風天麻二丸以預防之乃朝餌暮服以致大便不禁飲食不進而歿夫預防之理當養氣血節飲食戒七情遠禪曠可也若服前丸以預防適所以招風取中也予讀之快然遂確守先生之法蓋於今十有三年矣

折肱漫錄 卷五 三

予既信服立齋之書又遇海昌名醫陳月坡診予指麻之症議與薛合將補中益氣湯加減令予作丸服之醫家守古方皆謂湯不可丸丸不可湯獨月坡以湯爲丸殊是創見予遵而服之其力大勝於湯予病後弗能勝勞服前湯未効自服此丸遂覺勞而不病然則古人所立湯丸之方亦不必守膠柱之見也
立齋謂指麻是脾氣不能周真確論惟脾氣不周又不加意調攝以致虛而又虛故忽有中風之症

者認指因風而得麻而預餌祛風之藥以防之真所謂招風取中矣蓋撲風等丸多戕賊脾胃之藥斷不可輕服凡人脾氣不傷雖病可療若脾元一敗虛弱却走乾坤生意等書悞人不淺故非明理之儒醫書不可亂讀
凡臂痛指麻等症粗工無不以風治至於口糾語澁痰湧更無不確信以爲風者薛立齋治法獨推本于脾而必以補脾肺之藥奏效斯真元元本本之論不可爲粗工道者

折肱漫錄 卷五 四

立齋治高倉憲兩腿痿軟無力勞則作痛如刺人皆以爲風立齋曰此肝腎陰虛火盛所致痿軟者真病之形作痛者邪火之象用壯水益腎之藥而愈前症往往認爲風輒用發散而促其死者多矣予已酉夏應試南都與姊丈吳公甫聯社課藝見公甫步履微有不便云苦腿痛精神固無恙也聽庸醫之言以爲風濕遂專服云風燥濕之劑形容日槁八月間見咯血之症肌肉盡削至冬而歿即此驗之則腿足酸疼不可概作風治也益明矣腿

足皆是三陰部位多係肝腎陰虛法宜滋補顧反服風藥以耗之寧不速其死

王節齋云凡中風偏枯麻木之症必用南星半夏立齋云先用前藥清其痰即用六君子之類扶胃氣痰自不生若槩用風藥耗其陽氣而絕陰血之源適足以成其風益其病耳

時師治人感冒不論形氣虛實輒忌人參不知古人論虛人感冒不任發表者服補中益氣湯夫參且忌之而令服芪朮有不驚而咋舌者乎予初病

折肱漫錄

卷五

五

外感憚不敢服參名醫朱心園始教我助正疎邪不妨並劑及覽方書亦有觸發遂敢補散兼施頗覺相宜後至黃芪與防風並用亦未見壅閉外邪大槩醫家立論不同止有二說一則謂外感之候必須先散而後補停食之候必須先消而後補一則謂攻補可以兼行兩說每致枘鑿予初亦不能無惑乃後屢以身試始悟氣體壯實者可以散之消之而後補若氣體虛弱之人必先扶其正而後可以攻其邪一補一攻邪氣乃去倘泥於先攻後

補之言則邪氣未即去而元氣已先傷矣可不戒哉

凡人感風寒醫家必云不治邪將入內須及其在表而散之殊不其然予遇體中不快或時發熱未審是外感是勞傷將補藥表藥一槩停止惟避風靜養禁葷啖粥以守之恒得漸愈蓋外感勞傷病形相似悞藥有大害予曾悞服柴蘇湯數日體便狼狽每至夜分後即自汗大費調理不可不慎

外感肩背拘急勞傷亦然不可悞認其餘方書辨

折肱漫錄

卷五

六

之甚詳

人感風寒兩背必覺拘束不快及服表散藥汗之而拘束猶故此榮衛傷而血氣不充故也若謂邪猶未盡而再表之則受虛虛之禍矣

立齋云凡感冒咳嗽若悞行發汗過多喘促呼吸不利吐痰不止必患肺癰今但遇傷風咳嗽即服疎散之劑請以此語爲鑒

凡惡風寒流涕及寒禁噴嚏等症只宜茹素避風好自調理不可輕服散風之藥薛氏醫案中載

慎服疎風藥致體麻痰壅狀類中風治以益氣湯加門冬五味而愈可不慎與予膝理素虛自幼畏風風寒一襲涕唾隨至甚則發熱汗津津不止少時不知醫理謂必先散其風而後服參芪以質之豈知愈散愈虛外感益易四十歲以後方悟此理遂以補中益氣湯丸為常服之藥若值外感但住服益氣湯而疎散之藥禁不入口茆素避風以守之數日自愈而元氣不傷夢知膝理疎豁之人即感冒亦不可輕易發表慎之慎之

折肱漫錄 卷五 七

立齋論咳嗽云肺氣虛則腠理不密風邪易入治法當解表兼實肺氣肺有火則腠理不閉風邪外乘治法當解表兼清肺火邪退即止若數行解散則重亡津液邪蘊而為肺癰肺痿矣又云夏月尤當服六味九壯水以鎮陽光凡痰火症時師必禁用熟地以其膩也多用橘紅貝母天花粉等藥以消痰及涼藥以降火常觀先賢用六味九稍加別藥以治痰而奏效蓋痰因火動補其陰則火降而痰自消若專治其痰脾胃先

傷而痰終難治矣况又有腎虛而水泛為痰者尤宜服六味九予常患痰症不輟六味九未見膩膈助痰而屢以得効者

立齋治痰每言腎虛水泛為痰法當補腎予壬申秋咳嗽多痰自知因於色道先生法恪服六味九更不治痰嗽月餘竟愈時師治痰最忌熟地以為膩膈是烏知箇中妙理哉

歸脾湯治脾而開鬱道遙散治肝而疎鬱治鬱此為妙劑他藥恐耗散元氣宜慎用之

折肱漫錄 卷五 八

予少年患鬱火之症面時赤而熱手足不溫後覺咽乾口燥體中微熱夜更甚就醫吳門粗工投以黃連黃芩黃柏等藥服方二劑忽覺手足甚冷漸過腕過膝鼻間突出冷氣神魂如從高橋墜下深谿陰陰不能自止幾登鬼錄延名醫張蓮水治之張云症雖悞服寒藥之症又不可驟以熱藥激之但服八珍湯加薑及天麻久當自愈如法調之雖漸安而元氣則大減矣後簡方書有云鬱火之症不可折以寒劑悞治致死然則予之不死幸也

夫記之以爲鑿戒

立齋云大凡久瘧乃屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血
虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒
熱交作或吐涎不食泄瀉腹痛手足厥冷寒戰如
慄若悞投以清脾截瘧二飲多致不起按山瘧久
不止者多成壞症想不遵此治法而醫藥亂投之
故予表兄沈鴻生孝廉精神素自闕游歸患山
瘧幾一載元氣都耗後瘧雖止而面黑眼黃見者
驚異如是又二載卒以鼓脹亡先生指久瘧爲元

折肱漫錄

卷五

九

氣虛寒信爲確論

立齋截瘧法以參朮各一兩生薑四兩煨熟煎服
即止或以大劑補中益氣湯加煨薑尤効生薑一
味亦効

立齋治瘧與時師迥異時師大都用黃芩柴胡之
類謂必先散其邪而後用補劑予少時曾患此雖
不敢服清脾截瘧等藥而所服皆柴胡黃芩之劑
十四五仗方得止亦甚狼狽矣此病最忌生冷葷
腥使滋味澹泊邪氣自衰予病時守戒甚嚴瘧止

後茹素者半月饑極乃葷以是脾胃頓開飲食較
未病前倍增精神始王

立齋治好飲食而致脾虛發熱者用六君子加葛
根神麴山梔蓋葛花能解散飲食酒神麴能消酒
積山梔能瀉火然葛根葛花解肌疎腠理神麴伐
脾敗血山梔性寒體弱人亦宜審用王宇泰先生
準繩中載有飲酒發熱人治以補劑加乾葛猶不
禁其散而極言治酒病者無如枝矩子之妙此物
一名枳椇一名木密俗呼癩漢指頭北人名曰爛

折肱漫錄

卷五

十

瓜江南謂之白石樹杭州贊賣名客屈立詩所謂
南山有枸是也樹形似白楊其子着枝端如小指
長數寸屈曲相連春生秋熟經霜後取食味甘美
以此木作屋椽令一室之酒味皆淡薄趙以德治
酒人發熱用枝矩子而愈即此也又曰此物蘇州
亦有呼爲密六曲徽州最多呼爲金釣子九月有
之子留意徧訪尚未得見也

立齋云凡傷酒泄瀉之症若濕熱壅滯當用葛花
解醒湯分利其濕濕既去而瀉未已須用六君子

加神麴寶脾土化酒積此雖為酒而作實因脾土
虛弱不可專主濕熱

古方治目赤多用疏散寒涼之藥太體虛弱人不
宜服此子乙亥春患目竟不服藥俟其勢稍殺即
服四物湯加甘菊決明等養血之藥三七方愈雖
無速効而氣血不傷

予少時神氣不足患目每用目稍過輒酸澁無光
者累日博考方書多云六味地黃丸可治目予連
服二三料目疾轉甚改服別方補腎養氣血之藥

折肱漫錄

卷五

十一

始得稍愈後讀醫學鈞玄有目病不宜服六味丸
辨謂澤瀉茯苓滲水山茱萸不宜於目言之甚詳
以予驗之此論良是予從今思之目病有屬血虛
亦有屬氣虛者予血固不足氣則尤虛薛立齋治
兩目緊澁不能瞻視以為元氣下陷用補中益氣
湯倍加參芪而愈予悔往時不多服前湯而專事
於補腎養血以致久不痊迨四十後以指麻多服
前湯原無意於治目而目光漸充始信往時之悞
予幼時患風弦爛眼甚受其累百藥罔効遇一陳

姓醫士於長安邸受予白朮藥令敷於眼背患處
隨敷隨愈取効如神不肯傳方予畧訪之云有吐
蛔在內吐蛔者小兒口中吐出蛔蟲收乾候用其
中想更有製就蘆甘石配之者真竒方也

立齋引東垣先生之言曰五臟六腑之精氣皆稟
受於脾土貫於目脾者諸陰之首也目者血脈之
宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明
於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代
行其令相火者包絡也三百脈皆榮於目若勞役

折肱漫錄

卷五

三

過動勢乃妄行又因邪氣所并而損血脈故目病
生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標而不治
本是不明正理也若槩用辛涼苦寒之劑損傷真
氣將促成內障矣

予中年患痔點洗都不効惟白蘿蔔煎湯頻洗差
佳近讀瑯嬛集中載經霜冬瓜皮同朴硝煎洗翻
花痔立愈又法以白蘿蔔代冬瓜亦効冬瓜未之
試蘿蔔已驗矣

予座師茅五芝先生長公子子京偶於醫間患一

毒地非要害直易視之子京素知醫恐痛傷元氣
輒服人參其毒愈甚發寒熱乃始延醫又遇粗工
潰後胸應服參其反不能多服竟致不能收口
而沒蓋癰疽初起先宜瀉毒而後補若補之太
早遂有此禍可鑒也

凡臃腫結核等症世人多視為外科之症而付之
瘍醫立齋以為此屬腎水虧損肝火血燥筋攣法
當滋腎水生肝血用六味丸益氣湯治之其有胸
脇等處大如升斗或破而如菌如榴不問大小俱

折肱漫錄

卷五

三

治以前法

立齋論瘰癧乃脾經血燥當清肝火滋腎水不宜
令外科竟作痰治多成壞症

予年三十時醫生一小瘤根細如線而頭如豆大
越十年而漸大如荔有妨跨馬予有鑒於決瘤之
說不敢醫常歎曰吾年若六七十此瘤當如碗大
必妨行坐矣奈何既而歎曰吾若得至六七十即
碍行坐亦何妨遂安意養之及四十七歲時偶擦
傷瘤皮水滲出不止予懼其成漏乃延潘慧峰問

之潘云欲去此瘤甚易欲塞此漏甚難漏去則漏
自滿矣予不得已聽其治潘以藥塗瘡甚痛其肉
盡黑少頃血出津津予甚懼且悔不復求治但求
止血之藥越宿則黑肉已堅如石片數日脫去其
根尚有如豆水出仍不止予復商之潘潘云不去
其根漏仍不可塞也又以前藥點之痛甚肉黑如
初次日復點凡三次內服托裡散每劑用黃芪五
錢凡旬日堅肉脫去則根已平仍服托裡散外用
長肌收口藥絕慾息勞以漸收滿肌肉完好予之

折肱漫錄

卷五

丙

服藥守禁固勤且慎而潘君亦可謂妙手矣

予窗友賀立庵方伯常言其伯父賀岳精於醫刻
有醫經大旨曾治一孕婦將坐草患小便不通百
藥不效愈飲愈飽束手待斃賀君診之曰此乃脾
氣虛弱不能勝胞故胞下墜厭塞膀胱以致水道
不通大健其脾則胞舉而小便自通矣以白朮二
兩土炒加炒砂仁數錢別加一二輔佐之藥服一
劑小便立通其神如此予常記此言于懷中壬寅
歲予內人有姪臨月竟同此病醫藥無功危甚予

以此法告於醫者喜醫者虛心如賀法治之立効
遂舉長子寅錫予若不聞此言母子均殆矣

予家有女流患便癰兩拘腫痛不能起湯醫用敗
毒藥十餘劑以開藥逼之出膿腫痛愈甚予查薛
立齋外科秘要此症皆因鬱怒傷肝得之治用加
味歸脾湯加味逍遙散間服遂遵而服之不三劑
而腫痛減半六劑而起藥能中病神効有如此者
予孫孟溥山痘起發貫漿俱如法惟回漿太早九
朝左臂發一痘毒醫家通用清熱解毒之藥不四

折肱漫錄

卷五

五

劑而寒戰咬牙之症作矣醫家泥於痘毒不敢用
參朮止用歸芪而尚欲兼解毒予謂痘後氣血俱
虛復以寒藥傷脾故見斯症陽氣已虛甚即有歸
芪亦何能濟而况尚兼清解乎必無幸矣於是詳
考立齋保嬰撮要寒戰咬牙門用十全大補湯即
痘毒門初發時只用仙方活命飲一二劑旋用托
裡散助其元氣則未成可消已成可潰設使氣血
不充則不膿不潰難以收拾予於是斷以已意服
十全湯三劑而寒戰止再數劑而咬牙定乃延瘍

醫妙手外治其毒內服參芪歸芍不輟凡匝月而
全愈當寒戰症作臂腫方撤其藥頗多疑慮人參
且不敢多用而况白朮至於桂更不敢用至三分
者予歎曰予生平服立齋之書立齋不悞我豈獨
悞此孩乎即悞寧悞於立齋遂決意用大劑參朮
加桂至五六分不惟寒戰咬牙之症得痊而臂毒
亦旋愈立齋之治幼科其妙亦如此也

折肱漫錄

卷五

六

余媳申氏多鬱怒忽患不月腹漸大疑有妊醫者
視之亦以為妊也十餘月而弗產諸症漸見乃始
疑之醫者亦以為畜血之症時有欲下之者眾議
以為體弱不能勝止可暗消於是久用行血調血
之藥而不敢用下血之藥竟弗効厥後醫藥雜投
遂至不起余一日偶閱震澤紀聞載盛啓東治
東宮妃一案大為悔悼永樂中東宮妃張氏經不
通者十閱月衆醫以為胎也而脹愈甚 上命太
醫院盛啓東診之一一如見妃喜甚及出而疏方
皆破血之劑 東宮大怒曰早晚望誕育而用此
方其可乎置之數日病益劇乃復召診啓東仍疏

前方 東宮用其藥而禁其家人惶怖以為不免越三日歸紅棍前呼賞賜甚盛蓋妃服藥下血數斗而疾平也子媳病正與此符當十月外既確知非奸即宜大膽下之當可得生惜醫家無此膽不亦善乎

予倩孫培之得胡與辰金鉛丸有一比立患山瘡久不止與一丸服之減半再與一丸頓止益山瘡屬元氣虛寒金鉛丸能助陽氣故兩丸而竟愈也予家有庖丁王姓生平多慾年四十患脚痛往針

折肱漫錄

卷五

七

予若上予謂此是三陰虛針無益也數年後患瘵喘胸中痛晝夜不能眠予謂此腎虛氣不歸源峻補其下則氣自降適名醫陳月坡來診其持論與予畧同奈病者服陳藥嫌其作閻別尋粗工治之大服降氣寬中之劑服後覺寬寬後復發病者尚以暫寬為効信服之以至於死良可歎也大凡此等病服藥初覺闊久當漸寬漸愈患者嫌闊而別求寬藥死者比比而是如脾虛者亦然初服术必作悶久則自寬破氣消導之藥服之覺寬久乃愈

悶以至不可救病者不可不知

折肱漫錄卷五終

折肱漫錄

卷五

六

折肱漫錄卷六

醫藥篇 品藥

人參固補氣亦能瀉血蓋補氣而血自生陰生於陽甘能生血也王節齋謂勞疾陰虛服人參過多者不治恐是一偏之論蓋節齋方論用參最少與時師動必用人參者其弊相等惟肺受火邪實熱與夫陰虛勞極而喘急者則忌用耳予幼時參價甚賤十五六歲時亦時服參憶一兩止價三錢耳後日漸騰貴不數年價即與銀等至後破藩鐵而

折肱漫錄

卷六

一

價益高甚至三鍰東事敗復參之騰湧無足怪前此何以頓貴耶蓋前此醫者多不敢輕用參每等於附子用者少故價賤後來服參如果無人不用且世俗日益奢雖無東事參之價勢不得不日高乃時勢使然亦可慨也

乾地黃性寒而鮮地黃尤寒不宜單服恐傷脾胃鮮地黃搗取自然汁不見水煎膏貯磁瓶經年不壞懷慶土疎而田多山泉故質大而味厚予曾陪巡懷慶用意竟大地黃不可得土人云上等地黃

一出即為客人販往蘇州本地止存次等者諺云出處不如聚處信然

黃芪之功不下人參但性太綿密能閉腠理有邪者禁服不如人參之補而能宣耳然補益之功似出人參之上我郡岐黃家多不敢用芪惟恐悞補邪氣王宇泰先生用芪最多予少時時因服芪不多終不能勝勞而汗症莫療四十歲後大服補中益氣湯計一歲服四五斤然後能勝勞而汗症漸減往時多服參而無濟後來兼服芪而始効予故

折肱漫錄

卷六

二

駕其功于人參外科毒潰後用生芪補托予臂後生一瘤醫用藥點去幾成漏每日加芪五錢于諸藥內服竟得收功

王節齋云藥之氣味不同如五味子之味厚故東垣方少者五六粒多者十數粒今世醫或用二三錢深以為非吾地時師悉遵此法獨王宇泰先生及穆慕臺用藥五味子甚多王先生治夢遺單煎五味子膏一味考元和紀用經五味子散止一味近來兒曹苦夢遺以五味子一味為丸服之良效

又種子方以五味子肉蓯蓉各等分丸服則東垣之言似亦不必拘也

白芍藥為助脾瀉肝之要藥治瀉劑方中多用之薛立齋獨言有損於脾用此藥想以其性寒耶養生家審之

凡汗症人桔梗薄荷亦不宜輕服紫蘇人忽視之其發散更甚鮮者其力尤猛非真有感冒不可混食本草發明云若下元虛及怒氣上升不可服桔梗升麻

折肱漫錄

卷六

三

砂仁能下氣凡中氣虛人不可服

石菖蒲能通心氣養心丹中多用之然心氣不足者少用以能散氣也

腎藏志故補腎藥中用遠志

菊花清香妙品又能益血祛風點茶釀酒俱快事同地黃釀酒能黑髮作枕治頭風明目葉亦明目香不減花人不多用之何耶

肉蓯蓉五味子各等分加密丸助陽種子友人言有奇効予未之試

澤瀉一味有醫多用之十劑而五者薛立齋每言淡滲之藥不宜輕用惟泄瀉水火不分時暫用一二劑以分利既分即不可滲洩恐導損陽氣變成腹滿之症治者審之

大黃極不宜輕用因大黃安下而致殞者予目中蓋屢見矣即痢之初起大概宜早下然亦須審形症是強弱而後斟酌用藥方書中原有老弱不可之說慎勿可輕

仙茅助陽原非常用之藥有人極贊其功效予宦

折肱漫錄

卷六

四

南安攜十餘觔歸以遺友應太室方伯不受復予東云此藥有毒能殺人予遂不敢以相遺尚容再攷

附子信不宜輕用予少患下元氣虛快服寒藥以致夜半氣脫虛汗大洩不止飄飄似將絕者心中惶懼煎參附湯服之用熟附至錢餘病雖少定而火症大發旋患遺精兩載方愈近年曾因中氣快服尅伐之藥以致頓虛參朮芪等藥服之竟不應遂於補中益氣湯內加熟附子三分服一劑便覺

腰熱之病復發後患鼻動左鼻管中時時有乾血
在內調養一年餘方得愈附子之氣烈乃爾若加
於地黃丸內則有衆養陰之藥和之便不覺其熱
矣

予嘗閱本草成節度張益州進著發丸表頌其功
用之妙不可殫述及閱繆慕臺本草經疏言凡病
人患麻痺骨節疼痛無方由於脾腎兩虛陰血
不足非因風濕所中而得者不宜服此予深服其
言蓋蒼蒼之性輕揚而香治風治濕信有神功斷
折肱漫錄 卷六 五

非補益之藥若悞信而久服必損神氣
向讀本草贊蒼蒼丸之妙久服可以輕身延年予
初患指麻人咸謂宜服此丸予以為雖祛風而無
傷元氣製之與補劑兼服吾心疑之天下無祛風
而不傷元氣之理友人徐顯甫在燕亦患指麻單
服前丸一月餘精神大減步履俱艱遂改服補藥
一月餘步履始得如故乃知此藥亦是耗損元氣
之物本草之言未足信也

本草云人知蘭花之香不知蘭葉之妙散陳鬱之

氣治消渴利水道益氣生津潤膚逐痺如此妙藥
而人多棄之不用可惜也蘭乃幽蘭

忍冬花摘鮮者釀酒清香可愛此藥久服可免癰
疽等症香而有益不服亦愚矣

枳實性烈而速下有推墮倒壁之力若中氣不足
者雖兼補劑亦不可用方書極言枳木丸之妙予
服之閱月脾胃大傷終身受害慎之慎之厚朴性
亦猛厲虛弱之人宜審用本草言悞服脫人元氣
予中氣素弱每因腹痛悞用少許即覺中氣衰德
折肱漫錄 卷六 六

無不立見有時加於六君子湯中亦覺大傷中氣
要知此藥非純善之物即參朮同用亦不能勝也
藿香須自種乃真

吳茱萸辛熱氣猛下氣甚速要知茱萸醬雖快口
亦不宜常服者

蘇合香甘溫而性走竄能散氣故蠟丸不宜輕服
竹葉竹瀝皆取淡竹者為佳世多不辨混取雜竹
而用之安能對症療疾又淡竹草開翠花者俗亦
名淡竹葉鄉人不識藥性有妄認以為是者益謬

矣

橘皮下氣脾虛人不宜當食平當於中氣虛時偶服一二片即覺氣虛不堪以是知藥所宜忌龍眼肉本草言其能補心脾功與人參並若患心血少以龍眼煎膏收貯任意酒飲之予少時思慮傷神後來每遇勞心輒覺心中枯燥幾有心火自焚之象服此膏屢効

山查消肉食亦疏肝氣亦去食積痰然有積滯者宜食無滯不可用棠毳大於山查其消食亦同每

折肱漫錄

卷六

七

見人造查膏及查丁以為食用之供脾弱人不宜混食傷脾予中氣素弱每傷肉食用六君子湯加山查煎服不覺其消有時而暢或胸中無食滯而悞服前劑即覺中氣頓虛乃知此藥亦非和緩之劑故參朮不能勝其消尅也

人陰毛中生蝨名八角子貼伏毛根最癢惱人相傳此蝨不醫延及頭髮眉毛其人當死治法以生銀杏搗爛敷合毛上隔宿其蝨盡死予少年曾患此用此法神效有友為予言生此蝨者運會將否

之兆予患此之後抱病十餘年俯嘗苦楚其言果驗

胡麻最有補益古人稱為仙人飯配別藥名胡麻丸又方獨製一味為胡麻餅用藍色胡麻擇淨淘洗攤於蒸籠內以滾湯從上澆之此藥油最多籠下如絲流掛久而不止俟掛盡上鍋蒸之蒸熟晒乾又如前法入蒸籠內以滾湯澆之又蒸又晒九度乃止牽搗為末煉蜜為餅飢時可以當飯用酒下之頗香甜可食久服明目延年但苦油多不宜

折肱漫錄

卷六

八

於溲泄者亦不宜以茶湯下之予游宦嘗携此以充飢代飯神麩能消麩穀宿食人皆視為和易之藥殊不知性亦尅伐能墜胎予嘗悞服中氣頓虛故知亦不宜輕用者

大麥牙能消食如神麩但能消腎水不宜多用吳中所造豆豉味美而不可入藥本草所造載淡豆豉出江西予宦湖西始嘗此味泰和產者良其味亦有韻可下酒粗人不識也

予家有僕婦患小便不通之症時師藥以九節湯腹漸滿而終不通幾殆矣有草澤醫人以白蘿蔔子炒香白湯吞下數錢小便立通此予親見之者薄荷性涼能散熱紫蘇性溫能散寒皆散氣之劑世人不識藥理暑月每點薄荷湯代茶紫蘇以作餅作蔬忽為食物不知多食大損人氣

香薷乃散陽氣導真陰之劑真中暑方可用今人畏暑輒浸冷而快服之適所以招暑而取病耳若元氣素虛及房勞過度者尤不宜服立齋云人有

折肱漫錄

卷六

九

患暑症沒而手足冷指甲或肢體青黯者皆不究其因不溫補其內而泛用香薷之類所悞也

丹砂雄黃乃金石之藥非水飛極細者不可服服亦不宜多

玄明粉性涼消痰予曾聽方士煉服亦未見效本草發明云仙經雖備述其功浩大若臟腑虛寒脾胃氣弱不可服此為格言

六一散非盛暑中奔走極熱不宜服能損脾胃蓋此藥乃利竅滲濕之劑快服之則愈耗津液矣

爐甘石煨過治風弦爛眼甚效

亂髮煨成血餘入藥最能補血胎髮更効

麋鹿是二物麋乃鹿之大者麋茸性熱補陽鹿茸性溫補陰麋角冬至解鹿角夏至解大有分辨今人概指為鹿茸鹿角而雜用之即世上通行鹿膠不甚效須加毛角數枝方有力

鹿角膠人皆以透明者為佳殊不知毛角製就者其色黑暗品之優劣全不係明暗也爾善製此膠者將角入竹籃內置長流水中任其流滌候淨盡

折肱漫錄

卷六

十

煎之則毫無渣滓色如琥珀可愛然渣滓滌淨血氣亦無有矣亦何益於治病徒為觀美則可耳

阿井之水相傳是濟水其色綠其性急而沉其體較他水頗重予曾至其井取試之蓋濟性清而下故阿膠能益肺降火膠必得烏驢皮煎者兼補腎氣斯為合法然世間阿膠皆雜驢皮所煎非親製不可得也

羚羊角相傳明目益肝予因目病服之殊無効敗龜板取其自死者血肉盡滲甲中氣性全具故佳

耳予聞之王守泰先生云龜性最靈寢設散死後其田高靈可占言有人久服龜版腹中滋生小龜無數以此病死確有証驗故王先生用藥多不用龜版

鍊服紅鉛實為有益予之得延藉力於此非淺乎往時病丹玉氣法不能言百藥不効過一醫家以五炁丹授予纔兩三服即覺氣充能言其効如此是後自畜罈器廣收紅鉛製服較之草根樹皮之功真倍蓰焉衣巷聶邈元之五炁丹之聞務內予

折肱漫錄

卷六

十一

會服之果效李鴻爐進

上之丹予亦曾嘗有友張中吳以紅鉛製為一粒丹用乳調勻簪于鼻內男左女右以鼻孔向上仰承之名為進大藥密室中避風避勞或三七日或二七日淡味將理斷欲百日果有奇効能回陽助元予曾兩試之

予生平亦甚得紫河車之力炙乾河車不佳性熱動火取鮮者長流水洗去惡血其淡紅水不必盡去再用酒漉一遍漚去酒入磁盆封固重湯煮之

一晝夜熟爛為度配以藥末搗為丸如藥末多仍加密其藥方視人症候所宜大約入補陰藥中最宜有人謂河車性熱有火人不宜服此說最悞人河車乃是補血補陰之物何常性熱但以其力重似助火耳

秋石入藥必須水鍊者佳古人取秋露鍊成故名秋石今露不可多得惟以清水鍊之若火煉者則精華已去徒存渣質惡未必能補陰且鹽濕亦難入藥古方所指秋石必指水鍊者而言附子加于

折肱漫錄

卷六

三

八味丸中有地黃等陰佐之便不覺其熱加于補中益氣湯中其性便熱予曾加三分服一劑鼻衄頓發數載受其患

古方用何首烏以赤白各等分用今以得何首烏一時難兼二種勉強成丸服之亦效近來吾鄉多不可得大者若重二劑便為奇貨出山西者最大六七觔者甚多予宦于虔州覓此藥亦有重三四觔者但人言此藥出越中者良他地所產服之多不效予虔州所得以製七寶丹功力果遜人言或

考其然

七寶丹古方服之甚有益加杜仲四兩名八珍丹
人稱其更佳此藥若得大何首烏重三四觔者更
得赤白相配恰合則功力當更有大焉

折肱漫錄卷六終

折肱漫錄

卷六

三

折肱漫錄六卷

兩淮鹽政
孫進本

明黃承吳撰承吳字履素號閻齋秀水人黃洪憲
之子也萬歷丙辰進士官至福建按察使承吳體
羸善病因參究醫理疏其所以著是書分養神
養氣醫藥三門其論專主於補益未免一偏

鍼灸聚英四卷

〔明〕高武撰

中國中醫研究院圖書館藏明嘉靖十六年

陶師文刻本

附《四庫全書總目·針灸聚英

四卷》提要

高氏尚編有鍼灸節要故此
書口有中字字樣其上帙印節
要是也此是聚英單行本特為
註冊
甲庫有乙部一二帙俱全惜
印時較此本為後

余生平勤於搜諸名家醫書
以之別欣然喜不得別憫然
失明知玩物喪志然癖好未克因之
稍減以異讀欽定四庫全書總目
存目載針灸聚英五卷明高武撰
武之事蹟無可考是書別取經似
空穴類聚為一卷為病取穴治法
為一卷諸論針灸法為一卷為歌
賦為一卷凡諸書與素問難經異
同者取其同而論其異故以聚英名
書之余亦覺悸動于心急欲以而讀
之以證其源偏仿諸藏書家
莫之規也溯水求源君臣三醫秘
志在深通醫書搜羅極富曾覽
以此書余向知其價購以人
事竊涉之故于海上飛覓字

更託者在陳校先示之未敢以
應又適九如寓滬乃以此託其不
惜重金購求卒獲此孤本即託
雲陳化謀而未以去凡此一書經三
數人之手一再轉秘始為余有信
秘物聚所司好不期然之如此書於
余求滿恐亦未終為憾耳 書為
明刊本之寶貴檢自未獲書家目
錄罕見者載日本森立之狂羅醫
籍富備無匹其本目至別為一類
本無此本則希見可知矣馬氏不什
醫藏之中華人民建國之十八年
端午前一日成之氏記時年六十二

扁鵲有言疾在腠理熨燭之所及在血脉鍼石之所及
其在腸胃酒醪之所及是鍼灸藥三者得兼而後可與
言醫可與言醫者斯周官之十全者也蓋武謬以活人
之術止於藥故棄鍼灸而莫之講每遇傷熱入血室
閃挫諸疾非藥餌所能愈而必俟夫刺者則束手無策
自愧技窮因悟治病猶對壘攻守奇正量敵而應者將
之心鍼灸藥因病而施者醫之良也思得師指而艱其
人求之遠近以鍼鳴者各出編集標幽王龍肘後流注
神應等書其於燃鍼補瀉尚戾越人從衛取氣從榮置
氣之說復取素難而研精之旁究諸家又知素難為醫
之鼻祖猶易為撰著求卦之原諸家醫流如以錢擲甲

子起卦勾陳玄武騰蛇龍虎斷吉凶似易而亂易也後
世鍼灸亦若是爾嗚呼不溯其原則昧夫古人立法之
善故嘗集節要一書示不窮其流則不知後世變法之
弊此聚英之所以為也故近者猶曰易窮則變變
則通通則久是以古之君子取之郡縣者封建之
變租庸者井田之變後因之固足以經國治世奚怪
於鍼灸之變法哉蓋非今為哉豈知封建井田變
而卒莫如周之延祚八百鍼灸變而卒莫如古之能收
功十全如使弊法而可因則彼放蕩踰閑者可以為禮
以之安上治民妖淫恣蕩者可以為樂以之移風易俗
哉夫易謂窮斯變通久素難者垂之萬世而無弊不可
謂窮不容於變而自通且久也周子謂不復古禮不變

今樂而欲至治者遠然則不學古醫不變今俗而欲收
十全之功者未之有也故續編諸家而折衷以素難之
旨大然後前人之法今時之弊司命者知所去取矣時
嘉靖己丑歲六月六日四明梅振高武獻

一卷

仰人尺寸

中指寸法

手太陰經脉穴

足陽明經脉穴

手少陰經脉穴

足太陽經脉穴

手厥陰經脉穴

足少陽經脉穴

奇經督脉穴

陽蹻脉穴

衝脉穴

陰維脉穴

十五絡脉

五藏募穴

八會穴

二卷

騎竹馬法

冬勞法

竇氏八穴

藏府井榮俞

東垣鍼法

治例雜症

伏人尺寸

五藏六府圖

手陽明經脉穴

足太陰經脉穴

手太陽經脉穴

足少陰經

手少陽經脉穴

足厥陰經脉穴

任脉穴

陰蹻脉穴

陽維脉穴

帶脉穴

十二原穴

五藏俞穴

井榮俞經原合

四花穴

取腎俞

子午流注膠穴開闔

十二經是動所生病迎隨補瀉

治例傷寒

王機微義

二卷

鐵鍼

火鍼

折鍼

鍼灸傷

呼吸

十四法

四法

出鍼法

男女血氣

艾葉

點艾火

阿是穴

洗灸瘡

小兒戒逆灸

忌食物房勞

炷火

鍼灸避忌大乙圖

月內神人所

每月血忌

十二特忌

九部通神人

四季神人

四卷

灸鍼

溫鍼

暈鍼

煖鍼

補瀉

八法

下鍼法

人身左右補瀉不同

占人行鍼知鍼理

艾炷大小

壯數多少

治灸瘡令發

貼灸瘡

相天時

避人神

炷火先後

冬至叶蟄宮說

每月血支

十二支神人

十二部神人

新忌傍通

胡侍郎奏過尻神指訣

難經見節

素問內經見節

子午經一卷論鍼灸之要經成歌訣後人依托扁鵲者

銅人鍼灸圖三卷宋仁宗詔王維德考次鍼灸之法鑄

銅人為式分府藏十二經旁註俞穴所會刻題其名

并為圖法并主療之術刻板傳於世夏竦為序然其

窮穴比之靈樞本輪骨空等篇頗亦繁雜也

明堂鍼灸圖三卷題曰黃帝論人身俞穴及灼灸禁忌

曰明堂者謂雷公問道黃帝授之亦後人所依託者

存真圖一卷范氏謂楊介編崇寧間泗州刑賊於市郡

守李夷行遣醫併畫工往親決膜摘膏盲曲折圖之

盡得纖悉介校以古書無少異者比歐希五藏圖過

之遠矣實有益醫家也王莽時捕得程義黨王孫慶

使太醫尚方與巧屠共刺刺之量度五藏以竹筵道

其脉知所終始可以治病亦此意

膏盲灸法二卷清源莊綽李裕所集

千金方三十卷唐孫思邈所撰用藥之方診脉之訣鍼

灸之穴禁架之法至導引之要無不周悉曰千金者

以為人命至重有貴千金一方濟之德愈於此議者

謂其未知傷寒之數

千金翼方三十卷孫思邈掇拾遺軼以羽翼其書首之

以藥錄次之以婦人傷寒小兒養性辟穀起居補益

雜瘡癰色脉等灸而終焉

外宣持此以無謂能救之不可謂死人取灸而不
取鍼其為醫之蔽

金蘭循經元翰林學士忽泰必列所著其子光濟銓
大德癸卯平江郡文學嚴陵邵文龍為之序首繪前

府前後二圖中述手足三陰三陽走馬繼取十四經
絡流注各為註釋列圖於後傳

鉞梓吳門傳者始廣自滑氏註十二經流注而人志
慙其簡畧矣

濟生拔萃十九卷一卷

鍼法寶氏流注三卷

延祐間杜思敬所撰者
鍼經指南古肥實漢卿所撰首標幽賦次定八穴指法
及叶藝等圖頗於素問有不合者

鍼灸雜說疔家寶桂芳類次取千金禁忌人及離合
真邪論未能曲盡鍼灸之少

資生經東嘉王執中叔權取三百六十六穴背而頭末行
分類別以穴為病蓋合銅人下金明堂外經而一之
者也

十四經發源二卷許昌滑壽伯仁傳鍼法於東二

湯得其開闢流注交別之要至若陰陽

諸經滿而溢者此則受之宜與十二經並論及靈柝
本編所述經脉者十四經發揮通考遂穴六百五十
有七而施治功以靈柝之神秘

靈柝考

三

鍼灸聚考

一 諸書於經問難經多異少同今取其同議其異故以
聚考名

一 此書以經絡穴類聚為一卷各病取穴治法為二
卷論論鍼灸法為三卷各歌賦為四卷間或發揮一

一 用身尺寸已詳於前集素難節要今止繪圖各分馬
於上以便學童取穴

一 經絡俱屬於五藏六府今繪其圖於經絡之前者知
外有經則內為藏府也

一 明堂鍼灸銅人千金翼諸書拘頭而腹手足分列脛
穴殊無經絡起止次序今以滑氏十四經發揮金蘭

循經經絡給圖每經自始至終其穴主其病以便攷
究

一 資生經立者病目以各病穴分屬以難於閱今以各
經穴為主以主其病分屬之微神農本草例以穴

名在前藥性隨於後
一 各經穴或有原缺者仍舊

一 標幽玉龍肘後諸歌賦今醫家皆謂其易於記誦然
專事於其則鍼灸亦缺矣姑集於末卷以備參閱

一 奇經八脉十二絡脉入會脉原募穴雖備於本經絡
復表章於後以便分別

一 前人所取穴捷法治病而不明言穴名者今發明之
取穴法未明者竊舉一二

能好其餘愈出愈奇不合素問難經者多各附以發

一東垣鍼法深得素問之旨人多忽之各書亦不能載

今於脾胃論中表章於此

鍼刺

谷書有關於論鍼灸錄于卷末

濟生拔萃於十二經并榮俞經合穴萃集各書主治

病證其餘節穴則未之及故今做其例亦據銅人千金明堂外臺而補輯之

經絡悉依十四經發揮說注交接次第節穴亦依之

比之銅人等書有繁難空穴皆不增入

各空穴下分寸鍼淺深艾壯多少俱備錄以便四時


取用明堂經則曰明堂資生經則曰資生千金翼則

曰千金明堂下經則曰明下或曰下經外臺秘要則

曰外臺俱省文爾

世俗喜歌賦以其便於記誦也今類聚各書歌賦置之末卷

五藏六府之圖



脊骨二十一節大椎三節至尾骶共二十四節

肺附三椎 心附五椎 肝附九椎 脾附十一椎

腎附十四椎

膈膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍者脊所以避膈濁氣

不使上薰心肺也

胃在膈膜下小腸上 小腸在臍上 大腸當臍

膽在肝之短葉間 膀胱在腎下

心藏神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏志是為五藏

胃大小腸三焦膀胱瀉而不藏受五藏濁氣名曰傳化之


府此不能久留輸瀉者是為六府

五藏者藏精而不瀉也故瀉而不實六府傳化而不藏故

實而不能滿也所以然者以水穀入口則胃實而腸虛食


則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也

面銅人圖




針灸經書卷之二十一

背銅人




側銅人




針灸經書卷之二十一

八尺八寸



八尺八寸



手足陰陽流注

凡人兩手足各有三陰脉三陽脉以合為十二經也

三陰謂大陰厥陰少陰三陽謂陽明太陽少陽也人兩

手足各有三陰三陽脉合為十二經也詳見脉訣謂之

表行體者而言也表音謀言相夫也手之三陰從臑走至手手之三陽從手走至頭足之三陽

從頭走至足足之三陰從足走入腹

手三陰從臑走至手謂手太陰起中焦至出大指之端

手少陰起心中至出小指之端手厥陰起胃中至出中

指之端手三陽從手走至頭謂手陽明起大指之端至

上挾鼻孔手太陽起小指之端至目內眥手少陽起小

指之端至目銳眥足三陽從頭走至足謂足陽明起於

鼻至入中指內間足太陽起目內眥至小指外側端足

少陽起目銳眥至入小指次指間足三陰從足入腹謂

足太陰起大指之端至屬脾絡胃足少陰起足心至屬

脾絡膀胱足厥陰起大指聚毛至屬肝絡膽○足三陰

雖曰從足入腹然太陰乃復上膈挾咽散舌下少陰復

從腎挾舌本厥陰乃復上出額與督脉會於顛兼手太

陰從肺系橫出腋下手少陰從心系上肺出腋下手厥

陰循臂出脇上抵腋下此又素越人所謂諸陰脉皆至

象言氣無形而藏象有質氣陽而質陰也然則無形者
貴乎陽有質者貴乎陰歟

脈絡傳注周流不息

絡脈者本經之旁支而別出以聯絡於十二經者也本
經之脈由絡脈而交他經傳注周流無停息也夫十二
經之有絡脈猶江漢之有沱潛也是以手太陰之支者
從臑後出次指端而交於陽明手陽明之支從缺盆上
頰口鼻而交於足陽明足陽明之支別跗上出大指端
而交於足太陰足太陰之支從臑後胃別上膈注心中
而交於手少陰手少陰則直本經少冲穴而交於手太
陽不假支授蓋若者出令者也手太陽之支從臑內左
右別下膈中下至小指外側端而交於足少陰足少陰

之支從肺出注胃中而交於手厥陰手厥陰之支從掌
中循小指次指出其端而交於手少陽手少陽之支從
耳後出至目銳眥而交於足少陽足少陽之支從肝別
貫膈上注肺而交於手太陽也

故經脈者行血氣通陰陽以榮於身也

通結上文以起下文之義經絡之流行不息所以運行
血氣流通陰陽以榮養於身者也不言絡脈者舉經以

該之

其始平旦從中焦注手太陰肺陽明時注心陽明注足陽

明注胃時太陰注手少陰注心午時太陽注手少陰注心

此太陽注足太陰注手少陰注心少陰注手少陰注心主厥

陰注心少陽注足少陽注足少陽注足少陽注足少陽注足

厥陰復注手太陰明也
始於中焦注手太陰終於注足厥陰是脈之行一周身
也

其常以平旦為紀句以漏水下百刻晝夜流行與天同
度終而復始也


氣營氣紀統紀也承上文而言經脈之行其始則起自
中焦其氣則常以平旦為紀也營氣常以平旦寅時為
紀由中焦而始注手太陰以次流行也不言血者言氣
則血行可知漏水下百刻晝夜流行與天同度者言一
晝夜滿下百刻之內人身之經脈流行無有窮止與天
同一運行也蓋天以六百三十五度四分度之一為一
周天而終一晝夜人之營衛則以五十度周於身氣行

一萬三千五百息脈行八百一十丈而終一晝夜適當
明日之寅時而復會于手太陰是與天同度終而復始
也或云晝夜滿刻有長短其營氣盈縮當何如然漏水
雖有長短之殊而五十度周身者均在其中不因滿刻
而有盈縮也

肺藏



中指同身寸法
男左女右手
中筋第一
節內廷兩橫紋相去為
一寸取稍細心量或用
薄竹量則易折用蠟紙
則粘手不使用繩則有
伸縮不準用稻稈心則
易得而有準



六葉
兩平

手太陰肺經



肺藏為大腸

肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉四垂如蓋附着於脊之
第三椎中有二十四空行列分布諸藏之氣為諸藏之華
蓋為華蓋者以其高於諸藏雞經曰丁德州以木之脈脂
蓋者方一寸為一兩兩按推節度並起於黃鐘古之一
兩今之四
錢強也

西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺故病在背其味
辛其類金其色白其穀稻其應四時上為太白星是以知
病之在皮也其音商其數九其臭腥其液涕
西方生燥燥上金金辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎肺
主鼻其在天為燥在地為金在體為皮毛在藏為肺在色
為白在音為商在聲為哭在變動為咳在竅為鼻在味為
辛志為憂憂傷肺肺傷皮毛寒勝熱辛傷皮毛苦

勝辛

體中者臣使之官喜樂出焉

肺者氣之本魄之藏也其華在毛其充在皮為陽中之大

陽通於秋氣

肺之合皮也其榮毛也其主心也○肺氣通鼻和則知

香寒矣

肺氣虛則使人夢見白物見人斬血藉藉得時則夢見兵

刃血戰

肺色白欲如鵝毛不欲如鹽

肺白象金金得水而沉肺得水而浮何也肺者非為純金

也辛商也丙之柔大言陰與陽小言夫與婦釋其微陰昏

而就火其意樂火又行陽道多故肺得水而浮也肺熱而

復沉者辛當歸庚物極則反也

肺氣絕則皮毛焦肺氣行於皮毛氣弗榮則皮毛焦皮毛

焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折毛折

者則死毛死丙日篤丁日死

肺經

手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺起

發也絡繞也還復也循巡也又依沿也屬會也中焦者

在胃脘當臍上四寸之分大腸註見本經胃口胃上下

口也胃上口在臍上五寸上腕穴下口在臍上二寸下

腕穴之分也膈隔也凡人心下有膈膜與脊肋周回相

着所以遮隔濁氣不使上薰心肺也手太陰起中焦受

足厥陰之交也由是循任脉之外足少陰經脉之裏以

循臂以上骨下廉入寸口上魚際出大指之端

循臂以上骨下廉入寸口上魚際出大指之端

明相為未東也乃復行本經之外上循胃口逆還而屬

會手肺榮氣有所歸本經也

肺系謂喉嚨也喉以候氣下接於肺有下膈上際曰腋

腋謂腋處為膈骨肘之間也膈蓋皮為肘肘骨節也

自肺藏循肺系出而循膈第四行之中膈雲門

以出腋腋下循膈膈入府使白行手少陰心主之前

下入肘中抵尺澤穴也蓋手少陰循臑臂出手小指之

端手心主循臑臂出中指之端手太陰則行乎二經之

前也

循臂以上骨下廉入寸口上魚際出大指之端

肘以下為臂廉隅也邊也手掌後高骨旁動脉為關

筋動脉為寸口曰魚曰魚際云者謂掌骨之前大指本

節之後其肥肉隆起處統謂之魚魚際則其間之穴名

也既下肘中乃循臂內上骨之下廉廉孔最刺入寸

口之經渠太淵以上魚循魚際出大指之端至小商穴

而終也端杪也

其支者從腕後直出次指內廉出其端

臂骨盡處為腕脉之大隧為經交經者為絡本經以

出大指之端矣此則從腕後列缺穴達次指內廉其

端而交於手陽明也

是經多氣少血○平旦寅時氣血注此○受足厥陰

之交○九十一穴左右共二十二穴○手之陰陽

受氣之道通其氣之來疾刺深無過二分其留無過一呼過此者則脫氣

中府一名○雲門下一寸乳上三肋間動脈應手陷中六寸○肺之募也

銅人鍼三分留五呼灸五壯壯者以○主腹脹

四肢腫食不下喘氣胸滿有背痛嘔逆上氣肺系

急肺寒熱胸悸喘逆效噉濁涕風汗出皮痛面

腫少氣不得卧傷寒胸中熱飛尸遺疰癭瘡

雲門○巨骨下俠氣戶傍二寸陷中動脈應手舉臂取之

去胸中行任脈兩旁相去各六寸○素註鍼七分銅人

鍼三分不宜深深則使氣逆灸五壯○主傷寒四肢熱

不已效逆短氣氣上衝心胸脇微背痛痲痺肩背痛臂

不得舉癭瘡

天府○腋下三寸臂臑內廉動陷中以鼻取之○甲乙禁

灸灸之使以逆氣銅人鍼四分留七呼素註留一呼銅

人灸二十七壯至百壯資生云非大急不灸○主暴逆內

一逆肝脈相搏血流鼻口鼻衄血不止卒中惡風邪氣

出喜忘飛尸惡症鬼語逆下喘不得息瘡寒熱目眩逆

視眩脫癭瘡

夾白○天府下去肘五十動脈中○銅人鍼三分灸五壯

○主心痛短氣乾嘔煩滿

尺澤○肘心約上動脈中腕後云屈肘橫紋筋骨罅陷

○主手足太陰肺脈所入為合水肺實瀉之○素註鍼三分

留三呼灸三壯明堂禁灸銅人灸五壯資生同素問刺

中

中

中府之氣為不凝何○主肩背痛汗出中

便數而欠○主無度面白善嘔惡寒不舉

哭西浙寒熱風寒手足不得舉候痺上氣嘔吐

口舌乾乾嗽喘逆四肢肢暴腫臂寒短氣心痛肺

脹膨膨缺盆中煩胸亂少氣不足以息勞熱風汗出

中風小便數而欠上氣喘滿腰脊強痛肺積息奔小兒

慢驚風

孔竅○去腕上七寸○銅人灸五壯鍼三分○主熱病汗

不出效逆肘臂痲痛屈伸難手不及頭指不舉吐血失

音咽腫痛頭痛

列缺○手太陰絡別走陽明○去腕側上一寸五分滑氏

曰以手交叉頭食指末筋中○銅人鍼二分留三呼

瀉五吸灸三壯明堂鍼三分日灸七壯至七七壯○主

偏風口而喎斜手肘無力半身不遂掌中熱口噤不開

寒熱癰腫沫嗽嗽善笑縱唇口健忘溺血精出陰莖痛

小便頻頻驚妄見面目四肢癱腫肩痺胸背寒慄少氣

不足以息尸厥寒厥交兩手而背實則胸背熱汗出四

肢暴腫虛則胸背寒慄少氣不足以息

○素問云實則寸銳掌熱瀉之虛則寸軟小使遺補之

按素問曰直行者謂之經旁出者謂之絡手太陰之

支從腕後直出次指內廉出其端是列缺為太陰別

走陽明之絡人或寸關尺三部脈不見自列缺至

陽谷脈止者俗謂之反關脈此經脈虛而絡脈滿干

也

而况其生

經渠○寸口陷中○肺脈所行為經金○素註鍼三分銅

人鍼二分留三呼禁灸傷人神明○主瘰癧熱胸背

拘急胸滿膨脹喉痺掌中熱效逆上氣數欠傷寒熱病

汗不出基痺喘促心痛嘔吐

大淵一名大泉○掌後陷中肺脈所注為俞土肺虛補之

○難經曰脈會大淵疏曰脈病治此○平旦寅時氣血

從此始故曰寸口者脈之大要會手太陰之動脈也○

銅人灸三壯鍼一分素註鍼二分留一呼灸三壯○主

胸痺逆氣善噦嘔飲水欬嗽煩寃不得眠肺脹膨脹

內癰痛目生白翳眼背赤筋眼痛眼青轉筋乍寒乍熱

缺盆中引痛掌中熱數欠肩背痛寒喘不得息噫氣上

逆心痛脈瀉咳血嘔血振寒咽乾狂言口噤溺色變卒

遺失無度

魚際○大指本節後內側陷中又云散脈中肺脈所瀉為

榮火○銅人鍼一分留三呼明堂素註鍼二分灸三壯素

素問刺手魚腹內陷為腫○主酒病惡風寒虛熱舌上

黃身熱頭痛欬嗽傷寒汗不出痺走胸背痛不得息

目眩煩心少氣腹痛不下食肘彎肢滿喉中乾燥寒慄

鼓頷欬引尻痛溺出嘔血心痺悲恐乳癰○東垣曰胃

氣下溜五藏氣亂皆在於肺者取之手太陰魚際足少

陰俞

少商○大指端內側去爪甲角如韭葉白肉際宛宛中肺

脈所出為井木○銅人鍼一分留三呼瀉五吸不宜灸

素註留一呼明下灸三壯甲乙灸一壯○主頷腫喉閉

煩心善噦嘔心下滿汗出而寒欬逆痰涎振其腹滿噉

沫辰乾引飲食不下膨脹手舉指痛掌熱寒慄鼓頷喉

中鳴小兒乳癰○唐刺史成君緝勿領腫大如升喉中

閉塞水粒不下三日甄權以三稜鍼刺之微出血立愈

洩成熱也

按難經曰諸井者肌肉淺薄不足為使也刺井者當

刺榮甄權寫井而療喉痺杜寶善類聚井穴主治病

證者難經曰井主心下滿又曰春刺井蓋並行而不

悖也

或問素問註銅人明堂千金諸書於此穴有宜鍼灸

有禁鍼灸刺淺刺深艾壯多寡不同特從武曰

一穴而有宜鍼禁鍼宜灸禁灸者有病勢輕重緩急

病輕勢緩者當別用一主治穴以代之若病勢重急

倘非此穴不可療當用此一穴若諸書皆禁鍼灸則

斷不可用矣鍼淺深艾多少則以素問十二經淺深

刺法為主諸書相參互用之不可偏廢也經曰春夏

刺淺秋久刺深肥人刺深瘦人刺淺故在春夏與瘦

人當從淺刺秋冬與肥人當從刺深又曰陷下則灸

之陷下不甚者灸當從少陷下甚者灸當從多又寒

涼之月火氣衰灸當從多溫暑之月火氣旺灸當從

少又肌肉淺薄筋少刺淺艾少肌肉深厚筋多刺深


艾多又春與夏不同秋與冬不同肥瘦有適中者有

過肥而壅腫者有大瘦而骨立者以意消息不可執

一論也又大人與小兒刺淺深多少不同又人頭面及小兒寬毫鍼灸如小麥也


大腸之府

大腸上口小腸下口也



大腸下接直腸至腸下為肛門較道即後陰也

手陽明之府



大腸重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸當臍右迴十六曲盛穀一斗水七升半○大腸者傳道之官變

化出焉○大腸為白腸供養

五藏各有所司腑皆相近而心肺獨去大腸小腸遠者

何也然經言心榮脈衛通行陽氣故居在上大腸小腸

傳陰氣而下故居在下所以相去而遠也

食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實

大腸陽明經穴

手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中大指之次指謂食指也手陽明大腸經也凡經脉之道陰脉行手足之裏陽脉行手足之表此經起於大指次指之端商陽穴受手太陰之五行

於陽之分也。由是循指之上，歷三間以出，合谷兩骨之間，上入陽谿兩筋之中。

循臂上廉入肘外廉，上循臑上廉之偏，歷溫溜下廉，上廉三里入肘外廉之曲池，循臑外前廉，歷肘膠五里，臂臑絡臑會，上有至有腧穴也。

出髃骨之前廉，上出柱骨之會，髃骨有端兩骨間為髃骨，肩胛上際會處為天柱骨，出髃骨前廉循巨骨穴，上出柱骨之會，上會於大椎，下入缺盆，絡肺下膈，屬大腸。

自大椎而下，入缺盆，循足陽明經，脈外絡統肺，蔽復下膈，當天樞之分，會屬於大腸也。

其支別者，從缺盆上頸，貫頰入下齒，縫中頭莖為頰耳以下，曲處為頰口，前小者為齒，其支別者，自缺盆上行於頸，循天鼎，扶突，上貫於頰，入下齒，縫中，還出挾口，交人中，左之右，右之左，上挾鼻孔。

唇口上鼻下，為人中，既入齒，縫復出夾兩口，吻相交於中之分，左脈之右，右脈之左，上挾鼻孔，循禾膠迎香而終，以交於足陽明也。

是經氣血俱多。○卵時氣血注此。○受手太陰之交。○凡二十穴，左右共四十六。○手之陰陽，其受氣之道，近其氣之來，疾刺深無過二分，其留無過一呼，過

者則脫氣。

陽谿一名○手大指次指內側去爪甲角如韭葉，手陽明

大腸脈所出為井金。○銅人灸三壯，鍼一分，留一呼。○主胸中氣滿，喘欬支腫，熱病汗不出，耳鳴，耳聾，寒熱瘧瘡，口乾，頰頰腫，齒痛，惡寒，肩背急，相引，缺盆中痛，目青，首灸三壯，左取右，右取左，如食頃，立已。

二間一名○食指本節前內側陷中，手陽明大腸脈所出，為榮水，大腸實瀉之。○銅人鍼三分，留六呼，灸三壯。○主喉痺，頰頰腫，肩背腫痛，振寒，鼻衄，衄血多，驚齒痛，目黃，口乾，口喎，急食不通，傷寒水結。○東垣曰：氣在肘臂，足取之，先去血脈，後深取，陽明少陰之榮，俞二間三間。

三間一名○食指本節後內側陷中，手陽明大腸脈所注，為俞木。○銅人鍼三分，留三呼，灸三壯。○主喉痺，咽中如梗，下齒齲痛，嗜卧，胸腹滿，腸鳴，洞泄，大熱，瘧瘧，唇焦，口乾，氣喘，目眇，急痛，吐舌，戾頸，喜驚，多唾，志食不通，傷寒。

氣熱身寒，結水。

合谷一名○手大指次指岐骨間陷中，手陽明大腸脈所過，為原，虛實皆按之。○銅人鍼三分，留六呼，灸三壯。○主傷寒大渴，脈浮在表，發熱，惡寒，頭痛，脊強，無汗，寒熱，瘧鼻衄，不止，熱病汗不出，目視不明，生白翳，頭痛，下齒齲，耳聾，喉痺，面腫，唇吻不收，瘡不能言，口噤，不開，偏風，風疹，痲疥，偏正頭痛，腰脊內引，痛小兒，單乳，鵝。○按合谷，婦人妊娠，可瀉，不可補，補即墮胎，詳見足太陰脾經三陰交下。

陽谿一名○腕中上側兩筋間陷中，手陽明大腸脈所行，為經火。○銅人鍼三分，留七呼，灸三壯。○主狂言，喜笑。

陽谿一名○手大指次指內側去爪甲角如韭葉，手陽明

陽谿一名○手大指次指內側去爪甲角如韭葉，手陽明

陽谿一名○手大指次指內側去爪甲角如韭葉，手陽明

陽谿一名○手大指次指內側去爪甲角如韭葉，手陽明

陽谿一名○手大指次指內側去爪甲角如韭葉，手陽明

寒熱瘧疾寒嗽嘔沫喉痺耳鳴耳聾驚悸肘臂不舉痲

疔

歷○腕中後三寸手陽明終脈別走太陰○銅人鍼三

分留七呼灸三壯明下灸五壯○主肩臂肘腕痠疼膝

目眩腕痛痺瘰癧寒熱瘧疾多言咽乾喉痺耳鳴

風汗不出利小便○實則濕瀉之虛則寒痺雨補

之

溫溜一名溫○腕後大士五寸小士六寸明堂在腕後

五十六寸間○銅人鍼三分灸三壯○主腸鳴而痛傷

寒噦逆噎高心氣閉寒熱頭痛喜笑狂言見鬼吐涎沫

風逆四肢痲痺舌口舌痛喉痺

下廉○輔骨下去上廉一寸輔銳肉分外○銅人斜鍼五

分留二呼灸三壯○主癢泄勞瘵小腹滿小便黃便血

狂言偏風熱風冷痺不遂風濕痺小腸氣不足百無類

色痰癆瘵瘵若刀刺不可忍泄瀉腹痛滿狂走夾臍

痛食不化喘息不能行唇乾涎出乳癰

上廉○三里下一寸其分獨抵陽明之會外○銅人斜鍼

五分灸五壯○主小便難黃赤腸鳴胸偏風半身一

逐骨髓冷手足不仁喘息大勝氣脹風頭痛

三里一名平○曲池下一寸按之內起筋肉之端○銅人

灸三壯鍼二分○上臂氣逆失音氣逆痛頰頰腫

癱手臂不仁肘臂不伸口辟手足不隨

兩池○肘外輔骨肘中中以手拱胸取之手陽明

腸脈所入為合土○素註鍼五分留七呼銅人鍼七壯

得氣先瀉後補之灸三壯明堂日灸七壯至二百壯且

停十餘日更下止二百○主繞踝風手臂紅腫肘中痛

偏風半身不遂惡風邪氣泣出喜忘風癱瘓喉痺不能

一言胸中煩滿臂疼痛筋緩捉物不得挽弓不開屈伸

難風痺肘細無力傷寒餘熱不盡皮膚乾燥癢癩癩疾

舉體痛癢如虫咬皮脫作瘡皮膚如疥婦人經脈不通

肘膠○大骨外廉陷中○銅人灸三壯鍼三分○主風勞

嗜臥臂痛不舉肩重腋急肘臂麻木不仁

五里○肘上三寸行向裏大脉中央○銅人灸十壯素問

大禁鍼○主風勞驚恐吐血效救肘臂痛嗜臥四肢不

得動心下脹滿上氣身黃時有微熱瘰癧

臂臑○肘上七寸胛肉端有髃下一寸兩筋兩骨罅陷宛

宛中平手取之手陽明絡手足太陽陽維之會○銅人

灸三壯鍼三分明堂宜灸不宜鍼日灸七壯至二百壯

若鍼不得過三五分○主臂細無力臂痛不得向頭瘰

癧頸項拘急

肩髃一名中肩井○膊骨頭肩端上兩骨罅間陷者宛宛

中舉臂取之有空足少陽陽蹻之會○銅人灸七壯至

二七壯以差為度若灸偏風灸七七壯不宜多恐手臂


細若風病筋骨無力久不差灸不畏細刺即泄有臂熱

氣明堂鍼八分留二呼瀉五吸灸不及鍼以平手取其

穴灸七壯增至二七素註鍼一寸灸五壯又云鍼六分

留六呼○主中風手足不隨偏風風癱風瘖風病半身

不遂熱風有中熱頭不可回顧肩臂痠痛臂無力手不可
 可的頭熱急風熱癰癩顏色枯槁勞氣泄精傷寒熱不
 已四肢執諸癰氣○唐魯州刺史庾狄欽風痺不得挽
 弓腕攣使欽發弓矢向棚立鍼眉顴鍼進即可射
 ○骨○有尖端上行兩又骨鱗間陷中手陽明陽琦之會
 ○銅人灸五壯鍼一寸半明堂灸三壯至七壯素註禁
 鍼鍼則倒懸一食頃乃得下鍼鍼四分瀉之勿補鍼出
 始得正臥明下灸三壯○主驚癩破心吐血臂膊痛胸
 中有瘀血肩臂不得屈伸
 天鼎○頸缺盆上直扶突後一寸○素註鍼四分銅人灸
 三壯鍼三分明堂灸七壯○主喉痺噎腫不得食飲食
 不下喉鳴
 扶突○氣合後一十五分在頸當曲頰下一寸八迎
 後一寸五分仰而取之○銅人灸三壯鍼三分素註
 四分○咳嗽多唾上氣咽引喘息喉中如水鷄聲暴瘖
 氣硬
 沫節○鼻孔下夾水溝旁五分○銅人鍼三分灸三壯
 ○主尸厥及口不可開鼻冷息肉鼻寒不聞香臭氣逆
 迎香○未節上一寸鼻下孔旁五分手陽明足陽明之
 ○銅人鍼三分留三呼不耳灸○主鼻塞不聞香臭
 風口喘而癢浮腫風動葉葉狀如虫行唇腫痛喘息不
 利鼻鳴多涕執劍有瘡鼻有息肉



胃重二斤一兩大一尺五寸長二尺六寸徑五寸紆曲屈伸盛穀二斗水一斗五升○胃者倉廩之官五味出焉○胃為黃腸○五味入口藏於胃以養五藏氣胃者水穀之海六府之大原也是以五藏六府之氣味皆出於胃水穀入口則胃實而腸虛

食氣入胃散精於肝滌氣於筋

食氣入胃濁氣歸心滌精於脉脉氣流經經氣歸於肺肺朝百脉輸精於皮毛毛脉合精行氣於府府精神明留於四藏氣歸于權衡權衡以平氣口成寸以决死生飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以為常也

人胃中常有留穀二斗古十非今之比水一斗五升故平人日再至圖一行二升半日中五升七日五七三十五升而水穀盡矣故平人不食七日死也

東垣曰飲食勞倦內傷脾胃則胃脘之陽不能升舉并心肺之氣陷入中焦用補中益氣湯又曰胃中元氣盛多食不傷過時不飢胃火盛則多食易飢能食而大便溇者胃熱善消脾病不化也又曰脾胃不和九竅不通

足陽明經穴

足陽明之脉起於鼻交頰中旁約太陽之脉下循鼻外上入齒中還出挾口環唇下交承漿

頰鼻並也鼻山根為頰足陽明起於鼻兩旁迎香穴由是而上左右相交於頰中過精明之分下循鼻外歷承

遊四白巨膠入上齒中復出循地倉挾口兩吻環

下左右相交於承漿之分也

頰下為頰領中為頰頰前為髮際髮際前為額頰自承漿卻循頰後下廉出大迎循頰車上耳前歷下關過客主人循髮際行懸釐頰厭之分經頭維會于額頰之神庭

其支別者從大迎前下入迎循喉嚨入缺盆下屬胃絡

脾胸兩傍高處為膺膺上橫骨為巨骨巨骨上陷中為缺盆其支別者從大迎前下入迎循喉嚨歷水突氣合入

缺盆行足少陰俞府之外下膈當上腕中腕之分屬胃絡脾

其直行者從缺盆下乳內廉掖濟入氣沖中

直行者從缺盆而下乳內廉循氣戶庫房屋翳胸窓乳中乳根不容承滿梁門闕門太乙滑肉門下挾臑歷天樞外陵大巨水道歸來諸穴而入氣沖中也

其支者起胃下口循腹裏下至氣沖而合

胃下口下腕之分難經云大倉下口為幽門者是也自屬胃處起胃下口循腹裏過足少陰胃脘之外本經之裏下至氣沖中與前之入氣沖者合

抵至也股內為脾解前條上起肉處為伏兔伏兔後又
 又為解開挾勝筋中為臍臍骨為筋附足而也既相合
 氣衝中乃下脾關抵伏兔陰市梁丘下入臍臍中經
 積鼻循附之冲陽陷谷入中指外間之內庭至厲兌而終也
 其支者下膝三寸而別以下入中指外間
 此支自膝下三寸循三里穴之外別下歷上廉條口下
 廉豐隆解谿冲陽陷谷以至內庭厲兌而合也
 其支者別附上入大指間出其端
 此支自附上冲陽穴別行入大指間斜出足厥陰行間
 穴之外循大指下出其端以交於太陰
 此經多血多氣○辰時氣血注此○受手陽明之交
 ○九四十五穴左右共九十穴○足陽明五藏六府
 之海也其脉大血多氣盛壯熱不深不散不留不瀉
 一刺深六分留六呼
 承泣○目下七分直瞳子陷中陽蹻脉任脉胃脉之會○
 銅人灸三壯禁鍼鍼之令人目烏色明堂鍼四分于不
 宜灸灸後令人目下大如拳息肉日加如桃至十日
 定不見物資生云當不灸不鍼○東垣曰魏邦彥夫人
 目睛自下侵上者自陽明來也○主目冷淚出上觀瞳
 子并遠視視脈昏夜無見目睛動與項口相引口眼喎
 斜口不能言面葉葉動眼赤痛耳鳴耳聾
 四白○目下一寸直瞳子令病人正視取之○素註鍼四
 分甲乙銅人灸七壯鍼三分凡用鍼穩當方得下鍼刺
 太深令人目烏色○主頭痛月眩目赤痛解淚不明目

痒目睛翳口眼喎斜不能言
 巨邪○挾鼻孔旁八分直瞳子平水溝蹻脉足陽明之會
 ○銅人鍼三分得氣即瀉灸七壯明下灸七七壯○主
 痰癢唇頰腫痛口喎僻目障無見青盲無見遠視眵眵
 淫膚白膜翳覆瞳子面風鼻頰腫癰痛招搖視瞻脚氣
 膝腫
 地倉○夾口吻旁四分外如近下有脉微動手足陽明任
 蹻脉之會○銅人鍼三分明堂三分半留五呼得氣即
 瀉日可灸二七壯重者七七壯炷如粗釵股脚大炷若
 大口轉喎灸承漿七七壯即愈○主偏風口喎目不得
 閉脚腫失音不語飲水不收水漿漏落眼瞶動不止瞳
 子痒遠視視脈昏夜無見○病左治右右治左宜頻
 鍼灸以取盡風氣口眼喎斜者以正為度
 大迎○曲頰前一寸三分骨陷中動脉又以口下當兩眉
 是穴○素註鍼三分留七呼灸三壯○主風痙口瘡瘰
 口噤不開唇吻動頰腫牙疼寒熱頸痛癰癧舌強舌
 緩不收不能言目痛不得閉
 頰車一名機○耳下曲頰端近前陷中開口有空○銅
 人鍼四分得氣即瀉日灸七壯止七七壯明堂灸三壯
 素註鍼三分○主中風牙關不開口噤不語失音牙關
 痛頰頰腫不可嚼物頸強不得回頰口眼喎
 下關○客主人下耳前動脉下廉合口有空開口則閉閉
 二有穴足陽明少陽之會○素註鍼三分留七呼灸三
 壯銅人鍼四分得氣即瀉禁灸又不得久留鍼經云

刺之則欠不能故耳中有乾聾補之不得灸○主夫人
牙車脫口目眩齒痛偏風口眼喎斜耳鳴耳聾耳痛服

汁出

頤維○頤角入髮際本神旁一寸五分神庭旁四寸五分
足少陽陽明二脈之會○銅人鍼三分素註錢五分禁
灸○主頭痛如破目痛如脫目睜目風淚出偏風視物
不明

人迎五○頤大脈動應手夾結喉兩旁一寸五分仰而
取之以候五藏氣足陽明少陽之會○滑氏曰古以夾
喉兩旁為氣口人迎至晉王叔和直以左右手寸口為
人迎氣口○銅人禁鍼明堂鍼四分素註刺過深殺人
○主吐逆霍亂胸中滿喘呼不得息因喉腫瘰癧

水突木○頤大筋前直人迎下氣舍上○銅人鍼三分
灸三壯○主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不得

氣舍○頸直人迎下夾天突陷中○銅人灸五壯鍼三分
○主欬逆上氣有腫不得顧喉痺哽噎膈不消食飲
不下瘰癧

缺盆尺○脊下橫骨陷中○銅人灸三壯鍼三分素註
鍼二分留七呼不宜大深深則使人逆息刺缺中
內陷氣泄令人喘嗽○主息奔胸滿喘急水腫癰腫喉
痺汗出寒熱缺盆中腫外瘰癧生胸中熱濕傷寒胸中
熱不已

氣戶○巨骨下俞府兩旁各二寸陷中仰而取之去中

各四寸去膺窓四寸八分○銅人鍼三分灸五壯○主
欬逆上氣胸背痛欬逆不得息不知味欬胸脇支滿
喘急

庫房○氣戶下一寸六分陷中去中行各四寸仰而取之
○銅人灸五壯鍼三分○主胸脇滿欬逆上氣呼吸不
至息唾膿血濁沫

屋翳○庫房下一寸六分陷中氣戶下三寸二分去中行
各四寸巨骨下四寸八分仰而取之○素註鍼四分銅
人灸五壯鍼二分○主欬逆上氣唾血多濁沫膿血痰
飲身體腫皮膚痛不可近不禁衣淫溼糜癢不仁
膺窓○屋翳下一寸六分陷中去中行各四寸○銅人鍼
四分灸五壯○主胸滿短氣不得卧腸鳴注泄乳癰寒

熱

乳中○當乳中是○銅人微刺三分禁灸灸則不幸生蝕
瘡瘡中有膿血清汁可治瘡中有息肉若蝕瘡者死素
問云刺乳上中乳房為腫根蝕○丹溪曰乳房陽明胃
所經乳頭厥陰肝所屬乳子之母不知調養忿怒所
逆鬱悶所遇厚味所釀以致厥陰之氣不行欬不得通
汁不得出陽明之血沸騰熱甚化膿亦有乳之子膈
有滯痰口氣燥熱合乳而睡熱氣所吹遂生結核初起
時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治
必成癰癧若加以艾火兩三壯其效尤捷粗工使用鍼
刀卒意拙病若夫不得夫與勇姑慶怒鬱脾氣消阻
肝氣橫逆遂成結核如棊子不痛不癢十數年後為

陷名曰如岩以形如岩似岩穴也不可
於始生之際便使消息病根使心清神安然後施治亦
有可安之理

乳根○乳中下一寸六分陷中去中行各四寸仰而取之
○銅人灸五壯鍼三分素註鍼四分灸三壯○主胸下
滿悶胸痛高氣不下食飽病脅痛腫乳痛乳癰凄凄寒
熱痛不可按欬逆霍亂轉筋四肢

不容○幽門旁相去各一寸五分去中行任脈各三寸上
腕兩旁各一寸直四肋間○銅人灸五壯明堂三壯鍼
五分素註鍼八分○主腹滿噎噎唾血有脇痛口乾心
痛與背相引不可欬欬則引有痛嗽喘痰痰不嗜食腹
虛鳴嘔吐痰癆

承滿○不容下一寸去中行各三寸○銅人鍼三分灸五
壯明堂三壯○主腸鳴腹脹上氣喘逆食飲不下疝息
唾血

梁門○承滿下一寸去中行各三寸銅人鍼二分灸五壯
○主腸下積氣食飲不思大腸滑泄完穀不化

胃門○梁門下一寸去中行各三寸○銅人鍼八分灸五
壯○主善滿積氣腸鳴卒痛泄利不欲食腹中氣走挾
寒逆痛身熱振寒遺溺

分○主心煩嘔吐舌
滑肉門○太乙下一寸去夾臍下一寸至天樞去中行各
三寸○銅人灸五壯鍼八分○主嘔吐逆吐血重

舌強

天樞一○去脊脊半寸夾臍中兩傍各二寸皆中

大腸之募○銅人灸五壯濟生拔萃灸百壯鍼五分留
十呼千金云鬼魄之舍不可鍼素註鍼五分留七呼○
主奔豚泄瀉脹疝赤白痢水痢不止食不下水腫腹脹
腸鳴上氣沖胃不能久立久積冷氣繞臍切痛時上冲
心煩滿嘔吐霍亂冬月感寒泄利瘡寒熱狂言傷寒飲
水過多腹脹氣喘婦人女子癥瘕血結成塊漏下赤白
月事不時

外陵○天樞下一寸去中行各二寸素註一寸半○銅人
灸五壯鍼二分 鍼八分○主腹痛心下如懸下引
臍痛

大巨○外陵下一寸天樞下二寸素註一寸去中行各二
寸素註作一寸半○銅人鍼五分灸五壯素註鍼八分
○主小腹脹滿煩渴小便難癢疝偏枯四肢不收驚悸
不眠

水道○大巨下二寸素註三寸去中行各二寸○銅人灸
五壯鍼三分半素註鍼二分半○主背脊痠三焦勝
腕腎中熱氣婦人小腹脹痛引陰中月水至則腰背
痛胞中痠子門寒大小便不通

歸來○水道下二寸素註三寸去中行各二寸○銅人灸
五壯鍼五分素註鍼二分○主奔豚卵上入腹引莖中
痛婦人血脈積冷

氣衝氣歸來下素註腹下夾臍相去四寸鼠蹊上一寸

動脈應手死死中衝脈所起○銅人灸七壯禁食素
刺中脈血不出為腫鼠僕明堂鍼三分留七呼氣至即
瀉灸三壯○主腹滿不得止對癰疔大腸中熱身熱腹
痛大氣石水陰痿疔疔九寒痛小腹奔豚腹有逆氣
上攻心腹脹滿上搶心痛不得息腹滿不得飽仰澤樂
傷寒胃中熱婦人無子小腹痛月水不利好女子衝
心字難包衣不出○東垣曰脾胃虛弱感濕成痰汗大
泄妨食三里氣街以三稜鍼出血又曰吐血多不愈以
三稜鍼於氣街出血立愈

脾關○膝上伏兔後交分中○銅人鍼六分灸三壯○主
腰痛足麻木膝寒不仁痿痺股內筋絡急不展伸小腹
引飲痛
伏兔○膝上六寸起肉正跪坐而取之一云膝蓋上七寸
以左右各三指按捺上有肉起如兔之狀因此名○
此事難知定癱疽死地分有九伏兔後一劉宗厚曰脈
絡所會也○主膝冷不得溫風勞痺在邪手經縮身
應膝腹脹少氣頭重脚氣婦人八部諸疾
陰市○膝上三寸伏兔下陷中拜而取之○銅人鍼三
分禁灸明堂灸三壯○主腰脚如冷水膝寒痿痺不仁
不展伸卒寒疝力痿小氣小腹痛肝滿氣膝以下伏
兔上寒消渴
梁丘○膝上二寸兩筋間○銅人灸三壯鍼三分明堂鍼
五分○膝脚腰痛冷痺不仁難跪不可伸足寒大驚
乳腫痛

犢鼻○膝下前骨上俠解大筋陷中形如犢鼻故名○
素註鍼六分銅人鍼三分灸三壯素問刺犢鼻出液為
跛○主膝中痛不仁難跪起脚氣膝腫○膝腫腫潰
者不可治不瘡可治若犢鼻堅硬不便攻先洗熨微刺
之愈

三里○膝下三寸胫骨外廉大筋內宛宛中兩筋肉分間
舉足取之極重按之則跌上動脈止矣又云犢鼻三寸
足陽明胃脈所入為合土○素註刺一寸留一呼灸三
壯銅人灸三壯鍼五分明堂鍼八分留十呼瀉七吸日
灸七壯止百壯素註刺一寸十金灸五百壯少亦一二
百壯○主胃中寒心膈脹滿腸鳴臍氣虛慙真氣不足
腹痛食不下大便不通心悶不已卒心痛腹有逆氣上

攻股痛不得飽仰少腸氣水氣蠱毒鬼擊痲痺四肢滿
膝筋痠痛目不明產婦血暈不省人事○秦承祖云諸
病皆治華佗云主五勞七傷虛乏胸中痰血乳癰
○千金翼云主腹中寒脹滿腸中雷鳴氣上冲胸喘不
能久立腹痛胸腹中瘀血小腹脹皮腫陰氣不足小腹
堅傷寒熱不已熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口
噤鼓頰腫痛不可回顧顧而有所見喜悲上下求之口
辟乳腫喉痺不能言胃氣不足久泄利食不化腸下支
滿不能久立膝痿寒熱中消穀苦飢腹熱身煩狂言乳
癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑怒大罵霍亂遺尿失氣
陽厥婁婁惡寒頭眩小便不利喜噦脚氣○外臺秘要
云人年三十已上若不灸三里令人氣上冲目○東垣

曰飲食失節及勞役形質陰火乘於坤土之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋於六腑之陽氣是五揚之氣先絕於外外者天也下流入於坤土陰火之中皆由喜怒哀憂恐為五賊所傷而後胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當於胃合三里穴中推而揚之以伸元氣又曰氣在於腸胃者取之足太陰陽明不下者取之三里又曰氣逆霍亂者取三里氣下乃止不下復始又曰胃病者胃脫當心而痛上支兩脇兩噎不通飲食不下取三里以補之脾胃虛弱感濕成痿汗大泄妨食二里氣街以三稜鍼出血若汗不減不止者於二里穴下三寸上廉出血禁酒濕麵又曰六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病錯取於胃之合三里大

危○又曰有人年少氣弱常於三里氣海灸之節次約五七十壯至年老熱厥頭痛雖大寒猶喜風寒痛愈惡煖處見烟火皆灸之過也

巨虛上廉巨虛 三里下三寸舉足取之足陽明胃合手陽明大腸○銅人灸二壯鍼三分甄權隨年為壯明堂鍼八分得氣即寫灸日七壯下至三壯○主藏氣不足偏風脚氣腰腿手足不仁脚脛痠痛屈伸難不能久立風水膝腫骨隨冷疼大腸冷食不化飡洩勞瘵夾臍腹脇痛腸中切痛雷鳴氣上衝胸喘息不能行不能久立傷寒胃中熱○東垣曰脾胃虛弱濕痿汗泄妨食三里氣街出血不愈於上廉出血降口○下廉上一寸舉足取之○銅人鍼五分明堂八分

灸三壯○主足麻木風肘足下熱不能久立足寒膝痛脛寒濕痺脚痛脛腫轉筋足緩不收

巨虛下廉巨虛 上廉下三寸蹲地舉足取之足陽明胃與手太陽小腸合○銅人鍼八分灸二壯素註鍼三分明堂鍼六分得氣即瀉甲乙灸日七七壯○主小腸氣不足面無顏色偏風腿痿足不履地熱風冷痺不遂風濕痺喉痺脚氣不足沉重唇乾涎出不覺不得汗出毛髮焦內脫傷寒胃中熱不嗜食洩膿血胸脇小腹控臍而痛特窘之後當耳前熱若寒甚若獨有上熱甚及小指次指之間熱痛暴驚狂言語非常女子乳癰足跗不收跟痛

豐隆○外踝上八寸下節外廉陷中足陽明絡別走太陰
○銅人鍼三分灸三壯明下七壯○主厥逆大小便難急惰腿膝酸屈伸難胸膈刺痛若刀切痛風痰頭痛風逆四肢腫足清身寒濕喉痺不能言登高而歌棄衣而走見鬼好笑○氣逆則喉痺卒瘡實則顛狂瀉之虛則足不收脛枯補之
解谿○衝陽後一寸五分腕上陷中足大指次指直上附骨陷中足陽明胃脈所行為經火胃虛補之○銅人灸三壯鍼五分留三呼○主風面浮腫頰黑厥氣上衝腹脹大便下重瘰癧膝股脛腫轉筋目眩頭痛顛疾煩心悲泣霍亂頭風面赤目赤瘡疥不可忍
衝陽○足附上一寸去陷谷三寸骨節動脈足陽明胃脈所過為原胃虛實皆按之素註鍼三分留十呼素問刺


足跗上動脈血出不止死銅入鍼五分灸三壯○主偏
 風口眼喎附腫痛熱熱腹堅大不嗜食傷寒病振
 寒而欠久狂登高而歌棄衣而走足緩履不收身前痛
 陷谷○足大指次指外間本節後陷中去內庭二寸足陽
 明胃脈所注為俞木○素註鍼五分留七呼灸三壯○
 主百日浮腫及水病善噎腸鳴腹痛熱病無度汗不出
 振寒瘕疾○東垣曰氣在於臂足取之先去血脈後取
 其陽明少陰之榮俞內廷陷谷深取之

內廷○足大指次指外間陷中足陽明胃脈所溜為榮水
 ○銅人灸三壯鍼三分留十呼甲乙留二十呼○主四
 肢厥逆腹脹滿數欠惡聞人聲振寒咽中引痛口喘上
 齒齧齧不嗜食腦皮膚痛鼻衄不止傷寒手足逆冷汗

不出赤白痢○仲景曰太陽若欲作再經者鍼足陽明
 使不傳則愈

厲兌○足大指次指之端去爪甲角如韭葉是陽明胃脈
 所出為井金胃實滿之銅人鍼一分灸一壯一云三壯
 ○主尸厥口噤氣絕狀如中惡心腹脹滿水腫熱病汗
 不出寒瘕不嗜食面腫足所寒喉痺上齒齧惡寒鼻不
 利多驚好卧狂欲登高而歌棄衣而走黃疸訕訕口喎
 唇疹頸腫臃腫痛循胸乳氣衝股伏兔附外廉足跗
 上痛消穀善飢溺黃

脾藏



脾重三斤三兩廣三十長五寸有散膏半斤居脊之第十二椎掩乎大倉胃土裹血溫五藏

中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌本其味甘其類土其畜牛其穀稷其應四時上為鎮星是以知病之在肉也其首宮其數五其臭焦其液涎其色黃

中央生濕濕生土土生甘甘生脾脾生肉肉生肺脾主口其在天為濕在地為土在體為肉在藏為脾在色為黃在音為宮在聲為歌在變動為噦在竅為口在味為甘在志為思思傷脾怒勝思濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘

脾之合肉也其榮唇也其主肝也○脾胃者倉廩之官五味出焉

脾者倉廩之本營之居也其華在唇四白其充在肌此至陰之類通於土氣從謂氏○脾者土也孤藏以灌四旁

脾主四肢為胃行其津液舟溪曰脾具坤靜之德而前乾之

脾主治中央常以四時長四歲各十八日寄治不獨主於時也

脾氣通於口口和則知穀味矣

脾氣虛則夢飲食不足得其時則夢築垣墻蓋屋大則又

脾色黃欲如雄雞黃不欲如黄土大則又

脾氣絕則脈不榮其唇口唇者肌肉之本也脈不榮則肌肉不滑澤肌肉不滑澤則肉滿肉滿則唇反唇反則肉先死甲日篤乙日死

脾經太陰穴

足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過覈骨後上內踝前廉

覈骨一作核骨俗云孤拐骨是也足跟後兩傍起骨為跗骨足大陰起大指之端隱白穴受足陽明之交也由是循大指內側白肉際大都穴過核骨後歷太白公孫

商丘上內踝前廉之三陰交也

上膈內循新骨後交出厥陰之前膈示

膈腓腹也由三陰交上膈內循新骨後之漏谷上行二寸交出足厥陰經之前至地機陰陵泉

上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃

脾內為股臍上為股自陰陵泉上循膝股內前廉之血海箕門進入腹經冲門府舍會中極關元復循腹結

大橫會下腕歷腹哀過日月期門之分循本經之裏下至中腕之際以屬脾絡胃也

上膈挾咽連舌本散舌下

咽所以嚥物居喉之前至胃長一尺六寸為胃系也舌本舌根也由腹哀上膈循食竇天谿胸鄉周榮由周榮外曲折向下至大包又自大包外曲折向上會中府上行入迎之裏挾喉連舌本散舌下而終

其支別者復從胃別上膈注心中

此支由腹哀別行再從胃部中腕穴之外上膈注於膻中之裏心之分以交於手少陰

○此經多氣少血○已時氣血注此○九二十一穴左右共四十二穴

原白○足大指端內側去爪甲角如韭葉脾脈所出為井
才○素註鍼一分留三呼銅人鍼三分留三呼灸三壯
○主腹脹喘滿不得安卧嘔吐食不下胸中熱暴世衄
血卒尸厥不識人足寒不蘇溫婦人月事過時不止小
兒客忤慢驚風

大都○足大指本節後內側陷中骨縫赤白肉際脾脈所
溜為榮火脾虛補之銅人鍼三分灸三壯○主熱病汗
不出不得卧身重骨疼傷寒手足逆冷腹滿善嘔煩熱
悶亂吐逆目眩腰痛不可俛仰繞踝風胃心痛腹脹胸
滿心蛇痛小兒客忤

太白○足大指內側內踝前核骨下陷中脾脈所注為俞
土○銅人鍼三分灸三壯○主身熱煩滿腹食不化
嘔吐泄瀉膿血腰痛大便難氣逆霍亂腹中切痛腸鳴
膝股胛痠轉筋身重骨痛胃心痛腹脹胸滿心痛脈緩
公孫○足大指本節後一寸內踝前脾之絡別走陽明
胃經○銅人鍼四分灸三壯○主寒瘧不嗜食痼氣好
太息多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰頭面腫起煩
心狂多飲膽虛○厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛瀉
之虛則鼓脹補之

商丘○足內踝骨下微前陷中脾脈所行為經金脾實瀉
之○銅人灸三壯鍼三分○主腹脹腸中鳴不便脾虛
令人不樂身寒善太息心悲骨痺氣逆痔瘡骨蛆蝕癢
痲癩瘰癧熱好嘔陰股內痛氣逆氣痛走上下引小腹
痛不可俛仰脾積痞氣黃瘦舌木強痛胃脘痛腹脹寒

黃瀉瘕泄水 面黃善思善味食不消體重節痛急情
者卧婦人絕子小兒慢風
三陰交○內踝上三十骨下陷中足太陰少陰厥陰之交
會○銅人鍼三分灸三壯○主脾胃虛弱心腹脹滿不
思飲食脾痛身重四肢不舉腹脹腸鳴澹泄食不化痲
癖腹寒膝內痲痛小便不利陰莖痛足痿不能行疝氣
小便遺失膽虛食後吐水遺遺失精霍亂手足逆冷失
欠頰車嗟開張口不令男子陰莖痛元歲發動臍下痛
不可忍小兒客忤婦人臨經行房藏瘦瘕瘕漏血不止
崩漏不止妊娠胎動橫生產後惡露不行去血過多血
崩暈不省人事如經脈閉塞不通瀉之立通經脈虛耗
不行者補之經脈壅盛則通

按宋太子出苑逢姪婦診曰女徐文伯曰一男一女
太子性急欲視文伯瀉三陰交補合谷胎應鍼而下
果如文伯之診後世遂以三陰交合谷為妊婦禁鍼
然文伯瀉三陰交補合谷而墮胎今獨不可補三陰
交瀉合谷而安胎乎蓋三陰交腎肝脾三脈之交會
主陰血血當補不當瀉合谷為大腸之原大腸為肺
之府主當氣瀉不當補文伯瀉三陰交以補合谷是
血衰氣旺也今補三陰交瀉合谷是血旺氣衰矣故
劉元賓亦曰血衰氣旺定無妊血王氣衰應有體
漏谷 陰交 內踝上六十骨下陷中○銅人鍼三分灸
三壯○主腸鳴強欠心悲逆氣腹脹滿急疝瘕冷氣食
飲不為肌膚瘠澤足不能行

子 48-282

膝下五十膝內側輔骨下陷中仰足取之八太
陰和別走上一寸有空○銅人灸三壯鍼五分○主腰
痛不可俯仰溇泄腹脹水腫脹堅不嗜食小便不利
精不足女子癢按之如湯沃股內至膝

陰陵泉○膝下內側輔骨下陷中仰足取之或曲膝取之
與陽陵泉穴相對足太陰脾脈所入為合水○銅人鍼
五分○主腹中寒不嗜食脇下滿水脹腹堅喘逆不得
卧腰痛不可俯仰霍亂疝瘕遺尿失禁不自知小便不
利氣淋寒熱不節陰痛胸中熱暴泄

血海○膝臚上內廉白肉際二寸半○銅人鍼五分灸三
壯○主氣逆腹脹女子漏下惡血月事不調○東垣曰
女子漏下惡血月事不調暴崩不止多下水漿之物皆

田飲食不節或勞傷形體或素有氣不足灸太陰脾經
七壯

箕門○魚腹上越筋間陰股內動脈應手一云股上起筋
間○銅人灸三壯○主麻小便不通遺溺鼠鼯腫痛

衝門一名上○去大橫五寸府舍下橫骨兩端約中動脈
去腹中行四寸半○銅人鍼七分灸五壯○主腹寒氣
滿腹中積聚痰滯淫滲陰疝婦人難乳妊娠子冲心不
得息

府舍○腹表下三寸去腹中行各四寸半足厥陰太陰陰
維之會三脉上下三入腹結肝脾結心膈從脇上至肩
此太陰和三陰陽明之別○銅人灸五壯鍼七分○主
脾痺疼腹滿上搶心積聚

腹結即十四經發揮云大橫下一寸三分去腹中行四
寸半○銅人鍼七分灸五壯○主欬逆膈痛腹寒瀉利
心痛

大橫○腹結下三寸五分直臍旁二寸五分去腹中行四
寸半足太陰陰維之會○銅人鍼七分灸三壯○主大
風逆氣多寒善悲四肢不可舉動多汗洞痢

腹表○日月下一寸五分去腹中行四寸半足太陰陰維
之會○銅人鍼三分○主寒中食不化大便膿血

食竇○天谿下一寸六分舉臂取之○銅人鍼四分灸五
壯○主胸脇支滿雷鳴常有水聲兩痛


天谿○胸鄉下一寸六分陷中仰而取之○銅人鍼四分
灸五壯○主胸中滿痛欬逆上氣喉中作聲婦人乳腫

積癰
胸鄉○周榮下一寸六分陷中仰而取之○銅人鍼四分
灸五壯○主胸脇支滿引胸背痛不得卧轉側難

周榮○中府下一寸六分仰而取之○銅人鍼四分灸五
壯○主胸脇滿不得俯仰食不下喜飲欬逆稠膿欬逆
多淫淫

大包○淵液下三寸布胸脇中出兗肋間脾之大絡總統
陰陽諸絡由脾灌漑五藏○銅人灸三壯鍼三分○主
胸脇中痛喘氣○實則身盡痛瀉之虛則百節盡皆縱
補之

心臟



心少陰心之經



心宜一十二兩附著於脊之第五根居肺下膈上中有七孔三毛一云惟上智形如木敷蓮花

南方赤色入通於心心開竅於耳非成精於心故病在五藏其味苦其類火其畜羊其穀黍其應四時上為

燄或星是以知病之在脉也其音徵其數七其臭焦其味

苦其聲言其液汗

南方生熱熱主火火生苦苦生心心生血血生脾脾主舌

其在天為熱在地為火在體為脉在藏為心在色為赤在

音為徵在聲為笑在變動為憂在竅為舌在味為苦在志

為喜喜傷心恐勝喜苦傷氣鹹勝苦心者君主之官也神

明出焉

心者生之本神之變也其華在面其充在血脉為陽中之

太陽通於夏氣心之合脉也其榮色也其主腎也○心氣

通於舌舌和則知五味矣心氣虛則夢救火陽物得其時

則夢燔灼腹三○心色赤欲如帛裹朱不欲如赭素

五藏俱等而肺獨在膈上者何也然心者血肺者血氣為

榮氣為衛相隨上下謂之榮衛通行經絡營周於身故令

心肺在膈上也

陳氏曰心肺能以血氣生育人身則此身之父母也父

母之尊理當居上故曰膈膜之上中有父母

心氣絕則脉不通脉不通則血不流血不流則色澤去故

面色黑如黎此血先死壬日篤癸日死

一 手少陰心經穴

心系有二一則上與肺相通而入肺筋大葉則曰肺葉而下曲折向後並脊裏細絡相連貫脊髓與腎相通正當七節之間蓋五藏系皆通於心而心通五藏系也乎少陰經起於心循任脈之外屬心系下膈當膈上一寸之分絡小腸

其支者從心系上挾咽系目

支者從心系出任脈之外上行而挾咽系目也

其直者復從心系却上肺出腋下

直者復從心系直上至肺蔽之分出循腋下抵極泉也

穴在臂內腋下筋間動脈入胸

下循膈內後廉行太陰心主之後下肘內廉

自極泉下循膈內後廉行太陰心主兩經之後歷青靈

穴下肘內廉抵少海

循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內廉循小指之內出其端腕下蹠為兌骨自少海而下循臂內後廉歷靈道

通里至掌後兌骨之端經陰郄神門入掌內廉至少府

循小指端之少衝而終以交於手太陽也○滑氏曰心

為君主之官示尊於他藏故其交經授受不假支別云

○此經多血少氣○午時氣血注此○受足太陰之交

○九九穴左右共一十八穴

極泉○臂內腋下筋間動脈入胸○銅人鍼三分灸七壯

○主臂肘厥寒四支厥心痛乾嘔煩滿脇痛悲愁

青靈○肘上三寸伸肘舉臂取之○銅人灸七壯明堂三壯○主目黃頭痛脈寒脇痛肩臂不舉不能帶衣

少海○肘內廉節後大骨外去肘端五分屈肘向頭

之脈所入為合水○銅人鍼三分灸三壯甄權云不

宜灸鍼五分甲乙鍼二分留三呼瀉五吸不頁灸素註

灸五壯資生云數說不同要之非大急不灸○主寒熱

筋痛目眩發狂嘔吐涎沫項不得回顧肘掌腋脇下

痛四肢不得舉腦風頭痛氣逆噫噦瘰癧心疼手顫健

忘

靈道○掌後一寸五分心脈所行為經金○銅人鍼三分

灸三壯○主心痛乾嘔悲恐相引瘰癧肘掌瘡瘡不能

言

通里○腕後一寸指中手少陰心脈之絡別走大腸小腸

經○銅人鍼三分灸三壯明堂七壯○主目眩頭痛熱

病先不樂數日懊懣數欠頻神悲面熱無汗頭風暴痞

不言目痛心悸肘臂膈痛苦嘔喉痺少氣遺溺婦人經

血過多崩中○實則支滿兩腫瀉之虛則不能言補之

陰郄○掌後脈中去腕五分○銅人鍼三分灸七壯○主

鼻衄吐血酒漸長寒厥逆氣驚心痛

神門一名中衝掌後銳骨端陷中手少陰心脈所注為俞

土心實瀉之○銅人鍼三分留七呼灸七壯○主瘧心

煩甚欲得冷飲惡寒則欲暖溫中咽乾不嗜食心痛數

噦惡悸少氣不足手臂寒而赤喜笑掌中熱而腕目黃

脇痛喘逆身熱狂慧笑血吐血振寒上氣遺溺失音

心性癡呆健忘心積伏梁大小人五癰○東垣曰胃氣

下溜五藏氣皆亂其為病互相出見氣在寸心者取之


手少陰之命神門大陵同精導氣以復其本位○靈樞經曰少陰無命心不病乎其外經病而藏不病故獨取其經於掌後銳骨之端心者五藏六府之大主精神之所舍其藏堅固邪不能容容邪則身死故諸邪皆在心之包絡包絡者心主之脉也

少府○小指本節後骨縫陷中直勞宮手少陰心脉所流為榮火○銅人鍼二分灸七壯明堂三壯○主煩滿少氣悲恐畏人掌中熱臂痠肘腋攣急胸中痛手拳不伸瘡瘡久不愈振寒陰挺出陰痿陰痛遺尿偏墜小便不利太息

少衝一名始手小指內廉端去爪甲角如韭葉手少陰心脉所出為井木心虛補之○銅人鍼一分灸三壯明堂一

壯○主熱病煩滿上氣嗌乾渴目黃臍臂內後廉痛厥心痛痠冷少氣悲恐善驚太息煩滿掌中熱脇痛胸中痛口中熱咽中酸乍寒乍熱手攣不伸引肘腋痛悲驚○東垣曰一富者前陰臍臬末先師張潔古也治之曰夫前陰足厥陰之脉絡循陰器出其挺末凡臬者心之所主散入五方為五臬入肝為臬此其一也當於肝經瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝是治其標

藏



手太陽小腸經



小腸重二斤十四兩長三丈二尺廣二寸半徑八分分之
少半左回疊積十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之
大半胃之下口小腸上口也在臍上二寸水穀於是入焉
大腸上口小腸下口也至是而秘別清濁水液入膀胱滓
穢入大腸○小腸者受盛之官化物出焉○小腸為赤腸
○食下則腸實而胃虛以此推之則如指節下

手太陽小腸經穴

手太陽之脉起於小指之端循手大側上腕出踝中
臂骨盡處為腕腕下兌骨為踝大經起小指端少澤穴
由是循手外側之前谷後谿上腕出踝中歷腕骨陽谷
養老穴也

五上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出

肩解繞肩胛交肩上

脊兩傍為脊脊上兩角為肩解肩解下成片骨為肩胛
自養老穴直上循臂骨下廉支正穴出肘內側兩骨之
間歷少海穴上循臑外廉行手陽明少陽之外上肩循
肩貞臑俞天宗秉風曲垣肩外俞肩中俞諸穴乃上會
大椎因左右相交於兩肩之上
入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸

自交肩入缺盆循肩向腋下行當膺中之分絡心循
胃系下膈過上臑抵胃下行任脉之外當臍上二寸之

分屬小腸

其支者從缺盆貫頸上頰至目銳眦却入耳中
日外角為銳眦支者別從缺盆循頸之天窓天窓上頰

抵顛膠上至目銳眦皆過童子膠却入耳中循聽官而終
也

其支別者別循頰上頰音抵鼻至目內眦

目下為頰目大角為內眦其支者別循頰上頰抵鼻至

目內眦皆精明穴以交於足太陽也

○此經多血少氣○未時氣血注此○受手少陰之交

○九一十九穴左右共三十八穴

少澤一名手小指端外側去爪甲角下一分陷中手太陽

小腸脉所出為井金○素註灸三壯銅人灸一壯鍼一

分留二呼○主瘧寒熱汗不出喉痺舌強口乾心煩臂

痛瘰癧咳嗽口中涎唾頸項急不可顧目生膚翳覆瞳

等頭痛

前谷○手小指外側本節前陷中手太陽小腸脉所溜為

榮木○銅人鍼一分留三呼灸一壯明堂灸三壯○主

熱病汗不出痰瀉癩疾耳鳴頸項腫喉痺頰腫引耳後

鼻塞不利咳嗽吐衄臂痛不得舉婦人產後無乳

後谿○手少指外側本節後陷中握拳取之手太陽小腸

脉所注為俞木小腸虛補之○銅人鍼一分留二呼灸

一壯○主瘧寒熱目赤生翳鼻衄耳聾胸滿頭項強不

得回顛癩疾臂肘攣急痲疥

腕骨○手外側腕前起骨下陷中手太陽小腸脉所過為

原小腸虛實皆拔之○銅人鍼二分留三呼灸三壯○

主熱病汗不出脇下痛不得息頸腫寒熱耳鳴目冷

淚生翳狂惕偏枯肘不得屈伸痰癭頭痛頰開驚風瘰

痲五指掣頭痛

陽谷○手外側腕中銳骨下陷中○大陽大腸脉所行為
經火素註灸三壯鍼二分留三呼甲乙留二呼○主
痲疾狂走熱病汗不出脇痛頸腫寒熱耳聾耳鳴齒
齲痛臂外側痛不舉吐舌及頸交言左右顧目眩小兒
瘰癧舌強不啣乳

養老○手踝骨前上一云腕骨後一寸陷中○銅人鍼三

分灸三壯○主肩臂痠疼有欲折臂如拔手不能自上
下目視不明

支正○腕後五十手大陽絡脉別走少陰○銅人鍼三分

灸三壯明堂灸五壯○土風虛驚恐悲愁顛狂五勞四
肢虛弱肘臂難屈伸手不握十指盡痛熱病先腰頸

痲喜渴強項疔目○實則節池肘廢瀉之虛則生疔小
如指痲疥補之

少海○肘內大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之手

一太陽小腸脉所入為合上小腸實瀉之○素註鍼二分

一留七呼灸五壯○主頸項痛脇腫振寒肘腋痛腫小腹痛瀉發于
一 根腫風眩頸項痛脇腫振寒肘腋痛腫小腹痛瀉發于

一 鳴戾頸痲癢狂走頷腫不可回顧肩似拔膈似折耳聾
目黃頰腫

肩貞○曲胛下兩骨解間有髃後陷中○銅人鍼五分素
註鍼八分灸三壯○主傷寒寒熱耳鳴耳聾缺盆肩中

熱痛風痺手足麻木不舉

臑俞○挾肩髃肘後大骨下胛上應陷中舉臂收之手

大陽陽維陽蹻三經之會○銅人鍼八分灸三壯○主

臂痠無力肩痛引胛寒熱氣腫瘰癧

天宗○肩後大骨下陷中○銅人灸二壯鍼五分留六

呼○主肩臂痠疼肘外後應痛頰腫

秉風○天膠外骨上小髃後舉臂有空手太陽陽明手少

陽及少陽四脉之會○銅人灸五壯鍼五分○主肩痛
不能舉

曲垣○肩中央曲胛陷中按之應手痛○銅人灸三壯鍼

五分明堂鍼九分○主肩痺熱痛氣注肩胛拘急痛悶

肩外俞○肩胛上廉去脊三寸陷中○銅人鍼六分灸三

壯明堂一壯○主肩胛痛周痺寒至肘

肩中俞○肩胛內廉去脊二寸陷中○素註鍼六分灸三

壯銅人鍼三分留七呼灸十壯○主嗽嗽上氣唾血寒
熱目視不明

天窓○頸大筋間前曲頰下扶突後動脉應手陷中

○銅人灸三壯鍼三分素註六分○主痔瘻頸痛肩胛

引項不得回顧耳聾頰腫齒噤中風

天容○耳下曲頰後○灸三壯○主瘰癧項腫不可回顧
不能言胸痛胸滿不得息嘔逆吐沫齒噤耳聾耳鳴

頰膠○面頰骨下廉銳骨端陷中手少陽太陽之會○素
註鍼三分銅人鍼二分○主口喎面赤眼動不止頰


腫齒痛

聽會○耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽三


脉之會○銅人鍼三分灸三壯明堂鍼一分甲乙鍼三

分○主夫日瘰疾心腹滿聾耳耳聾如物填塞無聞下
中嘈嘈懷懷蟬鳴

膀胱



足太陽膀胱經



膀胱重九兩二銖縱廣九寸居腎之下大腸之側小腸下
曰乃膀胱上口水液由是滲入焉盛滿九升九合
膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣

膀胱為黑腸從藏為此

王安道曰或曰靈樞經云水穀者常并居胃中成糟粕
而俱下大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁滲入膀胱
焉王冰曰水液自回腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化
之而為溺以世出也楊介云水穀自小腸感受於闕門
以分別也其水則滲入於膀胱上口為溲便詳已上三
說則小便即泌別之水液滲入膀胱以出者也素問則
曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾散精上歸於肺通
調水道下輸膀胱則水便又似水飲精微之氣上升脾

肺運化而後成者也將何所同將何所憑乎余曰憑夫
理耳且夫澆溺者果何物耶水而已矣水之下流其性
則然也故飲入於胃其精氣雖上升其飲之本體固不
能上升也惟其不能上升者必有待於上升者為之先
道故素問又曰膀胱者津液藏焉氣化則能出矣且水
者氣之子氣者水之母氣行則水行氣滯則水滯或者
又謂小便純由泌別不由運化蓋不明此理故也雖然
膀胱固曰津液之府至於受盛津液則又有胞而居膀
胱之中焉故素問曰胞移熱於膀胱靈樞曰膀胱之泡
薄以濡類纂曰膀胱者胞之室且夫胞之居於膀胱也
膏上口而無下口津液既盛於胞無由自出必因乎氣
而後能漸浸潤於膀胱外積於胞下之空處遂為溺

以出於前陰也素問所謂膀胱津液藏焉者蓋舉膀胱
以該胞也若曰胞下無空處則人溺急時至廁焉能即
出乎夫惟積滿胞下空處而不可再容故急急則至廁
即出矣或言胞有上口而無下口或言胞上下皆有口
或言胞有小竅而為注泄之路不亦妄歟

太陽膀胱經穴

足太陽膀胱之脉起於目內眦上額交巔上
目大角為內眦髮際前為額腦上為巔頂也足太陽
之脉起目內眦睛明穴上額循膺竹過神庭歷曲差五
處承光通天自通天斜行左右相交於頂上百會也
其支別者從巔至耳上角
支別者從巔至百會抵耳上角過率谷浮白竅陰穴胛

以散養於... 腦髓也腦後為項與直行者由通天穴循絡却王枕
入絡腦復出下項抵天柱也
循肩胛內夾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱
肩後之下為肩胛骨為脊九上橫骨為腰挾脊為脊
自天柱而下過大椎陶道循脊有轉內挾脊兩傍下行
歷大杼風門肺俞厥陰俞心俞膈俞肝俞膽俞脾俞胃
俞三焦俞腎俞大腸俞小腸俞膀胱俞中膂內俞白環
俞由是抵腰中入循脊絡腎下屬膀胱也
其支別者從腰中下貫脊入胸中
腎反也挾腰膂兩傍為機後為腎腓腸上膝後曲

腰為膂其支別者從腰中循腰際下挾脊歷上髂次髂
中髂下... 十七至二十九... 脊上之... 胃倉盲門志室胞盲秩邊下歷尻腎過解樞也股外為
解捷骨之下為解樞

其支別者從膂內左右別下貫膂脊內過解樞
脊內曰膂挾脊肉也其支別者... 挾脊兩旁第三行相
去各三寸之諸穴自天柱而下從時內左右別行下貫
膂脊歷附分臑... 胃倉盲門志室胞盲秩邊下歷尻腎過解樞也股外為
解捷骨之下為解樞

其支別者從膂內左右別下貫膂脊內過解樞
脊內曰膂挾脊肉也其支別者... 挾脊兩旁第三行相
去各三寸之諸穴自天柱而下從時內左右別行下貫
膂脊歷附分臑... 胃倉盲門志室胞盲秩邊下歷尻腎過解樞也股外為
解捷骨之下為解樞

小指外側端

此經多血少氣○中時氣血注此○受手太陽之交
○九六十三穴左右共一百二十六穴○刺深五分留
六呼

精明一名
太陽足陽明陰陽踰五脉之會○銅人鍼一寸半留

三呼雀目者可久留鍼然後速鍼禁灸明堂鍼一分半
資生云面部所鍼淺者一分深者四分素註亦云一分
是銅人誤以一分為一寸也素註鍼一分留六呼灸三

壯○主目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩內眦赤
痛眦腫無見腎痿淫膚白翳大背拳睛弩肉侵睛雀目
瞳子生瘳小兒疳眼

按東垣曰刺太陽陽明出血則目愈明蓋此經多血
少氣故目翳與赤痛從內眦起者刺精明攢竹以宣

泄太陽之熱然精明刺一分半攢竹刺一分三分為
適淺深之宜今醫家刺攢竹則鍼直抵精明不補不

瀉而又久留鍼非古人意也
攢竹一名始元一名光明兩眉頭少陷宛宛中○素註鍼三分

留六呼灸三壯銅人禁灸鍼一分三呼為三級

出鍼宜以細三稜鍼刺之宜泄熱氣三度刺目大明明
堂宜細三稜鍼三分出血灸一壯○主目眦腫視物不
明淚出目眩瞳子癢目昏眼中赤痛及臉闊動不得卧
頰痛面痛尸厥厥邪神狂鬼魅風眩暈

曲差○神庭旁一寸五分入髮際○銅人鍼三分灸三壯
○主目不明翳衄鼻塞鼻瘡心煩滿汗不出頭項痛頂
腫身體煩熱

五處○夾上星旁一寸五分○銅人鍼三分留七呼灸三
壯明堂灸五壯○主脊強反折瘰癧癩疾頭風熱目眩
目不明目上戴不識人

五處後一寸五分又云一寸○銅人鍼三分禁灸
○主風眩頭風嘔吐心煩鼻塞不利目生白翳

通天○承光後一寸半○銅人鍼三分留七呼灸三壯○
主腰氣鼻衄鼻瘡鼻塞鼻多清涕頭旋尸厥口喎喘急
項痛重暫起僂仆癭瘤

絡却一名腦蓋○通天後一寸五分○素註刺三分留五
呼銅人灸三壯○主頭旋耳鳴狂走癡癡恍惚不樂腹
脹青盲內障目無所見

玉枕○絡却後一寸五分又云七分夾腦戶旁一寸三分
起肉枕骨上入髮際二寸○銅人灸三壯鍼三分留三
呼○主目痛如脫不能遠視內連系急失枕頭項痛風
眩頭寒多汗鼻窒不聞

天柱○挾項後髮際大筋外廉陷中○銅人鍼五分留三呼

百壯下經三壯素註鍼二分留六呼○主頭旋腦痛頭
風身不知香臭腦重加脫項如按項強不可回顛

大抒○項後第一椎下兩旁相去脊中各一寸五分陷中
正坐取之督脉別絡手足太陽少陽之會○難經曰骨

會大抒疏曰骨病治此素氏曰肩能負重以骨會大抒
也○銅人鍼五分灸七壯明堂禁灸下經素註鍼三分

留七呼灸三壯皆生云非太急不灸○主際痛不可屈
伸傷寒汗不出腰脊痛胸中鬱熱甚不已頭風振寒

項強不可俯仰痰壅頭旋勞氣咳身熱目眩腹痛僵
仆不能久立煩滿栗身交膈擊癩疾身躄急大

○東垣曰五藏氣亂在背取之天柱大抒不補不瀉
以導氣而已

風門熱府一名○二椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之
○銅人鍼五分素註三分留七呼明堂灸五壯若類刺

泄諸陽熱氣背永不發難疽灸五壯○主發背癰疽身
熱上氣短氣欬逆胸背痛風嘔吐傷寒頭項強目瞤胸

中熱
肺俞○第三椎下兩旁相去脊一寸五分千金對乳引繩
度之既權以搭手左取右右取左當中指末是正坐取

之○難經曰陰病行陽故五藏俞皆在陽滑氏曰背為
陽俞史記扁鵲傳作輸猶委輸經氣由此而輸彼也○

甲乙鍼三分留七呼得氣即瀉瀉鍼五分留七呼
百壯明下三壯○素問刺背者三壯其動為效

五日死○主癰氣其疽勞瘵口舌乾勞熱上氣腰脊強
痛寒熱喘滿虛煩傳尸骨蒸肺痿咳嗽肉痛皮膚癢嘔吐

支滿不嗜食狂走欲自殺背僂肺中風僂卧胸滿短氣
腎熱汗出百毒病食後吐水小兒龜背○仲景曰太陽

與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞硬者
當刺太陽肺膈肝膈

按素問云刺胸腹者必避五藏中肺者三日死云云
銅人乃於背部各俞六言之則固矣

厥陰俞關俞一名○四椎下兩旁各一寸五分正坐取之○銅
人鍼三分灸七壯○主欬逆牙痛心胸痛滿嘔吐留結

煩悶
或曰厥府皆有俞在背獨心包絡無俞何也曰厥陰
俞即心包絡俞也

心俞○五椎下兩旁相去脊各一寸五分正坐取之○銅
人鍼三分留七呼得氣即瀉不可灸明堂灸三壯資生

云刺中心一日死其動為噫又曰還死豈可妄鍼千金
言中風心急灸心俞百壯當撲其緩急可也○主偏風

半身不遂心氣亂恍惚心中風僂卧不得傾側悶亂胃
絕汗出唇赤狂走發癎語悲泣胸悶亂欬吐血黃疸鼻

衄目瞤目昏嘔吐不下食丹毒白狸瘰疔小兒心氣不
足數歲不語

鬲俞○七椎下兩旁相去脊中一寸五分正坐取之○難
經曰血會鬲俞疏曰血病治此蓋上則心俞心主血下

則肝俞肝藏血故鬲俞為血會又足太陽多血血乃水

之象也○銅人鍼三分留七呼灸三壯素問刺中商比
為傷中其病難愈不過一歲必死○主心痛周痺吐食
翻胃骨蒸四支怠惰嗜卧痲痺欬逆嘔吐南胃寒瘵食
飲不下熱病汗不出身重常溫不能食食則心痛身痛
腫脹腸腹滿自汗盜汗

肝俞○九椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之○
經曰東風傷於春病在肝俞○銅人鍼三分留六呼灸
三壯明堂灸七壯素問刺中肝五日死其動為效○主
多怒黃疸鼻酸熱病後目暗淚出目眩氣短效血目上

視效逆，乾寒疝筋寒熱筋急相引轉筋入腹將死
○千金云效引兩脇急痛不得息轉則難振肋下與脊
相引而反折目上視目眩循眉頭驚狂執起則目眩

肺生白翳效引胸中寒疝小腹痛唾血短氣熱病差
復食五辛目暗肝中風踞坐不得低頭繞兩目連額上
色微青積聚否痛

膈俞○十椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之○
銅人鍼五分留七呼灸三壯明堂鍼三分下經灸五壯
素問刺中膈一日半死○主頭痛振寒汗不出腋下腫

心腹脹口苦舌乾咽痛乾嘔吐骨蒸勞熱食不下目黃
按資生經所載准知梯平取四花穴上二穴是膈俞
下二穴膈俞四穴主血故取此以治勞瘵後世誤以
四花為斜取非也

脾俞○十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之
○銅人鍼三分留七呼灸三壯明堂灸五壯素問刺中

脾十日死其動為吞又曰五日死○主多食身熱
臍汗痲痺積聚腸下滿洩利淋瀝寒熱水腫氣喘
痛黃疸喜久不嗜食

胃俞○十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取之
○銅人鍼三分留七呼灸隨年為壯明堂灸三壯下經
七壯○主癩亂胃寒腹脹而鳴臍胃嘔吐不嗜食多食
羸瘦目不明腹滿胸膈支滿脊痛筋攣小兒羸瘦不生
肌膚○東垣曰中濕者治在胃俞

三焦俞○十二椎下兩旁相去脊中各一寸五分正坐取
之○銅人鍼五分留七呼灸三壯明堂鍼三分灸五壯
○主臍府積聚脹滿羸瘦不能飲食傷寒頭痛飲水吐
逆肩背急腰脊強不得俯仰水穀不化世注下利

腸鳴目眩頭痛
腎俞○十四椎下兩旁相去脊中各一寸五分與膈平
坐取之欲知背俞先度其兩乳間中折之更以他草
去半已即以兩隅相柱也乃舉以度其背令其一隅正
上齊脊大椎兩隅在下當其下隅者肺之俞也復下一
度心之俞也復下一度肝之俞也脾之俞也復下一度
腎之俞也○銅人鍼三分留七呼灸以年為壯明堂灸
三壯○素問刺中腎六日死其動為嘔又五日死○主
虛勞羸瘦耳聾腎虛水厥久冷心腹填滿脹急兩脇滿
引小腹急痛脹熱小便淋目視眈眈少氣游血小便濁
出精夢泄腎中風踞坐而腰痛消渴五勞七傷虛損
膝拘急腰寒如水頭重身熱振慄食多羸瘦面黃黑

子 48—293

鳴膝中四肢淫滯洞洩食不化身腫如水女人精
成勞乘經交接流瘦寒熱往來

大腸俞○十六椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏取之

○銅人鍼三分留六呼灸三壯○主脊強不得俯仰腰

痠腹中氣脹繞臍切痛腸鳴引脊痛多食身瘦腹中雷

鳴大腸中風而嘔大腸瀉沸腸澀洩利白痢食不化小

腹絞痛大小便難○東垣云中燥治在大腸俞

小腸俞○十八椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏而取

之○銅人鍼三分留六呼灸三壯○主膀胱二焦津液

少大小腸寒熱小便赤不利淋瀝遺溺小腹脹滿疝痛

泄痢膿血五色赤痢下重腫痛脚腫五痔頑痛虛之消

渴口乾不可忍婦人帶下○東垣云中者治在小腸俞

膀胱俞○十九椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏取之

○銅人鍼三分留六呼灸三壯明堂灸七壯○主風勞

脊急強小便赤黃遺溺陰生瘡少氣膝寒拘急不得屈

伸腹滿大便澀洩利腹痛脚膝無力女子疲聚

中膂內俞一名脊中○二十椎下兩旁相去脊中各一寸五

分夾脊伸起肉伏取之○銅人鍼三分留十呼灸三壯

明堂云腰痛夾脊裏痛上下按之應者皆項至此穴痛

皆宜灸○主腎虛消渴腰脊強不得俯仰腸冷赤白痢

疝痛汗不出腹脹腸痛

白環俞○二十一椎下兩旁相去脊中各一寸五分伏取

之一云挺伏地端身兩手相重文額氣息令皮膚俱緩

乃取其穴○素註鍼五分得氣則先瀉瀉訖多補之不

宜灸明堂云灸三壯○主手足不仁腰脊痛疝痛大小

便不利腰髓疼脚膝不遂溫瘧腰脊冷疼不得久卧勞

損虛風腰背不便筋學痺縮虛熱閉塞

上膠○第一空腰際下一寸夾脊陷中尺太陽少陽之絡

○銅人鍼三分灸七壯○主大小便不利嘔逆膝冷痛

鼻衄寒熱瘧疾出婦人白瀝絕嗣○大理趙卿患偏

風不能起宛宛擢鍼上膠環跳陽陵泉巨虛下廉即能

起跪○膠總治腰痛

次膠○第二空夾脊陷中○銅人鍼三分灸七壯○主大

小便不利腰痛不得轉搖背腰寒小便赤心下堅脹疝

氣下墜足清不仁陰氣痛腸鳴注泄偏風婦人赤白淋

○三空夾脊陷中足厥陰少陽所結之會○銅人鍼

二分留十呼灸三壯○主大小便不利腹脹下利五勞

七傷六極大便難小便淋瀝尿泄婦人帶下月事不調

下膠○四空夾脊陷中○銅人鍼二分留十呼灸三壯○

主大小便不利腸鳴注瀉寒濕內傷大便下血腰不得

轉痛引卵女子下蒼汁不禁中痛引小腸疝痛

會陽一名陰尾尻骨兩旁○銅人鍼八分灸五壯○主腹

寒熱氣冷氣泄瀉久痔腸痔下血陽氣虛之陰汗濕

承扶一名肉節○尻脊下股陰上文中又云尻臀下

陷文中○銅人鍼七分灸三壯○主腰脊相引如解又

痔尻脊腫入便難陰包有寒小便不利

穀門○肉脊下八寸○銅人鍼七分○主腰脊不可俯仰

舉重惡血泄注外股腫

浮斜○委陽上一寸展膝得之○銅人鍼五分灸三壯○
主癰亂轉筋小腸熱大腸結脛外經筋急骨樞不仁小
便熱大便堅

委陽○承扶下一寸六分屈伸取之足太陽之前少陽之
後出於腠中外廉兩筋間三焦下輔俞足太陽之別絡
○素註鍼七分留五呼灸三壯○主腰脊痛不可俯仰
引陰中不得小便癱瘓癩疾小腹堅傷寒熱甚

委中血氣○腠中央約文動脈陷中令人面挺伏地取
之足太陽膀胱脈所入為合土○素註鍼五分留七呼

銅人鍼八分留三呼瀉七吸甲乙鍼五分灸三壯素問
刺委中大脉令人仆脫色○主膝痛及拇指腰夾脊沉
尻然遺溺腰重不能舉小腹堅滿體風痺痺樞痛可出

血痼膠皆愈傷寒四反熱病汗不出取其經血立愈
委中者血郛也大風髮肩墮落刺之出血

附分○二椎下附項內廉兩旁相去脊中各三寸正坐取
之手足太陽之會○銅人鍼三分素註刺八分灸五壯
○主肘不仁肩背拘急風冷客於腰理頸痛不得回顧
髓戶○直附分下三椎下兩傍相去脊中各三寸正坐

取之○銅人鍼五分得氣即瀉又宜久留鍼日灸七壯
至百壯素註五壯○上背膊痛虛勞肺痿三尸走疰項
強急不得回顧喘息逆嘔吐煩滿

膏肓俞○四椎下近五椎上兩旁相去脊中各三寸正坐
曲脊伸兩手以臂著膝前令端直手大指與膝頭齊以
物支肘毋令搖動取之○銅人灸百壯多至五百壯當

覺痛者以水瀉之其亦當有所下若無停痰宿飲則
無所下也知病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令
取穴久之又當灸臍下氣海丹田關元中極四穴中取
一穴又灸足三里以引大氣實下○主無所不瘳癯瘦
虛弱得刀骨蒸夢中失精上氣欬逆發狂健忘疾病○
左傳成公十年晉侯疾病求醫於秦秦使醫緩名緩為
之未至公夢疾為二豎子曰彼良醫也懼傷我馬述之
其一曰居膏之上膏之下若我何醫至曰疾不可為也
在膏之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可
為也公曰良醫也厚為之禮而歸之○孫思邈曰特人
拙不能得此穴所以宿病難遣若能用心方便求得灸
之無疾不愈矣

一按先儒謂左氏失之誣其所載固未足信而思邈所
譏恐未中理何者如使天下無不可醫之疾則思邈
所著千金翼方二書具存其方其法豈能百發百中
哉以是知鏡川上工十全之論有為而發也又按膏
肓也心下為膏又曰凝者為脂釋者為膏又曰膏連
心脂膏也

楊文懿文集云周官論醫事以十全為上失一二
三四次之十失四為下吾嘗疑之夫疾有淺深則
醫有難易淺者雖庸醫可十全也使越人逢若齊
侯者三四使和緩過若晉侯者三四則皆失之矣
果孰為上下乎

神堂○五椎下兩旁相去脊中各三寸陷中正坐取之○


銅人鍼三分灸五壯明堂灸三壯素註鍼五分○主腰背脊強急不可俛仰胸腹滿氣逆上攻時體
 譏諸○有脾內應俠去推下兩旁相去脊中各三寸正坐取之以手重按病言譏諸應手○素註留七呼銅人
 鍼六分留三呼應五吸灸二七壯止百壯明堂灸五壯
 ○主大風汗不出勞損不得卧溫瘡寒瘡皆閉氣滿腹脹氣眩胃中痛引腰背腋拘脇痛目眩目痛鼻衄喘逆
 臂膊內麻痛不得俛仰小兒食時頭痛五心熱
 兩關○大椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中正坐開肩取之○銅人鍼五分灸三壯○主背痛惡寒脊強俛仰
 難食飲不下嘔噦多涎唾胸中噎悶大便不節小便黃
 風門○九椎下兩旁相去脊中各三寸陷中正坐取之外
 雲云十椎下○銅人鍼五分灸三壯○主尸厥走疰胸背連心痛食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃
 陽綱○十椎下兩旁相去脊中行各三寸正坐開肩取之外
 外臺云十一椎下○銅人鍼五分灸三壯下經灸七壯
 ○土腸鳴腹痛飲食不下小便赤澀腹脹身熱大便不節泄瀉赤黃不嗜食急情
 意舍○十一椎下兩旁相去脊中各三寸正坐取之外臺
 云九椎下○銅人鍼五分灸三壯至百壯明堂五十壯下經灸七壯素註
 虛脹大便滑泄小便赤
 消渴身熱目黃
 十二椎下兩旁相去脊中各三寸正坐取之○銅

乙鍼五分灸五壯甲乙三壯○主腹滿虛脹水腫食飲不下惡寒背脊痛不得俛仰
 膏肓○十一椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中又肋間與鳩尾相直正坐取之○銅人灸二十壯鍼五分又云
 灸二壯○主心下痛大便堅婦人乳疾
 志室○十四椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中正坐取之○銅人鍼九分灸三壯明堂灸七壯○王陰腫疼痛
 背痛腰脊強直俛仰不得飲食不消腹強直夢遺失精淋瀝吐逆兩脇急痛癱亂
 胞育○十九椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中伏而取之○銅人鍼五分灸五七壯明堂
 主腰脊急痛食不消腹堅急腸鳴淋瀝不得大小便癰
 關下腫
 雲云二十椎下兩旁相去脊中行各三寸陷中伏取之
 ○銅人鍼九分明堂灸三壯鍼三分○主五痔發腫小便赤腰痛
 或曰太陽膀胱行脊第二行自大杼至白環俞十七穴云第幾椎下兩旁相去各一寸半第三行自附分至秩邊十四穴云其椎下兩旁相去各三寸當除去脊骨一寸外重取之不然不應太近椎也曰旁者指第二第三行餘穴皆在脊之旁也按滑氏云自大杼至白環諸穴並第二行相去脊中各一寸五分歌云
 自從大杼至白環相去脊中三寸間夫既曰脊中則自脊骨一寸外重取而非骨外重取明矣○大按

穴共五行督脉在中太陽經四行在兩旁其穴又比
 揣摩脊骨各開取之如瘦人骨露易取肥人脊隱難
 摸取穴多不得其真須先將瘦人量取定將瘦人同
 身尺寸自其處起至本處是穴然後將肥人同身尺
 寸若干亦自其處起量至其處是穴假如取背脊穴
 先將瘦人揣摩得四推下五推上用墨點記却將稻
 稈心一條自結喉下圍轉到墨點處截斷稻稈兩頭
 用瘦人中指兩文角寸法量得此稻稈二十一寸強
 又別將稻稈一條量取肥人中指節兩文頭寸法二
 十一寸強截斷自肥人結喉下圍量至稻稈頭盡
 處用墨點記即是背脊矣餘倣此○或曰素問論五
 藏俞灸之則可刺之則不可故王燾亦以鍼灸殺生
 人不能起死人取灸而不取鍼蓋亦有所據也而銅
 人明堂千金諸書於五藏俞穴鍼灸並載何如曰按
 素問血氣形志論及遺篇俱論藏俞刺法以是知素
 問非成於一人之手也如背俞止鍼三四分漢書所
 載魏樊阿得鍼法於華陀其刺胸背深入二寸巨
 闕藏俞乃五寸而病皆瘳是又不以繩墨拘也
 合陽○約文中下三寸○銅人鍼六分灸五壯○主腰脊
 強引腹痛陰股熱肝瘦腹步履難寒疝陰偏痛女子崩
 中帶下
 承筋一名肱腸○肱腸中央陷中脛後從脚跟上七寸○
 銅人灸三壯禁鍼明堂鍼二分千金禁鍼資生云三說
 不同不刺可也○主腰背拘急大便秘腹腫痔瘡瘰

不仁腸痿急跟痛頭暈氣逆氣喘亂轉筋
 丞山一名魚腹一名充腸腸下分肉間陷中一云腿肚下
 分肉間○或經云取血須用兩手高托按掌上兩足指
 離地用足大指尖起上着足充腸腸下分肉間○銅
 人灸一壯鍼七分明堂鍼八分得氣即瀉遠出鍼灸不
 及鍼止一七壯下經灸五壯○主大便不通轉筋痔腫
 戰慄不能立脚氣膝腫腰痠脚跟痛筋急痛膝氣膝下
 腫痿亂急食不通傷寒水結
 飛揚一名外踝骨上七寸足太陽絡脉別走少陰○銅
 人鍼三分灸三壯明堂灸五壯○主痔腫痛體重起坐
 不能去頭不收脚腫痠軟不能久立久坐足指不
 能屈伸目眩目痛膝節風逆氣癩疾寒瘡○實則執寒
 頭骨痛鴻之虛則執氣補之
 陽陽○外踝上三寸太陽前少陽後筋骨之間陽筋脉部
 ○素註鍼六分留七呼灸三壯明堂灸五壯○主霍亂
 轉筋腰痛不能久立不能起體樞股肱痛痠厥風痺
 不仁頭重頭痛時有寒熱四肢不舉
 崑崙○足外踝後跟骨上陷中細脉動應手足太陽膀胱
 脉所行為經火○素註鍼五分留十呼銅人鍼三分灸
 三壯妊婦刺之落胎○主腰尻脚氣足腫腫不得履地
 難屈脚如結踝如裂痛脊背拘急欬喘滿腰脊內引
 痛偏痺陰腫痛目眩目赤如脫腫多汗心痛與背相接
 婦人字難包衣不出小兒發爛瘰癧○東垣曰鍼經云
 上氣不足此為之不滿下氣之苦鳴頭為之傾目為之

足少陰腎經



腎有兩枚重一斤一兩狀如石卵附著於脊之十四椎當胃下兩旁

北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎故病在竅其味鹹其類水其畜菟其應四時上為辰星辰以知病之在骨也其音羽其數六其臭腐其液唾其色黑

北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎腎生骨髓髓生肝腎生耳其在天為寒在地為水在體為骨在藏為腎在色為黑在音為羽在聲為呻在變動為慄在竅為耳在味為鹹在志為恐恐傷腎思勝恐寒傷血濕勝寒鹹傷血甘勝鹹

○腎者作強之官伎巧出焉

腎者主封藏之本精之處也其華在髮其充在骨為陰中之少陰通於冬氣○腎之合骨也其榮髮也其主骨也

藏各有一腎獨有兩者何也然兩者非皆腎也其左者為

右者為命門命門者諸精神之所舍原氣之所係也男

子以藏精女子以係胞故知腎有二也

程可久曰北方常配二物故易惟坎加習於物為龜蛇

於方為湖為北於大玄為玄為真

滑氏曰腎雖有左右命門之分其氣相通實皆腎也合

而觀之謂之五藏五府可也六藏六府亦可也

七節之旁中有小心

心為火腎為相火故曰小心七節自尾骶數上又

路為腎之配

腎氣虛則夢見舟船兩人得其時則夢伏水中若有所畏

腎色黑欲如重漆色不欲如炭色

腎氣絕即骨枯少陰者冬脉也伏行而溫於骨髓骨髓不

溫則肉不着骨骨肉不相親即肉濡而却故齒長而枯髮

無潤澤骨先死戊日篤巳日死○原病式曰仙經云先生

左腎則為男先生右腎則為女丹溪曰錢仲陽腎有補無

瀉又曰主閉藏者腎也施疏泄者肝也二藏皆有火而其

系上屬於心心者君火也為物所感則易動心動則相火

翁然而隨雖不交會亦暗流而疏泄矣○又曰火有二曰

君火曰相火以名而言形質相生配於五藏故謂之君以

少助之也... 肝腎之陰悉其相火人而周于天也

王節齋曰古方滋補藥皆無補右尺命門相火... 不知左腎原虛右腎原主若兩腎平補依舊火勝於水

足少陰腎經穴

是少陰之脉起於小指之下斜趨足心... 趨向也足少陰起小指之下斜趨足心之湧泉

足少陰之下循內踝之後別入跟中上膈內出膈內廉... 跟足根也由湧泉轉出足內踝然谷穴下循內踝大豁

循榮實出膈內廉抵陰谷也... 由陰谷上股內後廉貫脊會於脊之長強穴選出於前

其直行者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨... 諸穴貫肝上循幽門上膈膈步廊入肺中循神封靈墟

神藏或中命府而上循喉嚨並人迎挾舌本而終也... 其支者從肺出絡心注胸中

兩乳間為胸支者自神藏別出繞心注胸之膺中以交... 於手厥陰也

○此經多血少氣○酉時氣血注此○受足太陽之交... ○凡二十七穴左右共五十四穴○刺深二分留二呼

湧泉○足心陷中屈足捲指宛宛中宛取之足少陰... 脉所出為井木實則滿之○銅人鍼五分無令出血灸

三壯明堂灸不及鍼素註刺三分留三呼○主尸厥面... 黑如灰色敷吐有血喝而喘坐欲起目眦無所見善

恐惕惕如人將捕之舌乾咽腫上氣嗌乾煩心心痛黃... 腫腸游股內後廉痛痠厥者吐善悲欠小腹急痛泄而

重足腰重而逆腰痛大便難心中結熱風疹風瀉心... 病飢不嗜食咳嗽身熱喉閉舌急失音卒心痛狹痺胸

脇滿悶頸痛目眩五指端盡痛足不踐地足下熱男子... 如蠶女子如蠶婦人無子轉胞不得尿○千金翼云主

喜喘脊脇相引忽忽善忘陰痺腹脹腰痛不欲食喘逆... 足下清至膝咽中痛不可納食痞不能言小便不利小

腹痛風入腸中癩病火瘡痛急不止五疳熱病先腰... 痠其兩數引飲身項痛而寒且按足熱不欲言頭痛癩

癩然少氣寒厥霍亂轉筋積黃豚○漢濟北三阿母... 病患執發足熱淳于意刺足心立愈

然谷○足內踝前起太谿下陷中一云內踝前在下... 一寸別於太谿踠脉之斜足少陰脉所流為榮火○銅

人灸三壯鍼三分留三呼不宜見血令人立飢欲食刺足下布絡中脉血不出為腫○主咽內腫不能內唾時不能出唾心恐懼如人將捕涎出喘呼少氣足對腫不待腹地寒疝小腹脹上拾胸脇欬唾血喉痺淋瀝白濁溺癢不能久立足一寒一熱舌縱煩滿消渴自汗盜汗出痿厥河泄心痛如錐刺墮惡血留內腹中男子精泄婦人無子陰挺出月事不調陰瘰初生小兒臍風口

大谿一名足內踝後跟骨上動脉陷中男子婦人病有此脉則生無則死少陰腎脉所注為命土○素註鍼三分留七呼灸三壯○主久瘧嗽逆心痛如錐刺心脉流手足寒至節痛嘔吐痰實口中如膠舌暗寒而熱病

汗不出默默嗜卧溺黃消痺大便難咽腫唾血疰瘕寒熱咳嗽不嗜食腹脇痛瘦脊傷寒手足厥冷○東垣曰歲痿者以道濕熱引胃氣出行陽道不令濕土尅腎水其穴在大谿

大鍾○足跟後踵中大骨上兩筋間足少陰絡別走太陽○銅人灸三壯鍼二分留七呼素註留三呼○主嘔吐胸脹喘息腹滿便難腰脊痛少氣淋瀝洒浙腹脊強嗜卧口中熱多寒欲閉戶而處少氣不足舌乾咽中食噎不得下善驚恐不樂喉中鳴欬唾氣逆煩悶○實則閉癰瀉之虛則腰痛補之
照海○足內踝下陰驕脉所主○素註鍼四分留六呼灸三壯○銅人鍼二分灸七壯明堂灸三壯○主咽乾心

悲不樂四肢懈惰久瘧卒疝 吐嗜肝大風默默不知所痛視如見星小腹痛婦女經逆四肢淫樂陰暴跳起或痿流清汁小腹偏痛淋陰莖挺出月水不調○潔古曰癰病夜發灸陰驕照海穴也
水泉○大谿下一寸內踝下少陰部○銅人灸五壯鍼四分○主目眈眈不能遠視女子月事不來來即心下多悶痛陰挺出小便淋瀝腹中痛

復溜一名昌陽足內踝上二寸筋骨陷中前旁骨是復溜後旁筋是交信二穴止隔一條筋足少陰脉所行為經金腎虛補之○素註鍼三分留七呼灸五壯明堂七壯○主腸澀腰脊內引痛不得俛仰起坐目視眈眈善怒舌乾胃熱垂動挺出足痿不收履筋寒不自溫腹

中雷鳴腹脹如鼓四肢腫十種水病青赤黃白黑青取膏赤取榮黃取俞白取經黑取合血痔泄後腫五淋血淋小便如散大骨寒熱盜汗汗注不止鶴齒脉微細不見或時無脉

交信○足內踝骨上二寸少陰前太陰後蕙筋骨間陰驕之部○銅人鍼四分留十呼灸三壯素註留五呼○主氣淋瘡疔陰急陰汗瀉痢赤白氣熱癰股樞髀內痛大小便難淋女子漏血不止陰挺出月水不來小腹偏痛四肢淫樂盜汗出
築賓○內踝上五寸腓分中陰維之部○銅人鍼四分留一五呼灸三壯素註刺三分灸五壯○主癩疔胎疔癩疾狂易妄言怒罵吐舌嘔吐涎沫足膈痛

陰谷○膝下內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝乃

得之足少陰脉所入為合水○銅人鍼四分灸三壯○

主膝痛如錐不得屈伸縱涎下煩逆溺難小便急引陰

痛陰痿股內蕪痛婦人漏下不止腹脹滿不得息小便

黃男子如蠱女子少娘

橫骨○大赫下一寸盲俞下五寸陰上橫骨中宛曲如仰

月中央去腹中行各一寸半素註去中行一寸足少陰

衝脉之會○銅人灸三壯素註鍼一寸灸五壯○主淋

小便不通陰器下縱引痛小腹滿目赤痛從內皆始五

藏虛竭失精

大赫一名陰維氣穴下一寸去腹中行灸一寸半素註一

寸足少陰衝脉之會○銅人灸五壯鍼三分素註鍼一

十灸三壯○主虛勞失精陰痿精溢陰上縮莖中痛目

赤痛從內皆始婦人赤沃

氣穴一名地門四滿下一寸去腹中行兩旁各一寸半足

少陰衝脉之會○銅人灸五壯鍼三分素註鍼一寸灸

五壯○主賁脉氣上下引脊痛洩利不止目赤痛從內

皆始婦人月事不調

四滿一名中注下一寸氣穴上一寸去腹中行各一寸半

足少陰脉衝脉之會○銅人鍼三分灸三壯○主積聚

疝瘕腸辟大腸有水臍下切痛振寒目內皆赤痛婦人

月水不調惡血疔痛奔豚上下無子

中注○盲俞下一寸去腹中行各一寸半足少陰衝脉之

會○銅人鍼一分灸五壯○主小腹有熱大便堅燥不

利泄氣上下引腰脊常身內皆痛女子月事不調

盲俞○商曲下一寸去腹中五分素註一寸足少陰衝脉

之會○銅人鍼一寸灸五壯○主腹切痛寒疝大便燥

腹滿響響然不便心下有寒目赤痛從內皆始

按諸家俱以疝主於腎故足少陰經宛穴多兼治疝

冊發以疝本肝經與腎絕無相干足以正千古之訛

商曲○石關下一寸出腹中行各五分素註一寸足少陰

衝脉之會○銅人鍼一寸灸五壯○主腹痛腹中積聚

時切痛腸中痛不嗜食目赤痛從內皆始

石關○陰都下一寸去腹中行各五分素註一寸足少陰

衝脉之會○銅人鍼一寸灸三壯○主噦噫嘔逆腹痛

麻小便黃大便不通心下堅滿脊強不利多唾目赤

痛從內皆始婦人子藏有惡血血上衝腹痛不可忍

都食訖通谷下一寸夾胃脘兩邊相去五分素註一寸

足少陰衝脉之會○銅人鍼三分灸三壯○主心滿逆

氣腸鳴肺脹氣搶蹠下熱痛目赤痛從內皆始

通谷○幽門下一寸夾上脘兩旁相去五分素註一寸十

四經發揮云自商曲至通谷去腹中行各五分素註自

盲俞至幽門去中行各一寸足少陰衝脉之會○銅人

鍼五分灸五壯明堂灸三壯○主失欠口喎食飲善嘔

暴瘡不能言結積留飲痰癰胸滿食不化心恍惚喜嘔

目赤痛從內皆始

幽門○夾巨關兩旁各五分陷中明堂云巨關旁一十五

分千金云夾巨關一寸按幽門當在足陽明經脈

○銅人鍼一寸灸五壯○主小腹脹滿嘔吐涎沫喜唾

煩悶胸膈胸中滿不嗜食逆氣欬捷忘洩利膿血目赤

痛從內皆始女子心腹逆氣

步廊○神封下一寸六分陷中去胸中行二寸仰而取之

○素註鍼四分銅人鍼三分灸五壯○主胸脇支滿痛

引胸鼻塞不通不得息呼吸少氣欬逆嘔吐不嗜食不

得舉臂

神封○靈墟下一寸六分陷中胸中行名開二寸○素註

鍼四分銅人鍼三分灸五壯○主胸脇支滿痛引胸不

得息咳逆嘔吐胸滿不嗜食

靈○神蔽下一寸六分陷中去中行各開一寸○素註

鍼四分銅人鍼三分灸五壯○主胸脇支滿痛引胸不

得息欬逆嘔吐胸滿不嗜食

或中○俞府下一寸六分去胸中行二寸○銅人灸

人鍼四分灸五壯明堂灸三壯○主欬逆喘急不能食

胸脇支滿涎出多唾

俞府○巨骨下旋機旁二寸陷中仰而取之○素註刺四

分銅人鍼三分灸五壯下經灸三壯○主欬逆上氣喘

吐喘嗽腹脹不下食飲胸中痛

按錢氏於腎有補無瀉故於藥亦止制補腎地黃也

而無瀉腎藥也

手厥陰心包絡經



心包絡之經

心包絡在心下橫膜之上豎膜之下與橫膜相粘而黃脂裹者心也其脂膜之外有細筋膜如絲與心肺相連者心包也

滑氏云手厥陰心主又曰心包何也曰君火以名相火以位手厥陰代君火行事以用而言故曰手厥陰心主以經而言曰心包絡一經而二名實相火也

手厥陰經穴

手厥陰之脈起於胸中出屬心包下再歷絡三焦

手厥陰受足少陰之交起於胸中出屬心包由是下兩

歷絡於三焦之上腕中腕及臍下一寸下焦之分也

其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋腋下循肱內行大陰

少陰之間入肘中

膈上際為腋自屬心包上俯胸出脇下腋三寸天池穴上行抵腋下下俯膈內之天泉穴以介乎太陰少陰兩經之中間入肘中之曲澤也

下循行兩筋之間入掌中循中指出其端由肘中下臂行臂兩筋之間循郄門間使內關大陵入掌中勞宮穴循中指出其端之中衝云

其支別者從掌中循小指次指出其端小指次指出其端也自小指而逆數之則為次指出其支別者自掌中勞宮穴別行循小指次指出其端而交

右手少陽經多血少氣○戌時氣血注此○受足少陰之交○九九穴左右共一十八穴

天池天會腋下一寸乳後一寸着脇直腋腋間手足厥陰少陽之會○銅人灸三壯鍼二分甲乙鍼七分○主胸中有聲胸膈煩滿熱病汗不出頭痛四肢不舉腋下腫上氣寒熱痰瘕

天泉天濕曲腋下二寸舉臂取之○銅人鍼六分灸三壯○主目眩視不明惡風寒心病胸脇支滿欬逆膈背脾碎內廉痛

曲澤○肘內廉下陷中屈肘得之心包絡脉所入為合水○銅人灸三壯鍼三分留七呼○主心痛善驚身熱煩渴口乾逆氣嘔涎血心下澹澹身熱風腫臂肘手腕善

搖動搖頭清汗出不過肩傷寒逆氣嘔吐

郄門○掌後去腕五寸手厥陰心包絡脉所入○銅人鍼三分灸五壯○主嘔血衄血心痛嘔噦驚恐畏人神氣不足

間使○掌後三寸兩筋間陷中心包絡脉所行為經金○素註鍼六分留七呼銅人鍼三分灸五壯明堂七壯甲乙三壯○主傷寒結胸心懸如肌卒狂胸中澹澹惡風

寒嘔沫怵惕寒中少氣掌中熱腋腫肘擊卒心痛多驚中風氣塞涎上昏危瘖不得語咽中如梗鬼邪霍亂乾嘔婦人月水不調血結成塊少兒客忤

內關○掌後腕二寸兩筋間與外關相抵手心主之絡別走少陽○銅人鍼五分灸三壯○主手中風熱失志心痛目赤支滿肘擊○實則心暴痛瀉之虛則頭強補之

大陵○掌後骨下兩筋間陷中手厥陰心包絡脉所注為俞土心包絡實瀉之○銅人鍼五分素註鍼六分留七呼灸三壯○主熱病汗不出手心熱肘臂痛腋腫善笑不休煩心心懸若飢心痛掌熱喜悲泣驚恐目赤目


黃小便便如血嘔噦無度狂言不樂喉痺口乾身熱頭痛短氣胸脇痛癆瘵疥癬○東垣曰胃氣下溜五歲氣亂

在左手者取之心主之俞大陵同精導氣以復其本位勞宮一名五里○掌中夾動脉銅人無名指取之資生

屈中指取之滑氏云以今觀之屈中指無名指兩者之間取之為心包絡脉所溜為榮火○素註鍼三分留六呼銅人灸三壯明堂鍼二分得氣即瀉只一度鍼過

兩度令人虛禁灸灸令人息肉日加○主中風善悲笑

不休手痺熱病數日汗不出休傷脇痛不可轉側大小
便血衄血不止氣逆嘔噦煩渴飲食不下大小人口中
腥臭口瘡胸脇支滿黃疸目黃小兒銀爛
中衝○手中指端去爪甲角如非葉陷中心包絡脉所出
為井木心包絡虛補之○銅人鍼一分留三呼明堂灸
一壯○主熱病煩悶汗不出掌中熱身如火心痛煩滿
舌強



少陽三焦經

經

由

三焦

三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦者在心下下鬲
胃上口空內而不出其治在膻中玉堂下一寸兩乳間
膈者中丹也中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水穀其
治在臍旁下焦者當膀胱上口主分別清濁主內而出以
傳道其治在臍下一寸故名三焦
三焦者決瀆之官水道出焉

滑氏曰三焦相火也火能火熟水穀萬物焦從火火亦
腐物之氣命名取義或有在於此繳三焦有名無形又
曰三焦者於兩膜脂膏之內五藏五府之隙水穀流化
之關其氣融會於其間薰蒸兩膜發達皮膚分肉運行
四旁上中下各隨其所屬部分而名之實元氣之別使

也是故雖無其形倚內外之形而得名雖無其實合內
外之實而為位者也

三因方云古人謂左為腎藏其府膀胱右為命門其府
三焦三焦者有脂膜如手大正與膀胱相對有二白脉
自中出夾脊而上貫於腦所以經云男子藏精女子繫
胞以此推之三焦當如此說有形可見為是扁鵲乃云
三焦有位無形而叔和替失其旨意遽云無狀有名伴
後學承謬不已且名以召質無實奚名果無其形尚何
藏精繫胞為哉其所謂三焦者何也上焦在膻中內應
心中焦在中脘內應臍下焦在臍下即腎間動氣分布
人身上中下之異方人湛寂欲想不與則精氣散在二
焦榮華百脉及其想念一起慾火熾然翕撮三焦精氣

流溢並于命門輪瀉而去故號此府為二焦耳世承叔和之弊而不悟可為長太息也初甚異其說及為齊從事以... 有一舉子徐適者石守道之婿也少嘗... 齊病有精思曰齊嘗大飢野丐相繼而食有一人皮... 凶盡而骨脉全者視其五藏見右腎之下有脂膜如手... 大者正與膀胱相對有二白脉自其中出夾脊而上貫... 腦意此則導引家所謂夾脊雙闕者而不悟脂膜如手... 大者之為三焦也所見默合可以證古人之謬

舟溪朱氏曰三焦以焦而下焦司肝腎之分皆陰而土乎下者也天非此火不能以生物人非此火不能以有生

手少陽三焦經穴

手少陽之脉起於小指次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘

臂骨盡處為肘膈盡處為肘手少陽起小指次指之端闕中穴上出次指之間歷夜間中諸循手表腕之陽池出臂外兩骨之間循外關支溝會宗三陽四瀆乃上貫肘抵天井穴也

循膈外上肩交出足少陽之後入缺盆交膈中散絡心包下膈循屬三焦

有肘之間膈下對腋處為膈從天井上行循臂膈之外歷清冷淵消燦行太陽之裏陽明之外上肩循臂膈會肩膠天膠交出足少陽之後過秉風有井下入缺盆後由足陽明之外而交合於膈中散布絡於心包乃下

膈當胃上口以屬上焦於中腕以屬中焦於陰交以屬下焦也

其支者從膈中上出缺盆上項繫耳後直上出耳上角以歷下頰至頰

腦戶後為項目下為頰其支者從膈中而上出缺盆之外上項過大椎循天牖上耳後經翳風瘰脉頰息直上出耳上角至角孫過懸壺頰厭及過陽白精明屈曲耳頰至頰會頰膠之分也

其支者從耳後入耳中至目銳眦此支從耳後翳風穴入耳中過聽宮歷耳門禾膠却出至目銳眦會瞳子膠循絲竹空而交於足少陽也

○此經多血少氣○亥時氣血注此○受手厥陰之交

○凡二十三穴左右共四十六穴

衝○手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽三焦脉所出為井金○銅人鍼一分留三呼灸一壯素註三壯○主喉痺喉閉舌捲口乾頭痛霍亂胸中氣噎不嗜食臂肘痛不可舉目生翳膜視物不明

液門○手小指次指間陷中握拳取之手少陽三焦脉所留為榮水○素問銅人鍼二分留二呼灸三壯○主驚悸妄言咽外腫寒厥手足臂痛不能自上下痰癢寒熱目赤流頭痛暴得耳聾齒齦痛

中渚○手小指次指本節後間陷中在液門下一寸手少陽三焦脉所注為俞木○三焦虛補之○素註鍼二分留三呼銅人灸三分在鍼三分明堂灸一壯○主熱病汗

留三呼銅人灸三分在鍼三分明堂灸一壯○主熱病汗

不出日眩頭痛耳聾口吐黏膜久瘡咽腫肘臂痛手五指不得屈伸

陽池一名手表腕上陷中從指本節直摸下至腕中心手

少陽三焦脈所過為原三焦虛實皆按之○素註鍼二

分留六呼灸三壯銅人禁灸指微賦云鍼透抵少陵穴

不可破皮不可揉手恐傷鍼轉曲○主消渴口乾煩悶

寒熱瘧或因折傷手腕捉物不得肩臂痛不得舉

外關○腕後二寸兩筋間陽池上一寸手少陽絡別走心

主○銅人鍼三分留七呼灸二壯明堂三壯○主耳聾

渾渾痺痺無聞五指盡痛不能握物○實則肘擊瀉之

虛則不收補之

支脈一名腕後臂外三寸兩骨間陷中五少陽脈所行

為經火○銅人鍼三分灸二七壯明堂五壯素註鍼二

分留七呼灸三壯○主熱病汗不出肩臂痠重脇腋痛

四肢不舉霍亂嘔吐口噤不開暴瘡不結言心悶不已

卒心痛鬼擊傷寒結胸痲瘡疥癬婦人妊脈不通產後

血運不省人事

會宗○腕後三寸空中一寸○銅人灸七壯明堂五壯禁

鍼○主五癰肌膚痛耳聾

三陽絡通臂上大交脈支溝上一寸○銅人灸七壯明

堂五壯禁鍼○主暴瘡瘰癧耳聾嗜卧四肢不欲動搖○

四瀆○在肘前五寸外廉陷中○銅人灸三壯鍼六分留

七呼○主暴氣耳聾下齒齲痛

天井○肘外大骨後肘上一寸○兩筋又骨解中屈

肘扶腕狀之說推云曲肘一吋又手按腕頭取之兩

筋骨筋中手少陽三焦脈所入為合土三焦實瀉之○

素註鍼一寸留七呼銅人灸三壯明堂五壯鍼三分○

主心胸痛咳嗽上氣短氣不得語唾膿不嗜食寒熱凄

凄不得卧驚悸痰癆癩疾羊癰風痺耳聾噤腫喉痺汗

出目銳皆痛癩腫痛耳後臑臂肘痛捉物不得嗜臥撲

傷腰腕疼振寒顛項痛大風默默不知所痛悲傷不樂

脚氣上攻

清冷淵○肘上二寸伸肘寒臂取之○銅人鍼三分灸三

壯○主有痺痛臂臑不能舉不能帶衣

清瀆○有下臂外間脈斜肘分下○銅人鍼一分灸三壯

明堂鍼六分素註鍼五分○主風痺頭項強急腫痛寒

熱頭痛癩疾

臑會一名有前廉去有頭三寸宛中手少陽陽維之會

○素註鍼五分灸五壯銅人鍼七分留三呼得氣即瀉

灸七壯○臂瘰癧無力痛不能舉寒熱有腫引胛中痛

一項瘰癧氣痛

肩髃○有端臑上陷十針舉臂取之○銅人鍼七分灸三

壯○主頸堂五壯○主臂痛有重不能舉

天髃○有缺盆中上臑骨際陷中央須缺盆陷處上有空

一三三三空陷上突起肉上鍼之若以鍼陷處傷人五藏

一三三三平死○主胸中煩悶肩臂痠疼缺盆中痛汗不

一三三三煩滿頭項急寒熱

天牖○頸大筋外缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上

○銅人鍼一寸留七呼不宜補不宜灸灸即令人面腫

眼合先取謄謄後取天容天池即差若不鍼謄謄即難

療明堂鍼五分得氣即瀉瀉盡更留三呼瀉三吸不宜

補素註下經灸三壯資生云宜灸一壯三壯○主暴聾

氣目不明耳不聰夜夢顛到面青黃無顏色頭風面腫

項強不斜面顛目中痛

翳風○耳後尖角陷中按之引耳中痛鍼經先以銅錢二

十文令患人咬之尋取穴中手足少陽之會○素註鍼

三分銅人鍼七分灸七壯明堂三壯刺灸俱令人咬錢

令口開○主耳鳴耳聾口眼喎斜脫頰頰腫口噤不開

不能言口吃牙疳急小兒喜灸

癩瘡一名耳本後鵝足青絡脉○銅人刺出血如豆汁不

宜多出鍼一分灸三壯○主頭風耳鳴小兒驚癩瘡痰

嘔吐泄利無時驚恐移睛目睛不明

顯息○耳後間青絡脉中○銅人灸七壯禁鍼明堂灸三

壯鍼一分不得多出血多出血殺人○主耳鳴痛喘息

小兒嘔吐涎沫瘰癧癰胸脇相引身熱頭痛不得卧

角孫○耳郭中間上髮際下開口有空手太陽手足少陽

之會○銅人灸三壯明堂鍼八分○主目生翳膚齒齬

腫唇吻強齒牙不能嚙物齬齒頭項強

耳門○耳前起肉當耳缺中陷中○銅人鍼三分留三呼

灸三壯下經禁灸有妨灸不過三壯○主耳鳴如蟬聲

聾耳漿汁出耳生瘡癬疥瘡多強

和膠○耳前髮際下橫動脈手足少陽手太陽三脉之會

○銅人鍼七分灸三壯○主頭重痛牙車引急頸腫

耳中嘈嘈鼻涕面風寒鼻準上腫癰痛招搖視瞻癢癢

口噤

絲竹空一名眉後陷中手足少陽脉氣所發○素註鍼三

分留六呼銅人禁灸灸之不幸使人目小及盲鍼三分


留三呼宜瀉不宜補○主目眩頭痛目赤視物眩暈不

明惡風寒風癩目戴上不識人眼睫倒毛發狂吐涎沫

發即無時偏正頭疼



足少陽膽經



膽者中正之官喜樂出焉
膽為清淨之府
諸府皆傳氣獨膽無所傳道故曰清淨膽汁減則目昏又吐傷膽則視物倒植

膽為青筋

足少陽膽經穴

足少陽之脉起於目銳眥上抵角下耳後

足少陽經起目銳眥之瞳子膠於是循聽會客主人上抵頭角循頰脈下懸顴懸髮由懸髮外循耳上髮際至曲髻率谷由率谷外折下耳後循天衝浮白竅陰完骨又自完骨外折循本神迎風至正陽白會精明復從

精明上行循頰泣目窻正營承營膠二風池云

此經頭部自瞳子膠至風池九二穴作三折向外而行始瞳子膠至完骨是一折又自完骨外折上至陽白會精明是一折又自精明上循臨泣風池是一折緣其穴曲折外多難為科率以收此作一至二十次第該之一瞳子膠二聽會三客主人四頰厭五懸顛六懸釐七曲髻八率谷九天冲十浮白十一竅陰十二完骨十三本神十四陽白十五臨泣十六目窻十七丘營十八承靈十九腦戶二十風池

循頰行手少陽之前至肩却交出少陽之後入缺盆自風池循頰過天窻穴行手少陽之前下至肩循肩井却左右交出少陽之後過八椎大杼乘風當秉

風前入缺盆之外

其支者從耳後入耳中走耳前至目

其支者從耳後顛顛開過鬚風之分入耳中過聽宮出走耳前復自聽宮至目銳眥瞳子膠之分也

竅廣韻作力鞠切深空之貌即穴際之謂也江西席

橫家鍼灸書中諸竅字作膠字一窻聲相近而然今

悉改定雖然所改有不盡者不必苦求之也

其支者別目銳眥下大迎合于手少陽抵於頰下加頰車

下頰合缺盆以下胸中貫膈絡脾兩膈

其支者別目外瞳子膠而下大迎合手少陽於頰當

顛膠之分下臨頰車下頸循木經之前與前入缺盆

者相合下胸中天地之外黃脈即期門之所絡肝下至

日月之分爲肝膽也

筋脈出氣衝繞毛際橫入髀中

筋脈也腋之下爲筋曲骨之分爲毛際毛際兩旁動脈中

爲氣衝捷骨之下爲髀厭即髀也自屬膽處循筋內

章門之裏出氣衝繞毛際遂橫入髀厭中之環跳也

其直者從缺盆下腋循胸過季脇一合髀厭中以下循解

陽出膝外廉

脇骨之下爲季脇此直者從缺盆直下腋循胸歷淵液

輒筋日月穴過季脇從京門帶脈五經維道居髀入上

膠中膠長過而下與前之八髀厭者相合乃下循髀外

行太陽陽明之間歷中膺陽關出腋外廉抵陽陵泉也

下補骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足附

上小指次指之間

筋外爲輔骨外踝以上爲絕骨足下爲跗自陽陵泉下

外輔骨前歷陽交外丘光明直下以絕骨之端循陽輔

懸鐘而下出外踝之前至丘墟循足高之臨泣五會俠

谿乃上入小指次指之間至竅陰而終也

其支者別附入大指之間循大指岐骨內出其端還貫

入爪甲出一毛

足大指本節後爲岐骨大指爪甲後爲三毛其支者自

足附足臨泣穴別行入大指循岐骨內出大指端還貫

入爪甲出三毛交於足厥陰也

○是經多氣少血○子恃氣血注此○受手少陽之交

○四十三穴左右共八十六穴○初深則分留五呼

之會○素註灸三壯鍼三分○主目痒翳膜白青盲無

是遠視視晚赤痛淚出多眵膜內皆痒而痛閉

○銅入鍼七分留三呼得氣即瀉不瀉補日灸五壯止

三七十日後依前報灸明堂鍼三分灸三壯○主耳鳴

耳聾牙車口脫相離二寸牙車急不得嚼物齒痛惡寒

物齒痛惡寒狂走瘈瘲恍惚不樂中風口喎斜手足不

隨

客主人上臨耳前起骨上廉開口有空張口取之乃得手

足少陽陽明之會○銅入灸七壯禁鍼明堂鍼一分留

之得氣即瀉日灸七壯至二百下經灸一壯素註刺三

七呼灸三壯素問禁深刺深則交脈破爲內漏耳

聾又欠而不得坎○主唇吻強上口眼偏邪青盲眇目

眇眇惡風寒牙齦齩口喎嚼物鳴痛耳鳴耳聾瘈瘲沫

出寒熱瘧引骨痛

頰厭○曲周下頰顙上廉手足少陽陽明之交會○銅入

灸三壯鍼七分留七呼深刺令人耳聾○主偏頭痛頭

風目眩驚癇手拳手腕痛耳鳴目無見目外眦急好嚏

頸痛歷節風汗出

懸顙○曲角下顙顙上廉手足少陽陽明三脈之會○銅

入灸三壯鍼三分留三呼明堂鍼二分素註鍼七分留

七呼刺深令人耳無所聞○主頭痛牙齦痛面膚赤腫

熱病煩滿汗不出頭偏痛引目外眦赤身熱鼻洞濁下

不止傳...

懸壺○曲角上顛顛下廉手足少陽陽明四脉之會○銅

人鍼三分灸三壯素註鍼三分留七呼○主面皮赤腫

頭偏痛煩心不欲食中焦客熱熱汗不出目銳皆赤

痛

曲角一髮○在耳上髮際曲陷陷中鼓頰有空足太陽少

陽之會○銅人鍼三分灸七壯明下灸三壯○主頰頰

腫引牙車不得開急痛口噤不能言頸項不得顧腦兩

角痛為驚風引目眇

率谷○耳上入髮際一寸半陷者死死中嚼而取之足太陽

少陽之會○銅人灸三壯鍼三分○主疾氣痛腦兩

角強痛頭重醉後消風皮膚腫胃寒煩悶嘔吐

○銅人灸七壯素註三壯鍼三分○主癩疾風痺

腫驚恐頭痛

浮白○耳後入髮際一寸足太陽少陽之會○銅人鍼二

分灸七壯明堂灸三壯鍼三分○主足不能行耳聾耳

鳴齒痛胸滿不得息胸痛頸項癭癭腫不能言肩不

舉發寒熱喉痺效逆痰沫耳鳴嘈嘈無所聞

竅除一名完骨上完骨下動搖有空足太陽手足少陽之

會陳氏云髓會絕骨髓屬腎主骨於足少陽無所開

為髓海腦有枕骨穴則當會枕骨絕骨誤也髓病治

按竅除正足少陽經不知陳氏何以云此豈素問云

骨二穴者指督脈後頂腦戶而王註誤之歟○銅人

七壯甲乙灸五壯鍼四分不註鍼三分灸三壯○主四
肢轉筋目痛頭項頰痛引耳嘈嘈耳鳴無所聞舌本出
血骨勞癱疽發厲手足煩熱汗不出舌強脇痛效逆喉
痺口中惡苦之

完骨○耳後入髮際四分足太陽少陽之會○銅人鍼三

分灸七壯素註留七呼灸三壯明堂鍼二分灸依年為

壯○主足痿失履不收牙車急頰腫頭面腫頸項痛頭

風耳後痛煩心小便赤黃喉痺齒齲口眼喎斜癩疾

本神○曲差旁一寸五分直耳上入髮際四分陽維脉所

止○銅人鍼三分灸七壯○主驚癇吐涎沫頸項強急

痛目眩胸相引不得轉側癩疾嘔吐涎沫偏風

○素註鍼三分銅人鍼二分灸三壯○主瞳子癢痛目

上視遠視眵眵昏夜無見目痛目眇背膝寒慄重衣不

得溫

臨泣○目上直入髮際五分陷中令患人正睛取穴足太

陽少陽陽維之會○主目眩目生白翳目淚枕骨合顛

痛惡寒鼻塞驚癇反視大風目外皆痛卒中風不識人

目窓○臨泣後一寸足少陽陽維之會○銅人鍼三分灸

五壯三度刺令人目大明○主目赤痛忽頭旋目眵眵

遠視不明頭面浮腫頭痛寒熱汗不出惡寒

正營○目窓後一寸足少陽陽維之會○銅人灸五壯鍼

三分○主目眩頭項偏痛牙齲痛唇吻急強齒齲

承靈○正營後一寸五分足少陽陽維之會○主腦

痛惡風寒熱解鼻窒喘息不利

腦空顛顛承靈後一十五分夾玉枕骨下陷中足少陽

維之會○素註鍼四分銅人鍼五分得氣即瀉灸三壯

○主勞疾羸瘦體執頸項強不得回顧頭重痛不可忍

目瞑心悸發即為癩風引目眇鼻痛○曹操患頭風發

即心亂目眩華佗鍼腦空立愈

按三國志曹操患頭風久不愈後陳琳草檄操見之

喜頓愈蓋喜則氣舒故頭風解也今醫家所載不同

豈佗愈後復發而然歟

風池○耳後顛顛後腦空下髮際陷中按之引於手中手

足少陽陽維之會○素註鍼四分甲乙鍼三分銅人鍼

七分留三呼灸三壯甲乙鍼一十二分患大風者先補

後瀉少可患者以經取之留五呼瀉七呼灸不及鍼日

七壯至百壯○主西浙寒熱傷寒濕病汗不出目眩苦

偏正頭痛瘡癩頭項如拔痛不得回顧目淚出欠氣多

鼻軌劔目內眦赤痛氣熱耳塞目不明腰背俱疼腰

偃僕引頸筋無力不收大風中風氣寒涎上不語昏危

瘰癧氣○東垣曰少陽頭痛風寒傷上邪從外入令人振

寒頭痛身痛惡寒治在風池風府○平安公患偏風甄

權鍼風池有髑曲池支溝五樞陽陵泉巨虛下廉即差

○仲景曰太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池

風府却與桂枝湯則愈

肩井一名○肩上陷中缺盆上大骨前一寸半以三指按

取當中指下陷中手足少陽足陽明陽維之會連入

五藏○甲乙灸五壯素註鍼五分若刺深令人悶倒

如悶倒連按三里下氣補之須臾甦九鍼肩井須補三

里否則步後卒中之患明堂鍼四分先補後瀉不宜灸

婦人墮胎微損手足弱者鍼肩井七壯日灸七壯止二

百壯素註三壯○王中風氣塞涎上不語腎虛腰痛九

漏上氣短氣逆氣風勞百病撲傷腰髖疼頭項痛五勞

七傷頸項不得回顧臂轉痛悶兩手不得向頭婦人產

難墮胎後手足厥逆

淵液一名液下三寸宛宛中舉臂得之○銅人禁灸灸之

令人生腫蝕馬瘍內潰者死明堂鍼三分○主寒熱馬

癆

陽二寸五分上直兩乳側臥屈上足取之膽之募足太

陽少陽之會○銅人灸五壯鍼五分素註七分○主太

息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四肢不收嘔吐宿

汁吞酸

京門一名氣府○監骨下腰中季脇本夾脊脊之募○銅

人灸三壯鍼三分留七呼○主腸鳴小腸痛肩背寒瘕

有即內廉腰痛不得俛仰久立

帶脈○季脇下一寸八分陷中足少陽帶脈二脈之會○

知人鍼六分灸五壯明堂灸七壯○主腰腹縱溶溶如

囊水之狀婦人小腹脹急後重崩漏月事不調赤白

帶下

五樞○帶脈下三寸水道旁一寸半陷中足少陽帶脈二

經之會○銅人鍼一寸灸五壯明下三壯○主痿痺小腸膀胱腎餘小腹痛陰疝兩舉丸上入腹婦人赤白帶下東急瘕瘕

維道○章門下五寸三分足少陽帶脉二經之會○銅人鍼八分留六呼灸三壯○主嘔逆不止水腫三焦不調不嗜食

居膠○章門下八寸三分監骨上陷中素註章門下四寸三分足少陽陽維之會○銅人鍼八分留六呼灸三壯○主腰引小腹痛肩引胸臂舉急手臂不得舉以至有環跳○髀樞中側卧伸下足屈上足以右手摸穴左搖撼取之足少陽太陽之會○銅人灸五十壯素註三壯鍼一寸留二呼灸三壯指微云已刺不可搖恐傷鍼○主

冷風濕痺不仁風疹遍身半身不遂腰膝痛寒熱不得轉側伸縮○仁壽宮患脚氣偏風甄權奉勅鍼環跳陽陵泉陽輔巨虛下廉而能起行○環跳穴痛恐生附骨疽

中瀆○髀外膝上五寸分肉間陷中足少陽絡別走厥陰○銅人灸五壯鍼五分留七呼○主寒氣客於分肉間攻痛上下筋痺不仁

陽關陽陵泉上三十特鼻外陷中○銅人鍼五分禁灸○主風痺不仁膝痛不可屈伸

陽陵泉○膝下一寸肘外廉陷中蹲坐取之膽脉所入為合土○難經曰筋會陽陵泉疏曰筋病治此○銅人鍼六分留十呼得氣即瀉又重入留鍼灸七壯至七七壯

素註三壯明下一壯○主膝伸不得屈髀樞膝骨冷脚氣膝股內外廉不仁偏風半身不遂脚冷無血色苦隘中介然頭面腫足筋攣

陽交一名別陽○足外踝上七寸斜屬二陽分肉之間陽維之郛○銅人鍼六分留七呼灸三壯○主胸滿腫膝痛足不收寒厥驚狂喉痺面腫

外丘○外踝上七寸○銅人鍼一分灸三壯○主胸脹滿膚痛癢痺頸項痛惡風寒樹大傷毒不出發寒熱癩疾小兒龜胸

光明○外踝上五寸足少陽之絡別走厥陰○銅人鍼六分留七呼灸五壯明下七壯○主淫瀝脛痠胫疼不能久立熱病汗不出卒狂○虛則痠痺坐不能起補之實

陽輔一名○足外踝上四寸輔骨前絕骨端三分去丘墟七寸足少陽膽脉所行為經火膽實瀉之○難經曰髓會絕骨疏云髓病治此經木義曰絕骨一名陽輔表氏曰足能健步以髓會絕骨也髓髓皆為腎故為髓會素註鍼三分又曰鍼七分留十呼銅人灸三壯鍼五分留七呼○主腰溶溶如坐水中膝下腫腫筋攣百節痠疼實無所知諸節盡痛痛無常處腋下腫痠喉痺馬刀按腰膝筋痠風痺不仁厥逆口苦太息心脇痛面塵

頭角頰痛目銳皆痛缺盆中腫痛汗出振寒瘡胸中脇肋解膝外至絕骨外踝前 痛善察面青


應鐘一名足外踝上三十動脉中鍼灸經尋摸大骨者又

應鐘一名足外踝上三十動脉中鍼灸經尋摸大骨者又


吳絕骨四分開足三陽之大絡按之陽明脈絕乃取之
 前尋摸絕骨間尖如前離三分高一寸許是陽輔穴後
 尋摸絕骨間尖筋骨縫中是懸鐘穴按之陽明脈止乃
 取之足三陽之大絡○銅人鍼六分留七呼灸三壯指
 微云斜入鍼二寸許灸七壯或三壯○主心腹脹滿胃
 中熱不嗜食脚氣膝膈筋骨攣痛足不收逆氣虛勞
 寒損憂恚心中欬逆泄注痰涎頸項強勝瘡血陰痿
 鼻衄腦疽大小便澀鼻中乾煩滿狂易中風手足不隨
 丘墟○足外踝下如前陷中骨縫中去臨泣三寸又夾谿
 穴中量上外踝骨前五寸足少陽脈所過為原膽虛實
 一皆按之○銅人灸三壯素註鍼五分留七呼○主胸脇
 滿痛不得息又瘧振寒腋下腫痿厥坐不能起解拒中
 痛目生翳膜腿膝痠轉筋卒疝小腹堅寒熱頸腫腰跨
 痠善太息
 臨泣○足小指次指本節後間陷中去夾谿一寸五分足
 少陽膽脈所注為俞木○甲乙鍼二分留五呼灸三壯
 ○主胸中滿缺盆中及腋下馬刀瘍痠善噦頰天滿中
 腫淫滲筋瘦目眩枕骨合顛痛兩新淚寒心痛周痺
 無常度厥逆氣喘不能行疔瘡目發婦人月事不利
 腸支滿乳癰
 地五會○足小指次指本節後陷中去夾谿一寸銅人鍼
 一分禁灸灸之令人羸瘦不出三年卒○主腋痛內疝
 唾血足外無膏澤乳癰
 夾谿○足小指次指岐骨間本節前陷中足少陽膽脈

溜為榮水膽實則滿之○素註鍼三分留三呼灸三壯
 ○主胸脇支滿寒熱傷寒熱病汗不出日外皆赤目眩
 頰腫耳聾胸中痛不可轉側痛無常處○東垣曰先
 師潔古病苦頭痛發時兩頰青黃眩暈目不欲開懶言
 身體沉重兀兀欲吐此厥陰太陰合病名曰風痰灸夾
 谿服局方玉壺丸愈
 竅陰○足小指次指之端去爪甲角如韭葉足少陽膽脈
 所出為井金○素註鍼一分留一呼甲乙留三呼灸三
 壯銅人灸三壯鍼二分○主脇痛欬逆不得息手足煩
 熱汗不出轉筋癰疽頭痛心煩喉痺舌強口乾肘不可
 舉卒聾不聞人語聲自痛小背痛○少陽根於致陰
 結於窓籠窓籠者耳中也又曰少陽為樞樞折即骨絲
 而不安于地故骨絲者取之少陽視有餘不足骨絲者
 節緩而不取也所謂絲者搔故也當窮其本也
 今按病筋癢而腫痺者當取竅陰窓籠但窓籠未有
 所考恐是太陽小腸聽官是蓋手足太陽少陽三脈
 之會否則聽會未可知俟當別考

肝藏



足厥陰肝經



肝重四斤四兩左三葉右四葉共七葉附看於脊之第九
推其治在左其氣在右在腎之前並胃

東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝其病發驚駭其
味酸其類草木其畜雞其穀麥其應四時上為歲星是以
知春氣在頭也其音角其數八是以知病之在筋也其臭
臊其聲呼其液泣其色青

東方生風風生木木生酸酸生肝肝主筋筋生心肝主目
其在天為玄在人為道在地為化化生五味道生知玄生
神神在天為風在地為木在體為筋在藏為肝在色為蒼
在音為角在聲為呼在變動為握在竅為目在味為酸在
為怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸
肝主筋之官次斷行馬

肝者竊糧之本魂之居也其華在爪其充在筋以生血氣
此為陽中之少陽通於春氣○肝之合筋也其榮在爪其
主筋也

肝氣通於目目和則知黑白矣知當
肝氣虛則夢見菌香生草得其特則夢伏樹下不敢起春

人則血歸於肝目受血而能視足受血而能步掌受血
而能握指受血而能攝○肝色青欲如倉壁之澤不欲如

藍藍肥木得水而浮肝得水而沉何也然肝者非為純
木也乙角也大言陰與陽小言夫與婦釋其微陽而吸其

微陰之氣其意樂金又行陰道多故令肝得水而沉其從

肝也肝熱而反浮者乙當歸甲極而反也

肝有兩葉何也然肝者東方木也春也萬物始生其尚幼小意無所親去太陰尚近冬離太陽不遠夏猶有兩葉亦

應本也

肝氣絕則筋縮引外與舌卷肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故筋不榮則筋縮急筋縮急則引外與舌故舌卷卵縮此筋死死庚日篤辛日死

足厥陰肝經穴

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝

一寸足大指甲後為三毛三毛後橫紋為聚毛去相去

也足厥陰起於大指聚毛之大敦穴循足跗上廉歷行

之間太衝抵內踝一寸之中封也

上踝八寸交出太陰之後上膈內廉

自中封上蹠過三陰交歷蠡溝中都復上一寸交出

陰之後上膈內廉至臍間曲泉

循股入陰中環陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽

解內為股臍下為小腹由曲泉上行循股內之陰

里陰廉遂當冲門府舍之分入陰毛中左右扣

陰器抵小腹而上會曲骨中極關元復循章門三

之所挾胃屬肝下日月之分絡於臍也

上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連日系上出頰與

督脉會於頰

目內深處為系頰頰也自期門上貫膈行食竇之

外大包之裏故布脇肋上雲門淵液之間入迎之外

喉龍之後上入頰頰行大迎地倉四白陽白之外連目

系上出頰行臨泣之裏與督脉相會於顛頂之百會也

其支者從日系下頰裏環唇內

前此連日系上出頰此支從日系下行任脉之外本經

之裏下頰裏交環於唇口之內

其支者復從肝別貫膈上注肺

此經之支從期門屬肝處別貫膈行食竇之外本經之

裏上注肺下行至中焦挾中脘之分以交於手太陰也

○是經多血少氣○凡時氣血注此○受足少陽之交

○凡一十三穴左右共二十六穴○刺深一分留二呼

大敦○足大指端去爪甲如韭葉及三毛中一云內側為

隱白外側為大敦足厥陰肝脉所出為井水○銅人鍼

二分留十呼灸三壯○主五疝卒疝七疝小便數遺不

禁陰頭中痛汗出陰上入小腹陰偏大腹臍中痛悒悒

不樂病左取石病右取左腹脹腫病小腹痛中熱喜寐

尸厥狀如死人婦人血崩不止陰挺出陰中痛

行間○足大指縫間動脈應手陷中足厥陰肝脉所流為

榮火肝實則瀉之○素註鍼三分銅人灸三壯鍼六分

留十呼○主嘔逆洞泄遺溺痿閉消渴嗜飲善怒四肢

滿轉筋胸脇痛小腹腫效逆嘔血莖中痛腰疼不可俛

仰腹中脹小腸氣肝心痛色蒼蒼如死狀終日不得息

癩疾短氣便溺難七疝寒疝中風肝積肥氣發瘕癭婦

人小腹腫而癭脫色經血過多不止崩中小兒急驚風

○東垣曰前除脈尖前除者足厥陰脉絡循除器出挺

末九臭心之所主入肝為臊於肝經瀉行間是治本後
在心經瀉少衝是治標

按難經謂肝臭臊心臭焦脾臭香肺臭腥腎臭腐五
藏各有臭而皆心主之故瀉行間為治本次瀉少衝
是治標試効方序中治腋臭亦同此法蓋腋下是極

泉穴心脉所發腋臭亦屬脾故治法與前陰臊臭不
殊藥用柴胡草龍膽車前子黃連以瀉心肝二經也
太衝○足大指本節後二寸或云一寸半內間動脉應手

陷中足厥陰肝脉所注為俞土○素問女子二七太衝
脉盛月事以時下故能育子又診病人太衝脉有無可
以訣死生○銅人鍼三分留十呼灸三壯○主心痛脉

弦馬黃瘟疫肩腫吻傷虛勞浮腫腰引小腹兩丸塞
如死狀終日不休息大便難便血小便淋小腸疝氣
痛積疝小便不利嘔血逆發寒噎乾善渴肘腫內踝

前痛淫瀉筋痠腋下馬刀瘍癢唇腫女子漏下不止小
兒卒疝

中封泉○足內踝骨前一寸筋裏宛宛中素註一寸半
仰足取陷中伸足乃得之足厥陰肝脉所行為經金○

銅人鍼四分留七呼灸三壯○主瘡癩色蒼蒼蒼振寒
小腹腫痛食快快繞臍痛五淋不得小便足厥冷身黃

有微熱不嗜食身體不仁寒疝腰中痛或身微熱痿厥
失精筋變陰縮入腹相引痛

蠶瘻一名○內踝上五寸足厥陰絡別走少陽○銅人鍼

二分留三呼灸三壯下經灸七壯○主疝痛小腹脹滿
暴痛如癢關效噫恐悸少氣不足悒悒不樂咽中悶如

有息肉背拘急不可俛仰小便不利臍下積氣如石足
脛寒痠屈伸難女子赤白淫下月水不調○氣逆則鼻

九卒痛實則瀉長瀉之虛則暴癢補之
中都一名○內踝上七寸筋骨中與少陰相直○銅人鍼

三分灸五壯○主腸癰疝疝小腹疝不能行立脛寒婦
人崩中產後惡露不絕

膝關○擗鼻下二寸傍陷中銅人鍼四分灸五壯○主風
痺膝內廉痛引腹不可屈伸咽疾中痛

曲泉○膝股上內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫
文頭取之足厥陰肝脉所入為合水肝虛則補之○銅

人鍼六分留十呼灸三壯○主瘡疝陰股痛小便便腹
脇滿癢閉少氣洩利四肢不舉實則身目眩痛汗不

出目眦眦膝關痛筋攣不可屈伸發狂衄血下血喘呼
小腹痛引咽疾房勞失精身體極痛洩水下痢膿血陰

腫陰莖痛筋腫膝脛冷疼女子血瘕按之如湯浸股內
小腹腫陰挺出陰瘻

陰包○膝上四寸股內廉兩筋間跪足取之看膝內側必
有槽中○銅人鍼六分灸三壯下經七分○主膝尻引

小腹痛小便難遺溺婦人月水不調
五里○氣衝下三寸陰股中動脉應手○銅人鍼六分灸
五壯○主腸中滿熱閉不得溺風勞嗜甘
陰廉○羊矢下去氣衝二寸動脉中○銅人鍼八分留七

呼灸三壯至婦人絕產若未經生產者灸三壯即有子
章門一名長平大橫外直季脇肋端臍臍上三寸刃旁九
寸側卧屈上足伸下足舉臂取之又云肘尖盡處是穴
脾之募足少陽厥陰之會○難經成會章門號曰藏病
治此○銅人鍼六分灸百壯明堂日七壯止五百壯素
註鍼八分留六呼灸三壯○主腸鳴暴泄然食不化脇
痛不得卧煩熱口乾不嗜食胸脇痛支滿喘息心痛而
嘔吐逆飲食却出腰滿不得轉側腰脊疼痛溺多白濁
傷飽身散腹脹食積腹脹如鼓脊強四肢懈惰善恐
少氣厥逆者管不來○東垣曰氣在於腸胃者取之太
陰陽明不下取三里章門中腕○魏士珪妻徐病疝自
臍下上至於心皆脹滿嘔吐煩悶不進飲食滑伯仁曰

此寒在下焦為灸章門氣海


期門○直乳二肋端不容傍一寸五分又曰乳直下一寸
半肝之募足厥陰太陰之會○銅人鍼四分灸五壯○
主胸中煩熱實脈上下目青而嘔霍亂洩利腹堅硬大
喘不得安卧脇下積氣傷寒心切痛喜嘔酸食飲不下
食後吐水胸脇痛支滿男子婦人血結胸滿面赤大燥
口乾消渴胸中痛不可忍傷寒過經不鮮熱入血室男
子則由陽明而傷下血謔語婦人月水適來邪乘虛而
入及產後餘疾○仲景曰傷寒腹滿謔語寸脈微而緊
此肝乘脾也名曰縱刺期門傷寒發熱謔語惡寒大渴
欲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解肝乘脾也
曰橫刺期門又曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩暈

時如結胸心下否軟者當刺大椎第一間肺俞肝俞
不可發汗發汗則謔語五六日謔語不止當刺期門又
曰婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而
脈遲身涼胸脇下滿如結胸狀謔語者此為熱入血室
當刺期門又曰陽明病下血謔語者為熱入血室但頭
汗出者刺期門○王叔和曰少陰脈不至腎氣微少精
血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下
執歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門巨
闕○一婦人患熱入血室醫者不識許學士曰小柴胡
已遲當刺期門予不能鍼請善鍼者鍼之如言而愈
按傷寒發熱蓄蓄惡寒大渴飲食腹滿至於自汗出
則表已解小便利則裏自和故仲景曰其病欲解當

俟其自愈且肝乘脾為侮所不勝故曰橫今詳文義

刺期門三字疑衍故毋漢謂羅成之曰仲景書非全
書其間或文有不倫或意有未盡吾每思之不能以
無疑此之謂歟

肝經穴圖



督脉經穴

督脉者起於下極之胎

下極之胎兩陰之間屏翳處兩筋間為篡其內深處為下極督脉之始也

並於脊裏上至風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之海也

脊之為骨九二十椎通項骨三椎共二十四椎自屏翳而起歷長強穴並脊裏而上行循腰膂陽關命門懸樞脊中筋縮至陽陵臺神道身柱過風門循陶道大椎廉門至風府入腦循腦戶強間後頂上巔至百會前項顛會上星神庭循額至鼻柱經素膠水溝兌端至眼交而終焉云陽脉之海者以人之脉絡周流於諸陽之分也

一滴水也而督脉則為之都綱故曰陽脉之海

一〇行背中行〇九二十七穴

長強一名氣之陰脊骶骨端計三分伏地取之乃得足少陰少陽結會督脉別走任脉〇銅人鍼三分轉鍼以大

痛為度灸不及鍼日灸三十壯止二百壯此痔根本甲

乙鍼二分留七呼明堂灸五壯〇主腸風下血久痔瘻

腰脊痛狂病大小便難頭重洞泄五淋痺餅下部惡小

兒頰陷驚癇瘵嘔血驚恐失精瞻視不正〇實則脊

強瀉之虛則頭腫補之

腰膂一名背脊一名腰脊〇二十一椎節下間死宛中以

挺身伏地舒身兩手相重支額縱四體後乃取其穴〇

銅人鍼八分留三呼瀉五吸灸七壯至七七壯中乙鍼

二分留七呼灸七壯忌房勞舉重強力明堂灸三壯下

經灸五壯素註鍼一分又云二寸〇主腰體腰脊痛不

得免仰溫瘧汗不出足清不仁傷寒四肢熱不已婦人

月水閉溺赤〇宋徐秋夫聞鬼斛斯泣腰痛縛草作人

令依之鍼腰俞有井明日一人謝云蒙君救濟忽不見

按秋夫療鬼事涉怪誕然左氏記彭生子產立伯有

理或有如錄以傳聞見

陽關〇十六椎節下間坐取之〇銅人鍼五分灸三壯〇

主膝外不可屈伸風痺不仁筋掣不行

命門一名腰脊〇十四椎節下間伏取之〇銅人鍼五分灸二

壯〇主頭痛如破身熱如火汗不出寒熱痰瘧腰腹相

引骨蒸五歲熱小兒發癩張口搖頭身反折角弓

懸樞○十三椎下伏取之○銅人鍼三分灸三壯○主腰

脊強不得屈伸積氣上下行水穀不化下痢腹中留疾

脊中一名神宗○十一椎節下間俛取之○銅人鍼五分

得氣即瀉禁灸灸之令人腰僵痺○主風癩癩邪黃疸

腹滿不嗜食五痔便血溫病積聚下利小兒脫肛○素

問刺中隨為樞行鍼宜慎之

筋縮○九椎節下間俛取之○銅人鍼五分灸三壯明下

灸七壯○主癩疾狂走脊急強目轉反戴上視目睛疇

病多言心痛

至陽○七椎節下間俛取之○銅人鍼五分灸三壯明下

灸七壯○主腰脊痛胃中寒氣不能食胸脇支滿身羸

瘦背脊中氣上下行腹中鳴寒熱解俯強溼腰痠四肢重

痛少氣難言卒疝攻心胸

靈臺○六椎節下間俛取之○銅人鍼治病見素問

按靈臺一穴諸書缺主治資生經集銅人千金外臺

明堂亦無攷惟曰見素問攷之素問經文無所載王

冰注中惟言窈穴所在而已主心亦未之見竊意諸

書豈因靈臺靈墟名治相混而誤沒歟先儒謂心曰

靈臺經謂心者君主之官神明出焉豈主病向手少

陰神門而鍼刺淺深艾壯多寡同至陽神道歟或曰

手少陰神門主心矣推督脈何與而六椎節下又屬

之心心之所出何多邪曰督為陽脈之都綱猶五藏

既有命在背而督又處太陽之中故太陽有督俞而

督有命門靈臺為心無疑如紫微垣存天自大帝天

心中星又為帝星太微垣又有帝座天市垣又有帝

星蓋心為一身之主如帝王警蹕所至曰行在所也

曰論語示闕入春秋存夏五子何偕安若此曰安國

以郭公為號公晦庵補格致於大學將以明經也

神道○五椎節下間俛取之○銅人灸七七壯止百壯明

下灸三壯鍼五分千金灸五壯○主傷寒發熱頭痛進

退往來寒瘧恍惚悲愁健忘驚悸失欠牙車蹠張口不

合小兒風癩

身柱○三椎節下間俛取之○銅人鍼五分灸七七壯

止百壯明堂灸五壯下經三壯○主腰脊痛癩病狂走

癩瘡怒殺人身熱妄言見鬼小兒驚癇○難知云治

洪長伏二脉風癩驚癇發狂惡人與火灸三椎九椎

陶道○大椎下間俛取之足太陽督脉之會○銅人灸五

壯鍼五分○主瘰癧寒熱西漸脊強煩滿汗不出頭重

日與瘰癧恍惚不樂

大椎○一椎上陷者宛宛中手足三陽督脉之會○銅人

鍼五分留三呼瀉五吸灸以十年為壯○主肺脹脇滿

嘔吐上氣五勞七傷乏力溫瘧瘧瘧氣注背膊拘急頸

項強不得回顧風勞食氣骨熱前板齒燥○仲景曰太

陽與少陽併病頸項強痛或眩冒時如結胸心下否鞭

者當刺大椎第一間

瘰癧一名瘰癧一名瘰癧○在項風府後一寸入髮際五分項

甲中央宛宛中仰頭取之督脉陽維之會入繫舌本素註

鍼四分銅人鍼三分可繞鍼八分留三呼瀉五吸瀉盡

更留鍼取之禁灸之令人嘔○主舌急不語重舌諸
陽熱氣盛衄血不止寒熱風痲脊強反折癱瘓癲疾頭
重風汗不出

風府一絡○項後入髮際一寸大筋內定宛中疾言其肉
立起言休立下足太陽脊脈陽維之會○銅人鍼三分
禁灸灸之使人失音明堂鍼四分留三呼素註鍼四分
○主中風舌緩不語振寒汗出身重惡寒頭痛項急不
得回頭偏風半身不遂鼻衄咽咳腫痛傷寒在走欲自
殺目妄視頭中百病為黃疸○仲景曰太陽病初服
桂枝湯反煩不解先刺風池風府○岐伯曰巨陽者諸
陽之屬也其脈連府故為諸陽主氣○資生云風府者
傷寒所自起北人以毛皮覆之今以南人怯弱者亦

以帛護其領今護領乃云蔽垢賦實存名亡矣○瘡論
曰邪客於風府循督而下衛氣一日夜大會於風府明
且日下一節故其作晏每至於風府則膝理開腰理開
則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出於
風府日下一節二十五日下至骶骨二十六日入於脊
內故日作益晏也○東垣曰少陽頭痛治在風池風府
按風府禁灸矣項瘰癧於腦之下項之上此正風府
穴分也東垣先用火攻之策以大炷艾如兩枚許者
攻之至百壯宜瘡家與諸病異治歟

腦戶一絡○枕骨上強間後一寸半足太陽督脈之會○
銅人禁灸灸之令人癱或灸七壯妄灸令人瘖明堂鍼
三分素註鍼四分素問刺腦戶入腦立死○主面赤目

黃面頭痛重腫痛癩癧

按腦戶一穴資生明堂素問所論深鍼妄灸醫家當
知所戒矣

強間一絡○後頂後一寸半○銅人鍼二分灸七壯明堂
灸五壯○主頭痛目眩腦旋煩心嘔吐涎沫項強狂走
不卧

後頂一絡○百會後一寸半枕骨上○銅人灸五壯鍼二
分明堂鍼四分素註三分○主頭項強急惡風寒風眩
日晡頭顙上痛歷節汗出狂走癱疾不卧癩發癩癧
頭偏痛

百會一名三陽五會一名天滿○前項後一寸五分項中央旋毛
中可容豆直兩耳尖性理北溪陳氏曰畧退壯子猶天

之極星居北手足三陽督脈之會○素註鍼二分銅人
灸七壯止七七壯九灸頭項不得過七壯錄頭項皮薄
灸不宜多鍼二分得氣即瀉又素註刺四分○主頭風
中風言語蹇澀口禁不開偏風半身不遂心煩悶驚悸
健忘忘前失後心神恍惚無心力瘵癯脫肛風瀾青風
心風角弓反張羊鳴多哭語言不擇發時即死吐沫汗
出而嘔飲酒面赤腦重鼻塞頭痛目眩食無味百病皆
治○魏太子尸厥扁鵲取三陽五會有問太子死○唐
高宗頭痛秦鳴鶴曰宜刺百會出血武后曰豈有至尊
頭上出血之理已而刺之出血立愈

前項○顙會後一寸半骨間陷中○銅人鍼一分灸三壯
止七七壯素註刺四分○主頭風目眩面赤腫水腫小

兒驚癇痰厥腫

額會○上星後一寸陷中○銅人灸二七壯至七七壯初
灸不痛病去即痛痛止灸鍼二分留三呼得氣即瀉入
歲已下不得鍼緣顛門未合刺之恐傷其骨令人夭素
註鍼四分○主腦虛冷或飲食酒過多腦疼如破衄血
而赤暴腫頭皮腫生白屑風頭眩類青目眩鼻塞不聞
香臭驚悸目眩上識人

一星神堂○神庭後人髮際一寸陷中容豆○素問鍼二
分留六呼灸五壯銅人鍼四分以細三稜鍼宣泄諸陽
熱氣無令上衝頭目○主面赤腫頭風頭腫皮腫面虛
鼻中息肉鼻塞頭痛夜瘧振寒熱汗不出目眩目睛痛
不能遠視口鼻出血不止

神庭○直鼻上入髮際五分足太陽督脉之會○素註三
壯銅人灸二七壯止七七壯禁鍼鍼發狂目失睛○
主登高而歌棄衣而走角弓反張吐舌癲疾風癩戴目
上視不識人頭風目眩鼻出清涕不止目淚出驚悸不
得安寢嘔吐煩滿寒熱頭痛喘渴○張子和曰目痛目
腫醫腫鍼神庭上星額會前頂醫者可使立退腫者可
使立消


水瀉人中○鼻柱下人中近鼻孔陷中督脉手足陽明之
會○素註鍼三分留六呼灸三壯銅人鍼四分留五呼

得氣即瀉灸不及鍼日灸三壯明堂日灸三壯至二百
壯下經灸五壯○主消渴飲水無度水氣通身腫失笑
無特癲癩語不識尊卑乍哭乍喜中風口禁牙關不開
面腫唇動狀如虫行卒中惡鬼擊喘渴目不可視黃疸
馬黃瘟疫通身黃口喎僻

兌端○唇上端○銅人鍼二分灸三壯○主癲疾吐沫小
便黃舌乾消渴衄血不止唇吻強齒齦痛鼻塞痰涎口
喎僻

斷交○唇內齒上斷縫中任督足陽明之會○銅人鍼三
分灸三壯○主鼻中息肉蝕癆鼻塞不利額頰中痛頸
項強目淚眇汁內背赤痒痛生白翳而赤心煩馬黃黃
疸寒暑温疫○二十九難曰督之為病脊強而厥又曰
其受邪氣畜則腫熱射之也

素註
三分○主鼻中息肉不消多涕生瘡鼻窒喘息不利鼻
喎僻衄衄



任脉經穴

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉嚨屬陰脉之海也

任之為言妊也行腹部中行為婦人生養之本奇經之一脉也任與督一源而二岐督則由會陰而行背任則由會陰而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午也人身之任督以膈背言天地之子午以南北言可以分可以合者也分之以見陰陽之不雜合之以見渾淪之無間一而二二而一者也任脉起於中極之下會陰之分也由是循曲骨上毛際至中極行腹裏上循關元石門氣海陰交神闕水分下脘建里中脘上脘巨關鳩尾中庭膻中玉堂紫宮華蓋璇璣天突廉泉上頤循承漿

環房上至斷交分係兩日下之中央會承泣而終也云陰脉之海者亦以人之脉絡周流於諸陰之分譬猶水也而任脉則為之總管焉故曰陰脉之海

○行腹中一行凡三十四穴

會陰一穴○兩陰間任督衝三脉所起督由會陰而行背

任由會陰而行腹由氣衝行足少陰○銅人灸三壯

指微禁鍼○主汗陰虛陰中諸病前後相引不得

大小便陰端寒倒心驚中熱皮疼痛殺道搔癢久痔相

通女子經水不通陰門起痛○卒死者鍼一寸補之瀉

死者令人倒臥出水鍼補尿管出則活餘不可鍼

曲骨○橫骨上中極下一寸毛際陷中動脉應手足厥陰

任脉之會○銅人灸七壯至七七壯鍼二十素註鍼六

分留七呼又云鍼一寸○主失精五藏虛弱虛之冷極

小腹脹滿小便淋瀝不通癢疝小腹痛婦人赤白帶下

中極一名氣脈○關元下一寸臍下四寸膀胱之募是三

陰任脉之會○銅人鍼八分留十呼得氣却瀉灸百壯

明堂灸不及鍼日三七壯下經灸五壯○主冷氣積聚

時上衝心腹中熱臍下結塊賁脉捨心陰汗水腫陽氣

虛憊小便頻數失精絕于疝瘕婦人產後惡露不行胎

衣不下月事不調血結成塊子門腫痛不喘小腹苦寒

陰痿而熱○主恍惚尸厥飢不能食臨經行房廩腹寒

熱轉膝不伸尿婦人斷緒四度鍼即有子

關元○臍下三寸小腸之募足三陰任脉之會○紀者問

元也○素註刺一寸二分留七呼○主又云鍼二十

銅人鍼八分留三呼滿五吸灸百壯止三百壯明堂所
婦榮鍼若鍼而落胎胎多不出鍼外崑崙立水○主積
冷虛乏臍下疼痛流入陰中發作無時冷氣結塊痛寒
氣入腹痛失精白濁溺血暴赤風眩頭痛轉胞閉塞小
便不通黃赤勞熱石淋五淋洩利奔豚捨心婦人帶下
月經不通絕嗣不生胞門閉塞胎漏下血產後惡露不
止

石門一名利機一名精靈
灸二七壯止二百壯甲乙鍼八分留三呼得氣即馮千
金鍼五分下經灸上壯不註刺六分留七呼婦人禁鍼
禁灸犯之終身絕子○主傷寒小便不利利不禁小腹絞
痛陰囊入小腹黃赤心腹痛堅硬平心統臍氣淋血

淋小便黃嘔吐血不食穀穀不化水腫水氣行皮膚小
腹皮數數然氣滿婦人因產惡露不止結成塊崩中漏
下

氣海一名下育臍下一寸半宛宛中男子生氣之海○
銅人鍼八分得氣即瀉瀉後宜補之明下灸七壯○主
傷寒飲水過多腹腫脹氣喘心下痛冷病面赤臍虛氣
虛真氣不足一切氣疾久不差肌體羸瘦四支力弱黃
豚七疝小腸膀胱腎餘癥瘕結塊狀如覆杯腹暴脹按
之不下臍下冷氣痛中惡脫腸欲死大便不通小便赤
卒心痛婦人臨經行房羸瘦前中赤白帶下月事不調
產後惡露不止繞臍疝痛悶者臍下小兒遺尿○補
鄒英宗患滯下寒骨上租注江

暴絕得之病後酒色丹法為氣海漸斃服人參膏數
斤愈

陰交一名臍下一寸當膀胱上口三焦之募任脉少陰
衝脉之會○銅人鍼八分得氣即瀉瀉後宜補灸百壯
明堂灸不及鍼日三七壯止百壯○主氣痛如刀攪腹
填堅痛下引陰中不得小便兩丸塞疝痛陰汗濕癢腰
膝拘攣臍下熱鬼擊鼻出血婦人血崩月事不絕帶下
產後惡露不止繞臍冷痛絕于陰浮責脉上臍小兒陷
顛

神闕一名當臍中○素註禁鍼鍼之使人臍中惡瘍潰
矢出者死不治灸三壯銅人灸百壯○主中風不甦久
冷傷敗臟府洩利不止水腫鼓脹腸鳴腹痛繞臍小兒
源薄為灸臍中百壯始甦不起再灸百壯

水分○下脘下一寸臍上一寸六當小腸下口至是而必
別清濁水液入膀胱渣滓入大腸故曰水分○素註鍼
一寸銅人鍼八分留三呼瀉五吸水病灸太良又云禁
鍼鍼之水盡即死明堂水病灸七七壯止四百壯鍼五
分留三呼資生云不鍼為是○主水病腹堅腫如鼓轉
筋不嗜食腸胃虛脹臍痛冲心腰脊急強腸鳴狀如
雷聲上冲心鬼擊鼻出血小兒陷顛
下脘○建里下一寸臍上二寸六當胃下口小腸上口水
穀於是入馬足太陰任脉之會○銅人鍼八分留三呼
瀉五吸灸二七壯止二百壯○主臍下

胃脹羸瘦腹滿六府氣味較不轉化不嗜食小便赤澀
塊連臍上厥氣動日漸瘦脉厥動譫胃

建里○中脘下一寸臍上三寸○銅人鍼五分留十呼灸
五壯明堂鍼一寸二分○主腹脹身腫心痛上氣腸中
痰嘔逆不嗜食

中脘一名○上脘下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中

胃之募手太陽少陽足陽明任脉之會上紀者中脘也
胃之募也○難經曰臍會中臍病治此○銅人鍼八分
留十呼瀉五吸疾出鍼灸二七壯止二百壯明堂日灸

二十七壯止四百壯素註鍼一寸二分灸七壯○主五膈
喘急不止腹暴脹中惡脾疼飲食不進譫胃赤白痢寒
痺氣心疝伏梁心下如覆在心膨脹面色痿黃天行瘧

寒熱不已溫瘧先腹痛先瀉霍亂洩出不知飲食不化
心痛身寒不可俛仰氣發噎○東垣曰氣在於腸胃者
取之足太陰陽明不下取三甲章門中脘又曰胃虛而
致太陰無所稟者於足陽明募穴中道引之

上脘一名○巨闕下一寸當一寸五分去蔽骨三寸臍上
五寸上脘中脘屬胃絡脾足陽明手太陽任脉之會○

素註銅人鍼八分先補後瀉風癩執病生瀉後補立愈
日灸二十壯至百壯未愈倍之明下三壯○主腹中雷
鳴相逐食不化腹疝刺痛霍亂吐利腹痛身熱汗不出

譫胃嘔吐食不下腹脹氣滿心忪驚悸時嘔血痰多吐
涎奔豚伏梁三虫卒心痛風癩執病馬黃黃疸積聚堅
大如盤面勞吐血

上臍○鳩尾下一寸心之募○銅人鍼六分留七呼得氣
即瀉灸七壯止上七壯○主上氣欬逆胸滿短氣背痛

胸痛痞塞數種心痛冷痛蛔虫痛蠱毒蛔鬼胸中痰飲
先心痛先吐霍亂不識人驚悸腹脹暴痛恍惚不止吐
逆不食傷寒煩心喜嘔發狂少氣腹痛黃疸急疸急疫

咳嗽孤疝小腹脹噎煩熱雨不利五藏氣相干卒心
痛尸厥○妊娠子上衝心昏悶刺巨闕下鍼令人立甦
不悶次補合谷瀉三陰交胎應鍼而落如子手搦心生
下手有鍼痕頂母心向前人中有鍼痕向後枕骨有鍼

痕是驗
按十四經發揮云凡人心下有膈腹前齊鳩尾後齊
十一椎周圍者脊所以遮隔濁氣不使上薰心肺是

心在膈上也難產之婦若子上衝至膈則止兒之左
腹指未能執物尚堅握而不伸者又有胞衣乘之豈
能破而掬心坎心為一身之主神明出焉不容小有

所犯豈有被衝掬而不死哉蓋以其上衝近心故云
爾如胃脘痛曰心痛之類是也學者不可以辭害意

鳩尾一名尾翳○蔽骨之端在臍前蔽骨下五分人無蔽
骨者從岐骨際下行一寸曰鳩尾者言其骨垂下如鳩

尾形脉之別○銅人禁灸灸之令人永世少心力大妙
手方可鍼不然鍼取氣多令人天鍼二分留三呼瀉五

吸肥人倍之明堂灸三壯素註不可刺灸○主息責執
病偏頭痛引日外背噎喘喉鳴胸滿欬嘔喉痺咽腫水
漿不下癩癩狂走不擇言語心中氣悶不喜聞人語效

喉血心驚悸精神耗散少年房多短少氣○又靈樞經云膏之原出於鳩尾

中庭○膻中下一寸六分陷中○銅人灸五壯鍼三分明堂灸三壯○主胸脇支滿噎塞食飲不下嘔吐食出小兒吐奶

膻中一名○正堂下一寸六分橫 兩乳間陷中仰卧取

之○主 氣以分布除陽故為臣使之官難經曰氣會三焦陳氏曰三焦當作上焦一筋直兩乳間說曰氣病治此○銅

人禁鍼鍼之令人天明堂灸七壯止七七壯氣府論註鍼三分灸五壯○銅人禁鍼鍼之令人天明堂灸七壯

止七七壯氣府論註鍼二分灸五壯○主上氣短氣欬逆噎氣雷氣喉鳴喘咳不下胸中如塞心胸痛風痛

咳嗽肺癰唾膿嘔吐涎沫婦人乳汁少

玉堂一名○紫宮下一寸六分陷中○銅人灸五壯鍼三分○主胸膈疼痛心煩欬逆上氣胸滿不得息喘急嘔吐寒痰

紫宮○華蓋下一寸六分陷中仰而取之○銅人灸五壯鍼三分明下灸七壯○主胸脇支滿胸膈骨痛飲食不下嘔逆上氣煩心欬逆吐血噎如白膠

華蓋○璇璣下一寸陷中仰而取之○銅人鍼三分灸五壯明下灸三壯○喘急上氣欬逆哮喘喉痺咽腫水漿不下胸皮痛

璇璣○天突下一寸陷中仰頭取之○銅人灸五壯鍼三分○主胸脇支滿痛欬逆上氣喉鳴喘不能言哮喘咽

喉水漿不下胃中有積

天突一名在頸結喉下四寸宛宛中陰維任脉之會○銅

人鍼五分留三呼得氣即瀉灸亦得不及鍼者下鍼當直下不得低手即五截之氣傷人經壽明堂灸五壯鍼

一分素註鍼一寸留七呼灸三壯○主面皮熱上氣欬逆氣暴喘咽腫咽冷聲破喉中生瘡喉痛喘咯膿血瘡

不能言身寒熱頸腫哮喘喉中鳴翁翁如水雞聲胸中氣鯁鯁俠舌縫青脉舌下急心與背相控而痛五噎黃

痺醋心多睡嘔吐瘦羸○許氏曰此穴一鍼四効九下鍼後良久先脾胃食覺鍼動為一効次鍼破病根腹中

作聲為二効次覺流入膀胱為三効然後覺氣流行入腰後腎室間為四効矣

廉泉一名○頸下結喉下四寸中央仰而取之陰維任脉之會○素註低鍼取之鍼一寸留七呼銅人灸三壯鍼

三分得氣即瀉明堂鍼二分○主嗽嗽上氣喘息嘔沫舌下腫難言舌根縮急不食舌縱涎出口瘡

承漿一名○唇稜下陷中開口取之大腸脉胃脉督脉任脉之會○素註鍼二分留五呼灸三壯銅人灸七壯止

七七壯明堂鍼三分得氣即瀉留三呼徐徐引氣而出日灸七壯過七七停四五日後灸七七若一向灸恐足

陽明脉斷其病不愈停息復灸令血脉通宜其病立愈○主偏風半身不遂口眼喎斜面腫消渴口齒疳蝕生

瘡暴瘡不能言難經曰任之為病其苦內結男子為七疝女子為殺聚

疝女子為殺聚

奇經陽蹻脉

陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池其為病也令人陰緩而陽急兩足蹻脉本太陽之別合於太陽其氣上行氣并相還則為濡目氣不營則目不合男子數其陽女子數其陰當數者為經不當數者為絡也蹻脉長八尺所發之穴生於中脉以輔陽為鄰本於僕參與足少陽會於居膠又與手陽明會於肩髃及巨骨又與手足太陽陽維會於臑俞與手足陽明會於地倉又與手足陽明會於巨膠又與任脉足陽明會於承泣九二十六穴

申脉

外踝下

輔陽上

僕參上

居膠下

肩髃

大骨端

臑俞

有膠後甲

地倉

巨膠

兩

承泣

七分

已上諸穴陽蹻脉病者宜刺之

陰蹻脉

陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉此為病蹻人陽緩而陰急故曰蹻脉者少陰之別別於然谷之後上內踝之上直上陰循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入鼻屬目內皆合於太陽女子以之為經男子以之為絡兩足蹻脉長八尺而陰蹻之却在交信陰蹻病者取此

然谷

內

交信

陰蹻脉病取之二穴刺之

奇經衝脉

衝脉者與任脉皆起於胞中上循脊裏為經絡之海其浮

於外者循腹上行會於咽喉別而絡唇口故曰衝脉者起於氣衝並足少陰之經俠臍上行至胸中而散此為病令人逆氣而裏急難經則曰並足陽明之經以穴攷之足陽明俠臍左右各二寸而上行足少陰俠臍左右各五分而上行鍼經所載衝任與督脉同起於會陰其在腹也行手幽門通谷陰都石闕商曲盲俞中注四滿氣穴大赫橫骨九二十二穴皆足少陰之分也然則衝脉並足少陰之經明矣

幽門

石闕

通谷

陰都

商曲

盲俞

中注

四滿

氣穴

大赫

橫骨

逆氣裏急者取諸此

陽維脉

陽維維於陽其脉起於諸陽之會與陰維皆維絡於身若陽不能維於陽則溶溶不能自收持其脉氣所發別於金門以陽交為却與手足太陽及蹻脉會於臑俞與手足少陽會於天膠又會於肩井其在頭也與足少陽會於陽白上於本神及臨泣上至正營循於腦空下至風池其與督脉會則在風府及瘻門難經云陽維為病苦寒熱○此陽維脉氣所發九二十四穴

金門

陽交

臑俞

天膠

肩井

陽白

本神

臨泣

正營

腦空

風池

瘻門

瘻門

已上穴苦寒者刺之

陰維脈

陰維維於陰其脉起於諸陰之交若陰不能維於陰則悵然失志其脉氣所發者除維之別名曰築賓與足太陰會於腹哀大橫又與足太陰厥陰會於府舍期門與任脉會於天突廉泉難經云陰維為病苦心痛此陰維脉氣所發九十二穴

築賓

腹哀

大橫

府舍

期門

天突

廉泉

已上穴苦心痛者刺之

帶脉

帶脉者起於季脇回身一周其為病也腰腹縱容如囊水

帶脉

帶脉

之狀其脉氣所發正名帶脉以其回身一周如帶也又與

足少陽會於維道此帶脉所發九四穴

帶脉

已上穴病如上證者刺之

十五絡脉

手太陰之別名曰列缺

實則手銳掌熱瀉之虛則欠故小便遺數補之

手少陰之別名曰通里

實則支滿瀉之虛則不能言補之

手心主之別名曰內關

實則節弛肘廢瀉之虛則生疔小如指疔亦補之

足太陽之別名曰支正

手陽明之別名曰偏歷

實則齟齬瀉之虛則齒疳補之

手少陽之別名曰外關

實則肘擊瀉之虛則不收補之

足太陽之別名曰飛揚

實則執室頭痛瀉之虛則執紃補之

足少陽之別名曰光明

實則厥瀉之虛則痿厥坐不能起補之

足陽明之別名曰豐隆

氣逆則痰痺卒疔實則狂癲瀉之虛則足不收脛枯補之

之

足太陰之別名曰公孫

厥氣上逆則霍亂只則腸中切痛瀉之虛則鼓脹補之

足少陰之別名曰大鍾

其病氣逆則煩悶實則閉癢瀉之虛則腰痛補之

足厥陰之別名曰蠡溝

其病氣逆則羸九牛痛實則挺長瀉之虛則暴暴補之

任脉之別名曰屏翳

實則腹皮痛瀉之虛則癢搔補之

督脉之別名曰長強

實則脊強瀉之虛則頭重補之

脾之大絡名曰大包

實則身盡痛瀉之虛則百節盡皆癢補之

九此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之
上下人經不同絡亦異所別也

又按胃之大絡名曰虛里其動應衣脉宗氣也而
不係於補瀉之列蓋中焦之氣盛衰而宗氣為之
盈縮取之二里以下其氣而宗氣之盈者消調之
二里以補甘公氣而宗氣之耗者滋則其氣未嘗不
補瀉也特以非別走也他經故不在諸絡之例此
所以舉豐隆而不屬虛里也歟

○十二原穴

三焦行於諸陽故置一俞曰原又曰三焦者水谷
之道路原氣之別使也主運行三氣經歷五藏六
府原者三焦之尊號故所至輒為原也

太淵 大陵 太沖 太白 太谿 神門 心

陽池 京骨 丘墟 衝陽 合谷 腕骨 小

按難經云五藏六府之有病者皆取其原王海藏曰假
令補肝經於本經原穴一鍼太衝是如瀉肝經於本經
原穴亦瀉一鍼餘倣此

自太淵至神門皆氣俞自陽池至腕骨為原海藏皆
為十二原者豈五藏無原以俞為原六府有原取原
而不取俞耶

五藏募穴

中府 肺之 巨闕 心之 章門 脾之 期門 肝之

中脘 胃之

難經云陽病行陰故八募在陰陰病行陽故八募在陽

治腹之募皆為原氣不足從陰引陽勿誤也又曰六淫
客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病錯取於胃之合
及諸腹之募者必危

五藏俞穴 肺俞 心俞 脾俞 肝俞 腎俞

按難經云陰病行陽陽病行陰故令俞在陽

曰天外風寒之邪乘中而入在人之背上府俞藏俞是
人之受天外風邪亦有二說中於陽則流於經此病始
於外寒終歸外熱以故治風寒之邪治其各藏之俞

府會中脘 藏會章門 筋會陽陵泉 髓會陽輔

血會鬲俞 骨會大杼 脉會太淵 氣會臍中

難經云熱病在內者取會之氣穴也

五藏六府井榮俞原經合

井 心 肝 脾 腎 心包絡

井 少商 少衝 大敦 陷白 湧泉 中衝 卷刺

榮 魚際 少府 行間 大都 然谷 勞宮 夏刺

俞 太淵 神門 大衝 太白 太谿 大陵 季夏

經 經渠 靈道 中封 商丘 復溜 間使 秋刺

合 尺澤 少海 曲泉 陰谷 陰谷 曲澤 冬刺

大腸 小腸 膽 胃 膀胱 三焦

井 商陽 少澤 竅陰 厲兌 至陰 闕衝 所出

榮 二間 前谷 俠谿 內庭 通谷 液門 所流

俞	三問	後谿	陽池	陷谷	束骨	中渚	所出
原	合谷	臑骨	垣墟	衝陽	京骨	陽池	所通
經火	陽谿	陽谷	陽輔	解谿	崑崙	支溝	所行
合上	曲池	少海	陽陵泉	三里	委中	天井	所入

鍼灸聚英 卷終

騎竹馬法

治癱疽惡瘡發背男左女右臂腕中橫文起用薄篾二條量至大指齊肉盡處不量爪甲截斷久用薄篾取前同身一寸則子今病人脫去上下木服以大竹扛一條跨穴兩人隨徐扛起足要離地五寸許兩旁更以兩人扶定毋令動搖不穩却以前長篾貼定竹扛豎起從尾骶骨貼脊量至篾盡處以筆點記此不是穴却用後取同身寸篾取兩寸平摺自中橫量兩頭各一寸方是灸穴可灸三壯

依法量穴在督脉脊中至陽筋束二穴中外太陽行背二行兩俞肝俞之內非正當穴也疑必後人傳訛以三寸為二寸耳豈有不得正穴徒破好肉而能愈病哉此不能無疑也

四花穴

崔知悌云灸骨蒸勞熱灸四花穴以稻稈心量口縫如何闊斷其多火以如此長裁紙四方當中剪小孔別用長稈稈踏脚下前取脚大脂為止後取脚曲蹶橫文中為止斷了却環在結喉下垂向背後看稻稈止處即以前小孔紙當中安分為四花灸紙角也可灸七壯

初疑四花穴古人恐人不識點穴故立此捷法當必有合於五藏俞也今依此法點穴果合太陽行背二行兩俞膽俞四穴難經曰血舍難俞疏曰血病治此血骨蒸勞熱血虛火王故取此以補之膽者肝之府也取是俞也崔氏止言四花而不言萬膽俞四

工告也今只依揣摸脊骨俞膽俞為正然人口有大
小開狹不同故四花亦不一準

灸勞穴

資生經云久勞其狀手足心熱盜汗精神困頓骨節疼痛
初發咳嗽漸吐膿血肌瘦面黃減食少力令身正直用草
子男左女右自脚中指小量過脚心下向上至曲秋大紋
處截斷却將此草自鼻尖量從頭正中髮貼內量至脊以
草盡處用墨點記別用草一條令病人自然合口量闊狹
截斷却將此草於墨上點上平摺兩頭盡處量穴灸時隨
年多灸一壯如年三十灸三十一累効

依此量之其穴合五椎兩旁三寸心俞二穴也豈心主
血故灸之歟

取腎俞法

千金註云凡取腎俞者在平處立以杖子約量至臍又以
此杖子當背脊骨上量之知是與臍平處也然後相去各
寸半取其穴則腎俞也

按此法以臍準腎俞雖似然肥人腹垂則臍低瘦人腹
平則臍平今不論肥瘦均以杖量之未有準也

竇氏八穴 或云少室隱者之所傳○劉氏曰八穴用
為輔治排拘於法取者也

公孫二穴 足太陰脾通衝脈合於心胃主治二十七證

九種心痛 心胃 痰滯凝悶 心胃
臍腹痛脹 三焦胃 脇肋疼痛 心脾

產後血迷 心主 氣膈食不下 小腸胃
泄瀉不止 大腸胃 痰氣疼痛 心胃

裏急後重

大腸 傷寒結胃 小腸心

水隔酒痰

肝胃 中滿不快及胃嘔吐 胃

腹脇脹滿痛

脾胃 腸風下血 大腸包絡

脫肛不收大人

大腸肺 氣膈 心脾

食隔不下

胃脾 食積疼痛 胃脾

瘰癧小兒食癖

小腸心主 兒疳疔血塊 小腸三焦

酒癖

胃三焦 瘰癧 小腸胃

血刺痛

肝脾 小兒脾瀉 脾腎

瀉腹痛

大腸胃 胃中刺痛 心

瘰癧心痛

心包絡

內關 右病公孫後取內關
穴手厥陰心包絡通陰維主病一十五證

中滿不快 心胃 傷寒 心主

心胃痞滿

肝胃 吐逆不定 脾胃

胃滯痰隔

肺心 腹滿 胃

泄瀉滑腸

大腸 酒痰隔痛 心主

米穀不化

胃 橫痃痰氣 肝胃

小兒脫肛

大腸肺 九種心痛 心主胃

脇肋痛

肝膽 婦人血刺痛 心肝

腸鳴

大腸 積塊痛 肝

男子酒癖

脾肺 二膈并心下痞痛 肝

心脾胃

氣膈食不下 胃心脾 腹肋脹痛

脾胃心主

腸風下血 大腸 傷寒結胃

胃

裏急後重 小腸 食膈不下

心主胃	右病證內關卷主之	痰瘧寒熱 亦瀉有
足跌腫痛	胃	手足麻
咽喉腫痛	三焦	手足挛急
脇肋痛	膽	牙齦痛
手足熱	胃心主	鮮利傷寒
腿膝痛	膽	腳膝腫痛
四肢不遂	膽	頭風腫
頭頂腫	膀胱	浮風搔癢
身體腫	腎胃	身體麻
頭目眩	膀胱	筋空骨痛
頰頭痛	大腸	雷頭風
眼目腫痛	肝心	中風手足不舉
耳聾	腎膽	
外關	右件病證臨之悉主之先取臨泣後取外關	
肢節腫痛	腎	臂膊冷痛
鼻衄	肺	手足發熱
手指節痛不能屈伸	三焦	眉棱中痛
手足疼痛	胃	產後惡風
傷寒有汗	胃肺	頭風
四肢不遂	膽胃	筋骨疼痛

迎風淚出	肝	赤日淚痛
腰背腫痛	腎	手足麻痛并無力
眼腫	心	頭風掉眩痛
傷寒未熱	膀胱	破傷風
手臂痛	大腸三焦	頭項痛
盜汗	心主	目翳或隱淚
產後身腫	胃腎	腰膝痛
雷頭風	膽	
後谿	右病證外關卷主之	
手足挛急	肝	手足顛掉
頭風痛	三焦膀胱	傷寒不解
盜汗不止	肺心	中風不語
牙齒痛	胃大腸	癩癩吐沫
腰背強痛	腎	筋骨痛
咽喉閉塞	腎脾胃	頰頭腫痛
傷寒項強或痛	膀胱	膝脛腫痛
手足麻	胃	眼赤腫
傷寒頭痛	膀胱	表汗不出
衝風淚下	肝膽	破傷風搐
產後汗出惡風	肺	喉痺
脚膝腿疼	胃	手麻痺
申脈	右病後谿穴主之先取後谿後取申脈	

腰背強痛	膀胱	肢節煩痛	腎肝
手足不遂	胃肺	傷寒頭痛	膀胱
身體腫滿	胃	頭面自汗	胃
癩癩	肝	目赤腫痛	膀胱
傷風自汗	胃	頭風痒痛	膽
眉稜痛	膀胱	雷頭風	膽
手臂痛	大腸	臂冷	三焦
產後自汗	腎	鼻衄	肺
破傷風	肝	肢節腫疼	腎肝
腿膝腫痛	胃	耳聾	腎
手足麻	膽	吹妳	胃
洗頭風	膀胱	手足挛	肝腎
產後惡風	腎		

右病申脉穴主之先取申脉後取後谿
列缺手太陽肺經通任脉合肺及脾系突龍胃曲主治三

產後不語	心包絡	米穀不化	脾
男子酒癖	胃肝	乳癰腫痛	胃
婦人血塊	肝腎	溢病不差	膽
吐逆不止	脾胃	小便下血	小腸
小便不通	膀胱	大便閉塞	大腸
大便下血	大腸	胃腸痛病	心胃
諸積穴主治	心胃		
喉龍閉塞	胃	小便冷痛	腎肝
小便淋澀不通	膀胱	婦人血暈	肝腎
膀胱氣痛	膀胱	胎衣不下	肝
臍腹痛	脾	小腹脹滿	小腸
腸澀下血	大腸	飲食不納反胃吐食	胃
男子癖并酒積	肺肝	腸鳴下痢腹痛	大腸
中滿不快	胃	食不化	胃
婦人血積	腎心	兒枕痛	胃肝
難產	腎肝	洩瀉	脾
嘔吐	胃	酒積	脾
痰氣	胃	氣塊	脾肝腎
酒癖	胃肝	氣膈	心主
大便不通	大腸	食勞黃	脾胃
足熱厥	心主		

右病照海卷之先取照海後取列缺

若法先刺主當之穴腫痛左右上下所刺之仍循捫道
引按法林除如病未已必求合穴未已則求之須要停針
待氣使上下相接快然無其所苦而後出鍼

按此八穴治法溥博亦許學士所謂廣絡原野冀獲一
免者也

子午流注膠穴開闢

勝甲日甲與己合勝引戊戌時竅陰膽膽丙子時前谷榮
戊寅時陷谷俞并過本原坵墟庚辰時陽谿大腸壬午
時委中絡甲申時氣合三焦

肝乙日乙與庚合肝引酉時大敦肝丁亥時少府心巳五時
辛卯時經渠肺癸巳時陰谷腎乙未血納包絡
小腸丙日丙與辛合小腸引丙申時少澤小腸戊

戌時內庭胃庚子時三間大腸過本原腕骨原壬
寅時兌谷脾甲辰時陽陵泉膽丙午時氣納三焦
心丁日丁與壬合心引丁未時少冲心巳酉時大都脾辛亥時

大淵肺癸丑時復溜腎巳酉時曲泉肝丁巳時血納三
焦

胃戊日戊與癸合胃引戊午時厲兌胃庚申時三間大腸
壬戌時束骨膀胱過本原衝陽胃甲子時陽輔膽
丙寅時小海合戊辰時氣納三焦

脾巳日巳與甲合脾引巳巳時隱白脾辛未時魚際肺癸酉時
大谿心己亥時中封肝丁丑時少海心巳卯時血納包
絡

大腸庚日庚與乙合大腸引庚辰時商陽大腸壬午時通

谷谿甲申時過本原合合丙戌時陽谷
小腸戊子時三里胃庚寅時氣納三焦大腸
肺辛日辛與丙合肺引辛卯時少商肺癸巳時然谷脾乙未
時太冲肝丁酉時靈道心己亥時陰谿腎辛丑時血
納包絡

勝壬日壬與丁合勝引壬寅時至陰脾甲辰
時俠谿脾丙午時後谿小腸過本原京骨水壬午時
相交壬與丁合戊申時解谿胃庚戌時曲池大腸壬子時氣納
三焦原

腎癸日癸與戊合腎引癸亥時湧泉腎乙丑時行間脾丁卯時
神門心巳巳時商丘脾辛未時尺澤脾癸酉時血納包
絡

三焦十二經之本生氣之原壬子時關冲三焦甲寅時
液門心丙辰時中渚心過本原陽池原戊午時支溝經
庚申時天井合壬戌時氣入行

心包絡心壬戌時氣入行
大陵心巳未時間使經辛酉時曲澤合癸亥血入行

右子午流注開闢時原有方圖一圖今直錄之以便
記誦舊方圖以甲巳為九乙庚為八丙辛為七丁壬
為六戊癸為五子午為九丑未為八寅申為七卯酉
為六辰戌為五巳亥為四圓圖無此而缺三焦包絡
大抵昔之有方所以彰明其理耳今反晦之是以不
錄○寶氏并命俞經合應日開闢有圖有說今人泥
其圖而不詳其說妄言今日某日某時某穴開九

病皆錄矣此開穴明日其日其時其穴開九百病鍼
灸明日開穴誤人多矣今去其圖直錄其說使人知
專病宜鍼灸其經其穴當用其日其時開方鍼如東
垣治前除臊臭刺肝經行間用乙丑時矣又刺少冲
則宜丁未日矣豈東垣治一病而首尾越四十三日
刺兩次哉此又不通之論也大抵醫自素難之下皆
為旁谿曲徑非周什也

臟腑并乘俞經合主治

假令得弦脉病人善索肺為清淨面青善怒此膽病也若
心下滿當刺數陰井身熱當刺挾谿體重節痛刺臨
泣俞喘效寒熱刺陽輔逆氣而洩刺陽陵泉合又總
取丘墟原

假令得弦脉病人淋波難轉筋四肢滿閉右有動氣此
肝病也若心下滿當刺大敦井身熱刺行間體重節
痛刺太衝俞喘效寒熱刺中封逆氣而泄刺曲泉合

假令得浮洪脉病人面赤口乾苦笑此小腸病也若心下
滿刺少澤井身熱刺前谷體重節痛刺後谿俞喘效

假令得浮洪脉病人煩心心痛掌中熱而腕脛上有動氣
此心病也若心下滿刺少衝井身熱刺少府體重節
痛刺神門俞喘效寒熱刺靈道逆氣而泄刺少海合

假令得浮緩脉病人面黃善噫善思善味此胃病也若心
下滿刺厲兌井身熱刺內庭體重節痛刺陷谷俞喘
效寒熱刺解谿逆氣而泄刺三里合又總刺衝陽原

假令得浮緩脉病人腹脹食不消體重節痛意嗜嗜
四肢不收當刺打動氣按之若痛此脾病也若心下
滿刺太白井身熱刺大都體重節痛刺太白俞喘效

假令得浮脉病人面白善噫悲愁不樂欲哭此大腸病也
若心下滿刺商陽井身熱刺二間體重節痛刺三間
喘效寒熱刺陽谿逆氣而泄刺曲池合又總刺合

假令得浮脉病人喘咳洒淅寒熱臍右有動氣按之牢若
痛此肺病也若心下滿刺少商井身熱刺魚際體重
節痛刺太淵俞喘效寒熱刺經渠逆氣而泄刺尺澤

假令得沉遲脉病人面黑善恐久此膀胱病也若心下滿
刺至陰井身熱刺通谷體重節痛刺束骨俞喘效寒
熱刺崑崙逆氣而泄刺委中合又通刺京骨原

假令得沉遲脉病人逆氣小腹急痛泄如下重足胫寒而
逆此腎病也若心下滿刺湧泉井身熱刺然谷體重
節痛刺太谿俞喘效寒熱刺復溜逆氣而泄刺陰谷合

此五臟六府并乘俞經合刺法深得素難之旨學者
不可不知

十二經是動所生病補瀉迎隨
經曰十二經病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留
之不盛不虛以經取之又曰迎而奪之隨而濟之又曰
虛則補其母實則瀉其子惟經曰經脉行血氣通陰陽

是動病

吉本強食則嘔胃脫痛腹脹意得後出
氣則快然如哀身體皆重光上胖

所生病

舌本痛體不能動搖食不下煩心下急痛
寒痰滯泄水閉黃疸不能臥強立膝股內
腫厥天大指不用○盛者寸口大三倍於人
迎虛者寸口小三倍於人迎也

補用

時 大都穴在足大指本節後中為氣火
商丘穴在足中踝下微前陷中為氣金

手少陰心

紅屬火起極泉終少冲多血少氣午時注此
是動病 心乾心痛渴而欲飲是為腎厥主心

所生病

目黃脇痛膈臂內後腋痛厥掌中熱○盛者
寸口大再倍於人迎○虛者寸口反小於人
迎也

補用

時 少冲穴在手小指內脈端去爪甲如韭
補其

瀉甲

時 靈道穴在掌後一寸五分為經金上生
金為子實則瀉其子

手太陽小

經屬丙火起少澤終聽官多血少氣未時注
此

是動病

嗌痛頰腫不可回顧肩似拔膈似折是主液
耳聾目黃頰腫頸項痛肘臂外後腋痛○

所生病

盛者人迎大再倍於寸口○虛者人迎反小
於寸口也

補用

時 後谿穴在手小指外則本節後陷中為
時 小海穴在手小指內大骨外則本節中

是太陽膀胱經為壬水起睛明終至陰多血少氣申時注
此

是動病

頭痛似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲
腦如結肺似裂是為蹠厥是主筋

所生病

痔瘡在顛頭顛頂痛目黃淡出眦項背腰
尻腫脚皆痛小指不用○盛者人迎大再
倍於氣口虛者人迎反小於氣口也

補用

時 至陰穴在足小指外則去爪甲角如韭
補其

瀉用

時 束骨穴在足小指外則本節後陷中為
足少陰腎經 屬癸水 起湧泉終命府 多血少氣酉
時注此

是動病

饑不欲食面黑如炭色效唾則有血嗚嗚而
喘坐而欲起目眦然如無所見心如懸鐵
狀氣不足則善恐心惕然如人將捕之是謂
骨厥是主腎

所生病

口熱舌乾咽腫上氣啞乾及痛煩心心痛黃
疸腸辟脊股內後腋痛痿厥者即足下熱而
痛○盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反
小於人迎也

補用

時 復溜穴在足內踝上二寸動脈陷中為
瀉用酉時 湧泉穴在足心陷中為井水生木木
子厥陰心包絡經 配腎大起天池終中冲多血少氣戌
時注此

是動病

手足熱臂肘掌骨酸腫甚則胃協支滿心中

所生病

手足熱臂肘掌骨酸腫甚則胃協支滿心中

補用

時 小海穴在手小指內大骨外則本節中

所生病 澹澹大動面赤口黃善笑不依是土心包絡

補 用亥時 迎虛者寸口反小於人迎

瀉 用戌時 大陵穴在掌後兩筋間腕中為創土火

是動病 耳聾渾渾痺痺咽腫喉痺是主氣

所生病 汗出目銳皆痛頰痛耳後有膿肘臂外皆痛

補 用子時 中渚穴在手小指次指本節後間為

瀉 用亥時 天井穴在肘外大骨後上一寸兩筋間

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

所生病 塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨

補 用子時 頭角鎖痛目銳皆痛笑益中腫痛液下腫馬

瀉 用亥時 刀按癭汗出振寒痲臂中脇筋解膝外至脛

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

所生病 塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨

補 用子時 頭角鎖痛目銳皆痛笑益中腫痛液下腫馬

瀉 用亥時 刀按癭汗出振寒痲臂中脇筋解膝外至脛

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

所生病 塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨

補 用子時 頭角鎖痛目銳皆痛笑益中腫痛液下腫馬

瀉 用亥時 刀按癭汗出振寒痲臂中脇筋解膝外至脛

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

補 用丑時 坎溪穴在足小指次指岐骨間木節

瀉 用子時 陽輔穴在足外踝上四寸輔前骨絕骨

是厥陰肝經 屬乙木起大敦終期門多血少氣丑時注

是動病 腰痛不可俛仰丈夫癩疝婦人小腹腫甚則

所生病 嗌乾面塵脫色是主肝

補 用寅時 曲泉穴在膝內輔骨下大筋上以筋下

瀉 用丑時 行間穴在足大指間動脈應手為榮火

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

所生病 塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨

補 用子時 頭角鎖痛目銳皆痛笑益中腫痛液下腫馬

瀉 用亥時 刀按癭汗出振寒痲臂中脇筋解膝外至脛

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

所生病 塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨

補 用子時 頭角鎖痛目銳皆痛笑益中腫痛液下腫馬

瀉 用亥時 刀按癭汗出振寒痲臂中脇筋解膝外至脛

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

所生病 塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨

補 用子時 頭角鎖痛目銳皆痛笑益中腫痛液下腫馬

瀉 用亥時 刀按癭汗出振寒痲臂中脇筋解膝外至脛

是少陽膽經 屬甲木 起腫于窠終竅陰多氣少血于

是動病 口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有

黃帝曰黃帝經云從下上者引而去之上氣不足推而
揚之蓋上氣者心脾上焦之氣陽病在陰從陰引陽去
其邪氣於膝理及毛也又云視前痛者當先取之是先
以膠刺瀉其經絡之壅者為血凝而不流故先去之而
治他病

東垣曰胃氣下溜五藏氣皆亂其為病互相出見黃帝曰
五亂刺之有道乎岐伯曰有道以來有道以去審知其
道是謂身寶帝曰願聞其道岐伯曰氣在於心者取之
手少陰心主之輸 神門大陵同精導氣以復其本位
氣在於肺者取之手太陰榮是少陰輸 魚際大淵○成
痿者以導濕熱引胃氣出陽道不令濕土尅腎其穴在
大絡

氣在於腸胃者取之足太陰陽明不下者取之三里章門
中腕三里○因足太陰虛者於募穴中導引之於血中
有一說腑輸去腑病也胃虛而致太陰無所稟者於是
陽明之募穴中引導之如氣逆為霍亂者取三里氣下
乃止不下復始

氣在於頭取之天柱大杼不足取之足太陽榮輸○通谷
深束谷深○先取天柱大杼不瀉以導氣而已取
足太陽勝腕經中不瀉不瀉深束谷束谷丁心火已
脾土穴中以引導去之

氣在於臂足取之先去血脉後其陽明少陰之榮輸○
二間三間深取之內庭陷谷深取之○視其足背之血
絡盡收之後治其虛者不瀉不瀉深束谷束谷丁心火已

之上者出也去也皆陰火有餘陽氣不足從陰引陽
者榮血也當從陰引陽先於地中升奉陽氣次瀉於
乃導氣同精之法

帝曰補瀉奈何曰徐入徐出謂之導氣補瀉無形謂之同
精是而非有餘不足也亂氣之相逆也帝曰尤乎哉道明
乎哉問請著之玉版命曰治亂也

東垣曰陰病治陽陽病治陰陰陽應象論云審其陰陽以
別其瀉陽病治陰陰病治陽定其血脈各守其鄉血實
宜火之氣虛宜掣引之○夫陰病在陽者是天寒外寒
之邪乘中而外入在人之背土腑膈膈膈是人之受天
外寒邪亦有二說中於陽則流於經此病始於外寒終
歸外熱故以治風寒之邪治其各臟之俞非止風寒而

已六淫濕暑燥火皆五藏所受乃筋骨血脈受邪各有
背上五臟膈以除之傷寒一說從仲景中八風者有風
論中暑者治在背上小腸俞中濕者治在胃俞中燥者
治在大腸俞此皆六淫客邪有餘之病皆瀉其背之
俞若病久傳變有虛有實各隨病之傳變補瀉不定以

治在背膈俞○另有上熱下寒經曰陰病在陽當從
引陰必瀉先去絡脈經隧之血若陰中火旺上騰於
致六陽反不衰而上充者先去五藏之血絡引而下
云氣降下則下寒之病自去矣慎勿獨瀉其六陽此病

陽充乃陰火之邪滋之只去陰火只損脈絡經隧之
勿誤也陽病在陰者病從陰引陽是水穀之寒濕感則
害人六腑又曰飲食失節及勞役形質陰火乘於脾

之中致穀氣氣清氣胃氣元氣不得上升流於六腑
 之陽氣是五陽之氣先絕於外者天也下流伏於坤
 土陰火之中皆先由喜怒悲憂恐為五賊所傷而後胃
 氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當從胃合三
 里穴中推而揚之以伸元氣故曰從陰引陽若元氣愈
 不足治在腹上諸腑之募穴若傳在五藏為九竅不通
 隨各竅之病治其各藏之募穴於腹故曰五藏不平乃
 六腑元氣閉塞之所生也又曰五藏不和九竅不通皆
 陽氣不足陰氣有餘故曰陽不勝其陰凡治腹之募皆
 為元氣不足從陰引陽勿悞也若錯補四末之膈錯瀉
 四末之餘錯瀉者差尤甚矣按岐伯所說只取穴於天
 上天上者人之背上五藏六腑之俞豈有生者乎與言
 及此寒心切骨若六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血
 脉之病錯取穴於胃之合及諸腹之募者必危亦岐伯
 之言下工不可不慎哉

東垣曰三焦元氣衰王黃帝鍼經云上氣不足腦為之不
 滿耳為之苦鳴頭為之傾目為之瞑中氣不足溲便為
 之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿厥心使補足外踝
 留之

東垣曰一富者前陰燥臭又因連日飲酒腹中不和求先
 師治之曰夫前陰是厥陰之脉絡循陰器出其挺末凡
 是者心之所主散入五方為五火入肝為臊此其一也
 當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少冲乃
 治其標

傷寒
 發熱
 風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致此表熱也陽氣下
 陷入陰分蒸薰此裏熱也

汗不出悽悽惡寒取王枕大杼肝俞兩道○身熱惡
 寒後谿○身熱汗出足厥冷取大都○身熱頭痛食不下
 取三焦俞○汗不出取合谷後谿陽池厲兌解谿風池○
 身熱而喘取三間○餘熱不盡取曲池○煩滿汗不出取
 風池命門○汗出寒熱取五處攢竹上腕○煩心好嘔取
 關商丘○身熱頭痛汗不出取曲泉○身熱進退頭痛
 取神道關元懸顛

六脉沉細一息二三至冬氣海關元○少陰發熱灸大谿
 惡寒
 有執惡寒者發於陽無執惡寒者發於陰
 背惡寒口中和多關元

惡風
 有汗為中風衛病無汗惡風為寒傷榮
 先刺風池風府却與桂枝葛根湯

胃腸滿
 邪氣自表傷裏必先自胃腸以次入心腹胃
 胃腸滿而譫語刺期門

結胃
 藏氣閉而不流布也按之痛為小結不按自痛為

大結

刺期門 刺肝俞 刺人因血結胃熱入血室刺期門
又以黃蓮巴菝七粒作餅子置臍中以火灸之得利為

效逆

胸中氣不交也水火相搏而有殺故效逆也

刺期門

小腹滿

物聚而滿上為氣下為溺與血小腹硬小便自利

其人如狂血溢也當出不出積而為滿

中必腹虛脹或腹中急痛刺括委中或奪命穴等處

煩躁

邪氣在裏煩為內不安躁為外不安

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰俞穴

畜血

熱毒流於下而瘀血者

少陰證下利便膿血者可刺○陽明病下血譫語必熱入
血室頭汗出者當刺期門

嘔吐

表邪傳裏乘氣上逆則為嘔吐

口中和脉微澀弱皆灸厥陰○脉經云金翼林氏本日灸

厥陰五十壯

戰慄

戰者正氣勝慄者邪氣勝邪氣勝者爭心戰而外慄

為病欲解也

心氣內盛正氣太虛心慄而鼓頸身不戰者已而遂成寒
逆者宜灸之

四逆

四肢逆冷而不溫積涼成寒六府氣絕於外四肢

手足寒冷足脛寒逆少陰也四肢厥冷身寒者厥

陰也

四逆灸 氣海 腎俞 肝俞

厥

手足逆冷陽氣伏陷熱氣逆伏而手足冷也

刺

龐氏曰脉促而厥者灸之

替胃

替為氣不舒胃為神昏不清即昏迷是也多虛極

乘寒所致或吐下使然

替胃刺太陽少陽并病頭痛或胃悶如結胃狀當刺大推
第一間及肺肝二俞慎不可汗

自利

不經攻下自澀澀

利脉微澀嘔而汗出必更衣反小者當溫上灸之以消

陰

小便吐利手中不冷反發熱脉不至灸少陰太谿穴

少陰下利便膿血者可刺之宜通用之

熱入血室

男子由陽而傷下血謔語婦人則隨經而入月

水適來邪乘虛入
七八日熱除而脉遲胃腸滿如結胃狀謔語此熱入血室
刺期門用甘草芍藥湯不已刺隱白

霍亂
上吐下利揮霍擦亂邪在中焦胃氣不治陰陽乖

隔遂上吐下利躁擾煩亂也
乾霍亂或腹中急痛絞刺宜刺委中及絞一奪命穴

腹痛
有實有虛寒熱燥屎積積按之不痛為虛痛為實

合灸不灸令病人冷結久而彌困氣冲心而死
刺括委中穴

陰毒陰證

陰病盛則微陽消在上故沉重四肢逆冷臍腹築
痛厥逆或冷六脉沉細

陰毒灸關元 氣海

太陽少陽併病
刺肺俞肝俞○如頭痛刺大椎

小便不利
邪畜於內津液不行

陰寒甚下閉者灸之○陰證小便不利必陰囊縮入小腹
痛欲死者灸石門
不仁
不赤打痺痛寒熱皆不知正氣為邪氣閉於經節

不散血氣虛少故也

若越人入診號太子尸厥以鬻胃不仁為可治刺之而濟
或者神醫之診也設脉浮洪汗如油喘不休體不仁越人
其能治哉也上見劉

雜病

風
大率主血虛氣虛火與濕多痰

中風神闕風池百會曲池翳風風市環跳肩髃皆可灸之
以繫數踈風又鍼以道氣

寒
見傷寒

陰寒及陷下脉絕者宜灸之

發熱

有寒潮熱煩熱往來熱
熱病汗不出 商陽 合谷陽谷 俠谿 厲兌 勞宮
腕骨以導氣○熱無度不止陷谷血以洩熱

腰痛

有實有虛有寒氣滯死血積熱風濕痰蘊疾食滯
疝疝

頭痛

實痛宜刺瀉之大衝 三陰交大白 大淵 大陵
邪客經絡藥不能及者宜灸 氣海 關元 中脘
有風風熱痰濕寒其頭痛手足青至節死不治
多踈散寒 鍼 脉浮刺腕骨 京骨 脉長合骨

<p>氣虛血虛腎病風濕濕熱厥寒氣滯 血滯於下委中出血○灸腎俞 崑崙 又用附子尖烏 頭大商呈麝香雄黃樟腦丁香煉蜜丸薑汁化開成膏效 手內熨熱摩之</p>	<p>脇痛 肝火盛木氣實有死血痰注肝急</p>	<p>心膈 中瀆</p>	<p>心痛 有風寒氣虛食積熱</p>	<p>大谿 然谷 尺澤 行間 建里 大都 太白</p>	<p>中腕 神門 湧泉</p>	<p>牙疼 主血熱胃口有熱風寒濕熱虫蛀</p>	<p>合谷 內庭 浮白 陽白 三間</p>	<p>眼目 肝氣實風熱痰熱血瘀熱血實氣壅</p>	<p>絲竹空 上星 百會 攢竹 宣洩 痛者風池 合谷</p>	<p>張子和治眼目神庭 上星 前頂</p>	<p>灸太寒犯腦連及目痛或風濕相搏風邪皆可有用有翳取 二間合谷○小兒疳眼灸合谷二穴各一壯</p>	<p>瀉痢 氣虛蕪寒熱食積風邪驚邪熱濕陽氣下陷痰積</p>
---	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------	---	--

<p>當分治瀉輕劑重</p>	<p>陷下則灸之脾俞 關元 腎俞 腹瀉 腹聚 長強</p>	<p>大谿 大腸俞 三里 氣舍 中腕 白濁大腸俞</p>	<p>赤小腸俞</p>	<p>有風若山嵐瘴氣食老瘡瘡母寒濕痺五疔瘡五 府瘡</p>	<p>鍼合谷 曲池 公孫</p>	<p>灸不拘男女於大椎中第一節處先鍼後灸三七壯立效 或灸第三節亦可</p>	<p>咳嗽 風寒火勞痰肺脹濕</p>	<p>灸天突 肺俞 肩井 少商 然谷 肝俞 期門</p>	<p>行間 廉泉 扶突</p>	<p>鍼 曲澤 出血 前谷 面赤熱欬支淋 多瞋三里</p>	<p>吐衄血</p>	<p>身熱是血虛血溫身熱者死不治</p>	<p>鍼隱白 脾俞 上腕 肝俞</p>	<p>下血 腸風多在胃與大腸</p>	<p>鍼隱白</p>	<p>灸三里</p>	<p>諸氣 怒則氣上驚則氣亂恐則氣下勞則氣散思則氣</p>
----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	--	------------------	--	---------------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------	----------------------	---------------------	---------------------------------	------------	------------	--

消其則氣緩思則氣結
鍼以導氣

淋

屬熱熱結痰氣不利胞邪為寒老人氣虛

灸三陰交

小水不禁
灸陰陵泉 陽陵泉

喉痺

鍼合谷 湧泉 天突 豐隆

灸初起傍灸之蓋亦鑿竅使外洩也頭腫鍼曲池穴

諸瘡

瘰癧灸并井 曲池 大迎

鍼緣唇瘡瀉去惡血

疝

有因寒因氣因濕熱痰積流下

灸大敦 三陰交 小腹下橫紋斜灸一壯

鍼大衝 大敦 跳骨

腳氣

有濕熱食積流注風濕寒濕

鍼公孫 衝陽

灸三里

痿

有濕熱有痰有無血而虛有氣弱有瘀血

鍼中瀆

眾跳 一付待氣

灸三里 肺俞

喘

有痰氣虛喘虛

灸中府 雲門 天府 華蓋 肺俞

惡心

因痰熱虛

灸胃俞 幽門 高丘 中府 石門 胃俞 陽關

膈噎

因血虛氣虛熱痰火血積癥積

鍼天突 石關 三里 胃俞 胃脘 膈俞 水分

氣海 胃俞

水腫

皮水正水石水風水因氣濕食

刺胃倉 合谷 石門 水溝 三里 復溜 曲泉

四滿

鼓脹

氣脹寒脹脾虛中滿

鍼上脘 三里 章門 陰谷 關元 期門 行間

脾俞 懸鐘 承滯

頭眩

痰挾氣虛火動其痰

鍼上星 風池 天柱

痛風

風熱風濕血虛有痰



也○內經云穀刺肺上出血○子和曰刺其面大出血
如刺三次血色變刺有額至順 針上下俱刺安隔
一日一刺刺至二十餘日方已劉氏曰委中皆可出血同
汗也

癩

劉氏曰此疾與中風顛狂小兒急慢驚相類原其所由或
在母腹中受驚或因聞入驚而得蓋小兒神氣尚弱驚則
神不守舍舍空則驚或飲食失節脾胃有傷積為痰
飲迷心竅治法以驚火尋疾而治丹溪曰不必分六畜
牛馬鷄犬大率主痰火

黎古云晝發灸陽路夜發灸陰路各二七壯○千金方疔
癩按圖灸之○一小兒四歲與長老念呪摩頂受記發瘡
後見皂衣人即發羅譙市先與灸兩路各二七壯次服沉
香天麻湯

傷寒

陰厥脈絕氣海凝結陰汗不止腹脹腸鳴面黑指甲青
石關 關元宜灸百壯 陽陵泉 黎古曰煩滿囊縮者
灸此 太谿灸七壯治少陰皆利手足不冷反發熱脈不
至者○劉氏曰大抵不可刺者宜灸之一則沉寒痼冷二
則無脈知陽絕也三則腹皮急而陽隔也合此三者餘皆
不可灸○醫學發明云陷下則灸之天地間陰陽二氣而
已陽在外在上陰在內在下今言陷下者陽氣下陷入陰
血之中是陰反居其上而獲其陽脈證俱見寒在外者則
灸之異法方直論云北方之人宜灸燭也為寒寒大旺伏

陽在內皆宜灸之以至理論則腎主藏陽氣在內冬三
月主閉藏是也若太過則病內宜灸燭此陽明陷入陰水
之中是也難經曰熱病在內取會之氣穴為陽陷入陰中
取陽氣通天之竅穴以火引火而通之此宜灸燭也若將
有病一禁灸之豈不悞哉如仲景云微數之脈慎不可灸
因火為邪則為煩逆逆者逐實而散脈中火氣雖微內攻
有力焦骨傷筋血難復也又云脈浮宜以汗解用火灸之
邪無從出因火而盛病從要以下必重而痺名火逆也脈
浮熱甚而灸之此為實實而虛虛治因火而動必咽燥噤
血又云身之穴三百六十有五其三十六穴灸之有害七十
九穴刺之為安并中髓也此仲景傷寒例

按明堂鍼經條下所說禁忌明矣內經云脈之所見邪之
所在脈沉者邪氣在內脈浮者邪氣在表世醫只知脈之

說而不知病證之禁忌若表見寒證身汗出常清數慄而
寒不渴欲覆厚衣常惡寒手足厥皮膚乾枯其脈必沉細
而遲但有一二證皆宜灸之陽氣陷故也若身熱惡熱時
見躁作或面赤黃咽乾盜乾口乾舌上黃赤時渴咽嗌痛
皆熱在外也但有一二證皆不宜灸其脈必浮數或但數
亦不可灸灸之災害立生若有鼻不聞香臭鼻流清涕或
欠或嚏惡寒其脈必沉是脈證相應也或輕手得弦緊者
是陰伏其陽也雖面赤宜灸之不可拘於面赤色而禁之
也

瘡

元成云凡人初覺發背結未結赤熱腫痛先濕紙覆

其上豆神似之其氣先乾處... 取大薄切成
 片如當三錢厚薄安於頭上用大艾炷之三壯即換一蒜
 片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方住最要早覺早灸為
 上一日二日十灸七活三日四日六七日活五六日三四活
 過七日則不可灸若有十數頭作一處生者即用大蒜研
 成膏作薄餅鋪其上聚艾於蒜餅上燒之可能活也若背
 上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨蒜切
 去兩頭取中間半寸厚正安於瘡上着艾灸十四壯多至
 四十九壯又曰灸而不痛痛而後上其灸灸而不痛者先
 及其積所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而
 後止其灸灸而痛者先及其未積所以痛次及將積所以
 不痛也○劉氏曰此謂離疽初發宜灸之也然諸瘡患久
 成漏者常有膿水不絕其濃不臭內無交肉尤宜用附子
 浸透切作大片厚二三分於瘡上著艾灸之仍服內托之
 藥隔三二日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有濃
 水惡物漸清根深者郭氏治用白麵疏黃大蒜三物一處
 搗爛着瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二
 十一壯一灸一易後隔四五日方用翠霞錠子并信効錠
 子互相用之紙入瘡內歹肉盡處好肉長平然後外貼收
 斂之藥內服應病之劑調理即差矣蓋不止宜灸於瘡之
 始發也大抵始發宜灸要汗下補養之藥對證至灸冷瘡
 亦宜內托之藥切當設有反逆不唯不愈致轉生他病
 也

日腦項麻木腫勢外掀揚醫遂取五香連翹至八日
 不可而云不可速療十八日得膿俟膿出用藥或砭刺三
 月乃可平四月如故予記醫經云凡瘡見膿九死一生果
 如其言則有束手待斃之悔矣乃請東垣診視且謂膏梁
 之變不當投五香五香已無及當先用火攻之然後用藥
 以大艾炷如兩核許者攻之至百壯乃覺痛次為處方云
 是足陽膀胱之經其病逆當及治以黃連消毒丸○身面
 疣癩實鑑云灸灸十壯即用醋摩雄黃塗紙上剪如螺
 螭蓋大貼灸處用膏藥重貼二日一易候癩折出尋如豈
 粉愈

水氣
 內經謂經脉滿則脉絡溢絡脉溢則繆刺之以調其絡脉
 使形容如舊而不腫故曰繆刺其處以復其形謹按繆刺
 謂不分俞穴而刺之也水熱論刺水穴分大法水溢於表
 或腹脹或四肢雖腫而氣稍實脉浮洪者宜行此至病氣
 孤危脉微弱而四肢小氣盛實者今人往往繆刺之禍不
 旋踵蓋不審經言脉滿經溢繆刺之理也

腳氣
 孫真人云古人無此疾自永嘉南渡衣冠之人多有之濕
 流足脛房事所致發明曰北方人飲酒醱濕熱之物所致
 有道以來有道以去治之以灸炳為佳以導引濕氣出外
 又察足之三陰三陽是何經絡所起○楊大受云脚氣是
 為壅疾當治以宣通之劑使氣不成壅既成而盛者砭惡
 而而去其重勢經曰高則腫熱砭射之也

喉痺

原病式曰痺不仁也俗作閉閉塞也火主腫脹故熱客上焦而咽噤腫脹也張戴人曰手少陰少陽二脉並於喉氣熱則內結腫脹痺而不通則死後人強立八名曰單乳蛾雙乳蛾單閉喉雙閉喉子舌脹木舌脹纏喉風走馬喉閉熱氣上行故傳於喉之兩旁近外腫作以其形似是謂乳蛾一為單一為雙也其比乳蛾差小者名閉喉熱結舌下復生一小舌名子舌脹熱結於舌中為之腫名木舌脹木者強而不柔和也熱結於咽喉腫繞於外且麻且癢腫而大者名曰纏喉風暴發暴死者名走馬喉痺八名雖詳皆歸之火微者鹹軟之大者辛散之至於走馬喉痺生死人在反掌間砭刺出血則病已嘗治一婦人木舌脹其舌滿

口令以鉗針鏡而小者砭之五七度三日方平計所出血幾盈斗○劉氏曰傷寒少陰病咽痛及生瘡不能言聲不出者用甘苦辛溫制其標病以通咽喉至若傷寒伏氣內發咽痛兼下利清穀裏寒外熱面赤脉微弱者用辛熱之藥攻其本病以順陰陽利止則水升火降而咽痛自無也此非雜病一陰一陽結為喉之比不可妄施鍼砭及寒涼之藥右是火熱喉痺急用吹藥點刺少商合谷豐隆陽泉關冲等穴

淋閉

原病式曰淋小便澀痛也熱客膀胱鬱結不能滲泄故也劉氏曰氣淋者小便澀常有餘瀝石淋者莖中痛尿不得卒下膏淋尿似膏出勞淋者勞倦即發痛引氣冲血淋遇

熱即發甚則溺血劉氏曰大抵從膀胱蓄熱而成灸法燂盪不拘多少熱填滿病人臍中却用筋頭大艾炷七壯或灸三陰交

眼目

東垣曰五藏上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束裏損筋骨血氣之精而與脉併為系目者五藏六府之精榮衛魂魄之所常營也神之所至也子和曰目之五輪乃五藏六府之精華宗脉之所聚其白屬肺金肉屬脾土赤屬心火黑水神光屬腎水兼屬肝木目不因火則不病白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也凡目暴赤腫起羞明隱

淚泪出不止暴寒目匡匡大熱之所為也在針則神廷上星顯會前頂百會翳者可便立退腫者可便立消惟小兒不可刺顯會肉分淺薄恐傷其骨目之內眥太陽膀胱之所過血多氣少目之銳眥少陽膽經血少氣多目之上網太陽經也亦血多氣少目之下網陽明胃經也血氣俱多然陽明經起於目兩旁交額中與太陽火火俱會於目惟足厥陰肝經連於目系而已故血太過者太吹吹明之實也血不及者厥陰之虛也故出血者宜太陽陽明血此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以血養目而已雀目不能夜視及內暴怒大夢所致皆肝血少禁出血止宜補肝養骨○劉氏曰內障有因於痰

熱氣鬱結血熱陽陰脫管所致腫腫病因古人皆不議况
外障之醫有起於內背外背睛上睛下睛中當視其翳色
從何經而來如東垣治魏邦彦夫人目翳綠色從下而上
瀉自陽明來也綠非五色之正殆肺腎合而成病也乃就
盡家以墨調膩粉合成色與翳同矣如論治之疾遂不作
○眼生倒睫拳毛者兩目緊急皮縮之所致也蓋內復熱
陰氣外行當去其內熱并火邪眼皮緩則毛出翳膜亦退
用手法攀出內臉向外速以三稜針出血以左手爪甲迎
其針鋒立愈○目眵久赤爛俗呼為赤瞎當以三稜鍼刺
目眶外以瀉濕熱而愈○劉氏曰外治鍼也以瀉熱內
治服藥以杜其原可也○偷鍼眼視其背上有細紅點如
瘡以鍼刺破即差實鮮太陽之鬱熱也

腰痛

東垣曰經云腰痛上寒不可顧取足太陽陽明腰痛上熱
取足厥陰不可俯仰取足少陽蓋足之三陽從頭走足足
之三陰從足入腹經所過處皆能為痛治之者當審其何
經所過分野循其孔穴而刺之審其寒熱而藥之假令足
太陽令人腰痛引項脊尻皆如重狀刺其郛中太陽二經
出血餘皆倣此劉氏曰王註經中言灸疑誤灸者宜腎俞
腰俞寶鑑云灸曲踈下兩文頭左右脚四處各三壯每灸
一脚二灸齊下午時著灸人定以來臟腑自動一兩行或
轉動如雷聲立愈

損傷

內經云人有所墮惡血留內腹中脹滿不得前後先飲

利藥此上傷厥陰之脈下傷火陰之絡刺足內踝下然骨
之前出血刺足跗上動脈不已刺三毛各一痛見血立已
左刺右右刺左○其脈堅強者生小弱者死

婦人

寶鑑曰一婦病傷寒過夜則見鬼許學士曰得病之初曾
值月經來否其家人曰經水方來而病作而遂止曰此熱
入血室小柴胡已遲刺期門請善鍼者治之而愈○乳癰
腫痛鍼三里穴五分其痛立止乳癰喉痺腫足跗不收
灸下廉三壯

女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脈緩者灸血海二
穴三壯

女子如妊娠赤白帶下婦人漏血不止腹脹滯不得息小
便黃如蠱及治腰痛如錐刺不得屈伸舌縱涎下煩逆爾

難小腹急引陰痛股內痛灸陰谷二穴

女子不月灸會陰三壯○婦人月水不利難產子衝心

痛不得息灸氣街七壯○婦人目事不利利即多心下滿

目眩眩不能遠視腹中痛灸水泉五壯○婦人月事不調

帶下崩中內產惡露不止繞臍疝痛灸氣海○婦人不及

月不調勻赤白帶下氣轉連背引痛不可忍灸帶脉二穴

○產後惡露不止及諸淋注灸氣海○產後兩脇急痛不

可忍灸石關五十壯○女子月事不調產後惡露不止繞

臍冷痛灸陰交百壯○帶下癢因產惡露不止斷產絕

下經灸關元百壯○婦人卒口噤語音不出風癩灸承

漿五壯○婦人產後血氣俱虛灸三海百壯○婦人疝氣

臍腹冷疼相引脇下痛不可忍先灸中廷三七壯

小兒小兒純毛針艾炷如小麥或雀糞大

寶鑑曰急慢驚風灸前頂若不愈灸攢竹人中各三壯

武疑急驚屬肝慢驚屬脾寶鑑不分灸前頂攢竹二

穴俱太陽督脉未詳其議

小兒慢驚風灸尺澤各七壯○初生小兒臍風撮口灸然

谷三壯或針三分不見血立效○小兒癩癩癢脊強互

相引灸長強三十壯○小兒癩癩驚盡目眩灸神庭一穴

七壯○小兒風癩先曲手指如數物乃發也灸鼻柱直髮

際宛宛中三壯○小兒驚瀾先驚怖啼叫乃發灸後頂上

旋毛中三壯及耳後青絲脉○小兒癩氣久不消灸章門

各七壯臍後脊中灸二七壯○小兒脇下滿瀉瀉重四

肢不收痲痺積聚腹痛不嗜食痲瘰寒熱又治腹脹引背

食飲多漸黃瘦灸十一椎下兩旁相去各一寸五分七

壯小兒黃疸灸三壯○小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形寒瘦

瘵諸方不差灸尾翠骨上三寸陷中三壯蒸三伏內用揚

湯水浴之正午時灸自灸之後用帛子拭見有瘡宜汗

出此法神効○小兒身羸瘦黃豚腹脹四肢懈惰背脊不

舉灸章門○小兒吐乳汁灸中庭一壯○小兒脫肛瀉血

秋深不効灸龜尾一壯○脫肛灸臍中三壯千金云隨年

壯○脫肛久不差及風癩中風角弓反張多哭語言不擇

發無時節盛則吐涎沫灸百會七壯

戒逆鍼灸無病而先鍼灸曰逆

小兒新生無病不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五

臍因喜成癩河洛關中土地多寒兒喜成瘰其生兒三月
多逆灸以防之吳蜀地濕無此疾也古方既傳之今人不
分南北灸之多害小兒也所以田舍小兒任其自然得無
天橫也

秦承祖灸鬼法

鬼哭穴以兩手大指相並縛用艾炷騎縫灸之令兩甲角

後肉四處着火一處不着則不効

按舟溪治一婦人久積怒與酒病癩目上視揚手躑足

筋牽喉響流涎定則昏昧腹脹痛衝心頭至胃大汗癩

與痛間作此肝有怒邪因血少而氣獨行脾受刑肺胃

間有酒疾為肝氣所悔而為痛酒性喜動出入升降入

內則痛出外則癩用竹瀝薑汁參木膏等藥甚多癩痛

間作無度乘痛時灸大敦行間中腕間以陳皮芍藥甘

草川芎湯調膏與竹瀝服之無數又灸太冲然谷巨闕

及大指甲肉且言鬼恠怒為巫者舟溪曰邪乘虛而入

理或有之與前藥佐以荆瀝防痰又灸鬼哭穴衣告我

自去餘証調理而安

鍼灸聚英卷之二終

鐵鍼

本草云馬御鐵無毒日華子云古禮錐者研式

武按本草鐵即鐵有毒用則無毒以馬爲
午屬火火道金解故用以鍼古曰金鍼者貴之
也又金爲總名銅鐵金銀之類也

煮鍼

危氏書云馬御鐵者一曰洗擇之無用止相
筒用烏... 二日洗擇之無用止相
沒藥... 兩又知前水煮一日取出用
皂角水... 內煮一日仍用皂角打... 宜於

子油塗帶近人氣爲妙

按煮鍼非素問意今依法煮之以解鐵毒此有益無害
也

火鍼

經曰焮鍼者以麻油... 焮者令多如大... 其焮火
焮針類以麻油... 焮針用方有功若不紅者反
損於人不能去... 焮針下恐油... 手先令
八燒針... 焮針之... 焮針似以
先以... 焮針之... 焮針似以
之便... 焮針之... 焮針似以
劑了... 焮針之... 焮針似以
深深則反傷經絡不可太淺也

也凡大醉之後不可行針不適淺深有害無利凡行火鍼
必先安慰病人令無驚心較之火針及灸灸則直守艾灼
燒過痛則久也火針雖則視之畏人其針下快疾一針便
去疾不久也以此則知灸壯候數滿是疾之久也火針止
是一鍼不再則痛過也凡行火針一鍼之後疾速便去不
可久留尋即以左手速按針孔上則疼止不按則疼甚凡
下針先以手按穴令端正類以眼視無差方可下鍼燒針
之人委令定心燒之恐視他處針冷治病無功亦不入內
也人身諸處皆可行針面上忌之凡季夏大經血盛皆下
流兩脚切忌妄行火針於兩脚內及足則潰膿腫疼難退
其如脚氣多發於夏血氣濕氣皆聚兩脚或誤行火針則
反加腫疼不能行履也當夏之時脚氣若發藥治無效不
免灸之每一穴上但可灸三壯初其病退壯數之年亦苦
不潰腫膿瘡亦易平火針者宜破癰毒發背潰膿在內外
皮無頭者但按腫軟不堅者以潰膿闊大者按頭尾及中
以點記宜下三針決破出膿一針腫上不可按之即以指
從兩旁捺之令膿隨手而出或腫大膿多針時須側身回
避恐膿射出汗身○孫氏曰凡下火針須隔一日報之報
之後當膿水大出疾則効矣凡癰塊結積之病甚宜火針
此非萬効之功火針甚妙於結塊之上須停針慢出仍轉
動其針以發出汚滯凡下大針經一宿身上發熱惡寒此
爲中病無害事也火針亦行氣火針惟假火力無補瀉虛
實之害惟怕太深有害餘則無妨氣針者有淺有深有補
有瀉候氣候邪之難不可誤行恐虛者反瀉實者不宣又

以為害世之製火針者皆謂馬師鐵思之令喜意也
惟是要久受火氣鐵針不生為上莫如火爐中用發火
製針為佳也初製火針必須一日一夜不住手以麻油燈
火頻頻燒如是終一日一夜方可施用凡治癱瘓充宜
火針易獲功效蓋火針大開其孔穴不塞其門風邪從此
而出若氣鍼微細一出其針針孔即閉風邪不出故功不
及火鍼灸者亦閉門起賊其門不閉邪無出處故也若風
濕寒二者在於經絡不出者宜用火針以外發其邪鍼假
火力故功效勝氣針也破癰堅積結癰等皆以火針猛熱
可用又如川僧多用煨針其針大於鞋針火針以火燒之
可用即九鍼之中之大鍼是也其針大於氣針故曰火針
者其功能治風邪入舍於筋骨間不出者宜用之火針之

次也 孫曰三針者是鋒針鉞鍼火針也火針即煨針也
按燒針法仲景以前多用之以致禍故傷寒書屢言之
知曰用燒針必驚燒針令汗針處被寒核起發奔豚加
燒針因胸煩之類今世或用以出癰膿為便

溫鍼
王節齋曰近有為溫針者乃楚人之法其法鍼於穴以香白
芷作圓餅套針上以艾蒸溫之多以取効然古者針則不灸灸則
不鍼未有針而加灸者此後人俗法也此法行於山野貧賤之
人經絡受風寒致病者或有効只是溫針通氣而已於血宜行
於痰無預也古針法最妙但今無傳恐不得精高之人誤用之
則危拙出枚頃刻唯灸得穴有益無害日後宜行之

折鍼

太平醫工鍼人而鍼折在肉中不出者壯解肝及腦
之又象牙主諸針及雜物入肉則取屑細研入水和傅上
立出肘後方鍼折肉中象牙屑水和付上立出
寶鑑湧針膏取針刺入肉并箭頭鼠頭十箇蜈蚣四十
九箇土消魚十箇羌青馬肉中蛆醬內蛆俱焙燥娘巴莖
信砒礪砂夏枯草磁石黃丹蘇木地骨皮各一兩石腦油
三兩蒿柴灰汁三升右將灰汁石腦油以文武火熬成膏
次下諸藥令勻磁器內收貯臨時用着瘡大小點藥良久
自然湧出

萬聖神應丹出針并箭頭鼠頭根今天仙子苗是也於端
午前一持不語尋上我科取酌中一科要根枝葉實全
道先生你在這裏那能龍用柴灰自東南頭圍了用木

篋撥取子根下土次日端午日未出依前不語用鏤只一
下取出用淨水洗了不令雞犬婦人見於靜室中石臼中
搗如泥丸如彈子大黃冊為末紙袋內封了懸高處陰乾
鍼箭不出者以緋絹袋盛一丸放在臍下用綿綵肚繫了
先用象牙末屑於傷處貼了後用此藥若瘡口生合用刀
子微割開以象牙末貼之

神聖膏取針入皮膚單脂不拘多少成膏子好攤紙上如
錢大貼之二日一換三五次鍼自出大有神効
烏翎散取鐵針入皮膚烏翎三五枝火灸焦為末好醋調
成膏塗瘡上紙蓋一兩次其鍼自出
按素問云鍼耀而勻示人臨病當檢視其針令光耀滑
澤勻直而無曲損也能守此訓自不致折矣又磁石能

引鍼入肉古人療折鍼雖多今倫錄於此宜隨輕重選用之

量鍼

濟生拔萃云有隨針而碎者何曰一則不知刺禁如刺中心一日死之類也二則不預候候如下利其脉忽大者死之類凡鍼灸者先須審詳脉候觀察病證然後知其刺禁其經絡穴道遠近氣候息數深淺分寸

金鍼賦云其或量針者神氣虛也以鍼補之以袖掩之口鼻氣熱湯與之畧停少頃依前再施

按以鍼補之以所內之鍼施補也以袖掩之掩其口毋令氣泄掩其面毋令迎風也

指微賦註云醫人添明氣血往來取穴部分不差補瀉得宜必無鍼暈昏倒之疾或惚忙之際畏刺之人多感此壯者氣行自己怯者當速救按假令鍼肝經感氣暈以補肝

經合曲泉穴之絡假令針肝絡血暈以補本經曲泉穴之經鍼入復甦効如起死除皆做此

劉宗厚曰暈鍼者奪命穴之男左女右取之不回却再取右女亦然此穴正在上清上側筋骨陷中蝦蟇兒上自肩至肘正在當中

按暈鍼三法指微賦有劉氏止言奪命穴而不言何經何絡今按此穴分八肺大腸脉分而古亦無奪命穴之名也

鍼灸傷

危氏書云治鍼灸傷以經絡脈血不止黃芪八兩當歸三兩

肉桂木香乳香別研沉香各一兩為末用菜菔粉四兩薑汁糊丸梧桐子大每服五十九不拘時候熱水下

煖鍼

素問遺篇註云用員利針針長針未刺時先口溫鍼煖而用之又曰先以口啣鍼令溫又曰毫針於人近體煖針至溫又曰著身溫之

按口體溫針欲針入經穴氣得溫而易行也今或投針於熱湯中亦此意耳口溫與體溫微有不同口溫者鍼頭雖熱而柄尚寒不若著身溫之則鍼通身皆熱矣

呼吸

素文註云按經之皆先補其氣乃瀉其邪也何以言之補法呼盡內鍼靜以久留此段瀉法吸則內鍼又靜以久留

然呼則次其呼吸至則不兼呼內鍼之候既同又留之理復一則先補之義昭然可知○拔萃云呼不過三吸不過五○明堂云當補之時候氣至病更用生成之息數令病人鼻中吸氣出自覺熱矣當瀉之時使氣至病所更用生成之數令病人鼻中出氣口中吸氣按所病臟腑之數自覺清涼矣

補瀉

素問遺篇補腎俞註曰用員利針刺時呪曰五帝上真六甲玄靈氣符至陰百邪閉理念三遍先刺二分留六呼次入針至三分動氣至而徐徐出針以手捫之令受鍼人咽氣三次又可定神魂者也瀉脾俞註曰欲下鍼時呪曰帝扶天形護命成靈誦之三遍通刺三分留七呼動氣至

按說法非素問意補註又王氏輩為之未足信但鍼工念呪則一心在鍼故曰如待所貴不知日暮也

懈注按云瀉法先以左手揣按得穴以右手置鍼於穴下令病人咳嗽一聲然鍼入腔理得穴令病人吸氣一口

針至六分覺針沉澁復退至三四分再覺沉澁更退針一豆許仰手轉針頭向病所以手循經絡捫循至病所以合

手以迎針引氣過鍼三寸隨呼徐徐出針勿閉其穴命之

曰瀉○補法先以左手端揣按得穴以右手置鍼於穴上

令病人咳嗽一聲然鍼入腔理得穴令病人呼氣一口將

針至八分覺針沉澁復退一分許如更覺沉澁仰手

轉針頭向病所依前循捫其病所氣至病已隨吸而走出

針速按其穴命之曰補○又曰夫行針者當刺之時口溫

在煖先以左手揣按所針榮俞之處彈而怒之瓜而下之

捫而循之通而取之隨病人咳嗽一聲右手持針而刺之

春夏二十四息秋冬三十六息徐出入氣來如動脈之

狀補者隨經脈推而內之左手開針孔徐出針而疾按之

○瀉者迎經脈動而伸之左手開針孔疾出針而徐按之

虛羸氣弱痿麻者補之豐肥堅硬疼痛者瀉之

按素問云候呼內針又曰候呼引針候伺候也蓋工

持針等候病人之呼吸而用針也今令病人呼吸是以

呼吸候針矣又曰令病人吹氣一口吸氣一口又是非

鼻中呼吸矣諺之甚也此補瀉尚得素難意

明堂註云寒熱補瀉假令補冷先令病人咳嗽一聲俾入

理復令吹氣一口隨吹下針至六七分漸進肝之部

針徐徐入後復退針一豆許然針問病人覺熱否然

後針至三分及心肺之部又令病人吸氣內針然針使

氣下行至病所却外然針使氣上行直過所鍼穴一二寸

少吸而外然針出以手速按其穴此為補○夫病熱者治

之以寒何如須其寒者先刺入陽之分後得氣推內至陰

之分後令病人地氣入而天氣出謹按生成之息數足其

病人自覺清涼矣夫病惡寒者治之以熱也何如須上熱

者先刺入陰之分候得氣徐引鍼至陽之分後令病人天

氣入而地氣出亦謹按生成之息數足其病自覺和煖矣

十四法

動者如氣不行將針伸提而已○退者為補瀉欲出鍼時

各先退針一豆許然後却留針方可出之○搓者凡令病

人覺熱向外針似搓線之狀勿轉太緊治寒而稟針針前

轉法以為搓也○進者凡不得氣男外女內者及春夏秋

冬各有進退之理○盤者如針腹部於穴內輕盤搓而已

○搓者凡瀉時欲出針必須動搓而後出○彈者凡補時

用指甲輕彈使氣疾行也如瀉不可用○撚者以手撚

針也務要記夫左右為外右為內○循者凡下針於部

分經絡之處用手上下循之便氣血往來經云推之則行

引之則止○捫者凡補者出鍼時用手捫閉其穴也○攝

者下鍼時得氣澁滯隨經絡上大指甲上下切其氣血自

得通行也○按者以手按針無得進退如按切之狀○瓜

者凡下針時手指作方置針有准也○切者凡下針必先

用大指甲左右於穴切之令氣血宜散然後下針使不傷於榮衛也

按此十四法所謂進退動搖彈捫攝循切按爪皆素問鍼法搖然非素問法也

八法

金鍼賦云一曰燒山火治頑麻冷痺先淺後深用九陽而三進三退慢提緊按熱至緊閉插針除寒之有準也二曰透天涼治肌熱骨蒸先深後淺用六陰而三出入緊提慢按寒則徐徐舉針退熱之可憑皆細細搓之去病准繩三曰陽中之陰先寒後熱淺而深以九六之法則先補後瀉也四曰陰中之陽先熱後寒深而淺以九六之法則先瀉後補也補者宜瀉熱至瀉者務待寒侵猶如搓線慢慢

轉針在淺則用淺法在深則用深法二者不可兼而兼之也五曰子午攝曰水壘隔氣落穴之後調氣均勻針行上下九入六出左右轉之千遭自平六曰進氣之訣腰背肘膝痛渾身走注寒刺九分行九補卧針五七吸待氣上行亦可龍虎交戰左撚九而右撚六是亦住痛之針七曰留氣之訣痲痺癢癢刺七分用純陽然後乃直插針氣來深刺提針再停八曰抽添之訣癱瘓癩癩取其要穴使九陽得氣提按搜尋大要運氣週通扶針直插復向下納回陽倒陰指下玄微胃中活法一有未應反復再施

四法

按此八法巧立名色非難素意也

苦龍尾如扶龍龍不進不逮一左一右慢慢撥動二曰白虎搖頭似手搖鈴是方進其燕之左右搖而探之三曰蒼龜探穴如入土之家一退三進鎖剔四方四曰赤鳳迎源展翅之儀入鍼至地提鍼至天候鍼自搖復進其元上下左右四圍飛旋病在上吸而退之病在下呼而進之按此法亦巧立名色而已求鍼之明焉鍼之晦

下鍼法

金鍼賦云先瀉瓜按重而切之穴令咳嗽一聲隨咳下鍼凡補先呼氣初針刺至皮肉乃曰天才少停進針刺至肉丙是曰人才又停進針刺至筋骨之間名曰地才此為極處就當補之再停良久却須退針至人之分付氣沉緊倒針朝病進退往來飛經走氣盡在其中矣凡瀉者吸氣初針至天少停進針直至於地得氣瀉之再停良久却須退針復至於人待氣沉緊倒針朝病法同前矣○及夫調氣之法下針至地之後復人之分欲氣上行將針右撚欲氣下行將針左撚欲補先呼後吸欲瀉先吸後呼氣不至者以手循攝以瓜切指以針搖動進撚搖彈直待氣至以龍虎升騰之法按之在前使氣在後按之在後使氣在前運氣走至疼痛之所以納氣之法扶針直插復向下納使氣不回若關節沮滯氣不達者以龍虎龜鳳通經接氣大段之法馳而運之仍以循攝瓜切無不應矣此通仙之妙按素問有淺深法而此曰天地人三才者是亦九鍼論意也

意也

醫經小學云先說平鍼法含鍼口內溫按揉令氣散指穴

放教深持鍼安穴上令他嗽一聲隨嗽歸天部停鍼再至
人再停歸地部待氣候鍼沉氣若不來至指甲切其經次
提鍼向病鍼退天地人 補必隨經刺令他吹氣頻隨吹
隨左轉逐歸天地人待氣停鍼久三彈更發溢出鍼口吸
氣急急閉其門瀉欲迎經取吸則納其鍼吸則瀉右轉他
次進天人轉鍼仍復吸依法再停鍼出鍼吹出氣搖動大
其門

出鍼法

金鍼賦云病勢既退鍼氣微鬆病未退者鍼氣如根推之
不動轉之不移此為邪氣吸拔其針乃真氣未至不可出
之出之者其病即復再瀉補當停以待之直候微鬆方可
出鍼豆許搖而停之補者吸之去疾其穴急捫瀉者呼之

去徐其穴不閉欲令湊密然後吸氣故曰下針貴遲大急
傷血出針貴緩大急傷氣劉守厚曰出針不可猛出必瀉
作三四次徐徐轉而出之則無血若猛出必見血也

人身左右補瀉不同

神應經曰人身左邊右手以大指進前推針為補大指退
後推針為瀉右邊以右手大指退後推針為補進前推針
為瀉

然針左右已非素問意矣而人身左右不同謬之甚也

男女氣血

金鍼賦云男子之氣早在上而晚在下取之必明其理女
子之氣早在下而晚在上用之必明其理午為早屬陽
午後為晚屬陰男女之氣不同也

按針灸當隨經絡氣至十二時候如寅肺卯大腸經之
類男女所同男女氣血上下之分固非素難意亦不必
然也

古人有不行鍼知鍼理

一婦人患熱入血室醫者不識用補血藥數日成結曾證
許學士曰小柴胡湯已遲不可行也刺期門子不能鍼
請善鍼者鍼之如言而愈

鍼灸藥皆醫家分內事後世分門專科之醫出而各有
所長矣

艾葉

本草云艾味苦氣微溫陰中之陽無毒主灸百病○三月
三日五月五日採暴乾陳久者良○又辟惡殺鼠又採艾
之法取五月五日火旺之時灼艾有功效製艾先要如法令
乾燥入臼搗之以細篩去塵屑每入石臼搗取潔白為上
須令焙太燥則灸有力火易然如潤無功

證類本草云出明州圖經云舊不著所出州土但云生田
野今在處有之以複道者為佳初春布地生苗莖類蒿而
葉背白以苗短者為佳○或灸諸風冷痰入碗黃末亦可
○孟子云七年之病求三年之艾○丹溪云艾性至熱入
火灸則上行入藥服則下行

艾炷大小

千金云黃帝曰灸不三分是謂徒寬炷務大也小弱乃小
作之○又曰小兒七日以上周年以還炷如雀糞○明堂
下經云九灸欲炷根下廣三分若三分即火氣不能達

病未能愈則是艾炷欲其大惟頭與四肢欲小耳明堂一
經乃曰艾炷依小筋頭作其病脉粗細狀如細絲但今當
脉灸之雀囊大炷亦能愈疾又有一途如腹中疝瘕瘵癯
伏氣氣等准須大艾炷故小品曰腹背爛燒四肢則但去
風邪而已不宜大熱如巨闕鳩尾灸之不過四七炷祇依
竹筋頭大但令正當脉灸之艾炷若大復多其人永無
心力如頭上灸多令人失精神背脚灸多令人血脉枯竭
四肢細而無力既失精神又加細節令人短壽○正節齊
曰面上艾炷須小手足上則可粗

點艾人

下經云古來灸病忌松柏枳橘榆棗桑竹八木火切宜避
之有火珠耀日以艾承之得火次有火鏡耀日亦以艾引
得火此火皆良諸部落用鑊鐵擊塔石得火以艾引之
凡倉卒難備即不如無木火清麻油點燈上燒艾葉點灸
兼滋潤灸瘡至愈不疼用蠟燭更佳○良方云凡取火者
宜敲石取火或水精鏡於日得太陽火為妙天陰則以槐
木取火今行舟人以鐵鈍刀擊石以紙灰為丸在下承之
亦得火

按周禮夏官司燿掌行火之政令四時變國火以救時
疾鄒子曰春取榆柳之火夏取棗杏火季夏取桑柘之
火秋取柞櫟之火冬取槐檀之火饒氏曰此古人替化
育之一事艾葉點火只依取五火而已秦漢而下醫家
不識此意

壯數多也

千金云凡言壯數者若... 壯數深篤... 借於方數老...
羸弱可減半又曰小兒七以上周年以上不過七壯扁
鵠灸法有至三五百壯千壯曹氏灸法有百壯有五十壯
小品諸方亦然惟明堂本經云針入六分灸三壯更無餘
治故後人不準惟以病之輕重而增損之凡灸頭項止於
七壯積至七七壯止人若治風則灸上星前頂百會至二
百壯腹背宜灸五百壯若鳩尾巨闕亦不宜多灸但去風
邪不宜多灸灸多則四肢細而無力明千金方於足三里
穴乃云多至三二百壯心俞禁灸若中風則急灸至百壯
皆視其病之輕重而用之不可泥一說而不知其又有一
說也下經只云若是禁穴明堂亦許灸一壯至三壯恐未
盡也

阿是穴

千金云凡官遊吳蜀體上常須三兩處灸之切令痛若
則瘴癘溫瘧毒不能著人故吳蜀多行灸法有阿是穴之
法言人有病即令按其上若裏當其處不問孔穴即得使
快成痛處即云阿是灸刺皆驗故云阿是穴

治灸瘡令發

資生云凡著艾得瘡發所患即差不得發其病不愈甲乙
經云灸瘡不發者用故覆底灸令瘡發之三日即發今用
赤皮菰三五莖去青於煨灰中煨破拍破熱瘡十餘遍
其瘡三日自發于見人灸瘡不發者頻用生麻油漬之而
發亦有用皂角煎湯候冷... 瘡亦不... 氣血衰不
發於冬前後煎四物湯...

稟論也予常灸三里各七壯數日過不發再灸二壯右足發左足不發更灸左足一壯遂發亦在人以意取之若順其自然則終不發矣此人事所當盡也

按寶鑑云氣不至而不效灸之亦不發蓋十二經應十二時其氣各以時而至故不知經絡氣血多少應至之候而灸之者則瘡不發世醫莫之知也惜哉若壯實人不候時而灸亦發

洗灸瘡

九著灸住火便用赤皮蔥薄荷湯溫洗瘡周圍約一二尺令驅逐風氣於瘡口出更令經脈往來不滯自然瘡疾愈若灸瘡退痂後用東南桃枝青嫩皮煎湯溫洗能護瘡中諸風若瘡內黑爛加胡荽煎若瘡疼不可忍多時不效加黃

連煎神效

貼灸瘡

資生云貼灸瘡春用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬用兔腹上白細毛猶兕腹毛更佳今人多以膏藥貼之日三兩易全不疼但以膏藥貼則易乾爾若要膿出多而疾除不貼膏藥尤佳

按柳絮竹膜兕毛貼瘡恐乾燥作疼而太乙膏善應膏又有不對症藥皆不宜今只用白芷乳香當歸川芎等香油另煎膏藥貼之為要

小兒戒逆灸

千金云小兒新生無疾慎不可逆針灸之如逆針灸則恐其動其五臟因氣逆河間關中土此多寒兒喜病瘥其

生兒三日多逆灸以防之灸頰以防喉不噤者舌下厥急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血灸頰以防噤也吳蜀地溫無此疾也古方既傳之今人不許南北之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒任其自然皆行無橫夭也

相天時

千金云正午以後乃可灸謂陰氣未至灸無不著午前平旦穀氣虛令人癩眩不可針灸卒急者不可用此例○下經云灸時若遇陰霧大風雪猛雨炎暑雷電虹霓倏候晴明再灸急難亦不拘此

按日正午氣注心經未時注小腸經止可灸極泉通靈少海靈道通里神門少府少冲少澤前谷後谿腕骨等穴其餘經絡各有氣至之時故寶鑑云氣不至灸之發

千金所云午後灸之言恐非孫真人口訣也

忌食物房勞

資生云既灸忌食猪魚熱麵生酒動風冷物鮮肉取毒而房勞尤忌

按既灸之後當茹淡使胃氣和平血氣流通疾病隨艾氣驅出若厚味醉醜則血氣亂生痰涎阻滯病氣而不得驅逐房勞則損精神血脈故當守禁忌丹溪有茹淡論相火論讀不獨鍼灸為然也

避人神

千金云欲行針灸先知行年宜忌及神人所在不與禁忌相應即可故男忌除女忌破男忌戌女忌巳有日神忌有

每月忌有十二時忌有四時人神有十二部人神有十二部年人神有九部傍通入神有雜忌傍通入神有血支血忌之類凡醫者不能知此避忌若逢病人厄會男女氣怯下干至用通人達士豈拘此若遇卒急暴患不拘時法許希亦云卒基之疾須速灸療一日之間止忌一時是也千金云癰疽疔腫喉痺客忤尤為急凡作湯藥不可避凶日覺病須臾即宜便治又曰凡人卒暴得風中時氣凡百所苦須急救療久後皆難愈此論其當夫急難之際命在須臾必在吉日後治已淪於鬼錄此所以不可拘忌也惟平居治病於未形選天德月德等日服藥針灸可也

千金方云凡點灸法坐點穴則坐灸卧點穴則卧灸立點穴則立灸瀆四體平直毋令傾側若傾側穴不正徒破好肉耳

明堂云瀆得身體平直毋令脊繩坐點毋令俯仰立點毋令傾側

炷火先後
養生云千金方言凡灸當先陽後陰言從頭向左而漸下次從頭向右而漸下先上後下○明堂云先灸上後灸下先灸少後灸多皆宜審之○王際齋曰冬火瀆自上而下不可先灸下後灸上

鍼灸避忌太乙之圖序
鍼經曰太乙日遊以冬至之日始居叶蟄之宮從其宮數所在日從一處至九日復反于一帶如是無已周而復始

此太乙日遊之法也奈何行鍼之士無所知者遂將六直之日偏於庚圖始有八節得王之日從其宮至所在之處首一終九日徙一宮至九日復反于一週而復始如是次而行之計每宮各得五日九之則一節之日悉備今于一條次條細開其於逐宮之內使觀者臨圖即見逐節六之所直之日有何宮內乃知人之身體所忌之處庶使行針之士知四避之理入無忤犯太乙之凶乃僕之本意也

冬至叶蟄宮說

冬至叶蟄宮圖周身之法取九宮方位為上部中五為中部次為下部巽坤為二看臂窠尤為左右脇乾艮為左右二足太乙遊至處禁忌鍼灸若起叶蟄取冬至一日為首他皆倣此

太乙	忌戊申巳午	立秋	忌辛酉	秋分
血忌	忌丙午	夏至	忌諸戌巳	忌壬子
之圖	上天宮	九	四	三
	忌戌辰巳丑	立春	忌乙卯	春分
	天宮	八	四	三

按冬至叶蟄宮圖載於素問者止言八方之氣有應其時而生物違其時而生病又刺癰曰身有癰腫者欲治之無以其所直之日潰之今日謂諸鍼灸皆忌之是與素問不合

月內神人所在

一日在足大指厥陰分刺之附腫
二日在足外踝少陽分刺之經筋緩

三日在股內少陰分刺之小腹痛
四日在股太陽分刺之腰使無力
五日在口太陰分刺灸之舌強
六日在兩手陽明刺之咽喉不利一云在足小指
七日在內踝少陰分刺灸之陰經筋急
八日在手腕太陽分刺灸之腕不收
九日在尻厥陰分刺灸之病結
十日在腰背太陽分刺灸之腰背使
十一日在鼻柱陽明分刺灸之齒面腫
十二日在髮際少陽分刺之令人耳重聽
十三日在牙齒少陰分刺灸之氣寒
十四日在胃脘陽明分刺之氣腫
十五日在過身不宜補瀉針灸大忌
十六日在胃太陽分刺之逆息
十七日在氣衝陽明分刺之難息
十八日在股內少陰分刺之引陰氣痛
十九日在足跌陽明分刺灸之發腫
二十日在內踝少陰分刺之經筋挛
二十一日在手小指太陽分刺之不仁
二十二日在足外踝少陽分刺之經筋緩
二十三日在肝及足厥陰分刺之發轉筋
二十四日在手陽明分刺灸之咽喉中不利
二十五日在足陽明刺灸之胃氣脹
二十六日在胸太陰分刺灸之令人喘嗽

二十七日在膝陽明分刺灸之足經厥逆
二十八日在陰少陰分刺之小腹急痛
二十九日在膝脛厥陰分刺之筋痿少力
三十日在足跌皆忌針灸
按內經素問無此說
每月血支
正月丑二月寅三月卯四月辰五月巳六月午七月未八月申九月酉十月戌十一月亥十二月子
每月血忌
正月丑二月未三月寅四月申五月卯六月酉七月辰八月戌九月巳十月亥十一月午十二月子
十二支神人
子丑丑耳寅胸卯齒辰腰巳手午心未足申頭酉喉戌陰亥脛
十二部神人
建日在足禁晡時 除日在眼禁日入 滿日在腹禁黃昏
平日在背禁人定 定日在心禁夜半 執日在手禁鷄鳴
破日在 禁平旦 危日在鼻禁日出 成日在唇禁食時
收日在頭禁寅中 開日在耳禁午時 閉日在口禁日昃
十二時忌
子在踝 丑在頭 寅在耳 卯在面 午在胸 未在腹
申在心 酉在背 辰在項 巳在腰 亥在股 戌在
十二部神人
一歲 十三 廿五 卅七 四十九 六十一 七十二

十一月巳日十二月辰日

胡侍即奏過死神指訣

二歲 十歲 十九 廿八 卅七 四六 五五 六四

七三 八二 坤管义蹠

三歲 十歲 二十 廿九 卅八 四七 五六 六五

七四 八三 震管牙喘

三歲 十歲 廿一 卅 卅九 四八 五七 六六

七五 八四 巽管頭口乳

四歲 十歲 廿二 卅一 四十 四九 五八 六七

七六 八五 中宮管膺及尾窮骨

五歲 十歲 廿三 卅二 卅一 四一 五〇 五九 六八

七七 八六 乾管背面耳

六歲 十歲 廿四 卅三 卅二 四二 五一 六〇 六九

七八 八七 兌管手膊

七歲 十歲 廿五 卅四 卅三 四三 五二 六一 七十

七九 八八 艮管腰項

八歲 十歲 廿六 卅五 卅四 四四 五三 六二 七一

八〇 八九 離管脉肋

九歲 十歲 廿七 卅六 卅五 四五 五四 六三 七二 八一

九一 次管脚肘肚

一歲十歲起二宮順行日逐神人就甲子內檢死神者
神農之所制也凡人年命巡行九宮值此死神所在不
可針灸犯者必至喪命或生癰疽宜速急醫治急病不
拘此例又曰凡醫者不知此諸般避忌趨吉避凶妄亂

針灸非惟不能愈疾甚者或至傷生喪命為害非輕也
逢病人年命厄會身氣怯下手至難通人達人若
遇卒急暴患何暇選擇避忌即不可拘此

按以上諸禁忌惟四季所忌似合素問其餘不知何
時何人所起如所謂死神神者果有之則不分病
輕重犯之常有禍今又曰卒急何暇選擇此時人神
死神亦憫病危而不禍乎又按尻尾底骨即腎大曰
死神則是腎尖神矣何人之一身獨腎尖為神乎是
皆不可曉者也以俟能知者

鍼灸聚英卷之三終

鍼灸聚英卷之四

十四經穴歌

手太陰十一穴中府雲門天府列俠白尺澤孔最臑臂臑缺

經渠大淵淺魚際如韭葉

手陽明起商陽二間三間合谷歲陽谿偏歷溫溜下廉

上廉三里長曲池肘膠迎五里臂臑肩髃巨骨當天髀

扶突禾膠接終以迎香二十六

四十五穴足陽明承泣四白巨膠經地倉大迎頰車峙下

關頭維人迎對水寒氣含連缺盆氣戶庫房屋翳颯也胃

迎乳中廷乳根不容承滿梁門起關門太乙滑肉門天

樞外陵大巨存水道歸來氣衝次髀關伏兔走陰市梁

丘犢鼻足三里上巨虛連條口位下巨虛位及豐隆解

谿街陽陷谷中內庭厲兌經穴終

二十一穴太陰脾隱白大都太白隨公孫商丘三陰交漏

谷地機陰陵切血海箕門衝門開府合腹結大橫排腹

哀食竇連天谿胸鄉周榮大包隨

九穴手少陰極泉青靈少海深靈道通里陰郄遂神門小

府少冲尋

手太陽穴一十九少澤前谷後谿陽腕骨陽谷可養老支

正少海有貞走臑俞天宗及秉風曲垣肩內復肩中天

窓天容上顙膠却入耳中循聽宮

足太陽六十三睛明攢竹曲差參五處承光上通天絡却

王枕天柱靳大杼風門引肺俞厥陰心俞兩俞注肝俞

臍俞脾俞合胃俞三焦腎俞中大腸小腸膀胱俞中膈

白環兩俞輪自從大杼至白環相去脊中三寸間上髀

次髀中復下會陽承扶掖門惡浮郄委陽委中鐘髀內

夾脊附分當太陽行背第三行魄戶膏肓與神堂諶諶

兩關魂門旁陽綱意舍仍胃倉育門志室胞之育二十

椎下秩邊藏合膈以下合陽是承筋承山居其次飛揚

附陽洎崑崙僕參申脉連金門京骨束骨又通谷小指

外側至陰續

足少陰穴二十七湧泉然谷太谿溢大鍾照海通水泉復

溜交信築賓連陰谷橫骨大赫赫氣穴四滿中注立育

俞商曲石關蹲陰都通谷幽門僻步即神封靈墟位神

藏或中俞府既

九穴手厥陰天池天泉曲澤深都門間使內關對大陵勞

宮中衝備

二十三穴手少陽關衝液門中渚旁陽池外關支溝會會

宗三陽四瀆配天井上合青冷淵消燦臑會有膠偏天

膠天臑同翳風瘰脈臑息角孫通耳門禾膠絲竹空

少陽足經童子膠四十三穴行迢迢聽會客主領厥集懸

顧懸翬曲髮翹率谷天衝浮白次竅陰完骨本神企陽

白臨泣開目窓正營承靈及腦空風池肩井淵液長輒

筋日月京門當帶脉五樞維道續居竅環跳下中瀆陽

關陽道復陽交外丘光明陽輔高懸鍾丘墟足臨泣地

五俠谿竅陰畢

足肝經十三穴大敦行間大冲列中封蠡溝及中都膝關

曲泉膝內微陰包五里上陰廉章門期門貫上膈

督脉脊中行二十七穴始長強腰俞陽關命門富懸柱脊
一 中走筋束至陽靈臺神道長身性剛道大椎前庭門風
一 府腦戶俱強間後頂百會前頂顛會上星圓神廷素
一 膠水溝裏九端巖交斯已矣

任脉分三八起於會陰上曲骨中極關元到石門氣海陰
交神闕立水分下脘循建里中脘上脘巨闕起鳩尾中
庭竈中萃玉堂紫宮樹華蓋璇璣天突廉泉清上願還
以承漿承

右十四經穴歌順經編叶有起止次序滑氏所撰者
比之徐廷瑞周身經穴賦過之遠矣

十四經步穴歌

太陰肺兮出中府雲門之一寸許雲門氣戶旁二寸人

迎之下二骨數天府腋下三寸求夾白肘上五寸主尺
澤肘中約文論孔最腕中七寸 取列缺腕側一寸

半經渠寸口陷中 是太淵掌後橫紋頭魚際節後
本節 散脉舉少商大指內側端此穴若鍼疾減愈

手陽明經屬大腸食指內側起商陽本節前取二間定本
節後取三間強歧骨陷中尋合谷陽谿腕中上側詳腕後

三寸是偏歷五寸之中溫溜當下廉上廉各一寸上廉此
下一寸方屈肘曲中曲池得池下二寸三里場肘窩大骨

外廉陷五里肘上三寸量臂臑下一寸取有髃肩端兩
骨當巨骨有端又骨內天髀缺金之上鍼扶突曲頰下一

寸和膠五分水溝傍鼻孔兩傍各五分左右二穴皆迎香
○ 經兮足陽明承泣目下七分尋四白一寸不可深

巨髃鼻孔傍八分地倉夾吻四分近大迎曲頰車前寸三
頰車耳下八分針下刺下動脈者頭維本神寸五取人
迎候傍大脉真水突在頰大筋下直至氣舍上人迎氣舍
迎下扶天穴缺盆橫骨陷中觀氣戶俞府傍二寸至乳六
寸又四八庫房旁弱膺窓近乳中正在乳頭心次有乳根
出乳下各一寸六不相侵穴夾幽門一寸五是穴不容依
法數共下承滿至梁門關門太乙從頭舉節次續排滑肉
門各各一寸為君數天樞穴在夾臍傍外陵距下一寸當
二寸大巨五水道歸來七寸以尋將氣冲曲骨傍三寸來
下氣衝脉中央髀關免後六寸分伏兔市上三寸強陰市
膝上三寸許梁丘二寸得共場膝臑肝上尋犢鼻膝下三
寸求三里里下三寸上廉地條口上廉下一寸下廉條下

一寸係豐隆下廉外一寸上踝八寸分明記解谿衝陽後
寸半冲陽陷上二寸係陷谷內庭後二寸內庭次指外間
是厲兌大指次指端去爪如韭胃所起
拇指內側隱白位大都節後陷中起太白核骨下陷中公
孫節後一寸至商丘有穴屬經金踝下微前陷中是內踝
三寸三陰交布谷一寸有次第膝下五寸為地機陰陵內
側膝輔際血海分明膝臑上內廉內際二寸地箕門血海
上六寸筋門動脈須詳諱冲門五寸大橫下三寸三分尋
府合腹結橫下寸三分大橫挾臍非此假腹哀寸半去日
月五舉食實相連亞食竇天谿及胸鄉周榮各一寸六者
大包淵液下三寸出九肋間當記也少陰心起極泉中腋
下筋間肱入膏肓靈肘節上三寸少海肘內節後容靈道

掌後一寸半通經脈後一寸同陰經五分取動用神門掌後兌骨陰少府節後勞宮直小指內側取火冲

手小指端為少澤前在外側節前索節後陷中尋後絡腕骨陷前看外側腕中骨下陽谷計腕上一寸名養老支正

腕後量五寸少海助端五分好肩貞脾下兩骨解膈俞大骨之下保天宗骨下有陷中秉風髀後舉有空曲垣有中

曲膺膺外俞胛後一寸從肩中二寸大杼傍天窓頰下動脈詳天容耳下曲頰後顛顛面頰兌端量聽宮耳端大如

腋此為小腸手太陽足太陽少陽膀胱經目背內角始睛明眉頭陷中橫竹名曲

差二穴神廷伴五處挨排夾上星承光五處後寸半通天絡却亦停勻王枕橫夾於腦戶尺寸當准銅人經天柱夾

項後髮際大筋外廉陷中是夾脊相去寸五分大杼大椎二風門肺俞三椎厥陰四心俞五椎之下論更有膈俞相

撈級第七椎下隱然立第八椎下穴無有肝俞數椎當第九十椎膽俞脾十一十二椎下胃俞取三焦腎俞次第下

十三十四兩椎主大腸俞在十六椎小腸十八椎下止十九椎下尋腰脫中脊內俞椎二十白環二十一椎當上髀

次膠中與下一空二空夾腰膝並同夾脊四箇膠載在千金君勿訝會陽陰尾兩旁分寸須看督脉分第椎二下

外附分夾脊相去古法云先從脊後量三寸不是灸狹能陽筋總三椎膏育四五三分分明是第五椎下索神堂第六總諸穴出照關第七魂門九陽經意舍十一胃倉育門

百十九合詳參秩邊二十椎下詳承扶髀陰紋中央厥門承扶六寸直浮鄰一寸上委陽委陽却與殿門並腦山外

肱兩筋鄉委中膝膈約紋裏此下三寸尋合陽承筋膈膈中央是承山膈下分肉傍飛陽外踝上七寸附陽踝上三

寸量金門正在外踝下崑崙踝後跟骨中僕參跟骨下陷是申脉分明踝下容京骨外側大骨下束骨本節後陷中

通谷本節前陷是至陰小指外側逢腎經起處有所湧泉屈足捲指取然谷踝前大骨下踝

後跟上太谿府給下五分尋大鍾照海踝下陰躡生踝上二寸復溜名溜前筋骨取交信亦曰踝上二寸行築賓六

寸膈分處陰谷膝內著骨輔橫骨有陷如仰月大赫氣穴四滿據中注育俞正夾膈六穴五寸各一數商曲石關上

陰都通谷幽門一寸石幽門半寸挾巨闕步即神封過靈墟神蔽或中至俞府各一寸六不差殊欲知俞府居何分

璇璣之下各二寸厥陰心包何處得乳後一寸天池索天泉腋下一寸求曲澤內紋尋動脉却門去腕五寸通間使腕後三寸逢內關

去腕經二寸大陵掌後兩筋中勞宮屈中名指取中指之未取中衝

三焦名指外關冲小次指間名液門中渚次指本節後陽池表腕上陷存腕上二寸外關絡支溝腕上三寸約會宗

腕後三寸空瀕詳一寸毋令錯肘前五寸臂大脉外廉陷中三陽絡四瀆骨外並三陽天非肘上一寸側肘上二寸清冷淵消灤臂外肘分索臑會有頭三寸中府膺有端臑

上通天髓盆上其骨際天牖以頸後天容醫風耳後肖骨
 陷厥脉耳後鷄足逢顛顛耳後青絡脉角孫耳郭開有空
 絲竹眉後陷中看和節耳前允髮同耳門耳珠當耳缺此
 穴禁灸分明說○少陽膽經起外耳前陷中尋聽會上
 關耳前開口空懸鬚腦空下庶掃懸顛正曲角端領厭腦
 空上庶看曲髮偃正尖上邊率谷曲髮半寸安本神耳上
 入髮際四分平橫向前是曲髮之旁各一寸陽白眉上一
 寸記臨泣有穴當兩目直入髮際五分屬目窓正營各一
 寸承靈靈後寸五錄天冲耳上二寸居浮白髮際一寸符
 竅陰枕下動有穴完骨耳後四分通腦空正夾玉枕骨風
 池后髮際陷中肩井大骨前寸半淵液脉下三寸按輒筋
 平前却一寸期門在肋第二端○月期下五分斷京骨監
 骨腰間看帶脉季肋寸八分五握帶下三寸間維道五寸
 二分得居窮八寸三分尋環跳解樞死死論膝下五寸中
 瀆搜陽關陽陵上三寸陽陵膝下一寸求陽交外踝鍼七寸
 蹠上六寸尋外丘光明除蹠上五寸陽輔蹠下四寸收懸
 鍾三寸即絕骨丘墟蹠前陷中出臨泣寸半后夾谿地五
 會穴一寸灸夾谿小次岐骨間竅陰足小次指端
 大敦拇指看毛聚行間縫尖動脉處節後有絡百五會大
 衝之脉堪承據中封正在內踝前蠡溝蹠上五寸注中都
 正在復溜宮陰膝尖兩折中內蹠之上二寸詳少陰相
 直衝骨中膝關犢鼻下二寸曲泉紋頭兩筋逢陰包四寸膝
 膺上內蒸筋間索其當五里氣衝內寸半直下三寸陰股
 向陰蒸穴在橫紋膠章門膺下二寸量股取八寸看兩傍

期門乳旁各一寸直下二寸二肋詳此足厥陰肝經鄉
 督脉獻交唇上鄉兌端正在唇中央水溝鼻下溝中素
 膠宜向鼻端詳頭形北高而南下先以前後髮際量分爲
 一尺有二寸髮上五分神庭當廷上五分以上星位顛會星
 上一寸強上至前頂 上一寸半寸半百會頂中央後頂強
 間腦戶三相去各是一寸五後髮五分定庭門上五分
 是風府上有大椎下尾骶分爲二十有一椎古來自有折
 量法靈樞分明不可數九寸八分分之七二之七節如是
 椎大椎第一節上是二椎節下陶道知身柱第三椎節下
 神道第五不須疑靈室第六至陽七筋縮第九椎下思脊
 申懸樞命門穴十一三十四節陽關鎮住十六椎二十
 一下腰俞窺其下長強伏地取此穴鍼之痔根愈
 任脉會陰兩陰間曲節筋毛際安中極臍下四寸取三
 寸關元二石門氣海臍下一寸半陰交臍下一寸論分明
 臍內號神關水分一寸復上列下腕建里中上腕各各一
 寸爲君說巨關上腕上一寸半鳩尾蔽骨五分按中庭臍中
 寸六分臍中兩乳中間有王堂紫宮及華蓋相去各寸六
 分華蓋璇璣一寸量璇璣突一寸當天突結下宛宛取廉
 泉領下骨尖傍承漿頤前唇稜下任脉之部宜審詳
 石十四經步穴歌原用銅人穴編叶今以十四經發揮
 爲主有繁多者皆去之如叔負俞風市羊矢之類是也
 ○十二經脉歌
 手太陰肺中焦生下絡大腸出貫門上高厲肺從肺系系
 橫出液膈中行肘臂寸口生傷寒際大指內側爪甲根支絡

還從腕內出按次指屬陽明經○此經多氣而少血是動
則病咳與嗽肺脹膨欬盆痛兩手交替為臂厥所生病
者為氣嗽喘煩心胃滿結騰臂之外前脛痛小便頻數
掌中執氣虛者背痛而寒氣盛亦疼風汗出欠伸少氣不
寐息道失與萎弱色赤

陽明之脈手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷兩
筋歧骨循臂肘入肘外廉循臑外有端前廉柱骨旁從有
下入缺盆內絡肺下高屬大腸支從缺盆直上頸斜貫頰
前下齒當環出入中交左右上夾鼻孔注迎香○此經氣
盛血亦盛是動頰腫并齒痛所生病者為執衄口黃口乾
喉痺生大指次指難為用有前臑外痛相仍氣有餘兮脉
執腫虛則寒痺病偏增

胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出夾口繞承漿頰
後太迎頰耳前髮際至額顛支下入迎缺盆底下行五
入豐絡脾宮五者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行五
合氣衝達遂由臍關抵膝膈附膈中指內關同一支下膝
注三里前出中指外關通一支別走足跗指大指經盡矣
○此經多氣復多血是動欠伸而頰黑萎惡寒畏見人
忽聞木音心驚悸登高而歌棄衣走甚則腹脹乃黃響凡
此諸疾皆由經所生病者為其體溫濕汗鼻流血口喝唇
裂入喉者為喉痛腹脹結氣膈伏危斷外熱足跗中指
俱微有汗清發潮色黃不足身前寒振轉胃房脹滿食
不消氣感身前皆有熱

大陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內髁前上

原從腕內出按次指屬陽明經○此經多氣而少血是動
則病咳與嗽肺脹膨欬盆痛兩手交替為臂厥所生病
者為氣嗽喘煩心胃滿結騰臂之外前脛痛小便頻數
掌中執氣虛者背痛而寒氣盛亦疼風汗出欠伸少氣不
寐息道失與萎弱色赤

陽明之脈手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷兩
筋歧骨循臂肘入肘外廉循臑外有端前廉柱骨旁從有
下入缺盆內絡肺下高屬大腸支從缺盆直上頸斜貫頰
前下齒當環出入中交左右上夾鼻孔注迎香○此經氣
盛血亦盛是動頰腫并齒痛所生病者為執衄口黃口乾
喉痺生大指次指難為用有前臑外痛相仍氣有餘兮脉
執腫虛則寒痺病偏增

胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出夾口繞承漿頰
後太迎頰耳前髮際至額顛支下入迎缺盆底下行五
入豐絡脾宮五者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行五
合氣衝達遂由臍關抵膝膈附膈中指內關同一支下膝
注三里前出中指外關通一支別走足跗指大指經盡矣
○此經多氣復多血是動欠伸而頰黑萎惡寒畏見人
忽聞木音心驚悸登高而歌棄衣走甚則腹脹乃黃響凡
此諸疾皆由經所生病者為其體溫濕汗鼻流血口喝唇
裂入喉者為喉痛腹脹結氣膈伏危斷外熱足跗中指
俱微有汗清發潮色黃不足身前寒振轉胃房脹滿食
不消氣感身前皆有熱

大陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內髁前上

黃腰尻脚次逆骨淚流鼻衄及癲狂

足經腎脈屬少陰小指斜趨湧泉心然谷之下內踝後別

入跟中腓內侵出腦內廉上股內貫脊屬腎膀胱直者

腎貫肝肅入肺循喉舌本尋支者從肺絡心內仍至腦

中部分深○此經多氣而少血是動病飢不欲食喘嗽唾

血喉中鳴坐而欲起而如垢目視眩暈氣不足心懸如饑

常惕惕所生病者為舌乾口熱咽痛氣貫過股內後廉并

脊疼心腸煩痛瘧而瘳痿厥嗜卧體怠惰足下熱痛皆腎

厥

手厥陰心主起胸為包下肅三焦宮支者循胸出脇下脇

下連腋三寸同仍上抵腋循膈內太陰少陰兩經中指透

中冲支者別小指次指絡相通○是經少氣原多血是動

則病手心熱肘臂急腋腫甚則胸脇支滿結心中澹

澹或大動善笑目黃面赤色所生病者為心煩心痛掌

病之則

手經少陽三焦脈起自小指次指端兩指岐骨手腕上

出臂外兩骨間肘後膈外循肩有少陽之後交別傳下入

缺盆膈中分數絡心包膈身支者膈中缺盆上耳前

後耳角旋屈下至頤仍頰一支出耳入耳前結於耳

交曲頰至目內眦為之斯經少血運多氣是動則

喉腫痺所生病者汗自出耳鳴目銳眦痛

掌小指次指亦發

足脈少陽膽之經始從兩目銳眦生起循角下耳後

空風池次循行于少陽前至肩上交少陽右少陰左支者

耳後貫耳內出走耳前銳眦循一支銳眦六迎下合手少

陽抵項根下加頰車缺盆合入胃貫膈絡肝經屬膽仍從

膈重過下入氣衝毛際榮橫入脾厭環跳內直者缺盆下

腋膈過季脇下髀厭內出膈外廉是陽陵外輔絕骨髀前

過足耐小指次指分一支別從大指去三毛之際接肝經

○此經多氣而少血是動口苦善太息心脇疼痛難轉移

面壅又熱體無澤所生頭痛連銳眦缺盆腫痛并兩腋馬

刀決癢生兩傍汗出振寒瘧瘵疾胸脇脾膝至脗骨絕骨

蹠痛及諸節

厥陰足脈肝所終大指之端毛際叢足跗上廉太衝分深

前一寸入中寸上踝交出太陰後循膈內廉陰股衝環繞

陰器抵小腹夾胃脘肝絡膈達上貫膈裏布脇肋頰喉頰

頰目係同脉上巔會督脉出支者還生目系中下絡頰裏

還必內支者便從膈肺通○是經血多氣少焉是動腰疼

沈仰難男病女人小腹脹面塵脫色及咽乾所生病者為

脈滿而中洞泄小便難或時遺溺并狐疝臨證還須仔細

右

奇經八脉歌

督脉起自下極命並於脊裏上風府過腦額鼻入齶交為

陽脉海都咽要○任脉起於中極底上腹循喉承漿裏陰

脉之海任所謂○冲脉出包循脊中從腹會咽絡口唇女

入成經為血室脉並少陰之腎經與任督本於陰合三脉

並起而異行陽起是之跟乘循外蹠上入風池陰蹠肉
蹠循喉竅本足陽陰脉別支諸陰交起陰維脉發是少陰
築實歸諸陽會起陽維脉太陽之邪金門是帶脉周回季
脇間會於維道是少陽所謂奇經之八脉維繫諸經乃順
常

流注指微賦

疾居榮衛扶救者鍼觀虛實與肥瘦辨四時之淺深取穴
之法但分陰陽而豁谷迎隨逆順須曉血氣而升沉原夫
指微論中積義成賦知本時之氣開說經絡之流注每披
文而參其云篇篇之誓審尋覆經而察其言字字之明論
疑隱皆知實虛總附移疼住痛之有神鍼下復安暴疾沉
痾至危篤刺之勿誤詳夫陰日血引值陽氣流口温鍼暖

針灸經書卷之四

三

牢濡澤求諸經十二作數絡脉十五為周陰俞六十箴主
陽穴七二府收刺陽經者可卧鍼而取奪血絡者先俾指
而柔呼為逆而及作補逆為鬼而從何憂淹疾延患著灸
之由躁而逆而難拯必取八會腫奇經而畜邪穢醜
疔瘰况于甲膽乙肝丁心三水生我者號我生者名子
春并夏榮乃邪在秋經冬合乃刺美犯禁忌而病復用日
蒙而難已絲絡在於肉分血行出於父裏開昏鍼運經虛
補經須然及實瘳虛瀉子隨母愛指想夫先賢述効無出
於鍼今人愈疾豈難於醫徐文伯鴻孕於苑內斯由甚速
范九思療咽於江夏聞見言希大抵古今遺跡後世皆師
王築鍼魁而立康懶從被出秋夫瘳鬼而敵効竟免傷悲
既而感指幽微用鍼直訣竅齊於筋骨皮肉刺要痛察於

夕府肱寒熱換氣通經短長依法表外之絕贏盈必別
勿謂大勞使人氣亂而仲藥慎安呼及防他鍼昏而閉血
又以常尋古義由有藏機過高賢真趣則超然得悟達達
人示教則表扶危男女氣脉行分時合度養子時尅注
穴源依今詳定瘳病之宜神鍼法式廣搜難索之秘密文
而深考諸家之肘函妙臆故稱瀘江流注之指微以為後
序之規

右流注指微賦寶桂芳撰穴今自子午流注鍼經輯錄

於此

標幽賦

拯救之法妙用者鍼察歲時於天道定形氣於予心春夏
瘦而刺淺秋冬肥而刺深不窮經絡陰陽多逢刺禁既論

針灸經書卷之四

元

臟腑虛實瀆向經尋原夫起自中焦水初下漏太陰為始
至厥陰而方終穴出雲門抵期門而最後正經十二別絡
走三百餘支正側偃伏氣血有六百餘候手足三陽行走
頭而頭走足手足三陰足走腹而胸走手要識迎隨須明
逆順况乎陰陽氣血多少為最厥陰太陽少氣多血太陰
少陰少血多氣而又氣多血少者少陽之分氣盛血多者
陽明之位先詳多少之宜次察應至之氣輕滑慢而未來
沉濡緊而已至既至也量寒熱而留疾未至也據虛實而
辨氣氣之至也如魚吞鈎餌之浮沉氣未至也如閑處幽
深遂氣至速而効速氣至而不治觀夫九鍼之法
最微七罕可應象六主皆本形金也有獨邪扶正之
針水之有決瀉瀉之定刺象木或邪或正口載

定一十六分包含妙理雖細擬於毫髮同貫多岐可平
五藏之寒熱能調六腑之虛實拘攣閉塞遺八邪而去矣
痛痺開四關而已之凡刺者使本神朝而後入既刺
後本神定而氣隨神不朝而勿刺神已定而可施定脚
取氣血為主意下手處認水木是根基天地人三才湧
源同璇璣百會上中下三部也大包與天樞地機陽蹻陽
維并督脉主有背要腿在表之病陰蹻陰維任衝帶去心
腹脇肋在裏之疑二陵二蹻二交似續而交五大兩間兩
商兩井相依而列兩少足見取穴之法必有分寸先審自
意次觀肉分伸屈而得之或平直而安定在陽部筋骨之
側陷下為其在陰分邪腦之間動脉相應取五穴用一穴
而必端取三經用一經而可正頭部與有部詳分督脉與
任脉異一作定明標與本論刺深刺淺之經住痛移疼取
相交相貫之理豈不聞臟腑病而求門海俞募之微經絡
滯而求原別交會之道更窮四根三結依標本而刺無不
痊但用八法五門分主客而鍼無不効八脉始終連八會
本是紀綱一二經絡十二原是謂樞要一日取六十六穴
之法方見幽微一特取一十二經之原始知要妙原夫補
瀉之法非呼及而在手指速効之功要交正而識本經交
經繆刺左有病而右畔取瀉終遠鍼頭有病而脚上鍼巨
刺與繆刺各異微鍼與妙刺相通觀部分而知經絡之虛
實視浮沉而辨臟腑之寒溫且夫先令鍼耀而慮鍼損次
截口內而欲鍼溫目無外視手如握虎心無內慕如待貴

入左手重而多按氣散右手輕而徐入不痛之因空
心恐怯直立則而多舉背日沉插坐卦平而沒昏推於十
子十變知孔穴之開闔論其五行五臟察時日之旺衰伏
如橫弩應若發機陰交陽別而定血暈陰蹻陰維而下胎
衣痺厥偏枯迎隨伸經絡接續漏崩帶下溫補使氣血依
歸靜以久留停鍼待之必准者取照海治喉中之閉塞端
的處用大鍾心內之呆癡大抵痰痛實瀉瘵虛補體
裏節痛而俞若心下否痛而并主心脹咽痛鍼大衝而必
除脾冷胃疼瀉公孫而立愈胸膈痛刺內關脇疼肋痛
鍼飛虎筋拳骨痛而補空門體熱勞嗽而瀉鬼戶頭風頭
痛刺中脉與全門眼痒眼淚瀉光明於地五瀉陰郄止盜
汗治小兒骨蒸刺偏歷利小便醫大人水蠱中風環跳而
宜刺虛損天樞而可取由是今前卵後大陰生而疾溫離
左酉南月死朔而速於補捫腕勞留吸母而堅長爪下伸
提疾呼子而虛短動退空欬迎奪右而瀉涼推內進搓隨
濟左而補煖慎之大九危痰色脉不順而莫鍼寒熱風雲
穢飽醉勞而切忌望不補而晦不瀉弦不奪而劑不濟精
其心而窮其法無灸艾而燥其干正其理而求其原免後
鍼而失其位避灸處而和四肢四十有九禁刺處而除六
輪二十有二抑又聞高皇抱疾未差李氏刺巨關而復
太子暴死為厥越人鍼會紐而復醒肩井曲池甄權刺臂
痛而復射應鐘環跳華陀刺雙足而立行秋夫鍼腰俞而
免免沉痾王綦鍼交俞而妖精立出取肝俞與命門使醫
二龍效之末刺火陽傳交別脾脾夫德之聲聲主

聖心遠此道... 然言不敢示知明達者焉庶幾乎童蒙之心悟
右標幽賦寶漢所撰今自鍼經指南表錄於此

通玄指要賦

必欲治病莫如用鍼巧運神機之妙工開聖理之深外取
砭鍼能蠲邪而輔正中含水火善回陽而倒陰原夫絡別
支殊經交錯綜或滯渠絡各以岐異或山海丘陵而隙共
斯流以難察在絡網而有統理繁而昧縱補瀉以何功
法捷而明自運隨而得用且如行步難移太衝最奇之中
除脊脊之強痛神門去心性之呆癡風傷項急於於
而頭暈日眩要竟於風池耳閉頭眩會而治也

各以推之胸結身黃取湧泉而即可腦昏目赤瀉
便宜但見若兩肘之拘攣仗曲池而平掃牙痛
治頸項強承漿可保太白宣道於氣衝陰陰開通於水
腹脹而脹奪內廷以... 而料理瘰癧生寒... 可以勞宮... 王公謂此... 然谷瀉腎行... 二間宜取... 瘰癧頭疼... 瘰癧行... 瘰癧行...

厥於會維隨... 諸痛為實但麻曰虛實則自外而入也虛則自內而出歟
是故濟母而裨其不足奪子而平其有餘觀二十七之經
絡一一明辨據四百四之疾證件件皆除故得大枉都無
躋斯民於壽域幾微以判彰往古之玄書抑又聞心胃病
求掌後之大陵有替疼責肘前之三里冷痺腎餘取足陽
明之士連臍腹痛瀉足少陰之水春間心後者鍼中渚而
立痊腸下助運者刺陽陵而即止頭項痛擬後谿以安然
勝脚疼在委中而已矣夫用鍼之士於此理苟明者焉收
祛邪之功而在乎撥指

右流江指要賦羅謙甫謂實子產裁就今自衛生寶鑑
表錄於此所可疑者舊註牙齒痛呂細堪治云呂細勝

脫經一名太熱今按資生經千金銅人俱無太熱為呂細
別名而太熱為足少陰腎經非勝脫經也

靈光賦

黃帝岐伯鍼灸訣依他經裏分明說二陰二陽十二經更
有兩經分八脉靈光典註極幽深備正頭疼瀉列缺睛明
治眼弩肉攀耳聾氣不聰會間兩鼻輪切鍼禾邪鼻窒不
聞迎香間治氣上壅足三里天突宛中治喘痰心疾手顫
鍼少海少澤瀉除心下寒兩足拘攣愈降中五般腰痛委
中安胎俞不動瀉血並... 痰住喘脚痛... 足掌下去尋湧泉... 靈女子病...

血海麻五林中腕下腕治腹堅傷安遺在期門愈氣刺兩
乳水六刺大牧二穴主偏隆水溝間使治邪顛吐血定喘
補及澤地能止渴流涎芳宮醫得身勞倦水腫水分灸
即安五指不伸中者取刺車可鍼牙齒愈陰海陽兩蹠
諸穴一治治脚氣氣腰玄機宜正取骨背直止治百病灸
則切切痛命鍼灸一穴數病除準者尤宜加子細悟得
明師流注法頭目有病鍼四肢鍼有神烏明呼吸穴應五
行離四時得人身中造化此歌依舊是蒼蹄
右紫先賦總靈光典註而成不知誰氏所作今自鍼灸
大全表錄於此

席弘賦

凡欲行鍼須審穴要明補瀉迎隨訣留背左右不相同呼
吸陰陽男女別氣刺兩乳末太淵末應之時為列缺列缺
頭疼及偏正重瀉太淵無不應耳聾氣石聽會鍼迎香穴
驚功如神誰知天突治喉虛喘瀆尋三里中手連有春
痛難忍命各鍼時要太衝世池兩手不知意合谷下鍼宜
子細心疾手少海開若髮除根竟陰市但患傷寒兩耳
聾金門聽會疾如風五般肘肱尋尺澤太淵鍼後却收功
手足上下鍼三里食鹽氣塊憑此取鳩尾能治五般癩若
下瀉米人不死胃中有積刺璇璣三里功多人不知陰陵
泉治心胸滿滅到承山飲食思大行若連長強尋小腸氣
痛即行鍼委中尋治腰間痛時尋至陰氣帶腰疼
不能立噴汗大部救急氣胸專治五淋更賦二里隨

期門穴主傷寒遺六日過經未汗但向乳根二肋
間又治婦人生產難耳內蟬鳴腰欲折膝下明存三里穴
能補瀉五會間且莫向人容易說精明治眼未効時合
谷光明安可缺人中治顛功最萬十三鬼穴不須鏡水鍾
水分無氣海皮內隨氣氣自消冷嗽先宜補合谷却須鍼
瀉三陰交牙疼腰痛并咽喉三間陽谿疾逐逐更有三間
腎俞妙善除有背浮風勞若鍼肩井須三里不刺之時氣
未調最是陽谿泉一穴膝間疼痛用鍼燒委中膠痛脚掌
急取得其經血自調脚痛腫脹鍼三里懸鐘二陵三陰交
更向太衝須引氣指頭麻不自覺腰背筋目眩鍼魚腹承
山崑崙立便消肚疼瀉是公孫妙內關相應必然瘳冷風
冷痺疾難愈環跳腰間鍼與燒風府風池尋得到傷寒百
病一時消陽明二日尋風府吐還須上腕療婦人心痛
心隆穴男子痰癖三里高小使不禁關元好大便閉澀大
敦燒腕骨腿疼三里瀉復瀉氣帶使離腰從來風府最難
鍼却用工夫度深倘若勝脫氣未散更宜三里穴中尋
若是七疝小腹痛照海陰交曲泉鍼又不應時求氣海關
元何為效如神小腸氣撮痛連臍求為交笑在逢良久
湧泉鍼取氣此中玄妙少人知小兒驚風患多時先灸百
會次鳩尾久患傷寒者皆能鍼中注得其宜有上痛連
臍不休手中三里便瀉水下鍼脈重即瀉得氣之時不
用留腰連膝痛急必大便於三里攻其腹下鍼瀉三補
之氣上攻壹只管在噎不任時氣海灸定瀉一時立便瘳
補有升而散高瀉從邪其莫辭然其氣令真收

凡欲行鍼須審穴要明補瀉迎隨訣留背左右不相同呼
吸陰陽男女別氣刺兩乳末太淵末應之時為列缺列缺
頭疼及偏正重瀉太淵無不應耳聾氣石聽會鍼迎香穴
驚功如神誰知天突治喉虛喘瀆尋三里中手連有春
痛難忍命各鍼時要太衝世池兩手不知意合谷下鍼宜
子細心疾手少海開若髮除根竟陰市但患傷寒兩耳
聾金門聽會疾如風五般肘肱尋尺澤太淵鍼後却收功
手足上下鍼三里食鹽氣塊憑此取鳩尾能治五般癩若
下瀉米人不死胃中有積刺璇璣三里功多人不知陰陵
泉治心胸滿滅到承山飲食思大行若連長強尋小腸氣
痛即行鍼委中尋治腰間痛時尋至陰氣帶腰疼
不能立噴汗大部救急氣胸專治五淋更賦二里隨

室六喘乾苦口喉乾... 諸疾苦更用... 還輕中脉能除... 滿好用金鍼... 更有傷寒真... 溜六瀉好用... 太陽宜細辨... 門可用鍼但... 入造化常將... 宜深天地四... 入仍調各部... 皆在本經... 得師傳在... 氣血病人... 行病自無

右攔江賦不知誰氏所作今有凌氏所編集寫本鍼書表錄於此

頭面之疾... 腹有病曲... 腿又後... 穴真可... 難移步... 調停其患

急又澤刺... 五痔原... 隆刺入... 髓冷火... 實可用... 發不休... 他語寒... 休才關... 傷寒四... 溜半寸... 須補絕... 時補便... 藥不下... 角湯至... 食吐蛇... 傷寒痞... 使周身... 不汗合... 氣使安... 心肺胸... 如神不... 風先於... 腰腿疼... 藥尋方

藥不下... 角湯至... 食吐蛇... 傷寒痞... 使周身... 不汗合... 氣使安... 心肺胸... 如神不... 風先於... 腰腿疼... 藥尋方

先究其病源後以其穴道隨手見功應鍼取效方知玄裏
之玄如達妙中之妙此篇不盡畧述其要

右肘後百脈一風不知誰氏所作辭頗不及於指微標
幽曰百證者宜其曲盡百般病證鍼刺也而病名至多
亦有所遺焉

天元大一歌

先師秘傳神應經太乙通玄法最靈句句言辭多典妙萬
兩黃金學也輕每每不忘多効驗治病如神記在心口內
將鍼多溫煖使親患者審淨沉陰病用陽陽用陰分明便
舉陰陽神虛則宜補實宜瀉氣應其時病絕根氣至如擺
獨龍尾才至停鍼宜待氣凡用行鍼先得訣席宏玄妙分
明說氣刺兩乳求太淵未應之時列缺鍼列缺頭疼及偏
正重瀉太淵無不應耳龍氣閉喘綿綿三里中手擊脚背
疼難忍合骨仍瀉瀉太衝曲池主手不如意合谷鍼時宜
仔細心疼手顫少海間欲要除根鍼陰市若是傷寒兩耳
痛耳門聽會疾如風五般肘疼鍼天澤冷淵一刺有神功
手三里兮足三里食痞氣塊兼能治鳩尾獨治五般痢若
刺湧泉人不死大凡瘡癤最宜鍼穴法從來著意尋以手
按痰無轉動隨深隨淺向中心胃中有積取璇璣三里功
深人不知陰陵泉主胃中滿若刺承山飲食宜大權若連
長強取小腸氣疼立可愈氣沖妙手要推尋管取神鍼人
見許委中穴主腰疼痛其膝腫時尋至陰乾濕風毒并滯
氣玄機如此更尤深氣攻腰痛不能立橫骨大邪宜急意
流血文注解若遲變為風証從此得氣海偏能治五淋若

神效如神冷熱兩服皆治得便濁痼疾可除根期
分人丹健耳內蟬鳴腰欲折膝下分明三里穴若能補瀉
中切莫逢人容易說牙風頭痛孰能調二間妙穴莫
更更有三間神妙穴若治有背感風勞合谷下鍼順流
內隨鍼使氣朝冷病還瀉鍼合谷只宜脚下瀉陰交
瘦俱俱疾鍼有井不瀉三里令人悶兩臂并解似疼痛金
鍼一刺如聖神脚膝疼痛委中宜更兼學急鋒鍼施陰陵
泉穴如尋得輕行健步疾如飛腰腹脹滿治何難三里臨
肚鍼承山更向大衝行補瀉指頭麻木一特安頭痛轉筋
魚腹肚又治背疽及便毒下有妙穴陽陵泉腿轉筋急如
神取腸中疼痛陰陵沃耳內蟬鳴應會招更尋妙穴太谿

是醫門行瀉實為高浮沉腹脹水分瀉氣喘息龍瀉三里
更於膝中陰谷鍼小便淋瀝背消盡環跳能除腿股風冷
風膝痺瘡疾同最好風池尋的穴間使雙刺有神功傷寒
一日調風府少陽二穴風池取三五七日疔過經依此鍼
之無不應心疼嘔吐上脫宜豐隆兩穴更無疑蛇虫併出
傷寒病金鍼直刺顯明醫男子痰癆取少商女人血氣陰
交當虛盜二汗瀉宜補委中妙穴可傳揚項強腫痛屈伸
難更兼體重腰背痠宜向束骨三里取教若頃刻便開顏
閃挫脊脊腰疼轉不少多難行重聚備體遊氣生虛浮復
溜一刺人健美又止腰痛背脚勞但尋中注穴中調行
用心須尋氣管取從今見識高腰背連膝痛不休手中
里穴堪求神鍼木山急瀉瀉得氣之時不用留小脹便解

子 48-376

設難醫氣海中極間使心三里更須明補瀉下鍼斷了
毫厘

右天元太乙歌龍仙所撰今有神應經表錄於此

銅人指要賦

行鍼之士要辨浮沉以虛實鍼別淺深經絡絡脈之別
三刺繆刺之分經絡閉塞須用砭針疎導藏府寒溫必明
淺深補瀉經氣之正自有常數漏水百刻五十度周經絡
流注各應其時先脈訣病穴編病左手指穴右手置鍼
刺榮無傷衛刺衛無傷榮氣悍則鍼小而入氣滿則鍼
大而入深氣滑出疾氣澁出遲深則欲而淺則欲疾候其
氣至必辨於鍼徐而疾者實實而遲者虛虛則實之滿則
泄之宛陳則除之邪勝則虛之刺虛者求其實刺實者須

其虛經氣已至慎守勿失謹守其法勿更變也賊邪新客
未有定處推之則前引之則止其來不可逢其往不可追
損其有餘補其不足先去血脈而後調之無問其病以平
為期若有若無若得若失五藏以定九候以備診脈病明
行鍼病愈衆脈不見衆凶不聞外內相得無以形先可玩
往來乃拖於人手動若務鍼耀而勻伏如橫弩起於發機
見其烏鳥見其稷稷從見其飛不知其謀靜意是義觀適
之變是謂真莫知其形如臨深淵手如探虎如待所貴
不知日暮其氣已至適而自護五虛勿近五實不遠捫而
循之切而散之推而按之彈而弩之爪而下之通而取之
陰募在腹陽俞在背藏病取原府病取合藏病府募治
募治府病出入導氣補瀉同情善行水者不能注水善

地者不能繫樞衡以平氣口成寸以決死生飲食入胃
游溢精氣上輸於脾胃氣散精上歸於肺通水道下輸
膀胱食氣入胃散精於肝淫氣於筋食氣入胃濁氣歸心
淫精於肺五勞五痺九氣七情六淫六府九竅九州四氣
三因傷風傷寒雜病奇病婦人小兒盛則瀉之虛則補之
不盛不虛以經取之

右銅人指要賦多取內經詞語末後樞衡以平文不相
屬

禁鍼穴歌

禁鍼穴道要先明腦戶顛會及神庭絡却玉枕角孫穴顛
承泣隨承靈神道靈臺膻中忌水分神闕并會陰橫骨氣
冲手五里箕門承筋并青靈更加臂上三陽絡二十二穴

不可鍼孕婦不宜鍼合谷三陰交內亦通論石門鍼灸應
須忌女子終身無姙娠外有雲門并鳩尾缺盆客主人冥
深者并深時人悶倒三里急補人還平

禁灸穴歌

禁灸之穴四十五承光瘰門及風府天柱素窠臨泣上睛
明攢竹迎香數和膠頰翳絲竹空頭維下關與脊中肩貞
心俞白環俞天牖人迎共乳中周榮淵液并鳩尾腹哀少
商魚際位經渠天府及中冲陽關陽池地五俞隱白漏谷
陰陵泉伏兔髀關委中穴駁門申脈承扶忌

行鍼指要歌

或鍼風先向風門氣海中或鍼水水分夾腳膝邊取或鍼
結鍼著大腸瀉水穴或鍼勞瀆向風門及膏肓或鍼虛氣

九日委中奇或鍼氣置中一穴分明記或鍼嗽肺俞風門須用參或鍼痰先鍼中腕三里間或鍼肚中腕氣海腫中補脊胃吐食一般鍼鍼中有妙少人知

補瀉雪心歌

行鍼補瀉分寒熱瀉寒補熱須分別撚鍼向外瀉之方撚鍼向內補之訣瀉左瀉將大指前瀉右大指當後搜補左大指向前搜補右大指往下撚如何補瀉有兩般蓋足經絡兩邊發補瀉又要識迎隨隨則為補迎為泄古人補瀉左右分今人乃為男女別男女經脈一般生晝夜循環無暫歇兩手陽經上走頭陰經胃走手指輟兩足陽經頭走足陰經足走腹中結隨則鍼頭隨經行迎則鍼頭迎經奪更有補瀉定呼吸吸瀉呼補真奇絕補則呼出却入鍼要知鍼用三飛法氣至出鍼吸氣入疾而一退急捫穴瀉則吸氣方入鍼要知阻氣通身達氣至出鍼呼氣出徐而三退穴開捺莫向人前容易說

經脈交會八穴歌

公孫冲脉胃心胃內關陰維下總同臨泣膽經連帶脉陽維目鏡外關逢后谿督內連皆頸申脉躄絡亦相通列缺肺任行肺系陰躄照海膈喉龍

十五絡六歌

人身絡穴一十五我今逐一從頭舉手太陰絡為列缺手少陰絡即通里手厥陰絡為內關手太陽絡支正是手陽明絡偏歷當手少陽絡外關位足太陽絡號飛陽足陽明絡豐隆記足少陽絡為光明足太陰絡公孫崑崙足少陰絡

名大鍾足厥陰絡此講配陽督之絡號長強陰任之絡號屏翳脾之大絡為大包十五絡脉君須記

十二經脉晝夜流注歌

肺寅大卯胃辰經脾巳心午小未申申勝酉腎心包戌亥三子膽丑肝通

十二原穴歌

甲出丘墟乙太冲丙歸腕骨是原中丁出神門原內過戊胃冲陽氣可通已出大白庚合谷辛緣本出太淵同壬歸京骨期中過癸出太谿原穴逢三焦壬是陽池穴包絡大陵癸又重

八會穴

府會中腕藏章門筋會陽陵隨絕骨骨會大杼氣膈中血

會膈俞太淵脉

臟腑七募穴歌

肝募期門脾章門腎募京門心巨闕天樞膈元大小腸膽募當記在日月

薛真人天星十一穴歌

三里內廷穴曲池合谷截委中配承山下至崑崙穴環跳及陽陵通里并列缺合擔用法擔合截用法截擔截常記取非人莫浪說三百六十五不出十一穴此法少人知金鎖都開徹治病顯奇功有如涉發香學者細推尋神功無盡竭○三里在膝下三十兩筋間能通心腹脹善治胃中寒腸鳴并泄瀉腿膝腫痛發傷寒癱瘓損氣蠱及諸般年過三旬後鍼灸眼有光○內廷穴指外本屬足陽明能治

脈厥者靜惡聞聲癱瘓喉痛數欠及牙...

偏風手不收攙弓開不得筋緩莫梳頭喉痺從欲死發熱

更無休適身風癱瘓者即時家○合谷在虎口兩指岐

骨間骨痛并面腫癱瘓者遂失齒齦鼻血口...

鍼入五分深令人即便安○委中曲脈裏橫紋...

痛不能舉沉引脊疼疲筋攣展原痺發...

伸屈鍼入即安康○承山名魚腹腓腿分肉間...

痛痔疾大便難脚氣并膝腫展轉戰酸...

中刺便安○大冲足大指節後三寸中動脈知生元能醫

驚瀾風咽喉腫○厥兩足不能動七疝偏瘻眼目似雲

家亦能療腰痛○下有神功○崑崙足外...

轉筋腰尻痛暴喘滿冲心舉步行不得一動...

求安穩須於此穴鍼○環跳在髀側卧屈足取腰折莫

能顧冷風并濕痺腿膝連膈痛時則重嗟吁若入鍼灸後

頃刻痛消除○陽陵歸膝下外廉一寸中膝重并麻木冷

痺及偏風舉足不能起坐卧似衰翁鍼入六分止奇效

不窮○通里腕骨後一寸五分中欲言聲不出懊懷反怔

忡實則四肢重頭腮而頰紅則不能食暴瘡面無容毫

鍼微微刺方信有神功○列缺腕側上次指手交叉善瘰

瘰身風痺麻痰涎頻口口禁不開牙若能明補瀉應手

速如擘

右十一穴薛氏以爲扁鵲所傳按司馬子長爲扁鵲作

傳不言其有鍼書僅世蓋薛氏之依托也十一穴

八宿而曰十一宿則謬矣

八法八穴歌 西江月調

九種心疾涎悶結胃番胃... 疾膈病臍痛腹疼兼脇... 心泄瀉公孫立應... 下隔酒來傷積塊... 黃傷寒不解結胃... 麻發熱拘攣頭風... 咽腫浮風搔癢... 肢節腫痛背冷... 後皆痛手足... 獨會外關爲重... 腫淚連連... 手麻足麻... 自汗頭疼... 衄癰頭眩... 瘰癧腫泄... 飲噎產後... 缺乳難多... 復膈并... 中决氣氣...

宋徐秋夫惡鬼病十三穴歌
人中神廷風府始舌縫承漿頰車次少商大陵間使建

中陽陵泉有據隱白行間不可差十三穴是秋夫置

田陽九鍼歌

庭門勞宮三陰交湧泉大谿中腕接環跳三里合谷并此
是田陽九鍼穴

四總穴歌

肚腹三里留腰背委中求頭項尋列缺面口合谷收

六十六穴陰陽二經相合相生養子流注歌

甲時發陰前陷谷地虛陽谿委中續已合隱白魚際連太
溪中封少海屬○甲與已合○已合甲○甲膽竅陰耕效
逆弗能息轉筋耳不聞心煩并舌強穴在竅陰分○小腸
前谷燦熱病汗不出痰瘰及強癩白翳生於目刺其前谷
瘞○胃陷谷瑜面目浮虛腫身心怯採寒須鍼陷谷穴休

金匱要略卷之四

作等閑看○坵虛原痿厥身難轉轉樞痛不甦筋痠并脚

痺當下刺坵墟○大腸陽谿經狂言如見鬼熱病厥煩心

齒痛并瘡疥陽谿可下鍼○膀胱委中恰腰腫不能舉髀

樞脚痺風痿中神應穴鍼下便亨通○

乙時大敦少府始太白經渠陰谷止庚合商陽與通谷臨

泣合陽合三里○乙與庚合○庚合乙○乙肝大敦耕幸

疝小便數十陽汗似淋血崩臍腹痛須向大敦鍼○心少

府燥水氣胃中滿多怒懼人肘掌并掌熱少府效如神

○脾去白瑜煩心連膈脹嘔吐及便膿霍亂臍中痛神效

太白攻○肺經渠經膨膨而喘嗽胃中急變暴痺足心

經渠刺得安○腎陰谷恰臍腹逆陰補明中漏下流

陰谷穴一訣值千金

丙時少澤○三臍骨崑崙陽陵泉辛合少商然谷穴

衝靈道陰谿○丙與辛合○辛合丙○丙小腸少澤火

雲翳覆瞳子口乾舌強時寒瘧汗不出少澤莫遲疑○胃

內庭○四肢厥逆冷胸煩肚腹脹齒齧咽中痛當鍼足內

庭○大腸三間○金腸鳴并洞泄寒瘧及唇焦三間鍼入後

沉痾立便消○腕骨原迎風流冷決癱痲及黃軀腕骨神

鍼刺千金價不如○膀胱崑崙水脚腕痛如列腰尻疼莫

任崑崙如刺畢即便免呻吟○膽陽陵泉恰冷痺身麻木

偏身筋骨疼陽陵神妙穴隨手便安寧

丁時少冲大都先太淵復溜并曲泉壬合至陰夾後谿京

骨解谿曲池邊○丁與壬合○壬合丁○丁心少冲火少

陰多恐驚冷瘧潮腹心乍寒并乍熱宜向少冲鍼○脾大

都榮上傷汗不出手足厥而虛腫滿并煩嘔大都鍼使除

○肺太淵○金缺盆中引痛喘息病難獨心痛學中熱須當

鍼太淵○腎復溜經五淋下水氣赤白黑黃青腹脹腫水

蠱宜於復溜鍼○肝曲泉恰血瘕并瘰閉筋擊痛日深咽

喉膈腹脹應驗曲泉鍼

戊時厲兌二束骨冲陽陽輔小海入癸合湧泉行間瀆神

門商丘蕪尺澤○戊與癸合○癸合戊○戊胃厲兌并寒

熱無不食惡風多恐驚胃家諸孔穴厲兌最精英○大腸

二間○喉閉牙齒痛心驚鼻衄腥口喎連頰腫二間刺

安寧○膀胱束骨恰腰背膈如結風寒目眩瞤要參如此

疾束骨穴中窮○衝陽腹臍如結硬口眼忽喎斜狂病

棄衣走冲陽穴內作○膈陽輔樞節痛無常處諸風解莫

膈經難六六陽輔効如神○小腸小海火頭項痛難忍
腹脹疼莫甚者遠逢此疾小海便宜鍼○

已合甲○已隱白切足寒并兼泄月事過其特隱白脾家
并詳經可刺之○肺魚際○血狹中燥頭疼舌上黃傷
汗不出魚際一鍼康○腎木谿榆溺黃并尿血咳嗽齒牙
難痲痺諸濕痺太溪鍼便安○肝中封木繞臍腹走疼身
體及頑麻引腰間痛中封刺不差○心小海火目眩連
頭痛發強嘔吐涎四肢不能舉少海安然○

原合乙○庚大腸滿○並齒痛寒熱往來攻痰瘧
及中滿商陽刺便通○膀胱通谷木積結留諸欲眩眈目
不明頭風并項痛通谷可回生○臍臨泣木婦人月事閉
氣喘下能行顛骨合痛痛須鍼臨泣安○合谷原熱病逆

牙痛傷寒汗過期目疼風口禁合谷穴中推○小腸陽谷
經耳鳴頰頰腫脇痛發在陽陽入迎經刺如神助言神○
胃三里土合四體諸虛損五勞共七傷筋疲連膝腫三里刺

安康
辛合丙○辛肺少商并肺膨脹脹滿咳逆共喉風五臟諸
家熱少商鍼有功○腎然谷木婦人長不孕男子久遺精
洞泄并消渴連鍼然谷余○肝太冲木小便利淋瀝數心脹
步難行女子崩中漏太冲須細看○心靈道火卒中不能
語心疼及恐悲問云何所治靈道穴偏奇○脾陰靈氣洽

腹中寒積冷膈下滿吞酸疝癖多寒熱陰陵刺即安
壬合丁○壬膀胱至陰水心煩足下熱小便更遺精誰知
至陰穴能教死復生○膽夾溪木耳龍頰腫走江痛

常胸滿連腹滿火逆可刺堂○小腸後溪痛痺并項
目亦醫遂生一刺後溪穴神功妙不輕○京骨原脾經足
筋痛腰背苦難禁只可刺京骨休於別處尋○胃解溪土
膝勞連筋痛亂共風一刺解溪穴狂癲亦有功○大腸
西池合半身廢不遂兩臂痛難支汗後多餘熱宜鍼手曲

池
癸合戊○癸胃湧泉耕胃中藏結熱偏體復黃痿諸厥并
無子湧泉當堂刺○肝行間燥厥逆四肢冷膝頭腫莫當
道承并目疾行間要消詳○心神門燭咽乾不嗜食心痛
及任悲痴呆蕪嘔血神門刺莫遠○脾商丘墜身寒苦太
息痺病共脾虛但見如斯證商丘刺便除○脾火澤手
臂拘攣急四肢暴腫時口勞咳救尺澤善扶持

每遇陽干合刺三焦過陰干合刺心包絡陽干關冲液門
靜中者陽池支溝并陰干中冲勞官前太陵間使曲澤並
○陽干○三焦關冲針目中生翳莫舌上發焦乾霍亂心
胃噎關冲刺即安○液門燥手臂痛寒厥妄言驚悸昏偏
頭疾目眩當以液門論○中洛木熱病時無汗咽喉癢有
瘡如逢有背重中者刺交束○陽池原手腕難持物如因

打損傷陽池鍼刺後必痛應時康○支溝木脇疼牽筋痛
傷風啞痺喉明豎須識此疾早刺支溝○天井合瘰癧并
風疹上氣痛冲心瘰癧蒸熱瘰癧當於天井尋

陰干○包絡中冲并一身如火熱滿腹痛連心醫法當連
治中冲急下鍼○勞官火血并黃疸胃熱心痛攻大便
並尿血急急刺勞官○大陵瑜善笑還悲泣狂言痛莫禁

心胃如熱悶當下大陵鍼。○間使鉅嘔吐卒心痛心懸。再飢失心語不出間使實能醫。○曲澤恰逆氣身潮熱煩。心唇口乾問若何以治曲澤下鍼安。

右六十六歌實桂芳原有七言叶句今錄五言者便於記誦也其治證相同耳

十干相生流注歌

甲丙戊庚壬 乙丁己辛酉 丙戊庚壬甲 己辛酉乙丁
庚壬甲丙戊 辛癸乙丁己 丁己辛酉乙 戊庚壬甲丙
壬甲丙戊庚 癸乙丁己辛

十二經納天干歌

甲膽乙肝丙小腸 丁心戊胃己脾鄉 庚屬大腸辛屬肺 壬屬膀胱癸屬腎 亦向壬中寄 包絡同歸入癸方

五子元建歌 如天干於寅上

甲己之日丙作首 乙庚之日戊為頭 丙辛之日庚上起 丁壬寅寅順行求 戊癸甲寅定時候 六十首法助醫流

周身血氣歌

人身氣血無暫息 動靜周流在呼吸 呼行三寸吸亦然 一息定行六十脉 二百七十息數來 行六十丈二尺積此 周身一度過補瀉 分明知滑澀試 一呼吸幾多千一百 廿五的脉行六十七 丈五寸尚餘刻更將餘刻 為君明四十五息 二丈七寸幾何一萬二千幾 五百脉行八百 一十丈度行五十周身畢此是 平人脉氣歌 遲寒數熱難同測 脚不沾膝手不過肘

陽日陽時氣在前血在後考脉在後陰日陰時血在前氣在後考脉歸原陽日陽時氣左轉先取陽經府病看陰日陰時氣右轉行屬陰經藏府病

生成數 陰不過陽陽不過陰

天一生水地六成地 二生火天七成天三生木地八成地 四生金天九成天五生土地十成

此是河圖五行生成之數 一三五七九者奇也屬之天 二四六八十者偶也屬之地 一二三四五六七八九十 者數何以能生出五行來 蓋自天開地闢之後 落下便有水此天一地六所生成也 如父母生子頭生男女第一行曰一故曰一六也 第二胎生男女第二行曰二 是二七生火餘皆如此 曰生成者生如父之資始曰成者如母

胎育也

刺法啓玄

十二陰陽氣血凝滯全憑鍼 炳細推十五行謹按四時 八節出入要知先後開闢慎毋妄別 左手按穴分明右手持鍼 親刺刺榮無傷衛氣刺衛母傷榮 血循捫引道之因 呼吸調和寒熱補即慢慢出鍼瀉即徐徐閉穴發明難素 玄微俯仰岐黃秘訣若能勞心勞力必定愈明愈奇 譬如閉戶造車端正出門合撤倘逢志士細推不是知音莫說了却個人規模便是醫中俊傑

提氣法歌

提氣臨時最有功 祛除頑痺與諸風 分明漏泄神仙訣 留此玄微在世中 又曰 提氣千遭其病自消

過關歌

龍先擺尾赤風後掃頭上下伸提切關節至交流

流氣歌

氣塊病初遭時時發熱病煎熬手中在為流注法腹

氣魂漸漸消

納氣歌

納氣逐與進氣同一般造化兩般工手中用氣丁寧死妙

理玄玄在手中

提鍼歌

提鍼之時最有功祛除頑痺與諸風尋思得遇真仙訣行

鍼妙訣在其中

進鍼歌

進鍼八法可用心却除病與通靈此法秘傳休妄說論

借還雷抵萬金

龍虎交戰歌

天降真龍從此起尅木白虎真全體反覆離宮向北飛消

息陰陽九六裏

龍虎飛騰

龍虎飛騰撚妙玄氣通上下似連山得師口訣分明說目

下教君病自痊

陽鍼男歌

午前要知寒與熱左撚為補右為瀉提鍼為熱補為寒此

是神仙真妙訣

陰鍼女歌

後午要知寒與熱左撚為補右為瀉提鍼為熱補為寒女

人反此誤分別

燒山火歌

四肢逆冷涼難禁怕寒不住病非輕撥忙運起燒山火患

人時下得安寧

透天涼歌

渾身却似火來燒不住時時熱上焦若還依法行鍼刺搜

除熱毒病能消

蒼龍擺尾歌

蒼龍擺尾氣交流血氣奮發遍體周任君疼痛諸般疾一

掉須交萬病休

赤鳳掃頭歌

下水船中一舵遊猶如赤鳳上搖頭迎隨順逆須明辨休

得勞心苦外末

于午撚白歌

于午撚白達者柳九入七出莫更移萬病自然合天數故

教病者笑微微

梓岐風俗飛經走氣撮要金鍼賦

觀夫鍼道捷法取奇須要明於補瀉方可是於傾危先分

病之上下次定穴之高低頭有病而足取之左有病而右

取之男丁之氣早在上而晚在下取之必明其理女子之

氣早在下而晚在上用之必識其時午前為陽午後

為晚陽陰男女上下憑脈分之手足三陽手大頭而頭走

是手足三陰足走腹而胸走手陰升陽降出入之機逆之

鐵再停○八曰抽漆之訣... 氣提按搜尋大要運氣周遍... 陰指下玄微胸中活法一有未應... 過節催運氣以飛經走氣其法有... 扶船舵不進不退一左一右慢慢... 似手搖鈴退方進員兼之左右搖... 穴如入土之象一退三追鑽剔四... 翅之儀入鍼至地提鍼至天候鍼... 右四圍飛旋病在上吸而退之病... 久患偏枯通經接氣之法已有定... 而下十四過經四寸手足三陰上... 在手搖動出納呼吸同法驅運氣... 可使寒者煖而熱者涼痛者止而... 立見時功何傾危之不起哉雖然... 分八法不離陰陽蓋經脈晝夜之... 和則身體康健否則疾病競生譬... 困江河浴谷值歲時風雨均調則... 或一方一所風雨不均遭以旱潦... 遂至人之氣血受病三因亦猶方... 以通經脈均血氣蠲邪扶正故曰... 子午流注逐日按時定穴

甲日戌時膽竅陰丙子時中前谷榮... 本丘墟木在寅庚辰經注陽谿穴... 時納三焦水榮合天干取液門○乙... 時榮少府心已丑太白太冲穴辛卯... 宮陰谷合乙木勞宮水穴榮○丙日... 廷治脹康庚子時在三間俞本原... 崑崙上甲辰陽陵泉合長丙午時... 細詳○丁日木時心少冲已酉大... 門穴癸丑復溜腎水通乙卯肝經... 中○戊日午時厲兌先庚申榮穴... 骨冲陽土穴必深原甲子膽經陽... 戊辰氣納三焦經火支溝刺必痊... 辛未時中魚際取癸酉太溪太白... 丑時合少海心已卯間使包絡止... 午膀胱通谷之甲中臨泣為俞木... 小腸陽谷穴戊子時居三里宜庚... 中不用疑○辛日卯時少商本癸... 衝原太淵丁酉心經靈道引已亥... 包絡準○壬日寅時起至陰甲辰... 後谿俞返求京骨本原尋三焦寄... 的親戊申時注解谿胃大腸庚戌... 寄井穴關冲一片金關冲屬金壬... ○癸日亥時并湧泉乙丑行間穴... 本尋腎水太谿原包絡大陵原并... 未肺經合尺澤癸酉中衝包絡連... 後學莫忘言

右流注歌徐氏所撰還原化本之理血氣所納之穴斯

右流注歌徐氏所撰還原化本之理血氣所納之穴斯

右流注歌徐氏所撰還原化本之理血氣所納之穴斯

昭昭矣

孫真人十三鬼穴歌

百邪癩狂所為病，鍼有十三穴，須認九鍼之體，先鬼宮，次
鬼信，信無不應，一從頭，逐一求，男從左，起女從右，一鍼
人中，鬼宮停左邊，下鍼右出，鍼第二手，大指甲下，名鬼信
刺三分，深三鍼，足大指甲下，名曰鬼壘，入二分，四鍼掌後
大陵穴，入寸五分，為鬼心，五鍼申脉，名鬼路，火鍼三下，七
經，第六却尋大村，上入髮一寸，名鬼枕，七刺耳垂下五分
名曰鬼牀，鍼要溫，八鍼承漿，名鬼市，從左出，右君，須記九
鍼間，使鬼路上十鍼，上星名鬼堂，十一陰下縫，三壯女玉
門頭，為鬼藏，十二曲池，名鬼臣，火鍼仍要七，銍銍十三舌
頭，當舌中，此穴，須名是鬼封，手足兩邊，相對刺，若逢孤穴

只單通此是先師真妙訣，狂猖惡鬼走無蹤

八法手訣歌

春真先深而後淺，秋冬先淺而後深，隨處按之，呼吸輕迎
而吸之，尋內關，補虛瀉實，公孫是列缺，次當照海，深臨泣
外關和上下，後谿申脉，用金鍼，先深後淺，行陰數，前三後
二，却是陰先淺後深，陽數法，前二後三，陽數定，臨泣公孫
腸中病，脊頭腰背申脉，攻照海，咽喉并小腹，內關行，處治
心痰後谿，前上外有背列缺，鍼時脉氣通，急按慢提，陰氣
升急提，慢按，陽氣降，取陽取陰，皆六數，達人刺處，有奇效

八法飛騰定十干八卦歌

壬申之日公孫乾，乙癸坤宮申脉連，庚日外關屬震卦，丙
從艮位內關便，戊日臨泣坎象卦，後谿辛日巽宮遷，丁日

允宮鍼照海已應列缺與離前

三陰三陽歌

丙手太陽壬足陽，庚手陽明戊足脾，焦手少陽甲足類，辛
手太陰己足詳，丁手少陰癸足論，心包厥陰乙足掌
一論甲竅除膽足少陽，經乙木是大敦，肝經足厥陰丙少
澤小腸名為太陽，心少衝穴少陰，手中央戊屬兌胃
穴足上陽明訣已應，脾鄉太陰足中絕，庚商陽大腸陽
明在手鄉辛少商為肺，太陰掌上詳，壬至陰勝腕原是足
太陽湯泉腎經穴，足上少陰鄉三焦為父，手少陽包絡足
上厥陰母

甲膽原來屬竅陰，二焦足是少陽經，乙木屬肝名大敦，包
絡同歸踝厥陰，丙似少陽少澤鄉，壬屬勝腕足太陽，辛屬
肺經少商穴，已隱脾足太陰，詳丁少冲來却屬心，湧泉腎
足少陰精，庚似商陽大腸絡，戊屬厲胃足陽明

血忌歌

行鍼須要明血忌，正丑三寅二之未，四辛五卯六酉宮，七
辰八戌九居巳，十亥十一月午，當臟子更加逢口閉

逐日人神歌

初十一廿一起足拇鼻柱，手小指初二廿二
日外踝髮際外踝位，初三十三二十三股內牙齒足及肝
初四十四廿四右腰間胃腕陽明，手初五十五廿五
并口內通身足陽明，初六十六廿六同手掌腕前又在
初七十七二十七內踝氣衝及在腕初八十八廿八
辰戌內股內又在腕初九十九二十九在足膝脛後

初二十三日辰背內踝足跌跪

九宮瓦神歌

瓦神所在足跟由坤內外踝聖人留震宮牙喘分明記巽
位還居乳口頭中官肩骨連房骨面背從乾上遊手膊
兌宮難眩灸良官腰項也須休離宮膝助鍼難一坎肘還
連肚脚求為醫精曉瓦神法萬病無干禁忌憂

太乙神人歌

立春辰上起天留戊寅巳丑右足求春分左脇倉門震乙
卯日見定為仇立夏戌辰巳巳巽陰絡宮中左手愁夏至
上天丙午日正值應猴離首頭立秋亥委宮右手戊申巳
未坤上遊秋分倉果西方兌辛酉遂從右脇謀立冬左足
加新落戌戌巳亥乾位收冬至坎方臨叶熟壬子腰尻下

不交發寒卷之四

七曲

發流五臟六腑并臍腹招遙諸戊巳中州潰治離疽當須
避犯其天忌疾難瘳

雜病十一穴歌

攢竹絲空主頭疼偏正皆宜向此鍼更去大都除瀉動風
池鍼刺三分深曲池合谷先鍼瀉承與除痲病不侵依此
下鍼無不應管教隨手便安寧○頭風頭痛與牙疼合谷
三間兩穴尋更向大都鍼眼痛大淵穴內用鍼行牙疼三
分鍼呂細齒疼依前指上明更推大都左之右交互相迎
子細迎○聽會兼之與聽官七分鍼瀉耳中聾耳門又瀉
三分許更加七壯灸聽官大腸經內將鍼瀉曲池合谷七
分中醫者若能明此理鍼下之時便見功○肩背并和肩
膊寒曲池合谷七分深未愈入準加一寸更於三間次第

入七分於穴內少風少府刺二經穴內淺深依法用

當時獨疾兩之經○咽喉以下至於臍胃腕之中百病危
心氣痛時胸結硬傷寒嘔噦悶涎隨列缺下鍼三分許三
分鍼瀉到風池二足三間并三里中冲還刺五分依○汗
出難來到腕骨五分鍼瀉要君知魚際經渠并通里一分
鍼瀉汗淋漓足指三間及三里大指各刺五分宜汗至如
若通過體有人明此是良醫四肢無力中邪風眼溢難開
百病攻精神昏倦多不語風池合谷用鍼通兩手三間隨
後瀉三里兼之與太冲各入五分於穴內迎隨得法有功
○風池手足指諸間右瘳偏風左口癱各刺五分隨後瀉
更灸七壯便身安三里除交行氣瀉一寸三分量病看每
穴又加三七壯自然癱瘓仰時安○肘痛將鍼刺曲池經

不交發寒卷之四

七曲

然合谷共相宜五分鍼刺於二穴瘳病經身便得離未愈
更加三間刺五分瘳刺灸疑又兼氣痛憎寒熱間使行
鍼宜用連○腿膝腰疼氣攻髓骨穴內七分窮更鍼風
市兼三里一寸三分補瀉同又去除交瀉一寸行間仍刺
五分中剛柔進退隨呼吸去疾除痲指工○肘膝疼時
刺曲池進鍼一寸是相宜左病鍼右右病左依此三分瀉
氣奇瘳痛三寸鍼瀉鼻三里陰交更七吹但能子細尋其理
如瘳之功在時

半身不遂

左癱右瘳

半身不遂患偏風有顛曲池列缺同陽陵泉手三里合
谷絕骨上廉中環跳崑崙照海穴風市三里委中攻足無
瘳治上廉左癱右瘳曲池先陽合谷及中渚三里陽

<p>中風或目 土足</p>	<p>驚勞 風勞</p>	<p>風眩 風痛</p>	<p>二股馬針</p>	<p>口甘不潤 風痲癢什</p>	<p>骨熱癩疾 惡寒</p>	<p>寒熱</p>	<p>汗不出</p>
<p>類車承祭合谷該風痲疾發僵仆地風池百會灸無災○ 又曰半身不遂云中風七處各灸三壯同如風在左灸在 右患右灸左艾氣通等穴須從百會起大及耳前之髮際 第三肩井四風市六是絕骨五三里乃若曲池居第七灸 之神効無可比二椎五椎各七壯狀如羊羹核大炷以此 同灸二椎上中風目戴不能語</p>							
<p>身執頭痰積竹穴大陵神門與火澤合魚際中者間液 門委中與太白酒浙惡寒慄鼓頰 痛谷鍼巨細三里復溜蕪蕪泉公孫六三委中穴蕪治伏 知病有交寒熱風池與少海魚際合谷在復溜太白 臨泣中八穴治之病自瘳傷寒汗不出風魚際二間</p>							

<p>發狂</p>	<p>大便不通</p>	<p>發狂</p>	<p>大便不通</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	<p>痰喘咳嗽</p>	
<p>經不經不解期門上餘熱不盡先曲池火及三里與合 谷二穴治之餘熱除腹脹三里內及中陰發傷寒神闕攻 谷壯須及二三百焦幾能保命不終大熱曲池及三里復 瀉不失患者起嘔噦百會曲池中關使勞宮商丘底腹寒 熱氣少中商丘太冲行間同三陰交与隱白陰陵三 壯炷火紅發狂間使與百勞合谷復溜四穴焦不省人事 中商穴三里大敦二穴燒秘塞照海與章門小便不通陰 谷焚更煎陰陵三穴治之患者效自臻</p>																					
<p>痰喘咳嗽 痰喘咳嗽</p>																					

五勞傷
精虛

嘔氣

結積勞嗽

失精遺精大難... 肺痿法... 谷及隱白乳下... 與大敦火... 效... 膠膈俞五...

氣塊公氣一切... 溝上脫... 心下如痞... 腕痺背肢... 與天澤三...

可失大冲神門二穴中... 逆大陵曲泉二里... 者咳逆無所出... 大淵不可失... 寒治少商...

病即康... 澤上小氣... 俞然谷至陰... 諸積三里... 俞三焦俞上... 半弓二十七... 穴鍼三十...

乳根善
胃者若欲灸人... 穴須用線一條... 盡處是穴端...

腹痛脹滿
腹痛三里與內... 白中腕與行間... 下旁治內... 腸外外... 灸五壯男... 云于小腹...

市承山下... 夾臍痛... 冲太白引... 大都陷谷... 治勝脈... 絕骨上... 敦中腹... 中內庭... 脹而胃... 陽門水... 堅大冲... 穴是木...

腹角
食不下
小腹急痛
疝氣心痛
小腹脹痛

後湖上一穴治之命堅生... 痰疾各本三星期

心脾胃

心痛間使與曲池內關大陵神門腎太淵大谿通谷穴巨... 心煩... 吐冷酸水... 者冬之病自除心風灸心中腕者煩悶腕骨觀虛煩

心邪癡狂

口乾肺俞攻煩恣不卧治太淵公孫隱白陰陵泉肺俞三... 陰交六穴治之不患病不瘥煩喜心兮治少商再蒸大谿... 治之立見有神功嗜卧百會與天井二間三間大谿頂照

刺胃

胃俞脾胃及中腕膈俞百壯者安噎食不下治勞宮少... 商大白公孫同三里中腕中腕穴膈俞心俞胃俞中三焦... 俞兮大腸俞食兮下咽有冲功不能食兮治胃俞少商三

心邪癡狂

心邪癡狂搯竹穴陽谿開使入澤瀉狂野俞至百壯曲... 池一七理所當小海火氣開穴陽谿陽谷大陵方京骨... 合谷與魚際腕骨神門與中腕夜門穴與行間穴十六穴

及六陵并及水溝與列缺等穴百會水溝中日妄視方風
府攻鬼邪須治則使穴仍鍼後 起鬼宮試問鬼宮何所
在要識此穴即人中二魁信弓手大指甲下入肉三分是
三魁聖方是大指甲下入肉二分是四魁心弓即大淵治
之須至八寸半男從左方女從右起鍼之法依此等五鬼
路考即中穴大鍼七錢 三分下六鬼枕弓大椎上入髮
一寸非虛假耳前髮際七鬼床八鬼市穴即承漿九鬼營
即勞宮穴七鬼穴是入鬼室大鍼七錢鬼堂用鬼藏陰下
縫三壯十二鬼長即曲池大鍼亦與曲池宜十二輪該是
鬼封即是舌下一寸縫依次而行鍼灸倫二者兼到有神
功假如見鬼治陽氣九人歷夢商宜中惡不省水溝穴
中腕氣海當魚鬚不省人事用三里大敦一穴相兼治發

任少海間使中合谷後熱絲竹空并兼復溜穴在內治之
立持有神功往走風府陽谷安孤鬼邪神邪在與癩兩旁是
大搏肩絕縛定矣四尖要識此穴名鬼眼灸至三壯病必
痊小兒奶癩驚癩亦依此法一壯燃平任間使合谷中
并及後路三穴攻癩癩指掣門穴陽谷腕骨與勞宮帶
脉一穴并四穴通前五穴收全功呆癡神門少商宜湧泉
一穴與心俞登高而歌攝衣走久狂神門及後路并及中
腸共三穴于間感應似神祇煥發百會解谿頭基驚下廡
一穴末癩疾前不後路穴解谷金門及水溝并兼一穴是
申脉按穴治之此疾瘳

霍亂陰陵水穴次及解谿與太白霍亂吐瀉治關中又

支津中霍亂轉筋支津同逆數大都太白穴公孫丘
解谿攻再及中封承山穴陰陵陽輔與關中

瘧疾

瘧疾百會與經渠前谷三穴實相宜溫瘧中腕大椎穴乃
若瘧瘧治腰俞假如瘧疾發寒熱合谷液門商陽別瘧瘧
寒熱後谿穴兼治合谷隨即歇瘧疾依寒治上星丘墟陷
名得安寧頭痛脫骨神效得寒瘧三問治之精假如心煩
治神門寒瘧不食治公孫內庭厲兌共三穴久瘧中渚商
陽焚此疾兼治丘墟穴叮嚀騎者識此文熱多寒少問使
中并兼三里有神功脾寒發瘧大椎穴間使乳根三穴同

腫脹

津身浮腫治曲池合谷三里內庭醫行間陰交六穴治
之此病絕根株水腫列缺腕骨管合谷間使陰陵宜陰谷
三里曲泉穴復溜陷谷與解谿公孫厲兌冲陽穴陰陵水
分并胃俞并兼神闕十八穴速除此疾無憂四股浮腫
曲池中通里合谷中渚同液門三里三陰交風腫身浮解
谿攻腫水氣脹滿復溜并兼神闕功效收水脹滿陰陵
泉通身腫滿疾久纏更兼飲食又不化腎俞百壯病即瘳
九人消痺治太谿傷飽身黃章門腎紅腫合谷與百會委
中三里與曲池黃瘧百勞腕骨中三里湧泉中腕同然谷
太冲復溜穴皆且大陰與勞宮還有脾俞兼在內大谿一
穴在中封

汗

治之先次瀉復瀉汗即乾少汗先瀉
復瀉瀉即瘳有汗列缺與曲池火商麓崙沖
方救瀉泉穴無汗上星亞門腎中冲陽谷腕骨穴然谷風
府與風池中者液門及魚際合谷支溝與經渠大陵少商
尚陽等大都委中與俠谿而谷厲兌 廿二穴仔細治之
病自除汗不出者曲澤燒魚際少澤上星高曲泉復瀉崑
崙穴俠谿谿陰九穴焦

痺厥

風痺尺澤陽輔區積痺瘰瘰治膈俞寒厥太淵液門穴假
如痿厥治丘墟尸厥如死不知事瀉灸三壯於厲兌身寒
痺治曲池穴列缺環跳與風市委中商丘及中封耳垂臨
泣八穴攻厥逆列缺與中冲金門大都內庭中厲兌隱白
大敦穴瀉治八穴為有功四支尺澤與支溝少海前谷三
里頭三陰交與曲泉穴照海內庭大敦丘行間大都十二
穴次第詳治病即瘳

腸痔大便

腸鳴三里陷谷焚公孫太白與章門神闕胃前三焦俞三
陰交兮與水分腸鳴而泄神闕穴并治三門與水分食泄
上焦與下焦其泄瀉治隱白濟洞泄宜治腎俞穴瀉泄太
冲與神闕并治一穴三陰交泄不止者亦神闕泄不覺兮
治中脘痢疾曲泉大谿使太冲胃與脾俞並治小腸俞
改善使血水山并復瀉太冲太白四穴求大便不禁卅田
穴蒸治大腸俞即瘳大便不通者大谿山照海太冲宜
小腸俞穴與太白章門穴與神闕大便秘下重治承山

白帶淋漓刺紫照海穴
曲泉使白濁變然谷穴
會陰穴長瀉之穴與太冲
不通者胃腕穴功
中脘谷大腸俞與同乃若脫
此其瀉用治穴隨年壯
山復瀉二穴攻若足痔
宜治三白間瀉兼長
寒疝腹痛除中宜并及大
疝大敦與丘墟瀉治中
曲泉與中封并瀉商丘與大
里脾俞同陰交穴曲泉穴其
云疝瘕除陵大谿立瘕使
所差腸瘕疝小腸瘕瘕至百
俞三穴治之有神應傷降本
該陰疝太冲大敦穴二穴治
醫家宜把燔刺五樞氣海及
腎大小便秘或陰入腹大敦
三陰交腎俞除瘕腫痛治曲
敦大谿穴腎俞中極三陰交
與中極更治一穴三陰交四
淋瀝濁元陰病其可必腎虛
令日漸瀉陰寒少氣遺精

疝

疝
寒疝腹痛除中宜并及大
疝大敦與丘墟瀉治中
曲泉與中封并瀉商丘與大
里脾俞同陰交穴曲泉穴其
云疝瘕除陵大谿立瘕使
所差腸瘕疝小腸瘕瘕至百
俞三穴治之有神應傷降本
該陰疝太冲大敦穴二穴治
醫家宜把燔刺五樞氣海及
腎大小便秘或陰入腹大敦
三陰交腎俞除瘕腫痛治曲
敦大谿穴腎俞中極三陰交
與中極更治一穴三陰交四
淋瀝濁元陰病其可必腎虛
令日漸瀉陰寒少氣遺精

...治一穴是腎俞遺精白濁腎俞...
關元穴與三陰交夢泄百壯曲泉穴中封太冲至陰高陽
合神命腎俞平關元三焦三陰交寒熱氣林陰陵宜淋瀝
此然谷蠶陰陵行開人敦穴湧泉氣門小腸俞小便黃
赤陰谷中大谿腎俞泉海同勝脫俞穴大敦穴通治六穴無缺
有和功小便五色治交中須把前各第二攻小便不禁上
承陰陵委中大冲則勝脫俞穴大敦穴通治六穴患者
交小便赤如血大陵治關元病始輕婦人胞轉小便艱
二七壯者治關元遺溺神門魚際穴太冲大敦及關元陰
痿九寒陰谷中然谷三陰交中封兼治大敦通五穴此病
立待有神功除擬出治太冲少府照海曲泉同疝氣備
墜用小繩患者口角單一形分作三摺成三角如△字樣

頭面

為權衡一角安在臍心上兩角安在臍下平兩角畫處是
灸穴患左患右灸及更各三七壯病立愈二穴俱灸亦安
寧勝脫氣攻脇臍下陰腎入腹痛染增自臍量下至六寸
兩旁各十是穴中患左患右灸及覆炷如小麥大相應

頭痛百會七星中風府推竹小海攻陽谿後谿合谷穴腕
骨中者絲竹空風池崑崙陽陵等并無一穴是中冲頭強
痛者治頰車并治有井及風池少海穴并兼在內通計五
穴至後谿頭偏痛者鐵頭錐腦瀉通谷醫頭風上星
前項穴百會陽谷合谷宜通前通後共八穴崑崙關元與
俠谿腦痛上星風池中腦空天柱少海攻頭風而目赤何
通單解氣真有功腦風牽引腦項痛上星百會合谷

偏正頭風百會穴前項神庭上星通風池合谷頭維等攢
竹筵絲竹空醉後頭風治印堂推竹三里三穴當頭風眩
暈治合谷次及豐隆解谿方再兼風池通四穴垂手著膝
著腿雙兩般皆灸虎口內更詳此處宜灸壯面腫水溝與
上星攢竹艾淋開使應中渚液門解谿穴行間厲兌噫嘻
選再兼天膈風池等十三穴內治之精而痒腫者治迎香
再兼合谷治之良患者頭面項俱痛百會項後合谷強假
如頭風冷淚出攢竹合谷治無失腦昏目赤攢竹中頭旋
目窗百會同申脉至陰絡却穴通前五穴治有功至若面
腫與項強鼻生息肉治承漿頭腫上星前項穴大陵出血
公孫央若人類腫治頰車頤頰腫者陽谷宜腕骨前谷商
等穴谿手三里丘墟風動如強行迎香頸項強急風府

咽喉

凡人喉痺治頰車合谷少商與經渠太陵二間與尺澤再
兼前谷與陽谿假如鼓頰治少商咽中如鯁間使當再兼
一穴三間穴咽腫中渚大谿穴咽外腫者液門液門咳嗽食不
下灸中咽中閉者治合谷并有曲池二穴同咽喉腫痛
又閉塞水粒不下合谷得少商兼以三稜鍼刺于大指背
頭吉節上甲根不可差排刺三鍼斯為畢雙轉上液與金
津又兼少商三穴艾單鴉少商合谷等并治喉痛

有咽喉腫閉甚治之以細三稜針把鍼藏在筆端內以
藥點腫給患人却將筆端點腫處刺之立愈病除根續添
一語是咽喉若治風府效如神

耳目

鳴百會與聽宮聽會耳門絡却中陽谿陽谷前谷穴後
腕骨中渚同液門商陽腎俞頂竈并十四穴裏攻聾耳
生瘡有膿汁耳門翳風合谷窟重聽無所聞耳門翳風
也俠谿焚聽會聽宮通六穴治之此患定不存凡人目赤
目窗鍼大陵合谷液門臨上星絲竹空攢竹七穴治之病
絕根目風赤爛陽谷燒赤翳攢竹後谿高耳蕪液門通三
穴斯病可待無根苗目赤膚翳治大淵俠谿攢竹風池前
目翳膜者治合谷臨泣角孫液門前後谿中渚睛明穴白
翳臨泣肝俞痊睛痛內庭與上星假如冷淚治睛明臨泣
風池腕骨穴四穴不失醫者精迎風有淚治領維睛明臨
泣與風池眼淚出治臨泣穴百會液門與後谿通前通後
共八穴必是前谷與肝俞風生卒生翳膜引兩目痛弓不
可忍睛明穴及手中指本節間尖三壯準眼睫毛倒絲竹
空青育無見肝俞中并及商陽通二穴患左患右左右攻
眼背急痛三間醫假如目昏治頭維攢竹睛明目窗穴百
會風府與風池合谷肝俞絲竹空并蕪一穴是腎俞目眩
臨泣風府中風池陽谷中渚同通前通後共八穴液門魚
際絲竹空目痛陽谿二間精次及三間與大陵前後總算
六穴治須蕪前谷與上星目眩爛見風洞流宜治頭維額
額頭眼痒眼痛光明治五

命門童子察穴宜外背五分得氣湯再蒸合谷商陽
小兒雀目不見物手拇指甲後一寸宜在內廉外紋頭白
肉際各一壯穩

鼻

鼻有息肉治迎香血風府風池良合谷二間三間穴後
谿前谷委中強中脈崑崙并厲兌蕪治上星隱白長執
風府與二間并蕪一穴是迎香鼻塞上星臨泣燒百會前谷
厲兌高通前通後共七穴蕪治合谷迎香焦鼻流清涕治
人中上星風府二穴攻腦瀉鼻中臭涕出曲差上星治有
功鼻衄上星二七壯蕪治絕骨顛會康又法灸項後髮際
兩肋中間宛宛穴久病流涕出不禁百會灸之病絕根口
乾尺澤與曲池大陵二間少商穴再蕪一穴是商陽仔細
治之效自獲明乾大淵魚際中消渴水溝承漿通金津玉
液曲池穴太冲行間與勞宮商丘然谷隱白穴百日已上
不可攻香乾有涎治下蕪舌乾涎出復淵大谷乾飲食又
不下三間少商治之痊愈如香動如虫行水溝一穴治之
寧唇腫宜治迎香穴口喎眼斜頰車精水溝列缺大淵穴
合谷二間絲竹空蕪治地倉極有效感應最速如神靈口
緊夾車與支溝外關列缺內庭頭再蕪厲兌通二穴次第
治之病自瘳失口不語治間使支溝靈道蕪魚際合谷陰
谷復溜穴并治然谷病即愈舌緩大淵合谷中冲陽內庭
風府同通前通後共七穴三陽交穴崑崙治古強啞門少
商穴魚際二間與中冲并蕪陰谷然谷等七穴治之為有
功假如古黃治魚際齒寒少海會為貴齒痛商陽一穴

齒齲惡風合谷利升燕屬兌二穴攻醫者尋起須仔細
鷓鴣兌火海宜小海陽谷合谷奇液門二間門庭等斷痛
角孫火海若古齒腐兮承漿穴須無勞宮二穴醫牙疾少
海與曲池陽谷二間與陽谿更兼內庭與呂細并及液門
與頰中上牙疼兮治人中太淵合細三穴通臂上起肉中
五炷灸之立待有神功下牙疼者龍玄穴側腕交叉脉是
斯并及承漿合谷腕上五寸兩肋間灸至五壯病必痊
不能嚙物角孫強牙疳蝕爛至生瘡炷如小筋頭樣大七
壯須灸在承漿

胸背脇

胸滿經平與陽谿後谿三間間使宜陽陵三里曲泉穴足
臨泣等九穴醫假如胸痺治太淵胸膈悶兮肩井痊胸脇

胸背脇

九

痛者天井穴支溝間使太白連三里大陵丘墟等陽輔八
穴實為便胸中淡者間使宜胸滿支腫治膈俞再兼內關
通二穴得效最速定不遲胸脇引滿腹下廉丘墟俠谿腎
俞運假如胸煩期門穴胸中煩者豐中安有背痠疼治風
門肩井中渚支溝後谿腕骨委中穴次第治之病不存
心脇痛者治尺澤內關大陵三穴若胸滿血膨有積塊霍
亂腸鳴喜噫帶三里期門向外鍼二寸不瀉亦不瀉假如
脇痛章門奇脇痛陽谷腕骨宜支溝膈俞及申脉缺盆腫
足臨泣醫脇與脊引肝俞燒背項急大椎焦腰背強直
難轉側腰俞肺俞二穴高腰脊痛楚委中頭再兼一穴是
復溜腰背偃僂風池穴并治肺俞病即膠背拘急者治經
渠肩背相引二間宜商陽委中崑崙穴假如偏脇背痺酒

魚際委中穴可保此病無根株背痛魚際與經渠崑崙
京骨及丘墟脊脊痠痛委中穴腰背俱疼治風池天牖合
谷崑崙等四穴善治身不疲者肉牽疼難屈伸合谷復溜
崑崙真胸連脇痛期門穴宜於此處先入鍼章門穴與丘
墟穴行間湧泉須細尋肩痺痛者治肩髃宜兼天井與曲
池并治開冲與陽谷五穴仔細疾不居

手足腰腋女人

手臂痛難舉曲池須兼尺澤與肩髃三里少海大淵等陽
池陽谷與陽谿前谷合谷液門穴外淵腕骨次第醫臂寒
田澤與神門臂內廉痛大淵林火臂腕側痛治陽谷手腕搖
動曲澤存腋痛少海間使宜火府陽輔與丘墟須兼申脉
足臨泣腕勞天井治曲澤間使中渚與陽谿陽谷大淵腕

手足腰腋女人

九

骨等列缺液門十穴醫手腕無力列缺中肘臂痛者肩髃
攻曲池通里手三里四穴能除肘臂疼肘臂曲澤及肩髃
少海間使與後谿復瀉入後谿等七穴訓治病自除肩
背痠重治支溝肘臂手背痠疼曲池三里外關等兼治
中渚病即廖手背麻木天井宜外關支溝與曲池陽陵腕
骨上廉等再兼合谷與後谿手背於痛肩井中曲池下廉
三穴攻手背拘攣并筋痛曲池陽谷合谷同手熱曲池與
內關曲澤列缺經渠間大淵中冲少冲等勞宮九穴病必
安臂腫經渠曲池中渚里中渚合谷同并兼液門手三
里治之立待有神功風痺手攣不舉證尺澤曲池合谷應
差點拘攣不安偏風痲痺痺痺等胸脇填滿及筋緩無
力皮膚枯槁病前此九病後補宜肩髃手三里為證有臂

治曲洋小海間使大陵瘞腋下列者陽輔宜足臨泣考與
 丘墟腰痛肩井環跳穴陰市三里委中熾承山陽輔崑崙
 穴復兼腰俞與腎俞兩腿如水陰市中挫閃腰疼脇肋疼
 尺澤曲池合谷穴三陰交穴與陰陵行間三里手三里腰
 疼難動風市攻耳燕委中行間穴二穴治之誠有功腰疼
 強痛治腰俞委中湧泉小腸俞膀胱俞穴宜兼治腰脚痛
 者環跳宜風市陰市委中等取崑崙申脉腎腰膝內痛
 治委中三里三陰交穴同腿膝疼環跳穴陽陵丘墟三
 穴攻海膝痛者委中熾三里崑崙陽陵焦風市崑崙解谿
 等已上七穴最為高廉治脚腫治委中三里陽輔解谿同
 再及水山通五穴要如坐水陽輔攻足瘦不收治復溜風
 痺脚腫麻木憂宜治環跳風市攻足麻痺等環跳立陰陵
 陽輔大谿穴兼治至陰五穴膠脚氣肩井膝眼中風市三
 里承山同太冲丘墟行間穴髀樞痛者環跳攻陽陵丘墟
 共三穴病者治此為有功足熱考治三里委中陽陵復
 溜底然谷委中實骨焦一麻風市共七穴足寒如水腎俞
 高澤身戰掉及筋疼承山合門二穴觀足筋寒者復溜穴
 兼治申脉屬兌端足變骨陽陽陽陽絕骨皆宜焦月
 事不利治中極再煎一穴三陰交過時不止應白顏下經
 冷來治關元假如女人漏不止太冲三陰交為便血崩氣
 海與大敦陰谷太冲然谷三陰交穴與中極七穴治之
 高澤身戰掉及筋疼承山合門二穴觀足筋寒者復溜穴
 兼治申脉屬兌端足變骨陽陽陽陽絕骨皆宜焦月
 事不利治中極再煎一穴三陰交過時不止應白顏下經
 冷來治關元假如女人漏不止太冲三陰交為便血崩氣
 海與大敦陰谷太冲然谷三陰交穴與中極七穴治之

海等間使三陰交為宜小復堅治帶脉中絕子三五中極
 攻因產惡露或不止氣海關元必有功產後諸病期門宜
 乳癰下廉三里醫魚際少澤委中穴足臨泣考與俠谿乳
 腫痛治足臨泣難產合谷加無失再瀉一穴三陰交兼治
 太冲期為畢橫生死胎治太冲合谷三陰交穴同假如橫
 生手先出右足小指尖上攻三壯五壯為冬數炷如小麥
 大有功子上逼心氣欲絕這難須當攻巨關三陰交瀉合
 谷補產婦端的無險跌假如子手掬母心生下男女左右
 痕或在手心或腦後不在腦後人中尋產後血暈不識人
 支溝三里三陰交墮胎手足如水厥肩井五分鍼病消覺
 悶急鍼三里穴胎衣不下中極高煎治一穴是有井陰挺
 出者曲泉焦照海大敦共三穴無乳宜中火澤燒血塊曲
 泉復溜中三里氣海丹田同復帶三陰交一穴醫人須當
 仔細攻婦人經事若正行與夫交感瘦漸形寒熱往來精
 血競此病若把虛勞名宜治百勞腎俞等風門中極氣海
 并再煎三陰交在內如此治之功必成諸節皆治陽輔海
 如婦人臍腓病承山崑崙穴相應足緩陽陵冲陽中丘墟四
 穴定乃若脚弱治委中三里承山三穴同兩脚紅腫更疼
 痛膝關委中三里攻再煎陰市通四穴次第治之極有功
 若患穿跟草鞋風崑崙崑崙崑崙崑崙崑崙崑崙崑崙崑崙
 此妙術醫者通足不能行治曲泉三里委中陽輔復溜
 冲陽然谷等申脉行間骨連三陰交穴帶在內十一治
 之病即痊脚腕痠者委中喘再煎一穴是崑崙足心疼真
 命脚筋短急足重沉難轉風腫侵惡發不能起床榻

此等宜於風市... 痺脚筋又... 三壯一同灸... 灸至曉曉... 時可守腰... 壯灸指日... 癆膝下病... 絕骨崑崙... 如腿痛真... 伏兔鍼為... 里百壯灸... 絕骨良脚... 在內外筋... 紙

婦人

月脉不調... 及肩俞斯... 兮曲池穴... 三陰交欲... 分灸灸至... 苗一切冷... 用鍼開元... 小兒

大小五瀉水... 與金門... 及巨關

風腓骨最為... 目帶上... 病治太冲... 治百會... 脉中假如... 關灸至三... 勞宮二穴... 臍四邊各... 頂上旋毛... 麥大有功... 目赤皆大... 三壯頸門... 壯灸倉未... 灸止三壯... 瀾如尸厥... 上至五分... 推拿節間... 無災難牛... 有方僕參... 應假如大... 身生瘡曲... 膝眼二七... 輸六冲穴

熱風癩疹... 有願成曲... 池曲澤環... 跳等債帶... 合谷

湯泉腫脹振寒火海中疥癬瘡方曲池攻文瀟陽谿陽

谷等六陵合谷後谿同委中三里陽輔穴崑崙穴與行間

通三陰交穴百重葉十四穴治為有功

丁瘡 溺死 犬傷 蛇傷 脉絕 癰疽

疔生面上與口角須灸合谷瘡即落若生手上灸曲池若

生背上有井索三里委中臨泣中八穴灸之不可錯行間

通里火海蕪復帶太冲無病惡假如癩癰火海尋此穴皮

上宜先鍼二十六息推鍼入內須當定淺深追核大小

勿出核三十三下乃出鍼天池章門臨泣等穴瀉陽輔百

壯真復蕪肩井手三里肩井隨年壯為吟癰疽發背肩井

攻耳蕪一穴是委中以蒜片貼瘡上灸如不疼灸至疼

愈多愈好是此病若疾宜灸至不疼 溺水死者雖經宿

細按神經亦可救即解死人末帶開速急把他臍中灸

般如人被狂犬傷當時須灸咬處瘡 九人若是蛇傷

者亦把咬處灸三壯仍以蒜片貼咬處灸在蒜上即安康

人脉微細不見臨或時無有不可尋少陰經方復溜穴此

穴宜刺圓利鍼鍼至骨處順鍼去下刺候回陽脉臨陽脉

生時方穩當方棄此際可出鍼 癰疽瘡毒實難醫患人

須將竹馬騎薄茂用量患人手尺澤橫紋頭比齊起循肉

指至中指尖上截斷斯為宜竹杠兩頭置凳上患人去衣

方可騎須當以足微點地比篾頭安竹杠皮循肉直上篾

書處醫者須當墨點記只是取中非灸區更以薄篾量中

指中節兩紋為一寸將篾以墨點為土點上兩傍各一寸

是穴各灸五七炷或五或七不可多此法灸之無不愈

附辨

或問晴明迎香承泣絲竹空皆禁灸何也曰四穴近目

畏火故禁灸也以此是推之則知晴明可灸王註誤矣

或問迎而奪之隨而濟之此固言補瀉也然其義何如曰

迎者逢其氣之方來如寅時氣來注於肺卯時氣來注

大腸此時時肺大腸氣方盛而奪瀉之也隨者隨其氣之

方去如卯時氣去注大腸辰時氣去注於胃肺與大腸

此時正虛而補瀉之也餘倣此

或問腓穴鍼入幾分留幾呼之說曰愚以為初不如是相

拘蓋肌肉有淺深病去有遲速若肌肉厚實處則可深

淺薄處則宜淺病去則速出鍼病滯則又留鍼為可耳

故曰刺虛者須其實刺實者須其虛也

或問孫氏以灸為閉門趕賊何如曰夫以火瀉者疾吹其

火則火氣與邪氣去矣此內經火瀉法也又胡為而閉

其門手至於氣鍼雖微妄加無病則氣之瀉若河決下

流不可以其微而輕之也孫氏之云特歸重於火鍼耳

要之言不能無弊故曰立言難

或問人神隨年歲巡歷於身死神逐日坐臨於人若人死

此神與之俱死乎抑出於人之身飄流於天地間而失

所依乎抑別求人而附之手若別欲依人則人人自有

神矣將飄流天地間無人可依神亦離散矣既曰神則

靈變莫測者也何必求人而附之乎人之心為君主之

官神明出焉胡不驅此神使身安而不為鍼灸所犯乎

曰曰人神死神後世術家之言素難未有也何足信哉

或問胃之大絡曰足其動意大脉宗氣也而不係於

補瀉之列豈以神穴而廢之歟曰此固氣之所聚血之

盛會矣刺之禁也其過與不及自有其道焉蓋中焦

之氣盛衰而宗氣為之盈縮取之三里以下其氣而宗

氣之盈者消瀉之三里以補其氣而宗氣之耗者滋則

其氣未嘗不補瀉也特以非別走他經故不在諸絡之

例此所以舉豐隆而不厲虛里也歟

或問素問難經論鍼之旨何如曰素問博而詳難經精而

約其道則一而已孟子謂博學詳說將以反說約二書

不可偏廢也

或問古人補瀉在井榮俞經合然睛明瞳子膠治目疼聽

官絲竹空聽會治耳聾迎香治鼻地倉治口喎風地頭

維治頭項不係井榮俞經合何也曰以其病在上取之

上其高者因而越之之意也

素問補遺註云動氣至而即出鍼今鍼入穴邪氣吸拔推

之不前引之不後轉之不移必俟氣衰然後退鍼豆許

如此者三而可出也若僅能轉鍼而遽出之則血隨鍼

寫在於多氣少血之經尤所當忌吾嘗謂遺篇之補出

于後人之託其經註一律出於一人之手由是觀之豈

特註說未當而已邪

十二經絡窮穴各有流注衰王之時按時補瀉固是今病

在各經絡者或按時亦能去病蓋病著于經其經自有

虛實補虛瀉實亦自中病也病有一鍼而愈者數鍼始

愈蓋病有新故淺深新且淺一鍼可愈若深痼者必屢

鍼可示如服藥然有一二劑病退有多服至四十五劑

或累百而愈

或問鍼形至微何以能瀉有餘補不足曰如氣毳然方其

未有氣也則屬塌不堪蹴踢及從竅吹之則氣滿起胖

此虛則補之之義也去其數之所塞則氣從竅出復屬

塌矣此實則瀉之之義也

或問素難長沙東垣實肥瘠實桂芳鍼法何如曰素問猶

五經之載難經猶易之十翼發明素問長沙東垣則

如濂洛閩關之精思力踐二實猶老列荀揚文雖曰體

道不能無偏倚駁雜要之素問長沙東垣如美玉而二

實誠為有瑕之璧也

或問難經小學云出鍼不可猛出必須作三四次徐徐轉

而出之則無血若猛出必見血也素問補遺篇註云動

氣至而即出鍼此猛出也二說將誰從哉曰經絡有疑

血與欲大瀉者當猛出若尋常補瀉必當從醫經小學

也

或問銅人千金等書空穴多十四經所載空穴少如

風市督俞金津玉液等彼有此無不同何也曰十四經

發揮據素問骨空篇論及王註若銅人千金纂備書非

岐黃正經也

針灸聚英四卷

兩淮鹽政
採進本

明高武撰武始末詳是書以經絡窅穴類聚為

一卷各病取穴治法為一卷諸論針艾法為一卷

各歌賦為一卷凡諸書與素問難經異同者取其

同而論其異故以聚英名書其所蒐采惟銅人明

堂子午及竇氏流注等書餘皆不錄

鍼灸節要三卷

〔明〕高武撰

中國中醫研究院圖書館藏明嘉靖十六年

陶師文刻本

附《四庫全書總目·鍼灸節要

三卷》提要

嘉靖十六年丁酉陶師文梓行
書成於嘉靖己丑見
聚英序
乙庫尚有乙庫是以聚英單行
其即時較此本為早情無上快
之節要

鍼灸節要聚英敘

醫書最古而可信者莫如素
難於鍼灸之訣又獨詳焉蓋
原人之經絡血脈陰陽表裏
以起百病之本而鍼石湯火
各有所宜施其齊之得也雖
磁石取針何足云喻然每患
於註述乖刺拙者用之往往
失理鮮不以瘡為劇可不慎
耶四明梅孤子高武纂集鍼
灸節要及聚英共三帙一切
以素難為主而於後世之專

門名家多附述焉其用意勤
甚少參東石戴公既親為校
正且委諸鉛令未齋陶君師
文梓而行之是將廣其傳於
世欲人知所師而用之庶乎
其不繆也仁者之政類如此
矣陶君屬予言為之叙予因
題數語於簡端俾世之知此
書之傳實自二公始而醫之果不
繆也則高子之功何可少哉謹敘
嘉靖丁酉仲夏九日弋陽黃易書于

九潭精舍

鍼灸節要總目

一卷

九鍼圖

難經

相傳

鍼刺淺深

井榮俞經合主病

歲府榮合合主病

陰陽井榮和生

刺井當刺榮

奇經八脉

奇經病

八會刺穴

二卷

靈素

用鍼方宜

九鍼應天地人以起用

五刺應五歲

十二刺應十二經

刺常人

刺壯士

刺脉虛實淺深

刺胸腹

補瀉相反

先後淺深

四時井榮俞經合刺

歲府井榮五六

出井入合

經脉流注

十五絡脉

十二經以原為俞以俞為原

上下工治病

九鍼式

九鍼所宜

九刺應九變

黑白肥瘦刺

刺王公大人布衣

刺嬰兒

十二經氣血刺

補瀉

標本

鍼灸手

五奪不可傷

刺避

五節刺

刺弊

十二絡終刺

巨刺

深淺上下所宜

氣清濁淺深刺

五氣刺

耐痛

三刺救氣

刺宜從時

刺逆四時

禁太過不及

五藏病刺

血氣不同形

經刺

脉刺

人身左右上下虛實不同

死期不可刺

氣血盛衰

五逆

熱

腰痛

癱狂

痿

脹

大風

偏枯

癱

耳鳴耳聾

墜股

欠

喘噫

振寒

噫	泣竭成盲
太息	淚下
口目喎僻	筋鳴
日眩頭傾	喉痺
齒痛	衄
喘	怒
顛	頭痛
足	下血
疝	轉筋
厥	痲
霍亂	目痛
卒然無音	目不視不卧
氣交暴鬱刺法	司天不遷正刺法
司氣有餘不退位刺	司氣失守刺
全真刺	十一歲邪子刺
艾灸方宜	艾灸補瀉
灸寒熱	女子敗疵
灸癰	犬咬
傷食	宜灸不宜刺
三卷	
十二經病刺	奇經八脉病
十二經脉	奇經八脉
十五絡脉	十二經筋
空穴	十二經井榮經合原合

同身尺寸	經脉長短
難位節要異注指節骨肉之其室素之要	
不可名者馬玄經之	

鍼灸節要書目

素問十二卷

世稱黃帝岐伯問答之書及觀其旨意殆非一時之言而所撰述亦非一人之手劉向指為諸韓公子所著程子謂出戰國之末而其大畧正如禮記之萃於漢儒而與孔子子思之言並傳也蓋靈蘭秘典五常正大六元正紀等篇無非闡明陰陽五行生制之理配象合德實切於人身其諸色脉病名鍼刺治要皆推是理以廣之而皇甫謐之甲乙揚上善之大素亦皆本之於此而微有異同醫家之綱法無越於是書矣然按西漢藝文志有內經十八卷及扁鵲白氏云內經凡三家而素問之目乃不列至隋經籍志始有

素問之名而指為內經唐王冰乃以九靈九卷奉合漢志之數而為之註釋復以陰陽大論託為師張公所藏以補其亡逸而其用心亦勤矣惜乎朱墨混淆玉石相亂訛誥失之於迂疎引援或至於未切至宋林億高若訥等正其誤文而增其缺義頗於冰為有功

難經十三卷

秦越人祖述黃帝內經設為問答之辭以示學者所引經言多非靈素本文蓋古有其書而今亡之耳隨時有呂博望註本不傳宋王惟一集五家之說而醇疵或相亂惟虞氏祖為可觀紀齊卿註稍密乃附揚玄操呂廣王宗正三子之非周仲立頗加訂易而

考證未明李子野亦為句解而無所發明近代張潔古註後附樂殊非經義王少卿演繹其說目曰重玄亦未足以發前人之蘊○滑伯仁氏取長棄短折衷以己意作難經本義

鍼灸節要凡例

難經節要先行鍼補瀉次取井榮命經合天次及經脈各以類相從不拘舊經篇次

素問節要先九鍼次補瀉次諸法次病刺次經脈膠穴不拘舊文篇目

難經註雖多從滑氏本義折衷衆說故存之

各書有羽翼難經者集註于各條下

難經註與經旨未合者竊疑之非敢妄議前人也亦

欲求明大理耳

素問內經靈樞舊有王冰註讀者謂其多所強解今

去之惟錄其本文

素問注論今節要立題分類以便記誦

前人謂素問篇次失序錯簡不無合節要或錄其全篇或摘其一節而類聚之

書之有圖所以彰明其義也可圖則圖之今置圖卷首以備參攷

九鍼式

鑱鍼 鋒如錐其末銳其柄熱在頭身

員鍼 其身員鋒如卵形長一寸六分肉分氣滿宜也

鍤鍼 鋒如黍稷之銳長三寸五分脈氣虛少宜也

鋒鍼 刃三解長一寸六分瀉熱出血發泄癰疽宜也

鏃鍼 鋒如錐長一寸六分瀉熱出血發泄癰疽宜也

員利鍼 尖如毫且員且利中身微大長一寸六分

毫鍼 法象毫尖如蚊虻喙長一寸六分調經絡去疾新

長鍼 鋒如利長七寸彈深透骨解腰脊節素之間者

鑱鍼 名鑱鋒長四寸以處合于骨解皮膚之間者

鑱鍼 名鑱鋒長四寸以處合于骨解皮膚之間者

鍼灸節要卷之一

四明高武纂集

難經

補瀉

七十八難曰鍼有補瀉何謂也然補瀉之法非必呼吸出內鍼也

紀氏曰呼盡而內鍼吸而引鍼者為補吸則內鍼呼盡出鍼為瀉此言補瀉之時非必呼吸出內而已

然知為鍼者信其左不知為鍼者信其右

紀氏曰然知為鍼信其左者以左調右有餘不足補瀉於榮俞也不知為鍼者信其右但一心用鍼不知以左調右也

當刺之時先以左手厭按所鍼榮俞之處彈而努之爪而下之其氣之來如動脈之狀順鍼而刺之得氣因推而內之是謂補動而伸之是謂瀉不得氣乃與男外女內不得氣是謂十死不治也

滑氏曰彈而努之努讀作怒爪而下之指之稍重皆欲致其氣之至也氣至指下如動脈之狀乃求其至而刺之順循也來也停鍼待氣氣至鍼動是得氣也因推鍼而內之是謂補動鍼而伸之是謂瀉此越人心法非呼吸出內也是謂然也若停鍼候氣久而不至乃與男子則淺其鍼而伸之衛氣之分女子則深其鍼而候之榮氣之分如此而不得氣是謂其病終不可治也篇中前後二氣字不同不可不辨前言氣之來如動脈之

狀木刺之前左手所候之氣也後言得氣不得氣鍼下所候之氣也此自兩節周仲立乃云凡候氣左手五畧重候之不得乃與男則少輕其手於衛氣之分以候之

女則重其手於榮氣之分以候之如此則既無前後之分又昧停鍼待氣之道尚何所據為補瀉耶

六十九難曰經言虛者補之實者瀉之不虛不實以經取之何謂也然虛者補其母實者瀉其子當先補之然後瀉之不虛不實以經取之是正經自病不中他邪也當自取其經故言以經取之

滑氏曰靈樞第十篇載十二經皆有盛則瀉之虛則補之不盛不虛以經取之虛者補其母實者瀉其子能令母實子虛今于虛假令肝病虛即補厥陰之合曲泉

是也實者瀉陰之榮行間是也先補後瀉即後篇陽氣不足者當先補其陽而後瀉其陰之意若於此義不察其間誤則姜文也不實不虛以經取之者即四十九難憂愁思慮則傷心形寒飲冷則傷肺志怒氣逆則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地強力入水則傷腎蓋正經之自病者也楊氏曰不實不虛是諸藏不相乘也故去自取其經

七十六難曰何謂補瀉當補之時何所取氣當瀉之時何所置氣然當補之時從衛取氣當瀉之時從榮置氣其陽氣不足陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘當先補其陰而後瀉其陽榮衛通行此其要也

滑氏曰靈樞五十二篇曰浮氣不循經者為衛氣其精

氣之行于經者為榮氣蓋補則取浮氣之不循經者以補虛處焉則從榮置其氣而不用也置猶棄置之置然人之病虛實不一補瀉之道亦非一也是以陽氣不足而陰氣有餘則先補陽而後瀉陰以和之陰氣不足而陽氣有餘則先補陰而後瀉陽以和之如此則榮衛自然通行矣

七十五難曰經言東方實西方虛瀉南方補北方何謂也然金木水火土當更相平東方木也西方金也木欲實金當平之火欲實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實土當平之東方肝也則知肝實西方肺也則知肺虛瀉南方火補北方水南方火火者木之子也北方水水者木之母也水勝火子能令母實母能令子虛故瀉火補水欲令金不得平木也經曰不能治其虛何問其餘此之謂也

滑氏曰金不得平木不字疑衍○東方實西方虛瀉南方補北方者木金水火欲更相平也木火上金水之欲實五行之貪勝而務權也金水木火土之相平以五行所勝而制其貪也經曰一歲不平所勝平之東方肝也西方肺也東方實則知西方虛矣若西方不虛則東方安得而過於實邪或瀉或補要亦抑其甚而濟其不足損過就中之道也水能勝火子能令母實母能令子虛瀉南方火者奪子之氣使食母之有餘補北方水者益子之氣使不食於母也如此則過者退抑者進金得平其木而東西二方無復偏勝偏虧之患矣越人之意

大抵謂東方過於實而西方之氣不足故瀉火以抑其木補水以濟其金是乃使金得與木相停故曰欲令金得平木也若曰欲令金不得平木則前後文義窒礙竟說不通使肝木不過肺金不虛復瀉火補水不幾於實實虛虛邪八十一難文義正與此互相發明九卷蔡氏謂水火金木土穀惟脩取相勝以洩其過其意亦同故結句云不能治其虛何問其餘若為知常而不知變者之戒也此篇大意在肝實肺虛瀉火補水上○或問子能令母實母能令子虛當瀉火補土為是蓋子有餘則不食母之氣母不足則不能蔭其子瀉南方火乃奪子之氣使食母之有餘補中央土則益母之氣使得以蔭其子也今乃瀉火補水何歟曰此越人之妙一舉而兩

得之者也且瀉火一則以奪木之氣一則以去金之克補水一則以益金之氣一則以制火之光若補土則一於助金而已不可施於兩用此所以不補土而補水也或又問母能令子實子能令母虛五行之道也今越人乃謂子能令母實母能令子虛何哉曰是各有其說也母能令子實子能令母虛者五行之生化子能令母實母能令子虛者鍼家之子奪而不相伴也○四明陳氏曰仲景云水行乘金名曰橫內經曰氣有餘則制已所勝而侮所不勝木實金虛是木橫而凌金侮所不勝也木實本以金平之然以其氣正強而橫金平之則兩不相伏而戰戰則實者亦傷虛者亦敗金虛本資氣於土然其時土亦受制未足以資之故取水為金之子又為

水之母於其瀉火補水使水助火則火餒而取氣於木
木乃滅而不復實水為木母此母能令子虛也木既不
實其氣乃平平則金免木凌而不復虛水為金子此子
能令母實也所謂金不得平木不得得以金平其木必
瀉火補水而旁治之使木金之氣自然兩平耳今按陳
氏此說亦自有理但為不之一字所纏未免牽強費辭
不若直以不字為衍文則觀八十一難中當知金平木
一語可見矣○王安道曰余每讀至此未嘗不歎夫越
人之得經旨而憚夫後世之失經旨也先哲有言凡讀
書不可先看註解且將經文反覆而詳味之待自家有
新意加以註解參校庶乎經意昭然而不為他說所蔽
若先看註解則被其說橫胸中自家却無新意矣余

平生佩服此訓所益甚多且如難經此篇其言周備純
正足為萬世法後人紛紛之論其可嘆乎夫實則瀉之
虛則補之此常道也實則瀉其子虛則補其母亦常道
也人皆知之今肝實肺虛乃不瀉肝而瀉心此則人亦
知之至於不補肺補脾而補腎此則人不能知惟越人
知之耳夫子能令母實母能令子虛以常情觀之則曰
心火實致肝木亦實此子能令母實也脾土虛致肺金
亦虛此母能令子虛也心火實固由自王脾土虛乃由
肝木制之法常滿心則肝肺皆平矣越人則不然
其子能令母實子謂木則與常情不同矣故曰水者木
之母也子能令母實一句言病因也母能令子虛一句

言治法也其意蓋曰火為木之子子助其母使之過分
而為病矣今將何以處之惟補水瀉火之治而已夫
補水者何謂也蓋水為木之母若補水之虛使力可勝
火火勢退而木勢亦退此則母能虛子之義呀謂不治
之治也此虛字與補氣奪則虛之虛字不同彼謂能
其真而致虛此虛謂抑其過而欲虛之也若
曰不然則母能令子虛一句將歸之脾脾乎既歸於脾
肺今何不補脾乎夫五行之道其所畏者畏所對耳今
火大王水大虧火何畏乎惟其無畏則愈王而莫能制
苟非滋水以求勝之孰能勝也水勝火三字此越人寓
意處細觀之勿輕忽也雖瀉火補水並言然其要又在
補水耳後人乃言獨瀉火而不用補水又曰瀉火即是
補水得不大違越人與經之意乎若果不用補水經不
必言補北方越人不必言補水矣雖水不虛而火獨暴
王者固不必補水亦可也若先因水虛而致火王者不
補水可乎水虛火王而不補水則藥至而暫息藥過而
復作將積年累月無有窮已安能絕其根哉雖苦寒之
藥適為抑陽扶陰不過瀉火邪而已終非腎藏本藥不
能滋養北方之真陰也欲滋真陰舍地黃黃蘗之屬不
可也且夫肝之實也其因有二心助肝肝實之一因也
肺不能制肝肝實之二因也肺之虛也其因亦有一心
克肺肺虛之一因也脾受肝克而不能生肺肺虛之二
因也今補水而瀉火火退則木氣削又金不受尅而制
木東方不實矣金氣得平又土不受尅而生金西方不
虛矣若以虛則補母言之肺虛則當補脾豈知肝氣正

盛剋土之深雖每日補脾安能敵其正盛之勢哉縱使
土能生金金受火克亦所得不償所失矣所以不補
土而補水也或疑木王補水恐水生木而木愈王故聞
獨馮火不補水論忻然而從之殊不知木已王矣何待
乎生况水之虛雖峻補尚不能復其本氣安有餘力生
木哉若能生木則能勝火矣或又謂補水者欲其不食
於母也不食於母則金氣還矣豈知火克金土不生金
金之虛已極尚不能自給水雖欲食之何所食乎若如
此則金虛不由於火之剋土之不生而由於水之食尔
豈理也哉縱水不食金亦未必能復常也金不得平木
一句多一不字所以馮火補水者正欲使金得平木也
不字當刪去不能治其虛何問其餘虛指肺虛而言也

馮火補水使金得平木正所謂能治其虛不補土不補
金乃馮火補水使令自平此法之巧而妙者苟不能曉
此法而不能治其虛則不須問其他必是無能之人矣
故曰不能治其虛何問其餘若夫上文所謂金木水火
土更相平之義不勞解而自明茲故弗具也夫越人亞
聖也論至於此敢不歎往但恨說者之教蝕故辯之
滑氏受針法於東平高洞勝故以鍼法補馮註豈王氏
不習鍼故以用藥論而補馮之理明矣若經旨則疑難
七十二難曰經言能知迎隨之氣可令調之調氣之方必
在陰陽何謂也然所謂迎隨者知榮衛之流行經脈之往
來也隨其順逆而取之故曰迎隨
滑氏曰迎隨之法補瀉之道也迎者迎而奪之隨者隨

而濟之然必知榮衛之流行經脈之往來榮衛流行經
脈往來其義一也知之而後可以視夫病之逆順隨其
所當而為補瀉也○四明陳氏曰迎者迎其氣之方未
而未盛也以馮之隨者隨其氣之方往而未虛也以補
之愚按迎隨有二有虛實迎隨有子母迎隨陳氏之說
虛實迎隨也若七十九難所載子母迎隨也

調氣之方必在陰陽知其內外表裏隨其陰陽而調之故
曰調氣之方必在陰陽
滑氏曰在察也內為陰外為陽表為陽裏為陰察其病
之在陰在陽而調之也楊氏曰調氣之方必在陰陽者
陰虛陽實則補陰瀉陽陽虛陰實則補陽瀉陰或陽并
於陰陰并於陽或陰陽俱虛俱實皆隨其所見而調之

謝氏曰男女外內表陽裏陰調陰陽之氣者如從陽引
陰從陰引陽陽病治陰陰病治陽之類
七十九難曰經言迎而奪之安得無虛隨而濟之安得無
實虛之與實若得者失實之與虛若有若無何謂也
滑氏曰出靈樞第一篇得求而獲也失縱也遺也其第
二篇曰言實與虛若有若無者謂實者有氣虛者無氣
也言虛與實若得者失者謂補者必然若有得也瀉者
恍然若有失也即第一篇之義
然迎而奪之者馮其子也隨而濟之者補其母也假令心
病馮手心主俞是謂迎而奪之者也補手心主井是謂隨
而濟之者也
滑氏曰迎而奪之者馮也隨而濟之者補也假令心病

心火也土為火之子手心主之俞太陵也實則焉之是迎而奪之也木者火之母手心主之井中衝也虛則補之是隨而濟之也迎者迎於前隨者隨其後此假心為例而補焉則云手心主即靈樞所謂少陰無俞者也當與六十六難並觀○潔古曰呼吸出納亦名迎隨也所謂實之與虛者牢濡之意也氣來實牢者為得濡虛者為失故曰若得若失也

滑氏曰氣來實牢濡虛以隨清迎奪而為得失也前云虛之與實若得若失實之與虛若有若無此言實之與虛若得若失蓋得失有無義實相同互舉之省文耳十難曰經言有見如入有見如出者何謂也然所謂有見如入者謂左手見氣未至乃內鍼鍼入見氣盡乃出鍼是謂有見如入有見如出也

滑氏曰所謂有見如入下當欠有見如出四字如讀為而孟子書望道而未之見而讀為如蓋通用也○有見而入出者謂左手按穴待氣來至乃下鍼鍼入候其氣應盡而出鍼也○紀氏曰鍼之出入皆隨氣往來素問曰見其鳥為見其稷稷從見其飛不知其誰伏如橫弩起如發機是也

補瀉相反
八十一難曰經言無實實虛虛損不足而益有餘是寸口脈耶將病自有虛實耶其損益奈何然是病非謂寸口脈也謂病自有虛實也假令肝實而肺虛肝者木也肺者金也金木當更相平當知金平木假令肺實而肝虛微少氣

用鍼不補其肝而反重實其肺故曰實實虛虛損不足而益有餘此者中工之所害也

滑氏曰是病二字非誤即衍肝實肺虛金當平木如七十五難之說若肺實肝虛則當抑金而扶木也用鍼者乃不補肝而反重實其肺此所謂實其實而虛其虛損不足而益有餘教人必矣中工猶云粗工也

十二難曰五藏脈已絕於內用鍼者反實其外五藏脈已絕於外用鍼者反實其內內外之絕何以別之然五藏脈已絕於內者腎肝氣已絕於內也而醫反補其心脾五藏脈已絕於外者其心肺脈已絕於外也而醫反補其腎肝陽絕補陰陰絕補陽是謂實實虛虛損不足而益有餘如此死者難救之耳

滑氏曰靈樞第一篇曰凡用鍼者必先診脈觀氣之劇易乃可以治也又第三篇曰所謂五藏之氣已絕於內者脈口氣內絕不至反取外之病處與陽經之合有留鍼以致其陽氣陽氣至則內重竭重竭則死矣其死也無氣以動故靜所謂五藏之氣已絕於外者脈口氣外絕不至反取其四末之輸有留鍼以致其陰氣陰氣至則陽氣反入入則逆逆則死矣其死也陰氣有餘故躁此靈樞以脈口內外言陰陽也越人以心肺腎肝內外別陰陽其理亦猶是也紀氏謂此篇言鍼法馮氏謂合入用鍼補瀉之類

鍼刺深淺
七十 春夏淺刺深者何謂也然春夏者陽氣

在上人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下故當深取之

滑氏曰春夏之時陽氣浮而上入之氣亦然故刺之當淺欲其無太過也秋冬之時陽氣沉而下入之氣亦然故刺之當深欲其無不及也經曰必先歲氣無伐天和此之謂也四明陳氏曰春氣在毛夏氣在皮秋氣在分肉冬氣在骨髓是淺深之應也

七十一難曰經言刺榮無傷衛刺衛無傷榮何謂也然鍼陽者臥鍼而刺之刺陰者先以左手攝按所鍼榮俞之處氣散乃內鍼是謂刺榮無傷衛刺衛無傷榮也

滑氏曰榮為陰衛為陽榮行脈中衛行脈外各有淺深也用鍼之道亦然鍼陽必臥鍼而刺之者以陽氣輕浮過之恐傷於榮也刺陰者先以左手按所刺之穴良久氣散乃內鍼不然則傷衛氣也無毋通禁止辭

先後淺深

七十難曰春夏各致一陰秋冬各致一陽何也然春夏溫必致一陰者初下鍼沉之至腎肝之部得氣引持之陰也秋冬寒必致一陽者初內鍼淺而浮之至心肺之部得氣推內之陽也是謂春夏必致一陰秋冬必致一陽

滑氏曰致取也春夏氣溫必致一陰者春夏養陽之義也初下鍼即沉之至腎肝之部俟其得氣乃引鍼而提之以至於心肺之分所謂致一陰也秋冬氣寒必致一陽者秋冬養陰之義也初內鍼淺而浮之常心肺之部俟其得氣推鍼而內之以達於腎肝之分所謂致一陽

也此為較詳之說人特推其理有如是者爾凡用鍼補寫自有所宜初不必以是相拘也

井榮俞經合主病

六十八難曰五藏六府各有井榮俞經合皆何所主然經言所出為井所流為榮所注為俞所行為經所入為合井主心下滿榮主身熱俞主體重節痛經主喘咳寒熱合主逆氣而洩此五藏六府井榮俞經合所主病也

滑氏曰主主治也井谷井之井水源之所出也榮絕小水也井之源木微故所流尚小而為榮俞輸也注也自榮而注乃為俞也由俞而經過於此乃謂之經由經而入於所合謂之合合者會也靈樞第一篇曰五藏五俞五五二十五俞六府六腧六六三十六俞

空穴皆可經脈十二絡脈十五凡二十七氣所行皆井以言俞經合之所係而所主病各不同井主心下滿肝大榮也足厥陰之支從肝別貫膈上注肺故井主心下滿榮主身熱心火病也俞主體重節痛脾上病也經主喘效寒熱肺金病也合主逆氣而泄腎水病也謝氏曰此舉五藏之病各一端為例餘病可以類推而互取也不言六府者舉藏足以該之○項氏曰井象水之泉榮象水之波俞象水之窞經象水之流合象水之歸皆取水之義也○紀氏曰井之所治不以五藏六府皆主心下滿榮之所治不以五藏六府皆主身熱俞之所治不以五藏六府皆主體重節痛經之所治不以五藏六府皆主喘咳寒熱合之所治不以五藏六府皆主逆氣而泄

主喘咳寒熱合之所治不以五藏六府皆主逆氣而泄

但言藏不言府者恐未中理

四時井榮命經合刺

七十四難曰經言春刺井夏刺榮季夏刺俞秋刺經冬刺合者何謂也然春刺井者在肝夏刺榮者邪在心季夏刺俞者邪在脾秋刺經者邪在肺冬刺合者邪在腎

滑氏曰榮命之繫四時者以其邪各有所在也

其肝心脾肺腎而繫於春夏秋冬者何謂也然五藏一病輒有五也假令肝病色青者肝也脈臭者肝也喜酸者肝也喜呼者肝也喜泣者肝也其病最多不可盡言也四時有數而並繫於春夏秋冬者也鍼之要妙在于秋毫者也滑氏曰五藏一病不止於五尤衆多也雖其衆多而四時有數故並繫於春夏秋冬及井榮命經合之屬也用

鍼者必精察之○詳此篇文義以有缺誤今且依此解之以俟知者

藏府榮命合皆以井為始

六十三難曰六變言五藏六府榮命合皆以井為始者何也然井者東方春也萬物之始生諸蚊行喘息蚰飛蠕動當生之物莫不以春生故歲數始于春日數始于甲故以井為始也共去如切

滑氏曰十二經所出之穴皆謂之井而以爲榮命之始者以井主東方木木者春也萬物發生之始諸蚊者行喘息息謂喘吸氣也公孫弘傳作蚊行喘息義也白蚰者飛蠕者動皆虫身之屬凡當生之物皆以春生是以歲之數則始于春日之數則始于甲人之榮

則始于井也馮氏曰井谷井之井泉源之所出也四陳氏曰經云之氣所生則自井始而留榮注命過經入合故以萬物及歲月日數之始為譬也

滑氏曰藏井榮命合五

六十一難曰藏井榮有五府獨有六者何謂也然府者陽也三焦行於諸陽故置一俞名曰原府有六者亦與三焦共一氣也

滑氏曰藏之井榮有五謂井榮命經合也府之井榮有六以三焦行於諸陽故又置一俞而名曰原所以府有六者與三焦共一氣也虞氏曰此篇疑有缺誤當與十六難參攷

陰陽井榮木金相生不同

六十四難曰十變又言陰井木陽井金陰榮火陽榮水陰俞土陽俞木陰經金陽經火陰合水陽合土

滑氏曰十二經起於井穴陰井為木故陰井木生陰榮火陰榮火生陰俞土陰俞土生陰經金陰經金生陰合水陽井為金故陽井金生陽榮水陽榮水生陽俞木陽俞木生陽經火陽經火生陽合土

陰陽皆不同其意何也然是剛柔之旨也陰井乙水陽井庚金陽井庚金者乙之剛也陰井乙木者庚之柔也乙為木故言陰井木也庚為金故言陽井金也餘皆倣此滑氏曰剛柔者乙庚之相配也十干所以自乙庚而言者蓋諸藏府穴皆始於井而陰脈之井始於乙木陽脈之井始於庚金故自乙庚而言剛柔之配而其餘五行

之配皆做此也丁氏曰剛柔者謂陰井木陽井金庚金
為剛乙木為柔陰榮火陽榮木壬水為剛丁火為柔陰
俞七陽俞木甲木為剛己土為柔陰經金陽經火丙火
為剛辛金為柔陰合水陽合土戊土為剛癸水為柔蓋
五行之道相生者母子之義相尅相制者夫婦之類故
夫道皆剛婦道皆柔自然之理也易曰分陰分陽迭用
柔剛其是之謂道

二 出井入合

六十五難曰經言所出為井所入為合其法奈何然所出
為井井者東方春也萬物之始生故言所出為井也所入
為合合者北方冬也陽氣入藏故言所入為合也
滑氏曰此以經穴之流注始終言也

欲刺井當刺榮

七十三難曰諸井者肌肉淺薄不足使也刺之奈何然諸
井者木也榮者火也火者木之子當刺井者以榮瀉之故
經言補者不可以為瀉瀉者不可以為補此之謂也

滑氏曰諸經之井皆在手足指稍肌肉淺薄之處氣少
不足使為補瀉也故設當刺井者只瀉其榮以井為木
榮為火火者木之子也詳越人此說專為瀉井者言也
若當補井則必補其合故引經言補者不可以為瀉瀉
者不可以為補各有攸當也補瀉反則病益篤而有實
實虛虛之患可不謹哉武按滑氏謂經意為瀉井而補
實虛虛之患可不謹哉補井補合之言端在瀉南方補
此方

經脈流注

二十三難曰經脈十二絡脈十五何始何窮也然經脈者
行血氣通陰陽以榮於身者也其始從中焦注手太陽陽
明陽明注足陽明太陰太陰注手少陰太陽太陽注足太
陽少陰少陰注手心主少陽少陽注足少陽厥陰厥陰復
還注手太陽別絡十五皆因其原如環無端轉相灌溉朝
於寸口人迎以處百病而決死生也

滑氏曰因者隨也原者始也朝猶朝會之朝以用也因
上文經脈之尺度而推言經絡之行度也直行者謂之
經旁出者謂之絡十二經有十二絡蕪陽絡陰絡脾之
大絡為十五絡也謝氏曰始從中焦者蓋謂飲食入口
藏于胃其精微之化注手太陽陽明以次相傳至足厥
陰厥陰復還注手太陽也絡脈十五皆隨十二經脈之

所始轉相灌溉如環之無端朝于寸口人迎以之處百
病而決死生也寸口人迎古法以俠喉兩傍動脈為人
迎至晉王叔和直以左手關前一分為人迎右手關前
一分為氣口後世宗之愚謂昔人所以取人迎氣口者
蓋人迎為足陽明胃經受穀氣而表五臟者也氣口為
手少陰肺經朝百脈而平權衡者也○此事難知云寅
手太陽肺始於中焦終於大指內廉出其端卯手陽明
大腸始於手大指次指之端終於上俠鼻孔辰足陽明
胃始於鼻交頰中終於大指開出其端巳足太陰脾
始於足大指之端終於注心中午手少陰心始於心中
終於小指之內出其端未手太陽小腸始於小指之端
終於抵鼻至目內眦斜絡於額申足太陽膀胱始於目

內皆終於小指內側出其端酉足少陰腎始於小指之內
下終于注胸中戊手厥陰心包始於胸中終於循小指
次指出其端多手少陽三焦始於小指次指之端終於
目銳眥子足少陽膽始於目銳眥終于小指次指內出
其端其支者上入大指歧骨內出其端貫爪甲出三毛
丑足厥陰肝始於大指聚毛之上終于注肺中

奇經八脉

二十七難曰脉有奇經八脉者不拘於十二經何也然有
陽維有陰維有陽蹻有陰蹻有督有任有帶之脉凡
此八脉者皆不拘於經故曰奇經八脉也

滑氏曰脉有奇常十二經者常脉也奇經八脉則不拘
於十二經故曰奇經奇對正而言猶兵家之云奇正也

虞氏曰奇者奇零之奇不偶之義謂此八脉不係於正
經陰陽無表裏配合別道奇行故曰奇經也此八脉者
督脉督于後任脉任於前衝脉為諸陽之海陰陽維則
維絡于身帶脉束之如帶陽蹻得之太陽之別陰蹻本
諸少陰之別云

經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下何獨不拘于
經也然聖人圖設溝渠通利水道以備不然天雨降下溝
渠溢滿當此之時濤沛妄作聖人不能復圖也此絡脉滿
溢諸經不能拘也

滑氏曰經絡之行有常度夫奇經八脉則不能相從也
故以聖人圖設溝渠為譬以見絡脉滿溢諸經不能復
拘而為此奇經也然則奇經蓋絡脉之滿溢而為之者

歟或曰此絡脉三字越人正指奇經而言也既不拘於
經直謂之絡脉亦可也此篇兩節舉八脉之名及所以
為奇經之義

二十八難曰其奇經八脉者既不拘於十二經皆何起何
繼也然督脉者起于下極之命並於脊裏上至風府入屬
于腦任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至
喉咽衝脉起于氣衝並足陽明之經夾臍上行至胸中而
散也帶脉者起于季脇迴身一周陽蹻脉者起于跟中循
外踝上行入風池陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至
咽喉交貫衝脉陽維陰維者維絡于身溢畜不能環流灌
溉諸經者也故陽維起于諸陽會也陰維起於諸陰交也
比于聖人圖設溝渠溝渠滿溢流于深湖故聖人不能拘

通也而人脉隆盛入於八脉而不環周故十二經亦不能
拘之其受邪氣畜則腫熱砭射之也

滑氏曰經脉經作繫○督之為言都也為陽脉之海所
以都綱乎陽脉也其脉起下極之命由會陰歷長強循
脊中行至大椎穴與手足三陽脉之交會上至脊門與
陽維會至百會與太陽交會下至鼻柱人中與陽明交
會任脉起於中極之下曲骨穴任者妊也為人生養之
本衝脉起於氣衝穴至胸中而散為陰脉之海內經作
命足少陰之經按衝脉行於曲門通谷而上皆少陰也
當從內經此督任衝三脉皆起於會陰蓋一源而分三
歧也帶脉起于季脇下一十八分回身一周猶束帶然
陽蹻脉起于足跟中申脉穴循外踝而行陰蹻脉亦起

中照海穴循大脈... 故取蹻捷超越之義... 維也陽維所發別于金... 蹻脈會于臍俞與手足... 少陽會于陽白上本神... 會于風府瘕門此陽維... 築實與足太陰會于腹... 府舍期門又與任脈會... 之交也蓋毒不能環流... 二經亦不能拘之之下... 矣其受邪氣畜云云十二... 當有缺文然脈經無此... 閉格不得盡其命而死... 十五絡脈

二十六難曰經有十二... 然有陽絡有陰絡有脾... 者陰蹻之絡也故絡有... 滑氏曰直行者謂之經... 流絡則沱潛之支派每... 手太陰屬肺絡大腸手... 有十五者以其有陽蹻... 陽蹻陰蹻見二十八難... 二經直謂之絡亦可也... 胸脇其動應衣脈宗氣... 四明陳氏曰陽蹻之絡

陽諸絡出脾之能溉養五藏也

奇經病

二十九難曰奇經之為病... 陰陽不能自相維則悵... 為病苦寒熱陰維為病... 蹻為病陰緩而陽急衝... 強而厥任之為病其內... 之為病腹滿腰膝溶溶... 滑氏曰此言奇經之病... 陽不能維于陽則溶溶... 衛衛為氣氣居表故苦... 血血屬心故苦心痛兩... 陰結急受病者急不病... 喉故逆氣重急督脈行... 腹故病苦內結男為七... 故病狀如是溶溶無力... 自二十七難至此義實... 十二經以原為俞三焦... 六十六難曰經言肺之... 之原出於大衝脾之原... 之原出於兌骨也膽之... 三焦之原出于陽池膀... 合小腸之原出于腕骨

子 48-416

第二篇曰肺之俞大淵心之俞大陵肝之俞太衝脾之
 俞太白腎之俞大谿膀胱之俞束骨過於京骨為原
 之俞臨泣過于丘墟為原胃之俞陷谷過于衝陽為原
 三焦之俞中渚過于陽池為原小腸之俞後谿過于腕
 骨為原大腸之俞三問過于合谷為原蓋五臟陰經止
 以俞為原六腑陽經既有俞仍別有原或曰靈樞以大
 陵為心之原難經亦然而又別以兌骨為少陰之原諸
 家鍼灸書並以大陵為手厥陰心主之俞以神門在堂
 後兌骨之端者為心經所注之俞似此不同者何也按
 靈樞七十一篇曰少陰無輸心不病乎岐伯曰其外經
 病而藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端也其餘脈
 出入屈折其行之疾徐皆如手少陰心主之脈行也又
 第二篇曰心出於中衝溜于勞宮注於大陵行於間使
 入於曲澤手少陰也出中冲以下手少陰經
 別裁又素問診刺篇曰刺手心少陰兌骨之端各一
 痛立已又氣穴論曰藏主五十六穴王氏注五藏俞惟有
 心包經并俞之穴亦無心經并俞穴又七十九難曰
 假令心病寫手心主俞補手心主并詳此前後各經文
 義則知手少陰與心主同治也
 十二經皆以俞為原者何也然五藏俞者三焦之所行氣
 之所留止也三焦所行之俞為原者何也然臍下腎間動
 氣者人之生命也十二經之根本也故名曰原二焦者原
 氣之別使主通行三氣應于五藏六腑原者二焦之原

故故所止輒為原五藏六腑之有病者皆取其原也
 滑氏曰十二經皆以俞為原者以十二經之俞皆係于
 三焦所行氣所留止之處也三焦所行之俞為原者以
 臍下腎間動氣乃人之生命十二經之根本三焦則為
 原氣之別使主通行上中下之三氣經歷于五藏六腑
 也通行三氣即紀氏所謂三焦真元之氣即原氣也
 上達至于中焦中焦受水谷精悍之氣化為榮衛榮衛
 之氣與真元之氣通行達于上焦也所以原為三焦之
 尊號而所止輒為原猶警蹕所至稱行在所也五藏六
 腑之有病者皆於是而取之宜哉按卒云本經原穴無
 經絡逆從子母補瀉凡刺原穴診見動作未應而內氣
 吸則得氣無令出城管而又留氣盡乃出此按原之
 王海藏曰假令鍼肝經病了於大經原穴亦鍼一鍼
 補肝經未亦于本經原穴補一鍼如瀉肝經未亦於本
 經原穴瀉一鍼如餘經有病瀉畢後此例亦補瀉各
 原穴凡共十二原非瀉子母之法虛實通用故五
 六腑有病皆取其原
 六十七難曰五藏募皆在陰而俞在陽何謂也然陰病行
 陽陽病行陰故今募在陰俞在陽
 滑氏曰募與俞五藏空穴之總名也在腹為陰則謂之
 募在背為陽則為之俞募猶募結之募言經氣之聚於
 此也俞史記扁鵲傳作輸猶去輸之輸言經氣由此而
 輸於彼也五藏募在腹肺之募中府二穴在胸鬲雲門
 下一十乳上三肋間動脈膈中心之募巨闕一穴在膈

尾下一寸脾之募章門二穴在季脇下直臍肝之募期
門二穴在不容兩旁各一寸五分腎之募京門二穴在
腰中季脇本五藏俞在背行足太陽之經肺俞在第三
椎下心俞在五椎下肝俞在九椎下脾俞在十一椎下
腎俞在十四椎下皆俠膝兩旁各一寸五分陰病行陽
陽病行陰者陰陽經終氣相交貫感府腹背氣相通應
所以陰病有時而行陽陽病有時而行陰也鍼法曰從
陽引陰從陰引陽經言有難或然也必然而兩清註

八會刺穴

四十五難曰經言八會者何謂也然府會太倉藏會季脇
筋會陽靈泉髓會絕骨血會鬲俞骨會大杼脉會太淵氣
會三焦外一筋直兩乳內也熱病在內者取其會之氣穴

也

滑氏曰太倉一名中腕在臍上四寸六府取稟於胃故
為府會季脇章門穴也在大橫外直齊季肋端為脾之
募五藏取稟于脾故為藏會足少陽之筋結于膝外廉
陽陵泉也在膝下一寸外廉陷中又膽與肝為配肝者
筋之合故為筋會絕骨一名陽輔在足外踝上四寸輔
骨前絕骨端如前三分諸髓皆屬于骨故為髓會鬲俞
在背第七椎下去脊兩旁各一寸半足太陽脉氣所發
也太陽多血又血乃水之象故為血會大杼在項後第
一椎下去脊兩旁各一寸太淵在掌後陷中動脉即所
謂寸口者脉之大會也氣會三焦外一筋直兩乳內即
膻中為氣海者也在玉堂下一寸六分熱病在內者各

視其所屬而取之會也謝氏曰三焦當作上焦四明時
氏曰髓會絕骨髓屬于腎腎主骨於足少陽無所關腦
為髓海腦有枕骨六則當會枕骨絕骨誤也血會鬲俞
血者心所統肝所藏鬲俞在七椎下兩旁上則心俞下
則肝俞故為血會骨會大杼骨者髓所養髓自腦下注
于大杼大杼滲入脊心下貫尾能滲諸骨節故骨節之
氣皆會于此亦通古蓋衣氏曰人能健步以髓會絕骨
也者能任重以骨會大杼也

上工下工治病

七十難曰經言上工治未病中工治已病何謂也然所謂
治未病者見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣
無令得受肝之邪故曰治未病焉中工見肝之病不曉相

傳但一心治肝故曰治已病也

滑氏曰見肝之病先實其脾使邪無所入治未病也是
為上工見肝之病一心治肝治已病也是為中工靈樞
五十篇曰上工刺其未生也其次刺未盛者也其次刺
已衰者也下工刺其方襲者也與其形之盛者也與其
病之與脉相連者也故曰方其盛也勿敢必毀因其衰
也事乃大昌又曰上工治不病不治已病此之謂也

鍼灸節要卷之一終

靈素

用鍼方宜

帝曰鑿之治病也一病而治各不同何也岐伯曰地氣使然也故東方之域天地之所始生也魚鹽之地海濱之水其民食魚而嗜鹹皆安其處其食魚者使人熱中鹽者勝血故其民黑色理疎其脈皆為癰瘍其治宜砭石故砭石者亦從東方來○南方者天地所長養之盛處也其地水土弱霧露之所聚也其民嗜酸而食附其民皆緻理而赤色其病挛痺其治宜微鍼故九鍼亦從南方來○形樂志苦病生於內治之以鍼石

九鍼式

帝曰鍼之長短有數乎岐伯對曰一曰鑱鍼取法中鍼頭大末銳去末寸半卒銳之長一寸六分二曰員鍼取法于繫鍼筒暗其身而知其鋒鍼如外形員其末長一寸六分三曰鑱低鍼取法于黍粟之銳長一寸半四曰鋒鍼取法于絮鍼筒其身鋒其末刃三隅長一寸六分五曰鈹鍼取法于鈹鋒末如鈹廣二寸半長四寸六曰員利鍼取法于鑿鍼大如鑿且員且銳微大其末反小其身又曰中身微大長一寸六分七曰毫鍼取法于毫毛尖如蚊虻喙長一寸六分八曰長鍼取法于綦鍼鋒利身薄長七寸九曰大鍼取法于鋒鍼尖如挺其鋒微員鍼形畢矣此九鍼之長短也

九鍼應天地人時以起用

岐伯曰夫聖人之起天之數也一而九之故以主九野九而九之九九八十一以起黃鍾數焉以鍼應數也帝曰以鍼應九數奈何岐伯曰一者天也天者陽也五藏之應天者肺肺者五藏六府之蓋也皮者肺之合也人之陽也故為之治鍼必大其頭而銳其末令無得深入而陽氣出二者地也人之所以應土者肉也故為之治鍼必簡其身而員其末令毋得傷肉分傷則氣得竭三者人也人之所以成生者血脉也故為之治鍼必大其身而員其末令可以按末勿陷以致其氣令邪氣獨出四者時也時者四時八風之客于經絡之中為癘病也故為之治鍼必簡其身而銳其末令可以馮熱出血而癘病竭五者音也音者冬夏

之分分于子午陰與陽別寒與熱爭兩氣相搏合為癘膿者也故為之治鍼必令其末如鈹鋒可以取大膿六者律也律者調陰陽四時而令十二經脈虛邪客于經絡而為暴痺者也故為之治鍼必令尖如釐且員且銳中身微大以取暴氣七者星也星者人之七竅邪之所客經絡而為痛痺令于經絡者也故為之治鍼令尖如蚊虻喙靜以徐往微以久留正氣內之真邪俱往出鍼而養者也八者風也風者人之股肱八節也八正之虛風八風傷人內舍于骨解腰脊節腠理之間為深痺也故為之治鍼必長其身鋒其末可以深取遠痺九者野也野者人之節解皮膚之間也淫邪流溢于身如風水之狀而溜不能通于機關大節者也故為之治鍼大如挺其鋒微員以取大氣之不能

應於關節者也。一天二地三人四時五音六律七星八風九疇身形亦應之。鍼有九種。故曰九鍼。人皮應天。人肉應地。人脈應人。人筋應時。人聲應音。人除陽合氣應律。人齒面目應星。人出入氣應風。人九竅三百六十五絡應野。故一鍼皮二鍼肉三鍼筋四鍼五臟筋五鍼骨六鍼調陰陽七鍼應精八鍼除風九鍼通九竅除三百六十五節氣。此之謂有所主也。

九鍼所宜

九鍼之宜各有所為。長短大小各有所施。刺熱者用鑱鍼。刺寒者用毫鍼。刺大者用鋒鍼。刺小者用員利鍼。刺癢者用鈹鍼。鈹鍼出焉。陽氣負鍼者指摩分肉間不得傷肌。肉以馮分氣。鍼者上按脈勿陷。以致其氣。令邪氣勿陷。

鋒鍼者以發癩疾。鈹鍼者以取大膿。員利鍼者以取暴氣。毫鍼者靜以徐往。微以久留。而癢以取痛痺。長鍼者可以取遠痺。大鍼者以馮機關之水。病在皮膚取以鑱鍼。于病所膚白勿取。病在分肉間取以員利鍼。于病所病在脈氣少當補之者取之。鈹鍼于井榮分輸病為大膿者取以鈹鍼。病痺氣暴發者取以員利鍼。病痺氣通而不去者取以毫鍼。病在中者取以長鍼。水腫不能過關節者取以大鍼。以小治小者其功小。以大治大者多害。故其以成膿血者其惟砭石鈹鍼之所取也。

五刺應五藏

九刺有五以應五藏。一曰半刺。半刺者淺內而疾發。鍼無滅肉如拔毛狀。以取皮膚氣。此肺之應也。二曰豹文刺。豹文

刺者左右前後鍼之。以取經絡之血者。此心之應也。三曰關刺。關刺者左右盡筋上以取筋痺。慎無出血。此肝之應也。或曰淵刺。一曰豈刺。四曰合谷刺。合谷刺者左右鷄足。鍼于八分肉之間。以取肌痺。此脾之應也。五曰輪刺。輪刺者直入五分。出深內之至骨。以取骨痺。此腎之應也。

九刺應九變

九刺有九以應九變。一曰輪刺。輪刺者諸經榮命藏俞也。二曰遠道刺。遠道刺者病在上取之下。刺府輸也。三曰經刺。經刺者刺太經之結。絡經分也。四曰絡刺。絡刺者刺小絡之血脉也。五曰分刺。分刺者刺分肉之間也。六曰大罵刺。大罵刺者刺大膿以鈹鍼也。七曰毛刺。毛刺者刺浮皮毛也。八曰巨刺。巨刺者左取右右取左。九曰焮刺。焮刺者燔鍼以取痺也。

十二刺應十二經

九刺有十二節以應十二經。一曰偶刺。偶刺者以手直心。若背直痛。所一刺前一刺後。以治心痺。刺此者傍鍼之也。二曰報刺。報刺者刺痛處。常處也。上下行者直內無拔鍼。以手隨病所按之乃出。復刺之也。三曰恢刺。恢刺者直刺傍之舉之前後。恢筋之心。以治筋痺。四曰齊刺。齊刺者直入一旁入二以治寒氣小深者。或曰三刺。三刺者以治痺氣小深者也。五曰揚刺。揚刺者正內一傍內四而浮之。以治寒氣之博大者也。六曰且鍼刺。且鍼刺者引皮乃刺之。以治寒氣之淺者也。七曰刺刺。刺刺者直入直出稀發。鍼

而深之以治氣盛而熱者也八曰短刺短刺者刺骨痺稍
搖而深之置鍼骨所以上下摩骨也九曰浮刺浮刺者傍
入而浮之以治肌急而寒者也十曰陰刺陰刺者左右率
刺之以治寒厥中寒厥足踝後少陰也十一曰傍鍼刺傍
鍼刺者直傍刺各一以治留痺久居者也十二曰贊刺贊
刺者直入直出數發鍼而淺之出血是謂治癰腫也

黑白肥瘦刺

帝曰願聞人之黑白肥瘦小長各有數乎岐伯曰年質壯
大血氣充盈膚革堅固因加以邪刺此者深而留之此肥
人也廣肩腋項肉薄厚皮而黑色唇臨臨然其血黑以濁
其氣滯以遲其為人也食于取與刺此者深而留之多益
其數也瘦人皮薄色少肉麻廉然薄皮輕言其血氣清易

脫于氣易損于血刺此者淺而疾之○刺肥人者秋冬之
齊刺瘦人者以春夏之齊

刺常人

曰刺常人奈何視其白黑各為調之其端正敦厚者其血
氣和調刺此者無失常數也

刺王公大人布衣

帝曰夫王公大人血食之君身體柔脆肌肉軟弱血氣慄
悍滑利其刺之淺深疾徐多少何如岐伯曰膏粱霍亂之
味何可同也氣滑即疾出其氣滯則出遲氣悍則鍼小而
入淺氣滯則鍼大而入深深則欲留淺則欲疾以此觀之
刺布衣者深而留之刺大人者微以徐之此皆因其慄悍
滑利也○寒痺內熱刺布衣以火燔之刺大人以藥熨之

刺壯士

帝曰刺壯士真骨者奈何岐伯曰刺壯士真骨堅肉緩節
堅然此人重則氣滯血濁刺此者深而留之多益其數
勁則氣滑血清刺此者淺而疾之

刺嬰兒

曰刺嬰兒奈何曰嬰兒者其肉脆血少氣弱刺此者以毫
鍼淺刺而疾發鍼日再可也

刺脈虛實淺深

脈實者深刺之以泄其氣脈虛淺刺之使精氣無得出以
養其脈獨出其邪氣○刺陰者深而留之刺陽者淺而疾
之○脈淺者勿刺按其脈乃刺之無令精出獨出其邪氣
耳脈之所居深不見者勿按其脈而刺之微內鍼而久留

之以致其孔脈也

十二經氣血刺

夫人一經數脈陽當多血少氣少陽常少血多氣陽明常
多氣多血少陰常少血多氣厥陰常多血少氣太陰常多
氣少血此天之常數陽明多血多氣刺陽明出血氣太陽
多血少氣刺太陽出血惡氣少陽多氣少血刺少陽出血氣
惡血太陰多血少氣刺太陰出血惡氣厥陰多血少氣刺
厥陰出血惡氣少陰多氣少血刺少陰出血惡血也

手足經脈刺

足陽明五臟之府之海也其脈大血多氣盛壯熱刺此者
不深弗散不留不瀉也足陽明刺深六分留十呼足太陽
深五分留七呼足少陽深四分留五呼足少陰深三分留

四呼足少陰深二分留三呼足厥陰深一分留二呼手之陰陽其受氣之道近其氣之末疾其刺深者皆無過二分其留宿無過一呼刺而過此者則脫氣

補馬

帝曰余聞刺法有餘瀉之不足補之岐伯曰百病之生皆有虛實而補瀉行焉○瀉虛瀉實神去其室致邪失正真不可定粗之所敗謂之瀉也○補虛瀉實神歸其室久塞其空謂之良工○凡用瀉者瀉而瀉之迎而道之虛則實之滿則瀉之苑陳則除之○瀉則虛之徐而疾則實疾而實則虛言實與虛若有若無者後與先若存若亡為虛與實若得若失虛實之要九氣○補瀉之時以鍼為之瀉曰必持內之放而出之○補曰氣得泄按而引鍼是謂內溫血不得散氣不待出也補曰隨之隨之之意若妄之若行若按如蚊虻止如留如還去如絃絕今左屬右其氣故止外門已閉中氣乃實必無留血必取誅之刺之而氣不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復鍼○鍼有懸布天下者五黔首共餘食莫之知也一日治神二曰知養身三曰知毒藥四曰制砭石大小五曰知五藏血氣之診五法俱立各有所先今末世之刺也虛者實之滿者瀉之此皆眾工所共知也若夫法天則地隨應而動和之者若響隨之者若影道無鬼神獨來獨往帝曰願聞其道岐伯曰凡刺之真必先治神五藏已定九候已備後乃存鍼眾脉不見眾心弗開外內相得無以形先可玩往來乃施于人入有虛實五虛勿近五實勿遠至其高發間不容瞬手動

三

若務鍼而勿意其機者謂其莫知其形見其機而見其機後從其飛不知其誰伏如橫斧起如發機○刺虛者瀉其實刺實者瀉其虛經氣已至慎守勿失深淺在志遠近若一如臨深淵手如握虎神無營于眾物○義無邪下必正其神○小鍼之要易陳而難入粗守形上守神乎神客在門未親其疾惡知其原刺之微在速遲粗守剛上守機機之動不離其空空中之機清淨而微其來不可逢其往不可追知機之道者不可掛以髮不知機道叩之不發知其往來要與之期粗之闕乎哉哉工獨有之往者為逆來者為順明知逆順正行無問迎而奪之惡得無虛追而濟之惡得無實迎之隨之以意和之鍼道畢矣○凡用鍼者虛則實之滿則泄之苑陳則除之邪勝則虛之大要曰徐而疾則實疾而實則虛言實與虛若有若無察後與先若存若亡為虛與實若得若失虛實之要九鍼最妙補瀉之時以鍼為之瀉曰必持內之放而出之排陽得鍼邪氣得泄按而引鍼是為內溫血不得散氣不得出也補曰隨之隨之之意若妄之若行若按如蚊虻止如留如還去如絃絕今左屬右其氣故止外門已閉中氣乃實必無留血急取誅之○持鍼之道堅者為實正指直刺無鍼左右神在秋毫屬意病者審視血脉者刺之無殆方刺之時必在懸陽及與兩衛神屬勿去知病存亡血脉者在胸橫居視之獨澄切之獨堅○刺虛則實之鍼下熱也氣實乃熱也滿而泄之者鍼下寒也苑陳則除之者出惡血也邪盛則虛之者出鍼勿按徐而疾則實者徐出鍼

而疾按之疾而徐則虛者疾出鍼而徐按之言實與虛者
寒溫氣多少也若無若有者疾不可知也察後與先者知
病先後也為虛與實者工勿失其法若得若失者離其法
也虛實之要九鍼最妙者為其各有所宜也補瀉之時者
與氣開闔相合也九鍼之名各不同形者鍼窮其所當補
瀉也刺實瀉虛者留鍼陰氣隆至乃去鍼也刺虛瀉與
實者陽氣隆至鍼下熱乃去鍼也經氣已至慎守勿失者
勿變更也淺深在志者知病之内外也近遠如一者深淺
其候等也如臨深淵者不敢墮也手如握虎者欲其壯也
神與管于眾物者靜志觀病人無左右視也義無邪下者
欲端以正也必正其神者欲醫病人目制其神令氣易行
也○所謂易陳者易言也難入者難著干人也粗守形者

守刺法也上守神者守人之血氣有餘不足可補瀉也神
客者正邪共會也神者正氣也客者邪氣也在門者邪循
正氣之所出入也未觀其疾者先知邪正何經之疾也惡
知其原者先知何經之病所取之度也刺之微在數運者
徐疾之意也粗守關者守四肢而不知血氣正邪之往來
也上守機者知守氣也機之動不離其空者知氣之虛實
用鍼之徐疾也空中之機清淨以微者鍼以得氣密意守
氣勿失也其來不可逢者氣盛不可補也其往不可追者
氣虛不可瀉也不可掛以髮者言氣易失也和之不發者
言不知補瀉之意也血氣已盡而氣不下也知其往來者
知氣之逆順盛虛也要與之期者知氣之可取之時也粗
之開者其冥不知氣之微密也妙於上獨有之者謂知鍼

意也往者為逆者言氣之虛而小者逆也來者為順者
言氣之平平者順也明知逆順正行無間者言知所取之
處也迎而奪之者瀉也追而濟之者補也所謂虛則實之
者氣口虛而當補之也滿則泄之者氣口盛而當瀉之也
宛陳則除之者去血脈也邪勝則虛之者言諸經有盛者
皆瀉其邪也徐而疾則實者言徐內而疾出也疾而徐則
虛者言疾內而徐出也言實與虛若有若無者言實者有
氣虛者無氣也察後與先若無若存者言氣之虛實補瀉
之先後也察其氣之已下與常存也為虛與實若得若失
者言補者必然而有得也瀉則悅然若有失也○是故工
之用鍼也知氣之所在而守其門戶明于調氣補瀉所在
徐疾之意所取之度瀉必用員切而轉之其氣乃行疾而

徐出邪氣乃出伸而逆之極大其穴氣出乃疾補必用方
外引其皮令當其門左引其經右推其膚微旋而徐推之
必端以正安以靜堅心無解欲微以留氣而疾出之推其
皮蓋其外門神氣乃存用鍼之要無忘其神○瀉必用方
者以氣方盛也以月方滿也以日方溫也以身方定也以
息方吸而納鍼及復候其方吸而轉鍼乃復候其方呼而
徐引鍼故曰瀉補必用員者員者行也行者移也刺必中
其榮復以吸排鍼也故員與方非鍼也○瀉實者氣盛乃
內鍼鍼與氣俱內以開其門如利其戶鍼與氣俱出如氣
不傷邪氣乃下外門不開以出其實搖大其道如利其路
是謂大瀉必切而出大氣乃振特鍼叩置以定其氣候
內鍼氣出內鍼入鍼或曰春精無從出方實而疾出鍼

入鍼出熱不得遂閉塞其門邪氣亦散精氣乃得存動氣
候時近氣不失遠氣乃來是謂追之○吸則內鍼無令氣
忤靜以久留無令邪布吸則轉鍼以得氣為候呼引鍼
呼盡乃出大氣皆出故命曰馮捫而循之切而散之推而
按之彈而怒之爪而下之通而取之外引其門以閉其神
呼盡內鍼靜以久留以氣至為候如待濟貴不知日暮其
氣以至適而自護候吸引鍼氣不得出各在所處推闔其
門令神氣存大氣留止故命曰補○補瀉弗失與天地一
經氣已至慎守勿失淺深在志速近如一如臨深淵手如
握虎神無營于眾物持鍼之道欲端以正安以靜先知虛
實而行疾徐左手執骨右手循之無與肉果馮欲端以正
補必閉其輔鍼導氣得法法真氣得居帝曰捍皮開腠

理奈何岐伯曰因其分肉左別其膚微內而徐端之適神
不散邪氣得去○知其氣所在先得其道稀而疎之稍深
以留故能徐入之大熱在上推而下之上者引而去之視
先痛者常先取之大寒在外留而補之入于中者從合馮
之上氣不足推而揚之下氣不足積而從之寒入于中推
而行之○夫實者氣入也虛者氣出也氣實者熱也氣虛
有寒也入實者左手開鍼孔也入虛者右手閉鍼孔也○
形氣不足病氣有餘是邪勝也急瀉之形氣有餘病氣不
足此陰陽俱不足也不可刺刺之則重不足不足則陰陽
俱竭血氣皆盡五藏空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復
矣形氣有餘病氣有餘此謂陰陽俱有餘也急瀉其邪調
其虛實故曰有餘者瀉之不足者補之此之謂也故曰刺

不知逆順真邪相搏滿而補之則陰陽四溢腸胃充郭肝
肺內膜陰陽相錯虛而瀉之則經脉空虛血氣竭枯腸胃
痺辟支膚帶蒼毛膝天焦子之死期○凡用鍼之類在于
調氣氣清于胃以通榮衛各行其道宗氣留于海其下者
經于氣衝其且者走于息道故厥在于足宗氣不下脉中
之血流而不止非之火調弗能取之○散氣可收聚氣可
布深居靜處占神往來閉戶塞牖魂魄不散專意一神精
氣之分母聞人聲以收其精必一其神令志在鍼淺而留
之微而浮之以移其神氣至乃休男內女外堅拒勿出謹
守勿內是謂得氣○刺之而氣不至無問其數刺之而氣
至乃去之勿復鍼鍼各有所宜各不同形各任其所為刺
之要氣至而有効効之信若風之吹雲明乎若見蒼天刺

之道畢矣○用鍼者必先察其經絡之虛實切而循之按
而彈之視其應動者乃後取之而下之六經調者謂之不
病雖病謂之自己一經上實下虛而不通者此必有橫絡
感加于大經今之不通視而瀉之此所謂解結也上寒下
熱先刺其項太陽氣留之已刺則項項肩胛令熱下合
乃止此所謂瀉而上之者也上熱下寒視其脉虛而陷下
于經者取之氣下乃止此所謂引而下之者也大熱偏身
狂而妄見妄聞妄語視足陽明及入絡取之虛者補之血
而實者瀉之因其脈臥居其頭前以兩手四指挾按頭動
脉久持之捲而切推下至缺盆中一而復止如云乃止
此所謂推而散之者也○帝曰余聞刺法言有餘者瀉之
不足者補之何謂有餘何謂不足岐伯曰有餘者五不足

亦有五帝欲何問帝曰願盡聞之岐伯曰神有有餘有不
足氣有餘有不足血有餘有不足形有餘有不足志有餘
有不足凡此十者其氣不等也帝曰人有精氣津液四支
九竅五藏十六部三百六十五節乃生百病百病之生皆
有虛實今夫子乃言有餘有不足亦有五何以生之乎
岐伯曰皆生于五藏也夫心藏神肺藏氣肝藏血脾藏肉
腎藏志而此成形志意通內連骨髓而成形五藏五藏之
道皆出于經隧以行血氣血氣不和百病乃變化而生是
故守經隧焉帝曰神有餘不足何如岐伯曰神有餘則笑
不休神不足則悲血氣未并五藏安定邪客于形洒淅起
于毫毛未入于經絡也故命曰神之微帝曰補焉奈何岐
伯曰神有餘則瀉其小絡之血出血勿之深斥無中其大

經補氣乃平神不足視其虛絡按而致之刺而利之無出
其血無世其氣以通其經神氣乃平帝曰刺微奈何岐伯
曰按摩勿釋著鍼勿斥移氣于不足神氣乃得復帝曰善
氣有餘不足奈何氣有餘則喘咳上氣不足則息利少氣
血氣不并五藏安定皮膚微病命曰白氣微泄帝曰補焉
奈何岐伯曰氣有餘則瀉其經隧無傷其經無出其血無
世其氣不足則補其經隧無出其氣帝曰刺微奈何岐伯
曰按摩勿釋出鍼視之曰我將深之適人必董精氣自伏
氣散亂無所休息氣泄腰理真氣乃相得帝曰善血有
餘不足奈何岐伯曰血有餘則怒不足則恐血氣未并五
藏安定孫絡水溢則經有流血帝曰補焉奈何岐伯曰血
有餘則瀉其盛經出其血不足則視其虛經試其脈中

留而視脈太疾出其鍼無令血泄帝曰刺留血奈何岐伯
曰視其血絡刺出其血無令惡血得入寸經以成其疾帝
曰善形有餘不足奈何岐伯曰形有餘則腹脹溼澀不利
不足則四支不用血氣未并五藏安定肌肉蠕動命曰微
風帝曰補焉奈何岐伯曰形有餘則瀉其陽經不足則補
其陽絡帝曰微刺奈何岐伯曰取分肉間無中其經無傷
其絡衛氣得復邪氣乃索帝曰善志有餘不足奈何岐伯
曰志有餘則腹脹飧泄不足則厥血氣未并五藏安定骨
節有動帝曰補焉奈何岐伯曰志有餘則瀉○然筋血者
不足則補其復留帝曰刺未并奈何岐伯曰即取之無中
其經邪所乃能立虛○血清氣滯疾瀉之則氣竭血濁氣
滯疾瀉之則經可通

刺胸腹

刺胸腹者必以布敷著之乃從單布上刺刺之不愈復刺

標本

先病而後逆者治其本先逆而後病者治其本先寒而後
生病者治其本先病而後生寒者治其本先熱而後生病
者治其本先泄而後生他病者治其本必且調之乃治其
他病先病而後中滿者治其標先病而後泄者治其本先
中滿而後煩者治其本有客氣有同氣大小便不利治
其標大小
治其本病發而有餘本而標之先治其本
後治其標
而後生他
詳察間甚
思調之間者併行甚為獨行先小大便不利
有治其本也

鍼灸手

明目者可使視色聰耳者可使聽音捷辭疾語者可使傳
論語徐而安靜手巧而心密諦者可使行鍼艾理血氣而
調諸經也察陰陽而並法方緩節柔筋而心和調者可使
導引行氣疾毒言語輕人者可使唾癰呪病爪苦手毒為
事善勝者可便按積抑痺各得其能方乃可行其名乃彰
不待其人其功不成其師無名故曰得其人乃言非其人
弗傳此之謂也手毒者可便按鍼置龜干器下而按其上
五十日而死矣手甘者復生如故也

刺宜從時

凡刺之法必候日月星辰四時入正之氣氣定乃刺之是
故天溫日明則入血淖澤而衛氣浮故血易瀉氣易行天
寒日陰則入血凝泣而衛氣沉月始生則血氣始精衛氣
始行月郭滿則血氣實肌肉堅月郭空則肌肉減經絡虛
衛氣去形衛居是以因天時而調血氣也是以天寒無刺
天溫無凝月生無瀉月滿無補月郭空無治是謂得時而
調之也因天之時盛虛之時移光定位正時而待之故曰
月空而瀉是謂虛虛月滿而補血氣揚波絡有留血命曰
重實月郭空而治是謂亂經陰陽相錯真邪不別沈以留
止外虛內亂淫邪乃起○帝曰星辰入正何候岐伯曰星
辰者所以候日月之行也八正者所以候八風虛邪以時
至者也四時者所以分春夏秋冬之氣所在以調之也八
正之虛邪避之勿犯也○是故春氣在經脈夏氣在孫絡
長夏在肌肉秋氣在皮膚冬氣在骨髓中春者天氣始開

刺宜從時

地氣始泄東解水釋水道經通故八氣在脈夏者經滿氣
溢孫絡受血皮膚充實長夏者經絡皆盛內溢肌中秋者
天氣始收腠理閉塞皮膚引急冬者蓋藏血氣在中內著
骨髓通于五藏是故邪氣者常隨四時之氣血而入客也
○故用鍼之服者必有法則上視天光下同八正以避奇
邪而觀百姓審于虛實毋犯其邪是得大之露遇歲之虛
救而不勝反受其殃故曰必知天忌乃言鍼意○春刺散
俞乃與分理血出而止甚者傳氣間者環也夏刺絡俞見
血而止盡氣閉環痛必下秋刺皮膚循理上下同法神變
而止冬刺俞數于分理甚者直下間者散下春夏秋冬各
有所刺法其所在春者木始治肝氣始生其風病急經脈
常深其氣不能深入故取絡脈分肉間夏者火始治心氣
始強脈瘦氣弱陽氣滯溢熱薰分腠內至于經故取盛經
分腠絕膚而去者邪氣淺也所謂盛經陽脈也秋者金始
治肺時收殺金得勝火陽氣在合故陰氣初勝濕氣及
陰氣未盛未能深入故取俞以瀉陰邪取合以虛陽邪
氣始衰故取于心冬者水始治腎方閉陽氣衰少陰氣盛
盛巨陽伏沉陽脉乃去故取井以下陰逆取榮以實陽氣
故曰冬取井榮春不孰切○正月二月三月人氣在左無
刺左足之陽四月五月六月人氣在右無刺右足之陽七
月八月九月人氣在左無刺左足之陰十月十一月十二
月人氣在右無刺右足之陰○甲乙日自乘無刺頭無發
崇于耳內丙丁日自乘無振揆于肩喉廉泉八已日乘四
季無刺足去爪馬水庚申日自乘無刺明堂下股膝壬癸

日自來無轉之能。隨日之長短各以為紀而刺之。謹候其時病可與期失時反候者百病不治。故曰刺實者刺其來也。刺虛者刺其去也。此言氣存亡之時以候虛實而刺之。候氣之所在于而刺之。是謂逢時。在于三陽必候其氣在于三陽而刺之。病在于三陰必候其氣在于三陰而刺之。

五奪不可罵

形肉已脫一奪也。大脫血之後是二奪也。大汗出之後是三奪也。大泄之後是四奪也。新產大血之後是五奪也。此皆不可罵。

刺逆四時

春刺夏分。時亂氣微入。深骨髓病不能愈。又且少氣。春刺秋分。筋氣逆。氣環為。咳嗽病不愈。令人時驚。又且哭。春刺冬分。邪氣著。藏令人脹痛不愈。又且欲言。夏刺春分。病不愈。令人懈惰。夏刺秋分。病不愈。令人欲無言。惕惕如人將捕之。夏刺冬分。病不愈。令人少氣。時欲怒。秋刺春分。病不愈。令人惕然。欲有所為。起而忘之。秋刺夏分。病不愈。令人益嗜卧。又且善夢。秋刺冬分。病不愈。令人浙浙。時寒。冬刺春分。病不愈。令人欲卧不能眠。而有見。冬刺夏分。病不愈。令人上氣發。為諸瘕。冬刺秋分。病不愈。令人善渴。○春

刺絡脈血氣外溢。令人少氣。春刺肌肉血氣環逆。令人上氣。春刺筋骨血氣內著。令人腹脹。夏刺經脈血氣乃竭。令人解。秋刺肌肉血氣內却。令人善悲。夏刺筋骨血氣上逆。令人善怒。秋刺經脈血氣上逆。令人善忘。秋刺絡脈血氣不外行。令人卧不欲動。秋刺筋骨血氣內散。令人寒慄。冬

血氣皆脫。令人目不明。冬刺絡脈內氣外泄。留為大痺。冬刺肌肉陽氣竭。絕令人善忘。凡此四時刺者。大逆之病不可從也。反之則生亂氣。相滯病焉。

刺避

凡刺胸腹者。必避五藏中心者。遠死。其動為噫。中肝者。五日死。其動為語。中脾者。十日死。其動為吞。中腎者。六日死。其動為噦。中肺者。三日死。其動為咳。中膽者。一日半死。其動為嘔。中胃者。皆為傷。中其病雖愈。不過一歲。必死。刺避五藏者。知逆從也。所謂從者。高與脾腎之處。不知者。反之。○刺附上中大脈。血出不止。死。刺面上中溜脈。不幸為盲。刺頭中腦戶。入腦。立死。刺舌下中大脈。太過。血出不止。為瘡。刺足下布絡中脈。血不出。為腫。刺和。中大脈。令人

仆脫色。刺氣衝中脈。血不出。為腫。鼠僕刺脊間中髓。為偃。刺乳上中乳房。為腫。根蝕。刺缺盆中內陷。氣泄。令人喘咳。逆刺手魚腹中陷。為腫。○無刺大醉。令人氣亂。無刺大怒。令人氣逆。○刺大勞。人無刺新飽。人無刺大渴。人○病有脇下道二三歲。不已。名曰息積。此不妨于食。不可灸。刺○母損不足者。身羸瘦。毋用鈹石也。○刺陰股中大脈。血出不止。死。刺客主人內陷。中脈。為內漏。為腫。刺膝臑。出液。為跛。刺臂大陰脈。出血多。立死。刺足少陰脈。重虛。出血。為舌難。以言刺膺中陷。中脈。為喘逆。仰息。刺肘中內陷。氣歸之。不得屈伸。刺陰股下三寸內陷。令人遺溺。刺腋下脇間內陷。令人咳。刺小腹中膈。出令人小腹痛。刺膈內陷。為腫。刺巨上陷。骨中脈。為滿。為盲。刺關節中。依出不得。依

仲○無刺熇熇之熱無刺渾渾之脈無刺漉漉之汗無刺
病與脈相逆者○闕門而刺之者死于家中入門而刺之
者死于堂上○新肉勿刺已刺勿由已醉勿刺已刺勿醉
新怒勿刺已刺勿怒新勞勿刺已刺勿勞已飽勿刺已刺
勿飽已飢勿刺已刺勿飢已渴勿刺已刺勿渴○乘車來
者卧而休之如食傾乃刺之出行來者坐而休之如行十
里乃刺之大驚大恐必定其氣乃刺之

禁大過不及

內淺鍼深內傷良肉皮膚為癰病深鍼淺病氣不駕反為
大膿病小鍼太氣泄太其疾反為害病大鍼小氣不泄馮
亦復為敗失鍼之宜大者馮小者不移○病有浮沉刺有
淺深各至其理無過其道過之則肉傷不及則生外壅壅
則邪從之淺深不得反為大賊內動五藏後生大病故曰
病有在毫毛腠理者有在肌肉者有在脈者有在筋者有
在骨者有在髓者有在故刺毫毛腠理無傷皮膚傷則肉
肺動則秋病溫瘧疥瘡疥然寒慄刺皮無傷肉肉傷則
內動脾動則七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食
肉無傷脈傷則內動心動則夏病心痛刺脈無傷筋
筋傷則內動肝動則春病熱而筋動刺筋無傷骨骨傷
則內動腎動則冬病脹腰痛刺骨無傷髓髓傷則刺鑿
肝酸解依然不去矣○刺骨無傷筋者鍼至筋而去不及
骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋也刺脈無傷肉者
至脈而去不及肉也刺脈無傷皮者至皮而去不及脈也
刺皮無傷肉者病在皮中鍼入皮中無傷肉也刺肉

無傷者過肉中筋也刺筋無傷骨過筋中骨也此
之義也○太氣之在脈也邪氣在上濁氣在中清氣
在下故鍼陷脈則邪氣出鍼中脈則濁氣出鍼太深則邪
氣反沉病益故曰皮肉筋脈各有所宜各不同形各以任
其所宜無宜其無虛損不足而益有餘其謂病甚病益
甚取五脈者死取三脈者恆奪陰者死奪陽者狂鍼害畢
矣

五臟刺

振埃者刺外經去陽病陽氣大逆上滿于胸中憤噴息有
大氣逆上喘喝坐伏病惡埃煙鋪不得息取之天容其效
上氣竅胸膈痛者取之臑臑取天容者無過一里取臑臑
者血變而止○發蒙者耳無所聞目無所見刺府輸去府
病刺此必于日中刺其聽官中其眸子聲聞于耳此其輸
也刺邪以手堅按其兩鼻而疾偃其聲必應于鍼○去爪
者乃刺關節肢絡腰脊者身之大關節也肢胫者人之管
以趨翔也壘垂者身中之機陰精之候津液之道也飲食
不節喜怒不時津液內溢乃下留于胃血道不通日大不
休俛仰不便趨翔不能此病榮然有水不上不下鉞石所
取形不可匿常不得敵○微衣者言盡刺諸陽之奇輸未
有常處也是陽氣有餘而陰氣不足陰氣不足則內熱陽
氣有餘則外熱內熱相搏熱于懷炭畏綿帛近不可近身
又不可近席膝理開基則汗不出舌焦唇槁腸乾噎燥飲
食不讓羨惡于天府大柱三肅又刺中膺以去其熱補足
手太陰以去其汗熱去汗稀疾于微衣○解惑者知調

陰陽補馮有餘不足相傾移也。大風在身血脉偏虛者不足實者有餘輕重不得傾側死伏不知東西不知南北。上午下午反乍獲顛倒無常甚于迷惑焉其有餘補其不足陰陽平復則鍼若此疾于解哉。

五藏病刺

肝病者兩脇下滿引小腹令人善怒虛則目眩眩無所見身無所聞善恐如人行捕之取其經厥陰與少陽氣逆則頭痛耳聾不聰取血者。心病者胸中痛脇支滿脇下痛膺背肩甲間痛臂內痛虛則胸膈大脇下與腰相引而痛取其經少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者。脾病者身重善飢肉瘦足不收行善癢脚下痛虛則腹滿腸鳴除泄食不化取其經大陽陽明少陰血者。肺病者喘咳

逆氣肩背痛汗出死陰陰虛脾肺筋足皆痛虛則少氣不能報息耳聾噎乾取其經大陰足太陽之外厥陰內血者。腎病者腹大脛腫端身重汗出憎風虛則胸中痛大腹小腹痛清厥者取其經少陰太陽血者。太陽陽獨至厥喘虛氣不足陽有餘也表裏俱當瀉取之下俞。陽明獨至是陽氣重併也當瀉陽補陰取之下俞。少陽獨至是陰氣也瀉前卒大取之下俞少陽獨至者一陽之過也。太陽成搏者用心省真五脉氣少胃氣不平三陰也宜治其下俞補陽瀉陰一陽獨滿少陽厥也陽併于上四肢爭張氣滿于腎宜治其經絡瀉陽補陰一陰至厥陰之治也真虛者心厥氣留薄發為白汗調食和藥治在下俞。五藏有疾當取十二原十二原者五

藏之所稟二百六十五節氣味也。五藏有疾也應出十二原十二原各有所出明知其原觀其應而知五藏之害陽中之少陰肺也其原出于太淵太淵二陽中之太陽心也其原出于太陵太陵二陰中之少陽肝也其原出于太衝太衝二陰中之至陰脾也其原出于太白太白二陰中之太陰腎也其原出于太谿太谿二膏之原出于鳩尾鳩尾一盲之原出于臍臍一凡此十二原者主治五藏六府之有疾。

刺弊

脉氣盛而血虛者刺之則脫氣脫氣則什血氣俱盛而陰氣多者其血滑刺之則射陽氣畜積久留而不瀉者其血黑以濁故不能射新飲而液滲于絡而未合和于血也故血出而汁別焉其不新飲者身中有水久則為腫陰氣積于陽其因氣于絡故刺之血未出而氣先行故陰陽之氣其新相得而未和合因而瀉之則陰陽俱脫表裏相離故脫色而蒼蒼然刺之血出多色不變煩惋者刺絡而虛經虛經之屬于陰者陰脫故煩悶陰陽相得而合為痺者此為內溢于經外注于絡如是者陰陽俱有餘雖多出血而弗能虛也帝曰相之奈何曰血脈者盛堅橫以赤上下無常處小者如鍼大者如筋則而寫之萬全也故無失數矣失數而反各如其度帝曰鍼入而肉著者何也曰熱氣因于鍼則鍼熱熱則著于鍼故堅焉。○妄用砭石後遺身骨此治之二六也。○闕門而刺之者死於家中入門而刺之者死於堂上。

血氣不同形

帝曰余聞九鍼于夫子而行之于百姓百姓之血氣各不同形或神動而氣先鍼行或氣與鍼相逢或鍼以出氣獨行或數刺乃知或發鍼而氣逆或數刺病益劇凡此六者各不同形願聞其方岐伯曰重陽之人其神易動其氣易往也重陽之人焯焯高高言語善疾舉足善高心肺之藏氣有餘陽氣清盛而揚故神動而氣先行重陽之人而神不先行者此人頗有陰者也多陽者多喜多陰者多怒數怒者易解故曰頗有陰其陰陽之離合難故其神不能先行陰陽和調而血氣淖澤滑利故鍼入而氣出疾而相逢也其陰氣多而陽氣少陰氣沉而陽氣浮者內藏故鍼已出氣乃隨其後故獨行也人之多陰而少陽其氣沉而氣出難故數刺乃知也鍼入而氣逆者其氣逆與其數刺病益甚者非陰陽之氣浮沉之熱也此皆粗工之所敗上之所失其形氣無過焉

十一絡經刺

帝曰余聞經刺未得其意岐伯曰邪客于皮毛入于孫絡留而不去閉塞不通不得入于經流溢于大絡而生奇病也夫邪客大絡者左注右右注左上下左右與經相干而布于四末其氣無常處不入于經命曰經刺帝曰願聞經刺以左取右以右取左奈何其與巨刺何以別之曰絡病者其痛與經脈處故命曰經刺客于足少陰之絡令人之心痛暴脹胸脇支滿無積者刺然骨之前出血如食頃而已左取右右取左病新發者取五日已邪客于手少

陽之絡令人喉痺舌捲心煩臂外廉痛手不及頭刺

手中指次指爪上去端如韭葉各一痛壯者立已老者有頃已左取右右取左比新病數日已邪客于足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者各一痛男子立已女子有頃已左取右右取左邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足大指爪甲上與肉交者各一痛立已不已刺外踝下三痛左取右右取左如食頃已邪客于手陽明之絡令人氣滿胸中喘息而支脈胸中熱刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痛左取右右取左如食頃已邪客于臂掌之間不可得屈刺其蹠後先以指按之痛乃刺之以月死生為數月生一日一痛二日二痛十五日十五痛十六日十四痛邪客于足陽蹠之脈令人目痛從內眦始刺外踝之下半寸所各二痛左刺右右刺左如行十里頃而巳人有所墮墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一痛見血立已左刺右右刺左邪客于手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痛立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時聞者不可刺也耳中生風者亦刺之如此數左刺右右刺左凡痺痿來無常處者在分肉間痛而刺之以月死生為數用鍼者隨氣盛衰以為痛數鍼過其日數則脫氣不反日數則氣不傷左刺右右刺左病已止不已復刺之如法月生一日一痛二日二痛漸多至十五日十五痛十六日十四痛

漸少之邪客于足陽明之經令人執衄上齒寒刺足中指
 次指爪甲上與肉交者各一痛左刺右右刺左邪客于足
 少陽之經令人胸膈不得息效而汗出刺足小指次指爪
 甲上與肉交者各一痛不得息立已汗出立止效者溫水
 飲食一日已左刺右右刺左病立已不復刺如法邪客
 于足少陰之絡令人噎痛不可內食無故善怒氣上走賁
 上刺足下中央之脉各三痛凡六刺立已左刺右右刺左
 邪客于足太陽之絡令人腰痛引小腹控眇不可以仰息
 刺腰尻之兩胛之上是腰俞以月死生為痛數發鍼立已
 左刺右右刺左邪客于足太陽之絡令人拘攣背急引脇
 而痛刺之從項始數脊椎俠脊疾按之應手如痛傍刺之
 三痛立已邪客于足少陽之絡令人留于樞中痛痺不可
 以舉刺樞中以毫鍼寒則又留鍼以月死生為數立已治
 諸經刺之所過者不病則繆刺之耳聾刺手陽明不已刺
 其通脉出其前者齒齟刺手陽明不已刺其脉入齒中者
 立已邪客於五藏之間其病也脉引而痛時來時止視其
 病繆刺之於手足爪甲上視其脉出其血間一日一刺一
 刺不已五刺已繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背脉血者
 出之足陽明中指甲上一痛手大指次指甲上一痛立已
 左取右右取左邪客於手足少陰太陽足陽明之絡此五
 絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形
 無知也其狀若尸或曰尸厥刺其足大指內側爪甲上去
 端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痛後刺手
 大指內側去端如韭葉後刺手心主少陰銳骨之端各一

瘡立已不已以竹管吹其兩耳鬚其左角之髮方一寸燔
 治飲以美酒一杯不能飲者灌之立已有痛而經不痛者
 繆刺之視其皮部有血絡者盡取之此繆刺之數也○身
 形有病九候莫病則繆刺之

經刺
 岐伯曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留而不去入於
 孫絡留而不去入于絡脉留而不去入于經脉內連五藏
 散於腸胃陰陽俱盛五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於
 五藏之次也如此則治其經焉○凡刺之數先視其經脉
 切而從之審其虛實而調之不調者經刺之○不盛不虛
 以經取之

巨刺
 痛在于左而右脉病者則巨刺之○邪客於經左盛則右
 病右盛則左病亦有移易者左痛未已而右脉先病如此
 者必巨刺之必中其經非絡脉也

脉刺
 人迎一盛病在足少陽一盛而躁病在手少陽人迎二盛
 病在足太陽二盛而躁病在手太陽人迎三盛病在足陽
 明三盛而躁病在手陽明人迎四盛且大且數名曰溢陽
 溢陽為外格脉口一盛病在足厥陰厥陰一盛而躁在手
 心主脉口二盛病在足少陰二盛而躁在手少陰脉口三
 盛病在足太陰三盛而躁在手太陰脉口四盛且大且數
 者名曰溢陰溢陰為內關內關不通死不治人迎與太陰
 俱盛四倍以上命曰關格關格者與之短期人迎一

盛焉足少陽而補足厥陰二馬一補日一取之必切而
之疎取之上氣和乃止人迎二盛焉足太陽補足少陰二
寫一補二日一取之必切而驗之疎取之上氣和乃止人
迎三盛焉足陽明而補足太陰二馬一補日二取之必切
而驗之疎取之上氣和乃止脉口一盛焉足厥陰而補足
少陽二補一馬日一取之必切而驗之疎而取上氣和乃
止脉口二盛焉足少陰而補足太陽二補一馬二日一取
之必切而驗之疎取之上氣和乃止脉口三盛焉足太陰
而補足陽明二補一馬日一取之必切而驗之疎而取之
上氣和乃止所以日二取之者太陽主胃大富于穀氣故
可日一取之也人迎與脉口俱盛三倍以上命曰陰陽俱
盛如是者不開則血脉閉塞氣無所行流滯于中五藏內
傷如是者因而灸之則變易而為他病矣

深淺上下所宜

補須一方實採取之稀其病以極出其邪氣一方虛淺
刺之以養其脉疾按其病無使邪氣得入邪氣來也緊而
疾穀氣來也徐而和脉實者深刺之以泄其氣脉虛者淺
刺之使精氣無得出以養其脉獨出其邪氣刺諸痛者其
脉皆實故曰從腰以上者羊太陰陽明皆主之從腰以下
者足太陰陽明皆主之病在上者下取之病在下者高取
之病在頭者取之足病在腰者取之膈病生于頭者頭重
生于手者臂重生於足者足重治病者先刺其病所從生
者也春氣在毛夏氣在皮膚秋氣在分肉冬氣在筋骨刺
此病各以其時為齊故刺肥人者秋冬之齊刺瘦人者夏

齊病痛陰也痛而不可忍之不得者陰也深刺之病在
上者陽也病在下者陰也淺刺之病先起于陰
者先治其陰而後治其陽病先起于陽者先治其陽而後
治其陰刺熱厥者留鍼反為寒刺寒厥者留鍼反為熱刺
熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者刺二
陰也一陽者一刺陽也久病者邪氣入深刺此者深內而
久留之間日而後刺之必先調其左右去其血脉刺道畢
矣凡刺之法必察其形氣形肉未脫少氣而脉又躁躁厥
者必為繆刺之○脉之所居深不見者刺之微內鍼而久
留之以致其空脉氣也脉淺者勿刺按絕其脉乃刺之無
令精出獨出其邪氣耳所謂三刺則穀氣出者先淺刺絕
皮以出陽邪再刺則陰邪出者少益深絕皮致肌肉未入
分肉間也已入分肉之間則穀氣出故刺法曰始淺刺之
以逐邪氣而來血氣後刺深之以致陰氣之邪最後刺極
深之以下穀氣此之謂也

人身左右上下虛實不同刺

天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地
不滿東南故東南方陽也而人左耳目不如右強也東方
陽也陽者其精并於上并於上則上明而下虛故使耳目
聰明而手足不便也西方陰也陰者其精并於下并於下
則下盛而上虛故其耳目不聰明而手足便也故俱感于
邪其在上則右甚在下則左甚此天地陰陽所不能全也
故邪居之故天有精地有形天有八紀地有五里故能為
萬物之主也清陽上天濁陰歸地是故天地之動靜神明

之綱紀故能以生長收藏終而復始惟賢人上配天以奉
頭下象地以養中傍人事以奉五藏天氣通于肺地氣
通于嗇風氣通于肝雷氣通于心谷氣通于脾雨氣通于
腎六經為川腸胃為海九竅為水注之氣以天地為之陰
陽陽之汗以天地之雨明之陽之氣以天地之疾風名之
暴風象雷逆氣象陽故治不法天之紀不用地之理則災
害至矣故邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治
肌膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏治五藏者半
死半生也故天之邪氣感則害人五藏水殺之寒熱感則
害于六府地之濕氣感則害皮肉筋脉故善用鍼者從陰
引陽從陽引陰以右治左以左治右以我知彼以表知裏
以觀過與不及之理見微則過用之不殆

氣血清濁淺深刺

受穀氣者濁受氣者清清者注陰濁者注陽濁而清者上
出于咽清而濁者則下行清濁相干命曰亂氣帝曰夫陰
清而陽濁濁者有清清者有濁清濁別之奈何岐伯曰氣
之大別清者上注于肺濁者下走于胃胃之清氣上出于
口肺之濁氣下注于經內積于海帝曰諸陽皆濁何陽濁
甚乎岐伯曰手太陽獨受陽之濁手太陰獨受陰之清其
清者上走空竅其濁者下行諸經諸陰皆清足太陰獨受
其濁清者其氣滑濁者其氣澀此氣之常也故刺陰者深
而留之刺陽者淺而疾之清濁相干者以數調之

死期不可刺

病發于心一日而之肝三日而之脾五日而之肺三日不

已死冬夜半夏日中病先發于肺三日而之肝一日而之
脾五日而之胃十日不已死冬日入夏日出病先發于肝
三日而之脾五日而之胃三日而之腎三日不已死冬日
入夏早食病發于脾一日而之胃三日而之腎三日而之
腎勝脾五日而上之心二日不已死冬夜半夏日昧病先
發于腎三日而之腎勝脾三日而上之心三日而之小腸
三日不已死冬大晨夏早病先發于勝脾五日而之腎
一日而之小腸一日而之心二日不已死冬鷄鳴夏下哺
諸病以次相傳如是者皆有死期不可刺也間一藏及三
四藏者乃可刺也

五亂刺

清氣在陰濁氣在陽榮氣順脉衛氣逆行清濁相干亂于
胸中是謂大悅故氣亂于心則煩心密嘿首靜伏亂于
肺則俯仰喘喝按手以呼亂于腸胃則為霍亂亂于腎經
則為四厥亂于頭則為厥逆頭重眩仆曰五亂刺者刺之
有道乎曰有道以未有道以去審知其道是謂其氣已
聞其道曰氣在手心者取之手少陰心主之俞氣在足
者取之手足太陰榮足少陰俞氣在足腸胃者取之足太
陰陽明不下者取之三里氣在足頭者取之天柱大抒不
知取足太陽榮俞氣在臂足取之先去血脉後取其陽明
少陽之榮俞曰補焉奈何曰徐入徐出謂之道氣補焉無
形謂之同精是非有餘不足也亂氣之相逆也

氣血盛衰

足陽明之上血氣盛則髯美長血少氣多則髯短故氣少

血多則髯少血氣皆少則無眉兩吻多畫足陽明之下
氣盛則下毛美長至胸血多氣少則下毛美短至臍行則
善高舉足足指少肉足善寒血少氣多則肉而善瘡血氣
皆少則無毛有則稀枯悴善痿厥足彈足少陽之上氣血
盛則通髯美長血多氣少則通髯美短血少氣多則少髯
血氣皆少則無鬚感于寒濕則善痺骨痛爪枯也足少陽
之下血氣盛則脛毛美長外踝肥血多氣少則脛毛美短
外踝皮堅而厚血少氣多則脛毛少外踝皮薄而軟血氣
皆少則無毛外踝瘦而無肉足太陽之上血氣盛則有美
眉有毫毛血多氣少則惡眉面多少理血少氣多則面多
肉血氣和則美色足太陽之下血氣盛則跟肉滿腫堅氣
少血多則瘦跟空血氣皆少則善轉筋踵下痛手陽明之

上血氣盛則髮美血少氣多則髮惡血氣皆少則無髮手
陽明之下血氣盛則腋下毛美手魚肉以溫氣血皆少則
手瘦以寒手少陽之上血氣盛則眉天以長耳色美血氣
皆少則耳焦惡色手少陽之下血氣盛則手捲多肉以溫
血氣皆少則寒以瘦氣少血多則瘦以多脈手太陽之上
血氣盛則有多鬚面多肉以平血氣皆少則面瘦惡色手
太陽之下血氣盛則掌肉充滿血氣皆少則掌瘦以寒曰
刺之有灼乎曰有美者是太陽之脈氣血多惡者氣血
少其肥而澤者血氣有餘肥而不澤者氣有餘而血不足
瘦而無澤者氣血俱不足審察其形氣有餘不足而調之
可以知逆順矣○曰婦人無鬚者無血氣乎曰衝脈任脈
皆起于胞中上循背裏為經絡之海其浮而外者循腹右

上行會于咽喉別而終唇口血氣盛則充膚熱肉血獨盛
則澹滲皮膚生毫毛今婦人之生右口餘于氣不足于血以
其數脫血也衝任之脈不榮口唇故陰不生焉曰士人有
傷十陰陰氣絕而不起陰不用然甘鬚不去其故何也宦
者獨去何也曰宦者去其宗筋傷其衝脈血焉不復皮膚
內結唇口不榮故鬚不生曰其有天宦者未嘗被傷不脫
于血然其鬚不生其故何也曰此天之所不足也其任衝
不盛宗筋不成有氣無血唇口不榮故鬚不生

耐痛
人之骨強筋弱肉緩皮膚厚者耐痛其于鍼石之痛火灼
亦然黑色而美骨者耐火痛堅肉薄皮者不耐鍼石之痛
于火灼亦然

五逆

帝曰余聞刺有五逆曰病與脈相逆熱病脈靜汗已出脈
盛脈是一逆也病泄脈洪大二逆也著脾不移脘肉破身
熱脈偏絕三逆也淫而奪形身熱四逆也天然白及後下血
血脈重四逆也寒熱奪形脈脈五逆也

三刺穀氣

一刺則陽邪出再刺則陰邪出三刺則穀氣至穀氣至而
止所謂穀氣至者已補而實已傷而虛故已知穀氣至也

熱

肝熱病者小便先黃腹脹多眵身熱熱爭則狂言及驚脇
滿痛手足躁不得安卧庚辛甚甲乙太汗氣逆則庚辛死
刺足厥陰少陽其逆則頭痛以員引衝頭也心熱病者

先不樂數日乃熱熱則卒心煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽脾熱病者先頭重頰痛煩心煩青欲嘔身熱熱爭則腰疼不可用俛仰腹滿泄兩頰痛甲乙甚戊己大汗逆則甲乙死刺足太陽陽明肺熱病者先漸然蹶起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘咳痛走胸膈背不舒大息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陽陽明出血如大豆立已腎熱病者先腰痛肝酸舌渴數飲身熱熱爭則項痛而強筋寒且痠足下熱不欲言其逆則項痛員員澹澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽諸汗者至其所勝日汗出也肝熱病者左頰先赤心熱病者頰先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頰先赤病雖未發見赤色者刺之名曰治未病熱病從部所起者至期而已其刺之反者三周而已重逆則死諸當汗者至其所勝日汗大出也諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也熱病先胸脇痛手足躁刺足少陽補足大陰病甚者為五十九刺熱病始手足臂痛者刺手陽明太陰而汗出止也病始於頭首者刺項太陽而汗出止也病始於足脛者刺足陽明而汗出止也熱病先身重骨痛耳聾好刺足少陰病甚為五十九刺熱病先眩冒而熱胸脇滿刺足少陰少陽太陽之脉色榮顯皆熱病也曰今且得汗待時而已厥陰脉爭見者死期不過三日其熱病內運腎少陽之脉色也少陽之脉色榮顯前熱病也榮未文曰今且得汗待時而已與少陰脉爭

者死期不過三日熱病氣穴三椎下間主胸中熱四椎下間主胃中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在散也項上三椎陷者中也頰下逆顛為大瘖下才卓為腹滿顛後為脇痛頰上高上也○頭上五行行行者以泄諸陽之熱逆也大瘖膺俞缺盆皆俞此八者以寫胸中之熱也氣衝三里巨虛上下廉此八者以寫胃中之熱也雲門髀骨委中髓空此八者以寫四肢之熱也五藏俞傍五者此十者以寫五臟之熱也○熱病不可刺者九一曰汗不出大額發赤熾者死二曰泄而腹滿甚者死三曰目不明熱不已者死四曰嬰兒熱而腹滿死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰衄熱者死九曰熱而瘖者死腰折瘖瘖齒噤斷也凡此九者不可刺也

瘖

足太陽之瘖令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱焯焯暍暍然熱止汗出難已刺和血足少陽之瘖令人身體解休寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽足陽明之瘖令人先寒而洒淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月火光氣乃快然不足陽明附上足太陽之瘖令人不樂好太息不嗜食多食熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰則取之足少陰之瘖令人嘔吐甚多寒熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已足厥陰之瘖令人腰痛小腹滿小便不利如痿狀非痿也教以意恐懼氣不足腹中飽是刺足厥陰肺瘖者令人心寒寒甚熱間善驚如有所

見者刺于太陽陽明心瘡者令人煩心甚欲得清水反寒
多下惡熱刺手少陰肝瘡者令人色蒼蒼然太息甚狀若
死者刺足厥陰見血肥腫者令人寒腹中痛熱則腸中鳴
鳴已汗出刺足太陰腎瘡者令人浙浙然腰脊痛宛轉大
便難目眇眇然手足寒刺足太陽少陰胃瘡者令人且病
也善飢而不能食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脉出
血瘡發身方熱刺肘上動脉開其空出其血立寒瘡方欲
寒刺手陽明太陰足陽明太陰瘡脉滿大急刺背俞用中
鍼傍五腧俞各一適肥瘦出其血也瘡脉小實急灸脛少
陰刺指井瘡脉滿大急刺背俞用五腧俞背各一適行于
血也瘡脉緩大虛便用藥不宜用鍼凡治瘡先發如食頃
乃可以治過之則失時也諸瘡而脉不見刺十指間出血

金匱要略卷之五十五

血去必已先視身之赤如小豆者盡取之十二瘡者其發
各不同時察其病形以知其何脉之病也先其發時如食
頃而刺之一刺則衰二刺則知三刺則已不已刺舌下兩
脉出血不已刺却中盛經出血又刺項已下俠脊者必已
舌下兩脉者應泉之刺瘡者必先問其病之所先發者先
刺之先頭痛及重者先刺頭上兩額兩眉間出血先項背
痛者先刺之先腰背痛者先刺却中出血先手背痛者先
刺手少陰陽明十指先足脛酸痛者先刺足陽明十指間
出血風瘡瘡發則汗出惡風刺三脈經背俞之血者所瘡
痛其按之不可名曰附腫痛病以經絡經骨出血之已
刺體小痛刺至陰諸陰之井無出血隔一日一刺瘡不消
隔日而作刺足太陽湯而間日作刺足少陽溫瘡汗不出

為五十九刺

足太陽脉令人腰痛引項脊之骨如立狀刺其却中太陽
正經出血脊無見血少陽令人腰痛如以鍼刺其皮中循
循然不可以俯仰不可以頭刺少陽成骨之端出血成骨
在膝外廉之骨獨起者其無見血陽明令人腰痛不可以
頭頤如有見者善悲刺明于脗前三瘡上下和之出血
秋無見血足少陰令人腰痛痛引脊內廉刺少陰于內踝
上二筋春無見血出血太多不可復也厥陰之脉令人腰
痛腰中如張弓脊弦刺厥陰之脉在膕踵魚腹之外循之
緊索然乃刺之其病令人善言嘿嘿然不慧刺之三瘡解
脉令人腰痛痛而引脊目眩暈然時遺洩刺解脉在膕筋

肉分間却外廉之橫脉出血血變而止解脉令人腰痛如
引帶常如折腰狀善恐刺解脉在却中結絡如黍米刺之
血射以黑見赤血而已同陰之脉令人腰痛痛如小鍾居
其中怫然腫刺同陰之脉在外踝上絕骨之端為三瘡陽
維之脉令人腰痛痛上怫然腫刺陽維之脉脉與太陽合
膕下間去地一尺所衝絡之脉令人腰痛不可以俯仰則
恐傷得之重傷腰衝絡絕惡血歸之刺之在却陽筋之
間上經數寸衝居為二瘡出血會陰之脉令人腰痛痛上
濕溼然汗出汗乾令人欲飲飲已欲走刺直陽之脉上三
瘡在膕上却下五寸橫居視其盛者出血飛陽之脉令人
腰痛痛上怫然甚則惡以刺飛陽之脉在內踝上五
寸少陰之前與陰維之會昌陽之脉令人腰痛痛引膕目

脈既然甚則反折舌捲不能言刺二筋為二府在內踝上
大筋前太陰後上踝二寸所散脈令人腰重而熱甚生
項腰下如有橫木居其中甚則遺洩刺形脈在膝前骨肉
分筋外燕束脈為三痛肉里之脈令人腰痛不可以數
按則筋縮急刺肉里之脈為二痛在太陽之外少陽絕骨
之後腰痛俠脊而痛至頭凡九然目既既欲偃仆刺足
太陽卻中出血腰痛上寒刺足太陽陽明上熱刺足厥陰
不可以俛仰刺足少陽中熱而喘刺足少陰刺却中出血
腰痛上寒不可顧刺足陽明上熱刺足太陽中熱而喘刺
足少陰大便難刺足少陰如折不可以俛仰不可舉刺足
太陽引脊內廉刺足少陰腰痛引小腹控眇不可以仰刺
腰尻交者兩深腓上以月死生為痛數發鍼立已左取右

右取左○腰痛不可俛仰急引陰卵刺八髻與痛上八髻
左腰尻分間

周痺

帝曰周痺之在身也上下移徙隨脈在上下左右相應間
不容空願聞此痛在血脉之中邪將在今肉之間乎何以
致是其痛之移也間不及下鍼其痛之時不及定治而
痛已止矣何道使然願聞其故岐伯曰此眾痺也非周痺
也曰願聞眾痺曰此各在其處更發更止更居更起以右
處左以左處右非能用也更發更休也曰刺之奈何曰刺
此者痛雖已止必刺其處勿令復起曰善願聞周痺何如
曰周痺者在于血脉之中隨脈以上隨脈以下不能左右
各當其所以刺之奈何曰痛從上下者先刺其下以過之

後刺其上以脫之痛從下上者先刺其上以過之後刺其
下以脫之帝曰善此痛安生何因而有名曰風寒濕氣客
于分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚聚則排分肉而分
裂也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解
則放厥則他痺發發則知寒帝曰善余已得其意矣此內
不在藏而外未發于皮獨居分肉之間真氣不能周故命
曰周痺故刺痺者必先切循其下之六經視其虛實及大
絡之血結而不通及虛而脈陷空中者而調之熨而通之
其愈堅轉引而行之帝曰善余已得其意矣亦得其事也
九者經罷之理十二經脈陰陽之病也

癩狂

癩疾者始生先不樂頭重頭痛視舉目赤甚作極已而煩

候之于頰取手太陽陽明大陰血變而止癩疾始作而
引口啼呼喘悸者候之手陽明太陽左強者攻其右右強
者攻其左血變而止癩疾始作先反偃因而脊痛候之足
太陽陽明手太陽血變而止治癩疾常與之居察其所當
取之處病至視之有過者為之置其血于瓢壺之中至其
發時血獨動矣不動矣窮骨二十壯窮骨者骸骨也骨癩
疾者願齒諸俞分肉皆滿而骨居汗出煩惋嘔多沫沫氣
不泄不治脈癩疾者暴仆四肢之脈皆脹而縱脈滿盡刺
之出血不滿灸之挾項太陽灸帶脈于脇相去三寸諸分
肉本輸嘔多沫氣下泄不治癩疾者疾發如狂者死不治
狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂飢治之取手
太陽陽明血變而止及取足太陽陽明狂始發少卧不飢

有尚賢也自辯智也尊貴也善言日夜不休治之取手
陽明太陽太陰舌下少陰視之盛者皆取之不盛釋之也
狂言善笑好歌妄行人休者得之大恐治之取手陽明
太陽太陰狂自妄見耳妄聞善呼者少氣之病生也治之
取手太陽太陰陽明足太陰頭兩顛狂者多食善見鬼神
善笑而不發于外者得之有兩大喜治之取足太陰太陽
陽明後取手太陰太陽陽明狂而新發未應如此者先取
前泉在右動脈及盛者見血有頃已不已以法取之灸可
取二十壯○大熱偏身狂而妄見妄聞妄言視足陽明及
大終取之虛者補之血而實者瀉之因其偃卧居其頭前
以手四指夾按頸動脈久持之卷而切推下至缺盆中
而後止如前熱去乃止此所謂推而散之也○病在諸陽
脈且寒且熱諸分且寒且熱曰狂刺之虛脈視分盡熱病
已止病初發歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲
刺諸分諸脈其無寒者以鍼調之

頭

厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陽厥頭痛頭脈
痛心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡去血後調足厥陰厥
頭痛頭貞貞頭重血重瀉頭上五行行五先取手少陰後
取足少陰厥頭痛意善忘按之不得取頭左右動脈後取
足太陰厥陰頭項先痛腰脊為應先取天柱後取足太陽
厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱動脈云有寫出其血後取
足少陽直頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治頭痛
不可取于俞者有所擊墮惡血在于內若肉傷痛木已可

則刺不可遠取也頭痛不可刺者大痺為惡日作者可令
少愈不可已頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽

痿

帝曰五藏使人痿何也岐伯曰肺主身之皮毛心主身之
血脈肝主身之筋脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺
熱葉焦則皮毛虛弱急薄者則生痿癭也心氣熱則下脈
厥而上上則下脈虛則生痿癭折摯脛縱而不任地
也肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發為
筋痿脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿腎氣熱則
腰脊不舉骨枯而髓減發為骨痿帝曰何以得之曰肺者
藏之長也為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴嗚
則肺熱葉焦故曰五藏因肺熱葉焦發為痿癭此之謂也
悲哀大甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數
澀血故本病曰大經空虛發為肌痺傳為脉痿思想無窮
所願不得意淫于外入房大甚宗筋弛縱發為筋痿及為
白淫故下經曰筋痿者生于肝使內也有漸于濕以水為
事若有所留居處相濕肌肉濡漬痺而不仁發為內痿故
下經曰內痿者得之濕地也有所遠行勞倦逢大熱而渴
渴則陽氣內伐內伐則熱舍于腎腎水虛也今水不勝火
則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者
生于大熱也帝曰何以別之曰肺熱者色白而毛敗心熱
者色赤而絡脈溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉
蠕動腎熱者色黑而齒搖帝曰如夫子言可矣論言治痿

者獨取陽明何也岐伯曰陽明者五藏六府之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衝脈者經脈之海也主滲灌豁谷與陽明合于宗筋陰陽總宗筋之會會于氣衝而陽明為之長皆為下帶脈而絡于督脈故陽明虛則宗筋縱帶脈不引故足痿不用也治之各補其榮而通其俞調其虛實和其逆順筋脈骨肉各以其時受月則病已矣帝曰善

心痛

厥心痛與背相控善瘦如後後觸其心僂僂者腎心痛也先取京骨崑崙發鍼不已取然谷厥心痛腹脹胸滿心尤痛甚胃心痛也取之大都太白厥心痛痛如以鍼刺其心痛甚若脾心痛也取之然谷太谿厥心痛色蒼蒼如死

狀終日不得太息肝心痛也取之行間太衝厥心痛卧若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也取之魚際大淵真心痛手足清至節心痛甚曰發夕死夕發旦死心痛不可刺者中有盛聚不可取于俞○心痛引腰脊欲嘔取足少陰心痛腹脹嗇嗇然大便不利取足太陰心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陽心痛引小腹上下無常處便澀難刺足厥陰心痛但知氣不足以息刺手太陰心痛當九節刺之按已刺按之立已上下求之得之立已○背與心相控而痛所治天突十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也背胸邪繫陰陽左右如此

帝曰脈之應于寸口如何而脈岐伯曰其脈大堅以瀉者

脹

何以知藏府之脹也曰陰為藏脹為府曰夫氣之人脹也在下血脈之中耶藏府之內乎曰三者皆有焉然非脹之舍也曰頰間脹之舍曰夫脹者皆在藏府之外也藏府之舍也曰頰間脹之舍曰夫脹者皆在藏府之外之內也若胃之脹也各有其舍也各有次舍虛名而同處一域之中其氣各異類聞其故曰未解其意再問曰夫胸腹藏府之邪也體中者心中之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅間里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五藏六府各有畔界其病各有形狀營氣循脈衛氣逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹三里而篤近者一下遠者三下無問虛實上在疾馬曰頰間脹形曰夫心脹者煩心短氣此不安肺脹者虛滿而喘咳肝脹者脇下滿而病

引小腹脾脹者善噦四肢煩悅體重不能勝衣卧不安腎脹腹滿引背央央然腰解痛六府脹胃脹者腹滿胃脫痛鼻聞焦臭妨于食大便難大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感于寒則飧泄不化小腸脹者小腹膜脹引腰而痛膀胱脹者小腹滿而氣癢三焦脹者氣滿于皮膚中輕輕然而不堅膀胱者脇下痛脹口中苦善太息凡此諸脹者其道在一明知逆順鍼數不失為虛補實神去其室致邪失正真不可定粗之所敗謂之天命補虛為實神歸其室又寒其空謂之良工曰脹者為生何因而有曰衛氣之在身也常然並脈循分肉行有逆順陰陽相隨乃得天和五藏更始四時循序五穀乃化然後脹氣在下營氣留止寒氣通上真氣相攻兩氣相搏乃合為脹也曰善何以解感曰

之子其三合而得曰善曰脈論言無問虛實工在疾焉
近者一下遠者三下今有其三而下不者其過焉在曰此
言陷于肉而中氣穴者也下中氣穴則氣內閉鍼不陷
則氣不行上越中肉則衛氣相亂陰陽相逐其于脈也
當瀉不瀉氣故不下三而不必更其道氣下乃止不下
復始可以萬全焉有殆者乎其于脈也必當于診當瀉則
當瀉則補如鼓應桴惡有不下者乎○帝曰膚脹鼓脹
可刺邪曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去血絡也○腹
暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也少陰俞者脊推
三寸傍五用員利鍼衛氣逆而脈脈衛氣並脈為膚脹三
里而瀉近者一下遠者三下無問虛實三里疾瀉

胸脇痛

胸脇痛而不得息不得卧上氣短氣偏痛脈滿起斜出尻
脉絡胸脇支心貫兩上有天突斜下有交十一椎

大風

風從外入令人振寒汗出頭暈身重惡寒治在風府調其
陰陽不足則補有餘則瀉○大風頭項痛刺風府在上推
大風汗出灸噓毒在背下俠脊傍三寸所厭之今病人呼
噓噓○從風增風刺眉頭失枕在脊上橫骨間○病風且
寒且熱足出汗一日數過先刺諸分理絡脉汗出且寒且
熱一日一刺百日而已

癩風

癩風者素刺其腫者已刺以鍼其處按出其惡氣腫
盡乃止○骨節重積肩腫名大風刺乳肉為故汗出百日

刺骨髓汗出百日凡二百日須眉生而止鍼

偏枯

偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間巨鍼
取之蓋其不足損其有餘乃可復也痺之為病身無痛者
四肢不攷智亂不甚言微知可治甚則不能言不可治也
病先起于陽而後入于陰先取其陽後取其陰浮而取之

痿厥

痿厥為四末束攣乃疾解之日二不仁者十日而知無休
病已止歲以草刺鼻寒寒而已無息而疾迎引而立已大
驚之亦可

癰疽

癰疽之生膿血之成也不從天下不從地出積微之所生
也故聖人自治于未有形也惡者遺其已成也膿已成十
死一生故聖人弗使已成而明為良方者之竹帛使能者
踵而傳之世後無有終時者為其不予遺也帝曰其已有
膿血而後遺乎不導之以小鍼治乎曰以小治小者其功
小以大治大者多害故其已成膿者其惟砭石鉗鋒之所
取也○微按其難視氣所行先淺刺其傍稍內益深還而
刺之無過三行察其浮沉以為淺深已刺必發令熱入中
日使熱內邪氣益大難乃潰○治癰腫者刺腐上視癰
大小深淺刺之刺大者多血小者深之必端內鍼為故正
○癰疽不得瀉者回難不知所按之不應手乍米乍已刺
手大陰傍三筋與經脉各二掖癰大熱刺足少陽五刺而
熱不止刺手心三刺手太陰經絡者大骨之會各三○

暴癰筋絡分而痛髓汗不盡胞氣不足治在經俞○癰
氣之息者宜以鍼開除之夫氣盛血聚者宜石而厲之○
刺癰操鍼○左足應立春其日戊寅巳丑左陽應春分其
日乙卯左手應立夏其日戊辰巳巳齊喉音頭應夏至其
日丙午右手應立秋其日戊申巳未右脇應秋分其日辛
酉右足應立冬其日戊戌巳亥腰尻下竅應冬至其日壬
子六府膈下三歲應中州其大禁大禁太一所在之日及
諸戊巳凡此九者善候八正之處所主左右上下身有癰
腫者欲治之無以其所值之日瀆治之是謂天忌日也

鼠瘻

鼠瘻之本皆在于歲其末上出于頸腋之間其浮于脉中
而未內者于肌肉而外為膿血者易去也請從其本引其

末乃可衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以
去之其小如脉者一刺知三刺而已○鼠瘻寒熱刺寒府

寒府者膝外解營

耳鳴耳痛耳聾

耳者宗筋之所聚也胃中空則宗筋虛虛則下溜脉有所
竭故耳鳴補容主人手大指甲上與肉交者也○耳聾而
不痛者取足少陽聾而痛者取手陽明○耳聾無聞取耳
中聽宮耳痛取耳前動脉○耳痛不可刺者耳中有膿若
有乾肝脾耳無聲也耳聾取小指次指爪甲上與肉交者
先取手後取足耳鳴取手中指甲上左取右右取左先取
手後取足○耳聾取手陽明不已刺其通脉出耳前者

膝痛 脛痠

寒膝伸不尿治其捷坐而膝痛治其捷立而解治其散
關膝痛痛及拇指治其關坐而膝痛如物隱者治其關膝
痛不可屈伸治其背內連脘若折治陽明中俞膠若別治
巨陽少陰榮淫潔脛痠不能久立治少陽之維在外踝上
五十輔骨上橫骨下為健俠髓為機膝解為骸關伏膝之
骨為連骸骸下為輔軸上為關脘上為關頭橫骨為枕○
膝中痛取犢鼻以員利鍼發而間之鍼大如釐刺膝無疑

少陰氣至則嚙舌少陽氣至則嚙頰陽明氣至則嚙唇視
主病者則補之○重舌刺舌柱以鉞鍼也

欠

陰氣積于下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故
數欠陽氣盡陰氣盛則目眩陰氣盡陽氣盛則寤矣馬足
少陰補足太陽○腎主欠取足少陰

噦

穀入于胃胃氣上注于肺今有故寒氣與新穀氣俱還于
胃新故相亂真邪相攻氣併相連復出于胃故噦補手太
陰馬足少陽

噦

陰氣盛而噦氣陰陰氣疾而陽氣徐陰氣盛而陽氣絕故
為噦補足太陽少陰○寒氣客于胃厥逆從上下故
復出于胃故噦補足太陽陽明

寒

寒氣客于皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄補諸陽

神可

胃不實則諸脉虛諸脉虛則筋脉懈惰筋脉懈惰則行陰用事氣不能復故為難因其所在補肉分間

定

湯氣和則滿于心出于鼻故為嚏補足太陽榮眉本

泣竭成盲

泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無見故命曰奪精補天柱經頰項

太息

憂思則心系急則氣約氣約則不利故太息以伸出之補手少陰心足少陽留之也

涎下

飲食入胃胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則蕪泉開

蕪泉開故涎下補足少陰○涎出者是蛟虻也以手聚按

堅而持之無令得移以大鍼刺之久持之虫不動乃出鍼也

口目喎僻

足之陽明手之太陽筋急則口目喎僻皆急不能卒視治皆如右方也

腸鳴

中氣不足溲便為之變腸為之善鳴下氣不足則為痿厥心悅補足外踝留之

目眩頭傾

上氣不足頭為之不能頭為之善傾補足外踝下留之

喉痺

喉痺不能言取足陽明能言取手陽明○厥氣走喉而不能言手足清大便不利取足少陰○噎乾口中熱如膠取足少陰○喉痺舌捲口中乾煩心心痛臂內應痛不可及頭取手小指次指爪甲下去端如韭葉

齒痛

齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取手陽明○齒齲刺手陽明不已刺其脉入手中者立已

衄

衄而不止衄血流取足太陽衄血取手太陽不已刺腕骨下不已刺胸中不血

喘

中熱而喘取足少陽胸中血絡氣滿胸中喘息取足太陽大指之端庶去爪甲如韭葉寒則留之熱則疾之氣下乃止

怒

喜怒而不欲食言益小刺足太陽怒而多言刺足少陽

顛

刺手陽明○顛痛刺足陽明曲周動脉見血立已不已按人迎于經立已

項痛

項痛不可俛仰刺足太陽不可以顧刺手太陽足解不可舉側取之在握合中以員利鍼大鍼不可刺

明虛則宗筋... 引故足痿不用也補其...

下血取曲泉

山

在小腹小腹滿不得大小便名曰疝得之寒刺小腹兩...

轉筋

轉筋于陽治其陰轉筋于陰治其陰皆卒刺之○轉筋者...

厥

厥挾脊而痛者至頂頭沉沉然目眈眈然腰脊強取足太...

痲

痲驚脈五鍼手大陰各五刺經太陽五刺手少陰經...

修者一足陽明一上五

霍亂

霍亂刺俞傍五足陽明及上傍三

日痛

日中赤痛從內背始取之陰蹄

卒然無音

帝曰人之卒然憂恚而無音者何以之寒何氣出行使音...

目不瞑不卧

夫邪氣之客于人也或令人目不瞑不卧者何氣使然伯...

積于胸中出于喉嚨以貫心脈而行呼吸為榮氣者必其...

分間行于五藏六府今厥氣密于五藏六府則衛氣得
衛其外行于陽不得入于陰行于陽則陽氣盛陽氣盛則
陽蹻陷不得入于陰陰虛故目不瞑曰治之奈何曰補其
不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪

補遺篇氣交暴鬱刺

帝曰升降不前氣交有變即成暴鬱余已知之如何預救
生靈可得却乎岐伯曰昭乎哉問臣聞夫子言既明天真
須窮法刺可以折鬱扶運補弱全真焉盛瀾除今除斯苦
帝曰願卒聞之曰升之不前即有甚凶也木欲升而天柱
窒抑之木欲發鬱亦須待時當刺足厥陰之井火欲升而
天蓬窒抑之木欲發鬱亦須待時君火相火同刺包絡之
榮土欲升而天衝窒抑之土欲發鬱亦須待時當刺足太

陰之俞金欲升而天英窒抑之金欲發鬱亦須待時當刺
手太陰之經水欲升而天內窒抑之水欲發鬱亦須待時
當刺足少陰之合帝曰升之不前可以預備願聞其降可
以先防曰既明其升必達其降也升降之道皆可先治也
木欲降而地晶窒抑之降而不入抑之鬱發散而可待位
降而鬱發暴如天間之待時也降而不入鬱可速矣降可
折其所勝也當刺手太陰之所出刺手陽明之所入火欲
降而地玄窒抑之降而不入抑之鬱發散而可矣當折其
所勝可散其鬱當刺足少陰之所出刺足太陽之所入土
欲降而地蒼窒抑之降而不入抑之鬱發散而可入當折
其勝可散其鬱當刺足厥陰之所出刺足少陽之所入金
欲降而地彤窒抑之降而不入散抑之鬱發散而可入當

其勝可散其鬱當刺心包絡之所出刺手少陽所入也才
欲降而地阜窒抑之降而不入抑之鬱發散而可入當折
其土可散其鬱當刺足太陽之所出刺足陽明之所入帝
曰五運之至有前後與升降往來有所承抑之可得聞乎
刺法岐伯曰當取其化源也是故太過取之不及資之太
過取之次抑其鬱取其運之化源今折鬱氣不及扶資以
扶運氣以避虛邪也資取之法今出密語

司天不遷正刺法

帝曰升降之刺以知要願聞司天未得遷正使司化之失
其常政即萬化之或其皆安然與民為病可得先除欲濟
群生願聞其說岐伯曰悉乎哉問言其至理聖念慈憫欲
濟群生臣乃盡陳斯道可中洞微太陽復布即厥陰不遷
正不遷正氣塞於上當為足厥陰之所流厥陰復布少陰
不遷正不遷正即氣塞於上當刺心包絡脈之所流少陰
復布太陰不遷正不遷正即氣留於上當刺足太陽之所
流太陰復布少陽不遷正不遷正則氣塞未通當刺手少
陽之所流少陽復布則陽明不遷正不遷正則氣未通上
當刺手太陰之所流陽明復布太陽不遷正不遷正則復
塞其氣當刺足少陰之所流

司氣有餘不遷位刺法

帝曰遷正不前以通其要願聞不遷欲折其餘無令過失
可得明乎岐伯曰氣過有餘復作布政是名不遷位也使
地氣不得後化新司天未可遷正故復布化令如故也已
亥之歲天數有餘故厥陰不遷位也風行於上未化而天

當刺足厥陰之所入子午之歲天數有餘故少陰不退位也執行於上上餘化布天當刺手厥陰之所入丑未之歲天數有餘故太陰不退位也濕行於上雨化布天當刺足太陰之所入寅中之歲天數有餘故少陽不退位也執行於上上化布天當刺手少陽之所入卯酉之歲天數有餘故陽明不退位也當刺手太陰之所入辰戌之歲天數有餘故太陽不退位也寒行於上凜化布天當刺足少陰之所入故地氣逆化成民病以法刺之預可平病或謂諸歲運大流木火土金水七氣之氣非也蓋經曰運氣者謂歲時之氣也木火土金水七氣之氣非也蓋經曰運氣者謂歲時之氣也

司氣失守刺

帝曰剛柔二干失守其位使天運之氣皆虛乎與民為病可得乎岐伯曰深乎哉問明其奧旨天地迭移三年化疫是謂根之可見必有逃門假令甲子剛柔失守剛未正柔孤而有虧時序不令即音律非從如此三年變大疫也詳其微甚察其淺深欲至而可刺刺之當先補腎俞次三日可刺太陰之所注又有下位已卯不至而甲子孤立者次三年作上癘其法補寫一如甲子同法也假令丙寅剛柔失守上剛于失守下柔不可獨主之中水運非太過不可執法而定之布天有餘而失守上正天地不合即律已音異如此即天運失序後三年變疫詳其微甚差有大小徐至即後二年至其即音三年當先補心俞次五日可刺腎之所入又有下位地甲子辛巳柔不附剛亦名失守即

司氣失守刺

司氣失守刺

司氣失守刺

地運皆虛後三年變水癘即刺法皆如此矣其刺如畢慎其大喜欲情於中如不忌即其氣復散也令靜七日心欲實令少思假令庚辰剛柔失守上位失守下位無合乙庚金運故非相招布天未退中運勝來上下相錯謂之失守姑洗林鍾商音不應也如此即天運化易三年變大疫詳其天數差有微甚微即微三年至其即甚三年至當先補肝俞次三日可刺肺之所行刺畢可靜神七日慎勿大怒怒必真氣却散之或在地下地甲子乙未失守者即乙癸干即上庚獨治之亦名失守者即主之三年變癘名曰金癘其至待時也詳其地數之差等亦推其微甚可知運連兩諸位乙庚失守刺法同肝欲平即勿怒假令壬午剛柔失守上壬未遷正下丁獨然即雖陽年虧及不同上

司氣失守刺

司氣失守刺

司氣失守刺

下失守相招其有期差之微甚各有其數也律呂一角失而不同音有日微甚如見三年大疫當刺脾之俞次三日可刺肝之所出也刺畢靜神七日勿大醉歌樂其氣復散又勿飽食勿食食物欲令脾胃實氣無滯飽無久坐食無天酸無食一切生物宜甘宜淡又或地下甲子丁酉失守其位未得中司即氣不當位下不與壬奉合者亦名失守非名合德故柔不附剛即地運不合三年變癘其刺法一如木疫之法假令戊申剛柔失守戊癸雖火運陽年不太過也上失其剛柔地獨主其氣不正故有邪干迭移其位差有淺深欲至將合音律先同如此天運失時三年之中火疫至矣當刺肺之俞刺畢靜神七日勿大悲傷也悲傷即肺動而真氣復散也入欲實肺者要在息氣也又或地

下甲子癸亥失守者即柔失守位也即上失其剛也即於
名戊癸不相合德者也即運與地虛後三年變鷹即名火
瀉是故立地五年以明失守以濕法刺於是疫之與鷹節
是上下剛柔之名也窮歸一體也即刺疫法只有五法即
總其諸位失守故只歸五行而統之也

全真刺

帝曰人虛即神遊失守位使鬼神外干是致夭亡何以全
真願聞刺法岐伯曰昭乎哉問謂神移失守雖在其體然
不致死或有邪干故今天壽只如厥陰失守天以虛人氣
肝虛感天重虛即寇遊於上邪干厥陰大氣身溫猶可刺
之刺其足少陽之所過次刺肝之俞人病心虛又遇君相
二火司天失守感而三虛遇火不及黑尸鬼犯之令人暴

亡可刺手少陽之所過復刺心俞人脾病又遇太陰司天
失守感而三虛又遇土不及青尸鬼邪犯之於人令人暴
亡可刺足陽明之所過復刺脾之俞人肺病遇陽明司天
失守感而三虛又遇金不及有赤尸鬼干人令人暴亡可
刺手陽明之所過復刺肺俞人腎病又遇太陽司天失守
感而三虛又遇水運不及之年有黃尸鬼干人正氣吸
人神冤致暴亡可刺太陽之所過刺足少陰之俞

十二歲邪干刺

帝曰十二歲之相使神失位使神彩之不圓恐邪干犯治
之可刺願聞其要岐伯曰悉乎哉問至理道真宗此非聖
帝焉究斯源是謂氣神合道契符上天心者君主之官神
明出焉可刺手少陰之源肺者相傳之官治節出焉可刺

手太陰之原肝者將軍之官謀慮出焉可刺足厥陰之原
膽者中正之官決斷出焉可刺足少陽之原膽中者臣使
之官喜樂出焉可刺心包絡所流脾為諫議之官知周出
焉可刺胃之原胃為倉廩之官五味出焉可刺胃之原大
腸者傳送之官變化出焉可刺大腸之原小腸者受盛之
官化物出焉可刺小腸之原腎者作強之官伎巧出焉可
刺腎之原三焦者決瀆之官水道出焉刺三焦之原膀胱
者州都之官精液藏焉氣化則能出矣刺膀胱之原九竅
十二官者不得相失也是故刺法有全神養真之理亦法
有修真之道非治道也故要修養和神也

灸法

灸灸方宜

此方曰天地之所閉藏之域也其地高陵居風寒冰冽其
民樂對處而乳食藏寒生滿病其治宜灸灸炳故灸病者亦
從北方來

艾灸補馬

氣盛則瀉之虛則補之○以火補者母吹其火須自滅也
以火瀉者疾吹其火傳其灸須其火滅也○絡滿經虛灸
陰刺陽經滿絡虛刺陰灸陽○陷下則灸之○鍼既不為
灸之所宜陰陽皆虛火自當之○經陷下者火則當之○

灸寒熱

灸寒熱之法先灸大椎以年為壯數灸次灸掖骨以年為止
數視背俞陷者灸與背脊上陷者灸之為季脇之間灸之

外踝上絕骨之端灸之足小指次指間灸之端下陷脈灸之
之外踝後灸之缺盆骨上切之堅動如筋者灸之膺中陷
骨間灸之臍下關元三寸灸之毛際動脈灸之膝下三寸
分間灸之足陽明附上動脈灸之巔上一灸之

女子敗症

發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之

灸法

五藏發四口遲灸之

大交

犬齒大所噬處灸之三柱即以犬傷病發灸之當灸二十
九處

傷食 苦藥

傷食灸之。形樂志苦病生於內治之以灸刺

宜灸不宜刺

胸中大俞在肝骨之端肺俞在三焦之間心俞在五焦之
間膈俞在七焦之間肝俞在九焦之間脾俞在十一焦之
間腎俞在十四焦之間皆挾脊相去三寸所則欲得而驗
之按其處應其中而痛者乃其俞也灸之則可刺之則不
可刺也氣血形志論及諸篇所論諸病皆出於一特之言此
云何灸不可刺故論諸病皆謂素問非出於一特之言此
云何灸不可刺故論諸病皆謂素問非出於一特之言此
云何灸不可刺故論諸病皆謂素問非出於一特之言此
云何灸不可刺故論諸病皆謂素問非出於一特之言此
云何灸不可刺故論諸病皆謂素問非出於一特之言此

鍼灸節要二卷終

鍼灸節要卷之三

十二經病刺

四明高武

手太陰 是動則病肺脹滿逆膨而喘欬缺盆中痛其則
交兩手而蒼此為臂厥是主肺之所生病者欬上氣喘
煩渴心胸滿膈臂內前應筋腋掌中熱 氣盛有餘則
肩背痛風寒汗出中風小便數而欠○氣虛則有背痛
寒心氣不足以息溺色變者寸口大三倍於人迎虛
者寸口反小於人迎也

手陽明 是動則病齒痛頰腫是主津液○所生病者目
黃口乾執衄喉痺肩前膈痛大指次指痛不用○氣有
餘則當脈所過者熱腫○虛則寒慄不復○盛者人迎
大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足陽明 是動則病洒洒振寒善呻數欠類黑病至則惡
人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉而寒痛而厥
甚則欲上高而歌棄衣而走資響腹脹是為肝厥是主
血 所生病者狂瘧溫淫汗出衄衄口喎唇頰腫喉
痺大腹水腫膝膈腫痛循膈乳氣街股伏兔外廉足
附皆痛中指不用○氣盛則身已前皆熱其有餘於
胃則消穀善飢色黃氣不足則身已前皆寒寒者胃中寒
則脹滿○盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於
寸口也

足太陰 是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噦得
後與氣則快然如柔身體常重是主脾○所生病者舌
本痛體不能動搖食不下煩心下急痛澹澹泄水閉

黃疸不能則強之股膝內腫厥足大指不用盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手少陰 是動則病虛乾心痛渴而欲飲是為腎厥是主

心○所生病者目黃脇痛臍臂內後廉痛厥掌中熱痛

○盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手太陽 是動則病嗌痛頰腫不可以顧肩似拔膈似折

是主液○所生病者耳聾目黃頰腫頸項痛臍外

後廉痛○盛者人迎大三倍於寸口虛者寸口反小於

人迎也

足太陽 是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折

脘如結端如裂是為蹠厥是主筋○所生病者痔瘡狂

癩疾頭顛項痛目黃溺出衄衄項背腰尻腫脚皆痛

小指不用○盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小

於寸口也

足少陰 是動則病飢不欲食面如炭色欬唾則有血喝

喝而喘坐而欲起目眈眈如無所見心如懸若飢狀氣

不足則善恐心惕恍如人將捕之是為骨厥是主腎○

所生病者口乾舌乾咽腫上氣噤乾及痛煩心心痛黃

疸腸澼脊股內後廉痛癢厥嗜卧足下熱而痛○盛者

寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手厥陰 是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支

滿心中澹澹大動面赤目黃喜笑不休是主脉○所生

病者煩心心痛掌中熱○盛者寸口大一倍於人迎虛

者寸口反小於人迎也

手少陽 是病則病耳聾渾渾焯焯噉腫喉痺是主氣○

所生病者汗出目銳皆痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指

次指不用○盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小

於寸口也

足少陽 是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則

面微有塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨○所

生病者頭角頰痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬快

瘦汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸

節皆痛小指次指不用○盛者人迎大一倍於寸口虛

者人迎反小於寸口也

足厥陰 是動則病腰痛不可以俛仰丈夫遺疝婦人小

腹腫甚則噤乾面塵脫色是主肝○所生病者胸滿嘔

逆飧泄孤疝遺溺閉癰○盛者寸口大一倍於人迎虛

者寸口反小於人迎也

此十二經病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之

陷下則灸之不盛不虛以經取之

奇經八脉病

督脉 此生病從小腹上衝而痛不得前後為衝疝具女

子不孕瘰疬遺溺噤乾脊強反折督脉生病治督脉

任脉 為病男子內結七疝女子帶下瘕聚

陽蹻脉 為病陰緩而陽急氣併相還則為目濡不合

陰蹻脉 為病令人陽緩而陰急

衝脉 為病令人逆氣裏急

陽維脉 若不能維於陽則澹冷不能自收持

陰維脉 若不能維於 則則然失志
帶脉 為病腰腹絞空 如囊水之狀

十二經脉

帝曰經脉者所以決死生處百病不可不通○肺手太陰之脉起於中焦下絡大腸循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋腋下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端○八勝手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷○胃骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上循臑外上廉上肩出髃骨之前廉出於柱骨之會上入缺盆絡下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還入頰口交人中左之右右之左上挾

鼻乳○胃足陽明之脉起於鼻之交頰中旁納一木太陽之脉下循鼻外入上齒中還出頰口環唇下承漿却循頰

後下廉出大迎循頰車耳前過客主人循髮際至額顙其支者從大迎前下入迎循喉龍入缺盆下膈屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳內廉下挾臍入氣街中其支者起於胃下口循腹裏下至氣街中而合以下解開抵伏兔下膝膕中下循胫外廉下足跗入中指外間其支者下廉三寸而別下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端○脾足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上端內循胫骨後交出厥陰之前上循股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上高注心中○心手少陰之脉起於心中

心系下兩絡小腸其支者從心系上俠咽繫目系其直者復從心系却上肺下出掖下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內循臂內後廉出腕後兌骨之端入掌內後

端循手外側上腕出環中直上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交脊上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循臑上廉至目銳眦却入耳中共支者別頰上頰抵鼻至目內眦斜絡於頰○膀胱足太陽之脉起於目內眦上額交頰其支者從頰至耳上角其直者從頰入絡腦透出別下項循脊內挾脊抵腰中入循脊絡終於尻屬膀胱其支者從腰中下夾脊貫腎入中其支者從脊內左右別下貫腓挾脊內通解

經循頰後從頰下合頰中以下貫頰內出外踝之後循京骨至小指外側○腎足少陰之脉起於小指之下斜走是心出於然谷之下循內踝之後別入跟中以上廉內出臑內廉上股內後廉屬腎絡膀胱其直者從臑上貫肝膈入肺中循喉嚨夾舌本其支者從肺出絡心注胸中○心主手厥陰心包絡之脉起於胃中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支者循胸中出脇下腋三寸上抵腋循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端○三焦手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩筋之間上貫肘循臑外上膈而交出足少陽之後入缺盆循臑中脇絡心包下膈循三焦其支者從

腦中上出缺盆上項繫耳後直上... 顛其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眦○膽足少陽之脉起於目銳眦上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眦後其支者別銳眦下大迎合於手少陽抵於頰下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循膈裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循肱過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛○肝足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上脛內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫兩布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出頰與督脉會於巔其支者從目系下頰裏環唇內其支者從頰別貫膈上注肺

奇經八脉

督脉者起於小腹以下骨中大女子入繫走孔其孔兩孔之端也其絡循陰器合纂即繞纂後別繞腎至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屈腎與太陽起於目內眦上額交額上入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循脊絡腎其男子循莖下至莖與女子等其小腹直上者貫膈中央上貫心入喉○通環心係兩目之下中央○督脉起於下極之命門通脊系上至風府入腦上

通氣至鼻柱屬陽脉之海也

衝脉與任脉皆起於胞中循脊裏為經絡之海其浮於外者循腹上行會於咽喉別而絡唇口又衝脉起於氣衝並足少陰之經挾臍上行會於咽喉至胸而散陽蹻脉起於跟中循外踝上行入風池兩足蹻脉本太陽之別合於太陽男子數其陽女子數其陰皆數者為經不當數者為絡也

陰蹻脉起於跟中循內踝上行至喉龍宮受衝脉蹻脉少陰之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出入迎之竅入頰屬目內眦合於太陽男子以之為經女子以之為絡陰蹻之經也信

陽維脉維於陽起於諸陽一合交於維維皆維於身其脉之所發別於金門以陽交為維與手足太陽及蹻脉會於臍俞與手足少陽會於天髻之會於之井在頭也又與足少陽會於陽白上於本神及臨泣上至正營循於腦空下至風池其與督脉會則在風府及煙門

門與任脉會於天突廉泉

帶脉者起於季脇圍身一周其時氣所發季脇下一寸八分正名帶脉以其圍身一周如帶也又與足少陽會於維道

十五絡脉

手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散入於魚際其病實則手銳掌熱虛則欠故小便遺數取之去腕半寸別走陽明也○手少陰之別名曰通里去腕一寸半別而上行循經入於心中繫舌本屬目系實則支膈虛則不能言取之掌後一寸別走太陽也○手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋之間循經以上繫於心包絡心系實則心痛虛則頭強取之兩筋間也○手

太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則節弛肘發虛則生肱小者如指痲疥取之所別也○手陽明之絡名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂秉有筋上曲頰偏齒其別者入耳合於宗脉實則齟齬虛則齒寒痺隔取之所別也○手少陽之別名曰外關去腕二寸外透臂注胸中合心主病實則肘掌虛則不收取之所別也○足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走少陰實則靴室頭背痛虛則靴切取之所別也○足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿廢坐不能起取之所別也○足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上膝合諸經之氣下絡喉咽其病氣逆則喉痺瘖瘖實則狂瘋虛

別是不收脛枯取之所別也○足太陰之別名曰公孫去

之後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛虛則鼓脹取之所別也○足少陰之別名曰大鍾當踝後透跟別走太陽其別者并經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癱虛則腰痛取之所別也○足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者徑脛上擊結於莖其病氣逆則羸腫卒疝實則挺長虛則禁癢取之所別也○任脉之別名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛虛則癢擦取之所別也○督脉之別名曰長強於脊上項散頭上下當肩胛左右別走太陽入貫脊實則脊強虛則頭重高搖之夾脊之有過者取之所別也○脾之大絡名曰大包出淵液下三寸布於脇

實則痛虛則百節盡皆酸此脉若羅絡之血者皆取之不見於經也凡十五絡者實則必見虛則必下視之不見於經也凡十五絡者實則必見虛則必下視之不見於經也

足太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃實則節弛肘發虛則生肱小者如指痲疥取之所別也○手陽明之絡名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂秉有筋上曲頰偏齒其別者入耳合於宗脉實則齟齬虛則齒寒痺隔取之所別也○手少陽之別名曰外關去腕二寸外透臂注胸中合心主病實則肘掌虛則不收取之所別也○足太陽之別名曰飛揚去踝七寸別走少陰實則靴室頭背痛虛則靴切取之所別也○足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿廢坐不能起取之所別也○足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上膝合諸經之氣下絡喉咽其病氣逆則喉痺瘖瘖實則狂瘋虛

○足少陽之筋起於小指次指上結外踝上循脛外廉結
 于膝外廉其支者別起外輔骨上走髀前者結于伏兔之
 上後者結于尻其直者上乘少季脇上走腋前廉係於膺
 乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上
 額角交頰上下走頰上結於頰支者結於目皆為外維其
 病小指次指支轉筋引膝外轉筋膝不可屈伸膺筋急前
 引髀後引尻即上乘少季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急
 從左之右右目不開上過右角並躡脉而行左絡於右故
 傷左角右足不用命曰維筋相交治在燔鍼劫刺以知為
 數以痛為輸○足陽明之筋起於中三指結於跗上邪外
 上如於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上循脇屬脊
 其直上者循髀結于其支者結於外輔骨合少陽其直
 者上循伏兔上結于髀聚於陰器上腹而布至缺盆而結
 上頸上挾口合于頰下結于鼻上合于太陽太陽為目上
 綱陽明為目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指支
 脛轉筋脚跳堅伏菟轉筋髀前腫癢疝腹筋急引缺盆及
 頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目下開頰筋有寒則急
 引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏
 其急者以白酒和桂以塗其緩者以桑鈎鈎之即以生桑
 灰置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美酒噉炙
 肉不飲酒者自強也為之三拊而已治在燔鍼劫刺以知
 為數以痛為輸○足太陽之筋起於大指之端內側上結
 於內踝其直者絡於膝內輔骨上循陰股結於髀聚於陰
 器上腹結於臍循腹裏結於肋散於胸中其內者著于脊

其病足大指支內踝痛轉筋膝內輔骨痛陰股引髀
 痛陰器痛下引臍陽陰痛引膺中脊內痛治在燔鍼劫
 刺以知為數以痛為輸○足少陰之筋起於小指之下並
 足太陽之筋邪走內踝之下結于踵與太陽之筋合而上
 結于內輔之下並太陽之筋而上循陰股結於陰器循脊
 內挾脊上至項結于枕骨與足太陽之筋合其病足下轉
 筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主燔刺及痺在
 外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰
 病者不能仰治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸○足厥
 陰之筋起於大指之上結於內踝之前上循脛上結內輔
 之下上循陰股結於陰器絡諸筋其病足大指支內踝之
 前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷於
 外則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣其病
 轉筋者治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸○手太陽之
 筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內銳骨之
 後彈之應小指之上入結於腋下其支者後走腋後上廉
 繞肩甲循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者入耳
 中直者出耳上下結於頰上屬目外眥其病小指支肘內
 骨後廉痛循臂陰入腋下腋後廉痛繞肩胛引頸
 痛應耳中鳴痛引頰目眩良久乃得視頭筋急則為筋痿
 頸腫寒熱在頸上者治在燔鍼劫刺以知為數以痛為
 輸其為腫者復而銳之本支者上抽牙循耳前屬目外眥
 上頰結於角其病常所過者支轉筋治在燔鍼劫刺以知
 為數以痛為輸○手少陽之筋起於小指次指之端結於

此上循臂結於肘上繞膈外應上行走頸合手太陽其支
 者當曲頰入繫吉本其支者上曲牙循耳前屬目外皆上
 乘頰結于角其病當所過者即支轉筋舌捲治在燔鍼劫
 刺以知為數以痛為輸○手陽明之筋起於大指次指之
 端結於腕上循臂上結于肘外上膈結於臑其支者繞肩
 胛挾脊直者從有臑上頸其支者上頰結於頰直者上出
 手太陽之前上左角絡頭下右頰其病當所過者支痛及
 轉筋肩不舉頸不可左右視治在燔鍼劫刺以知為數以
 痛為輸○手太陽之筋起於大指之上循指上行結於魚
 後行寸口外側上循臂結肘中上膈內應入腋下出缺盆
 結右前臑上結缺盆下結胃裏散貫貫合貫下抵季脇其
 病當所過者支轉筋痛成息貫脇急吐血治在燔鍼劫刺
 以知為數以痛為輸○手少陰之筋起於中指與太陽之
 筋並行結於肘內應上臂陰結腋腋下不散前後挾脇其支
 者入腋散貫中結于臂其病當所過者支轉筋前入及胸
 息貫治在燔鍼劫刺以知為數以痛為輸○手少陰之筋
 起於小指之內側結於鏡骨上結肘內應上入腋交太陽
 挾乳裏結于胸中循臂下係於臑共病內急心承伏梁下
 為肘網其病當所過者支轉筋痛治在燔鍼劫刺以知
 為數以痛為輸其成伏梁膿血者死不治經筋之病寒
 則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰
 急則挽不伸燥刺者燥寒急也熱則筋緩不收無用燔鍼
 ○足之陽明手之太陽筋急則口日為噤皆急不能卒視
 治皆如石方也

空穴
 藏俞五十六穴府俞七十二穴熱俞五十九穴水俞五十七
 穴頭上五行行五五二十五穴中脘傍各五九十六上
 兩傍各一九二穴目腫子浮白二穴兩髀厭分中二穴
 鼻二穴耳中多所開二穴眉本二穴完骨二穴項中央一
 穴枕骨二穴上關二穴大迎二穴下關二穴天柱二穴巨
 虛上下廉四穴曲牙二穴天突一穴天府二穴天牖二穴
 扶突二穴天窓二穴肩解二穴闕元一穴委陽二穴肩貞
 二穴肱門二穴臑一穴胸俞十八穴背俞二穴膈俞十二
 穴分肉二穴踝上橫二穴陰陽踰四穴水俞在諸分熱俞
 在氣分寒俞在兩骸厭中二穴大禁二十五在天府下五
 寸九三百六十五穴鍼之所由行也○凡太陽脈氣所發
 者七十八穴兩眉頭各一八髮際至頂三寸半傍五相去
 三寸其浮氣在皮中者九五行行五五二十五項中大
 筋兩傍各一俠背以下至尻尾二十一節十五間各一五
 藏之俞各五六府之俞各六委中以下至足小指傍各六
 俞○足少陽脈氣所發者九六十二穴兩角上各二直目
 上髮際各五耳前角上各一耳前角下各一銳髮下各一
 客主人各一耳後陷中各一下關各一耳下牙車之後各
 一缺盆各一掖下三寸脇下至臑八寸各一解樞中各一
 臑以下至小指次指各六俞○足陽明脈氣所發九六十
 六穴額顙髮際傍各三面髀骨空各一大迎之骨空各一
 人迎各一缺盆外骨空各一膺中骨間各一俠鳩尾之外
 當乳下三十俠胃脘各五俠臍廣三寸各三下臍二十俠

各三氣衝動脈各一伏菟上各一三里以下至足中指
 各八俞分之所在穴空○手太陽之脈氣所發者三十六
 穴目內眥各一目外眥眥骨下各一耳郭上各一耳中各
 一巨骨穴各一曲腋二骨穴各一柱骨上陷者各一上天
 窓四寸各一肩解下三寸各一下至手小指本各六俞○
 陽明脈氣所發者二十二穴鼻空外廉項上各二大迎
 骨空各一柱骨之會各一髑骨之會各一肘以下至小指
 六指次指本各六俞○手少陽脈氣所發者三十二穴腕骨
 下各一肩後各一角上各一下完骨後各一項中足太陽
 之前各一挾扶突各一肩貞各一肩貞下三寸分間各一
 肘以下至手小指次指本各六俞○督脈氣所發者二十
 八穴項中央二髮際後中八面中三大椎以下至尻尾及
 傍十五穴至臍下凡二十一節脊推法也○任之脈氣所
 發者二十八穴喉中央二膺中膺陷中各一鳩尾下三寸
 胃腕五十胃腕以下至橫骨六寸半一腹脈法也下陰別
 一目下各一下唇一○衝脈氣所發者二十二穴鳩尾外
 各半寸至齊寸一齊下傍各五分至橫骨寸一腹脈法也
 ○足少陰舌下厥陰毛中急脈各一手少陰各一陰陽驕
 各一手足諸魚際脈氣所發者凡三百六十五穴也○水
 俞五十七穴尻上五行行五伏菟上兩行五左右各一行
 行五踝上各一行行六穴
 十二經井榮俞原經合
 帝曰九刺之道必通十二經絡之所終始脈之所別處五
 俞之所留六府之所與合四時之所出入五藏之所留處

關數之度淺深之狀高下所至願聞其詳岐伯曰請言其
 次也○肺出於少商少商者手大指端內側也為井木溜
 於魚際魚際者手魚也為榮注於太淵太淵魚後一寸陷
 中者也為俞行於經渠經渠寸口中也動而不居為經入
 於又澤又澤肘中之動脈也為合手太陰經也○心出於
 中衝中衝手中指之端也為井木溜於勞宮勞宮掌中
 指本節之間也為榮注於大陵大陵掌後兩骨之間方下
 者也為俞行於間使間使之道兩筋之間三寸之中也有
 過則至無過則止為經入於曲澤曲澤肘內廉下陷者之
 中也屈而得之為合手少陰也○肝出於大敦大敦者足
 大指之端及三毛之中也為井木溜於行間行間者足大
 指間也為榮注於太衝太衝行間上二寸陷者之中也為
 俞行於中封中封內踝之前一寸半陷者之中使逆則死
 使和則通搖足而得之為經入於曲泉曲泉輔骨之下太
 筋之上也屈膝而得之為合足厥陰也○脾出於隱白隱
 白者足大指之端內側也為井木溜於大都大都本節之
 後下陷者之中也為榮注於太白太白腕骨之端也為俞
 行於商丘商丘內踝之下陷者之中也為經入於陰之陵
 泉陰之陵泉輔骨之下陷者之中也伸而得之為合足太
 陰也○腎出於湧泉湧泉者足心也為井木溜於然谷然
 谷然骨之下者也為榮注於太谿太谿內踝之後跟骨之
 上陷中者也為俞行於復溜復溜上內踝二寸動而不休
 為經入於陰谷陰谷輔骨之後大筋之下小筋之上也按
 之應手屈膝而得之為合足少陰之經也○膀胱出於至

注主除者足小指之端也為井金溜於通谷通谷本節
 前外側也為榮注於束骨束骨本節之後陷者中為俞
 過於京骨京骨足外側大骨之下為原行於崑崙崑崙在
 外踝之後跟骨之上為經入於委中委中膕中央為合委
 而取之足太陽也○膽出於竅陰竅陰者足小指次指之
 端也為井金溜于俠谿俠谿足小指次指之間也為榮注
 於臨泣臨泣上行一寸也陷者中也為俞過於丘墟丘墟
 蹠之前下陷中也為原行于陽輔陽輔外蹠之上輔骨之
 前及絕骨之端也為經入於陽之陵泉陽之陵泉在膝外
 陷者中為合伸而得之足少陽也○胃出於厲兌厲兌者
 足大指內次指之端也為井金溜于內廷內廷次指外間
 也為榮注於陷谷陷谷者中指內間上行二寸陷者中
 也為俞過於衝陽衝陽足跗上五寸陷者中也為原搖足
 而得之行於解谿解谿上衝陽一寸半陷者中也為經入
 於下陵下陵膝下三寸胫骨外三里也為合復下三厘三
 寸為巨虛上廉復下上廉三寸為巨虛下廉也大腸屬上
 小腸屬下足陽明胃脈也大腸小腸皆屬於胃是足陽明
 也○三焦者上合手少陽出於關冲關衝者手小指次指
 之端也為井金溜於液門液門小指次指之間也為榮注
 於中渚中渚本節之後陷中者也為俞過於陽池陽池在
 腕上陷者之中也為原行於支溝支溝上腕三寸兩骨之
 間陷者中也為經入于天井天井在肘外大骨之上陷者
 中也為合屈肘乃得之○手太陽小腸者出於少澤少澤
 小指之端也為井溜於前谷前谷在手外廉本節前陷

中也為榮注於後谿後谿者在手外側本節之後也為俞
 過於腕骨腕骨在手外側腕骨之前為原行於陽谷陽谷
 在銳骨之下陷者中也為經入於小海在小海在肘大骨之外去
 肘十寸陷者中也伸臂而得之為合手太陽經也○大腸
 上合手陽明出於商陽商陽大指次指之端也為井金溜
 於本節之前二間為榮注於本節之後三間為俞過於合
 谷合谷在大指歧骨之間為原行於陽谿陽谿在兩筋間
 陷中者也為經入於曲池在肘外輔骨陷者中屈臂而得
 之為合手陽明也是謂五藏六府之俞五五二十五俞六
 六三十六俞也
 同身尺寸
 頭之大骨圍二尺六寸胸圍四尺五寸腰圍四尺二寸髮
 汗覆者頭至項尺二寸髮以下至頤長一尺結喉以下至
 缺盆中長四寸缺盆以下至髆髆長九寸過則肺大不滿
 則肺小肺以下至天樞長八寸過則胃大不及則胃小
 天樞以下至橫骨長六寸半過則脾腸廣長不滿則狹短
 橫骨長六寸半橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八
 寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉下至內
 踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸膝膕以下至跗屬
 長一尺六寸跗屬以下至地長三寸故骨圍大則太過小
 則不及角以下至柱骨長一尺行腋中不見者長四寸腋
 以下至季脇長一尺二寸季脇以下至髀樞長六寸髀樞
 以下至膝中長一尺九寸膝以下至踝長一尺六寸外踝
 以下至京骨長三寸京骨以下至地長一寸耳後骨完

者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸兩額之間相去七寸兩乳之間廣九寸半兩髀之間廣六寸半足長一尺二寸廣四寸半肩至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸半項髮以下至骨長二寸半脊骨以下至尾骶二十一節長三尺上節長一十四分分之一寸分在下故上七節至於脊骨九寸八分分之七此衆人骨之度也

經脈長短

手之六陽從手至頭長五尺五六三丈手之六陰從手至胸中三尺五寸三六一丈八尺五六三尺合二丈一尺○足之六陽從足上至頭八尺六八四丈八尺足之六陰從足至胸中六尺五寸六六三丈六尺五六三尺合三丈一尺○躡脈從足至目七尺五寸二七一丈四尺二五一尺合一丈五尺○督脈任脈四尺五寸二四八尺二五一尺合九尺凡都合十六丈二尺此氣之大經隧也

鍼灸節要三卷終

鍼灸節要三卷

兩淮監政採進本

明高武撰是書以難經素問為主難經首取行鍼補瀉次取井榮俞經合次及經脈素問首九鍼次補瀉次諸法次病刺次經脈空穴俱顛倒後先於經文多所割裂

簡明醫殼八卷

〔明〕孫志宏撰

中國中醫研究院圖書館藏明崇禎三年刻本

附《四庫全書總目·簡明醫殼

八卷》提要

簡明醫殼叙

古人有言曰學書紙費學醫人費

蓋戒徇臆尤警泥方競志慎重

也今世刻方書充棟而是豈皆秦

越人著誤哉必洞情晰理廣究細

核斯勒一家稱醫學宗爾古不論

昭代原禮樹幟於建業立齋標譽於

吳中節菴振響於杭浙皆獨斷鮮

徇臆之失師古絕拘方之弊故著

述光焉越數十載復得戎台石孫

翁生節菴鄉入戴薛室精心博

覽於此道既家鉢而矚垣慧照時

有創裁且薦事丈六金身不忍欺
世誤人是以時、窮討念、虔肅
談一證能晰本證之發源製一藥
能盡本藥之至理三十年来輯其
先人聞見徵信之遺續以增芟疏
論計八卷俾客旅仕商一見瞭然
得方書之要領識其宗旨別類分
門確可據信以療治予友沈刺史
題曰簡明醫彀二三好德之士梓
以壽世問叙於予、於醫不異聲
瞽然讀其書義先暘而繫之以方
使人了、於心乃入之口不苦人

以窮鄉難得之藥不眩人以鈎深
難解之辭其意若專為貧愚倉皇
時設實則大富貴聰明極閒暇時
亦復用之不盡咀味之不窮斯其
願力也宏功德也大矣卷中大旨
已臚列刺史公序中予第三復簡
明二字名實兩無慙焉古稱仁人
孝子疇其兼之其惟斯集欵台石
有善男子女人者八子庠生仲文
氏暨五齡季處子往生事最奇今
台石著書修道鴻光一室斷塵世
嗜好老益堅貧益樂應是龐道玄

載來若八卷中諄、告語惟恐病者不自了、為克棟者誤則亦煩惱佛之苦心不可以弗表也遂不辭而為之序

賜進士出身資善大夫刑部尚書大

理寺卿侍

簡明醫教序

四

經筵官都察院右副都御史通家眷

侍生吳中偉頓首拜題



題辭

浩然公曰鑿者之中病狂射者之中的射匪入殼雖弄蒙罔與呈如林之巧皆匪入殼雖軒岐莫能奏霍然之功斯殼之說所怪來已永不諳室居恒每嗜

簡明醫教序

一

閱方書桂漏其句者似簡矣而義不暢令人探討而為之煩悞明於今有臺架其詞者似剛矣而文或贅令人記澁而莫之窮詰奈乃之管兩者皆識書片仔半充棟有大運意不也皆術焉

全徽者其惟台石孫氏之茲集
乎瀚余時曩雅尚角林有石
留台石其人第未辨識寔維壬
戌延年投紱北上之次年台石
以病家不遠省躬多請福之我
平原亦如日与德、及偏台則

簡明醫叢序

經史子集間亦有可發明至於
語釋典外於楞嚴法華等法
經偈懺悔、口陳、如倒囊而出
物亦不覺亟至影映曰滿語孫
君者寧翅良堅固密而儒也
心學而佛者以迨依館國中凡

其屬紳袴佩多惟者日益衆
譽望弥隆其治病也小試則小效
大試則大效若挹水於河而取生
於燄中麻弗種者詩曰殺彼小
豕殪此大兕蓋言射之才如此而
台石留之中病而大率類是居

簡明醫叢序

三

鹽六七年所、生活者三三身步
千百人巷中畏壘康康之祝
正殷魚一日翻於動歸里編告人
曰某將偕離神佛此來生西土蓮
花什矣急流勇退多去多方謝
心而不得去構亭園湧聖城下余

常為類生齋曰全真小憩云云
越二載後來則手持一編既余曰
此第一生殫竭精神求醫竟
等字取竊付窺豹一斑編粉而
成帙者也今將付刻剛氏碩先
生并以嘉名崇傳不朽余謹謝

簡明醫教序

四

不敏不獲已受而卒業第一卷
言醫要十六則之類第二卷之
六淫愛生諸證直學詞乎其
亦江標固本之功解儀如列眉
第三卷言七情九氣為病第四
卷言上事亟虧損沉痾極片說

了其於榮衛腠理之真注究
如指掌自五卷以迄八卷則之
脈面耳目口鼻衆患并舉述
嬰科女科外科諸書皆要言
不繁耳然於古今濟世傳本
鉤刻扶輿燭照數計而

簡明醫教序

五

龜卜譬之汰沈沙而拾拱鐸分
示和凝時掄駘駕而拔蹇駒則
孫陽務斯巨細際括經始包
羅且工大是苦心此書入彀之
書最明之最省者未因傷題曰
簡明醫教台石唯、鼓掌大快

揆厥所繇只石洞明祥樾大莊
數子卷挽之亦離阿耨多羅三
藐三菩提心倘止眩闔世尊之
蕩蕩欣台石重通儒色毛信三
百而教之一言曲禮三子而別以
世不教倘六精嗣尼父之闡闕歛

簡明醫教序

六

余謂在不以儒佛及官於前為
信是集一梓余意不但崇醫其
家傳戶誦中却人士屬意之兩
之藏送中而然不可少為人
實之世之珍之具也
御醫局收購之共奉為著

蔡異日者或傳滿久而先真鬼
神忌之耳埋沒在大川尚存先
心必起而歸天也豈與友方書
桂漏生向意繁生詞贊之馬汗
牛先棟者向余哉抑之說焉台
石大父孝植公學君桂麓公世以

簡明醫教序

七

儒醫起家水陸木本脈有所
自况統膝有丈夫子三列家威
以此道行一惜孝弟台與有聲
尚院而不克終亦轉二難於別
在石醫教之刻謂之送種可
也謂之濟美亦可也謂之承前可

也謂之極後亦可也又况跨蓋仲
買登補情士中子負食序序更已
淋援者然性弱佛及考終子並多
柔狀識者以為得道而化若夫台
石孝友懿行藉之贈炙人口曾刻
苑淨土三經大乘廣寶證佛法

簡明醫教序

人

旌孝若干卷以世勸又自度人
之淨業九章哉者歟 告
就元崇祿紀元之二己巳嘉平
月哉生明海上浩然公沈以遇
少於浩於梅中



孫台后簡明醫教序

天下不患無對病之藥而患無識病之醫有識
病之醫以用藥則藥之溫涼補瀉與病之寒熱
虛實一一脗合固弗効如善射者引滿而發發
必中的今孫君台后蓋識病之醫也著書八卷
不曰簡明藥方而曰簡明醫教其自負良不薄
矣夫醫籍莫詳於本草讀者每苦其浩博而難
窮妄謂不簡莫精于素問讀者每苦其奧突而

簡明醫教

序

種一

難解長謂不明今孫君茲編而能簡能明即命
曰本草之鉤玄素問之註脚可也諸君子捐貲
助梓共成勝事宜矣予所以樂為之序而不辭
也有容從旁訊予曰昔者蒼頡作書容成造律
胡曹為衣儀狄作酒奚仲為車此五人者皆有
神明之道聖智之迹故人作一事而遺後世非
能一人而兼有之今孫君嫻于禪乘嘗著佛法
指掌一編流播寓內乃今復有茲刻得無多岐

矣乎予曰不然金僊氏以慈悲度世為教雖鏗
蟻鐵鑿皆所不棄矧人之疾病夭死而忍不為
之所乎茲編行而家喻戶習庶知微瘳事無疾
者可以長寧因病施方抱病者可以立愈躋斯
民于壽考轉穉子為耄釵予政喜孫君之能現
暨王身而說佛法也子顧訝其多岐無乃有蓮
之心也乎容於是竦然起而謝不敏起予為孫
君序之孫君名志宏字克容台石其別稱家世

簡明醫教

序

鍾

錢塘人厥考桂巖公以鑿術著嘉隆間君仍其
業而闡繹之嘗採藥三山遇異人得龍宮秘訣
所至輒活人僑寓我鹽良久鹽人倚為司命低
細留之不能舍且與吾友松日玄海兩沈君仲
修則梁兩陳君相善予是以識荆云

崇禎庚午歲長至日桐廬老人鍾祖保撰



簡明醫教自序

蓋聞吾儒民物胞與痾瘵乃身醫雖藝乎依仁者所必
游以弘聖賢之德業徹性命之淵微然而醫之人與醫
之書鈞重而弗可偏廢世專托命於人不窺其書其失
非渺夫古精醫者謂身所暨有盡書所訖無窮故各以
其所得筆諸書政欲令天下萬世人人得而讀焉以偕
脫凶疾之極而綏壽康之福豈徒為業醫者訓乎哉第
書緒紛運猝難領會間有纂本輒多挂漏或門類未備
或真方而不疏病源不析致病異同或未經信驗或方

簡明醫教序

一

論未盡協古皆於濟世不能無憾先君桂巖翁嘗擬精
輯一書行世非徒欲醫者歸博於約兼慮遊宦行商及
僻居貧窶倉卒感疾延醫不給顛連罔措者俾得做書
修採坐收良醫之功厥志慙慙而未竟不佞宏幼業制
舉長乃顯醫迄今五十餘載恒以所佩庭訓及所驗心
得視人疾慄慄勿敢憑臆勿敢徇俗壹摹古人成法遂
與念續緒并闢夙願蒐網古今羣書反復演互幾換星
霜始成斯集卷首先弁一十六篇迺修德砥行尊生慎
疾之要及醫藥得失喫緊之綱其次門類臚方必溯致

病所繇與其同異確有徵信程古而不私翔博采而不隅執務宣先人救世之懷衷彌彰于人心目間即詰問之久而於載籍外別有證悟可補往哲未發者亦必公諸世毋敢私秘其書備而不冗約而不漏義類淺顯人人可解若射必有彀故命曰簡明醫彀云人人宜手一冊晨夕覽繹以為未然之防偶或遘疾有醫則可據以參同無醫亦可恃以弭患既免受誤於衰見復能默契於名手捷取守約之益浸為淹博之階可以自利可以利人寧直天涯遊旅之寶函寔亦家居衛生之靈銓也

簡明醫彀序

二

可謾曰吾疾自有醫之人在而書可閣弗窺耶則古所稱為人子者不可不知其謂之何夫開卷有益非醫者尚爾而醫者益可知矣嗟乎弗自欺乃能孚世惟自慎乃能益人幼誦孔子已知斯人矣迨皈竺教逾覺同體親切我人苦樂癢痲胡忍不問即於此道未敢自謂入微其或不慎以欺世寔未有也神而明之存乎其人踵事增華俟後之君子

崇禎己巳陽生日武林孫志宏序

新刊簡明醫彀凡例

一是編諸論首內經要旨次先哲格言次感受根源次本證形狀次治療方法次脉理大體悉從簡徑明白藥名字眼依俗欲令覽者易了也

一是編取便宦遊旅客鄉居僻處及暮夜叵測迎醫不給者簡捷去病故於微言奧義惟採切要

一是編於各門各病備載感受之由加以警戒之語尊生君子預知調攝可避疾延壽

一諸證上方後附成方皆前哲造理精妙兼以祖傳家秘參酌用之無不奏功至如末附簡方亦皆選驗無誤更便無藥者

凡例

一

一傷寒法祖仲景方兼節菴及胎產痘疹外科比諸證關繫尤重故特加詳備

一諸病惟嘔證不能納藥服時欲嘔預備姜湯兼送更以炒鹽二包輪熨喉下至胸多炒熨即安

一藥品必取真實新鮮方產最佳者依法製度迺得獲痊倘低偽黠蛙或合費用賤及製配鹵莽或遇畧知醫者妄亂加減皆無効非方之咎

一治病分寒熱虛實不可濶須細玩方論如有疑惑先配小劑少服相安漸加進之病愈即止勿多服若攻利藥尤不宜過

一是書成後惟願高明重加訂梓用廣拯濟幸甚

功梓縉紳孝廉太學文學諸公姓氏

悉依卷內為次

卷之一

生白吳 諱中偉 蔡愚朱 諱學忠 景雲賀 諱萬春

松日沈 諱弘選 方壺鍾 諱祖保 仲修陳 諱日懋

宗之馮 諱振宗 鳴球沈 諱延鍵 菁莪沈 諱胤芳

則梁陳 諱梁 遠之徐 諱元呈 太常沈 諱延紹

卷之二

允章徐 諱弘文 景萬祖 諱錫祚 漢城湯 諱慶

天與陸 諱廷諱 稗翰朱 諱學章 鹿岩朱 諱奇珍

苞六朱 諱乾禎 仲默賀 諱萬言 去非陳 諱于王

題名

靈茂陳 諱許廷 勅五陳 諱天叙 閻之陸 諱又宣

宗勺沈 諱德源 斯皇朱 諱帝

卷之三

滋泉鄭 諱忠材 南城鄭 諱恕材 思孟鄭 諱端胤

上申朱 諱維封 孟門朱 諱延坊 天虞朱 諱懋輝

皇敷朱 諱敷錫 衡甫朱 諱秉銓 朱 諱行壽

泰垣滿 諱宗宸 基甫沈 諱延錫 游餘蔣 諱光祚

葦航釋 諱明濟

禹懷洪 諱應試 去羞宋 諱恒 楫五洪 諱瑞錫

用可毛 諱漸儀 舜含毛 諱漸苞 錫文宋 諱孟鏞

卷之四

瑞南崔 諱應鶴 紹南崔 諱應鴻 九玄崔 諱理

炎伯朱 諱明復 以修崔 諱來庭 集思崔 諱增

季青崔 諱筠

孟含蔣 諱初英

陽勇羅 諱文宗

蘭亭劉 諱恒龍 蘭崖陳 諱自新 瑞徵劉 諱國顯

卷之五

卷之六

卷之七

卷之八

月槎文 諱如金

瑞生陸 諱錫肝

仲簡崔 諱文輝

瑞生陸 諱錫肝

瑞生陸 諱錫肝

卷之一

要言一十六則

却病延齡 福壽真樂 奉養高年 撫育幼冲戒溺女歌

業醫須知 臨病須知 制方定規 病分寒熱

傷寒不藥 脾胃為主 大黃芒硝 人參附子

三法神功 氣不歸元 毋恣茶酒 足氣愈痛

總論製度諸藥法 煎藥大法 服藥大法

中風附四肢不舉 酒厥 諸類中風 預防中風 傷風 中寒

傷寒 正名 論初感附小愈 論兩感 六經形證治例

目錄

陰陽似證 陰陽毒 腎傷寒 汗吐下等不可法

變證三十有六已見六種 皆不重贅 辯證大要 察脉大要

用藥大法 諸方法通計一百有奇

暑證附中暑 暑風 注夏 濕證附身重 燥證

火證

卷之二

厲風附紫白 破傷風 歷節風附鶴 惡寒

惡熱 溫疫附大頭瘟 喉痧 痢冷

泄瀉 痢疾 瘧疾 霍亂

疽證附黃腫 脚氣附足跟 秘結 積熱

卷之三

諸氣 鬱證 梅核氣 關格

噎膈 翻胃 痞滿 腹脹

蠱證 水腫附陰腫 積聚 血證吐衄咳咯唾 便溺血等

傷食 內傷附倦怠 嘔吐附惡心 吞酸吐酸附吐清

嘈雜 噯氣 咳逆 眩運

痿證 痺證附麻木 厥證 瘧證俗作瘧

疝證 痔證附脫肛 體氣附腋漏 瘴氣

蠱毒 解諸毒附藥毒 飲食毒 獸蟲傷毒

諸蟲

目錄

卷之四

虛損附脫陽 勞瘵 附傳屍 音聲 虛煩

驚悸附怔忡 恍惚 健忘 恐怒喜

自汗附頭汗 汗斑 心汗 盜汗附陰汗 脚汗

痰飲 咳嗽附哮喘 喘急附短氣 肺痿

顛狂 癩證 邪祟 夢遺精滑

濁證附交腸 便癃附大小便閉 遺溺附不禁

淋證 不寐 三消 皮膚附搔癢

癢疹附癩丹 傷損附金瘡 杖傷 竹木刺 湯火

骨物鯁 五絕

卷之五 利

頭痛 附頭風 肩痠痛 項強 身體痛

肩臂痛 心痛 附胸中痛 脾痛

胃脘痛 腹痛 附絞腸痧 脇痛

腰痛 眼科 鼻證 鼻淵 鼻痔 耳證

口證 唇證 舌證 齒證

面證 咽喉 鬚髮 癭瘤

結核

卷之六

幼科總論 附初生十則 扶口 回氣

目錄

洗浴 着衣 斷臍 服餌

透肛 哺乳 藏胞 看顛

變蒸 胎熱 胎寒 胎肥

胎怯 胎驚 胎黃 胎風

撮口 口噤 鎖肛 臍突

眼閉 論形色 面相圖 八段錦 侯額法 三關紋 手拍訣 診脈法

養子十法 五臟虛實 雜病歌 調護歌

寒熱藥忌 驚風總論 急驚 慢驚

夜啼 容忤 天釣 內釣

癩證 傷寒 中暑 濕證

諸熱 牙疳 脾胃 疳疾

嘔吐 泄瀉 霍亂 痢疾

腹痛 腫脹 蛔蟲 咳嗽

瘧疾 黃疸 陰腫疝氣 盤腸氣

諸汗 遺尿 脫肛痔證 五軟五硬

白虎證 龜胸龜背 語遲 齒遲

行遲 鶴膝 赤遊丹毒 癰毒腫癤

懸癰 停耳 白禿瘡 諸瘡

痘疹總要 論痘 即天瘡 百歲瘡 痘疹無醫 順逆險六候

發熱三朝證治 報痘三朝證治 起脹三朝證治

貫膿三朝證治 結靨三朝證治 落痂三朝證治

表裏虛實寒熱 氣血虛實寒熱

血熱痘證 氣虛痘證 實熱痘證

咽啞水瘡 癢塌灰白 寒戰咬牙 乾枯倒陷

口渴內潰 煩躁啼叫 咳嗽痰涎 痘內夾斑

水泡失血 不食能食 餘毒癰腫 痘疔賊痘

紙撚照法 調護得宜 乳母服藥 諸證治方

論疹 即痧子 種麻 出痘 發疹

發熱五朝證治 見疹三朝證治 疹後餘毒證治

補遺方

目錄

貫膿三朝證治 結靨三朝證治 落痂三朝證治

表裏虛實寒熱 氣血虛實寒熱

血熱痘證 氣虛痘證 實熱痘證

咽啞水瘡 癢塌灰白 寒戰咬牙 乾枯倒陷

口渴內潰 煩躁啼叫 咳嗽痰涎 痘內夾斑

水泡失血 不食能食 餘毒癰腫 痘疔賊痘

紙撚照法 調護得宜 乳母服藥 諸證治方

論疹 即痧子 種麻 出痘 發疹

發熱五朝證治 見疹三朝證治 疹後餘毒證治

補遺方

卷之七 貞

婦科總論 調經 附經閉 廣嗣 男服五方 女服十方 交感

妊娠 附驗胎 驗男女 薄男 厚女 惡阻 胎前 論胎元 論自產 論收遲 胎後 胎前十要 胎後十要 胎水不下 血運 神昏 狂言

產後 不語 不臥 產後眾疾 惡露 下血

崩中 帶下 赤白 淋瀝 畏寒

瘕瘕 癥瘕 小腹痛 心腹痛

轉脬便閉 遺尿失禁 陰挺 附陰冷 陰腫 瘰癧 乳癰 附乳癰 吹乳 乳閉不通 出血 陰瘡

附方 種子方

目錄 卷之八

外科總論 論陰陽 論虛實 論感受

論治法 五善七惡 內消 托裏

膿腫 定痛 惡肉 生肌

禁忌 食肉 作渴 附預防毒患

灸法 隔蒜灸 豆豉餅灸 明灸 桑枝灸法

騎竹馬灸法 卷末有圖 神燈照疽法

灸漏 鍼法 火烙鍼法 吸法

葱熨法 漏瀆法 圍法 砭法

刺法 蟻針法 附蟻蟻吮毒血勿 諸方法

目錄

疥瘡 癩瘡 癰疽 流注

胃癰 肺癰 臂癰 腹癰

腎癰 腸癰 懸癰 囊癰

腦疽 鬚疽 胸疽 腰疽 附骨疽 俗名貼骨癰 耳發 面癩 附非癰

穿腮 頸癰 喉癰 對口

夾疽 脇疽 喉癰 對口

手疽 手發背 丫刺 指疽

天蛇頭 穿掌疽 腕癰 代指

足瘍 脫疽 脚氣瘡 甲疽

代指 足發背 足跟疽 婦人足跟腫

手足裂 冬月脚裂

通論諸毒 惡瘡 附人面瘡 翻花瘡 丹毒

楊梅瘡 下疳 便毒 腎臟風

廉瘡 天泡瘡 疥瘡 癬瘡

漆瘡 竹馬灸圖

目錄竟

六

要言一十六則

○却病延齡 却病之法惟治未病為上。人能清心寡慾。慎起居節飲食。則病自不萌。而齡可延矣。凡人百病無出三因。一曰外因。風寒暑溼燥火天之六淫是也。一曰內因。喜怒憂思悲恐驚人之七情是也。一曰不內外因。起居失宜。飲食失節。房勞過度。跌損金刃。五屍鬼疰。邪祟。蠱毒。山嵐瘴氣。不伏水土等證是也。舉外因六氣言。風者。天地鬱勃之氣。經曰。風為百病之長。善行數變。其變莫測。輕則傷風咳嗽。重則中風。風非諸證。故云避風如避箭。寒者。天地嚴凝之氣。經曰。冬傷於寒。春必病溫。三時猶輕。冬感為重。即病者。名傷寒。伏於肌骨。春月隨發生之氣為

簡明醫教

卷之一

病謂之春溫。次曰晚發。及熱病也。暑者。天地酷烈之氣。經曰。夏傷於暑。秋必瘧。瘧。夏月天之陽氣。盡浮於地。人之陽氣。盡浮於表。故多煩渴。嗜水。瓜果不知。陽外陰內。生冷停積。溼熱相蒸。而為痢。瘵。理汗泄。風寒襲之。邪正相搏。陰陽相併。而為瘧。冒暑奔馳。病名中熱。水閣陰軒。過于寒涼。病名傷暑。若卧于磚石。泥地。漆櫪之類。感受風寒溼氣。秋深收飲。膜理閉密。邪伏難出。歷節走注。作疼。而成痛風等證。溼者。天地陰潤之氣。為害匪細。東南地卑薄。衣履坐卧。溼從外入。西北地高燥。嗜乳酪。麵。溼自內生。燥者。陽明燥金之氣。經曰。諸澀枯涸。乾勁。數揭。皆屬於燥。蓋因風熱耗其血液。而戍在表。則為皮膚裂屑。手足乾勁。甚而

縮爪枯等證。在裏則為大便秘結。消渴引飲等證。火者。君相五志之火。經曰。諸熱躁擾。狂罵氣逆。衝上。噎嘔。瘡瘍。痛癢。耳目諸證等。皆屬於火。腎經孤水。奚能勝之。且火日增。而水日損。東垣云。火為元氣之賊。此勝則彼負。若上下往來。熬真陰。涸津液。引為陰虛等證矣。舉內因七情言。經曰。喜傷心。蓋喜極則心火熾。盛輕為口舌破爛。瘡瘍斑疹。重為顛狂等證。經曰。怒則氣上。又曰。大怒則火起於肝。甚則嘔血。蓋怒則陽氣逆上。而肝木乘脾。故為嘔血。發泄。胸脇痞痛。不食等證。經曰。憂則心氣乘之。又曰。憂愁不解。則傷意。夫憂氣鬱而生痰。痰與氣搏。升而不降。多成噎膈等證。經曰。思則氣結。蓋指其專篤沉滯者言。如難思。釋怨

簡明醫教

卷之一

思報苦吟。竭志男女懷思之類。遂成怔忡諸證矣。氣結為病。為昏昏。為中滿。否塞。為咽嗝。不利。不嗜飲食等證。經曰。悲則氣消。蓋悲則心竅蘊結。肺布葉舉。而上焦不通。榮衛不行。熱氣在中。故氣消。又曰。悲氣所至。為陰縮筋攣。肌痺。脈痿。男為便數。洩血。女為血崩。孕婦胎漏。目昏等證。經曰。恐則氣下。陰氣無能上行。則志氣恐懼。日久則為失志之證。經曰。驚則氣亂。神無所歸。棲靈之舍。虛而為痰涎。所聚。有成顛癇諸證矣。舉不內外因數事。言起居者。人身運動。全賴精血。經有七損八益。五勞七傷。六極之戒。飲食者。經曰。飲食自倍。腸胃乃傷。生冷滯膩。炙博辛熱。慎勿太過。又曰。諸肉補陽。諸穀補陰。陽盛則火熾。痰壅津液。燔燥

陰盛則火熄水盈精血生長房慾者人身所寶精氣神至人秘固以煉金丹大則成僊小則却病多慾者如飛蛾赴火迷不自知但能擇節即期願之基跌撲金刃數種多由不慎所值不立於巖壑可也可知預為謹持精神內守外邪豈得侵哉善治未病者巧出良醫之外功居美樂之先其于康寧永壽乎何有

○福壽真樂 箕疇五福一曰壽以有壽乃能享諸福也然其四曰攸好德及六極之五曰惡六曰弱可見德為福壽之本若其剛惡而不肯好德柔弱而怠於修德則禍極隨之而絕福壽根源矣至衛生一節尤為修德中事也觀子之所慎疾及君子三戒等可見矣黃帝問岐伯曰余聞上古之人春秋皆度百

簡明醫教

卷之一

三

歲而動作不衰今人年半百而動作皆衰者時勢異耶人將失之耶岐伯對曰上古之人知道者法於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而終其天年度百歲乃去今時之人不然以酒為漿以妄為常醉以入房以慾竭其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆於生業起居無節故半百而衰也觀此則壽命修短全係精氣神之盈虧精血一敗神氣無所依附欲長壽而享諸福難矣其害以淫慾為最少壯宜節老年宜絕男女皆同蓋男二八精通八八精絕女二七天癸至七七天癸止交合施泄不可太早男三八女三七為佳古人少年遲婚中年後早絕慾多得壽今人早婚縱慾水

枯火亢精神垂盡僊丹莫療悔之晚矣達者當知精髓有限生之甚難耗之甚易如油滿燈明油盡燈滅若縱慾喪精假力藥餌棄真取偽棄內取外不亦愚乎請以貪儉二字醒之貪不之各得而不貪長久之福壽儉易得之財物而不儉難得之精神頹倒極矣其次嗔怒憂愁皆能傷氣血燥元和致不測之疾噫人誠能制情忍性以惜福養壽雖南面王樂不與易詩所謂求多福書所謂自作元命也將時時享勿藥之喜焉即偶違和而精氣神原因可一劑立瘳矣

○奉養高年 養親不可不知醫高年尤為切要然醫特其輔耳其本在得親惟心親心多拂多違疾所由生常使親心喜悅非止盡孝亦以善治親之末病也其次當調適其飲食雖或貧乏亦必約已豐親勞力致養常盡心于目前勿姑俟于日後務令精潔不在肥腴生冷膩滯煎炒硬硬及烹飪失宜等皆忌又次當檢其起居行住坐臥皆令安樂棲息處宜高燥靜密無風冬暖夏涼衣服常須浣焙器皿常須拭潔玩物適情之類無弗

簡明醫教

卷之一

四

迎令寒暑風雨靈霧黑早黃昏陰途遠道皆勿令行一切瑣屑可惱事皆勿令聞如有意外災咎必先自己鎮靜安慰親心勿令驚怖有疾則擇延明醫勿泥卜筮受誤庸手湯藥必躬為問治如法勿托他人老年嗜欲或有過當處須婉節之勿縱其情長其過恒以玄門衛生法告之若夫禪宗出世之旨則尤宜朝

外勤勉德懋成就急乘易盡殘年了微無上大事又豈區區
養賢樂之比乎雖然為人父母亦當自愛曲體子心至老年尤
宜知止知足憾悔前過勤行善事為齋歸計噫人生結果事時
刻當警得勉之哉

○撫育幼齡附戒溺女歌經曰滋苗者必固其根伐下者必枯其上

嬰兒一生之強弱安危其根全繫于父母可不慎歟懷妊十月
能尊胎教則子多賢多壽痘輕疾少若父母縱慾不謹加以厚
味煎炒姜椒諸熱毒物或服種子助陽熱藥致生子有驚
風及惡痘胎毒諸證初生時如拭口斷脰洗浴等事悉宜如法
乳母飲食起居極宜嚴慎如嗜厚味熱毒兒患積熱食生冷及

簡明醫教 卷之一 要言 五

感風寒兒飲冷乳吐瀉腹痛毋恚怒致兒驚恐久停乳先略持
去前乳次與兒以房多慾乳之氣味皆變有孕乳子令兒黃瘦
小兒變蒸發熱乃是長筋骨堅臟腑生智慧常以數日而安但
宜調護不必服藥小兒驚疾或因採兒胸搖兒身誘兒笑語久
戲不止使兒力疲頭眩氣喘腸痛或繼以哭多睡中驚甚至擲
兒上下兒雖強笑實惶怖不堪駭其神志傷其腑臟有以無知
幼兒打撲尤可痛恨當為大戒小兒乳食宜少不宜多衣服忌
太煖初冬未甚寒只薄牽舊絮若早重裹新綿致火鏢肺金生
風成痰致肺風痰喘驚搐等證啼哭未止及初止皆未可與乳
食未及暮不可如晝雖暮後不宜縱食大腥及生冷煎炒油膩

甘甜閉氣硬物經曰多食肥令人內熱多食甘令人腹滿肚大是也
脾氣弱者停積為吐瀉瘧痢疳蟲等證又忌嚼食嬰兒易生疳
積及蟲又小兒夜卧被下須着單衣勿過熱卧宜露首近枕
勿以被覆頭面又小兒常令見日色受和風間坐履地上皆能
使堅筋骨實肌理若時刻不離裏抱悶閉密室反有損又兒額

上常須以手撫拭脫衣則以手拭胸背欽毛孔防風又乳母抱
母僮婢等皆須慎擇其人朴實謹厚者又小兒不特護其形體
尤宜保其心性勿恣其慾縱其怒常教以仁厚端方勿導以機
詐巧言等常教以好生施濟勿導以慘殺驕吝等勿以蟲鳥等
籠縛為娛勿使聞淫歌鄙語三四歲便須謹防其習風勿姑息

簡明醫教 卷之一 要言 六

其幼以俟後日七八歲小學時常以先輩名公善言善事及三
教明顯要言時時語之使記憶稍長謹防其友伴損益能移換
性情離惡真朴是為首戒然後讀書習禮法處處印證前聞俱
于身心寔有受用古云教婦初來教子嬰孩一生人品善惡高
下全係幼時又豈特保護醫藥已乎

○附戒溺女歌 東越藥園道人撰 乾坤六子女並重無偏
倚人生子女同骨肉均一體皆是天所命胡為獨不舉我聞人
溺水慘狀不可脫力掙不能免石人亦汗泚盍念斯痛苦而忍
加吾女痛苦親不顧女子默自茹莫謂女無知但口不能語性
靈已具備貌與親死似生我者何人父母天地比殺我者何人

卽我父母是借問何爲然。不過爲貧耳。貧窮本前定。殺女不可。扒親未成富。翁女已作怨。鬼女有女之禍。不待親分與女。若命好時助親增福。祉女或命薄時殃。傷自適已。何如全我。慈。卽前正完聚幼女。衣食需相揆。費幾許。祔長學女。工綠廳共蔬。不嫁不責。聘儀荆布亦非耻。況殺自己女。實殺他家婦他家也。溺女。汝婦在何處。世間男人多。無妻者屢屢殺女。女益少。天地喜不喜。禽魚猶放生。蟲蟻亦救死。我女反殺之。殘忍一至此。豈無有王法。豈無有天理。王法或可逃。天理暗報汝。現世及來世。罪譴誰能避。嗟哉。溺女者不仁。又不智。請君聽此歌。相傳相勸諭。

簡明醫叢

卷之一

七

亡醫緊人之安危。死生眷屬之悲歡。聚散豈非天地間最重大事哉。故非其人不可信托。是必其德仁厚。其學淹通。諸練而後能起痾迴生。奪災行之數。而造天命。慰人心焉。然則業醫者當時刻兢兢業業。以救人之德。殺人之罪。爲儆戒也。明矣。每臨病務以濟人自矢。勿重財利。若遇危難證。當明告某方某藥。勿說言珍秘而索重價。若病果易治。勿故言難療。致病家驚憂而妄勞。如果難治。勿故言易愈。致病家虛喜而空費。或有早晚可奏効。而故以藥停阻之。以勒重酬。或前醫有成功。而故捏詞誹謗之。以自居功。又或諸醫覆絕。詒彼獨肩。可挽如瘡。瘡僅存皮骨。語言不能。尚誘其厚餽。乃不日旋斃之類。又或盡心富家。而忽

慢貧家。延請不往。求藥不發。此等種種不一。總是重利鄙夫。忍心害理之所爲。詎可以驅命付托乎。且今醫不自揆。淺陋氣傲。心如既不肯。詭詐高明。又不肯溫讀醫書。取則恭酒晏笑。或算計財利。此所謂學醫人費以人命爲僥倖者也。元革云。道未行。謂無利益不學。道既行。謂應酬無暇不學。尤不可犯此二語。古之良醫。不敢逞臆見。而務博學。又不致泥俗諦。而求諸閱歷。又不執一二證驗。而求圓變無窮之心悟。至老手不釋卷。虛心常廣。容詢誠以人命爲重。自存德行也。雖然其責又在延醫者。勿輕聽人言。進用多誤。全在鑑察精確。人謀爲主。獨斷行之。不可專憑卜筮。嗟嗟。醫人有胸無心病家。有耳無眼人命其危矣哉。

簡明醫叢

卷之一

八

○臨病須知 臨病時古有望聞問切四法。切脈固爲重要。望聞尤居先。當細察受病之源。辨其所現之象。望其色之榮枯。聞其聲之勇怯。問其飲食進否。喜冷喜熱。探其胸腹有無痛處。便溺秘利。驗其目睛鼻舌氣息。踏卧挺身。向內向外。次診脈理。明表裏虛實。寒熱陰陽。有餘不足。與外證相參。合不合。酌見病之淺深。正變。明辯病之同異。真似。追遡病前日如何。又預料病後日如何。急則治標。緩則治本。或當正治。或當從治。病劇者。再候兩足太谿。太衝。衝陽之脈。更驗服過某方某藥。着意詳審。盡得病情。始擬方立案。在患病者。尤當以自已平日嗜好性情。及受病原由。詳細說與醫者。倘諱疾忌醫。則是助庸醫之謬。擊明醫

之肘而自貽其禍也。又醫者固當熟透古方。當神契物性。蓋藥品有陰陽升降氣味勝等之不同。須令洞徹詳明。則取用時能不泥古而不悖古。所謂藥不執方。合宜則用。古人方藥。但陳大略。原俟後人潤色。蓋天時有寒燠之不同。民居有燥溼之不同。人身有老少強弱肥瘦黑白。飲食多寡。寒之不固。病情有內外虛實似虛而實。似實而虛。似寒而熱。似熱而寒等之不同。其間情態百變。相機時措。古所稱神聖工巧。豈異人任哉。又凡治法用藥。有奇險駭俗者。只要見得病真。便可施用。不必顧忌。即如病有臨危。原屬有餘。失於攻下所致。雖至幾微。欲欲絕。猶當攻下取效。若久瀉久痢。至於滑脫不禁。則宜切止。而後調之。如國家

簡明醫教

卷之一

九

以刑治姦盜。以兵却虜寇。不得已而用權。權不離經。非霸術也。王道也。乃有醫謬稱王道。一味平補調停。此可施與不足。不可施于有餘。施于有餘。則邪氣得補而愈盛。是速其斃也。又有遇危難。謾如大黃附子。迥若霄壤。恐致殺人。而惟用中和之方。無大熱。大寒。救療而死。其殺人一也。病家無識。喜其平穩。卒受害而不覺。悲夫。雖然。臨病妙用。全係平日之識。見學力明透精熟。豈能微俸。襲取于朝夕哉。

○制方定規 醫有成法。有活法。成法師古。不可悖。活法因時。不可拘。古方切中人病。自有定見。品味及分兩。皆按君臣佐使。不可漫為增減。其製丸散。用服時。便悉有肯綮。蓋心肺居上。屬

陽。治心肺藥。必大丸調化。或湯散。或噙嚥。皆使易化。必飯後臨睡服之。欲其藥氣戀於心肺也。腎肝居下。屬陰。治腎肝藥。必細丸吞服。以煉蜜酒糊黃蠟等為丸。皆使遲化。必早空心服。更以乾物壓之。欲藥氣令直達於腎肝也。脾為中州。藥須細丸。或水盪。或蒸餅糊。或棗肉。或飯丸。服於半饑半飽已時之分。使藥氣正歸中州也。如風火寒暑急證。欲取功速者。及走表四達者。皆以湯散為主。湯者蕩也。取其蕩滌。散者散也。欲其疎散。如虛損淹延之病。不能一時奏效者。主以丸。丸者緩也。令其從容培植。各有定格。常見時俗。心脾丸方減數味。加肝腎病之藥。腎肝丸方減數味。入心肺病之俾。上下混淆。皆不奏功。虛費藥本。為輕

簡明醫教

卷之一

十

遷延病深為重。若此者。須分二方。早晚各服。為是。

○病分寒熱 病有寒有熱。有似寒實熱。似熱實寒者。皆須細審。經曰。諸躁狂越。驚悸。笑屬於熱。喘嘔吐酸。暴注下迫。諸禁。反懷。皆似寒實熱。治以涼藥。諸病上下所出水液。澄澈清冷。而青肢厥。屬于寒。而紅不熱。躁渴。不喜冷飲。欲坐臥泥水井中。皆似熱實寒。治以熱藥。心盛則生熱。腎盛則生寒。心虛則熱。攻于內。腎虛則寒。動乎中。此熱清寒溫。虛補實瀉也。有初感熱病。因過服寒劑。及生冷之類。遂變而為寒者。有初感寒病。因過服熱藥。及姜椒之類。變而為熱者。不知用藥之法。中病即止。治之太過。則病外添病矣。如病家不知脈理。欲辯寒熱。但看病人畏熱

惡火怕日色煖氣口渴思飲冷湯水大便閉結小便短赤心煩身躁多言聲響不寐仰身挺臥喜睡涼處皆屬熱證凡病人畏寒喜暖口不乾思飲熱湯大便秘小便長口鼻氣冷懶言踈臥皆屬寒證熱多屬實寒多屬虛做此推之寒熱虛實皆可辨矣

傷寒不藥 諸病中惟傷寒關係最重然治之亦有捷要但乘其初起在肌表時蚤如法治之無弗愈者譬禦盜於未入室之前自易驅除要在審辨的確所謂陰盛陽虛汗之則愈下之則死陽盛陰虛下之則愈汗之則死差毫釐謬千里不死於病而反死於醫藥不如不藥之為愈矣故曰傷寒不藥為中醫蓋或偏旅即舟次或山僻鄉村無明理醫家切勿妄服藥凡傷寒

簡明醫教 卷之一

十一

初起頭疼身痛怕寒拘急無汗為寒傷榮即宜絕戒腥酒殺味諸菓飲食一切有形難化之物更宜却勞斷怒氣房慾風寒安卧急取帶鬚葱頭一握生姜五錢陳皮二三錢細茶葉一撮白梅一個紫蘇三錢水二大鍾砂鍋煮沸以被袂覆患者頭入藥確令熱氣先薰頭面汗出再乘熱飲一大鍾渣即煎接飲以厚被覆身裏頭烘足俟汗出至足為愈腿足無汗而身熱頭疼仍在者寒邪未盡也宜再發微汗如病初起頭疼身熱大汗出者屬風傷衛不必發汗恐有亡陽之害如自有微汗仍如前法再略取汗前法中去紫蘇葱頭加黑棗三個煎服汗止為愈如起病時胸膈脹滿因傷殺肉諸物本日即與淡鹽湯熱飲三二碗

以吐出飲食為度不得吐即以所傷之物燒灰姜湯調服如過數日者用姜葱熨法見傷寒最忌腥酒米湯不飲一口必無餓死之理絕戒穀味易安如絞腸沙米湯一口殺人例也如口乾大渴但飲茶白湯燈心湯姜湯或至七八日熱極則如雪梨西瓜鮮菱嫩藕生蘿菈惟搗取清汁啜之去渣凡調理不如法至數日後熱邪傳裏身大熱口大渴謔語煩躁狂言發斑大便閉或下利穢水揚手擲足揭去衣被唇焦舌白胎漸變黃黑或天氣暄熱內外熱極可將病人卧於涼地席上四圍多致水盆令病人手浸水中或更以青布一幅浸濕覆于胸前切宜避風必病人喜好方可為之若渴極飲水問其欲飲幾何但與之半勿多飲

簡明醫教 卷之一

十一

或和蘇葉姜汁沙糖油梅之類亦佳勿強與水致水結胸之患又有大熱至六七日忽然作冷厚加蓋覆猶寒戰悚不定此名發戰迺正氣復而邪欲出之象急宜泡姜湯一大壺置病人胸前任意呼喚以助正氣少頃正勝邪散汗出而解矣如七八日外熱退或有潮熱二便通快胸膈清爽惟以清米湯飲之漸加稠湯進薄粥以少為貴若進腥酒立刻番復更慎房室尤有鄉村專務殺牲禱神所謂食歸泉口罪歸病人惜哉又陰證傷寒腹痛肢冷依中寒條多吃濃姜湯炒鹽熨用灸法治之

○脾胃為主 雖有美饌靈藥必賴脾胃運化蓋脾胃一臟一腑屬土易曰至哉坤元土為萬物之母經曰飲入於胃游溢精

氣上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行，合於四時，五藏陰陽，極度以爲常也。蓋五臟各得受此精華，爲精爲血，分布脈絡，灌溉週身，皆仰賴脾胃納穀，而而成。所以脾爲倉廩之官，胃爲水穀之海，胃主納受，脾司運化，胃不和，則食不思，脾不和，則食不化，故氣血津液，百骸臟腑，各失榮養，百病滋起矣。雖然，胃常有餘，脾常不足，脾尤重焉。故先哲云：治諸病，以健脾爲充調，一身以理脾爲主。從來補虛皆重腎經，獨東垣云：補腎不如補脾。苟或飲食失節，寒溫失調，思慮過度，四肢勞極，皆傷脾之由也。夫脾居坤靜之德，而有乾健之運，健則能食，而形體壯盛，傷則少食，而肌肉消瘦，故節食，即

簡明醫說

卷之一

五

勞以養脾也。悅心平氣，情氣寡慾，以養四臟也。養四臟，亦以助脾也。母子剋制，環相資養之功，知此則養生之道，思過半矣。

○大黃芒硝 謹按神農本草經：大黃味苦寒，無毒，主調中化食，破積除痰，通利水穀，腸胃結熱，推陳致新，安和五臟。又按芒硝味辛苦寒，主五臟積聚久熱，破留血，腹中痰實，結搏，通經脈，利二便。古今通治傷寒有餘熱，證東垣賦云：大黃定禍亂而致太平，故名將軍。如傷寒熱邪傳陽明之本，陽邪傳入陰經，陽毒火極等證，用之，則頃刻回生，舍之，則死不踰日。如不能以脈理明辯者，可以舌色驗之。如舌乾燥胎，唇焦口渴者，先宜白虎湯，重用錢塘硬石膏，研末，如小便短赤，大便秘結，大熱大渴，不怕寒，反

怕熱，搗手擲足，搗去衣被，大便下利，蒼黑穢水，名協熱，自利，膈內硬，硬作痛，乃腸中有燥屎，則大黃可用矣。渴極睛紅，胎黃煩躁，芒硝可用矣。如舌胎黑色，如芒刺，芒硝大黃可倍用矣。如舌燥雖有白胎，大便下利，清水，身無大熱，手足厥冷，脈沉細，名協寒，自利，硝黃不可用。如舌胎黑色，而溼滑，名臟結，有陽證變陰者，皆不可用也。如痢疾初起，或日數多，猶有積滯不清，後重者，迫非大黃不能通快。如頭大痛，目赤腫等證，非酒煮大黃不除。凡實證涼藥不効者，可用數分，專在用之中病，誤用則傷人。失用尤殺人。豈可畏如鴆毒，一例不用乎。今醫者逢迎病家，不用大黃，恐傷胃氣，爲談柄，病家敬其謹慎，王道屢有熱邪熾極，寧袖手坐視，其斃嗚呼痛哉。余曾見小兒患痘，大渴，失用石膏，胃爛潰穿，脚背而死。見痢疾大熱，失用大黃，腰後腎俞枯涸成窟而死。夫用硝黃所致，如此甚多。如明醫視病的確，用之無不起死回生，歷代名師治法方中，多用今以硝黃奏奇功者，豈勝枚舉，姑舉一案例之。

簡明醫說

卷之一

五

附紀 如鹽官沈觀察弟天谷公，應試南都，與選貢劉邑源公同日患痢，沈憶去曾語初感，即用大黃等一劑，獲瘳。劉延醫不肯用，沈亟往告，醫用熟大黃九一錢，藥中仍加白朮山藥，失於通導，竟至不起。又石膏者，傷寒等證，神藥，醫有絕不用者，情哉。

○人參附子 謹按神農本草經：人參味甘氣微寒，無毒，主補五

藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智附子味辛甘
氣大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中破堅積聚血癥寒溼腰
臂拘攣膝痛不能行步入補劑宜熱溫散寒氣宜生人參補臟
腑元氣附子益臟腑真陽火衰陽弱非此不能回生如久病氣
血虛憊一切虛損人參可用如命門火熄中氣日損一切虛寒
附子可用先哲用補劑必加附子數分以壯參耆之功力追覆
散失之元陽參附之助豈小補哉凡有尪羸虛冷之象亟宜用
矣倘有如瘧邪未散之類醫家常執正氣足而邪自避之語專
用補法猶如閉門逐盜盜從何出且邪得補而愈盛反助其邪
為害匪細此所謂損不足而益有餘如肺熱還傷肺參亦不可
簡明醫說 卷之一 五

藥用近賢遇富貴人輒慮其虛不問病之虛實一例從補亦致
失誤此與當用不用者等於亡羊皆錄不能洞矚病情故耳
三法神功 張子和治病不離汗吐下三法本療暴病而久
病亦可用以秦捷暴病者如傷寒胃邪者汗之及大頭疽頭面
腫脹并熱為寒包喘急難眠諸風溼證一汗可安癘毒初起經
曰汗之則瘡已此皆邪隨汗解也如食積痰滯者吐之及喉風
乳蛾而頭面頸項大腫點水不入音聲不出命懸須臾慎勿刺
破破者多立斃惟一吐則腫消索食并乾霍亂絞腸痧類皆賴
吐全經曰木鬱達之是也如裏邪實熱者下之及頭目周身火
熱熾盛皆可下之痢疾腹痛等證下之即暢經曰痛隨利減服

以利寬是也久病者如風寒久伏肌體微熱惡風或累月痰癢
諸寒溼腫脹皆可汗之年遠厲風大汗驅之如積月關格或小便
便癃閉等患或伏痰滯氣時痛時脹懨懨數年不能發越百藥
無功一吐可愈如痢證始初失下大痛口渴肛門腫閉小便不
通粒米不進氣息微一吐霍然至于氣結痰凝蓄血留積必
以攻下推陳致新是也可見此三法之妙毋論暴病即久病亦
甚神又毋論少壯即衰老亦多奏功今人能以此治暴病而不
敢用諸久病又併遇暴病而誤慮虛弱疑畏不用以致病邪深
入漸不可救雖然病屬有餘極至困篤用可立起病屬不足亦
難行之最宜詳審

簡明醫說 卷之一 六
氣不歸元 經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危
又曰一息不運則機絀第一毫不續則霄壤判故人身一動一
止至理寓焉一汗一降存亡係焉經曰心出血肝納血肺出氣
腎納氣蓋足少陰腎經為元氣之主司其經設有虧損不能藏
其氣則氣無所依由別道而出如洩氣即今古書轉尿氣是也
因過食或氣滯得氣出即寬及小兒老人皆勿論然有少年因
新喪過度所致洩不自知不能自禁其徵也其人必面青慘
形色憔悴誠虛損之漸患此者當自警之有男婦久病之後腎
經虛乏真水涸竭氣不歸元而變成喘滿氣急痰實壅嗽呼吸
短促不能安臥甚至擡肩頓肚等狀若多服降氣利膈定喘寬

胸之氣強下其氣致氣無所歸反增大便下墜後重裏急頻至
困而不解有用補腎藥而愈者其始必因多慾傷精失意傷志
則腎不得養不能藏攝其氣猶器收不能藏物也其有男遺精
女下帶而不可止及大小便頻多易出而不自禁者皆可倒推
人能寡慾節食起居有常則脾腎強固精能通運無氣之可漏
力能完攝不使氣之妄行何病之有

○毋恣茶酒 按本草有茶茗二名茶味甘苦微寒無毒早採
細者氣清上升主瘰瘡清頭目去痰熱渴令人少睡茗味同晚
採粗者重濁下降主下氣消宿食利小便通大腸宜熱飲如多
飲少睡令人瘦去人脂茶茗賦云釋滯消壅一日之利暫佳瘡

簡明醫教

卷之一 要言

七

氣侵精終身之累斯大蓋十二經補瀉溫涼之藥茶為腎經瀉
品難經曰瀉南方補北方東垣云腎無質不可瀉生民以來七
火常有餘一水常不足七藏神云腎藏精與志尤為元氣所藏
瀉腎則精氣日損古無茶茶始于唐盛于宋然亦惟飽後乃飲
空心但飲百沸白湯耳酒大熱有毒主殺百邪惡毒氣通血脈
厚腸胃禦風寒霧瘴養脾行藥力味辛者能散通導周身至極
高之分味苦者能下甘者和中淡者利小便然大寒凝滯惟酒
不水能熾心火傷肺金腐腸胃成癖積甚至成勞傷寒飲酒者
死其在火酒及過于辛勁者為害尤甚况又為肝經補品豪飲
則肝橫臆浮肝者將軍之官勇敢出焉故怒發無懼膽者中正

之官故直許無隱取禍招尤職酒之故噫能養人亦能害人善
養生者慎之哉

○吳氣愈痛 帝曰願聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰
經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客于脈
小則血少客于脈中則氣不通故卒然而痛帝問種種不同之
義岐伯曰寒氣客于脈外則脈寒脈寒則踈踈則脈絀急
則外引小絡故卒然而痛得吳吳音拱則痛立止所以諸痛得
暖氣則止甚者火烘炒鹽熨炒姜蔥或炒麩糠灰砂皆可如脛
中痛用麩或布條作圈放臍上炒鹽填于中大艾炷灸之陰經
中寒灸氣海關元感風寒溼氣四肢筋骨痛甚絮包火烘勞傷

簡明醫教

卷之一

六

痛者同法癰毒初起蒜灸即散如腿足寒溼腫痛六月水邊熱
砂堆擁腿足可愈若腹痛得吳不止者是寒氣與腹中吳氣相
薄而滿熱氣留於小腸腸中痛癰熱焦渴則堅不得出故痛而
便閉不通須涼藥治之面色黃赤為熱白為寒青黑為痛為積

製藥法

今人製藥勢不能悉依雷公矣然如地黃犯鐵男損榮女損衛
久服令人腎消沉木香乳香沒藥荳蔻砂仁等取氣味不取形
質世俗常配入藥中殊不知見火則辛香盡失惟存其熱性助
火損血凡取香氣者皆宜另研末調入服如人參不去蘆反不
効山茱萸固精核反滑精麥門冬清心其心反煩心酸棗仁失

神而得睡生用則反不寐之類不勝枚舉必宜遵之又製藥事
在取効不必膠泥古法如鹿茸虎骨龜板酥炙久無焦極成木

氣味何在宏變煮法世以阿膠炒珠同煎滾起粘於藥罐之口

阿鹿龜膠必切片頓化作九酒蒸和入如地黃胞衣等酒蒸

煮搗膏和入雖不犯鐵春夏徵蛙至於炒枯研末者滋潤之性

全無血少陰虛何賴無利而有害矣用藥必要求真如阿膠胆

朮膠丁皮馬蘭花紫草之類難得其真莫如不用

人參亮沙參玄參丹參苦參防風白芷桔梗秦艽藁本升麻絲

膽草靈樞撫芎漏蘆茵陳前胡柴胡軟苗性柔銀柴胡細續斷川地

榆羌活獨活羌活內揀黃白色者是胡黃連折有烟起大小薊並去

簡明醫教 卷之一 九

烏藥木通防已天粉猪苓澤瀉俱良姜乾葛草薜赤川姜黃並洗

蔓荊决明牛蒡白芥槐角非子蒿子紅豆草蔻黑白丑並研

薄荷澤蘭益母花青蒿斯艾側柏蘇合紫蘇兼散邪子降氣梗

金銀花凌霄旋覆蜜蒙欵冬花甘菊山茶葛花槐花紅花並取

枳殼枳實綠枳實炒橘皮廣東去白消痰下陳香圓青皮並去

枳仁杏仁炮去瓜蒌仁栝子仁並去益智草果郁李核並取

肉桂海桐檉皮奧椿根牡丹皮地骨皮五加白蘚皮桂枝並去

薏苡仁神麴並炒蘿蔔子麥芽酸棗仁並炒蒼朮炒白朮土炒

荆芥香薷瞿麥劉寄奴夏枯草並取三稜蓬朮川芎天麻並火

山茱萸金櫻金鈴去核訶子去核石斛并射干貫眾石菖蒲並去

茯苓赤利茯神去皮木並取天門冬麥冬百部貝母蓮肉並去

胡麻青蘘葶藶地膚子蛇床子並陳桑寄生山豆根三七並廣

黃蘗桑皮並炒藜蘆瓜蒂微炒骨碎補知母毛赤芍延胡並酒

遠志巴戟其炒黑豆煮半夏南星湯泡篇蓄淡竹葉地丁並去

百合蓮蕊覆盆去五靈脂荆芥蒲黃生用行血皂刺辛黃並去

茵陳兒藿香枝梗厚朴柴厚黃柏黃厚補杜仲去皮切姜汁炒

檳榔雞山藥根五味子遠肥黃連川者若黃多燥心空性堅

鬱金壯枸杞子州麻黃根止黃芩枯片海肺火條實海大喘

海石研連翹細甘遂研勿多當歸頭止血上行身養血中守

簡明醫教 卷之一 三

兜鈴用肉果製斑猫用壹個甘草生則分身稍而瀉火炙

紫苑取白附子泡木鱉壹或個白芍藥酒炒補脾止瀉痛益血

蘇木打梔子炒使君子肉色車前子有殼粗大有真取鮮草

白芨用牛膝酒浸紫草取真久山查健脾胃傷胃脘肉食者亦用

常山酒細辛北細竹茹去外青大黃欲緩酒潤者包大熟生川

蟬退土燕莢微炒青黛水淘取犀角者偽入藥磨或細末

蜂房火吳茱萸湯京墨火散羚羊角明亮光澤照逆稍有血

丁香枝赤小豆廣黑大豆料沉香紫黑色上成炭灰者真

故紙枝淡豆豉西白扁豆研乳香沒藥新瓦上略炙出汗研

粟殼取川椒去閉鱉甲並便或枇杷葉細去毛皂莢指牙者佳

芒硝化服 鹽洗淨 大腹皮黑豆 熊膽置水上一 商陸治腫物

石葦去毛 乾漆炒煙 蛤粉松江大 牡蠣三次研細 木香形如桔

決明火龍骨 穿山甲炙黃 大小茴香鹽水 水麝皆忌

製附子 平正重一兩者 灰火炮去皮麻 或切開姜汁浸透用

甘草黃連各取 童便煮乾 天雄大川烏 小烏喙雙尖 側子五名

製香附 搗光散寒理氣生用 散鬱醋炒 如四製一 米醋一童

便一人乳 一鹽酒浸透晒焙乾 或同艾醋煮 搗作餅晒

製膽星 星白膩圓小者真 粗黑臍凹扁大皆非 以姜湯泡

透研末 拌入臘月牛膽 掛至次冬 又拌如此七年 牛黃同功

半夏麩 湯泡七次為末 九兩麩一兩 姜汁拌踏餅 竹紙包掛

簡明醫教 卷之一 三

久佳 南星半夏 姜蒜甘草 皂莢水浸透 煮乾切晒用効

製神麩 麩二十斤 辣蓼草汁八合 青蒿汁六合 蒼耳汁四合

赤小豆杏仁各二合 研細和勻 踏餅 極過晒藏

製麥芽 大麥水浸一 濾竹羅內作窩 上蓋溼草 日酒水三

地黃末 懷酒浸透 入甕蒸 或入甕包固 或蒸 或重湯煮一日

搗膏 諸藥為末 將地擦勻 重晒磨末 入蜜和丸 如生地浸

菴蓉末 取大者酒洗去鱗甲 眼乾搗膏 拌木晒重磨凡 天門

冬五味枸杞皆可 用此法如 潤滋潤之性 地黃犯鐵無功

製河車 先用米泔水洗淨 以銀簪脚挑去血筋 好酒砂鍋煮 至極爛重十五兩 乾重一兩二錢 首男胎 預成藥末 候煮乾搗

捺勻晒重磨 末有末新瓦焙乾切磨

竹瀝法 淡竹現砍者 截斷打碎 搗新大口烏罈高尺內 一新

鉢掘地坑埋 鉢口平地 竹罈合上 鉢口罈肩 縱布條寒緊 布外

堆泥罈背上 堆礬糠三斗 點火煨三時 後掃去灰泥 併布 瀝在

新罈內 每瀝一盃 夏入姜汁一分 冬二分味酸不堪

製虎骨 經骨一對 鋸八片 好酒一筋 砂鍋慢煮 酒汁小半 盃

符骨上筋 臆剝下 搗膏 骨切極薄片 研末 同膏汁入末 加蜜丸

製鹿茸 茸截下劈八條 如前者 將茸條搗膏 同汁入藥 加蜜

用膠法 鹿膠阿膠龜膠 入煎藥切片 藥煎成汁 蒸化服 入丸

藥用酒少許 蒸化 同蜜和勻 如蒸不化者 偽膠也

簡明醫教 卷之一 三

取麻仁 新鮮麻子 揀淨 入小苧袋 下百沸湯滾透 懸過夜 次

早芽出 傾碗內 飯上蒸過 晒燥 操板二塊 合磨碎 播去殼

巴豆霜 取肉兩 研細 草紙包打油 盡霜重一錢用玻璃店

兔絲餅 兔絲子 絹袋淘淨 好酒浸二日 砂鍋添酒 煮皮搭綠

出酒乾 石臼搗膏 捏餅晒燥 入藥 形細性堅 否此不成末

煉血餘 壯盛人亂髮 米泔洗 次豆腐漿洗 黑亮 入罈中 封固

外以鹽油泥 搗灰 溲乾 先微火 次炭火 燒青烟 盡取 起待冷 開

玄明粉 真來路硝切勿誤用 皮中出 可入洗藥 每斤用蘿蔔一斤 切片

鋪鍋底 上放硝 水煮化 麻布絞去 薑汁傾淨 鉢去脚 次早結成 芒硝再煮 或鋪豆腐上 蒸一遍 取硝 濾乾 紙包掛 當風火煉

飛砂 鮮紅光明墻壁砂研極細水攪輕者隨水飛過定下

之劑者又飛盡澄出清水晒燥重研二萬下揚之不墜乃佳

珍珠雄黃滑石礞石石膏等用法青黛亦水中揚過出者用

煨藥法 蛇含石先微火煨數日次用鉛銀罐或瓦上燒紅投

米醋中淬之再燒再淬如此七次色紅可研為度未酥打碎

煨代赭石法同前 煨蘆甘石廣東點眼藥先煎黃連濃汁次

以甘石入鉛銀罐瓦蓋燒紅透投入黃連汁內如此三遍再燒

投重便內一遍將酥化者洗下研水飛燒不化硬青石去之

蒸藥法 何首烏滿動者佳雄竹刀刮去皮切片并細黑豆半

大胡麻煉好酒浸透九蒸九晒赤白對用稀菴草酒拌和蜜勝九蒸九晒

煎膠法 鹿角去龜板去助鱉甲俱換水浸三日新砂鍋桑柴煎

汁多次煨過夜汁濃粘為度汁濾入砂鍋慢火熬和藥欲成

煉膏法 止嗽益金諸膏新砂鍋煎首汁煎濾查煎二汁再煎三

汁麻布絞去查濾第三汁入鍋煎減半入二汁又減半下首汁

熬入糖蜜慢火收稠傾碗中坐水內一週每半盃重湯頓溫服

人中黃 竹截斷兩頭留節外餘寸許鑽一眼繫繩節上鑽一

眼入甘草末裝滿竹釘楔緊竹筒外劈去青浸糞缸內繩懸縛

四十九日劈開取甘草晒燥用若空筒浸久內汁即盡清糞製

人中白 僧房數十年夜壺入米醋滿瓦蓋口鉄絲扎定用鹽

泥搪固糞糠火煨至醋乾炭火煨紅待冷打開刮取或長流水

多浸刮用木圍桶底垢鑿取火煨或置屋上日晒雨露數月亦

可用 黃治一切熱毒 自主養陰退陽皆能除傷寒大熱過

經不解壞證退骨蒸勞熱神藥糞清解一切毒燥成煙久更佳

煎丸服法

煎藥大法 每劑水二鍾煎八分查用水鍾半煎七分如劑大

再水一鍾煎半鍾劑輕水減小兒藥水量用之補湯須是煎利

藥不嫌生煎者多水煎生者少水浸透數沸即濾服用桑柴火

不緩烈取幾分者必准其數汁有餘則藥力未得盡出汁過少

則藥味耗濁焦枯及傾番滾出皆無効必宜至親監督切勿專

委僕婢若外有煎成磨調化入之藥併煎藥引極宜點檢

煎藥大法 如細丸湯送大丸及末藥先以湯少許調勻添湯

嚥下服煎丸時候如頭目咽舌止嗽安神心肺上焦藥末藥大

丸喻化及水盪細丸俱宜食後臨睡服煎藥少哈細嚙猴項藥

去枕臥床徐服令藥氣在上也如散鬱寬胸快氣進食脾胃中

膈藥水盪桐子大及黃米粉神麴糊丸宜半飽飽午飯前服藥

居中也如腹痛瀉痢膝股腿足腎肝下部藥宜蜜蠟酒醋糊丸

空心食前頓服更以乾物壓或頓足使藥行於下也寒藥熱服

熱藥溫服附子藥冷服如嘔證藥不能下者另搗生姜及陳皮

數錢炒糯米百粒泡湯哈藥一口飲湯送之令人摩胸藥可嚙

下如醫留藥多劑倘病有變遷天時寒暄更改藥宜止服

武林白石孫志宏克容氏編輯

吳江文菴張應麒伯禎氏 閱

中風 附四肢不舉 酒厥 諸類中風 口眼喎斜 食厥 預防中風

經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或疑作均為風也又曰風者百病之長也至其變化乃為他病也無常方然致有風氣也又曰諸風棹眩皆屬肝木所謂理中風大法有四一曰偏枯半身不遂也二曰風痲四肢不收也三曰風癱奄忽不知也四曰風痺諸痺類風也古名醫槩以外中風邪立論定方謂人有勇怯氣有盛衰邪有微甚中有淺

簡明醫教

卷之一

中風

一

深分中腑中經可治中臟難痊中腑小續命湯解表中經大秦芫湯調養中臟三化湯攻裏後賢乃分西北地高土燥則真中風邪者有之東南地卑土溼皆溼生痰痰生熱熱生風也劉河間謂將息失宜君相五志七火妄動腎水虧虛不能制之熱氣拂鬱心神昏憤而卒倒也宜防風通聖散之類李東垣謂年踰四十陰氣半衰或因七情致傷其氣或肥厚者亦是形盛氣衰故耳宜補中益氣湯之類朱丹溪謂多屬溼痰有氣血虛者宜六君子湯之類以三先生之論悉屬內因主火主氣主溼痰為本則臟腑經絡榮衛氣血亦以諸邪致損故腠理不密外邪易侵則風為標矣以歷年試之有暴威盛怒肝木之風實甚而忽

倒者其證喉無痰聲目瞑口合肢冷脈沉乃中氣也有卒中者

多因處於順境恣肆暮之樂或年已五八後陰氣半衰而猶縱

慾或年近八八精絕而不斷姪致水竭火騰銷燦真陰煎熬津

液凝泣為痰隨氣升降四肢百骸無所不至更以厚味醇酒補

助其陽陽實陰虛氣血日耗雖外之動作如常內之臟腑榮衛

精髓竭矣暮然痰火上逼壅塞清道出入頓廢僵仆不省其證

面赤汗流眼合口開喉中痰聲如鋸涎沫湧溢勢如釜沸隨呼

吸而濺出唇吻併見種種惡候湯藥不受服牛黃丸更用陝西

牛黃散分灌之無功不週時而斃若有則我未之見有老

年惟因七情勞役氣血虧傷神明失守奄忽而作不省人事喉

簡明醫教

卷之一

中風

三

無痰壅但胸射之狀雖數日不醒進藥得宜可至全愈不可驟進牛黃水麝及大戟甘遂芫花損血耗氣忌利小便以奪津液先進清痰順氣之藥少兼疎風接服大秦芫湯之類應變而施可安脈經曰脈微而數中風使然滑而大者為痰沉而實者為氣浮遲者急數凶 治法宜提頂髮插人中以皂角末吹入鼻或生半夏末或北細辛末取噴嚏得嚏可治無嚏不治口噤者用細辛南星木泡烏梅搗擦牙自開或鹽梅或單用烏梅擦隨以生薑自然汁灌之次灌稀涎散吐痰痰盛者瓜蒂散虛老人參蘆煎湯吐口噤者鼻中灌之令患人覆身雞毛蘸生桐油或燈窩油絞口痰涎吐盡可甦虛而不勝吐者用陳年石灰龍膏

調灌痰降或滾痰丸。牛黃豁痰丸。方見調下。痰降可治。或灸百

會關元氣。海人中少。魁煎主方服。隨證加減。中氣證先以蘇

合香丸。方見中寒。灌之。口噤先以半丸擦齒。次宜八味順氣散。枳桔

二陳湯。烏藥順氣散。蘇子降氣湯。氣門選用。審的因暴怒所致。氣

平自復。不藥可安。凡疑似難明。先服攝生飲。方見類中風。痰熱盛

者。宜主方加黃連枳實。

主方順氣陳皮 半夏 白茯苓 人參 白朮

烏藥 南星 天麻 殭蠶 白芷分 甘草減

右加生薑五片水煎。成入竹瀝半小盃。生薑自然汁五匙。服

加減法。通連癱瘓。見後。參酌方者。法之體法者。方之用。

簡明醫家 卷之一 中風 三

中腑者。手足偏廢。面顯五色。惡風寒拘急。先小續命湯一劑。解

表。有汗及夏月去麻黃。汗多加黃芪。有熱去附子。血虛

加當歸。次以主方加川芎香附羌活防風。各八分 細辛桂枝

各參 減人參。白朮殭蠶天麻。忌牛黃水麝能通。關利竅反引邪深入

中經者。口眼喎斜。舌強難言。外無六經形証。內無便溺阻滯。主

方加葛蒲遠志黃連枳實麥門冬。無汗加羌防麻黃川芎。葱

頭 去人參白朮殭蠶天麻 汗多加白芍桂枝黃芪 去

白芷天麻 次服大秦丸湯

中臟者。邪極深也。九竅不利。二便秘澀。痰聲如鋸。先服三化湯

利便。兼服牛黃丸。次主方加當歸川芎芍藥羌防枳實麝

尤減烏藥白芷殭蠶天麻 便秘有痰滾痰丸。方見

左癱屬血與風。血虛合四物湯。死血加桃仁紅花 風加羌活

防風。方見 火加芩連 手不遂加黃芩。酒桂枝 足不遂加黃柏牛膝

右癱屬氣與痰。氣滯加枳殼桔梗紫蘇子枇杷葉鬱金 氣虛

加黃芪參朮 痰盛加瓜貝母天粉海石白附白芥子皂

莢天竺黃玄明粉之類 風痰加白附全蝎 實人用荆瀝

火盛加芩連梔子 血虛加四物 自汗加黃芪白芍桂枝

身痛加羌活蒼朮酒芎 頭痛加川芎細辛荆芥蔓荊子

頂加加棗本酒芎 心虛加遠志石菖蒲 驚悸加酸棗仁

麥門冬茯神竹茹 肥人瓜貝母黃連黃芩羌活防風荆

芥靈仙薄桂少加附子 瘦人合四物三黃。俱酒 嘔不止加

藿香磨木香 如風熱已清宜天門冬麥門冬當歸芍藥菊

花枸杞鬱金淮生地五味子黃柏黃芪牛膝人乳之類。悉以

主方加減 大便秘滾痰丸搜風順氣丸多服 後服虎潛

丸。方見 及大補氣血滋培元本之藥

小續命湯 中腑不省人事。手足戰掉。語蹇痰盛。筋脉拘急。不

能屈伸。痛難轉側。半身不遂等証。脚氣緩弱。久病風人亦服

防風桂枝心 黃芩 杏仁 芍藥 甘草

川芎 麻黃 人參。各錢 防已。錢 附子。分 右作二服

水鍾半薑五片棗一枚煎服。取微汗 無汗惡寒麻 杏仁

防風 <small>各加壹倍</small> 有汗惡風桂枝芍藥杏仁 <small>各加壹倍</small> 身熱無汗不惡寒	加知母石膏 <small>各四分</small> 減附子 身熱有汗惡風加葛根 <small>壹錢</small> 黃芩	桂心 <small>壹倍</small> 無汗身涼加乾薑 <small>壹錢</small> 附子甘草 <small>各加壹倍</small> 有汗無熱桂	附草 <small>壹倍</small> 汗多加黃芩 如有雜證相仍隨宜加減	大秦芩湯 中經脈者外無六經表證內無便秘裏證乃血弱不能養筋故手足不能運動舌強難言口眼喎斜宜養血筋	秦艽 石膏 <small>各壹錢</small> 甘草 川芎 當歸 芍藥	羌活 獨活 防風 黃芩 白芷 白朮	生地 熟地 茯苓 <small>各七分</small> 細辛 <small>五分</small> 右加薑棗水煎服	遇天陰薑七片 春夏加知母一錢 心下痞加枳實	化湯 中臟九竅不利有表證先服小續命次此湯通便溺	大黃 枳實 厚朴 羌活 <small>各伍分</small> 右水煎服	愈風湯 通治諸風初覺不致倒仆治未病聖藥又中風內邪已除外邪未盡此方加減常服久則清濁自分榮衛自和	羌活 甘草 防風 當歸 蔓荊子 川芎	細辛 黃芪 枳殼 人參 麻黃 白芷	甘菊 薄荷 枸杞子 知母 地骨皮 獨活	秦朮 黃芩 芍藥 <small>各叁兩</small> 蒼朮 生地 <small>各四兩</small> 肉桂 <small>壹兩</small>	右剉每服一兩水二鍾生姜三片煎空心服查再煎欲汗加	麻黃 <small>壹錢</small> 欲利加大黃 <small>壹錢</small> 大寒後加半夏人參柴胡 <small>各分</small> 穀雨
---	---	---	---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------------------	--	--------------------	-------------------	---------------------	---	-------------------------	--

後加石膏黃芩知母 <small>各叁分</small> 季夏加防風白朮茯苓 <small>各叁分</small> 大暑	後加厚朴藿香 <small>各叁分</small> 肉桂 <small>半兩</small> 霜降後附子肉桂 <small>各分</small> 當歸 <small>壹分</small>	防風通聖散 諸風潮搐手足癱瘓邪熱暴甚肌肉蠕動遍身	斑疹疔瘡頭痛目赤一切屬風屬火證神效小兒急驚癇疳	滑石 <small>壹錢</small> 防風 <small>壹錢</small> 甘草 <small>壹錢</small> 當歸 石膏 黃芩 <small>各八分</small>	桔梗 <small>八分</small> 麻黃 <small>夏減半</small> 芍藥 連翹 薄荷 梔子	川芎 芫荽 <small>各四分</small> 白朮 荆芥 <small>各叁分</small> 右加生姜水煎服 <small>確</small>	熱盛便秘量虛實加大黃 <small>有汗去麻黃</small> 頭痛加羌活白芷蔥頭	喘嗽加桑皮杏仁半夏桔梗冬花紫苑 目腫赤腫加羌活	赤芍木賊蒺藜菊花決明蔓荊蟬退 鼻濁涕每兩加薄荷	黃連 <small>各壹錢</small> 小便淋閉去麻黃倍滑石連翹加木通 小兒急驚加大黃梔子茯神調辰砂服	烏藥順氣散 一切風氣攻注走痛手足癱瘓骨節拘攣麻木	烏藥 陳皮 <small>各壹錢</small> 麻黃 枳殼 桔梗 白芷	川芎 <small>各壹錢</small> 僵蠶 乾姜 <small>炮各五分</small> 甘草 <small>各叁分</small> 右姜三片棗一枚水煎服 中風一身麻木加人參白朮當歸麥冬先服此大進	風藥 久病去麻黃加羌活防風南星半夏 遍身痛加當歸官桂乳香沒藥 臂痛加桂枝蒼朮羌活防風 脚膝腫	痛加牛膝薏苡仁 腰痛加杜仲故紙茴香 手足冷痺加	附子肉桂 胸滿加蓬朮三稜
---	---	--------------------------	-------------------------	--	--	--	---	-------------------------	-------------------------	---	--------------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------	--------------

搜風順氣丸 治三十六種風七十二般氣腸胃積熱胸膈痞

悶大便閉小便澀腸風痔漏肢節麻痛手足癱瘓語蹇

大黃五兩酒車前子或兩五檳榔 牛膝 山藥

麻仁 兔絲餅 山茱萸 郁李仁各兩 防風 枳殼

獨活各兩 右為末蜜丸桐子大每服三十九早酒或米湯下

瓜蒂散 諸風痰壅高食諸痢服滿吐後服降火利氣清神藥

瓜蒂研炒每服實人一錢虛老五分茶末或分酸棗汁調下

風痲加全蝎末五分 腫脹加赤小豆 宜晴天午前空心

服不止用麝香少許白湯送下 煮淡豆豉汁調尤佳

稀涎散 中風涎潮氣閉鼻塞不通鬱結關格喉蛾諸痰證

皂莢不蛀者炙去明礬等分研末每服一錢白湯調下不止陳

史國公浸酒仙方 癱瘓筋掣半身不遂乾溼脚氣淫滯經絡

木瓜兩五川草薢 白殭蠶 續斷 五靈脂 牛膝

天麻 白芍 烏藥 威靈仙 黃芪 松節

當歸 虎骨打極防風各壹右用無灰酒一斗浸藥二七日

緊封日足取藥晒乾研末每服二錢藥酒調下酒完米湯下

稀菴丸 中風不語口眼喎斜時吐涎沫四肢麻痺遍身痠軟

稀菴草五月五日六月煮酒入蜜少許拌勻甑內蒸過晒燥

如此九次搗末蜜丸桐子大每服百丸空心酒或米湯下

靈仙丸 通十二經脉去宿垢微利不瀉口眼喎斜癩風頭風

癩風皮膚搔癢手足頑麻疥癬腰重陰腫婦人月閉諸證

威靈儂洗淨右為末好酒拌潤入竹筒內塞口九蒸九晒煉

蜜和丸如桐子大每服二十九酒下朝服暮効外靈儂煎洗

八味順氣散 即四君子湯加陳皮青皮烏藥白芷水煎服

神氣不清 涼膈散加青黛藍根為末蜜丸彈大味砂全前為

風虛眩暈 四物湯四兩加秦尤羌活各半每服五錢水煎服

四肢不收恍惚不言 竹瀝生葛汁各和分三服

中風多熱痰盛常服 竹瀝 荆瀝 姜汁減和勻五合温服

簡便方

癱瘓諸風取汗 紫背浮萍七月攤竹篩內下着木盆晒乾

研細末煉蜜和九彈子大每服二九細黑豆煎酒調下暖室

通治諸風 蒼耳草端陽研末蜜丸桐子大每服廿九日三服

酒下若有風處如麻豆粒起此風毒出也針刺黃汁出愈

中風癱瘓肢廢癱風 麻黃去根節河水五升煎汁去查再熬膏

入白芷桑皮蒼朮甘松浮萍各壹川芎苦參各壹為末和膏

丸如彈子大每服一丸臨卧酒下取微汗隔二日服

中風經年不愈 青松壹斤右細剉為末石臼搗細生絹袋以清

酒一斗浸二宿火煨一宿初服半升加至一升汗出即止

三十六種風 菖蒲淨根薄絹袋盛懸罈內入酒一斗密封百

日以熟黍米一升內罈中封十四日開出取淨酒温飲

風症昏迷強直吐沫及產後痲 黑豆炒焦投酒淬淋漬酒一

碗入川獨活荆芥各卷煎七分温服未安再服

中風腹中切痛 食鹽少炒燥含口中熱湯吞下得吐痰安

口噤涎潮 皂莢大者去皮猪膽炙研末一錢調灌不吐再服

諸風及男子陰痿婦人帶下小兒客忤 蠶蠶為末一錢酒下

水腫風疾脚軟筋攣膝痛 大黃豆同甘草煮湯頻飲

○四肢不舉 經曰足受血而能步手受血而能攝掌受血而

握動言視聽無非血養是證若膏梁之士感於中風之後兼以

語寒流涎乃痰飲隨氣入於四肢無血以養故不能舉動也專

宜治痰不須養血壯筋骨等藥有水竭火盈耗損營血宗筋失

簡明醫案 卷之一 四肢不舉 九

養而致宜養血滋陰有肥甘過厚脾土太實所致宜三化承氣

瀉令陽虛土平可安有脾虛不能為胃行其津液以達四肢故

不舉當十全大補湯隨證加味可也

主方 前梁風 橘紅 貝母 膽星各錢 茯苓 白附子

天麻 瓜蒌仁去油 白芥子 海石研各錢 水二鍾生薑五片批

杷葉三大片去毛 煎八分入竹瀝一盃姜汁十匙食後服

○口眼喎斜 舉世皆謂風邪中於臟腑痰飲留於經絡專用

祛風豁痰之藥多不見効外用鱈血吊法尤為非理切戒治法

當以清火養血為主或兼散鬱行氣有風痰者兼而治之必宜

頻服藥餌脉洪火炎瀆為血少

主方 黃連 黃芩 梔子 當歸 芍藥

川芎 生地 天麻 秦艽 木瓜分等 右水煎温服

火盛加遠翹石膏玄參 便秘加大黃 滋陰天門冬麥門

冬知母黃柏甘菊枸杞五味牛膝石斛人乳 利氣烏藥

○諸類中風 經曰神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則成廢

魂傷於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮稿志傷於盛怒則腰廢

難以俯仰勿謂肢廢筋攣等藥作風治更有五志過及六淫氣

侵勞傷氣血房悻精脫因喪暮夜邪惡衝觸及痲厥屍厥痰厥

氣厥血厥等證皆至卒暴倒仆不省先宜掐人中取嚏艾灸等

法見急煎主方同蘇合香丸中風寒暑溼皆可服少甦詳辯證

簡明醫案 卷之一 諸類中風 酒厥 十

名各依本門治理

主方 攝生飲 半夏湯 南星酒 木香各錢 蒼朮生 甘草生

北細辛 石菖蒲各錢 右劑加生薑七片水煎磨入木香

温服調蘇合丸同灌尤佳 痰盛加全蝎研 二枚

○酒厥 有因飲酒過多而致蓋酒之為物水形而火性故標

悍酷烈溼熱蘊積之久則為飲為痰滲於臟腑流於關節為半

身不遂口眼喎斜更值醉甚亦至昏愒僵仆治宜解酒除溼

主方 葛根葛花 陳皮各錢 砂仁 白芷 猪苓

澤瀉 白茯苓 人參 白朮 乾姜各錢 水煎服

○食厥 因飲食倍常不能運化填塞胃氣升降不通卒然倒

仆。目瞑口噤亦似中風。急宜多灌姜鹽湯探吐。吐出痰食自甦。萬勿誤服祛風藥。重傷胃氣。斃可立待。右開脉弦緩而浮。○胃風。夏月胃風證。乃傷食乘風而感。亦此類也。

主方 白朮錢貳 陳皮 半夏 白茯苓 厚朴

山查各錢半 人參 木香磨 砂仁研各壹錢 甘草伍分 右加姜棗

水煎調入香砂服隨證加減

○預防中風 膏粱之士。肥甘醇酒。皆能助火生痰。痰生熱。熱生風。風火同陽。性並上行。致頭目眩暈。痰盛氣虛。手足指節麻木。軟弱。面如蟲行。口眼牽掣。肌肉臃動。臂膊懈不仁。語言顛錯。胸膈迷悶。神思不清。口渴便秘。小便赤少。此皆中風階梯。極

簡明醫教

卷之一

預防中風

十一

當防微杜漸。脉多弦滑虛軟無力。左脉不足。服四物湯。方見右婦科 脉不足。服四君子湯。方見虛損 痰壅導痰湯。方見痰門 火盛防風通聖散。次服愈風湯。搜風順氣丸。三方見前

主方 天麻 荆芥 白朮各錢 膽星 半夏製

橘紅 茯苓 當歸 黃連各壹錢 枳實 人參

甘草各五分 水二鍾。生姜三片。黑棗二枚。煎八分。入竹瀝半盃。

姜汁五匙。食遠服。以此方加減。配合為末。竹瀝九分 姜汁壹分 疊

丸如桑豆大。每服二錢。食遠服。日二三次。忌鮮猪肉之類。

傷風

經曰。傷於風者。上先受之。又曰。虛邪賊風。陽先受之。又曰。清淨

則肉腠閉拒。雖有大風苛毒。弗之能害。蓋風為天地浩蕩之氣。

四時八風之變。未嘗無也。間有傷者。不能法道清淨。不得腠理

固密。表上陽虛所致。一因也。有挾虛痰熱。其氣拂鬱。風邪易於

外束。二因也。有火乘肺金。煎熬津液。成痰痰火。騰奔。風自内生

三因也。感病者。無出於此。其脉浮而大者為風。浮緩為傷風。鼻

塞。浮滑而大為內熱生風。治法表虛受風。專宜發散。勿致汗多

亾陽。有汗者實表散邪。桂枝湯。方見中風 內挾痰熱而傷風

邪者。參蘇飲之類。痰壅火盛。內熱生風者。防風通聖散。方見中風

類。加減調之。凡鼻塞聲重。腦脹頭疼。鼻流清涕。畏風屬寒。鼻中

濁涕而熱氣時出。咽乾咳嗽。痰唾稠粘。屬熱。外之風邪。疎散。內

簡明醫教

卷之一

傷風

十一

之痰火未平。芩連枳桔二陳湯。方見痰飲 之類。清肺降火。利氣消痰

主方 蒼朮 藁本 羌活 白芷 川芎

防風各七 細辛 甘草各五分 右加姜三片。葱頭三個。水煎

有汗表邪。加桂枝白芍。無汗惡風。加紫蘇葛根。

參蘇飲。傷風感冒發熱。頭痛咳嗽。涕稠。疎邪清氣。消痰除熱。

人參 紫蘇葉 葛根 半夏 前胡 桔梗

陳皮 茯苓 枳殼等分 木香 甘草減半 右加姜棗

水煎服。咳嗽去參。香加桑皮杏仁。肺熱加黃芩。

川芎茶調散 治傷風上攻頭目鼻塞聲重

薄荷葉四兩 川芎 荆芥各貳兩 羌活 白芷 防風

甘草各壹兩 細辛伍錢 右為末每服二錢食後茶湯調下

中寒

經曰冬三月此謂閉藏水冰地圻無擾乎陽早臥晚起必待日
光夫中寒者卒中天地之寒氣也或冬月嚴凝之氣或三時暴
客之寒手足厥冷臍腹絞痛厥陰昏迷唇青口噤面如刀刮引
衣蹇卧不渴當分三陰治之中脘痛屬太陰理中湯臍腹痛屬
少陰五積散小腹痛屬厥陰四逆湯倍附子治之先用灸熨之
法稍緩不救如腹不痛惟脈沉肢冷者俗謂陰證傷寒是也醫
以房室受寒為論若患人因平素斷喪腎虛而成病時不犯必
堅執不伏不肯服藥或以他證處治反藥從之藥亦怠緩不滿

備用醫藥

卷之一

中寒

七

六日而死嗚呼遇此之候但依方調理勿以犯姪為論致病者
疑或有初感乍寒乍熱脈弦似瘧猶能行動失用附子溫散三
四日手指漸冷而斃脈遲緊或沉細澁皆寒墜弦或沉細為中
寒寒脈散者死有汗尺脈遲滯寒在下焦者死

主方

回陽救急湯 人參 白朮 茯苓 半夏製 乾薑炮

肉桂

附子煨去皮 甘草各壹錢 陳皮五分 五味子九粒 加薑煎服

右方通治中寒證甚者倍附子 乾嘔吐痰涎白沫加吳茱
萸 無脈加猪膽汁一匙 瀉甚加黃芪升麻 吐甚多加

薑汁 次兼官桂當歸溫血分益寒傷榮也 倉卒無藥用
布條纏作團放臍上中安炒鹽上以大艾炷三個灸多壯腹

痛止為度 更灸氣海一穴臍下一寸五分 丹田一穴臍元一穴

臍下三寸治臍結不可攻者及陰汗不止腹脹腸鳴面黑指
甲青百餘壯量法 病人屈中指中節兩折紋尖為一寸

中寒

卷之一

中寒

七

一法用吳茱萸二升酒拌炒熟以絹袋盛或二三合煮滾入
麩升鹽一合炒包熨心腹及手足心氣通則止姜葱熨方見
一法用葱一握束縛如餅切去根葉存白二寸許先以火烙一
遍令通熱着病人臍上下以熨斗火熨之先以麝香硫磺安
臍中尤妙更作三四餅壞則換手足溫微汗乃止內服主方
蒸臍法 麝香 半夏 皂角末各 安臍中上鋪鹽灸二七壯
理中湯 治太陰中脘痛自利不渴寒多腹痛瀉霍亂厥冷

備用醫藥

卷之一

中寒

七

人參 白朮 乾薑 甘草各貳錢 右加生薑煎服
腎氣動者去朮加桂枝錢 吐多去朮加生薑參錢丁香五
分 刺多加木香壹錢 小便澀加茯苓 渴加木 寒加
姜 腹痛下利加附子炮貳錢 霍亂轉筋加散石膏五錢
枳實理中丸治寒實結胸加茯苓枳實為末蜜丸彈大白湯下
五積散 治少陰臍腹痛及感冒寒邪頭疼身痛拘急嘔吐不
問外感風寒內傷生冷寒溼客於經絡腰背痠疼婦人經閉

白芷 當歸 川芎 陳皮 厚朴 蒼朮

白芍 枳殼 桔梗 半夏製 乾薑 茯苓

官桂各五分 甘草各壹錢 麻黃冬八分 加生薑三片葱頭三個煎服

四逆湯 治厥陰小腹痛太陰自利不渴陰證脈沉身痛先服
附子壹枚生去皮 甘草各壹錢 乾薑五分 二劑水煎溫服取汗

臍切作八片

茱萸四逆湯 治厥陰中寒小腹痛甚 通脈四逆湯前方倍加其草

吳萸泡附子炮 乾薑各錢 炙草半錢 右加姜水煎服

附子散 中寒陰證唇青面黑身背強直四肢厥冷諸沉寒冷病

附子製錢 官桂錢 當歸錢 白木錢 乾薑半夏分 薑五片棗二枚 煎服

蘇合香丸 治中風中氣中寒卒倒口噤不省暴感寒毒臍腹

絞痛肢冷吐瀉心痛脾疼兎崇邪惡癆瘵傳屍疫厲穢氣嵐

瘴蟲疰小兒急慢驚風每服男婦一九小兒半丸生薑汁化

開薑湯調下牙緊半九 擦牙開灌之如感冒風寒咳嗽痰喘薑葱

湯下產後泄瀉腹痛一切風寒怒氣胸滿等證防霧露酒服

香附 白木 安息香如無以白 檀香 木香

簡明醫要 卷之一 中寒 五

丁香 草撥 犀角另錢 沉香 訶子肉各 麝香

乳香 硃砂水飛 蘇合油各壹 冰片五錢 右各取真者另研細

末次入麝水油砂研勻加煉熟白蜜和每丸重二錢黃蠟厚

封或入小瓶蠟封口勿令泄氣勿溼潤

傷寒 正名 初感小愈 兩感 六經證治 陰陽似證

經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱又曰凡傷於

寒則為病熱熱雖甚不死若兩感於寒而為病者必死傷寒者

霜降後至春分前感寒即病之名也冬時寒伏於肌骨春時隨

陽氣升發或復感寒邪發為溫病經曰冬傷於寒春為溫病是

也三四月病名晚發鬱而至五六月為熱病夏月壯熱不惡寒

為中膈頭疼脛冷腹痛滿為溼溫身熱足冷項屈惡寒頭搖口噤

身背反張為瘧證春宜溫而反寒夏宜熱而反涼秋宜涼而反

熱冬宜寒而反溫感之為病各時氣有沿家遍戶長幼病同者

名疔癘不時有暴感風寒而病者各感胃又有冬溫溫毒寒疫

風溼等同類一十四證凡身熱無汗屬寒邪可用主方發汗

身熱有汗屬風與溼可加減方止汗而愈○有類傷寒四證

如頭疼發熱身不痛氣口脈盛惡食欲吐者食積也不頭疼身

痛惡寒或煩熱時頭痛不眠者虛煩也憎寒發熱不頭疼項強

氣急胸滿脈滑大者寒痰也發熱憎寒嘔綠色水腿脚紅光腫

痛甚而衝心作痛者脚氣也各有 ○有惡寒拘急飲食作嘔甚

簡明醫要 卷之一 傷寒 六

則心煩眩暈氣急脈浮緊者腫毒疔癰也或内生肺癰腸癰之

類依外 ○有因跌損閉挫亦發熱者瘀血也○婦人經脈不行

及陰虛血少等證亦惡寒發熱拘急切宜分別如傷寒誤食傷

人諸證誤作傷寒斷其穀食尤至傷人慎之

○論初感附小 夫寒邪中人陽經受病太陽為首陰經受病

少陰為先足少陰腎經與足太陽膀胱經相為表裏陰陽臟腑

之配合也然寒之初感必入膀胱陽經而作熱若腎虛或因房

勞過寒則邪乘虛直入少陰作寒為陰證矣依中 如膀胱受邪

寒主收引腠理閉塞其陽氣為逼身熱可即以發散藥服之依中

理開汗出而邪解陽氣得泄身涼而愈若此時遠巡畏縮或藥

不中病。則邪熱漸傳六經。變態百狀。治療最難。但能防之於未
然。寧有深重之疾哉。蓋風初感。肺先受之。必噴嚏鼻塞。頭痛腦
脹。惡風等候。乃風入之漸也。此際能增益衣衾。百凡戒謹。豈有
傷風之患乎。如寒初感。腠理閉之必足下微冷。身上覺寒。形體
拘急。臂膝頻欲舒挺。為快。乃寒入之漸也。此際能斷穀食。絕房
幃。包首裹足。厚覆安臥。惟飲熱姜葱茶湯。令有微汗出。過宿自
然平復。豈有傷寒之患乎。若已感冒寒邪。初猶不覺。仍前作勞。
強進飲食。邪氣得腥酒穀味補助。所謂邪得補而愈盛是也。寒
邪必然入裏。多致危急。更犯色慾。必為陰證。為兩感。皆由失於
防微杜漸也。○有小愈病加者何。蓋此證多日不食。必不餓死。
簡明醫家 卷之一 論初感 論兩感 十七

必宜待熱退。方可飲食。日數縱多。亦待熱勢將平。微與粥湯養
其胃氣。熱除。漸與薄粥。最忌腥酒。又有因病時熱渴。誤飲涼酒。
遂致危亡者。經曰。多食則復。食肉則遺。飲酒則劇。復感風寒。勞
復。皆難治。犯姪自病。名女勞。復無病者。名陰陽易。多死。

○論兩感 帝曰。其兩感於寒者。其脈應與其病形何如。岐伯
曰。兩感於寒者。一日太陽與少陰俱病。則頭疼發熱。口乾而煩
滿。二日陽明與太陰俱病。則腹滿身熱。不欲食。譫語。三日少陽
與厥陰俱病。則耳聾囊縮而厥。水漿不入。不知人。六日死。又云。
天之邪氣。感則害人五臟。以知內外兩感。臟腑俱病。欲解表則
有裏。欲攻裏則有表。表裏既不能一治。故死。感之淺者。猶或可

治。宜中和靈寶飲。或大羌活湯治之。次六形證。如裏證急者。大
柴胡湯。或調胃承氣湯微攻之。表證急者。柴葛解肌湯。或小柴
胡湯微解之。若下利身痛。四肢厥冷。脈沉。邪傳陰經。宜四逆
湯。或理中湯分輕重溫之。

六經形證治例

○足太陽膀胱經 頭痛項強。脊腰膝痛。惡寒拘急。身熱無汗。
為表實。依主方 得病微熱。譫語。小便不利。熱結膀胱。宜桂苓
飲。小便利而小腹急脹。為蓄血證。看大便黑。口渴飲水不欲
飲。桃仁承氣湯下去黑血。熱甚汗出至頸而還。渴欲飲水。小
便不利。必發黃。宜茵陳五苓散。五苓散加茵陳。汗後口渴。渴鼻塞。表未解。煩
躁。目瞑。必衄。血成流病。解不成。流再微汗。

簡明醫家 卷之一 六經形證治例 十八

○足陽明胃經 目痛鼻乾。不眠身熱。微畏寒。自汗舌乾。脈微
洪。長屬陽明表證。本病 舌胎白滑。葛根湯。加柴胡黃芩。不
退。生地芩連湯。已後大渴。舌黃胎屬經證。如神白虎湯。渴甚
倍石膏。加天粉黃連竹葉。潮熱自汗。揚手揭被。大便秘。轉矢
氣也。或自利穢水。胸痞舌黃胎。乃陽明標病。大柴胡湯。未効
六乙順氣湯。舌胎黑燥。如芒刺。重用大黃芒硝。未効。加用。失用
則死。表未清裏又劇。大柴胡湯。熱甚三黃石膏湯。三黃
○足少陽膽經 耳聾脇痛。乾嘔口苦。寒熱往來。微畏寒。汗少。
白胎。脈浮弦者。為少陽經病。膽無出入之路。在半表半裏。禁

汗吐下宜柴胡雙解飲和解 已後身熱耳聾胸滿嘔渴舌黃

胎自利脉弦為標病只宜小柴胡加黃連竹茹枳實一便秘必加黃

○足太陰脾經 腹滿咽乾舌黃胎手足温身黃小便澀大便

秘腹痛脉沉有力為本病宜桂枝大黃湯下 已後頭汗至頸

而還口渴小便赤大便實身目黃脉沉實為標病宜茵陳大黃

湯 如不渴嘔吐大便通利小便清長舌紅潤脉沉無力手足

厥冷宜加味理中湯或先屬陽證因體虛下之太過虛邪傳入

陰經寒證悉具理中湯温補

○足少陰腎經 口燥咽乾舌胎邊黃中黑大便秘或清水脉

沉實有力此熱邪傳少陰本病調胃承氣湯微下之 已後證

簡明醫聚 卷之一 六經形證治例 十九

語便秘透臍鞭痛煩躁大渴脉反沉疾此熱邪傳入少陰標病

宜大承氣湯急下之 本經有熱邪傳于衝脉于于血分血熱

妄行逆上則嘔血迫下則便血外證神昏譫語舌燥無胎如火

灸猪腰子脉沉瀼或洪數宜生地黃連阿膠湯或歸地養榮湯

已上皆熱邪傳腎水涸為病非真陰證也 本經惡寒厥逆踈

卧不渴吐瀉腹疼身重脉沉遲屬厥寒宜回陽救急湯温補

○足厥陰肝經 胸腹脹滿消渴飲水謔言煩躁便秘或下清

水舌乾黃黑燥胎脉沉實有力此熱邪傳入厥陰本病宜六乙

順氣湯下已後有前證手足反冷或乍温乃熱深厥亦深非寒

厥也脉沉實有力為標病大承氣湯急下之 本經口吐涎沫

四肢逆冷過乎肘膝不渴小腹痛脉沉遲此本經真陰證急宜

回陽救急湯茱萸四逆湯温之

六經中惟少陰腎經疑似難明脉俱沉沉而有力為陽大黃芒

硝攻下沉而無力為陰附子姜桂温補一毫千里殺人反掌臨

時細心并外證參酌 陽證似陰陰證似陽等十二證古書皆

各分條立論初學最難剖析 極欲後人易解姑彙為二論雖

然大同小異用藥寒熱輕重臨病細加詳察

○陽證似陰 陽亢於內 陽邪傳入陰經有陰經之名 陽厥

當下 熱邪傳裏失下 表寒裏熱 身體厥冷反不欲衣 陽盛

拒陰 身雖寒 火極似水 承乃制

簡明醫聚 卷之一 陽證似陰 二十

右六證名異病同 初起時身大熱頭項痛陽證也六七日後

熱伏于裏陽邪陷入少陰經外證通體雖寒反不欲衣手足厥

冷不過肘膝或乍冷乍温此因失用大黃攻下伏熱已深陰失

其守而避在肌表充陽侵於內為裏熱表寒之證雖有前證猶

有口渴舌燥謔語昏亂不眠大便秘或利黑水小便赤爪甲紅

六脉沉實有力可證也正氣猶實六乙順氣湯下之弱者如神

白虎湯清之危者歸地養榮湯誤認為陰寒而用熱藥者立死

○陰證似陽 陰伏於內 陰盛格陽 孤陽飛越於上 陰厥當

溫內外皆陰無陽 表熱裏寒 陰證亦有發熱者熱 陰極發

躁 陰證宜熱 水極似火 物極則反 陰證脉弦乍寒乍熱誤作瘧

右六證各異病同。初起時身不熱，頭不疼，口不渴，或乍寒乍熱，手足常冷，大便泄，或陰寒凝結而大便秘，小便清長，陰證也。三四日陰極煩躁，面赤不熱，欲坐泥水井中，口微渴，欲飲水，不能入口，或身熱反欲穿衣又熱脫衣又寒。此因失用附子溫經，伏寒已深，陽失其守，而浮於肌表，淫陰僭於內，為裏寒表熱之證。雖有前證，猶有惡寒踈臥，身難轉側，昏沉多睡，爪甲青黑，六脉沉微，無力可證也。宜理中湯四逆湯回陽返本湯，溫散寒邪，使陽氣復而微汗出為愈。誤認為陽熱，而用涼藥者立斃。

○太陽脉似少陰 始得病，頭疼身熱，故為太陽證，脉當浮。今反沉，似少陰脉，多因裏虛久寒，正氣衰微，身必痛，故宜救裏，使清明書卷

卷之一

陰證似陽

三

正氣內強，通邪外出，用生附四逆湯。雖曰溫裏，亦能汗出而解。○少陰證似太陽 始得病，脉沉細，不頭疼，故為少陰證，當無熱。今反有熱，似太陽證，猶有寒邪在表，未傳入裏，膠理鬱閉為熱。宜麻黃附子甘草湯，熱附溫裏寒，麻黃散表熱。

○陽毒 受惡毒之氣，入於陽經，或失汗下，或熱病誤熱藥，其證大熱，咽痛發斑，面赤譫語，脉洪，宜陽毒升麻湯青黛一物湯，咽痛，玄參升麻湯三黃巨勝湯。甚至舌卷焦黑，鼻孔如煤，宜水漬法，五日治，七日不治。

○陰毒 受深重之寒，伏于腎經，致陰氣獨盛，其證腹痛下利，咽閉嘔逆，唇青而黑，手足厥冷，身如被杖，短氣難息，六脉沉微。

宜服甘草湯真武湯兼熨法薰法，灸關元百壯，三日後不治。○腎傷寒 少陰咽痛，伏氣病，三名一證也。因冬月受寒，伏于少陰腎經，或太陽傳入，或感暴寒，多發於春，本經循喉嚨，挾舌本，故咽痛，後必下利，屢有誤為火病，服涼藥殺人。先宜甘桔湯寒熱皆効，加玄參服，如覺惡寒拘急，服參蘇飲倍甘桔取微汗安。口瘡赤爛，宜升麻六物湯之類。

汗下等不可治法

○可汗 失汗邪不出，寒邪在表，頭疼骨痛，發熱惡寒，脉浮，一日至十三日或多日，略有前證，皆宜主方隨輕重發表。少陰脉沉身痛，麻黃附子細辛湯發汗，切勿太過。○不可汗 不宜汗而清明書卷

卷之一

汗下等治法

三

因風暑溼，自有汗，勿再汗，臍上下左右有動氣，瘡家，衄血，咽閉口瘡，瀉利清穀，婦人經行，小便淋瀝，皆宜小柴胡和減。○可下 陽毒等證，熱邪在裏，大渴舌胎，大便秘，遶臍硬痛，協熱入氣，凡有表證，無裏證，小便澀，四肢冷，咽閉嘔吐有汗，臍上下左右有動氣，犯此而有下證，大柴胡湯微下，虛老黃龍湯。

○可吐 痰食初病有食，淡鹽湯吐，氣滯有痰，稀涎散吐。○不可吐 無食痰，傷風有汗，四肢冷，虛人皆忌。

○可溫 益火之源，陰寒盛，脉沉遲，下利腹滿，身痛發熱，脉反沉，陰毒呃逆，四逆湯，少陰寒嘔，理中湯。○不可溫 諸陽熱證，脉雖

沉而熱先頭痛大熱後肢冷禁溫

○可補邪出脈弱氣虛汗多肢冷獨語鄭聲不眠不食皆宜補

○不可補餘邪未盡脈實頭痛身熱大渴舌胎便秘下利穢水腹滿

○可和解已平無汗吐下證惟往來寒熱胸未清宜小柴胡湯

○未可和解表裏未盡表證未罷裏證猶甚防風通聖散合六一散

○可水以水但要病人自思水飲問欲幾何惟與其半飲之

○不可水水停心下強與則成水結胸陰證似陽雖思不能飲

傳經變證已見六經形證者皆不重贅

○大結胸同類十一證不按而痛因頭疼惡寒表證未罷早用大黃等下

○小結胸傳經變證按之方痛心胸硬滿亦用熨法內服小陷胸湯

○熱結胸實熱結胸懊憹煩渴心下滿脈實宜三黃石膏湯

○寒結胸外無熱證而內服結宜枳實理中丸方見中寒

○水結胸飲水過多泪泪有聲小半夏茯苓湯小便不利制五苓散

○血結胸有瘀血強止蓄于上焦胸滿漱水不欲嚥犀角地黃湯

○支結支結者滿而濡心下妨悶也小柴胡湯加桂枝

○臍結狀如結胸舌上有胎溼滑飲食如故時時下利小柴

胡倍姜更灸關元然素有痞連在臍旁痛引小腹控入陰筋死

○氣結胸滿刺痛脈沉二陳湯方見痰門加枳實厚朴檳榔

○痰結胸痞不痛脈滑二陳湯加枳桔前貝痰火苓連粉茹

○痞滿按之不痛而硬有表枳桔湯最良欲下大柴胡湯

○吐嘔噦有物無聲曰吐此胃寒不能司納而自反屬太陽

藿香正氣散方見二卷加羌活有物有聲曰嘔吐此寒熱交併于胃

鬱鬱不寧而上逆屬少陽小柴胡有聲無物曰嘔此胃火衝逆

屬陽明表證經曰嘔多雖有陽明證不可下枳桔湯渴甚竹葉

石膏湯無物無聲若嘔狀延頭問口名噦此大便秘結膈上有

寒火伏于中上下不得泄越所致以小柴胡湯加黃連竹茹

○二瘧項強頭搖面赤口渴身反張是也屬太陽中風重感

寒溼或發溼家汗及產後血虛宜如聖飲有汗名柔瘧加桂枝

○白木無汗名剛瘧加麻黃杏仁如脚掣咬牙皆裏熱承氣湯下

○譫語附鄭聲經曰實則譫語虛則鄭聲譫語屬陽鄭聲屬陰

譫亦有虛實實者胃中實熱乘心神識昏亂身熱躁渴脈洪便

秘或旁流穢汁腸有燥屎三承氣湯量輕重用虛者誤汗亡陽

或吐下後利不止脈沉微難治柴胡桂枝湯三陽合病譫語宜

白虎湯大熱黃連解毒湯男子失汗成瘀血女人熱入血室桃

仁承氣湯鄭聲者氣脫神竭也或一事言之不已獨語者

如見鬼狀或睡中呢喃脈沉肢冷參附藥溫補或獨參湯

○發黃即脾病脾陰為溼熱所蒸則土色現外茵陳五苓散大

便秘茵陳大黃湯初覺發黃瓜蒂為末口含水搗末三分入

○吐血鼻衄 便血 陽邪在表失汗致熱毒蘊於經絡逼

血妄行。火炎氣逆則吐血。犀角地黃湯加芩連 煩躁目瞤必

衄。因汗不出得衄為汗也有表證。葛根湯 衄不止生地芩連

湯。茅花湯 便膿血。地榆散 溺血。延胡索散

○潮熱 陽明旺於未申。一日一發。如潮汛應時。此表欲解而

裏未和也。必大便秘。小承氣湯下 譫語自汗大承氣湯 小

便難。大便澹。小柴胡湯 熱于寅卯屬少陽 巳午屬太陽

○四肢拘急 拘急者。四肢屈伸不便。蹠臥惡寒之貌。乃諸陽

本虧。過汗所致。宜芍藥甘草附子湯。誤謂餘邪。重發汗必死

○下利 雜病下利當屬沉寒傷寒下利多緣協熱如手足冷

脈沉無大熱屬陰寒。用溫經藥。理中湯。如頭疼發熱至四五日

熱邪傳裏。口大渴。頻下穢水。經云。火極反兼水化。若五金火煉亦化如水也

協熱自利。旁流穢汁。桃花湯為丸 如達臍硬痛。舌乾有胎。乃

腸中燥屎未下。六一順氣湯下 熱除利止。俗呼漏底。誤用止

瀉熱藥。肉果殺人多矣 太陽陽明合病下利。先服葛根湯

太陽少陽下利。黃芩湯。嘔甚。加半夏生姜 少陽陽明合病下

利。脈弦長者。木邪尅土也。名曰負。負者死。脈長不弦。餘證皆屬

熱承氣湯下 自利而大渴。白虎湯 裏寒下脫。桃花湯 三

陰下利。先從陽經來者。通脈四逆湯。下利語直視。舌白胎而

滑厥逆。無脈或脈反實者不治

辨別醫案 卷之一 傳經變證 三五

○發斑 熱則傷血。血熱不散。裏實表虛。出於皮膚。為斑。輕如

蚊跡。重如錦紋。或因失汗。失下。或過熱藥所致。已發斑忌汗。若

汗更加斑爛也。消斑青黛飲。兼咽痛。玄參升麻湯 表證多。防

風通聖散。去硝黃 如大便利。短氣肢冷。斑青黑。小建中湯。甚

○短氣 謂呼吸之氣。不能接續也 心腹脹滿。短氣邪在裏

為實。大柴胡下 心腹濡滿。自汗短氣。邪在表為虛。宜桂枝湯

○喘 喘者。表裏不清。邪盛所致也 太陽無汗而喘。宜主方

麻黃湯 陽明失下而喘。承氣湯 陰證喘。理中湯。四逆湯

水停心下。服五苓散

○煩躁 心不安曰煩。身不寧曰躁。心熱則煩。陽實陰虛為熱

輕。腎熱則躁。陰實陽虛為熱重。分虛實治 太陽煩躁宜主方。

陽明內實煩躁。承氣湯。陽明白虎湯 煩躁消渴。宜五苓散

少陰煩躁。脈沉肢冷。自利屬寒。又不欲衣。欲水不能入口。宜中

寒主方。吐利交作。脈如湧泉者死 結胸煩躁。肢冷自利。不得

臥者死 煩躁大渴。點水入口。即嘔不能嚥。宜竹葉石膏湯。或

大半夏湯。加黃連天粉麥冬

○似瘡 寒熱止作有時也 太陽似瘡。桂枝湯 陽明似瘡。

柴葛解肌湯 少陽小柴胡湯 惡寒發熱。日二三度。面赤身

瘰。主方加白朮微汗 婦人經水適來。熱入血室。似瘡。小柴胡

○懊憹 鬱悶惱亂。甚于煩躁也。汗下之不當。正氣內虛。宜梔

辨別醫案 卷之一 傳經變證 三五

子豆豉湯微吐之。胸滿硬，大陷胸湯。陽明有燥屎，承氣湯。

○咳嗽 肺為邪所乘，氣逆不下也。水逆射肺而嗽，大青龍湯汗之。水與裏寒相合而嗽，真武湯溫之。三陰 嗽四逆散 五味乾姜

○腹痛 邪正相搏也。如陽邪傳裏而痛，止作不常，辛劑和之。

小建中湯 陰寒在內而作，悠悠常痛，熱劑溫之，宜理中湯。

○筋惕肉瞤 經曰：陽氣者，精則養神，柔則養筋。發汗過極，陽虛津涸，筋肉失養所致，宜真武湯救之。及溫經益元湯調之。

○陰陽易 謂邪熱之氣變相換易也。如傷寒男病新瘥與婦交而婦反病曰陽易，婦病新瘥與男構而男即病曰陰易。其證身重腹痛，四肢不持，百節解散，宜逍遙湯竹皮湯。夫治男陰挺 女舌出而死

○拂鬱 陽氣蒸越，面赤若醉，汗不徹，主方微汗，便秘承氣湯。

○蛔厥 病人素有寒，而妄發其汗，或過汗，致胃寒不食，食即吐，蛔靜煩上下無定，蛔也。宜理中湯烏梅丸兼黃連、川椒、烏梅。

○狐惑 久病精氣乏，熱積本臟為蟲，蟲食肛曰狐，下唇生瘡，蟲食臍曰惑，上唇生瘡。宜桃仁湯、雄黃散或犀角。地黃湯加 黃連桃仁

○欬逆 即呃 吃忒 餽 纒發聲於喉間而捺止者是也 陽證失下，火熱內鬱，少與承氣下。因汗吐下太過，虛氣衝逆，脈微，橘皮半夏生姜湯加竹茹，虛寒加桂附。或柿蒂湯。方見 胃寒理中湯 呃逆

○渴 渴者，津液為裏熱耗涸也。太陽無汗渴忌白虎，宜小

簡明醫家

卷之一

傳經受證

三

柴胡湯加減 陽明多汗渴忌五苓，宜竹葉石膏湯。少陰自利而渴，導赤飲。汗後渴，白虎加人參湯。先嘔後渴為欲解。

可與水。先渴後嘔為停水，小半夏湯。小便不利，五苓散。散六

○戰慄 六七日邪氣外與正爭為戰，邪內與正氣爭為慄。乃病欲解，不必藥，但宜厚蓋飲姜湯。見用藥 大法

○發狂 熱毒在胃，併入於心，神不安而狂，獨勝尤極所致。非大下不止。有失汗脈洪面赤，微汗之。熱瘀蓄血，上犀角地黃，下桃仁承氣。熱極，三黃石膏湯。陽狂，膽草一物湯與水。飲水與面

○厥逆 初起手足冷，從中寒治。先微熱後寒，亦有陰證。

先大熱後微寒，乃陽邪傳入陰經，四逆散。冷厥，四逆湯。熱厥，白虎湯。若疑似難明，先以小劑理中湯，倍甘草試之。

○汗 初起無汗屬寒，有汗屬風。暑溼，依主方服。汗後惡寒，黃芪建中湯。大汗小便難，五苓散。汗多便秘，承氣湯下。

六汗脈 洪 人參白虎湯。頭汗者，邪搏諸陽，則刺頸而還，不可再汗。熱鬱於內而上達，或吐或下，以去其邪。如大便黑，蓄血也。手足汗者，手足諸陽之本。熱聚胃則津液旁連四肢，承氣湯下。

盜汗者，睡出醒收，柴胡桂枝湯。或當歸六黃湯。方見 盜汗

○大便秘 經曰：脈浮而數，能食不大便為實。名曰陽結。大柴胡湯。甚者，承氣湯。脈沉而遲，身體重，大便反鞭，名曰陰結。金液丹。甚者，從陰證治。發汗利小便，津耗，但宜蜜導，或猪膽法。

簡明醫家

卷之一

傳經受證

天

多日熱秘。小承氣。透臍硬痛。大承氣急下。臟結而厥。逆

湯冷服。三下不通。吐以提之。虛者。皂莢燒烟薰大便通。標

稠灰煎湯洗亦通。或炒鹽熨臍下。冷結不通。先服理中湯。次

小便澀。熱邪聚於下焦。結而不散。脈浮五苓散。脈沉導赤

飲。不通。五苓散合六一散。加梔子。汗後。汗多。戒利小便。

○壞證。十餘日猶大熱。口燥舌胎。諸藥不効。謂之壞證。不可

治。用藥全以苦寒清熱之餌。殊不知陰氣愈泄。熱可退乎。蓋受

病之始。由寒傷榮。當以調榮養血。壯水滋陰之品。大劑日數服

乃安。經曰。壯水之主。以振陽光。宜鱉甲散未効。歸地。養榮湯更兼苦參湯

○百合。謂百脈一宗。病久臟腑不平也。似寒非寒。似熱非熱。

簡明醫教 卷之一 傳經變證 五

欲食不食。欲卧不卧。不知所以。舉身俱痛。柴胡百合湯

○瘥後昏沉。初愈錯語少神。屬氣血虛。似瘥可微汗。日輕

夜重。宜歸地芍參芪麥冬知母。餘熱遺胞絡。導赤各半湯。

○勞復。新瘥略有勞煩。憂怒復病。小柴胡湯加減。復感風

寒。微汗之。復見胸滿腹痛大便秘。微下之。犯房室。方見陰陽易

但初病易治病後元氣已虛。易於感病而難治。患人多壞於此。

○食復。臟腑受傷。脾胃尚弱。不能健運。多食觸助餘熱。仍以

小柴胡湯。加山查神麩麥芽砂仁消食。腹脹。枳實厚朴陳皮。白

○熱入血室。婦人衝脈為血海。得熱則妄行。寒熱作而似瘧。

晝靜夜劇。如見鬼祟。小柴胡加丹皮赤芍合四物。婦未安。期則

○胎前。血能養胎。涼則固而熱則行。熱邪傳裏。後胎為主。宜

條芩白朮兼清涼。毋活血。毋耗氣。則胎氣無犯。外用井底泥

靛青。竈心土。頻敷臍腹。遇大滿大實證。黃龍湯下。大黃可。芒硝

○產後。雖云產後宜補。如感冒風寒。仍宜主方輕表微汗。不

可大汗。食積遇下證。大柴胡輕劑攻之。邪去兼補。產後風邪易後謹防為要

○小兒傷寒。治療悉與大人同法。但劑輕小耳。傷寒藥酌

傷寒陰。陽表裏。虛實寒熱。辯認不真。慎勿妄治。所謂不藥為中

醫。病邪傳盡。自能氣復。而安。誤用藥必死矣。聖人憫生。民病苦

而醫藥興。若不能精明。至理而妄治。是不死於病。而死於醫也。

○辯證大要。頭疼骨痛。身熱惡寒。屬太陽。宜發散表邪。按其

簡明醫教 卷之一 辯證大要 三

胸腹脹滿。兼消導食積。如口燥鼻乾。目痛不眠。屬陽明。宜解肌

胸寬而大便秘。宜攻下。如寒熱口苦。脇痛耳聾。屬少陽。宜和解

如前一經之證未罷。又見一經之證。名併病。如見兩經之證。名

二陽合病。如手足冷。脈沉。乃陰證也。尤宜驗舌色。傷寒切要分

別。表裏陰陽寒熱虛實八字。生死係焉。舌色紅潤。屬表。屬陰。屬

寒。屬虛。舌乾有胎。屬裏。屬陽。屬熱。屬實。如舌青紫。陰寒也。泥色

虛極也。舌乾白胎。邪初入裏也。黃胎熱甚。黑胎如芒刺。或捲縮

極熱也。凡面赤病熾。面目黃色。病已。舌無胎。結成乾赤。光皮。似

煨熟猪腎。乃陽中伏陰也。舌胎黑而溼滑者。臟結證也。舌胎黃

燥。足冷脈沉。亦非純陽證。切忌硝黃

○察脉大要 傷寒之脉浮大動滑數屬陽沉澁弱弦微屬陰

陰證見陽脉者生陽證見陰脉者死外感內傷之脉最宜察

緊盛受風寒氣初病脉浮無有力為傷寒有不浮者一手無脉

曰伏略有頭疼發熱表證悉具即當主方發汗乃憑證不憑

脉也。有熱邪傳裏脉必沉沉滑有力為裏實沉滑無力為裏虛

間有脉沉微無力者但口渴便秘身大熱手足溫實熱證悉具

亦當大柴胡湯微下也陰證脉沉遲微細無力為虛為寒為臟

病宜甘溫補益或辛熱溫散陽證脉浮洪實數有力為實為熱

為胃腑病宜甘寒清解或苦寒下泄虛證脉浮芤細數無力為

表虛宜參芪桂芍以實表沉瀉微弱無力為裏寒宜參朮姜桂

簡明醫教 卷之一 察脉大要 三

附子溫裏實證脉洪大滑數有力如斑狂譫語之證為在經宜

三黃石膏湯或白虎湯清利若便秘舌胎之證為在腑宜服大

柴胡湯或承氣湯攻下

○用藥大法 初感發熱頭疼骨痛項強拘急惡心有食積先

宜淡鹽湯吐之不吐藥兼消導厚蓋臥腿足裏烘極煖次服藥

主方 羌活 蒼朮 防風 川芎 白芷

黃芩 生地黃 甘草 北細辛

右加生姜三片葱頭三個水煎二次熱服取汗出至足即愈

天涼減生地黃黃芩加紫蘇 胸滿有食積加山查

麥芽 神麴 夏月大熱主方加石膏 知母

脉浮緊無汗惡寒屬寒傷榮宜發表散邪出汗安 依主方

脉浮緩有汗惡風屬風傷衛宜實表疎邪止汗安 依加減

減蒼朮 加白朮 微汗蒼白 汗

多去蒼朮加黃芪 有食查芽麴 汗不止加芍藥直錢

右二方春分後至霜降用 如霜降後天暖亦用

冬月正傷寒脉浮緊無汗惡寒頭疼骨痛發熱宜發汗麻黃湯

減蒼朮生地黃芩細辛 加麻黃 桂枝 杏仁 升麻

姜葱查芽麴 食不消將所傷之物燒灰服 更用姜 桂枝湯

冬月正傷風脉浮緩有汗惡風頭痛春強發熱宜止汗 桂枝湯

減蒼朮地芩辛慈 加桂枝 赤芍 白朮 查芽麴

簡明醫教 卷之一 傷寒 三

右二方霜降後至春分用 如春分後天寒 及有麻七桂三

兩感傷寒因口傳陰陽兩經表裏俱病故為死證冲和靈寶

主方減蒼朮慈加柴胡葛根石膏棗 黑豆 煎服取微汗

次依兩感論調治 凡服麻黃桂枝藥面赤身癢汗不出者用

紫蘇姜葱煎湯熱飲助汗 已有汗切勿過表 前發表四方

服後頭疼骨痛拘急皆減惟熱未盡退四時可接服柴葛解肌

湯疎餘邪退熱則不傳陽明少陽也 如再有餘熱宜小柴胡

湯加減清之胸猶未寬加黃連枳實瓜蒌仁兼姜葱切切勿早

用大黃必待胸中食積消化挨下至臍腹間方可攻之 如邪

熱漸傳陽明口大渴熱不解如神白虎湯 若胸寬惟臍腹硬

痛。大便秘。宜大柴胡湯下之。甚至熱邪傳入陽明之本。大渴引飲。舌上白胎。漸變黃黑。謔言狂亂。揚手擲足。揭去衣被。唇焦睛紅。小便赤短。大便秘結。或直泄清水。乃協熱自利。芎流穢汁。腸中燥屎未下。宜六一順氣湯。小便不通。五苓散合六一散。加梔子燈心。若燥硬宿糞已下。熱雖減未清。小柴胡加減。熱甚者。涼膈散。黃連解毒湯之類。退餘熱。有伏陰證。及婦人邪。傳衝任血海。舌如煨熟猪腰子。服小柴胡。涼膈散之類。如不効。宜歸地養榮湯滋養。有虛人病至七八日。忽發寒戰。悚身大冷。乃邪正相攻。急宜厚蓋火烘極煖。用生薑數兩搗細。泡湯一壺。放病人懷中頻飲。以助正勝邪去。汗出熱除。如多日猶

簡明醫數 卷之一 傷寒 三

大熱大渴舌胎。服諸退熱藥不効。為過經不解。名壞證。宜鱉甲散歸地養榮湯調理。如病已退。神昏懶言。短氣無力。參芪歸地白朮茯苓麥冬五味棗仁遠志之類。補益氣血。安養心神。健脾助胃。隨餘證加減。

○如暴感風寒輕淡之證。以十神湯至參蘇飲八方採用亦可。又有發表藥二三劑汗不出。乃陽虛不能作。勿強發。宜再造飲。有身熱頭疼。不煩便躁。面赤飲水不能入口。名戴陽證。宜益元湯。無頭疼惡寒。惟身熱渴。大便黑。口無倫。邪傳心脾。名挾血。如見崇。當歸活血湯。有頭疼身熱。惡寒微汗。身痛腿脚酸疼無力。沉倦脈空。誤發大汗為害。此名勞力感寒。宜調榮養衛湯。

有因過發汗出不止。宜溫經益元湯。患人又手冒胸。尋衣摸牀。乃熱乘肺經。宜升陽散火湯。病後無熱。二便清利。神思漸昏。不語或獨語。目赤唇焦不飲水。與稀粥則嘔。乃邪傳心經。導赤各半湯。

傷寒方法 通計壹百貳拾

主方 總合治足太陽膀胱經初感春溫夏熱秋溼冬寒等證散邪發表隨證用 大青龍湯 加味麻黃湯 加味桂枝湯 羌活沖和湯 加減沖和湯 桂麻各半湯 沖和靈寶飲 十神湯 時令不正瘟疫矣行。發熱頭疼。咳嗽無汗。陰陽兩感 麻黃 川芎 甘草 乾姜 紫蘇 升麻 赤芍 各壹錢 白芷 陳皮 香附 各六分 姜五蔥三煎服取汗

簡明醫數 卷之一 傷寒 三

不換金正氣散 傷寒嵐瘴。商旅遠方。不伏水土。霍亂吐瀉。諸 蒼朮 陳皮 藿香 半夏 厚朴 各壹錢 甘草 五分 右姜棗水煎服

神木散 四時傷寒發熱。頭疼項強。咳嗽鼻塞等證 蒼朮 羌活 白芷 川芎 藜本 各七分 甘草 北細辛 各五分 右加生薑三片葱白三莖水煎熱服取汗 香蘇飲 傷寒疫癘時氣。胸滿嘔逆 紫蘇 香附子 陳皮 各貳錢 甘草 七分 右加姜棗水煎服 對金飲 即平風寒溼氣嵐瘴霧露。霍亂吐瀉。不服水土。膈滯服 蒼朮 厚朴 陳皮 各六分 甘草 四分 右加木香砂仁尤佳為

冲和散 寒温不常陰晴時作客途旅即將理失常頭疼拘急

蒼木雨荆芥 甘草各七錢為木每三錢姜棗湯下煎亦可

敗毒散 四時不正之氣天行疫癘妊婦傷寒方見靈疫土方

蘇飲 感冒風寒發熱頭疼咳嗽聲重流涕有痰胸滿方見傷風

大羌活湯 治兩感傷寒

防風 羌活 獨活 防己 黃芩 黃連

蒼朮 白朮 甘草炙 細辛各五分 知母 川芎

生地各錢半 水煎熱服不解再服見効則止餘證依兩感論

柴葛解肌湯 服藥汗出表證已除熱猶未退四時可接服此湯

柴胡錢葛根 黃芩各錢半 羌活 白芷 芍藥

簡明醫案 卷之一 傷寒 壹

桔梗各壹錢 甘草五分 右加姜三片棗二枚水煎服 口渴加石

膏汗出不透徹猶頭疼骨痛春秋加柴胡夏秋加紫蘇 胸滿加山查麥芽

小柴胡湯 少陽寒熱往來口苦脇痛耳聾和解餘熱

柴胡錢黃芩錢 半夏 人參 甘草各壹錢 姜棗煎服

柴胡桂枝湯 本方加桂枝 柴胡雙解飲本方加芍藥陳皮

小便澀加茯苓 嘔加姜汁竹茹 脇痛加青皮 痰加瓜

萎貝母 似虛加桂 渴加天粉知母甚加石膏 嗽加五

味子金沸草 胸滿未可下加枳實桔梗黃連瓜蒌効少

陽陽明合病加葛根芍藥 如神白虎湯 身熱大渴有汗不解或汗後舌乾脉微洪中暍

石膏五錢知母錢 甘草壹錢 加麥冬錢 梔子半錢 人參七分

五味子十五粒 加姜一棗一竹葉廿片背寒去梔加天粉心煩

三黃石膏湯 傷寒汗不暢發熱脉大表裏皆實陽盛拂鬱或

醫謂汗後不解復下之致大便頻小便澀目紅面赤齒黃大

湯或已下脉數身熱拘急解表清裏

石膏五錢黃連 黃柏 黃芩 梔子各壹錢 豆豉半合

麻黃冬壹錢夏五分 水煎服未効再服如神汗下誤治後三焦生熱

脉洪語喘息鼻衄熱不解身目黃狂叫欲走或過經壞證

三黃巨勝湯 陽毒斑狂渴目赤脉大氣喘便燥古卷囊縮

石膏湯去麻黃豆豉加大黃芒硝姜一棗一煎服入泥清水

簡明醫案 卷之一 傷寒 三六

小陷胸湯 小結胸脹悶按之而痛

瓜蒌錢半夏錢 黃連錢 右先煎瓜蒌次入半夏黃連煎熱

服 口渴去半夏加枳實

大陷胸湯 大結胸滿實不按而痛兼用熨法或六乙膠氣湯

大黃錢芒硝壹錢 甘遂末壹分 水煎成內硝滾一沸入甘遂分

大柴胡湯 內實大便難身熱不惡寒反惡熱有下證先用此

柴胡錢黃芩 芍藥各貳錢 半夏 大黃各壹錢 枳實八分

右加生姜五片黑棗二枚水煎熱服 渴減半夏加天花粉

調胃承氣湯 太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘用承氣湯先

大黃壹錢甘草 芒硝各五分 煎成去渣入芒硝滾一沸服

小承氣湯 五六日不大便，胸腹脹滿，陽明無表證，潮熱狂言。

大黃 厚朴 枳實 芒硝 右水二鍾，煎八分，熱服，得利止。

大承氣湯 六七日大便秘，腹滿煩渴，少陰口燥，日晡熱，脈實。

大黃 厚朴 枳實 芒硝 右先煮厚朴枳實減半，下大黃，滾數沸，次下芒硝，液服。

三乙承氣湯 三湯證兼有，此湯合治。及中風僵仆，風癩發作。

大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘草 加姜三片，煎服。

六乙順氣湯 熱邪傳裏，代大陷至大承三乙承氣等六湯神。

藥大便秘，或協熱自利，口乾怕熱，揭衣揚手，斑黃，腹滿，硬屎。

大黃 厚朴 枳實 芍藥 黃芩 柴胡 煎服。

芒硝 甘草 右水二鍾，滾三沸，入衆藥，煎至八分，次下芒硝，滾一沸，臨服入鐵秀水三匙。

桂枝大黃湯 太陰腹痛，渴，肢溫，脈沉有力，熱邪陽經傳入。

大黃 芍藥 桂枝 甘草 加柴胡、姜、棗，煎入內服。

茵陳大黃湯 太陰腹滿，身目黃，小水不利，大便實，渴，頭汗，際。

大黃 茵陳 梔子 黃芩 枳實 厚朴 煎服。

甘草 右加燈心水煎服。

桃仁承氣湯 小腹滿痛，小便利，大便黑，有蓄血，下盡黑血愈。

桃仁 大黃 桂枝 芒硝 芍藥 煎服。

右加當歸芍藥青皮枳實柴胡水煎服入硝。

黃龍湯 大便秘，或利清水，乃日飲湯藥也。宜急下，如虛長年，婦不勝下，用此湯。

大黃 芒硝 人參 厚朴 枳實 當歸 煎服。

附子瀉心湯 心下痞，惡寒汗出，有陽證，仍在，又見沉足冷，身重，死證，或姑以此湯漸試。

附子 大黃 黃連 黃芩 煎服。

陽毒升麻湯 陽毒發斑，狂言吐血。

升麻 犀角 射干 黃芩 人參 甘草 煎服。

青黛一物湯 陽毒發斑，青黛，右水研服，効。

玄參升麻湯 發斑咽痛，玄參升麻甘草，右水煎服。

升麻六物湯 口瘡，升麻 梔子 大青 黃芩 杏仁 加葱煎服。

消斑青黛飲 邪熱傳裏，失下，裏實表虛，血熱為斑，便秘短氣。

黃連 犀角 玄參 石膏 山梔 知母 煎服。

生地 青黛 柴胡 人參 甘草 煎服。

生地 黃芩 黃連 山梔 犀角 川芎 煎服。

芍藥 桔梗 柴胡 甘草 煎服。

桂苓飲 初病無熱，狂躁不安，乃熱結膀胱，名如狂證。

桂苓 澤瀉 桂枝 白朮 知母 黃柏 煎服。

山梔	甘草	茯苓	滑石 <small>各壹錢</small>	加姜 <small>三片</small> 煎服取微汗
導赤飲	治小便不利。即桂苓減知母黃柏。加燈心。汗後 <small>汗多則</small>	再造飲	頭疼發熱。表汗藥汗不出。勿妄發。乃陽虛不能作汗	
黃芪	人參	桂枝	川芎	附子 <small>製</small>
羌活	防風 <small>各壹錢</small>	甘草 <small>分十</small>		
加生薑五棗二煎成入炒芍藥滾三沸服夏加黃芩石膏				
益元湯	身熱頭疼。不煩便躁。面赤欲水不能入口。乃元虛火	泛。名戴陽證。若誤服涼藥者必死		
附子 <small>熟</small> 人參	乾姜	甘草 <small>分</small>	麥冬	黃連
五味子	知母 <small>分</small>	加葱艾姜棗煎成入童便三匙頓冷服		
簡明醫教	卷之一	傷寒	五九	
當歸活血湯	無頭疼惡寒。惟身熱口渴。小便利。大便黑。口語	無倫。乃邪傳入心脾。或如見鬼祟		
當歸	赤芍	生地	柴胡	人參
枳殼				
乾姜	紅花 <small>酒</small>	桂心	甘草	桃仁 <small>分</small>
右水煎服後去桃仁紅花乾姜桂心加白朮茯苓煎服				
導赤各半湯	病後胸腹寬。二便利。 <small>身無熱神漸昏不飲水與稀粥則藥乃邪傳心經</small>			
黃連	梔子	黃芩	滑石	甘草
知母				
犀角	茯神	麥冬	人參 <small>分</small>	右加姜棗燈心水煎服
調榮養衛湯	頭疼身熱惡寒微汗。 <small>脚軟倦脈空浮乃勞力內傷氣血外感寒邪藥大汗</small>			
當歸	生地	川芎	柴胡	防風
羌活				

陳皮	白朮	人參 <small>加</small>	黃芪 <small>分</small>	細辛	甘草 <small>半</small>
右加生薑三片葱白三莖棗二枚水煎服					
升陽散火湯	又手冒胸。尋衣摸牀昏沉。乃熱乘 <small>肺氣虛小便</small>	人參	當歸	柴胡	芍藥
黃芩	麥冬				
白朮	茯神	陳皮 <small>分</small>	甘草 <small>分</small>		
右加姜棗金與銀煎服	痰加半夏便秘加大黃				
犀角地黃湯	失汗。上焦瘀血。漱水不欲嚥。大便黑等證	生地 <small>錢</small>	丹皮	芍藥	犀角 <small>各壹錢</small>
右加陳皮桔梗當歸紅花甘草水煎入藕節汁服					
茅花湯	鼻血不止	茅花 <small>一把無用根</small>	右水煎服		
簡明醫教	卷之一	傷寒	早		
地榆散	傷寒熱毒不解。晚即壯熱。腹痛便膿血	地榆	犀角 <small>無用升麻</small>	黃連	茜根
黃芩	右水煎成入芒硝三分服				
延胡索散	尿血	延胡索 <small>錢</small>	右水煎成入芒硝三分服		
溫經益元湯	過汗不止。肉瞶筋惕。亡陽衛虛。及下後利不止	熟地	生地	白朮	黃芪
甘草	芍藥				
當歸	人參	茯苓	薄桂 <small>分</small>		
右加姜棗糯米煎服	胸滿加陳皮枳殼	虛甚加附子			
如聖飲	剛柔二症。頭搖口噤。身反張。手足攣搐。面赤。癰瘰。同	羌活	防風	川芎	白芷
柴胡	芍藥				
當歸	烏藥	半夏	黃芩 <small>分</small>	甘草 <small>分</small>	右加姜煎

入竹瀝姜汁服 有汗剛瘧。加白木桂枝。無汗加蒼朮麻黃

逍遙湯 初愈交接媾慾。名女勞復無病者。反得病名。陰陽易

人參 知母 黃連 滑石 生地 柴胡

犀角等減 甘草減 右加菲根竹青剉取 同姜棗煎入視襠末

一錢五分調服有粘汗出愈無汗再服

燒裨散 取裨襠近隱處一方燒灰錢半服男用 或只竹青煎

猥鼠矢湯 雄鼠屎十四粒 韭根一大握。水煎服。必取汗安

柴胡百合湯 瘵後昏沉發熱渴錯語失神。及百合勞復等證

柴胡 人參 黃芩 百合 生地 知母

陳皮等減 甘草減 右加姜棗鱉甲水煎服 渴加天粉 熱

簡明醫彙 卷之一 傷寒 聖

加梔子 嘔加半夏 胸滿加枳殼桔梗 煩加竹葉

回陽返本湯 陰盛格陽。陰極證。回陽救急湯治陰證中寒主方

附子梨 乾姜 麥冬 人參 陳皮各壹錢 甘草七

五味子九 臘茶一撮 右水煎成入蜜五匙。頓冷服。取汗為効

真武湯 陰證脉沉身痛。發汗過多。肉腠筋惕。少陰咽痛

茯苓 芍藥 附子各壹錢 白朮錢 右加生薑三煎分二服

通脉四逆湯 厥逆下利。脉不至方見中寒 面赤加葱 嘔加生

姜 咽痛加桔梗 利止脉不出加人參

三建湯 元虛冷證 天雄 附子 川烏等分 右水煎服

三建湯 甘草 升麻 當歸 桂枝雄黃蜀椒各壹錢 紫甲叁錢 水煎服

麻黃附子細辛湯 少陰發熱脉沉身痛等證

麻黃 細辛各壹錢 附子壹錢 右水煎服取微汗出安

麻黃附子甘草湯 少陰無表裏證

麻黃錢 附子 甘草各壹錢 右水煎服

四逆散 少陰四逆或咳或悸或小便不利腹痛等證

甘草 枳殼 柴胡 芍藥各五錢 為細末每服錢湯

大半夏湯 傷寒痰證 茯苓半夏 各五分 加生薑煎服

小半夏湯 水結胸 赤茯苓參 半夏四分 水煎入生薑汁服

大橘皮湯 嘔噦煩滿 陳皮 甘草 人參各貳錢 加姜煎服

小橘皮湯 嘔噦肢冷 陳皮五錢 生薑兩 右水煎服

簡明醫彙 卷之一 傷寒 聖

橘皮竹茹湯 痰逆惡寒

陳皮五錢 人參錢 甘草錢 加竹茹生薑水煎服

橘皮乾姜湯 咳逆噦惡 陳皮 通草 乾姜 人參等分

枳桔湯 少陰咽痛 桔梗貳錢 甘草五錢 右水煎服

枳實湯 痞證胸滿 枳實 枳殼各伍錢 右水煎服

小建中湯 少陰惡寒手足踈而溫

桂枝 甘草各貳錢 芍藥錢 右加姜三棗二水煎入怡三匙服

黃芪建中湯 身痛尺脉遲汗後脉弱 加黃芪錢 餘同

黃芩湯 陽明協熱自利 太陽少陽合病下利

黃芩錢 白芍錢 甘草各壹錢 加棗二枚煎 嘔加半夏壹錢

竹葉石膏湯 陽明汗多而渴渴欲飲水飲入即吐及病後渴

石葶麥冬 人參 甘草 半夏 竹葉 水二鍾半煎鍾半入粳米一撮煮米熟去查入生薑

梔子豉湯 吐下後心中懊憹身熱不去心中痛

肥梔子 香豉 水二鍾煮梔子至一鍾內政煮

桃花湯 少陰下利膿血溫毒下利

赤石脂 乾姜 糯米 右水二鍾煮米熟去查取半盃調脂末二錢服日三服

烏梅丸 蛔厥 烏梅 細辛 附子 人參 黃柏

桂枝 乾姜 黃連 蜀椒 當歸

簡明醫說 卷之一 傷寒 三

右為末醋煮加蜜搗和丸桐子大每服三十九白湯送下

整中散 十餘日頭疼骨痛惡寒表證悉除胸腹全寬二便皆

通小柴胡 白虎涼膈等藥盡服惟身熱口渴渴舌胎名曰壞證

鱉甲 升麻 前胡 烏梅 黃芩 犀角

枳實 生地 甘草 右水煎服未効服養榮湯

歸地養榮湯 壞證身熱口渴渴舌胎及舌如煨熟猪腰子

當歸 生地 鱉甲 麥冬 芍藥 青蒿

阿膠 五味子 加枳朮 芍藥 燈心

右煎成烱化阿膠服日二三劑 甚者人中黃人中白研細

各一錢調服 加知母地骨皮苦參亦可 虛人加人參黃

芪炙甘草 患人服藥安臥竟日熱除渴止

苦參湯 傷寒大熱多日及時疫 苦參 煎服練樹子亦可

桃仁湯 失汗狐惑 桃仁 槐子 艾 棗 水煎服

雄黃散 唇瘡聲啞 雄黃 青箱子 苦參 黃連

桃仁 右為末生艾汁蜜和如小指綿裹內下部中

白頭翁湯 治腸垢協熱自利 渴而下利

白頭翁 黃蘗 黃連 秦皮 右水煎服

大青龍湯 傷寒見風傷風見寒 太陽無汗脈浮緊煩躁服

麻黃 桂枝 甘草 杏仁 石膏 服取微汗出

葛根湯 太陽無汗惡風 剛瘧 太陽陽明合病

簡明醫說 卷之一 傷寒 四

葛根 桂枝 芍藥 甘草 麻黃 煎服取微汗

芍藥附子甘草湯 汗下後惡寒拘急切戒再汗

芍藥 附子 甘草 右水二鍾煎八分去查服

荷皮半夏生薑湯 咳逆 卽小橘皮湯加半夏

獨參湯 氣虛脫陽等證 及吐血去多孤陽不 人參 煎服

瀉草一物湯 及黃連百合青木香之類凡一物者單味煎服

參蘇飲 傷風 五苓散 藿香正氣散 二陳湯 六一散

涼膈散 黃連解毒湯 茵陳五苓散 卽五苓加茵陳

防風通聖散 見中風 四逆湯 柴胡四逆湯 並見中寒

密導法 自汗大便秘或虛老不勝攻下 蜜一盃銅杓熬如

飴勿焦捻作挺如指內肛門中即通 加皂角末尤効

猪膽法 陽明自汗小便利勿攻 大猪膽入醋少許煎膏乳

香油法 甚有日久不解多以香油灌穀道至鼻中油氣即通

薰陰毒 大豆或升炒 極熱先桶內置熟醋或升 扶病人坐桶上薰

葱熨法 陰毒以索纏葱白如臂大切去根及背先以火熨一

姜葱熨 傷寒初起必有食積先按患人胸腹略覺脹悶作痛

即是病時飲食停滯變成結胸殺人及諸結胸痞滿等症凡

男婦老幼食積氣滯痰凝冷痛悉効 用生姜葱連殼菜另

切搗細麻布絞汁并置一處聽用 二查內入鉛粉煎兩沸

研勻起油鍋炒極熱布包着實順氣揉熨脹處先隔布次貼

簡明醫教

卷之一

傷寒

聖

肉重熨如冷拌入姜葱汁調勻 少許 炒又熨多次全暢為度

陰毒灸法 乾艾搓軟豎筋頂上捺成柱灸開元二百壯方以

陽毒漬法 內外結熱舌捲唇焦鼻孔如煤用青布以新水漬

淫搭于患人胸腹燥再漬以手足浸水患人要飲水可與飲

嗽咳逆 硫黃乳香研末入瓶充熱酒入患人嗽或雄黃調服

灸期門 呃逆婦人熱入血室婦起乳房處男乳下一寸動處

撲汗法 汗多不止 白朮藁本川芎白芷等分為小米粉對

蒸汗法 薪火燒地熱透去火洒水鋪蠶沙相葉三寸厚不足

桃葉糠麩湊之放蓆令患人卧厚蓋令汗至足凡服藥取汗

灸結胸 黃連或寸 為末巴豆肉七 粒搗入黃連末捻作餅放臍中灸

暑證 附中 暑風 注夏

經曰夏至後病熱為暑又曰脉虛身熱得之傷暑蓋暑時相火

司令炎熱盛行感受為病則有陰陽動靜之殊如勞役辛苦之

人于烈日酷暑中作勞奔走致之者是動而得之中熱之陽證

也其病必苦頭眩煩躁惡熱齒燥舌乾捫之肌膚烙手大渴引

飲汗大泄無氣以動乃暑熱外傷元氣也宜清涼之劑益元散

黃連香薷飲虛者清暑益氣湯生脉散之類如富貴安逸之士

于溪堂廣廈中乘風取涼致之者是靜而得之傷暑之陰證也

其病必頭疼骨痛惡寒形體拘急心煩胸滿發熱無汗乃陰寒

閉塞陽氣也宜辛溫之劑藿香正氣散見二 縮脾飲甚者理中

簡明醫教

卷之一

暑證

四十六

湯方見 加附子之類中熱脉虛大傷暑脉弦緊

主方 治傷暑 乾薑 厚朴 蒼朮 茯苓 陳皮

枳殼 羌活 白芷 甘草 加姜葱煎服取汗

頭痛加川芎壹 細辛 伍分 食積加山查麥芽

十味香薷飲 治中熱口渴或吐或瀉一切暑證

香薷 厚朴 扁豆 人參 白朮 茯苓

陳皮 黃芪 木瓜各壹 錢 甘草伍分 右水煎冷服 熱甚

加黃連 渴甚加石膏知母

益元散 即六一散 治中暑身熱煩渴泄瀉小便不利白濁痢疾

能燥溼去熱利水實脾化食行滯逐凝血清火邪之聖藥夏

月遠行不可缺。小便赤少合五苓散方見便尿

滑石水飛兩 甘草末壹兩 研勻每服二錢不拘時燈心湯調下熱湯新汲水下

清暑益氣湯 治中暑汗出喘急無氣以動懶言

蒼朮 黃芪 升麻各壹錢 人參 白朮 陳皮

麥冬 神麩 澤瀉各伍分 黃栢 當歸 青皮

葛根 甘草各叁分 五味子九粒 右水煎服

縮脾飲 解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

乾葛 白扁豆炒 甘草各壹錢 烏梅肉 砂仁 草果各伍分

右剖水煎冷服

生脉散 生津益氣潤肺養心夏月陰內陽外煩渴宜服

簡明醫彙 卷之一 中腸 四十七

人參壹錢 麥門冬貳錢 五味子九粒 右水煎不拘時服

簡便方 治中暑 車輪上土水調澄飲或掘地坑注水開澄取水飲

又方 大蒜熟土研爛水調去查服 又 水蓼煮汁灌之

又方 絲瓜葉壹片 白鹽梅壹個 連仁 共研細新汲水下治中暑霍亂

法 冒暑倒仆者若飲水即死宜移置陰涼處掬途間熱土於

臍上作窩眾人尿窩中更以童便灌之次以前地漿水飲徐

徐扇之乃甦

○中暈 其證身熱頭痛微寒拘急舌燥生胎前板齒燥大渴

煩躁乃熱傷膀胱經也

主方 石膏貳錢 知母壹錢 人參伍分 麥冬 香薷

梔子 芍藥 茯苓 白朮 扁豆各壹錢 陳皮八分

甘草伍分 右加烏梅壹個 蓮肉七個 水煎服腹痛胸滿吐瀉忌石膏

○暑風 因火熱之氣尅制肺金不能平木搐搦卒倒不省人事名曰暑風亦有因痰火氣鬱而倒者宜吐痰法見清風中風

主方 羌活貳錢 黃連壹錢 香薷壹錢 扁豆 厚朴

陳皮 茯苓各八分 水煎服 痰加南星半夏氣加枳殼桔梗

○注夏 夏初頭眩身倦五心煩熱神昏多睡口苦舌乾飲食

減少胸膈不利脉數無力乃陰虛血少元氣不足

主方 人參伍分 白朮 茯苓 當歸 白芍

熟地 麥冬各壹錢 黃栢壹錢 知母 陳皮各七分 甘草叁分

簡明醫彙 卷之一 暑風 注夏 四十八

五味子十粒 右加棗二枚烏梅一個水煎服 少食嘔吐加藿

香砂仁白蔻去當芍地栢知 泄瀉加山藥澤瀉去當栢等

行動無力加牛膝杜仲 有汗少睡加黃芪棗仁煎成調味砂壹錢服

溼證附身重

經曰諸溼腫滿皆屬脾土又曰溼勝則濡泄又曰地之溼氣感

則害人皮肉筋骨蓋溼氣侵人有從外人有自内生外入者感

山嵐之瘴氣受陰雨之溼潤江海地卑居處泥地履之則溼氣

客於腠理滲走皮膚泛溢經絡致頭痛目眩自汗拘急骨節酸

疼四肢困倦其脉浮緩治宜滲溼為主而略兼發散內生者酒

醪厚味瓜果生冷溼麪乳酪多飲湯液留積於胃脾土虛弱土

不制水浸漬肌肉。致面目浮腫。胸滿喘急。大便澹泄。小便短澀。腿膝附腫。其脈沉緩。治宜理脾為主。而兼利水。所謂治溼不利小便。非其治也。

主方治外感 蒼木 紫蘇 羌活 乾葛 防風

川芎 藁本 柴胡各八分 升麻 甘草各參分

右加生姜三片。黑棗一枚。水煎服。微散外邪。有內邪後。參用利水實脾湯。治溼由內生。通利小便。

蒼木 白木 茯苓 陳皮 猪苓 澤瀉

滑石 香附 撫芎 厚朴 砂仁各八分 甘草參分

右加生姜三片。燈心二十枝。水煎食前服。發腫氣急。加腹

簡明醫聚 卷之一 溼證 四九

皮枳殼蘇子桑皮蘿蔔子去白木甘草 面目虛浮加山藥

芍藥去撫芎 實人先以神佑丸下之方見痰門

二木四苓湯 治諸溼腫滿一身盡痛發熱煩悶二便不利

白木 蒼木 茯苓 猪苓 澤瀉 羌活

芍藥 梔子各等分 甘草減半 右加姜三片。燈心。甘枝。水煎服。

除溼湯 治中溼身體重著。腰腿痠疼。大便溼。小便澀。或利。

蒼木 半夏 厚朴 茯苓各錢半 陳皮七分 藿香

炙甘草各五分 右加姜七片。棗二枚。水二盞。煎八分。食遠服。

羌活勝溼湯 治春痛項強。腰如折。項如拔。上冲頭痛。乃足大陽經不行。此藥主之。

陽經不行此藥主之

羌活 獨活各錢 藁本 防風各錢 蔓荊子 川芎

炙甘草各四分 右水 盞煎八分。食後溫服。

溼溼湯 治坐臥溼地。雨露所襲。身重脚弱。關節疼痛。發熱惡寒。小便不利。大便澹泄等證。

人參 白木 茯苓 甘草 附子炮 乾薑炮

桂枝 芍藥等分 右加薑三片。棗一枚。水煎。不拘時服。

簡便方 感溼鼻塞。腦痛黃腫。

甜瓜蒂為末。口合水吹三分入鼻中。流出黃水。効。

又方 治一切風溼痺。四肢拘急疼痛。

蒼耳子去刺為末。三兩水二鐘半。煮二鐘。去查。呷服。

簡明醫聚 卷之一 溼證 五十

又治風溼 檳木皮。厚煎水洗。又 小便不利。茵陳蒿木通煎服。

又方 煮赤小豆。連汁。喫一日。勿飲食。効。

又方 寒溼疼痛。用薑汁半碗。米醋一盞。水膠四兩。熬稠。用肉桂。花椒。皂角。木各一兩。攪成膏。絹布攤貼患處。包煖烘熱。止痛。

○身重 經曰。肝虛腎虛。脾虛。皆令體重。煩冤。由氣血不能克。

暢四肢。沉重。食後昏悶。治宜補脾益腎。理元氣。

主方 黃芪錢 人參 甘草錢 陳皮 青皮各伍分

當歸 黃柏酒炒 升麻 柴胡各參分 神麴十分

右水煎加燈心

燥證

經曰諸澁枯涸乾勁揭絨皆屬於燥若皮膚裂屑乾疥爪枯之類為燥病之表證大便秘結消渴引飲之類為燥病之裏證脈芤而虛宜滋陰養血脈澀而弱宜益腎壯水更察表裏緩急分治如脈浮而弦乃風勝其溼潤兼治風脈洪而數乃火熯其津液兼治火臨證詳審

主方 黃芩 黃芪 各壹錢 天門冬 麥門冬 各壹錢

當歸 生地 熟地 各貳錢 棗仁 桃仁 各伍分 五味子 九

紅花 升麻 水煎服 大便燥加麻仁 郁李仁 杏仁 不

潤腸丸 治脾胃伏火大便秘澁全不思食宜潤燥和血疎風

麻仁 郁李仁 桃仁 各壹錢 當歸尾 羌活

簡明醫教 卷之一 燥證 五十一

防風 秦艽 山藥 各伍錢 皂莢仁 枳殼 檳榔 各壹錢

右為末煉蜜和九桐子大每服三十九空心白湯送下

瓊脂膏 治血虛皮膚枯燥消渴等證

鮮地黃 十斤洗淨 搗絞清汁 鹿角膠 真酥油 白蜜 各半斤 生薑 真汁 壹兩

右以砂鍋慢火熬地黃汁減三之一下膠油蜜薑煎如飴傾

磁器中坐水內一日夜每服數匙溫酒或湯送頻服

簡便方 便秘 豬油 熬 白蜜 紅棗 各四兩 右研勻任服

又方 治血燥 四物湯 方見 桃仁 搗 大黃 分 右為末蜜丸如

桐子大每服三十九白湯送下

又方 諸燥 山藥 為 杏仁 搗細 各 牛乳 貳斤 共入磁瓶包固重

火證

經曰諸痛瘵瘡瘍皆屬於心諸禁鼓慄如喪神守諸逆衝上諸躁狂越皆屬於火諸腹脹大諸病有聲鼓之如鼓諸病附腫疼痲驚駭諸轉反戾水液渾濁諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱又曰諸熱皆悉暴疇冒昧躁擾狂越罵詈駭驚噎嘔喉痺耳鳴及韓嘔湧溢食不下目昧不明暴注瀾惡暴病暴死皆屬於火又五火者喜動心火怒動肝火思動脾火憂動肺火恐動腎火兼以君相二火七火日熾左腎一水奚能勝之火邪燔燼則耗損元氣煎熬真陰陰血既虧則陽火愈盛津液枯涸諸火熱之證生焉治火之要微者涼藥清解甚者苦寒直折極者溫藥從治

簡明醫教 卷之一 火證 五十二

謂酒炒姜製或少加 姜桂為寒藥之嚮導 三法不已當滋腎補血是壯水制火養陰

抑陽之理經曰益火之源以消陰翳壯水之主以振陽光脈虛

浮為虛火宜補洪大為實火宜瀉見於何部而於本經補瀉之

細瀉而急數者乃陰虛火動宜滋培之治肥人火兼清痰治瘦

人火兼養血熱極生風防風通聖散 方見 中風

主方 治火 黃連 黃柏 黃芩 梔子 等 水煎熱服

心小腸火倍黃連加木通生地甘草淡竹葉 肝火加柴胡

白芍 膽火加龍膽草 脾火倍梔子加滑石防風白芍枳

殼 胃火加石膏 肺火倍估片芩加桑皮地骨皮甘草

大腸火條黃芩枳殼 腎膀胱火黃柏知母 鹽水炒又連翹

散鬱火瀉諸經客熱 玄參去上焦浮遊之火除無根失守之火尤能壯水制火 青黛瀉五臟鬱火又清肺肝火 人中白瀉肝火療勞熱 甘草緩急速之火 人中黃清陰火 理傷寒疫厲大熱 薄荷葉祛上焦風火 梔子去三焦屈曲之火從小便出 大黃芒硝瀉有餘實火 瀉實火藥中暫加酒煮大黃數分効速	補中益氣湯 治虛火最効 <small>方見虛損</small> 益元散瀉實火有功 <small>方見暑證</small>	升陽散火湯 治男婦四肢筋骨肌表俱熱如火捫之烙手此因血虛或胃虛食生冷之物鬱遏陽氣於脾土之中火鬱宜	升麻 葛根 獨活 羌活 白芍 人參 <small>各六分</small>	簡明醫要 卷之一 火證 五三	柴胡 防風 <small>各五分</small> 甘草 <small>二分</small> 右加生姜三片水煎熱服	滋陰降火湯 治陰虛血少陽火妄動為骨蒸等證	當歸 地黃 <small>生涼血 熱補血</small> 麥冬 <small>錢</small> 天門冬 <small>錢</small> 白芍 甘草 <small>各一分</small>	白朮 <small>各壹錢</small> 知母 黃柏 <small>炒</small> 遠志 陳皮 川芎 <small>各七分</small>	右加生姜燈心水煎服 氣虛加參芪 嗽加五味阿膠 痰加貝母瓜婁 吐血加丹皮藕節汁焦荆芥焦蒲黃 骨蒸熱加地骨皮甚者青蒿鱉甲胡黃連銀柴胡之類 火盛者用涼藥少兼溫散	麥門冬湯 治病後火熱乘肺咳唾有血胸膈脹滿上氣喘急 五心煩熱渴而躁悶等證
--	--	---	--------------------------------------	----------------	--	----------------------	--	--	---	-------------------------------------

麥冬 <small>分七</small> 天門冬 <small>分七</small> 桑白皮 <small>分七</small> 五味子 <small>九</small> 紫苑茸 貝母 <small>各六分</small>	桔梗 甘草 <small>各五分</small> 生地黃 淡竹葉 <small>各壹錢</small> 右加姜棗水煎服	涼膈散 瀉三焦六經諸火 加黃連名清心湯	大黃 朴硝 甘草 <small>各壹錢</small> 連翹 <small>壹錢</small> 梔子 黃芩	薄荷 <small>各五分</small> 右水盞半煎入蜜一匙和勻服	三補丸 瀉三焦火令元氣安故名加大黃去黃連名三黃丸	黃芩 黃柏 黃連 共為末滴水丸服 <small>加梔子各金花 丸每百丸茶下</small>	生薑瀉腸湯 治大腸實熱腹脹不通口舌生瘡	生薑 橘皮 竹茹 <small>各伍分</small> 生地黃 <small>錢</small> 白朮 茯苓	黃芩 梔子 <small>各壹錢</small> 朴硝 <small>錢</small> 桂心 <small>伍分</small> 右加棗一枚水煎服	簡明醫要 卷之一 火證 五十四	黃連解毒湯 三焦實火五臟積熱內外火熾口瘡煩渴便赤	黃連 黃芩 黃柏 梔子 柴胡 芍藥	連翹 <small>等分</small> 右加燈心廿枝水煎服 減柏柴芍翹餘各二兩加	黑丑 <small>為末</small> 滑石 <small>水飛各四兩</small> 共為末水盞九桐子大每服五十九白	湯下治諸經火邪熱毒瘡癰腫筋脉拘攣咬牙驚悸 <small>淋瀝痔漏</small>	簡便方 清火 扁栢葉泡湯飲或葶或芹焯食皆去熱	又方 雪梨頗食大治火熱之病 糞清大解熱毒	又方 童便以其出於二陰竅故性寒治火然而源從太陽經來不傷胃氣古人猶謂便溺及乳人有七情之火特 <small>取驢馬 牛羊者</small>	新刊簡明醫要卷之一
---	---	---------------------	--	------------------------------------	--------------------------	---	---------------------	--	--	-----------------	--------------------------	-------------------	---	--	--	------------------------	----------------------	---	-----------

武林台石孫志宏克容氏編輯

男九苞訂

厲風

經曰衛氣與太陽俱入行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉臄臄而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉不仁也厲者以其暴悍可畏之惡疾俗名大麻風類風感天地殺物之氣而成雖然未有不由嗜欲作勞氣血鬱熱或汗泄不避風邪溼冷使溼淤熱蒸外則腐潰內則生蟲食肝眉脫食肺鼻崩食脾音變食腎耳聾食心足底穿而死間有傳染而成者亦必有

簡明醫教

卷之二 厲風

一

風淫鬱熱之氣乃感千金方謂業報所招脉多浮而大治宜先服防風通聖散方見中風加苦參天麻蟬退百貼令臭汗常出大便微利更以爪蒂散方見中風吐去腥涎穢沫外用七珍湯洗浴次以主方為丸久服最宜斷厚味五辛鹽醬清心絕慾十生一二

主方 苦參一斤 防風 荆芥 蒼耳子 胡麻子半斤
熟皂角刺各十 蛇床子 何首烏各半斤 白芷半斤 蔓荊子
牛蒡子 生地 枸杞子 薄荷 黃荊子各壹斤 右末皂
莢搗碎煎膏見製藥法和九桐子大每服五十九茶酒任下日服
醉僂散 大風在上者及遍身癢疹怪癢麻木
胡麻一斤 牛蒡子 枸杞子 蔓荊子各壹斤 苦參 白蔘

防風

天花粉各九錢

右為末每一兩入輕粉七分和勻每

服一錢茶調下早午晚各一服五七日先子牙縫出臭黃涎

渾身疼痛昏悶如醉次利下膿血惡氣病根乃去止可食淡粥水煎菜

通天再造散 大風在下者內實熱壅

鬱金兩 大黃壹兩 皂角刺壹兩 白丑取頭末六錢十生用 右為末每

服五錢日未出而東無灰酒下盡量飲晚利下黑頭小蟲病

輕下如魚腸穢物忌葷腥厚味雖半年犯之病再作難救

七珍湯 大風洗浴

斬艾 青蒿 金銀花藤 蒼耳子 桑條 桃條

柳條參條 右煎水一桶入炒鹽半斤 間日一洗室中席圍取汗待乾乃出

簡明醫教

卷之二 厲風

二

神效第一方 厲風惡疾取桑枝灰半斤 熱湯淋取汁洗頭面一

日一次再用黑豆紫豆漿添湯三日一浴內用扁栢葉蒸晒

乾白膠香即楓樹 為細末滴水丸桐子大每服七丸 溫水

簡便方 癩風 用苦參五斤新 好酒三斗浸三十日頻飲

苦參晒乾為末或水丸服或陸續水煎服

又 扁栢葉九蒸九晒為末密丸桐子大每服三十九白湯下

又 天門冬去心酒拌蒸搗膏每服二三錢酒下久服長生

又 殺厲風蟲 明硫黃研細酒調浸過夜空心飲清汁再添

硫黃浸酒次日飲汁或搗大風子同浸尤妙

又 諸風癢疹癩風 用蒼耳子製丸服

又一切諸風取汗 用紫背浮萍二法簡便方

○癩風 白癩風者。身面頸項皮膚生紫白癩。並不痛癢。此亦風邪搏於膚腠之間。氣血不而成。紫癩風者。多在四肢或身上有紫疣瘰。此為風熱壅結而然。治法紫白同方

主方 蒼朮製 苦參 何首烏 荆芥穗分

右為丸服法與厲風主方九相同癩風亦可服

四神散 治紫白癩風

雄黃 雌黃 硫黃 白礬等 右為末先以湯浴汗出

肥皂擦癩處洗淨次用生薑切斷 蘸藥擦患處過三日又洗

簡便方 癩風 硫黃為末雞蛋清調塗布上晒乾汗出時布擦患處

簡明醫案 卷之二 癩風 三

又 雄黃硫黃黃丹蜜陀僧南星等 為末照前法塗布擦汗斑亦効

破傷風

按此證有三因之別焉如患疥癩日久外着白癩閉塞其氣陽熱內鬱熱極生風為內因有諸瘡不差艾火灸法熱毒內攻甚而生風為不內外因有偶為刀剪等傷或跌磕破損或生瘡毒淋洗敷藥見風為外因外受者多傷處或如豆粒些許忽為風邪襲之肌表即傳播經絡寒熱更作手足抽掣戰掉不安漸至身體反張如弓口噤牙緊飲食不納腸腹大痛邪深入臟七日而死若藥能中病十生二三往往患者必不慮此倘醫非經歷誤作他病治理十無一生有富貴家至死終不知何病者多矣

脈浮太陽長而有力陽明茲屬少陽沉數為裏治亦類中風傷寒也

主方 蒼朮錢四 川烏錢 草烏 白芷各壹錢 防風分五

川芎分五 天麻 細辛各錢 全蝎分 右分為二劑煎服或為細末每服二錢熱酒調下被益出汗未効再服

玉真散 治破傷手足打撲損傷 南星 防風分

右末生薑汁同酒調服二錢再敷傷處牙緊反張童便酒下

靈砂丹 治破傷風及一切風

威靈仙 黑丑各頭 蒼朮各五錢 何首烏 香附各六錢 乳香研

川烏去皮 沒藥研各錢 硃砂各錢 皂莢去灰 右為末皂莢打碎

用酒二升半春秋三日夏二冬七日浸汁打糊煎亦可為丸每百丸酒下

簡明醫案 卷之二 破傷風 四

如聖散 治破傷止血定痛

蒼朮兩 川烏炮去 草烏炮各錢 稍微炒 天麻 細辛

川芎 兩頭尖去皮 白芷各七錢 防風兩 雄黃 乳香各錢

右為細末每服一錢不拘時酒調下

獨聖散 五六日身反牙緊 蟬退五錢 為末好酒一盞煎滾服

羌活防風湯 治破傷風初盛在表

羌活 防風 川芎 藜本 當歸 芍藥

地榆 細辛 甘草 右水煎服 大便秘加大黃下之

服後汗出不止加白朮黃芪防風各錢 未効邪入裏芫黃湯

芫黃湯 邪傳裏大便秘取利為痊

川芎 黃芩 冬武 甘草 五 水煎服未利去甘草加 羌活壹錢 大黃三錢

簡便方 治破傷風 蜈蚣 乾者一 為末擦牙吐出涎安

又 殭蠶 直炒研末 姜汁調五分灌多調以鷄翎掃瘡口勿 乾

又 草烏為末每五分酒下 又 蝎稍七個為末熱酒下

又 川烏半夏南星天麻 等分 每服一錢黑豆炒焦淋酒調服

歌曰 半兩當歸蝎鼠錢合末槌碎酒同煎直須煎爛和查嚼一

一人臂生小瘡挑破出血感風說有大害不信夜覺臂如水浸

證漸危大痢峻攻忽胸背腫大如椀 又製人命飲 十日調牛黃 真人活命飲 作三日服安

歷節風 附鶴膝風

簡明醫說 卷之二 歷節風 五

是證亦與痺證相類俗謂白虎歷節風白虎者痛甚如虎嚙歷

節者循歷四肢關節而痛也因夏月膝理開豁之際貪涼乘風

或泥地漆椀坐臥而受風溼或汗出當風或酒醉感風秋冬膝

理閉寒風寒溼邪與氣血相併手指攣曲腿膝腫脹作非常之

痛不可忍亦有溼痰流注作痛者如風寒則夜尤甚溼痰日夜

皆然脈浮大為風寒弦細溼滑多痰治宜辛溫解表逐風寒溼

邪當歸拈痛湯之類溼痰滲溼導痰痛減兼養血舒筋

主方 羌活 蒼朮 黃芩 酒炒 防風 猪苓

澤瀉 秦朮 麻黃 夏月用茵陳等分 升麻 減 右水煎服

手臂痛加桂枝海桐皮 腿膝痛加牛膝木瓜 痛甚調乳

香服 當歸拈痛湯 方見 導痰湯 方見

羌活續斷湯 治一切歷節風手足肢節腫痛如錐

羌活 川續斷 牛膝 防風 當歸 川芎 各壹錢

蒼朮 麻黃 甘草節 枳殼 穿山甲 各七 秦朮

川烏 五 薄桂 分 右加葱一根水煎服取汗至足

簡便方 治歷節風 三年釀醋 五 煎數沸切 慈白二枚者

又 羌獨活煮酒飲 又 松葉 半 搗爛酒 三 浸七日 每日服

又 虎骨 兩 打細好酒三椀煮至半椀將骨切片搗為末乳香

沒藥 各五 出汗研末同虎骨末調酒內分十次添酒調服

又 用羊蹄根好醋生鐵磨聚塗患處入硫黃末尤妙

簡明醫說 卷之二 鶴膝風 六

萬靈膏 捻入乳香末攤布上貼痛處外包熨熱痛止 方見或

以綿布絮厚包烘熨極熱汗出痛止

○鶴膝風 膝頭腫大作痛腿脛漸細故名致筋攣不能屈伸

由風寒溼氣流注也更宜風溼痺門檢方急治有日久不痊延

及臀股腫大出膿至肉削而斃者

主方 羌活 防風 白芷 當歸 牛膝

苡仁 川芎 川烏 杜仲 白木 木瓜

水煎服 瘀血加桃仁漏蘆 筋攣加木瓜秦朮威靈俱

痛甚加乳沒研細調服 或小續命湯加川草蘇川練子羌

獨活木瓜服時調麝香少許 後以五積散去麻黃酒煎服

膝腫大痛 早蓮草摘斷一握搗入糲飯一酒藥一塊勻烘放

上箬油紙布包火熨聞酒香數日愈再包或陳年糟炒熟也

又 無名異五錢地骨皮三錢乳香沒藥各研一分車前草汁入

惡寒

經曰陽虛生外寒蓋陽氣不能外衛所以惡寒必背惡寒甚脈

浮無力陽虛宜參芪之類甚者加附子三分病久而惡寒者亦

宜解鬱蓋惡寒非寒明是熱証火極似水熱甚而反覺自冷實

非寒也有用熱藥少愈者以辛能發散鬱遏暫開耳又曰火熱

內熾寒必盪外故實非寒證以辯理并外證參酌擬定寒熱藥用

主方寒邪 人參 白朮 乾姜 炙草 白茯苓

簡明醫教 卷之二 七

半夏 肉桂 五味子 陳皮 姜棗煎熱月磨要厚

消涼飲 惡寒而脈洪數兼日瀉口渴心煩便秘屬熱

黃連 黃芩 梔子 連翹 薄荷 甘草

右加燈心水煎服有夏月外綿衣脈洪數小便短赤大便秘

結加大黃芒硝愈飲酒人惡寒黃芪兩葛根兩煎服汗出安

惡熱

經曰陰虛生內熱陽在外為陰之衛陰在內為陽之守房室過

度斷損真陰陰氣既虛陽無所依遂致浮散於肌表之間雖有

惡熱之狀誠陰虛証也脈必細數治宜滋陰

主方 當歸 白芍藥 生地黃 知母 麥門冬

白朮 白茯苓等 柴胡 甘草減 姜棗煎服

瘟疫附大頭瘟

帝曰有病瘟疫汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食

病名為何岐伯對曰病名陰陽交者死不治此陰陽交錯而

發走而熱所以不愈謂服藥汁出熱不解脈躁不治又曰冬傷於寒春必病瘟故瘟疫當

推運氣所發夫春溫夏熱秋涼冬寒乃四時正氣反此為不正

之氣感受則病如冬月嚴寒若觸之即病為傷寒毒藏於肌

膚春變為溫夏為熱病或冬有非時之暖感之為冬瘟有眾人

病一般者為天行時疫有一歲之內節氣不和寒暑乖候及有

暴雨疾風霧露不散則民病瘟疫無論少長率皆相似故云瘟

簡明醫教 卷之二 瘟疫 八

疫癘病所謂冬不藏精春必病瘟君子固密不傷於寒智者自

能避大風苛毒弗之能害是也其傳經治療與傷寒大同小異

可以傷寒方法酌用發表宜辛平之劑不可麻黃熱藥脈法太

陽大陽明絃長少陽絃數太陰細絃少陰沉細厥陰微緩

主方散 羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎

枳殼 桔梗 白茯苓 人參減亦可 甘草減 加生薑煎

或為末湯調服尤治傷寒風溼肢痛增寒壯熱項強睛痛或

嶺南瘴氣老幼疫厲或風痰腳氣等證日三服瘟疫頭疼骨

痛屬太陽羌活中和湯發熱口渴屬陽明柴葛解肌湯寒熱

往來屬少陽小柴胡湯並見

六神通解散 通治瘟疫

蒼木武麻黃夏用黃芩 石膏 滑石各壹錢甘草伍分

右咀加豆豉汁粒生姜七片葱頭二個水煎服蓋被出汗

活人心統方 治瘟疫

蒼朮 麻黃 黃芩 乾葛 川芎 升麻

甘草等分加姜葱水煎服 春加柴胡防風薄荷 夏加石膏

滑石黃連黃秋加羌活前胡枳殼 冬加乾姜官桂細辛

咽痛甘桔湯方見 玉樞丹方見 霍香正氣散卷二

又方 人中黃飯丸每七十九日湯下 極熱者飲真清効

○大頭瘟 因天行邪氣客於三陽之經頭目俱腫而為病也

簡明醫教 卷之一 大頭瘟 蝦蟆瘟 九

太陽頭頂腦項赤腫宜荆防敗毒散加羌活藜本 陽明鼻

額面腫二目不開氣喘口乾普濟消毒飲 內實防風通聖散

間服 少陽耳之上下前後頭角赤腫寒熱脇痛小柴胡加消

毒藥 頭面大腫發熱骨痛冲和湯冬麻黃湯汗出腫消

蝦蟆瘟 天行邪氣客於少陽頸項并腮俱腫大如蝦蟆樣

故名宜用消風清熱之藥宜敗毒散倍羌活加酒炒黃芩大黃

隨病加減不可峻用降藥內實雖用硝黃須細細呷之 如有

大熱狂證可用承氣湯白虎湯等治之或水漬法看輕重用

普濟消毒飲子 疫癘初覺憎寒壯熱頭面漸腫咽喉不刊服

黃連酒炒黃芩酒炒人參各錢無陳皮去甘草 玄參各錢

馬勃 連翹 牛蒡子 桔梗 板藍根各壹錢柴胡捌分

升麻 殭蠶各壹分 右為末半用湯調卧牀慢服半用蜜丸噉

化如上法或加防風川芎薄荷當歸細辛水煎服如大便秘

加酒煮大黃一錢或二錢以利之頭疼骨痛身熱宜先汗之

二黃湯 治大頭瘟

黃連 黃芩俱酒炒生甘草等分 右為末每五錢水煎服慢呷

未退加牛蒡芒硝加引經藥太陽羌活防風 陽明石膏少

陽柴胡 渴加瓜婁根或口乾葛根 身痛羌活防風芍藥

水漬法 治內外熱極傷寒

簡便方 治瘟疫瘟熱大渴欲飲水者蚯蚓泥搗新水飲之

簡明醫教 卷之一 十

又方 晚蠶沙搗水濾清汁飲

又方 向東桃枝葉煎湯浴席圍汗出

又方 以真降香燒 辟邪小兒帶之

又方 赤小豆囊置井中三日取起向東立水吞男三十粒女

二十粒舉家服之不染瘟疫

瘟疫呪法并花邪病宜 戒房室葷酒用棗一枚呪曰 華表柱念七遍望天

置取氣一口吹棗上令病人嚼吃湯下此三字鬼之祖名也

宣聖辟瘟丹孔氏六十餘代用之 法以臘月二十四日五更初取井花水

在平日第一汲盛淨器中量入口多少浸乳香至歲旦五更

令溫暖從小至大每人以乳香湯飲之香一小豆塊吞下則

一年不患時疫

五瘟丹

黃連 黃栢 黃芩 山梔 香附 紫蘇

甘草梢 右七味生為末將大黃三倍煎汁熬膏和丸雞子

大珠砂雄黃為衣金箔貼每用一九取泉水七梳浸化可服

七人前方乙庚年黃芩為君丁壬山梔丙辛黃藥戊癸黃連

甲己甘草為君者加一倍也餘減半

雞子清飲 治熱病五六日壯熱之甚狂言欲走

雞子取殼芒硝研細各石膏研細各

右先取新汲水調硝石末次下清攪勻分二服

簡明醫說

卷之二

痢冷

十一

五

痢冷

帝曰陰盛生內寒奈何曰厥氣上逆寒氣積於胸中而不散不

散則溫氣去寒獨留則血凝血凝則脈不通其脈盛大以濇故

中寒按諸病上下所出水液澄澈清冷痲痲痲痲痲痲痲痲痲

痛下利清白食已不肌吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固皆屬於

寒蓋痲痲之證迺真陽耗散脾胃虧傷又啖生冷難化之物或

受風寒陰溼經年累月日久乃成則脾胃因而瀆積臟腑致成

虛寒及有外邪觸犯內外邪相感忽然而作手足厥冷戰慄憎

寒嘔吐涎沫脘腹絞痛或常得大便溏泄小便頻數飲食不化

咳嗽瀕痲等證其脈沉而遲治宜溫養脾胃補益氣血助陽本

主方理中人參 白朮 乾姜 炙甘草 寒甚加附

子或川烏生薑七片黑棗二枚水煎服 未安加丁香木香

砂仁白芷薤胡椒肉桂茴香沉香藿撥之類隨輕重用另研

末調入服 已上皆煖脾胃溫臟腑之品隨證加減用之

氣血虛十全大補丸 下元冷憊桂附八味丸二方見

甦肚方治腹中寒積痲冷用之神效兼升田 神關令人有子男婦可用有孕去之

檀香 排草各壹兩 沉香 丁香各伍錢 馬蹄辛 廣零陵

白芷 丁皮各陸錢 甘松 附子 乳香各貳錢 麝香五分

右為末和棗艾綿鋪中用帛做成甦肚以線釘定勿令移動

外又細夾甦肚及小腹初裏一夜日去之漸至二夜一去之

簡明醫說

卷之二

泄瀉

十一

漸至五夜一去方可常裏

洗浴法 治下元虛寒一切冷病腰腹冷痛崩漏帶下小腹痲痛

椒目 川烏 細辛 乾姜 官桂等分研末煎

簡便方 治一切冷氣 胡椒三七粒搗酒服

又方 治下元虛冷 胡椒破故紙炒 共為末蜜丸空心酒下

又方 治心腹冷痛 大芎藭三寸細嚼酒下

泄瀉

經曰春傷於風夏必飡泄又曰溼勝則濡泄又曰暴注下迫皆

屬於熱又曰諸病水液澄澈清冷皆屬於寒夫脾胃同溼土之

化主腐熟水穀胃氣和平飲食入胃精氣則輪於脾土歸於肺

經行於百脉而成榮衛。若飲食過多。起居不時。傷其脾胃。則不輸化。上升精華之氣。反至下降。是為飧泄。經謂清氣在下。則生飧泄。是也。久則太陰傳於少陰。而為痢疾矣。治瀉大綱。必分寒熱為要。但以脉沉遲。口不渴。身倦少食。腹溫溫常痛。直出清水。小便清白者。屬寒。脉沉數。口渴。聲亮。暴注下迫。肛門熱痛。腹忽大痛。小便短赤者。屬熱。無藥可包。緩臍。腹一日不食安。

主方 白朮 茯苓 車前子 澤瀉 芍藥

陳皮 炙甘草等分 加生姜熱加 水煎服 傷食加山查神

麩麥芽 熱瀉加滑石黃連梔子 寒加木香砂仁乾姜肉

桂 冬月再加益智香附丁香去車芍澤瀉燈心 夏月香

簡明醫彙 卷之二 十三

薏扁豆木通厚朴 口渴葛根石膏 小便短赤或不通

苓木通滑石石蓮子 溼加蒼朮半夏 痰乍瀉乍止加半

夏南星 胸脹厚朴枳實香砂 口渴引飲人參五味麥冬

葛根升麻少烏梅 胃氣下陷人參黃芪升麻柴胡 久

瀉滑脫不禁肉果煨 訶子肉粟殼木香乾姜各伍 五更瀉

加肉果茴香破故紙炒 脾虛加人參山藥苡仁扁豆蓮肉

暑瀉六一散 夏秋溼熱大行暴注水瀉加炒黃連蒼朮

升麻木通

胃苓湯 治男婦暑溼停飲泄瀉不伏水土等證

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 白朮 茯苓

豬苓 澤瀉各等分 右咀加姜棗水煎服 本方加黃連扁豆

香薷去蒼朮陳皮甘草名需苓湯治夏月欲成痢者

青六九 治三焦溼熱泄瀉兼治產後腹痛自利亦治血痢

六一散陸 紅麩炒 右為末飯九桐子大每七十九白湯下

瀉六散 治泄瀉嘔吐神効

六一散陸 乾生薑兩 右研勻每服三錢姜湯下

溫脾散 治大人小兒外受風寒內傷飲食腹痛泄瀉一服安

香附兩 山查 三稜 甘草各貳 甘松 益智各壹

丁香 三柰各伍 右為末每服二錢空心姜湯下小兒量服

固腸丸 治日久泄瀉痢後滑脫不禁

簡明醫彙 卷之二 十四

白朮兩 人參 訶子肉 木香 肉果煨 龍骨研

山藥 白茯苓 赤石脂研 肉桂 炙草 升麻各伍

右為末研入龍骨赤脂水法丸或神麩糊丸桐子大每百丸

空心姜棗湯下 脾虛加黃芪蓮肉芡實 虛寒加附子乾

姜丁香畢撥 腹脹加陳皮厚朴茴香去炙草 不食加藿

香白薏菴 食不消加砂仁山查麥芽 五更瀉加破故紙

甚不止加粟殼沒石子臭椿根

參苓白朮散 治泄瀉因脾虛者及瀉後調補

白朮兩 人參 山藥 茯苓 薏苡仁 扁豆

砂仁 桔梗 蓮肉 甘草各壹 右末每二錢白湯下

老幼虛弱久瀉去桔梗加芡實配米粉白糖爲末蒸糕大効

桂苓甘露飲方見卷末治夏月水瀉口渴小便短赤加香薷

簡便方止水瀉車前子炒研末米湯下 又 生姜半夏聚子煎服

又方 生姜一塊打細同艾煎服 又 乾姜末錢米湯調下

又方 黃連厚朴各錢加生姜三片煎服

又方 吐瀉神昏手足冷南木伍錢姜棗煎服

水瀉及男遺精女白帶

風化石灰伍錢茯苓伍錢石礪木糊丸白湯下

又方 百年石灰 味九膠亦効 又 蠟礬丸方見外科止瀉効

灸法 百會頂心關元臍下三寸氣海臍下一寸

簡明醫教 卷之二 痢疾 十五 九

痢疾

經曰諸下痢皆屬於溼。又曰下痢稠粘皆屬於火。又曰下痢膿血滯下皆實熱證也。受病之源雖云夏感酷熱過食生冷。至秋陽氣始收。余氣下降而成。如冬月患者亦多。莫不因於飲食致傷。留積腸胃。溼蒸熱聚。干於氣分則白。干於血分則赤。及如塵腐屋漏。豆汁魚腦色。裏急後重。窘迫不通。腹中絞痛者。皆屬實熱。不俱日數。必以苦寒藥治之。醫家畏縮遷延。甚至所下純血兼紫血塊。雖見日色。煖氣人來近。皆畏爲熱。漸至肛門紅腫大便不通。小便短赤。大渴舌胎。引飲不止。腹中大痛。飲食不進。至於腰脊兩傍。腎淵成窟。舌黑縞捲。前陰乾縮。肛門火逼。乾吊如

孔積全不下。茶湯過多。穢水直出。右醫認爲大孔如竹筒誤用人參附子殺人者悲痛之極

初則煩躁。至此神昏。細察病情真確。此際仍可以主方服之。如

得臟腑猶未煎熬腐壞者。十救七八。一服積下。頃刻回生。脈滑

而沉細。身涼易安。脈洪而弦數。身熱難治。又有寒涼太過。而成

大孔如竹筒者。宜商澁之。必因日久而成。元氣下陷。虛坐努責

宜養血升提。有失於通導。多成休息痢。經年累月。有致不起者。

治法。調氣則後重自除。和血則便膿自愈。忌腥酒易安。

主方 不拘日數 大黃壯人伍錢一服可安弱人二錢小兒壹錢至伍分黃連 黃芩各錢

芍藥錢當歸 枳殼 檳榔各壹錢桂藥分爲寒熱水一

鍾半煎數沸去渣化入芒硝一錢。虛人五分。磨入木香七分。

簡明醫教 卷之二 十六 十

調滑石壹錢空心熱服 未暢加黑丑一錢。車前草搗汁半

盃尤妙 或以大黃芒硝木香滑石另丸藥汁吞服

香逆化滯湯 痢已通暢積未盡宜服

黃連 黃芩 當歸 白芍 檳榔 木香各壹錢

枳實 厚朴 陳皮 青皮 滑石 甘草各捌分

右剉水煎成調木香滑石空心熱服 小便短赤加石連車

前香薷 不食加砂仁神麴麥芽 血痢加生地桃仁 腹

痛加赤芍倍白芍甘草 腹脹痛加三稜蓬朮 血不止加

地榆 如積通痛止頻頻空解名虛坐努責倍當芍加升麻

積盡不實加白木茯苓山藥砂仁

香連丸 治赤白休息諸痢已通後皆可服黃連仍同黃連至

川黃連肆兩 吳茱萸煎兩煎汁一梳 木香錢捌 右為末醋糊

和丸象豆大每服百九空心米湯下去木香加白芍貳兩各

駐車丸 治冷熱不調下痢無問新久赤白日夜無度腹痛後

黃連陸兩 阿膠蛤粉炒 當歸酒洗 乾姜炒各

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服五十丸加至七十

九空心米飲送下 一方就用阿膠醋熬化調和為丸

真人養臟湯 治痢積已通日久不止大孔如竹筒滑脫不禁

人參 白朮 當歸 白芍酒炒 肉果藥裏 芡粟殼

訶子肉各壹 木香另磨 肉桂 甘草炙各

簡明醫彙 卷之二 十七

次服加升麻 小便澀加茯苓 不止龍骨赤石脂烏梅樗

根皮陸 虎寒焦姜砂仁丁香

白朮調中丸 治脾胃不和心下堅滿脇腹脹痛噫宿腐氣霍

亂吐瀉完穀不化久痢赤白膿血相雜多日羸瘦不食

白朮 神麩炒四 人參 茯苓 猪苓 澤瀉各壹

木香貳錢 官桂壹錢 甘草伍分 乾姜炮各

右為末麵糊丸如桐子大每服五七十丸空心淡薑湯下

外灸膏 治一切虛寒久痢赤白或時腹痛腸滑不禁用此法

木香 附子炮 蛇床子 吳茱萸 胡椒 川烏各等

右為細末每三錢和麵二錢用生薑汁調作餅貼臍中上以

油紙掩定復以衣服帛蓋之以熨斗熨火熨之痢止為度

烏梅丸 治夏秋腹痛泄瀉後重將欲成痢疾或痢已通後猶

有餘積腹中鳴痛胸滿腹脹心疼痔血等証神効

烏梅取肉壹斤 半夏研 生姜切各 食鹽壹兩同入白搗勻入坩包

取出 神麩 麥芽各貳 木香 檳榔 陳皮

青皮 枳殼 三稜 蓬朮各壹

右為細末水丸如桐子大每服百九空心姜湯下

六一散方見 燈心湯調多服効痢前渴雪梨妙後渴烏梅湯

簡便方 痢初起腹大痛後重不通用大黃伍錢 好酒一鍾浸半

日煎數沸濾服查水煎未通再服已通再以茶黃芩白芍煎

簡明醫彙 卷之二 十八

又不痢後不止日夜無度 粟殼蜜炒 厚朴姜炒等分為末每

又方不臭椿根白皮 右為末糊丸如桐子大每五十丸米湯下

又方血黃連壹錢 烏梅伍錢 水煎服 又 黃連壹錢 乾姜伍分 煎服

又 艾葉醋煎服或加生薑止瀉痢心腹痛五痔血

又 栢葉肆兩 芍藥兩半為末每 木耳陸兩 水服或姜醋

又 枳實末貳錢 米湯下小兒 又 生薑細茶煎服

又 甜菜絞汁服又止血生肌 又 馬齒莧煮粥食

又 紫蘇肆錢 防風貳錢 煎汁調白蜜兩 服 又 雞子醋煮食

又 石榴搗汁飲或以皮搗研 又 五倍子焙研 九服

又 訶子十貳個取肉陸個 研末赤痢生甘草白炙草煎湯

又方 日入津液 特四散冷 用冬瓜一枚以黃泥五寸煨熟去土絞汁服

又方 如痢 大渴 雪梨數個去皮心吃搗汁頓溫飲尤妙

又 葱一握切和米煮食 又 蒜搗爛貼兩足心亦可

又 百草霜 錢 研米湯下 又 赤小豆煮粥食亦可

又方 治噤 口 石連子去殼取肉微炒研末二錢陳米湯下

又 石連末香連丸 各壹錢 同服 又 木鱉子 研 雄黃 少許 臍中

又 山藥剉碎一半砂鍋煮一半生同為末每三錢米湯下

又 人參二錢黃連一錢石菖蒲八分石連肉二錢右剉碎

煎終日慢服一口下即食

又 取向東壁土炒陳皮共為末每服一錢姜棗湯下

又 紅椏花陰乾為末先用麪餅二個末搽上食先湯灌開

瘧證

經曰夏傷於暑秋必痲瘧 瘧老也俗 名三日瘧 夏熱已甚秋陽復收雨熱

相攻故為瘧帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯對曰夏傷于大

暑其汗大出腠理開發因遇夏氣悽愴之小寒藏於脉理皮膚

之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於

寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧 云 示 內

經論瘧極詳皆謂風寒暑溼之邪客於臟腑致陰陽上下交爭

虛實更作陰陽相併相移也後人始論七情勞役食積痰飲皆

成瘧所謂無汗要有汗發散邪為主帶補有汗要無汗扶正氣

為主帶散 發散邪則升葛芍苓柴胡之類扶正氣謂小柴桂枝 湯白虎桂枝湯之類傷寒有汗用桂枝疎邪黃表

之 又謂傷之淺者近而暴傷之重者遠而緩為瘧瘧也瘧脉自

弦絃數多熱弦遲多寒弦緊發汗弦遲宜溫瘧不宜截早欲速

愈則邪氣閉塞而成他證為害匪細有變水腫鼓脹諸毒等證

惟夏秋連日發邪瘧四五次可截 如二三日發及陰瘧必先發 汗散邪勢輕常山藥截亦可

主方 蒼朮 川芎 白芷 羌活 防風

葛根 柴胡 分等 甘草 半 加姜棗煎服 無汗加紫蘇細辛

荆芥穗 頭 有汗加桂枝檳榔白芍白朮 土 茯苓去蒼朮 連

日發及午前加黃芩 間日及下午夜間加當歸白芍各八

分紅花升麻各三分 有痰加陳皮半夏 有食及不食脹

痛加山查神麩麥芽青皮陳皮草果砂仁 暑月加香茹扁

豆兼服六一散 口大渴加石膏知母麥冬 痞悶加枳實

桔梗 寒不熱加乾姜官桂良姜白朮去麻黃為根柴胡蒼

朮 寒甚加附子 溼瘧因雨溼身體重痛嘔脹加猪苓澤

瀉白朮茯苓陳皮半夏去葛根柴胡服一二貼後服清脾飲

加猪苓澤瀉分理陰陽瘧自止若不止惟處暑前一日一發

於日間者三四發之後行截藥 若處暑後間日或三日一

發於夜間者先依方服二三貼天寒加麻黃必令汗出 遷至

日間再宜主方加當歸芍藥生地知母少加升麻紅花酒洗

提至二日至一日漸漸輕可如汗多少食身倦無力或遷延

日久氣血兩虛或小勞則甚宜服八珍湯左見或十全大補

湯猶有微熱補藥加柴胡黃芩蒼朮葛根之類一補一發也

久不已四獸飲截之 久虛欲吐不吐者宜藜蘆末水調服

以吐為度或雄黃瓜蒂赤小豆各二分研服可吐

清脾飲 治先寒後熱熱多寒少單熱不寒者

黃芩 半夏 青皮 厚朴 茯苓 白朮各壹錢

草果壹錢柴胡伍分甘草伍分 加生姜三片黑棗一枚水煎服

人參養胃湯 治寒多熱少及單寒不熱者

蒼朮錢陳皮 厚朴各壹錢半夏 茯苓 草果

藿香 人參 炙草各壹錢烏梅壹錢 生姜三片水煎服

簡明醫教 卷之二 十一

七寶飲 治諸瘧已服發表散藥提上陽分漸輕欲截

常山 厚朴製 青皮 陳皮 甘草錢 檳榔

草果各壹錢 右酒水各半煎首汁二汁露過夜當發之日早重

溫先首汁次二汁面東服

草果飲 治諸瘧通用

草果 白芷 良姜 青皮 川芎 紫蘇

甘草各壹錢 右咀每服五錢水盞半加姜煎亦寒瘧

四獸飲 截虛瘧久瘧

人參 白朮 茯苓 甘草錢 陳皮 半夏

草果 右加烏梅姜棗鹽少拌醃少時溼紙包煨香熟煎服

截瘧常山飲 治瘧處暑前連日發四五次後

常山 檳榔 烏梅 草果 知母 甘草錢

川山甲炮 每服五錢水盞半煎露一宿臨發日前二時溫服

黃芪驚甲飲 治瘧疾久不愈腸下痞滿腹中結塊名曰瘧母

驚甲鱗 草果仁 黃芪 白朮 白芍藥 厚朴製

檳榔 橘紅 川芎 甘草各壹錢

右咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚烏梅一個煎服

瘧瘡乃山嵐氣蒸嶺南燥溼不常人患血乘上焦迷悶發有

啞者此實熱所致宜涼膈散疎通大便小柴胡湯加大黃或

平胃散五苓散二陳湯之類調之

簡明醫教 卷之二 十二

簡便方 常山草果知母貝母各壹錢 好酒半鍾浸過夜天初明

煎滾數沸向東服

七轉丹 連日發宜 巴豆肉研 麝香五分 白礬錢 白芷二錢 硫黃

雄黃各壹錢 官桂五錢 硃砂一錢 青黛五錢 黑附三錢 右另研細

末各包按方列淨盤預供神前端陽午時潔誠拜禱取五家

粽尖和九桐子大每一九 祭日五更錦裏寒鼻男左女右用

瘧瘧三日 由風寒感深故發遲必主方減葛加蘇檳陳半葱

冬加麻黃食加查并大發汗從頭至足不暢再汗次柴葛解肌

湯加陳半苓檳次清脾飲加猪苓澤瀉陳皮自止如減輕未止

用酒煮常山等藥截無害如不發汗散邪即常山截有一二

年尤腫脹而數單用參補亦開門逐盜也

參朮

霍亂

經曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂。輕重腹痛筋骨痠併。是證雖因飲食過度七情內傷風寒溼熱外感誠因暑火所致。發必夏秋。口大渴轉筋反戾火也。病感於火治從風散。蓋夏時腠理開豁暑氣易入。或坐卧陰澤當風取涼風寒之邪客于三焦傳于脾胃更傷飲食勞役復感風寒外來則內邪雜揉陽氣不能外舒變為鬱熱致陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜上下否隔邪客胃多吐邪客脾多瀉受邪淺乃得上下分行為易治若深者邪忤中焦上不得吐下不得瀉攪腹顛倒揮霍撩亂大痛危甚此乾霍亂也。俗名絞腸痧。急治則生失治則死多飲淡鹽湯水二鐘燒百沸入鹽一撮。

簡明醫錄

卷之二

霍亂

十三

和河水二鐘加生薑及皂角水以許九仕。患人頻飲必得吐或瀉便是生機次服煎藥切戒米湯一口入胃立死轉筋者手足攣縮筋收入心腹者死男子急挽其陰囊女子挽定兩乳用鮮蓼一束煎或鹽煎熟湯淋漬腿足筋掣處可舒或以綿絮裹煖飲溫姜湯過一時與米湯脉宜洪大忌虛細如大痛時脉多伏不宜漸遲。鹽湯吐瀉不藥亦安。
主方 半夏 茯苓 蒼朮 陳皮 厚朴
猪苓 霍香 澤瀉 炙草 右姜棗杞杷葉煎服
手足厥冷加乾姜官桂良姜 冷極脉欲脫加入參附子
怕寒加紫蘇白芷 吐甚去霍香 腹痛加炒芍藥 少腹痛加吳茱萸 心腹脹加木香砂仁大腹皮 轉筋加牛

藤木瓜火煨石膏 食積加山查神麴麥芽 心下痞加枳

實青皮 暑加香薷扁豆 大渴飲水水調六一散微渴湯調

煩渴加麥冬葛根 胃寒發呃加丁香香附茴香良姜去甘

草 遠至他鄉不伏水土而作加木香砂仁 瀉加白木山

藥烏梅 喘加蘇子桑皮去甘草 藿香正氣散方見卷末

針刺十指甲盡處出血先從臂復下繩扎十指乃刺及兩委中

穴在膝後腕中橫紋處先以冷水從腿肚搭上見紫點起針或用磁銚刺

腹痛不止炒鹽麩或灰砂包熨痛甚將麩或布條作團放臍上

圓圈中放炒鹽上以大艾炷三個灸多壯痛止為度痛在上下對痛灸

六和半夏湯 治霍亂吐瀉

簡明醫錄

卷之二

霍亂

十四

白木 甘草 砂仁 杏仁 人參 半夏製各五分

藿香 赤茯苓 白扁豆姜汁炒 木瓜各壹錢 香薷成厚朴 姜製成錢

右咀作一服姜三片棗一枚水二盞煎至一盞溫服

木瓜湯 治霍亂吐瀉舉身轉筋入腹則悶絕

紫蘇葉十片 乾木瓜壹兩 吳茱萸半兩 小茴香炒 甘草炙各壹錢

右加姜棗水煎服 更用絲瓜葉搗絞汁河井水和服

藿香湯 治外感風寒內傷飲食霍亂轉筋嘔吐瀉泄等證

藿香 厚朴 白木 茯苓各壹錢 甘草炙五分 紫蘇

白芷 大腹皮 桔梗 半夏 陳皮各八分 肉桂

猪苓 澤瀉各七 右咀一服水二鐘姜五片煎八分食遠服

簡便方 用良姜兩煎服 又 枇杷葉刷去毛 橘皮 棗 姜煎服

又 桑葉搗汁一盞服冬月又 厚朴姜汁 為末或 汲新水服

又 丁香十四枚為末服 或白羊眼豆為末醋調服

垂死者用生姜三兩煎湯一碗溫服 吐不止梨枝葉一握

又 胡椒四十粒滾白湯吞下 或枯礬一錢白湯服

又 胡椒朶豆各四十粒 研細水煎服口渴為末水調下

大瀉肢冷 附子炮為末四錢鹽三錢水二鍾煎溫服

吐瀉不止 艾一把水煎服 乾嘔不息 用薤葉煎服

轉筋 赤蓼切三合水煎服 或皂角末吹入鼻取嚏

筋攣 薏苡仁為末連進數服 筋痛 生姜或葱搗貼患處

痢後轉筋 用羊眼豆葉一握搗醋煎服

乾霍亂不得吐瀉 鹽湯未通用小蒜一碗水三碗煮汁晚半

煩躁 葱白廿 大棗廿 水煎汁服 沙病 水紅花根水煎服

吐瀉後大渴 飲童便妙 漸少與黃米湯

痘證 附黃腫

經曰。滿黃赤安臥者痘病。多由酒食過度。臟腑不和。水穀相併。

移於脾胃。復為風溼所搏。瘀結不散。熱氣鬱蒸。如食已即飽。身

體面目及爪甲小便盡黃。時欲安臥。乃其證也。痘證有五。曰黃。殺。酒。女。勞。痘。黃。汗。是也。溼熱一同。皆由溼生熱。溼熱相徵為黃。常多大小便澀。專宜通利小便。最為捷要。但小便清長。黃自退。

世近世多用草藥者。取新鮮味涼氣悍而快利耳。凡脈浮者吐

之汗之脈沉者下之利之七八日口有血者亦宜下之

主方 茵陳銖見 梔子各壹 赤茯苓 猪苓 澤瀉

黃連七 甘草稍 右加燈心廿枝水煎空心服 不遇加車

前草汁調滑石末服 甚加葶藶枳實草龍膽

茯苓參 澤瀉湯 治黃疸

蒼朮 白朮各貳 梔子 黃芩各八 枳實 黃連各七

茯苓 澤瀉 茵陳 陳皮 防己 青皮各五分

葛根湯 治酒疸 葛根六 枳實炒 山梔子 豆豉各

甘草五 右水煎服

茵陳石骨湯 治黃汗

石膏貳 茵陳 赤芍藥 黃芪 麥冬各壹 豆豉一

甘草分五 右加姜三片水煎服

理中湯方見 建中湯方見 並治內傷勞役發黃之證

簡便方 治黃 秦艽一兩作二服好酒煎空心服

又 蘿蔔子為末白湯下日三服 或絲瓜連子燒灰因類病

黃疸無汗 麻黃貳 春夏少用秋水煎 亦治傷寒發黃

皮膚眼目如金 用青小麥或苜搗汁每用一盞空心溫服

又 野苧麻根煎服 或乾葛酒煎研白荳蔻五 服或搗

黑疸多死 急以瓜蔓根搗汁服

急心黃疸 百合蒸和蜜食 又 生茅根一握細切同煎時煮汁飲勿食肉

今用草藥治疸 車前草 平地木 雪裏青 荷包草

僂人對坐草 隨取一味搗細和生白酒絞汁飲

○黃腫 卽俗謂黃胖起於食積溼鬱傷脾脾氣虛敗色黃腫

主方 白朮 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 錢

砂仁 錢 昆蟲 粉炒

右爲末除皂礬另製用紅和米粉一升先將皂礬砂鍋內炒

至烟盡再下粉炒香熟爲度取起和前末一處醋煮糊丸如

桐子大每服五十九日進二服姜湯送下忌麵食生冷油膩

又方 皂礬煨五兩棗肉三兩乾蒸餅三兩 右爲末生薑自

簡明醫錄 卷之二 附黃腫 三一

然汁爲細丸每服二十九米湯送下日進三服

視金脣脾丸 治黃腫腹脹

蒼朮 香附 製礬 茵陳 白朮 厚朴

陳皮 青皮 乾漆 蓬朮 三稜 川椒

甘草 右爲末用大黑棗煮一滾去皮核搗爛和丸如乾

添棗湯勺丸桐子大每服五十九空心米湯或姜棗湯下病

製礬法 綠礬 小麥 淘淨曬燥入鍋內用好米醋五六碗

煮半乾入礬在內煮乾炒黃色搗麥開看黃色急搶起勿焦

紫礬丸 治食滯疔身背皆黃色

皂礬 紅棗 煎熟取肉同礬搗勻爲丸

脚氣 附足跟痛

經曰濕甚則附腫又曰當風取涼醉以入房多致脚氣脚爲腎

之外候司下體腎屬水主寒化暴寒傷人腎先受之水濕居下

脚先受之飲食入胃脾濕下流注於足而不散風寒暑濕皆能

患此而濕熱居多始覺惡寒發熱類傷寒但足脛紅光腫痛腿

膝酸疼小便短澀惡聞食氣甚至衝心作痛吐綠色水勿誤作

腫毒治腫者名濕脚氣宜滲濕清熱不腫而痛名乾脚氣宜養

血潤燥初宜敗毒散發汗疎邪瘟疫冬月五積散方見接本門

主方次服當歸拈痛湯身痛方見脈浮風緊寒濡濕數妄言不食危

主方 蒼朮 羌活 當歸 防風 防已

簡明醫錄 卷之二 脚氣 二六

澤瀉 酒苓 苡仁 牛膝 右加姜棗水煎服

筋寧加木瓜靈仙 大便秘積實大黃 小便澀猪苓茵陳

或大腹皮檳榔荆芥烏藥陳皮紫蘇枳殼桑皮木瓜加姜煎

檳榔湯 治一切脚氣踈墜利膈

香附 陳皮 紫蘇 檳榔 五加皮 木瓜

灸草 加生姜一片水煎服

濟察方 脚氣入腹衝心大痛腫滿大小便秘

蘇子 蘇子 木瓜 羌活 白芍藥 檳榔

枳殼 青皮 甘草 加姜煎磨沉香 調服

鷄鳴散 男婦脚氣風濕流注筋脈腫大痛極第一効

檳榔七枚 陳皮 木瓜各壹兩 吳茱萸貳錢 生姜 桔梗各五錢

紫蘇叁錢 右為粗末分四服。晨宿用水三鍾煎。鍾半查再水二

鍾煎一鍾并置床頭五更分數次冷服冬月胃弱服後餅物

加味二妙丸 兩足感濕熱腫痛如火漸至跨腹或脚氣常發

蒼朮四兩 黃柏酒炒 牛膝 防己 當歸俱酒浸 草薢川

龜板酥酒 熟地搗各壹兩 右末酒糊丸。桐子大每百九空心鹽酒

當歸拈痛湯 濕熱脚氣最効及肢節腫痛遍身大痛方見

簡便方 脚氣必効 蒼朮製 黃柏製各四錢 水煎空心服 外包

煖鹽炒熱熨 或小便乘熱浸洗 多食煮白蘿蔔下氣

脚氣冲心 白礬三兩用棗木一斗五升煎數沸浸脚良

簡明醫發 卷之二 脚氣 壬九

○足跟痛 有痰有濕熱有血熱察其兼證脈理推療如患風

寒瘧邪等而足跟痛但宜清解足太陽經邪病痊自已

主方 蒼朮 防風 枳殼 當歸各壹錢 防己壹錢

牛膝 薏苡仁 木瓜各壹錢 水煎服 血熱四物加黃柏知

母牛膝 寒痰五積散加木瓜 濕熱除濕湯加薏苡仁

秘結

經曰北方黑色通入於腎開竅於二陰藏精於腎又曰腎主五

液故腎實則津液足而大便潤腎虛則津液竭而大便燥凡大

便秘結皆由房勞過度或恣飲酒喜食辛熱飲食火起於脾胃

淫慾火起於命門致陰虛血耗火盛水虧津液少生傳道失度

有高年血少或脫血腸枯或新產血竭或虛人運滯皆成斯證

惟當養血滋陰滑澀潤燥勿妄通利耗傷真元再發轉甚辯風

秘氣秘熱秘寒秘濕秘之異酌治若日久幽門不通上衝吸門

不開漸成噎膈者有矣脈沉伏而結自汗小便澀忌攻宜法潤

主方熱 當歸 生地 熟地 麻仁 桃仁

杏仁 枳殼 厚朴 條芩各七 大黃酒蒸五分 水煎服或

血虛加芍藥倍歸地桃仁 風秘郁杏仁羌活皂莢 氣虛

人參麥冬 氣實檳榔枳實 痰多瓜蒌竹瀝 老人天麥

冬薤仁倍歸地 產後加人參紅花倍歸地 幽門不通加

脾約丸 治腸胃燥熱大便不通宜兼燥證茶酌

簡明醫發 卷之二 秘結 三千

大黃酒 厚朴 枳實 白芍各貳兩 杏仁 麻仁各兩

右末煉蜜和丸桐子大每服三十九空心白湯下常服寸九

潤腸丸 治脾火腸燥秘結少食 瓊脂膏潤燥通便二方並

蒲中益氣湯方見 治氣虛秘加養血潤腸藥 血虛四物約九

四物湯婦科 治血燥秘加桃仁大黃等 為末蜜丸三十九湯下

搜風順氣丸 能潤腸宜水久服諸病皆効方見

掩臍法 大小便秘葱壹 薑壹 豉壹 鹽壹 共搗掩臍帛縛自通

塞導 猪膽 香油灌等法見傷寒門

簡便方 便秘 硃砂壹錢 真蘆薈壹錢 研細滴好酒和丸作

又 黑丑半斤 研末每服二錢熱茶下 或麻子研和米煮粥

又 羊蹄根一兩水煎服 常食豬油及雪梨妙

又 菘蓉壹個手參四兩 白酒三椀煎一椀服峻補精血便通

積熱

經曰諸病喘逆轉筋反戾小便渾濁癰疽瘍疹痛氣結核吐下

霍亂脊鬱腫脹鼻寒翹衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚惑

悲笑譫妄衄衄血汗皆屬於熱熱毒蘊積非朝夕之故人生陰

平陽秘神氣以寧無熱可積狗情縱欲因致積熱皆出於心甚

則傷血或在心肺之內令人口苦咽乾涎唾稠粘目澁多眵蓋

心氣通於舌脾氣通於口故口舌生瘡便秘等證皆積熱所致

也經曰衄麤大者陰不足陽有餘為熱中也治宜清熱降火食

簡明醫說

卷之二 積熱

三

主方 黃連 連翹 黃芩 梔子 薄荷

大黃 甘草 芒硝各七分 加灯心水煎服 咳嗽痰多胸

膈脹滿大便利加桑皮杏仁枳殼桔梗去芒硝大黃

清炎解毒湯 長切內熱痰盛腮腫項核口舌破爛生瘡

牛旁子錢 甘草半錢 犀角 防風 荆芥各壹錢 水煎服

既濟清神散 益腎水降心火清上實下

桔梗 黃芩 川芎 山梔 當歸 羌活

白朮 茯苓各八分 知母 甘草 薄荷各五分 煎入蜜

神芎丸 一切熱證常服清頭目利咽喉清痰利氣神強體健

滑石 黑丑各四兩 大黃 黃芩各壹兩 黃連 薄荷

川芎各五錢 右末水壺九桐子大每四十丸常服廿九溫水下

碧雪 一切積熱喉閉口瘡發熱煩悶壅塞九頻膺喉閉壅塞吹

簡便方 熱煩不食 稀荻草搗汁服 或藍靛水調下

熱毒 雞子清壹盞 和服 或軟石膏煨研每服一錢水下

熱渴 葛粉四兩 粟米半升 水 拌煮粥食 雪梨西瓜甘蔗可食

熱攻心 牛旁子根搗汁飲 諸熱用六月雪煎湯日三服

霍香正氣散 傷寒頭痛發熱咳嗽痰飲霍亂嘔逆中脘疼

藿香 紫蘇 桔梗各一錢 白朮 厚朴各八分 前胡

陳皮 半夏 茯苓 甘草各六分 腹皮 白芷各五分

右制加生姜三片黑棗一枚水煎熱服蓋取微汗查再煎

簡明醫說

卷之一 積熱

三

桂苓甘露飲 清暑除熱利小便止煩渴霍亂吐瀉

澤瀉一錢 猪苓五分 茯苓 白朮各一錢 肉桂五分 滑石

寒水石 石膏各錢二分 甘草四分 水煎研末服亦可霍亂姜湯下

發背方 收龜板去肋黃 研末服外五倍子末二錢 騰黃三錢 醋

疔瘡方 露天鐵鏽研極細金銀簪甲批被擦原皮蓋根出安

下疳方 小刺即小 土枸杞根皮各 煎濃汁頻浸三日痛止愈

肺癰方 魚腥草煮汁不佳飲即痊或金絲荷葉白酒搗汁飲

更毒方 棉地榆四兩 山甲二片 白酒三碗煎加甘草銀花白芷

梅瘡棉花子仁搗 槐花細末 對口金銀花槐樹水酒煎飽服

新刊簡明醫說卷之二

新刊簡明醫教卷之三

武林白石孫志宏克容氏編輯

男九錫九疇全訂

諸氣

經曰怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收是則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結此九氣之為病也夫怒則氣逆甚則嘔血及發泄喜則笑不休為毛華焦甚為狂悲則陰縮筋攣女人血崩恐則肉脫骨痠痿厥寒則水液澄澈清冷是則嘔逆吐酸暴注驚則潮涎口噤痼疾勞則喘息汗出氣竭思則氣鬱不眠中痞不食等證內經治七情九氣之法皆以五行

五志之理

諸氣

五志之理制而勝之深中痛情之至治也夫怒動肝火喜動心火思動脾火憂動肺火恐動腎火凡一經氣盛則病如怒甚者病屬肝木宜肺金勝之當以悲憂苦楚之言感之故悲可以治怒如喜甚病屬心火宜腎水勝之當以恐懼死亡之言怖之故悲可以治喜如悲甚屬肺金宜心火勝之當以諛浪褻狎之言娛之恐甚屬腎水宜脾土勝之當以慮彼忘此之言奮之思甚屬脾土宜肝木勝之當以汚辱誣罔之言怒之夫何今人不諳化理徒以方藥治之與情志之病殊不相通鬱結諸病必令自道但以藥餌助之氣無補法誠為大蔽如邪氣壅盛必宜驅散病去五則中和病去七則漸兼補益矣氣脈必沉沉極則伏滿

玉方

陳皮 半夏 茯苓 枳殼 神麩

青皮 厚朴 各八分 蘿蔔子 研 撫芎 桔梗 蘇子 研

香附 各壹錢 右加姜三片水煎成磨水香汁五匙服 鬱怒痞

脹作痛加枳榔三稜木通蓬木 氣急加葵仁 面目浮腫

加猪苓澤瀉葶藶兼外邪加紫蘇前胡羌活蒼朮甘草 血

瘀腹痛加赤芍玄胡鬱金 脇痛加柴胡膽草黃連 目眩

痛加草豆蔻 不食加藿香砂仁麥芽山查 氣閉加烏藥

蘇梗 久變成熟者加姜製黃連山梔 初起兼寒凝者宜

溫散加吳茱萸小茴香

小香檳榔丸 一切滯氣痞塊心腹脹痛脇滿吐酸痰涎食積

簡明醫教

卷之三

諸氣

二

酒毒及痢疾便閉不通積熱口乾煩燥能推陳 致新滋陰抑

大黃 貳兩 黑丑 頭末 香附 醋炒 四兩 木香 枳榔 枳殼

青皮 當歸 陳皮 三稜 蓬木 黃連

木通 蘿蔔 子各壹錢 甘草 各壹兩

右為末水法丸如菜豆大每服百丸姜湯送下

蘇子降氣湯 治心腹脹滿喘促短急

蘇子 半夏 麩 前胡 當歸 陳皮 厚朴 製各

官桂 甘草 各壹分 右咀水二鍾姜三片 煎七分不拘時服常

升陽順氣湯 治七情所傷及勞役飲食不節滿悶短氣

人參 黃芪 陳皮 半夏 升麻 柴胡

當歸 黃柏分 草豆蔻分 神麩分 甘草分 加姜水煎服

分消導氣湯 治氣痰壅盛二便不利

桔梗 枳殼 厚朴炒 青皮 香附子製 茯苓

半夏分 瓜蒌 黃連 川貝母 檳榔 澤瀉

川芎 麥芽 木通分 甘草分 水煎服或神麩糊丸

復元通氣散 治氣不宜通腹脇刺痛或成瘡節并攪挫作痛

舶上茴香炒 川山甲蛤粉炒去 玄胡索兩 白牽牛兩

甘草炒 陳皮去白 木香七錢 白芷 天粉 青皮各二 貝母一兩

右為末每服一錢熱酒調下病在上食後服病在下食前服

四磨飲 理諸氣 真沉香烏藥枳殼檳榔等分水磨服

簡明醫教 卷之三 諸氣 三

蘇合香丸 一切鬱氣壅滯等證方見中藥

參蘇飲 發散諸氣方見傷風

簡便方 除氣快氣 黑丑末 木香 檳榔 蘿蔔子等 為末白湯下暫用

又 陳 蘿蔔子研 等分為末服 或陳皮蘇梗水煎服

又 烏藥香附為末服 或陳香圓木香一味湯服或姜葱煎法見傷寒

鬱 經曰治五鬱者木鬱達之謂吐之令其調達火鬱發之謂汗之

令其疎散土鬱奪之謂下之令無壅碍金鬱泄之謂溲泄解表

利小便水鬱折之謂抑之制其衝逆六鬱者氣血溼熱痰食也

鬱者結滯而不得發越也人之氣血冲和百病不生一有凝聚

諸病生焉在婦人尤有貪戀慈愛妬嫉憂患八者染一則堅牢

不破無論富貴貧賤感此最多氣鬱胸脇脹痛脉沉而澀溼鬱

周身走痛陰雨則發脉沉細熱鬱脊悶煩心小便赤脉沉澀痰

鬱行動喘急脉沉而滑血鬱四肢無力能食便血脉沉而孔食

鬱酸酸腹飽惡食氣口脉紫治宜發散鞠鬱詳審其由凡久病

必開鬱破滯令氣血調和始愈

主方 香附童便或醋炒 撫芎 蒼木 神麩 陳皮

桔梗 右加生姜水煎服 氣加木香青皮蘇子厚朴枳殼

溼加羌活白芷澤瀉 熱加梔子連翹 痰加貝母茯苓半

夏海石 血加桃仁牡丹皮紅花 食加山查麥芽厚朴砂

簡明醫教 卷之三 鬱證 四

仁檳榔 痰鬱不能吐咯氣鬱不舒先用稀涎散吐之方見中藥

越鞠丸 治諸鬱 香附製 蒼木製 神麩炒 梔子炒 撫芎等

右為末水法九象豆大每服百丸白湯送下加貝母尤効

六鬱湯 能解諸鬱 陳皮去 貝母 連翹 蒼木 枳殼 撫芎各壹

梔子炒 赤茯苓分 香附子或錢 蘇子 砂仁研各五分 右水二盞

姜三片煎一盞溫服 氣鬱加木香檳榔蘿蔔子倍香附砂

仁 溼鬱加白朮倍蒼木 熱鬱加苓連倍梔子 痰鬱加

南星半夏 血鬱加桃仁紅花赤芍 食加山查神麩麥芽

木香栝榔丸 治氣鬱食鬱胸膈痞滿大便結滯方見諸氣

生薑飲 治食鬱久則胃脘有瘀血作痛大能開提氣血

生薑加酒一二杯同服 治諸 木香砂仁白荳蔻等分 研末每五分不拘時白湯下

簡便方 治諸 木香砂仁白荳蔻等分 研末每五分不拘時白湯下

或木香酒磨下或砂仁白荳蔻常嚼一粒佳 鬱金酒磨服效

又 枇杷葉刷去毛 蘭香葉二味煎湯時時啜之或貝母嚼細白湯送下

梅核氣

是證因七情之氣鬱結不舒或因飲食之時觸犯惱怒婦人患此最多總由痰與氣結狀如梅核或如破裂停於咽嗑之間咯之不出嚥之不下或中脘痞滿氣不舒快或痰壅熱盛上氣喘

簡明醫發 卷之三 梅核氣 五

急或留飲惡心嘔吐涎沫久久不已則為噎膈開格之漸治宜

開鬱順氣利膈化痰清肺為主

主方 陳皮 半夏製 白茯苓各壹 枳實 青皮

南星製 蘿蔔子 蘇子 神麩炒 砂仁炒 白豆蔻研

益智 檳榔各五分 右姜五片水煎成調砂蔻末臥牀慢服

氣鬱加香附撫芎厚朴脹加青皮腹皮 火加梔子黃芩

七氣湯一名四湯 治七情九氣結滯成痰狀如破裂或如梅核在

咽喉之間咯不出嚥不下中脘痞滿氣不舒快或痰飲嘔逆

等證並皆治之神効

半夏 茯苓各壹 柴蘇葉 厚朴姜炒各貳錢 右煎一盞食後服

簡便方 用臘糟不下水者一斤朴硝淨者半斤和勻新磁罈

收貯封置淨處每取三匙煎湯一盞臥牀慢飲

關格

經曰陰陽不相應病名曰關格難經曰五藏不和則九竅不通六腑不和則留結為癰邪在六腑則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣邪在五藏則陰脉不和陰脉不和則血留之血留之則陰脉盛矣陰氣太盛則陽氣不得相榮也故曰格陽氣太盛則陰氣不得相榮也故曰關陰陽俱盛不得相榮也故曰關格關格者不得盡其正命而死是證膈中覺有所碍欲升而不升欲降而不降欲食不能食此謂氣之橫格也關

簡明醫發 卷之三 關格 六

者則不得大小便甚熱之氣在於下焦填塞不通無出之用故

曰關也格者則吐逆不能食甚寒之氣在於胸中遏絕不納無

入之理故曰格也胸中有寒者當以熱藥治之丹田有熱者當

以寒藥治之胸中之寒丹田之熱上下治法主當緩治客當急

治經曰陽盛陰不得榮故人迎大三倍于寸口曰關陰盛陽不

得榮故氣口大四倍於人迎曰格

主方 陳皮 白茯苓 貝母 枳實炒 蘇子炒

瓜蒌仁 香附炒 撫芎 厚朴各七分 木香 沉香各五分

另甘草分 右生薑三片水煎加燈心竹瀝磨沉香木香調服

利格湯 治關格

陳皮 滑石 木通 各壹分 半夏 茯苓 各八分 人參 盧氏 半

甘草 四分 右姜棗煎服再煎探吐 如氣虛脾弱治宜吐法

以提其氣之橫格不在痰也 有痰者二陳湯吐之 如中

氣不運者利格湯去滑石木通參蘆加入參白朮升麻枳實

灰薑 如胃寒不納以沉木香砂仁白蔻為末不時舂噉下

焦大便不通以承氣湯為末糊丸晒燥湯下或以大黃末布

條圍胸中作窩朴硝湯逐匙漬之大便通痰多二陳湯加木

噎膈

經曰三陽結謂之膈又曰少陽所致為嘔湧溢食不下食不得

入是有火也是證因七情過極房室勞役致五臟火熾血液枯

清用醫教

卷之三

噎膈

七

涸煎熬成痰漸至胃脘乾稿近咽噎間則水飲可行食物難入

名之曰噎稿在胃脘食雖可下不能運行良久復出不出則噎

滿難當名之曰膈既無穀味生養氣血自然衰憊或因病起微

漸之時惟欲速効過用香燥辛熱之藥損傷陰血而致者然去

死不速也脉寸緊而尺微瀆浮弱氣虛瀆小血弱治宜補氣養

血順氣消痰清熱五噎者憂思氣勞食也五膈者思憂喜怒悲

也此神思間病惟內觀自養神靜陰生陰生則血生火降而腸

胃滋潤能斷厚味庶不助火若吐白沫糞如羊屎者不治

主方 人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮

半夏 黃連 甘草 右加姜棗煎磨入沉香汁

氣虛加黃芪 嘔加藿香砂仁 助胃加山藥蓮肉 消食

山查麥芽 開鬱香附神麩撫芎山梔 氣脹不舒加木香

蘿蔔子 大便秘加酒煮大黃 肥人多痰加二陳製半夏

貝母萸仁藥中入竹瀝姜汁少許菲汁童便隨尿服 瘦人

四物養血少加桃仁紅花常宜人乳牛羊乳少入姜汁蜂蜜

砂糖甘蔗汁梨汁作飲枇杷葉青橘葉蘭葉煎湯飲御米粟

米煎粥入竹瀝食此證有乾食糯米飯絕不飲茶湯而安者

五噎五膈散 治膈噎等證

人參 半夏 桔梗 白朮 白豆蔻 木香

沉香 乾姜 枳頭糠 草澄茄 甘草 枇杷葉

清用醫教

卷之三

噎膈

八

右加生薑七片水一盞煎服

生薑汁煎 治噎食不下咽喉壅塞胸膈煩悶等證

生薑 白蜜 牛酥 人參 百合 右藥入銅

鉢中以慢火煎管不拘時每用三匙用人參百合湯調下

枇杷葉煎 治五噎立効

枇杷葉 陳皮 生薑 水盞半煎七分作二次

嘉禾散 治脾胃不利胸膈痞悶氣逆生痰不進飲食五噎

砂仁 白茯苓 薏苡仁 枇杷葉 桑白皮

沉香 五味子 甘草 木香 青皮 藜芽

藿香 隨風子 石斛 大腹皮 陳皮 半夏麩

神麩炒 檳榔 杜仲美汁炒斷 絲各參分 白豆蔻 丁香

人參 白朮各五分 右水二盞姜三片棗二枚煎八分食遠服

五噎入柿乾一枚 膈氣吐逆入韭白三寸棗五枚同煎

人參和膈丸 治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯膈噎聖藥

人參 當歸 藿香各壹兩 木香 檳榔各七枚實炒

甘草各八錢 厚朴姜炒 大黃煎兩 右為末滴水丸桐下三十九

翻胃

經曰濁氣在上則生膈脹邪氣逆上則嘔而吐是證由榮衛俱

虛氣血不足停水積飲于胃則臍冷而脾不運行氣逆而成翻

胃也故朝食暮吐心下牢大如杯甚則食已即吐經曰得效則

胃用醫發 卷之三 九

且絕穀則亡穀味難進去死不速患者知此萬緣屏息澄心靜

養參酌方藥尤宜食乾飯以陳年醬姜下之渴以甘蔗汁少入

姜汁為飲能飲熱鹽尿最佳切忌羹湯生冷硬物近世多以辛

香燥熱之藥治之間有虛寒者取効若食已即吐屬實熱者用

之因辛能行氣破滯雖然暫可由是五臟之火反熾脾胃之陰

愈傷病轉甚矣尤有藥餌將養得宜遂獲小愈則百念復生欲

食雜進病加不能生全理當預知如有痰熱大便燥秘日服滾

痰丸數分方見脈緊而弦為虛寒浮緊滑數皆為熱小新運滋

為寒而正氣虛兼助元健脾胃為本

主方 半夏 厚朴 丁香 黃連 陳皮

茯苓 蒼朮木州 浸炒 竹茹 枳殼各八分 香附子 神麩

澤瀉 當歸 白豆蔻各五分 甘草煎

右生姜三片水二鍾煎八分入磨沉香汁服

和中桔梗湯 治上焦氣熱上冲食已即吐脈浮而洪

桔梗兩半 夏麩煎兩 陳皮壹兩 白朮伍錢 枳實炒 白茯苓

厚朴壹兩 右咀每服一兩煎取清汁調木香散二錢隔夜

空腹服三服之後氣漸下吐漸止然後去木香末每料中加

芍藥二兩黃芪一兩五錢服之便愈如大便燥硬食不能下

以小承氣湯微下之少利為度再服前藥補之木香散木香

檳榔各等分為末見小承氣 傷寒

胃用醫發 卷之三 反胃方 十

茯苓澤瀉湯 治翻胃吐而渴欲飲水

澤瀉兩 白茯苓半兩 甘草 桂枝各兩 白朮壹兩 生姜四兩

右水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服三合日三

服一方有小麥一升

青金丹 治翻胃及一切寒熱嘔吐百藥不効者一服即止

水銀壹兩 硫黃伍錢 右同研至不見星每服壹錢濃生姜陳皮

湯調下 未止再服或姜糊丸衆豆大姜湯下屬寒者二錢

姜汁酒熱調服厚被蓋出汗小兒量服

更以半夏 陳皮 茯苓 厚朴 藿香 蒼朮 各壹兩 生姜 七指入

水煎成調砂仁炒明服另取姜汁半盃和湯一盃熱而飲者

每進藥一口姜湯一口送服完頓飲熱姜湯垂死者用人參

二錢水煎頓服日再進以人參煮粥食未安再服

滾痰丸 治痰熱吐方見荆黃湯 熱氣冲逆食已即吐方見

簡便方 平胃散依方製成姜汁紅棗九鹽湯下或姜棗同研服

又 六一散 生姜自然汁澄下稠者糖果店榨和九兼豆大

又 白粳米汁合生姜汁合和服 又 乾柿餅燒灰壹酒下

又 米粉搜和成劑丸如桐子大煮熱點鹽少許空心吞

又 大附子壹個姜汁煮乾母丁香拾個共為末以少許安掌中

又 蚯蚓尿壹兩木香伍錢共為末神麴糊為丸陳皮姜湯送下

痞滿

南明醫教 卷之三 痞滿

十一

經曰太陰所至為積飲痞滿痞不通之謂精神榮衛氣血津液出入流行之紋理闕密而為痞也有傷寒下早邪氣攻上而痞者有雜病下多亡陰血虛而痞者有中氣虛弱不能運化精微而痞者有飲食痰積壅塞而痞者有溼熱太甚而痞者蓋痞與脹不同脹滿則內空虛而外有形痞滿則內闕實而外無狀脉宜浮滑忌短濇治宜察其虛實而行攻補實人略與疎通隨宜調補不可專於通利暫得寬舒再作益其

主方 陳皮 半夏 茯苓 枳實 黃連姜炒

厚朴姜炒各八分 草豆蔻 木香 蒼朮 青皮

柴胡各五分 乾姜 吳茱萸各參分 右水煎服 脾虛無血加當

歸芍藥川芎白朮 鬱加香附神麴 中氣虛痞加人參白

木蒼朮 痰積加貝母山查麥芽 溼熱加酒炒黃芩梔子

蒼朮 肥人溼痰半夏茯苓木滑石 瘦人枳實黃連芍

藥升麻 痰挾血成窠囊桃仁紅花香附大黃鬱金

黃連消痞丸 治心下痞滿小便不利有熱者

黃連炒兩 黃芩炒 乾姜各參錢 茯苓 白朮炒 甘草炙

厚朴製 豬苓各五錢 枳實壹兩 陳皮七錢 澤瀉 姜黃各參錢

砂仁五分 半夏製壹兩 右為末蒸餅丸桐子大每服百九白湯送下

開結枳實丸一名木香 治溼痰留滯胸膈痞悶時作鳴聲

枳實炒 白朮 半夏製 南星泡 枯礬 大黃

南明醫教 卷之三 方

十一

青皮 木香各五錢 牽牛頭木 皂角炙 旋覆花各壹兩

右為末麴糊丸如桐子大每服三十五丸米飲下

香砂枳實丸 治痞 保和丸並見

簡便方 痰食積痞 半夏為末姜汁和作餅子用溼紙包慢

火煨香熱水二鍾餅一個鹽五分煎至一鍾服

又 涼物過飽不消遂成痞 用馬牙硝一兩以陳年吳茱萸

半煮濃汁入硝乘熱服良久未轉更服

又 用枳實炒為末每服二錢清粥湯送下

又 卒得胸痛雖根搗自然汁飲 姜葱並見

腹脹

經曰。諸腹脹大。鼓之如鼓。皆屬於熱。又曰。腹滿脹。脹支高。肚脹。下厥上冒。過在大陰陽明。乃寒溼鬱遏也。是證雖因七情勞役。飲食失節。房室斲喪。及風寒暑溼。皆能致此。然怒氣抑遏而成者多。蓋鬱怒日積。則肝木氣盛。而脾土受尅。脾能生養萬物。為一身之主。雖具坤靜之德。而有乾健之造。脾土既虛。胃雖納受。水穀而轉輸之官失職。不能司消化之令。運行精微。分布灌溉。致使心肺之陽不降。腎肝之陰不升。而成天地不交之否。清濁澗滯。而成壅塞。溼氣不流。鬱而為熱。溼熱留積。因成脹滿。若四肢齊腫。是為水腫。治之尚易。如單腹脹。膠固難除。脈盛而堅。遲而滑者。為脹。浮大順。虛小逆。治宜和中順氣。健脾利水。

簡明醫說

卷之三

腹脹

三

主方 陳皮 茯苓 蒼朮 厚朴 枳實

香附各錢 猪苓 澤瀉 大腹皮 木通各八分 木香五分

砂仁一分 加生姜燈心水煎。調木香砂仁服。如腫甚兼用

神佑丸二服方見 以指按之有凹不起者屬虛。加扁豆白

朮當歸各八分 以手按之隨手凸起者屬實。加三稜蓬朮

椰青皮益智 便秘加大黃酒 邪去正虛加人參 氣下

陷加升麻柴胡各分 不食而嘔加藿香 先脹而後喘者

治在脾。加扁豆麥芽草少 先喘而後脹者治在肺。加黃

連黃芩麥門冬 痰加南星半夏麴 朝寬暮急屬血虛。加

當歸紅花酒 去脹草果 熱加梔子黃連 暮寬朝急

屬氣虛。加人參白朮 寒加乾姜肉桂藿香丁香茴香吳茱

萸 腰以上腫。宜發微汗。參蘇飲方見 傷風之類 鬱加撫芩神

麴益智草豆蔻烏藥 腰以下腫。宜利小便。加石蓮子滑石

下氣加沉香蘇梗 痛加姜黃玄胡

五子五皮飲 治壯實人初感可用。病略減止服

梔子皮 大腹皮 生姜皮 茯苓皮 陳皮 蘿蔔子

香附子 車前子 葶藶子 蘇子 右水煎服

蘇子湯 憂思過度致傷心脾。腹脹喘促。嘔逆腸鳴。二便不利

紫蘇子壹兩 大腹皮 草果 半夏 厚朴 木香

陳皮 木通 白朮 枳實 人參 甘草各錢

簡明醫說 卷之三 腹脹 右每服五錢水盞半姜三片棗一枚煎七分服

木香順氣湯 治濁氣在上則生膈脹

木香 草蔻麴 蒼朮製各 厚朴製四 當歸五分 陳皮

澤瀉 乾姜 吳茱萸泡 半夏各分 升麻 柴胡各分

右咀作一服水二盞煎服。忌生冷硬物。惱怒房勞

鷄屎醃散 治心腹脹滿。且食不能。暮食致成嘔逆鼓脹

鷄屎醃鷄屎炒極熟入 大黃 桃仁各等

右為末。每服二錢水盞半姜三片煎七分食前服

簡便方治腹 草豆蔻為末。每服五分 木瓜 又 煨榔為木每二

又 獨蒜煨熟去皮。綿裹納下部中。冷即易。又治開格腹脹大

又用葶藶炒紫色酒浸七日研爛每服三匙好酒送下

蠱證

經曰病久則傳化上下不并也。不通易以上下垂隔不通為蠱。其

證乃陰陽氣血皆虛出入升降違度先由大怒致肝木盛極剋

制脾土運行失職遂成中滿痞塞諸疾漸而正虛邪實以成膠

固難起之病至此欲攻恐正氣愈虛欲補恐邪氣轉熾僅可中

和調之此際猶有恣食縱怒者自速死耳欲行治理必絕怒氣

斷鹽醬速音樂戒鴛鴦淫諸物循序服藥十生一二脉浮大

順虛細逆或患人急脹痛苦之甚姑以腹脹痞滿水腫諸方及

三花神佑丸方見暫用數服次以主方接服消補兼行。

備用醫案

卷之三

蠱

主方 人參五分 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉各錢

木香 白豆蔻 陳皮 木通 右水煎服

分清丸 治氣蠱腹脹如鼓俗名單腹脹臍突堅硬如石

厚朴 枳實 黃連 乾姜 知母

澤瀉 海金沙 陳皮 猪苓 人參 薑黃

黃芩 白朮 甘草 右為末水丸每服錢

經驗桃奴丸 治血蠱腹上有血絲婦女月經不通腹中有塊

脹痛及男子墜馬跌撲瘀血留積脹痛等證

桃奴 小兒便 蝦鼠糞 玄胡索 香附子

肉桂 五靈脂 桃仁 如泥 砂仁

右為末水法丸如桑豆大每服三錢空心溫酒送下

利水益元散 治溼熱為病二便不利正氣虧虛等證

茯苓 白朮 人參 猪苓 澤瀉 滑石

甘草 右為末每服三錢食遠燈心湯調下

簡便方 蠱服用馬鞭草到晒勿見火或酒或水煎服

又初感氣實有痰陳葫蘆一吐幾危吐後腹漸寬

封固重湯煮數沸去子飲酒盡一吐幾危吐後腹漸寬

水腫 附陰腫

經曰肺移寒於腎名曰湧水如溢囊裏漿或遍身腫滿疾行則

濯濯有聲諸有水氣者微腫見於目下也身浮而光手按成窟

簡明醫案 卷之三 水腫 夫

寒手即滿上則喘咳氣急下則足腫皆原大小便短澀不利皆

因脾虛不能制其腎水水氣妄行漬於肌肉蓋以脾虛則肺金

既不得母氣之養又肝木無所畏更來侮土此脾所以益虛也

土弱則水愈強故腫不易消古方多用攻下之劑特攻其標耳

治法必養脾土上輸精氣以全運化之職保肺氣以下降滲道

開通敗濁之邪其稍清者復迴而為氣為血為津液其敗濁者

在上為汗在下為溺而分清矣脉洪數為熱沉遲為寒浮大則

順沉細則逆

上方 香薷 赤小豆 桑白皮 白朮

蒼朮 猪苓 澤瀉 赤茯苓 大腹皮 防已

厚朴各八分 滑石壹錢五分 右加椒目燈心水煎服 加減法

前腹脹相類 五子五皮飲神佑九可兼用

茯苓散 治諸般氣腫

澤瀉 芫花醋拌 郁李仁 甜葶藶 漢防已 藁本各半錢

陳皮去 白茯苓 白檳榔 瞿麥各五錢 滑石 大戟各七錢

右為細末每服二錢桑白皮煎湯空心調服取下碧綠水如

爛羊脂為度忌鹽醬百日不可多服

當歸散 水腫多由腎水不能攝養心火土無所滋水溢泛溢

滲透經絡發為浮腫

當歸 木香 肉桂 赤茯苓 白朮 陳皮

前中醫書 卷之三 腫方 十七

木通 赤芍藥 檳榔 牡丹皮 紫蘇等 水煎服

簡便方 治水腫 香薷為末史以香薷為末煎汁熱膏為細丸日三服

又 黃瓜根 切開勿去子醋煮一半水煮一半空心食

又 棗子一斤 放鍋入水滄四指以大戟根苗兩 鋪上煮乾去戟食棗

又 苦葫蘆子炒為末每服二錢陳皮木通湯或酒下

又 猪腰子一個分七片其逐末壹分摻入溼紙包煨熟頻食

又 瓜蒂末分 吹鼻內日三次未愈黃芩末五錢 煎湯服

又 香附醋糊丸服 又 馬齒莧少入粳米醬汁煮食

○陰腫 是證由膀胱蘊熱風溼相乘或因溼熱水腫流注或

痛氣攻作或暴風客熱及小兒啼叫怒氣結聚或坐溼地於石

或蟲蟻吹毒所致詳其所因而施治之

主方 白朮 桑皮 木通 陳皮各半兩 白丑兩

右共為末每服二錢小兒止服五分空心姜湯調下

治小兒啼叫成者 桃仁去皮 官桂 黑丑炒 白茯苓

牡丹皮大黃各錢 為末蜜九桐子大每五十九青皮木通

治小兒陰腫 牡礪煨研粉津調敷次以粉擦之

五苓散 加丹皮防風服 或桃仁研膏津唾調敷

又 蟬蛻五錢煎水頻洗仍以五苓散加燈心煎服

簡便方 治外腎腫 小茴香 川山甲炒 木香各等分 為末

男婦陰腫 馬鞭草搗爛絞汁塗 小兒用老杉木燒灰入醋

前中醫書 卷之三 陰腫 六

又 荊芥一兩杜硝二兩蘿蔔子一兩五錢葱白同煎洗

又 葱園蚯蚓糞甘草煎汁調塗或生薄荷汁敷亦可

外腎腫 大黃末醋調塗乾再塗或加牛糞燒灰等分

積聚

難經曰積者陰氣也聚者陽氣也故陽浮而動陰沉而伏氣之

所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所

成積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始

左右有所窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其

痛無常處謂之聚故以是別知積聚也蓋五積之名肝之積名

曰肥氣在左脇下如覆釜心之積名曰伏梁在心下如臂脾之

積名曰痞氣在胃脘如覆盤肺之積名曰息黃在右脇下大如
 杯腎之積名曰奔豚在少腹上若豚狀尤有癥者腹中堅硬有
 形可徵癥者假物而結推移可動痞者氣血凝聚肌肉之間癥
 者飲食凝滯外無形跡及痞塊多證皆不外乎七情鬱結痰食
 氣血而成凡積聚脈多沉伏或附骨癥瘕多弦實強順微弱逆
 治宜消積為標次兼養正為本 服藥最忌厚味發氣之物

主方 陳皮 厚朴 枳實 青皮 香附

山查肉各八分 三稜醋炒 蓬朮醋炒 砂仁 檳榔各六分 木香五分

右加生姜水煎服 痰積加半夏貝母海石芒硝去山查

血積加桃仁紅花官桂當歸尾 食積加神麩麥芽 痛加

消中散 卷之三 十一

玄胡索撫芎五靈脂草豆蔻 甚者加乳香沒藥 痞加黃

連 服加蘿蔔子 不消加黑丑良姜 吐酸加紅豆蔻

古方五九治五積琴書具載依法服亦多効但五方中皆有巴

豆霜近世鮮用今另考五方於左用者酌之

伏梁丸 治心積

茯苓去皮 厚朴炒 人參 枳殼炒 三稜煨 半夏泡

訂木各等分 右為木薄糊丸桐子大每五十九食遠米湯送下

瘕氣丸 治脾積

大烏頭去皮 附子同 川椒炒出 乾姜 桂心

赤石脂火煨 右為末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五

肥氣丸 治肝積

青皮 陳皮 三稜 蓬朮醋炒 黃連 枳實

厚朴各壹兩 檳榔 蘿蔔子炒 川山甲 肉桂 乾姜炮各

右為末入炒鹽三錢醋糊和丸桐子大每五十九食遠米湯送下

息黃丸 治肺積

半夏炮 桂心 人參 吳茱萸泡 桑白皮炙 葶藶

甘艸炙各壹錢半 右水二盞姜五片棗一枚煎至一盞服作丸亦可

奔豚丸 治腎積

乾葛 川芎 當歸 桑白皮炙 黃芩 甘艸炙

甘李根皮各壹錢五分 半夏泡 加生姜三片水煎食遠服亦可

消中散 卷之三 五積

香稜丸 治五積六聚三焦痞塞痰癥諸積

三稜醋炒 青皮 陳皮 蓬朮煨 枳殼 蘿蔔子

香附子 厚朴各壹兩 黃連 肉桂 神麩 麥芽

山查肉 檳榔 益智各壹兩 乾漆炒烟 木香 砂仁

桃仁各五錢 右為末醋糊丸桐子大每服七十九空心姜湯下

玄白丸 治五積六聚胸膈脹滿痞悶吞酸心疼腹痛脇下刺

痛遇風寒怒氣食生冷發氣之物勞碌憂愁則積攻動大痛

得熱熨暖氣痛減者宜服此

黑丑 白丑 良姜各四兩 砂仁 紅豆蔻 陳皮

三稜 蓬朮 乾姜各貳兩 青皮 草豆蔻 肉桂

玄胡索

五靈脂各五

右為末用真阿魏五錢剉細米醋

研化持入末內醋煮麵糊丸桐子大每服百九空心姜湯下

簡便方 治諸積 瓦楞子火煉七次為末酒調服即蚘殼

酒食積 丁香神麩麥芽香附砂仁共研末每貳錢

酒積酸嘔 神麩麥芽各壹黃連五巴豆霜壹錢同研為末湯

魚蟹積 紫蘇陳皮山查香附煎粉麵積 蘿蔔子炒研煎

痰癖癥結及諸蟲 馬齒莧和鹽醋煮一椀食有蟲盡出

厥外癥及氣塊 玄胡索為末猪胰一具切碎炙熟拌食

養食積塊 風化石灰丸服陳者尤妙食膾成瘕 馬鞭草搗汁入

發癥法 吳茱萸一斤搗碎酒煮乾布包熨冷再煮炒至移動

簡明醫說

卷之三

諸積

主

血證

經曰心出血肝納血又曰臥則血歸肝目受血而能視足受血

而能步掌受血而能握指受血而能攝所以動言視聽無非血

養又曰怒則氣逆甚則嘔血夫吐血者多因大怒傷肝憂愁思

慮傷心酒色過度陽盛陰虛水不制火或厚味醇酒以動胃火

感受之由不同無出于火載血上錯經妄行凡榮衛太虛腑

易損血脈空竭因而悲怒驚忿暴氣逆溢不循經絡血脈流

是證作矣諸失血多屬於君相二火諸經之熱煎逼其血而出

諸痰也色赤紫為熱極凡血上行者為逆復而下行變病為順

藥兼降氣則血歸經脈多孔清沉細者順洪大者逆身涼脈靜

者易治身熱脈盛者難治

主方 犀角磨汁牡丹皮 赤芍各錢生地黃錢黃連五分

右水一盞童便一鍾煎服 如血不止加茅根汁磨京墨汁

各半鐘和服 吐血出于胃加天門冬黑山梔阿膠焦荊芥

蒲黃 厚味動胃火加石膏枳殼 衄血鼻出咳血痰中血

絲皆肺火加黃芩連翹玄參 唾血咯血皆出于腎加黃柏

知母熟地黑山梔 凡血紫黑成塊胸中氣塞加大黃桃仁

大便血臟氣傷風邪入下血面黃時熱加防風枳殼柴胡升

麻槐角地榆 小便血小腸與心為表裏心熱則尿血兼有

膀胱火山梔滑石瞿麥木諸見血藥中可用藕節汁扁柏葉

簡明醫說

卷之三

血證

主

山茶花大小薊甚不止暫用廣西三七真花蕊石髮灰白芨

可以為末調服三錢止後多用鬱金山茶桃仁以清瘀血

無後患有吐多神昏不省者乃陰氣暴絕孤陽欲飛越而去

不能獨存急用人參一兩煎濃汁半鍾灌下氣復則甦如血

止火降胸寬氣和止是虛弱無力參芪白朮歸身之類補之

地黃飲子 治吐血衄血下血溺血等證皆屬于熱

生地 熟地 枸杞子 地骨皮 黃芩 天門冬

芍藥 黃芪 甘草各等 右咀每服七錢水二鍾煎八分

去查食遠服如脈微身涼惡風者加桂二分

必勝散 治男婦錯經妄行流溢或咳或衄血並治

小蘗 人參肺熱瀟黃 熟地黃酒洗 烏梅

川芎各壹錢 右阻作一服水二鍾煎一鍾不拘時服

麥門冬湯 治思慮傷心吐血衄血

麥冬 天門冬 遠志 當歸 白芍藥 生地黃

人參 黃芪 牡丹皮 阿膠 藕節 炙草各壹錢

右作一服每服水二鍾姜一片煎一鍾不拘時服

刺薊散 治衄血諸血經日不止

刺薊 苦參 黃連 梔子仁 生地黃 側柏葉

大黃炒各壹兩 右咀每服五錢水二鍾入竹茹五分煎八分溫服

槐榆丸 治大便下血諸痔及脫肛

簡明醫說 卷之三 血方 槐角子 地榆 枳殼 黃芩條 防風 當歸頭等

右為末水法丸桐子大每服二錢空心白湯送下

生艾葉 生薄荷葉 側柏葉 生地黃分

右俱搗爛丸如雞子大每用一丸煎去查服

十灰散 治癆證諸失血嗽血先服此

大蘗 小蘗 荷葉 側柏葉 茅根 茜根

山梔 大黃 牡丹皮 棕桐皮各燒灰紙包盛地下

先以藕節汁或蘿蔔汁磨京墨調末五錢 甚有去升平不能止者花蕊石髮灰三七白芨研末暫服 神昏服獨參湯

簡便方 治吐血 藕節荷葉頂各七個 水煎入蜜一匙服

又 鮮地黃汁壹升 姜汁半 和服 或生地酒煎服或生蜜湯服

又 百合搗汁飲煮食亦可 又 熟猪肝蘸白芨末食或單白芨

又 生藕生地黃大蘗各搗汁三合入蜜一匙服

又 蘿蔔搗汁和童便或鹽少許 舌上無故出血槐花末敷

止吐衄血 白芨末涼水調鹽花貼鼻穴中或貼印堂及鼻紙

封頰以涼水潤之 或溼紙搭頰項或頂心頰以涼水潤之

茅根煎 京墨磨 藕 萱草 馬鞭草 車前草並搗 百草霜或錫 梔

子研 黃葵子 炒黃糯米 髮灰 並可研末 涼水調下皆效隨用一味

止衄血 槐花 末 蓮房 髮燒 鴉鴉糞燒 梔子燒 皆可吹入鼻

簡明醫說 卷之三 血方 蘿蔔汁 車前汁 葱汁 皆可滴入鼻內石榴花瓣 皆可塞入鼻

咯血疔瘡 杏仁細研 青黛作餅以柿合溼紙裏煨慢嚼米湯下

大便下血 烏梅五倍子炒 白芷研末 米糊丸桐子大每服百

又 臭椿根皮為末醋 或殭蠶末烏梅肉 或苦練子炒黃為末

又 茄科燒灰 米湯下或木槿煎服 或山查末或五倍子末

小便出血 蒲黃炒 破故紗炒 陳石灰炒 等分研末湯服

又 辰砂五苓散燈心 或柿餅燒 米湯調下或車前子水煎服

又 蒲黃炒 後四物湯加木通車前子或車前草搗汁服

小便血條 當歸白芷為末煎湯下 或黃連黃柏末煎湯調下

又 五倍子末烏梅 或鬱金湯調下 或扁柏葉為末酒調下

傷食

經曰飲食自倍腸胃乃傷又曰飲食勞倦則傷脾脾傷則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之劑也又曰安穀則胃絕穀則亡蓋脾者陰氣也脾居陰靜之體而有陽健之用故司消化之令貴在節飲食以養脾使滋榮中外猶土氣盛而萬物發生若饑飽過則諸病所階右手氣口脈緊盛者傷食右關沉遲脾胃虛寒關沉而滑為食不消兩關弦大脾胃飽脹

三方 人參五分 白朮 茯苓各壹錢 炙甘草 陳皮

半夏 麥芽各七分 山查錢半 右加姜三片棗一枚水煎服

脾虛少食加砂仁白蔻蓮肉扁豆官桂 嘔加藿香丁香

簡明醫教 卷之十一 傷食 五

行氣香蘇散 外感風寒濕氣內傷飲食生冷腹脹頭痛身熱

紫蘇 陳皮 香附 烏藥 川芎 羌活

枳殼 麻黃等分 甘草半 加生姜三片水煎熱服取汗

寒甚加葱白 傷食山查麩芽 濕加蒼朮 隨宜加減

枳木丸 健脾強胃利氣消痰除痞滿化飲食定嘔吐止泄瀉

白朮土炒 枳實炒 右為細末荷葉湯煮老米飯為丸菜豆

大每服百丸食前白湯下 痰多加橘皮半夏 食不化神

麩麥芽各貳兩 腹痛瀉木香砂仁各壹兩 濕火噎酸黃連黃芩各

胃火 石膏梔子 血少歸芍 氣鬱香附蘿蔔子

保和丸 寬胸順氣消滯化食加白朮名大安丸

山查貳兩 茯苓 半夏 神麩 陳皮各壹兩 連翹

蘿蔔子各半兩 右為末水丸或神麩糊丸菜豆大每二錢白湯下

消痰利氣去濕熱快脾加蒼朮白朮香附朴實芩連酒炒 姜糊丸

葛花解醒湯 飲酒太過嘔吐痰逆胸膈不利神昏體倦

人參 白朮 茯苓 白豆蔻 葛花或根 砂仁各壹錢

陳皮 青皮 猪苓 澤瀉各柒分 神麩炒 木香各五分

右加生姜五片水煎食遠溫服取微汗或為末姜醋湯調下

瀉黃散 脾胃壅滯不食口内生瘡煩渴

防風 藿香 石膏煨 砂仁 山梔 甘草華分

右加燈心二十枝黑棗一枚水煎服

簡明醫教 卷之十一 傷食 五

簡便方 蘿蔔子炒研煎服 食已作脹飲淡鹽湯指攪探吐

飲食傷胸滿 即以所食之物如傷酒用酒藥飯食用鍋焦肉

食用肉骨之類燒成炭研細白湯下

經曰陽者天氣也主外陰者地氣也主內故陽道實陰道虛犯

賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之即內傷也

陽受之則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱時以上為

喘呼入五臟則腹滿閉塞下為飧泄瀉而完久為腸癖也蓋內

傷飲食勞役房室亦與外感相似誤治則危內傷則氣口右中

脈大寒熱間作惡寒得微煖即解惡些小風出言懶怯先重後

輕，手心熱頭痛時作時止，怠惰嗜臥，四肢不收，溫補外感則人迎左寸前脈大，寒熱齊作，惡寒得烈火不除，惡一切風，發言壯厲，先輕後重，手背熱，頭痛常無止歇，筋攣骨疼，拘急蹇臥，口能知味，宜湯，汗吐兼微邪，先用發散藥一劑。

主方 人參疑似 黃芩 白朮各壹錢 當歸八分 陳皮

茯苓 炙草各壹錢 柴胡五分 升麻五分 加姜三片 棗一枚 煎服

頭痛加川芎羌活 頂腦痛藜本壹錢 細辛分 痰加半夏前

胡 額痛白芷防風 嗽桑杏 食積查麩芽 舌乾葛根

煩渴天粉麥冬 熱芩連 下體無力牛膝杜仲 腳弱木

升陽順氣湯 飲食不節勞役所傷，腹脇滿悶短氣，春時則口

簡明醫要 卷之三

淡無味遇夏猶有惡寒，饑常如飽，不喜冷物。

人參壹錢 黃芩壹錢 白朮壹錢 當歸 黃柏炒 陳皮

半夏各壹錢 神麩分 草豆蔻分 升麻 炙草各壹錢 柴胡各二分

右加生姜三片水煎食前溫服

茯神湯 勞心思慮復損精神，眩日昏心虛氣短，驚悸煩熱

茯神 酸棗仁研入 麥冬各壹錢 芍藥

生地黃 川芎 陳皮 山梔各壹錢 五味十五粒 甘草五分

右加生姜三片龍眼五個水煎溫服

調中益氣湯 補中益氣湯並見 二方隨證服

倦怠嗜臥 夫胃主納受脾主運動，脾虛穀氣不克脾愈無

所稟矣，脾運四肢既稟氣有虧，則四肢倦怠而嗜臥也，有食後體倦嗜睡者，乃脾虛不能運化而然，皆當補脾理胃兼消導自安，脈沉無力，右關細濡為倦怠。

主方 人參五分 白朮 茯苓 黃芪 山藥

山查 麥芽各壹錢 炙草分 加姜三片 棗一枚 肥人加陳

皮半夏蒼朮升柴 瘦人當歸芩連 食不消保和丸傷食

生脈散 治倦怠嗜臥口乾少神方見

嘔吐噦附惡心

經曰諸逆衝上，皆屬於火，諸嘔吐酸暴注下迫，皆屬於熱，又曰寒氣客於腸胃，厥逆上出，故痛而嘔，是證總屬胃氣不和，然有

簡明醫要 卷之三

寒熱痰食風邪，氣逆久病胃虛之異，必當詳辯，胃寒者惡寒惡食，朝冷暮吐，清水涎沫，喜熱物，脈沉遲，胃熱者食入即嘔，躁悶煩渴，吐味酸苦，思食冷物，脈洪大，痰飲則吐有痰涎，食積則脹，受酸腐，風邪則暴發而甚，氣逆則胸膈鬱遏，胃虛則不能納食，各以脈理參酌，嘔屬陽明，有聲有物，宜生薑為主，吐屬太陽，有物無聲，陳皮為主，噦屬少陽，有聲無物，半夏為主。

主方 半夏 陳皮 蒼朮 厚朴 藿香各壹錢

甘草分 加生薑七片 棗二枚 水煎成入姜汁服，不能噦藥者，另以生薑搗細，陳皮炒糯米泡湯，每藥一口，隨飲湯一口，送寒嘔加乾姜白朮，以丁香白蔻砂仁另研 熱嘔加竹茹梔

于黃連姜炒 痰加扶苓南星枳實 食加山查麴芽蘿蔔

砂仁 風寒香附紫蘇 氣逆香附枳實枇杷葉 久病六

君子痰加丁香 吐蛔加黃連川椒烏梅檳榔 酒加葛根

砂仁自蔻黃連烏梅 諸吐大渴飲童便切勿飲水 姜湯飲

夏月五苓散加陳皮半夏生姜 虛人神昏人參壹兩煎服或同米煮粥食

半夏麴芽湯 治飲食積滯痰涎壅盛嘔吐不已

半夏 陳皮 茯苓 枳殼 檳榔 神麴

麥芽 香附 厚朴 蒼朮各壹錢 甘草三分 姜棗煎服

荆黃湯 治嘔吐暴作熱氣上逆渴煩便秘

荆芥 大黃各貳錢 黃芩壹錢 甘草六分 水煎調檳榔未壹錢服或調胃丞氣湯

簡用醫教 卷之三 惡心 无

姜橘湯 治病後或虛弱人一切嘔吐不納藥食

橘紅圓 生姜七錢 枳殼再打碎 棗一枚 粟米一撮 水煎細呷

和中桔梗湯方見 上焦氣熱衝逆食已暴吐脉浮洪

蘇合香丸方見 治冷嘔 青金丹方見 治冷熱吐極一服即止

簡便方 姜汁煎滾白蜜煉熟每姜汁壹匙 入蜜貳匙 白湯調頻服

冷嘔 砂仁白豆蔻不時嚼嚥 又 陳年醬姜嚼細米湯下

熱嘔 黃連姜炒同柿蒂煎服痰多加竹瀝姜汁

乾嘔 生薑葛根取汁服 或甘蔗汁温服 或羊乳空心飲

○惡心 無物無聲欲吐不吐氣至咽而復入心中兀兀不寧

主方 半夏 茯苓 陳皮各貳錢 生薑七片煎或加姜汁煎服

石痰而虛加參朮草胃寒丁香理中湯方見 火姜連之類

吞酸吐酸附吐清水

經曰諸嘔吐酸皆屬於熱或以吐酸為寒者蓋謂傷生冷硬物則發殊不知寒涼抑遏腸胃陽氣怫鬱而為熱也吞酸與吐酸不同吐酸是濕熱鬱於肝出於胃隨氣上升而吐出也吞酸乃氣鬱日久不能發越伏於脾胃之間咯不出嚥不下肌表復因風寒外束則內鬱愈甚而酸味刺心肌表得温煖則腠理開豁而畧解或有用辛香燥熱湯丸而暫愈者因本熱標寒辛以散表故也如過服温熱之藥致津液涸竭反成噎膈翻胃之證久病必宜散鬱火少佐辛温脉遲寒數熱浮緊熱內鬱寒外束

簡用醫教 卷之三 不酸 辛

主方 陳皮 蒼朮 茯苓 半夏泡 梔子姜炒

黃連姜炒 香附童便炒 紅豆蔻神麴各壹錢 吳茱萸八分 甘草分

右加生薑煎服 寒加丁香藿香 熱加黃芩酒炒 吐酸加山

查扁豆木香砂仁 痰加南星 吞酸用生料蒼朮陳朴草麴

芽加姜水煎服 治酸必用吳茱萸泡 蒼朮神麴紅豆之類

迺芥菜更九 治濕熱吐酸

黃連壹兩陳土炒 蒼朮七錢土炒 黃芩土炒 陳皮 吳茱萸各伍錢

右為末神麴糊丸菜豆大津液嚥下

神橘丸 治中脘宿食留飲酸痞心痛口吐酸水

神麴丸 治中脘宿食留飲酸痞心痛口吐酸水 共為細末神麴糊丸每百丸

加味二陳湯 方見痰飲吐酸頭眩或食生冷脾胃不和九粒

吐清水 是證忽作清水如從齒縫中出源源而來吐至碗

許感受之由種種不同因寒因濕因蟲痰飲食積因醉飽房勞者居多治亦小異諸方與吐酸參用皆宜戒厚味

主方 益智 滑石 各錢二分 蒼朮 土炒 白朮 土炒 半夏 製

陳皮 去白 茯苓 各錢五分 吳萸 五分 甘草 一分 加姜棗煎熱服

虛寒加人參乾姜 炮 痰加南星 宿食加神麩砂仁 蟲梅

嘈雜

經曰胃為水穀之海無物不受若恣食濕麩魚腥生冷及烹飪厚味朝傷暮損食積痰飲留滯中宮兼七情鬱熱故為嘈雜噯

簡用醫說 卷之三 噯雜

氣不酸痞滿等證蘊久失治則為翻胃噎膈之漸蓋嘈雜為病條爾腹中如火發于腔內空空若無一物似痛非痛似饑非饑

懊懷熱辣得食暫止者是也乃痰動其火有兼噯氣惡心胃脘痛者兩寸脉弦滑胸有留飲關脉弦急將成翻胃 沉瀉為鬱總不外痰火二字

主方 橘紅 半夏 南星 黃連 炒 梔子 炒

黃芩 酒炒 茯苓 各等 右加生姜五片水煎服 痰多加蒼白朮

鬱加香附撫芎 熱加青黛黃栢軟石膏 從治加紅荳蔻

三聖丸 治嘈雜

白朮 兩 橘紅 兩 黃芩 錢 共末神麩糊丸 黍豆大每五十九姜湯下

益君湯 治心血少而嘈者

當歸 白芍藥 生地黃 熟地 各錢五分 人參 五分 白朮

茯苓 麥冬 梔子 陳皮 各八分 甘草 三分 烏梅 壹

右加炒米百粒水煎成調辰砂水飛五分臨睡服

和中湯 治虛火嘈雜

人參 白朮 陳皮 半夏 茯苓 各壹錢 甘草 五分

黃連 姜炒 棗二枚粳米百粒水煎服

噯氣

經曰太陽所謂上走心為噯者也。陰盛而上走陽明陽明絡屬心為噯又曰胃中伏火膈上停痰令人噯氣是證多因胃氣不和窒塞不通脉右關弱短左關弦大肝盛脾虛治宜健胃消

滯清痰降火

簡用醫說 卷之三 噯氣

主方 陳皮 半夏 茯苓 白朮 香附 各壹錢

藿香 黃連 炒 砂仁 各六分 木香 炙草 各壹錢 加姜棗煎

寒加白蔻益智厚朴 熱加梔子 石膏 煨 虛人 氣實 梔子 實

半夏丸 治痰火噯氣

半夏 南星 炮 軟石膏 香附子 梔子 等

右為末神麩糊和九桐子大每服七十九食遠白湯送下

欬逆

經曰歲金太過欬逆金鬱之發欬逆若胃火上衝而逆隨口應起于上膈者易治若膈下上衝直出於口者陰火上升難治俗

名打呃是也脉浮緩者順弦急者逆治宜順氣為先久者而火

主方呃丁香 柿蒂 良姜 官桂 半夏姜炒

陳皮 木香磨 藿香 沉香磨 茴香 厚朴姜炒

砂仁 乳香另研 甘草或 右加枇杷葉三片姜三片水煎成

調水沉乳香服 寒極脉沉肢冷加附子乾姜去良姜官桂

熱逆湯 治發熱煩渴便秘脉數熱呃

黃芩 梔子 柿蒂 陳皮 香附鹽水炒 連翹

白芍藥 半夏各壹錢 砂仁 藿香各六分 甘草叁分

加連肉七個烏梅一個竹茹一團水煎服 痰加茯苓貝母

氣虛并久痢加人參白朮茯苓 陰火黃連黃柏滑石

簡便方 雄黃末壹錢 溫水服即 或柿蒂十五個 白鹽梅半個 水煎服

寒呃 丁香柿蒂各壹錢 煎服 呃嘔 半夏兩 生薑兩 水煎作服

又 吳萸池 青橘葉各貳錢 姜三片煎服 或陳皮枳殼半夏煎服

又 川椒末麵糊九桐子大二十九白湯下 傷寒呃見本

痰呃 半夏十四枚 猪牙皂角壹條 姜五片煎服得吐痰出妙

又 食鹽壹兩 濕草紙包煨紅去紙以河水三碗入鹽滾飲探生

灸法 男左乳下一寸餘劫處灸 女右乳下起肉處大三壯 氣海寸半

駭運

藍玉散 治火邪上炎肺金受尅欲悲而呃 六一散方見加

青黛 薄荷末 燈心湯調下 或黃連解毒湯方見

簡便方 雄黃末壹錢 溫水服即 或柿蒂十五個 白鹽梅半個 水煎服

寒呃 丁香柿蒂各壹錢 煎服 呃嘔 半夏兩 生薑兩 水煎作服

又 吳萸池 青橘葉各貳錢 姜三片煎服 或陳皮枳殼半夏煎服

經曰諸風掉眩皆屬肝木夫眩運之始必因火尅肺金金衰不

能制木故木旺而生風肝木既旺復能生火風火二氣屬陽陽

主動性同上升兩動相搏則為旋轉猶燭得風然而未有不兼

四氣七情者七情相感臟氣不平鬱而生涎積而為飲煎熬成

痰火動其痰令人眩運又挾於疲勞過度血液耗損精髓虧傷

皆能致此發則頭運目眩耳鳴身轉昏憤欲倒如立舟車乃上

實下虛也脉浮有汗屬風脉緊無汗屬寒脉虛煩悶屬暑脉沉

吐逆屬濕左關弦數肝火右寸滑大多痰治痰為主降火驅風

主方 天麻明實 荆芥穗 橘紅 半夏各貳錢 茯苓半錢

枳實 川芎各壹錢 酒苧 羌活 防風 南星各七

甘草叁分 加生薑三片水煎入竹瀝姜汁服 火盛加黃連酒

梔子 肥人及病後氣虛加人參白朮去枳實 瘦人血虛

有火及婦人產後當歸熟地去南星風熱上攻防風通聖散

滋補正元湯 治氣血兩虛心脾耗損神昏有痰眩運一服安

當歸 黃耆 白朮各錢 白芍酒炒 茯苓 茯神

生地 麥冬壹錢 人參 遠志 陳皮 半夏

川芎各七 炙草五分 右加生薑三片黑棗壹枚水煎早晚服

運倒肢冷虛極 人參伍錢 附子壹錢 加姜煎勞苦 補中益氣湯

眩運甚者火極 大黃酒煮 三錢茶下有痰 半朮天麻湯

痰證

子 48-541

經口肺主身之皮毛。心主身之血脉。肝主身之筋。脾主身之肌。腎主身之骨髓。故肺熱葉焦。則皮毛虛弱。急薄著。則生痿。也。蓋痿之始。必因縱慾傷精。腎水虛敗。不能制火。火尅肺金。致肺熱葉焦也。又曰。治痿獨取陽明。陽明者。五藏六腑之海。主潤宗筋。宗筋能束骨而利機關。陽明熱。宗筋失養。故足痿水竭。火盈必兼唇燥。小便澁。雖遺如豚膏。漿糊之狀。脉浮大洪數。宜壯水制火。補氣血。健筋骨。足常熱者。火起湧泉穴。防痿證。

主方 黃栢鹽酒炒 知母鹽水炒 當歸 生地 白芍藥
石斛 麥門冬 山茱萸等分 水煎空心服 虛加人參黃芪 補腎加枸杞龜膠 補脾加白朮山藥 小水不利茯苓車

簡明醫教 卷之三 痿證 羣

薛滑石車前石連地膚子海金沙 火盛苓連梔耆玄參氣 下陷升麻柴胡 渴五味天粉 壯筋骨杜仲牛膝故紙

鹿角膠丸 治血氣兩虛腿足痿弱久卧不起

鹿角膠壹斤 鹿角霜各半 熟地各半 當歸身四兩 牛膝 白茯苓

兔絲子餅 人參各叁兩 白朮 杜仲各貳兩 虎脛骨壹斤 龜膠兩

右為末入製虎骨以無灰酒或溶化角膠和丸 桐子大每服百丸 空心鹽湯下

草薺丸 治痿躄不起

草薺 杜仲姜汁炒 肉苁蓉酒洗 兔絲子煮 右末蜜丸 桐子大

每服三錢空心鹽酒下 後再服健步丸虎潛丸方見 尤佳

健步丸 治膝軟無力屈伸不便腿脚沉重行動艱難

歸尾 白芍酒炒 陳皮 蒼木 牛膝酒洗 條苓
吳茱萸 生地各五錢 桂枝貳錢 大腹子參個即
右為細末酒煮蒸餅糊丸 桐子大 每百丸 空心白朮木通湯下 風濕加防已 風羌澤 濕熱滑石 寒濕川烏 隨證加減

痺證 附麻木
經曰風寒濕三氣雜至。合而為痺也。其風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。濕氣勝者為著痺。五痺者。冬為骨痺。春筋痺。夏脉痺。季夏肌痺。秋皮痺。又曰。血凝於膚者為痺。又周痺者。在身上下移徙。隨脉左右相應。間不容空也。衆痺者。各有其處。更發更止也。按風寒濕氣客於分肉之間。迫切而為沫。沫得寒則聚。聚

簡明醫教 卷之三 痺證 羣

則排分肉作痛。此內不在臟外不在皮。獨居分肉之間。如痺不在骨則重而不舉。在筋則屈而不伸。在肉則不仁。在脉則凝。在皮則寒慄。皆不痛也。凡痺逢寒則急。逢熱則縱。治宜先攻風濕定痛。次養血潤燥滋陰。脉濇而緊為痺。

主方 羌活 蒼木 白朮 酒岑 防已

當歸 片姜黃州 防風各一錢 草七分 生薑五片 水煎食前服

寒勝痛甚倍羌加麻黃桂枝 風勝加獨活藥本白芷 濕

勝倍蒼白朮加猪苓澤瀉茵陳 當歸拈痛湯方見

定痛丸 治諸痺風濕流注骨節疼痛麻痺

乳香兩半 沒藥並出 羌活 歸尾各壹兩 兩頭尖去皮生

右各為末酒糊丸如桐子六每服三十九黃酒送下

蒼木蕙苳湯 治手足流注作痛麻木不仁難以屈伸

蒼木製成 蕙苳仁秘 當歸 芍藥 桂心 麻黃各

甘草分 右加生姜五片水煎服 有汗去麻 熱去桂

芎附湯 寒濕痺痛甚五痺從腿臂間發

撫芎 附子炮去 黃芪 防風 白木 當歸

熟地 桂心 柴胡 炙草分 加姜棗水煎服

三邪飲 風寒濕邪成痺痛甚四肢麻木不舉

麻黃 蒼木 浮萍七月 白芷 苦參 桑皮

川芎 茸松各 水酒煎服煖室出汗三日再服

簡明醫教

卷之三 痺方

委

秘傳藥酒方 男婦風濕相搏腰膝及遍身骨節痛甚

麻黃 白芷 當歸 芍藥 肉桂 桔梗

半夏 防已 甘草各 杜仲 牛膝 烏藥

枳殼 厚朴 陳皮各 蒼木 木瓜 羌活

檳榔各 無灰酒三罈藥盛三袋懸罈心重湯煮二時或煨

過三日取飲日三次查為末酒糊丸桐子大每百丸早酒下

痛寧酒 治風寒濕火相乘遍身筋骨走痛白虎歷節諸風痛

當歸 秦艽各 川芎 白芍藥 生地黃 蒼木

羌活 黃芩各 猪苓 澤瀉 防風 茵陳各

苦參 虎骨打細 上身痛靈仙升麻 下身痛牛膝黃柏

將藥絹袋盛內封固十四日取酒飲查晒為末末糊丸桐子大每服八十九空心酒下忌發風動火物

烏頭粥 風寒濕痺麻木不仁 如四肢腫痛加苳仁末煮噉

烏頭生研為末 白米煎 砂鍋煮稀粥入姜汁一匙白蜜三匙

髮汗法 治風寒濕痺遍身大痛不可忍者

醇酒斤 川椒 乾姜 桂心各壹斤 同綿絮壹斤白布

四丈並入酒中用馬糞或薯糠煨三日夜取布絮曬乾復漬

酒盡為度椒藥為末布縫如夾複藥絮填入複內複用炭火

炙熱髮痛處冷再灸髮數十遍汗出複拭乾勿見風病輕者製半料

薰蒸法 風寒濕停于腿膝痛甚者

簡明醫教

卷之三 麻木

委

川椒壹斤 葱壹握 鹽壹斤 小麥麩約四升 酒醋各椀許拌

潤銅器內炒極熱薰蒸痛處上厚蓋卧一時要汗出冷再煨

避風

簡便方 痺痛 布絮包緊烘極熱痛減 又治一切痺痛

五加皮五兩 南木香兩 好酒一罈絹袋盛浸着包煮一日開飲

麻木 經曰不痛不仁為麻痺即麻木證又曰麻屬氣虛木

者屬死血此證由氣血兩虛風寒濕乘之病邪入深榮衛之行

既瀆經絡時疎故不痛皮膚不榮故不仁如繩札縛初解之狀

也治宜先汗後補或痰滯四肢或手指麻木脈浮瀆而濡防為

頰中風之徵宜預調之

主方 蒼朮 羌活 川芎 白芷 陳皮

半夏 茯苓各八分 桂枝 麻黃 升麻 附子製

甘草各五分 右加姜棗水煎服

補氣養榮湯 氣血虛而邪乘先散邪後用此補養兼清濕熱

人參 黃芪 天麻 當歸 芍藥 茯苓

黃連 黃柏俱酒炒 蒼朮 牛膝 澤瀉等分 姜棗煎服

溫經丸 治遍身麻木

附子壹個製 去皮臍 黃芪壹兩 人參 當歸 白芍酒炒 各五錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九酒下早晚服

十指疼麻 附子壹錢 煎成調木香末壹錢 服有痰常服滾痰丸

簡明醫教

卷之三 厥證

手

黃帝問曰厥之為寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥又曰厥令人腹滿或暴不知人或半日一日知人者何也伯曰陰氣盛於上則下虛腹滿陽氣盛於上則邪氣逆陽氣亂暴不知人也名曰屍厥氣復則生不復則死皆因斷喪傷精致陽氣日損陰氣獨盛邪在三陰則為寒厥身冷脉沉面慘唇青眼反踈卧若醉飽入房致陰精日竭陽火獨熾邪在三陽則為熱厥身熱脉數便秘煩渴甚至昏仆又有氣血兩虛痰鬱暴怒及吊喪入廟登塚夜行飛屍鬼擊忽然厥冷神昏妄言者先搯人中兩人分捉頂髮噤面用皂莢末搯鼻

取嚏或針入人中至齒灸關元膝下百壯鼻尖有汗匙為度 灸乳下

主方 陽勝 大黃 黃芩 白芍 厚朴 枳實

柴胡 甘草各壹錢 水煎成化入芒硝壹錢 熱服或白虎湯傷寒

附子理中湯方見中寒 治陰厥 冷甚重用附子肉桂腹痛吳茱萸

異香平胃散 治屍厥中惡邪氣

蒼朮兩 陳皮 厚朴兩 甘草 白豆蔻 丁香

檀香 木香 砂仁 藿香各壹兩 為末或錢棗湯少入鹽調下

減桂麻黃湯 治卒厥暴死 攝生飲可服類中

麻黃壹錢 杏仁十五粒研 炙甘草壹錢 水煎灌下即甦髮引肩臂

返魂湯 血逆卒厥并產後血厥昏暈目閉口噤婦人多患此

簡明醫教

卷之三 厥證

四

當歸酒洗 川芎 肉桂 乾姜炮 赤芍藥 甘州

黑豆壹兩 紫蘇等分 右水煎服或為細末每服二錢酒調下

八味順氣散方見中風 治氣厥 導痰湯方見痰門 治痰厥 酒厥生薑汁灌

四物湯婦科方見 治失血發厥 蛔厥烏梅川椒煎服加黃連練樹根皮尤効

蘇合香丸方見中寒 玉樞丹方見毒 諸厥効更以首蒲末枯礬雄黃鼻吹

瘧證

俗作瘧

經曰諸瘧項強皆屬於濕又曰諸暴強直皆屬於風劉河間曰諸瘧強直乃筋勁而不柔和也蓋脾土主安靜濕勝過極則反兼風化亢則害承乃制實非風也身熱足冷頸項強急惡寒口噤項強面赤背反張如弓者瘧證也陰瘧曰柔陽瘧曰剛如傷

寒太陽發汗過多。或瘧家過汗。或大發濕家汗。亦有氣血內虛。風濕外襲。有火熱傷肺。金不平木。有產後血枯。有破傷風。皆能致此。脈浮緩有汗為柔。浮緊無汗為剛。治宜養血為主。分虛實

主方 當歸 川芎 芍藥 熟地 白朮

茯苓 分等 甘草 半減 加姜棗煎 無汗加羌活防風蒼朮柴胡葛

根。冬加麻黃。去芍地白朮 有汗加桂枝黃芪。去川芎 厥

冷。加熟附菴活 虛加人參 煩渴麥冬知母乾葛黃芩。去

白朮川芎 身熱煩渴。臥不着席。大便秘。大黃枳寔厚朴黃

芩。去白朮川芎茯苓 汗吐下後發者。重加參芪歸地菴荆

瘧火發瘧 二陳芩貝枳桔參麥梔芩當歸蘇子加姜煎

簡明醫教 卷之三 瘧證 聖

括萎桂枝湯 太陽病。其證儻。身體強。凡凡然。脈反沉遲。瘧病

括萎根 桂枝 芍藥 各錢半 甘草 五分 姜五片棗二枚煎

疝氣

經曰。任脈為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。夫疝者。少腹控引。睪丸。脹急而腫痛也。由鬱熱內積。抑遏至久。寒濕外侵。收引拘縮。相搏而痛。衝上則面黑口噤。墜下則仆地昏沉。甚至絕者。亦為頑證。有七種之別。水疝腫脹明亮。搔癢水出。得之醉酒飲冷。汗泄當風。宜逐水寒疝。囊冷結硬。陰莖不舉。得之坐臥濕處。子嗣艱難。宜溫經。癩疝大如升斗。不癢不痛。得之地卑土薄。江淮多感。宜滲濕。血疝小腹之旁。橫骨中腫。俗名得之氣血凝滯。

留結為癰。宜攻散。氣疝狀連腎區下及陰囊。得之號哭忿怒。氣鬱而成。宜散滯。狐疝臥入晝出。往來有聲。得之鬱怒憤氣。抑遏不舒。宜逐氣。筋疝陰腫潰痛。挺縱洩濁。得之房慾致傷。邪術所感。宜制火。經曰。肝脈急大沉為疝。牢急者順。弱急者逆。治宜除內熱。祛外邪。兼疎利行氣。後補逐並施。治宜龍膽。為肝濕

主方 烏藥 陳皮 蒼朮 茴香 香附 各壹

當歸 玄胡索 不香 川烏 各五分 甘草 叁分 加姜煎服

囊熱加梔子去川烏 冷濕加吳萸 諸疝定痛。山查枳寔

檣核荔枝青皮脂艸川練子三稜蓬朮檳榔撫芎柴胡山甲

砂仁益智等酌用 痛甚調乳香沒藥 有痰加海石半夏

簡明醫教 卷之三 疝證 聖

茱萸內消丸 腎經虛弱。膀胱為邪氣所搏。結成寒疝。偏大

吳茱萸 山茱萸 肉桂 馬蘭花 陳皮 木香

山藥 川練子 青皮 茴香 鹽炒研

右為末。酒糊丸。桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下

保命丹 遠年近日小腸疝氣。偏墜。下搐痛。以致悶亂。陰

吳茱萸 陳淨。壹兩。分四分。姜酒。米醋。澤瀉。煎

右為末。酒煮薄麵糊。丸。桐子大。每五十九。空心鹽湯下

硫黃丸 疝氣甚。手足厥冷。上冲心腹。欲死者。服愈

硫黃 溶化。即投水中。去毒。研細末 陳皮 荔枝核 打碎。炒黃。各等分。研細末

右飯丸。桐子大。每服五丸。酒下。勿多用

蒼附湯 治諸疝痛 或加破故紙葫蘆巴

蒼朮 香附俱鹽 黃柏酒炒 青皮 玄胡索 益智

桃仁研各 茴香炒 附子鹽水 甘草分 水煎服或為末湯下

查橘丸 治諸疝痛

山查四 橘核炒 山梔炒 柴胡 牡丹皮 桃仁炒

大小茴香俱鹽炒 吳茱萸炮半 為末酒糊九桐子大 煎湯下

簡便方 寒疝 玄胡索胡椒小茴香分 為末每貳錢酒調下

或桂心末壹 或靈脂蒲黃末貳 或苦練子末貳 或丹參木壹

諸疝 小茴川山甲全蝎洗 木香分 為末每服二錢空心酒下

又 茴香猪苓木通甘草分 燈心淡竹葉煎調乳香服

簡明醫案 卷之三 疝氣 聖

又 枇杷葉野蘇葉椒葉蒼耳葉葡萄葉煎洗 或炒鹽包熨

又 栝香五錢好酒煎去查服再飲酒至醉三服安

血疝 四物湯加大黃枳實厚朴水煎入芒硝服

偏墜 牡蠣粉良姜末分 津調敷 或槐子炒研入鹽少許酒

下 或五倍子研末酒下至醉

小腸氣 小茴鹽 枳殼木 沒藥末 勻每一錢酒下或荔枝

或烏藥酒浸 良姜茴香青皮等 每二錢酒下或乾絲瓜

法 兩手合搓熱掌揉數百回痛止久可消 小兒偏墜用雙

蒂茄懸房門上出入令兒視之茄乾愈 或釘釘日視多次

諸痔 附脫肛

經曰因而飽食筋脈橫解腸癖為痔多由飽食用力或恣厚味

醉飽房勞熱毒蘊蓄或強忍敗精及過服固精藥餌停積歸注

或怒動肝火火侮燥金毒聚肛門或脾胃濕熱下迫大腸不勝

枚卒更兼六淫七情而成痔有七種肛邊肉珠時出膿血名牡

痔肛瘡腫突如癩出血名牝痔瘡血淋漓痛而復癢名豚痔腫

核脫肛往來寒熱名腸痔始如腸風清血時下名血痔併酷飲

而成名酒痔憂怒則發名氣痔也破潰日久膿血水出名痔漏

欲調治須斷房室戒厚味怒氣脈沉小寔易治洪大軟弱難治

主方 諸 當歸 連翹 生地 芍藥 防風 稍

荆芥 白芷 梔子 條芩 地榆等 甘草牛

簡明醫案 卷之三 諸痔 聖

右加萊烏梅各一枚水煎空心服 熱加連栝 馮加白木

秘加大黃麻仁 濕加蒼朮猪苓澤瀉 酒痔葛根 煎根

秦艽蒼朮湯 諸痔痔漏大便秘澀大痛一服安

秦艽 桃仁研 皂莢仁 蒼朮製 防風七 黃柏酒

歸尾 青皮各 澤瀉 枳殼 大黃 木香各

右除桃皂枳木另研外水煎成調入四末煎一沸服少時以

乾物壓之有膿加白葵花五 忌熱毒物

羌活秦艽湯 痔漏下垂不勝其癢

羌活 秦艽 黃芪 防風各 升麻 灸草

麻黃 柴胡各 藁本各 細辛 紅花各 水煎服

臘連丸 治諸痔。及腸風下血。

黃連 川者去黃蘆 研木六兩 槐角 子末 兩 兩 豬大腸去頭稍將連槐末盡

入半空勿服腸破砂鍋水煮爛待乾連臘搗若濕加炒黃米

粉少許丸如桐子大每服百九空心白湯下

蝟皮丸 諸痔漏下血遠年近日皆効

蝟皮 壹個 槐角 防風 當歸 貫衆 枳殼

黃萆 枯礬 髮灰 各壹兩 猪懸蹄 小中十個

右為末蜜丸或醋糊丸如桐子大每服百九空心白湯送下

收痔丸 理諸痔通用 或服槐榆丸諸痔有効 方見血門

真阿膠 黃連 貫衆 各半兩 蝟皮 炙 蜂房 炒 蛇退 炙

簡明醫殼 卷之三 諸痔 四六

皂角刺 炒 穿山甲 炙 當歸 川芎 槐花 髮灰

猪後蹄 垂甲燒各 參錢半 皂莢 長尺者 炙 炙去弦 為末醋糊丸 大服如前

黑丸子 年久痔漏累効

百草霜 乾姜 砲各壹兩 木饅頭 生場頭者 兩 烏梅肉白芷敗櫻扁 枳

油髮 俱燒焦研 各半兩 桂心 錢 右為末醋糊丸 桐子大服如前

又 乳香沒藥輕粉黃柏末軟石膏 龍骨 等研極細摻之

枯痔 用五倍子 尖上開孔掃淨蛙屑入輕粉滿孔糊好 小

用濕草紙包數 乾後燒令燉去紙研細入木片少許濕者

簡便方 馬齒莧煎湯薰洗肛門腫加皮硝再以熊膽 水研化

痔血 東行臭椿根皮為末醋糊丸桐子大每百九空心米 下

諸痔 風 扇 兩 白礬 五錢研末 拌栢炒乾 敗櫻 燒灰 兩 槐花 四兩炒末 每

洗痔 非黍煮汁置罈中先坐薰次傾盆中將非醃洗日三次

又 茄柯槐花冬瓜皮陳香圓煎湯入罈患人坐薰次傾出洗

又 用乾蓮房荆芥 各壹兩 枳殼薄荷 各半兩 水煎入朴硝五錢洗

又 槐花艾葉荆殼水煎入白礬洗 或冬瓜或五倍子煎洗

痛甚 用枸杞根煎洗 或水楊柳根上赤鬚煎洗 羊蹄根

菜油蒸食 枳殼末蜜丸服 蒼耳子末白湯調服

痔瘻 甘草白芷荆芥槐花煎湯薰洗更以布鞋底烘熱熨

○脫肛 經曰下者舉之滑者澁之先哲皆謂氣虛有熱或謂

簡明醫殼 卷之三 脫肛 四六

大腸熱甚故出或謂大腸與肺為表裏肺經蘊熱則肛閉結虛

寒則滑出不收或因用力或因痢後細推寒熱治理小兒患多

主方 白木 茯苓 當歸 川芎 芍藥 酒

生地 升麻 各壹錢 桔梗 炙草 各五錢 加姜棗水煎空心服

虛加參芪 熱加苓蓮 滑脫倍升麻加訶子五倍子 煎服

補中益氣湯 治瀉痢大病及產後 槐榆丸 治脫肛

簡便方 老幼脫肛 香附子荆芥穗或蓮蓬殼橡斗殼煎洗

又 用朴硝湯洗次魚腥草搗爛坐肛門下或石灰炒熱 包坐

或五倍子明礬煎洗 或桑葉桃葉湯洗草麻仁搗塗頂心

又 赤石脂或五倍子或龍骨木賊 燒 或黃栢軟石膏滑石皆

可研末抄草紙上烘熱托上 或梁上塵鼠糞桶內燒薰

體氣 附腋漏

證屬足厥陰肝經鬱熱而成。腋下有竅泄臭氣。以枯礬麝香之類搓擦。僅止一時。必久服疎肝藥乃愈。關脈弦急寔大。主服氣

主方 龍膽草 生地黃 當歸 木通 車前子

澤瀉 柴胡 黃芩 青皮 等分 水煎服或當歸龍薈丸

驅穢散 治體氣外用除根法。內以此藥每五分 姜湯調下。渴穢毒出為度

大黃 錢 檀香 木壹錢 檳榔 八分 青木香 丁香 各叁分 共末入麝香分服

除根法 先剃去腋毛。用鉛粉水調塗之。數日後看有一小孔。即出氣處也。以艾炷如米大灸七壯。孔實愈。

簡明醫錄

卷之三

體氣

四七

簡便方 蜜陀僧入麝研末。水調塗。用熱蒸餅急夾腋下 一將

又 五更用精猪肉二大片。拌其遂末 壹兩 挾腋下。天明甘草煎汁飲。瀉穢物地上。即埋。恐傳人 或白芷枯礬黃丹花椒木

腋漏 兩腋下并手足心。陰股及囊。常有汗濕。汚衣故名。

主方 枸杞根 薔薇根 甘草 各壹兩 商陸 鉛粉

滑石 各五錢 右為細末醋少許和頻塗諸處愈為度

簡便方 木饅頭 生壹兩 煎湯洗各處再以蜜陀僧研敷

瘡氣

瘡出閩廣嶺南。山嵐致濕。金石生水。霧多風少。鬱蒸為熱。冬不甚寒。溽開汗出。夏月連雨。伏暑冷侵。寒熱不齊。陰陽相搏。遷客

羈士。飲食平常。崎嶇勞損。氣虛感受。輕者惡寒。類瘧。謂之

冷瘧。重者蘊熱昏沉。如臥灰火中。謂之熱瘧。其最重者。得病便

失音。謂之啞瘧。有歸路復感。謂之回頭瘧。相類傷寒。但不宜大

汗吐下。可依傷寒法治。有發黃者。依傷寒發黃治。俗云。莫飲卯

時酒。莫食申時飯。又云。瘧染勞力體虛人。飲酒勿飽。食却無事。

患愈七日洗面。二七梳頭。三七酒醒。絕戒房室。治法悉備。萬病

玉樞丹 方見 初覺水磨湯服。或頭咬嚙。併蘇合香丸 方見 若畏

寒。飲熱酒姜湯滾水。冷瘧正氣散。暑月六和湯。熱瘧啞瘧草子

法。身熱頭痛和解散。有先受冷而病。後變身熱煩渴。雖思水而

不能入口。仍宜附子湯。生煎冷服 類陰證 煩甚加竹茹。渴甚加

簡明醫錄

卷之三

瘧氣

四七

人參五味子。呢加丁香。淡竹葉。煩渴大作。竹葉石膏湯。減石膏

加熟附子。或冷湯足。冷頭額。虛汗。姜附湯。并灸氣海 臍下若非

上熱下冷。未可用附子之類。預服及初感。用主方。次和解散。若

有傷寒頭痛發熱證。即服羌活沖和湯。如寒熱往來。且與小柴

胡湯辯認的確。屬寒。方服附子等熱藥。欲散血黑神散 方見

主方 前服 半夏 製壹錢 陳皮 厚朴 姜炒 茯苓 各七 枳殼 分

人參 藥用 枳仁 研各五分 甘草 三分 加生姜三片。棗二枚。水煎服

和解散 瘧初作。胸滿頭眩發熱。及中風感寒。諸病皆効

蒼朮 製六兩 厚朴 陳皮 甘草 各四兩 棗 各六兩

右咀每服五錢。姜三棗二水煎。日再服。夜一服。

生薑附子湯 冷痺手足冷。內虛發熱。痰嘔吐逆。頭疼身痛。

附子壹枚 乾姜壹兩 分四服。每服加生薑十片。水一鍾。煎六分。溫服。

乾姜附子湯 瘴毒陰候發熱。或煩躁。胎引飲 附子配乾姜。

附子湯 瘴瘧寒振熱微。面色青白。食少。手足冷。大小便清利。

附子壹枚 茯苓壹兩 白朮壹兩 甘草壹兩 附子壹枚 製藥法製。草果仁廿粒 分四服。加生薑水煎。非寒甚勿用。

奪命散 傷寒瘴證。陰陽不明。或誤投藥。致病重煩渴。婦人胎產感瘴

人參七錢 水二鍾。煎一鍾。去渣。連確沉新汲水取冷。一服完。

六和湯 廣南夏月瘴疾。冷熱未分。煩躁口渴。方見霍亂

椒囊法 辟瘴氣風寒時疫。絳紗囊兩許。佩身內衣。諸邪不侵。

降椒酒 降香貳兩 川椒壹兩 去刺。絹囊貯。無灰酒貳斗 中浸。依辟瘴氣。

簡明醫錄 瘴氣 厚朴 陳皮 草果各五 甘草壹

檳榔 治瘴氣寒熱嘔吐腹滿。

生薑壹塊 厚朴 加棗二枚。水煎服。寒熱作嘔。四散飲。小便短赤。五苓散。

冷湯 人參壹錢 大附子壹錢 炙草壹錢 淡竹葉十四片 棗五枚。水煎服。

石綠五錢 研末。水調生麵糊。丸。芡實大每服壹丸。及木化服。

草子法 飲酒太過。多食煎炒。腥膻熱毒。感瘴熱甚。晝夜不安。

連三日。血凝不收。用針刺頭額。及上下唇。仍以楮葉擦舌。皆

令出血。次以草藥解其內熱。即愈。南方有土人專刺者。

不換金正氣散方見傷寒 一切嵐瘴。傷寒頭痛。風濕諸瘧。吐瀉霍亂。

扁脹腹疼。吞酸痰飲。不伏水土。胎前產後。加草預研末常服。

羌活沖和湯 小柴胡湯並見傷寒 五苓散方見便癰 四獸飲方見柴門

蠱毒

世傳閩廣有人造毒。密藏飲食。害人。中者面日青黃。躁悶胸滿。

吐血。腹痛如蟲嚙。吐下皆如爛絮。小便淋瀝。不急治。即死。亦有

後者。經年而死。有傳他人。名曰蠱症。有客彼。娶妻欲歸。婦人下

定年蠱。違期則死。試法。一唾津清水中。沉者是。浮者非。一口含

大豆。豆脹皮脫。嚼之不腥。氣是一。煮雞蛋去殼。簪脚插入。口含

一飯時。看簪蛋俱黑。是一。嚼白礬。不澀。反甜者。蠱也。一閩有石

首魚。腦骨為器。置食。有蠱。即暴裂。倘已中蠱。於某物。能終身不

再食。亦安。切忌食冷。若至蠱鄉。看其門窓。滿屋無塵者。有蠱。食

簡明醫錄 瘴氣 第一筋。握手中。出門。埋十字路口。安。或先問主人云。恐有蠱麼。

說破。無害。脈洪。大生。微細。死。治法。服解毒玉樞丹。不及磨嚼細

嚥下。多服。即吐下毒物。未吐。用白礬一錢。配膽礬五分。或配皂

莢末五分。滾水調服。或鷲毛。蘸桐油。搽吐毒物。盡出。如臍腹痛。

再以鈔金末二錢。空心白湯調下。瀉毒物。地上愈。天日忌。神物。

主方 萬病解毒丹 卽玉樞丹 紫金錠 神仙追毒丸

治一切嵐瘴。霧露寒暑。曠野邪魅。蠱毒。誤食諸般。菌鱉禽獸

毒。疫瀉。蛇虺。凡遠行。賞帶。時臭。藥氣。稍覺不快。嚼嚥少許。安

川文蛤卽五倍子。打碎。取 山慈菴處州。遂昌。有。佳。草。

續隨子卽千金子。取白仁。四兩。研細。竹紙包。加草。紙裝。

紅芽大戟 勿誤用柴大戟 取者宜去毒 煎去毒

真麝香 極雄黃明 研碎 鮮紅梅等 研碎 與木飛 煎去

右研勻 端午上七夕重陽天月二德 預齋戒獨宿及期宜

神前香燭供藥末包乃沐浴更衣拜禱於淨室不見婦女孝服

生人雞犬腥酒每末 煮熱糯米粉團 和勻太乾入團湯 煎

入臼杵千餘下搥條印錠 欲便佩帶穿眼陰乾後畧晒密藏

一切癰疽發背疔腫癩毒水磨頻塗葱酒服厚蓋出汗 凡

蛇蝎蜈蚣諸蟲頭犬傷楊梅風濕癱核乳蛾丹毒等水磨塗

患處酒服 凡中風中氣中惡卒倒不省噎膈腫脹酒下

傷寒疫癘乾霍亂赤白痢喉風諸食毒小兒驚疳薄荷湯下

簡明醫彙 卷之三 毒 至

心腹疔諸氣積聚盤腹姜湯下 白縑溺木跌打損傷酒下

諸頭痛姜葱汁磨塗太陽川芎湯下 牙痛酒塗 疔發時

東流水磨桃柳枝煎湯下 婦人月閉腹痛紅花酒下孕婦

勿服 鬼怪酒服更燒數錠 六畜疫毒磨塗 忌諸甜物

障家大宅皆宜製遠行佩帶諸邪不侵尤便濟人功德無量

簡便方 蠱毒 白礬甘草等分為末每二錢白湯下吐瀉妙

又 雄黃白礬 端午溶黃蠟和象手九桐子 大念藥王菩薩

又 平胃散 用生漆和丸桐子大每七十九酒下漸加服

解諸毒 肝飲食中毒 眼毒傷毒

中此信毒 噪狂腹痛眩暈而背肢冷 宜地漿水 淨地掘坑

多飲 藍根汁沙糖和服 煎毒藥或煎汁 菘豆 牛升豆

白扁豆 青靛花 糞清 乾犬糞尖 研水

附子毒 防風甘草煎服 或豆汁 飴糖 童便皆可効

巴豆毒 芭蕉根葉搗汁 或黃連甘草煎汁冷服

斑猫毒 猪油和大豆汁飲 烏頭毒 甘草煎汁服 諸藥出

丹毒 地漿水 蕈毒 金銀花葉生啖或煎汁服

射工毒 溪澗中蟲射人影則病似傷寒俗名沙瘧失治者死

淡豆豉 葛根升麻 加葱水煎服 或白礬甘草煎服

箭藥毒 交廣人以焦銅作箭中人即死急飲糞清以糞塗

一切藥毒 薺危汁扁豆汁菜豆汁甘草汁 飴糖 隨取一味服

簡明醫彙 卷之三 解諸毒 至

藥相反毒 面青豚絕腹脹吐血 蠶退紙燒灰服或甘草煎

飲食中毒 飲麻油一鍾吐或鹽湯吐 玉樞丹 諸毒宜服

禽獸魚蟹諸毒 豆豉煎汁飲 或蘆根搗汁乾者煎亦可

蟹毒 紫蘇或藕汁 酒毒 黑豆煮汁飲或橘皮葛根皆可

禽獸自死魚無鱗腮驚下有文蟹腹有毛煮酒新出夏月飲食

經宿酒貯錫壺過夜銅器蓋熟食桃李雙仁果熟自落皆勿食

獸蟲傷毒 虎傷 飲香油一椀 葛根湯洗香油塗傷處

青布作條燃火入竹筒放烟薰傷處 口乾沙糖調水飲

頭犬傷 班猫 糯米 同猫 炒宋黃去猫 又 同

米炒赤去猫 又 炒米焦去猫 止用米 入香油 水調空

心服須臾再服二便利下惡物為度腹痛以青靛調水解或黃連甘草煎湯冷服或水調六一散服終身禁食犬犯則死

風犬咬 急於無風處啣去惡血再針刺出血小便洗淨虎骨

研末油調敷或雄黃加麝油搽 拔去頭頂紅髮艾灸傷處

常犬咬 南星防風等分童便調服口含水洗傷處或杏仁湯或鹽湯洗

蛇傷 即以針刺傷處出血用雄黃等敷留孔泄毒傷處兩頭

繩札極緊不致毒氣內攻取核桃殼半盛糞合傷處殼外艾

火灸 內服玉樞丹或五靈脂雄黃等分為末每服二錢酒下

又 雄黃另研細辛白芷等分為末每服二錢酒下或玉簪花葉搗

汁酒服查敷或貝母未酒下油調敷或茶耳葉汁飲查敷

簡明醫教 卷之三 解毒毒 五至

或白礬甘草為末服 急無藥以糞塗之如手足急浸糞中

蝎螫 膽礬研搗患處 或半夏白礬為末醋調敷 或雞口

濕出涎塗之 或南星白礬敷 人家藏雄黃最辟蛇蟲毒

蜈蚣傷 鹽擦鹽湯洗或吳茱萸嚼塗 井底泥雜糞黃皆

可塗 油燈薰 夏夜呼茶壺嘴中并吹火筒內防蜈蚣

螞蝗誤吞 田泥少小死魚巴豆數粒油猪脂搗丸田冷水下

蜂螫 小便洗溫湯漬 雄香油搽 刺毛虫傷 嚼甘草敷

蠅螻尿射人影遍身生瘡 用宿久乾雞毛燒灰油或雞糞調

蜘蛛咬人 胸腹赤脉貫喉欲死 雄黃青黛研少研服

蚯蚓毒 形如大風鬚肩脫落石灰化冷浸洗 或鹽湯洗

小兒受毒陰腫 將鴨口含少時消 鼠毒 貓毛燒灰入

諸蟲

經曰飲食自倍腸胃乃傷過食生冷腥膾肥甘臟腑致傷成積

濕熱相蒸化而為蟲循腐草為螢之義也人腹中之蟲有九曰

伏蛔白肉肺蝟弱赤蟻蟲是也更因五行五味相感如蟹如蚓

種種不同治亦小異患者心腹痠痛脹滿少食嘔吐清水日漸

羸瘦眼眶鼻下青黑是其候也若元氣尚實未為大害根本虧

損遂受其殃然而勞瘵諸蟲傷寒狐惑異如應聲溪鼠之類非

理可測者有矣脉沉實者生虛大者危服蟲藥宜月初蟲頭非

主方 黑丑半生半炒三稜煨檳榔各二兩雷丸 錫灰醋

簡明醫教 卷之三 諸蟲 五至

蓬朮煨 木香 青皮 大黃各二兩右為末每服三錢

月初一至五前晚飯莫吃五更嚼香肉一塊少時吐出即以

蜜湯或沙糖水調下能記食某物生蟲更嚼某物同藥嚼直

化蟲丸 練樹根去粗皮史君子肉檳榔 鶴虱 胡粉炒

蕪荑炒取仁白礬或錢為末皂莢汁熬和小兒五九米湯下

簡便方 練根皮兩水三椀煎椀半取汁煎粥先嚼炒肉一塊

漸吃粥完蟲下 或史君子肉七個嚼熱水下蟲出

寸白蟲 樞子壹兩月頭食盡蟲下未盡再食 或檳榔未葱

蛔蟲攻心 川椒黃連烏梅練根煎服 或龍膽草壹兩煎服

新刊簡明醫教卷之三

新刊簡明醫教卷之四

武林台石孫志宏克容氏編輯

平原君彞沈延鎔太常甫泰閣

同郡門人甥陳自昭抱一甫訂

虛損 附脫陽

經曰。男子盡八八而精絕。女子盡七七而經閉。夫人之陰氣。止供三十年運用。難成而易虧。可以縱欲耶。又曰。年四十而陰氣自半。起居衰矣。又曰。飲食飽甚。汗出於胃。驚而奪精。汗出於心。持重遠行。汗出於腎。疾走恐懼。汗出於肝。搖體苦勞。汗出於脾。又曰。久視傷血。損心。久卧傷氣。損肺。久坐傷肉。損脾。久立傷骨。簡明醫教 卷之四 虛損

損腎。久行傷筋。損肝。若夫七情五臟之火。飛越男女聲色之慾。過淫是虛損之所由也。難經曰。感寒則損陽。陽虛則陰盛。凡損自上而下一損損肺皮聚而毛落。二損損心血脈虛少不榮。臟腑婦人則月水不通。三損損胃。飲食不為肌膚。治宜以辛甘淡過於胃。則不可治矣。感熱則損陰。陰虛則陽盛。故損自下而上。一損損腎骨。痿不能起床。二損損肝筋。緩不能自收持。三損損脾。飲食不能消。又曰。心肺損而色德。腎肝損而形痿。又曰。損其肺者益其氣。損其心者補其榮血。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。蓋虛損之證。多由色慾過度。喜怒不節。起居不時。飲食恣意。有所勞傷。皆損其氣。氣

衰則火旺。火旺則乘其脾土。而胃氣散解。不能滋榮百脈。灌臟腑。衛護周身。而病成矣。故百脈煩痛。腰脚痿軟。胸滿氣短。心煩不安。耳鳴目眩。口乾盜汗。嗽痰失血。遺精白濁。發泄肌瘦。食少無味。睡中驚悸。乍寒乍熱。倦怠嗜卧。女子經閉。皆虛損之候也。脈洪數。火熾。花滿。失血。滑大。痰多。浮長。嗽甚。最忌寸部細數。急瀉而溢。出本位者難治。此証宜防微杜漸。若病成不可全賴藥力。極當斷房室。絕慾氣。薄滋味。戒殺生。清心滌慮。默養可安。忌食鮮猪肉。諸動火發氣物。

主方 人參 白朮 茯苓 當歸 生地

麥冬 白芍 甘草 加姜一片 棗一枚 水煎服

簡明醫教 卷之四 虛損

日晡寒熱。骨蒸夜甚。加知母。地骨皮。不退。加銀柴胡。胡黃連。

青蒿。煎甲。人中白。人中黃。隨輕重。暫用不退。加焦姜。三分。或桃柳脂。汗多加黃耆。酸棗仁。嗽加五味。冬花。天

冬。百部。百合。紫苑。桑皮。杏仁。痰多。貝母。橘紅。天粉。瓜。蒞。

神不安。遠志。茯神。栝子。仁。硃砂。遺精。蓮蕊。遺精。蓮蕊。

保和湯 治嗽痰肺痿諸證

知母 貝母 天冬 麥冬 冬花 天粉

以仁 五味子 當歸 生地 桔梗 甘草

右加生姜一片。煎化入阿膠。餡糖數匙。服。嗽甚。加紫苑。

百合 潤肺。瓜。蒞。杏仁。火盛。芩。連。薄荷。梔子。竹。茹。失

血蒲黃炒 茜根 藕節 小蘗 喘加真蘇子 桑皮 桐紅 沉香

補中益氣湯 補氣養血 理脾助胃 升陽益陰 扶元固本

黃芪 白朮各壹錢半 人參 當歸 陳皮各壹錢 炙甘草五分

柴胡分 升麻分 右加姜一棗一水煎空心服隨證加減

調中益氣湯 理氣血兩虛 前方減白朮當歸加蒼朮五分 香薷分

人參固本丸 補養心腎 滋填精血 聖藥 選料誠製有煨二地 姜製

生地黃 熟地黃 天門冬 麥冬各貳兩 人參 五味子壹兩

右依法為末蜜丸桐子大每服七十丸空心溫酒或鹽湯下

六味地黃丸 五臟齊損 六腑致虛 陽盛陰虧 水不制火 煎熬

肺金 嗽痰失血 盜汗骨蒸 煩渴形悴 腰膝痠軟 遺精便濁等證

簡明醫說 卷之四 虛損 三

熟地煨大兩 山茱萸肉 山藥煨各四兩 牡丹皮 白茯苓 澤瀉各

右為末煉蜜和搗于下丸桐子大每百丸空心淡鹽湯送下

桂附八味丸 治命門火衰 夜多便溺 陽事痿弱 火不生土等

前方加附子一個係製肉桂壹兩 丸服法同

知柏八味丸 陰虛火動 腎水不足 五心煩熱 口燥咽乾 溺赤

前方加黃柏鹽水炒兩 知母鹽炒兩 丸服法同

加味地黃丸 男婦陰虛火動 手足心熱 口乾唇燥 夜卧不安

遺精白濁 咳嗽失血 痰涎壅盛 面黃肌瘦 骨蒸勞熱 等證

六味加黃柏製四兩 當歸 白芍 知母 生麥冬各六兩 五味子貳兩

培元大補丸 虛損勞傷 頭暈目眩 耳鳴體倦 嗜卧懶言 一切

氣虛無力 證悉治 常服補精駐顏 益腎填髓 強筋骨 養榮衛

人參 白朮 茯神 茯苓 天冬 麥冬

生地 熟地 遠志 牛膝 杜仲 菴蓉

黃柏鹽酒炒 知母鹽酒炒 當歸 山藥等分 為末蜜丸桐子大每百丸酒下

補陰丸 濟陰養血 補腎益精 強腰膝 壯筋骨

黃柏 知母俱鹽酒炒 熟地各兩 龜板酥炙四兩 白芍 當歸

牛膝各貳兩 虎脰骨製 瑣陽酒炙 陳皮各兩 右為細末煉蜜和

丸如桐子大每服百丸空心溫好酒或淡鹽湯送下

加味虎潛丸 諸虛不足 腰腿酸疼 行動無力 壯元陽 滋腎水

前方加人參 黃芪 杜仲 枸杞 山藥 虎脰骨 故紙七錢 減陳

簡明醫說 卷之四 虛損 四

天王補心丸古方 寧心保神 益血固精 壯力強志 令人不忘 清三

焦化痰涎 祛煩熱 除驚悸 療咽乾 口燥 育養心氣

人參 熟地 天冬 麥冬 茯苓 茯神

石菖蒲 遠志 丹參 玄參 酸棗仁 栝子仁

當歸 五味子 杜仲 百部 桔梗 甘草等分

右製成爲末蜜丸龍眼大每一丸臨睡燈心黑棗泡湯化下

仙傳班龍丸 壯精神 除百病 養氣血 補虛損 奇効 衰弱常服

延年選壽 昔蜀中道人酣歌酒肆 曰 尾閭不禁 滄海竭 九轉

金丹都慢說 惟有斑龍頂上珠 能補玉堂關下血真人仲源

鹿角膠 鹿角霜 兔絲餅 栝子仁 熟地各八兩 白茯苓

破故紙各四兩為末。將膠用酒二碗蒸化。添酒糊和九柳子大

斑龍二至丸 前方減兔絲栢仁熟地故紙加黃栢知母首烏

補天丸 治氣血虛敗。百髓羸德。臟腑虧傷。精神疲竭等證。

紫河車壹具法見前製藥法常服。配十全大補湯藥料十數兩為末。另

將河車煮爛搗膏和末焙磨乾者切。同藥研蜜丸每三錢酒

四君子湯 補元氣益脾胃

人參 白朮 茯苓各壹錢 甘草分 加姜棗水煎服

六君子湯 補元健脾消痰理氣 卽四君加陳皮半夏

八珍湯 補氣養血 四君子合四物歸芍芍地

十全大補湯 大補氣血實滕溫經。八珍湯加黃芪壹錢 肉桂分

補腎醫教 卷之四 虛損 五

○脫陽 此由斷喪過度腎水虧竭。相火獨熾。不能攝精。易於

傾泄。或吐瀉大病後。或傷寒證新瘥。交接狂縱。忽致脫絕。其證

四肢厥冷。小腹急痛。外腎吊縮。短氣不續。冷汗神昏。急宜搗姜

葱炒熨臍腹。煎獨參湯。或五積散。或理中湯。方見中寒更以姜汁好

酒熱灌。依中寒門灸法

勞瘵 附傳屍

經曰。有所勞倦。形氣衰少。穀氣不盛。上焦不行。下脘不通。胃氣

熱。熱氣薰胸中。故內熱。又曰。陰氣者。靜則神藏。躁則消亡。又曰。

神靜則陰生。形役則陽亢。陰虛生內熱。陽虛生外寒。夫虛勞者。

五勞七傷六極是也。五勞者。心勞則悸。惕善忘。口舌生瘡。肝勞

則面黑目昏。精神不守。脾勞則舌本若直。不得咽唾。肺勞則短

氣面浮。不聞香臭。腎勞則背難俯仰。餘瀝莖痛。囊濕生瘡。小腹

滿急。七傷者。大飽傷脾。脾傷善噁。倦臥面黃。大怒傷肝。肝傷失

血。目闇不明。強力舉重。久坐濕地。傷腎。腎傷少精。腰脊強痛。厥

逆下冷。形寒飲冷。傷肺。肺傷少氣。咳嗽鼻鳴。憂愁思慮。傷心。心

傷苦驚。怔忡健忘。風濕寒暑。傷形。形傷則髮膚枯槁。恐懼不節

傷志。志傷則恍惚不樂。六極者。氣極令人內虛。五臟不足。不欲

多言。血極令人無顏色。肩髮落墜。筋極令人數轉筋。指爪甲痛。

苦倦不能立久。骨極令人瘦削齒痛。手足煩疼。立不欲行。肌極

令人羸瘦無澤。不生肌肉。精極令人少氣。發翦然內虛。感病之

補腎醫教 卷之四 勞瘵 六

必因形體虛弱。勞損心神。七情六慾。妄動陽火。房勞斷喪。致

耗真陰。或風寒瘧痢。咳嗽痰飲。日久變成。漸至朝涼夜熱。盜汗

遺精。咯吐膿血。煩燥咽乾。病機不可勝言。無出陰虛陽盛。火邪

燔灼。最宜絕慾。減言。澄心靜慮。內觀自養。乃得陽伏陰生。若至

音啞肉削。女子血枯經閉。虛扁莫療。凡脈洪大者。猶可治。細數

急澹者。難調。宜滋陰抑陽。壯水制火。養血益氣。和胃健脾。藥忌寒涼。食戒生冷。

主方 當歸 白芍 生地 天冬 麥冬

黃栢鹽炒 知母生 白朮 陳皮等分 甘草減 加姜棗煎。入竹瀝童便

夜熱加骨皮秦朮 晝熱加丹皮 血痰加天冬紫菀阿膠

肺火玄參片苓枇杷葉石膏 腎虛山萸枸杞 胸滿加枳

穀桔梗 腰痛膝軟加牛膝杜仲破故紙石斛山藥 泄瀉

加蓮肉扁豆山藥苡仁 小便不利石蓮車前滑石 咽痛

甘草桔梗山豆根 音不出河子沒軟蜜 加減法與虛損用

抑陽丸 虛勞初甚形肉未脫最宜退熱為急務雖有泄瀉等

症皆由熱致熱除瀉止若病者遷延藥力怠緩其熱晝夜煎

熬故血澗水枯津液乾竭真陰頓絕內熱愈熾何異烈燬肺

金受害尤劇痰涎壅盛喉音漸啞肌肉瘦削必不起矣熱退

人中黃 人中白研 驚甲童便或醋 青蒿秋冬 當歸各貳

麥門冬地骨皮各兩 右為末猪膽十個取汁和水壺九菜豆

大每服百丸白湯送下日三服驚甲同龜甲煎膠入猪膽和

簡明醫教

卷之四

勞瘵

七

黃芪益損湯 男婦童男女諸虛不足五勞七傷骨蒸盜汗咽

乾痰嗽咯吐血絲寒熱頰赤神昏不食服熱藥煩躁衝滿寒

黃芪 人參 石斛 白朮 當歸 茯苓

川芎 白芍 熟地 山藥 丹皮 麥冬各六

木香另 肉桂 甘草各貳 五味子五

右咀水盞半姜三片棗一枚小麥五十粒烏梅一個煎七

驚甲散 虛勞客熱肌肉消瘦煩熱心悸盜汗食少多渴嗽血

驚甲 黃芪 青蒿淨 知母 秦艽 紫苑

地骨皮 銀柴胡 懷生地 赤芍藥 桔梗 甘草等

右加批把葉去毛水煎服 虛加人參天門冬五味茯苓

太平丸 治陰虛咳嗽吐嘔咯血骨蒸虛勞諸証白湯調

天門冬 麥門冬 知母 貝母 冬花 杏仁各

生地黃 熟地黃 當歸 黃連 阿膠各兩 蒲黃炒

京墨火 桔梗 薄荷各壹 麝香不用 為末蜜和九龍眼

犀角丸 治骨蒸勞熱等證効

犀角屑 驚甲打 枳殼 黃連各壹 龍膽草 貝母

升麻各壹 烏梅肉各貳 秦艽各貳 柴胡壹兩 右末烏梅蒸搗入

猪膽汁各貳 煉蜜和搗丸桐子大每服三十丸不時米湯下忌

坎離膏 治勞瘵發熱陰虛火動咳嗽吐衄咳咯血喘急盜汗

黃栢炒 知母各四 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬各貳

簡明醫教

卷之四

勞瘵

八

杏仁淨研 胡桃肉去殼 蜂蜜各四 先將栢知童便入碗添側栢

葉煎 四碗去渣次將二冬地入汁漆水二碗煎二碗將藥

杏搗細水二碗煎一碗共三碗杏桃搗如泥同密入汁慢火

熬成膏磁器盛貯坐水內一日出火毒每服數匙扁栢湯下

生汁止咳膏 雪梨汁十 藕汁 鮮地黃汁 茅根汁各五

麥門冬汁 蘿蔔汁各貳 慮淨入新砂鍋煎減半入白蜜八

飴糖四兩 姜汁少 有血加扁栢入童 韭汁黃根汁各半 鐘散煎

簡便方 除骨蒸祛鬼氣 童便五碗青蒿汁五碗砂鍋煎至

三碗濾淨慢火熬至二碗入猪膽汁三枚煎至半碗許入片

草末搗千下丸如桐子大每五十丸空心米湯下

又 童便二鍾無灰酒一鍾新磁器盛入猪腰子一對重湯煮過夜五更腰汁同食多乃効 煮雞子亦可

又 胡黃連末壹錢 蜜湯下 或於羊角末壹錢 溫水下

又 生地黃汁一筋蜜四兩熬稠頓服或苦參末壹兩 薑湯下 虛勞不眠 酸棗仁壹兩 水二盞絞汁地黃汁一合貳合 粥食

○傳屍 此證父子兄弟夫妻患病傳染相延數世甚至滅門者實有勞蟲出死入生羣書繪形逐世變易計九種弱人切宜

萬病解毒玉樞丹方見 治傳屍勞每用一錠雞鳴時磨服俟下惡物或有形或如亂髮紅絲亦是也次進飲食未下明早再服

下為度又樞子口 空心食殺蟲

衛明醫錄 卷之四 傳屍 九

又 屍蟲 雄黃壹兩 松香壹兩 溶化和丸蓮子大平且 吞壹丸

蘇合香丸 用石榴皮桃柳梅桑枝青蒿鬼臼赤箭煎湯服

又 桃仁百粒 搗為丸平旦水服完飲酒至醉未下再服 肉百粒

屍蟲骨蒸 百部壹兩 青蒿子八兩 為末蜜丸每百丸早晚 減服

音聲

經曰內奪而厥則為瘖俳皆腎虛也俳者 蓋心為音聲之主肺

為聲音之門腎為音聲之根舌乃心之苗故心絕者舌不能轉

而為言也然而又有暴感風邪咽閉者有因爭兢叫傷者有因

歌唱損氣者風寒昇濕燥火並可干於音聲皆為易治惟酒色

過度腎臟虧傷不能納氣歸元氣奔咽隘嗽痰喘脹諸病雜揉

致氣之失音者俗名啞勞是也神人莫療脉浮緊為風寒洪大為火滑為痰微弱氣虛惟細數急瀆危候

主方 桔梗 甘草 茯苓 陳皮 石菖蒲

水通 訶子取皮 加燈心念枝水煎食後服 風寒冬加

麻黃杏仁少加桂枝夏紫蘇葛根前胡 痰半夏竹瀝姜汁

少許 火加苓連梔耆參薄荷 嗽加金沸草麥冬貝母

咽痛山根射干牛旁 熱痰壅盛音不出鹽湯探吐之 便

秘大柴胡湯 感濕啞不換金正氣散並見 諸風啞加防風

羌活蠶蠶 痰多其桔訶子煎湯吞滾痰丸痰

龍腦膏 治謳歌叫傷及痰火等諸般失音

衛明醫錄 卷之四 音聲 十

薄荷菜四兩 甘草 桔梗 連翹各貳 百藥煎貳兩 如無

則用半 訶子皮 砂仁 大黃各壹兩 為末雞子清和

蕭音湯 一切痰火勞瘵失音 茯苓各壹 橘紅 甘草各七 杏仁七粒

麥門冬錢 桔梗 茯苓錢 橘紅 甘草分 杏仁研

取金竹刮茹一團劈取竹衣錢 竹葉十片 水煎加竹瀝服

杏仁煎 治咳嗽音不出 杏仁泡去皮 蜂蜜 姜汁 砂糖各壹 桑皮去赤 木通

貝母 北五味 紫苑各壹 石菖蒲 欬冬花各五

右咀水五碗煎半去杏入杏姜糖蜜火煎 至二碗兩日服

風寒留滯 桂枝二錢石菖蒲一錢煎細細呷

火盛失音 桔梗兩 甘草二寸半 訶子四箇 分二服水煎入

經喉風閉 旋花薄荷葉等分爲末 密丸嚙化

簡便方 蘿蔔搗汁入姜汁少許 治痰閉陳皮五兩水煎頓飲

又 訶子水煮軟入蜜煮乾常噙一個慢嚙汁少時徐嚙

虛煩

經曰因於暑汗煩則喘噎大聲也 又曰陽虛則外寒陰虛則內熱

是證多屬陰虛水虧火盛其煩安也必躁安也 暑月多有之吐

瀉後煩而口渴傷寒後及婦人產後煩渴而手足厥冷脉沉者

乃內傷元氣邪伏至陰從其所化六脉沉遲津涸舌乾宜乾姜

附子之劑復陰回陽苟榮衛失調元煩復起或證相似而脉沉

簡明醫發

卷之四

虛煩

主

數有力口渴大便燥實熱宜承氣湯下有表裏實熱煩渴人

參白虎湯有傷寒大渴點水入口即嘔煩躁欲絕竹葉石膏湯

傷寒去參加知母煩渴辰砂六一散燈心湯服煩熱渴五苓散

使愈恍惚妙香散方見 不寐清心蓮子飲方見 脉大緩吉急數凶

主方

麥門冬錢 茯神錢 棗仁錢 當歸錢 半夏錢

炙草七 加姜三棗一竹茹圓 小麥錢 煎服 虛加參芩小

草 心虛人參遠志 有痰橘紅竹瀝 大渴石膏知母

小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁煩躁不安

人參 炙草 右咀每四錢水一盞姜五片煎八分服

酸棗仁湯 霍亂吐瀉增劇虛勞煩擾氣奔不眠

聚仁炒兩 人參 桂心各壹 知母 茯苓各叁 炙草錢

石膏錢 右咀每七錢姜三片棗一枚水煎服

簡便方 大病後及諸虛煩 竹茹麥冬各三錢水煎服

又 棗仁炒研 竹葉湯下 又 苦竹筍煮食亦治消渴利水

發汗不得心煩骨疼嘔逆人參陳皮各貳 竹茹廿 各壹錢

驚悸

經曰陽氣與陰氣相搏水火相惡故惕然驚也夫人之所主者

心心之所主者血心血一虧神氣不守此驚悸之肇端也驚者

謂實有見聞悸者恍如見聞虛之甚也血不足則神不守神不

簡明醫發

卷之四

驚悸

主

守則驚恐悸怖恍惚眾證作焉肝脉急數主驚心脉滿數虛

治宜鎮心神安魂魄清痰制火養血疎肝○怔忡之證無特而

作忽然虛火上浮煩悶昏眩心中惕惕動搖不能主持少頃復

主方 當歸 人參 黃連 遠志 炙草

茯神 石菖蒲炒各 加竹葉龍眼燈心煎成調硃砂飛一錢

臨睡服 心虛加栝子仁麥冬 有汗黃芪棗仁 痰加半

夏膽星橘紅痰多在膈上稀涎散吐之膈下滾痰丸利之

養心湯 治心虛血少驚悸不寧

當歸 川芎 茯神 遠志各壹 人參 黃芪

半夏麴 茯苓 栝子仁 棗仁各五分 官桂 甘草各五分

五味子九粒 加蓮肉七個棗一枚水煎服

寧志丸 治驚悸定心神 安神丸宜服方見不寐

人參 茯苓 茯神 栝子仁 棗仁酒浸去殼研各 遠志 肉

當歸 琥珀研 石菖蒲各五分 乳香 硃砂研各

右為細末入珀乳砂勻蜜丸棗豆大每服二錢臨睡棗湯下

濕膽湯 心膽虛怯怔忡驚悸 二陳加竹茹枳實遠志姜棗

簡便方 金銀煎湯服 或硃砂水飛服 因驚九竅出血木

健忘 帝曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃

簡明醫發 卷之四 健忘 十一

實而心氣虛則榮衛留於下久之不以時上故善忘也夫善忘

者乃憂思過度損其心胞以致神舍不清遇事則忘然思傷脾

亦能令人健忘心脉洪大而散主於火瀉為血少治宜養血安

主方 人參 石菖蒲 遠志肉 茯神 丹參

當歸 麥冬 生地等分 甘草等分 加燈心龍眼七枚水煎

臨睡服中脘有痰妨於心竅亦令健忘加橘紅膽星黃連

歸脾湯 憂思傷脾心血耗損健忘驚悸怔忡恍惚盜汗煩熱

神亂少睡或嗜卧減食女人經愆肺熱癩癩流注不消不飲

人參 白朮 龍眼肉 白茯苓 遠志肉 當歸

酸棗仁研炒 黃芪各壹錢 木香 甘草各五分 姜三棗一水煎服

二神散 治健忘十日効久服日記千言

茯神 遠志 石菖蒲等分 早晚各四錢水一鍾煎十

簡便方 健忘 吉祥草為末錢 酒下 書室栽之明目強記

又 蓮子泡去皮心 研粉先以粳米二合煮粥次入粉煮食

恐喜怒 經曰腎在志為恐恐傷腎思勝恐恐者自知如人將捕之狀欲

人作伴夜設燈燭是也又曰肝在志為怒怒傷肝悲勝怒怒在

陰之陽陰氣閉遏其陽而陽不得伸故怒也又曰肝木太過其

病怒而勇敢喜笑不休者經曰心藏神神有餘則笑不休又曰

精氣并於心則喜笑皆屬心火之甚猶燔燂之火而鳴笑也

簡明醫發 卷之四 恐喜怒 十一

主方 治恐 人參 枳殼 五味子 桂心各六分 栝子仁

熟地 茯神各錢半 枸杞子 井菊花 山茱萸各壹錢

加姜棗水煎服 不能獨卧加遠志白朮前胡各七分 細辛分

抑肝散 治怒 甚者 服當歸龍薈丸方見

香附四兩 柴胡 黃連 青皮各貳兩 甘草壹兩為末每

黃連解毒湯 治喜方見 加半夏竹瀝姜汁 先以食鹽貳錢 兩

赤河水二碗煎三沸徐啜之以指探喉中吐痰為度 因驚

邪心虛致笑宜服牛黃造命丹方見小兒驚門

自汗附頭汗 心汗 經曰汗者心之液陽加於陰謂之汗自汗者無時而濺濺然出

動則更甚屬陽氣虛陽實則無汗人賴衛氣固其表衛弱則自

汗津津時泄當補陽助衛腠理可實矣亦有心火上騰脾濕不

降猶濕熱蒸而為雨故汗多出宜清利之脈微瀉而濡主虛汗

主方 人參 黃芪 白朮 茯苓 當歸

黃連 白芍 棗仁 牡蠣 桂枝 甘草 五味子

右加浮小麥一撮烏梅一個棗二枚水煎服不止加五味子

肉桂麻黃根煎成調龍骨末 虛人加山茱萸肉從蓉 濕

勝者澤瀉茯苓防風白芷 陽虛加製附子 火盛倍黃連

熱極者另煎涼膈散 甚不止浮小麥半升煎汁去麥

用汁煎藥 兼痰盛氣滯等隨證加減

簡明醫發 卷之四 自汗 十五

黃芪建中湯 治虛勞自汗

黃芪 芍藥 桂枝 甘草 加姜三棗二水煎服

黃芪湯 喜怒驚恐勞致傷陰陽偏虛自汗

黃芪 茯苓 熟地 肉桂 麥冬 麻黃根

龍骨 當歸 防風 甘草 五味子 加浮小麥

一撮水煎食遠服 四肢厥冷加熟附子 發熱加石斛

大補欬汗湯 治氣虛自汗

人參 茯苓 熟地 從蓉 黃芪 當歸

防風 山茱萸 白朮 肉桂 甘草 五味子

右加生姜三片黑棗一枚水煎食遠服

玉屏風散 治表虛自汗

白朮 防風 黃芪 加姜三棗一水煎服

簡便方 自汗 硃砂 白芷 麥冬 茯神 棗仁 煎湯服

又 牡蠣 麻黃根 黃芪 分二服加浮小麥水煎服

又 黃芪 甘草 水煎服 又 人參 茯苓 棗仁 煎湯服

又 麥麩 椒末 為末每三錢水煎露一宿溫服

又 浮麥黑豆煎湯作飲 又 粳米 龍骨 末參 煎湯服

頭汗 惟頭出乃陽氣上脫或寒熱脇滿心煩而嘔小便澀

主方 柴胡 桂枝 黃芩 天粉 乾姜

牡蠣 甘草 水煎服 渴欲水必發黃五苓散治之

簡明醫發 卷之四 自汗 十六

心汗 汗為心液人多有之憂怒驚恐勞傷心氣或鬱結成

主方 人參 白朮 當歸 生地 棗仁

白芍 麥冬 黃連 陳皮 甘草

加姜棗二枚烏梅一個浮麥一撮水煎服

簡便方 思慮太過心汗茯神為末艾湯調下或 散湯有燒服

汗斑 暑汗濕熱鬱於皮膚日久不散或汗衣晒熱未燥而

穿濕熱蒸侵發而為斑黑白相雜有變癩風者亦當祛之

主方 玄參 滑石 防風 荆芥 升麻

甘草 水煎服 外以白附子硫黃蜜陀僧為末擦之

數方 蜜陀僧 黃丹 硫黃 雄黃 信 研極細先以肥皂

擦洗斑淨用生姜搗細稀紗包令汁出蘸末塗斑為日後服

盜汗附陰汗 脚汗

是證屬陰虛血弱。陽蒸陰分而液出者為盜汗。然陰虛陽必奏。陽火乘之故睡中出汗如洗覺來即收。非若自汗常出也。脉虛細而微濡。宜補陰清火實腠理壯腎水。

主方 當歸 芍藥 生地 熟地 黃芪

麥冬 棗仁 茯神分 水煎服 加麻黃根亦可

常歸六黃湯 陽乘陰分盜汗一服安

黃芪錢 當歸 黃連 黃栢 黃芩 生地

熟地各壹錢 水煎服

簡明醫教 卷之四 盜汗 十七

飲汗益脾湯 治氣虛脾弱盜汗

黃芪 人參 白木 茯苓 扁豆 山藥

陳皮 半夏 葛根 甘草分 水煎服

麥麩散 止盜汗

麥麩錢 防風 白木 牡蠣 黃芪各錢半 加棗煎

簡便方 止盜汗 白木八錢 切塊浮麥一升水十碗者乾將木

切片為末每三錢另取浮麥湯下或牡蠣根研 防風末壹錢

盜汗不止 椒目麻黃根等分為末每服一錢無灰酒下

盜汗有熱 龍膽草防風等分為末每服一錢米湯調下

脾虛盜汗 白木參 茯苓錢 加姜棗水煎服

陰虛盜汗 黃栢炒 知母炒 甘草分 水煎服

睡中汗出 酸棗仁炒 人參 茯苓分 水煎服

○陰汗 下焦濕熱不行以致陰間及囊汗出宜滲濕利小便

主方 滑石錢 龍膽草 猪苓 澤瀉 茯苓

白木各壹錢 桂分 加燈心廿枝水煎服

簡便方 大蒜煨熟同淡豆豉搗丸硃砂為衣每三十九分

又 蛤粉 牡蠣俱煨研極細絹袋盛撲

○脚汗 脾經濕熱內淫手足心汗至冬陽氣內伏則汗愈多

主方 白木 蒼朮 茯苓 半夏 黃連

滑石各壹錢 羌活分 柴胡 升麻 甘草各壹錢 燈心煎服

簡明醫教 卷之四 陰汗 十八

簡便方 白替黃芪煎湯頻洗 又牡蠣研 枯礬研

痰飲

經曰諸症強直積飲皆屬於濕稠濁者為痰屬肺火清稀者為

飲屬脾濕論痰有五曰風濕食火酒是也夫風痰者形寒飲冷

外感內鬱清白多涎或成癱瘓濕痰者生冷寒濕停積不散倦

怠軟弱或面腹腫食痰者膏粱厚味煎博辛辣重稠疊穉多成

癖塊火痰者諸經火炎煎燥肺金津液稠粘有成癱瘓酒痰者

酷飲過縱不得運導次日猶嘔傷肺成積夫人之氣血流行無

一息間斷纔有壅滯鬱而為熱痰遂生焉亦有因寒者然而百

病生於痰如中風口噤言蹇流涎不能行動二便失常眩暈嘈

維顛仆喪神等證。以至婦人白帶。小兒驚癇。周身諸疾。多因痰

成。論飲有四。曰痰。懸。溢。支。是也。如人素肥。今瘦。水走腸間。漉漉

有聲。謂之痰飲。水流脇下。咳唾引痛。謂之懸飲。水入四肢。失汗

身痛。謂之溢飲。欬逆形腫。短氣不臥。謂之支飲。諸飲因於酒後

飲冷所致。脉滑大有痰。兩關大實。膈上有痰。宜吐。眼胞及眼下

黑者亦痰。肝脉濡散。弦而浮滑。飲證。治痰清肺利氣。治飲實脾燥濕

主方二陳湯 陳皮 半夏各壹錢 茯苓壹錢 甘草壹錢 姜三棗一煎

順氣加枳殼桔梗 火盛苓連梔子 清肺桑皮杏仁 熱

痰天粉青黛玄明粉 老痰貝母海石瓜蒌 虛痰參朮

痰在脇下白芥子 痰在四肢經絡竹瀝姜汁實人別煎 風痰

簡明醫報 卷之四 痰飲 十九

天麻白附膽星 濕痰蒼白朮 積痰香附查麩芽 酒痰

芎根砂仁烏梅 結核在咽海石芒硝 寒痰官桂乾姜

濕痰流注腫。鼓蒼羌防酒苧香附木香紅花竹姜 停痰留

飲南星香附青皮木香蒼朮實 諸飲旋花白朮猪澤肉桂

導痰湯 治痰多氣滯 主方加南星枳實

溫膽湯 寧神豁痰止嘔 主方加竹茹枳實

蠲痰疎氣湯 一切痰疾及肺氣壅塞日服此湯夜服滾痰丸

前胡素多鬱怒先 半夏各貳錢 人參虛者用 桔芩 陳皮

南星 枳殼 紫蘇 薄荷葉 厚朴 羌活

甘草各五分 加姜五片水煎服 中風加獨活 無熱去黃芩

滾痰丸 治痰因火炎肺金受剋煎熬津液而成晝夜吐咯不

已一切實熱咳嗽痰多及顛狂癱瘓風毒腮腫腫硬頸項結

核遍身走痛頭疼牙痛噎氣吞酸胸痞氣塊涎飲吞胃怔忡

驚悸陰陽開格久痰喘嗽喉閉赤眼結核瘰癧女人經閉小

兒嗽熱痰喘驚癇功難盡述中風後言蹇肢痿奇病皆治瀝

大黃錦紋者切好酒 黃芩枯片者去腐竹 礞石清煨金包水

沉香紫色上九蒸晒 俱為末水盪丸如芥子大每服實人一錢

虛老五七分小兒二分晚飯後茶湯一口送過咽喉即便仰

臥使藥攻喉間之痰從上而下大早去多減服痰不下加服

素多痰而大便不潤者每晚服三分永無中風諸患持蜜各化尤妙

簡明醫報 卷之四 痰飲 二十

三花神祐丸 治一切濕熱沉積痰飲氣滯變生諸病或風熱

燥鬱肢體麻痺走注痛腫風痰喘嗽氣血不通未鼓脹前藥

黑牽牛取頭末 大黃生研 芫花醋拌 大戟紅芽者取 甘遂研末

各五錢 輕粉壹錢 和勻水法丸芥子大每服一分早午晚各一服

大便利日一服此攻結破飲瞑眩之藥用合宜必得中病惟

要量虛實能推陳致新順三焦調五臟神品嬰兒服三錢

牛黃豁痰丸 治中風顛狂驚癇僵仆不省人事痰涎壅盛牙

關緊急男婦老幼一切痰盛喘滿危篤者多服痰下即安痰

膽星 天竺黃 熟大黃 黃芩枯各 貝母 黑丑各

玄明粉 白附子 天麻各壹錢 雄黃 硃砂 礞石俱水飛

沉香真者牛黃與陝西水片各研極細末稱配勻

蜜丸彈大金箔為衣每服壹先小兒壹用竹瀝入姜自然汗

丹溪化痰丸 治上焦痰火壅盛咳嗽煩熱胸滿氣急

陳皮 半夏 枳實各六茯苓 黃芩各黃連

南星各五瓜蒌仁 杏仁 天粉 前胡各四甘草各

右為末竹瀝姜汁或水壹丸菴豆大每二錢食後白湯送下

加味潤下丸 治濕熱痰涎久積 丸服法與化痰丸同

橘紅入兩食鹽五錢南星製半夏 黃芩各壹黃連各壹

石膏丸 治久近痰火効

軟石膏入兩食鹽五錢南星製半夏 黃芩各壹黃連各壹

簡明醫說 卷之四 痰飲

蚌殼火煨俱研極細水壹丸或末服早晚大麥湯下或蜜和

醫林蠲痰丸 治風痰冬月冷痰安神定志

半夏泡七次南星泡去明礬另研辰砂五錢姜汁糊九百

五飲丸 治一切停痰留飲理脾順氣消食寬胸

青皮 陳皮 茯苓 枳實 白礬各壹白朮

半夏 南星俱製皂莢 生姜各貳香附 蘇子

山查肉神麩各半右末竹瀝姜汁糊丸每服七十

稀涎散 痰在膈上喉如拽鋸中風口噤乳蛾喉風並宜吐愈

瓜蒂散 甚者用之女人宜束定兩乳見中風

礬蜜湯 白礬壹錢水一碗煮十沸入蜜小半杯溫服未吐再飲

簡便方 風痰 蠶七條洗炒為末姜汁一匙溫水調下

又 蚘殼或蛤蚌殼研細瓜蒌黃熟者搗餅晒每末每壹錢

寒痰惡心 草撥或胡椒末每五分吐涎水清痰赤石脂研服

痰飲昏眩 吳茱萸泡白茯苓等分為末蜜丸白湯下

痰厥氣絕 古塔上陳石灰兩水煎滾去水用清水一盞煎滾

痰盛喘急 好牛黃壹分貝母壹錢研勻白湯下單服貝母亦可

頸項痰核 五倍子南星大黃朴硝為末醋蜜調團日久者消

咳嗽

經曰秋傷於濕冬必咳嗽又曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也

皮毛者肺之合皮毛先受邪氣以從其合也五臟咳之久乃移

簡明醫說 卷之四 咳嗽

六腑故諸咳皆由邪正相搏蓋邪伏則氣靜邪動則氣奔氣上

逆于咽喉不得宣通而為咳嗽甚至煩悶欲絕皆邪氣使然也

感病之始必宜散邪為要如變諸咳則有十種曰風寒支肝心

脾肺腎膽厥陰咳是也又六咳者風熱火燥寒濕是也咳者無

聲有聲因傷肺而動於濕因咳而嗽也又咳有三因之別如

風寒暑濕燥火而致為外因喜怒憂思悲恐驚而致為內因如

咳而寒熱引腰背痛中滿搶心痛不欲食乃饑飽傷脾或勞役

傷肝房幃傷腎叫呼傷肺之類屬不內外因又乾咳嗽者嗽多

聲而無痰乃陰虛火盛火鬱而成漸至午後寒熱盜汗血痰多

成弱證或嗽久津亡或濁唾涎沫膿血腥穢胸中隱痛而成肺痿肺癰脈浮風緊寒數熱細濕浮緊虛寒沉數實熱弦滿不足

洪滑多痰治法初感疎散肺經風寒內有肺火宜清降之必兼消痰順氣止咳寬中

主方 前胡 葛根各錢 茯苓 枳殼 桔梗

陳皮 半夏 桑皮 杏仁 紫蘇各錢 甘草五分

右加生姜三片黑棗一枚首貼葱頭二個春是上升之氣加

知母黃芩 夏是火炎於上加黃芩石膏薄荷 秋是濕熱

傷肺加防風梔子枇杷葉 冬是風寒外束麻黃壹錢 桂枝參分

金沸草早晨嗽黃連枳實 午前嗽知母石膏 晚嗽加四

物黃柏知母 黃昏五味子 胸滿瓜蒌 喘貝母蘿蔔子

簡明醫教 卷之四 咳嗽 三

蘇子 嗽有血岸角地黃湯紫苑阿膠 虛嗽天麥冬知貝

母 風寒啞細辛參分 姜葱 痰多合痰方 嗽久人參五味

冬花麥冬阿膠白芨百部百合知貝母烏梅如諸邪已清惟

是嗽久肺脹不能止兜苓粟殼壹錢 五倍之類暫用一劑亦忌

拗湯 治風寒冷嗽遇風冷則嗽喘痰涎胸滿氣塞

麻黃壹錢 杏仁連皮研 甘草生用 加荆芥桔梗名五拗湯

常止嗽丸 因感風寒雨濕成嗽患久不已冬月風冷嗽甚

紫蘇葉 冬花蔬 紫苑茸 杏仁研紙壓油 烏梅壹錢

粟殼去殼 麻黃根 陳皮 桑皮壹錢 知母 甘草各錢

官桂壹錢 為末入梅拌重晒磨和杏蜜九龍眼大煎湯化下

清金利肺湯 諸嗽痰盛氣急胸滿

陳皮 茯苓 貝母 桔梗 天冬 麥冬

枳殼 杏仁 桑皮各壹錢 甘草參分 加姜棗煎

氣急加蘇子蘿蔔子葶藶瓜蒌竹瀝枇杷葉 火盛加梔子

黃連 虛嗽當歸知母 血痰生地芍藥阿膠紫苑 久嗽

五味子冬花百部百合兜苓 嗽痰加旋覆半夏

蘇子煎 治上氣咳嗽 真蘇子研 生姜汁 生地汁 白蜜

杏仁去皮尖搗如泥 五味攪勻微火熬成膏每數匙喻化湯下

定嗽喻化丸 一切咳嗽氣急有痰咽喉不利煩渴火盛

薄荷淨菜 天冬 麥冬 橘紅 桔梗

簡明醫教 卷之四 咳嗽 三

甘草 冬花 貝母各五錢 共研極細末另用軟石膏壹錢

青黛真 瓜蒌去油 海石玄明粉各五錢 柿霜壹兩

水片五錢 烏梅內十個 洗蒸和勻 蜜和丸彈大不拘時喻化

焚香透膈筒 一切風寒冷嗽胸膈脹滿

鴛管石壹兩 欬冬花壹錢 艾葉壹錢 雄黃各五錢 各研和勻紙捲成

筒火點合漏斗於上口吹烟一口淡姜湯嚥下加佛耳草佳

寧嗽膏 嗽久諸邪服藥已清惟是嗽不止可服邪未清切戒

天冬 麥冬各壹錢 粟殼去殼 陳皮各七錢 五味子 蘿蔔子

貝母各五錢 冬花 百合 百部 天花粉 枳殼

兜苓 紫苑各壹錢 加白果三十個打碎 飯前煉膏法煎成

入枳糖入兩熬稠傾磁碗內坐水中一日每服半盃溫湯送下

太平丸 治血痰虛嗽方見

簡便方 止咳 蛤粉厚大者青黛少研勻每二錢入麻油一點薑菜湯調下

又 桑皮搗鮮者米泔浸一宿竹糯米武兩共末每二錢米湯

久嗽 粟殼水潤醋拌晒研末蜜丸噙化 或梨汁畧熬趁熱

久嗽肺癰 葱苡仁水一大鍾煎三分入酒一分服

咳嗽血痰 欵冬花五味子肉各白帶五分共末雞子十個

蜜四攪勻用豬肺一個同裝入管內水五碗煮大蘿蔔十

搗細煮爛去膏取汁煮肺熟空心食 或肺一病人每一歲

用杏仁壹個竹簽眼入杏將麻扎煮熟去杏食肺効

簡明醫錄 卷之四 咳嗽 三五

又 杏仁淨搗牛骨髓白蜜各四兩慢火熬稠逐匙噙化或白湯

久嗽 杏仁胡桃仁等分蜜丸噙 或杏仁蘿蔔子各壹兩研

○哮喘 始因風寒傷肺交生痰飲復遇外邪閉塞滯痰鬱氣

不舒是證作矣有因鹹酸致傷實人宜吐痰忌生冷厚味寒涼

主方 麻黃武杏仁 石膏散陳皮 半夏

茯苓 桑皮 欵花 蘇子各壹甘草五分右加生姜三

片葱頭一個細茶一撮白果念個去衣煎成磨沉木香各壹

寧肺丸 哮喘喘急咳嗽痰涎擡肩擗肚不能睡臥風冷尤甚

南星圓小枳實者蛤粉厚大青黛武兩半夏池七次去

蜂房炙各天竺黃 白礬各錢信製法用明礬白礬各錢

扎鹽泥通身漚好眼乾莫火 各研細末稱和用薄麵糊為丸

如粟米大每服大人三分小兒分半臨睡蘿蔔或菜湯茶下

簡便方 蘿蔔子研末姜汁調薄糊細丸每三十九津燕

又 雞子壹個畧敲浸尿缸三日煮食

喘證 附短氣

經曰諸病喘滿皆屬於熱又曰淫氣喘息痺聚在肺夫喘急之

候發則張口擡肩搖身頓肚而作哮喘之聲痰壅喉中聲如拽

鋸或如水雞之响此內外邪干而氣實也有氣為火鬱而痰在

肺胃之間有水氣乘肺而肺虛挾寒作喘有肺虛挾熱火炎而

喘有驚憂氣過肺脹而喘有胃絡不和而喘有腎虛不能攝氣

簡明醫錄 卷之四 喘證 三六

而喘然未有不由痰火內鬱風寒外束經曰熱為寒包則喘者

明矣又喘則必脹脹則必喘何也蓋肺朝百脈通調水道下輸

膀胱小便出焉如肺受邪而失降下之令則小便漸短而發腫

此必先喘後脹屬肺病當清肺降氣分利水道夫脾主肌肉脾

土受邪不能制水妄憤肌肉而為腫肺無母氣之養反得泛溢

之侵氣不下行而為喘此必先脹後喘屬脾病當理脾滲濕順

氣定喘宜分標本先後治之短氣者似喘而實非喘因元氣虛

火氣不接續而然或有氣從臍下起直冲清道而上乃正氣虛

損切宜認辨喘急攻邪二證霄壤悞治必危喘証脈浮滑手足

溫者生沉瀆急疾代止肢冷自汗者死治喘發時宜散表清裏

主方 陳皮 半夏 枳殼 桔梗 紫蘇

麻黃 杏仁等分 甘草減半 加生薑三片黑棗一枚水煎服

嗽加桑皮冬花紫苑 氣壅加瓜蒌薤白蘇子 乍喘乍止

貝母麥冬 肺火枯萃枇杷葉甚加葶藶子栝榔

五虎湯 治風寒喘急哮喘不臥

麻黃 杏仁研 軟石膏假各 甘草分七 細茶半 加桑皮錢

右加生薑三片葱頭三個水煎熱服 痰多合枳桔二陳湯

二審湯 治風痰壅盛喘促不能睡一服安

半夏四個 南星兩個 甘草錢壹 皂莢灸去皮 姜指大水煎服

蘇子降氣湯 虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰壅喘嗽

簡明醫教 卷之四 喘證 三

真蘇子錢 陳皮 厚朴 前胡各錢 肉桂 半夏錢

當歸 南星各錢 甘草分五 右加生薑三片棗一枚水煎服

寒喘去前半當星加乾姜錢壹 加姜煎調砂仁錢壹 磨沉香各錢 沉香三分

四磨湯 治七情之氣鬱結而喘 喘而腫三花神祐丸方見痰門

真沉香 栝榔 枳殼 烏藥各錢 湯調服

安氣湯 治弱人腎虛不能納氣氣不歸元而喘

人參分五 五味子九 麥冬 酸棗仁研 山藥 茯苓

阿膠錢 煎成充化阿膠服次八味地黄丸減桂加五味 兩參壹兩九服

簡便方 桔梗一兩童便一鍾煎八分去查服

喘甚 葶藶壹錢 罌粟壹錢 蜜丸水二鍾煎十 煮一鍾去棗入九分 煎八

又 真沉香末硃砂各分三 湯調服 或川椒子研壹錢 姜湯下

又 杏仁炒研 煮食 火喘 石膏研細 甘草灸研五錢 和每

灸法 膈中穴在兩乳折中 氣海臍下 喘證忌苦寒藥

短氣方 人參 白朮 茯苓 陳皮各壹錢 杏仁

紫蘇子 當歸 桑皮各七 甘草分五 加姜壹棗壹水煎磨

肺痿

證屬上焦遊火蘊熱肺金受其薰蒸則清純之氣擾亂生化之

令不施故為咳嗽紅痰往來寒熱自汗便數口中濁唾涎沫多

出寸脉數而虛者是也又有因汗多有因吐甚或消渴而反通

小水或虛閉而峻利大便重津液真陰日損致肺燥而亦成

簡明醫教 卷之四 肺痿 三

痰矣如咳嗽惡風胸膈脹滿者防成此患

主方 貝母 知母 紫苑 阿膠 黃芪

茯苓 人參各壹錢 桔梗 麥冬 冬花 薄荷各七

其草分五 五味粒十二 姜一片水煎衝膠服 往來寒熱柴胡黃

芩 痰多加橘紅製半夏 血虛加當歸白芍 咽乾而渴

另用生薑錢五 人參錢貳 甘草錢貳 大棗錢壹 分煎 涎多不渴用桂

枝錢五 甘草錢壹 大棗錢壹 皂角錢壹 分二服水煎

保肺飲 肺痿咳嗽胸中隱痛碎碎燥咳

人參 麥冬 薏苡仁 百部 黃芪 桑皮

五味子 當歸 芍藥酒 片黃芩 百合等分 加姜煎服

癲狂

經曰癲疾厥狂。久逆之所生也。又曰陽氣太上。甚則狂。癲陽盡在上而陰氣從下。下虛上實。故癲狂也。又曰重陰者願重。陽者狂。又曰陰陽復爭。則欲登高而歌。棄衣而走。又曰狂病始發。少則不饑。自高賢也。自辯智也。自尊貴也。語言善惡。不避親疎。神明之亂也。夫感病之由。得於大怒。大喜。大喜。及不得志。或有所失。或得於驚。驚則能動人之神。心為神之舍。神去則合空。津液流入。則變為痰。迷心。痰鬱成火。火性炎上。故登高大言。或屈無所伸。怒不能泄。肝木膽火。炎上於心。心火奔騰。神舍失守。久而而成也。脈實大。堅滑者生。弦急而虛者死。治宜降火清痰。鎮

簡明醫彙

卷之四

癲狂

三九

心安神。兼服滾痰丸。豁痰丸。並見痰門造命丹。小兒驚門

主方 黃連 黃芩 梔子 連翹 茯神

遠志 棗仁研 石菖蒲 當歸 生地黃 川芎等

甘草減 加燈心 竹葉水煎調辰砂服 虛加人參白朮 實

熱大便秘加大黃 或防風通聖散方見風門 痰多加橘紅南星

半夏 天麻 白附海石 瓜蒌竹瀝去遠志 棗仁當歸生地

清心湯 治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黃連 黃芩 薄荷 連翹 梔子 甘草

大黃 芒硝各等 右水盞半 竹葉十筒煎八分溫服

抱膽丸 男婦一切癲狂風癩婦人產後驚心室女經行驚氣

硃砂飛研 乳香研 水銀 黑鉛各壹兩 先將鉛銚內溶化

下水銀攪勻研細入硃乳末用米粥和丸茶豆大每服壹錢

牛黃瀉心散 治心經邪熱狂言妄語禁捉不定

牛黃 水片各壹錢 硃砂小飛 大黃生末 研勻每服壹錢

蔚金蜀地香 明礬各 右為細末薄糊丸桐子大每五十九白

簡便方 陽狂火熾作渴用鉛溶化下水銀等攪勻研細每服

三分水一碗調勻服 狂甚時與水飲之可安

此證宜察致病之由。當如其願。有喜甚致狂者。以恐怖抑之。

雪梨消痰清火。多食大益。忌鮮猪羊肉厚味酒動火發氣物。

簡明醫彙

卷之四

癲狂

三九

癩證

經曰神不得守。謂神亂也。按此病皆由驚動其神。使臟氣不平。

慳而生涎。閉塞諸經。痰涎壅積。變熱生風。顛屬於心。癩屬五臟。

故有五種。馬癩作馬嘶鳴。應心。羊癩作羊咩聲。應脾。雞癩。猶雞

撲翅。應胃。猪癩。若指叶狀。應腎。牛癩。似牛吼喘。應肺。發則昏運。

倒仆。口眼相引。目睛上視。手足搐搦。腰背強直。隨吐涎沫。皆由

痰火時潮。平復則甦。雖因痰鬱。屬間。更屬肝經風火。先宜治痰。

次疎肝火。脈浮陽癩。沉為陰癩。滑大易治。微細難痊。凡氣血虛。

上方 茯神 南星 橘紅 瓜蒌 枳實

桔梗 梔子 半夏 黃芩 甘草 加生姜三片

水煎成磨入木香五錢辰砂壹錢竹瀝半盃姜汁三匙調服

清心抑膽湯 平肝解鬱清火化痰定眩運養血氣

當歸 白芍酒炒 白朮 茯苓 陳皮 半夏

黃連 石菖蒲 枳實 香附炒各壹錢 麥冬 川芎

人參 遠志各七分 甘草四分 加生薑三片竹茹一團水煎服

牛黃安神丸 鎮養心神消痰清火養血五癩宜常服

當歸 人參 茯苓 酸棗仁 生地黃 黃連酒炒

橘紅 膽南星 牛黃 珍珠 琥珀各壹錢 硃砂水飛

天竺黃各五錢 右諸藥為末次以牛珍珀砂各研極細和勻

蜜九菘豆大每服百丸臨睡燈心龍眼湯下金銀煎湯尤妙

簡明醫說 卷之四 癩證

追風祛痰丸 治諸癩與前安神丸兼服無不効

天麻 白附子細包 防風 僵蠶各壹兩 全蝎洗淨 枯礬

木香各五錢 半夏六兩湯泡七次為末壹半用皂角搗 共為末

姜汁打稀糊九菘豆大硃砂衣每百丸臨睡姜湯下 火加

黃連壹兩 薄荷湯下 胃虛白朮

簡便方 南星粉 九泡蒸九晒為末姜汁糊九桐子大麥冬湯下

又 荆芥穗研末 白礬研各壹兩 糊九黍米大硃砂為衣每服壹錢

又 代赭石壹兩火煨醋淬 明礬兩 各研末勻糊九菘豆大每丸十九

邪祟

經曰邪氣盛則實外邪精氣奪則虛又曰人憂愁思慮則傷心又

曰驚而奪汗出於心世俗謂衝斥邪惡為病有諸奇怪之狀及

妄聞見妄言作誠因其人元氣耗損心血虧傷而致蓋心者神

明之舍經曰心藏神為君主之官神明出焉心君失職則十二

官各失其守故視聽言動皆不得其正矣又有曠野靜僻山谷

幽陰魘魅魍魎迷惑乎人及人家男婦似有鬼附者當知必非

精神完固氣血充足之人也脉經以午鍊午數年大午小邪祟

三方 菖蒲壹寸 鬼箭 桃奴臘月樹上 當歸 川芎

人參 茯神 麥冬 遠志 蒼木各壹錢 甘草叁分

右加生薑七片金銀同煎調辰砂雄黃各壹錢 磨木香五分 調服

蘇合香丸宜服方見 玉樞丹宜服可燒 燒檀速諸香方見

簡明醫說 卷之四 邪祟

秦承祖灸鬼法 一切驚狂譫妄衝斥邪祟以患人捉定先縛

兩臂次細繩並縛兩大拇指用大艾炷置於中兩指甲及兩指

角肉四處着火灸七壯一處不着火不効及灸人中臍中壯

簡便方 五屍邪惡卒中插人中提頂髮半夏皂角末搗臭取

嚏 或竈心土為末吹入鼻 或竈突烘姜汁酒調灌 燒

諸香多人圍繞甦醒方可移動以雞蛋一枚取白與吞搗碎

又 桃奴小乾 桃蠶為末酒下或搗菖蒲汁灌或多取桃七枚

女子邪交 雄黃壹兩 研細松香兩 溶化桃枝攪勻丸如彈大焚喚

令女坐燔籠中被圍留頭面身下燒九薰之邪斷

夢遺精滑

經曰精者身之本生氣之源髓之化也又曰陰平陽秘精神乃

治陰陽離決精神乃竭蓋精之藏攝在腎精之主宰在心心為

君火腎為相火相奉君命故病在腎而責在心心藏神神勁精

泄病機有五曰夢交火熾神虛宜養心藥欬曰滑脫腎虛不攝

宜滋補腎氣曰滿溢少壯鰥曠宜靜默精化精能曰情想妄言

視聽宜攝意降心曰濕熱傷熱流通宜滲濕清火大都制相火

壯腎水寧心神固精髓不易法也又脈洪數失精便濁心脈短

主方 黃連 生地 遠志 茯神 棗仁

芡實 栝子仁 石蓮肉 黃栢鹽炒 麥門冬 蓮蕊各錢

右加燈心汁枝水煎成調硃砂飛研各服

簡明醫教 卷之四 遺精 圭

下荆公妙香散 安神定心固精

茯苓 茯神各錢 遠志 益智仁 龍骨研各錢 甘草

硃砂飛研各錢 右為末入龍珠研勻每服二錢臨睡溫酒調下

全瓊丹 腎虛精滑心神不安

黃栢鹽炒 知母炒各錢 牡蠣火煎 赤石脂 龍骨研各錢 蓮蕊

芡實 茯苓 遠志 山萸肉各錢 硃砂飛研各錢

右為末山藥末調糊丸桐子大硃衣每服六十九空心酒下

固精丸 扶元益腎秘精

人參 白朮 茯苓 熟地 山藥 瑣陽 牡蠣煨 蛤粉煨 黃栢 知母俱酒炒 杜仲 金櫻子

椿根皮 吳破故紙酒炒各錢 右末蜜九桐子大硃衣每五十九

十全大補湯或補中益氣湯方見 加山萸五味山藥之類治氣

簡便方 泄精 蓮子心為末一錢入硃砂二分空心白湯下

又 嫩烏藥 益智仁 硃砂各壹兩 山藥九早鹽湯下

又 韭子炒研 酒糊丸每二錢鹽湯下或早蓮草焙研末米湯下

遺精盜汗 臥床中側身縮脚唾調五椋子末填臍內帛束壹

便濁 附交腸

經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱又曰脾胃濕熱下流滲入

膀胱故便澀白或赤而渾濁蓋緣思慮過節房慾無度致心腎

氣虛君相不能管攝陰陽不能升降上下乖睽清濁混淆傷氣

簡明醫教 卷之四 便濁 圭

分者曰傷血分者赤又有肥人因濕痰流注稠粘如糊宜燥脾

土弱人因傷精旋白光彩如膏宜益下元少年患者溺時痛似

刀割管口精濁乾凝多緣慾事中阻淫火不泄治宜分利清火

為主亦兼清心調氣白兼補腎培元兩尺脈洪數便濁

主方 便濁 赤茯苓 澤瀉 猪苓 木通 黃栢鹽炒

瞿麥 車前子 淡竹葉 篇蓄各八錢 滑石研細 甘草分

右加燈心汁枝水煎空心服 火盛加梔子條黃芩車前草

分清飲 治赤白濁

益智 川草薺赤 石菖蒲 車前子 赤茯苓 猪苓 澤瀉 白朮 枳殼 陳皮各八錢 升麻 甘草研各錢

右加燈心水酒各半煎空心服首貼加麻黃八錢升麻八錢如
熱甚作痛加炒黃柏錢煎成調青黛七分滑石末錢去枳陳智
不通加木通淡竹葉扁蓄石葦等 變虛寒加炮姜肉桂分
日久服涼藥過多真元耗損腎虛有寒頻數無度光彩如膏
益智草薺萹蒲烏藥茯苓等分水煎入鹽一分空心服

珍珠粉丸 治白濁遺精

黃栢鹽炒 蛤粉各四兩 珍珠五錢 水飛如丸桐子大每瓶
無用真青黛錢燈心湯下

水陸二仙丹 治赤白濁及遺精

芡實肉研 金櫻子去刺 搗絞汁熬膏和芡丸每服二錢空心
白湯下

白龍丸 治白濁滑精

龍骨煨各 鹿角霜兩 為末山藥末調糊九桐子大
五十九空心酒下

妙靈丸 治赤白濁遺精

白茯苓 兔絲子煮 龍骨煨各 益智仁 石蓮肉 桑螵蛸各
五錢

右末山藥末調糊丸桐子大每服五十九空心人參聚仁湯
下白湯亦可

清心蓮子飲 赤濁淋瀝澀痛遺精口苦咽乾渴帶下
淋門

二陳湯方見 肥人濕痰下流加 白朮一錢升麻柴胡各五分
濕痰氣血虛加蒼白朮參歸地黃梔柏牛膝

六味地黃丸方見 瘦人虛熱便濁加芍知麥栢參朮草藤蕭蓄

六一散方見 濁痛 每三錢車前草搗汁調勻灯心湯送下

簡便方 白濁遺精 白鹽入磁瓶蓋瓶通紅 茯苓山藥末各
地上放冷每兩入

棗肉和蜜丸如梧桐子大每服三十九空心棗湯下

又 茯苓兩 猪苓兩 水一碗煮乾去猪用茯苓為末蠟丸彈大
每丸骨細灯心棗湯下 或韭子研末 或陳冬瓜仁研末
朱湯下

○交腸 乃大便出尿小便出糞凡人小腸下口名關門七飛
門之一。由此分別清濁氣不循故道則失其守也

主方 澤瀉 猪苓 茯苓 白朮 黃連

阿膠 滑石各壹錢 官桂 木香磨各五分 加灯心水煎化膠服

簡便方 破襖頭或漆帽燒灰米湯下

便癥附大小便閉

經曰胞移熱於膀胱則癃溺血膀胱不利為癃又曰足三焦者

太陽之別也並太陽之脉入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺

溺蓋腎主水膀胱儲之陰陽升降榮衛流行則水竇開闔有常

若二經氣虛水不制火或容熱乘之致君相不攝陰陽不調熱

閉下焦故水道清察熱微甚用藥寒涼當寒因熱用必伏其所

主而先其所因始則大同終多小異虛而熱乘壯水制火氣虛

補氣血虛補血兼濕痰則滲濕清痰緣氣結則導氣升結數

先宜吐法大吐升提其氣則水自降譬如滴水之器上竅通而

下竅之水出矣又有鬱怒日久水剋脾虛土不制水漬入胞

腫脹急痛水道絕矣漸見毛孔水出者不治婦人多患須初覺

時猛宜健脾疎肝脉多滯數左尺脉實清熱調氣

主方結 黃栢 牛膝 滑石 木通 猪苓

澤瀉 麥門冬 車前子 瞿麥 篇蓄 各八分 甘草稍 各一分

加灯心廿枝水煎空心服 未通加地膚子草薢石蓮子秋

葵子海金沙枳殼 老人氣血虛不通加四物湯黃芩 水煎

清肺飲 肺乏生化之源口渴便閉熱在氣分

猪苓 通草 各五分 赤茯苓 澤瀉 燈心 木通

篇蓄 瞿麥 各七分 水煎成調入真琥珀末 車前末 壹服

坎離丸 不渴而小便閉熱在血分

黃栢 知母 俱鹽炒 肉桂 爲末蜜丸桐子大每百九空

心淡鹽湯下頓足藥行小便利莖中痛以六一散 有惡物下

簡用醫要 卷之四 便秘 三五

助元湯 便閉因氣血兩虛

人參 當歸 生地 赤苓 猪苓 澤瀉

黃栢 知母 牛膝 梔子 枳殼 升麻

茸草 加灯心廿枝水煎空心服

益陽湯 便閉無熱證屬虛寒甚因涼藥過多加附子

肉桂 當歸 赤苓 白朮 枳殼 牛膝

石蓮子 澤瀉 各八分 甘草稍 加姜一片灯心廿枝水煎

五苓散 分理陰陽清利水道通小便止泄瀉

澤瀉 茯苓 白朮 猪苓 肉桂 去各四分散

右爲細末每服二錢空心白湯調下煎服亦可

八正散 實熱便癃或大小便閉 淋門 方見

六味地黃丸 通治前證虛而熱乘頻數遺溺加黃栢知母 方見

老人元虛轉胞脹痛數日困篤欲絕倍澤瀉煎服 方見

全大補湯加黃栢知母扶虛 血虛勞傷 藥中兼探吐 虛損

簡便方 便閉 甘遂末水調填臍內用甘草節煎汁飲

又 秋葵子 赤茯苓 水煎 或牛膝水煎入麝少許服

又 陳皮 秋葵子 五分 葱白 三水煎 或年久 筆頭燒

又 車前草搗汁 入蜜 服 或秦艽 煎服 或吞雞卵

又 武烏白皮煎服 或雄黃末蜜和捻條納溺孔 或杏仁 研服

又 便閉轉胞 無烟梁上掛塵一撮水調服

簡用醫要 卷之四 便秘 三五

法 用猪尿脬底開小孔將鷄毛管線扎緊口用小竹筒扎緊

吹滿氣將鷄毛管塞入小便之口將氣擠入小便即出

或葱 炒鋪臍腹熨 或炒鹽熨 或鹽填臍中灸灸即通

或高莖菜搗貼臍 或蚯蚓泥水調填臍

作婦胞胎壓便閉或因腸曲服補中益氣湯倍升柴 方見 患人

仰臥下體擡高頻擺動更托胎舒腸小便自出

大小便閉 乃大小腸膀胱三經之實熱也多由暴感驚憂

分怒鬱遏之氣無可伸發觸動心肺之火傳於三經卒然氣乘

致大小便閉迫小腹急脹逆上衝心甚則悶絕欲死脉多沉數

主方 大黃 滑石 皂角 右爲末煮酒調作四

服 大便不通加大黃錢 小便不通加滑石錢

丁香散 臟腑實熱大小便不通 兼服八正散方見

苦丁香五分 川烏炮 草烏炮 白芷 皂莢炮 細辛各五分

胡椒分 麝香分 右為末用竹管吹入肛門即通

簡便方 皂莢炙去皮子為末酒糊丸桐子大每三十九酒下

又 木通為末酒下 掩臍法見秘 更以朴硝同蜜湯調下

遺溺附不禁

經曰膀胱不約為遺溺。又曰督脉主病為遺溺。夫人之漩溺藉

心腎二經傳送。蓋心與小腸為表裏。腎與膀胱為表裏。若心腎

氣衰。陽道不固。傳送失度。必成遺溺。不禁之愆。亦有因三焦氣

虛而作者。肺從上焦。通調水道。下輸膀胱。腎上連肺。母子相關。

腎與膀胱虧損。則子能令母虛。肺金水源滲流。膀胱無能藏攝。

尤致斯患。或熱病時過用寒涼藥。或立夏前多服白虎湯。並宜

溫藥升陽。然二證大同小異。遺溺較甚。遺溺者。睡中遺出而不

自知不禁者。時常欲溺而不能制。左尺微瀼。皆宜補腎。陰虛則

主方 人參 黃芪 當歸 白朮 熟地黃

石斛 益智研各 陳皮七 肉桂分 升麻木切 柴胡各

虛老加附子製 姜三片 棗一枚 水煎空心服 體虛加山藥

山萸 棗仁五味 或六味地黃丸合補中益氣湯煎服方見

家韭丸 治少長遺尿不禁白濁夢遺精滑補元進食虛損

鹿茸壹對 韭子炒 肉蓯蓉 兔絲子煎 熟地黃 當歸

牛膝各 杜仲姜炒 巴戟天去 石斛 肉桂 乾姜各壹

右各依法製度除鹿地外共為細末製鹿地法見 入好酒糊

和丸桐子大每服五十九空心鹽湯或酒下

秘元丹 治小便不禁自汗

龍骨另研 靈砂木飛 訶子肉 砂仁各壹

右為細末煮糯米糊和丸桐子大每服五十九空心鹽湯下

縮泉丸 治頻數不禁

益智仁 烏藥天台 等分為末山藥糊丸桐子大每五十九

益血固元陽 治陰虛血少火盛不禁

黃栢 知母俱鹽 當歸 白芍 生地 熟地

天門冬 麥門冬 白朮 梔子炒 益智各壹 姜棗煎

六味地黃丸 久患不愈去澤瀉加益智多合久服見効

簡便方 遺溺不禁 雞胞內黃皮火炙為末男 空心酒下

又 牡蠣入小砂礮上下安鹽瓦蓋 赤石脂研細拌醋煨

右各研極細末等分酒糊丸桐子大每五十九空心鹽湯下

又 茯苓為末同麵煨餅空心米湯下忌 或猪脬燒研酒下

又 小茴香壹錢 川椒七 鹽壹錢 炒研晚開糯食蘸吃溫酒送下

又 猪脬糯米 入椒鹽煮蘸茴香食酒下 或羊脬盛水兩頭

又 鹿角霜為末 酒糊丸酒下 或益智兩半 或烏藥為末酒下

老人夜溺多 白芷壹兩糯米五錢炒黑為末糯糊丸木饅煎湯下
小兒遺尿 肉桂為末雄雞肝搗丸每寸九或煮去後高內草燒研末水調下

淋證

經曰血泄淋閉皆屬於熱蓋諸淋始作當以同類析之小便濁痛不甚白曰白濁赤曰赤濁不痛自出或服養者為滑精不痛下血為溺血不痛脹澁為瘕閉惟小腹脹急痛引臍下小便頻少解時滴瀝澁痛叫喊難忍為淋有五證血石膏勞肉是也血淋火動則發所下皆血石淋如小砂石澁痛難出膏淋邪熱煎稠狀如脂膏勞淋作勞則甚痛引氣衝肉淋成條室塞甚至入呼多方得出隨夜大痛死證不治又氣淋者小便澁數常有餘

簡明醫教 卷之四 淋證

四一

下下而施其消化之令也脉盛實大生虛細瀉死戒發汗

主方 黃柏酒炒 知母酒炒 滑石水飛 木通 梔子

荷蓄 生地黃 當歸 赤茯苓 枳殼 麥門冬

牛膝各壹分 甘草五分 加灯心煎血淋加炒蒲黃茅根 石淋石葦

管淋加川草薺石連子 勞淋加入參 肉林連翹秋葵子

氣淋加青皮 熱淋黃連酒煮大黃 尿淋市前草搗絞汁

死血淋桃仁牡丹皮玄胡索琥珀另研 老人虛淋加入參

黃芪升麻許 去知栝扁滑 久虛補中益氣湯六味地黃丸

五淋散 諸淋初感皆効日久宜滋陰補腎忌瀉腎與膀胱藥

赤茯苓 赤芍藥 梔子各壹錢 木通 澤瀉 生地

車前子 黃芩條 當歸各人 滑石水飛 甘草稍五分 水煎

八正散 治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澁淋瀝不通

大黃 瞿麥 木通 滑石 篇蓄 梔子炒

車前子 甘草稍各 右加灯心枝木煎空心服

海金沙散 五淋一服効

當歸酒洗 大黃酒浸 川牛膝酒洗 木香研 海金沙研 雄黃等分

右為末入香沙雄每服錢半臨睡好酒調下

清心蓮子飲 上盛下虛心火炎上口苦咽乾渴小便濁或淋

石蓮子 人參 黃芪 麥冬 赤苓各壹錢 車前子

簡明醫教 卷之四 淋證

淋證

四二

黃芩 地骨皮 甘草各五分 水煎空心服

二陳湯加香附木通探吐痰出上竅通下竅利初疎通久升提

簡便方 血淋 車前草搗汁飲石淋用汁調軟石膏煨研壹服

石淋 土牛膝煎服入乳香麝香各少許 秋葵子研末米湯下

又 黑豆百粒甘草二寸水煎調滑石末服 或黃魚腦骨煨

血淋 竹茹五錢水煎服 或苦杖根研服 尿血升麻煎服

諸淋 三葉酸漿草搗絞汁盪熱空心服加蜜便閉加沙糖

諸淋痛 六一散許海金沙研 各二錢灯心木通麥冬煎湯入

又 大蘿蔔切一指厚五片蜜二兩浸拌鐵罐上慢火炙蜜盡

痛甚 牛膝煎濃汁飲酒煎亦可 或萱草根搗汁服或茅根煎服

又 赤芍藥宜枚 為末水調空心服 或煎服

不寐

經曰。衛氣者。晝行于陽。夜行于陰。行于陽。不得入于陰。陰虛故目不瞑。蓋陽主動。剛也。陰主靜。閑也。故行于陽。則動而醒。行于陰。則靜而臥。陽光亢上。則氣有餘。又曰。合夜至雞鳴。天之陰。陰中之陰也。氣行于陽而陰不足。則陽愈狂而陰乃格。靜反為動。閤反為闢。神氣散而不守。故不得瞑也。然而又有思慮過極。心陽獨亢者。有心氣耗傷。血不育養者。有神明失養。真陰不升者。有肺受火炎。膈上痰壅者。寸脉浮滑痰火。洪大陰虛陽盛。瀆為血虧。治當養陰抑陽。清痰降火。安神寧心。

簡明書

卷之四 不寐

聖

主方 當歸身 生地黃 黃連 橘紅 半夏

茯神 人參 麥門冬 酸棗仁 栝子仁 炙草

右加龍眼肉竹茹生薑燈心木煎成調辰砂臨睡服

殊砂安神丸 治心虛有熱夜卧不安神氣不寧

黃連兩 甘草兩 生地兩 當歸身各錢 殊砂木飛壹兩

右為細末入殊砂蒸餅糊和丸粟米大殊衣每服壹錢臨睡

溫膽湯 寧神豁痰二陳湯加竹葉石膏湯 天王補心丸傷寒

三消

經曰。二陽結謂之消。又曰。心移熱於肺。傳為膈消也。夫三消者。上焦受病。多飲而少食。小便多利而不禁。甚至舌乾白胎或裂

屬肺。名消渴。亦名膈消。中焦受病。渴而多食。食已即饑。屬胃。名

消中。下焦受病。小便淋濁如膏糊。甚至面色黎黑。形瘦耳焦。屬腎。名腎消。多因脾不輸精於肺。肺乏生化之源。經曰。多食肥。令人內熱。恣食肥甘。炙煨鹹物。及醉飽入房。斷喪傷腎。或大病陰虛。或過勞血耗。所因多種。燥熱則一。宜清心絕慾。戒厚味。斷思慮。靜養生陰。不則腎水不升。心火不降。復變癰毒鼓脹等證者。多矣。脉實疾可治。弦小難痊。洪數陽盛。濡散宜養肺降火 生血滋陰補益腎水。

簡明書

卷之四 三消

聖

主方 當歸 生地 白芍藥 上消加人參麥冬

五味天粉水煎入生藕鮮地黃汁人乳服 中消加石膏知

母甘草滑石寒水石 下消加黃柏知母熟地五味之類

加味白虎湯 治上焦消渴熱甚

石膏壹 知母錢 人參壹 甘草五 黃芩 杏仁

梔子各壹 麥冬貳 五味十五 加粳米一撮水煎服

生津甘露飲 治消中能食而瘦口乾自汗大便結小便數

石膏錢 黃柏 龍胆草 黃芩各壹 黃芪 知母

生地各八 葛根 梔子 當歸 甘草半 天粉各六

升麻門 桃杏仁各十粒去尖研 水煎溫服

加味地黃丸 治腎消小便淋濁等証方見

簡便方 消渴 白芍藥甘草等 水煎服 或烏梅壹 水四

碗煎一碗入蜜壹 砂仁末五 砂鍋慢火熬膏入檀香末

又 大豆五升兩 甘草四兩 水一桶煮至豆熟飲汁食豆

又 繼絲湯隨意飲大効蟬貯埋久愈佳如無絲綿煎湯亦可

又 桑椹汁 牛乳 蘿蔔汁 瓜蒌根汁 淘糯米泔水

又 黃連煎汁 蔗汁 梨汁 麻子煮汁 陳粟米粥隨取飲

又 瓜蒌葛根搗焙研末 雄牛穿鼻橫木燒灰晚籩末 隨取服

皮膚附搔癢

經曰凡十二經絡脈者皮之部也百病之生必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於腸胃也故皮者有分部不與而生大病也又曰

肺主皮毛在臟為肺在體為皮故氣不榮則皮毛焦津液去則

膚明醫散 卷之四 皮膚 四十五

爪枯毛折而斃皮膚索澤即所謂皮膚甲錯皮帶而不清潔也

皮膚枯燥或痛治宜生血滋榮而潤燥脈右寸浮瀉

主方 黃連 黃芩 當歸 生地 麥冬各錢

玄參 柴胡 秦艽 乾葛各錢 白芷六分 升麻

甘草四分 右加生薑三片葱頭一寸水煎熱服取微汗

○搔癢 經曰諸癢為虛蓋肺主氣司皮毛肺氣不通閉固鬱

熱生風宜清熱疎風涼血散鬱服防風通聖散蓋出微汗無汗

姜葱紫蘇湯助虛人中氣不足衛虛作癢補中益氣湯加防

主方 玄參 升麻 白芷各壹錢 蟬退 防風

黃芪 川芎各七分 甘草四分 右加葱白一寸水煎服

胡麻散 治風邪挾熱搔癢及癩疹等証

草胡麻兩 苦參 荆芥 何首烏 威靈仙 防風

石菖蒲 牛蒡子 白蒺藜 蔓荊子 菊花各壹錢 甘草五分

右為細末每服二錢薄荷湯或茶湯調下水丸服亦可

簡便方 薄荷葉 蟬退等 為末每服二錢酒下

浴方 乾荷葉藥本甘松白芷霞仙蒼耳草金銀花藤煎湯人 煨鹽壹撮

癩疹附班月

經曰風痺癩疹乃風氣挾熱鬱於腠理無從發散起於皮膚不

紅不腫惟有顆粒高起而作癢者風痺也畧有形迹見於皮膚

者癩疹也皆風熱所成或因新浴湊風及汗出脫解而得或挾

暑濕久而不退亦變瘡瘍如風熱甚者防風通聖散脈多浮數

主方 羌活 前胡各壹錢 防風 天麻 蟬退

薄荷 川芎各七分 荆芥 連翹 梔子各六分 水煎服

消風散 治諸風癩疹方見 未効於風火二門採方治之

○斑丹 斑丹火毒皆熱邪積久鬱於皮膚輕為細斑重為丹

毒如錦紋赤色便秘心煩風熱搏於榮血而成自內出遊四肢

易治四肢走入心腹難治甚者排針刺出惡血否則肌肉糜爛

上方 防風 玄參 黃芩 梔子 生地黃

芍藥 牛蒡子 連翹各壹錢 枳殼 荆芥各七分 右水煎服

防風通聖散 治丹毒方見 白虎湯 丹毒渴甚方見

簡便方 寒水石 滑石 黃柏等 青黛減 芭蕉或冬青葉汁

又 大黃末朴硝同研水調敷 又 赤小豆為末雞子清調

又 慎火草俗名火丹草 搗敷 又 灶心土錢 淡豆豉末五分 麻油

又 木鱉子煎油敷最效方見勿利 與外科丹毒參看

傷損附金瘡 杖瘡 湯火

經曰有所墜墮惡血留內腹中脹滿不得前後先飲利藥導之

如落馬跌磕從高墜墮打撲傷損閃胸挫折杖瘡腫焮大痛不

破損出血先宜主方行去瘀血若金刃傷皮破血出過多但宜

活血和血止痛次兼調氣養血補益胃氣切忌大行血之藥○

跌撲損傷骨折出臼急用白礬衝湯布蘸熨傷處痛止即時

申醫發

卷之四 傷損

四七

一理稍遲則肉腫血凝痛甚矣切須仔細辨認曲直或宜輕手

揣摩揉捺更要相度左右骨宜正宜斜交接平正看骨縫形勢

捺歸曰或宜數人重手扳捺端正當近本骨平復用苧繩扎或

杉木板片榜三五日淋洗換藥切勿見風不救如手臂骨出向

左右扳向左右扳如腦骨碎剪去髮輕手搓揉平正不厥用烏

龍散敷圍破者風流散填塗外用油紙或綿紙包凡入骨後用

烏龍散圍腫處留破處用風流散填凡無藥處但挑開口解小

主方 大黃 枳殼各錢 當歸尾 厚朴 陳皮

甘草和 紅花 蘇木 木通各錢 水鍾半煎數沸濾服

不通加苾硝錢已通去大黃瘀血不下加桃仁肉桂黑丑劉

奇奴土牛膝之類 輕者無瘀血及去血多或老幼減黃殼

蘇硝等加玄胡索赤芍丹皮澤蘭骨碎補之類 定痛以真

乳香沒藥研細調入藥服 次兼歸芎白芷木香之類 弱

人加參芪 切忌生冷草藥 飲酒無灰者食牛肉痛甚

烏龍散 跌撲骨碎出臼先煎葱湯洗整骨端正用軟絹或皮

紙攤貼外木片縛齒獸傷亦貼留破口以風流散塗

川山甲炒 丁皮無真者用丁香各六兩 土當歸即土獨百草霜另

枇杷葉去毛各五錢 右為細末姜汁水或生地黃汁同姜汁調貼

風流散 治損傷皮肉血出不止及破腦傷風用藥填敷

血竭錢 乳香同研 沒藥各五錢 降香節四錢 歸尾錢 龍骨五錢

申醫發 卷之四 傷損 四八

紅花各錢 蘇木錢 燈心把 右各為細末和勻每用少許乾

搽傷處血不止多搽血藥乾結外用清油調塗

淋洗方 傷重用此煎洗然後上藥

荊芥穗 土當歸各錢 大蔥數株同生姜搗爛煎湯熱洗患處

小紅丸 皮破骨出筋斷損後傷肢節攣縮多服養筋骨氣血

骨碎補姜 土當歸 川烏炮 楊白皮 芍藥各六錢 川芎

蓬朮各錢 肉桂 細辛各四錢 乾姜炮 丁香各錢 續斷錢

附子各錢 乳香研 沒藥研 為末醋糊丸每丸九酒下

簡便方 墜打痛腫 歸尾 大黃等分 為末每三錢酒下

又 大黃杏仁當歸赤芍川芎酒煎服以菘豆粉炒酒醋調敷

又 立止痛無痕 沙糖葱白搗敷板縛 或半夏末水調敷

又 白蔞藜或益母草或沒藥為末酒下 瘀血老茄種為末酒下

惡血攻心 乾荷葉燒灰三錢酒下日三服 無藥只飲酒於血亦

下外葱搗炒敷熨手或小粉炒黑葱汁醋調敷或葱蜜搗

骨斷 白芨末錢酒下即續外用骨碎補為末黃米粥調敷

跌打傷 沒藥種木錢酒下或胡桃肉酒下外麥麩熱酒醋和敷

又 姜汁四兩香油四兩順攪勻以無灰酒熱調下飲至醉

○金瘡 一切刀斧所傷也

主方 黃柏 黃芩 當歸 赤芍藥 黃連

黃芪 牡丹皮 地骨皮 生地黃 桑皮各錢 甘草

簡明醫說 卷之四 金瘡 四九

白芷 馬藜用菜燒過 木鱉子去殼筋斷 加杜仲錢

右用桐油煎藥焦濾去渣油仍入鍋燒熱下白嫩松香兩

黃蠟兩慢火煎頻用柳條攪勻傾水內扯白另研乳香沒藥

末黃丹各七錢手探和膏內入鉢水養蓋好七日換水凡

刀斧傷量大小取膏填傷孔中白紙護之疼止一日一換五

日生肌收口加龍骨末五分入膏損傷只用油紙攤貼

止血散 刀斧傷出血不止 或加石灰風定粉 去無各

龍骨錢 無名異錢 乳香 沒藥各錢 五倍子兩 生半兩

白礬兩 各研細和勻搽傷處不作膿不怕風定痛生肌

長肌散 治金瘡止血定痛生肉收口 內以本婦灰酒服

乳香 沒藥 三七 象皮 龍骨 飛丹

兒茶 軟石膏飛 各研極細等分和勻搽

簡便方 出箭頭 花蓋石七 研細撒傷處四圍箭頭自出

一檢金 金櫻葉嫩芋頭各錢 桑葉兩搗敷或閉日研末備用

刀斧傷 降真香五倍子銅末等分研勻敷

又 桑葉炕乾為末更搗汁調敷 桑汁調石灰亦可

又 石灰入臘月牛膽陰乾研敷 頭碎亦効或石灰飛麵敷

又 夏枯草嚼爛敷 或白芨末 或雞肫內黃皮焙研敷

血不止 三七嚼 花蓋石研 五倍子研 野苧葉搗隨用

湯未透膜 乳香沒藥各錢 研細以小便熱酒各半 調服外用敷藥

簡明醫說 卷之四 杖傷 五十

傷重氣存 葱白搗炒熱遍敷傷處冷則再換痛止

止痛 劉寄奴為末糯米湯調敷 凡傷處急用炒鹽搽不爛

○杖瘡 飲童便或眾人尿則血不攻心切忌房室犯之難斂

主方 歸尾 赤芍 生地 白芷 防風

荆芥 羌活 連翹 黃連 黃芩 黃柏

梔子 枳殼 車前子 甘草分 水煎服

潤肌湯 治杖瘡日久不斂

人參 白朮 茯苓 當歸 白芍 熟地

香附 陳皮 貝母 白芷各人 甘草分 木煎服

寒熱加柴胡骨皮 口乾麥冬五味 膿清黃芪 欵遲肉桂

又 將狗後脚提起涎出飲少許 或胡荽翠搗拌醋連查蘸
又 霜梅肉搗指大綿裹冷茶下扯住線頭嘔出

麥芒梗 鷺倒提口涎飲消 篾刺 爛竹籬棍急流水煎飲
錢梗 生芙蓉搗汁飲 或葶薺汁 或艾汁或百部四兩煎酒吹効

錢金銀物 胡粉膏搗硝石少許作二服在腹中服此亦消
又 取雞黃晒令萎黃煮熟勿切食一大束即下

又 誤吞針 磁器一塊呵之即出 又多食猪羊肥肉高汁自出
一兒誤吞鈎鈎刺喉得鈎線在外用數珠子穿線上逐個送入
喉中以珠抵鈎頂脫其尖一掣而鈎上出巧法也

一吞錢哽喉以白紙卷實如筋以刀橫亂割其端作鬚鬆狀別
簡用醫教 卷之四 骨物類 五三

取一筋縛針鈎於端令不可脫先下咽輕提輕抑覺鈎入錢
眼次以紙捲納之咽中與鈎尖相抵一掣而出

五絕 自縊溺水壓墜鬼魔產死氣已絕皆可救甦及諸暴絕並以七
夏末或皂莢末捻入鼻取嚏或葱韭白心刺入鼻數寸插人中
提頂髮及大指甲下離一韭葉許各灸數壯更灸臍下

○自縊 急抱起緩解下切勿割斷繩用手裏衣抵住糞門婦
人并塞陰戶氣泄不救放下安臥一人以脚踏兩肩手緊挽其
髮勿縱一人搓正頸喉摩動胸腹一人將臂腿徐屈伸之四人

各執蘆管吹耳鼻更掩其口待眼開氣舒即以姜湯粥飲灌之諸經心下溫者可生

○溺水 撈救得合覆安大椗上垂其頭腹下仰卧活人或覆
牛背上刀幹開口橫放筋一隻令水出脚高起數寸用皂莢末
綿裹塞糞門內以鹽擦臍中水出盡取燥壁土杵細鋪地上溺
人仰卧埋其身以艾灸臍中○冬月急換煖衣用灶內無火熱
灰埋蓋其身四人吹耳鼻姜汁灌

○墜壓 磚木石壓從高墜下氣絕者幹開口令人撒尿口內
得嚙即生取淡豆豉數兩水酒煎服血攻心乾荷葉燒灰童便
調下三錢日三服或熱好酒灌將連根韭搗炒縛傷處熨手熨火

○魔寐 不宜上前叫喚但痛咬脚跟足拇指多唾其面有燈
則存無燈勿點半夏皂莢末吹鼻取向東桃柳枝煎湯灌或灶
簡用醫教 卷之四 五絕

心土研二錢井水下次用蘆管吹耳鼻
○鬼擊 客忤等一切卒死用菖蒲根或韭冬用根搗汁灌口鼻
中或乾菖蒲研末吹鼻水調下更取井底泥塗身目令人垂頭

井中喚姓名或腹痛如刀刺艾煮汁灌吐蟲物灸足大指甲後十四壯
○凍死 急換活人煖衣用大宋或灶灰炒熱囊熨心上冷再
換熱酒姜湯粥湯頻灌以氈單或草薦裹緊二人輕手滾捍肢
溫即活切勿見火蘇合香九姜湯酒調灌妙

○中熱 移陰處熱土堆臍眾人尿熱土同大蒜研水灌詳見暑門
○胎產 血運揀療極宜肅靜諠叫則死詳見產後

新刊簡明醫教卷之四

新刊簡明醫教卷之五

武林白石孫志宏克容氏編輯

當湖爾可崔 遠廓然子訂梓

頭痛

附頭風 眉稜痛

難經曰。手三陽之脈。受風寒伏留不去。則厥頭痛。蓋厥者。逆也。逆。逆而衝其頭。故作痛。如痛引腦。陷於泥。九宮者。名真頭痛。手足厥冷至節。且發夕。非藥可治。夫頭痛之證。內成者。因氣血痰飲。七情抑鬱。外感者。因風寒暑濕。諸邪致傷。然屬風火居多。以人之頂。惟風火二氣。易升故也。矧面為五臟精華。頭為六陽會首。宜疎風散邪。兼清火養血。此其大略也。尤當分別六經。

卷之五

頭痛

及氣血寒熱。濕痰新久為要。凡太陽顛頂痛連額項。惡風。陽明頭目痛連齒頰。身熱。少陽頭角偏痛連耳。寒熱往來。太陰體重。有痰腹滿。少陰足寒氣逆為厥。厥頭痛。厥陰頂痛厥冷。或吐痰沫。有頭痛耳鳴。九竅不利。氣虛也。眼目昏花。晝寧夜劇。血虛也。痛而多痰。頭目眩運。痰厥也。痛而心煩體麻。足熱濕熱也。有犯大寒內至骨髓。髓以腦為主。腦逆為痛。寒也。目煩浮腫。躁熱大痛。熱也。新發為實。經年為虛。如頭痛惡寒。身熱屬傷寒。從本門治。又頭風之證。偏正皆屬風熱。伏留。男子逆風。露宿。婦人頭不包裹者。多患此。日久不愈。邪乘空竅。乃致喪明。偏左屬風。及血虛。偏右屬痰。與氣虛。治療方法。頭痛同類。經曰。寸口脈中手短者。

頭痛。脈經曰。陽弦頭痛。凡寸口緊急。或短或浮或弦。皆為頭痛。脈浮滑風痰易治。短濇難痊。

方 川芎 宜錢五分 羌活 白芷 防風 藜本 各壹錢

升麻 細辛 甘草 各分 加細茶一撮。葱頭三個。水二

鍾煎時。以被覆頭。通連藥。確口。令熱氣薰頭。痛處汗出。煎

至八分。熱服。再煎再煎。服完厚包頭臥。汗出痛止。顛頂痛

倍藥本加酒炒升麻柴胡 火加酒茶 痰加橘半 冬加

麻黃 夏加石膏 太陽倍羌活加蒼木惡風寒麻黃獨活

陽明倍白芷升麻自汗發熱惡寒葛根石膏 少陽加柴胡

酒茶 太陰加半夏蒼木南星脈沉理中湯 門 少陰倍細

辛厥冷。脈沉細。麻黃附子細辛湯為主。 方見傷寒 厥陰連項痛

欲入太陽亦倍羌蒼厥冷。脈沉緩。吳茱萸湯。 方見傷寒 氣虛人參

黃芪 血虛當歸川芎 兩虛調中益氣湯。 方見傷寒 加川芎蔓

荆細辛神効 痰厥半夏白朮天麻湯 因濕可吐濕熱空

清膏 有宿痰先以川芎茶調散吐之。再服川芎薄荷辛涼

之藥 犯大寒厥頭痛羌活附子湯 火極大痛使閉大承

氣下 大黃酒煮 肥人二陳加蒼白朮 瘦人四物酒茶。 方見傷寒

風 勞苦及下虛人痛甚。此相火自下衝上。補中益氣湯。 方見傷寒

虛加芎歸甚者。知柏蔓荆細辛 頭面壅腫。有熱涼膈散。 方見傷寒

去硝黃加桔梗荆芥薄荷風熱上攻。天麻蔓荆台芎酒茶。 方見傷寒

羌活附子湯 治冬月犯寒及風邪入腦痛甚連齒亦名腦風

麻黃 附子 炮 防風 白芷 蠶蠶 羌活

木香 佛耳草 黃耆 甘草 升麻 水煎服

川芎茶調散 治諸風上攻偏正頭風頭痛鼻塞聲重

薄荷葉 川芎 荆芥 防風 白芷 羌活

甘草 細辛 右為細末每服貳錢食後茶湯調下

如聖餅 治風寒伏留陽經痰飲氣逆頭痛

防風 半夏 天麻 南星 川烏 炮 川芎

乾姜 甘草 右末蒸餅糊和作餅 芥木嚼細茶湯下

九仙丹 男婦入般頭風一切頭痛

簡明醫說 卷之五

川烏 炮 石膏 白芷 川芎 草烏 南星

半夏 細辛 全蝎 右末非汁九桐子大 九茶下

空清膏 偏正頭痛久不愈及風熱日痛腦疼等證

羌活 防風 黃連 甘草 柴胡 川芎

枯本 右末每三錢茶清調如膏抹口內臨臥白湯下

頭痛甚加細辛三錢 痰厥痛加半夏偏頭痛倍羌防芎

上清散 頭痛連眉骨眼痛不可忍

川芎 鬱金 芍藥 荆芥 匹硝 乳香

沒藥 薄荷 水片 右為細末每用三分搐鼻內

半朮天麻湯 痰厥頭痛欲裂眼昏運惡心如風雲

橘紅 半夏 麥芽 白朮 神麩 芥木

人參 黃芪 天麻 茯苓 澤瀉 乾姜

黃柏 右加生薑三片水煎一服安

簡便方 决明子為末水調貼太陽穴或作枕

新沐感風 川芎 天麻 為末蜜和嚼茶下

風吹項背腦痛婦人胎產頭痛 白芷泡研末蜜和細嚼茶下

風熱頭痛 川芎白芷石膏 每四錢茶下

止痛 大南星川芎 為末連鬚葱白搗餅貼太陽痛處

痰厥痛 烏梅 鹽 水煎服吐痰愈 卒痛 蠶蠶末

諸頭痛 蒼耳川芎當歸等分為末每服三錢臨臥茶下

簡明醫說 卷之五

冷痛 艾葉揉軟用帛夾包痛處以熨斗火熨煖熱痛止

熱痛 大黃末朴硝等分研勻井底泥和作餅貼太陽及痛處

痛不可忍 玄胡索 猪牙皂角 為末水調敷分令

患人臥竹管送入男左女右鼻中藥至喉小酸坐起門牙

○眉稜痛 屬風熱與痰痛連頭額作風痰治素多怒者疎肝

火理風痰見光明痛甚屬肝虛目不能開晝靜夜劇導痰

主方 羌活 防風 川芎 酒岑 白芷

荆芥 薄荷 細辛 升麻 甘草 葱茶煎服

濕痰蒼白朮二陳南星 火加梔子連翹 多怒柴胡膽草

血虛當歸生地赤芍 肝虛阿膠橘葉 風寒川草烏

項強

經曰諸頸項強皆屬於溼蓋頸項強直不能回顧不得轉動者乃風溼之邪干於足太陽經或痰熱客於經絡或致微痛脈數而實右手為甚治宜驅風散邪利氣舒筋有痰熱寒溼相干者隨證治之

主方 陳皮 半夏 茯苓 木瓜 羌活

酒苓 紅花 甘草 各伍分

右水煎服 兼有外邪加烏藥蒼朮 甚者加乳香沒藥

治項強 鮮木瓜一個取蓋去穢入乳香沒藥末各五錢扎定

飯上蒸多次研成膏每服五錢地黃汁和酒下 或乾者酒煮 搗入乳沒服

簡明醫發 卷之五 項強 五

身體痛

夫周身骨節之痛種種不同有溼鬱周身作痛者有食滯而身痛者有痰凝經絡作塊而痛者有諸骨節疼痛或寒或熱者有汗酒溼熱鬱滯而痛至於臂項腫疼發熱嘔吐上焦不能清利者皆日常醞釀致生痰涎飲沫隨氣上行浮壅於肺咳嗽發動稠濃者為痰留聚於脾溢流口角不禁者為涎停積於胃嘔吐出清稀者為飲飲脈多沉濡而弦痰脈多浮大而滑鬱滯脈多沉伏痛甚脈沉而緊治宜散鬱行氣滲溼疎風清痰去熱痛止之後調補氣血

主方 蒼朮 羌活 酒苓 秦艽 威靈仙

當歸 防風 姜黃 甘草 水煎服未安服後方

當歸拈痛湯 治風寒溼三氣雜至合而為痺遍身走注肩臂

背腰腿膝周身作痛甚者及風溼諸證脛足水溼膿瘡潰爛

蒼朮 白朮 酒苓 羌活 猪苓 澤瀉

當歸 茵陳 知母 人參 苦參 升麻

葛根 防風 炙草 水煎 上痛食後服 痛甚加乳香

上身痛倍升麻下身痛加牛膝腿足加木瓜苡仁臂痛桂枝

威靈仙丸 治溼痰風痛

威靈仙 桂枝 羌活 南星 黃柏 蒼朮 神麴 川芎 防已 白芷 桃仁 紅花

簡明醫發 卷之五 六

龍膽草 右為末神麴糊丸如桐子大每百丸白湯下

舒筋散 治風溼血刺身體疼痛四肢拘攣

當歸 玄胡索 辣桂 各等分為末每二錢酒下

痰滯二陳湯加肉桂 勞倦身疼十全大補湯加陳皮半夏

清痰寧痛丸 治酒客多飲致痰涎飲積致痛兼服拈痛湯効

橘紅 茯苓 半夏 貝母 天麻 白朮

膽星 白附子 瓜蒌仁 酒苓 右共為末水法丸菜

豆大每服二錢白湯下 竹瀝姜汁為丸尤妙 痰飲 稀

肩臂痛

經曰寒氣客於背俞之脈則血脈泣血虛則痛其

俞注於心。故相引而痛。按之則熱氣至。熱氣至則痛止矣。若背
脹而痛。搥打稍愈者。乃痰滯氣凝。故搥散而行之。少愈。背痛連
腰脊者。皆屬太陽經之風寒也。脉有促而急者。有弦緊者。左候
左右候右肩背痛。治當散風瀉火行氣。左屬血與風。右屬氣與痰。

主方 羌活 獨活 各壹錢 藜蘆 防風 甘草 各伍分

川芎 荆芥 各壹錢 姜 壹錢 葱 壹錢 水煎服。火加酒連。 虛加入參。

蒼朮復煎散 風濕合作腦後痛惡寒頸項脊筋骨痛。強痛腿膝酸痛。

蒼朮 羌活 各壹錢 白朮 澤瀉 升麻 柴胡

藜蘆 黃柏 紅花 各伍分 另煎蒼朮汁 煎藥再煎如

烏藥順氣散 治肩背痛。方見中風。

簡明醫教 卷之五 肩臂痛 七

凡周身腿膝臂膊等處痛甚者。用綿絮包煖。以火烘令極熱。

微汗出痛可止。或以姜葱湯淋洗。或用姜葱熨法。法見傷寒內以。

乳香研細充熱酒服尤佳

心痛 附膈中痛

經曰。真心痛者。寒邪傷其君主。手足甲青。至節甚。則旦發夕死。
厥心痛者。乃寒邪客於心胞絡也。蓋諸心痛證。皆少陰厥陰之
氣上衝也。有熱厥心痛者。身熱足寒。痛甚則煩躁而吐。額上汗
出。脉浮洪大。有火實心痛者。因氣而食。卒然發痛。大便燥秘。小
便短赤。久則注悶。心胸高起。口渴思冷。飲按之愈痛。時作時止。
不能飲食。多屬久病。急宜下之。服寧痛湯。有寒厥心痛者。手足

厥逆。身冷汗出。便溺清長。大便利而不渴。氣微力弱。急宜溫之。
服木附湯。方見寒門。凡寒痛者。綿綿無增減。喜手按。近溫暖。飲熱姜
湯。則痛少安。多屬新感。有悲怒憂鬱。飲食勞役。或生冷厚味。不
能消散。結而為積。過食還發。名積心痛。及其臟寒吐蛔。亦致心
痛。謂九種者。曰飲食風冷。熱悸虫注。曰去來痛是也。世之心痛。
皆胃脘痛。胃受病不運行。雖多日不食。亦不死。痛初止便食。必
復痛甚。脉短而數。痛甚則伏。沉細而遲者。生浮大弦長者。死。病
人喜熱湯暖氣。宜熱藥。如口渴喜冷飲。宜涼藥。

主方 蒼朮 陳皮 香附 撫芎 玄胡索

五靈脂 各壹錢 甘草 伍分 草薹 研細 水煎服 傷肉食加山查麩

簡明醫教 卷之五 八

食神麩穀味麥芽水果草果 有塊加三稜蓬木 如吃熱

姜湯炒鹽熨痛減。加良姜乾姜 炮 官桂藿香木香砂仁

清火寧痛湯 治心胃痛甚不可忍者。口渴思飲。大便不通。忍

大痛或暫止。胸膈間。如有塊築塞。升上手按愈痛。此因怒氣

鬱悶。成火致痛。婦人多患之。必以大便通利方止。經曰。痛隨

利減。脹以利寬。

梔子 姜炒 黃連 吳萸 枳實 厚朴 檳榔 各壹錢 五靈脂

蓬朮 玄胡索 大黃 各壹錢 木香 另研 甘草 伍分 右水煎服

未通去小香甘草倍大黃。以大便通為度。實人或再加黃芩

赤芍藥金鈴子沒藥草果荔枝核 煎成入芒硝 壹錢

枳實大黃湯 治大痛大便不通口渴等證

枳實 大黃 檳榔 厚朴各錢 木香另研 水煎溫服

加味七氣湯 治七情或風溼致痛

半夏製壹錢 肉桂 玄胡各錢 人參分 乳香各

非草分 加姜一片棗一枚水煎服

落蓋湯 治急心痛

陳皮 香附 良姜 吳茱萸 石菖蒲各壹錢

煎成先以香油五點入盞內調勻服

却痛散 治冷痛

川烏炮貳錢 肉桂 石菖蒲 當歸 木香 胡椒各錢

簡明醫教 卷之五

靈脂 蒲黃各壹錢 水煎入鹽醋少許服

行血定痛丸 治素喜食熱物死血留於胃痛

玄胡兩 滑石 紅花 官桂 紅麴各伍錢 桃仁粉

右為末蒸餅糊丸每服四十九丸姜湯下

白木半夏丸 治氣血痰熱心痛

白木伍錢 半夏 砂仁 白芍 當歸各錢 桃仁

黃連 神麴炒 陳皮各貳錢 吳茱萸半錢 僵蠶 甘草各壹錢

右為末蒸餅糊和丸每服五十九丸姜湯下

木附湯 寒痛客忤屍注蘇合香丸見中集

簡便方治心 梔子炒 乾姜炒 等分為末水法丸每服五丸姜湯下

又方治火 梔子炒 煎服或為末姜湯調粥糊丸白湯下亦可

又方治熱 梔子川芎煎服或梔子合二陳湯加蒼朮服

凡服梔子藥愈後復發者仍用梔子另入玄明粉 煎服

又 熱痛大便不通服三花神佑丸方見

又方治冷 良姜官桂各壹錢 又 玄胡索胡椒各壹錢

又方治婦人 玄胡索為末每服二錢酒湯任下或桃仁去皮尖

又方治蟲 面上白班唇紅痛後能食上半月頭向上易治先用

肉汁或蜜引蟲頭向上服取蟲丸安蟲散方見

又 練樹根皮煎服加烏梅川椒尤好 又 白熟艾壹錢 煎服或明礬石榴皮末

諸心痛 玄胡索壹錢 炙草貳錢 水煎分三服或明礬石榴皮末

簡明醫教 卷之五

又 灶心土末一錢冷痛酒下 又 東引桃枝酒煎服

又 檳榔二錢陳皮一兩為末每二錢蜜湯送下

又 桃仁七枚研水調服 又 嫩槐枝水煎服

又 萱草根一寸醋磨服 又 枯礬蜜調服

又 久痛小蒜醋煮頭服

○膈中兩乳 痛屬憂思久耗心血遇憂即發

主方 當歸半錢 白芍壹錢 棗仁 丹參各壹錢 陳皮壹錢

貝母 茯苓各貳錢 甘草分 脉數加酒炒黃連一錢

脾痛

經曰心痛脾疼陰寒之設凡病胸膈心腹疼痛動輒飲食勞倦

七情致傷。則脾氣為之鬱滯。或犯寒暑溼熱。及食積痰氣。脾受之而作痛。非心痛也。

主方 木香 丁香 檀香 香附 烏藥

莖木 官桂 片薑 乾薑 白豆蔻 砂仁

炙草等分 右為末每服二錢紫蘇湯調下

化食丸 治飲啖生冷水果油膩難化之物。留積胃脘作痛

厚朴 草果 砂仁 山查 麥芽 神麩

乾姜 陳皮 良姜等分 炙草等分

右為末每服二錢空心熱淡鹽湯送下

胃苓湯方見 治脾虛積黃而痛如內傷不食而痛。補中益氣湯方見

簡明醫發 卷之五 十一

方見 虛損加草豆蔻 熱加梔子實熱痛枳實大黃湯方見

大安丸方見 治胃不和食不化脹痛或以本方煎服

簡便方治脾 用烏藥陳皮紫蘇煎服

又 吳茱萸等分 桃仁等分 和炒冷菜莖焦去莖用桃仁研末分

三服用葱白三莖煨熟煮酒調下

又 良姜為末 米湯下 又 生姜川椒丁香研鹽湯下

又 川椒二十五粒漿水浸一宿鹽湯送下

胃脘痛

經曰木鬱之發。民病胃脘當心而痛。夫胃為脾之腑陽先於陰。故臟未病而腑先病也。甚而致於脇下如刀刺之痛。已連及於

臟矣。胃之下口。名曰賁門。與心相連。俗謂心痛。雖曰五運脈復

之氣。未有不由清痰食積。鬱於中宮。七情九氣。觸於內腑而成

者。致病之由。多因縱恣口腹。喜好辛辣熱辣。煎燻酒腥。生冷滯

滯。朝傷暮損。日積月深。痰積血液。妨碍升降。故酸噯嘈雜嘔噦

噎膈。翻胃之漸也。寸口脈沉而遲。關上小緊而數。初治暫用辛

溫疎散。後當養正。兼以除邪。

主方 氣鬱 痰火 撫芎 乾姜 炮 蒼木 梔子姜炒 陳皮

半夏姜製 茯苓各壹錢 草豆蔻研 甘草各伍分 生姜伍片 木煎正痛

時服 痛止半日。方可飲食。即食復作痛。寒痛去梔加木香

砂仁 痛不止加靈脂玄胡 痛甚加乳香沒藥

簡明醫發 卷之五 十二

草豆蔻丸 治客寒犯胃作痛及心脾胞絡諸痛或產後諸痛

草豆蔻麩包煨去皮 益智 陳皮 礪礪 延胡索

黃芪 吳茱萸各別 甘草各別 炙草 當歸 青皮

神麩 姜黃各別 澤瀉壹錢小 便 桃仁壹個去皮

柴胡肆分詳脇 半夏製肆分

右除桃仁另研餘為末蒸餅糊丸。菴豆大每服三十九空心

白湯送下 熱厥痛金鈴子散 大實痛三花神祐丸方見

腹痛舟較腸沙

帝曰願聞人之五臟卒痛。何氣使然。岐伯對曰經脈流行不止。環周不休。寒氣入經而稽遲。泣而不行。客於脈外則血少。客於

脈中則氣不通故卒然而痛。夫腹痛之證，多因勞役過甚，飲食失節，中氣不足，寒氣乘虛而客之，故卒然而作大痛。經曰：得氣則止。哭者，以熱治寒。治之正也。然腹痛有分，臟位有高下。感受不同，為病非一。故痛有九種。曰：寒熱食血溼痰出虛實是也。凡痛綿綿無減，增以熱手暖氣按之，飲熱姜湯之類，得暫止。脈沉遲者，虛寒也。時痛時止，腹滿堅實，按之愈痛，口渴大便便秘，脈洪數者，實熱也。痛甚欲大便，利後痛減，脈沉實者，食積也。痛有常處而不動移，從心下至腹，遍滿而痛，若小便利，宜通小便。若小便利者，屬蓄血。脈濇者，瘀血或死血也。居處卑溼，多飲停蓄為涎，肥人氣虛，脾溼生痰，小便不利，或得辛辣熱湯少可。

簡明醫說 卷之五 腹痛

十三

脈滿滑者，溼痰也。痛定能食，時作時止，面白唇紅，或肚上青筋腫聚，往來無休止，嘔吐清水，脈乍大乍小者，蟲也。

主方 蒼朮 香附 撫芎 茯苓 白芍

陳皮 厚朴 神麴 半夏 枳實 甘草

右室姜三片水煎服 寒痛加良姜乾姜 炮肉桂藿香木香 砂仁吳萸厚朴 不止加玄胡茴香 甚者加乳香沒藥各五分 研細調入服 寒極手足冷加附子去良姜吳萸 甚則用理中湯之類 寒門熱痛加梔子 滑石黃連 白芍 煨 不止加玄胡 甚者加木香砂仁茴香乳香從治 食痛加厚朴山查麥芽木香砂仁官桂乾姜 溼痛小便不利加

苓澤瀉 痰痛加南星 痛甚防乾霍亂戒米湯一口即死

活血湯 治瘀血作痛

烏藥 赤芍藥 當歸尾 桃仁 牡丹皮 玄胡

枳殼 撫芎 紅花 官桂 木香 加姜煎服

桂枝大黃湯 治腹滿痛躁渴經曰痛隨利減脹以利寬

白芍 桂枝 生薑 甘草 大黃 姜棗煎服

芍甘湯 治諸腹痛効

白芍 甘草 右加生薑五片水煎服 熱痛加黃芩

草薺湯 治臍腹虛寒疼痛

澤瀉 木香 神麴 半夏 枳實 草豆蔻

簡明醫說 卷之五 十四

黃芪 益智仁 甘草 陳皮 川歸

茯苓 右咀加生薑三片黑棗一枚水煎服

厚朴 溫中湯 治胃虛腹滿疼痛

厚朴 陳皮 茯苓 草豆蔻 木香 甘草

乾姜 右咀水盞半姜五片煎八分不拘時熱服

黃芩芍藥湯 治腹痛脈洪大口渴因火者

黃芩 芍藥 甘草 右剉加生薑水煎服

溫經湯 治虛寒腹痛

良姜 香附 陳皮 厚朴 當歸 茴香

益智 砂仁 木香 官桂 玄胡 水煎服

枳梅湯 治蟲痛

枳實 香附 木香 砂仁 厚朴

乾姜 肉桂 川練子 練根皮等分 甘草半 川椒粒

烏梅個 右姜一片水煎服未止加黃連

承氣湯方見 加枳榔木香治寶熱痛

簡便方治諸腹痛 小麥稗燒灰去火毒將麻布包煮汁服立止

又方 白沙糖壹兩 酒三椀煮服 又 葛蒲根試寸 吳萸同煎

又 官桂一兩水二椀煎八分服未止再服無桂用生姜

又 木瓜三片桑葉七片大棗三枚水煎服或胡散升一椀 熱酒服川椒亦可

又方熱 梔子十四枚豆豉七合水二大碗先煮豆豉至碗半絞

簡明醫說 卷之五 十五

去查內梔子煎至八分去查分二服 或明礬末淡湯泡服

○絞腸沙 由外感內傷痛極欲死先用鹽兩 百沸湯冷水一

椀調化令飲盡得吐瀉痛止陰沙手足冷身有紅點油燈火燒

陽沙肢溫針刺十指爪甲邊出血蘸溫水重搭膝腕有紫點針刺出血安

脇痛

經曰肝病兩脇痛引少腹善怒何謂也曰厥陰肝經之脈自足

而上環陰器抵少腹又上貫肝膈布脇肋故兩脇下痛引少腹

蓋脇痛之證當分左右治之左屬肝主血有瘀血為病右屬肺

主氣有滯氣為病而脾亦係於右其經溼勝故痰飲流注右膝

作痛所以通論則左屬肝火瘀血右屬氣鬱溼痰雖然若左右

肝者乃鬱怒動肝火肝木熾盛則制已所勝之經脾也侮所

不勝之經肺也肝木乘之右亦痛矣如七情氣結飲食火節冷

熱不調常有鬱怒者兩脇俱痛皆宜疎肝木為主或有溼痰流

注顛仆傷形所挾之證不可執一脈沉澹氣滯弦滑順洪大逆

主方左右 柴胡 青皮 白芍 川芎 枳殼炒

香附 當歸各壹錢 龍膽草 木香 砂仁各伍分

加姜水煎服 氣急加桑皮紫蘇 脹加腹皮草果陳皮蘿

蔔子 左痛加黃連吳萸炒 桃仁各壹錢 紅花伍分 香附砂仁甘草

右痛加陳皮半夏各壹錢 枳榔肉桂各伍分 去芍芎當歸龍膽

當歸龍會丸 通治脇痛因氣成火者神効

簡明醫說 卷之五 十六

當歸 龍膽草 梔子仁大 黃連 大黃酒蒸 蘆薈

青黛各伍錢 青皮 木香試錢伍分 麝香伍分 柴胡伍錢 石為木研

入蘆薈麝用神麴糊丸桐子大每服三十九熱濃姜湯下

豁痰飲 治素有痰飲而致右脇痛

陳皮 貝母 茯苓 瓜萎仁 枳實 白芥子

半夏 青皮 梔子各壹錢 木香 甘草各肆分 加姜水煎

枳殼煮散 治悲哀煩惱有傷肝氣至兩脇皆痛筋脉拘急腰

脚重滯股脇髀痛四肢不舉

防風 川芎 細辛 枳殼炒 桔梗各壹錢 甘草各伍分

葛根捌分 右咀水二盞姜三片煎八分食後溫服

左金丸 瀉肝火行溼為執甚之反佐

黃連陸壹 吳茱萸陸壹

右為末湯浸蒸餅丸菘豆大每服三十九滾姜湯送下

木通散 治男婦脇肋苦痛

木通 青皮 川練子取肉壹兩用巴豆去殼 蘿蔔子半兩同炒黃去巴不用

莪朮 木香 滑石各半兩

右為細末葱白湯調下每服三錢或煎服即愈甚者只二服

異香散 治腹脇痞悶

莪朮 三稜 益智 甘草各壹錢 青皮 陳皮各伍分

石蓮肉參分 厚朴姜製 右咀水盞半姜三片棗二枚煎七分溫服

簡明醫數

卷之五

十七

氣鍼丸 治久積風壅。心胸築痛。兩脇似有鍼刺。疼痛不可忍。六脉沉伏按之不可近。此藥屢試神効。常服疎肝氣止痛。

木香 檳榔 青皮 陳皮 大黃各肆兩 牽牛半斤

熱取頭末半斤 右為細末煉蜜丸桐子大每服三十九姜湯送下

左痛不動移乃死血宜活血湯方見

因傷勞虛痛久不止宜補中益氣湯方見

熨法 姜蔥炒熱包熨或葱或艾或韭或蒜皆可熨

灸法 治卒脇痛以蠟繩橫度兩乳中間屈繩從乳橫以趨痛

脇下灸繩盡處三十壯為度

外貼法 芥菜子水研敷或吳茱萸醋研敷

腰痛

經曰。太陽所致為腰痛。巨陽虛則腰背頭項疼。是動則項如拔。夾脊痛。腰似折。脾不可以曲。蓋腰者腎之府。為一身之大關節。所恃以轉移闔闔者也。且諸脉皆貫於腎。而終於腰脊。腎氣一虛。腰必痛矣。內經推足三陰三陽。皆令人腰脊痛。書敘五種。三因致痛。曰陽氣不足。曰風痺寒溼。曰腎虛勞役。曰墜墮險地。曰寢臥卑溼。五也。如六淫氣浸皆屬外因。用力舉重。因於墜墮。惡血留滯。閃肭挫氣。房勞疲力。耗竭精氣。及腎脊腰痛。腰冷如冰。身重不渴。如帶五千錢。因作勞汗出。衣裏冷溼。久久得之。腎脈偃。腰重引季脇痛。屬不內外因。失志傷腎。鬱怒傷肝。憂思傷脾。皆致腰痛。其證虛。氣不足。而色黑。兩耳熱。痛精氣不固。齒疼。斷腫。失志所為也。腹急脇脹。目視眩暈。所祈不得。意注於外。宗筋弛縱。及為白淫。鬱怒所為也。肌肉濡漬。痺而不仁。飲食不化。腸胃脹滿。閉墜腰脇。憂思所為也。皆屬內因。感受。雖有種種。無出腎虛一門。脉沉而弦。澹血。滑痰。治雖祛邪。必以補腎為主。

簡明醫數

卷之五

十八

主方 杜仲姜炒 破故紙鹽酒炒 牛膝 當歸 生地 白芍 黃柏 知母俱鹽炒 熟地各壹錢 茴香各壹錢 肉桂各壹錢

懷山藥朱分 棗二枚煎成入鹽壹分 服多食胡桃肉飲好酒送服

痛甚加玄胡另磨沉香研乳香砂仁末服去白芍藥生地

虎加人參黃芪龜膠枸杞山萸之類

煨腎散 治腎虛日夜悠悠痛不已與主方兼用

杜仲姜炒 破故紙鹽酒炒 右研細先以猪腰子一個切七

斤鹽醃拭淨將仲紙入茴香末鹽少許摻挾溼紙包煨酒下

青娥丸 治腎虛腰痛

杜仲兩 破故紙兩 右為末胡桃肉四十九個搗

細入山藥糊和丸如桐子大每服七八十九酒下

補腎丸 治腎虛腰痛

熟地 當歸 杜仲各錢 白芍 破故紙 枸杞子

黃栢酒炒 川練肉 茴香鹽酒炒 川芎各錢 桃仁壹錢

右為末蜜丸桐子大每服七十九鹽湯下

簡明醫教 卷之五 十九

腎着丸 治腎虛為病身重腰冷如水不渴小便自利飲食如

故腰下重痛如帶五千錢 滲溼湯亦可服

白朮 茯苓各四兩 乾姜 甘草各壹兩 右咀每四錢空心服

川芎肉桂湯 治冬月因感寒溼腰痛兼行瘀血

羌活錢 柴胡 肉桂 桃仁 當歸尾 蒼朮

甘草錢 川芎各八分 獨活 神麴 防風 防已酒各

右酒三盞煎至一盞食前煖室溫服

牛膝酒 治腎受風毒攻刺腰痛不可忍者

牛膝 地骨皮 五味子 薏苡仁 川芎 羌活

甘草各 海桐皮 生地黃兩

右咀用綿包藥入無灰酒裝入罈內浸春五夏三秋七冬十
日每服一盞一日三四次常令酒氣不絕

摩腰膏 治寒溼腰痛

附子壹兩 天南星 川烏各壹錢 肉桂壹錢 雄黃 樟腦

丁香各壹錢 麝香伍分 右為末蜜丸龍眼大每用二九姜汁化開

頓熱塗腰間綿紙覆外烘熱綿衣縛定內火熱三日一次

風溼寒熱痛宜當歸拈痛湯方見 瘀血夜痛甚四物湯加秦

仁紅花 閃挫痛當歸玄胡肉桂為末每二錢酒下 大便

秘三花神佑丸方見 痰門痛甚者經曰腰痛不可俛仰腎將儻矣

宜參芪配補腎藥大劑服忌寒涼藥

簡明醫教 卷之五 二十

簡便方 治腰 用大胡桃二個炮焦取肉燒酒送下

又方治風冷 川烏一兩為末鹽酒調敷痛處綿紙軟帛束之

又方治寒 杜仲一兩製次以韭白七莖鹽花椒姜醋醬作羹食

又方治腰 楫榔末一錢酒下 又 鱉甲炙為末酒下

又方治腰 風栗子每早吃十枚再以猪腰子煮粥食

又 白疾黎為末蜜丸桐子大每服七八十九一日三服

又 杜仲一兩川草薺二兩為末每三錢酒調下

又 紅麴一錢炒研酒下或炒鹽熨或橘核炒去殼茴香酒下

眼科

經曰諸脉者皆屬於目得血睛能視又曰肝氣通於脉肝和則

目能辨五色而明矣其五輪者應五行八廓者象八卦凡患者煎燻腥酒房室怒鬱憂思久視等因而成瘵而不痛為風眼紅腫刺痛為熱眼腫軟酸澁為氣眼視物不明為虛眼風與熱并赤腫淚出風與氣搏癢澁昏沉血熱交聚致紅縷倫針之類氣血不至成雀目盲瘵之形昔紅努肉心熱黑珠星障肝火眼眶赤爛脾胃溼熱瞳人不明腎水枯竭一眼忽痛乃犯飛絲腫子散大食毒熱甚痛癢大作火熾生風拳毛倒睫脾受肝尅所謂散熱為治目之要行血為療眼之綱此皆論其標也治本之理補益脾胃育養心神脾者諸陰之首心者眾脉之宗脾虛則五臟之精氣皆失心虛則百骸之榮養皆虧脉洪火盛當察何部

備明醫教

卷之五

眼科

二十一

五輪

五輪歌
血輪四皆屬心經

水谷脾胃關泉心

八廓歌

八廓

肝氣輪白肺黑風輪

會陰屬腎胞陽門

廓

肉輪上下臉脾胃

傳道肺腸清淨膽

圖

水輪屬腎主瞳人

津液膀胱養化林

主方

當歸尾 川芎

赤芍

生地黃 防風

羌活

黃連 黃芩

石膏

梔子 荊芥

薄荷

甘草

加燈心二十枝水煎食後服次加木通菊

花

痛甚大便實或秘加酒煮大黃一錢煎成化入芒硝五

分未安再服 怒動肝火加柴胡龍膽草去薄荷 小便短

赤加滑石鬱火加連翹 有星障加木賊蒺藜蟬退 多淚

加蔓荊子 痛止去黃連黃芩梔子歸尾石膏加當歸菊花

決明子密蒙花知母穀精草 目不痛惟是黑睛上有障翳

凝結不退宜養血祛風去障藥 加白芷八分細辛二分

服藥時先嚼白豆蔻二粒辛溫退之去涼藥 凡痛止障退

腫消止是隱澁難開視物不明藥宜養血為主兼養心神滋

腎水理脾胃更宜瞑目靜養如時行暴發風熱火眼腫痛難

開頭面俱腫怕日羞明防風通聖散 方見

明目丸 生精補血益腎養肝退翳止泪除澁明目

備明醫教

卷之五

二十二

生地 酒蒸 黃芩 炒 知母 鹽 牛膝 酒 枸杞 各武

蒺藜 羌活 防風 石斛 枳殼 菊花 各壹

右末蜜為丸每百丸空心鹽酒下或鹽湯臨睡白湯下久服

明目兼補陰益腎 六味地黃丸 方見 加當歸白芍枸杞子

菊花五味子共為末蜜丸如前服法

滲淫清脾散 治常患上下眼眶赤爛屬脾胃溼熱

石膏 錢 蒼朮 白芷 白芍 黃芩 黃連

梔子 羌活 防風 枳殼 荊芥 甘草 各伍

滑石 水飛 右水煎成調入滑石末食遠服

蟬花無比散 治大人小兒遠年近日一切風眼氣眼攻注昏

睛臉生風粟或痛或癢漸生翳膜或久患頭風牽搐兩目漸

漸細小眼睜赤爛並皆治之若常服祛風退翳除障明目

蒼木 防風 芍藥 茯苓 甘草 各各 蛇退 炒

羌活 當歸 石决明 鹽水煮一時 川芎 各各

蟬退 去頭翅 白蒺藜 炒去刺

右為末每服二錢臨卧時飲湯下或酒亦可

當歸養榮湯 治睛珠痛甚血少枯澀

當歸 川芎 芍藥 防風 熟地黃 白芷

羌活 分等 右水二盞煎至一盞食後熱服

明目羊肝丸 治肝虛風熱冷淚赤澀內外障眼

簡明醫教 卷之五 三十三

黃連 南家 菊花 石决明 煨 熟地黃 龍膽草 麥門冬

當歸 枸杞子 牛膝 防風 羌活 黃礬

人參 柴胡 青鹽 各各 肉桂 半 羯羊肝 一具焙乾為末生搗亦可

右為末煉蜜九梧桐子大每服七十九溫水下

養肝散 治肝虛目痛冷淚不止畏明

夏枯草 兩 香附子 兩 俱童便浸透晒乾同為末每三錢茶下

明目第一方 古諸賢有目疾皆用此

省看書 減思慮 專內視 簡外視 晨興進 夜眠早

洗方 黃連 錢 切煎上鋪稀絹濾汁洗眼日三遍或用黃連五

分切拌人乳蒸點

又 黃連黃柏黃芩梔子防風連翹白芷當歸尾苦參五倍子

荆芥薄荷朴硝 分等 為末薄荷湯丸芡實大每一九 滾水泡化

又方 眼胞 五倍子黃連荆芥防風各一錢五分苦參四錢銅青

五分薄荷湯丸龍眼大每一九湯泡化頻洗

又 白鹽一錢每早擦牙以鹽津洗面眼閉一時

○吹方 治一切火眼內障

黃丹 芒硝 各壹 雄黃 錢 沒藥 伍分 右研末吹鼻中先含溫

水一口左日吹左右日吹右如兩目痛俱吹久患者勿吹

○拳毛倒睫 木鑿子去殼搗爛用綿紙包搥成細條塞鼻中

左病塞左右病塞右一日三次其毛自起

簡明醫教 卷之五 三十四

簡便方 治風熱冷淚 用肥簪脚插入母姜拔出點眼背角

又方 諸 春月嫩桑條曬乾淨器燒成白灰用三錢滾水一大

碗泡打轉澄出清汁重湯頓溫洗

又方 治久患 用决明子炒研末每服一錢白湯下

又方 治目翳及 用男左女右手指甲洗淨用木賊草磨下細末

刀刮亦可以燈草頭打溼蘸其末點翳上數次即去

天絲入眼 忽然一眼大痛急用錫粉或京墨磨濃批入眼略

閉復開令人撒起上眼胞看粉白墨黑細珠即是天絲聚成

者用光肥銀或骨簪脚撥出如未盡再入墨取盡即安

灰塵入眼 掙眼看水自出或砥溼自手背掙眼批出

鼻證

經曰。鼻者肺之外候。又曰。膽邪移熱於腦。令人辛頰鼻淵。蓋肺開竅於鼻。肺氣清順。鼻氣通利。而知香臭。肺受風火之邪。悞於經。則津液壅沸。故鼻氣不得宣調。或流濁涕稠水不止。名鼻淵證。俗為腦漏是也。此火極反兼水化之象。夫五行之理。微則當其本化。甚則兼其鬼賊。故經曰。亢則害。承乃制也。凡鼻之為病。如生瘡乾結痛癢。鼽衄。至於鼻痔鼻息。鼻癰。鼻齕等諸證。皆屬於火也。惟傷風鼻塞。流清涕者為寒。若鼻中熱氣濁涕有痰。亦為熱矣。脈右寸浮洪而數。治當清肺火。有風邪兼疎散。

主方 鼻竅 片苓

梔子 防風 桔梗 枳殼

簡明醫彙

卷之五

鼻證

二十五

桑皮 石膏

玄參 荆芥 木通 甘草

枇杷葉

水煎服。又防風通聖散。治鼻淵涕水。

辛夷湯 治肺氣不利。頭目昏眩。鼻塞聲重。鼻淵涕水。

辛夷 川芎

白芷 防風 羌活 荆芥

藜蘆 薄荷

木通 細辛 升麻 甘草

右咀每服五錢水二盞煎一盞食遠溫服

麗澤通氣散 治鼻不聞香臭

黃耆 蒼朮

羌活 獨活 防風 升麻

葛根 炙甘草

麻黃 川椒 白芷

右咀作一服姜三片棗二枚葱白三寸水二盞煎食遠溫服

芩薈散 治鼻塞為癰

芩薈 檳榔 肉桂 麻黃 防己 木通

細辛 石菖蒲 白芷 木香 川椒 甘草

右咀每服三錢水二盞姜三片紫蘇葉煎八分食遠服

簡便方 葛蒲皂角為末每一錢綿裹塞鼻仰臥

又 南星湯泡二次切晒為末每二錢棗七枚甘草食後服

又 瓜蒂蒸蘆為末每一錢綿裹塞鼻中日三易之

又 槐葉五兩水五碗煎二碗量下葱三莖豆豉一撮再煎二

沸分二服 或用麻鞋燒灰吹鼻中即通

又方 梔子略炒為末黃蠟九桐子大每服三十九

簡明醫彙 卷之五 鼻方

二十六

又 天門冬側柏葉細茶 共研一處每日用一撮盛於罐

中滾湯內蓋好當茶一月効

又方 用黑牛耳內垢敷 又 桐核 錢研胡椒酒下

耳證

經曰。腎開竅於耳。耳為腎之外候。又曰。腎者作強之官。技巧出

焉。又曰。脫精者則耳聾。又曰。心通竅於耳。陽氣上甚而聾。故耳

鳴也。夫腎經寄竅於耳。所藏者精。所納者氣。精氣調和。腎經充

足。則耳聰矣。若勞傷氣血。耗損精髓。或酒膠厚味。痰火上升。或

素多鬱怒。氣逆於上。或大病後。皆致耳鳴。設若精脫。腎虛。則為

聾矣。有厥風。陰熱。氣勞。諸蠶。各雖種種。感受無出腎虛所致。又

有邪熱乘虛隨脈入耳。作聾耳之證亦皆熱候脈大部洪盛爲火。濡瀦而短爲陰虛。治宜補腎壯水制火。

主方 腎虛黃柏鹽酒炒 知母鹽酒炒 當歸 川芎 白芍

柴胡 生地各壹分 麥冬 五味子各柒分 右水煎空心服

疎肝清耳湯 治左耳鳴聾。恚怒氣鬱肝火炎灼

黃連 黃芩 梔子 當歸 青皮 膽星各壹分

香附 龍膽草 玄參各柒分 青黛 木香各伍分 焦姜各分

右剉加生姜三片水煎服

補腎養陰湯 治右耳鳴聾。屬腎不足命門火盛

黃柏酒炒 知母酒炒 山藥 山茱萸 牡丹皮 澤瀉

簡明醫按 卷之五 二十七

白芍 白茯苓 石菖蒲 遠志 當歸 川芎各捌分

熟地壹錢 右剉水煎空心溫服

清炎寧痛湯 治耳痛

黃連 黃芩酒炒 連翹 玄參 蔓荊子 當歸

白芍 山梔 防風 川芎 柴胡各分 右水煎服

平肝清胃丸 治耳聾耳鳴。因於飲食厚味挾怒氣以動肝胃

枯苓 黃連 白芍其酒洗 生地酒洗 柴胡 半夏各柒分

人參伍錢 青皮伍錢 赤茯苓 蔓荊各壹兩 甘草壹錢

右爲末葱湯浸蒸餅爲丸。菜豆上每服百丸。食遠姜茶湯下

補腎丸 治腎虛耳鳴耳聾

芍藥 山茱萸 乾姜炮 巴戟去心 澤瀉 兔絲子煎

桂心 遠志取肉 黃芪 細辛 石斛 乾地黄

附子炮 蛇床子酒浸 當歸 牡丹皮 肉蓯蓉酒浸 人參各叁兩

菖蒲 茯苓各壹兩 防風 甘草各半兩 羊腎貳枚

右爲末以羊腎研細酒糊丸。桐子大每服五十丸。蠶酒下

益氣聰明湯 治飲食不節勞役形體脾胃不足得受內障耳

聾之患服此令人精神過倍元氣自益輕身健體耳目聰明

黃柏酒炒 芍藥各伍分 蔓荊子 升麻 葛根 人參

黃芪 甘草各壹錢 右水二盞煎至一盞臨臥時服

黍粘子湯 治耳痛生瘡

簡明醫按 卷之五 二十八

蘇木 黍粘子 生甘草 昆布 龍膽草 連翹

蒲黃 黃芩各肆分 當歸伍分 紅花少許 桔梗壹錢 生地黃

柴胡 黃耆各肆分 黃連叁分 桃仁三粒 水煎食後服忌涼藥

兩耳聾。膿耳。耳上焦痰火並宜涼膈散。神等丸。當歸龍薈丸

九方見 防風通聖散方見 痰火滾痰丸方見 諸方採川

耳鳴。因火者。吳茱萸。草烏。尖。大黃三味爲木津調

耳鳴耳塞。用石菖蒲。肥。巴。豆壹粒 全蝎壹個 共爲末。葱涎爲丸

如棗核。綿裹塞耳。或用生川烏爲末。綿裹塞耳。或用磁石能

針者。川山甲炒爲末 二味綿裹塞二耳口。含少生鐵覺耳引

簡便方 治耳 聾 茶葉子搗爛入乳調綿裹塞

又方 雄黃硫黃研綿裹塞或草麻肉五粒熟棗壹個乳汁研九寒

日一換晒乾或大蒜壹瓣入巴豆壹粒慢火炮熟研九塞或骨

碎補削成條火煨乘熱塞或鮮烏頭削塞或巴豆壹粒斑猫壹個

去研塞或巴豆一個針透眼塞耳中

耳鳴及膿 用香附為末砂鍋煎蘿蔔種湯調二錢服

耳大痛 或有血水蛇退燒灰用鵝毛管吹入耳

取耳出膿 方見功科

諸蟲入耳 香油滴入自出或桃葉捲筒切齊塞搗葉亦可或蒜汁

滴入或姜韭葱醬醋汁皆可滴

耳凍瘡 用橄欖核燒灰清油調搽耳痛鹽炒包熨

簡明醫殼

卷之五

二十九

口證

經曰中央黃色入通於脾開竅於口藏而於脾故病在口蓋口

為脾之竅脾氣通於口口和則知五味兌若臟腑熱盛熱乘心

脾氣衝於口故胃熱則口臭脾熱則口甜心熱則口燥膽熱則

口苦肝熱則口酸肺虛則口辛腎熱則口鹹胃虛則口淡肺熱

則喉腥又口瘡者乃脾虛凝滯風熱加之則發口瘡小兒將養

太過衣衾暖厚心臟客熱其口亦臭此口瘡應臟腑之邪熱也

復有酒色過度之人服涼藥久而不愈者乃中氣不足虛火泛

上無制宜溫熱之藥惟任細參脈證以別其虛實可也脈浮大

洪鼓見於何部皆屬實熱脈虛屬中氣不足治理尤當審別

主方 上瘡黃連 黃芩 梔子 連翹 當歸

生地 白芍 枳殼 桔梗 薄荷 甘草等分

水煎食後卧牀徐徐噙嚥慎勿頓服恐上熱未除下成寒疾

甘露飲 治男婦小兒胃中客熱牙宣牙齦腫爛時出膿血

口舌生瘡咽喉腫痛又瘵脾胃受溼痰熱在裏或醉飽多勞

溼熱相搏致成臆病身而皆黃或時身熱而腫大小便不調

枇杷葉拭去毛 生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬

茵陳 石斛 枳殼炒 黃芩各壹錢 甘草炙

右作一服水二鍾煎至七分食後服去麥冬加山豆根犀角

玄參散 治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

簡明醫殼

卷之五

三十

玄參 升麻 獨活 麥門冬去心 黃芩 黃柏

大黃 梔子仁 前胡 犀角屑 甘草一分 右水煎服

升麻黃連丸 治多食肉口臭不欲聞其穢惡

升麻 兩生薑 黃連 黃芩酒炒 檀香 甘草各

青皮兩 右為末泡蒸餅丸彈大每一丸不拘時細嚼白湯下

清胃飲 治口臭

黃連 黃芩 梔子 石膏 生地 滑石

連翹各壹錢 知母 升麻 葛根 大黃酒炒 石斛各

甘草五分 加蘆根水煎服口甜加枳殼骨皮去知母芍根石斛

涼肺飲 治口辛辣

桔梗 桑白皮 地骨皮 金沸草各錢 甘草錢 右水煎服

加減紫胡湯 治口苦及口酸

柴胡 黃芩 半夏 麥冬 黃連 青皮

膽草 當歸 骨皮 白芍藥分 右水煎服

坎離丸 治口鹹

黃栢 知母各錢 肉桂錢 為木水法丸鹽湯下

敷方 治口舌破爛唇吻燥裂咽喉腫痛

黃連 黃栢 黃芩 梔子 細辛 乾姜分

右為末先以米泔水漱口搽敷或吐或嚥

又方 黃栢末一兩或兩 青黛三錢同研搽少

簡明醫鏡 卷之五 三十一

又方 黃連 好酒煎二沸候冷 或枯礬黃丹敷

赴筵散 黃連末 乾姜 和勻淡鹽湯漱口敷

口糜生瘡 胡連 川連 細辛 薑香 研勻敷

又 硃砂 青黛 薄荷 石膏 研勻搽 又 白芷 銅青 分敷

又 黃栢 青黛 敷或大黃明礬敷或枯礬雄黃敷

驗方 益智甘草為末 或湯調下

又 白芷 川芎 為末 或丁香 川芎 甘草 白芷 為末 蜜丸 隨服

口乾燥 石膏 寒水石 水四碗煎碗半入白蜜

口上嘔 忍生紫泡如蛋急刺破出血用蒲黃青黛敷

簡便方 五倍子為末敷 又 先以亂髮拭口淨

又方 薔薇根避風者去土煮濃汁含冷則易

又方 芒硝陸續含化 又 香茹煎汁含嚥

唇證

經曰 脾胃大小腸三焦膀胱者 倉廩之本 榮之居也 其華在唇

大脾臟應唇通口氣 脾與胃為合 足陽明胃之經 其脈來口環

唇 故脾胃受邪 則唇為之病 風則動 寒則緊 燥則乾 熱則裂 氣

鬱則生瘡 血少則色白 治法宜對證 清理脾胃 外敷散藥 乃安

唇緊撮口 難開飲食難進者 名曰緊唇 又曰噤唇 失治則死

主方 心胃 杏仁 黃連 麥門冬 赤茯苓

黃芩 地骨皮 山梔 大黃 黃連 麥門冬 赤茯苓

簡明醫鏡 卷之五 三十一

甘草 犀角 右加竹葉水煎服 唇乾生瘡加石膏

獨活散 治唇生惡核由脾胃熱 豬油和塗或荷花研末

獨活 升麻 桑寄生 犀角 沉香 漢防已

蔥 川大黃 甘草 右水煎磨入犀沉服

葱 苡仁 湯 治風熱在唇 唇動或結核或浮腫

苡仁 防已 赤小豆 甘草 右咀每七錢水煎服

唇生腫核用 松香 大黃白欬赤小豆胡粉為末

緊唇用 白布一塊纏作燈炷如指大燃安唇刃上有汗出拭

取得唇上日三度愈 舊青布亦佳 或用青布燒灰猪脂調敷

緊唇用 黃栢 五倍子 蜜陀僧 甘草 水調頓全唇上

舌證

經曰南方赤色入通於心開竅於舌故曰舌乃心之苗又曰七情氣鬱心經蘊熱則舌腫滿不得息心熱則舌裂而瘡肝熱則舌木而硬脾熱則舌滑而胎又曰少陰氣至則齧舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧唇若產後血竭舌如黃土或色乾白子死則舌黑母死則唇黑心脈洪大舌病浮滑舌瘡

主方心 生地酒洗 木通 黃連 升麻 玄參

梔子 甘草等分 加竹葉廿片灯心三分水煎食後臨睡服

玄犀飲 心脾熱壅木舌腫脹

玄參 升麻 大黃 犀角無用 生地 黃芩

簡明醫案 卷之五 舌證 三三

黃栢 生地等分 甘草減半 水煎服

升柴湯 心脾虛熱上攻舌瘡舌強頰腫

柴胡 升麻 芍藥 梔子 木通 大青

黃芩各七 石膏錢半 水煎服 甚者加熟附子三分從治

絳雪 舌瘡口瘡咽喉腫痛等證

軟石膏飛 玄明粉飛 硃砂飛 硼砂各錢 水片分

右研細勻頻搽患處嚥下不妨喉痛蘆管吹入

碧雪 一切熱壅舌瘡舌根緊強腮頰腫痛咽腫皆心脾火

蒲黃 青黛書家 軟石膏飛 硼砂明 甘草各錢 水片分

玄明粉或焰硝錢 各研極細末入水勻錢 和丸化

齒證

簡便方 舌瘡 薄荷蒲黃青黛研末等分和敷如米片尤如舌上細孔出血 黃連黃栢梔子酒煎服 蒲黃末敷 木舌腫大殺人 枯礬百草霜等分研捻搗茄自然汁調灌 或蓖麻油紙擦蘸點烟薰舌消縮 舌下有筋刺破鍋煤敷 虛陽上浮舌瘡 吳萸醋炒 乾姜炮 木鱉五錢 研五分 水調納

經曰腎衰則齒豁精固則齒堅又曰齒乃腎之標骨之餘也夫齒者骨之所終髓之所養內床生者名齒外單立者名牙手足陽明所過上斷隸於坤土乃足陽明胃脈貫絡重濁不動惡熱喜寒下斷嚼物屬金乃手陽明大腸脈絡輕清能動惡寒喜熱

簡明醫案 卷之五 齒證 三四

故痛時飲食有寒熱相宜又有痺蝕蛀缺血出而痛有脾胃風熱斷腫而痛有風寒濕熱蟲五種之別有牙疳臭爛穢氣者火熱極也脈見右寸關浮洪數大二陽明之火盛矣

主方 當歸身 生地 牡丹皮 黃連各錢 升麻

石膏上齒 大黃酒 黃芩條 細辛分 水煎食後服

上齒痛甚涼膈散大黃酒 加石膏升麻知母一劑即安方見

清胃湯 治一切風熱濕痰牙痛接服七神

梔子 蒼朮 條芩 當歸 生地 石膏

黃連各壹 白芍 青皮各八分 荊芥 藿香 升麻

細辛 丹皮各五分 甘草四分 水煎服含浸痛處

七神散 痛甚繼以姜黃白芷川芎細辛末椒鹽湯漱敷患處

龍膽草錢半黃連錢半 防風各壹錢 升麻七錢 草豆蔻建寧者十粒研

北細辛連葉貳分 灸草四分 水一鍾煎半鍾哈一口含浸患處少煎

宣風牢牙散 駐顏補腎滋血固齒

當歸 川芎各壹兩 青鹽七錢 細辛四分 右為末清晨漱口

淨用擦牙連藥嚙下 不嚙加石膏一兩

簡便方 菘豆十粒 胡椒七粒 搗細綿裹豆大咬於痛處

又 黑豆葱白艾葉川椒水煎含漱 或乾姜壹錢雄黃五分研擦

或獨蒜煨熟熨冷則易 或霜後絲瓜燒擦 或雄黃九塞

走馬牙疳 婦人淘桶垢火服壹錢銅青五分麝香一分研勻釐許敷患處

簡明醫教 卷之五 齒證 三五

取欲下牙 草撥草烏各五錢 川椒細辛各壹錢 為末敷患牙內牙

堅牙去風 香附炒焦研末入青鹽兩日擦 牙動出血

風蟲牙痛 鮮苜蓿咬痛處 或良姜煨熟咬患處痛止 或

李根皮煎湯漱 或槐白皮醋煮入 或胡荽子煎汁合或煎

咽喉 經曰一陰一陽結謂之喉痺厥陰風木少陽相火 又曰咽喉者水穀之道

路也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之門戶也足少陰

腎上系於舌絡於橫骨終於會厭夫喉痺者由痰生熱熱生風

火主腫脹故熱客上焦而咽喉腫痛也咽喉之於會厭內經謂

之吸門咽以候氣通肺屬金輕清不容喉以納食通胃屬土無

物不受會厭管乎其中以司開闔能閉其咽以進食俗伴誤投

滴粒嗽出乃止咽中惟呼吸行焉故為人身之橐籥緊關卒然

漿水不入語言不出命懸須臾喉痺即今之乳蛾咽喉一十八

證謂單蛾雙蛾纏喉風之類名狀不同其源則一相火是也

感於酒腥辛辣厚味七情痰火發則通連頸項頭面腫脹古書

治法刺破出血今屢見因刺有傷人者莫如探吐痰涎萬無一

火床宜浮洪忌微伏尤有傷寒少陰咽痛及陰陰下虛痛不能

寸方 桔梗四錢 甘草錢 荆芥錢 玄參錢 水煎服白木

詳脈證屬熱漸加牛旁連翹天粉蠶射干山根薄荷荳蔻連

梔栝防風升麻生地當歸擇用 大便秘大黃小便澀木通

簡明醫教 卷之五 咽喉 三五

清心利咽湯 咽喉腫痛痰涎壅盛

桔梗 黃連 黃芩 薄荷 荊芥 防風

梔子各錢 甘草 玄參 連翹各壹錢 大黃 芒硝

牛旁子各七 右作一劑水煎食後服 兼用碧石研

透天水 一切風熱喉痺口舌生瘡頭目不清痰涎壅盛

黃連 薄荷葉 枳殼 蒲黃 荊芥穗 甘草

黃栝各末五分 冰片分 柿霜五錢無 蜜和丸不時喻化

玉雪散 咽喉腫痛單雙乳蛾一十八證皆効

蠶蠶堅亮者洗壹錢 山豆根廣西者取皮研五分 雄黃飛 玄明粉如無用柿

研碎明亮者各分 研極細入水片二分勻先以筋捺下舌蘆管吹

入患處閉口一時口噤吹入鼻加薄荷其枯木蜜丸喻亦佳
稀涎散 乳蛾喉腫面浮目閉口噤食絕

皂莢 未佳 牙明 研各 白湯調灌牙緊灌入鼻末吐以鷲毛

蘸生桐油 或灯 高油 口內攪即吐一人托額一人用指口內引出

痰涎益許即刻痛止腫消聲出食進未全愈再吐 或只白

碧或油亦可發吐 或土牛膝根 壹名鼓槌草俗名夫娘子 紅梗大葉壯節生子刺衣

搗汁入白碧灌 或馬藍頭 春苗可食秋 搗絞汁入香油少

許灌 或膽碧五分湯調得吐愈 或飲鹽湯二碗吐亦可

簡便方 治喉痺 真山豆根水浸透含嚥汁

急喉痺 巴豆 紙打油作燃點火吹滅以烟薰入鼻涎出

簡明醫教 卷之五 喉 三七

又 皂角 去末 筋頭點患處以米醋調敷項下

又 雪梨搗絞汁飲効 走馬喉痺 桔梗 水煎分二服

喉痺并毒氣 生姜汁和蜜共一椀熬六分日服三五次

纏喉風 生白礬末 水調下 或韭菜搗細敷項上 或蘿

荷汁和皂角末服吐痰 或礬砂化

面證

帝曰首而與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則冽地凌
則水其辛寒或手足懈惰然其面不衣何也岐伯曰十二經脉
三百六十五絡其氣血皆上於面而走空竅其精陽氣上走於
目而為睛其別氣走於耳而為聽其宗氣上出於鼻而為臭其

濁氣出於胃走唇舌而為味其氣之津液皆上薰於面而皮厚

肉堅故大寒甚熱不能勝之也又曰頭者諸陽之會也然諸陽

脉皆上於頭而面之寒熱由足陽明胃經之虛實本經多血多

氣木實則風熱上行或面鼻紅紫風刺癢疹兼而作焉其面之

浮腫有二者之別腫屬肝風胃火為實風火上炎紅腫而熱按

之作痛此邪氣有餘脉必急躁緊實當用防風通聖散之類

風散而瀉之浮屬脾土肺金為虛脾勞役肺氣失度或時作

喘此正氣不足脉必虛浮無力當用利木實脾湯之類方見濕

主方 防風 連翹 黃連 酒芥 桔梗

川芎 白芷 梔子 炒各七分 薄荷 升麻 各五分 甘草 分

簡明醫教 卷之五 面證 三七

水煎服加竹瀝尤佳 頭面瘡加芍地玄荆之類便實大黃

升麻附子湯 治面作寒畏風冷

升麻 葛根 附子 炮 黃芪 白芷 各七分 人參

草豆蔻 益智仁 灸草 各五分 右加葱白三莖水煎服

犀角黃連湯 治面作熱燥赤

犀角 黃連 白芍 酒芥 白芷 灸草

川芎 各五分 薄荷 荆芥 各五分 升麻 葛根 各錢半 水煎服

苻梁之士面熱生瘡加大黃芒硝連翹去芷芍葛研末調服

美容膏 治面生黑點雀斑 單用蜜陀僧研末人乳敷亦妙

防風 零陵 藁本 各兩 白芷 白附子 白欬

天粉 菜豆粉 蠶蠶 白芷各壹兩 井松 三奈

草香各五錢 肥皂去皮 共為末蜜和搗勻擦 或白茯苓白芨

白附白欵為末蜜陀僧定粉白石脂另等分乳調敷過夜

簡便方 面瘡毒 黃連黃柏為末入鉛粉油調敷

指爪傷面 生姜自然汁調輕粉敷無痕

面黥 麴蠶白芷細辛等分為末入乳和九芘實大洗面化塗

粉刺 兔絲子 浸數日搗絞汁塗 或白礬末酒調搽

面上卒得紫黑丹如疹至遍身殺人急用鹿角燒灰香油調搽

面目身上赤斑作癢腫 殺羊角燒灰研細雞子清調搽

簡明醫叢 卷之五 面證

三九

經曰腎之合骨也其榮髮也多食其則骨痛而髮落又曰女子

七歲腎氣實齒更髮長五七陽明脈衰而始焦髮始墮丈夫八

歲腎氣實髮長齒更五八腎氣衰髮墮齒稿又曰髮鬢黃赤者

多熱多氣白者少血少氣黑者多血少氣美眉者太陽多血通

髻極鬢者少陰多血美鬢者陽明多血此其時然也蓋足少陽

膽之經其榮在鬢足少陰腎之經其華在髮故氣血充盛髮鬢

黑而美若氣血衰弱鬢髮白而落鮮能挽復于既衰之後可以

保護于未敗之前人年三十外常服補腎滋陰之餌不致枯槁

主方 兔絲子酒 金鈴子 覆盆子 五味子 枸杞子

蛇床子各壹兩 牛膝 何首烏酒 熟地黃酒 地骨皮各壹兩 木瓜川

茴香脂上者鹽炒各貳兩 右除地另搗餘為末入地重晒磨酒糊和丸

桐子大每服七十丸空心米湯下加參苓末各貳兩 尤効思白

七寶美髯丹一各七珍 與神仙六子丸相間久服補功無以加

何首烏赤白各壹兩酒洗竹刀破故子鹽酒炒香 兔絲子法製藥

牛膝去蘆各八兩拌黑豆蒸升用酒浸一宿歸身酒沒酒焙

赤茯苓用牛乳 白茯苓用人乳各五碗 炒如泥 枸杞子州者晒

右為細末煉蜜和勻搗千下丸如彈大每服一九日三服早

溫酒午後姜湯臨睡鹽湯初服七日小便多或雜色是臟腑

病出二七唇紅津生有腹痛勿懼乃搜病根去三七身輕乳

潤一月百病皆出七七血長精添火瀉水溢久服強健康寧

簡明醫叢 卷之五 鬢髮

四早

烏鬢方 京省通行此方可用不壞鬢製得法可黑一月

五倍子四川大者打碎揀淨鍋內炒黑色 蘇爛有白爛

紅銅花取細銅絲炭火燒赤淬醋內用時 枳末末 銅末末

皂礬明礬 沒石子研 食鹽各貳分 礪砂淨 和勻以

酒或煎濃茶用磁盃調如稀糊坐湯中煮至盃內綠氣生而

上為好先將皂角湯洗鬢淨拭乾用濕皮紙托定則稍梳藥

塗鬢紙包過夜次早溫水洗胡桃油燃之連染二夜黑矣

三青膏 生胡桃皮 生酸石榴皮 生柿子皮

先將榴皮去子入丁香滿稱過分兩後將柿皮與榴丁等

分晒研末牛乳調盛鉛瓶中封口埋馬糞內三七日取塗鬢

簡便方 髮白反黑 烏芝麻酒九蒸九晒為末兼肉丸服

髮落不生 麻子壹升壓油搽頭 或鮮半夏搗擦

髮油汚衣 早梳畢以雞子青塗頭則髮新衣不汚

癭瘤

經曰堅者削之留者攻之結者散之鬱者達之發者奪之泄者折之夫人之氣血循環一身必使週流常無留滯之患倘喜怒失節憂思過度之類致氣滯血凝而成此疾屬足陽明與任脈二經氣凝於上血不下流故多著頸項腋脇皮寬之處日久血氣寢衰不能攻擊矣癭有五曰肉筋血氣骨癭有六曰骨脂肉筋血石二證惟氣癭可消脂癭可破餘證皆不宜強治屢見膿

簡明醫殺

卷之五 癭瘤

聖

血潰漏無已竟致難救服藥內消必鹹以軟堅斷厚味戒房室

主方 海藻 膽草 海蛤 通草 昆布

桔梗 松蘿各六 半夏 貝母各七 石木各八 連翹各九 射干各十 三服

秘傳木香散 治一切癭瘤結核

猪膽子七個 益火 海螵蛸 南木香 青木香

神麴 麥芽 孩兒茶各五 雄黃 辰砂各三

右為末每服三錢臨睡酒調下即臥勿言語惱怒房室緊驗

簡便方 消癭 黃連 海藻等分 置掌中時紙之津嚥下

又 鮮南星馬或乾者為末醋研如膏先以小針密刺布攤貼

又 久服蠟替丸外科 或昆布空袋 綿裹醋浸常含嚥汁

海藻昆布嫩者酒浸或醋拌家常作小菜久食消癭癥結核

結核

經曰癭氣結核皆屬於熱蓋由氣鬱成火結滯堅硬如果之核不須潰發氣散自消結於頸項臂脇多在皮裏膜外濕痰流注七情過傷皆致斯患婦女常感者因富貴貧賤多有鬱也若臥枕動悲苦忿怒乃成項中不散則變癭癥腋下不消則為馬刀必宜早治日積月累而得服藥亦須久長最忌鮮猪肉熱毒物

主方 項核 橘紅 南星 半夏並姜 枳實 桔梗

羌活 防風 前胡 柴胡 連翹 赤芍藥

黃連 蓬朮 蔓荊子 木通 甘草等分

簡明醫殺

卷之五 結核

聖

右加生薑五片灯心三十枝木煎去枕臥床患處向下細

散結丸 治結核久不消 兼用圍方見前

橘紅鹽水 赤茯苓 大黃酒 連翹各等 山梔各

半夏曲 桔梗 瓜蒌仁 牡蠣煅 玄參 天粉

癭蠶洗各 甘草節四錢 右為末水盪九羅荷子每 服法錢

滾痰丸方見 每服五分臨睡葱鹽湯下常服三分睡時并蜜膏

簡便方 癭蠶炒 大黃酒 青黛 膽星各等分為末蜜丸喻化

又 草麻子七個 去殼研爛紙捲插入雞子內紙封固水浸濕煨熟

去紙設只食雞子每早晚一枚十日効 或射于磨酒服効

新刊簡明醫殺卷之五

新刊簡明醫殼卷之六

武林白石孫志宏克容氏編輯

當湖爾可崔 遠廓然子訂梓

幼科總論 初生 拭口 回氣 洗浴 着衣 斷臍

黃帝曰。吾不能察其幼小者為別。是一家調理爾。此不在黃帝

圖經之論。古來以嬰幼為啞科。謂其不能體問病源。極為疑難。

世以幼科為易者。乖謬甚矣。兒在母胎。受其精氣。十月百神滿

而生。六十日瞳子成。識人學語笑。百日任脉生。能反覆。一百八

十日。尻骨成。能獨立。二百一十日。掌骨成。能匍匐。三百日。懶骨

成。能起立。周滿。膝骨成。能行步。否此者。氣血之盛衰也。或過重

簡明醫殼 卷之六 初生

圍暖衣。不見風日。不着地氣。致筋骨軟弱。者有之。初生得地氣

○拭口 兒初生。莫待聲出。急以綿帛裹指蘸溫湯。展去舌上

穢血。用手遲啼一出。即入腹中。斯為患矣。兒口舌不堅。無冷到

注。用黃連甘草 各取汁少許 硃砂 大塊鮮紅。明如雲母。清水

之。調煉。口中以月七分。蜜九赤豆大。○回氣 兒初生。有不

出聲者。急灌溫水。少許。更以口頻進氣於兒口。自啼。有因難產

受寒。兒氣欲絕者。急烘綿絮包裹懷中。以胎衣置火上燒燃。又

以大紙撚清油點。燒於臍帶上下。使暖氣入腹。須臾即回。○洗

浴 未可斷臍帶。恐風臍爛 湯中切桃李梅柳枝。去不祥。取猪

膽。週身擦之。不生瘡瘡。月內冷 背勿受風。多勿久 浴罷。看

口上勝有細白泡。名七星。銀簪挑破。京墨塗。看白膜。名口。用

舌等。○着衣 男用父。女用母。舊衣綿改之。切勿過厚。貴

平適中。恐動火生瘡。痰熱 周內造衣。皆須故帛。用新綿。令兒壯

熱發驚。晒兒衣。勿使過夜。露溼之毒。入邪之害。兒黃瘦腹痛壯

熱夜啼。疥疥。又夜染無辜鳥屎。令兒致病。○斷臍 切忌用剪

刀。致兒內虧。切宜浴後。用紙作大然如指。油點燒臍帶。留六寸

長。則傷肌。短則傷臟。古用單衣前咬。呵入。暖氣看臍 裹臍。古用

白練新綿。今以糾絲。帶上滲 合之。緩急得中。急則兒吐。兜

解。貼膏藥臍上。填衣。俱宜開戶。下帳。冬月宜火烘。暖氣。勿令 服

餌 所落之臍。宜炭火煨研。每重幾何。對稱硃砂和勻。濃煎

簡明醫殼 卷之六

甘草汁。陸續調與兒服。解痘疹胎毒。最効神方。○透肛 罕有

兒初生。無穀道。大便不能出者。旬日必不救。須速用細刀刺穿

要對孔。親切開通之。後用絹帛捲如小指。以香油浸透。插入。使

不再合。傷用生肌散敷之。方見 自愈。如有孔。不造者。以金玉

○乳哺 乳食以少為貴。人云小兒常病傷於飽 多則傷脾

胃。初則乳。後則粥。初生未有乳。猪乳代之。 胎衣盛於新瓶內。以青布裹

口。扎緊。用磚蓋好。三日後。依月吉地。向陽高燥處。埋入地三尺

築實。兒壽有志。○看顛 顛顛者。精神之門戶也。開竅之

竅。脩也。上下相貫。百會相通。七竅應透。五臟所藉。泥丸之宮。魂

時嘔氣多。噎無神彩。治宜前浴法。泄瀉服參苓白朮散。方見

○胎驚 兒在胎。因母驚悸。有所觸撲受驚。子乘母氣。生後精神不爽。顏色虛白。初則溫溫有熱。其後頰赤多驚。咯動則恐。聲响則悸。印堂青色。睡中驚跳。手足抽掣。身僵目反。則成驚癇矣。

主方 人參 南星牛膽製 天麻 茯神 白附炮炙

硃砂水飛 甘草炙 青黛錢半 麝香伍分

右為細末。煉蜜丸。如芡實大。用鈎藤皂莢子煎湯化服。

猪乳膏 治胎驚諸癇證 全蝎壹個 琥珀壹分 硃砂貳分

右為極細末。每服二分。麥門冬泡湯調下。加猪乳妙。

○胎黃 兒在胎。受母熱毒。生下通身面目俱黃大便 閉。小便赤多。啼不乳。

簡明醫教 卷之六 五

主方 同服 生地黃 赤芍藥 天花粉 赤茯苓 川芎

當歸 猪苓 澤瀉 茵陳 甘草等分

○臍風 多因斷臍帶後。風溼停臍而成。風入臍者。令臍腫脹。口撮多啼。不能飲乳。若入經絡。多變為癇。如臍邊青黑。撮口不開。為內搐。爪甲黑者死。如熱在胸臍。伸縮努氣。亦令臍腫。治宜千金龍膽湯。方見 稀涎散吐痰。方見 或降痰藥化服。

主方 治臍 羌活 防風 白芷 川芎 當歸 甘草等分

右為細末。每二分。燈心湯調抹兒口內。

宣風散 治斷臍後。外傷風溼。唇青不乳。多喘。臍風撮口。

全蝎此一個頭足全者洗淨無灰酒拌炒研末 麝香取分另研和心為末每法別 金銀煎湯調服

○撮口 兒在母胎。感於風熱。生後血氣未調。洗浴冒風而成。口吐白沫。四肢俱冷。必難救矣。此證最急。雖有種種。皆由內結鬱熱。干於腸胃。閉悶不通。氣不得化。腹中滿脹。肚下青筋。撮口不乳。證候甚急。若不速與氣通利下。無可救療。少緩即斃。

主方 殭蠶直者去神 蛇退炒研 硃砂水飛 麝香伍分 蘇合壹分 龍膽草 黃芩炒 赤芍藥 鈎藤 甘草炙 茯苓各八分

右為細末。每三分。黑棗煎湯。或防風麥門冬湯調服。

撮風散 治撮 蜈蚣乾赤足者 鈎藤伍分 麝香貳分 全蝎稍洗淨 硃砂壹錢 右為末。每服二分。竹瀝調下。

簡明醫教 卷之六 六

○口噤 兒在胎時。母食熱物。攻入臟腑。則生後熱結。聚於口舌。上有形如粟。口不能開。但見不能吮乳。啼聲漸小。口吐涎沫。須急看兒上臍。如有白點。先以指甲輕輕括去。次用藥。初生臍風撮口。口噤三證。惟貴預防。則不患。若有患者。多難救治。

主方 治口噤 蟬退廿枚去 全蝎柒個 輕粉少 右為末。乳調服。

全蝎散 全蝎廿個 硃砂伍分 硼砂 冰片 麝香各分

右為末。用乳母唾調塗兒口唇內及牙上。或猪乳調入口內。

又方 蜈蚣藥店乾者去足炙焦為末入麝少許猪乳調 或猪乳獨用治兒口噤。

○鎖肛 由胎中受熱。熱毒壅盛。結於肛門。而不通。無復滋潤。所以有此。急令婦人以溫水漱口。吸啞兒前後心。併臍下。手足

心共七處。凡四五次。仍以輕粉五分。蜜少許。溫水化開時。時些少服之。以通為度。如不通。即是肛門內合。當以物通之。全替為上。玉簪次之。須插入二寸許。以蘇合丸為條。納入孔中。糞出為快。壯服不孔。或以猪膽導法。見便。蘇合丸。中。

臍突 初生兒有熱邪在胃及胸中。則頻頻伸引。呃呃作聲。多爭其氣。抑入臍腹之內。臍腫赤大。由母受驚熱。勿外敷毒藥。

主方 梔子仁炒 白朮 白茯苓 猪苓 澤瀉分官桂

右為末。每服三分。蜜湯或燈心湯調日二服。

二豆散 赤小豆 淡豆豉 南星製 白欬各壹

右為末。每服五分。以芭蕉自然汁調敷四圍。日一。大小便。

簡明醫教

卷之六

七

眼閉 初生眼閉不開者。由產母食熱毒之物。致成斯疾。宜用熊膽少許。以水一滴。浸化點入眼中。一日七八次。

主方 當歸 川芎 赤芍藥 生地黃 天粉 甘草各壹

右劑水煎服。或為細末。燈心湯調抹兒口中。宜多服。

釀乳方 澤瀉 茵陳各壹 瓜蒞根 猪苓 生地黃

甘草各壹 右劑水煎食後服。初用二服。且捏去宿乳。各壹

論形色

額屬心。色紅。主火盛。風熱煩躁。青主驚。○左臉屬肝。色赤。主身熱。拘急。肝風。青主驚。黑腹痛。○右臉屬肺。色赤。主身熱。氣粗。鼻塞。嗽。白主咳嗽。痰氣。青風入肺。○鼻屬脾。色紅。肺熱。極。衄血。內燥。

孔乾。熱氣出。或濁涕。痰嗽。內生風。白色清涕。外感傷風。或泄瀉。○下頰屬腎。色赤。主膀胱熱。小便不利。頰色赤。積熱。痰盛。身熱。○頰色赤。內熱。夜啼。○印堂青。主驚。紅火盛。黑客忤。邪祟。○山根紫。傷乳食。青驚。黑危。○準頭黃。吐瀉。赤熱。青驚。紅紫。痰氣。黑危。○眉皺。痢疾。紅夜啼。心煩。躁熱。○眼黑。睛黃。傷寒。白睛黃。浮積。赤心熱。淡紅心虛。熱。青肝熱。眼胞赤。爛。脾臟。淫熱。白睛黑。死。○人中黑。腹痛。蟲動。點點。黑吐利。○口唇紅。乾燥。脾熱。赤裂。脾熱。極。紫風寒。白虛弱。○承漿黃。吐。青驚。○面淡白。惡心。不食。青白。吐瀉。欲發驚風。面青唇白。吐乳。胃冷。青黑。吐沫。不吐者。蟲痛。黃食積。亦主驚。或天癆。面青身熱。發躁。多變。痢疾。面青有汗。

簡明醫教

卷之六

八

口內氣熱。必發釣痛。面黃盜汗。而青有驚。青黑。或時吐沫者。客忤。天釣。啼哭。凶。面紅。赤色。傷寒。發熱。身躁。不安。心煩。頭而青。筋欲作驚。或吐肚痛。頭面大小青筋。如綠繩。透起者。急治。不爾。發驚。搐。太陽紅。血淋。青驚。亦傷寒。風池紅。熱。多啼。黃吐。逆。○金匱青筋驚。舌紅。乾燥。熱。白胎。黃胎。熱甚。舌捲。驚。舌破。裂。有瘡。心火。赤腫。大便秘。小便不通。或熱瀉。舌黑。如芒。刺。陽毒。熱。極。久瀉。痢。舌黑。及傷寒。等證。舌黑。而溼。滑者。死。○耳微黃。驚。耳輪乾。燥。睡中。咬牙。主疳。骨蒸。熱。耳。內。外。有。瘡。腎。經。積。熱。面部五臟色診圖 面青屬肝病驚風 面赤屬心病熱盛 面黃屬脾病疳積 面白屬肺病虛寒 面黑屬腎病惡候

邪服發汗藥。或因食積。過用通泄。或冷熱不調。致傷脾胃。吐瀉淹延。脾土既虛。肝木乘之。故筋攣作搐。

嘔乳糞清。兒在胎時。母過取涼。冷氣入於胞胎。後因悲啼未定。便與乳食。使氣與食結。久而不散。致傷脾胃。輕則嘔泄。重則腹鳴氣逆。涎潮流溢。以致難治。

勿輕服鎮墜諸藥。水銀。輕粉。硃砂。珠珀。雖云下痰鎮心。毋得泛常輕用。凡小兒皆畏服藥。倘病源究未。其確藥不切中。勿因浴致生丹毒。一周之內。肌膚脆嫩。腠理不密。洗之恐溼熱。

鬱蒸。變生赤遊丹毒。身發壯熱。毒入腹者死。有因浴傷風咳嗽。上氣。漸成篤疾。由此而始焉。

簡明醫要 卷之六

十一

五臟虛實

心主驚。實則叫哭發熱。飲水而搖。虛則悸動不安。心熱喜涼。處臥。睡中口氣溫。目上竄。搖頭咬牙。皆心熱。導赤散主之。喜仰臥。瀉心湯主之。肝主風。實則目直大叫。呵欠。項急。頓悶。虛則咬牙多欠。肝熱。手尋衣領。及亂捻物。肝有風。目連劄不搐。瀉青丸治之。熱甚。身反張。目直視。風火相搏。導赤散兼之。脾主困。病則困睡泄瀉。不思乳食。實則多睡。身熱飲水。虛則吐瀉。益黃散主之。肺主喘。實則悶亂喘促。虛則哽氣長出。肺熱。手掐眉目。鼻面。肺盛。復有風冷。胸滿短氣。嗽痰。當先散肺熱。後散風冷。肺實熱。瀉白散主之。腎主虛。無實也。虛者。由胎氣不成。則神不

足。目多白睛。顛顛開鮮。面色眇白。下竄畏明。兩足熱。不喜衣履。此腎水虛。而心火乘之。宜地黃丸主之。

雜病歌

小兒雜病切須知。不問男兒與女兒。多睡只因肝是本。心中積熱。夜驚啼。叫呼冷汗。因蟲痛。寒熱其中積在脾。面赤口澹。心肺熱。虛風搐搦。四肢垂冷。滑傷脾。多瀉痢。如膿如血。下無時。積多肚大。多揪水。氣喘腮黃。不問醫。眼重吐涎。頭擺急。莫教脉息慢。微微堪笑。愚人偏問鬼。不求良藥。苦求師。

調護歌

養子須調護。看承莫縱馳。乳多終損胃。食擁則傷脾。食厚非為益。衣單正所宜。無風頓見日。寒暑順天時。

簡明醫要 卷之六

十一

小兒不宜服涼藥。足脛冷。腹虛脹。黃色青。吐乳食。

眼珠青。面青白。脉沉微。此皆寒證。故不宜涼藥。

小兒不宜服熱藥。足脛熱。兩臉紅。大便秘。小便赤。

上氣急。脉緊數。渴不止。此皆熱候。故不宜熱藥。

驚風總論

小兒急慢驚風。古謂之陰陽瀰。急慢者。後世名之也。急屬陽盛。而陰虛。慢屬陰盛。而陽虛。皆臟腑邪熱。銷剋肺經。而成痰。痰復生熱。熱生風。風生驚。必因驚。風痰熱。四證合作。而為搐。兩手十指。掣。夢如。頭偏。反。身仰。引。臂。若。竄。似。怒。視。不。活。入。候。生。焉。

及搭眼搖頭張口出舌唇青臉赤面青睛青太陽髮際印堂皆青三關虎口紅紫及青皆驚風之候也男搐左視左女搐右視右男眼上竄女眼下竄男握母指出外女握母指入內男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲皆為之順反此為逆治風先利驚治驚先豁痰治痰先解熱若驚風由痰熱而生必退熱化痰而驚自止若四證俱有治必兼施先後綱領如此折而言之暴烈為急沉重為慢志則勢雖甚而屬有餘其愈易慢則候雖緩而屬不足其愈難有初為壯熱發搐之急驚因吐下太過涼藥用多脾胃虧損肢冷昏憤而變慢驚者有先為吐瀉脾虛之慢驚因溫補太過熱藥用多體熱涎壅面紅目赤而變急驚者

簡明醫教

卷之六

十一

醫家用藥可不慎歟大抵嬰兒之疾貴乎早治纔覺受驚傷風發熱便與疎解何慮之有哉治宜先用搐鼻法以猪牙皂角末或半夏末或二物并以紙捲蘸捻鼻孔或蘆管吹入得嚏可治次吐痰瓜蒂散伍分白或稀涎散伍分白吐痰為妙或通關散或以神佑丸或分白或青州白丸子或滾痰丸同抱龍丸豁痰丸化痰或以造命丹治驚如驚風已退定志丸調之

急驚

急驚之證因熱所生熱客於心痰壅於肺熱極生風風生驚劇則搐搦僵仰仆反目八候漸見矣凡見欲發驚風必精神不定恍惚懼人顧左復右觀上回下即宜清熱降痰鎮養心神不

令至甚如只反張搐搦上竄若牙關不緊喉無痰聲口無涎沫非為驚風蓋夾驚夾食傷寒痘疹或三焦蘊熱五臟不宣流入經絡熱在筋脈亦作搐搦量輕重而利之脈候浮數洪緊虎口紋青紫相半治宜主方利驚丸導赤散方見大門安神丸與前方

主方利驚丸龍膽草青黛用者防風各錢鈎藤錢黃連壹錢

牛黃麝香冰片各分黛牛麝冰研細末

右為末入四味勺神麴糊丸黍米大每三十九煎湯送下

安神丸治小兒驚悸渴悶面紅頰赤口燥脈實

牙硝山藥麥門冬茯神甘草各伍分硃砂壹錢

右為細末蜜丸鷄豆大每服半丸砂糖湯下

簡明醫教 卷之七 十四

鎮驚造命丹治胎驚急慢諸驚顛癇不省人事目直上視驚風痰壅睡中驚跳夜卧不安啼哭不止客忤內癆凡一切驚疾初生至長及奇怪形狀不能辯名者併大人因驚憂勞損卧不安寐怔忡恍惚恐怖顛狂婦人產後不語皆憤啼笑

蛇含石微火煨熟炭火煨紅米醋淬再煨再淬七次研細水飛澄去水曬燥重研萬下肆兩代赭石研

如辰砂水飛重研青礞石水飛重研南星牛膽製過茯神各伍錢殭蠶壹錢蟬退去土白附子使君子天麻各木牛黃各分麝香分冰片分右研勻煉蜜和丸金箔為衣大人二錢小兒一錢

嬰兒三五分噤心薄荷湯化服金銀煎湯尤好

抱龍丸治傷風寒暑發熱變蒸驚風痰壅喘急咳嗽等證

後調理初生至長微有不快即宜服及大人風痰等證悉效

南星 服月牛膽製 天竺黃 另研 硃砂 水 雄黃 各 甘草 各

麝香 五分未出 加牛黃 陝西 琥珀 各五分 右和勻取臘

雪水或早首汲井水另煎甘草汁和丸如艾實大每服一丸

臨睡薄苛湯化下病急多服傷風感寒姜蔥紫蘇湯下取汗

大人每服三五丸如風痰用竹瀝入姜汁數匙化服 姜湯亦可

慢驚

是證非因急驚變成必因大病之後吐瀉之餘或久痢滑脫或

氣虛暴吐或久嗽成痢或峻攻癖積感受之由不同無出脾胃

虛損風邪相乘肺為脾子子母皆虛津液不運變為痰涎喉如

簡明醫教 卷之七 五

鋸聲昏睡盜汗睛露唇掀煩躁引飲四肢浮腫大小便秘口鼻

氣冷時復癱瘓 似抽搦 胃痛啼哭如鴉聲若髮直睛定便溺

自遺形骸似癱者並皆不治治宜回陽補氣 理脾開胃有驚過

主方 人參 白朮 茯苓 甘草 天麻

礪蠶 白附子 木香 另 寒加乾姜 甚加附子 寒嘔

加丁香霍香 痰嘔加陳皮半夏 久瀉加肉果訶子 痰

多加膽星 右加姜棗水煎服或加全蝎 洗 共為細末調服

夜啼

有陰陽二證陰者臟冷也夜則陰盛與冷相搏陽者臟熱也夜

則陽衰皆致腹痛而啼先宜母吮嘔屈心次服主方

主方 當歸 赤芍 五味子 白朮 各伍 茯苓

陳皮 官桂 甘草 各一 水煎服

治一百二十日內啼 蟬退 四十九個 為細末鈎藤煎湯下

又 燈花 茶 硃砂 分 為末蜜調兒睡抹唇內或乳頭上

客忤

小兒心虛神弱生人卒至或父母家人遠來未宜見見恐經履

神廟喪門墳塚病家有帶來穢惡之氣或飲酒騎馬汗氣胸犯

於兒面變五色口吐涎沫喘急腹痛倒仆不省狀若驚癲厥來

急數口中有惡響左右有小泡即以竹刺潰之或銀簪刺或指

甲摘破治宜辟邪氣扶正氣鎮心安神之藥如造命丹蘇合丸

簡明醫教 卷之七 五

玉樞丹 可服 或燒沈檀速降諸香或艾灸百會印堂二穴有因

小兒心愛之物大人強取之則神迷物遷昏憤口噤宜先與其

物次服安神鎮心之藥如無前項藥只用煎方 百會穴頭頂心

主方 人參 茯苓 麥門冬 天麻 鈎藤

藿香 紫蘇 遠志 甘草 甘草 等 水煎成調硃砂服

又方 龜心土 或兩 鷄子 一枚 和水少許調勻

天鈎

由乳母飲酒食肉房勞熱毒之氣流入乳中兒飲之傳其熱毒

津液成痰蘊積于內外加風寒致壯熱驚悸眼白眇騰手足抽

掣或啼或笑甚則爪甲皆青如祟之狀脈大而實宜解利風熱

主方 鈞藤 人參各五分 犀角各五分 天麻 全蝎洗

甘草各五分 加研細菴豆十四粒細茶三分水煎服風加荆芥

有痰神昏天竺黃辰砂雄黃各壹分 枯礬半壹分 研細調入煎藥服

內鈞

腹痛多啼汗出發青咬乳睛慢流涎或唇焦黑囊腫偃僕眼內

紅筋虎口脉絳侵入掌中治宜造命丹或利驚丸二方並見急驚

主方 桃符研末 乳香壹錢 銀硃伍分 蒜壹個煨 搗九黍米大每服伍分 薄荷湯下

痢證

經曰痢為神不守舍謂神亂也皆由驚動臟氣不平鬱而生涎

閉塞諸經厥而乃成或母胎中受驚或感風寒暑溼或飲食不

節逆於臟氣而成者有矣其痢有三曰驚曰風曰食驚痢起於

驚駭風痢起於衣服過暖熱極生風切時曲指如數物而作 食痢由於乳

食太過吐而發熱其候瞪眼直視面目牽引口噤涎流肚腹作

脹手足抽掣項背反張時作時止治宜順氣豁痰及平和氣血

之藥調下蘇合丸或預服五痢丸以造命丹為主

主方 人參 石菖蒲 白蘚皮 茯神各伍分 遠志內伍分

麥冬伍分 犀角研 石膏研 甘草壹分 水煎服

五痢丸 治小兒諸痢及大人顛狂等證

鉛壹兩 錫壹兩 水銀伍錢 鈎壹兩 珍珠壹兩 雄黃壹兩 硃砂壹兩 俱水飛研萬下和前再研密丸麻子大每服一丸全與銀煎

牛黃膏 治風癇抽搐潮熱

膽南星 全蝎洗 蟬退去足各壹錢 殭蠶去嘴壹錢 白附 防風

天麻壹錢 牛黃壹錢 右為細末棗肉丸如小豆大用荆芥湯調服

傷寒

小兒與大人無異初感畏寒宜散邪消化乳食如熱邪傳裏嬰

兒亦舌上白胎揚手擲足怕熱不惡寒可與白虎湯大便閉結

小便短赤承氣湯下之若手足涼口氣冷頭額冷汗面色黑暗

大便瀉青此為陰證須用溫裡之藥治方與大人相同但藥劑

之分兩輕少耳凡天行痘疹時從痘疹門用藥微感風寒宜抱

龍丸惺惺散治之如遇變蒸之期但宜調護不藥可也

簡明醫教

卷之六

十八

中暑

小兒身熱汗出口渴吐瀉霍亂等證治宜辰砂五苓散治伏暑

吐瀉渴煩五苓散 六和半夏湯霍亂 六一散加天砂

溼證

陰雨地溼坐臥感受或溺汚衣被皆能致之或見沉緩身體煩

痛發熱惡風而多汗小便不利大便溇泄日久則子垂足腫入

臟則瘖啞不言治宜疎利小便其溼自除兼健脾土及峻攻之

主方 白木伍分 蒼朮伍分 猪苓伍分 澤瀉伍分 乾姜壹分

車前伍分 赤茯苓 木通壹錢 右加燈心十莖水煎服 寒溼去木通加厚朴甘草 嘔加陳皮半夏藿香 腫脹加大

諸熱

小兒純陽臟腑易熱。陰陽氣遷。薰蒸於外。致身熱也。肝熱則眼腫。腎瘴。心熱則舌瘡。溺赤。肺熱則鼻衄。便秘。脾熱則唇燥。流涎。胃熱則口臭。作渴。腎熱則耳瘡。膿出。若夫五臟蘊熱。面赤煩躁。痰涎壅盛。大抵小兒為病。多因熱極。生風。風生驚。故有熱即當清之。此按本塞源者也。然小兒發熱。更有多種。患潮熱者。發歇有時。驚熱者。顛叫恍惚。夜熱者。夕發旦止。邪熱者。晝夜熱盛。實熱者。壯盛壅滯。虛熱者。氣血俱虛。食熱者。乳食致傷。疳熱者。肚大形瘦。煩熱者。身躁心煩。積熱者。頰赤口瘡。風熱者。汗出惡風。容熱者。去來不定。癰熱者。腹中有塊。痰熱者。涎嗽喘急。脈浮沉

簡明醫教

卷之十

十九

皆數治宜隨證用方。幼科雖另門類。方藥亦可與大方參用。

主方 治肝火 防風

當歸

川芎

羌活

薄荷

大黃 煎酒

龍膽草 梔子

甘草 分

水煎或為末茶調下

心熱導赤散。脾熱瀉黃散。胃火加石膏。肺熱瀉白散。加芥天粉。防風茯苓。腎熱耳膿通聖散。四方並見火門。潮熱壯熱夜熱宜後方。

又方 治三 種熱

柴胡

骨皮

知母

麥門冬

半夏

赤茯苓

黃芩

甘草 分

加姜棗水煎服。燈心可加。

驚熱 從驚 風治邪熱 從傷 寒治實熱 涼膈散 方見大門 虛熱 四物湯 加黃芩 黃連 人參 黃芪 甘草 煎酒 食熱 從傷 寒治疳熱 從傷 寒治風熱 從傷 寒治客熱 飲子

連人參 黃芪 甘草 煎酒 食熱 從傷 寒治疳熱 從傷 寒治風熱 從傷 寒治客熱 飲子

方見 煩熱 生地木通 當歸 梔子 黃芩 甘草 煎酒 積熱 保和丸 方見大門

痰熱抱龍丸

方見小柴胡湯 往來寒熱 白虎湯 治發熱 參蘇飲 方見傷寒 門

牙疳

走馬牙疳者。多因氣虛受邪。及有宿滯不去。積溼成熱。氣蒸斷齒。或食甜酸鹹膩。或瘡疹餘毒不散。致牙焦黑爛。有潰穿腮頰。傷人者。治宜內服主方。蘆薈丸。外以敷藥細末。淡鹽湯絞口。淨

主方 蘆薈 龍膽草 史君子 麥牙 檳榔

黃連 煎酒 蘆薈 炒取 人參 木香 各錢 胡黃連 錢

右為末。豬膽汁調糊丸。如黍米。大每服六十九。空心米湯下。

敷方 鷄肫內黃皮 陰乾為末 二錢 白芷末 錢 銅青 分 麝香 分 敷患處

又方 鷄肫皮 燈上燒存性 研細入黃柏末 枯礬 麝香 少許 和勻 米泔攪淨 口敷之

簡明醫教

卷之十

二十

又 青黛 黃柏 五倍 枯礬 分 右為末 米泔攪口淨敷

又 樛斗殼 二個 盛鹽對合 炭火煨透 放地上 許米泔攪淨敷

脾胃

小兒臟腑怯弱。乳食過度。則脾胃受傷。疾病生焉。而黃肌瘦。肚大青筋。嘔吐瀉泄。腹痛積滯。皆所不免也。其脈關部弦。效治宜補脾益胃。消食化積。脾胃以消為補。在小兒尤宜用之。

主方 白朮 茯苓 陳皮 山查 神麩

麥芽 炒研 右水煎服。或為末。蜜丸。彈大。每服一丸。米湯化下。

腹痛加木香砂仁厚朴 虛加人參黃芪甘草 少加陳皮

虛冷加乾姜 瀉加猪苓澤瀉甚加肉果 嘔加半夏薑

脹加香附腹皮 積塊加三稜蓬朮檳榔

痢疾

小兒油膩生冷乳食太過則脾胃不能運行痢疾之證成矣或

因缺乳飲食太早而成則腹大青筋大便澹泄小便白色上熱

口臭髮豎毛焦四肢瘦怯甚而項小脚弱目澁白膜耳鼻生瘡

尤有丁奚哺露無辜等痢皆由微漸而起治宜消積除熱理脾

主方 胡黃連 川黃連 山查 麥芽 神麩

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 檳榔 木香

蘆薈 使君子 右為細末煉蜜丸如彈大每服一丸空心

米湯化下熱退去胡連瀉加肉果服至病去七分即止另以

簡明醫說 卷之六 三十一

後方服 白朮 白茯苓 懷山藥 山查 神麩

麥芽 黃連 龍膽草 虛加入參 製服法同

嘔吐

嘔者有聲吐者有物凡乳食不宜過飽飽則傷胃有感外邪而

成者熱吐則頭額溫嘔黃涎唇乾口渴五心煩熱小便赤色多

是得於暑月其脈洪數冷吐則清涎夾乳小便清長面色皸白

得於胃寒或乳母當風乳兒飲之則冷氣入胃而作其脈沉遲

有因痰吐必夾痰涎因食吐必夾食治宜隨證用藥

主方 半夏 陳皮 茯苓 厚朴 藿香

蒼朮 山查 麥芽 神麩 加生姜煎入姜汁服

寒吐木香砂仁甚加丁香白蔻 熱吐黃連 乾葛竹茹枳

杷葉 痰加南星枳實 虛加入參白朮 夏月香茹扁豆

泄瀉

此證有寒熱食驚風暑溼等多種冷瀉則肚痛穀完不化

瀉亦有不化者 瀉亦有不化者 瀉亦有不化者 瀉亦有不化者

全可方與乳熱瀉大便黃赤小便短澁口渴渴與溫米湯薄粥

湯飲傷食瀉腹脹噯噯不食先須消導去積次補脾胃驚瀉則

大便菜色睡中驚跳當止瀉兼鎮驚之藥風瀉春月多兼傷風

咳嗽暑瀉夏月口渴欲飲水小便澁少而垢煩躁溼瀉着冷腸鳴

腹痛肢寒脈微緩順洪大逆治宜隨證加減

簡明醫說 卷之六 三十一

主方 白朮 茯苓 豬苓 澤瀉 厚朴

陳皮 甘草 右加姜一棗一水煎服 寒加木香砂仁乾

姜藿香 熱加車前黃連黃芩木通 夏月口渴小便短赤

加香茹 食積加山查神麩麥芽 久瀉加人參訶子粟

香橘餅 治小兒泄瀉傷食冷積腹痛及痢疾

厚朴 神麩 麥芽 木香 陳皮 青皮

右為細末煉蜜丸如彈大每服一丸空心姜米湯痢白湯服

夏月水瀉 滑石 香茹 豬苓 澤瀉 車前

益智 白朮 茯苓 升麻 甘草 水煎服

熱瀉舌胎口渴 茯苓 黃連 肉果 白朮

人參伍分 香附叁分 麥冬八分 甘草叁分 加燈心煎服

霍亂

脾居中州。乳食入胃。脾主運化。分其清濁。乳食不節。致傷脾胃。不能運行。則清濁相干。或兼外邪。吐瀉作矣。先瀉後吐。乃脾胃虛寒。必先白水。吐亦不多。氣緩神倦。額汗腹痛。六脉沉濡。先吐後瀉。乃脾胃有熱。氣促唇紅。面赤脉洪。渴飲水漿。與冷米湯或兼吐痰。有傷風吐瀉兼咳嗽者。有暑月傷暑煩渴者。有伏暑厥冷者。大抵夏至後熱多。大暑後相半。立秋後寒漸多矣。

主方 蒼朮製 厚朴 陳皮 甘草熟生 半夏

藿香 茯苓 熱加白朮猪苓澤瀉去蒼朮 虛寒厥冷加乾

簡明醫教

卷之六

三三

姜白朮去 虛加入參 暑加香薷扁豆滑石 風寒加

紫蘇白芷 食加神麩麥芽 加姜棗水煎乾霍亂與淡味湯得吐瀉痛止

痢疾

多因夏月食生冷油膩難化之物。或乳母縱食以傳之。必先服通導之劑。次及調理。方與大人同。但劑分輕重耳。若謂小兒不敢用大黃等藥。且以止瀉之藥塞之。誤兒性命矣。但宜大人方減半量與服

腹痛

周內無故啼哭不止者。腹痛也。面慘唇青。瀉利清白屬寒。烘熱綿裹。腹乳母多飲姜湯。如面赤唇紅。大便不通。得煖啼甚者。屬熱。勿強就煖。周外多因食積所致。脉細小順。實大逆。

主方 蒼朮 厚朴 陳皮 茯苓 藿香

半夏 甘草 姜棗煎服 寒加乾姜炮 肉桂 熱加白芍

黃芩去藿香 大便不通少加大黃 食積加山查麥芽

腫脹

脾虛則土不能制水。反得浸漬於土。滲於皮膚。注於肌肉。而為腫脹也。其狀目胞上下微起。肢體重着。小便澀黃。大便滯泄。皮薄而光。手按成凹。脉浮大者順。沉細者逆。

主方 赤茯苓 白朮 陳皮 大腹皮 澤瀉

猪苓 木通 小便少加滑石車前子 氣喘加蘇子桑皮

羅荀子枳殼甚加葶藶 痰加半夏 腹脹加厚朴草菓木

簡明醫教

卷之七

三十四

香 氣滯加香附三稜蓬朮 加生姜皮燈心水煎服

蛔蟲

臟腑虛弱。或食肥甘。因寒因熱。皆能作痛。高聲啼叫。貫傷心者。死。只看人中鼻額唇口一時皆黑。脉大者是。

主方 烏梅 乾姜炮 黃連 川椒 細辛

檳榔 苦練根皮 腹痛加芍藥 甚者加使君子水煎服

咳嗽

小兒之嗽。多因感冒風邪。傷於肺經。或因衣衾太厚。肺家壅熱。或因過食鹹酸而致。受病不外此三種。最宜慎之。蓋兒臟腑脆。難於速效。遷延日久。變為頓嗽。發則捏拳頓足。面赤淚流。飲食

吐出甚是有血遂成頑疾或變肺風痰喘有至危殆者皆由微

漸成外感宜參蘇飲壅熱宜芩連二陳湯之類

主方 嗽久 貝母 天門冬 麥門冬 款冬花 紫苑

百部 百合 五味 瓜蒌仁 蘿蔔子 水煎服

氣喘加桑皮蘇子 枳殼 痰多天粉 半夏南星海石

潤肺加杏仁 肺火黃芩枇杷葉 竹瀝 利肺 赤苓

止小兒嗽 雪梨 白蘿蔔白果 白蘿葡白果

瘧疾 小兒瘧疾緣乳母解脫胃風或感暑溼尤多因於傷食用藥必

兼消導與大人同治法初患者始以散邪發表次清解表

漸輕自止尤無後患若驟截之即臍腹脹大而變諸患不可測

度如微見腹脹仍服散邪之藥服神佑丸

主方 柴胡 羌活 蒼朮 川芎 白芷

半夏 陳皮 防風 紫蘇 細辛 甘草

右加生姜三片葱頭二個水煎熱服取微汗至足 有食加

山查麥芽 汗後熱多清脾飲加猪苓澤瀉

黃疸 凡皮膚面目俱黃者黃病也一身面目指甲皆黃大小便澀滯

如屋塵色着物皆如染黃者黃疸也百日半歲身微

黃疸 凡皮膚面目俱黃者黃病也一身面目指甲皆黃大小便澀滯

如屋塵色着物皆如染黃者黃疸也百日半歲身微

黃疸 凡皮膚面目俱黃者黃病也一身面目指甲皆黃大小便澀滯

主方 山茵陳 梔子仁 川大黃 猪苓 白木 茯苓

茵陳 黃連 黃芩 梔子 水煎服

陰腫疝氣 多因居處近于溼地或坐于土石上致感風寒溼氣或內有溼

熱常坐冷處寒溼凝結內熱為外寒所束溼熱相搏為腫為痛

或啼叫怒氣閉擊抑遏不散聚于臍囊加以水竇不行即成

主方 澤瀉 猪苓 白木 茯苓 牡丹皮

防風 官桂 加生姜水煎服 又 防風丹皮為末調服

又方 牡礪研極細末津唾調或鷄子清調敷腫處

小兒腹痛腰曲乾啼額上有汗口閉脚冷上唇乾燥是其候也

主方 烏藥 當歸 芍藥 吳茱萸 陳皮

香附 茴香 右加生姜三片水煎服 痛加玄胡素

乳香木香 或用乳香沒藥木香為末調服

諸汗 兒氣血嫩弱膚腠未密衣衾太厚臟腑生熱心為熱邪所勝津

液不能內藏蒸出肌體而為汗也或傷冷熱陰陽不和津液外

泄或諸病後虛汗宜養心氣實腠理如上至頭下

主方 黃芪 生地黃 當歸 酸棗仁 牡蠣

黃芪 生地黃 當歸 酸棗仁 牡蠣

黃芪 生地黃 當歸 酸棗仁 牡蠣

黃芪 生地黃 當歸 酸棗仁 牡蠣

黃芪 生地黃 當歸 酸棗仁 牡蠣

黃芪 生地黃 當歸 酸棗仁 牡蠣

茯神 甘草 炙 右加燈心水煎調水飛砂臨睡服

又方 治虛 人參 當歸 黃芪 水煎服

又方 夜過 龍膽草為末醋糊丸如桐子大每七丸米湯化下

又方 汗 黃連牡蠣貝母 各壹兩 米粉半升和勻絹囊盛撲遍身

汗出處 又蒲扇燒灰撲 又浮麥煎或黑豆煎飲

遺尿

由膀胱冷不能約於水故也。尿淋者膀胱與腎俱冷 夜屬陰故

主方 雞肫皮 炙 牡蠣 茯苓 肉桂 桑螵蛸

龍骨 右為末每服二錢空心姜棗湯調下

又方 破故紙 炒 研為末每服一錢熱湯調下

簡明醫錄 卷之六 壬七

又方 益智仁白茯苓 等分 為末每服一錢米湯調下

又方 五倍子半生半炒熟為末米糊丸每服一錢白湯下

脫肛痔證

皆因久患瀉痢得之大腸頭自糞門出亦有因大腸熱而出者

宜用葱湯蒸洗令軟送上或五倍子煎湯入明礬薰洗而上

主方 龍骨 訶子肉 赤石脂 粟殼 水淘去筋醋

沒石子 或 右為末每服一錢空心米湯調下 熱加苓連

又方 防風荆芥煎湯洗蜜陀僧白礬冰片為末敷

又方 蓖麻子研成膏貼頂上腸入即洗去 或苦參煎湯洗

又方 腸頭作瘻即有虫以生艾川練根煎湯洗

痔方 黃丹滑石 右為細末水調日上五次托法 脫肛大人

五軟五硬

良由父精不足母血不充生後筋骨痿弱頭項手足身體軟弱

名五軟有頭硬不能俯視氣壅胸膈手足心冷如石而硬名五

硬又有肚大青筋而不寬宜去積之藥治之 瀉青丸能治

主方 脚軟立 虎脛骨 生地黃 酸棗仁 茯苓 防風

川芎 牛膝 肉桂 等分 右為末蜜丸麻子 或 木瓜湯

又方 五軟 附子 南星 右為末姜汁調敷膝脛

又方 白虎證 五加皮為細末酒調下仍以此末酒調敷頭骨上

簡明醫錄 卷之六 壬八

小兒病此如太歲在巳白虎在辰方餘倣此觸犯之 等

主方 安息香 白 沉香 降真香 檀香 乳香 人參

茯神 酸棗仁 甘草 等分 麝香 少 為末每五分金銀湯調下

龜胸龜背

胸高腫突此肺家受邪喘久所致或乳母多受五辛者背高偻

僕此為風寒入脊骨或坐早而然多成痼疾間有灼艾收功者

主方 百合 天門冬 杏仁 木通 桑皮 石膏

大黃 煨 甜葶藶 隔紙 右為末蜜丸黍豆大 每服五丸臨

又方 枳殼 防風 羌活 前胡 麻黃 當歸

大黃 煨 右為末酒糊丸如黍米大食後未湯送下

語遲

言乃心之聲。兒在胎時。母驚邪乘心。兒感母氣。心宮不守。舌本不通。故四五歲不言。

主方 石菖蒲九節 人參 麥門冬 遠志 當歸

川芎各錢 乳香者妙 硃砂伍錢 右為末。蜜丸。麻子大。每十九臨臥米湯下

齒遲

齒乃骨之餘。骨乃腎之候。腎氣不足。骨痿少力。故齒遲生。

主方 川芎伍錢 當歸 白芍 生地黃 山藥

甘草各錢 右為末。每服一錢。食前白湯調下。更調敷齒根。

行遲

簡明醫教 卷之六

五

周歲膝骨成。乃行不能行者。由父精母血虛弱。胎氣不強。軟弱

主方 五加皮 川牛膝 宣木瓜分 右為末。每服一錢。入

好酒調空心米湯送下。未効服大補氣血滋腎壯筋藥。

鶴膝

稟受不足。故肌肉瘦薄。骨節呈露。狀如鶴膝。亦腎虛髓虧。日乾

主方 熟地四兩 山茱萸 山藥各錢 白茯苓 澤瀉各錢

丹皮壹兩 鹿茸對 川牛膝兩 右為末。蜜丸。空心酒或白湯下。

赤遊丹毒

由乳母食酒麪煎炙熱毒。與夫烘衣兒穿。或發於手足。或發於頭面胸背。令兒躁悶。腹脹如火。痛不可言。入腹者死。周內不可

頻浴。溼熱之氣。鬱蒸不散而成。或片片如胭脂塗。腫而壯。執

急用蜈針法得生。姑以法附後。極危篤始用。萬不可輕施。

主方 防風 荊芥 牛蒡子 犀角另 梔子

木通 黃芩 連翹 玄參各等 甘草半

右加竹葉水煎空心服。熱極加大黃少錢 去之。加麥冬天粉。

數方 大黃末二錢。菘豆粉。姜汁薄。荷汁蜜調塗患處。

又方 滑石寒水石等分 為末。水調塗。或用大黃錢 土硝五分 敷

蜈針法 先用溼紙搭毒上看腫處。一點先乾。即是正頂。以大

筆管一個。安于頂上。以水蜈一條。于管中。頻以冷水灌之。吮

其膿血。其毒自散。如毒甚。可再用。若不去。十無一生。血出不

簡明醫教 卷之六

三

止藕節泥塗之。又以磁器打碎。鋒刺去惡血。亦妙。

又方 竈心土。研細末。新汲水調塗。乾再敷。

癰毒腫癰

皆由氣血凝滯。而蘊熱之氣乘之。故結聚成毒。凡始初微見。週

遍起。急用不語唾。夜半頻塗。即消。不退。用萬病解毒丸。磨塗患

處。并以酒磨服。立効。化毒丹方見 唾。吮掌後。多揉至散。

主方 漏蘆 麻黃 連翹 升麻 黃芩

甘草 芒硝各錢 白欬半 大黃壹兩 右為末。每二錢。水煎服。

圍方腫毒 一切 南星 草烏 赤小豆 黃柏等分

右為末。如紅腫。以醋調白腫。以姜汁調。圍患處。四畔。

毒丸 治兒一切瘡腫癰毒丹遊周身痒瘡及痘疹餘毒

玄參 連翹 升麻 黃芩 芍藥 當歸

羌活 防風 生地 荆芥 甘草 等分

右為末蜜丸如彈大每服一丸薄荷湯化下

青解丸 治兒五臟積熱毒氣上攻胸膈喉痛頭面瘡疹口唇

寒水石 石膏 青黛 兩

右為極細末水浸蒸餅打糊丸如芡實大每一丸薄荷湯下

又方 大枳殼 石上磨平以麩糊搭四圍粘在癬上自破

膿出盡更無癢痕 又軟癬久不愈用新磚為末醋調敷

懸癰

簡用醫效 卷之六

三

初生口內上腭及舌上有泡如瘡或如蘆籜有此急以針用綿

裏雷針尖如粟米許刺泡上出黃赤血汁用淡鹽湯拭淨次以

硃砂 硃砂 各伍 冰片 研勻蜜調敷患處嚙下無妨若再發仍

用刺法及敷藥即安矣更以涼膈散服之尤佳

停耳

耳者腎之候小兒腎氣實其熱上攻於耳由津液壅滯為膿汁

出矣亦有沐浴水入耳中傳於氣血釀成有久不愈變成耳重

主方 防風 荆芥 薄荷 梔子 黃芩

玄參 黃柏 蔓荊 連翹 甘草 水煎服

吹藥 枯礬 龍骨 黃丹 乾胭脂 麝香 少

右研先用綿紙條捻膿水乾吹以蘆管或鷲毛管吹入

又方 枯礬 乾胭脂 麝香 少許研勻

耳內外爛 黃連 蛇床子 右為末入輕粉吹入外油調

白瘡瘡

胎中熱毒或生後感熱毒上攻頭額成瘡致白屑

敷方 瀝青 苦參末 川椒末 水銀 杏仁 研如

百草霜 先入栢油少許百草霜杏仁同水銀研不見星

再入眾藥添栢油研如糊 刺髮搽之忌發氣熱毒之物

諸瘡

小兒瘡瘡皆因乳母飲食熱毒七情之火發於內為驚痰身熱

簡用醫效 卷之六

三

發於外為瘡瘍疥癬必先令乳母服清火解毒煎餌小兒服解

毒丸化毒丹之類 方見 次用敷藥 見前

月蝕瘡 小兒指月 薔薇根 地榆皮 輕粉 右研末敷

眉瘡 上眉 用傾銀確研為極細末加輕粉許麻油調敷

鼻匿瘡 鼻外四 枯礬 海螵蛸 雄黃 赤石脂

鉛粉 黃丹 孩兒茶 輕粉 右研極細末

鼻下爛 鉛粉 澤瀉 鬱金 山梔 甘草 右水煎服

火灼瘡 小兒遍身赤 木鱉子 對半切開用香油一鍾煎至木

鱉焦 切開無 濾淨碗內 夜出火毒 鷲毛搽患處

魚臍瘡 頭黑深黃水 蛇退燒存性為末鷲子清調搽

瀉膿瘡膿流主 萊豆粉兩 黃丹錢 枯糝錢 輕粉錢 香油調搽

賴頭瘡生瘡 牛皮烟膠黃丹枯糝各錢 輕粉香油調搽

滿頭遍身瘡爛癢痛 黃連末伍錢 蛇床子末貳錢 五倍子末壹錢 輕

粉分 右研勻先以荆芥葱椒煎湯充化白礬朴硝各壹錢 洗淨

次將前末香油調搽 又 練樹根皮炒研末猪油調搽

頭瘡 栢油山西來者 搽或調苦杖根末搽前藥用栢油調尤効

頭至足諸熱瘡 滑石水飛壹兩 黃連末貳錢 大黃末黃栢末各壹錢

青黛貳錢 研勻冬青葉搗汁調搽

周身有膿結靨諸瘡用外科萬靈膏加乳香銀珠等者難貼即効且不汚衣

諸瘡久不愈 白膠香即根樹脂五錢 輕粉貳錢 右研勻細末搽

簡明醫發 卷之六 三五

癬瘡 羊蹄根明礬同搗絹包搽或川澤皮醋磨或馬鞭草葉搽

漏瘡 松香煨研末 頭髮灰 黃丹分 右研勻油調敷患處

痘疹總要

夫太極而生兩儀人道而有夫婦男女交合無慾不行無火不動恣情縱慾而火毒遺於精血之間小兒痘疹之毒由此而成然痘之與疹雖皆胎毒原同而證異孕成之初先有臟而後有腑腑屬陽而臟屬陰痘在裏從肌肉內起故難疹在表從皮膚間出故易痘屬陰陰主靜有形有汁顆粒不動而合偶數疹屬陽陽主動有形無汁乍出乍收一日三見三日九發而合奇數也其見證之不同者痘則首尾不可吐瀉能進飲食為吉如吐

瀉乃毒火盛極而攻衝不食由毒火鬱遏而滯滯藥不可治疹

則吐瀉竝作飲食不進為吉得吐瀉則毒火由此而泄不食則

空虛而毒火疎通痘宜益氣生血藥用補托而求肉實疹宜養

陰制陽藥用解散而忌肉實痘則有平順有虛寒有實熱有血

熱疹則皆屬實熱毒火一從清涼忌辛溫藥痘以頭面多為逆

疹以頭面多為順皆宜房室固密衣食厚覆常令和暖則勝理

疎豁而易出又須嚴守禁戒如或風寒外襲觸犯避忌皆能以

輕變重以安易危但疹之日數少痘之日數多若謂痘重而疹

輕不知疹之變態作於頃刻危亡之機甚於痘也

論痘 即天毒 百歲卷

簡明醫發 卷之六 三五

凡看痘之法治痘之方當知有順逆險三種之分順候但宜謹

慎調理不必服藥如不宜表而表則成班爛難收之患不須補

而補則有助毒發癰之愆或痘未出而藥用清涼痘得寒而反

為凝滯毒未解而妄行溫補亦得熱而反不化漿轉增他劇豈

非藥之過歟設謂痘輕不加敬謹有犯禁戒變而為重誠非失

藥之咎矣逆候服藥誠然無功若以仁術論之姑與立方勉強

治療十中倖得生一寧非無量功德乎險證全藉藥餌合宜調

理謹慎父母保護如法則從順不爾則從逆矣其始也必遇痘

火太過熱毒流行則痘毒因之而發為證之初與傷寒相似發

熱煩躁面赤唇紅頭疼身痛噴嚏呵欠咳嗽痰涎有因外感風

有因傷食吐瀉。有因時氣傳染。有因跌撲驚恐。致成諸痘疹之毒。伏於腎經。痘毒既發。腎經應無證矣。故必預驗耳冷。翕冷。尻尾足冷。是則腎經無証。若三處熱而腰疼。凡痘中。指冷。鼻尖。耳後筋紋。淡紅。少而輕。深紅。多而重。眼目困倦。而額有紅紋。皆出痘之候。

痘疹無醫

若鄉居。若宦邸。無醫之處。忽患痘與疹。最宜房室固密。謹避風寒。衣衾溫厚。懷抱和緩。父母乳母。須赤身與臥。令患兒融和如春。大助發生之力。又不宜烈火薰蒸。以助火毒。經云。寒主收引。人之腠理。即毛。暖則疎。通快暢。在痘則易於發出。起脹貫膿。收飲結靨。落痂無滯。在疹則依時發出。依時收斂。三日毒盡。疹散。

簡明醫教

卷之六

三五

班消。寒則閉塞。不通。在痘則不能盡出。有陷伏內攻。倒靨等證。作焉。在疹則發不透徹。有喘急腹脹昏亂等證。生焉。蓋痘之與疹。內之本原。雖有輕重寒熱之殊。外之調護。當知宜忌。始終則一。倘遇寒天。和暖最為急務。若逢暄日。清涼必為要論。用意調理。可保無虞。今之變壞者。原犯逆證者有之。常因風寒劇犯。而夭枉者亦多矣。深可痛惜。大凡兒至十歲外。氣血壯於飲食寒暖。自知保護。肯聽教戒。保全為易。所以嬰兒值遇痘疹。天行勿令出外。恐傳染流殃。及避風寒。節飲食。更令懼悅。勿焦煩。怒哭。致動心肝之火。及跌撲驚恐。庶可延免。

發熱三朝證治

順 身熱和緩。不時發驚。動也。神色清爽。氣息和平。胎臥安寧。飲食不減。二便如常。不必服藥。疑似難明。通治方一劑。略表微汗。令痘易出。若因風寒。汗出即愈。但令甫足。微有汗。身體壯熱。乍盛乍輕。神昏汗出口渴。嘔瀉。飲食減少。或二便秘澀。宜服散邪發表之藥。或發驚搖。宜服平肝木。利小便之劑。勿服涼心藥。恐寒開腠理。

主方 升麻 乾葛 前胡 桔梗 山查 陳皮
枳殼 川芎 羌活 等分 甘草 減半 水煎服 熱甚加木通防風聲音忽變倍。甘草桔梗加玄參牛蒡荊芥。或加清肺飲。熱盛合導赤散。或消毒飲。方俱見後。

簡明醫教 卷之六 三五

逆 身發大熱。絕不飲食。但宜清毒。大勿誤用。成脹啼叫。喘急。悶亂。或飲食入口。即大吐不止。此乃毒火入心。或泄瀉。亦宜升提發表。或腰疼腹痛。不能站立。此乃毒火入腎。不能能飲食。有食者。大宜清涼解毒。宜出痛止。頭面一片如胭脂。及照心。胸肉裏。或週身有紅塊者。死。頭溫足冷。昏悶如痴。凶。

報痘三朝證治
順 發熱始終溫和。三日見痘。標於年壽。鼻準。人中。口角。唇吻。腮頰。兩耳。面之下部。單粒圓綻。如珠如粟。陸續增出。大小不等。淡紅潤澤。頂尖光彩。疔手出快。根窠紅活。頭面稀少。胸背全無。乳食如常。神氣清明。四肢溫和。二便如前。不必服藥。嚴

全無。乳食如常。神氣清明。四肢溫和。二便如前。不必服藥。嚴

守禁忌依法調理

胡荽懸掛前併作湯飲切避風寒 毋令痘兒怒氣助火 飲

食宜淡 忌辛辣甘甜鷄魚猪肉棗柿栗葱蒜醋及荔枝與

酒皆能難化厚味房中宜燒乳香若未大棗老幼伏侍 戒少

年男婦忌犯房事月經川東向上炒生人 家人遠歸

糞穢氣 服臭 瘡毒人 蚊烟 吹滅燈燭 誤燒髮骨

煎炒氣 葱韭腥氣 麝香 叫罵 梳頭 搔癢 荒急

言 飲食調樂 掃地

輕變重 不忌口常泄瀉日風寒犯房事過服涼藥穢氣相觸生人輒至

重變輕 節飲食避風寒常和煖嚴禁忌用藥得宜能戒煎炒調理謹處

簡明醫教 卷之六

陰 壯熱二日見痘氣粗胸滿煩躁不寧飲食減少口渴泄瀉

痘標叢出見於額天庭山根印堂眉稜方廣兩額耳後項

頸面之上部心胸稀少痘粒雖多而成類分頭雖瑣碎而陸

續增出但乾枯而不紅潤或昏暗而帶滯澁或夾疹惟表痘出而疹

自或見乾紅紫黑大便秘結微下之不為惡毒火不痘色紅

紫忌升麻但宜發表勿謂有大用忌涼藥藥則痘或有虛候

忌補氣藥參芪補則熱毒愈甚或吐血者服藥可愈單前地

類 痘至脚底方為出齊

主方 川芎 前胡 桔梗 山查 陳皮

木通 枳殼等 甘草減 水煎服 大便不實去枳殼熟

甚加乾葛根後刺加防風牛旁蟬退色紅加生地清熱紅花

如不甚熱而容青慘兒晝白精神懶怯痘出不振呢乳便澇瀉

屬虛寒證前方去前胡木通枳殼加白芷瀉加白木生姜煎

如毒火擁遏身熱向赤毛焦皮燥睡時不寧

防風 荆芥 桔梗 川芎 連翹 黃芩

牛旁子 甘草 生地 葛根 羌活 木通心

或升麻葛根湯合導赤散隨派羌活散鬱湯方見後

如初發壯熱體紅臉赤毛焦色枯渴飲水日

川芎 桔梗 木通 連翹 丹皮 赤芍

歸尾 紅花酒 大腹皮 生地黃 加燈心煎熱極便實

簡明醫教 卷之六

特加黃湯不止加大粉滑石 或退火回生丹但乾紅紫色二

便不利即宜疎利導赤散加酒製苓連大黃或四順清涼飲

不然後成黑陷出之大壞毒火極盛者用此

逆 大熱烙手一日見痘一齊擁出如痞如麩如蚕種稠密成

片不分顆粒紅紫焦枯報痘即叢出見於天庭方廣司空太

陽毒邪太盛妄參於面之上截陽位頭額多謂之蒙頭頭項

多謂之瑣項兩腮多謂之托腮口唇多謂之攢口或隱隱不

起或出而復沒澇語狂言胸滿喘急飲食不進唇焦音啞不

能言語眼目無神大小便秘大渴吐衄舌捲囊縮痘色青乾

或紅紫黑陷或夾疔疔疔疔後各前證姑從實執治

起脹三朝證治

順 顆粒漸長粗肥面綻高聳結實根窠紅潤一團紅暈紫附
痘根痘頂壯滿光澤明亮脚地疎朗內外平正漸至根紅頂
白毒化水色乃氣充血盛血氣歸附

險 痘雖起發昏滯枯澁或平塌灰白而頂不圓綻或根脚雖
紅而暈不緊附蓋痘之形由氣根之色由血必賴氣血而始
終其功然而解毒尤為急務痘於六日乃為界限六日前清
盡毒火六日後溫補助漿至此失治欲溫補又助毒邪熾盛
反不化漿欲清涼復恐漿滯不行遂成掣肘然臨證又不可
固執六日前毒火已清即兼補益六日後熱邪未盡必兼清

簡明醫教

卷之六

五九

解如痘不光澤飽滿亦有二焉如花卉遇陰天則艷麗華美
逢烈日則焦萎乾枯誠不係於樹力之強弱耳痘不綻看餘
證有躁煩執渴二便秘澀等熱候宜清涼有體倦熱緩二便
清利等虛候宜溫補最宜細察豈可槩謂不綻便行補益而
蹈實實虛虛殺人之罪乎凡口渴多飲急宜清胃火失治則
外雖收飲胃受火毒爛潰內攻致穿胸背而死輕者通身亦
斑亦危

主方

當歸

川芎

芍藥酒炒

蟬退

殭蠶

山查

牛蒡子

日芷

桔梗等分

甘草減

右水煎服

有虛寒證六日加入參黃芪肉桂糯米少加陳皮無則七

又方治虛寒證

川芎

白芷

山查

陳皮

當歸 桔梗

甘草分

漸加溫補

加藥
水煎

又方 治實熱證

川芎

蟬退

山查

牛蒡子

桔梗 木通

防風

加燈心大棗水煎服

又方 治血熱證

歸尾

生地

木通

桔梗

連翹 川芎

蟬退

殭蠶

水煎服

夾斑加黃芩

黃連紅花丹皮酒炒

生地

小便清長去木通

便澀腹脹加

腹皮不潤加當歸

不快加牛蒡

陷塌黃芪

痛加白芷

不勻防風

細斑難治大斑令人呼出毒血

口渴服六一

散甚白虎湯方見
傷寒

逆 痘不起而平塌虛浮色不澤而根窠無暈腹脹不食氣促

簡明醫教

卷之六

四十

神昏或痘粒遍體過頭紅紫如胭脂或頭面紅腫而痘反退
伏或痘中陷眼如針孔而黑紫或如粟粥皮面或口唇上下
腫甚俗名判官嘴皆氣滯血凝或氣離血散為逆逆者交會
不足致毒乘機而內攻也又邪視面如橘皮不分肉地或腰
下有痘腰上無痘皆不治證

貫漿三朝治證

順 痘初貫膿先作水色漸轉白亮濃厚飽滿變黃蠟色根圍

紅活緊附痘脚飲食二便如常

險 痘雖行漿不濃厚滿足或皮薄嬌紅淡白塌塌必然發癢

而有後患急宜保元湯溫補自然濃厚猶有熱毒略兼清涼

或如白飯色。平塌不起。四圍淡白。乾澁。不紅活。血虛。頭不起。氣虛。保元湯

加川芎當歸肉桂木香。好酒。或見諸惡候煩躁不安。但得痘

色不變飲食如前不妨。癢場。後另。有條。抓破有膿血。吉空殼。

主方 人參壹錢 黃芪壹錢 甘草肆分 肉桂分 當歸八分

川芎分 白芍首尾 糯米百粒水煎服 如兼解毒加白芷防

風牛旁之類用人參以加山查以清參芪之膩加木香行氣

多用或再用枳殼青皮 脹痛雖為順候不止加木香山查

或行漿半足忽然乾紫腫消眼開名為倒靨。後另。有條。或停食泄

瀉等。加消食止瀉隨證治之。或過用涼藥過而不進身不熱

遂成水伏之證。大劑溫補。男。女。散。木。香。散。之。類。或頂平脚濶漿清。十全

簡明醫說 卷之六 聖

大補加木香 痘毒盛者十日外漿未足大補氣血略兼解毒

恐後有難治之患。或上成膿腿足成大水泡。毒亦解矣。

逆 痘色焦枯黑陷不得貫膿或紅色變紫紫變黑。或如水晶

全無紅色。皆毒未盡氣血已竭死證。或發驚寒戰咬牙不食等證。惡候始補氣血。

結靨三朝證治

順 飲食如常氣調血和毒解漿回。老色收斂。次轉黃蠟色。漸

變黃褐色。結靨從口唇人中起。頭面週身。未至腿足紫黑色。

堅厚之痂。惟宜節飲食。慎風寒。

陰 氣血已竭。未易收靨。停漿不斂。身重發熱。在。理。列。凡曾經

泄瀉後所見諸証皆作虛治。上。今。大。痛。其。水。解。毒。攻。水。香。參。粉。泄瀉而煩渴不止。

大用 漿足難收。大便結實。略宜疎通。或風冷入胃。下利膿粘。

熱滲膀胱。小便尿血。並宜清利。痘後發熱。午前是陽盛。宜

午後是陰虛。宜陰。滋。大熱便實。恐變急驚。微熱便澀。恐變慢驚。

主方 當歸 芍藥酒 白木 茯苓 山藥

苡仁 桔梗分 甘草分 蓮肉柒 口渴加麥冬五味 虛

加人參不飲加水通 水煎服

逆 氣滯而血凝毒留而漿薄。不能回水結靨。則為乾枯外剝。

落痂三朝證治

順 疤痕綻凸。色見桃紅。光澤鮮明。神氣清爽。

陰 疤痕淡紅而不綻。宜。補。氣。血。如全白者。急。用。大。補。不。則。數。月。猶。危。從發熱至

簡明醫說 卷之六 聖

此身常溫熱。不。熱。為。小。伏。證。如大熱。疔紫乾焦。大。宜。清。涼。解。熱。如稠密危痘

賴能飲食。外收結靨成片落者。切勿剝傷。見風太早。變成瘡

瘍。年年生發。若痂後身弱。立則戰搖等證。宜。後。

主方 人參 白木 茯苓 當歸 川芎

白芍 熟地 黃芪 知母 麥冬分 甘草減

水煎服。小便澀加水通 大便瀉加肉果 痂當落不落乃

火盛也。紫苓湯調辰砂六一散外以蜜水調滑石末敷之。

逆 痂若竹衣。大便膿血。若發慢驚。目無神。而。面。青。或。發。牙。疳。或。生。疳。毒。後。另。有。條。

表裏虛實寒熱

凡痘灰白。不紅綻。不起發。昏暗頂陷。為表寒而虛。參芪補氣。兼

四物養血。凡二便清利。身涼。口氣冷。少食。唇白。涕清。為裏寒而虛。四物養血。兼參芪補氣。皆宜溫脾胃。補氣血。加木香肉桂之類。助成漿收斂。凡紅紫乾滯黑陷。焦枯。屬表熱而實。清涼兼解毒。次分利小便。導赤散。凡二便秘澀。身熱。氣盛。鼻乾。躁渴。屬裏熱而實。解毒兼清涼。微通利大便。四順散。皆宜化毒湯。六一散。黃芩。黃連。丹皮。紅花。蟬退。荆芥之類。

氣血虛實寒熱

寒則虛。實則熱。虛寒溫補。實熱清利。氣虛補氣。血虛補血。氣熱則清涼。血熱則解毒。凡頂陷不起。不堅實。不碍手。不起脹。不行漿。皆氣虛。保元湯。倍酒炒黃耆。川芎。肉桂。木香。人乳。好酒漿。

簡明醫教

卷之六

四十三

同服。凡根窠不紅。或紅色不緊。圍痘根而鋪散。手摸過變白。色痘上如寒毛。豎起枯澀。不紅潤。皆血虛。保元湯。加歸芎酒洗。紅花。加山查。消參。芪之滯。加木香。許行氣活血。凡用參芪在痘盡出之後。凡用丁香。木香。桂。在毒盡解之時。凡用地黃。姜。芍藥。當歸。酒洗。地黃。酒洗。炒。芍藥。酒洗。炒。當歸。酒洗。炒。其大黃。車前。滑石。生地。牛旁。枳殼。過用。則氣陷內攻。麻黃。乾葛。升麻。羌活。防風。荆芥。蟬退。川山甲。人牙。查。或。登。過用。則表虛。癢塌。

血熱痘證

初發壯熱。腮紅。面赤。毛焦。色枯。煩躁。渴欲飲水。啼哭不寧。喜卧涼處。揭去衣被。大便秘結。小便赤澀。宜升麻葛根湯。合十神解。

毒湯服。熱證悉平。太乙保和湯助漿。漿足後。保嬰百補湯。八九日紫黑乾陷。獨勝。人牙之類。惟泄瀉後。熱證已除。見虛寒證。異攻散。木香散可用矣。

氣虛痘證

凡兒久病之後。或元氣極弱。發熱和緩。或乍熱乍涼。手足時冷。面青神倦。食少昏睡。二便清利。輕用發表。宜紫蘇。川芎。防風。白芷。桔梗。大腹皮。少加白朮。茯苓。甘草。略佐升麻。痘出齊後。即加參耆。芎。桔之類。如漿清。痘灰白色。自汗。保元湯為主。或十全大補。去川芎。加山查。如見泄瀉。足冷寒戰。咬牙虛寒證。則異攻。木香。可。擇。用。

實熱痘證

初發壯熱。猶如火烙。紅赤毛焦。氣粗躁渴。腹脹怒哭。狂言譫語。二便秘澀。面浮眼腫。宜升麻葛根湯。加發表藥一服。隨用羌活散。鬱湯。熱毒已平。益元透肌湯。保嬰百補湯。後治法與血熱同。表裏熱盛者。但宜安表。和中。勻氣。透肌解毒。五者不失。雖甚。可。甚。

咽啞水哈

音聲出於肺。肺金為火所尅。毒壅氣道。音不出也。作痛者。亦由此耳。甘桔湯。玄參。牛蒡之類。水哈者。蓋氣喉居前。食喉在後。氣喉有痘壅碍。茶湯誤入。故嗽也。甘桔湯解毒為主。加玄參。牛蒡。麥門冬。杏仁。荆芥之類。但痘飲自安矣。

癢塌灰白

是證由氣血兩虛也。陽氣虛則陰血乘之，血味鹹，醃於肌肉，故癢。宜溫補兼芳藥，酸欬陰血虛則陽氣乘之，氣性熱，猶灼火故痛。養血兼清涼，灰白者，因氣虛故灰色而不光澤，而不紅潤。

寒戰咬牙

斯證見于七日之前。寒戰者，乃心火亢盛，上薰肺金，九竅閉塞，火極之故，宜解表諸熱。咬牙者，乃陽明熱甚，宜清胃火。七日之後，皆屬虛寒戰者，溫補陽氣，兼養血，咬牙者，大培陰血。

乾枯倒陷

是證尤有陷伏倒靨之類，形畧似而證不同也。痘色乾紅變紫，紫黑名曰乾枯，熱極也。當於乾紅時，急宜清涼解毒，防風白簡明醫說

卷之六

四十五

並連起荆芥牛蒡升麻乾葛之類，兼利小便，如胃虛不能納食，副榮衛不能盡出，雖出而復沒，故根暈白色，或黑。此內虛所致，手足微冷，或嘔或倦，名曰陷伏，宜辛溫之藥，如理中湯之類，甚則異攻木香，如被風寒所觸，或香臭惡氣，生入房事，月經衝觸，痘色忽變，名曰倒靨，風寒參蘇之類，加羌防黨退，衝觸加味四聖飲，如胃膿七八日間，氣血兩虛，不能漿老結靨，或因泄瀉，不食，忽然痘色乾紫，腫消開眼，名曰倒靨，毒伏內攻，非結痂也，急宜大補氣血，倍用人參黃芪，炒白木當歸川芎肉桂炙甘草丁香木香，為末，加山甲炒研，人牙，攻補，或得頭面數粒，結靨，或攻潰成外收，或出細痘數粒，或生癰毒，皆生機矣。

口渴內瀆

口渴者，因毒熱攻衝，致胃火上炎，口作大渴也。內瀆者，胃腕潰爛，穿出胸背而死，慘傷莫此為甚。琴書皆謂風寒外襲，腠理固密，壅塞不通，陽氣挾同毒火內攻而瀆，如無大渴，有惡寒狀，宜升麻葛根湯，加羌防芎芷散風寒，如見渴證，即勿專於畏縮，但用麥冬五味之類，止渴，則益水之力，豈能救車薪烈火也耶。凡小渴六一散大渴大劑白虎湯，大便秘兼涼膈散一劑，必令渴止，方免大害。安可坐視生靈之斃乎。如痘後渴不甚者，保元湯加麥冬五味天粉，或參苓白朮散之類。

煩躁啼叫

簡明醫說 卷之六

四十六

心經有熱則煩躁，蓋痘毒之熱蘊蓄於心，所以煩躁啼叫，悶亂狂言也。宜解毒湯及辰砂六一散，使二便清利，火泄自可。有因痛癢煩躁者，隨證治之。痘後煩躁，虛而有餘毒也。

咳嗽痰涎

是證由熱毒壅遏而剋肺金，或風邪乘虛而入，或解毒或發散，暫加止咳清痰之藥，桑皮杏仁枳殼桔梗前胡貝母陳皮茯苓之類。半夏南星戒之，有藥入口即嗽吐出者，毒熱也。

痘內夾斑

斑者，血之餘也，有點而無頭粒，如毒火點胎，然痘隨臟而出，其勢迅速，如熱毒熾盛，痘有太過之血，夾毒上浮，乘痘毒之熱而

發為斑也。如痘毒起齊內必虛矣。內虛則斑從內解。如不解常散其火邪。涼血活血解毒之藥。宜玄參升麻湯加黃芩黃連紅花三味丹皮荆芥當歸川芎白芍。在初起宜用表散。次宜解利。如得斑退血附則當補益。猶防損陷。但痘中夾斑亦危惡之候。十救一二紫斑不過三日。青黑斑不出週時。斑如錦紋六日而

水泡失血

水泡者毒盛之時。火不能炎上。水不能潤下。搏激于皮膚之間。而灰者也。宜理脾順氣。然而起於臄足之處。毒亦由此而化。痘收泡亦欬帶紅紫色。乃熱極也。失血者毒火逼血妄行也。鼻出易治。口及大小便出者難治。

簡明醫教

卷之六

四七

不食能食

經曰得穀則昌。絕穀則亡。凡痘見危惡諸候。但脾胃強健而能飲食。從首至尾皆可扶持收功。極篤者切勿棄捨。用意作外收。不過麻而已。如不食在一二日者。痘出自食。若在五六日不食。乃危候也。雖用補藥多不奏功。有因唇口痘脹不能吮乳。進食者可用糯粉作細團。拌砂糖少許逐粒喂之。兼以湯送。欲補者。和人參於內亦可。如能食太過。乃胃火盛。藥中加石膏之類。以清胃火。失治能為大害。愈後能食者宜矣。但勿過食。

餘毒癰腫

險痘雖愈。身熱不退。發毒之預徵也。急宜服大連翹飲。作如亦

發出頭頂上。或兩臂肘曲池穴。或兩膝腕委中穴。俱無妨害。發於胸背者。死。切勿嚼生豆之類。食散則攻於內。次惟宜前方。或真人活命飲治之。甚而腫軟有膿。不得穿破者。以皂角刺針深。入血出見膿為止。以細紙捻細孔內。出紙於頭分開。貼拔。毒氣膿盡長肉。如管直不能曲。日久自破。又氣急痰嗽。毒在肺。口臭泄瀉。毒在脾胃。盜汗熱渴。毒在心。睡中驚跳熱在肝。耳熱尚熱。毒在腎。藥中兼治之。又眼合身熱。不藥皆餘毒。

痘并賊痘

報痘之時。如痘出不長。恐有痘疔。通身細照看。獨大色黑者是。在貫漿之時。留滯不行。須防賊痘。大者黃。色者是。二者皆以銀簪挑破。口含清水。吸去穢血。珍珠研末。頭髮燒灰。蠟胭脂調勻。填入。破處無膿乾。換或後灸法亦可。

簡明醫教

卷之六

四八

紙燃照法

患痘疹房室。門窗密閉。小孔亦遮蔽之。凡看時用草紅紙。或用方高烘燥。燃條如小指。蘸油燈上烘乾。勿令油滴。見才點火。照頭面眼鼻口耳。及遍身皮膚之內。細加認辨。曉然明白。屢有看痘者。要抱兒房外。就天日光。觸冒風寒。痘疹由此隱沒。為害多矣。惟知痘之有變證。豈知看誤之過。若看婦人之痘。額可驗胸。鼻可驗腹。兩額臂兩腮。驗腿。徐體之皆應。

調護得宜

兒出痘疹之時。必服發表疎散之藥。痰理開豁。風寒易侵。及飲食起居。百凡嚴禁。天寒被褥宜厚。乳母當亦身伴臥。不宜烈火。

烘蒸如過天暖被褥不宜太厚恐反助火毒如此則重痘可生
否則輕痘變重悔恨何及

乳母服藥

蓋小兒都不肯服藥病值猖獗非藥不痊強之益增驚恐無法
與服切勿惜藥但須大劑濃煎頭汁兒多寡服之餘藥及查再
煎汁小兒吃乳時乳母服之如大劑藥于兒前煎薰有效

三豆湯 治痘蘊熱咳嗽 已下十方可預服或天行時即服

赤小豆 出麻 黑豆 料豆 菜豆 加甘草煎熱令兒飲汁食豆

四脫丹 蟬退 鳳凰退 神仙脫 甲火灸 蛇退 蟾

右四味各為細末等分 每服壹錢 煉蜜為丸 如菜豆大每
年除夜甘平湯服三年痘毒消

簡明醫教 卷之六 四九

玄兔丹 玄參 去麻木梓石白揭 兔絲子 蜀葵水淘淨好酒浸

研 二味俱勿犯鐵器 服三五沙糖湯化下無時

硃砂丹 硃砂 大塊如墻壁鮮紅光明似云母色者 牛黃 陝西

分 每服五分密調服痘將發時用猪糞 調水澆清汁調味
服大解毒

甘草散 預服消毒痘出不太盛

大甘草 為末每日食後白湯調下五分人中黃尤佳

生油劑 治小兒臟腑伏熱未成痘疹四肢頭額微熱用生油

一小盞旋入鐵銚內用溫水一小盞傾和入以杖攪之煎令

水盡更令攪勻如蜜則止夜臥時百日至三歲每服二匙殼

五七歲三匙殼八歲至十五半合大人一合量增減服後良

久令臥水時大小便通利熱毒退痘疹不生

苦練子湯 取練樹子煎湯浴兒痘疹不出出亦稀少

麻油擦法 痘發時每夜臨臥用手中三指蘸麻油擦兒頭至

足遍身然後睡即可以便輕此亦暢達流通升脫凝滯之

稀痘飲 天行將發 山查 紫草 牛蒡子 各壹 防風

荆芥 各壹錢 甘草 伍分 生薑一片水一鍾煎服

瑣瑣葡萄 出回國進貢年 小兒食之稀痘

升麻葛根湯 治初熱壯盛疑似難明服之未見痘表熱甚者

升麻 壹錢 葛根 貳錢 甘草 壹錢 白芍藥 壹錢 加姜葱煎服

或加紫蘇山查牛蒡子芥尖 各壹錢 冬加麻黃 錢

簡明醫教 卷之六 五

清毒飲 治痘已出 荆芥 貳錢 牛蒡子 貳錢 甘草 壹錢 姜片 貳錢 水煎服

清肺飲 咽乾聲啞 麻黃 壹錢 麥門冬 伍分 知母 天花粉

荆芥 各捌分 訶子 取 葛蒲 各陸分 水煎加竹瀝小半鍾 姜汁 三

羌活散 羌活 赤毛焦躁亂咳喘喘急實熱等證

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮

川芎 連翹 牛蒡子 紫草 大腹皮 甘草 分

右為粗末每五錢加燈心十四枝水煎服熱甚難 升麻 湯

根天粉 腹脹鼻塞而赤 麻黃 大便秘加 枳殼當歸 甚不 大黃 嘔吐

陳皮猪苓澤瀉 若怒毛直枯加 升麻 禁服用白木茯苓肉 紫

蘇桑皮 失調 犀角地黃黃連 加 黃連黃芩山梔 赤加 滑石

梔子地黃芍藥加犀角黃芩加木通加山梔加青皮加

山查麥芽神麩出牛蒡山查蟬退色生地紅花丹皮加

退火回生丹熱滑石粘辰砂各冰片各研每勻壹分溫

四順清涼飲便當歸芎芍藥甘草大黃分水煎服

冰肌散 治痘一齊湧出一服略飲熱極者用熱輕者戒之

柴胡 前胡 黃芩 梔子 連翹 澤瀉 黃連

黃栢 犀角 地骨皮 牡丹皮 為粗末每三錢水煎服

保元湯即治元氣虛弱精神倦怠肌肉消瘦飲食少進面

青皖白睡臥寧靜痘頂不起漿不足服及有雜證皆屬虛弱宜

簡明醫說 卷之六 五十一

人參一黃芪二非草伍分前生桂貳分虎右加生薑壹片水

初起的屬虛寒本方加川芎桔梗起脹便兼服漿足後助收

飲方可加白朮茯苓白芍之類 出不快加川芎官桂

小便赤加木通皮茯苓皮泄瀉加白朮茯苓木香肉果

大便秘如當歸禁大黃枳殼生地嘔吐禁半夏痰貝母

減食加山查神麩傷食禁積實三棧蓬水煩渴加麥冬

有虛證見者決非實喘乃毒不得外達上乘於肺禁麻黃龍

短氣虛極加人則喘自止腹脹加腹皮厚朴有傷生冷寒氣

營過從內傷外感治內傷用丁香肉桂神木香外感用防等藥四五

日手足厥冷加丁香肉桂川芎倍四肢不起加防風漿不足

異攻散 治痘表虛癢塌裏虛泄瀉腹脹喘嗽悶亂煩渴寒戰

咬牙頭溫足冷凡曾經泄瀉後見證皆屬虛寒宜急服之有

始口血熱毒火證過服涼藥變虛寒者亦服

木香 官桂 當歸 人參 茯苓 陳皮 厚朴

丁香 肉果各茶附子寒甚各伍右為粗末每服

五錢生薑三片棗二枚水一大鍾煎至六分服

木香散 治痘表虛灰白內虛泄瀉腹脹其功如神如無灰

簡明醫說 卷之六 五十二

木香 人參 肉桂 赤茯苓 大腹皮 青皮

前胡 訶子取半夏 丁香 甘草各等分

每服五錢生薑三片水一大鍾煎六分溫服

四君子湯補元氣養脾胃人參 白朮 茯苓 甘草姜棗

四物湯養血木方配四當歸 白芍 川芎 熟地七日後酒

十全大補湯 大補血氣痘頂平脚腫不滿足即回子

化毒湯 治痘已出清熱涼血毒一解不至黑陷紫草無真者

升麻 蟬退 地骨皮 黃芩 甘草加木通等

十神解毒湯 治血熱痘證身如火烙腮紅臉赤毛焦色枯已

出未出三日前痘點煩紅躁湯多飲睡卧不寧小便赤澀

生地 紅花 當歸尾 桔梗 牡丹皮 赤芍藥

木通 大腹皮 連翹 川芎 等 右加燈心 水煎服

身熱盛 加葛根 毒盛綿密 加荆芥 渴 加天粉竹 嘔 加枳 瀉 加

防風 大便閉 加枳殼 喘 加委 便黑 加犀角 黃 小便短 加木

赤加梔子 發紅斑 連山 梔子 黃 煩渴狂亂 譫語 加如

門冬 嘔瀉 加黃連 猪 咽痛 加其草 牛 痘證屬血熱者多 乃製

前方此證認明 只宜重用 升提發散 使毒得以達表 而從外

解 引以滲泄 使熱得以下行 而從內消 佐以清涼解毒 行血

涼血之劑 則雖稠密 亦能消散 易聚易飲 此方之功 也用至

痘頂白光 接用太乙保和湯 切勿誤用補藥 則變危急不救

簡明醫教 卷之六 五三

太乙保和湯 治血熱痘服十神解毒湯熱毒去 三日之後 不易長 大用之 或淡收醫

桔梗 川芎 山查 木通 人參 紅花

生地 糯米 燈心 生薑 水煎服 起不快 加

十 便瀉腹脹 加皮 繁紅不潤 加常歸 陷塌 加黃 痛 加白 不勻

加防 嗽渴 加茶 門 瘰 及水泡 加白 芷 七八日 漿足 按用 保嬰

益元透肌湯 治寶熱痘服羌活散鬱湯 後擁熱悉開 三四日

後不肥大 用之成漿收靨 即太乙保和湯 去生地 紅花 加蟬

退牛蒡陳皮煎服 加減悉同 七八日 漿足 接服 保嬰百補湯

保嬰百補湯 治寶熱血熱痘 八九日 無他證 並以此方 調理

蓋痘證平順者 不必藥 惡逆者 藥無功 險證宜藥 虛寒者 少

二熱證多 特另出此五方 此方後用

當歸 芍藥 地黃 白朮 人參 茯苓

山藥 甘草 等 棗 二枚 水煎服 氣虛 加黃芪 官桂

加味四聖飲 治痘出不快 及變陷 倒靨 小便

紫草 黃芪 人參 川芎 蟬退 木通

木香 甘草 大便秘 加枳殼 右加糯米 百水煎服

活血解毒湯 解毒 防風 荆芥 生地 赤芍

當歸 連翹 黃連 牛蒡 紫草 白朮

薄荷 川芎 木通 甘草 等 水煎服

玄參升麻湯 溫毒 玄參 升麻 甘草 等 水煎服

簡明醫教 卷之六 五五

大連翹飲 治痘 連翹 防風 荆芥 牛蒡

當歸 柴胡 黃芩 梔子 蟬退 赤芍

木通 玄參 滑石 甘草 等 右加姜 一片 水煎服

獨聖散 治痘 川山甲 每服五分 兒大 加服 酒漿調

人牙散 治痘 老人牙 每服二錢 酒漿調 下勿多服

參蘇飲 治痘 犀角 地黃湯 方見 六一散 方見 白虎湯 方見

柴苓湯 治痘 小柴胡湯 方見 柴胡 甘草湯 方見 理中湯 方見

真人活命飲 治痘 論疹 即麻 疹 瘡 斑

麻疹之發 必在天行厲氣傳染之時 沿門遍戶 輕重不等 其始

也。身體發熱，面腫腮赤，眼胞浮腫，淚出汪汪，鼻流清涕，嘔吐惡心，大便泄瀉，即是疹候。便宜發表散邪，行氣解毒，必兼泄火清肺之藥。次清胃火，次宜滋陰養血。蓋疹乃陽毒火邪熾盛，肺金受尅，所以疹證必有咳嗽痰涎，胸滿喘急之患。皆肺家之證也。若元口乾作渴，乃胃火也。即宜白虎湯之類，隨輕重用。失治則陽明火盛，後有走馬牙疳，齒斷鼻爛之證。傷人最多。滋陰者，疹毒熱甚，則陰血受其煎熬而虛耗也。表發既出，必于後出而午後收。午後出而于後收，以六時為度。此陽生陰成，陰生陽成之妙也。如吐瀉不食，鼻衄滯下之證，皆不必用藥。諺云：吐不殺，瀉不殺，餓不殺，誠哉斯言也。吐瀉則毒火得泄，不食則內虛易出。

簡明醫說

卷之六

五五

鼻衄滯下，肺與大腸之火，由此疎通。惟宜表發疹出之後，諸證可安。飲食自進，最宜避風寒，忌腥酒厚味，鹹酸生冷，糟物海味，守禁忌。服藥所謂疹有六閉，觸胃風寒，毒火熾盛，飲食填塞，皮膚粗厚，出而復沒，藥誤辛熱是也。但宜古方防風通聖散。方見中風通治有效。世傳痘重而疹輕，殊不知死生係於反掌，豈可忽諸。

發熱五朝證治

發熱之初，憎寒壯熱，鼻流清涕，嘔吐泄瀉，咳嗽氣急，腮紅眼倦，印當解表得微汗，則皮膚通暢，脈理開豁，疹易出，寧有閉悶腹脹喘急之患哉。初起全似傷寒，但面赤中指冷為異。

主方 大劑依 升麻 葛根 防風 荆芥 桔梗

枳殼 前胡 桑皮 杏仁分 甘草減半 加連翹
 煎熱加黃芩黃連梔子玄參木通石膏知母減開麻葛根入
 和暖加石膏知母牛蒡薄荷連翹木通減升麻葛根燈心十
 時暖時寒加羌活牛蒡連翹赤芍減枳殼 水煎服
 大寒加麻黃酒羌活川芎少加去升麻葛根 水煎服
 四方加桑皮杏仁 凡吐瀉不食不必治，惟發表疹出透諸證自安。如大便秘加大黃五七分以通為度。

見疹三朝證治

疹之初出，多於耳後項上及腰腿先見，其頂尖而不長，其形小而勻淨者吉。既出之時，色宜淡紅疎朗，如深紅紫色兼火化也。

簡明醫說

卷之六

五五

若紫紅乾燥，昏暗無光，乃火盛毒熾也。服表藥後，祇拾照之，紅影出於肌膚，成片而將起，切戒風寒生冷及諸禁忌。一有觸犯，即反收沒多致不救。遇此急宜表出，如不出，猛加發藥，外用擦法。若毒內攻，則致癱塌難救。或皮膚閉塞，毒氣壅滯，遂變為渾身青紫，煩躁腹痛，喘急悶亂而死。若自利不止，或小便頻數，雖為惡候，如疹稠密，深紅紫色，則又無妨。但至三日後熱不退，疹不收者，毒火太盛，餘邪未盡也。宜服清火解毒之藥，自收。依後
 輕 或熱或退，五六日後出疹，色淡紅滋潤。頭面勻淨而多依
 重 頭面不出紅紫，黯燥咽喉腫痛，不能食，冒風寒沒早。變熱

主方 防風 前胡 川芎 枳殼 桔梗

桑皮 杏仁 陳皮等分 甘草半 水煎服 發未透加升

麻麻黃夏少用 出透加連翹牛蒡 毒火渴甚加石膏知母玄

參黃連黃芩梔子 喘嗽加蘇子瓜婁仁蘿藦子 火閉加

大黃 色白加紅花炒 赤芍藥炒

疹色深紅而渴 石膏錢 知母壹錢 牛蒡 連翹

升麻 地骨皮 淡竹葉 甘草各錢 右加糯米百粒 水煎服

天熱大渴引飲不止加梔子麥冬天粉 與萊豆燈心湯飲

以寒閉塞於出不透 麻黃酒洗壹錢或 升麻酒洗壹錢 人中黃如無用童便拌甘草 蟬退

牛蒡子各壹錢 姜葱煎服 外用胡荽同酒糟蒸熟於無風暖

處周身頭至足擦令熱汗出為度

簡明醫數 卷之六 五七

紫赤乾燥 川芎 生地 紅花酒洗 乾葛 黃芩

連翹 牛蒡子 右水煎成調六一散服

將出復沒 麻黃酒洗 升麻 葛根 羌活 防風

荆芥 牛蒡子 前胡 桔梗 甘草 水煎服

孕婦出疹主方加川芎生地條芩艾葉安胎為主兼解毒藥宜

多服 如胎氣上沖急用芎根艾葉煎湯磨生櫛榔服 熱

毒蒸胎胎多受傷內服藥外用護胎法保全倘失治胎墮母

可無恙蓋痘宜內實胎落母亡疹宜內虛故母可安必宜母子俱生

護胎法 靛青 灶心土 井底泥 研勻塗臍腹寸厚頻敷

不治證 黑黯焦枯忽見紫點一出即沒 鼻扇口張目直無

神 鼻青糞黑 氣喘前心吸 疹後牙疳臭爛

疹後餘毒證治

疹屬陽毒感之則暴悍酷烈為害匪細變態頃刻所以發熱時

甚宜解表散邪必令發出透徹乃無餘毒蘊熱之患或表發不

透或風寒阻寒或誤飲食或犯禁忌疹雖收而餘證作者多矣

疹後自宜熱退若拂熱猶在隨證詳審如嘔吐仍用前方便秘

加製大黃若胸高如圭肩聳而喘口鼻血出面紅或青枯黯皆

為惡候然亦有肺虛為毒所逼而發喘連聲不已用止咳清肺

方參酌如日夜煩躁譫語狂亂主方調六一散方見 加辰砂燈

心湯下小便亦短五苓散便癢 加苓連煎調辰砂服煩躁譫語

簡明醫數 卷之六 五八

升麻葛根湯辰砂六一散服隨所見證以後方酌用

止咳清肺 知母 貝母 天門冬 麥冬 桔梗

欬石膏 杏仁 馬兜苓等分 糯米百粒水煎服熱加連翹

石葛蒲酒洗 麥門冬 桔梗各錢 知母壹錢 荆芥取德 天粉

石葛蒲酒洗 當歸酒洗 白芍酒洗 生地黃酒洗 陳皮 貝母

瓜蒌仁 白茯苓 片黃芩 梔子炒 天門冬 玄參

麥門冬 桑皮 杏仁 熱加黃連石青蘇

嗽不止 陳皮 半夏 茯苓 黃連炒 甘草竹茹水

瀉不止 猪苓 澤瀉 滑石 赤芍 黃連炒 升麻

甘草 水煎服 未止加止瀉藥

痢不止 黃芩 芍藥 枳殼 當歸 木通

生地 不通加酒大黃 後重木香另磨檳榔水煎

汗不止 黃芪 黃連 黃柏 黃芩 生地 熟地黃

酸棗仁 當歸 加浮小麥一撮水煎服

鼻衄出血 玄參 丹皮 生地 茅花 片黃芩

梔子 石膏 甘草 水煎調百草霜服

咽喉腫痛 黃連 黃芩 黃柏 苦參 玄胡索

乳香 雄黃 孩兒茶 右各為細末研勻蘆管吹入

夜臥不安 黃連 當歸 生地 遠志 人參

簡明醫教 卷之六 五九

酸棗仁 丹參 栝子仁 石菖蒲 麥冬 甘草

右為末入金箔三張山藥糊丸硃砂為衣每一錢

於後難毒 羌活 穿山甲 金銀花 白芷 大黃

甘草節 乳香 右為末每服一錢 用牙皂角刺同煎

咽喉腫痛 甘草 桔梗 玄參 連翹 牛蒡子 射干

山豆根 右水煎服 前吹藥入薄荷甘草桔梗

走馬牙疳 人中白 蘆薈 使君子 龍膽草 胡黃連

五靈脂 右為末蒸餅糊丸黍米大每服一錢臨睡白湯下

敷方 雄黃 黃柏 麝香 右研勻 先用艾煎湯

又方 五倍子 雄黃 枯恭 右研勻 洗淨艾敷藥

右研勻先溫米泔洗淨敷藥 痘疹後牙疳宜敷服

疹後水蓄證因渴時多飲所致水停于胃為嘔噦入脾為腫脹

宜利水實脾猪苓澤瀉茯苓白木入肺為喘咳加葶藶入心驚

悸宜赤苓木通入肝脇痛加芫花入腎膀胱小便不利車前子

疹後晝夜發熱毛髮焦枯皮膚乾稿肌肉羸瘦清熱 九方見牙

如忽然心腹絞痛汗出乃元氣虧損失於補養外雖似安內虛

未實偶中惡氣多致不救及睡中露睛手足厥冷欲作慢脾風

不救之證 熱甚失血犀角地黃湯 方見 加三黃梔子茵陳木

通小便泄火 疹時食鷄魚終身皮膚粟起天行疹時重出食

猪肉每歲出疹之月下痢食鹽醋每歲月咳嗽食五辛則生驚

簡明醫教 卷之六 六十一

熱不時必四十九日或百口無忌

痘疹 痘疹或痛 樺皮乳香茵陳和勻燒薰及薰被蓋立止

痘瀉 三日前毒火發藥重加黃連愈 乾柿餅研末水調服

痘喘 白花地丁煎服愈火痘毒盛搗絞汁和白酒漿少許服効

稀痘神方金銀花為末以糖調經年服或再花連藤煎湯作飲

極疹喘急悶亂西河柳研木 水調服愈 疹後藥中重加大効

人參 白木 茯苓 芍藥 桔梗 天粉

細辛 甘草 為末一二錢生薑薄荷煎熱柴胡隨證加

新刊簡明醫教卷之六

新刊簡明醫說卷之七

虎林白石孫志宏克容氏編輯

武塘月槎支如金

當湖瑞生陸錫祥

仝梓

婦科總論

夫天地造端乎夫婦，乾坤配合於陰陽。雖清濁動靜之不同，而成象效法之有類。原茲婦人之病，如風寒暑淫燥火六氣之外，侵喜怒憂思悲恐驚七情之內，擾與夫飲食勞役諸患，悉與男子同法治理，其不同者三焉。一婦人氣習偏僻，執滯難移，情志抑遏不舒，心思鬱結不暢，丹溪所謂婦人之病，因於鬱者，十常八九。富貴貧賤皆有之，何也？蓋貪戀慈愛，妬嫉惡忌，八者之中，簡明醫說 卷之七 婦科

一有所染，則蒂固根深，堅牢不破，是以有鬱也。故及胸滿痞膈，脇脹腹膨，諸證醫難豁然快效，此性質之不同也。二婦人常多諱疾之弊，雖問之未必盡吐，若豪貴之婦，深居奧室之中，覆護蔽帳之內，不可望色聞聲，則治病之法，關其二焉。黃帝曰：凡治病察其形氣色澤，形氣相得謂之可治，色澤已孚謂之易已。形氣相失謂之難治，色天不澤謂之難已。又曰：診病之道，觀人勇怯骨肉皮膚，能知其虛實，以為診法。若婦人脈病不相應，既不見其形，醫惟據脈供藥，或未得其病情，欲究感受根源，不免瑣屑繁問，遠為醫學不精故耳。往往得藥，反不深加敬信，可謂最難。此治療之不同也。三婦人之病多於男子者，經脈愆期淋帶

崩漏孕育胎產，乳陰諸患，及妊娠所挾之證，此為病之不同也。故診視用藥之際，難於調理。古人云：寧醫十男子，莫醫一婦人。斯言誠然也。脈經曰：寸口脈微而澀，微則衛氣不足，其息短其形燥，澀則榮氣不足，其形逆。榮衛俱虛，言語乏力，微弱而澀，少年無子，中年絕產，六脈沉弦細濇急數，皆病脈。婦人之病，氣多血少而成，治法以理氣養血為主。

主方

香附子

打細行氣生用，內熱當歸，地黃有熱用生，童便養氣，醋炒，參錢，補血用熟。

白芍藥

涼血用生，補血用熟，酒炒，參錢，半川芎，水煎空心服，調和氣血加。

烏藥砂仁丸服亦可，胸膈鬱悶不寬，滅地黃加陳皮茯苓，枳殼蘇梗蒼朮甚者加木香砂仁厚朴蘿蔔子，氣滯加烏藥。

簡明醫說

卷之七

婦科

二

三稜逢木 腹痛加赤芍藥，胃脘痛加玄胡五靈脂，草薢食不消，山查神麩麥芽，痰加陳皮半夏茯苓貝母，風加防風羌活，風溼痛秦艽，遍身痛蒼朮羌活酒芩，嘔吐陳皮半夏茯苓香生姜炒黃連，胃虛加白朮，熱嘔黃連，血虛頭眩體倦懶言動，加入參黃芪白朮炙草，自汗黃芪，盜汗加酸棗仁，浮小麥，有熱心煩加梔子黃連，陰虛內熱手足心熱口燥咽乾加麥冬，知母地骨皮黃柏，骨蒸勞熱胡黃連銀柴胡青蒿鱉甲，打細，口渴麥冬五味子天花粉烏梅，煩渴喜冷石膏知母，心氣虛丹參人參，神不安，伏神遠志麥冬棗仁柏子仁金與銀同煎。

殊砂水服 不寐黃連酸仁 炙甘草 虛弱乾嗽滅

香附川芎加天麥冬百部百合冬花紫苑 上焦風熱黃芩

黃連梔子玄參薄荷 風痰眩暈加天麻荆芥秦朮羌活

子宮閉冷不孕乾姜肉桂斬艾醋 赤白帶下臭椿根皮 牡

獨大瓶 赤石脂烏梅 血積成塊加三稜蓬朮官桂乾漆炒

蘇木紅花九服

艾附女珍九 治婦人氣盛血衰經期不准或前或後紫淡多

少赤白帶下崩漏淋瀝面黃肌瘦四肢無力倦怠嗜臥精神

短少目暗耳鳴頭眩懶言五心煩熱咽乾口燥夜寐不安等

香附五兩分四分一章便一 斬艾醋 當歸各 川芎

白芍 熟地黃黃芩各 阿膠酒 臭椿根皮 各

右為末搗地黃阿膠酒和勻加醋糊丸如桐子大每百丸空

八珍益母丸 治氣血兩虛脾胃並弱飲食少思四肢無力月

經違期或先期而至或腰痠腹脹愆期不收赤白帶下身作

寒熱服之罔不獲效一月之後即可受胎虛甚者用藥一斤

必能對期受孕

益母草四兩不見鐵器止 人參去 白朮土 茯苓去皮 各

炙甘草去皮 當歸酒 白芍藥醋 川芎 熟地酒 各

右為末蜂蜜和丸如彈子大空心蜜湯下一丸或丸如小豆

大每服七十九 脾胃虛寒者加砂仁一兩姜炒 胸滿加

山查肉一兩 多氣鬱加香附子二兩童便

丹參散 補新血破瘀血安生胎下死胎止崩帶調經脈逐產

後惡血治冷熱勞腰痛骨節煩疼與四物湯同功

丹參酒 右為末每服二錢空心溫酒調下

艾附煖宮丸 治經水不調小腹時痛赤白帶下子宮虛寒

香附壹斤四兩醋 艾四兩酒 白芍酒 熟地黃製 玄胡各 各

當歸兩 斬艾醋 川芎 白芍酒 熟地黃製 玄胡各 各

甘草八 右為末醋糊和丸如桐子大每服百丸空心或酒下

全元百補丸 婦女勞傷氣血陰陽不和乍寒乍熱心腹疼痛

香附壹斤四兩 當歸六 川芎 熟地各 茯苓

玄胡索各 白朮四 甘草壹 益母草各 各

右為末蜜丸桐子大每七十九空心砂仁湯下醋湯酒 任下

四物益母丸 婦人經水不調小腹有塊久服全愈且有孕

當歸 熟地各 益母草勿 香附子製 白芍藥炒 各

川芎 吳萸各 為末蜜丸彈子大每一丸空心酒下 亦可

十全大補湯 治氣血兩虛肢體無力脾胃怯弱飲食少思一

切虛羸之證並効四君子四物湯加黃芪肉桂方 見

調經附 經閉

岐伯曰女子二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下則

有子蓋任主胞胎通以陰道之泰也衝為血海盛則氣血俱盛

也婦人稟陰柔之體以血為主陰血充足腎氣全盛衝任週流如月之虧盈應期行止而有常度曰調週交合則有子矣否則三五錯綜皆所謂不調也不調則百病變生甚至不治孕服言子經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息責者死不治泥心屬陽而主血脾裏血以行氣若月經不通未必不由心事不足思慮傷脾適有勞役穀氣不輸肺金失養腎水無滋經血津液日以枯涸以致三五不調漸至閉絕虛損內熱骨蒸勞瘵之證作則卒難於治也有稟賦薄弱自幼庭羸多病或飲食不節起居不常性情急暴素多忿怒或生而明敏性質聰慧用心太過精神耗損或行經時手掬水漿口

滑明醫教

卷之七

婦科

五

食生冷雷阻敗血或婦人有犯房室血去不淨皆致後期小腹作痛經未行而先疼既來而斷續漸成崩漏淋瀝之證孕育不成或憂愁鬱結累月經年不能發越稍不治理致氣滯血凝蓋氣之虛實與熱升降通塞而陰血悉隨之以消長行止也為癥瘕癖塊血枯經閉變患無涯豈勝枚舉無非經愆之所致矣婦人乏孕多服種子墜娠之餌而不專於調經是不揣其本而齊其末也調經之要莫先於益血滋陰益血之道必先補心健脾所謂寧其心則血生實其脾則血足又曰養心則血生健脾則氣布二者胥和則氣暢血行而調經之要斯其至矣蓋婦人調理急務莫甚於此能經前無閉阻腹痛之患經後無遷延斷續之尤亦無遲速之愆期不致

紫淡之異色何患胎孕之不受哉凡欲孕之脈宜六部和而帶滑忌微弱遲滯微則無精弱為榮虛遲是陰中寒滯乃血不流而經閉或三月一來此謂居經少年脈微氣血兩虛治宜補血為主

主方 當歸錢 白芍藥 生地各壹錢 川芎壹錢 吳茱萸七錢

右水煎服 加吳茱萸者恐芍藥酸寒地黃涼滯素有熱者去之 或但以芍藥酒生地姜製則無害於脾胃也

經水不及期而來者血虛有熱也加黃連條芩香附醋炒各壹錢

黃柏知母炒各五分 蘄艾附 甘草各壹分 水煎成化入阿膠壹錢 服

經水過期不行或腹痛者血少有寒或氣滯也去生地加熟地香附蓬朮蘇木各壹錢 木通八分 肉桂五分 桃仁去皮尖紅花各壹錢

肥人多痰色淡加蒼木製 南星半夏製 陳皮海石貝母各八分

瘦人多火加黃芩白朮過期倍當歸芍藥少佐桃仁紅花

經水閉絕不通者血枯也倍當歸加桃仁紅花牛膝熟地黃

芩寒加肉桂 經阻發腫者瘀血入脾也加丹皮乾姜香附

厚朴玄胡枳殼木香 經阻腹脇有塊者加砂仁木香小茴

香枳實厚朴玄胡香附牛膝 過期色淡挾虛有痰宜活血

比痰本方倍當歸合二陳加蒼朮過期紫黑或塊者氣鬱

血滯也加桃仁紅花青皮玄胡丹皮香附將來腹痛

者氣滯血實也加香附薤仁紅花青皮玄胡索丹皮木香

五靈脂痛甚者加蓬朮烏藥酒煮大黃有熱加柴胡黃芩

滑明醫教

卷之七

六

經後作痛者氣血兩虛也倍當歸合四君子湯寒加黃芪乾

姜肉桂 肥胖體盛月經不通或三月一行者由痰多軀脂

滿碍合二陳湯加南星枳實蒼木白木黃連香附 瘦弱體

虛月經不調不能成孕乃陰虛少血倍當歸加熟地丹參兼

補氣加人參白木黃芪茯苓 經水過多日久不止將成血

崩加白木條苓白茯苓山梔地榆香附 蒲黃荆芥 並炒

水煎化入阿膠 不止 磨入京墨 久不止發腫滿者脾敗

血虛也加茯苓白木砂仁大腹皮陳皮木香厚朴蘇子 研猪

苓木通香附子蘿蔔子 經行着怒氣心腹脹痛乃瘀

血也加桃仁紅花玄胡索蓬木青皮 錯經妄行出于口鼻

乃火載血上氣之亂也加條苓山梔丹皮犀角阿膠麥冬黃

連大薊鬱金焦荊芥焦蒲黃山茶花水煎成和入藕節汁童

便茅根汁甚者加姜汁 磨京墨髮灰服 經行身痛麻

痺寒熱頭疼乃觸經感冒也加羌活白芷蒼木防風紫蘇 附

調經至寶湯 理赤白帶下崩漏淋瀝惡寒發熱口渴腹痛小

腹急疼五心煩熱久不成孕

當歸 白芍藥 熟地黃 川芎 人參 吳茱萸

丹皮 半夏 阿膠 麥冬 肉桂 加姜棗煎服

大補調經湯 治婦女氣血虛損血海虛寒經水不調或心腹

作痛帶下淋瀝面黃肢瘦頭眩肌羸虛證悉皆療之

當歸 熟地黃 白芍藥 川芎 香附 白木

茯苓 黃芪 阿膠 人參 砂仁 吳茱萸

陳皮 小茴香 玄胡 肉桂 炙草 姜棗煎服

婦寶調經湯 治經期不准或前或後紫淡不同多少不等

當歸 熟地黃 白芍藥 川芎 香附 大腹皮

吳萸 紫金皮 肉蓯蓉 條苓 甘草 姜棗煎服

丹桂散 治氣血虛損內則經閉不行外則肢體羸瘦

丹皮 桂心 蓬莪木 京三稜 玄胡 當歸 紅花

陳皮 赤芍藥 甘草 乾漆 沒藥 蘇木 烏藥

理氣調榮湯 治室女氣血不和致生諸病

香附 當歸 川芎 白芍 生地 烏藥

陳皮 砂仁 茯苓 甘草 姜棗煎空心服

調經八物丸 養血調經除赤白帶久服如期自然成孕

白木 熟地黃 當歸 川芎 白芍 白茯苓

條苓 陳皮 玄胡索 丹皮

右為末蜜丸如桐子大每服百丸空心淡鹽湯下寒月酒下

鎮經湯 經水先期而來過多不止蓋因腎損陰虛不能鎮守

當歸 白芍藥 生地黃 黃蘗 阿膠 條黃芩

知母 甘草 川芎 香附子 黃連 白芷

右水盞半煎七分空心服

活血通經散 氣虛留滯瘀血不行過期斷續時作腹痛漸至閉絕

白芷 肉桂 各壹兩 兩半 劉寄奴 取赤芍 各五兩 凌霄花 蘇木

紅花 牛膝 上者 九兩 甘草 香附 各壹兩 木通 桃仁 各壹兩

右為末每服三錢空心熱好酒下午晚再服未効紅花酒下

楞白固經丸 經水過多不止及赤白帶下崩漏淋瀝

龜板 臭椿根 黃芩 條各壹兩 白芍藥 七錢 香附 炒 錢半 黃栢 各壹兩

右為末醋糊丸桐子大每服七十九空心烏梅或醋湯下

○經閉 婦女經閉之證始因憂愁怒氣鬱結不舒抑遏成火致成五心煩熱咽乾口渴大便秘結小便短赤諸證經水悉前

清明醫案 卷之七 婦科 九

或一月兩至。妄行去多。皆火逼之也。血既去多。又因內熱耗潤。遂至二三月一行。即閉之漸也。則寒熱煩躁。盜汗咳嗽。飲食進

少。不食雖嗜。食已難化。胸膈痞悶等證。乃至腹中結塊。或動或

痛。似孕非孕。乃血枯經閉。俗謂乾血勞是也。此際神丹莫療。大

培陰血。寧心理解。不致陰陽失度。氣血垂維。望生十一。再與香

附桂枝三稜蓬朮砂仁菴菴羅荀子烏藥玄胡桃仁紅花強逼

共行是速其死也。脈必細數急瀉。

主方 當歸 芍藥 生地 各壹兩 白朮 白茯苓

麥冬 牡丹皮 地骨皮 丹參 穀芽 各壹兩 陳皮 五分

右加蓮子七枚姜一片棗一枚水煎早晚服 肺虛加沙參

天門冬 痰中見血加側柏葉及止血藥 夜熱加知母柴

胡梢 煩躁口渴渴加炒山梔倍麥冬 脇下脹疼加青皮川

芩 胸膈滿悶加黃連 炒 姜 枳實 桔梗 去麥門冬 地骨 盜汗

加黃連黃芪去柴胡桔梗 大便悶結加桃仁倍當歸 咳

嗽不已加瓜蒌阿膠沙參 頭眩頭痛加天麻川芎 小水

不利加木通茯苓 煩渴不利加滑石倍麥冬之類隨證加

簡便方 桃仁 七個 去皮 研如泥 大黃末 七分 斑猫 未炒 右為末酒糊

丸桐子大每服七丸酒下血枯經閉四物湯送下 或單桃仁 湯為丸服

廣嗣

易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生又曰陰陽合德

而剛柔有體正所謂獨陽不生獨陰不成是也蓋人之夫婦猶

天地然天地之道陰陽和而萬物育夫婦之道陰陽和而男女

生苟或父精母血一有不及而謂有胎孕者未之見也是故欲

求子者必先審其婦之月經調否經者常也如月月應期而來

按期而止無易常也故曰月經經或不調先後頻閉紫淡多少

而致赤白帶下崩漏淋瀝兼以夜熱諸證斷不成孕雖得成孕

半產墮胎坐蓐不育或兒致疾苦常有之矣此所以論經血之

病也更有三因之雜證必宜調之若六淫外侵七情內擾及不

內外因則起居作勞飲食失節諸證尤當療於經血之前如氣

體不充榮衛虛弱則風冷乘虛而干之或受於經絡或循於腸

腹或致脾胃不和。則不能司消運之令。飲食必減。生化之道有虧。則四臟百骸失養。故榮衛凝滯。肌膚黃燥。而不光澤。或兼大得氣虛。則為泄瀉。不利。若流入關元。致絕子嗣。隨有所傷。臟腑悉能致疾。此舉一外感風冷而言也。其如暑溼燥火。內傷諸患。皆類此而推之矣。經曰。婦人三十六病。皆因六邪外傷。七情內鬱。加以勞役等因。是故衝任之脈。為十二經之會海。故婦人之病。皆見於少陰太陽之經。而致焉。能先愈其病。將攝順理。則榮衛充足。滕理固密。何六邪之襲乎。氣血和暢。性靜神怡。何七情之擾乎。若此。則陰陽冲叶。而經調。經既調。而服以孕。姪之丸。引以種子之法。則自然受孕。無惑矣。及夫男子之病。亦當詳審。如

簡明醫書

卷之七

廣嗣

十一

或精氣不足。子嗣難成。有腎虛精滑。精少精清。或臨事痿弱。盜汗精遺。便濁腰憊。好色陰虛等證。皆致精髓虧損。更有男子不誠實。謹守。妄作外淫。又不足言也。欲求嗣者。必至夫婦無病。一一謹節。血盈精足。何難生育乎。如服藥必宜久久滋培。不可斷續。致腎氣充足。精髓盈滿。子生藥止。

主方

男服 鹿角膠 懷山藥 兔絲餅 製
五方 肉從蓉 乾入兩餘 同五味子 搗成膏 擦藥末 麝香細

五味子

鹿角膠 懷山藥 兔絲餅 製

人參

鹿角膠 懷山藥 兔絲餅 製

當歸

鹿角膠 懷山藥 兔絲餅 製

覆盆子

鹿角膠 懷山藥 兔絲餅 製

右依法製成除味膠茸。地外共為細末。入蓉味地膏。搽勻。重晒磨末。次製茸。將鹿膠酒蒸化。膠茸和添煉蜜。和九如桐子。大每服九十九空。心鹽酒或鹽湯送下。金水生時日三服。精不固。加蓮蕊。芡實。龍骨。牡蠣法製。

巨勝子丸

左尺脈微而弱。陽虛不舉宜服。

胡麻

何首烏 牛膝

熟地

肉苁蓉 兔絲子 天門冬 枸杞子

天雄

破故紙 北五味 巴戟天

韭子

楮實子 川續斷 芡實 覆盆子

川椒

胡蘆巴 蓮蕊 南木香

簡明醫書

卷之七

婦科

十二

右為木煉蜜丸。如桐子大。每服七十九空。心酒下。食物壓之。滋陰大補丸。腎脈微弱。陰陽兩虛。與虎潛丸。虛損相間服之。所謂補陰和陽。生益精血。潤澤肌膚。強筋骨。性不寒不熱。有牛膝。山藥。各壹。杜仲。姜汁。炒。巴戟。去。肉苁蓉。酒洗。去。甲。苗香。白茯苓。五味子。遠志。其草湯泡。枸杞子。各五。熟地黃。兩。右為細末。煉蜜和紅棗肉丸。如梧桐子大。每服七十九空。心酒下。或淡鹽湯送下。

五子衍宗丸

男子服此藥。添精補髓。疏利腎氣。不問下焦虛實。寒熱服之。自能平秘。獨稱古今第一名方。有世服此藥。子孫蕃衍。遂成村落之說。故名衍宗。

甘州枸杞子 兔絲子 各八兩酒煮 北五味子

車前子 各貳兩 覆盆子 四兩酒洗淨 右為末煉蜜和丸如桐子大

空心服九十九臨臥服五十九白沸湯送下修合日春取丙

丁巳午夏取戊巳辰戌丑未秋取壬癸亥子冬取甲乙寅卯

補陰丸 左尺脉浮洪太虛此藥固精元滋陰降火壯水益腎

黃柏 知母 俱鹽酒炒 熟地黃 各半斤 白芍藥 炒 川牛膝 炒

陳皮 瑣陽 當歸 各兩 龜板 酥炙 虎脛骨 兩 冬加乾姜

五錢 為末酒煮羊肉爛搗和丸桐子大每五十九空 心鹽酒或鹽湯送下

王方 女服 杜仲 炒 桂心 防風 秦艽 厚朴 各五錢

人參 壹兩 白茯苓 細辛 白薇 沙參 牛膝 乾姜 炮

簡明醫教 卷之七 七

半夏 製各壹兩 附子 壹個 右為末煉蜜丸如桐子大每服

五十九空心米湯或酒下覺有孕止服

墨香丸 婦人久無孕育月經不調及數月墮胎半產甚効

香附米 壹斤分四製酒醋童便米 斯艾 去梗四兩好醋數碗

上品青烟墨 壹兩 當歸 川芎 人參

熟地黃 酒拌飯 白茯苓 木香 各壹兩

右為末糊丸如桐子大每服六十九空心温酒或醋湯下

滋血暖宮丸 一名百子 陰陽不和氣血不足服此藥無不孕者

香附 前四製 當歸 川芎 白芍藥 酒炒 熟地黃 酒洗

真阿膠 酒蒸化 艾葉 酒煮晒乾 白木 兩 澤蘭葉 兩 甘草 壹兩

右為末醋糊丸桐子大每服百九空心醋點湯下食物壓之

陰丸 婦人血虛挾火子宮乾澀不能攝精 久無子服此滋陰養血有孕

當歸 熟地黃 生地黃 川芎 芍藥 各貳兩 香附 八兩

人參 八兩 肉桂 七錢 黃芩 兩 右為末蜜丸桐子大 食前米湯或酒下五十九

妙應丸 婦人氣虛痰盛滿溢子宮不能受精肥胖婦人無子

人參 黃芪 各壹兩 白朮 十兩 地黃 酒洗 陳皮 去白 半夏 製

當歸 茯苓 蒼朮 米泔水浸酒 滑石 炙草 各七錢

右為末糊丸桐子大每服五十九空心姜湯下

加味養榮丸 此藥能助婦人速孕且無小產之患

熟地 當歸 酒洗 白朮 各壹兩 白芍藥 川芎 黃芩 炒各

簡明醫教 卷之七 七

人參 茯苓 香附子 陳皮 去白 麥門冬 知母 各壹兩

阿膠 蒸化 炙甘草 五錢 黑豆 四十九粒 右為末煉蜜丸

如相子大每服八十九食前温酒或鹽湯下忌食諸血

勝余丸 婦人久虛無子及胎前產後一切病患此藥能安胎

催生娠臨月服數丸產時痛減亦治積年麻痺半身不遂

赤白帶崩淋月閉婦人諸病新久皆効男子下虛無力並治

當歸 酒洗 芍藥 川芎 人參 白朮 炒 白茯苓

白芷 炙甘草 白薇 酒洗 牡丹皮 玄胡索 桂心 炮後

藥本 沒藥 壹兩除石脂及藥二味 香附子 醋浸二日炒晒

右末煉蜜和丸如彈子大磁瓶藏空心温酒化下受孕及產

後三日一丸醋湯下尤妙 加赤石脂俱各一兩

續嗣降生丹 凡婦人稟受氣弱胎藏虛寒服必孕

當歸酒洗 桂心 烏藥天台 秦艽 杜仲炒斷 吳茱萸

龍骨 益智仁 茯神各壹兩 防風 石菖蒲去毛 細辛

桔梗 半夏製 川牛膝酒浸 白芍各五錢 乾姜生半兩

川椒壹兩 附子壹枚 附子壹枚 附子壹枚 附子壹枚 附子壹枚

右為末雷附子肉硃砂為衣酒調米粉糊和丸如桐子大每

服三十九漸加至七十九空心淡醋湯或酒鹽湯任下

芡實粥 健脾土生萬物精氣神皆盛多子神効老服愈健

簡明醫彙 卷之七 交感 十七

芡實壹升 白梁米壹合 蓮肉泡去皮心 薏苡仁鮮者 山藥末各壹合

共為末和白糖四兩研勻每日早調數匙服以代早粥

壬子丸 此藥要壬日修合

白芨 白薇 吳茱萸 白茯苓各壹兩 牛膝 細辛

菖蒲 白附子 桂心各五錢 厚朴 人參 當歸各四兩

乳香沒藥 右為末密丸九豆大每服十九空心溫酒下

交感

黃帝曰婦人有微老不生男女何也曰因多房事損動臟腑或天癸不通子宮狹寒或男子事狂陽弱精少清寒不能射又不既濟而相接此所以不生也或有正生年斷六七年數歲不生

何也亦由女人有上數疾勞損身體以致經脈不調雖有亦微

弱難以容納陽精也且夫婦之道交合以時生子必壯聰慧永

壽古人有圖擇生男之月而王隱君謂春取甲乙日夏丙丁秋

庚辛冬壬癸四季月後各十八日取戊己為旺相日及天月二

德諸吉日論時則取婦人經行適當三十時訣云三十時辰兩

日半二十八九君須算落紅滿地是佳期金水過時空霍亂霍

亂之時枉費工樹頭樹底覓殘紅但解花開能結子何愁丹桂

不成叢此云婦人月經方止金水初生時子宮正開乃受精結

胎之候妙合太和之際宜以人事副之庶不失造化之理也過

此佳期則子宮閉而不受胎矣然婦人經水來時有兩日半淨

簡明醫彙 卷之七 交感 十七

者有三五七日淨者惟以收血去盡新血初生但以潔白布帛

拭之如鮮紅者未盡也淺淡者太過也看新血如金色者正當

時也交合無不成孕更宜淨後一三五日成男雙日成女宜子

時後得遇天月二德及諸吉辰不近穢污擇淨潔之處則有福

德善慧靈光托化得子必神氣清秀聰慧勝人又云男子施精

向左女人屈左足而左側臥成男胎成之後不宜連續交合最

宜安靜調養乃保彌月而誕生福壽之子嗣矣或曰女子受孕

此常道也何若是之難乎曰大矣哉人之有生也其陰陽造化

之妙乎夫陰陽生生不息之德其在於物則本乎乾坤其在於

人則根乎精血是故雖有通體之妙而實遇修用之機且其常

而觀之則愚夫愚婦無不知也。自其變而言之。雖博綜之上。亦有所不能焉。是故體則陰陽精血。用則陰陽配合也。精血盈足。配合中時。此其常也。及其變也。當本所以變之理。達人君子。可不於有變之際。而加意焉。子嗣之求。研究聖賢之蘊。以贊化育之機者也。世之人。知所以用。則益斯光於此矣。錫祚永之胤。終大地之功。豈小補云。俗有男子精氣未足。女子經脈不通。而成谷。豈之禮。男子有成勞。怯女子多成崩。淋雖不能如古人。男子三十。女子二十。為父母者。必待男成冠。納室女及笄。于歸自成。孕育分婉。無虞。蕃衍胤嗣。更何病之有哉。婦人不孕。不可藥。謂子宮虛寒。冷閉。而通用溫熱之藥。有體瘦而多氣鬱。全是內

簡明醫教

卷之七

七

火煎。然陰血津液枯涸。但宜滋陰養血。兼以清熱。乃效。若全用溫熱之藥。則陰血愈虧。非惟無孕。變生他病。禍不旋踵矣。脈法。沉清氣鬱。洪數內火。微遲虛寒。微弱細瀉。氣血兩虛。少年無孕。中年絕產。六脈相停。滑而和乃成孕。

主方 秋石 鹿角霜 人參 枸杞子 山茱萸

麥冬 天門冬 杜仲 生地黃 熟地黃

右為末。老米粉作糊。丸。桐子大。每服五十丸。空心白湯下。

月後候。女子月經過。金水正生時。男子空心服。車前子湯半。

益夜交合。得孕。隨時更以前方。參酌修合。兼服。

主方 香附子

白朮 川芎 白芍藥 熟地黃 生地黃
阿膠 丹皮 黃芩 益母草 柴胡 吳椿根白
皮 右末醋糊丸。桐子大。每六十九空。心淡醋湯下。乾物

帝曰。人有重身。九月而瘖。此何為也。岐伯對曰。胞之絡脈絕也。胞絡者。繫於腎。少陰之脈。貫腎。繫舌本。故不能言。當十月而復。無損亦無頽也。衰其大半而已。蓋妊婦有疾。不可不投藥也。必審度疾勢。輕重量度。藥性高下。處以中庸。不必多品。視其疾勢已衰。藥宜止服。則病去。母子亦無損。復何懼于攻治。

簡明醫教

卷之七

七

夫夫婦婦受孕之始。其說見于古書。一月名始胎。二月名始膏。三月名始胎血。不流行形。象始化。未有定儀。見物而變。母宜見賢良。貴人欲男。操寸。天玩美玉。觀孔雀。四月始受水精。以成血。五月始受火精。以成其氣。六月始受金精。以成其筋。七月始受木精。以成其骨。八月始受土精。以成其膚。九月始受石精。以成其毛髮。十月五藏六腑。關節人神。皆備。古人胎教之法。寢不側。坐不偏。立不蹕。不食邪味。動止端嚴。情性和悅。常處靜室。多聽大言。於人講讀詩書。陳禮說樂。耳不聽淫聲。目不視惡色。如此。則生子。形容端正。才力過人。忠孝賢達。智慧聰明。此所謂因外象而內感也。故宜淨房。幃兒不受淫人之毒。無危惡之痘疹。

尤兇牛產墮胎之憂不慮臨盆橫逆之害母受驚恐兒有胎驚諸證母食熱赤兒成胎熱癩癩癩癩母受風冷兒致胎寒嘔泄諸尤兒生月內諸患皆母懷胎之失調也孕婦若發動喜怒憂悲感風寒暑溼及多沐浴擲冷水妄作勞輕舉動受胎之後身體不安而腰及腹痛甚至下墜及身熱倦怠必食吐嘔胸膈滿悶至於行動少力等證皆由氣血兩虧無所榮養而使然也有懷孕而仍行經者名盛胎血盛故也有踰月不產十二三至二十四五月生者亦有之由氣血不足故也惟宜服大補氣血藥有貴人多在十一二月生

上方 白朮 黃芩 當歸 香附 生地
白朮 黃芩 當歸 香附 生地 各錢

用明醫發 卷之七 妊方 尤
 川芎 白芍藥 右水煎服 胎痛加紫蘇 胎動
 仁 調服 胎漏加牡蠣 桑寄生 房室動
 安胎飲 姪娠胎不安腹微痛飲食少進

白朮 條芩 當歸 白芍藥 熟地 人參
 川芎 陳皮 砂仁 甘草 紫蘇 右水煎服
 下血加河膠 甚加艾葉 腹痛加芍藥 腰痛杜仲枸杞
 保胎丸 三月胎動氣血不足中衝脈傷宜戒怒少勞節飲食

香附子 當歸身 條芩 白朮 熟地
 川芎 白芍藥 艾葉 甘草 川續斷 益母草
 陳皮 砂仁 桑寄生 有為末煎服和九桐子大

白朮散 姪娠四肢浮腫或面目遍身俱浮名子腫

白朮 大腹皮 白茯苓 生姜皮 陳皮 右末每二

錢米湯調下 未安加木通條芩檳榔木香 足腫 加青木

消痰利氣湯 四肢不能轉側痰氣喘促飲食不進腹脹甚者

陳皮 貝母 茯苓 杏仁 荆芥 紫蘇

枳殼 桑皮 澤瀉 先服二貼痰消喘定去貝母荆

芥枳殼杏仁加荆芥子倍茯苓 下身安去荆芥子澤瀉加

白朮條芩當歸川芎芍藥 有熱加梔子 為末米湯下

竹葉湯 姪娠煩悶不安名子煩

當歸 茯苓 麥冬 防風 黃芩 梔子

用明醫發 卷之七 干
 加竹葉廿片煎 未安加人參生地犀角甘草 去防風梔子

澤瀉散 喘急胸滿小水不利名子滿

澤瀉 赤茯苓 木通 枳殼 桑皮 檳榔

陳皮 加生姜 煎服 不食加白朮腹皮紫蘇桑皮煎

車前散 姪娠小便頻流作痛下焦有熱名子淋

當歸 枳殼 梔子 車前子 赤苓 木通

赤芍 石葦 陳皮 檳榔 川芎 甘草

加燈心煎服 未安加澤瀉石蓮肉地膚淡竹葉菖蒲瞿麥

又 地膚草 水煎或搗汁服 或鮮地黃搗汁入蜜服

羚羊散 忽然胃悶不省人事四肢角弓反張痰壅盛名子癇

冷羊角當歸

川芎

酸棗仁

研茯神

五加皮

防風 薏苡仁

杏仁

木香

甘草

加姜煎服

馮肝飲 八事不省目直上視語語罵狂叫關脉洪數

貝母

白芍藥

茯苓

天麻

橘紅

龍膽

梔子

青皮

右水煎成調青黛五分服

紫蘇飲 妊娠胎元不和上秦心腹脹滿疼痛名子懸

香附 當歸

紫蘇

大腹皮

陳皮

白芍藥

川芎 甘草

水煎服

藿香正氣散可服

又

紫蘇

橘紅麥冬等分爲末每服四錢加枇杷葉竹茹一錢五分煎

當歸湯 胎動冲心悶燥口渴上衝下禁唇口青黑手足厥冷

南明醫案

卷之七

轉男

上

當歸 人參

阿膠

甘草

葱白

連煎二劑

四聖散 妊娠不能飲食冲心欲死遍身疼痛

白朮 黃芩

白芍

砂仁

右分四貼水煎服

轉男 凡妊娠未滿三月形象未著男女宜用方術轉女成

男多驗特錄 法取明雄黃一埋重用絳囊盛之佩于孕婦身

左更以弓弦同貯佩之或萱花同佩又常張弓弦於其

父側懸弧以視母 又 鉞戈斧斤密置于牀蓆之下勿令人

知 誦詩書之聲 又 孕婦着夫 衣冠于井中左頭并西影

胎法 三個月足用白大川芎一個研末三錢空心温酒

或艾葉調下微動是胎不動者血阻也

○驗男女 胎動時頭向左動者是男頭向右動者是女 診左尺脉洪盛是男右尺脉沉實是女 五月作偶遺妊婦面南行忽呼之左迴者男右迴者女

○半產 夫半產墮胎之患每至三月而落蓋妊娠三月名始胎至此則血不流行形象始化未有定儀易于傷墮皆由氣血不充肌體薄弱有稟賦而致者有勞損而致者胎元雖成而無以滋養之故也或因七情火熾逼血妄行或因行動跌磕致傷而墮皆宜隨證用藥調理最宜安靜爲貴蓋胎元 胎元 僅得臍帶繫母腰腎名紫河車蒂甚微甚脆有孕婦氣血充足胎元安穩飲食起居如常忽然小產實非產也乃少年男婦不諳事理

南明醫案

卷之七

半產

上

上

惟恐情慾相觸致致婦踈腰曲腹忽斷此蒂瞬息母死胎下

若此甚多深可痛憫

主方

人參

黃芪

白朮

條芩

當歸身

熟地

川芎

白芍

陳皮

黃連

升麻

柴胡 糯米八十一粒水煎服爲丸亦可

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

胎者此方平和氣血補益脾胃有熱倍芩減砂仁無熱反之

○惡阻 謂孕婦嘔吐惡心氣逆胸滿不能飲食也

主方 橘紅 半夏 茯苓 木瓜 麥冬

人參 香附 加竹茹一團 枇杷葉 生薑水煎服

安胃飲 妊娠惡阻不食

半夏 茯苓 藿香 白茯苓 陳皮 神麩

白朮 香附 當歸 白芍藥 砂仁 姜棗水煎

烏附湯 孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏藥 香附 白朮 陳皮 人參 炙甘草

右加生薑三片水煎服時另以姜汁入糯米炒一撮泡湯送下

蘇梗飲 治血熱氣逆嘔噦異常湯藥難進

蘇梗 山查 芍藥 茯苓 黃連 木瓜

橘紅 水煎徐熱服 未止去蘇梗山查芍藥茯苓黃連

加麥冬人參竹茹 枇杷葉 真藿香 分即安

參橘散 妊娠胃虛惡阻嘔吐飲食少進益胃和中

人參 橘皮 白朮 茯苓 麥芽 炙草

生薑 茯苓 粳米 右水煎服未止加製半夏

安胎進食湯 治不食胎氣衝心遍身疼痛欲死

黃芩 白芍藥 白朮 砂仁

右分四劑水煎服次服香正氣散勿產

胎 婦人懷孕胞內惟有水水涵兒身胞兒脾帶繫母左

腎仰猶果蒂在枝賴母之元氣生長胞之外皆是血養若母因

憂悲怒鬱以動其血或飲食辛熱老酒厚味其鮮猪肉尤忌

致傷衝任之脈先則微下後略有傷動則源源而來有至八九

個月血大行僅存胞兒視之如無孕者能服參歸大補之藥將

理得宜仍得分婉無虞母子皆安有不得藥餌飲食補益致胎

乾難產母子俱損者亦有之有逐月血微下謂之記月有少壯

者懷孕而復行經名曰盛胎有過月不產十八九二十三四月

而產者惟宜大補氣血可也

主方 當歸 川芎 白芍藥 熟地 阿膠

簡明醫說 卷之七 漏胎鬼胎

山藥 條芩 白朮 砂仁 香附 艾葉

糯米水煎服 不止加蒲黃荆芥 地榆之類 有八

九月兒哭者因母仰身承高取物致兒口含臍帶脫出故也

乃曲身令兒含之即安或煎黃連湯吸之 胎不安之故非

有觸犯不外虛熱二字虛者氣血之虛熱者非五志之火則

慾念之火亦致不安當加制相火之藥治之

○鬼胎 婦人鬼胎之說非實有鬼交而成胎也皆本婦自心

所現之境也凡人晝之所思即為夜之所見亦猶男子之夢遺

因女子血盛思慾所致或虛而有慾念者則相火無時不起故

涎津血液流入子宮結聚成塊者也遂至腹中脹滿儼若胎形

因而精神氣血相感亦能轉動世俗謂之鬼胎也古良醫治一
女因抵暮入廟見黃衣神忽然心動是夜夢神與交腹大似孕
母告其由醫以破血墮胎藥進之下如蝌蚪魚目者二升許而
安噫非神之感女乃女感於神智者明之

○妊娠藥忌 雄黃雌黃水銀鉛粉麝香朴硝芫花大戟牛黃

巴豆野葛牛膝薏苡皂角藜蘆槐子瞿麥附子烏頭天雄蜈蚣

斑蝥水蛭蠱蟲蜈蚣蟻蝻蠅皮蟬退蟹甲半夏南星牽牛

代赭大黃滑石木鱉紅花蘇木三稜蓬朮甘遂乾漆桃仁丹桂

○妊娠食忌 螃蟹兔肉蝦羊肝羊眼犬肉鱉肉鱔魚田雞雀

驢馬肉菌茨菰無鱗魚燒酒姜椒蒜煎燻執毒忌雞肉餚鯉

簡明醫教 卷之七 藥食忌胎前 五

鴨子糯米雞子桑椹同食孕婦喜食桃梅李杏楊梅酸醋之類

經曰心出血肝納血肝味酸血養胎肝虛而求外之酸味以補

之耳亦不宜過多恐肝木盛剋制脾土也亦有過食酸物聚

胎前

詩云誕彌厥月先生如達惟彌滿其月雖首夫孕婦生育之難

易母子性命之安危全賴人事調護之其最者至八九個月極

宜保養氣血安和臟腑謹慎起居嚴避風寒不妄作勞加飲食

食棲止適宜身心悅逸乃得胎元穩足尤宜禁戒房幃自然十

月滿滿此生之道得也設若孕婦氣血不充形體羸弱而復

無藥餌之補益飲食之滋養反致勞役不息怒忿憂愁諸法乖

違必至危殆而失矣凡能依十法調理可保萬無一失明者理

○論胎元 夫胎元之形不可不知兒在母腹胞衣之中惟水

涵兒形圍身胞內男頭向左女頭向右兩手抱耳兩膝抵頰胞

外血護兒之轡帶連胞繫母左腎即命門也名紫河車蒂正產

者即猶果熟自落半產者因氣血兩虛猶樹木無力花果脫落

嗣損墮胎者即此喻也至若房室放縱蒂斷腎傷及未當產而

強收致損母子猶摘生果而枝折也

○論自產 鄉居無穩婆處皆當自產先以浴盆內置草扶產

婦坐于上背後令人抱之候時至則兒自然出矣無收早過時

壞兒之咎古書催生之藥必待臨盆坐草始服此正合古意穩

簡明醫教 卷之七 胎元自產收遲 五

婆之設亦無不可但全藉為主宰反致遲速之愆蓋兒產時至

十月足腹中痛陣兒如夢覺轉頭向下母腹漸收兒能拆胞自

出頭對產門隨水而下產婦用力一通兒胞齊落惟令穩婆接

取此最宜之法也世多不明此理產婦初覺腹痛即喚穩婆或

彼有富貴家欲產行止倉惶但云取湯試之詎謂產門已開幾

乎悶壞即令產婦坐上圍桶產婦無知用力努掙兒如未覺隨

力亂出橫生逆產由此故耳或穩婆手入指斷其蒂而強收之

致產婦痛苦萬狀重則傷命輕則臥病累月豈若自然生者無

大痛苦數日即安動作如故上帝好生本不傷人之矯拂者

自取之耳○論收遲 世俗皆謂收遲致兒悶死死胎難下母

子俱下其故何也由產婦諸人不知生產自然母子無恙因藉
憐姿爲主彼倘來遲兒本欲出不知自然之理家衆徬徨反致
產婦寧耐按捺產門不令兒出以致悶死諸人驚駭產婦神魂
已離死胎難下危下必矣凡欲產之婦預當說明此理如初產
尤宜詳告所謂天生天化者也但宜安心守至胞破水下穩婆
未至先以圓桶淋淨內襯草紙一二百不能接取產婦坐其上
後人抱棄任兒自出倘胞衣不下婦將自髮含嚙一噉而下預
備小脚箱紙絮作窩將兒胞急取起放於內上以紙絮蓋覆勿
掩兒口天與下自不能斷臍洗浴候穩婆至可也

簡明醫教

卷之二

胎前十要

三七

爲之不寧胎息因之而弗安且誤損其胎多致傷生說身產母
能清淨斷慾子無瘳癩頭瘡熱毒諸患懷孕即能戒必無危惡
痘疹○二飲食忌煎炒炙煨姜椒雞魚蝦蟹海鮮羊肉猪首醃
酒辛辣一切熱毒之物兒無服亦便秘瘡瘍胎熱胎毒諸患症
思○三起居行動切宜謹慎忌登高涉險仰身攀物尤不宜跌
撲響聲驚恐如母驚一驚致兒胎驚諸疾最爲嬰兒重病○
四避風寒孕婦傷寒治理最難發表攻裏如苦硝大黃桂枝之
類用則妨胎不用病劇誠爲掣肘邪入大熱多致胎下雖強存
之後多不育○五七情五志皆能動火逼血妄行致半產胎漏
故安胎必用條黃芩等清涼之藥蓋血熱行冷凝也如首產者

必有恐怖之憂宜預說天然之理生育自然容易以安其心不
致慌懼○六孕婦最宜安靜經曰神靜則陰生血足養形役則
陽亢陽火行一切女工皆當暫止常令挺身舒步行止自由○
七節飲食得穀則昌絕穀則亡人生全賴穀味運化精微生養
氣血勿因不甘美而不節養致饑飽失時胎元不長氣血不足
必爲難產之徵○八不宜無故占卜如小有不安只宜安靜調
養如問卜師巫必云禳解災咎則宰殺性命妄費資財或備辦
不周家人聒噪反致產婦疑惑憂懼以成大病大害○九預擇
老練寧耐穩婆擬定安靜誠謹媪婦臨時毋得錯雜違誤將十
月腹痛或胎元轉動名曰弄胎俗名未爲產時若無母姑輩老

簡明醫教

卷之七

盤腸產

五

成經歷者少年不諳事理誤喚穩婆彼或恐後日他真惟圖一
時之利詭謂當產而嘗試之如摘生果之喻小則致病大則傷
生○十將欲生產之候急備藥餌飲食酒醋童便姜糖之類置
辦器具炭火諸物房中切宜安靜產婦可進如意厚味但忌糯
粉滯膩難化之物惟徐步舒身正立令人緩覆胸腹兩傍多耐
痛陣直候胞破水下方可坐蓐

○盤腸產 臨產腸先出胎後下宜先安產婦心切勿驚慌用
淨盆或漆器盛之取黃芪或枳殼煎湯浸或溫水養之產畢令
婦仰臥以米醋半碗和溫水七分哈嚙婦面每一嚙腸一收至
完或搗草麻子四十九粒塗頂心收盡即去之或以大紙擦香

油點吹滅烟薰入鼻即收或半夏末或皂角末搽鼻取嚏若乾
難收用香油五斤盆盛頓溫坐一時潤之可收

主方 送生 大腹皮 洗 白米 白芍藥 當歸 各七人參

陳皮 紫蘇 各五分 甘草 四分 加黃楊腦葱三葉春加川芎防

風夏加黃芩五味子秋加澤瀉冬加砂仁胸滿加枳殼砂仁

胎動加金銀湯野苧根多怒加柴胡芩連少食加神麩砂仁

渴加麥門冬葛根有痰加貝母半夏 製 九個月多服之

束胎散 順氣滑胎易產

香附 兩 枳殼 兩 甘草 兩 右為末每二錢空心白湯下

催生散 直至臨盆坐草見胞水破服之

簡明醫說 卷之二 胎前方 三九

滑石 百草霜 白芷各研細末等分和勻每服二錢童便

老酒調勻入醋一匙白湯送下

佛手散 將臨盆時服早多服尤佳

當歸 川芎 益母草 各五分 右水二鍾煎頓服

縮地湯 治胎動必欲下者服之即安

砂仁 壹兩 懷地黃 貳兩 右水酒各二碗煎一碗分二次服

金銀湯 治胎動痛欲下者効

金 銀 共兩許煎湯調砂仁末服

獨聖散 妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極効安胎易產

砂仁 壹兩 帶殼炒令黃剉取仁為末 此一味乃產後之聖藥

簡便方 胎產百病益母草煎服

妊娠轉胞不得小便 秋葵子梔子滑石 各五錢 水通 錢 水煎服

外以前藥為末葱汁調膏堆臍中即通 前藥分二次

大便不通 大黃 枳實 黃芩 白芍 厚朴 等分 煎服即通

胎逆喘急 黃芩 香附 等分 右為末每服二錢空心白湯下

傷寒護胎法 灶心土 研末 散青 井底泥調勻塗臍腹頻加厚

產後

丹溪云產後如有雜證相仍以未治之惟以大補氣血為主雖

然先生一代之良師一言之下後人亦當圓融若惡露去盡腹

中不疼手按臍至小腹亦無硬硬亦無風寒頭疼發熱傷食胸

簡明醫說 卷之七 胎後 三九

滿等證惟是氣血兩虛大補宜矣如神氣清爽飲食可進猶有

腹中梗痛敗血未盡宜服行血之藥黑神散之類如感風寒

疼骨痛畏寒拘急即當服散邪藥故必穿衣而起正氣虛時腿

足微露風寒易侵古方用茯苓補心湯常不能速効亦當傷寒

冲和湯之類取微汗易愈如傷飲食胸膈脹悶加山查麥芽神

麩之類產後忌芍藥惡酸寒伐發生之氣如白芍藥酒炒產後

止腹痛之妙品赤芍藥加用產後行改血之良藥可不用乎

○初產十要 產婦坐靠牀中一人頓覆臍腹庶令惡露易下

大略一晝夜後收血下盡方纔睡倒乃安○二房中伏侍宜老

到曾有經驗者行步輕緩語言低情百凡謹慎細心安妥忌取

婦幼婢。輕舉妄動。多言高聲。致產婦動怒。變生不測。○三牀前
置炭火爐。頻燒乾漆。破漆器。漆消敗血。常令嗅其氣味。不令
惡血上逆。○四宜備醋一椀。頻令婦嗅。知醋味則無事。不知醋
味。及耳中聞如烹茶聲。乃血運之候。預以鐵器燒炭內令紅。仍
置醋半壺。以韭菜一握。揉浸醋內。運作時。提起頭髮。搗住人中。
急取赤鐵投醋壺內。蓋定口。令熱氣從壺嘴出。對鼻孔薰。取炭
火醋沃薰。而肅靜則神復而甦。若驚慌叫哭。則不復矣。急灸關
元。臍下三寸。氣海。臍下二寸。○五頻與沙糖湯行惡血。兼與姜
湯。天熱與菜豆湯。心煩與白蜜調湯。腹中兒枕痛與山查湯。○
六預備清魂散治血運。益母返魂丹治百疾。保生錠鎮心神。黑

簡明醫教

卷之七

初產十要

三三

神散治胞衣不下。惡露不行。腹痛及兒枕痛。用童便煮酒調下。
○七冬月牀前。多置火爐禦寒。房中固密。勿有小隙入風。起身
便溺。腿足勿露。虛時寒邪易入難治。多致危殆。○八夏月牀前
勿置火爐。不可搖扇。風臥房樓上者尤熱。多致血崩。傷人必
當預移樓下。牀下多致水盆。○九月內勿令洗浴。每見少婦欲
淨。因浴作勞。致病危篤。夏月七日後可浴。○十產婦頻與熱粥
湯。漸與薄粥。切戒醒酒。各方風俗。有產即食蛋。二枚煮湯者。有
食煮猪血一碗者。多致傷食。為病皆不宜。尤不宜為產婦宰殺
性命。及宴客。則母安子壽。產後數日間。必探其血。盡腹。不
痛為安。否此。即服行血藥。多因失看。十數日。忽然崩下。不救。久

傷食胃寒。大特健勞。且產中成病。治亦難效。多成痼疾。更勿
多飲酒。引敗血流入隧道。及四肢關節。永久疼痛。古云產婦致
患。微若秋毫。成病重如山。獄地藏經云。殺生致母子不安。俗云
產亡者。受血湖地獄。此獄殺業重者受之。婦女預釋其疑。

主方 惡露下 當歸尾 赤芍藥 益母草 澤蘭葉 玄胡索
少腹痛 當歸尾 山查 各壹 蒲黃 官桂 甘草

焦姜 熟地黃 山查 各壹 蒲黃 官桂 甘草
右加姜棗煎成。用黑豆炒焦。淋入好酒一盃。去豆用酒。併童
便和服。血不下。加蘇木。紅花。丹皮。桃仁。香附。五靈脂。荆芥

之類。敗血去盡。腹不痛。加補藥。血去多不止者。去歸尾
玄胡。赤芍。蒲黃。官桂。加參。芪。生地。阿膠。梔子。烏梅。荆芥。

簡明醫教

卷之七

產後十要

三三

地榆作血崩治。另以當歸 五 荆芥 炒 山查 兩 煎服。無他患
黑神散 產後惡露不盡。胎死難產。胞衣不下。敗血攻心。腹痛
黑豆 半升 熟地黃 當歸尾 肉桂 各貳 乾姜 炒焦 甘草 兩
赤芍藥 蒲黃 為末。每服二錢。童便煮酒下。血盡止服。
益母丸 胎前產後百疾皆治
益母草 端午日採。取葉 蜜丸。彈大。每服三丸。臨產白湯童便
酒化下。加四物湯。各二兩。尤効。搗絞汁。煉膏。服更佳。
烏玄湯 治惡露不下。腹痛。乍寒乍熱。不時作運。
何首烏 兩 玄胡索 兩 荆芥 五 右煎汁。二碗。重滾。執用。橘紅 兩
置從中熱汁。泡入。蓋少時。去橘紅。取汁。服。血行痛止。

清魂散 產後血運昏迷去瘀生新血

川芎 澤蘭葉 荆芥 人參 其五入其方

奪命丸 血氣凝滯胞衣不下

丹皮 當歸尾 黑附子 乾漆 右為末用大黃

醋煮成膏加雞子白搗勻和丸桐子大酒吞五十九即下

歸膝湯 治胞衣不下服此即下

歸尾 牛膝 木通 滑石 冬葵子 水煎服

八味理中湯 產後氣血俱虛汗出嘔吐

白朮 炙甘草 人參 茯苓 乾姜 滑石

麥芽 神麩 為末米糊丸桐子大每五十九食前姜湯下

簡明醫教 卷之七 三

返元湯 惡露上逆神昏不省二便不通脉洪

當歸 川芎 五靈脂 桃仁 大黃 芍藥

肉桂 人參 右水煎加童便沙糖酒服

保生錠 產後鎮養心神 更以山查 當歸 荆芥 炒煎服

辰砂 好當歸 川芎 為末密和印定金銀煎湯化下

歸竭丸 產後血積腹中成塊 單用五靈脂為末 酒下亦効

當歸 血竭 蓬朮 白芍 五靈脂

右為末醋糊丸如梧桐子大每服六十九空心酒送下

神昏氣促自汗 人參 核桃肉 麥門冬 右水煎服

元氣脫血上逆 人參 蘇木 右童便煎服

血運 荆芥 童便煎服氣虛加當歸人參血虛川芎

胞衣不下 最宜產時婦白髮嚼一嘔而下稍遲敗血入胞矣

砂仁 當歸尾 水煎服

血未盡悶亂欲絕 紅花 酒二鍾煎一鍾烏梅湯二匙和服

惡血未盡腹痛 當歸赤芍 肉桂 姜三片水煎服

產後隨處作痛 當歸玄胡 血竭沒藥 其末 煎服

玉門不飲陰戶突出 硫黃 兔絲子吳茱萸蛇床子 煎服

簡便方 子宮不合 藿香荆芥臭椿根皮煎湯薰洗

難產數日不下體俱冷 椒橙葉煎湯一盆小椀令產婦坐盆

中薰洗良久腿腹熱氣溫血行而產

簡明醫教 卷之七 產後證 五

胞衣不下 黑豆一合炒熟入醋煮六七沸 去豆用醋三次以

又 取夫單衣蓋井上 又 澤蘭葉浸酒中鐵鎚燒熟滓飲

產後百病血不下 用血竭沒藥為末每二錢童便酒下

血不止 百草霜 童便酒下或桑白皮煎湯入姜汁二匙飲

一月血水不乾竹紙綿皮紙 荆芥 半夏 水酒煎服

子腸不收 枳殼河子五倍子白礬煎湯薰洗或頭頂心 煎服

○產後狂言 產婦妄見鬼祟因驚恐動其心神致敗血冲心

昏憤狂亂或因去血過多心無所養敗血上干于心造命丹効

○夜臥不安 乾荷葉生地黃牡丹皮 煎調生蒲黃服即効

或芍藥 煎水飛砂服或幼科驚門牛黃造命丹尤効

○產後不語 蓋聲言出於心心主血血去心虛故也 宜等
歸益母麥冬遠志茯神人參加紅花少許同全與銀煎成調殊
砂服造命丹可服或用白礬末一錢熱湯調下

○惡露下少 欲知敗血有無但看腹中痛否腹軟不痛去盡
矣痛之微甚驗血多少如小腹痛劇服主方及黑神散外用綿
衣裹手烘熱揉痛處若失治忽然血崩昏運而絕矣

崩中

婦人崩中最高為沉痾年少之婦女火熾血熱幃幃恣情或經未
盡而犯交感或鬱怒氣逆手掬冷水或飲食生冷皆致敗血留
阻遇於後陽亢七情火炎敗血妄行紅紫不同或紫黑成塊致

崩中

卷之七

崩中

三五

成斯疾大都涼血固澁升氣養榮可愈中年已上及高年萎孀
多屬憂愁過度怒氣傷肝肝傷不能藏血以致錯經妄行先後
愆期或欲來而先痛既來而斷續或年近七七天癸當止而不
止皆由鬱火不能發越攻衝臟腑逼血妄下或反倍常皆為血
山崩漏之證此氣血兩虛難以速愈必涼血止血散鬱火和肝
氣隨兼大補氣血庶可奏功

主方 當歸頭 白芍 生地 川芎 黃芩 條

地榆 梔子 黃連 黃柏 各錢 水煎服 末止去當歸 加炒黑荆芥

涼血地黃湯 婦人陰虛不能制火火激其血妄行不止

生地 當歸頭 條黃芩 荆芥 炒各錢 黃柏 知母

藥本 川芎 黃連 甘草 各五分 升麻 柴胡

防風 蔓荊 各錢 水煎服 未止加蒲黃 炒玄參 阿膠 附

固源湯 血崩日久不止

條芩 臭椿 根 錢 龜心土 當歸頭 熟地黃 白芍 葉

地榆 川芎 各錢 艾葉 荆芥 五分 加烏梅煎服

參芪湯 治血崩虛甚者

人參 黃芪 麥冬 各錢 五味子 七分 杜仲 熟地黃

山茱萸 各錢 枸杞子 各錢 川續斷 壹錢 荆芥 炒入 阿膠 錢

右河水煎三次一日服

一赤八烏丸 治血崩甚者

崩中

卷之七

崩中

三五

血竭 京墨 髮灰 百草霜 蓮蓬殼 黃絹

取棕 煎 蒲黃 梔子 共為末蜜丸菜豆大每服百丸

米湯送下或米湯調服亦可

簡便方 止血 棉花子仁 炒 條芩 甘草 等 為末每二錢空心酒下

又 京墨 煎 為末二錢酒下 又 柿餅燒灰二錢白湯下

又 乾漆 燒 五靈脂 為末二錢酒下或貫眾燒灰煎

又 乾黑驢屎研入罈中燒爛婦坐上薰止或梔子燒研服

又 龍骨 當歸 香附 各錢 棕灰 為末每四錢空心米湯下

又 烏梅肉炒研末二錢酒下或棕燒灰加枯礬末酒下

又 蒼耳草燒灰三錢酒下 或槐花地榆 酒下或煎服

或荆芥穗平油澄上燒焦研末童便酒下 或烏金木耳炒存

性研末錢阿膠炒研末錢烏梅湯調服

赤白帶下

經曰溼痰流下滲入膀胱經為帶此言肥人也瘦人由內火煎

熬津液而成然而婦人女子帶下之證又多由脾胃溼熱所致

白多為氣虛赤多為血熱患久則漸次虛寒面黃體瘦肌膚憔悴

悴形容枯槁行動懶怯多因帶證而致焉何則但因感此者外

無病患之形內無痛楚之苦隱而不覺歲月遷延脈訣云崩中

日久成白帶漏下多時骨木枯是以氣血漸損形體漸羸而變

成大病者多矣調理之要治標必以止寒為主肥人兼消痰瘦

人兼清火少佐升提固飲治本必理氣和血次健脾溼溼六君

子五苓姜炒黃連大補氣血多不以為為急患之既久脾胃虛弱

至於月經不調其則淋瀝崩漏遂成危疾難為攻治矣方藥合

宜庶可獲効如日久不止者專以補氣血為主先以上方治之

次服十全大補湯去桂加醋炒芍藥牡蠣粉禹餘糧補中益氣

主方 當歸 川芎 赤芍 熟地 艾葉

茯苓 牡丹皮 臭椿根 香附醋 山藥各 升麻各

右加烏梅二個水煎另用牡蠣大龍骨大赤石脂各研成

末調服或作丸服亦可

固真丸 帶久不止腹痛眼昏溜火陽明伏火此丸大瀉寒溼

乾姜炮 柴胡 白石脂另 白龍骨另 當歸各 白芍酒

黃柏酒 白朮各 右為末醋糊丸桐子大每服百丸空心醋

湯下以乾物壓之不令熱藥犯胃

飲帶丸 帶久氣血兩虛面黃肌瘦無力身熱飲食無味四肢

當歸 川芎 茯苓 白朮 香附醋 山藥

臭椿根 杜仲姜 牡蠣火 鹿角霜另 破故紙酒 白芍酒

人參各 右為末烏梅肉和 加醋糊丸如桐子大每服百

九空心米湯下 虛加黃芪地黃 熱加地骨皮青黛 痰

加陳皮半夏南星 小便澀加車前子 瘦人加黃柏 胸

滿去人參加砂仁 腹痛去參加玄胡小茴香冬 加炮姜久

收帶丸 赤白帶因溼痰腹痛燥中宮之溼提陷下之氣

蒼朮 白朮 白茯苓 陳皮鹽 當歸 白芍酒

熟地 半夏製 椿根皮 牡丹皮 黃柏酒 甘草炙

防風各 升麻各 右為末酒糊丸桐子大每服百丸米湯下

簡便方白 石灰風 白茯苓兩 為末木丸每服三十亦 白湯下

又 赤白帶下 椿麥麩雞子清為丸每服五十九丸白湯送下

又 香附子醋 臭椿根皮 等分為末醋糊丸桐子心 醋湯下

淋瀝

是證頗有穢血點滴淋漓不淨非若崩中頻而多也甚至經年
果凡不能起身慄慄倦臥飲食難進面色痿黃無力行動四肢

困乏俗名血虧有因於女子未并早嫁甚而天癸未至衝任未盛血

海未充竟以合昏後月水雖降顛倒錯亂孕育不成最可憫惜

主方 當歸 川芎 白芍 熟地 丹參

艾葉醋煮牡丹皮 阿膠元化吳椿皮 地榆等分加烏梅肉一個水煎服

七灰散 治婦女崩漏淋瀝

蓮蓬殼益母草 早蓮草 粟殼 蟹殼 棕毛

藕節七味燒灰等分每服三錢醋湯調下 崩中方可互用

簡便方 淋瀝 黃芩條沉水者為末每服三錢燒秤鐮滓酒下

又 崩淋 棕灰烏梅肉乾姜炒焦等分俱為末每二錢烏梅湯下

又 烏梅肉炒研末二錢或棕灰枯礬為末或蒼耳草燒灰三錢

或荆芥燒灰為末或槐角地榆為末並用酒或童便下

畏寒

婦人稟陰柔之體畏寒常甚於男子此稟言之也婦人尤多感

寒之由故持另條以明之如孔子則不時閒懷解衣進風如夜

臥兒在身側肩臂常露或兒便溺即時起身因此感冒風寒但

婦人畏寒有二種若霄壤不侔故宜詳察一外感風寒惡寒則

頭疼骨痛拘急腰膝酸軟惡心此言暴感也宜從傷寒門用發

表取汗藥或微惡寒朝涼夜熱皮膚熱內不甚雖累月如是脉

浮而緊宜服發表藥一貼取微汗一陽虛生外寒陰虛內熱五

心煩口乾舌燥夜以不安乾嗽紅痰漸至午後陰分微微惡

寒時手足心熱黃昏漸加皮膚不甚重按骨裏蒸蒸大熱脉

必細數急滿此宜主方治之二者差誤係人之死生最宜斟酌

主方 當歸 白芍藥 懷生地 麥門冬 地骨皮

知母 牡丹皮等分水煎服 氣鬱加香附童便炒撫芎連翹

口渴加天花粉五味子 嗽加天門冬紫苑冬花 熱甚加

銀柴胡連青蒿鱉甲 有痰加貝母陳皮茯苓甘草

啓脾湯 寡婦室女思慾不遂脾傷食少寒熱似瘧面黃時紅

當歸 白朮各壹錢半香附製 鬱金 玄胡 柴胡精

川芎 人參各壹錢 甘草精 青皮各五分 右水煎服

疝瘕

簡明醫說 卷之七 疝瘕 疝瘕 疝瘕

是證氣結而成疝者腹之左右各有一條大者如臂小者如指

亦名弦氣瘕者肋之兩旁有塊作痛二者遇風冷怒氣則發

多沉瀆治法須久服丸藥消之兼積聚門治

主方 當歸 檳榔 蓬朮 三稜 芫花醋炒

桃仁 五靈脂 木香 沒藥另研 肉桂各壹錢 阿魏壹錢

麝香五分右為末入沒藥麝香阿魏醋研化入飯丸每服十丸淡醋湯下

癥瘕

是證由七情時動飲食失節寒溫不調氣血凝滯而成故瘕者

臟腑氣結有形可徵也瘕者痛處無定浮假可移也發則氣壅

腹脹相引兩脇煩悶滯於經絡月水不通亦當丸藥治之

主方

當歸

川芎

乾漆炒烟

木香

羌花炒

肉桂

赤芍藥

琥珀各五分

大黃

牛膝各五分

桃仁各五分

麝香五分

右為末或丸每服一錢空心熱好酒送下

流氣散

臟腑虛弱氣血不調或兼外邪成形作痛攻注上下

當歸

延胡索

川芎

烏藥

肉桂

桃仁

木香

赤芍藥

枳殼

蓬朮

青皮等分

為末二錢

小腹痛

婦人小腹為衝任之脈血之海忽感嚴凝之寒客於脈絡則氣

血留滯凝滯而痛得溫暖則氣血和通而痛止內服溫散之藥

外炒鹽熨或燒熱物熨之脈多沈緊如臨經時腹痛調經方治

簡明醫教

卷之七

小腹痛心腹痛

聖

主方

玄胡索

五靈脂

吳茱萸湯泡

肉桂

木香

茴香

陳皮各壹兩

白芷錢五分

右為末每服一錢空心酒下

心腹痛

婦人患此皆由臟腑虧虛及氣滯不暢兼以七情動於中六淫

襲於外邪氣干之故痛作隨氣升降衝上則心膈疼攻下則臍

腹痛皆邪正相搏而使然也內服藥外得煖氣則痛止脈沉緊

主方

延胡索

烏藥

香附

肉桂

當歸

川芎

木香各五分

桃仁各八分

赤芍壹錢五分

姜三片棗一枚煎服

轉牌便閉

是證孕婦因胞胎所壓或承高取物以致尿脬轉而小便不遜

或山崩崩有熱或恐小便久之故小腹急痛兼小便不通門治

主方

木通

寒水石

秋葵子

車前子

石菖蒲等分

右研細水煎服見効即止或秋葵子車前子亂投為末

每服二錢茶下或五苓散取鮮車前草搗汁調服或紫

苑為末葱湯下

一法用鹽炒熱包熨小腹自通

遺尿失禁

是證屬心腎氣虛傳送失度如婦人產理不順致傷膀胱亦無

時而出或因脾寒臟冷而致宜詳察之先用

主方

白龍骨

赤石脂

牡蠣火煨

益智各壹兩

枯礬

訶子核去

砂仁各五分

右為末每服二錢米湯調九服亦可

簡明醫教

卷之七

婦人久虛小便澀澀泄不禁

聖

鹿茸九

鹿茸

川椒

桂心

附子製

牡蠣製

肉苁蓉

雞胞內黃皮

沉香各壹兩

右為末酒糊丸每三十九丸

陰挺

婦人隱處之疾雖夫婦未必盡吐肯告醫索藥乎故醫書多不

論寧知陰中之患有致傷生者醫書可獨遺哉蓋陰挺之證因

於鬱怒傷肝積久不舒肝氣亢極致陰中突出長數寸痛癢水

淫牽引腰股小便澀短先服龍膽瀉肝湯或當歸龍薈丸

次兼主方及補中益氣湯歸脾湯加柴胡青皮川芎茯苓山梔

黃柏之類又有陰中如茄墜出直身則收入俗名前方加升麻

柴胡藥本有多怒思姓者出赤筋大痛蓋陰戶屬肝經肝主筋也

主方 當歸 芍藥 熟地黃 川芎 桂心

白薇 凌霄花 澤蘭葉 牡丹皮 蒼朮 甘草分

右咀每七錢水煎服 更用金毛狗脊五倍子黃連魚腥草

枯礬各壹兩 分四貼每加水楊柳根一握煎湯用有嘴瓶盛再

以竹管去節引熱氣入陰內薰待溫頻洗 突出作瘡者用

臭椿根皮荆芥穗藿香各等分 煎湯薰洗至收前方未効加柴胡皮龍膽草

○陰冷 證因衝任虛損風冷客之故陰中冷襲不受胎孕久

不治則面黃肌瘦腹痛吐清水等冷證作矣

主方 五加皮 乾姜 肉桂 杜仲姜汁炒 蛇床子

南明醫說 卷之七 陰冷 聖

丹參 天門冬 熟地黃 鍾乳粉研 地骨皮各等分

右剉生絹袋懸罈心貯黃酒滿浸三日蒸熟早晚溫飲

洗方 用硫黃枯礬等分 煎湯頻洗 未安製桂附八味丸服

陰腫 陰戶腫痛由正氣不足風邪客之不去乘于陰與氣

血相搏氣血不滯脘理壅閉不得泄越而為腫矣

主方 石菖蒲 當歸各壹兩 吳茱萸炒 秦艽各五錢 右咀每五

錢加葱白五寸水煎空心服 用枳殼炒 包製冷再炒製

洗方 艾葉防風大戟煎洗 或加麻黃蛇床烏梅去大 煎洗

又 甘菊苗或馬鞭草煎洗 或小麦五倍子葱白煎湯化入

礬硝洗 或白礬五錢 大黃壹錢 甘草五錢 為末薄綿裹納入日

○陰癢 始因溼熱生蟲蝕於陰中痛癢不已有寒婦室女思

想不息溼火淫津日久而成或房室太過毒火壅積為癩潰爛

致傷人者 亦可用陰挺洗方

主方 黃芪 黃芩 大黃各壹兩 赤芍藥 玄參

丹參 山茱萸 蛇床子各五錢 右為末每服二錢空心酒下

洗方 花椒吳茱萸各壹兩 蛇床子熟蘆各五錢 陳茶葉一水煎

入煨鹽兩 加明礬朴硝各壹兩 好薰洗次用杏仁研 加雄黃入

麝香許少 稀絹包烘熱納陰中

陰中生蟲 用熟牛肝或猪肝切三 炙熟納陰中引蟲出盡

又 肝拌平胃散貫衆末納 或桃葉搗綿裹納一日換五次

南明醫說 卷之七 陰癢 聖

陰中出血 百草霜研 葫蘆搗汁和納 或髮灰青布灰和敷

陰瘡深熱 蛇退一條 枯礬黃丹篇蓄菜本各壹兩 硫黃荆芥蛇床

子各五錢 為末香油調搽溼者脫 先用荆芥蛇床子煎湯薰洗

乳癰

婦人情思拂逆久合鬱怒無由散越致肝木氣盛乳房屬肝發

于此也始有小核如豆漸漸長大經年累月發則大痛腫潰故

如岩穴之狀血膿赤水淋漓甚穿內臟終致不救宜如小棋子

時先服十六味流氣飲方見 次服主方有穿潰者姑與解毒托

裏散外用去腐生肌藥治之 未破已破兼服蠟礬丸

主方 貝母 瓜蒌仁 青皮 柴胡 赤芍

當歸 撫芎 木通分 水煎服 痛加乳香沒藥

○乳癰 由暴感鬱怒氣滯血凝而成先宜忍痛用熱手或手裏綿衣烘熱重揉次用葱熨蒜灸淋洗諸法見外科必宜速散為妙婦人因苦痛延挨遂成大患

主方 瓜蒞仁研 金銀花 貝母各錢 天花粉 皂角刺 當歸尾 川山甲研 白芷稍 甘草節各錢 酒煎服甚加乳香

神效瓜蒞散 乳癰未成即消已成化水瘰癧諸毒皆効方九

又方 瓜蒞兩 搗炒研末酒下効或蛇退壹錢燒片草木五分 酒送下香油調敷

葱熨法 葱搗炒熱作餅疊患處上用銅杓微火熨汗出腫消

敷方 蒲公英春生路邊黃花如菊後結絨毬莖長三寸 搗絞汁和酒飲查敷

簡明醫說 卷之七 乳癰吹乳丸 聖方

又 馬鞭草 酒搗絞加搥碎姜一塊熱服一二椀查敷患處

又 五月五日棕箬燒灰酒調二服安 吹乳亦宜葱熨搽散

○吹乳 因兒吮乳母子睡熟兒口熱氣吹腫痛各外吹孕婦乳腫痛各內吹亦宜前方及瓜蒞散治之 或黍子各錢 好酒下

又 鹿角鹿兩炭 研細分二次用無灰酒滾熱飲盡汗出安

○乳汁不通 初覺急宜搽散及搗葱作餅熨結核成餅即為乳癰

主方 天花粉 柴胡 桔梗 瞿麥 木通各錢 連翹 赤芍藥 白芷 青皮各七 甘草五分 右加通草錢 煎服 水煎服 頻用油木梳烘熨乳房

主方 漏蘆 木通 穿山甲研 天花粉 王不留行

當歸各錢 皂角五分 右加通草三錢用猪前蹄足五寸同煮至蹄熟食蹄與汁或為末用蹄汁調下

又 芝麻半升 胡桃肉四兩 皂角五錢 穿山甲炒 殭蠶炒 各肉果錢 右共為末每服三錢溫酒送下一日五服

又 猪前足通慈草做花切 煮食蹄汁 又 赤小豆煮汁飲

又 肥胖婦人因痰氣壅盛乳閉滯塞消痰藥加漏蘆之類

又 天花粉研末 酒下 或飲蒿苜湯并食炒萊子同穿山甲研服

乳頭裂痛 芋麻根搗敷 補遺胎產諸方

乳癰 夏枯草 蒲公英乾各二兩 金銀花 漏蘆各兩 貝母

簡明醫說 卷之七 乳方 聖方

橘葉 菊花 鼠糞火 連翹 白芷 紫花地丁 山慈菴

炙甘草 瓜蒞 茜根 陳皮各一兩 乳香 沒藥各研七錢 右為末用夏枯五筋公英二筋搗絞汁煎濃為丸每錢食遠湯

乳癰 潰爛經年者 鼠糞火 土棟子經霜者 露蜂房各三錢 取淨末和勻分三次酒下間兩日一服完即愈

乳癖 白芷鼠糞各一錢 為末好酒下至醉外用白芨末水調敷胎痛山血 四物湯加香附童便 共為末每服三錢紫蘇湯調

火逼胎動 四物湯加條黃芩黃連 逆上氣急加香附 房事胎動 四物何膠斷艾白朮餘各錢 動而痛當歸四錢煎服 難產胞乾 滑石一兩 白蜜香油各半盃慢火畧熬調石頭服

煎調一兩摩塗臍腹上下。未產更以輪白皮秋葵子葱煎調

交骨不開難產 當歸川芎 各五錢生膏婦人髮燒三錢龜板

難產多日欲死 人參 五錢 當歸 一炮姜 二水煎服 元月丹產益

子死腹中 唇紅舌黑子死唇黑舌紅母死俱紅並生俱黑同

死 平胃散一大貼煎一鍾入芒硝三錢服再煎洗腹胎下

又 肉桂 三錢 麝香 五分 作一服酒下 或百草霜灶心土白芷

等分研末童便酒下或葱白二七莖煎服加童便酒更好

催生驗方 魚膠 四錢切以針刺 栝枝 一兩一葉一刺五月開

白芷 一錢 百草霜 一錢 研 千里馬 男左足舊草

右以栝芷水酒各一鍾煎一鍾去查入膠煮化酒一末服

簡明醫教 卷之七 四七

產不快順 雲母 五錢 用溫酒調服即生 胞不下 芒硝 三錢

催生 魚膠 燈上燒焦一錢或敗筆頭燒灰 九服 貝母 一錢去

秋葵子 七十粒 鳳仙花子 研路傍草鞋鼻 燒灰 乳香 末一錢

白羨粟貝母 等分 為末 三錢 灶心土 二錢 隨取一味酒下或米湯下

弩牙燒赤淬酒 飲 鑿柄蓬頭燒灰或槐子 七 或細艾性灸右足

或草麻肉搗貼脚心 產下 或赤小豆煮服 橫生 益母草六兩

天寒難下五積散加 蛇退煎服 觸犯禁忌硃砂符燒灰酒下

產後氣脫 人參 五錢 乾姜 二錢 肉桂 二錢 煎服虛甚倍參加製附一

產後虛喘 人參 五錢 附子 五分 煎服有漸加參至三兩附三錢功

產後喘汗用參甚不効宜補心腎秦仁一懷生地白芍麥冬五

味枸杞牛膝杜仲當歸身阿膠牡蠣龍眼肉至數十劑全安

種子丹 海鹽都諫陳海洋公五十無子服此連舉五子五女

何首烏 兩 仙茅 四兩 牛膝 酒 白茯苓 八兩 乳砂 牛乳

生地黃 蒸搗 枸杞 紅州 人參 明 當歸 身 杜仲 姜 汁 拌 鹽

遠志 牛草 汁 相子 仁 去 山茱萸 兔絲子 餅 破 故 紙 炒 香

大胡麻 酒 蒸 核桃仁 松子仁 俱 研 右 各 為 末 稱 配 入 地

黃重晒磨加二仁煉蜜丸桐子大每百九空心酒下夏鹽湯

製首烏 八月採赤白各半極大如龜蛇形尤佳竹刀刮去皮

切片米泔水浸一宿瀝晒三次木臼搗末

肇姪丸 調經養血順氣健脾男子預宜脾健腎足精滿氣充

簡明醫教 卷之七 四八

香附 一兩 四分 鹽 酒 童 便 搗 光 當 歸 酒 熟 地 酒 蒸 姜

白芍藥 酒 炒 各 白木 澤 蘭 陳 皮 各 二 黃 柏 炒 甘 草 酒

阿膠 酒 蒸 化 右 為 末 磨 地 入 膠 酒 糊 丸 每 服 百 九 空 心 米 湯

男忌六錯 一甲子庚申本命朔望二奔走作勞力疲氣乏三

醉酒病後憂怒驚恐四交接頻數起早睡遲五神聖座近星月

風雷六大寒大熱大飽大饑 女忌五迷 一經愆多病帶下

崩淋二皮蠹肉燥口大氣雄三勞弱羸怯癡風暗疾四肥胖太

瘦多產少食五形質不全陰妬不良巧奪天機之妙孕嗣人倫

大端得人不得失人非人而傳失巧但敬授慎默廣為善事助

新刊簡明醫教卷之七

武林白石孫志宏克容氏編輯

富湖仲簡堯文燁

瑞生陸錫祥

仝梓

外科總論

經曰膏梁之變足生大疔受如持虛膏梁厚味熱毒內積其變多生大疽其受毒部分則毒從虛處受之大疔大疽也以其根深在內也又曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫夫瘡瘍之證初成之時當察經之傳變病之表裏人之虛實受之淺深而攻補之如腫痛熱濕大便閉結邪在裏也疎通之腫焮赤痛寒熱頭疼邪在表也發散之焮腫痛甚者邪在經絡也和解之微腫微痛而不作膿者氣血虛也補托之浸腫不痛或不作膿或膿成不潰者氣血虛甚也峻補之色黯而微覺腫痛或膿成不出或腐肉不潰者陽氣虛寒也溫補之若泥於未潰而能用敗毒之藥復損脾胃不惟腫者不能成膿而潰者亦難收斂七惡之候蜂起多致不救此其大略而已

論陰陽

癰疽之證有二十餘種最切要者分別陰陽是也發於陽者屬六府為表為火為實發於陰者屬五臟為裏為鬱為虛故陽發則大而高起皮薄色赤發有椒毬數十輕按即痛形大而淺為癰故陰發則平而內作皮厚色淡腫硬不起狀如頑膚重按隱

木而痛形小而深為疽又有陽中之陰似熱非熱雖腫而實虛

若赤而不躁雖痛而無膿既浮而復隱外盛而內腐其人多肥

肉緊而內虛有陰中之陽似冷非冷不腫而實赤微而躁有膿

而痛形雖不盛而內實煩悶其人多瘦肉緩而內實有陽變為

陰者病發於陽而極熱則當順氣勺血因有赤腫發熱便閉躁

渴之熱證脈洪數而實雖嚴冬惟當暫用苦寒之藥以瀉熱毒

如過用寒涼或悞草藥性冷則氣滯血凝而危急用溫熱藥使

氣行血和乃可成膿有陰變為陽者病發於陰而極冷則當內

用平補兼以宣氣滋血助陽健脾進食或不腫不赤皮寒肢冷

瀉利腸鳴飲食不入不時嘔逆等冷證脈微弱而遲雖盛暑亦

簡明醫教

卷之八

陰陽

二

當暫用辛溫之藥以助陽氣倘又誤涼藥急用大熱之劑回陽不

論虛實

寒熱作痛皮膚壯熱口渴煩躁飲食如常大便秘硬小便赤澀膿出稠粘膿盡收斂為實熱證易治氣血虛弱者塌而不起雖腫不赤而軟慢肌寒肢冷自汗色脫食少懶言小便自利大便滑泄不起不腐膿少而清極難收斂切忌攻伐專宜溫補此虛

寒證難治。小按即痛者。膿淺為實。重按乃痛者。膿深為虛。按之不復起者無膿。乃清水也。按之即復者有膿也。膿出反痛者。虛也。宜補。有膿多者。亦氣血虛而不能禁固也。有腫高而軟者。此膀胱經絡從背起也。豈可禁以為熱而用涼藥。潰後脈流遲緩者。易愈。細而沉時直者。裏虛。若痛尚未痊。脈洪滑粗散者。難治。以正虛邪實也。發熱而渴。脈虛而大。乃真氣虛。邪氣盛。不治。凡腫堅硬而無光澤。皮厚蒼頭如粟。脈洪大。按之澹。此精氣已絕。不治。如未穿破。毒攻臟腑。一毫熱藥不可用。若已破潰。臟腑既傷。飲食少進。一毫冷藥不可用。此亦言其常也。變者又宜斟酌。如毒成膿。管寸長深滿。膿血膠粘。易治。臭穢清水。血敗氣衰。腸絕陰虛。不治。

論感受

夫人之一身。本於五臟。五臟皆本於胃氣。邪氣鬱於胃中。胃氣盛而體實。則邪氣相搏而流注於經絡。澹於所滯。血脈會聚。結而為癰。胃氣弱而體虛。則邪氣盛而宿於經絡。阻於所行。血脈凝滯。結而為疽。故曰外如粟。內如谷。外如錢。內着拳。雖因榮衛不調。經絡凝滯。致病之由。非止於此。究其源有五。一天行時氣。二七情氣鬱。三體虛外感。四蘊熱搏於風冷。五食膏粱厚味。腥膻熱毒。又云一天行二疲弱氣滯。三怒氣四腎經虛。五服法酒。服丹藥。食炙煖物。及大怒鬱憤。盡力房勞。精虛氣耗。皆能致發。背搭手。腦疽大疔。癰癤脚發。乳癰。諸般腫毒之證。

論治法

經曰。汗之則瘡已。所謂疎泄榮衛之邪。此大法也。故初感脈浮。數。痲腫赤痛。加減敗毒散。發散之。脈沉實。煩熱躁渴。腫硬痛深。大便秘。邪在裏。宜下之。黃連湯之類。疎通之。仙方活命飲。外無痲腫。內無便秘。邪在經絡也。宜調和榮衛。托裏養榮湯。白芷升麻湯。腫高。痲痛。脈浮。宜托裏藥治。內托復。大痛或不痛。痲腫不作膿者。邪氣凝結也。宜解散。內托復。之內。服仙方活命飲。煩躁飲冷。痲痛脈數者。邪在上也。宜清利之。清涼飲。全銀花散。惡瘡久而不潰。氣實兼寒邪也。宜宣而補之。十宣散。如發熱汗多。大渴便閉。語者。結陽證也。宜下之。黃連內疎湯。破格丹。是也。不作膿而不潰者。虛也。大補之。補中益氣。或十全大補湯。腫痛飲冷發熱。睡

語者。火也。宜清降之。清心湯。即防風通聖散。加黃連。不作膿。或不潰。及不飲。陽氣虛也。托補之。托裏散。微腫微痛。不作膿。及漫腫不痛。膿成不潰。俱宜大補色。皆加助陽藥。亦宜補之。有陰證。而又誤涼藥。急宜大熱藥。回陽。建陽湯。建陽散。首先宜服乳香。豆粉。救心護膜。初病作嘔。毒攻心胞絡。救其心神安寧。雖有重病不死。世有輕病反死者。因透膜而元氣泄也。故救心護膜為第一義。如按之上。下不熱不軟。都牽強者。尚未有膿。急消之。凡按之軟實有膿。而不潰。宜急破之。不然則內潰日久。難于收斂。若未有膿。切不可破。針破。

五善七惡

動息自寧。飲食知味。一。大小便調。二。膿潰腫消。水鮮不臭。三。神

彩精明語聲清亮四體氣和平五善也大渴發熱泄瀉或閉一

黃芪竹葉湯氣血俱虛水珍湯加黃芪

冬五味山藥或八味丸方以咀煎服

膿血既泄腫痛尤甚

色敗臭二入參黃芪湯或十全大補湯加麥冬五味

腫了上視三六味丸加山梔麥冬五味如未

臥四六君子加姜棗如未効補中益氣湯加山藥山萸

便四肢沉重五補中益氣湯加山萸山藥五味如未

食不下舌不知味六六君子加木香砂

目四肢浮腫七補中益氣湯加姜棗未効六君子加炮

痛泄瀉咳逆昏憤救裏溫中湯後用六

驚悸寤寐不寧牙關緊急自汗脈洪大按之如無或身熱惡衣

簡明醫教 卷之八 五善七惡 五

欲投於水或厚衣仍寒或手足逆冷腰背反張頸項勁強急用參苓

歸木附子救之五善見三則吉七惡見四則危實證見惡候可治虛證

內消 經曰汗之則瘡已又曰發表不速熱故瘡瘍初感必以消散為

最勝內服發汗之劑外用蒜炙之法靡不奏功惟當審經絡處

所形脉虛實深淺大小而兼引經之藥如腦背腰項臂臑皆太

陽經宜黃連羌活脊背連脇處為近少陽宜敗毒散形實脉實

者宜漏蘆湯五利大黃湯等疎利之氣虛參芪為主血虛參歸

為主佐以消毒加以引經而行補瀉惟少陽一經與氣血虛同

法治凡瓜蒞射干山甲蟾酥連翹地丁牛蒡子金銀花木別子

類皆內消之藥

托裏

凡癰疽血氣虛者則邪氣入深而散漫不能突起亦難潰膿或

潰後膿少或膿清稀或堅硬不軟或根脚雖紅而膿不開大者

皆氣血兩虛必用內托以補藥為君活血驅邪為臣辛香行滯

為佐加溫藥以禦虛寒亦有一二日使覺脉沉細而煩悶臟腑

弱而皮寒恍惚不寧外證深沉者即當用托裏諸方扶搖兼溫

熱之劑從治之

膿蝕

瘡瘍穿破膿血潰出則重者亦覺輕可甚不得已乃用刀針若

勢緩證輕以藥餌破之後有昏針丸之類皆可用以咬頭出膿

定痛

簡明醫教 卷之八 托裏 膿蝕 定痛 六

經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火後有止痛諸方痛甚者必宜苦寒

藥為主虛弱者補中益氣湯加苦寒藥量輕重用血熱者四物

湯加牛旁黃芩連翹在下加黃柏肥人加羌防荆芷大便秘加

大黃諸藥中兼乳香沒藥痛可定矣

惡肉

去惡肉者腐肉也必宜去之推陳致新壯人自去老弱必取之

不去則腐爛筋膜結成多骨有致大潰而死者用大補氣血藥

收斂或可用手法去之或用雄黃輕粉敷之蠹肉努出或用遠

志末油調塗之又法息肉突出烏頭半兩醋三碗浸三周時洗

之日夜三四次諸瘡努肉如蛇突出數寸硫黃末敷之即落宿

膿潰久。靈肉不腐。亦用硫黃輕粉敷之。四圍仍有腫焮處。用毫
針燒赤刺之。約一米深。紅腫即縮。

生肌

潰後收斂遲速在氣血之盛衰也。然龍竭乳沒赤石脂煨寒水
石象皮水銀輕粉之類。雖可收斂。必宜內服參芪當歸白朮白
芷之類以助之。如色赤血熱不收。四物加山梔連翹。色白宜補
托。或潰後而根脚赤暈。反開展不收。宜大補十宣散去朴桂。倍
參芪當歸加金銀花白芷連翹犀角瓜萎根。夏秋加三黃羌活。
破後不潰。瘡口堅硬者風也。蠹肉不腐者雄黃輕粉研勻敷之。
如癰疽腐爛。及諸瘡毒滑石兩雄黃伍錢研細无洗淨敷上外以
膏同醫受卷之二生肌避忌七

避忌

患諸毒者。宜慎風寒。謹口腹。適起居。減言動。藥餌精潔。飲食以
時。雖小愈。尤宜絕戒房室。犯之必不合口。存細孔如簪脚。津津
水出而成漏。累月經年不收。多變小便澀數。消渴消中等證。致
津液枯涸。肌肉瘦削。諸患而死。可不慎歟。又有發背之證。腥穢
尤甚。常有小蜈蚣潛入。則大痛大潰。必至於死。切宜置卧榻於
室之中。榻下縛雄鷄數隻。得免此害。凡血氣間香則行。得臭則
逆。且香氣入腠而醒脾進食。患人卧處宜香氣。忌穢氣。

食肉

經曰膏粱之變。足生大疔。此言富貴人也。日食厚味以助其陽。
不能走空竅以行陽道。反行陰道。則脾土溼氣大勝。子能令母
實。則心火大熾。火土既盛。腎水虧傷。溼熱上行。必出於太陽膀胱
之經。為腦疽。為發背等諸最重之證。故患時不宜再食厚味。
以助宿積之蘊熱也。若貧家則不然。無過氣鬱而成。蓋諸穀補
陰。諸肉補陽。素不得穀肉之養。再泥以諸毒戒肉。何所賴以補
益乎。故不可一途而論也。一貧士患發背。無力買人參。補藥日食肉。飽飽而愈。

作渴

附預防

瘡瘍之證。必因膏粱厚味。或恚怒鬱結。致毒火蘊蓄。漸覺心煩
躁熱。口作大渴。引飲不休。食已即餓。乃欲發癰疽之候。當急服
清火解毒之藥。而預防之。可免斯患。如患後因膿水泄其津液。
亦至口渴不已。無問初腫潰後作渴。竹葉黃芪湯。脉數無力。口
乾。補中益氣湯。便秘清涼。飲尺脉洪大。按之無力。用加減八味
丸。若口燥舌黃。渴欲飲水。此丸尤妙。渴與口乾不同。若用丹藥
鎮墜。禍不旋踵。惟截嫩桑枝。同五味子煎湯飲。可以救陽水。

灸法

蒜灸

豆豉餅灸

淨十灸

瘡瘍用灸。有回生之功。一切癰毒發背初起。赤熱腫痛。可拔引
鬱結滯氣。及攻散沉凝留血。必能取效。老弱元氣虛寒者。不灸
必至敗亡。先以溼紙覆其上。立視紙先乾處。即癰頭也。取蒜灸
獨蒜猶佳。切片如三文錢厚。安瘡頭上。用大艾炷灸之。三壯。德

蒜痛者。灸至不痛。不痛灸至痛。一二日十灸十愈。二四日灸六
七愈。五六日灸三四愈。十數日灸無功。若有十數頭。蒜研成餅。
聚艾灸之。亦愈。如瘡大。日夜灸。若有椒眼。一二十。逐眼灸之。用
蒜併淡豆豉乳香搗作餅。灸尤効。初起中有一黃粟米頭。用獨
蒜切去兩頭。安瘡上。灸十四壯。多至四十九壯。一人背疽。踰月
益甚。艾加瘡上。早灸至晚。百五十壯。知痛。明日鐸去黑痂。敷藥
服藥即安。如無蒜。用豆豉搗作餅。如俱無。用淨土以衆人唾。或
加葱汁。或漱口水。和捏作餅。大小依瘡厚。一二分。痛則加厚。不
大熱減薄。一壯一換。灸四十九壯。以驗爲度。

明灸

簡明醫彙 卷之八

明灸

九

明灸者。着肉灸也。患人勿畏痛楚而失之。能耐一時之痛。免多
日之大痛苦也。人年四十以上。患發背等毒。急宜早治。爲治之
要。莫過灼艾之功。勝於用藥。使毒氣外泄。而有行散之力。使熱
氣內攻。而有消逐之能。則凝血滯氣。由此而解矣。若處鄉居僻
境。深山窮谷。及遊宦行商。舟車驛邸。無醫藥之處。尤宜行此灸
法。其効甚捷。明灸之法。亦施於陰毒頑木。不痛惡瘡。在陽證瘡
瘍。腫毒隔蒜可也。最勝者。獨蒜大顆。切片三分厚。次赤皮蒜。搗
爛作餅。或切片。古有豆豉椒姜鹽葱。相和搗爛。捻餅灸法。其硫
黃灸。豆豉餅灸。淨土灸。皆良法也。取其便而用之。初起攻散。已
潰接補。陽氣如瘡不開。大肉不敗壞。瘡口易斂。皆一灸之神力。

也。灸後依大採取方法。隨證而治之。庶幾可云十全矣。

桑枝灸法

發背不起。或瘡肉不潰。乃陽氣虛。用桑枝燃火吹息。稍近肉。取
其火氣。灸患處。片時。日三五次。助腫潰。若已腐潰。新肉生遲。宜
四畔灸之。瘰癧流注。膿瘡惡瘡。久不愈者。亦宜此法。未潰解毒
止痛消瘀。已潰補氣散餘毒。生肌肉。陽證初起。用此。即出毒水
肉消。日久用之。雖潰亦淺。大有神功。勿以平易而賤忽之。

騎竹馬灸法 後有圖

治一切癰疽腫毒。按諸項灸法皆好。惟此尤能消患於未形。諸
神首取。惜乎近世少用。是不知其妙也。其法令患人以肘憑几
案。豎臂腕。腰直。用篾一條。自臂腕中。曲紋盡處。男左女右。貼臂
肉。量起。直至中指尖。不連指甲。用竹扛一條。患人脫衣。騎定身
正直前行。二人扛起。令脚不着地。使二人扶定。勿令仰攬。將量
臂腕。從竹扛坐處。尾骶骨盡邊。直豎竹扛上。貼脊背。量至篾
盡爲則。用墨點記。此只是取中。非灸穴也。另用薄篾量病人中
指中節。相去兩橫紋。尖爲則。截爲一寸。就前所點記處。兩邊各
量開。指篾盡處。乃是灸處。兩穴各灸五壯。或七壯。不可多灸。不
問癰生何處。及乳癰。並用此法。灸之。無不愈者。如疽發身左。灸
左。發身右。灸右。甚者左右皆灸。蓋此二穴。心脉所過。經曰。諸痛
癢瘡瘍。皆屬心火。又云。心主血。心氣滯。則血不行。故逆於肉理。

簡明醫彙 卷之八

桑灸

十

而生癰。灸此使心火調暢。血脈流通。即能奏效。起死回生。

神燈照疔法 雄黃 硃砂 血竭 沒藥 麝香 各等分

共研搽綿紙十四條。作燃潤麻油點照。瘡毒離半寸。自外內。

周圍照藥氣薰毒令熱。先三漸消用敷藥。車前草 穉荻草

五龍草 金銀花 俱鮮者 加陳年小粉飛鹽。少又搗如糊。頻敷

中雷頭 早可散。遲略潰。草欲鮮者。取根或乾者。為末。加陳醋

灸漏

凡瘡瘍日久成漏者。非止一端。有因生于虛軟卑下之處。其氣

脈下行而難于收口。或氣血虧傷。遷延不收。或患瘡毒未平復。

因犯房室成漏。小孔出水。不已。漸成不救之患。用大附子一個。

簡明醫教 卷之八 灸法 十一

重一兩者。氣足為末。津唾調作餅。如漏孔大三文錢厚。用艾炷

於餅上灸。內服大劑十全大補湯助之。至孔合為度。如無附子。

用淡豆豉。搗作薄餅。灸或猶在穿潰時。難於生肌。疽毒根深。水

從內出。用硫黃為末。和入白麵。以大蒜搗捻成餅。如孔大厚三

分。艾灸勿令痛。要令大熱。至二十一壯。每壯一換。隔五日。用翠

雲錠。信効錠子。以此許用入瘡口。反肉去。好肉生。次上生肌散。

內服大補托之藥。

針法

瘡瘍用針為貴。有肉已潰。膿不出。必宜針之。惟審淺深。若皮薄

針深。恐傷良肉。肉厚。針淺。膿毒不出。如先見血。後見膿。綿紙條

捺塞口。若附骨疽氣毒流注。及其經久不消。內潰者。用針開之。

若治咽喉。宜用三稜針。及癰疽痛而四畔赤腫。如灼。用磁鋒。砭

破鼻角刺亦可。即輕切勿見風。癰若皮薄而多有微脹。瘡寒之

狀。膿血不出者。用針橫直裂之。凡瘡不起。可托不膿。可補。膿成

不出。及時針之。但不宜早。如在虛處。近筋骨。未可針。若畏痛。而

不針。則誤矣。恐傷良肉。則惑矣。瘡發於肉薄之處。腫高寸許。針

入二分。發背高三四寸。針入寸許。附骨 沉患處。肉已腐。何痛之

有。怯弱人。及附骨疽不破。遷延日久。膿變臭水。而透內膜。必至

火烙針法

如附骨疽氣毒流注。及其經久不消。內潰不痛。宜火針開之。鐵

簡明醫教 卷之八 灸法 十二

筋一烙。極為痛。後膿亦流通。名曰熟瘡。此法必用於日如

用尖針。恐口再合。必如筋大頭。圓長六七寸。一樣二。然時蘸

香油於炭火上。燒紅。於瘡頭近下烙。宜斜入。向軟處。一烙不透。

再烙。必得膿水流出。不假按。抑須用真綿紙作捻。折轉如索樣。

隨深淺入瘡口。餘紙分開。瘡外貼膏藥。烙直入。恐透膜。宜斜

吸法

諸毒初感。用苦竹長一二寸。用頭節。妙削去青皮。似紙薄。為佳。

其大小。隨瘡斟酌。當毒瘡初發時。用白炭。蒸蒼木厚朴烏柏皮

各伍 剝片。用水一碗。藥與竹筒同煮。以藥將乾為度。乘竹筒熱

以手按之於患處。須待其筒自粘在瘡上。不必手按。須臾用前

藥分兩再煮。候前竹筒冷。以手拔去。再將熱者如前法。其膿自吸入筒中而瘡愈矣。

熨法

治瘡瘍腫毒癰疽。及流注結核。鶴膝風附骨疽等。及婦人乳癰。若先已用灼艾等法。而餘腫猶未消。或輕者未經艾灼。皆宜用此法。以葱連白頭根鬚搗爛炒熱。勿畏痛楚。須布包着實熨之。必用二包輪轉炒熨。痛者熨至不痛。硬者熨至軟為度。大抵此法必用于微覺之時。且熨且揉。必至於散而後已。最有大功。若跌撲傷損。瘀血凝滯。亦用此法。更以南星草烏為末。拌入爛葱內熱熨。尤為神效。葱與生姜搗炒布包。熨傷寒結胸。及男婦老幼。一切食積氣滯。胸膈滿脹。病悶大有功力。頃刻見效。

湯漬法

凡瘡腫諸毒。無出氣血凝滯而然。所謂熱則行。冷則凝。又云。熱則流通。寒則凝結。必使熱氣攻之。使腠理疎通。經絡融暢。誠至理也。古人有此法焉。其法以藥濃煎成汁。如瘡在四肢。則塌漬之。在腰腹者。則淋洗之。下部者。則盪浴之。仍以淨布蘸汁多淋患處。冷則再熱。日用十餘次。夜亦不息。乃効。藥方見後。

圍法

發表不達。熱敷圍亦發之意。又云。熱則行。冷則凝。不可一於寒涼。當隨陰陽寒熱。各適其宜。如果極熱。陽證。清涼可用。大都寒

砭法

兼之。若非極熱。必以溫治。如大涼非特氣血凝滯。致令腠理閉塞。而毒攻內矣。如一因藥時。但宜欬其根脚。必不可當頭敷。遇所請避其來。是也。治背癰等證。及小兒丹毒腫赤。遊走不定。用細磁器打碎。取有鋒銛者一塊。以竹筋劈開頭寸許。夾住磁銛。用線扎定。以兩指輕撮筋槽。將鋒銛對息處懸寸許。再用筋擊之。銛刺其毒。血出自愈。若如是而疼者。不可怠緩。不然毒入心胞。多致不救。按心屬火。毒亦火。同氣相求。故獨攻心。

刺法

諸毒宜刺此穴。在手大指內側。去爪甲如韭葉。刺三分許。以手自按至刺處。血出則消。若重者及成膿者。須再灸患處。

簡明醫要

卷之八

砭法 刺法

十四

湯漬法

主方 加減散 治癰疽疔腫發背乳癰等證。憎寒壯熱。其狀似傷寒。一二日至五日。連進二三服。重者輕輕者。散諸毒首服。
羌活 獨活 柴胡 前胡 桔梗 茯苓
枳殼 川芎 金銀花 連翹 防風 荆芥
甘草節 薄荷等分 加生姜三片。連鬚葱頭三個。水煎熱服。厚蓋取汗。出透微可散。毒在上。食後在下。食前諸藥皆然。
冬加麻黃升麻 熱甚加黃芩連翹 大便秘加大黃芒硝
追風通聖散 治癰疽發背腦疽流注腫毒壞病死肌疔患於未萌之前。拔毒於既成之後。順氣勻血。扶值胃本。并折傷痛

氣血疔脚氣諸般瘡毒腫痛腰疼痰飲皆治

當歸尾 何首烏忌鐵木通去皮 赤芍藥 白芷 小茴香

烏藥 枳殼 甘草等分水酒各一鍾照前煎服

壯人去當歸 腦疽發背去木通 有痰加半夏 風痰加

桔梗生薑 流注加川獨活 傷寒變流注尚有熱邪加蘇

葉升麻葛根 頭痛加川芎 發背已久涼藥太過去木通

加厚朴陳皮甚者加白豆蔻 腸癰宜十宣散與此間服加

金銀花藤 腫毒堅硬不穿加川芎獨活麻黃蔥頭出汗即

穿 折傷去木通加川芎陳皮 經年腰痛加川草麻玄胡

索酒煎 脚氣木瓜板榔山甲水煎瘰癧流注通身拘急喘

簡明醫方

卷之八

制法

七五

真人活命飲 治一切癰疽發背疔瘡腫毒不問陰陽虛實善

惡赤腫大痛或不痛然當服於未潰之先與初潰之際毒已

大潰勿服發背惡毒甚者須一日夜服二三劑可消

金銀花錢穿山甲錢當歸尾 陳皮錢天花粉

甘草節 赤芍藥 乳香另研白芷各壹錢 貝母 防風各壹錢

沒藥另研 皂角刺各五分好酒二鍾煎成充化乳香沒藥上

食後服下身食前服查再煎多飲酒蓋汗出為度

在背倍皂角刺 胸加瓜婁仁 腋倍白芷 手足倍金銀

花 老弱病後加參芪 疔瘡加紫花地丁 發背惡毒初

起每貼調化牛黃二分服大効

托裏消毒飲 一切癰疽六七日服此未成即消已成即潰能

壯氣血固脾胃使毒氣不內攻膿易出肌易生膿未盡切忌

生肌藥收口早必復內攻

金銀花錢黃芪錢天粉各壹錢 防風 當歸 川芎

皂角刺 川山甲研厚朴各壹錢 桔梗 白芷各壹錢 陳皮錢

水酒煎服一方用參苓木翹 去枳朴粉風

托裏十宣散 治癰疽疔瘡發背未成膿猶可散已成連潰膿

出切勿手擠惡肉自去不必用針此藥用於前藥之後八九日

人參 黃芪炒 當歸酒各壹錢 川芎 防風 桔梗

白芷 厚朴 薄桂 甘草生各壹錢

簡明醫方

卷之八

藥方

十六

右為細末每服三錢黃酒調下不飲酒木香湯調下煎亦可

癰疽疔毒倍白芷 不腫痛倍官桂 不食加砂仁香附

痛甚加乳香沒藥 水不乾知母貝母 不破皂刺 咳陳

皮杏仁生薑 大便秘大黃枳殼 小便澀麥冬車前木通

十六味流氣飲 流注因一切毒怒氣結腫硬作痛或胸膈痞

滿風寒溼毒血氣不和結成腫塊肉色不變或漫腫無頭癰

人參 桔梗 當歸 官桂 甘草各壹錢 黃芪錢

厚朴 防風 紫蘇 芍藥 烏藥 枳殼

檳榔 木香 川芎 白芷各伍分 水煎食遠服

五香連翹湯 諸瘡初覺一二日便厥逆咽喉閉寒熱不可輕用

連翹	升麻	獨活	甘草	桑寄生	木通
黃芪	各等	大便秘加大黃			
右為末每五錢水煎沉香木香丁香乳香為末麝調服取利					
當歸黃芪湯	瘡瘍臟腑已行如痛不可忍宜和榮衛				
當歸	黃芪	生地	地骨皮	川芎	芍藥
熱加黃芩	不臥加梔子	嘔乃溼氣侵胃加白朮水煎服			
內疎黃連湯	瘡毒腫熱作嘔大便秘	煩躁飲冷心煩脈實邪在臟宜服此疎通之			
黃連	梔子	當歸	芍藥	木香	板榔
黃芩	薄荷	桔梗	連翹	大黃	甘草各壹錢
黃芪竹葉湯	癰疽氣血虛胃火盛而作渴乾嘔				
簡明醫家	卷之八	藥方	十七		
淡竹葉	生地	麥門冬	當歸	川芎	黃芩
芍藥	人參	半夏	軟石膏	黃芪	加甘草各壹錢
內托復煎散	腫癰於外根盤不深	形證在表脈浮痛在皮肉此因邪甚宜急服散裏			
防風	地骨皮	黃芪	芍藥	黃芩	白朮
人參	茯苓	當歸	防風	甘草	桂
右咀先將蒼朮半斤水五升煎去蒼朮入前藥煎至四盞					
作四次終日服完又煎蒼朮復煎前藥	未効再半料大便秘煩熱再少服黃連湯				
奪命丹	惡毒腦疽發背等諸熱毒	大黃	牡蠣	乳香	沒藥
右分二服加生薑好酒一碗熬數沸去渣調入	乳沒露一宿透服				
護心散	一日至三日連進數服內托不透膜雖甚無妨	透服			

眞菴豆粉	兩	明乳香	半兩	慢火瓦上出汗研末
右研每服三錢濃煎甘草汁調下	時時細呷要藥在心膈若毒沖心嘔逆宜多服或因受寒嘔另用溫藥止嘔陰毒冷証及老弱非因丹石致病三日外皆不宜服			
人參養榮湯	潰瘍發熱倦怠黃瘦少食氣血不足不能收口			
黃芪	天粉	陳皮	當歸	皂角刺
川山甲	桔梗	防風	熟地黃	五味子
遠志肉	甘草	右加姜棗水煎服		
定痛托裏散	定諸腫毒瘡痛聖藥	當歸	白芍	肉桂
沒藥	俱出汁研	栗殼	去帶	右水煎服
簡明醫家	卷之八	藥方	十八	
內托黃芪湯	潰瘍作痛少腫口乾	人參	白朮	茯苓
川芎	白芍	生地	甘草	黃芪
遠志	官桂	右加姜棗水煎服		
乳香定痛散	乳香	沒藥	寒水石	滑石
右為細末諸痛不可忍者敷上患處寒熱痛皆止				
獨聖散	諸癰疽發背因氣滯血凝或因鬱怒所致服此非發藥人	香附子	打碎去毛生薑汁醃一宿晒焙	
右為末每三錢白湯送下	若非鬱怒切不可服服反增甚			
千金托裏散	一切癰疽發背疔毒	黃芪	川芎	白芷
官桂	甘草節	人參	厚朴	防風
連翹	當歸	木香	乳香	沒藥

右為木每服三錢酒一大盞煎二三沸和香熱服

托裏消毒散 胃氣虛弱或因疔伐不能潰散服此無膿可消有膿即潰去腐生新

人參 黃芪 鹽水炒 當歸 白芍 酒炒 白茯苓 芎藭

白朮 炒 金銀花 白芷 各五分 甘草 五分 連翹 分 水煎服

高腫焮痛加黃連 漫腫微痛去銀花連翹倍參朮 頭痛

加羌活川芎 渴煩大便秘去參朮芪歸 加大黃

針頭散 一切頑瘡瘰肉不化癰根不消潰久成管兼托裏藥

赤石脂 白丁香 沉香 各二錢 黃丹 飛 人言 各一錢 輕粉

麝香 各五分 蜈蚣 一條 右末搽瘰肉等瘡口小或腐成條維和

托裏養榮湯 瘰癧流注及一切不足證不作膿或不潰或潰後於熱惡寒肌肉消瘦飲食少思臥不寧盜汗不止

簡明醫要 卷之八 外科方 十九

人參 黃芪 生地 酒炒 當歸 川芎 芍藥

白朮 各五分 五味子 麥冬 甘草 五分 右加姜三片水煎服

白芷升麻湯 治臂癱腫痛右手脉大未成膿者

白芷 壹錢 升麻 桔梗 各壹錢 黃芩 叁錢 甘草 壹錢 紅花 各伍分

黃芩 四錢 酒水炒 右水一鍾酒半鍾煎服

漏蘆湯 一切惡瘡腫毒原癰疔瘡五發癰疽初覺一二日便

如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒身痛四肢沉重恍惚亂坐臥

不寧皮膚壯熱大便秘結小便黃赤並治孕婦勿服

漏蘆 白欬 黃芩 麻黃 枳實 升麻 芍藥 甘草 炙 大黃 芒硝 連翹 右水煎服

蟾酥丸 疔瘡多種至遍身麻子細疔發皆諸毒 危者兼服八寶散見疔門

硃砂 雄黃 研 蟾酥 酒研 和丸如蘿蔔子大每二丸用金銀花

紫花地丁稀發夏枯草車前鐵箬草木賊過山龍 各二錢

酒二碗煎八分吞下查水煎 熱服大熱厚蓋汗出大便閉小便長愈未効再服酒與粥湯

神仙解毒丸 一切疔瘡發背便毒諸般惡瘡無名腫毒初起者即服神効

明禁溶化丸如菜豆大硃砂為衣 每服二十九連類慈頭七側煎湯熱服蓋汗出即消

清涼飲 熱毒 大黃 炒 赤芍藥 當歸 甘草 各壹錢 水煎服

蠟燭丸 一切癰疽腫毒陰陽虛實肺癰腸癰乳癰乳疔等證

未潰消腫解散已破護心托裏潰後收飲生肌多服有効粉

癰痰核惡瘡三五年者可消 白禁 參兩 黃蠟 貳兩 溶化和禁

簡明醫要 卷之八 藥方 二十

末為丸但易冷難九一新瓦焙熟上鋪溼布數層放布上蒸

飲眾手丸一以蠟煮湯中乘軟熱撈起和禁丸一再入銀花

末 密 搗勻丸桐子大每服三十九酒米湯任下

國老膏 治一切癰疽腫毒懸癰附骨疽初覺即服

甘草 壹斤 河水四碗浸二宿 今藥汁出再煎去渣浸火砂鍋熬成膏酒或湯煎服

牛皮膠 截癰疽惡瘡外塗患處內可服之使毒氣不攻下內

連志酒 一切癰疽發背癰毒惡候有死血陰赤則不痛傳之

即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傳之則不痛若蘊

熱在內熱逼人手不可近傳之則清涼或氣虛血冷潰而不

欲傳之則欲若七情內鬱治之必愈

遠志祛去骨取肉晒研末每三錢酒一盞調服飲查敷患處

麻油酒背諸毒真芝麻油煎滾取起陸續和好酒飲

銀花酒治癰疽發背乳癰金銀花鮮者連藤葉磁器內搗入無

灰酒和絞汁飲查敷患處乾者煎湯或取五兩其草節壹兩

槐花酒治同槐花槐花微炒黃乘熱入酒二枕煎十餘沸去查

凡癰毒先飲槐花或銀花酒外用灸法次以銀花黃芪

回陽酒 治陰毒誤服涼藥不腫不腐吐瀉氣脫

附子炮 乾姜各錢 人參 白木 黃芪各錢 當歸

甘草各錢 陳皮各錢 右用酒水各半煎服不効倍參附

簡明醫要 卷之八

十全大補丸 治癰疽潰後補氣血進飲食最為切要凡膿血

出多有回生起死之功或有腫平痛寬遂以為安漫不知

桂附地黃丸 治命門火衰不能生土致脾土虛寒而患流注

等證及癰疽潰後虛寒七惡證見並宜服如虛熱者去附子

加五味子兩未得成丸加減煎服潰後調理如補中益氣丸

君子四物八珍皆可間服諸湯方合宜則用六君子湯即四

雄黃解毒散 一切癰疽腫毒勢甚難用此藥二三次後用湯

明礬四兩寒水石假雄黃水三碗入前末煎洗貼膏藥

豬蹄湯 消腫毒去惡肉潤瘡口止痛用豬蹄一隻煮汁煎藥

白芷 黃芩 蜂房陳年 當歸 赤芍藥 甘草各錢

右到以蹄汁煎藥去查淋洗患處以下俱洗方

漏腫湯 升麻 黃耆 防風 生地黃 細辛

川芎各錢 右用水五碗煎十餘沸稍熱淋漏內消如神

又方 漏蘆 升麻 芒硝 梔子仁 蒴藶

黃芩各錢 右用水五碗煎十餘沸稍熱淋漏或以淨布蘸漏効

又方 苦參 防風 甘草 露房蜂 照前法洗

大鐵籬散效一切腫毒 芙蓉葉 木鱉各四 寒水石

白芷 赤小豆 黃柏 白欬各錢 紫荆皮 貝母

大黃 地青 羌活 白芨各壹兩 防風伍錢

右為末水調圍四畔如肉脫去白欬白芨加生地地榆汁調

簡明醫要 卷之八 藥方

敷極熱證 寒水石 大黃 煇硝 梔子炒 朴硝研

南星 右為末生地黃汁或芙蓉葉汁調敷亦可

南星膏 治毒發險處以此藥圍之可使移之不險處

五倍子壹兩 南星 草烏 黃柏 白芨各貳兩為末

四虎散 治發背初生筋脈緊急不舒 附子生去皮

天南星壹錢 半夏湯洗 狼毒各五錢 右為細末熱酒調成膏

塗腫處以帛掩定雖覺熱如火燒無礙

神効散 治癰疽發背一切疔毒并瘰癧等證已成未成皆可

川烏炮去 川黃柏炙去 右為末唾調唾少漱口水調敷患處

四圍留頭藥乾用米泔不住潤溼已成潰爛先以槐枝艾葉

煎湯洗淨以香油潤之日換一次膿出勿擠痛減生肌腐肉

自落不落剪去不宜用針發背不宜貼膏藥忌怒氣房室孝

服體氣飲酒人忌一切發氣熱毒物 腦疽對口不必洗 風

又 白鳳仙花科根葉搗爛先以陳醋洗後敷藥一日一換將

又 初起以風化石灰或細辛 兩為末醋調敷三次或白芷末

又 南星赤小豆為末醋調或姜汁調圍或野苧麻根搗圍

又 鼓槌草根即上騰 搗圍或蒲公英路邊黃 或羊蹄根搗敷

又 奇無敵膏 一切癰疽疔毒兼服紫金錠諸解毒煎丸藥

桑柴灰五升稀紙飽 煎內滾水淋汁味淡則止入碗重湯淨濃如稀糊 茄桿灰石灰五

升依前 三汁熬成膏亦可點 每膏一兩調細藥取極真好者

石明醫發 卷之八 三十三

硃砂 雄黃 珍珠綿裹打細俱水 冰片 硼砂 輕粉

乳香 沒藥俱人乳研 酥酒研 銅青三分 明礬 火硝各六分

牛黃 麝香各二分 硃砂五分 和研萬下膏攪極勻入小口瓶塞

紫黃蠟厚封每用少許塗毒正頂勿着 藥乾醋蜜潤化其毒

爆出黑血毒水即時鬆解疔瘡加鐵鏽黃細 奎頂經宿根出

替針丸 膿成不得穿破者可咬頭出膿潰後無內攻之患

白丁香 硃砂另研 沒藥另研 乳香研各錢 糯米四十粒 用礮灰

如拳大貯碗內量入井水化待熱氣將息以米排灰中良久

米如水晶取出候用 右各為末和勻以米粒研九象豆大

用一粒安毒頭上將拔毒膏貼于外膿自出

又方 巴豆肉去油 油鹽豆豉十四粒 舍去皮令軟同研爛

入真麝香少許 捏小餅安頭上如有孔不大潰出膿檢作小麥

樣用紙撚送入痛少時膿大出肉色已黑不得去用巴

又 用蛾口蟹殼 燒灰酒調服頭破 又 牛旁子壹粒酒吞

巴油膏 解一切瘡毒及腐化瘻肉最能推陳致新

巴豆去殼炒焦 香油少許 共研勻點些少於腫處亦取收斂

乳沒生肌散 治諸般瘡癰癰疽毒凡一切新久諸瘡生肌收

軟石膏紅色者尤佳炭火煨紅待 龍骨參 乳香沒藥俱出汗

血竭 赤石脂各壹錢 輕粉伍分 右各研極細末和勻重研入

磁確寒緊勿出氣瘡毒洗淨挹乾搽上外貼膏藥或護紙

簡明醫發 卷之八 藥方 三十四

烏龍膏 治瘡疽發背疔毒瘡癩一切無名腫毒噴頭疔毒

跌撲損傷流注諸毒惡瘡凡已破潰不能生肌收口悉宜貼

之抽膿拔毒去腐生肌及膿瘡凍瘡湯火灸瘡杖傷脚裂楊

梅毒久爛不收者悉効及內臟諸癰並宜為丸蛤粉為衣酒

下熱毒水下亦白帶當歸湯咳嗽疾綿裏含嚙一切頭風

赤眼梔子湯下仍貼太陽穴跌打傷陳皮湯下膝痛鹽湯下

仍治婦人經閉血塊貼臍腹虎犬傷金瘡癩癰梅毒貼上

當歸 赤芍藥 官桂 大黃 生地黃 白芷

玄參各壹兩 剉細芝麻油貳斤 浸藥三日入鍋煎至藥焦以苧布

濾去渣淨油再熬熱滾桃柳棍三枝扎緊不住手絞轉看片

烟起。入水飛丹十二兩夏增冬減陸續傾入油不住攪轉。滾水中

成珠不粘手為度。撥起安定缸上攪噴水三口。扇令烟盡。薄

綿濾入鉢內。待冷攪入乳香沒藥未各伍錢數年不壞

萬靈膏 治風寒溼氣跌撲損傷風毒脚氣遍身疼痛挫氣悶

胸筋骨酸疼及血風膿窠裙邊癩瘡手足一切諸瘡毒立効

木鱉去殼廿個草麻去殼百粒威靈仙 當歸 川芎 赤芍

防風 荆芥 羌活 獨活 生地黃 白芷

黃芩 黃連 黃柏 姜黃各錢蛇退壹條

麻油冬兩夏五兩浸藥一日煎藥焦。濾去渣油入鍋煎滾。下

黃蠟兩次入嫩松香貳斤老松添油桃柳枝攪化。滴水成珠不粘手。

簡明醫教 卷之八 藥方

預備水半缸稀麻布一幅鋪綿少許。二人扯定將膏傾於布

上濾入水中。二人對扯黃色入鉢陸續置小器中微火頓攤

油紙或布如風氣悶搥搗炒姜葱擦患處大貼骨藥酒湯

硃竭膏 貼諸瘡尤効 血竭銀硃輕粉乳香沒藥各錢右各

研細末和勻以前萬靈膏兩以手蘸水將諸末拌扯紅色

散毒膏 治一切癰疽發背諸般腫毒熱節嗜噴頭毒週身諸

毒初起貼之即消有膿者咬頭出膿去腐清腫抽膿拔毒

前膏木鱉至蛇退再入 金銀花 皂角刺 川山甲切

麻油 黃蠟 松香煎法相同略不粘手即取起扯黃每斤

用真銅青二兩木鱉少許研化真蟾酥二錢酒少許研化二味拌扯入膏內。

用隨大小捏薄。捺布上貼如小者油紙攤。

神異膏 治癰疽瘡瘍腫毒一切諸毒甚効

露蜂房有子者壹兩蛇蛻鹽水洗飛丹拾貳兩真麻油貳斤

先用黃耆玄參杏仁各壹兩入油煎至黑色方入蜂蛇男髮一

團再煎一時不住以柳枝攪將稀麻布一方鋪綿少許慢鉢

口濾去渣淨油入鍋徐下飛丹柳枝攪滴水檢不沾為度

疔瘡

經曰膏梁之變足生大疔。此證因於肥甘厚味煎煇熱毒醇酒

房室以致邪穢蘊蓄而成此患亦有誤食死牛馬肉及夏月烹

調肉食庖人汗滴肉中或造豆腐者汗滴或人家水缸中飯糝

簡明醫教 卷之八 疔瘡

頭向額眉唇吻四肢臂膝初生雖腫而形小頭凹赤黃紫黑常

無定色或如黃泡中有黑水但如小瘡按之內硬或麻或癢先

寒後熱心胸煩悶頭疼拘急嘔吐眩暈神思昏憤遍身麻木四

肢沉重甚則心悸眼花等證是其候也。急取生豆嚼之不腥生

繫嚼之不澁為的是無疑。速宜調治。瘡毒致害莫此為甚。慢疔

七日急疔三日而死人不早覺者因形小而無大痛故常忽之

初起不覺復犯腥 此證雖有多種為治則一合卒無藥則取蒜

炙不痛去蒜明炙數十壯不痛用肥針筋炭火燒赤烙之如焦

炭取瘡為度四邊用針刺令出血更看瘡邊有紅絲如瘡在唇

口入於喉生手者入於心生足者入於腹即死細尋紅絲盡處
針刺出毒血以蟾酥少許酒研化塗入尤宜瘡頭用銀簪脚撥
破入酒化蟾酥得四圍腫起或有細瘡名護場易治不起難治
內服加減敗毒散及漏蘆湯取微汗隨服追疔奪命湯兼真人
活命飲萬病紫金錠及諸方法急治藥力少緩毒攻心患人服
黑如見火光必不可救矣

王方追疔奪命湯羌活 何首烏 黃連各壹錢 甘草節壹錢 蠶蠶壹錢

北細辛 防風各捌分 金銀花 青皮各柒分 紫河車重樓

赤芍各陸分 澤蘭伍分 蟬退肆分 加紫花地丁藕節各壹錢

右到首服倍金銀花一兩澤蘭一兩葱頭三個生姜五片同

簡明醫教 卷之八 疔方 三七

搗爛好酒銚熱泡之去查熱服不飲酒者用水酒各一半或

水煎生姜十片熱服出汗病減後再加大黃錢弱人減半同

煎熱服利數次去餘毒若有膿加何首烏白芷稍 在脚加

木瓜板柳 要通利加大黃梔子黑丑青皮木香

聖功丸 一切癰疽疔毒發背初起小兒痘瘡黑陷喉閉癰毒

血竭錢 蟾酥真者壹錢 雄黃 硃砂 冰片 乳香

沒藥各伍分 輕粉叁分 真麝香貳分 右為末用人乳研化蟾酥為

丸如黃豆大每服一丸嚼化好酒嚥下 神仙解毒丸如方

八寶散 疔如白泡輕黃黑根紫脹痛頭疼寒熱煩嘔指本狂

牛黃珍珠琥珀硃砂雄黃犀角金箔麝香冰片研極細金與

二活散與奪命湯同服 羌活 獨活 當歸 烏藥 連翹

金銀花酒洗 赤芍 天花粉 甘草節各伍錢 白芷伍錢 紅花

蘇木 荆芥 殭退 乾葛各叁錢 檀香錢

右共為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

賽奪命丹 治癰疽發背疔瘡乳癰便毒及一切無名腫毒

蟾蘇 辰砂 雄黃 膽礬 血竭 乳香

沒藥各叁錢 蜈蚣 麝香各伍分 細辛 全蝎 蟬退

川山甲 蠶蠶 牙皂各陸分 片腦 白礬各伍分 用信

右為末端午日酒糊九菘豆大每三九葱酒一小鍾吞下衣

覆取汗或汗或不汗再進一服後喫白粥忌黃瓜水茄

簡明醫教 卷之八 疔方 三五

內托連翹散 治疔瘡初發色不變不痛身發寒熱者看有黃

泡處即是瘡頭用針刺出惡血服此藥內托

生地黃 赤芍藥 連翹 白芷各壹兩 大黃伍錢 黃芩伍錢

梔子 薄荷各柒錢 朴硝貳兩 甘草壹兩 右研每服一兩加

竹葉燈心煎大病只三四服愈如喘加入參少許硝泡

治疔方 用和油樹葉搗爛絞汁二椀煎服得大為愈冬月取

又 千頭子即掃帚子 槐花子紫花地丁水煎服加蟾酥少許

又 古文錢一個核桃仁同嚼細黃酒送下至死不過二服愈

圍毒散 疔癰 川烏草烏蒼朮細辛白芷薄荷防風甘草各等分

為末雞子清調留頭

又 經霜芙蓉葉白芨各肆 兒茶錢 乳香沒藥血竭青木香廣

木香各壹 右為細末用生蜜米醋調塗患處綿紙貼之錢

又 用針刺破葱白搗爛敷上手帕繫住人行五里其汗自出

又 歇鐵石為細末醋調敷疔出加巴豆牛 研葱廷審搗敷

又 玉簪花根粟根各搗絞汁首用二汁共半碗取甘草煎

豆一撮水八分煎半碗合前汁飲次二汁共半碗取甘草煎

豆加麻黃一兩水二鍾煎八分合前汁服益汗出未愈再用

前二汁半碗取其草加大黃一兩煎和服愈

簡便方 治疔毒 蒿苣搗汁敷冬用苗為末水調

又 核桃殼半個入鷄溇糞合瘡上敷外灸便毒等皆効

又 蒼耳草或子同白梅搗敷疔出根葉搗加童便絞汁飲

又 殭蚕蟬退為末醋調塗四圍疔出去之再塗

又 疔毒垂死菊花葉搗汁一碗入口即活

發背

經曰氣傷痛形傷腫發背之證感受有五酒肉肥鮮悻悻恣意

一陽熱熾盛傷寒餘毒二誤服金石燒煉熱藥三陰毒氣冷深

隱漸發四山嵐瘴氣冒蓄臟腑五也大都富貴家多因法酒肥

羊膏梁厚味寒薄者大怒憂憤鬱結不舒屬於督脈及足太陽

膀胱之經或癢或麻或痛或不痛有陰陽腑臟之別焉感于六

腑積熱舉發於膚肉之間其候暴速腫皮高軟侵展濶大炎灼

于如碗如盆焮赤熱痛名曰背癰乃邪氣壅遏於經絡

于傷故其毒專攻于外勢雖盛而骨髓終不枯竭臟腑亦不致

傷此為易治惟難調護而愈遲十無一死感於五臟積熱攻注

於肌骨之內其發遲緩內外俱平微作赤色如粟如錢時作痒

痛名曰背疽乃邪氣隱伏於筋膜證屬於陰故其毒專於內形

雖微而精氣皆已敗壞榮衛必不能固斂此為難治雖然極力

而罔効十無一生所謂外如粟內如谷外如錢內着拳是也治

法宜先用蒜搗餅多艾灸之痛灸至不痛或去蒜明灸先以加

減敗毒散大刺汗之接服真人活命飲日二三劑其銀花酒槐

花酒蠟礬丸皆可兼用次服托裏諸方十宣八珍十全大補之

簡明醫教 卷之八 發背 三十

類便秘服黃連肉桂湯忌木必服護心散 外用敷藥

膿成不得穿破者用管針九不穿用針法方見

土方 真人活命飲倍皂角刺加羌活錢肉桂分好酒煎服如

不飲酒水酒同煎前後宜用諸方皆於總論中採用

男子年五十外患此四五日焮腫大痛赤暈尺許重如負石

勢熾當峻攻察其脈虛先砭赤處出黑血碗許稍輕外圍藥

內多服真人活命飲砭處出黑水而消

瘰癧

帝曰寒熱瘰癧在項脈者何氣使然岐伯曰此皆風寒熱之

毒氣留於脈而不去者也帝曰去之奈何岐伯曰鼠瘻之本皆

在臟其末上出於頸腋之間。浮於脈中。尚未內著於肌肉而外。為膿血者易也。瘰癧者。結核連續是也。形長如蛤者。為馬刀也。必起於少陽一經。不守禁忌。延及陽明。大抵原屬氣血不足。復感悲怒氣逆。憂思鬱結。風熱邪氣內搏於肝。食味之厚。曰毒曰風。曰熱。皆此三端。招引變換。須分虛實。實者易治。虛者兼補。以其三焦相火氣多血少所致。婦人患此。則月經不調。寒熱變生。稍久轉為潮熱等證。漸寬。則俗謂瘰癧是矣。宜開蒜灸之。服敗毒散十貼。不消服後方。必宜戒怒。寡慾。斷絕厚味。可治。脈浮數。清熱涼血。脈沉伏散鬱行氣。經曰。火淫所勝。治以鹹寒。先用食鹽一二兩炒熟。入長流水數碗。頻飲。以鵝翎於喉中探引。得吐。隨時醫藥。

卷之八 癰疽 三十一

涎三二碗。先服五香連翹飲。加牡蠣。便實加大黃。數錢。攻動作痛。作熱。次用消散之藥。接服涼血通經藥。加玉燭散。四物湯。見方。

精涼膈散。黃連解毒湯。方見大門。

主方	桔梗	甘草	防風	海藻	昆布
連翹	柴胡	三稜	龍膽草	條芩	半生
黃連	白芍藥	黃栢	知母	天粉	葛根
升麻	當歸尾	右到	每服一兩	水二鍾	浸半日
鍾去查	臥床	去枕	頭着席	患處	向下足伸高
十次	嗽	用後方	亦如此	服法	另配一料
藥汁	一口	嚥下	即安	臥藥氣	在咽

其枯散瘰湯	治瘰癧先從喉下起	甘草	桔梗	枳殼	羌活	川芎	芍藥
前胡	大腹皮	紫蘇	黃芩	柴胡	水煎服		
羌獨破結湯	治先從項中起	羌活	獨活	防風	紫蘇	連翹	川芎
芍藥	桔梗	前胡	蒼木	甘草	水煎服		
疎肝消滯湯	治先從左起	柴胡	青皮	羌活	防風	枳殼	桔梗
當歸	芍藥	龍膽草	川芎	甘草	水煎服		
導氣抑雷湯	治先從右起	香附	子羅	烏藥	蘇子	厚朴	桔梗
羌活	防風	半夏	茯苓	甘草	右水煎服		
玉燭散	治瘰癧自消和血通經	當歸	川芎	赤芍藥	熟地黃	大黃	黃芩
甘草	右為末	每二錢	加姜三片	水煎入芒硝	三分	連查服	
清肝飲	治馬刀生脇下	柴胡	桔梗	連翹	當歸尾	黃芩	黃連
牛蒡	子三稜	甘草	紅花	右水煎服			
連翹清堅湯	治瘰癧馬刀	柴胡	天粉	龍膽草	黃芩	防風	羌活

連翹 當歸尾 芍藥 各伍 三稜 蓬朮 黃連

蒼朮 甘草 右剉一料為粗末 每服壹兩水煎一料為

又 連翹 芎藭 大黃 甘草 分六十服 每日水煎服

又 夏枯草 大治瘰癧 散滯氣 補養厥陰 血脉退寒熱 虛者儘

可倚仗 實者行散 佐之艾灸取効 草高尺許 枝頭密開紫花

夏至即枯 鮮者搗汁煎膏 枯者煎服 又桑椹黑者為汁 桑柴

又 五倍子 大黃 南星 芒硝 為末等分 初起時用米醋蜜調圓

又 皂角子 玄參 連翹 水五碗 砂鍋慢火熬水盡為度

用煮皂子軟者 每夜嚼三粒 津唾嚥下 硬者為末 蜜丸噙化

流注

簡明醫說 卷之八 流注

三五

經曰精氣奪則虛 邪氣盛則實 流注之證 因於怒氣鬱結 或溼
痰流積 或飲食勞倦 脾胃傷損 或房勞陰虛 陽氣湊襲 或腠理
不密 外邪客之 或閃肋折挫 跌撲血滯 或脾虛氣弱 風溼相搏
或傷寒失汗 邪留經絡 或染氣不從 逆於肉理 或產後敗血 流
入關節 皆能致此 或發胸背腰臀 或生四肢臂膝 或結塊 或漫
腫 或作痛 或潰膿 若氣凝滯者 散之攻之 膿疎脾虛者 驅之補
之 最宜先散外邪 次調氣血 又次生肌收口 有風溼筋掣骨痛
宜溫經絡 有膿管或瘀血者 用去惡肉方法 治如久而瘡口寒
不收者 更宜附子餅灸 慎起居 節飲食 除七情 戒房事 可安初
起用葱熨法 隨服主方 驅逐寒邪 接補陽氣 更宜參酌 加減未

成者令散 已成者令潰 如抑鬱所致 而不痛者 宜散鬱行經絡

腫硬作痛者 通氣和血 為主潰而不斂者 益氣養血 為主傷寒

餘邪未盡者 和解為主 暴怒所致 胸膈不寬者 調氣為主 脾虛

淫熱 凝滯 肉理而然 健脾除溼 為主 閃肋瘀血 活血調氣 為主

寒邪 筋掣 骨痛 宜溫經絡 養氣血 為主

主方 何首烏 烏藥 羌活 白芷 防風

川芎 枳殼 當歸 紫蘇 各壹 柝榔 水煎服

漫腫木悶 加官桂 木香 氣鬱加香附 陳皮 厚朴 溼加蒼

朮 秦艽 痰加二陳湯 方見 傷寒 疔邪加減 敗毒散 加小柴

胡湯 寒加五積散 方見 氣血虛 加人參 黃芪 白朮 芍藥

簡明醫說 卷之八 腫在下部加牛膝杜仲

三五

腫在下部 加牛膝 杜仲

一人因怒 脇下作痛 以小柴胡對四物湯 加青皮 枳殼 桔梗 愈

一人腿腫 肉色不變 不痛 以補中益氣湯 加生姜 茯苓 枳殼 木

香煎 以附子餅熨之 後服流氣飲 愈 始用六君子湯 加當歸 歸愈

胃癰

證由寒氣 隔陽 熱聚 胃脘 寒熱不調 血肉腐壞 氣逆於胃 令人

寒熱如瘧 咳嗽 嘔膿 吐血 脈洪 數 膿已成 急宜排膿 之劑 脈遲

緊 屬瘀血 可下之 否則毒氣 內攻 為害 匪細

主方 射干 山梔 赤茯苓 升麻 各壹 赤芍 壹錢 五分

白朮 連翹 各伍 右水煎服

薏苡仁湯 治風熱唇口動或結核或浮腫

防風 薏苡仁 赤小豆 甘草 各分 右水煎服

肺癰

肺癰者由風寒傷於肺經其氣結聚所成也肺主氣候皮毛勞傷氣血則滕理閉密而寒邪乘虛入之寒搏於血蘊結成癰積熱不散敗血為膿其人喘咳則胸內滿隱隱痛兼右脇痛而戰動咽乾口內辟辟燥而不渴時時出濁吐腥臭久久吐膿如米粥者難治右寸脈緊數而實為肺癰治法初起宜先服小青龍湯方見寒門只一劑以散風邪次服

主方 黃芪 桔梗 貝母 薏苡仁 百合 各壹錢

簡明醫案 卷之八 肺癰 三五

當歸 枳殼 瓜婁 桑皮 防己 杏仁 去皮

甘草 節各分 右加姜五片水二鍾煎服 大便秘加大黃 分

又方 知母 貝母 生地 阿膠 桑皮

射干 桔梗 天門冬 杏仁 薄荷 白芨 各七分

甘草 伍分 烏梅 壹個 姜三棗二水煎食後服 痰盛加南星半夏風寒加防風白芷紫蘇

排膿補肺 黃芪 壹兩 水煎服 或甘草桔梗多煎服 又 葶藶湯直服方見喘門

簡便方 槿樹皮水煎服或烏農樹皮煎服或薏苡仁煮粥食

又 白芨為末每二錢白湯下或槿皮白飲煎服 或葶藶煎湯作飲

臂癰

證發臂上如鴨蛋狀皆由榮衛不調所致急宜消散否則上下

筋骨交連舉動不便垂手墜痛痛極徹骨或致筋傷拳縮若發

臂內名曰魚肚宜活命飲加羌獨活桂枝桔梗水酒各半煎服

或奪命丹紫金錠兼用壯者可下若漫腫無頭服敗毒藥不散

者十全大補 加桂枝桔梗托之 若肘之內生癰屬三陰經乃心胞絡鬱

火引經用黃連升柴肘之外生癰屬三陽經乃大小腸積毒

引經用藥本升柴並用黃連消毒散活命飲之類後用托裏大

補之藥又有膈臂表裏俱赤惟肘節處差小俗名藕包以內外

分陰陽俱同上治

主方 赤芍 羌活 防風 金銀花 獨活

桔梗 桂枝 水酒煎服接服白芷升麻湯 方見總門

簡明醫案 卷之八 臂癰 三十六

油泥膏 治藕包 桐油 熟鹽泥信和勻勢毛頻搽

腹癰

證因膏梁之變七情久鬱脾虛氣滯而成發於肚腹皮裏膜外

腹腫痛甚易至潰腐先宜隔蒜灸法內服活命飲次用托裏藥

若紅腫無膿托裏消毒散速其瀉如不潰代針丸或針刺破如

漫腫堅硬色不紅腫用托裏十宣散次服主方戒尅伐涼藥如

潰後必用十全大補湯倍人參黃芪加乾姜附子補托

主方 人參 白朮 茯苓 白芷 枳殼

當歸 川芎 黃耆 各等分 甘草 炙 右水煎服

臂癰

證屬太陽膀胱部分陰中之陰。位僻道遠氣血難及宜急治之。切宜慎起居。絕房室。旬日平復。乃保無虞。稍遲多成冷漏。則難治矣。始用蔥熨蒜灸等法。內服敗毒散活命飲。次托裏消毒飲。次十全大補湯之類兼服之。

主方 治脾癰 羌活 黃柏 各壹錢 防風 藜本 肉桂

連翹 甘草 炙 蒼木 各捌分 右水酒各半煎空心服

腸癰

證因榮衛不調。或瘀血停滯。或下焦積熱。多患婦人處子。致臍腹強急。按之若有水聲。小便如淋。時時汗出。微覺惡寒。身皮甲錯。大腹如鼓。或透臍生瘡。二便不通。口渴引飲。甚則痛如刀刺。簡明醫家 卷之八 癰疽 腸癰 三七

小腹硬痛。脈遲緊。小者有瘀血。未有膿也。用大黃湯下之。次兼敗毒散加秦艸連翹。脈扎澀。四物湯加桃仁紅花玄胡索木香。小腹軟痛。脈洪數者。已有膿也。用薏苡湯排之。次用諸方。膿從臍出。或大便出。為害匪輕。急服藥消之。不出膿為愈。

主方 初起臍腹腫痛 大黃 芒硝 各壹錢 牡丹皮 桃仁 瓜萎仁

薏苡仁 各伍錢 水煎服。大便未通。確黃加用。以通為度。小便不通。加滑石。痛甚加玄胡索五靈脂赤芍藥口渴食雪梨。或煎薏苡仁湯。治腸癰煩燥渴腹滿不食。

薏苡仁 瓜萎仁 各壹錢 牡丹皮 桃仁 各伍錢 右水煎服

神效瓜萎散 腸癰癰癰便毒一切腫毒効乳癰尤為最神驗

瓜萎 大者二個 當歸 甘草 各伍錢 乳香 沒藥 俱分研

右作二貼用好酒三碗煎二碗分二次調乳沒服查卷患處

龍膽瀉肝湯 懸癰下疳及腸癰乳癰因鬱怒致肝經邪實者

柴胡 澤瀉 各一錢 車前子 木通 各五錢 生地黃 歸尾

龍膽草 酒浸炒黃 右加燈心甘枝水煎食前服

懸癰

經曰。氣傷痛。形傷腫。患於肛門之前。陰囊之後者。懸癰也。因於七情鬱怒。氣滯血凝。有強忍敗精。有情慾不遂。皆能致此。治之不早。鮮不傷生。凡覺腫痛。急用大赤皮甘草連節數兩。取長流水煎汁空心飲。更製入藥先服敗毒散。如寒熱痲痛。清肝解熱。簡明醫家 卷之八 癰疽 懸癰 三十八

小柴胡湯如痛腫之甚。肝經淫熱。龍膽瀉肝湯諸方皆製甘草為君。外用隔蒜灸法。膿成不穿針之。

主方 甘草 伍錢 龍膽草 當歸尾 金銀花 生地黃

柴胡 各壹錢 澤瀉 車前子 木通 各伍錢 水煎空心服。小便澀

倍車前子木通澤瀉加茯苓黃柏知母 發熱加黃連青皮

小柴胡湯 方見 次服此方以製甘草為主 不潰用八珍湯加

製甘草 無力清心蓮子飲 方見 已上諸方悉製甘草為君

久不收服大補藥外川豆豉餅炙

製甘草法 治懸癰腫痛發熱不問腫潰俱効

甘草 赤皮大者 用潤流水一大盞浸透。漫火炙乾。又浸又

炙水盡為度。每服一兩。無灰好酒一碗煎七分去渣空心服。

囊癰

證屬厥陰肝經。陰道虧虛。溼熱不利。濁氣下注。流入滲道。而然。有腹腫漸流入囊。水液不分而致。甚有膿潰皮脫。畢尤懸掛。囊裂水流。惟在治理得宜。亦可平復。先疎肝除溼。次滋陰補養氣血。有醉後飲水入房。及汗出遇風寒。溼毒乘聚於囊。先以導水丸二服。水去小便如常。以胃苓湯倍白朮茯苓。

主方

歸尾

龍膽草

生地

柴胡

澤瀉

木通

車前子

茯苓

右加燈心水煎。空心服。未効加

黃柏 金銀花 皂角刺 白芷

膿成不破針之。次服參芪歸

簡明醫報

卷之

癰疽

三九

木四物湯加知母黃柏

外用紫蘇末敷。或杉炭末敷。紫

蘇葉包裹仰臥養之

久不收飲服大補藥。外以附子餅灸

腦疽

腦後痙腫。屬太陽膀胱經積熱。或溼毒上壅。或腎虛陰涸。初腫痛甚。煩渴脉洪。數腫硬未作膿者。宜除溼解毒。痛甚屬溼熱。宜黃連消毒飲之。類大痛或不痛。隔蒜灸。服真人活命飲。方見如便秘邪在內。宜瀉之。不甚痛不作膿。宜四君子湯加當歸黃芪。補托膿成而痛。針之兼托裏。膿多不飲。大補氣血。喜飲冷宜瀉火。毒盛便秘者。防風通聖散。方見此證宜用騎竹馬灸法。

主方

黃連

羌活

生地

當歸身

連翹

黃芪

黃柏

獨活

防風

藁本

防已

蘇木

陳皮

桔梗

澤瀉

知母

人參

甘草

右水煎成入酒少許服

鬚疽

是證多因怒氣而成。或肝膽三焦風熱血虛所致。痙腫大痛。寒熱拘急。先服加減敗毒散。發散表邪。因於怒動肝火。小柴胡湯加連翹桔梗金銀花。次服活命飲之類。不作膿不潰。宜托裏。如作膿大痛。托裏解毒。膿成不破針之。膿潰不斂。大補氣血。

主方

柴胡

山梔

黃芩

川芎

人參

連翹

桔梗

甘草

右水煎食後服

簡明醫報

卷之八

癰疽

四十

胸疽

疽發於胸。初如黃豆。肉色不變。若冷氣攻心。精神恍惚。嘔吐冷痰。毒氣內陷。腹脹者死。若心煩身躁。肌如火熱。汗出唇焦。渴飲冷水。是其候也。急服活命飲加黃連桔梗。及奪命丹之類。汗之下。惡証見。犀角解毒湯。疽發於膈。在胸兩傍高處。名臆疽。色青寒熱。治同上法。心窩上兩乳間生者。名臆中疽。發於氣之海。分布陰陽之所。由臟腑不和。七情鬱結而成。宜活命飲加紫蘇薄荷汗之。再兼紫金錠選用。脾發疽。生心窩下兩旁。皆有。乃過食煎煇。醉飽入房所致。治法大同小異。

腰疽

附石疽

證發脊骨第十四椎之旁乃腰腎之位名曰腰疽卽下搭手也
由於房勞過度腎水虧傷而致其證口乾舌燥寒熱交作百節
疼痛急服敗毒散活命飲及黃芪托裏之類若穿潰透膜者不
可救矣○有在腰胯之間患疽如石不潰者名石疽屬少陽陽
明二經之積熱邪毒內結元氣不足不能起發急服活命飲加
羌活獨活柴胡黃芩及紫金錠汗之實者一粒金丹或黃連內
疎湯下之隨服十全大補湯人參養榮湯托之

附骨疽 俗名貼骨毒

證因風露寒溼所侵或夏月貪涼膝理開竅臥于漆機泥地而
成蘊蓄日久變而爲熱或內因醇酒厚味蓄積熱毒下注或溼
熱明醫家

卷之八 腰疽 附骨疽 四十一

痰瘀血相搏而成始則環跳穴作痛穴在臂之側不便行動臥
難轉側疽生骨之上肉之內多至不救急宜治療外用取汗法
內服追風散兼漏蘆湯方見敗毒散活命飲皆可服攻散爲愈
稍緩則膿成外無赤腫之狀必宜針破如待潰穿多難收斂而
疽針破後宜托裏排膿補養氣血十全大補湯之類

主方 蒼朮製 黃柏炒各 青皮錢 甘草市 金銀花錢

右用水煎入姜汁少許服 生於腿加牛膝錢 薏苡仁錢 冬

月加肉桂分 夏加黃芩錢 無汗加麻黃錢

又方足大蓋既陰腫分腫生腿內逆非 股或腫或附骨疽初起腫痛勢大

黃芪錢 柴胡錢 羌活分 連翹壹錢 歸尾半 肉桂分

生地 黃柏各 土灰根酒洗 右水酒三盞煎熱服二貼愈

又方治足少陰經分腫生腿外則或因寒溼得附骨 疽或微使陽明經分堅硬腫痛不能行動等証

黃耆錢 當歸尾錢 柴胡壹錢 連翹壹錢 肉桂壹錢 大力子錢

白芷壹錢 升麻分 黃柏分 甘草分 右水酒各一鍾煎服

取汗法 掘地坑深數尺柴炭燒紅將小便一桶潑之急放小

人頭面或以大桶令患人赤身竹椅坐下置盆盛燒赤鷄卵

石或石灰用荆芥末調米醋沃之桶口用棉被蓋覆止露頭

出令熱氣薰蒸汗出毒散未效再汗

耳發

簡明醫家 卷之八 耳發 四十二

經曰耳爲腎之外候又曰腎通竅于耳亦因大怒動厥陰肝經

風熱燥火瘡生耳輪作熱痛痒用柴胡清肝之類兼小柴胡湯

次服加味地黃丸耳內生毒皆由手少陽足少陰二經風熱耳

證有五曰停耳曰溼耳常出黃膿水曰風耳常出紅膿曰纏耳

出白膿曰耳疳生奈臭穢曰震耳耳內虛鳴時出清水證雖有

五其源則一又有耳聾耳痔閉塞不通用黃連消毒飲活命飲

治之有爲耳癰用活命飲加升麻桔梗蔓荊子有大痛爲疔者

先以經絲草俗名天荷葉延紅 絲到處生石吻邊搗汁滴入失治則頭腫極大

主方 右耳後一寸三分生煎急 柴胡 梔子 丹皮

芍藥 當歸 蔓荊子 川芎 生地 龍腦草

右到水煎食後服

面癢

面癢之發見於胃頰腮頰鼻髭地角諸瘍皆屬上焦鬱火諸經積熱風溼壅結陰陽相滯而生宜萬病解毒丹之類焮腫赤痛先服加減敗毒散發汗次用真人活命飲加黃芩黃連梔子玄參桔梗木通之類

主方 治口唇頰車髮鬚 犀角 升麻 白芷 防風 黃芩 白附子 川芎 甘草

羌活 右作一服水五盞煎至三盞去滓分作三服一日一服熱減製輕劑服之

痛有醫家

卷之八

四三

瘰癧 證屬陽明胃經或因風熱所乘或因積熱而致內熱腫痛外用敷方內服祛風清火之藥

主方 治風熱上攻面目 白芷 升麻 當歸 蔓荊子 草豆蔻 柴胡 黃柏

其草 羌活 葛根 草豆蔻 柴胡 黃柏

藥本 羌活 蔓荊子 蠶蠶 麻黃 右水煎服

敷方 錠青 蚯蚓泥 井底泥 隨取一味敷患處

穿腮

證由憂愁思慮驚恐悲傷或過熱毒藥物初生下連頸項隱痛內有小核漸大牙齦腫痛寒熱間作穿潰腐爛淋漓不已或左或右牙關不開飲食難進始宜鷲翎蘸生桐油探吐多去痰熱

切忌刀針已破切勿入風多致不救

主方 宜接服 黃連 黃柏 黃芩 梔子 玄參 桔梗 柴胡 甘草 升麻 右水煎服

頸癰

證因怒鬱驚惶積憤而成屬手少陽三焦經初覺宜隔蒜灸多壯內服活命飲加玄參桔梗之類壯者攻下老弱補托神勞多怒頸項腫硬用八珍湯加柴胡香附勞心過度宜服補中益氣湯

喉癰

癰發盛中憂憤積熱所致屬任脈及手太陽少陰宜清熱攻毒用真人活命飲黃連消毒散紫金錠壯人攻下若過時失治穿漏明醫家 卷之八 頰癰 喉癰 四三

對口

證由熱毒上攻屬足太陽膀胱之經甚者類腦癰治輕者取鮮白茄蒂七個鮮何首烏對稱准水鍊半煎服如出膿再一服收口如無鮮者乾者亦可

夾疽

夾喉兩旁而生屬手少陰足太陰足厥陰火熱蘊毒上攻而發宜加減敗毒散及黃連消毒散 活命飲加玄參

脇疽

證由心肝二經火盛虛中有熱而發於兩脇下各發脇屬手足厥陰經初宜神效瓜萸散 柴胡清肝湯 或活命飲加

柴胡瀆後宜清熱托裏滋腎水有熱當歸龍會丸方見腸下至
腰及遍身紅紫宜破出惡血內服防風通聖散方見紫金錠
簡便方 雞糞搗入鹽少許醋和敷患處腫消痛止膿成有效

○手疽 附手發背 腕腫 代指 大蛇頭
兩手背發癰無頭漫腫乃三陽風熱鬱滯宜活命飲加黃芩梔
子枯梗升麻寒加桂枝熱加姜黃水酒煎服或紫金丹奪命丹

○丫刺 虎口內結毒癰腫又名合骨疽屬陽明大腸風熱積
毒始宜隔蒜灸內服真人活命飲加桂枝姜黃枯梗升麻煎服
外以玉樞丹水磨塗之

○指疽 證發大指頭亦名指發如粟漸大青紫黃黑麻木作
癢或大痛徹心屬手太陰經外以玉樞丹濃敷內服更用發汗
攻下諸方次托裏補益悉如前法此證切勿怠緩若攻心嘔吐
不食齒縫出血者不治指變黑色急宜截去可生若指節可

振毒散 泥蜂窩研乳香 右為末米醋調敷患處
又方 蜈蚣乾者燒烟薰 又方 雞子清浸指痛止

○天蛇頭 指頭結毒癰亦腫痛膿潰裂開形如蛇頭故以為名
屬手厥陰心胞絡經積熱宜服活命飲加柴胡羌活枯梗黃
連消毒飲玉樞丹之類

救方 雄黃 蜈蚣 全蝎各壹錢為末摻入蒜蒜油也孔
○穿掌疽 手心赤腫痛者名曰穿掌屬手厥陰心胞絡經積

熱初宜隔蒜灸法內服活命飲加桂枝姜黃實人宜斟酌表裏
而汗下之天托裏補益大同小異

○腕癰 手屈處癰腫治法同前更以玉樞丹加蟾酥少許
○代指 患於指甲內冷藥瀉瀆為快蓋爪者筋之餘筋賴血
養血熱毒成流注於指端故指赤腫成膿證類指疽然無毒

治代指 麻黃煎汁入芒硝熱浸之 又 甘草煎濃汁浸之
又 酸漿水入鹽熱浸冷再換 又 烏梅肉蒸爛醋研浸
英蒼散 治手指結毒及天蛇頭

蒲公英 解毒神功路邊 蒼耳草共為末酒服更以米醋浸
或蒲公英同金銀花藤煎酒服 又 蒲公英鮮者搗汁酒服

○足癆 附脫疽 腳氣癰 甲疽 代指 足發背
足部之證屬三陽經淫熱或三陰經精血虧損微赤而腫膿出
而清難治若赤腫焮痛而潰膿者屬淫熱易治若色黯不腫不
痛不潰膿煩熱作渴小便澀短者陰氣敗絕之惡候

初宜蒜灸內服活命飲次服托裏次補中益氣湯六味地黃丸
色黯不痛者着肉用桑枝灸內服十全大補八味地黃丸之類

○脫疽 足大指潰而自脫難治如色變赤黑者死宜急截去
餘指易治初起以萬病解毒丹醋磨厚塗未成者宜蒜灸次托
裏消毒用引經藥或敗毒散加銀花牛膝白芷大黃或活命飲

○腳氣瘡 因腎虛風溼所搏氣血壅滯毒在膚腠不得宣通

脚上生瘡若風毒不散遷延日久黃水淋漓氣血虧傷難治

王方風溼腫潰漏蘆 五加皮 槐皮 白欬 甘草各半

疾藜子兩 水煎無風處淋洗

敷脚瘡 蘊灰 紅棗燒 竹蛀屑 黃丹 枯礬

韶粉 右各等分研勻換之

○甲疽 指甲內潰爛因於溼熱或剪傷或履窄勿涼藥敷

敷方 綠礬鐵器內炭火封收溶化 蘆薈壹錢 麝香五分

右研細和勻製一絹袋盛藥套指上線扎定日換自愈

脚指四邊腫爛以前礬末一錢入乳香末三分敷愈

又方 牡蠣頭生研極細每服二錢錠花研酒調下仍敷患處

簡明醫方 卷之八 足瘍 附藥方 四七

又方 烏梅或白梅取肉蒸爛裏或燒灰調敷

○代指 指頭腫爛爪甲結膿用烏梅核中仁為末米醋調膏

另以朴硝泡湯洗漬指於前膏內或以猪油調蚯蚓糞塗

○足發背 足面生疔屬足厥陰陽明二經之會由溼熱乘虛

下注活命飲加木瓜肉桂牛膝先蒜灸次托裏再用十全之類

用羊糞瓦上炙乾烟盡羅末麻油調敷癢加輕粉痛加麝少許

敷外以山茶葉或冬青葉裏之絹條縛定

○足跟疽 屬太陽經乃陰陽二躄發源之所由臟腑積熱所

致忌毒藥敷外宜蒜灸內服活命飲加牛膝肉桂或紫金錠之

類陰虛服補陰諸丸煎服○婦人足跟足指腫痛足心發熱腫

處潰膿皆宜八珍湯六味丸內熱逍遙散之類

敷方 白木為細末先以鹽湯洗淨乾搽上一日一換効

治腿肚上瘡水出作瘻用貫衆煎湯洗後用百藥煎末唾調敷

○手足裂 乃手足皴澁皮膚裂開疼痛不能見風

膏方 瀝青肆 白色黃蠟捌 乳香貳錢 另 右用鐵器先熬麻

石壹 煎熱次下瀝青即下黃蠟以麻布濾入水中扯拽黃色

粉伍 入磁器收貯每用以藥火上烘軟塗之外貼紙其縫自合

又方 手足裂痛用清油伍 慢火煎沸入黃蠟壹 再煎溶入水

粉伍 倍末各少許熬紫色為度以熱水洗手足軟用藥敷以

又 脚縫溼爛用枯礬三錢黃丹五分為末搽

簡明醫方 卷之八 附方 四六

又 指縫搔癢成瘡血出不止用多年糞桶燒灰敷之

又 脚裂爛以蒸熟藕研成膏敷之

又 脚裂縫以五倍子為末同牛骨髓填縫內即愈

冬月脚跟裂大開出血用白芨要明亮堅 研細末水調如糊勿枯燥

以裂熱湯洗淨搽藥外用紙蓋裏脚過夜愈冬月施人利益

通論已上諸毒 凡諸般腫毒初見焮赤腫痛高大速起屬陽

證易治惡寒發熱表證宜加減敗毒散發汗消解煩躁口渴裏

證宜黃連內疎湯攻下大便無表裏證惟作大痛邪在經絡先

宜真人活命飲解毒定痛次托裏養榮湯調和臟腑若微赤腫

痛下塌不起屬陰經難治急宜十宣散托裏散之類溫補助陽

外治可灸可圍可洗惟不可鍼或攻散或穿潰托裏排膿生肌收口諸方諸法悉於總論採用其諸癰疽瘡瘍治法亦大同小異但宜各證加引經藥如患在上入升上之品在下兼降下之味潰後溫補氣血寒熱虛實隨證參酌可獲十全之功矣

惡瘡

經曰諸痛癢瘡皆屬心火諸溼腫滿皆屬脾土心主血脾主肉血熱肉溼溼熱相搏潰散肌膚浸淫不休不可定名故曰惡瘡然亦有辯焉如氣血鬱於皮膚腠理可以表而散者如疥癬瘍疹之類是也汗之瘡即已若氣血鬱於肌肉之分外連皮膚作寒發熱而生膿或七情所招或膏粱所致皆宜內托不宜發

簡明醫要

卷之八

四九

汗汗之則發痘證故瘡成于皮膚之間則因其輕而揚之故汗之用殺蟲潤燥藥敷之若瘡成于肌肉之內當因其重而滅之瀉經絡之熱清涼氣血外以化膿生肌膏燴之瘡在頭面則升而取之用酒製寒涼藥更以風藥升而上之外以殺蟲解熱藥敷之明此三者其于治瘍思過半矣

上方 連翹 當歸 瓜蒌根 生地 荆芥

黃芩 赤芍 麥冬 牛蒡子 瞿麥 木通

梔子 防風 川芎 甘草各等分 為粗末每四錢水服

上方 白礬錢 乳香分 輕粉分 沒藥分 右研勻敷

洗方 一切惡瘡 貫衆 川芎 茵陳 地骨皮 荆芥

獨活 防風 扁蓄 當歸 甘草 右水煎洗

地丁散惡毒腫痛 地丁 當歸 大黃 赤芍 金銀花

甘草試 右用水煎服

○人面瘡 多生于膝上或臂間狀如人面眼鼻口俱全此為冤業所致內服十六味流氣飲苦參丸外用貝母末較之大用生肌散

○翻花瘡 瘡潰從中翻出努肉如蛇頭狀大小不一證由肝經血燥所致宜內服清肝養血之藥次入珍湯十全大補湯加參冬五味之類

丹毒

人身忽然變赤如丹乃血熱肌虛風邪所搏而成宜防風通聖散之類治之

上方 薄荷 連翹 鬱金 黃芩 黃連

簡明醫要

卷之八

五

上方 梔子 大黃 甘草 糯米各等分 為末每服三錢湯服

敷方 車前草 益母草 地膽草 共搗爛塗患處

又方 赤小豆研羊角灰 右研勻雞子清調敷

又方 治丹毒大蒜搗如泥厚塗患處乾即易

又單方 水苔 慎火草 浮萍 豆葉 生地黃監取搗敷患處

灶心土 靛青 大黃 蚯蚓泥隨取一味研末雞子清調塗

楊梅瘡

此瘡乃淫熱邪毒所成或共處者患此傳染或同飲食坑廁固桶或於姪室薰惹穢氣或患下疳便毒而起治當察其表裏虛實先須發散表邪如防風通聖散加減敗毒散溼熱羌活蒼木

湯次清裏熱內疎黃連湯之類隨證連服數貼大勢略緩次服
 主方解毒次調和氣血最不宜妄求速効誤服輕粉粉霜之藥
 反收熱毒沉凝骨髓日久毒發頭而周身潰爛不已痛苦萬狀
 悔之不及致成終身痼疾初患者後有羊酒方可用。

主方 當歸尾 川芎 赤芍 生地 升麻

葛根 黃芩 黃連 金銀花 黃柏 連翹

防風 羌活 甘草 蟬退 大黃

右劑煎成入芒硝一錢服大便已通減去硝黃

又方 防風 荆芥 連翹 白芷稍 地骨皮

當歸尾 川芎 木通 黃連 赤芍藥 五加皮

簡明醫說 卷之八 五十二

黃芩 梔子 白蘚皮 金銀花 木瓜 薏苡

苦參 皂角刺 蟬退 殭蚕 黃柏 白蒺藜

甘草 土茯苓 痛加羌活獨活 虛加人參茯苓去梔

子 右劑作五十貼每日二貼水煎服 忌食牛羊肉

又方 金銀花 黃連 連翹 當歸

生地 防風 木通 薏苡 白蘚皮 白木

皂角刺 甘草 右劑加燈心二十枝用仙遺糧石柏槌碎煎汁二碗

入眾藥煎服土茯苓二汁再煎眾藥查服

茯苓餅 防風 人參 五加皮 白蘚皮

當歸 丁皮 皂角刺 海桐皮

川芎 金銀花 甘草 乳香 沒藥

右為末對和麵作餅蒸熟拌乳香沒藥末嚼食白湯送下

西聖復煎丸 治瘡後腫塊經年破爛諸藥不愈

乳香 孩兒茶 沒藥 丁香 阿魏 白花蛇

血竭 白麵 蜂蜜 香油 糯米粉

右為一處搗千餘下丸如彈大每服二丸土茯苓

拔毒糕 土茯苓 白蜜 糯米粉

右和勻蒸糕食土茯苓汁送下忌飲茶湯

羊酒方 治楊梅瘡初覺即宜服此 大黃 麻黃

簡明醫說 卷之八 五十三

蟬退 羊肉 同好酒三碗煎藥至三碗先以

羊肉同飯吃完次服藥汁完厚蓋臥頭至足出大汗欲瀉至

空地連解連移勿令氣復入肛門內外毒盡出無後患

玉脂膏 治楊梅瘡愈後發鵝掌風手上白皮層起

牛油 香油 相油 黃蠟 銀珠

官粉 麝香 油藥和勻火烤掌熱擦再烘顯擦

又方 治楊梅瘡不論久近及癰毒鵝掌風亦須內服解毒方

灶心上 水銀 枯礬 百草霜 白蘚皮

香油 右四味研至不見星入蘚油和勻無風處擦手足

心藥完吃葱湯二碗厚蓋臥出汗三日一擦三次愈

煎藥 銀硃 輕粉 杏仁 雄黃各等分

右研細末猪膽調搽或摻膏藥上貼加冰片尤妙

導水丸治便毒下疳楊梅毒 大黃兩 黃芩兩 黑丑炒

滑石研各四兩 右爲末水丸或糊丸每服二錢臨臥湯下

簡便方 官粉錢 豆腐兩 以官粉摻入腐重湯煮食

又方 土茯苓新鮮白者佳 石相槌碎煎湯代茶湯任意飲之

灸法 楊梅瘡初發數個逐個灸三五壯愈隔蒜灸亦可

下疳

人之前陰屬足厥陰肝經多因鬱怒日久抑遏不舒致成此患

或姓家交接至傷或硬衣擦損而起陰頭破爛不速愈延及下

簡明醫竅 卷之八 下疳 五五

莖名曰蛙梗治法相同切宜防微杜漸有腐去玉莖塊塊藥

全失本形數年而斃者脉多尺部洪數先服加減敗毒散次龍

膽瀉肝湯方見懸癰 小柴胡湯之類腫痛甚者宜清肝火除溼熱小

便赤澀利小便如不澀而自汗者不可利若利之榮衛枯竭無

主方 柴胡錢 黃柏伍分 赤芍藥 赤茯苓 膽草各錢

蒼朮 知母 黃連 荆芥 連翹 木通各半

防風 獨活各六分 甘草稍分 右加燈心二十枝水煎空心服

發便毒加大黃 熱甚加梔子滑石去蒼朮 寒熱往來加

黃芩澤瀉 二便不利宜服八正散方見便

涼血解毒丸 先服敗毒散次主方未全可再製此丸服

苦參兩 黃連兩 連翹 防風 石膏各兩 牛蒡子

生地 白芷 大黃各壹兩 右爲末荆芥煎汁打糊丸如

桐子大每服百丸空心白湯送下久不愈宜服六味地黃丸

敷方 雞肫內黃皮不見水取淨火炙研細末壹錢 孩兒茶另研八分 珍珠另研參分

水片錢 右研勻米泔淨洗敷

又方 枯礬 雄黃 珍珠 黃柏另研 鉛粉各等分

右爲極細末米泔洗拭乾猪膽汁調搽

又方 抱退雞子殼研末 孩兒茶研細

右研勻細末茶洗淨溼者乾擦乾者猪膽汁調搽

玄霜散 下疳蛙梗莖爛亦能長全及諸瘡毒膿瘡久不愈者

簡明醫竅 卷之八 藥方 五五

可收飲占傷乳沒湯含止痛敷此藥

黑鉛錢 銅鈎溶化入水銀錢 攪勻傾出研不見星入獸石

膏火煎參錢 真輕粉錢 明礬錢 珍珠另研細 冰片另研

右共研勻入磁瓶內用時葱椒艾煎湯入坛先薰至氣洗淨

敷藥乾者猪膽潤淨擦上

洗方 黃連 黃柏 當歸 白芷 羌活

防風 荆芥 苦參等分 加烏梅肉五個銅錢五十字文水

入皮硝明礬先薰後洗一日五次

又方 黃連 瓦松 花椒 葱根 川

艾葉等分 右用水煎湯膏布洗拭癢加硝礬少時重搽

簡便方 六一散加輕粉水片研勻溼者乾摻乾者指

又 用亂髮洗淨燒灰敷 又 用雞脆皮炙研細末敷

一人莖腫不消一潰而腫痛發熱便澁一小兒腫痛各煎小柴

胡湯方見傷寒吞當歸龍薈丸方見傷寒而安

便毒

騎馬癰魚口血疔各四生於兩腿合縫之間屬衝任為病見於厥陰肝經之旁絡皆鬱怒蘊熱血聚成毒有因勞役而致者或不遂交感精離不泄或強固敗精留結而致或先下疳而繼生常有接發楊梅瘡者微覺前羊酒方可用初宜發散即行疎利而兼解毒一服已瀉不必再服次清溼熱疎肝火如不散先托裏次調養氣血

簡明

卷之八 便毒

五十五

主方 大黃參錢虛人減用 殭蠶錢 當歸尾 赤芍藥 金銀花

白芷稍各壹錢 芒硝壹錢 木鱉子壹錢 穿山甲壹錢 天粉壹錢

右用好酒二碗煎至一碗入大黃芒硝滾一沸連罐露一宿五更溫服厚蓋卧出汗通利一二次愈

治便毒 山甲參片土炒 木鱉參個切碎 牡蠣壹個 大黃參分 金銀花

黃連 黃柏 黃芩 連翹各壹錢 黃蠟錢半 人蠟壹錢 當歸尾

又方 起便毒初起可消 大黃 皂角刺 金銀花 防風 當歸尾

甘草節 瓜蒌仁各等分 右用水酒各半煎空心服仍頻提掣頂

又方 可消散 殭蠶 槐花各壹錢 右為末酒下欲疎利加大黃

又方 龍膽草 大黃 瓜蒌仁 桃仁各壹錢 木鱉壹個

右用水酒濃煎露一宿溫服

又方 代赭石另研 梔子 大黃各壹錢 當歸伍分

右用水煎調孔香沒藥末各一錢服

又方 萎粉 大黃伍錢 連翹各伍錢 枳實參錢 厚朴 甘草各壹錢

桃仁壹錢 右分三貼酒煎服

又方 勞役射干參 生薑 三片水煎空心服未利加大黃煎服

灸法 用核桃殼半個以人糞填滿合毒上殼外艾炷灸至消度

一人腫痛服疎利藥不消亦不潰用人參黃耆當歸白朮柴胡

白芷甘草皂角刺并八珍湯而愈

一人潰而腫不消脉浮滑以豆豉餅灸內服十全大補湯而愈

簡明

卷之八 腎臟風

五十六

腎臟風

證由風溼所襲溼熱汗潤致陰囊抓癢或腎水虧虛火炎血燥隱處癢痒成瘡致黃水浸淫此方亦治脚門擦脚底鋪鞋中及脚指縫爛

敷方 枯礬壹兩 牡蠣壹兩 黃丹炒各伍錢 為末夜擦數遍

廉瘡

按外廉屬足三陽內廉屬足三陰此瘡皆由溼熱下注瘀血凝滯或寒溼裙邊血風傷手細瘡而始不守禁忌恣啖熱毒朝傷暮損遷延日久溼淤生熱溼熱相蒸漸成斯患亦有跌磕破損而成惟鍋口割傷者竟為終身之患皆由行動勞傷氣從下流難於收斂外用膏藥摻藥內服當歸拈痛湯如氣血虛宜補托

之藥更忌熱毒發氣之物。

膏方

阿魏壹分 少酒研化

黃丹錢

兒茶

龍骨各壹錢半

乳香

海螺水煎 各貳錢

赤石脂

血竭各壹錢半

水銀鉛製

輕粉錢

沒藥出汗研 右各研極細末

加水片三分研勻聽用

麻油貳兩

銅杓熬老柳棍攪轉

化入黃白蠟各伍錢 次入嫩松

香兩

兩熬化綿濾枕內坐水中過夜將前藥調勻以薄油紙二

層中夾膏藥如瘡口大四邊摺轉膏上唇脚密透眼瘡用洗

方或葱椒煎米泔洗淨搥乾先搽玄霜散更生肌散護之外

隔紙膏

黃芪末伍錢 輕粉

乳香

沒藥

銀硃各壹錢

血竭伍分

銅青貳分 右各研細末和勻

香油調膏薄油紙如前

簡明醫方

卷之八

三七

又方 隨瘡口大裁好綿紙十二張四角小紙拾釘住聽用

香油兩 銅杓熬下川椒四十粒 煎黑取起次下槐枝長一寸 煎

焦黑取起次下黃蠟兩 輕粉貳分 枯礬伍分 煎前紙令透勿焦取

起用槐枝葱椒煎湯洗瘡暖透拭乾以膏紙貼外以油單紙

掩護絹帛縛定一日揭下近瘡一張盡十二日愈

又方 松香錢 乳香錢 各為末香油調敷患處外用筆管

密刺孔縛之或冬青葉縛每日導轉

又方 黃栢末兩 輕粉錢 猪膽汁調敷溼者乾搽

又方 五倍子兩 香油兩 百草霜壹錢 熬滾下黃蠟兩 化勻

調前末為隔紙膏貼

又方 川椒末 枯礬 百草霜 研勻調桐油敷患處

又方 灶心土 黃丹 輕粉 黃栢末 乳香 沒藥俱研末

石研勻清油調膏薄油紙水煎 夾膏透眼貼患處每日導轉

頻勿傷動守禁忌加赤石脂妙

又方 蘆甘石火煨至黃色 澤入黃連黃兩 白占伍錢 象牙末錢

右研勻香油調敷

簡便方 陳小粉研 芝麻炒 細茶研 用香油調勻攤紙貼外縛

油紙一日一換藥包裹

天泡瘡

此瘡溼熱為本風邪為標脈浮緩發熱拘急加減敗毒散發散

諸邪鹹沉實二便秘澀防風通聖散疎通表裏為末敷瘡亦效

敷方 滑石 黃栢各壹錢 右為末先以皂角刺挑破靛青調搽

又 大黃末壹兩 海金沙兩 右為末以新及水調搽患處

簡便方 靛青 滑石末 蚯蚓泥 井底泥 隨取一味敷

疥瘡

經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火雖然亦由五臟蘊積熱毒兼血虛

風溼而發疥有五種曰乾溼虫砂膿是也乾者枯槁燥癢溼者

溼熱多水虫者有虫傳人砂者細而癢甚膿者脹滿膿窠治宜

先服發汗疎風涼血解毒清臟腑熱毒之藥釜底抽薪次用藥

宜用防風通聖散方見 減硝黃枯木中風 白黃連黃栢金銀花煎服

敷方 水銀 硫黃 雄黃 蛇床子 大楓子

杏仁 同楓搗如泥 川椒 檳榔 樟木 枯礬

右先以銀硫礬雄加信五研至不見星再添礬研次入楓杏

研次入諸末研勻和油鉢中頓半炸撮起調諸藥勻抓

又方 諸般刺芥 苦椒皮 白芷 苦參 大黃

檳榔 黃柏 為木人枯礬末 硫黃 以醃猪油

膿窠瘡 輕粉 枯礬 硫黃 用雞子一個香油一

兩煎蛋焦取油調前三末搽

又方 枯礬 硫黃 五倍子 川椒 人言

右為細末用香油二兩依前煎蛋油調搽

諸瘡蟲 蛇床子 楓子 水銀 白錫 枯礬

右將錫入銅杓溶化水銀和勻加礬研細楓子搗如泥和猪

油或柏油同前藥研勻搽

疥瘡經年不愈 威靈仙 蔓荊子 何首烏 荊芥穗

苦參 右為細末每服食前溫酒調下

洗方 防風 荊芥 馬鞭草 野菊花 苦參

川椒 右加葱水煎湯化入明礬朴硝日洗數次

癬瘡 癬有五種曰溼頑風馬牛是也皆因血分燥熱以致風毒尅於

皮膚浮淺於疥多挾風溼熱毒而成亦有日久生蟲致多年不

愈者宜內外用藥或防風通聖散減礬黃加浮萍皂角搽之

主方 浮萍 當歸 川芎 赤芍 麻黃

荊芥 防風 甘草 淡豆豉 蛇床子 寒水石 金毛狗脊

敷方 雄黃 班貓 蛇床子 寒水石 金毛狗脊

輕粉 硫黃 朴硝 右各研細末和勻

又方 白飲 川樅皮 雄黃 右為細末以無根水

調飯上蒸赤色為度癬不可抓破搽藥七日勿洗

又方 枯礬 樟腦 右為細末以醋調抓傷搽

簡便方 黑棗一枚巴豆肉三粒搗勻搽

又 蒜搗碎煮水洗浴拭乾再用生桐油搽上火烘乾愈為度

簡明醫殼 漆瘡 卷之八 新法 六十一


近新漆器或漆汚身感其氣則面身腫熱痛癢或謂木形人患

主方 甘草 滑石 連翹 水煎成調雄黃青黛服

簡便方 鐵店磨刀水盆底垢脚塗 或杉木屑煎湯洗効

或蟹殼炙研末水調塗 或面身俱患甘草煎湯浴安

竹馬灸圖



簡明醫毅跋

嘗按軒岐之理通乎性命入
乎聖神自秦越人既逝剖胸探
心幻不可追而方書始汗牛
充棟于世然以生人表裏
之缺陷止假艸木之英金石

簡明醫毅跋

之屑欲以搏挽造物補泄五
行此其玄機妙解蓋亦
難言之矣古今來惟素問
難經諸篇為法門指南然
非淺夫濁眼便能洞徹于
是人持一說家持一篇莫不

以生嘗試則曷以故取途行

迴而匡臆汶閣如台石先生

承桂巖先生衣鉢淵源夙

有紹明負菩提心居恒念

窮陬窶人子偶罹疾苦盼

藥餌不翅丹砂如膏而市

簡明醫毅跋

二

阿堵者未嘗過而河馬迺獲

壺中術利濟三吳兩浙間

名噪甚于武原尤活人多

復以不酌其徑省則惠不

溥不壽之剗剗則澤不永

五閱寒暑搆成一編願以簡

明醫穀夫簡則不明，則不
簡。先生胡以蕙收之也。余知
之矣。先生從儒理解，入
從禪，埋泰透，亦不屏，不
離，打破葛藤，心胸了見
坦照膽，固不悲中肯綮。

無論一證先攻其受病之
原，次定其瘳治之法，又次
調其加減，宜俾人之通
曉，在易給而沙界眾生
開卷引睫，六返大還現
前，具足公家思德之傳。

不在是乎，則謂此書即迷
津之覺路，苦海之慈航，
也壽。

國壽民功德當作無量觀
賜進士出身江西道監察御史奉
勅巡按直隸督理長蘆鹽課

何道驛傳轄山東河南開
歸等處前四奉劄巡視

皇城靈溝橋城工廣渠門通
家眷侍生吳興施標切首
撰



2034444

S
Z122-5
100



21181888442876

簡明醫說八卷 內府藏本

明孫志宏撰志宏字台石杭州人是書卷首冠要
言一十六則議論亦平正其餘按門列方淺顯且勿
解然未能盡醫道之變化也