

T 7970/2240(12)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

神農本草經疏卷之十四

木部下品

總九十九種今疏其要者二十九種

巴豆

蜀椒

皂莢

子刺

訶黎勒

棟實

附根

椿木葉

附槲木

郁李仁

無食子

黃蘗根

雷丸

蘇方木

胡椒

南燭枝葉

椽實

石南

哈佛大學哈佛藥劑
圖書館珍藏印

益智子

紫荊木

紫真檀

烏柏木

杉材

接骨木

樺木皮

木鼈子

番木
鼈附

釣藤

赤檉木

水楊葉

柞木皮

櫻櫚

木槿

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩條五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒

爛胎

蟲疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可鍊餌之益血脈令人色好變化與鬼神通

疏○巴豆生於盛夏六陽之令而成于秋金之月故味辛氣溫得火烈剛猛之氣故其性有大毒別錄言生溫熟寒恐熟亦不甚寒氣薄味厚降也陽中陰也入手足陽明經其主破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水腫鬼毒

蠱症邪物女人月閉者皆腸胃所治之位中
有實邪留滯致生諸病故腸胃有病則五臟
六腑閉塞不通此藥稟火性之急速兼辛溫
之走散入腸胃而能蕩滌一切有形積滯之
物則閉塞開水穀道利月事通而鬼毒蠱症
邪物悉為之驅逐矣溫瘧者亦暑濕之氣入
於腸胃也腸胃既清則溫瘧自止火能灼物
故主爛胎記及去惡肉性熱有大毒則必有損

於陰故不利丈夫陰本經又主傷寒寒熱及
別錄燒餌之法悉非所宜豈有辛熱大毒之
物而能治傷寒寒熱及益血脈好顏色之理
哉

主治參互

同白礬枯過去巴豆單用礬研細吹入喉中
流出熱毒涎喉即寬治急喉痺如神 一味
炒烟盡存性研膏治癰疽潰後腐肉不落傳

用巴

豆二枚

上卽拔毒去瘀生新 外臺秘要飛尸鬼擊
 中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用巴豆記二
 枚去皮心熬黃杏仁二枚以綿包椎碎熱湯
 一合捻取白汁服之當下而愈量老少用之
 瑣碎錄天絲入咽凡露地飲食有飛絲入
 上食之令人咽喉生瘡急以白礬巴豆燒灰
 吹入卽愈 經驗方耳卒聾閉巴豆一粒綿
 裹針刺孔通氣塞之取効 普濟方一切惡

月巴

豆一

瘡有蟲者巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油
 調硫黃輕粉末頻塗取効 仲景三物白湯
 治傷寒懊懺滿悶身無熱者爲寒結胃用桔
 梗三分巴豆一分去皮心熬黑貝母三分二
 味爲末內巴豆白中杵之以白湯和服強人
 半錢弱者減之病在膈上必吐在膈下必利
 不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯

簡誤

四
元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用世
以之治酒病膈氣以其辛熱能開通腸胃鬱
結耳第鬱結雖開而血液隨亡真陰虧損從
正曰傷寒風溫小兒痘瘡婦人產後用之下
膈不死亦危奈何庸人畏大黃而不畏巴豆
以其性熱而劑小耳豈知蠟燭之猶能下後
使人津液枯竭胃熱口燥耗却天真留毒不
去他病轉生觀二公之言則巴豆之爲害昭

明

昭矣然而更有未盡者巴豆稟火烈之氣沾
人肌肉無有不灼爛者。試以少許輕擦完好
之膚須臾卽發出一泡况腸胃柔脆之質下
咽則徐徐而走且無論下後耗損真陰而腑
臟被其熏灼能免無潰爛之患耶凡一槩湯
散丸劑切勿輕投卽不得已急證欲借其開
通道路之力亦須炒熟壓令油極淨入分許
卽止不得多用

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨
節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒
溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩
精女子字乳餘疾散風邪痲結水腫黃疸鬼疰
蠱毒殺蟲魚毒久服頭不白輕身增年開腠理
通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食
令人乏氣口閉者殺人

疏○蜀椒稟火金之氣得南方之陽受西方

之陰本經味辛氣溫別錄大熱有毒氣味俱
厚陽也入手足太陰兼入手厥陰經其主邪
氣欬逆皮膚死肌寒濕痺痛心腹留飲宿食
腸澼下痢黃疸水腫者皆脾肺二經受病肺
出氣主皮毛脾運化主肌肉肺虛則外邪客
之爲欬逆上氣脾虛則不能運化水穀爲留
飲宿食腸澼下利水腫黃疸二經俱受風寒
濕邪則爲痛痺或成死肌或致傷寒溫瘧辛

溫能發汗開腠理則外邪從皮膚而出辛溫能煖腸胃散結滯則六腑之寒冷除腸胃得溫則中焦治而留飲宿食腸澼下利水腫黃疸諸證悉愈矣其主女子字乳餘疾者亦指風寒外侵生冷內停而言洩精癢結由下焦虛寒所致此藥能入右腎命門補相火元陽則精自固而結癢消矣療鬼疰蠱毒殺蟲魚毒者以其得陽氣之正能破一切幽暗陰毒

之物也外邪散則關節調內病除則血脉通佐補陰涼血之藥則頭不白齒髮堅耐寒暑輕身增年所自來矣

主治參互

同女貞子牛膝地黃何首烏旱蓮草枸杞子沒食子桑椹子黃蘗人參南燭子能烏鬚黑髮悅色駐顏 空心單服能收輕粉水銀毒 椒紅丸治元臟傷憊目暗耳聾服此百日

覺身輕少睡足有力是其効也服及三年心
 智爽悟目明倍常面色紅悅髭髮光黑用蜀
 椒去目及閉口者炒出汗曝乾搗取紅一斤
 以生地黃搗自然汁入砂器中煎至一升候
 稀稠得所和椒末九梧子大每空心煖酒下
 三十九丸合藥時勿令婦人鷄犬見 孫真人
 方心腹冷痛以布裹椒安痛處用熨斗熨令
 椒出汗即止 普濟方餐泄不化及久利小

椒一兩炒蒼朮二兩土炒研末醋糊丸梧子
 大每五十九丸米飲下 經驗方囊瘡痛痒紅
 椒七粒葱頭七箇煎水洗之 大全良方寒
 濕脚氣川椒二三升疎布囊盛之日以踏脚
 入仲景烏梅丸治虵厥 宗奭方治盜汗
 將椒目微炒研細用半錢以生猪上唇煎湯
 一合睡時調服無不効 甄權方治腎虛耳
 中如風水鳴或如鍾磬之聲卒暴聾者用椒

目巴豆菖蒲同研細以松脂黃蠟溶和爲挺
納耳中抽之一日一易神驗 千金方水氣
腫滿椒目炒搗細每酒服方寸七

簡誤

椒稟純陽之氣乃除寒濕散風邪溫脾胃煖
命門之聖藥然而肺胃素有火熱或欬嗽生
痰或嘈雜醋心嘔吐酸水或大腸積熱下血
咸不宜用凡泄瀉出於火熱暴注而非積寒

虛冷者忌之陰痿腳弱由於精血耗竭而非
命門火衰虛寒所致者不宜入下焦藥用欬
逆非風寒外邪壅塞者不宜用字乳餘疾由
於本氣自病者不宜用水腫黃疸因于脾虛
而無風濕邪氣者不宜用一切陰虛陽盛火
熱上衝頭目腫痛齒浮口瘡衄血耳聾咽痛
舌赤消渴肺痿咳嗽咯血吐血等證法所咸
忌

皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭
淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊
結婦人胞不落明目益精可為沐藥

疏○皂莢稟木氣而兼火金之性故味辛微
鹹氣溫有小毒氣味俱厚浮而散陽也入足
厥陰手太陰陽明經厥陰為風木之臟其主
風痺死肌頭風淚出者皆厥陰風木為病得
金氣之厚者能勝木稟辛散之性者能利竅

木氣平關竅利則風邪散諸證除也關竅既
利則神明自通精物邪氣安得不去哉又厥
陰之脈循陰器而絡於肝厥陰客寒為囊結
辛溫散厥陰之寒則囊結解矣肺受風寒所
迫為欬嗽入肺散邪則咳嗽止矣鹹能軟堅
溫主通行辛能開竅橫走故又主腹脹滿消
穀及婦人胞不落也宣壅導滯之性而云益
精明目無是理矣

○子氣味與皂莢同炒春去赤皮以水浸軟煮
熟糖漬食之疎導五臟風熱壅滯及治大腸
虛秘瘰癧惡瘡腫毒

○刺功用與莢同第其銳利能直達瘡所爲癰
疽妬乳丁腫未潰之神藥蘇頌以米醋熬嫩
刺作煎塗癰瘡有奇効又治癘風惡瘡胎衣
不下殺蟲凡癰疽已潰不宜服孕婦亦忌之

主治參互

同真珠象牙末牛黃冰片白蠟蠶滴乳石土
茯苓治蛙疔神効 孫用和稀涎散治中風
昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流
涎斯須不治便成大病此證風涎潮於上胃
痺不通急宜吐之用大皂莢肥實不蛙者四
挺去黑皮白礬明者一兩爲末每用半錢重
者三字溫水調灌不大嘔吐只是微微稀冷
涎或出一升二升當待醒醒乃用藥調治不

可便大吐之恐過劑傷人累効不能盡述

聖惠方胃中痰結皂莢三十挺去皮切水五

升浸一夜按取汁慢熬至可丸如梧子大每

食後鹽漿水下十九 又釣痰膏用半夏醋

煮過以皂角膏和勻入明礬少許以柿餅搗

膏丸如彈子大噙之 千金方二便關格皂

莢燒研粥飲下三錢立通宣明方鐵腳丸同

千金方齟鼻不通皂角末吹之 十全方

牙痛

風蟲牙痛猪牙皂莢角食鹽等分爲末日搯

之 袖珍方便毒腫痛猪牙皂角七片煨黃

去皮弦出火毒爲末空心溫酒服五錢婦人

妬乳同 直指方便毒癰疽皂角一條醋熬

膏傅之屢効 儒門事親便癰初起皂角子

七枚研末水服効 阮氏經驗方年久癩癧

用不蛀皂角子一百粒米醋一升蓬砂二錢

同煮乾炒令酥看癧子多少如一箇服一粒

癧

名下用
廣濟

十箇服十粒細嚼米湯下酒浸煮服亦可一
云虛人不可用蓬砂 同蟬蛻白殭蠶杏仁
芭蕉根白毛藤土茯苓獨核肥皂仁白蘚皮
連翹薏苡仁草薺漢防已治下疳廣瘡神効
同連翹白芷甘菊紫花地丁白及金銀花
甘草鼠粘子茜草地榆治下部癰疽腫毒
神仙傳崔言患大風惡疾雙目昏盲眉髮白
落鼻梁崩倒勢不可救遇異人傳方用皂角

刺三斤燒灰蒸一時久日乾為末食後濃煎
大黃湯調一匕飲之一旬眉髮再生肌潤目
明

簡誤

皂莢利九竅疎導腸胃壅滯洗垢膩豁痰涎
散風邪暴病氣實者用之殊効第似中風證
由於陰虛火炎煎熬津液結而為痰熱極生
風以致猝然仆蹶世人多以稀涎散吐之損

其不足竭其津液津液愈耗則經絡無以榮
養為拘攣偏廢之證矣法所最忌也孕婦忌
服

訶黎勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食

疏○訶黎勒其味苦澁其氣溫而無毒苦所
以洩澁所以收溫所以通惟斂故能主冷氣
心腹脹滿惟溫故能下食甄權以止水道
蕭炳用以止腸澼久洩蘇頌用以療腸風瀉

血帶下朱震亨用以實大腸無非苦澁收斂
治標之功也

主治參互

得人參治肺虛受寒喘嗽 得橘皮砂仁主
冷氣入內心腹脹滿及因寒食不下 得益
智止氣虛寒小水不禁 佐樗根白皮止腸
澼瀉血 佐白木蓮實止久洩因於虛寒
同蛇牀子五味子山茱萸杜仲續斷止虛寒

帶下 同人參肉苳菟則實大腸

簡誤

訶子性溫而味澹澹主斂不主散故咳嗽因於肺有實熱泄瀉因於濕熱所致氣喘因於火逆衝上帶下因於虛熱而不因於虛寒及腸澼初發濕熱正盛小便不禁因於腎家虛火法竝忌之至於滯下必本濕熱喘嗽實由肺火用之立斂殺人不可不深戒也東垣謂苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用亦此意耳

棟實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道根微寒療虻蟲利大腸

即金
錢子

疏○棟實稟天之陰氣得地之苦味故其味苦氣寒極苦而寒故其性有小毒氣薄味厚陰也降也入足陽明手足太陰經經曰冬傷

於寒春必病溫其主溫疾傷寒大熱煩狂者
總因寒邪鬱久至春變為溫病邪在陽明也
苦寒能散陽明之邪熱則諸證自除膀胱為
州都之官小腸為受盛之官二經熱結則小
便不利此藥味苦氣寒走二經而導熱結則
水道利矣濕熱鬱積則內生諸蟲濕熱浸淫
則外為疥瘍得大寒極苦之物則濕熱散故
能療諸蟲及疥瘍也根氣味相同故亦主殺

蟲利大腸耳

主治參互

疝氣

劉孝恩

疝子的
癩疝腫

同牛膝木瓜橘核荔枝核杜仲巴戟天烏攬
樹子蘘香治腎虛疝氣 澹寮方棟實丸治
癩疝腫痛或鈎腎偏墜痛不可忍用川棟子
肉五兩分作五分一分用破故紙二錢炒黃
一分用小茴香三錢食鹽半錢同炒一分用
斑蝥七枚去頭足同炒一分用萊菔子一錢

同炒一分用牽牛子三錢同炒炒完揀去食
鹽萊菔子牽牛班蝥只雷故紙茴香同研為
末以酒打麵糊丸梧子大每五十九空心酒
下 根同白蕪荑檳榔鶴蝨黃連牽牛雷丸
使君子錫灰烏梅蘆會殺腸胃一切蟲 集
簡方治小兒虻蟲棟根皮同雞卵煮熟空心
服之次日蟲下

簡誤

脾胃虛寒者不宜用

椿木葉味苦有毒生洗瘡疥風疽皮上甘蜜栲

木根葉尤良 雷公云凡使椿根不近西頭者為
上採出拌生葱蒸半日剉細以袋

盛掛屋南
陰乾用

疏○椿稟地中之陰氣以生本經味苦有毒

甄權言微熱震亨言涼而燥然考其用必是

微寒苦燥之藥入手足陽明經本經主甘蜜

及洗疥瘡風疽藏器去口鼻疔蟲疥蟹者因

腸胃有濕熱故現是證苦涼而燥所以外治
皆得也藏器又主殺虻蟲蠱毒下血及赤白
久痢日華子主腸風瀉血蕭炳云得地榆主
疳痢孟詵云止女子血崩及產後血不止赤
帶皆取其苦能燥濕寒能除熱瀆能收斂之
功耳採得去粗皮蜜炙用 樗功用相同

主治參五

存仁方下血經年樗根白皮三錢水一盞煎

下五

七分入酒半盞服 外臺秘要小兒疳痢困

重者用樗根白皮搗粉以水和棗作大饅飩
子日曬少時又搗如此三遍以水煮熱空腹
吞七枚重者不過七服愈 子母秘錄小兒
疳疾椿根白皮日乾二兩為末以粟米淘淨
研濃汁和丸梧子大十歲兒三四丸米飲下
量大小加減仍以一丸納竹筩中吹入鼻內
三度良 經驗方下利清血腹中刺痛椿根

白皮洗刮曬研醋糊丸梧子大空心米飲下
 三四十九 婦人良方產後腸脫不能收拾
 者樗根取皮焙乾一握水五升連根葱五莖
 漢椒一撮同煎至三升去渣傾盆內乘熱熏
 洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時
 忌鹽酢醬麵發風毒物及用心勞力等事
 丹溪方女人白帶椿根白皮滑石等分爲末
 粥丸梧子大空腹白湯下一百丸 寇宗奭

白帶

一云洛陽一女子年四十六七耽飲無度多
 魚蟹畜毒在臟日夜二三十瀉大便與膿血
 雜下大腸連肛門痛不堪忍醫以止血痢藥
 不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血無
 膿如此半年氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則
 腹愈痛血愈下服冷藥則注泄食減服溫平
 藥則病不知如此期年垂命待盡或人教服
 人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常

服之而愈其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不瘥用栲根白皮一兩人參一兩為末每服二錢空心米飲調服忌油膩濕麵青菜菓子甜物雞猪魚羊蒜薤等

簡誤

脾胃虛寒者不可用崩帶屬腎家真陰虛者亦忌之以其徒燥故也凡滯下積氣未盡者亦不宜遽用不入湯煎

郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道

疏○郁李仁得木氣而兼金化本經味酸氣平無毒元素言辛苦性潤而降下陰也入足太陰手陽明太陽經其主大腹水腫面目四肢浮腫者經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰諸腹脹大皆屬於熱脾虛而濕熱客之則小腸不利水氣泛溢於面目四肢辛苦能潤熱結

降下善導癰閉小便利則水氣悉從之而出
矣甄權主腸中結氣關格不通日華子云泄
五臟膀胱結痛宣腰膝冷膿消宿食下氣元
素云破血潤燥李杲云專治大腸氣滯燥瀉
不通均得之矣

主治參互

同當歸地黃麻仁麥門冬桃仁生蜜肉蓯蓉
治大便燥結不通甚者加大黃 楊氏產乳

腫滿氣急不得臥用郁李仁一大合搗和麵
作餅喫入口卽大便通泄氣便愈

簡誤

郁李仁性專降下善導大腸燥結利周身水
氣然而下後多令人津液虧損燥結愈甚乃
治標救急之藥津液不足者慎勿輕用

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉

疏○無食子稟春生之氣兼得西北金水之

性故味苦氣溫無毒金主斂肅大腸屬金以類相從故主赤白痢腸滑春為發生之令溫能和脾胃養腠理故主生肌肉水為潤下色黑而象腎故李珣以之益血生精和氣安神烏髭髮治陰痿諸證也得溫煖之氣復兼收斂之性故為固瀆精氣之要藥雷公云凡使被火驚者用類小無松米者妙用漿水於砂盆中研令盡焙乾再研如烏犀色入藥

主治參互

同蓮鬚女貞子枸杞子地黃南燭子何首烏黃精旱蓮草木人參為烏鬚髮之勝藥同覆盆子牡蠣枸杞子五味子車前子地黃蓮鬚龍骨鹿茸沙苑蒺藜魚膠砂仁黃蘗能補益精氣治一切夢遺洩精仲景方治陰汗用無食子燒灰先以湯浴了布裹灰撲之甚良宮氣方小兒久痢沒食子二箇熬黃研末作餛飩食之聖濟總錄牙齒疼痛綿

夢遺

牙齒

裹無食子末一錢咬之涎出吐去 聖惠方
大小口瘡沒食子炮三分甘草一分研末搽
之月內小兒生者少許置乳上吮之入口卽
啼不過三次 奇効方足趾肉刺無食子三
枚肥皂莢一挺燒存性爲末醋和傅之立効

簡誤

赤白痢由於濕熱鬱於腸胃兼積滯多者不
宜用

黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡癭喉痺蛇犬
咬毒研水服之亦含亦塗

疏○黃藥根得土中至陰之氣以生故其色
黃味苦氣平無毒平卽兼涼日華子加涼是
矣氣薄味厚降多升少陰也入手少陰足厥
陰經諸惡腫瘡癭皆榮氣不從逆於肉裏所
致蓋榮主血肝心又主血藏血之臟二經得
苦涼之氣則血熱解榮氣和標證不求其止

而止矣經曰一陰一陽結為喉痺一陰者少陰君火也一陽者少陽相火也解少陰之熱相火自不妄動而喉痺瘳矣蛇犬咬毒亦血分受熱毒所傷故也苦寒能涼血得土氣之厚者又能解百毒也日華子以之療馬病蓋馬性多熱亦取其苦寒除熱之義耳

主治參互

同忍冬藤夏枯草白及白歛紫花地丁甘菊

茜草連翹牛旁子白芷貝母白藥子之屬治一切疔腫癰疽本經并載赤藥俗名紅藥子予嘗得一方以之為君每四兩加白及白歛各一兩乳香沒藥各五錢并砂雄黃各三錢麝香龍腦香各一錢為細末量瘡大小蜜調敷瘡四圍中留大孔以綿紙護之時時以米醋潤之其痛即減亦復易潰易收治一切發背癰疽俱神効陰毒尤要如無赤藥子以黃

藥子代之 孫思邈千金月令方療忽生癰
 疾以萬州黃藥子半斤須緊重者為上如輕
 虛即是他州者力慢須用加倍取無灰酒一
 斗投藥入中固濟瓶口以糠火燒一伏時待
 酒冷乃開時時飲一杯不令絕酒氣經三五
 日後常把鏡自照覺消即停飲不爾便令人
 項細也 聖惠方治吐血不止黃藥子一兩
 水煎服 簡要濟眾方治鼻衄不止黃藥子

治吐血

為末每服二錢煎薄膠湯下良久以新水調
 麵一匙頭服之 禹講師經驗方產後血暈
 惡物冲心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子
 一兩頭紅花二錢水二盞婦人油釵二隻同
 煎一盞服大小便俱利血自下也

簡誤

癰疽已潰不宜服癰疽發時不炊腫不渴色
 淡脾胃作泄者此為陰證當以內補為急解

毒次之藥子之類宜少服止可外敷
雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣
胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病
逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸
白自出不止久服令人陰痿

疏○雷丸稟竹之餘氣兼得地中陰水之氣
以生本經味苦氣寒別錄加鹹有小毒黃帝
岐伯桐君扁鵲云甘詳其所主應是苦鹹為

勝氣薄味厚陰也降也入手足陽明經其主
殺三蟲白蟲寸白自出者腸胃濕熱甚也逐
毒氣胃中熱邪氣惡風汗出皮中熱結積者
腸胃邪熱盛也苦寒能除二經濕熱邪氣則
上來諸證自除作摩膏治小兒百病者以小
兒好食甘肥腸胃類多濕熱蟲積苦能殺蟲
除濕鹹寒能清熱消積故主之也凡蠱毒必
熱必辛苦寒能除辛熱故又主解蠱毒也利

丈夫不利女子者蓋以男子屬陽得陰而生故喜陰寒之味女子屬陰得陽而長故不利陰寒之物也別錄又云久服令人陰痿正見其過於苦寒偏至之氣能令陽道痿也

主治參互

同蕪荑使君子蘆會五穀蟲胡黃連青黛治小兒疳蚘有神 同檳榔鶴蝨棟根貫衆牽牛錫灰薏苡根殺腸胃一切蟲 經驗方下

印虫

寸白虫

寸白蟲雷丸水浸去皮切焙為末五更初食炙肉少許以稀粥飲服一錢七須上半月服蟲乃下 除殺蟲外他用甚稀故不著簡誤惟赤色者能殺人用時細擇去之

蘇方木味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮苦酒煮五兩取濃汁服之効

疏○蘇方木稟水土之氣以生故其味甘鹹氣平無毒好古加辛降多於升陽中陰也入

足厥陰兼入手少陰足陽明經凡積血與夫
產後血脹悶欲死無非心肝二經為病此藥
鹹主入血辛能走散敗濁瘀積之血行則二
經清寧而諸證自愈日華子主婦人血氣心
腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲
損瘀血女人失音血噤海藥主虛勞血癖氣
壅滯產後惡露不盡心腹攪痛及經絡不通
悉取其入血行血辛鹹消散亦兼有軟堅瀾

下之功故能祛一切凝滯留結之血婦人產
後尤為所須耳

主治參互

同澤蘭川芎麥門冬生地黃蒲黃人參童便
益母草牛膝黑豆荆芥穗治產後血暈有神
同山查延胡索牡丹皮澤蘭當歸五靈脂
赤芍藥紅花治產後兒枕作痛加入乳香沒
藥治產後血癖不消因寒而得者加炒黑乾

薑桂各少許 同延胡索牡丹皮牛膝當歸
 地黃芍藥續斷治婦人月候不調煎濃汁加
 入乳香沒藥血竭自然銅麝蟲麻皮灰黃荆
 子等末量病輕重調服四五錢治跌撲損傷
 如神 胡氏方產後氣喘面黑欲死乃血入
 肺也用蘇木二兩水二碗煮一碗入人參末
 五錢服隨時加減神効不可言名參蘇飲

簡誤

產後惡露已盡由血虛腹痛者不宜用

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除臟腑

中風冷

疏○胡椒稟天地純陽之氣以生故其味辛

氣大溫性雖無毒然辛溫太甚過服未免有

害氣味俱厚陽中之陽也入手足陽明經其

主下氣溫中去痰除臟腑中風冷者總因腸

胃為寒冷所乘以致臟腑不調痰氣逆上辛

溫煖腸胃而散風冷則痰氣降臟腑和諸證
悉瘳矣

主治參互

食療治心腹冷痛胡椒三七枚清酒吞之
衛生易簡方夏月冷瀉及霍亂用胡椒碾細
飯丸梧子大每米飲下四十九

簡誤

胡椒辛溫大熱純陽之藥也凡胃冷嘔逆宿
食不消或霍亂氣逆心腹冷痛或大腸虛寒
完穀不化或寒痰冷積四體如水兼殺一切
魚肉蠶蕈等毒誠爲要品然而血分有熱與
夫陰虛發熱咳嗽吐血咽乾口渴熱氣暴衝
目昏口臭齒浮鼻衄腸風臟毒痔漏洩瀝等
證切勿輕餌誤服之能令諸病卽時作劇慎
之慎之

南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣久

服輕身長年令人不饑變白去老取莖葉搗碎
漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如
瑩珠袋盛之可適遠方日進一合不饑益顏色
堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名
牛筋言食之健如牛筋也

疏○南燭稟春升之氣以生本經言其味苦
氣平性無毒然嘗其味亦多帶微澹其氣平
者平卽涼也入心脾腎三經之藥十劑云澹

可去脫非其味帶澹則不能上泄非其氣本
涼則不能變白髮者血之餘也顏色者血之
華也血熱則鬢髮早白而顏枯槁脾弱則困
倦嗜臥而氣力不長腎虛則筋骨軟弱而行
步不前入心涼血入脾益氣入腎添精其云
輕身長年令人不饑者非虛語矣凡變白之
藥多是氣味苦寒有妨脾胃惟南燭氣味和
平兼能益脾爲修真家所須 子味甘酸其

功效尤勝枝葉真變白駐顏輕身却老之良藥也牧童食之輒止饑渴亦一驗矣

主治參互

孫思邈千金月令方南燭煎益髭髮及容顏兼補暖三月三日采葉并蓋子入大淨甌中以童子小便浸滿甌固濟其口置閒處經一周年取開每用一匙溫酒調服極有效驗同旱蓮草沒食子地黃桑椹枸杞山茱萸何

首烏白蒺藜爲烏鬚髮之聖藥 氣味和平

性復無毒除變白外無他用故不著簡誤

椽實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼爲散及煮汁服亦主痢并堪染用

疏○椽實感天地微陽之氣兼得秋時收斂之性故其味苦氣微溫性無毒氣薄味厚陽中陰也入手足陽明足太陰少陰經夫脾胃爲五臟根本一身之最要喜溫暖而惡寒濕

寒濕則違其性故宜急食苦以燥之此藥味苦能除其所惡氣溫能遂其所喜故主厚腸胃肥健人也得收斂之性故又主下痢及日華子瀉腸止瀉諸治兼能瀉精煑食復能止饑禦歉歲 穀氣味與實相同而瀉則過於實故亦主下痢并堪染皂也

主治參互

聖惠方水穀下痢日夜百餘行者橡實二兩

楮葉炙一兩為末每服一錢食前烏梅湯調下 直指方下痢脫肛橡斗子燒存性研末猪脂和傅

簡誤

濕熱作痢者不宜用

石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療腳弱五藏邪氣除熱女子不可久服 今思男

疏○石南得火金之氣故其味辛苦氣平有
毒然觀其用當是金勝火微其性應云有小
毒可升可降陰中陽也入足厥陰足少陰經
少陰屬水得金氣之厚者能生水故主養腎
氣又腎為陰中之陰肝為陰中之陽二經俱
在下而主筋骨二經得所養則內傷陰衰自
起筋骨皮毛自利而脚弱自健也濕熱之邪
留滯五臟則筋骨皮毛氣血皆為之病矣邪

熱散則諸病自瘳女子久服思男者以其補
腎氣助陽火耳

主治參互

同巴戟天肉蓯蓉瑣陽鹿茸枸杞子山茱萸
治腎經虛寒精滑精冷 同白蒺藜桑葉何
首烏淫羊藿巴戟天五加皮兔絲子威靈仙
虎骨治肝腎為風寒濕所乘以致痺弱不能

行動

精滑
精冷

不能
行動

簡誤

腎虛而陽道數舉者不宜用脚弱由於肝腎虛而不由於風寒濕客下部者不宜用

益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益智安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗

疏○益智子仁得火土金之氣故其味辛其氣溫其性無毒人足太陰足少陰經惟辛故

所以散結惟溫故所以通行其氣芳香故主入脾其稟火土與金故燥而收斂以其斂攝故治遺精虛漏及小便餘瀝此皆腎氣不固之證也腎主納氣虛則不能納矣又主五液涎乃脾之所統脾腎氣虛二臟失職是腎不能納脾不能攝故主氣逆上浮涎穢泛濫而上溢也斂攝脾腎之氣則逆氣歸元涎穢下行宜東垣用以治客寒犯胃和中益氣及人

多唾王好古謂益智本脾家藥主君相二火
故用以益脾胃理元氣補腎虛滑瀝劉河間
又謂益智辛熱能開發鬱結使氣宣通皆以
其香可入脾開鬱辛能散結復能潤下於開
通結滯之中復有收斂之義故也

主治參互

益智在集香丸則入肺在四君子湯則入脾
在大鳳髓丹則入腎當於補藥中兼用不宜

多服 佐人參茯苓半夏橘皮車前子則攝
涎穢立効 同藿香蘇子橘皮枇杷葉木瓜
止逆氣上壅 同五味子山茱萸炒鹽人參
治小便頻數淋瀝 同人參乾薑橘皮藿香
治因寒犯胃作嘔吐

簡誤

益智乃脾腎二經之藥其用專在脾所以亦
能入腎者辛以潤之之故也然其氣芳香性

本溫熱證屬燥熱病人有火者皆當忌之故
凡嘔吐由於熱而不因於寒氣逆由於怒而
不由於虛小便餘瀝由於水涸精虧內熱而
不由於腎氣虛寒泄瀉由於濕火暴注而不
由於氣虛腸滑法竝忌之

紫荆木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服
之

疏○紫荆木皮內稟天地清寒之性外感南

方初陽之氣故其味苦氣平花木色皆紫藏
器言寒無毒入足厥陰經血分寒勝熱苦泄
結紫入榮故能活血破血消腫毒下五淋也
花梗氣味功用竝同

主治參互

仙傳外科發背初生一切癰疽皆治單用紫
荆皮為末酒調籬住自然撮小不開內服柞
木飲子乃救貧良劑也并可內服 楊清叟

仙傳方冲和膏治一切癰疽發背流注諸腫
毒用紫荊皮三兩炒獨活炒三兩赤芍藥炒
二兩生白朮一兩木蠟炒一兩為末用葱湯
調熱敷血得熱則行葱能散氣也瘡不甚熱
者酒調之痛甚者加乳香 除癰毒外他用
甚稀故無簡誤

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒

疏○紫真檀稟水氣以生故其味鹹氣微寒
性應無毒氣味俱厚陽中陰也入足厥陰經
其主惡毒風毒者凡毒必因熱而發熱甚則
生風而榮血受傷毒乃生焉此藥鹹能入血
寒能除熱則毒自消矣弘景以之傅金瘡止
血止痛者亦取此意耳宜與番降真香同為
極細末傅金瘡良

烏柏木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積聚
疏○烏柏木根皮稟火金之氣以生本經味

苦氣微溫日華子言涼然詳其用應是辛苦
溫之藥而其性則有毒也與巴豆牽牛大略
相似性沉而降陽中陰也入手足陽明經其
主暴水癥結積聚者皆二經爲病苦能泄辛
能散溫能通行腸胃則諸證無不除矣

主治參互

肘後方二便關格二三日則殺人烏桕東南
根白皮乾爲末熱水服二錢

簡誤

水腫多屬脾虛不能制水以致水氣泛濫法
當補脾實土爲急此藥必不可輕用如果元
氣壯實者亦須暫施一二劑病已卽去之

杉材微溫無毒主療漆瘡

疏○杉材得陽氣而兼金化本經氣微溫無
毒日華子加辛氣味芬芳可升可降陽也入
足陽明經本經主療漆瘡及蘇恭療脚氣腫

滿者皆從外治取其芬芳能解漆氣之穢惡
辛溫能散濕毒之衝逆也蘇恭又云服之治
心腹脹痛去惡氣日華子云治霍亂上氣無
非假其下氣散邪辛溫開發之功耳木皮主
金瘡血出及湯火傷灼取老樹皮燒存性研
傅之或入雞子清調敷一二日愈香油亦可

主治參互

同橘皮木瓜香薷砂仁白蘊豆石斛治暑月

霍亂轉筋 柳柳州纂救死三方云元和十

年二月得脚氣夜半痞絕脇有塊大如石且
死困不知人三日家人號哭滎陽陳洵美傳
杉木湯服半食頃大下三行氣通塊散方用
杉木節一大升橘葉切一大升無葉則以皮
代之檳榔七枚童子小便三大升共煮一大
升半分爲兩服若一服得快卽停後服此乃
死病會有效者乃得不死恐人不幸病此故

傳之 危氏得効方小兒陰腫赤痛日夜啼
叫數日退皮愈而復作用老杉木燒灰入膩
粉清油調傅効 救急方廉瘡黑爛多年老
杉木節燒灰麻油調隔箬葉攤貼紮定數易
即愈 除轉筋脚氣外他用甚稀故不著簡
誤

接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢
齧齒可作浴湯

疏○接骨木稟土氣以生故其味甘苦氣平
無毒甘能入脾養血故主折傷續筋骨苦涼
能除風濕浮熱故主風癢齧齒也千金方打
傷瘀血及產婦惡血一切血不行或行不止
竝煮汁服

主治參互

易簡方治折傷筋骨接骨木半兩乳香半錢
芍藥當歸川芎自然銅各一兩為末化黃蠟

四兩投藥攪勻衆手丸如芡實大若止損傷
酒化一丸若碎折筋骨先用此敷貼乃服無
別用故不著簡誤

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良
疏○樺木皮生於西北陰寒之地故其味苦
氣平無毒氣味俱薄降多升少陰也入足陽
明經五疸皆濕熱鬱於陽明所致苦平能除
濕熱故主諸疸也藏器以之治傷寒時行熱
毒瘡宗爽以之治肺風毒皆取其苦涼能散
風邪熱毒之義耳

主治參互

靈苑方乳癰初發腫痛結硬欲破一服卽瘥
以北來真樺皮燒存性研無灰酒服方寸七
卽臥覺卽瘥也 唐瑤經驗方乳癰腐爛靴
內年久樺皮燒灰酒服一錢日一服 和劑
局方肺風毒瘡遍身瘡疥如癩及癰癭瘙癢

面上風刺婦人粉刺竝用樺皮散主之樺皮
燒灰四兩枳殼去穰燒四兩荆芥穗二兩炙
甘草一兩各為末杏仁水煮過去皮尖二兩
研如泥研勻每服二錢食後溫酒調下瘡疥
甚者日三服

簡誤

脾胃弱易於作泄者忌之

木鼈子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌

止腰痛除粉刺黥黯婦人乳癰肛門腫痛

疏○木鼈子稟火土之氣感長夏暑熱之令
以生故其味甘氣溫無毒味厚於氣可升可
降陽也為散血熱除癰毒之要藥夫結腫惡
瘡粉刺黥黯肝門腫痛婦人乳癰等證皆血
熱所致折傷則血亦瘀而發熱甘溫能通行
經絡則血熱散血熱散則諸證無不瘳矣其
止腰痛者蓋指濕熱客於下部所致而非腎

虛爲病之比也用者詳之

主治參互

孫用和秘寶方肛門痔痛用木鼈仁三枚砂盆搗如泥入百沸湯一盞乘溫先熏後洗日用三次仍塗少許 聖惠方耳卒熱腫木鼈子仁一兩赤小豆大黃各半兩爲末每以少許生油調塗之

簡誤

木鼈子味雖甘而氣則大溫本經雖云無毒然亦未免有毒但宜外用勿輕內服劉續霏雪錄云木鼈子有毒不可食昔薊門有人生二子恣食成痞其父得一方以木鼈子煮猪肉食之其幼子當夜死長子明日死其爲毒雖未如此之厲然亦必非純粹之物也 ○番木鼈形小於木鼈而色白味苦氣寒性無毒主傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊竝含之嚥

汁醫方摘要治喉痺作痛用番木鱉青木香
山豆根等分爲末吹之

簡誤

番木鱉性大寒味至苦凡病人氣血虛弱脾
胃不實者慎勿用之

釣藤微寒無毒主小兒寒熱卡二驚癇

疏○釣藤稟春氣以生本經氣微寒無毒保
昇言苦甄權言甘平應是甘苦俱不甚氣味

悉和平者也爲手少陰足厥陰經要藥少陰

主火厥陰主風風火相搏則爲寒熱驚癇此

藥氣味甘寒直走二經則風靜火息而肝心

寧寒熱驚癇自除矣甄權主小兒驚啼瘈瘲

熱壅客忤胎風者亦此意耳

主治參互

得遠志茯神琥珀棗仁丹砂牛黃天竺黃犀
角屑生地黃龍齒麥門冬金箔治小兒驚癇

瘕癥有痰加竹瀝南星橘紅 聖濟錄小兒
驚熱釣藤一兩消石半兩炙甘草二錢五分
為散每服半錢溫水服日三服 聖惠方卒
得癩疾釣藤炙甘草各二錢水五合煎二合
每服棗許日五夜三 除小兒驚癩外無他
用故不著簡誤

赤檉木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火炙熨
之亦可煮汁浸之

疏○赤檉木稟春陽之氣以生故其色青而
葉稍帶微赤凌冬不凋其味甘鹹其氣溫而
無毒浮而升陽也入足陽明手太陰少陰經
觀本經載其能解驢馬血入肉發毒者蓋以
驢馬性熱故多毒生時汗氣沾人即能為病
所以剝時熱血入肉亦能致毒此藥味甘鹹
甘得土氣鹹得水氣故能入血解血分之毒
也近世又以治痧癩熱毒不能出用為發散

之神藥經曰少陰所至為瘍癰正劉守真所謂諸痛癢瘡瘍皆屬心火之旨也蓋熱毒熾於肺胃則發斑癍於肌肉間以肺主皮毛胃主肌肉也此藥正入肺胃心三經三經毒解則邪透肌膚而內熱自消此皆開發升散甘鹹微溫之功用也

主治參互

同石膏知母薄荷荆芥玄參牛旁子麥門冬

竹葉連翹黃芩甘草之屬治癍癰發不出或雖發不透如熱甚毒熾舌生芒刺大渴譫語癍色紫黑者加入三黃石膏湯內大効 單用及兼各藥竝主痧癍首尾諸證 治一切風不問遠近用赤檉木葉半斤切荆芥半斤水五升煮二升澄清入白蜜五合竹瀝五合新瓶盛之油紙封入重湯煮一伏時每服一小盞日三服 酒多致病長壽仙人柳曬乾

為末每服一錢溫酒下 氣味甘溫性復無

毒除痧瘳外他用甚稀故不著簡誤

水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白搗和水絞取汁服一升日二大効

疏○水楊葉嫩枝生於涯涘之旁得水土之陰氣偏多故味苦氣平無毒久痢赤白腸胃濕熱也得苦涼之氣則濕熱散痢自止今人又用以治癰腫痘瘡多効魏直博愛心鑑云

痘瘡數日陷頂漿滯不行或風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯溫浴之如冷漆湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌者皆不可浴痘不行漿乃氣滯血滯腠理閉密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖氣而發行漿

貫滿功非淺也若內服助氣血藥藉此升之其効更速直見一嫗在村中用此有驗叩得妙也

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸七

疏○柞木即鑿子木處處山中有之葉小而細齒光滑而其木及葉皆皆有針刺經

冬不凋五月開碎白芝不結子木心裏皆白色本經味苦氣平無毒然其性又善下達主黃疸病者蓋黃疸因濕熱鬱於腸胃而發此藥苦能燥濕微寒能除熱兼得下走利竅之性則濕熱皆從小便出而黃自退矣今世又以爲治難產催生之要藥亦取其下達利竅之性耳同魚膠人參千里馬百草霜牛膝白芷當歸益母草爲

藥無別用故不著

石難
產催

參互及簡誤

櫻欄皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩
腸風赤白痢入藥燒灰用不可絕過

疏○櫻欄皮稟微陽之氣以生故其味苦澁
氣平無毒本經主諸病皆燒灰用者凡血得
熱則行得黑灰則止故主鼻洪吐血苦能瀉
熱澁可去脫故主崩中帶下及腸風赤白痢
也止血固脫之性而能消瘀血故能破癥也

凡失血過多內無瘀滯者用之切當與亂髮
灰同入更良如暴得吐血瘀滯方動暴得崩
中惡露未竭濕熱下痢初發腸風帶下方熾
悉不宜遽用卽用亦無効入藥須年久敗者
良

木槿平無毒止腸風瀉血又止痢後熱渴作飲
服之令人得睡入藥炒用

疏○木槿本經氣平無毒詳其主治應是味

苦氣寒清熱滑利之藥腸風瀉血濕熱留中
也痢後作渴餘熱在經津液不足也夜臥少
睡心經蘊熱虛煩不寧也苦寒能除諸熱滑
利能導積滯故主如上等證今人用治癬瘡
多取川中所產肉厚而色紅者彌良花功用
相同作湯代茶兼能治風

主治參互

扶壽方牛記牛皮癬川槿皮一兩大風子肉十五

牛皮癬

筒半夏五錢剉河水井水各一盃浸六七宿
入輕粉一錢禿筆掃塗覆以青衣數日有臭
涎出妙忌澡浴 簡便方癬瘡有蟲川槿皮
剪入肥皂浸水頻頻擦之或以槿皮浸汁磨
雄黃尤妙

神農本草經疏卷之十五

人部

總二十五種今疏其要者十一種又陳藏

器三種

髮髮

亂髮

人乳汁

頭垢

人牙齒

人尿人中黃附

人溺

秋石附

溺白塗

婦人月水經衣

附

浣禪汁

婦人禪褙附

懷妊婦人爪甲

天靈蓋

人胞

胞衣水附

初生臍帶

髮髮味苦溫小寒無毒主五癰關格不通利小

便水道療小兒癩大人瘰仍自還神化合鷄子

黃煎之消為水療小兒驚熱

雷斅云是男子二十已來無疾患顏

色紅白於頂心剪下者入丸藥膏中用先以苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煨赤放冷研用

疏○髮者血之餘也經曰男子八歲腎氣盛

齒更髮長是髮因人之血氣以為生長榮枯

也故血盛之人則髮潤而黑血枯之人則髮

燥而黃本經用髮髮之意為是故爾其味苦

氣溫別錄小寒無毒入手足少陰經大人瘰

小兒驚癇皆心肝二經血虛而有熱也髮為

血之餘故能入心入肝益血微寒而苦又能

泄熱所以療小兒驚癇及大人瘰也心與小

腸為表裏腎與膀胱為表裏心腎有熱則二

腑亦受病此藥能入心除熱入腎益陰則水

道利五癰關格俱通矣是以古人治驚多用
 茯苓琥珀竹葉之類取其分利心經之熱自
 小腸出也日華子主止血悶血暈金瘡傷風
 及煎膏長肉消瘀血者悉取其入心走肝益
 血除熱之功耳自還神化之事未見別方大
 抵以火煨之復化而凝成血質此即自還神
 化之謂是因血而生復還為血非神化而何
 ○亂髮微溫主欬逆五淋大小便不通小兒驚

癩止血鼻衄燒之吹內立已

疏○亂髮即常人頭上墮下者其氣味所主
 與髮髮相似第其力稍不及耳以髮髮一時
 難得故別錄重出此條以便臨時取用療體
 實不甚相遠也

主治參互

和劑局方腸風黑散治腸風瀉血用亂髮一
 兩半荆芥二兩槐花槐角各一兩以上共煨

腸風
瀉血

為末枳殼甘草各一兩半為末和前末勻每服二錢水一盞煎七分空心服溫酒調下亦得
 劉禹錫傳信方孩子熱瘡亂髮一團如梨子大鷄子黃十箇煮熟同於銚子內熬至甚乾始有液出旋置盞中液盡為度用敷瘡上外即以苦參粉摻之神効
 又方小兒斷臍即用清油調髮灰傅之不可傷水臍濕不乾亦傅之効
 千金方小兒驚啼亂油髮燒

趙香珍

研乳汁或酒服少許良
 聖惠方鼻血不止血髮燒灰吹之
 又方諸竅出血頭髮敗壞陳蓮蓬竝燒灰等分每服三錢童便溫酒調下
 婦人良方記女人漏血記亂髮洗淨燒研空心溫酒服一錢
 入諸膏藥內能消毒止痛長肉生肌
 肘後方女勞黃疸膏髮煎用猪膏半斤亂髮鷄子大三團和煎髮消藥成矣分再服病從小便中出也

簡誤

髮灰走血分而帶散其主諸血證亦是血見
灰則止取其治標之義居多若欲全仗其補
益未必能也經熬煨成末後氣味不佳胃弱
者勿服入外科藥殊有神効

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

唐本注療目赤痛多淚解

獨肝牛肉毒合豉濃汁飲之神効

疏○人乳乃陰血所化生於脾胃攝於衝任

未受孕則下為月水既受孕則留而養胎已
產則赤變為白上為乳汁此造化玄微之妙
人身轉運之神也其味甘氣平無毒入心入
腎入脾潤肺益壽延年之聖藥也氣血之液
故能補五臟五臟得補則氣血充實而體自
肥白悅澤也經曰目得血而能視乳為血化
故能療目赤痛多淚甘能解毒故又主解獨
肝牛肉毒也

主治參互

攝生衆妙方接命丹治男婦氣血衰弱痰火上升虛損之證又治中風癱瘓手足疼痛不能動履等證用人乳二盃香甜白者爲佳以好梨汁一盃和勻銀石器內頓滾每日五更一服能消痰補虛生血延壽此以人補人之妙法也 聖惠方眼熱赤腫人乳半合古文錢十文銅器中磨令變色稀稠成煎瓶收日

點數次或以乳浸黃連蒸熱洗之 萬氏家

抄方一切虛損勞證太乙神應丸人乳一碗

磁器煮乾焙燥牛乳一碗同前製杜仲三兩

破故紙二兩半白蘚皮白茯苓牛膝當歸各

二兩黍米金丹一箇曬乾卽初生兒口中血

珠共爲末蜜丸桐子大每服一丸夜間噙化

簡誤

乳屬陰其性涼而滋潤血虛有熱燥渴枯涸

趙香珍

者宜之若臟氣虛寒滑泄不禁及胃弱不思食脾虛不磨食竝不宜服

頭垢主淋閉不通

梳上者名百齒霜

疏○頭垢頭上垢膩也其性滑潤而下走故本經主淋閉不通及弘景療噎疾其味苦溫能走陽明故又主勞復及婦人吹乳也

主治參互

同白芷貝母半夏爲丸酒下治婦人吹乳

同山茨菰橘葉鼠糞人爪蒲公英柴胡山豆根白芷連翹貝母夏枯草忍冬藤治乳岩乳癰神効 類要方天行熱病後勞復含頭垢棗核大一枚良 外臺秘要預防勞復傷寒初愈欲令不勞復者頭垢燒研水丸梧子大飲服一丸 衛生寶鑑婦人吹乳百齒霜以無根水丸梧子大每服三丸 數條之外無別用故不著簡誤

人牙齒平除勞治瘡蠱毒氣入藥燒用

疏○牙齒者腎之標骨之餘也經云男子三八腎氣平而真牙生五八腎氣衰而齒槁以腎主骨故也其味甘鹹氣熱有小毒其主除勞治瘡者蓋勞乃勞極精氣之絕腎家虧損所致也齒牙為腎氣所生以類相從適還其本故主之也瘡亦因勞而發非夏傷暑秋為瘡之比故亦主之味甘而鹹所以能解蠱毒

氣也今世又以之治痘瘡倒靨乳癰未潰為必須之藥

主治參互

錢氏小兒方痘瘡倒靨人牙燒存性入麝香少許溫酒服半錢 聞人規痘疹論人牙散治痘瘡方出為風寒外襲或變黑或青紫此倒靨也宜溫肌發散使熱氣復行而斑自出用人牙不拘多少瓦罐固濟煨過出火毒研

末出不快而黑陷者獺猪血調下一錢因誤服涼藥血滯倒陷者入麝香溫酒服之其効如神 肘後方乳癰未潰人牙齒燒研酥調敷之 直指方陰疽不發頭凹沉黯不疼無熱內服補散不起用人牙燒過穿山甲炙各一分爲末分作二服用當歸麻黃煎湯下外以薑汁和麪傅之

簡誤

近世用人牙治痘瘡陷伏稱爲神品然一經用之貽害不淺夫齒者腎之標骨之餘也痘瘡則毒自腎出方長之際外爲風寒穢氣所冒腠理閉塞血滯不行毒不能出或變黑倒靨宜用此以酒麝達之竅入腎經發出毒氣使熱令復行而瘡自紅活蓋劫劑也若伏毒在心昏冒不省人事及氣虛色白痒塌不能作膿熱沸紫泡之證止宜解毒補虛苟誤用

此則鬱悶聲啞反成不治之證可不慎哉其除勞治瘧本經雖言之今世亦稀用

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者搗末沸湯沃服之

疏○人之五穀入胃津液上升為氣血糟粕下降而成糞其本原以化過但存極苦大寒之氣味耳入足陽明經經曰陽明實熱則登高而歌棄衣而走苦寒能除陽明之熱故療

時行大熱狂走也凡毒必熱必辛苦寒能除辛熱故又主解諸毒也蘇恭云新者封疔腫一日根爛蓋疔腫乃風火之毒氣結成得大寒極苦之氣則風火散根自爛也今世人又以之治痘瘡血熱紫黑倒靨者殊效

○糞清臘月截淡竹去青皮塞口納糞坑中積年得汁甚黑而苦主天行熱狂熱疾中惡毒惡瘡瘟病垂死者皆瘥一名黃龍湯俗名

金汁

○人中黃卽多年廁坑中甕上所凝結黃泥是也藥性治療大約與人屎同解胃家熱毒有
効

主治參互

斗門方熱病發狂奔走似癲如見鬼神久不
得汗及不知人事者以人中黃入大罐內以
泥固濟煨半日去火毒研末新汲水服三錢

未退再服 寇宗奭衍義大熱狂渴乾陳人
屎爲末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將
末二三兩匙於坑中以新汲水調勻良久澄清
細細與飲卽解 儒門事親四靈無價散治
痘瘡黑陷腹脹危篤者此爲劫劑用人糞猫
糞猪犬糞等分臘月初旬收埋高燥黃土窖
內至春取出砂罐盛之鹽泥固濟炭
烟盡爲度取出爲末入麝香少許研
器

密封收之一歲一字二歲半錢三歲一錢蜜
水調下須臾瘡起 千金方疔腫初起刮破
以熱尿傅之乾即易 又方五色丹毒黃龍
湯飲二合并塗之良 陶弘景解藥箭毒交
廣夷人用焦銅為箭鏃更以毒藥物汁漬之
射人纔傷皮便死惟飲糞汁即解

簡誤

傷寒溫疫非陽明實熱者不宜用痘瘡非火
熱鬱滯因而紫黑乾陷倒靨者不宜用以其
苦寒之極耳

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

疏○人溺乃津液之濁者滲入膀胱而出其
味鹹氣寒無毒為除勞熱骨蒸咳嗽吐血及
婦人產後血暈悶絕之聖藥晉褚澄勞極論
云降火甚速降血甚神飲洩溺百不一死服
涼藥百不一生言其功力之優勝也經云飲

入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱故人服小便入胃亦隨脾之氣上歸於肺下通水道而入膀胱乃循其舊路也故能治肺病引火下行凡人精氣清者爲血濁者爲氣濁之清者爲津液清之濁者爲小便與血同類也故其味鹹而走血鹹寒能伏虛熱使火不上炎而血不妄溢是以能療諸血證也蘇恭主久嗽上氣失

聲及日華子止勞渴潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血在內暈絕止吐血鼻衄皮膚皴裂難產胞衣不下諸證悉由此故本經主寒熱頭疼溫氣者鹹寒能除邪熱故耳法當熱飲熱則於中尚有真氣在其行自速冷則惟存鹹味寒性矣

主治參互

同枇杷葉天門冬麥門冬蘇子桑白皮沙參

五味子生地黃欬冬花百部治陰虛咳嗽聲
啞喉間血腥氣 同蘇木番降香續斷牛膝

牡丹皮蒲黃治內傷吐血或瘀血停雷作痛

同澤蘭荆芥白芷續斷延胡索牛膝蘇木

黑豆治產後血暈虛者加入參 凡產後溫

飲一盃可免血暈至三日後止之 中暍昏

倒以熱小便灌下即活 聖濟總錄頭痛至

極童便一盞豉心半合同煎至五分溫服

孟詵必効方骨蒸發熱童便五升煎取一升

以蜜三匙和之每服二碗半日更服此後常

服自已小便輕者二十日重者五十日瘥

聖惠方絞腸沙痛童便乘熱服之即瘥 仲

景方中暑昏悶夏月在途中熱死急移陰處

就掬道上熱土擁臍上作窩令人溺滿煖氣

透臍即甦乃服地漿蒜水等藥 千金方金

瘡出血不止飲人尿五升 外科發揮折傷

跌撲童便入少酒飲之推陳致新其功甚大
 千金方火燒悶絕不省人事者新尿頓服
 二三升良 通變要法人咬手指瓶盛熱尿
 浸一宿即愈 普濟方赤眼腫痛自己小便
 乘熱抹洗即閉目少頃此以鹹寒內有真氣
 故能退去邪熱也

簡誤

人溺滋陰降火除骨蒸解勞乏治諸吐衄咯

唾血其効甚速褚澄遺書云人喉有竅則
 咳血殺人喉不停物毫髮芥帶必欬血既滲
 入愈滲則愈欬愈欬愈滲惟飲洩溺則百不
 一死若服寒涼則百不一生其為肺腎有火
 者必須之物第其性稍寒惟不利於脾胃虛
 寒或澹泄及陽虛無火食不消者咸在所忌
 今世人類用秋石此乃水澄火鍊真元之氣
 盡失其功不逮童便多矣况難多服久服則

鹹能走血使血凝泣爲病

溺白堊療鼻衄湯火灼瘡

疏○溺白堊卽人中白乃人溺之積氣結成其味鹹氣涼無毒能瀉肝腎三焦膀胱有餘之火本經療鼻衄及大明治傳屍勞熱肺痿心膈熱吐血羸瘦渴疾者以其能入諸經瀉去火邪也涼能除熱故又治湯火灼瘡今人以之治口舌生瘡疳蟲等證多効是其除熱

降火之驗也

主治參互

同水片礪砂青黛黃檗牙硝白礬治口舌生瘡及小兒走馬牙疳口臭 經驗方鼻衄不止人中白焙乾入麝香少許溫酒調服立効 又方小兒口疳人中白煨黃檗蜜炙焦爲末等分入水片少許以青布拭淨摻之累効

婦人月水解箭毒并女勞復

陳藏器云經衣主金瘡血湧出炙熱

熨之又燒灰傅虎狼傷瘡及箭鏃毒入腹

疏○經云女子二七天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下謂之天癸者乃天一所生之水也上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝夕故月事一月一行與之相符也其味鹹鹹爲水化凡毒得水則解故能解箭毒也女勞復者熱病新瘥後交感而得其證發熱煩躁少腹陰囊牽引而痛以前病餘熱未除陰精

復損故有是證月水乃陰中有陽之物能補陰除熱故主之也金瘡及虎狼傷瘡皆血分受傷爲病以類相從乃所以補其不足也童女首經名紅鉛能回垂絕之陽氣第一時難得耳如女子自受胎時筭至十四歲足卽於是日是時經至者此爲正鼎其經爲上藥用法招攝於經將至時真氣先到采入身中名得大藥可以接命卽首楞經所載精仙是也

絕非入爐交感亦非情想得通故亦成仙道耳

主治參互

扁鵲方丈夫熱病後交接復發忽卵縮入腹腹痛欲死燒女人月經赤衣為末熱水服方寸七即定并治女勞色疸 千金方男子陰瘡因不忌月事行房陰物潰爛用室女血衲瓦上燒存性研末麻油調傅 博物志交廣

夷人以焦銅和毒藥於箭鏃上中人即沸爛須臾骨壞而死但服月水尿汁解之

簡誤

月水雖能治病然穢污不潔之物故女子入月時人宜遠之其昇丹煎膏治藥及小兒出痘切須避忌如犯之則藥不靈痘變壞也紅鉛其性質乃陽氣凝結而成火盛人不宜單服須多服人乳并入童溺乃佳

浣禪汁解箭毒并女勞復亦善 婦人禪襠主
陰易病當陰上割取燒末服方寸七童女禪益
佳若女患陽易即須男子禪也陰易病者人患
時行病起後交合陰陽便即相著甚於本病其
候小便赤澇寒熱甚頭痛腰痛耳鳴眼花服此
便通利

疏○禪襠居下體得陰氣勝取其以類相從
氣相感能導邪熱故主陰陽易病也

主治參互

仲景方陰陽易病身體重少氣腹裏急或引
陰中拘急熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花
膝脛拘急者燒禪散主之取中禪近陰處燒
灰水服方寸七日三服小便即利陰頭微腫
則愈男用女女用男 千金方胞衣不下以
本婦禪覆井上即下

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障

疏○爪託者筋之餘肝膽之外候也經曰多食辛則筋急而爪枯以辛能散真氣而走筋也本經獨用懷妊婦人者蓋婦人氣血充實乃能受孕取其有生長力緊之意也其味甘鹹氣平無毒目中醫障肝經血虛也爪甲乃肝之餘氣所生而性又帶散故點目能去醫障也寇宗奭以衆人甲刮取細末搐鼻內治鼻衄立愈兼能催託生利小便止尿血散乳癰等

用

主治參互

聖惠方胞衣不下。取本婦手足爪甲燒灰。酒服。又方一切目疾。以木賊草。擦取爪甲末同丹砂等分研勻以露水搜丸芥子大每以一粒點入目內或用乳汁和亦得并治飛絲入目

大靈蓋味鹹平無毒主傳尸疰鬼氣伏連久

瘴勞瘧寒熱無時者燒令黑細研白飲和服亦
合丸散用

疏○天靈蓋乃死人腦蓋骨也不用他骨而
用此者以人生時腦爲諸陽之會而此骨則
一身衆骨之主也其主傳尸尸疰鬼氣伏連
者取其同類之氣引出邪魅則其魂魄飛越
不復附人故得瘥也又瘴勞瘧寒熱無時者
亦邪惡之氣侵人也辟惡散邪是其能事故

亦主之

主治參互

同鬼白乾漆象膽獺肝丹砂胡黃連入滋陰
藥內治傳尸勞 同牛黃象牙末蛙竹屑血
竭乳香沒藥黃蠟明礬真珠作丸治楊梅結記
毒 痘瘡經驗方痘瘡陷伏灰平不長此係
虛寒證用天靈蓋燒研酒服三分
○附化屍場上人骨取爲細末傳金瘡止血長

肉及惡瘡不收斂并能治打撲折傷人受杖記時服之不痛不腫不爛

簡誤

天靈蓋治勞瘵者以其有尸鬼勞蟲為害取其逐散邪也今人虛損勞怯皆係色欲過度損傷真陰實無鬼氣淹伏何得用此幽暗不祥之物治之哉其痘瘡虛寒陷伏或為邪氣所觸發不出者不過借其陽氣所結之餘逐

散其邪以發出耳非正治也若血熱煩躁瘡乾紫黑者用之必致危殆不救慎之慎之人胞主血氣羸瘦婦人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦瘁者以五味和之如髓餌法與食之勿令知一名紫河車

疏○夫人有生之初攬父精母血以成胚胎外即有衣一層裹之即胞也至十月降生時隨兒後出其味甘鹹氣溫無毒血氣羸瘦婦

人勞損面黧皮黑腹內諸病漸瘦瘁者皆榮血不足精氣虧損也此藥得精血之氣而結能從其類以補之是以主諸證也今世以之治男女一切虛損勞極為益血補精氣之用
主治參互

同人參黃耆鹿茸白膠當歸補骨脂五味子巴戟天治真陽虛極畏寒足冷 吳球大造託丸治虛勞骨蒸女人無子及多生女月水不

託

調小產難產服之必主有子危疾將絕者一二服可更活一二日其補氣血之功力可見也久服耳目聰明鬚髮烏黑延年益壽有奪造化之功故名大造丸用紫河車一具男用女胎女用男胎初生者米泔洗淨淡酒蒸熟搗曬研末敗龜板童便浸三日酥炙黃二兩黃檗杜仲各一兩半牛膝一兩二錢生地黃二兩半入砂仁六錢白茯苓二兩絹袋盛入

瓦罐酒煮七次去茯苓砂仁不用杵地黃為膏聽用天門冬麥門冬人參各一兩二錢淨夏月加五味子七錢俱忌鐵器為細末地黃膏加酒米糊丸小豆大每服八九十九空心鹽湯下女人去龜板加當歸二兩男子遺精女人漏下並加牡蠣粉一兩去人參

簡誤

人胞乃補陰陽兩虛之藥以其形質亦得男

女坎離之氣而成如陰陽兩虛者服之有反本還元之功誠為要藥也然而陰虛精涸水不制火發為咳嗽吐血骨蒸盜汗等證此屬陽盛陰虛法當壯水之主以制陽光不宜服此並補之劑以耗將竭之陰也胃火齒痛法亦忌之

○胞衣水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮豎虛痞等證

天行熱病飲之立効此卽胞衣埋地下久遠
化爲水者得地中之陰氣其氣必寒辛寒而
走足陽明經故主如上諸證也南人以甘草
升麻和入胞瓶盛埋之三五年後掘出取爲
藥也

初生臍帶主瘡燒爲灰飲下之

疏○臍者命蒂也當心腎之中爲真元歸宿
之處胎在母腹臍連於胞喘息呼吸滋養之

多
多
看
看

妙從此而通胎出母腹臍帶剪斷則一點真
元之氣從此而歸入命門丹田故臍爲命蒂
而臍帶亦真氣會聚之所也本經以之治瘡
者應是久瘡虛寒之甚藉其氣以補不足也
今世以小兒脫下臍帶燒灰與服可解胎中
一切毒及免驚風痘患亦取裨補真元耳

主治參互

全幼心鑑臍汁不乾綿裹落下臍帶燒研一

入當歸頭末一錢麝香一字搽之 保幼
全預解胎毒臍帶燒灰以乳汁調服或入
砂少許可免痘患無毒而主療甚稀不著

向誤

本草經疏卷之十五



