

漢書必用類選

夏


漢書門			
一	二	三	四
六	八	函	號
冊	架	冊	架

內閣文庫			
函	冊	號	類
15	15	15	15

內閣文庫			
番號	漢	12246	
冊數	4 ( 2 )		
函號	301	79	








新刊醫家必用類選卷之二

真中風論



真中風邪者東垣謂有中血脉者有中腑者有中  
臟者若外無六經之証內無便溺之阻肢不能舉  
口不能言此中血脉之經也宜用大秦芫湯補血  
以養筋然其方必的係風邪卒中有外感而無內

傷者斯可用之否則不可輕用也經曰邪之所湊  
其氣必虛

大秦芫湯



秦艽 石膏各二兩 甘草 川芎 當歸

芍藥 羌活 獨活 防風 黃芩 白芷

生地黄 熟地黄 白茯苓 白朮各一兩

細辛五錢

右剉每服一兩水煎天陰兩加生薑七片春夏加知母一兩○若面加五色有表症脉浮而惡風寒拘急不仁皆中腑也陽受症也中腑多着四肢中腑用加減小續命湯發其表調以通聖辛涼之劑或曰中腑宜少汗○若唇緩失音鼻塞耳聾眼瞽便心皆中臟也陰受症也中臟多滯九竅中臟以

三化湯通其滯調以十全四物之劑或曰中臟宜少下

三化湯

厚朴 大黃 枳實 羌活

石剉每服一兩水煎

凡中腑及中臟者茶心兼用先發其表而后通其滯也

類中風辯

內經曰風之傷人或為寒中或為熱中諸書因著為中風方治此為真中風者言也但人之病此者



甚少若內傷熱症而卒暴僵仆類乎中風而病與  
風無干只以內傷主治世人率名為中風以風藥  
治之殺人多矣此確論也昔人主乎風劉河間謂  
特息失宜水不制火而主乎火極是東垣謂因內  
傷氣病主乎氣丹溪主乎濕熱曰火曰氣曰熱三  
者類中風而非中風也大率專主血虛有痰或挾  
火與濕治法以痰為先補養次之亦有死血留滯  
者皆不治今以真中風証治列於前類中風証治  
列於後如此則名同病異判然明白而臨症施治  
庶不差矣又謂地有不同人病亦異西北人外中

風者亦有東南人只是濕土生痰々生熱々生風  
中風論

風本生於熱以熱為本以風為標火本不燔遇風  
乃燔故熱勝則風動此大槩耳分而言之中風有  
三中血脉則口眼喎斜中腑多著四肢則肢體廢  
中臟多滯九竅昏緩失音鼻塞耳聾眼瞤便秘輕  
則神思昏憤言語蹇澁重則卒然倒地不知人事  
急以通關散細辛去葉皂角去皮子為細末用半  
分以竹筒吹入鼻有嚏即效針人中穴如醒遲更  
以半復末半分吹入鼻但覺甦醒灌服真蘇合香



凡如無真蘇合香丸用破棺散南星半錢片腦少許為細末擦牙齒此急救回生之妙法也至於口開手撒眼合遺尿髮直吐沫搖頭直視聲如鼾睡者不治中風之症初即順氣久當和血此萬古不易之論又云半身不遂大率多痰在左屬死血在右屬痰及氣虛左用四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁右用二陳四君子亦入竹瀝薑汁俱當隨症施治不可執一若外無六經之形症內無便溺之阻膈惟肢體不遂言語蹇澁宜大藥養之當順時令調陰陽安臟腑和榮衛未有不愈者也又有高年

氣弱或將息失宜或七情相干而卒似風狀者非外來風邪乃本氣為病也若以風藥治之反害非輕此劉守真許學士之高論也不可不一說中腑宜少汗中臟宜少下初得之症恐表裏不和故汗下之表裏既和治之則在經也凡中風者必有先兆之症覺大柎指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣是先兆也三年內必有大風之症經云急則治其標緩則治其本宜調榮衛養氣血為主當用四君子補氣壯胃四物以養血滋陰則胃氣壯盛榮衛調和腠理密緻邪



氣不能為害切不可用發表攻裏之藥耗血氣損  
 真元也又曰手麻者屬氣虛手木者屬血虛  
 愈凡飲

治半身不遂手足欠利語言費力呵欠噴嚏白木  
 口眼喎斜寬弛頭目眩暈痰火熾盛筋骨時痛頭  
 或痛心悸

川芎一分錢 當歸一分錢 生地黃八分  
 熟地黃八分 製紅花四分 牛膝八分  
 羌活六分 防風六分 天麻一分 南星一分  
 半隻一錢 薑一分 橘紅八分 白茯苓一分  
鹽

黃芩八分 薄桂枝六分 白木一分  
 甘草四分 酸棗仁八分 白芍藥二錢  
 黃柏三分 夏月酒炒 用之

水煎入淡竹瀝薑汁二三茶匙清且時溫服○四  
 物湯加紅花牛膝共六錢二分補血涼血活血二  
 陳湯加南星白朮黃芩治濕痰風痰火痰再加竹  
 瀝薑汁以行肌表經絡之痰共五錢九分○羌活  
 防風天麻桂枝皆行經絡肌表辛溫開發之劑引  
 送血藥流散邪滯桂枝橫行手臂牛膝黃柏行腰  
 腿○白朮為君佐以茯苓甘草白芍藥橘紅半夏



又以固脾胃之氣血以運行諸藥輸送各經○酸  
枣仁佐川芎當歸羌活入肝治筋骨酸痛濕痺又  
佐地黃當歸入心治虛振悸○四物湯得羌活防  
風桂枝南星半夏為佐使則經絡肌表筋骨之血  
皆補其虛而活其滯矣○南星半夏雖燥然二味  
共止二錢羌活防風桂枝雖辛溫三味止一錢四  
分通共三錢四分溫燥之藥加於血藥六錢二分  
之內况又有黃芩黃柏甘草苦寒甘寒藥共一錢  
五分多寡懸絕焉得燥吾之血耶此正君臣佐使  
分兩多少之妙○痰之為物遍身上下無處不到

故古人用二陳湯通治之隨其所在而用藥引導  
之今用南星天麻竹瀝薑汁導之入手足經加以  
白朮黃芩降其隔上之火痰○冬寒月減黃芩二  
三分少加炮川烏二分若用川烏減桂只用一二  
分風病減去可去川烏桂減南星羌活素有火黃  
芩不必減○羌活風家要藥若寒涼月遇有感冒  
可加至一錢有汗而惡風此則真感風症也可加  
桂枝六七分病減則減去之川烏桂枝羌活防風  
南星等藥皆行經絡開發腠理之劑故治風家必  
用之風能燥故必用滋血潤燥藥邪既容於經絡



肌表之中則津液不得流通凝滯而為痰飲故必  
用治痰茶風也血也痰也三者相因但各有輕重  
先後之不同或先因中風則治風為重或先因血  
虛血熱則治血為重或先因痰則治痰為重張仲  
景小續命湯是論風也劉張丹溪諸說是論血與  
痰火也要在隨症推移消息之耳

烏茶順氣散

治男婦風氣攻症四肢骨節疼痛遍身麻痺手足  
癱瘓言語蹇澀筋脉拘攣及脚氣步履艱辛脚膝  
軟弱婦人血風老人冷氣胸膈脹滿心腹刺痛吐

瀉腸鳴等症

麻黃

二兩  
去節

陳皮

二兩  
去白

烏藥

二兩  
去木

川芎

一兩

白僵蚕

炒  
絲角去

枳殼

去穰  
各一兩

白芷

炒

甘草

桔梗

略一兩

乾薑

錢五

右每用冰薑葱半酒煎服○有拘攣加木瓜石斛

○濕氣加蒼朮浙木栝榔○脚膝浮腫加牛膝五

加皮獨活○遍身疼痛加官桂當歸沒藥乳香○

腰疼加杜仲八角茴香○虛汗加黃耆去麻黃○

潮熱去軍薑加黃芩青藤根○胸膈脹滿加枳實

莪朮○夜間疼痛加虎脰骨石楠葉青木香○頭



眩加細辛好細茶○脚不能舉動加麝香羌活防  
風○心痛刺痛加茴香○手足不能起擡加川續  
斷威靈仙○陰積浮腫合和五積散○四肢皆有  
冷痺加川烏附子交桂○麻痺疼痛極者合和三  
五七散○左癱右瘓加當歸天麻白茯苓○二三  
年不能行者合和獨活寄生湯○婦人血氣加防  
風薄荷荆芥○日夜疼痛午闌輕夜又痛合和神  
秘左經湯

八味順氣散  
治中風先宜服此藥以順其氣次用治風之藥

白朮 白茯苓 青皮去 白芷 陳皮去

烏茶 人參各二錢 甘草錢

右咬咀分二貼水二鍾煎至八分去粗食遠服若  
痰盛加半夏二錢生薑三片○

防風通聖散

治一切風熱大便秘結小便赤澀頭面生瘡眼目  
赤痛或熱極生風舌強口噤或鼻生紫赤風刺癢  
疹而為肺風或成風厲而世呼為大風或腸風而  
為痔漏或腸鬱而為諸熱譫妄驚狂併皆治之

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒硝



連翹 薄荷 麻黃 不去節 各半兩 石膏 桔梗

黃芩 各一兩 白朮 山梔子 荊芥穗 各二兩半

滑石 甘草 各三兩

右咬咀如麻豆大每服一兩生薑三片同煎溫服  
日再服○勞汗當風汗出為酸鬱乃瘕勞汗出於  
玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府  
之風當調其榮衛俗云瓜刺○生癢疹或赤或白  
加麻黃鹽豉葱白出其汗麻黃去節并去芒硝  
走血而內凝故不能發汗還依前方中加四物湯  
黃連解毒三藥合而服之日二服故內經曰以苦

發之謂熱在肌表連內也○小便淋閉去麻黃加  
滑石連翹煎茶湯調木香末二錢麻黃主表不主  
裏故去之腰脇痛走注疼痛者加硝石當歸甘草  
一服各二錢調車前子末海金砂末各一錢內經  
曰腰者腎之府若破傷風者加在表則辛以散之  
在裏則苦以下之兼散之汗下後通利血氣祛逐  
風邪者每一兩內加荊芥穗大黃各二錢調全蝎  
末一錢羌活末一錢諸風潮搐小兒急慢驚風大  
便結秘邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄睡語  
筋轉驚悸肌肉縮動每一兩加大黃一錢梔子二



錢調茯苓末二錢○肌肉蠕動者調養活末一錢  
經曰肌肉蠕動命曰微風○風傷於肺咳嗽喘急  
每一兩加半夏桔梗紫苑各二錢○打撲傷損支  
節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各三  
錢半調沒藥乳香末各二錢解利四時傷寒內外  
情傷母一兩內加益元散一兩葱白十莖鹽豉一  
合生薑半兩水一大碗煎至五七沸或煎一小碗  
溫冷服一半以筋投之即吐罷後服一半稍熱服  
汗出立解○飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連  
鬚二錢葱白下莖依法立愈慎勿用桂枝麻黃湯

解之○頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加薄荷  
黃連各二錢半內經曰膽移熱於腦則辛額鼻淵  
鼻淵者濁涕下不已也王注曰膽液下澄則為濁  
涕下不已如水泉故曰鼻淵也此為足太陽脉與  
陽明脉俱盛也○氣逆者調木香末一錢服之  
搜風順氣丸

治三十六種風七十二般氣去上熱下冷腰脚疼  
痛四肢無力多睡少食漸令羸瘦顏色不完惡瘡  
下疳風氣脚氣癰癤氣塊老人小兒皆可服補精  
駐顏踈風順氣



車前子二兩 換柳 火麻子微炒去  
 柳李仁湯泡去 牛膝酒浸 鬼絲子酒蒸搗  
 山藥各二 枳殼炒 防風去 鬼絲子酒蒸搗  
 獨活各一 大黃生半熟 防風去 鬼絲子酒蒸搗  
 右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九漸加至  
 四五十九酒茶米飲任下百無所忌空時臨睡各  
 一服久服去腸中宿滯精神強健耳目聰明腰脚  
 輕健百病皆除老者反少孕婦勿服如服茶覺臍  
 臍微動以羊肚肺羹補之又治腸瓜下血中風癱  
 瘓語言蹇澁百病不生無病不治

小續命湯

治卒暴中風不省人事半身不遂口眼歪斜手足  
 顫掉語言蹇澁肢體麻痺神情昏亂頭目眩暈痰  
 涎壅盛筋脉拘攣及脚氣緩弱不能動履屈伸

防已 桂心 黃芩 杏仁去皮 芍藥  
 甘草炙 川芎 麻黃去節 人參各一分  
 防風二錢 附子炮七分此茶通行  
 右咬咀分二貼每貼水二鐘薑五片棗一枚煎八  
 分食遠溫服○精神恍惚加茯苓遠志○骨節煩  
 疼有熱者去附子倍芍藥○心煩多驚加犀角○



骨節疼痛此有寒濕倍加官桂附子○嘔逆腹脹  
加半夏倍人參○燥悶大便澀去附子倍芍藥入  
竹瀝○臟寒下痢去防己黃芩倍附子加白朮○  
自汗去麻黃杏仁加白朮○脚膝弱加牛膝石斛  
○身疼加秦芫○腰痛加桃仁去皮杜仲薑汁  
凡治中風不審六經之形證加減雖治與不治無  
異也加減法具于後  
麻黃續命湯 治中風無汗惡寒  
本方中麻黃防風杏仁各加一倍  
桂枝續命湯 治中風有汗惡風

本方中桂枝芍藥杏仁各加一倍  
白虎續命湯 治中風身熱無汗不惡寒而渴  
本方中加知母石膏一錢四分去附子  
葛根續命湯 治中風身熱有汗惡風  
本方中加葛根官桂茯苓各一錢半  
附子續命湯 治中風無汗身涼  
本方中加附子一倍乾薑一錢  
桂附續命湯 治中風有汗無熱  
本方中加桂附甘草各一倍  
羌活連翹續命湯 治中風肢節攣痛不仁



本方中加羌活連翹各一錢半  
省風湯

治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂一切風症  
可服

防風各三錢 天南星各三錢 半夏洗湯 黃芩各一錢

右咬咀作一服水二鐘生薑五片煎至一鐘不拘  
時服

獨活寄生湯

治風濕臥床不起七日見效

獨活 桑寄生如無以續 杜仲炒去 秦艽

牛膝酒浸 茯苓 川芎 人參 防風 細辛

桂心各二兩 芍藥 當歸 熟地黃各三兩

甘草錢五

右剉每一兩薑三片水二鐘煎至一鐘通口熱服  
每日一劑外用金鳳花柏子仁朴硝木瓜煎湯洗  
浴每日二三次

回風膏

治渾身手足風濕疼痛大有効驗

松香一斤 芥菜汁一大碗 木鱉子一兩 去殼



薑汁一大碗 葱汁一大碗 沒藥一兩 相油一兩

燒酒一大碗 乳香一兩 川山甲一兩 土

右木鱉沒乳川甲俱為末務要極細餘為汁務要  
濾淨先將松香入鍋煎化用細眼布慮入水中取  
起候用先將桐油入鍋次將燒酒分作三次俱在  
內每傾下時又凝成塊皆須待汁化勻然後傾下  
次將薑汁亦分作三次投下待勻又將葱汁分作  
三次投下待勻又將芫菜汁分作三次投下然後  
方下松香化開待勻將木鱉子川山甲入內用槐  
枝攪和滴水中有黃黑色成珠則膏成矣一法將

槐枝挑起膏于彈碎不粘于為度甚好即起鍋離  
火待溫和下乳香沒藥末亦以槐枝攪和傾入罐  
中放水以出火氣然後烘攤如要貼時先將生  
薑煨熱擦患處令熱貼之一說先將薑葱芫汁滾  
熬俟生水盡方入熬膏令不溢則膏可成矣  
通關散

治卒中風昏悶不醒牙關緊閉湯水不下

細辛洗去土葉 猪牙皂角去子各一錢

右為末每用女許吹入鼻中候噴涕服茶  
稀涎散



治中風四肢不收涎潮膈塞閉不通

光明晉礬一兩 猪牙皂角四箇肥實不

右為細末研勻每服半錢溫水調下涎自出

治中風

先以真正蘇合香丸薑汁調和灌省後用

白朮 天麻 當歸 川芎 薄桂枝 南星

陳皮

右各等分水二鐘煎七分加竹瀝一酒盞飲之則

漸舒矣

治中風不語惟五不治外雖危可救累效十無一

死治症口噤牙緊先將通關散吹入鼻中數次候

口開將不語散用熱童便調服嚥入口內效

通關散

遼細辛去土 猪牙皂角去核炙

藜蘆五錢生俱為末預備聽用

不語散

桔梗一兩半生半炒 柯子四十九箇半生半炮 粉草二錢半生半炙

右俱為細末煎熟用童便一大鐘每服七錢甚者

不過四服能言小兒減半服

治中風不語并痰厥先用



硃砂錢一 朴硝一分 川芎一分 朴硝錢一

共為末吹入鼻內口開又用硃砂一 吹入喉中吐痰即解

月溪云半身不遂大率多痰在左屬死血與無血在右屬痰屬氣虛見纂要知所屬施治易愈

治破傷

藜蘆一兩 甘草五錢

創

右大暑前創取藜蘆陰乾去鬚用防風燻水將藜蘆洗過用木甑蒸訖晒乾照前再洗再蒸再晒如此者三通剉碎用硃鍋炭火焙黃色同甘草搗為

細末收訖如遇有破傷凡者或牙關緊閉發搐不止大人秤三分用好黃酒半鐘調服如發搐重者秤四分小兒秤一分或一分半皆用好黃酒調服次項吐痰一碗或二碗許若發渴用米飲補之孕婦不可服服藥時封閉門窗服藥後忌食生冷三二日此藥甚効

菴菴丸

專治肝腎風氣四肢無力麻痺筋骨疼痛腰膝無力亦能行大腸氣又治二十五般風眼無不瘥常服此丸心効菴菴草處處有之用五月五六月六



九月九採葉洗淨用好酒拌蜜晒乾蒸拌九次碾末蜜丸梧子大用磁器裝盛每服四十九或五十丸每日空心用無灰好酒送下服此其効不可盡述

丹溪心法預防中風之說先服八風散○愈風湯○天麻丸更常服加減防風通聖散以預防之則風疾不作而獲安矣此論亦是仍以補氣養血為主

### 八風散

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚層癢癢癢

成瘡治寒塵不調鼻塞聲重

藿香 去土半斤

白芷

前胡

去芦各一斤

黃耆

去芦

甘草

人參

去芦各二斤

羌活

去芦

防風

去芦各三斤

右為末每服二錢水一盞入薄荷少許煎湯調下食後溫服茶清亦可

### 羌活愈風湯

治腎肝虛筋骨弱語言難神昏憤風濕內弱凡熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂大抵心勞則百病生心靜則萬病息此藥既安心養神調陰陽無偏勝



天麻丸

服臨睡渣再煎服

右作二服每服水二鐘生薑三片煎至一鐘空

生地黄	熟地黄	蒼木	錢各七	官桂	半錢
黃芩	甘菊花	薄荷	前胡	芍藥	白茯苓
半芩	厚朴	防己	芍藥	白茯苓	
杜仲	秦艽	當歸	獨活	白芷	
地骨皮	麻黃	柴胡	枸杞子		
蔓荊子	川芎	細辛	枳殼	知母	
羌活	甘草	防風	黃芪	人參	

草薺	天麻	牛膝	酒浸	玄參	各六兩	羌活	兩十
----	----	----	----	----	-----	----	----

杜仲	去皮剉碎	薑湯浸	一兩	當歸	酒浸	十兩
----	------	-----	----	----	----	----

生地黄	兩十六	大附子	臍去皮	一兩
-----	-----	-----	-----	----

右為末煉蜜為丸每服七十九加至百丸空心溫酒下或白湯此藥用牛膝草薺治筋骨杜仲使筋相助天麻防風除風當歸地黃養血和榮衛玄參主用附子佐行經絡

傷寒

傷寒論

風喜傷肝故風當自足少陽膽入之



寒喜傷腎故寒却自足太陽膀胱入之  
暑喜傷心包絡故暑當自手少陽三焦入之  
濕喜傷脾故濕當自足陽明胃入之  
熱喜傷心故熱自手太陽小腸入之  
燥喜傷肺故燥自手陽明大腸入之  
以上除暑熱一氣燥濕同源故不別論其風寒暑  
濕四者所傷者陰也以類推之而又謂當自陽入  
者何也凡病表先受之故經曰陰為之主陽與正  
別於陽者知病從來此之謂也夫傷寒自仲景而  
下著述紛然未有定論大率自霜降後至春分前

感寒而即發從足太陽膀胱鬱熱以次而傳陰經  
或太陽不傳陽明胃少陽膽而即傳少陰腎或不  
由陽經而直入陰經或二陽三陽同受而為合病  
或太陽膀胱陽明胃先後受而為併病或太陽膀胱  
與少陰腎陽明胃與太陰脾少陽膽與厥陰肝  
陰陽俱受而為兩感之類此皆感而即病仲景立  
法所治之傷寒也其不即病而寒毒藏於肌膚之  
間至春變而為溫夏變為暑或將發而復感暑寒  
此是不即發之溫病也暑熱病也若本無冬月所  
受之邪而春夏自感暑寒之類此皆後人通謂之



四時傷寒也若只外感而無內傷者用仲景法其  
本因飲食勞倦所傷然氣虛邪襲每感寒而顯表  
症此乃所謂挾內傷之傷寒也但傷寒挾內傷者  
十居八九經白邪之所凌其氣必虛補中益氣湯  
從六經所見之症加減用之

補中益氣湯  
黃耆勞役熱甚 炙甘草已上各 升麻三

人參三錢有 當歸身焙乾 橘皮不去白

柴胡三 白朮三

右咀水煎熱服

如見足太陽膀胱症頭項痛腰脊強無汗惡寒不

惡風加羌活藁本桂枝

如見足陽明胃症身熱目疼而鼻乾不得卧加乾

葛倍升麻

如見足少陽胆症胸脇痛耳聾加黃芩半夏川芎

倍柴胡

如見足太陰脾症腹滿噎乾加枳實厚朴

如見足少陰腎症口燥舌乾而渴不惡寒反惡熱

倦怠加生甘草桔梗

如見足厥陰肝症煩滿囊縮加川芎



如變証發斑加乾葛玄參倍升麻  
若內傷重外感輕以補養為主而兼發散  
若外感重內傷輕以發散為先而後補養  
劉草窓先生曰傷寒傳足經不傳手經蓋謂人身經  
絡上下手足走而不息豈有間斷其傳足不傳手  
者蓋足經所屬皆水土木如足太陽膀胱水足陽  
明胃土足少陽胆木足太陰脾土足少陰腎水足  
厥陰肝木是水遇寒則涸而冰木遇寒則葉落枝  
枯土遇寒則圻而不堅是皆不勝其寒也手經所  
屬皆金與火如手太陽小腸火手陽明大腸金手

少陰心火手少陽三焦火手太陰肺金手厥陰心  
包絡火是金遇寒則愈堅畏火不畏寒也火體極  
熱而寒不能襲由此觀之傷寒傳足不傳手之理  
極其明矣

治傷風傷風屬肺者多蓋以肺氣通於天風邪入  
於腠理鼻先受之肺主皮毛故也  
若頭痛發熱惡寒怕風宜用解散

防風 羌活 升麻 葛根 白芷 川芎

荆芥之類其中補藥痰茶隨症加減  
治飲食過傷又兼傷風用



白木 陳皮 山查 麦芽 青皮

枳實消導其裏 川芎 防風 羌活以解其表

治因起居不常房勞之後以致感傷必須補氣血為主用

人參 白木 川芎 當歸以補其裏 防風

羌活等藥以解其表

大羌活湯

解利而感傷寒經云而感不治然所稟有虛實所感有淺深若稟實而感淺者間亦可生治之而不救者有矣未有不治而生者用此十中或活一二

羌活半一錢 獨活 防己 黃芩 黃連

白木 川芎各一錢 細辛五分 生地黃

知母各二錢

右剉作一服水煎熱服

冬時即病傷寒仍用仲景法

麻黃湯

治太陽脉浮頭痛發熱惡寒身痛無汗而喘冬時即病宜服春分後忌之

麻黃半一兩 桂枝兩一 甘草錢五 杏仁枚五十

右剉每服五錢水煎溫服取汗出為度



桂枝湯

治太陽中風發熱汗出鼻鳴乾嘔冬時即病宜服  
春分後忌之

赤芍藥

桂枝各六錢

甘草四錢

右剉每服五錢加生薑三片棗二枚水煎溫服須  
臾啜稀粥助藥力以取微汗

若小便數及飲酒人不宜用飲酒人不喜甘草恐  
中滿而嘔

若春夏秋三時不分溫暑寒疫悉以九味羌活湯  
治之但有表証使與此藥無不愈者

九味羌活湯

治春分以後及夏秋代桂枝麻黃湯用

羌活

防風

蒼朮

各一分

甘草

白芷

川芎

生地黄

黃芩

各一錢

細辛

四分

右剉作一服加薑三片棗一枚水煎熱服覆取汗  
若一服不汗加紫蘇即汗若原有汗去蒼朮加白  
朮渴加知母石膏

若傷寒頭痛惡寒已除不惡寒而惡熱大便難方  
可擬下略帶表証用大柴胡

大柴胡湯



治內熱大便難身熱不惡寒反惡熱

柴胡二兩

黃芩七錢

芍藥三錢

半隻

六錢

枳實四枚

大黃五錢

右剉作三服每服加薑棗水煎溫服

若傷寒已無表証若痞而不便者用小承氣湯

小承氣湯

治六七日不大便作痞腹脹滿陽明胃無表症汗後不惡寒潮熱狂言而喘

大黃二兩

厚朴五錢

枳實六箇

右剉作一服水煎溫服以利為度未利再服

若邪在中焦作滿者用調胃承氣湯

調胃承氣湯

治大陽之明不惡寒反惡熱邪在中焦作滿大便秘譫語嘔噦

甘草五錢

大黃一兩

芒硝二合

右剉水先煎大黃甘草至七分去粗入硝煎一二沸溫服取利五錢作一服

若痞實滿燥者用大承氣湯

大承氣湯

治胃痞實滿燥譫語五六日不大便腹痛煩渴少



陰舌乾口燥

大黃五錢 厚朴一兩 枳實五箇 芒硝五錢

右水一鐘半先煎厚朴枳實至一鐘入大黃煎七分去粗入硝煎一二沸溫服以利為度未利再服

藿香正氣散

治外感發熱頭疼內因痰飲凝滯為熱或中脫痞滿嘔逆惡心又云治傷寒頭痛增寒壯熱

茯苓 白芷 大腹皮 紫蘇各一兩 陳皮

桔梗 白朮 厚朴 半夏 甘草各二兩

藿香三兩

右剉每服五錢薑三片棗一枚水煎熱服欲汗以被蓋之

十神湯

治時氣瘟疫兩感風寒

川芎 甘草 麻黃 紫蘇 白芷 升麻

陳皮 香附 芍藥各四錢 乾葛一兩四錢

右剉每服五錢或一兩薑三片水煎熱服欲汗以被蓋之

九味養活湯

治春分後傷寒代桂枝麻黃湯用冬月用之亦可



其餘春夏秋三時重則用此輕則用香蘇散

羌活 防風 蒼朮 各一分 甘草 白芷

川芎 生地黄 黃芩 各一錢 細辛 四分

右剉作一服加薑三片棗一枚水煎熱服覆取汗  
原有汗去蒼朮加白朮渴加知母石膏○羌活治  
太陽肢節痛大無不通小無不入乃撥亂反正之  
主也防風治一身盡痛聽君將命令而行隨所使  
引而至蒼朮雄壯上行之氣能除濕氣下安太陰  
使邪不傳脾經甘草緩裏急和諸藥白芷治陽明  
頭痛在額川芎治厥陰頭痛在腦生地黄治少陰

心熱在內黃芩治太陰肺熱在胸細辛女陰腎經

苦頭痛此方乃易老所製凡見表證悉宜服之不

犯三陽禁忌實解利之神藥也然以藥而類治諸證苟用其方而不知所以立方之意則未免有執一之弊故述各藥主治使學者詳而用之

### 六神通解散

主發表凡疫病初起用正氣散煎一大鍋每六人服

散服之皆有一服乃却疫捷法也

麻黃 石膏 滑石 黃芩 各二兩 仙朮 四兩

甘草 兩

右剉每服薑五片葱白五寸豉五十粒煎服用方



凡一兩半去麻黃或云  
秋冬去防風加麻黃

參蘇飲

治四時感冒發熱頭痛咳嗽或中脘痞滿嘔吐痰  
水寬中快膈不致傷脾一切發熱及內外所感皆  
能取效

人參錢三 蘇葉 桔梗 乾葛 前胡各四錢

陳皮 茯苓 枳殼羊三錢 木香羊一錢

甘草羊二錢 半隻錢四

右剉薑棗煎服○咳嗽加五味子杏仁○久咳者  
加桑白皮柴胡○鼻衄加麥門冬茅根烏梅○心

盛去木香加黃芩柴胡○嘔逆加破仁藿香○鼻  
衄出過多加和四物湯○頭痛加川芎細辛○脾  
泄加蓮肉黃耆白扁豆

香蘇散

治四時傷寒瘟疫頭痛寒熱往來及治內外兩感  
之證春月得病宜用此方

蘇葉錢四 香附子炒五錢 陳皮去白五錢 甘草錢一

右剉入薑棗葱煎熱服○潮熱加人參黃芩○發  
汗加蒼朮麻黃○咳嗽加桔梗五味子○頭痛加  
川芎細辛荆芥白芷○疹痘未成加升麻乾葛○



瘰癧加枳殼黃連去甘草○水瀉即脾泄加藿香  
肉豆蔻○惡寒潮熱加桂枝麻黃○身疼加赤芍  
藥官桂○心氣痛加玄胡索烏藥茴香○久瀉加  
木香訶子○瘰癧加枳殼草果○胸膈痞滿加枳  
實半夏○脾膝拘攣加木瓜枳殼牛膝羌活又名  
換蘇散○潮熱往來加和正氣散○嘔逆加丁香  
軍薑○腹痛加赤芍藥白朮

經驗對金飲子

治諸疾不問遠近無不愈者常服固元陽益氣健  
脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵及療

四時傷寒手足腰疼五勞七傷外感風寒內傷生  
冷不問三焦痞滿極有神効

厚朴 去皮薑汁炙 蒼朮 米泔水浸一宿 甘草 炙各一兩  
陳皮 去白炒令黃色半斤

右剉每服五錢薑棗煎服○有瘟疫時氣二毒傷  
寒頭疼加撫芎藭白芷煎服○五勞七傷有熱  
加黃芩柴胡○手足酸疼加烏梅枳殼○痰嗽發  
瘰癧加草果烏梅○冷熱氣痛加茴香木香○水氣  
腫滿加桑白皮木通○婦人赤白帶下加黃耆當  
歸○酒傷脾胃加丁香砂仁○傷食加良薑白豆



藜○四時瀉泄加 肉豆蔻藜訶子○風癢加荆芥北  
細辛○脚膝冷痛加牛膝乳香○腿痺加兔絲子  
羌活○渾身拘急有熱加地骨皮麥門冬○白痢  
加吳茱萸赤痢加黃連去甘草○頭風加藁朮白  
芷○有氣加茴香○氣塊加三稜莪朮○頭疼加  
茱萸軍薑○婦人腹痛加香附子烏藥○眼熱加  
大黃荊芥○冷淚加木賊夏枯草○腰痛加杜仲  
八角茴香

加減玄武湯

治傷寒數日未解六脉浮沉身疼頭痛惡寒潮熱

咳嗽痰喘遍身疼痛手足冷痺飲食少思大腑澀  
痢及治四時傷寒等症

白朮 芍藥各一錢 白茯苓七錢 甘草三錢

右到每服五錢用生薑五片煎服○頭疼加川芎  
細辛○泄瀉加木香藿香○咳嗽加五味子半夏  
遍身疼痛加官桂川芎○有痰加南星陳皮○水  
瀉加軍薑木香○四肢疼痛加附子名真武湯○  
心煩加人參麥門冬○熱未除加黃芩乾薑○三  
日無汗如憎寒惡熱加麻黃桂枝

生料五積散



治四時調中快氣化痰消宿食心腹痞滿嘔逆惡  
心外感風寒內傷生冷肩背拘急四肢浮腫寒熱  
往來腰膝疼痛及婦人難產經候不調或不通並  
皆治之

枳殼

麻黃

白芍藥

當歸

半芩

官桂

川芎

白芷

厚朴

乾薑

桔梗

蒼朮

茯苓

陳皮

甘草

半錢

右依此治療每服生薑七片煎至六分入水酒半  
盞溫服甚効○足浮腫加五加皮大腹皮○已成

風痺加羌活獨活防風○腰疼加桃仁麝香茴香

○小腸氣痛加茱萸茴香○手足攣拳加楨榔木

瓜牛膝○咳嗽加杏仁馬兜鈴桑白皮○遍身疼

痛加乳香沒藥北細辛○難產加麝香交桂即交趾桂

也○老人手足疼痛加和順元散○手足風緩加

和烏茶平氣散○四肢濕痺加烏茶順氣散因溫

所感加和換蘇散

### 消風百解散

治四時傷寒傷風頭痛項強壯熱惡寒身體煩痛  
四肢倦怠行步喘發及蹇壅咳嗽喘唾稠粘自汗



惡風並宜治之

荊芥 白芷

陳皮 蒼朮

麻黃 各二錢半

甘草 一錢二分

右用水二鐘生薑三片烏梅一枚煎溫服

小柴胡湯

治傷寒中風其病半在表半在裏筋脉拘急身體  
疼痛寒熱往來或嘔或嗽胸膈痞滿硬痛及汗後  
餘熱不解瘟疫雜病蒸熱并兩感可和解等症

柴胡 四兩

半夏 一兩二錢半製

黃芩 一兩半炒

人參 一兩

甘草 一兩

右剉如麻豆大每服五錢生薑四片棗一枚水一  
鐘半煎至八分去粗溫服日三服○腹中痛去黃  
芩加芍藥○心下悸小便不利者去黃芩加茯苓  
二兩○胸中煩不嘔者去半夏人參加枳實四  
分之二○渴者去半夏加人參枳實根二兩○脇  
下痞使去棗加牡蠣○不渴外有微熱者去人參  
加桂枝一兩半溫服微汗愈○咳嗽者去人參加  
五味子一兩二錢半乾薑一兩并去棗子生薑○  
寒熱往來經水不調去半夏加秦艽芍藥當歸知  
母地骨皮牡丹皮川芎白朮茯苓○婦人虛癆發



熱加羚羊赤茯苓○小柴胡湯與四物湯各半名  
調經湯無孕嘔者加半夏○無汗者加柴胡○惡  
寒者加官桂○有汗者加地骨皮○咳嗽者加紫  
苑○通經者加京三稜廣茂○癆者加鼈甲○婦  
人傷寒經水適來適斷發熱惡寒夜則譫語此為  
熱入血室故寒熱如瘧小柴胡湯主之○傷寒過  
經不解胸膈滿而嘔晡發潮熱加芒硝一兩  
不換金正氣散

治四時傷寒頭疼發熱惡寒身體痛潮熱往來咳嗽  
嘔痰逆嘔噦惡心及治山嵐瘴氣等症

蒼朮

半斤

陳皮

去白各五錢

藿香

二錢

甘草

三錢

半夏

泡洗七次三錢

厚朴

薑製四錢

右依此修合每服薑五片葱一根煎服○頭疼加  
川芎白芷○潮熱加黃芩前胡○口燥心煩加乾  
葛柴胡○冷瀉不止加木香訶子肉豆蔻○瘧疾  
加常山樛榔草果○咳嗽加杏仁五味子桔梗○  
喘急加麻黃蘇子桑白皮○身體疼痛加桂枝麻  
黃赤芍藥○感寒腹痛加軍薑官桂○嘔逆加丁  
香砂仁○足面脚浮腫加大腹皮木瓜五加皮○  
氣塊加枳殼樛榔茴香三稜○熱極大腑不通加



扑硝 大黃○腹脹加香附子枳殼白豆蔻○胸脇  
脹滿加枳實莪朮破仁○痢疾加黃連枳殼去甘草  
沖和靈寶飲

治兩感傷寒起於頭痛惡寒發熱口燥舌乾以陽  
先受病多者以此湯探之中病即愈

羌活 防風 川芎 生地黃 細辛 黃芩

柴胡 甘草 乾葛 白芷 石膏

右水二鍾煨生薑三片棗二枚入黑豆一撮煎溫  
服取微汗為愈

治傷寒傷風發汗散

生菜豆 一兩 去皮 麻黃 八錢 去節

右二味為極細末用無根水半茶鐘服之量人強  
弱為菜之多寡壯者一錢半次者一錢十歲以下  
服五六分不用蓋被其汗立出而效

又發汗方

麻黃 四兩 甘草 四兩 荆芥 四兩 菜豆粉 二兩 五錢

右為末服法同前

中暑

五苓散

治中暑煩渴身熱頭痛霍亂泄瀉小便赤少心神



恍惚

白木一兩

茯苓去皮 八錢

肉桂去皮 七錢

猪苓錢上

澤瀉錢八

右咬咀每服五錢水二鐘煎至八分食前服或為末每服二錢白湯調下本方除桂名四苓散倍加茵陳名茵陳五苓散一方加辰砂名辰砂五苓散一方加大黃治初痢亦治積聚食黃并酒疸量人虛實大黃多則三錢少則二錢須煎藥八分熟然後入之○陽毒加芍藥升麻去肉桂○狂言亂語加辰砂酸枣仁○頭疼目眩加川芎羌活○咳嗽加

五味子桔梗○心氣不定加人參麥門冬○痰多加半隻陳皮○喘急加烏塊苓桑白皮○大便不通加大黃朴硝○氣塊加三稜莪朮○心熱加黃芩蓮肉○身疼拘急加麻黃○口乾愛水加乾葛烏梅○眼黃酒疸及五疸加茵陳木通滑石○鼻衄如山梔子烏梅○五心熱如勞加桔梗柴胡○有痰有熱加桑白皮人參前胡○冰氣加甜葶藶木通平腎氣加吳茱萸枳殼○小腸氣加茴香木通○霍亂轉筋加藿香木瓜  
十味香薷飲



治一切暑熱腹痛霍亂吐利煩心等症

香薷兩 人參 陳皮 白茯苓 白朮

木瓜 白扁豆 厚朴 甘草各五錢 黃芪五錢

右剉每服四五錢水煎服一方止用香薷厚朴白

扁豆各香薷飲本方去扁豆加黃連各黃連香薷

飲然氣虛者不可過多蓋厚朴泄氣藥也

清暑益氣湯

黃芪一斤 蒼朮各半 升麻一錢 人參

白朮 陳皮 神麩炒 澤瀉各五 甘草炙

黃蘗酒浸 當歸 麥門冬 青皮 乾葛各二

五味子枚

右剉作一服水煎稍熱服

清氣飲

治夏月傷暑發汗大泄血氣刀脈虛細而遲此暑

傷元氣也

人參一錢 黃耆蜜炙一錢 麥門冬去心一錢 黃柏三分

黃連五分 白朮一分 白芍藥一錢 陳皮一錢

甘草五分 白茯苓一錢 香薷七分 知母七分

生薑三片水一盞半煎至七分食前溫服

香薷飲



夏暑在途常服壯元氣清熱驅暑免中暑霍亂瀉痢等症

人參 二錢

麥門冬 一錢

五味子 十粒

白朮 一錢

白芍藥 一錢

甘草 五分

知母 七分

白茯苓 一錢

黃芩 三分

陳皮 七分

香薷 七分

生薑二片 水一盞 半煎至七分 食前溫服

益元散 一名六一散

治中暑身熱小便不利燥濕分水道實大腑化食毒行積滯逐凝血解煩渴補脾胃降妄行火之要

茶也

滑石 六兩

甘草 一兩

右末和勻每服三五錢新汲水調

白虎湯

治暑熱發渴或身熱頭疼燥亂不寧熱傷肉分

如針刺解毒加柴胡

石膏

用軟脆有紋理而細者五錢研

知母 二錢

甘草 一錢

右剉作一服入粳米一撮水煎加人參一錢半名

人參白虎湯

桂苓甘露飲



治伏暑引飲過多肚腹膨脹霍亂瀉痢並皆治之

白朮 猪苓皮去 白茯苓皮去 滑石研各一兩

甘草炙 寒水石研 澤瀉各一兩 肉桂去皮五錢

石為末每服三錢熱湯或冷水調下不拘時入蜜

少許

清熱解暑湯

天門冬 當歸 麥門冬 白朮 知母

白芍藥 香薷 白茯苓 陳皮 黃連

黃芩以上各一錢 人參 甘草以上各五分

石用薑三片水一盞半煎至七分服渣再煎

治夏秋暑熱過食冷物茶水以傷其內坐過涼處

風傷其外致惡寒發熱胸膈飽悶飲食不進或吐

瀉此內外俱傷寒冷也

白朮一錢 人參 乾薑炒 厚朴 陳皮

羌活 枳實 白茯苓各一錢 炙甘草五分

石作一服加薑三片水煎

若暑月避暑深堂涼臺過受寒涼其病必頭痛惡

寒形拘肢痛心煩肌熱無汗此為陰寒所遏周身

陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒

厚朴 紫蘇 乾葛 藿香 羌活



蒼朮之類

如肉復傷生冷再加乾薑縮破神麴煎服

中濕

經曰因於濕首如裹又云地之濕氣感則害人皮  
肉筋脉又曰諸濕腫滿皆屬脾土蓋首為諸陽之  
會位高氣清為濕氣蒸蒸而沉重似有物以蒙之  
也失而不治則鬱而為熱之傷血不能養筋故大  
筋緩短而為拘攣濕傷筋不能束骨故小筋弛長  
而為痿弱矣

賈氏曰濕為土氣火熱能生濕土故夏熱而萬物

濕潤濕病本不自生因熱而怫鬱不能宣行故停  
滯而生濕也治濕之法宜理脾胃清熱利小便為  
上故曰治濕不利小便非其治也蓋濕病有二○  
濕熱證多○濕寒證少○當以脉證辨之如脉洪  
數小便赤澀引飲身熱為濕熱證若小便自利清  
白大便瀉利身疼不熱自汗為寒濕證宜五苓加  
生附蒼朮木瓜治之

濕勝一身甚痛發熱身黃小便不利大便反快五  
苓加茵陳臙脂蘆自利蒼朮湯治寒濕所客身體  
沉重腫痛面色痿黃加升麻



治患濕氣背間身體如負二百斤之重茯苓白木

茯苓 白木 乾薑 甘草 去桂心

加澤瀉 猪苓 酒黃芩 木通 蒼朮 服之

治患濕氣兩膀疼痛小便不利當歸粘痛湯加

滑石 木通 燈心 澤瀉 猪苓

治患濕氣膝脚攣拳身不直當歸粘痛湯加

杜仲 黃柏 川芎 白木 甘草

枳殼 而愈 貼

治患濕氣四肢疼痛兩足難移補中益氣湯

川牛膝 黃柏 知母 五味子 杜仲

治濕方

治傷食成濕熱黃疸 張曉川方 効

陳皮 半隻 茯苓 甘草 七分

白木 錢二 黃連 錢四 山查 錢一 紫蘇 錢一

瓜蒌仁 錢一 天花粉 錢一 蘿蔔子 錢一

右吹咀入生薑水煎服之

羌活勝濕湯

治肩背痛不可回顧手太陽氣鬱而不行以風茶

散之脊背項強腰似折項以按足太陽經膀胱症



木通 羌活 獨活 各一錢 藁本 防風 各一錢

甘草 炙 川芎 各五錢 蔓荊子 各三錢

身如重腰沉此經中有寒濕也加防已輕用附子  
重用桂枝水煎服

清燥湯

六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱  
相合而刑庚大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之  
邪寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰  
以下痿軟癱瘓不能行走不正兩足欹側以此藥  
主之

蒼朮 錢半 五加皮 十四 黃連 綿黃耆

白朮 橘皮 白茯苓 當歸 人參

生地黄 各七 麥門冬 神麴 炒 猪苓

黃柏 酒炒 甘草 澤瀉 各半 柴胡

升麻 各三

作一服水二鐘煎至一鐘食前服

桂苓甘露飲

治濕熱內甚煩渴而瀉小便澀大便急痛霍亂吐  
下頭痛口乾 方見暑門

獨活寄生湯



腎

治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或攣拳制手痛不可伸屈或緩弱冷痺行步無力並治之

獨活兩三 細辛 桂心不見 川芎 防風去

牛膝浸酒 人參 秦艽去土 白芍藥 熟地黄

當歸 杜仲炒去絲 甘草炙 茯苓

桑寄生如無以續斷代之各三兩

每服水一鐘煎空心服

當歸枯痛湯

治濕熱為病肢體煩痛肩背沉重胸膈不利下注於脛腫痛不可忍者

甘草 茵陳葉浸酒 羌活各半 防風

知母洗酒 猪苓去皮 澤瀉 當歸身各三兩

茯苓三錢 升麻 蒼朮米泔水 葛根各二錢

黃芩二錢 白朮一錢半 苦參二錢 人參二錢

每服用水二鐘半先以水拌濕候少時煎至一鐘食前溫服待少時美膳壓之

調衛湯

治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

蘇木 紅花各一分 猪苓二分 麥門冬三分

生地黃三分 半夏湯洗七次 生黃芩 生甘草



當歸梢 各七

羌活 分七

麻黃根

黃耆 各一錢

五味子 七枚

右艾咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去粗  
稍熱服中風證必多汗汗多不得重發汗故禁麻  
黃而用根節也

二妙散

治筋骨疼痛因濕者亦治脚氣有效

黃柏炒

蒼朮

米泔浸炒

右為末沸湯入薑汁調服二味皆雄壯之氣表實  
氣實者加酒七許佐之有氣虛加補氣藥血虛加

黃

補血藥痛其者加生薑汁熱服之一潛行散黃柏  
酒浸為末入湯茶調服

羌活勝濕湯

治背惡寒雖盛暑亦欲著綿人之背屬陽濕中太  
陽久而熱乃火也火起而痰隨之滲入於骨蒸以  
飲酒酒乃濕熱之物與病湊合濕痰結聚外雖惡  
寒其中濕熱也先燥濕次降火病則除矣內多太  
陽引經之劑且能勝濕

羌活 一錢

獨活 一錢

炙甘草

炙川芎



