

三稜煎

治血癥血瘕食積瘀滯

三稜

醋浸

莪术

製全上各三兩

青皮去白

半夏

麥芽

炒各一兩

右用好醋一鍾煮乾焙為末

醋糊丸梧子大每服三四十九淡醋湯下

痰積生姜湯下

○脬轉小便不利

婦人脬轉或內熱傳搏於脬或忍小便氣逆於內以致小腹急痛不得小便甚者至死

薛氏曰前症不問男女孕婦轉筋小便不利命在

反掌非八味丸不能救

一婦因鬱怒小便滴瀝漸至小腹腫脹痰咳喘促用八味丸料煎服小便即利而痊

葱白湯

治氣滯小便不通腹脹欲死

陳皮

三兩

葵子

一兩

葱白

一握

水煎分三服

八味丸

治轉脬小便不通殊有神効但世所用以致悞人方見虛損

滑石散

脬轉數日不通

滑石

一兩

寒水石

二兩

葵子

一合

右研以水

一斗煮至五升每服一升即通利

又方 亂髮 煙 蒜子 車前子 各等分酒

調下二錢

強忍小便致脬轉尿不利困篤欲死

滑石 二兩 髮灰 一兩 為末每服三錢桃白皮
一觔細切搗熟入水三盞絞取汁調服
千金翼用杏仁去皮尖二十枚麸皮炒黃嚼細水
送下立通

一方 皂角為末咬鼻內取嚏

石蓴湯 治脬轉小便不通及小便實熱氣滯

淋瀝

石蓴 黃芩 炒木通 萍子 榆白皮 瞿麥
甘草各五分 加生姜水煎服

○小便數

薛氏曰小便數頻若肝經火動用逍遙散加龍膽

草車前子

膀胱火動亦味地黃丸加麥門冬五味子

肝腎溫熱龍膽鴻肝湯 驚傷肝脾加味逍遙散

加味歸脾湯 脾肺氣虛補中益氣 加麥冬五味
肝經血虛加味逍遙散 腎氣虛敗鹿茸散

如不應用六味丸

桑螵蛸散 治腎氣虛寒小便數少或時頻數或夜間丸數

桑螵蛸炒三枚 鹿茸炙 牡蛎煅 炙甘草

灸黃蓍 右為末每服二三錢食前空心用姜湯調下日二服

縮泉丸 治脬氣虛寒小便頻數或遺尿不往

小兒丸效

烏藥 益智仁

各等分為末酒煮山藥糊為丸

鹿茸散

治腎氣虛寒便溺數甚或夜間頻數

九梧子大

每服七十丸鹽酒或米飲下

遺溺

鹿茸炙

烏賊魚骨

桑寄生

川歸

龍骨煅各二兩 白芍炒

附子炮各三錢

桑螵蛸炙五錢

右為末每服二錢空心并食

前溫酒調下作丸亦可

○遺尿失禁

附小便出尿名交腸病也

內經曰胞移熱於膀胱則癃溺血膀胱不利為癃
不約為遺溺註云膀胱為津液之府水注由之
然既三焦脉實約下焦而不通則不得小便足
三焦脉虛不約下焦則遺溺也靈樞曰足三焦
者太陽之別也並太陽之正入絡膀胱約下焦
實則閉癃虛則遺溺

良方曰此乃心腎之氣失其常度故有便道澁而
遺者有失禁而不知自遺者亦有傷產傷膀胱
不時而遺者有脬寒臟冷而不自知者

薛氏曰設肝腎虛熱延孔瘻漏用六味丸如不應
用加減八味丸陽氣虛愆膀胱積冷用鹿茸丸
如不應用八味丸若肺氣虛弱不能禁止用補
中益氣湯加山藥山茱萸五味子肺氣虛寒前
湯加桂附溫症屬虛熱者多真寒者少治宜審
察

千婦小便自遺或時不利日晡益甚以肝熱陰挺
不能約制用六味丸料加白朮黃柏酒炒黑
分知母五分數劑諸症悉愈若寒用分利之藥
七

愈損真陰必致不起

二老婦患前症，惡寒、脉倦、四肢逆冷。余以為陽氣虛寒，用補中益氣湯加附，三劑不應，遂以參附湯四劑，稍應。仍以前藥而安。附子計用四枚，人參三觔許。

一婦病愈後，小便出屎，此陰陽失於傳送，名曰小腸交也。先用五苓散二劑而愈。又用補中益氣湯而安。

鹿茸丸 治陽氣虛，小便白濁滑數，不禁，或臍

腹陰冷，大便不實。

鹿茸

炙

椒紅

炮

牡蛎

煅

桂心

炒

石斛

炒

附子

炮

多

沉香

各一兩

桑螵蛸

炙主

右為末，酒糊丸，梧子大，每服三十丸，空心溫酒下。

秘元丹

治陽氣虛，小便不禁，或夜多，小便頻

數

白龍骨

煅

三

訶子

去核

十枚

砂仁

一

兩

右為末，糯米粥丸，梧子大，空心益湯下。五十丸。

酒亦可

又方 鹿角鏗屑炒為末每服三五錢空心熟酒調下

又方 雞腔脰炙為末每服二三錢空心食前酒調下日三次

又方 桑螵蛸酒炒為末每服一錢空心姜湯調下

大宮詹少溪吳馭閣校

終

赤水玄珠婦人門二十六卷目錄

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



小便出血	陰腫
陰瘡	陰挺下脫
胎前惡阻痰逆	交接輸血出痛
胎漏下血	胎動不安
妊娠心腹痛	胎氣上逼
妊娠小腹痛	妊娠腰背痛
妊娠數墮胎	妊娠心腹脹滿
胎不長	

婦人全書

卷之二

目錄

墮胎血下不止

未足月欲產

過期不產

妊娠欬嗽

妊娠吐血衄血

終

婦人全書卷之二

新安生生子孫一奎著輯

○小便出血

良方曰心主於血，通行經絡，循環臟府。得寒則凝，溢得熱則妄行。失其常道，則溢滲於脬，則小便出血也。

薛氏曰：前症肝經血熱者，加味逍遙散、怒氣血傷者，同治調送血餘灰妙；若肝經風熱，用前散送子芩丸；氣血俱虛者，八珍散送血餘灰膏，梁積

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

熱者清胃散加槐花甘草風熱傷胃者四君子加防風枳壳胃虛不能攝血者補中益氣劑結傷脾不能攝血者濟生歸脾湯

十婦小便出血服四物蒲黃之類更加發熱吐痰加芩蓮之類又飲食少思虛症婦起肝脉弦而數脾胃弦而緩此因肝經風熱為沉陰之劑脾傷不能統血發生諸臟而然也用補中益氣六味地黃丸而痊

蒲黃鹿茸散 治勞損尿血發熱內熱或寒熱往

來口乾作渴

蒲黃炒

鹿茸炙

當歸

生地

葵子炒

續斷酒炒各為末每服二錢酒調日三服

髮灰散

起居所傷小便尿血或忍尿脬轉脅下急痛小便不通又治肺疽心効內崩吐血舌

上出血俱妙本草云能療瘀血通閨膈利水瘡瘍膀胱通大小便止咳嗽鼻衄右每服二錢米醋湯調下

生地黃散 血熱尿血

生地

黃芩

炒五錢

阿膠炒

側柏葉

炒各一錢

右水煎食前服

當歸散 血分熱尿血

全經

川歸

羚羊角屑

赤芍各五

刺薊葉一錢

生地

一錢右水煎服

又方

治血

分有熱生地黃搗汁每用一

小盞三服日

又方

治血

分熱尿血用炒蒲黃末每以

二錢酒下

鹿角膠散

鹿角膠炒為末

二兩作二服長流水

調妙

○陰腫

良方曰陰腫曰胞絡素虛風邪客之乘于陰部血氣相搏故也

薛氏曰氣血虛弱補中益氣湯肝經濕熱龍胆鴻

肝湯又當與陰痒陰挺陰冷相參而治

又云一婦陰中腫悶小便澀滯兩脇作脹內熱晡
熱月經不調時或寒熱此曰肝經鬱怒元氣下
陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結
補脾氣升元氣夕用加味逍遙散清肝火生肺
血除濕熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸丹

皮調補肝脾而經水如期

菖蒲散

治月水澁滯陰戶腫痛

菖蒲

當歸

炒各一兩

秦艽

二兩

右每服五錢入葱白水煎服

白礬散

治陰腫堅痛

白礬

五錢

甘草

五分

大黃

一兩

右為末水調如東大綿裹內陰中一日兩換

以愈為度

○陰痒

良方曰：陰痒為三虫在腸胃之間，因臟虛而餓輕則陰中痒甚，則陰中痛也。

生生子曰：前症亦有虛者，古人有用竹參一兩煎湯服之而愈。予曾治一宦婦年廿一，疹出未彌月而犯房事，熱目下陷，陰中痒甚，每一發神魂颺然，兩手抓壁，口中咬物，鮮血淋漓，皮脫肉破而不遑顧。七日肌肉如削，諸洗挿方歷試無功，作丸治尤劇，欲懸深求死，予為籌之，乃虛熱陷入至阴，當從阴引阳，以黃芪六錢甘草二錢防

風一錢柴胡二錢水煎食前服之其疾頓止此引金伐木之法也

薛氏曰前症屬肝經所化當用龍胆鴻肝湯逍遙散以主其內外以茺仁研膏和雄黃末或鷄肝內陰中以制其虫

一婦胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢體倦急陰中悶痒小便赤澁此鬱怒傷肝脾所致用歸脾湯加山梔而愈復因怒患處并小腹脹痛用小柴胡加芎帰山梔芍藥痛止用山梔入逍遙散

而瘡又因勞役患處腫脹小便仍澁用補中益氣加山梔茯苓丹皮而瘳

一方 新茺葉搗綿裹內陰中一日三易

大黃散 治陰痒

大黃炒微 黃芩 黃芪炙各五兩 赤芍 玄參

蛇床子 山茱萸 為末酒調服二錢

又方 杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之

又詩曰 玉戶生瘡時痛痒皆因房色損其元黃葱水洗二三次杏仁燒灰油調痊加麝香尤妙

又方 鯽魚胆搽之妙

○陰挺下脫

良方曰婦人陰挺下脫或曰絕絡傷損或曰子臟虛冷或曰分娩用力所致

薛氏曰前症當升補元氣為主若肝脾鬱結氣虛下陷共用補中益氣湯若肝火溫熱小便澀滯龍膽鴻肝湯

一婦陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕

熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清脾火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生豬脂和藜芻末塗之而收

一婦陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便澀滯夕與龍膽鴻肝湯分利溫熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加山梔茯苓川芎黃柏間服調理而愈後因勞後或怒氣下部湿痒小水不利仍用前藥即愈

一方 治陰挺下脫入當歸 黃芩各二兩 杜鵑半兩
蠅皮一兩 赤芍半兩 右為末每以二錢食前溫
酒調下米飲亦可

治陰挺長出玉戶數寸者疼痛不可忍飲食不進
用前方治其內仍以 大黃 山慈姑 百羔
牡蠣 乳香 為細末水調揣熟捏作條子如
中指大陰乾挿入玉戶其痛即止

○陰瘡

薛氏曰此症乃七情鬱火傷損肝脾溫熱下流其

外症陰中突出如蛇如菌如鷄冠或生虫溫痒
或潰爛出水或腫悶墜痛其內症体倦內熱經
候不調或飲食無味晡熱發熱或胸脇不利小
便痞脹或赤白帶下小水淋漓其治法腫痛者
四物加柴胡丹皮山梔胆草濕痒者帰脾湯加
柴胡山梔丹皮淋漓者龍膽瀉肝湯加白朮丹
皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜痛者補中
益氣湯加山梔丹皮佐以外治之法

一婦素性急陰內痛小便赤瀦怒而益甚或發熱

或寒熱此肝經溫熱所致用芎歸炒梔柴胡芩
木丹皮澤鴻炒芍草前炒連甘草數劑漸愈乃
去黃連澤鴻又數劑全愈

一婦腰腹上下并玉戶遍生濕瘡狀如馬疚瘡他
處並無熱痒而痛太小便濁出黃汁食減身面
微腫衆作惡瘡治反劇愈痛急令洗去乃用馬
齒莧四兩青黛一兩同搗爛敷瘡上即時痒止
痛定而熱亦退仍服八政散日三服分散客熱
每敷藥僅得一時久藥已乾燥再塗新濕藥又

安凡如此二日僅減三分之一五日減三分之二自
此二十日全安緣此婦嗜酒貪嘴魚蟹發風
之物而中下焦蓄風熱之毒氣當作腸瘻內痔
等疾后當禁酒及發毒之物

一方 治玉戶生瘡 杏仁燒存性雄黃 明瓦金錢
麝香二分 右為末敷之

又方 飛丹研極細生桐油調搽二三日效

○交接輒血出痛

薛氏曰一婦每交接便血出作痛此肝火動脾而

不能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈若
出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

千金方 療交接血出 伏龍肝 桂心 分

為末每服一錢酒調下

○胎前惡阻及痰逆不食

惡阻者謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也脉息和順但竟肢體沉重頭目昏眩好食鹹酸甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水不能支持古謂之子病由胃氣怯弱中脘停痰之所致也

薛氏曰脾胃虛弱嘔吐不食用茯苓半夏湯蓋半夏乃健脾化痰滯之主藥也痰涎壅滯飲食少思胎氣不安為必用之藥湏倍加白术然半夏白术陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃也予嘗用之驗甚若兼氣惱更加柴胡因風寒湏用參蘇生生子曰前症亦有因火者故丹溪用抑青丸前人亦有用濟生竹茹湯者予歷見火症者多寒者間而有之亦有愈治而愈逆者便當勿棄待之俟胃氣和當自瘳矣

茯苓半夏湯

姪娠脾

胃虛弱飲食不化嘔吐

正不

半夏

泡炒黃

陳皮各一錢

白茯苓二錢

砂仁炒一錢

茯苓丸

姪娠煩悶頭暈食吐逆或胸腹痞悶

茯苓丸

姪娠煩悶頭暈食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓

人參桂心炮姜半夏

泡炒黃

橘紅各一兩

白术炒葛根甘草炙枳壳

麸炒各二兩

右蜜丸

梧子大每服五十丸米飲下日三服

白术湯

胃虛惡阻吐水甚至十餘日粥湯不

白术炒一錢

人參五分

丁香

炙甘草各二分

右姜水煎服

保生湯

姪娠惡阻少食嘔吐或兼吐嚦作渴

人參一錢

炙甘草

白术炒

香附

烏梅

橘紅各五分

右姜水煎服

仲景乾姜人參半夏丸

治姪娠嘔吐不止

乾姜人參半夏

半夏等分

為末姜汁糊丸梧子

大米飲下十月三服

歸原散

惡阻嘔吐不止頭痛全不入食諸藥無效

人參

甘草

川芎

當歸

芍藥

丁香各一錢

茯苓

白术

陳皮各一
兩半

桔梗炒
枳壳各三
兩半

半夏

泡炒黃
一兩

右每服五錢加
姜六片東一枚

竹茹湯

惡阻嘔吐不下食
青竹茹

橘紅各三
兩

生姜

茯苓各四
半夏五
兩

右水六升煮取
二升半分三服

人參橘皮湯

惡阻嘔吐痰水

人參 橘皮

白术

麥冬各一
兩

甘草

三錢

厚朴制

白茯苓各五
錢

右每服五錢加
青竹茹一錢生
姜三片水

煎服

妊娠嘔吐痰水不食

生芦根一
兩

橘紅七
錢

生姜

一
兩

枳榔錢

右作三次水煎服

妊娠惡食心中煩憊熱悶嘔吐

竹茹

麥冬各三
兩

前胡

二
兩

橘紅一
兩

芦根一
握

水一大升煮半

升作

二次食前服

已上四方治熱痰之劑也

羅太無半夏茯苓湯

惡阻心中憊悶頭目眩暉

四肢怠倦百節頑痛胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞

食氣好噉酸鹹多卧少起全不進食先服此湯

次服前茯苓丸

半夏泡炒黃一
兩二錢

赤茯苓

熟地黃各七錢半

芍藥

旋覆花千金方無此而有細辛紫蘇

甘草

各五錢

橘紅各半兩

人參

川芎

桔梗

甘草

右每服五錢姜七片水煎空心服○若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半若腹冷下利去地黃加炒桂心五錢○若胃中虛熱大使秘小便赤澑加大黃七錢半去地黃加黃芩二錢半

○胎動不安

妊娠胎動或飲食起居不節或衝住經虛或因過

酒房室擊觸跌撲損動臟府或脾氣虛弱誤服藥餌或感冒風寒當各推其因而施治之有母病而胎動者但治其母而胎自安有胎不堅固動及母疾但安其胎而母自愈面赤舌青其胎已死面青舌赤吐沫其母必死唇口色青而邊沫出子母俱死也

薛氏曰前証胎氣鬱滯者紫蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加紫蘇枳壳鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔鬱怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者

加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝
腐化之

丹溪曰產前當清熱養血，因火動胎逆上喘急者以條芩香附之類為末調下。墮胎乃氣虛血虛血熱所致懷姪嗜物乃一臟之虛黃芩安胎妙藥乃上中二焦之前能降火下行加白朮為安胎聖藥也俗不知以為寒而不取用殊不知產前宜清熱令血循經而不妄行故能養胎又曰將臨月胎熱以三補丸加炒香附白芍餅餅

為丸服抑熱以三補丸以地黃膏為丸○孕至八九個月必用順氣湏枳壳紫蘇梗

固胎方法

川芎

地黃

黃芩

各五分

歸身

人参

白芍

陳皮各

錢

白朮一錢

甘草三分

黃柏

黃連

俱少許

桑寄生

一錢

右每服五六錢

加糯米五十粒水煎服

血虛不安者

加阿膠

腹痛者加砂仁能止痛安胎行氣故也

無黃方

仲景云妊娠宜常服

當歸散

當歸

黃芩

孕九

連名固

芍藥 芎芻各一
白术半斤 右為末酒調服方
寸七日二服常服之即易產胎無苦疾產後百
病悉主之

肘後方 治胎動不安 取苧根如足大指者一
尺水煎服一方有生姜五片。丹溪云苧
立効散 治胎動不安如重物所墜冷如冰即佛手
縮砂散 治胎動不安墮在湏更痛不可忍神效
砂仁連壳炒黑為末 每服二錢酒下
釣藤湯 嫦娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者

釣藤鈎 當歸 茯神去木 人參各一錢 苦梗半錢
桑寄生一錢 右水煎服煩熱者加石膏
黃芪湯 氣虛胎動腹痛下水水 糯米合炙黃芪
川芎各兩 水煎分三服
順氣飲子 產前服之安胎 紫蘇葉 木香煨
人參 草豆蔻 茯苓各一錢 炙甘草五錢
大腹子一兩氣虛者去之 右每服三五錢加苧根三
寸糯米三十粒水煎服
安胎寄生湯 嫦娠下血或胎不安或腰腹痛

桑寄生

白朮各五分

茯苓四分

甘草一錢水煎服

安胎飲

寐倦惡食或胎動腹痛或下血發熱

腰痛

炙甘草

茯苓川歸熟地

川芎白朮

黃芪

白芍炒半夏泡

阿膠炒地榆各五分

加姜棗水煎服

又方

好銀煮取水入葱白作羹食之妙

生生子曰按良方云姪娘婦人倘氣血虛弱無以滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍若胃氣壯實衝任榮和如魚之處淵得其所也宜必

盡方技以補養之庶無所悞設曰病而胎不能安者不得不下之藥劑亦須謹慎

桂心散

姪娘目病而胎不能安者以此下之

桂心瓜萎牛膝蘿麥各五分歸尾一錢
右水煎服

又方牛膝一兩酒煎食前空心服下

又方生鷄子一枚鹽三錢撓匀服之立下

佛手散更妙凡胎死者即下生者即安

○胎漏下血附卒然下血下如葷汁

良方曰：妊娠經水時，由衝任氣虛，不能約制，蓋心小腸二經相為表裏，上為乳汁，下為月水。故妊娠經水壅以養胎，蓄之以為乳。若經水時，下名曰胞漏，血盡則胞矣。

丹溪曰：胎漏有曰氣虛者，有曰血虛者，有曰血熱者，不可不察也。

華氏曰：前症有風熱者，以防風黃芩丸。若曰益熱加味逍遙散，血虛二黃散，血去太多，八珍湯。朱應補中益氣湯。若曰肝火，用柴胡山梔散，脾虛養胎之外，而有餘者不必服藥。

加味歸脾湯。若曰事下血，作痛，八珍湯。加阿膠、熟艾、脾腃虛者，補中益氣湯。加五味子，下陷者倍，并麻柴胡，補熱內熱，用逍遙散。亦有血氣感養胎之外，而有餘者不必服藥。

卒然下血，良方謂冷熱不調，七情失宜，氣血不和所致。若傷於胎，則痛血去多，則墮矣。薛氏云：前症氣怒者，小柴胡湯風熱用，一味防風丸。血熱用一味子芩丸。脾氣虛六君子湯。中氣下陷，補中益氣湯。

丁婦妊娠六月每怒下血甚至寒熱頭痛脹腹
痛作嘔少食子謂寒熱頭痛乃肝火上冲脅張
腹痛乃肝氣不行作嘔食少乃肝侮脾胃下血
乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓
白朮而愈。訶子能止胎漏及胎動欲生脹悶
氣喘。

安胎散 治卒然腰痛下血

熟地 艾葉 白芍 炒川芎 黃芪 炒川歸
阿膠 炒甘草炙地榆各五分 加姜棗水煎服

子芩丸 治肝經有熱妄行用細条芩沉實者炒
為末每服一錢以鉄秤鎗燒赤淬酒熱調服若
脾胃虛者不宜用

防風丸 治肝經有風血曰妄動而不歸經
防風為末每服一錢白湯調下

防風黃芩丸 治肝經有風熱致血崩便血尿血
用條芩炒焦防風等分為末酒糊丸梧子大每
服三五十丸食前米飲或酒下

二黃散 治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈

煩躁作渴或脇肋脹痛等症

生地

熟地

為末每用三錢煎

白朮枳壳湯

調服

度不枯槁而有力也

芎歸膠艾湯

妊娠下血

腹中痛為胞阻以此安

艾葉

阿膠

炒川芎

當歸

各三兩

甘草

一兩

右細切以水八升煎取三升內膠溶盡分三服

立聖散

治姪姪下血不止

阿膠散

姪姪無故下血不止

鷄肝三枚用酒一升煮熟頓食之大効

阿膠三兩炒為末酒一升半煎令溶一服愈

又方 治血熱下血及胎漏下血不止

阿膠二兩為末

生地黃半斤

搗取汁以清酒

三升絞汁分三服

又方 治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

生地黃汁一升

陳酒合

金

煎三五沸溫三服以止度

枳壳湯

治虛熱胎漏下血或回事下血

枳壳

黃芩

各半兩

白朮

一兩

水煎食前分三服

本事方

治胎下血不止

菟奴菟樹上乾不落菟子是也燒存性為末水調服妙

姪娠胎漏下黃汁或如荳汁白漿或如赤荳汁予歷見此症不早治其胎必墮

大方 治姪娠忽然下黃汁如膠或如荳汁胎動腹痛乃氣虛也

糯米升五 黃芪兩六 水七升煎取二升分四服

薛氏云若肝脾溫熱用升陽除濕湯肝脾風熱加味逍遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯脾胃氣虛用

錢氏白朮散若脾氣下陷補中益氣湯風入腸

胃用胃風湯

東垣升陽除濕湯治婦人女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食失節或勞傷形躰或素患心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其脉緩而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡 羌活 蒼朮 黃蓍

炒各半錢

防風 升麻

甘草炙藁本各半錢

蔓荆子各半錢

獨活

當帰各五分

右水煎食前服

胃風湯 治風邪乘虛客於腸胃水谷不化泄瀉
下注腹脹虛滿腸鳴作痛及腸胃虛熱下如
荳汁或瘀血日夜無度

人參 白朮 茯苓 川芎 川歸 白芍
桂皮 粟米 右水煎食遠服
銀亭酒 治妊娠下黃汁或如赤荳沙
苧根皮去黑 好銀各一 水九升煮取四升每服入
酒半升煎分二服

脉經曰婦人懷軀六月七月暴下共 斗餘水其胎必

倚而墮此非時孤漿預下也胎漏下水乃徐徐而下今暴下而多
○胎上逼子懸

妊娠將至如法則血氣調和胎得其所而產亦易
否則胎動氣逆上逼臨產亦唯甚至危矣

陳良甫云治一婦人有孕七個月遠歸忽然胎上
冲心而痛坐卧不安兩醫治之無効遂說胎已
死矣用草麻子研爛加射香貼脐中以下之命
在垂亡名陳胗視兩尺脉絕他脉平和陳問二

故知胎墮

家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

醫作何症治答曰死胎也陳曰何以知之曰兩尺脉絕是以知之陳曰否此子懸也若是胎死却有辯處面赤舌青子死母活面青舌赤時沫母死子活唇白俱青母子俱死今面不赤舌不青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲治之至十服其胎遂不逼而下安矣

紫蘇飲 治姪娠胎氣不和逼上脹滿疼痛謂子懸兼治臨產驚恐氣結連日不下

紫蘇葉一
大腹皮 人參 川芎 陳皮

白芍

各五錢

當歸

三錢

甘草

一錢

右剉分三服

每服加姜四片葱白七寸水煎至七分空心服○曾有累自產不下遍服催生藥不効此必半草少早心存一點畏惧氣結而不行非不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯則上焦閉則氣還則下焦脹氣乃不行得此藥一服便產及治姪娠六七月子懸每用此數服有驗不十服胎便近下而安

大方 治胎上逼煩悶併治胎動因篤

葱白二十七莖濃煮汁飲之若胎未死則安已死

即下如未効再服○若唇口青黑手足厥冷

湏佐以當歸湯本草云葱白通陽氣安胎此方神妙脉浮滑者宜之

當歸湯治胎動煩躁或生理不順唇口青黑手

足厥冷人參當歸

阿膠炒炙甘草各一錢

葱根連白

一握右水四碗煎四味減半去渣入葱

再煎至二碗分二服

薛氏云一姪婦每曰恚怒其胎上逼左閔脉絃洪乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳壳山梔而愈

但寐倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳壳調和肝氣乃瘥

又一姪婦胎上逼胸滿噯氣飲食少思此脾氣鬱滯用紫蘇飲頤安又用四君子加枳壳柴胡山梔而瘥

大聖散

治姪娠怯悸夢驚心腹脹滿連脅急痛

白茯苓

川芎

麥冬

黃芪炒

枳壳各一錢

人參

炙甘草

木香各五分

加生姜水煎服

白朮湯

姪娠遍身痛或沖心欲死不能飲食

白术

五兩

黃芩

二兩

芍藥

四兩

右水六升煮取

二升半分三服

○

緣胎有水致痛兼易產

○姪娘心痛腹痛

姪娘心腹痛或宿有冷疾或新觸風寒或痰飲相

搏若痛傷胞絡必至動胎甚則傷墮

姪娘卒心痛氣欲絕

川芎

當歸

茯苓

厚朴

一錢制各

水煎服

當歸芍藥湯

姪娘心腹急痛或去血過多而眩

暉

三錢

白芍

炒

當歸

茯苓

白术

炒

澤瀉

各一錢

川芎

二錢

右水煎服

阿膠散

治胎痛腹痛

白茯苓

白术

炒

川芎

阿膠

各一錢炒

當歸

陳皮

各一錢

甘草

三分

右姜東水煎服

熟艾湯

治姪娘心腹痛或吐血衄血

熟艾

如拳大水煮服之效

中惡亦妙

有癥者宜去癥

凡胎動多在當脐今動在脣上故知是癥也此症宜以

仲景桂枝茯苓丸主之

桂枝茯苓丸

姪娘腹痛不能忍或偶有所傷胎

動不安，命將絕者，砂仁不以多少連皮炒黑色或單用仁，炒為末，熱酒調下二錢，不飲酒者，未飲下，但覓腹中熱胎已安矣。懸命須臾者，以砂仁湯吞桂枝茯苓丸，又名奪命丸，專治婦人小產下血，子死腹中，其婦增寒，手指唇舌爪甲青白，面色黃黑，胎上搶心，悶絕，欲死，冷汗自出，或食物或誤食草藥，傷動胎氣，下血不止，胎或未損者，服此即安，胎已死者，服此即下腐爛者，亦能取下，此方原係異傳。

丹溪亦稱其神，此即仲景桂枝茯苓丸，但用淡醋湯嚼下耳。桂枝 茯苓 牡丹皮
菟去皮仁尖 赤芍藥 右各等分蜜丸，彈子大，淡醋湯嚼下，一丸不知漸加至三丸。

○妊娠腰背痛

腎主腰，胎繫于腰痛甚者，或因勞役傷損，則胎墮也。

薛氏曰：若外邪所傷，用獨活寄生湯，勞傷元氣，珍湯杜仲砂仁膠艾，脾腎不足以前藥加白朮。

補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳壳肝火
所動以小柴胡湯加白朮枳壳山梔肝脾鬱結
用歸脾湯加柴胡枳壳

一姪婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致
用拔萃恙活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及
八珍湯以祛邪固本而痊

通氣散 腎虛腰痛神效 破故帛炒為末空心
每服二錢嚼胡龜肉半個以溫酒下

杜仲丸

治姪娠腰背痛 杜仲炒

川續斷酒浸

各等分為末煮東鳴為丸梧子大每服七十
丸酒或米飲下

膠艾湯 治腰腹疼痛胎動欲落即前姪娠下血
安胎飲是也 熟地 艾葉 白芍 川芎
黃芪 阿膠 川歸 甘草炒 各等分加
姜棗水煎服

獨活寄生湯 治足三陰虛風濕所侵腰膝壓節
獨活 桑寄生 繢斷酒 杜仲姜汁細辛
秦艽 牛膝酒 炒 茯苓 白芍炒 桂心

川芎

防風

人參

熟地

川歸

粉草

炙各
五分

右水煎服

一婦若腰痛數年不愈用白朮一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之症白朮能利腰膝之血故安胎而治痛也

拔萃羌活勝溫湯

治頭疼脊痛腰似折項似拔

羌活

獨活

各一錢

蔓荆子

各一分

甘草

各五分

川芎

藁本

防風

炙甘草

各五分

沉沉然是溫熱也加黃柏一錢附子五分

蒼朮二錢

○妊娠小腹痛

薛氏曰一姪婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽鴻肝湯一劑諸症頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

龍胆鴻肝湯治肝經濕熱兩拗腫痛或小腹痛
腸痛小便澁滯等症

龍胆草酒拌炒黃

澤鴻錢

木通

生地

川歸

車前子炒

山梔炒

黃芩炒

甘草各五分

水煎服

阿膠散

膠艾湯
氏名

不問妊娠月數深淺或顛仆或目

毒藥胎動不安腰疼腹痛捨心短氣

熟地

艾葉

白芍

川芎

黃芪

阿膠

川歸

甘草炙各一兩

右剉每服五錢入姜東水

煎服

金匱方無黃芪

○妊娠心腹脹滿

薛氏曰若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散若

食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇飲
一妊娠飲食停滯心腹脹滿或用人參參胃湯加
山楂青皮枳壳其脹益甚其胎上攻惡心不食
右關脉浮大按之則絃此脾土不足肝木所侮
用六君子加升麻柴胡而愈後小腹痞悶用補
中益氣湯升舉脾氣乃瘥

○妊娠數墮胎

夫胎乃陽施陰化榮衛調和經水完全十月而產
若血氣虛損不能養胎所以數墮也凡妊娠腰

痛多致墮胎

薛氏曰。丹溪云。陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛乏。不能衆養其胎。則墮。譬^レ如枝枯。則果落。藤瘦^リ。則花墜。嘗治賈氏婦。每有姪至三月前後。必墮。診^ク其脈。左右大而無加^ラ。則濶^ス。知其血虛也。補^ク其中氣。使血自榮。時正初夏。教以濃煎白朮湯。下黃芩末二錢。與數十帖。得保^ク而生。因而思之。墮於內熱而虛者。於理為多。曰熱曰虛。蓋姪至三月上屬相火。所以易墮不然。何以黃芩熟艾阿膠。

等為安胎之妙如此。也大抵治法湏審。某月屬某經。育養而藥之。

生生子曰。胎猶爪也。爪生於藤。肥而爪壯未熟而凋者。由藤槁而風搖也。胎藏母腹繫于命門。命門者。督脉之所循也。又衝任二脉為血之海。妊娠而經不行者。血蓄以養胎也。足月而生者。猶爪熟而蒂落也。苟內無所傷。外無所感。何墮之有。衝任督三脉。一宗衝脈。由氣街而行足少陰。任脉起於胞門子戶。由會陰而行腹督脉繫。

廷孔由會陰而行背，歷長強，循腰，輸命門，而上
巔。驗今之墮胎者，苟非衛任之不足，必由色慾
之縱恣，淫火一動，則搖撼其督脈，胞門亦由之
而不閉，胎斯墮也。胎墮心腰痛者，腰輸命門，皆
督脈之所歷，胎又繫于命門，故也。覩牝獸之護
胎，則可推其所慎矣。牝杜交合有節，懷胎之後
牡獸近身，則蹄而遠之，是以交而必孕，而必
育者，由交合之有節也。懷姪而不遠，即幸不
墮牛子，亦必脆弱多疾，痘瘡亦多，險逆皆淫火

煅煉所致。觀丹溪曰：虛曰熱，抑豈無其所自乎。
予故揭而告諸，保孕者當知其所慎，重至于藥
劑，則虛熱二字為之本矣。是以八珍、阿膠、杜仲
黃芪、黃柏、黃芩、桑寄生、香附為安胎之妙者，得
非治其本欤。

九保胎當理脾胃，脾胃為倉廩，五臟六府之所稟
受，胚胎由之以滋養也。胃屬陽明，陽明者，衝任
之長也。

一方 鯉魚二斤者一尾，粳米一升，用鹽醬和煮。

食之甚善一月食三次為佳

芎窮補中湯 懷姪血氣不能榮養以致半產早能服此預先補之不致于墮

乾姜 煥 阿膠 炒 莊 穗 五味子各五 黃芪 炒

川歸

白朮

炒 杜仲

炒 白芍藥

錢各一

人參

甘草

錢各一

人参

木香

甘草

炙各五分

右水煎服

虛寒

所宜

甘草

錢各一

人参

千金保孕湯 氣血不足每至三四月而墮當

人參

白朮

川歸

甘草

黃芩

錢各一

人參

杜仲

桑寄生

川續斷

白芍藥

砂仁

錢各一

右水煎服

虛寒

所宜

加梗米五十粒水煎食遠服○若氣痞悶不

舒加厚朴蘇梗○若腹疼加熟艾葉香附○

見血下加升麻地榆椿根白皮阿膠○

醋附丸

治數墮胎者

此藥甚妙

亦治崩漏帶

下積聚癰瘕脅腹疼痛

香附子

擦去毛淨

用好醋煮透焙乾為末仍以醋打

糊為丸梧子大每服三十九米飲下

脉經曰婦人懷胎一月之時足厥陰脈養之二月足少陽養三月手心主脈養四月手少陽脈養

五月足太陰，脉養六月，足陽明，脉養七月，手太
陰，脉養八月，手陽明，脉養九月，足少陰，脉養十
月，足太陽，脉養諸，陰陽，脉各養三十日，手少陰
太陽不養者，上為乳汁，下主月水也，值養胎之
經者，不可針灸犯之，必墮胎。

○胎不長

良方曰：妊娠而胎不長者，因有宿疾或因失調以致，臟腑虧損氣血虛弱，而胎不長也，當治其疾，痰益其氣益，則胎自長矣。

生生子曰：曾見一宦婦，每姪至五六月，則墮，如此者三次，胎甚瘦，小詢知少時患嘔嗽，因而背駝軀亦矮小，因腹中不舒，其胎不能長，后治其嘔嗽，再孕乃不墮，竟足月而產一子，此固偶然，則良方宿疾之說似不誣矣。

薛氏曰：一婦胎六月，躰倦懶食，面黃，晡熱，而胎不長，因勞欲墮，此脾氣不足也，用八珍湯，倍加參木茯苓三十餘劑，脾胃漸健，胎安而長矣。

生生子曰：昔在西吳，有張氏婦，年二十三孕，達三

月迎子胎之其脉兩尺皆濇左手短弱右關不充據脉濇不當有姪而其夫云向已喪胎者二俱彌月而產脉皆不完始無吉次無水火門戶產下隨死而無生氣今第二孕矣心憂之以翁治法多奇思幸投劑而保全之也予以脉參之多為神志不足因處一方曰壯神益志保孕湯即語之曰是方每月可服十帖過八月則不必服矣彼欣然從之服之足月產一女形全而氣壯及再有姪未服藥雖生一女完美而頭面為

白膜遮蔽隱僅見耳自口鼻而亦隨死也後又孕遭予歸省其婦心憂失措夫諭之曰無恐前保孕方在向以未服乃致乖舛今可亟服也照方服如前至期生一子而無恙舉家以此方為神錄而置之香火堂中夕祝之此亦愚見之偶中者人以旋服旋効而遂神之也亦其家為富而甚不仁丘里嘯之當其產而偵之其產而怪以為作惡之報迨產子而無恙即以鄙為保孕之神至今傳頌不衰也予因記其事并戒夫

人之為患者

壯神益志保孕湯 茯神 當歸 酸棗仁

人参 遠志 山藥 黃芪 鹿角膠各一錢

白朮二錢 砂仁三分 甘草四分 加貞眼肉五枚 束二

枚 水煎服

黃芪湯 治姪娘不長更安胎和氣 黃芪炒

白朮炒陳皮 麥冬 白茯苓 前胡

人參各五分 川芎 甘草炒三分 右姜棗水煎服

集驗方 用鯉魚長尺許者如食法整理飲其汁

則胎漸大而長矣然亦須每月服數次為妙
墮胎後血下不止

墮胎後復損經脈而下血不止甚則煩悶致死皆
以調補胃氣為主

薛氏曰一姪婦墮胎昏憤不時吐痰自用養血化
痰之劑昏憤不省自汗發搐痰涎湧出彼以為
中風欲用祛風化痰予曰此屬脾氣虛寒所致
遂用十全大補湯加炮姜二十餘劑尋愈
墮胎下血煩滿寒熱狂悶鎊鹿角屑為末每服三

錢水調下日三服

墮胎下血腹痛 阿膠炒一兩 艾葉五錢 水煎服
補中益氣湯 加鹿角膠一錢臨服入童便半酒
杯立止

人參黃芪湯 治小產氣虛血下不止

人參 黃芪炒 當歸 白朮炒 白芍炒

艾葉各一錢

阿膠炒二錢

水煎服

○未足月欲產

妊娠未足月而痛欲產者知母丸桂氣血不足者

芎帰補中湯倍加知母或八珍湯內加之血熱
薛氏曰一妊娠八月胎欲墮如產則久少安日晡
益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半
夏隨愈更以八珍湯調理而安

芎帰補中湯 治氣血虛而欲產

艾葉代姜炒

阿膠炒

川芎

五味子炒

白朮炒

黃芪炒

人參

芍藥炒各一錢

川帰

甘草炙五分

杜仲錢一錢

水煎作二次服

知母丸 十月未足而痛如產兼治產難及子煩

知母為末，蜜丸，梧子，大米飲下三十丸或酒下。
又方 月數未足而似欲產，腹痛。

槐子 蒲黃 苦分為末，蜜丸，梧子，大酒吞三十九丸，痛止為度。蒲黃味以井水調服亦佳。

千金方 治月未足而欲產。

菖蒲根搗汁一二升灌下。

本草云菖蒲治胎動不安下血

○過期不產

妊娠月足而過期不產者當補血行滯，羅先生以四物湯加香附、赤芍仁、枳壳、縮砂紫蘇水煎服之。

數帖即生。

○妊娠咳嗽

夫肺內主氣外主皮毛，腠理不密，寒邪乘之則咳嗽，秋則肺受之，冬則腎受之，春則肝受之，夏則心受之，其嗽不已，則傳于臟府。妊娠病久不已，則傷胎也。

薛氏曰：若秋間風邪傷肺，用金沸草散；夏火邪犯金，用參平肺散；冬寒邪傷肺，用參敗毒散；春風邪傷肺，用參蘇飲；若脾肺氣虛，用六君子。

芎歸桔梗若血虛桑皮杏仁桔梗腎火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃氣虛風寒所傷補中益氣湯加桑皮杏仁桔梗

又治一姪婦氣喘痰甚諸藥不効素有帶下始于目下有浮氣兩月其面亦然此氣虛而有痰飲也用六味丸料數劑而愈

一姪婦嗽則小便出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎氣而安

一姪婦咳嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予以為此水泛為痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數帖而安

一姪婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加山梔枳壳白朮茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也六君子加柴胡升麻而桔梗散治風寒咳嗽喘急不食_參天冬_{去心}桔梗散治風寒咳嗽喘急不食

赤茯苓

_錢

桑皮

桔梗

_{炒紫蘇}

貝母

人參

_{各五分}

麻黃_{去節}

炙甘草_{三分}

右加姜水煎服

馬兜鈴散

治咳嗽氣喘

馬兜鈴

苦梗

人參

甘草

貝母各五錢

紫蘇一錢

橘紅

大腹皮

桑皮各一錢

川百合

紫苑

首合散

咳嗽胸膈煩悶

甘草三分

竹茹二分

麥冬

苦梗

桑皮各五錢

甘草三分

加姜水煎服

妊娠傷寒涎多咳嗽

知母

杏仁

天冬

桑皮各五錢

姜水煎服

加味參蘇飲

治項背拘急鼻塞頭眩時發寒熱

咳嗽

即參蘇飲加五味子杏仁是也

○妊娠吐血衄血

妊娠吐血衄血由七情臟府所傷氣逆于上致益上溢不止心悶甚者多死或墮胎也宜用局方

必勝散

薛氏曰若肝經怒火先用小柴胡中施生地次用前藥合四物後用加味道達散若肝經風熱防風子芩丸心經有熱硃砂安神丸心氣不足茯苓補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀角地

小蘄連枝	人參	蒲黃炒	熟地	川歸
川芎	烏梅	水煎服		
黃芩清肺飲	治姪娘肺熱，吐衄，及治肺熱小便不利	黃芩炒 山梔炒各一錢 鹽豉粒二十	水煎服	
加味清胃散	治醇酒厚味，唇齒作痛，或齦齦潰爛，并頭面頸項疼痛，及姪娘吐衄	水煎服		
黃連	丹皮各一錢	川歸		
升麻	甘草分			
○子煩	右水煎服	便秘加木黃		

黃湯膏梁積熱加味清胃散肺經有火黃芩清肺飲因氣鬱滯紫蘇飲子氣不攝血用補中益氣湯腎經虛火六味地黃丸
 紫蘇飲 治姪娘失調胎氣不安上攻作痛或氣逆失血李方在胎上逼卷中

一姪婦因怒失血，而脇脹痛，小便淋漓，此怒而血蓄于上隨火出也。用小柴胡合四物四帖血止。用六君子安胎飲調理全安。

必勝散 治男子婦人血妄流溢，或吐嚥衄血並妙。

良方曰：姪娠苦煩悶者，以四月受少陰君火以養精。六月受少陽相火以養氣。若母心驚胆寒，多有是症。產寶云：是心肺虛熱或痰積于胸膈，三月而煩者，吐涎惡食，大凡停痰積飲寒熱相搏，吐甚則胎動不安。

薛氏曰：內熱子煩，用竹葉湯，氣滯用紫蘇飲，痰滯用二陳加白术、黃芩、枳壳、氣鬱用三分氣飲加川芎。脾胃虛弱用六君子加紫蘇山梔。

竹葉湯 姓姪心驚胆怯終日煩悶，名曰子煩。

白茯苓二錢 防風 黃芩 麥冬各一錢 竹葉十片
水煎服知母

書

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

人參散 熱乘心脾煩熱乾渴參 人參 麥冬
赤茯苓 地骨皮 黃芩炒 乾葛 甘草五分
犀角一錢 水煎服

竹茹湯 姓姪煩躁或胎不安少

淡竹茹一兩水煎服之

知母丸 知母一味炒為末，東、西丸如彈子大，每服一丸，人參湯下。

分氣飲

脾胃虛弱氣血不和胸膈不利或痰氣

喘嗽飲食少思

陳皮

茯苓

半夏

桔梗

大腹皮

蘇葉

白朮

枳壳

山楂

一錢

甘草

分五

右加姜東水煎服

治子煩口乾不得卧用黃連為末每服一錢米飲
調下

大宮詹少溪吳馭閣校

終

赤水玄珠婦人門第二十七卷目錄

煩

妊娠煩躁口乾

風瘻子癧

妊娠瘦癰

妊娠鬼胎

妊娠不語

傷寒熱病防損胎

妊娠傷寒

妊娠時氣

過時熱病

熱病胎死腹中

妊娠瘡疾

妊娠泄瀉

下痢黃水

大小便不通

小便不通

名曰
轉脬

孕淋


妊娠遺尿

妊娠尿血

胎水腫滿

腹內鍾鳴

孕癰



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

藏躁悲傷

滑胎方法

十產論

產難方論

交骨不開產門不閉

下死胎方

產難生死脉訣

胞衣不出

產後血暈

產後顛狂

狂言譖語

產後不語

(

終

婦人全書卷之三

新安生生子孫一奎著輯

妊娠煩躁口乾

足太陰脾之經其氣通於口手少陰心之經其氣通於舌若臟腑不調氣血不和以致內熱乘於心脾津液消燥故心煩口乾也與子煩大同小異宜用益母丸即前一味知母丸是也

一、妊娠煩熱、咽疼用知母散加山梔清肺而愈后又內熱咳嗽小便自遺用補中益氣加麥門冬

卷之三

三

一

山枝以補肺氣滋腎水而痊

知母散

治煩躁悶亂口乾

知母

麥冬

黃芪炒

子芩炒

赤茯苓各一錢

甘草

水煎入竹瀝一合再煎

丁沸服之

人參黃蓍散

治身熱煩躁口乾

人參

黃蓍炒

葛根

秦艽

赤茯苓

麥冬各一錢

知母

甘草各五分

右姜三片竹葉十四片水煎服

○妊娠風瘻子癟

妊娠體虛受風而傷足太陽經遇風寒相搏則口噤背強甚則腰反張名之曰瘻湏更自醒良久復作又名曰子冒又類子癟。

生生子曰風瘻乃外邪從足太陽而入有副柔之分當從仲景法於傷寒門中求治子癟乃痰涎所致是內臟所生治當分別

薛氏曰若心經風熱用釣藤湯肝脾血虛加味道遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲