

**梅毒症候**  
 病毒ニ感染セル後  
 數週チ經テ初メ感  
 染セル部即チ通常  
 陰部ニ無疼痛性硬  
 結ヲ生シ次テ潰瘍  
 ニ變テ若クハ初メ  
 潰瘍ヲ發シ其邊縁  
 硬結ヲ鼠蹊腺腫脹  
 ス然レモ赤色疼痛  
 ナシ呈セル多ク日  
 子ヲ經テ潰瘍ハ癒  
 痼チ結フモ膿ノ腫  
 起ハ久シク膿始メ  
 而シテ數月ノ後皮膚  
 ニ普微疹ヲ發ス後  
 來ノ經過ニ於テ梅毒  
 毒ニ基因スル諸種  
 ノ皮膚病、粘膜炎、  
 答兒、骨膜炎、骨質  
 炎、腸炎、腎丸炎、  
 虹彩炎、肝臟炎等  
 ナリ將來スルアリ

○五十倍ノ石炭酸溶液一〇〇  
 病肉ヲ食メテ發スル内症ニハ速ニ吐劑ヲ與ヘ、虛脱ニハ樟  
 腦皮下注入チ施スヘシ

○梅毒 Syphilis

○梅毒 Syphilis 預防法ハ其原因ヲ避クルニ在リ  
 治療法ニハ局處及ヒ全身ノ別アリ

[甲] 局處療法  
 ○淺表潰瘍ノ皮膚ノ造成チ促スニハ患部ヲ  
 清潔ニシ、屢冷水或ハ石炭酸水(五十倍)ヲ以テ洗滌シ、或ハ陰  
 莖浴ヲ行フ、又時々硝酸銀ノ中等溶液(二十倍)ヲ塗布ス、若シ  
 潰瘍面ト、佗ノ皮膚ト觸擦スルキハ、其間ニ綿撒絲ヲ插入ス  
 ヘシ、近時沃度仿謨末ヲ撒布シ、或ハ其溶液ヲ塗布シテ、其潰  
 瘍速ニ肉芽面ニ變スルノ効チ収メタル者アリ、痼鈍性潰瘍

ニハ、硝酸銀軟膏ヲ塗布ス

○沃度仿謨三、〇 亦ニ酒精一〇〇 亦同 備里設林三〇、〇

右外用

○硝酸銀〇、六乃至一、二 亞鉛華軟膏一五、〇 百露拔爾

撒謨四、〇 右塗布料

[乙] 全身療法  
 ○更ニ之ヲ分テ、自然療法及ヒ藥用療法ト爲

(一) 自然療法ニ於テハ、醫藥ヲ與ヘス、只攝生ヲ嚴ニシ、淡泊  
 ノ食餌ヲ取ラシム、此法患者ノ耐忍力ニ乏シキカ、或ハ身體  
 衰弱セル者ニハ施シ難シ

(二) 藥用療法ニハ、水銀、沃度、沃度仿謨、薩爾沙根ヲ應用ス  
 ○水銀軟膏 右二、〇チ取り一日一回、左ノ順序ニ從



○チ、之ヲ塗擦ス、即チ第一日兩上膊ノ内面、第二日兩腿部ノ内面、第三日兩前膊ノ内面、第四日兩脛部ノ内面、第五日胸部、第六日下腹部、第七日ニ至リ再ヒ前記ノ次序ニ從テ、交互塗擦スヘシ、但シ、毎回塗擦前ニ、溫浴ヲ取ルヘシ

〔注意〕 室内ノ溫度ハ、攝氏二十度ニ在ルヘシ、而シテ塗擦中ハ、口内ヲ清潔ニシ、格魯兒酸加留謨液(五十倍)ヲ以テ、含嗽ヲ行フ、塗擦ノ數ハ、十八回乃至三十回ヲ常度トスレトモ、中毒症ヲ發スレハ直チニ之ヲ中止スヘシ

○昇汞〇、〇〇五 偏里設林六〇、〇 水一五、〇 右一回半筒、二局處ニ注入ス

○昇汞〇、五 水三〇、〇 右同上

○黃色沃度化汞〇、六 阿片末〇、二 甘草羔

草末各適宜

右三十九ト爲シ、一日三回、一九

○甘草〇、二四 阿片末〇、〇六 白糖一五、〇 右十

○二包ニ分テ、一日三回、一包

○昇汞〇、〇六 右適宜ノ依的兒ニ溶解シ、甘草羔及ヒ

甘草末ヲ加ヘ、十六丸ト爲シ朝夕一九

〔注意〕 水銀ヲ内服スルノ間ハ、菜蔬果物等ノ如キ不消

化性食物ヲ避ケ、室内ノ溫度ヲ平等ニ保持シ、鹹味ヲ食

物ヲ禁スヘシ、口内ヲ清潔ニスルカ爲メ、格魯兒酸加留

謨溶液(五十倍)ノ含嗽ヲ行ヒ、若シ中毒症ノ發起スルヲ

見レハ、速ニ後服ヲ止ムヘシ

○沃度丁幾二、〇 水二〇〇、〇 右朝夕、一食匙

○沃度化加留謨四、〇 苦味丁幾四、〇



右一日三回、二日ニ分服ス

○沃度化加留謨四〇 龍膽越幾斯 龍膽末各適宜

右六十九ト爲シ、一日三回、五九

○強室篤滿煎

薩爾沙根百分ヲ、二千六百分ノ常水ニ和シ、二十四時間

熱浸シテ後、之ニ白糖及ヒ明礬末各、六分ヲ加ヘ、三時間

熱浸シ、終リニ臨ンテ、湯泥子、茴香各四分、旃那葉二十四

分、甘艸十二分ヲ加ヘ、其漉液ノ全量ヲ、二千五百分ト爲

スヘシ

○弱室篤滿煎

薩爾沙根五十分ヲ、二千六百分ノ常水ニ和シ、三時間温

浸シ、終リニ臨ンテ、拘櫛皮、桂皮、益智、及ヒ甘艸、各、三分ヲ

加ヘ、其漉液ノ全量ヲ、二千五百分ト爲スヘシ

早朝、寢衾中ニ於テ、一乃至二磅ノ強煎ヲ温服シ、二時

間温覆シ、夕時ニ及テ、弱煎一磅ヲ冷服ス

○先天梅毒 Syphilis congenita.

甘汞一日二回〇〇七銀灰散(水銀加白堊、水銀軟膏)〇三乃

至一、〇ヲ、毎日入浴後ニ塗擦ス(沃度強壯藥(火性磷酸鐵)ノ類

ヲ與フ

○銀灰散〇〇六乃至〇〇一 乳糖二〇 右六包ヲ分チ

一日三回一包(小兒ノ量) 水一〇〇〇 右一日六回、二

日ニ分服ス(小兒ノ量)

第九篇

先天梅毒症 多クハ流産或ハ早産ニ由テ死後速ニ消シ或ハ生後速ニ消シハ先天性梅毒ノ症候トシテ、性鼻加答兒、口角裂傷、脚腫、大水泡、及ヒ足趾ノ扁平瘡、疔腫、疔發、甚シク腫等ヲ往々虹彩、炎ヲ來タス預後不



皮膚諸病

第一節 皮膚分泌變常ノ諸病

○皮脂漏

小兒ノ頭蓋ニ發スル Seborrhoe. 日六回二

痂皮ヲ柔軟ニシ、且ツ之ヲ除去スヘシ、油、石礮水、加里石礮精、

「ラチル」及ヒ蠟布ヲ以テ、製造セル頭巾ヲ應用ス、○痂底ニ

炎症ヲ呈スルキハ、亞鉛華軟膏或ハ鉛軟膏ヲ貼シ苦癢アル

者ニハ五十倍若クハ三十倍ノ石炭酸溶液ヲ用ウ、○又全身

療法ヲ施スヘシ、○毒華攝林五〇〇 右混和軟膏ト

○酸化亞鉛

爲シ塗擦料

○撒里失爾酸五、〇

水二〇〇〇 右混和洗滌料

○面皰

炎症アル者ハ粉刺 Comedones. 條ヲ參考ス可シ

夫天壽堂

〔原因〕腺病、結核、月經異常等ナリ

〔療法〕毎夕、加里石礮精或ハ白色加里石礮、硫黃、礮砂精等ノ

擦塗法ヲ施ス、又晚間、先ツ石礮水ヲ以テ、皮膚ヲ摩擦シ、半時

間濕潤ニ保持シ、爾後細砂ヲ以テ摩擦ス、依的兒各等分

○硫黃乳 外偏里設林 酒精 依的兒各等分

○礮砂精 安息香丁幾一〇 薔薇水一〇〇〇

右同上

第二節 皮膚諸炎

(甲) 急性炎症

○丹毒 Erysipelas

局處療法ニハ油ヲ塗り、綿花ヲ以テ之ヲ被包ス、又八倍ノ礮



酸銀水、或ハ沃度丁幾ヲ以テ、患部ノ周圍幅三四センチメートルニ塗擦スレハ、屢其進行ヲ防禦シ得ルコトアリ、ホントル氏ニ據ルニ、其初起ニ於テ、石炭酸溶液ヲ皮下ニ注射スレハ能ク蔓延ヲ防止シ得ヘシト云フ

○石炭酸一、〇 水三〇、〇 亞爾簡保爾一、〇 右

一日數回、一筒、皮下ニ注射ス

内服ハ只、對症療法ニ過キス、即チ消化不良ニハ、鹽酸ヲ與ヘ、往々催吐藥ヲ投ス便秘ニハ、緩下藥ヲ施シ、高熱ニハ撒里矢爾酸那篤留謨及ヒ規尼涅、盧脫ニハ、興奮樂ヲ與フ

○稀鹽酸五、〇 苦味丁幾二〇、〇 右每食後、十五滴

○吐根浸(五、〇)六〇、〇 右每十五分時一食匙、但シ吐チ得ルヲ以テ、後服ヲ止ム

○滲出性潮紅斑 Erythema exudativum.

多シハ其治療ヲ要セス、唯之カ原因ヲ除去スルヲ以テ足レリトス、但シ甚シク痒痛スル者ハ、氷囊ヲ貼スヘシ、  
○イソテルトリゴニハ、澱粉、亞鉛華、亞鉛華軟膏ヲ貼ス、其頑固症ニハ百倍ノ硝酸銀水ヲ塗布ス

○蕁麻疹 Urticaria.

〔原因〕種々ノ食物即チ殊ニ蟹、蚌蛤類、菌類、魚類、和蘭莓、瓜、醋蜜等ヲ食シ、其他拔爾撒謨類、華澄茄、阿片等ヲ服スルヨリ發シ又腸蟲、子宮病、佗ノ皮膚病モ亦之カ原因ト爲ルコトアリ  
〔療法〕原因療法ヲ施シ、熱性症ニハ酸性飲料、瀉下藥ヲ投シ冷水、接骨木花浸、三倍ノ醋酸等ヲ以テ、患部ヲ洗滌ス

○純精酒石二五、〇 枸橼油糖一〇、〇 右一日二回



一茶匙ヲ糖水ニ和シ用ユ  
慢性症ニハ、砒石ヲ内用シ、水治法ヲ施シ或ハ石礮ヲ以テ洗  
淨スルノ後水銀硬膏ヲ貼ス又加兒爾斯泉搥ヲ與フ、痒癢ア  
ル者ハ寒罨法ヲ施シ或ハ呀囉仿謨軟膏(二倍)醋酸ニ亞爾箇  
保爾(醋酸一分亞爾箇保爾百分ヨリ成ル者)等ノ塗布ヲ行フ  
○亞砒酸加留謨液 一〇〇 水 一〇〇〇 一日二回

二日ニ分服ス

○匍行疹

寄生性ナ  
ラサル者 Herpes.

大抵治療ヲ施サバ、ルモ數週ヲ經過スレハ自カラ治癒スル  
者ナリ、陰部ノ匍行疹ハ、清潔ヲ主トシ、五十倍ノ硝酸銀水ヲ  
塗布シ、或ハ亞鉛華膏ヲ糊帶藥ト爲ス、  
疼痛性帶狀匍行疹ニハ、別刺敦那越幾斯ノ硬膏ヲ貼ス(二十

分中五分ヲ含ムモノ)又鹽酸莫兒比涅ヲ皮下ニ注射シ、或ハ  
軟膏(三十倍)ト爲シ用キ其他無刺戟性軟膏ニ阿片越幾斯ヲ  
伍スルモノヲ貼ス

○阿片越幾斯 一〇 豚脂 一〇〇 右軟膏ト爲ス

神經痛ノ條ヲ參觀ス可シ

○瘡瘡及癰疽 *Furunkel und Carbunkel.*

〔原因〕 局處刺戟、全身病等ナリ  
初起ニハ、沃度丁幾、水銀軟膏、水塊等ヲ外用シ、早ク切開スル  
ヲ佳トス、(但シ疼痛ヲ緩快スルノ効アレハ、治癒ヲ促スニ足  
ラス)若シ其經過ヲ短縮セシメント欲スレハ、温罨法ヲ施ス  
ヲ以テ最佳トス、殊ニ口唇ノ瘡瘡ハ速ニ切開スルヲ要ス  
頻發スル者ニハ、温浴ヲ持重シ、内服ニハ、砒石(亞砒酸加留謨



液一日ノ量十滴ヲ與フ  
**(乙) 慢性炎症**

○濕疹 Ekzema.

〔原因〕皮膚刺戟(化學的及ヒ器械的)貧血、體液不調、腺病質、靜脈血還流ノ妨礙等ナリ

〔療法〕急性症ニハ、痲皮ヲ柔軟ニシ、阿列布油、苦扁桃油、罌粟油、亞鉛華膏、ヘブラ氏軟膏等ノ塗布ヲ施ス

慢性症ニハ、白降汞軟膏、昇汞溶液、釜兒水、酒精製硝酸銀溶液(十倍ノモノ)、苛性加里石礮一日二回、アラチルヲ以テ、五分時間塗擦シ、爾後一時間、寒電法ヲ施ス

ヘブラ氏軟膏等ヲ用ウ

○白降汞一〇乃至二〇 豚脂三〇〇 右軟膏ヲ作り、塗擦料ト爲ス

○昇汞〇・〇三乃至〇・〇五 水三〇〇 右塗布料

○二倍ノ苛性加里溶液一〇〇 右毎三日、毛筆ヲ以テ、患部ニ塗布シ、直チニ冷水ヲ以テ之ヲ洗去ス、之カ爲メニ疼痛ヲ發スルキハ寒電法ヲ施ス

其他原因療法(貧血、腺病、佝僂病等)ヲ施シ、砒石、薩爾沙根等ヲ與フ

○亞砒酸加留謨液一〇 水二〇〇〇 苦味丁幾四〇

右一日三回、二日ニ分服ス

○亞砒酸〇・二 甘草羔 甘草末各適宜 右六

十九トナシ、一日三回、一丸

○薩爾沙根一五〇 旃那葉五〇 右水適宜ヲ以テ

煎沸漉過シテ、二〇〇〇ノ液ト爲シ、一日數回ニ分服



○慢性泡疹

*Pemphigus chronica.*

強壯藥ヲ與ヘ、冷水纏絡法、冷浴或ハ微温浴之ニ五〇、〇ノ苛性加里或ハ一〇、〇ノ昇汞等ヲ加フ、小兒ニハ昇汞一、〇ヲ以テ足レリトス)ヲ施シ、局處ニハ、澱粉、石松子等ヲ撒布シ、或ハ硝酸銀軟膏、亞鉛華軟膏、單鉛軟膏ノ塗布ヲ行フ、發熱アル者ハ規尼涅ヲ與フ

○汚苔疹

*Rubia.*

脂肪油類ヲ以テ、痂皮ヲ軟却シ、潰瘍面ニ、硝酸銀ヲ塗布ス、又驅梅毒、強壯藥ヲ用ヅ

○散生粉刺

*Acne disseminata.*

面皰ノ治法該條ヲ參考スヘシ)ヲ施シ、偏里設林石鹼、白色加里石鹼ヲ以テ洗滌シ、或ハ温湯ヲ以テ、時々洗滌ス、其効未タ充分ナラサ

ルキハ、硫黃乳炭酸加留膜、偏里設林、苦扁桃水、燒酒各等分ヲ以テ糊泥ト爲シ、毎夕患部ニ貼シ、翌朝之ヲ洗除ス、又シンメルフェルド氏ノ洗劑ヲ用ヅ  
○沈降製硫黃ハ、樟腦〇、五、亞拉昆亞護膜一、〇、石灰水、薔薇水各六〇、〇、右混和洗劑料(クンメフェルド氏洗劑)前夜之ヲ患部ニ貼シ、翌朝乾燥シタル儘ニシ皮膚肥厚ニハ、水銀軟膏ヲ稱用ス  
○酒齶鼻 銅色面皰 *Acne rosacea.*  
原因療法ニハ、飲酒ヲ限制シ、婦人生殖器、泌尿器、胃、肝、門脈系等ノ障害ヲ除クヘシ  
膿疹ヲ亂切シ、擴張シタル血管ヲ亂刺シ、結節ハ之ヲ切除シ、或ハ抽出ス、又一週三回、石炭酸一分、酒精三分ノ混液ヲ以テ



腐蝕大出、硫黃劑、水銀硬膏、昇汞等ヲ應用ス

輕症ニハ、硫黃劑、水銀硬膏、昇汞等ヲ應用ス

○硫黃乳 稀酒精 留水各一五〇 右每夕、患

部ニ塗布ス 偏里設林 石礫精各等分 右同上

○硫黃乳 偏里設林 石礫精各等分 右同上

○昇汞〇〇〇七 水三〇〇 右洗浣料、及ヒ綿帶藥料

ト爲ス

○鬚苔疹 *Acne mentagra.*

油類或ハ琶布ヲ以テ、痂皮ヲ柔軟ニシ、鬚毛ヲ拔取シ、或ハ短

剪スヘシ、爾後、ヘブラ氏軟膏、硫黃酒調鼻ノ條、赤降汞軟膏、或

ハ白降汞軟膏等ヲ貼ス

頑固ノ症ニハ、拔毛セル部分ニ注意シテ醋酸、濃厚ノ硝酸銀

溶液等ヲ塗布ス

○膿苔疹及膿胞疹 *Impetigo und Ekthyma.*

全身療法ヲ施シ、其營養ヲ改良ス

局部療法ニハ、油ヲ以テ痂皮ヲ柔軟ニシ、毛髮ヲ剪除シ、白降

汞軟膏、白降汞一〇乃至二〇、豚脂一五〇、亞鉛華軟膏、ヘブラ

氏軟膏等ヲ貼ス、又硝酸銀溶液(五十倍ノモノ)ヲ塗布スル

アリ

○鱗屑癬 *Psoriasis.*

〔療法〕内服ニハ、砒石劑(亞砒酸加留護液、一日三回、二滴ヲ與

ヘ、爾後漸々ニ其量ヲ增加ス、但シ結膜炎等ノ如キ、中毒症ヲ

發スレハ、直チニ後服ヲ止ムヘシ)ヲ與フ

○亞砒酸〇〇五 亞拉昆亞護護適宜 甘草末二〇



○右二十九ト爲シ、一日二回、一丸

○亞砒酸〇〇六〇阿片〇二五、其藥用石鹼適宜 右

局處療法ニ最モ稱用スル者類、蒸氣浴(或ハ溫浴)中ニ於テ、軟石鹼及ヒ毛筆ヲ用テ、鱗屑片ヲ掃除ス、鱗屑片已ニ剝去スレハ、綠色石鹼ヲ塗擦(一日二回)スルヲ、三日乃至六日間ナルヘシ、此施療中、患者ヲシテ、絨衾中ニ在ラシメ、爾後三日間、塗擦ヲ止メ、只、猶絨衾中ニ在ルヲ要ス、塗擦ヲ止ムル後、第四日ニ至レバ、二三日間、溫浴ヲ持重セシム、時ニシテ、黃、以上ノ療法ヲ再三反復ス、其時、癬ノ消滅ス、其發疹ノ散在性ヲ示シ、只、軟石鹼ヲ「ララチル」ニ塗布シ、之ヲ患部ニ貼ルヲ以テ足レリトス

頭蓋及ヒ顔面ノ鱗屑疹ニハ、加里石鹼ヲ用ウ

其他、嬰兒軟膏、石炭酸軟膏ヲ貼ス 白蠟〇五 杏仁日一

○桂松木麥兒油 綠石鹼各二五、〇 酒精五〇、〇

○石炭酸三〇、〇 單軟膏三〇、〇 右同上(石炭酸軟膏)

又「クリツ」酸、苦利沙羅並或ハ護亞粉ヲ貼ス、其法ハ、先ッ

鱗屑ヲ除カ、爲メ石鹼精、若シ共「ア」ロセシ「ア」ヲ撒里矢爾

酸酒精溶液ヲ以テ、患部ヲ摩擦シ、左ノ軟膏ヲ攤貼スヘシ

○「クリツ」酸、或ハ苦利沙羅並(或ハ護亞粉)二〇、〇、Zanjanin

○「クリツ」酸、或ハ苦利沙羅並(或ハ護亞粉)二〇、〇、Zanjanin

○「クリツ」酸、或ハ苦利沙羅並(或ハ護亞粉)二〇、〇、Zanjanin

○「クリツ」酸、或ハ苦利沙羅並(或ハ護亞粉)二〇、〇、Zanjanin

○「クリツ」酸、或ハ苦利沙羅並(或ハ護亞粉)二〇、〇、Zanjanin

○「クリツ」酸、或ハ苦利沙羅並(或ハ護亞粉)二〇、〇、Zanjanin



小兒ニハ、肝油一日ノ量一五〇、大人ニハ、其三〇〇乃至六〇〇  
○チ内服セシメ、外用ニハ、一日二回之ヲ塗擦ス(其上ニ綑縛  
法ヲ施ス)且ツ腺病療法ヲ併施スヘシ

○赤色滲出性苔癬 極メテ稀有 Lichen exsudati-

vus ruber.

種々ノ藥品ヲ應用ス。モ、大抵其効驗ヲ見ス、只、亞硫酸ヲ持  
重スレハ、一時ノ効ヲ奏スルコトアリ

○痒疹 Prurigo.

内服ニハ、亞硫酸(一日三回〇〇〇ニ)必魯加兒必涅或ハ耶僕

蘭日葉ヲ與フ

○鹽酸必魯加兒必涅 〇〇二

白糖 〇五

右每日一

○耶僕蘭日葉浸(三、〇)六〇〇

右同上

外用ニハ、冷浴、昇汞浴(一浴ノ量、一五〇乃至三〇〇)ヲ施シ、結  
麗阿曹篤水(百倍)、石炭酸(百倍)ノ塗布、爹兒、白降汞軟膏、榆木爹  
兒油ニ啞囉仿謨ヲ和セシ者、爹兒油六〇、〇啞囉仿謨一五、〇  
肝油等ノ塗擦ヲ行フ、又硫酸加留謨、偏里設林、豚脂、各等分ヲ  
以テ軟膏ト爲シ、塗擦スルノ法アリ

○白降汞 五、七五

樟腦 三、七五

右

軟

○火傷 Combustio.

此症ヲ分テ三期トス、其第一期(變赤)ハ、寒濕法ヲ施シ、或ハ  
古魯胃謨ヲ塗布ス  
第二期(水泡生成)ニハ、水泡ヲ刺開シテ、亞麻仁油或ハ阿列布



油ヲ塗布後、之ヲ被覆本所ニ綿花ヲ以テ蓋シ、而シテ二十四時  
 方後、再ニ之ヲ交換ス、之ヲ交換スルニ當リ、膿液ノ浸潤  
 及シテ膠著セシ部分ニハ、微温湯ヲ應用ス、後期ニ至ルハ、綿花  
 ノ膠著ヲ防グ爲メ、單軟膏、又ハ亞鉛華膏ニ等分ノ扁桃油  
 ナリ和シテ者等ヲ塗布ス、又五十倍ノ撒里矢爾酸軟膏、五十倍  
 ノ硼酸軟膏ヲ貼敷、硝酸銀溶液ヲ塗布(五半倍)ノモノヲ塗布  
 シ爾後七八層ノ布片ヲ以テ之ヲ被覆ス、而シテ布片ハ其溶  
 液内ニ常ニ濕潤ナルヲ要ス(等分撒里矢爾酸軟膏、扁桃油、  
 第三期(腐痂生成)ニハ、防腐綿帶ヲ施シ、又外科的切手術ヲ行  
 フ可キ時、水(白油)百部、意亦、白油、白油、白油、白油、  
 依用ス、**凍瘡** (Cottrelatio) 量一五〇乃至三〇〇ヲ敷、  
 (療法) 凍結セシ部分ハ、漸次ニ之ヲ煖クシ、即チ初メ雪或ハ

氷水ヲ以テ摩擦シ、次チ冷水ヲ用テ、遂ニ微温湯ヲ用テ、全身  
 ノ凍冷ニ於ケルモ亦然シ、*Psoriasis erythematosa*  
 凍瘡、沃度寸幾十倍ノ鞣酸溶液、阿列布油、五十倍ノ硝酸  
 銀水、弾力性古魯胃膜、三十倍ノ硝酸等ヲ塗布、或ハ古魯胃膜  
 五〇、〇蓖麻子油二〇、〇、的列並底油六〇ノ混和物ヲ塗擦ス、  
 凍瘡潰瘍ニハ、硝酸銀軟膏ヲ貼ス、  
 ○硝酸銀〇、〇、豚脂二〇、〇、  
 軟膏ト爲シ、患部ニ  
 貼ス、  
 脫疽ニ陷頭タル部分ニハ、分界線ヲ生シ、待テ、之ヲ切除  
 スヘシ  
 ○**魚鱗癬** (Ichthyosis) 者  
 温浴ヲ命シ、阿列布油、或ハ肝油ノ塗擦ヲ行ヒ、殊ニ軟石鹼ノ



塗擦ニ兼ヌルニ温浴ヲ以テスルノ法ヲ稱用ス

〔丙〕新生物ニ係ル者

○狼瘡 Lupus.

〔療法〕 内服ニハ、肝油、沃度化加留謨、亞硫酸等ヲ與ス。外用ニハ、尖銳ノ烙鐵、若クハ白金烙、或ハ苛性加里腐蝕後直チニ粉末トナリ、布敷等ヲ以テ、結節ヲ壞滅シ、或ハ銳匙ヲ以テ之ヲ抉出ス。蔓延性ノ硬結部ニハ、點狀ノ亂刺ヲ施シ、爾後、格魯兒化亞鉛同量ノ酒精ニ溶解セシ者ヲ以テ腐蝕ス、腐蝕剝脫ノ後、八日乃至十日後、再ヒ之ヲ反復シ、都テ五乃至八回施行ス。長ク水銀硬膏ヲ貼用ス。

○紅斑性狼瘡 酒鼻 Lupus erythematodes.

水銀硬膏ヲ以テ被包シ、又加里石鹼精ヲ以テ洗滌シ、爾後、白

降汞軟膏白降汞一分、單軟チ貼ス、毎三日ニ、苛性加里ニ二倍

ノ水ヲ和スル者、發烟硝酸、石炭酸ニ同量ノ亞爾箇保爾チ和

スル者、腐蝕性沃度偏里設林等ヲ以テ腐蝕ス

内服ニハ、肝油、亞硫酸、鐵等ヲ與フ

○沃度偏里設林化加留謨各五、〇。偏里設林一、〇。

右外用 右塗布後、二十四時間ヲ經テ、之ヲ洗滌シ、爾後

○冷捲法ヲ施ス腐蝕性沃度偏里斯林

第三節 寄生性皮膚病

○疥癬 Scabies.

百露拔爾撒謨、或ハ蘇合香ノ塗擦法ヲ以テ、最佳トス、其他硫

黃劑、揮發油、例之ハ、的列並底油、茴香油、刺賢垓爾油等ヲ用キ

ルニアルモ、其効確實ナラサルカ、或ハ劇シク刺戟スルヲ以



ヲ現今多シハ之ヲ用キス  
○百露拔爾撒謨三〇〇並並並右全身ヲ塗擦ス(此塗擦ヲ  
百露行ワタル後絨衾中ニ在ルヲ二十四時間ニシテ入浴シ  
石鹼ヲ以テ之ヲ洗除スヘシ)

○蘇合香三〇〇 阿列布油八〇 右同上

○蘇合香三〇〇 再醱酒精八〇 阿列布油四〇

右同上

○百露拔爾撒謨 蘇合香各一五〇 右同上

○硫黄二分 亞細生石灰一分 常水十分 右煮沸十

分 二分ト爲シ濾過ス一日二回塗擦ス(但シ劇シク炎症ヲ

木起シタル者ニハ適セズ) 同量 亞細生石灰一分 白堊二分 山毛榉兒油各三分 白堊二分 山毛榉兒油各三分

○硫黃花 山毛榉兒油各三分 白堊二分

亞得石鹼 豚脂各六分 右混和四十八時間四回二分

マ汁ヲ塗擦ス(表皮ノ刺戟過敏ナル者ニ適ス) 亞得石鹼

刺赤油膏 ○白癬 Favus 亞得石鹼 亞得石鹼 亞得石鹼

油ヲ以テ痂皮ヲ柔軟ニシ毛髮ヲ拔取シ一日二回藥用石鹼

ヲ塗擦ス又結麗阿曹篤軟膏的列並底油白降汞軟膏等ノ塗

擦或ハ石炭酸溶液昇汞溶液等ノ塗布ヲ行フ

○結麗阿曹篤一〇〇 豚脂一五〇 右塗擦料未審

○白降汞一〇〇 大黃豚脂一五〇 右同上

○石炭酸二〇 偏里設林 亞爾簡保爾各一〇〇 患部

亞得水八〇〇 並並 右塗布料 大黃末 其餘藥膏大ヤ

百〇二百倍大昇汞水 右同上 正治部 用ヤ 患部中

手製ヤ ○寄生性匍行疹 Herpes tonsurans 五百倍氏亞二



毛髮ヲ有セサル部ニハ、白降汞軟膏、昇汞溶液(五百倍乃至二百倍)、石炭酸水(五十倍)、石炭酸軟膏(二十五倍)等ヲ用ウ、就中護亞粉、苦利沙羅並或ハ羊蹄根(和大黃)末ハ、其効驗著大ナリ

○護亞粉 右適量ヲ取り、醋ヲ以テ稀泥ト爲シ患部

ニ塗布ス(和大黃末ノ用法ハ、護亞粉ニ同シ)

毛髮部ニハ、先ツ毛髮ヲ鋏切シ、或ハ拔取シ、而シテ、昇汞溶液或ハ石炭酸水ヲ貼ス

○癬風 *Pityriasis versicolor*

軟石鹼、或ハ加里石鹼精ノ塗擦ヲ行フテ、皮膚ヲ柔軟ニシ、白降汞軟膏、昇汞溶液(五百倍)、石炭酸酒精溶液(五十倍)等ノ塗擦ヲ行フ、最モ良効ヲ奏スルハ、グリソフアン酸軟膏(四倍)或ハ護亞粉(醋ヲ以テ稀泥トナス)是レナリ

第十篇

中毒症

第一節 急性中毒症

(緒論) 凡ソ毒物ノ急性作用ハ、或ハ只局處性ニシテ、其接觸シタル表面ニ於テノミ、化學的或ハ刺戟的ノ作用ヲ及ボスカ、或ハ汎發性ニシテ、己ニ吸收セラレタル後、種々ノ神經中樞(特ニ多シ)ニ、固有ノ作用ヲ逞ウスルカ、或ハ兩者同時ニ、併發スルニ在リ、是故ニ治法ノ自途ハ他ナシ、只腐蝕性ノ物質ヲ稀釋シ、或ハ中和シ、以テ其作用ヲ減弱セシメ、或ハ胃腸内ニ遺留スル所ノ殘毒ヲ排洩シ(吐法、胃唧筒、下劑)或ハ「アルカロイド」ノ鞣酸ニ逢フテ、沉澱物ヲ生スルカ如ク、不溶性或ハ難溶性(此際亦瀉下法モ、缺ク可ラサル者トス)或ハ無害性ノ



化合物ニ變化セシムルノ三法ニアリ。第一、毒物既ニ血中ニ吸収セラレ、其ハ胃及ヒ肺ヨリ或ハ皮下及ヒ皮下用法ノ後ニ於テ、之ヲ中和シ得ル極メテ稀レタル但シ氣狀毒物ニ在テハ可ナリ、硫化水素ノ章ヲ參觀スルニ、然レモ最初ニ夥多ノ刺絡ヲ施シ、後移血法ヲ試施スルニ殊ニ氣狀毒物ノ中毒症危篤ナル者ニハ、其奏効ヲ見ルヘシ一定ノ神經裝置ニ其作用ヲ過ウスル所ノ種々ナル毒物ノ侵襲ハ、反對ノ作用ヲ有スル佗ノ藥物ニ由テ、之ヲ制剋スルを得ヘシ(反對毒、殊ニアルカロイド)ニ屬スル者、但シ決シテ中毒量ヲ與フル勿レ、或ハ對症的ノ治法ヲ施ス、即チ虛脱ニハ、興奮藥ヲ與ヘ、強劇ノ腦充血ニハ、刺絡ヲ施シ、又青酸、斯篤里幾尼涅及ヒ毒性瓦斯ノ中毒ニハ、人工呼吸法ヲ行フ

刺戟性及ヒ腐蝕性中毒ノ症候ハ、劇烈ノ炎症、殊ニ第一道ノ炎症、腐痂ノ生成等ニシテ時トシテ、穿孔、出血ヲ來タス。アリ○中毒胃炎以テ部ヲ參考スヘシ。本篇中ニ記スル所ノ藥物ハ、一々用法、及ヒ用量ヲ示サス、蓋シ中毒ノ際ニハ、其毒ノ多少緩急ニ隨ヒ、之ヲ稀釋シ、中和シ、又ハ吐出スルヲ以テ、畢竟ノ目的トシ、尋常ノ諸病ニ於ケルカ如キ一定ノ用法ヲ墨守ス可カラサル者多ク、レ中ナリ

類(甲)固形及液狀毒物

第一、(一)無機性毒物

第二、(イ)腐蝕性無機酸ノ中毒

口内、及ヒ咽頭粘膜ノ腐蝕、困苦ナル咳嗽、痰狀、及ヒ血液狀物ノ吐出、腹痛、裏急後重、血便、間、頑固ノ便秘、虚脱ヲ以テ、其症候トス



或ハ包裹ス、之ヲ中和スルニハ、炭酸加爾斐謨、石灰水、炭酸麻  
偏涅斐謨、或ハ酸化麻偏涅斐謨ヲ(數茶匙宛水ニ和シテ)與ヘ、  
已ムヲ得サルキハ、佗ノ亞爾加里、石鹼水等ヲ用井ルヲアリ  
多クハ自ラ嘔吐ヲ催ス、但シ其嘔吐過劇ナル者ニハ、氷片、炭  
酸水、阿片等ヲ與フ

★成キ一(口) 金屬、非金屬及其化合物ノ中毒

又ハ抽出 ○亞爾加里及土類 Alkalien und Erden.

腐蝕作用ナキ加里中毒ニハ、興奮藥ヲ要ス、硝石ニハ、其佗吐  
劑兼與フルノ後、包攝藥(葛湯等)、鶏卵ノ蛋白、阿片等ヲ與フ  
濃厚腐蝕亞爾加里液ハ、之ヲ稀薄シ、中和シ、又ハ鹼化セシム  
ルニシ、即チ醋、枸橼汁、脂肪油等ヲ與フ  
格羅謨酸加留謨ニハ、炭酸麻偏涅斐謨或ハ重炭酸那篤留謨

及ヒ單舍利別ト、鐵粉トヨリ成ル所ノ稀粥等ヲ與フ  
腐蝕土類(殊ニ腐蝕石灰)ニハ、炭酸水、冷糖水、醋、炭酸亞爾加里、  
脂肪油、卵等ヲ與フ  
重土、及ヒ重土鹽類(其症候ハ、胃ノ炎性刺戟、嘔吐、胃部疼痛、頭  
痛、視力減少、眩暈、痙攣)ニハ、蛋白、硫酸亞爾加里及ヒ土類、瀉利  
鹽ヲ與ヘ(不溶解性ノ硫酸重土ヲ形成スルヲ目的トス)、催吐  
法(鹽酸亞剎莫兒比涅〇、〇〇五ヲ、皮下ニ注射ス)ヲ施ス

○安知母尼劑 Antimonialien.

虎列刺樣ノ吐瀉ヲ發シ、胃腸炎ヲ起ス  
稀薄且ツ緩和スルノ諸方(水、乳汁、脂肪油等)ヲ與ヘ、又ハ鞣酸  
ヲ含有スル諸質、規那丁幾、及ヒ鞣酸劑ヲ投シ以テ不溶解性  
ノ化合物ヲ形成スルヲ期ス







〔療法〕蛋白、牛乳、硫酸亞鉛ノ吐劑、瀉下藥、蓖麻子油乳劑等ヲ與フ  
 解毒劑トシテ、硫黃、硫酸亞爾加里或ハ硫酸麻偏涅叟謨(硫酸鉛ヲ形成スルヲ目的トス、但シ直チニ體內ヨリ排除セサルキハ猶ホ毒アリ、宜ク吐法、又ハ下劑ヲ併用スヘシ、己ニ得サレバ、明礬、磷酸鹽類、或ハ稀薄硫酸ヲ與フ、阿片劑ハ、夥多ノ排泄後ニ投ス可シ

○沃度及沃度化加留謨 Jod und Jodkalium.

多量ヲ頓服シタルヨリ發スル者、惡心、持久性嘔吐、吐瀉、痲痛、脈搏細數、及ヒ所謂沃度沈醉ヲ以テ、其症トス  
 澱粉、蛋白等ヲ與ヘ、且ツ對症療法ヲ施ス  
 (地) 急性重積作用ヨリ起ル者 (Jodismus acutus)

其症候ハ、前額痛、疼痛性壓迫、嘔吐、咽頭加答兒、結膜炎等ニシテ、間ト吐瀉(臭氣ナシ)、皮膚疹ヲ發スルアリ

沃度劑ノ服用ヲ休止スルヲ以テ緊要トシ、其他ハ、對症療法ヲ施ス

○貌羅謨化加留謨 Bromkalium (Bromismus).

重積作用トシテ、皮膚及ヒ粘膜、加之角膜ノ知覺鈍麻、咽頭炎、頭痛、記憶力減少、嗜眠、五官痲鈍、面皰狀ノ發疹、皮膚蒼白、全体衰弱、大小便失禁等

貌羅謨化加留謨ヲ服用ヲ休止シ、浴湯、蒸氣浴、下劑、液狀ノ滋養性食物ヲ與ヘ、冷水灌腸法ヲ施ス

○銅鹽類 Kupfersalze.

其症候ハ、胃腸炎ヲ發シ、銅味ヲ帶フル綠色物ヲ吐シ、痲痛、及ヒ裏急後重、譫語、及ヒ痲攣ヲ起ス

毒力ヲ稀釋スルカ爲メ多量ノ蛋白、牛乳、酸化麻偏涅叟謨、葡萄糖、蜂蜜等ヲ與フ(油類、及ヒ醋ヲ禁忌ス)、鐵屑、フェルロニ藏化加



留謨(一)ヲ加へ、又單舍利別ニ、鐵屑及ヒ硫黃華ヲ和シ製スル稀粥モ亦可ナリ

○磷 Phosphor.

其症候ハ劇烈ノ胃腸炎(但シ之ヲ必トセス)煩渴、虛脱、黃疸等ニシテ、其吐瀉物ハ蒜臭ヲ放チ、暗處ニ於テハ燐光ヲ發ス

胃唧筒ヲ用ウ、又吐劑、殊ニ硫酸銅(一回一〇頓服)ヲ與へ、之ニ次テ初メニハ每半時ニ、炭酸銅〇、二五乃至〇、五ヲ少量ノ水ニ和シ服セシメ、其際毎回半食匙ノ醋ヲ水ニ和シテ併用ス其間ニハ、寒冷ノ飲料、果物、氷等ヲ與へ、凡ソ二三時間ノ後、再ヒ硫酸銅ノ吐劑ヲ與ス

○水銀 Quecksilber.

(天) 腐蝕性水銀製劑ノ中毒

咽頭嫩灼及ヒ絞痛ノ感覺、腹部ノ劇痛、硬腫ノ感覺、間血液狀物ノ嘔吐、下利及ヒ裏急後重、虛脱、痙攣等ヲ以テ其症候トス

蛋白質、穀粉ヲ水ニ攪和スル者、牛乳、砂糖水、新タニ沉澱シタル含水硫化鉄綠礬溶液ニ、硫化亞爾加里ヲ和スルニ由テ得タル者、下劑等ヲ與フ

(地) 急性水銀中毒症

口内粘膜ノ加答兒及ヒ潰瘍、頸部疼痛、吐涎、齒牙動搖、口臭、發熱、惡心、下顎壞疽等ヲ以テ、其症候トス

水銀軟膏ノ外用ニ由テ發スルキハ、其殘留物ハ盡ク石鹼水ヲ以テ洗ヒ去リ、解凝劑殊ニ溫浴、薩爾沙根、沃度化加留謨等ヲ與へ、且ツ口内炎及ヒ吐涎ノ治療各其本條ヲ要ス

○硫肝硫化加留謨 Schwefelleber.

硫化水素ノ游離ルヲ以テ毒アリ



○氣狀毒物ノ中毒  
症ヲ參觀ス可シ

胃炎、嘔吐、眩暈、虛脱、心臓作用及ヒ  
呼吸ノ閉止ヲ以テ其症候トス

粘滑飲料、牛乳ヲ與ヘ、格魯兒瓦斯(注意セテ吸入セシム)ヲ用  
キ、又ハ人工呼吸法ヲ施ス

○亞鉛及錫鹽類 Zink- und Zinnsalze.

惡心、嘔吐、下利、煩渴、四肢振顫、胃腸  
炎、腹痛、虛脱等ヲ以テ其症候トス

蛋白、牛乳、鞣酸、重炭酸那篤、留謨等ヲ與フ

(二) 有機性毒物 Organische Gifte.

○羯答利斯芫菁 Canthariden.

劇烈ニシテ尿、血液ヲ維ユル嘔吐、強劇ノ腸痛、咽頭痙攣、吐  
涎、利尿管迫、血尿、淫慾、熾盛、五神昏憒等ヲ以テ其症候トス

催吐藥及ヒ緩下藥ヲ與ヘ、爾後粘滑飲料(油類ヲ禁忌ス)、少量

ノ樟腦ニ阿片ヲ伍スル者ヲ投ス、琶布及ヒ水蛭ヲ腎臟部ニ  
貼ス

○魚肉中毒 Fischgift.

虎列刺、棘ノ吐瀉、腹痛、但シ亦便秘スル者ナキニアラス、嚥下困難、  
嘔吐、上眼瞼下垂、及ヒ視覺障害、非常ノ衰弱、精神錯亂、痙攣、血斑等  
ハ諸症ヲ以テ死ニ陥リ、或  
ハ徐々ニ回復スルヲアリ

排瀉法ヲ主トス、毒物胃ニ在レハ瀉下セシム、爾後興奮的ノ對症  
療法ヲ施シ、嘔吐過度ナルキハ、之ヲ鎮靜シ、芥子泥ヲ胃部ニ  
貼ス

○毒蛇咬傷 Schlangenbiss.

眩暈、惡寒、倦怠、手足厥冷、瞳孔散大、痙攣、呼吸困難、嚥下困難、嘔吐、黃  
疸、出血ノ狀況、強劇ノ局處腫起、膿瘍形成(動モスレハ脱疽ニ陥ル  
ヲアリ)ヲ其  
症候トス

最モ咬傷部ニ接近セタル適當ノ肢節ヲ緊紮シ、以テ毒血ノ



内進ヲ禦キ、創傷ヲ吸引シ、其口内ニ創傷等アル者ハ、此吸引ヲ行フ可カラス、亂刺シテ後、血角ヲ貼ス、又烙鐵、苛性加里、安母尼亞水等ヲ以テ其局處ヲ腐蝕シ、硝酸斯篤里幾尼涅ヲ内服シ、又ハ皮下ニ注射ス、内服、及ヒ皮下注射ノ量ハ、一日一回〇、〇〇五、

○昆蟲螫傷 Arthropodenstiche.

創傷ヲ壓搾シ又ハ吸引シ、安母尼亞ヲ以テ、其毒ノ酸性ナル者ヲ中和ス、石灰水ヲ應用スルモ亦可ナリ、且ツ冷罨法ヲ施ス

〔口〕 毒性有機酸及其化合物ノ中毒症

○ 蓼酸 Oxalidine.

其濃厚液ハ、局處ヲ腐蝕シ、(咽頭絞窄ノ感覺、血液ヲ維ユル嘔吐、腹痛)又麻酔的ニ腸及ヒ脊髓ヲ侵襲ス(精神迷蒙、知覺鈍麻、關節運動困難、心臟麻痺、呼吸)

解毒劑ニハ、石灰水、又苛性麻偏涅矢亞、白堊、卵殼等ヲ與フ、但シ亞爾加里及ヒ安母尼亞ハ、蓼酸ニ逢フテ毒性ノ化合物ヲ構成スルカ故ニ用ウ可カラス、自ツカラ嘔吐ヲ催サ、ルキハ吐劑ヲ與フ、其景況ニ因テ興奮藥ヲ投ス

○ 石炭酸 Carbolisäure.

大參兒、結麗阿曹、篤亞尼林、ニトロペンツォール(即チ人工苦扁桃油)、ヒリクン酸モ亦同シ、其少量ニ於テハ、(一回量〇、八一日量二、〇)、倦意、頭痛、眩暈、冷汗、嘔氣、嘔吐、利尿、窘迫、加之、腎炎等ヲ發ス、腐蝕作用ヲ起スヘキ大量ハ、局處ノ腐蝕、嘔吐、昏倒、知覺乏絶、臨死ノ精神變常、眩暈、譫語、絶脈、急劇ノ虚脱ヲ以テ其症候トシ、呼吸ニ參兒臭ヲ帶フ、胃唧筒、刺絡、緩和藥、蛋白質、牛乳、沉降製炭酸加爾叟謨、阿列布油、或ハ甘扁桃油ニ蓖麻子油ヲ配伍スル者、興奮藥、洗腸、皮膚刺戟法等ヲ用ウ



持久性ノ者ニハ、硫酸那篤留謨一回量一五、〇乃至三〇、〇等ヲ稱用ス

○青酸 Blausäure.

窒息毒ノ部ニ出ツ、就テ見ルヘシ

〔八〕植物性及有機性物質ノ中毒

〔天〕刺戟性物質 Acria.

一般ノ症候ハ、口内及ヒ咽喉ニ於ケル灼熱及ヒ苦辣ノ感覺、胃腸炎、接觸セル粘膜ノ腫起、嘔吐、下利、裏急後重等ナリ

〔第一〕刺戟力ヲ有スル者、即チ海葱、薩昆那、瑞香、歐仿爾繆謨、白屈菜、數多ノ毛茛科、白頭翁屬、強烈ノ胡椒及ヒ芥子屬

〔第二〕刺戟性ニシテ、強キ瀉下作用ヲ有スル者、即チ巴豆、蘇甘沒紐謨、越刺的留謨、藤黃、古魯聖篤「プリオニア」等

〔第三〕刺戟性ニシテ、殊ニ麻醉性作用ヲ有スル者 神經毒ノ部ヲ參考

シテ可即チ古爾矢屈謨、魯別利亞、リグストルム、ウルガーレ、蠟樹、勿刺篤留謨、歌列僕里、撒拔實爾刺、スタフニス、アグリア、白頭翁、木本黃精葉鉤吻、デルフイニウム、オレアンデル「ナスチービス、ラブルスム」皮等

療法ハ、吐劑、下劑、緩和藥、氷、局處瀉血、阿片、鞣酸ヲ與フ、其他ハ中毒性胃腸炎ノ章ヲ參考スヘシ

〔地〕筋及ヒ神經ニ對スル毒物(麻醉性

物質) Muskel- und Nervengifte (Narcotica).

〔一〕腦ニ對スル物質 Cerebralgifte.

○阿片 Opium. Papaver.

頭痛、惡心、嘔吐、非常ノ困倦、恐怖、妄語、狂走狀ノ發作、又ハ沉睡、譫語、健忘等ヲ以テ其症候トシテハ痙攣ヲ發シ、瞳孔大ニ收縮シ、脈搏呼吸甚ク遅緩及ヒ不整ナリ、起シ、流汗、皮膚ニ淋漓ス



強劇ノ催吐藥ヲ與ヘ、胃唧筒ヲ使用ス（數時間ヲ經タル後ニ於テモ仍ホ行フテ可ナリ）  
解毒藥ニハ、鞣酸及ヒ硫酸亞篤魯必涅〇〇〇一、乃至〇〇〇  
三ヲ皮下ニ注射スヲ與フ

對症療法ニハ、斷ヘス患者ヲ拉シテ運動セシメ、冷灌法ヲ施  
ス、虛脫ニ陥ル者ニハ、興奮藥殊ニ濃厚ノ咖啡、樟腦（皮下ヲ與フ、又已ニ阿片ヲ排瀉シタル後ニ於テ、植物酸ヲ用キレハ大ニ其症候ヲ輕減セシムルコアリ）

○酒精類 Alcohol.

其症候ハ、即チ醋酐ノ甚シキ者ナリ

寒捲法及ヒ冷水灌漑法ヲ施シ、誘導法ヲ行ヒ、又瀉血法（水蛭等）加之刺絡ヲ施ス、アアリ（腦充血ノ部ヲ參考スヘシ）  
内用ニハ、濃厚ノ咖啡ニ、枸橼汁ヲ加フル者、安母尼亞水八乃

至十滴ヲ水ニ和スル者、炭酸水等ヲ與フ

(11) 腦脊髓ニ對スル毒物 Cerebrospinalgifte.

○抱水格魯刺爾 Chloralhydrat.

虛脫、冷汗、長深ナル肝息、狀ノ呼吸、結膜潮紅、瞳孔散大、唇色紫青、下顎墜垂、脈搏初メ強且ツ緩、終リニ細數ナル等ヲ以テ、其症候トス

胃唧筒、人工呼吸法、摩擦、及ヒ強烈ノ温煖法等ヲ施シ、心臟麻  
痺ニハ、斯篤里幾尼涅ノ皮下注射ヲ行ヒ（其用量初メハ〇、〇  
〇三、後ニハ之ヨリモ少量ヲ反復ス）麝香、樟腦、依的兒（皮下注  
射又ハ内  
等ヲ與フ）

○別刺敦那、莨菪、曼陀羅華及ヒ菲沃斯

*Belladonna und Stramonium, Hyoscyamus, Atropin*

瞳孔散大、視覺昏槽、脈搏及ヒ呼吸ノ促進、咽頭及ヒ皮膚ノ乾燥、沈  
醉及ヒ譫語等ヲ發シ、又ハ狂走ニ次クニ嗜眠ヲ以テシ、間ニ嘔吐、腹



痛、下利(殊ニ其子實ヲ誤食スル時)等ヲ起スヲアリ

胃ノ内容物ヲ排出シ、鞣酸、動物炭、沃度、鹽酸莫兒比涅(O、O三ヲ皮下ニ注射ス)、或ハ加刺拔兒豆、耶僕蘭日葉等ヲ解毒藥トシテ與ヘ、又ハ多量ノ亞爾箇保爾飲料ヲ投ス、其他更ニ對症療法ヲ施スヘシ

○[ニコチン]

烟草 Nicotin.

眩暈、頭痛、嗜眠、及ヒ精神遲鈍、倦怠ノ感覺、疼痛、惡心、嘔吐、瞳孔縮小、冷汗、虛脫、搐搦性痙攣等ヲ以テ、其症候トス

解毒藥ニハ、鞣酸ヲ與フ、其他ハ對症療法、人工呼吸法等ヲ施ス

(三) 脊髓ニ對スル毒物 Spinalgifte.

○番木鱈 Strychnos (Nux vomica).

動直、緊張、筋搐搦、強直、之ニ繼起スル呼吸困難、大煩悶、及ヒ不穩、青色、瞳孔散大等ヲ以テ、其症候トシ、人事不省ハ、後期ニ至テ發ス、最モ僅微ノ外來刺激モ、亦前症ノ發作ヲ誘起ス(反射症)

吐劑ヲ投シテ、毒物ヲ排出シ、已ニ時間ヲ經タル者ハ、蓖麻子油又ハ巴豆油ヲ投シテ、瀉下ヲ促シ、鞣酸、沃度丁幾(十乃至三十滴ヲ水ニ和シ、反復飲用ス)ヲ與ヘ、鹽酸莫兒比涅ヲ皮下ニ注射シ、抱水格魯刺爾ヲ内服シ、亞硝酸亞密爾二乃至三滴、又哥囉仿謨(頻回)ヲ吸入シ、平流電氣ヲ延髓部ニ施シ、人工呼吸法ヲ行フ

○加拉拔兒豆 Faba Calabarica.

嘔吐、非常ノ困憊、其甚タシキニ至テハ、全身不遂、遺溺、及ヒ遺尿(蠕動機ノ亢進ニ基因ス)、吐涎及ヒ發汗ノ過多、瞳孔縮小、呼吸困難、漸次進歩スル脈搏遲慢、及ヒ體溫低降等ヲ以テ、其症候トス

嘔吐ヲ催進シ、解毒藥トシテハ、斯篤里幾尼涅或ハ亞篤魯必



涅等ヲ與へ、人工呼吸法、強劇ノ興奮劑、温煖法、其他對症療法ヲ施ス

(四) 主トノ心臟ニ對スル毒物 Herzgifte.

○烏頭 附子(雙鸞菊) Aconit.

咽頭痛、舌上攪痒、胃痛、頑固ノ便秘、呼吸困難、筋弱、其甚タシキニ至テハ、筋ノ不遂、瞳孔散大、皮膚ノ厥冷、及ヒ知覺減少、心臟作用ノ遲慢及ヒ休絶等ヲ以テ、其症候トス

吐劑、及ヒ下劑ヲ以テ毒質ヲ排瀉シ、解毒藥ニハ、鞣酸及ヒ沃度ヲ與へ、又心臟ヲ興奮スルノ療法ヲ施ス

○實荳答利斯 Digitalis

嘔吐、下利、脈搏非常ノ減少(一分時間四十搏以下)、呼吸困難、虛脫、昏睡等ヲ以テ、其症候トス

吐劑又ハ鞣酸ヲ與へ、強力ノ興奮劑、樟腦、依的兒、葡萄酒、咖啡、安母尼亞等ヲ投ス

○勿拉篤里涅 白藜蘆 Veratrinum. Helleborus albus.

強劇ノ嘔吐(筒ノ血液ヲ混ス)、呃逆、下利、胃ノ灼痛、虛脫、○脈搏及ヒ體温ノ低降(呼吸緩慢、搐搦狀痙攣、人事不省等ヲ以テ、其症候トス

鞣酸、興奮劑、安母尼亞、茴香精、緩和藥、阿片等ヲ與へ、對症療法ヲ施ス

○古爾矢屈謨 Colchicum.

惡心、及ヒ持久性ノ嘔吐、痙攣、下利、及ヒ裏急後重、脈搏沈降、筋弱、顔色憔悴、虛脫、眩暈(但シ神識ヲ失ハス)等ヲ、其症候トシ、稀レニ、昏睡及ヒ痙攣ヲ發ス

鞣酸ヲ與へ、排泄法(吐藥又ハ瀉下藥)、興奮法、對症法ヲ施ス

(人) 窒息性毒物

○青酸及ヒ藏化加留謨已下ノ青素化

合物 Cyanverbindungen.



呼吸困難、筋弱、四肢厥冷、人事不省、瞳孔散大、痙攣、窒息性痙攣ヲ以テ其主徴トシ又窒息者ノ如ク青色ヲ呈シ、甚タシク青酸ノ臭氣ヲ放ツ

〔療法〕 胃ノ内容物ヲ排出シ(胃唧筒)亞篤魯必涅ヲ皮下ニ注射シ(一回〇、〇〇一)興奮藥ヲ與ヘ又安母尼亞ヲ靜脈中ニ注入ス(注意スヘシ)温浴ヲ取ラシメ其際頭部ニ冷水ヲ灌注ス其他人工呼吸法ヲ施フ

〔乙〕 氣狀毒物

○硫化水素 Schwefelwasserstoff

悪心、全身衰弱、恐怖及ヒ苦悶、脉搏遲慢及ヒ中止、呼吸増進、次ニ過止、瞳孔散大、痙攣(窒息性痙攣)ヲ以テ其症候トス  
人工呼吸法ヲ施シ格魯兒瓦斯ノ稀釋セル者ヲ吸入セシメ

(硫化水素ヲ分解スルノ目的ヲ有ス)安母尼亞水ヲ靜脈中ニ注入シ且ツ對症療法ヲ施ス

○酸化炭素、沼氣及燈用瓦斯 酸化炭素、沼氣、水素、炭化水素

類ノ混合 Kohlenoxyd, Sumpfgas, Leuchtgas etc.  
頭痛、倦怠、眩暈、麻痺、言語、知覺、乏絶、痙攣、間歇性ノ呼吸、心臓作用ノ減弱、青色、呼吸閉止ヲ以テ其症候トス

新鮮ノ空氣ヲ呼吸セシメ、人工呼吸法、冷水ノ灌漑、皮膚刺戟劑、麥角越幾斯(エルゴニン)ノ皮下注射等ヲ施シ興奮劑ヲ與フ

○炭酸 Kohlensäure

其症候ハ、呼吸増進シテ、畢ニ強劇ノ呼吸困難ト爲リ、頭痛、眩暈、麻痺、視覺及ヒ聽覺ノ亡失、瞳孔散大、全身痙攣(ワット橋中ノ痙攣中樞ノ刺戟)ヲ發シ、終リニ假死症ニ陥リ、其脉搏ハ少量ニ於テハ、毫モ變化セス、或ハ僅ニ増進スルノミナリト雖モ、通常ハ其緊張ノ度ヲ増加シ、迷走神經中樞ノ興奮ニ依テ、減降スルモノトス



新鮮ノ空氣(酸素)ヲ呼吸セシメ、與舊藥ヲ與ヘ、對症療法ヲ施ス

○依的兒及嘔囉仿謨 Aether und Chloroform.

運動神經機ノ痙攣ニ依テ、卒然心臟作用ヲ休止セシムルニ由リ、或ハ延髓中呼吸中樞ノ痙攣ニ由テ、卒死ヲ招ク、而シテ其痙攣ハ、或ハ急卒ニ發シ、或ハ漸次炭酸中毒ノ諸証候ヲ呈シテ、久シク呼吸困難且ツ淺短ト爲ルノ後ニ發ス、又舌ノ弛緩ヲ呈シテ、自カラ後方ニ牽キ、以テ器械的ニ呼吸ヲ妨礙スルノ屬之アリ

舌ヲ牽出シ(下顎ヲ牽引スルモ、亦同一ノ効ヲ奏ス)、胸部及ヒ顔面ニ冷水ヲ撒布シ、鼻及ヒ喉頭粘膜ヲ、輕易ニ刺戟シ、頭部ヲ低下シテ人工呼吸法ヲ施ス、而シテ之ヲ行フハ、(甲)種々ノ器械的方法ニ由リ、殊ニ胸膈ヲ壓迫シ、又卒然其壓ヲ除去スルノ術ヲ反復交換スルヲ最佳トシ、或ハ(乙)扁平ノ電極ヲ喉頭ノ兩側ニ抵テ、以テ橫膈膜神經ニ電氣刺戟ヲ受ケシメ、或

ハ(丙)心臟作用ノ停止スル際ニハ、心臟ノ部位ヲ衝突シ、又ハ心臟部ニ電氣鍼刺法ヲ施スニ在リ

第二節 慢性中毒症

慢性中毒ノ原因タル者ハ、硝酸銀、砒石、鉛、水銀、亞鉛、燐、沃度、亞爾箇保爾、阿片、抱水格魯刺爾、烟艸、麥角、硫化炭素等ナリ

○慢性硝酸銀中毒 Chronische Silbervergiftung.

其症候ハ、皮膚ニ黝灰色ヲ呈シ、全身困憊ノ感覺、頭部體閉、記憶力乏少、背筋攣縮、咽頭及ヒ歐氏管ノ加答兒、視力昏惰、慢性胃腸加答兒、蛋白尿(腎臟炎)等ナリ

其療法ニハ確實ノ者ナク、只硝酸銀劑ノ藥用ヲ停止スルヲ以テ足レリトス

○砒石惡液質 Arsenikkrachexie.



初期ノ症候ハ、胃部壓痛、嘔吐、下利、不眠、眩暈、四肢顫慄、咽喉乾燥、結膜炎等ニシテ、其他迷ニ精神遲鈍、憂鬱、皮膚乾燥、發疹、夜間發熱、咳嗽、苦悶、食欲減少、羸瘦、痿痺等ヲ起ス

主トシテ其原因ニ遠サカリ、蒸氣浴ヲ以テ新陳代謝機ヲ亢進シ、強壯藥殊ニ鐵劑ヲ投シ、滋養性ノ食料ヲ取ラシメ、又礮砂ハシノノ氏ノ法中及ヒ器官中ニヲ與ヘ、其他對症療法ヲ施ス

○礮砂 精製甘艸羔各五〇 水二〇〇〇 右每時、一食匙

慢性鉛中毒 *Saturismus chronicus.*

(イ) 鉛毒疝 疝痛ノ條ヲ見ルヘシ

(ロ) 鉛毒關節痛 例之ハ鉛毒股關節痛ノ如シ、殊ニ風筋ノ定處間歇性疼痛ニシテ持久スルハ其部枯瘦ス

其他鉛毒顫慄、痙攣、痲痺、急痲及ヒ鉛毒痿痺、伸筋等モ亦之ニ屬ス

下劑、溫浴、沃度化加留謨、貌羅謨化加留謨、麻酔藥、瓦爾華尼電氣(局處或ハ交感神經ニ施ス)、斯篤里幾尼涅、冷灌法、強壯藥等ヲ撰用ス

○蓖麻子油五〇〇 巴豆油二滴 右每一時一食匙、快利ヲ得ルヲ度トス

○沃度化加留謨二〇乃至三〇 貌羅謨化加留謨八〇 水二〇〇〇 苦味丁幾四〇 右每二時一食匙

○阿片〇〇三 白糖〇五 右數包ヲ作り、每一時一包ヲ服シ、鎮痛ヲ度トシ、止ム

○亞硝酸亞密爾三滴 右綿絮ニ浸シテ吸入ス

○硝酸斯篤里幾尼涅〇〇五 蒸餾水一〇〇 右一日一筒ヲ皮下ニ注射ス



(一) 鉛毒腦病  
姑息的ノ對症療法ヲ施ス、即チ瀉下性ノ浣腸、發泡膏ヲ施シ、胸部ニ乾角ヲ貼ス、強劇ノ消炎法ハ不可ナリ

(二) 鉛毒勞

強壯劑(鐵)、硫黃浴等ヲ撰用シ新鮮ノ空氣ヲ呼吸セシム

慢性水銀中毒 *Mercurialisimus chronicus.*

水銀職工ノ汞毒、頭暈、

主トシテ、其原因ヲ遠サケ、口内ヲ清潔ニシ(五十倍ノ格魯兒酸加留謨溶液ヲ以テ含嗽ス)解凝藥殊ニ決度化加留謨、發汗藥、蒸氣浴、硫黃浴、強壯藥等ヲ撰用シ、滋養性食料ヲ取ラシム  
○決度化加留謨 二〇〇 單舍利別 一五〇 水 二〇〇〇  
下 右 每 二 時、一 食 匙

○ 挖物兒氏散 〇、五

右頓服量

慢性亞鉛中毒 *Chronische Zinkvergiftung.*

消化機ノ障害、衰弱、水血ニ基因スル水腫等ヲ以テ、其症候トス

先ツ亞鉛劑ノ藥用ヲ止ムル等其原因ヲ避ケ、爾後強壯藥ヲ投与、滋養性食料ヲ與フ

慢性磷中毒 *Chronische Phosphorvergiftung.*

其症候ハ、胃部ノ諸患、口臭ヲ帶フル噁氣、眩暈、倦怠、顔色不其、氣管支炎、結核、疼痛如裂、頸骨ノ骨膜炎、并ニ該部ノ腫脹等ナリ

外科的ノ對症療法ヲ施シ、強壯藥ヲ與ヘ且ツ滋養性ノ食料ヲ取ラシム

慢性沃度中毒 *Iodismus chronicus.*

其症候ハ、食欲缺乏、消化機障害、嘔噎等ニシテ、自餘ハ急性沃度中毒ノ症狀ニ同シ、神經系統ヨリ發スル症候ハ、不安、輕易ノ興奮、頭痛、不眠、四肢顫慄、心悸、全身衰弱、羸瘦、腺ノ消耗等ナリ



其療法ハ沃度劑ノ藥用ヲ停止シ、注意シテ強壯療法ヲ施セ  
ハ足レリ

○慢性亞爾箇保爾中毒 Alcoholyscrasie.

精神及ヒ身體ノ衰弱、慢性咽喉胃腸加答兒、震盪、譫妄、  
其他精神的ノ異常症候、不眠等ヲ以テ其症候トス

主要ナル現症及ヒ器官的ノ疾患ヲ療ス、特ニ之ニ稱用スル  
藥物ハ、苦味藥健質亞那、規那、番木鱈、炭酸亞爾加里、次硝酸蒼  
鉛、阿片(〇、〇五乃至〇、一)、抱水格魯刺爾(一、〇乃至二、〇)ノ神經症  
用等ナリ、其他溫浴、冷灌法等ヲ施ス

○龍膽浸(一〇、〇)ニ〇〇、〇 單舍利別一五、〇 右每

二時、一食匙

○番木鱈丁幾二〇、〇 苦味丁幾二〇、〇 右每食後

十五滴ヲ服ス

○規那煎八、〇)ニ〇〇、〇 單舍利別一五、〇 右每二

時、一食匙

○重炭酸那篤留謨五、〇 苦味丁幾三、〇 水二〇〇、〇

右每二時、一食匙

○次硝酸蒼鉛五、〇 重炭酸那篤留謨二〇、〇 右一

日三回、一小刀尖ヲ服ス

瀉血ヲ禁忌ス

○慢性阿片中毒 Chronische Opiumvergiftung.

一其服量過多ナルハ、久シク之ヲ持重スルモ、著明ノ害ナシ  
ト雖モ、多量ナルハ、胃腸加答兒、矢荷兒、陪克性齒齦、非常ノ羸瘦、  
四肢顫慄、精神遲鈍、及  
ヒ五神錯誤等ヲ起ス

阿片劑ノ藥用ヲ停止シ、興奮的ノ對症療法ヲ施ス

○慢性莫兒比涅中毒 Morphinismus.



顔面蒼白、發汗過多、發疹、重視、瞳孔縮小、或ハ不同、不眠、神經痛、其作多般ノ神經障害、蛋白尿、間歇熱ヲ以テ其症候トス

徐々ニ莫兒比涅劑ノ服用ヲ減少セシムルヲ最佳ノ療法トス但シ休藥若キ急遽ニ過キテ困難ヲ來スコトアルトキハ、一時鹽酸莫兒比涅ノ皮下注射(〇、〇一)ヲ施シ、以テ之ヲ退クベシ

慢性抱水格魯刺爾中毒 Chronische Chlorhydratvergiftung.

其症候ハ、結膜炎、瞳孔縮小、發疹、殊ニ喉熱ノ感アルモ、潮紅疹ニシテ、纒ニ亞爾爾保爾性飲料、或ハ温燻ノ食物ヲ取ルモ、亦能ク之ヲ喚起ス、又呼吸困難ノ發作アリ

先ツ該藥ノ服用ヲ停止シ、爾後、強壯劑ヲ與フレハ、足レリ

烟艸中毒 Nicotianismus.

呼吸困難、咽喉及喉頭加答兒、結膜炎、心悸、四肢顫慄、依ト昆哇兒、精神ノ變換等ヲ以テ、其症候トシ、間、視力減弱、黒内障ヲ起ス

烟草ヲ停止シ對症療法ヲ施ス

麥角中毒 Ergotismus.

壞疽性ノモノハ手足ニ乾潤性壞疽ヲ發シ、壞疽部ニ經界線ヲ發シテ脱落シ、其際發熱、毒血症ヲ起ス

眩暈、眼花、耳鳴、殊ニ手足指ノ蟻行感覺及吐下ヲ起シ、其甚メキニ至テハ、筋肉痙攣ヲ發ス、壞疽性ノ者ハ、外科的對症的、防腐的ノ諸療法ヲ施シ、痙攣性ノ者ハ、麻醉藥及ヒ、迷朦藥ヲ發作時ニ與フ、又瀉下藥、強壯藥及ヒ、滋養性ノ食料ヲ與ス

醫通譯



醫通附錄

第一篇

診查要訣

第一章 コルソン氏診查整體法

- (一) 鎖骨部ヲ露出セシムルニハ兩側ノ手關節ヲ腰部ニ於テ相合シ肩胛ヲ後方ニ牽掣ス
- (二) 肩胛骨部ヲ露出セシムルニハ兩腕ヲ頭上ニ於テ交叉セシム
- (三) 上肩胛骨部ヲ露出セシムルニハ腕ヲ前ニ交叉シ兩手ヲシテ各反對セル側邊ニ置カシム
- (四) 下肩胛骨部ヲ露出セシムルニハ手ヲ以テ各反對セル側邊ノ肩胛ヲ把握ス

第二章 心臟部位ノ要點

僧帽瓣(一)○心尖鼓動ノ位置ハ第五左肋骨間ニ於テ妙シク乳頭ノ内下方ニ在リ(「ハトック」音ナリ)

三尖瓣(一)○胸骨右緣及ヒ胸骨上ニ位シ恰モ第五右肋骨ノ附著點ニ適合ス

大動脈(一)○密ニ胸骨右緣ニ接著シ恰モ第二右肋骨間ノ内部ニ適合ス

肺動脈(一)○密ニ胸骨左緣ニ近接シ恰モ第二左肋骨間ノ内部ニ適合ス

胎兒心音(十八週乃至二十週ヨリ始マシ)百二十乃至百六十至以上○胎兒ノ位置正常ナル時ニ於テハ左側膈骨前下棘



ノ方向ニ於テ臍部ニ偏在ス。第三章 心臟ノ濁音部

真正ナル心臟濁音部ノ形勢ハ一ノ角線ニ符合ス而シテ其

尖端ハ第四左肋骨ノ胸骨附着部ニ位シ其一脚ハ之レヨリ

外部及ヒ上方ニ凸隆スル弧線ヲ爲シテ心尖鼓動部ニ向テ

進シ佗ノ一脚ハ或ハ胸骨左緣ニ傍テ直下シ或ハ之ヲ超過

シテ微ニ弧線狀ヲ爲シ胸骨中線ニ向テ下行ス

下方ニ於テハ心臟濁音直ニ肝臟濁音ニ變移ス

第四章 肺臟ノ經界

尖端部前面ノ上方ニ於テハ其清音鎖骨上緣ノ上三、五、セ

ノトニ達シ其後面ノ上方ニ於テハ第七頸椎ノ棘狀

突起ノ横端ヲ横過シテ存スルト想像スルキ所ノ平面ニ達

ス

其基部ハ右ノ方、肝臟ノ經界ニ至リ左ノ方、副胸線ニ於テ

ハ、心臟ノ濁音部ニ、乳線ニ於テハ、第七肋骨ノ上緣ニ、腋線ニ

於テハ、第八肋骨間ニ、肩胛線ニ於テハ、第八肋骨ニ、脊梁ニ沿

フテハ、第十一肋骨ニ達ス

第五章 肝臟ノ濁音部

上方ノ經界ハ殆ント地平線ノ狀ヲ爲シテ右胸半ヲ環走シ

右副胸線ヲ第六肋骨ニ於テ、乳線ヲ第一肋骨間ニ於テ、腋線

ヲ第七肋骨ノ下緣ニ於テ、肩胛線ヲ第九肋骨ニ於テ交截シ

第十一肋骨ニ於テ脊柱ト會ス

矮短ノ人ニ在テハ肝臟經界ノ上部、心尖鼓動ノ位置ト共ニ

間ニ肋間高ク存在スルヲアリ



其下方ノ經界ハ腋線ニ於テハ少シク肋骨弓ノ上方ニ位シ  
第十或ハ第十一肋骨間乳線ニ於テハ肋骨下縁稀レニ一乃  
至一五センチメートル下方ニ位シ中線ニ於テハ略ハ劍狀突  
起ト臍トノ中間ニ位シ之ヨリ斜メニ心尖鼓動ニ向テ上方  
ニ赴ク

### 第六章 脾臓ノ打診

此打診ヲ行フニハ或ハ直立ノ位置ニ於テシ或ハ仰  
臥ト右側臥トノ中間ニ於ケル斜線様ノ位置ニ於テ  
其敲打ハ輕々ニ行フ可シ打診上確定スルコトヲ得ルニ只脾  
ノ前縁ノミ、所謂幅員下章ヲ參ノ増大及ヒ前界ノ變換ヲ診  
定スルヲ以テ要點トス

其上界(肺脾界)ハ腋線ニ於テハ通常第八肋骨間或ハ第九肋  
骨ニ在リ  
脾ノ下界ト上界トノ距離(即チ脾臓濁音部ノ幅員、第九肋骨  
ト第十一肋骨トノ間ニ在リ)ハ鉛直ノ方向ニ於テ五乃至六  
センチメートルトルニ當ル  
脾ノ前界ハ正常ノ景况ニ於テ肋關節線第十一肋骨ノ尖端  
ヨリ鎖胸關節ノ方位ニ引ク所ノ線ナリヲ超過スルコトナク  
且ツ肋骨弓ヲ遠サカルコト四乃至五センチメートルノ位置  
ニ在リ  
後方及ヒ下方ニ於テハ脾臓ノ濁音ハ腎臓ノ濁音ニ變移ス  
結腸及ヒ胃ノ充盈ハ打診ヲ妨礙スル者トス

### 第七章 肋骨計數法



肋骨ヲ計數スルハ左ノ諸件ニ憑依スレハ大ニ便宜ヲ得ヘ  
 第二肋骨以下第七ニ至ル迄ハ肩胛骨下ニ在リ第七ハ肩胛  
 下隅ニ位ス  
 第四肋骨ハ其前端ヲ以テ乳頭ノ水平線内ニ在リ  
 手肘ヲ牽着シ身體ヲ直立スル時ニ當リ臂關節尖端ノ觸合  
 スル所ハ即チ第九肋骨全徑ノ中點ニ當ル  
 第十一及ヒ第十二肋骨ハ共ニ容易ク肋骨弓ノ後角ニ於テ  
 觸知ス可シ故ニ之ヨリ上方ニ肋骨ヲ數フヘ  
**第八章 胸廓ノ周圍**  
 手ヲ地平形ニ伸舉シ肩胛下隅及ヒ乳頭ニ密接シテ測ルト  
 キハ男子ニ於ケル胸廓周圍ノ平均ハ左ノ如シ

氏從

最深ノ吸息ニ於テハ十五歳八十九セシメ  
 最深ノ呼息ニ於テハ八十二セシメ  
 胸廓ノ擴大シ得ヘキ  
 平均尺度即チ吸息ト呼息トノ差ニハ大抵  
 而シテ此尺度ト体重及ヒ身長トノ關係ハ左ノ如シ  
 吸息周圍ノ一セシメトルハ六五八〇瓦ノ體重及ヒ  
 一八セシメトルノ身長ニ相當ス  
 呼息周圍ノ一セシメトルハ七一〇〇瓦ノ體重及ヒ  
 二セシメトルノ身長ニ相當ス  
 呼吸ノ差一セシメトルハ八二三九〇瓦ノ體重及ヒ  
 二三〇セシメトルノ身長ニ相當ス



歐洲ニ於テハ七十五立方センチメートル呼吸容量以下ノ者ハ通常兵士ニ編入セズ澳國ノ兵制ニ隨ヘハ凡ソ兵士タル者ハ其胸廓ノ周圍半身ノ長サニ超コルコト乃至ニツォルコトヲサレ可カラスト又露國ニ於テハ甲ノ乙ニ超ユルコトハセンチメートルナラサル可カラストセリ

### 第九章 一分時間ニ於ケル呼吸ノ平均數

フォーゲル氏ニ從ヘハ就眠ノ嬰兒ニ在テハ一分時ノ呼吸數平均四十六、四ニシテ醒覺時ニハ大抵之ヨリモ多數ナリトス、一年ノ小兒ニ在テハ平均四十乃至四十四、五年ノ小兒ニ在テハ平均二十六、十年ニ至レハ平均二十、十五年ヨリ二十年ニ至ル迄ハ平均十八、二十五年ニ於テハ平均十四乃至十六度ノ呼吸ヲ爲ス

### 第十章 脉搏平均數

フォーゲル氏ニ從ヘハ就眠ノ嬰兒ニ在テハ一分時平均百九至ト爲ス(最小數九十二、最大數百三十六)而シテケテレー氏ハ左ノ脉搏平均數ヲ算出セリ(但シ安靜ノ状態ニ在テハ其數必ス之ヨリモ減少スヘシ)

一年ニ於テハ二百三十至、二年ニ於テハ百十至、三年ニ於テハ百〇八至、五年ニ於テハ百〇三至、十年ニ於テハ九十一至、十五年ニ於テハ八十二至、廿年ニ於テハ七十四至、廿五年ニ於テハ七十二至、六十年ニ至レハ脉搏再ヒ増加シテ七十五至ニ昇リ、更ニ高齡ニ至レハ殆ソト七十九至ニ達ス

呼吸ト脉搏トノ關係ハ二ト九トノ比例ニ在リ(則チ一呼吸



間三四五ノ脈搏ヲ得ヘシ  
第十一章 分娩期預算法

出生ノ期日ヲ預定スルニハ最後ノ月經ヲ得タル月日ヨリ  
三箇月ヲ減(還算)シ之ニ加フルニ七日ヲ以テスヘシ即チ最  
後ノ月經ヲ得タル月日ハ十月二十日ナリトスレハ之ヨ  
リ三箇月(即チ七月二十一日迄)ヲ減算シ之ニ七日ヲ加ヘタ  
ル者ハシテ七月二十七日ナリトスルニハ

第十二章 妊娠ノ鑑識(シュリョーデル氏ノ法)

第二月○子宮ハ中等ノ橙實大ト爲リ肥厚且ツ硬固ナリ(雙  
手診)乳房ハ漸ク膨大シ乳暈及白線較暗色ニ變ス  
第三月○子宮底ハ兒頭大ニシテ柔軟前腔穹窿部ニ於テ之  
ヲ觸知ス可シ子宮腔部ハ稍後方ニ向フ(雙手診)

第四月○子宮底ハ大人頭大ニシテ外部ヨリ之ヲ診スルニ  
既ニ恥骨縫際ヲ上部ニ於テ觸知ス可シ  
第五月○子宮底ハ臍ト恥骨縫際トノ中間ニ於テ觸知ス可  
シ此月末ニ至レハ胎動及ヒ心音ヲ認メ得ヘシ屢分娩セル  
婦人ニ在テハ子宮ノ外口開墜シテ指ヲ送入スルヲ得ヘシ  
第六月○子宮底ハ臍ニ達ス  
第七月○子宮底ハ已ニ臍上二三指幅許ノ位置ニ達ス  
第八月○子宮底ハ臍ト心窩トノ中間ニ位ス此際腹ノ周圍  
ヲ臍部ニ於テ測ルトキハ平均九十五センチメートルニシ  
テ恥骨縫際ト臍トノ中間ニ於テ測ルトキハ九十七センチ  
メートルニ居ル  
第九月○子宮底ハ心下ニ達シ子宮外口ハ初妊ノ婦人ニ於



テモ亦開哆ス  
 第十月〇子宮下降シテ底部ノ位置ハ猶ホ第八月ニ於ケル  
 カ如ク又前方ニ傾斜ス臍部ニ於テ腹ノ周圍ヲ測ルルハ平  
 均九十九センチメートルニシテ其下方ニ於テハ百センチ  
 メートルニ至ル  
 第十三章 齒牙生出期  
 乳齒二十枚ノ生ヌル順序ハ通常左ノ如シ  
 二枚ノ中央下切齒 第四月ヨリ第七月ノ間ニ生ヌ  
 四枚ノ上切齒 第八月ヨリ第十月ノ間ニ生ヌ  
 四枚ノ第一白齒<sup>第一</sup> 第十二月ヨリ第十五月ノ間ニ生ヌ  
 二枚ノ外側下切齒<sup>第二</sup> 第十八月ヨリ第二十四月ノ間ニ生ヌ  
 四枚ノ犬齒 十八月ヨリ第二十四月ノ間ニ生ヌ

四枚ノ第二白齒<sup>第二</sup> 第三十月ヨリ第三十六月ノ間ニ生  
 ス、五年或ハ六年ニ於テ四枚ノ第三白齒(第一碎齒)ヲ生ヌ  
 ルト同時ニ齒牙ノ交換ヲ始ム、第十二年迄ニ四枚ノ第四  
 白齒(第二碎齒)ヲ生シ二十年或ハ仍ホ後年ニ於テ第五白  
 齒(智齒)ヲ生ヌ、是故ニ顎ノ各半邊ニ存スル者ハ二枚ノ切  
 齒、一枚ノ犬齒、二枚ノ嚙齒(下ナル者ハ一根、上ナル者ハ内  
 外二根ヲ有ス)、三枚ノ碎齒(下ナル者ハ前後二根、上ナル者  
 ハ二箇ノ外根ニ箇ノ内根ヲ有ス、智齒ニ於テハ屢ニ一根ニ  
 融合ス)ナリ



第二篇

強壯藥、興奮藥、麻醉藥ノ通用處方

強壯、興奮、麻醉ノ三藥ハ、種々ノ病患ニ對シテ應用スルノ  
頗ル頻繁ナルモノナルガ故ニ、本文各病ノ下ニハ、只強壯  
藥等ノ目ヲ掲クルノミニシテ、一々其處方ヲ示サズ、茲ニ  
最モ汎ク實際ニ行ハル、己上各藥ノ處方ヲ列載シ、以テ  
讀者ノ撰擇ニ供ス

第一章 強壯藥ノ處方

強壯藥トシテハ、規那、鐵、肝油、苦味藥、百弗聖等ヲ用ユ。藥五白  
○規那煎八、○乃至一五、○(二〇〇〇)十二單舍利別一五、○(二〇〇〇)  
右毎二時、一食匙 氣、四時、一食匙、一日三回、第一藥、右ニ  
○規那酒二〇〇〇 用法同上 藥三十六日、開、全

○硫酸規尼涅 五、五 甘草羔 甘草末 各適宜 右

○三十九ト爲 一日三回 一丸 甘草末 各十回

○還元鐵 一 硫酸規尼涅 各一、五 甘草羔 甘草末

○各適宜 右三十九ト爲 一日三回 一丸 甘草末

○乳酸鐵 一〇〇 鹽酸聖古尼涅 各四〇 甘草羔 甘草末

各適宜 右六十九ト爲 一日三回 一丸 或ハ二丸

○硫酸鐵 一五、〇 鹽酸化麻偏涅 叟 二、五 偏里設林

適宜 右九十九ト爲 一日三回 一丸 乃至二丸

○乳酸鐵 五、〇 規那越幾斯 一〇、〇 右百五十九ト

爲 桂皮末ヲ以テ衣トシ、一日三回 二乃至五丸

○林檎鐵丁幾 適宜 右一日三回、二十滴

○林檎鐵丁幾 二〇〇 亞砒酸加留謨液 五、〇 右一



- 日三回十五滴(此處方ハ其病況ニ隨ヒ、砒石劑ヲ要スル時ハ注意シテ應用スベシ)三四二十滴
- 可溶鐵液適宜 以テ其右一日三回五滴 可溶鐵液即チ參野元養氏著、製劑捷覽ニ詳ナリ就テ見ルヘシ 百五十次
- 鐵酒一〇〇〇、右一日三回、一食匙 式五二式
- 還元鐵五〇 亞砒酸〇、參野元龍膽越幾斯適宜 甘草末
- 右混和百丸、ナシ 日二三九日三回、一食匙、八二式
- 鐵飴煎一〇〇〇、參野元龍膽越幾斯適宜 甘草末
- 含糖酸化鐵三〇、式重碳酸那篤留讓 五〇、右十包、分チ一日二回一包 甘草末
- 乳酸鐵、參野元龍膽越幾斯適宜 白糖各三〇、右十包、分チ一日二回一包 甘草末

- 沃度化鐵舍利別一五〇、參野元龍膽越幾斯適宜 右一日三回、半乃至一食匙其病況ニ隨ヒ、沃度劑ヲ要スル時ニ應用スベシ
- 肝油適宜、參野元龍膽越幾斯適宜 右一日三回、乃至四回、一食匙
- 苦味丁幾適宜、參野元龍膽越幾斯適宜 右一日三回二十滴
- 番木鱈丁幾一〇〇、參野元龍膽越幾斯適宜 苦味丁幾二〇〇、參野元龍膽越幾斯適宜 右一日三回、十五滴
- 龍膽浸(一〇〇)一八〇〇、參野元龍膽越幾斯適宜 橙皮舍利別一五〇、參野元龍膽越幾斯適宜 右每二時、一食匙
- 含糖百弗聖二〇〇、參野元龍膽越幾斯適宜 稀鹽酸一五〇、參野元龍膽越幾斯適宜 水一八〇〇
- 百弗聖酒適宜、參野元龍膽越幾斯適宜 右每食後、一食匙



第一章 興奮藥ノ處方

興奮藥トシテハ麝香、樟腦、依的兒劑、亞爾箇保爾劑、安母尼亞劑等ヲ用ユ

○麝香 〇・〇五 白糖 〇・五 右數包ヲ作り、一日數回

一包

○麝香 〇・〇五 樟腦 各 〇・〇五 白糖 〇・五 右同上

○樟腦 〇・一乃至 〇・二 白糖 〇・五 右同上

○樟腦 二・〇 阿列布油 二・〇 右一日數回、一筒、皮

下ニ注射ス

○依的兒精(即チ忽布滿鎮痛液)適宜 右一日數回、二

十滴

○依的兒適宜 右一日數回二十滴、糖水ニ和シ服ス

○依的兒適宜 右一日數回、半筒乃至一筒、皮下ニ注

射ス

○甘硝石精適宜 右一日數回、二十滴

○コロンニヤク(即チ上品ノ燒酒)適宜 甘草 右一日數回、半

乃至一茶匙、糖水ニ和シ服ス

○ポルト酒又ハ設利酒 六・〇 單舍利別 一五・〇

右一日數回ニ分服ス

○赤葡萄酒 一〇・〇 單舍利別 一〇・〇 右用法同上

○良好ノ日本酒 一〇・〇 右用法同上(已上酒類ハ總

テ患者ノ酒量ニ隨ヒ、適宜ノ増減ヲ爲ス、ソアルヘシ)

○炭酸安母紐 一 白糖 各 五・〇 右十五包ニ分チ、

「オプラー」ニ包ミ、毎二時、一包



○炭酸安母紐謨〇、五 樟腦〇、二 白糖一、〇

○右一包ト爲シ、一日數回、一包

第二章 麻醉藥ノ處方

麻醉藥トシテハ、阿片、莫兒比涅、抱水格魯刺爾、別刺敦那、非沃斯、苦扁桃水、老利兒結爾斯水、貌羅謨化加留謨等ヲ用ユ

○阿片〇、〇三乃至〇、一 白糖〇、五 右一包ト爲シ、一

○日一回若クハ數回、一包

○抱物兒氏散〇、三 右同上

○阿片越幾斯〇、〇五 甘草羔 甘草末各適宜 右同上

○右一九ト爲シ、一日一回若クハ數回、一九

○阿片丁幾適宜 右二十滴頓服(或ハ每二時、五滴)

○舍電華謨阿芙蓉液適宜 右用法同上

○鹽酸莫兒比涅〇、〇〇五乃至〇、〇一 白糖〇、五 右一

○包ト爲シ、一日一回若クハ數回、一包

○鹽酸莫兒比涅〇、一 蒸餾水五、〇 右半乃至一筒

○宛皮下ニ注射ス

○抱水格魯刺爾一、〇乃至三、〇 蒸餾水 亞拉昆亞謨

○謨漿各一五、〇 右頓服

○抱水格魯刺爾二、〇乃至四、〇 貌羅謨化加留謨六、〇

○水一八〇、〇 右每二時、一食匙

○別刺敦那越幾斯〇、二 乳糖二、〇 右四包ニ分

○チ、一日四回、一包

○非沃斯越幾斯〇、五 苦扁桃水一〇、〇 右一日數

○回、五乃至十滴



○ 鹽酸莫兒比涅 〇、一

苦扁桃水

蒸餾水各一五、〇

○ 右二日數回、二十滴

第三篇

皮下注射用藥品及其用量

皮下注射器ハ一瓦蘭謨(一立方センチメートル)ノ藥液ヲ含有シ且ツ藥液ヲ容ルベキ部分ヲ十分シテ之ニ劃度ヲ附シ其一分ハ正ニ一「デシ」瓦蘭謨ニ符合セサル可カラス、皮下注射用ノ藥液ハ成ルヘシ十倍數ノ比例ヲ以テ處方スヘシ(例之ハ百倍 $1:100$ 、五十倍 $1:50$ 、二十倍 $1:20$ 等)然ルトキハ毎回ノ用量ヲ取ルコト最モ容易ニ且ツ錯誤ヲ避クルノ便アルモノ上ス、又皮下注射劑ハ大抵峻烈ノ藥物コノ間、危險ノ誤謬ヲ來タスノ恐レアルガ故ニ處方ノ全文ヲ藥瓶上ニ記載セシ

ムルヲ可トス

已下各藥ノ下特ニ記載セルモノ、外溶解液トノハ蒸餾水ヲ應用ス例之ハ石炭酸ノ下 $1:300$ ハ石炭酸ノ三百倍蒸餾水溶液ト知ルヘシ

○ 石炭酸  $1:300$  一回〇、五乃至一、〇 (即チ石炭酸 $0.03$ ) 己上殊ニ神經痛并

ニ皮膚炎局處消炎藥トノ用ユ

○ 過オスミウム酸  $1:100$  一回〇、五乃至一、〇 (即チ過オスミウム酸 $0.01$ ) 局

處神經痛藥トノ用ユ (褐色ノ硝子瓶ニ入レテ與フ)

○ スクレロチン酸 (ドラゼンドルフ氏ニ據ルニ麥角越幾斯ノ真正有効

成分)  $1:20$  一回〇、五乃至一、〇 (即チスクレロチン酸 $0.05$ )

○ アコニチーチ (獨逸「アコニチーチ」 $1:100$  (溶液藥トシテハ酒精或ハ少許ノ鹽酸ヲ加ヘタル蒸餾水ヲ用

ユ) 一回〇、二乃至〇、五 (即チ獨逸「アコニチーチ」所謂結晶「アコニチーチ」

ハ適カニ少量ニ應用セサル可ラス即チ一回主藥ノ量 $0.0002$ 乃至



至〇、〇〇〇五ヲ應用ス、此注射劑ハ疼痛ヲ起スノ恐レアリ

〇依的兒 一回〇、五已上 衰脫症

〇鹽酸亞刺莫兒比涅 催吐藥トノハ 1:100 大人ニハ一回〇、五乃至一、  
(即チ鹽酸亞刺莫兒比涅) 幼兒ニハ 〇、一五 (即チ鹽酸亞刺莫兒比涅) 稍、長シタル  
(〇、〇〇五乃至〇、〇〇一)

〇小兒ニハ 〇、三 (即チ鹽酸亞刺莫兒比涅)

〇硫酸亞篤魯必涅 1:500 一回〇、二乃至〇、五 (即チ硫酸亞篤魯必涅)  
(〇、〇〇四乃至〇、〇〇二)

〇樟腦 與奮藥トノ樟腦油 樟腦一分ヲ阿列布油九分ニ溶和ス 又ハ樟腦精ノ狀ニ於テ注射ス  
 一回一、〇乃至二、〇 (即チ樟腦)

〇重硫酸規尼涅、貌羅謨水素酸規尼涅、鹽酸規尼涅(已上ハ皮下注射ニ適  
 スル規尼涅攪ナリ但シ硫酸規尼涅ハ此目的ニ適セス) 1:10 (溶解藥ト  
 水便利設林各、等  
 分ノ混和液ヲ用ユ) 一回一、〇 (即チ規尼涅) 已上

〇抱水格魯刺爾(本品ハ原來皮下注射ニ適セス) 1:10 大人ニハ一回二、〇

乃至八、〇 (即チ抱水格魯刺爾) 幼兒ニハ 一、〇 (即チ抱水格魯刺爾)、稍、長シタル小  
 兒ニハ 二、〇 (即チ抱水格魯刺爾)、(刺爾〇、四)、其它抱水格魯刺爾ハ莫兒比涅ニ伍用スルヲ  
 ナ得(抱水格魯刺爾〇、五鹽酸莫兒比涅〇、二五蒸餾水二五、〇) 一回ノ  
 量一、〇已上

〇嚼囉仿謨(單味) 一回一、〇已上

〇鹽酸古加乙涅 1:20 一回〇、二乃至一、〇 (即チ鹽酸古加乙涅) 神經痛及  
 〇ヒ知覺過敏ニ用ユ

〇咖啡涅、枸橼酸咖啡涅、貌羅謨水素酸咖啡涅(更ニ可ナルハ安息香酸咖  
 啡涅那篤留謨及ヒ撒里矢爾酸咖啡涅那篤留謨) 1:5 一回〇、五乃至一、  
(即チ咖啡涅鹽) 〇、(即チ咖啡涅鹽) 神經性頭痛等ニ用ユ

〇純ニホルヒナン 1:50 一回〇、五乃至一、〇 (即チホルヒナン) 神經痛ニ  
 用ユ



○「クラーレ」毒 1:100 (溶解薬トシハ蒸留水備利設) 一回一〇乃至五〇 (即チラ  
 1レ0.01) (林各等分ノ混和液ヲ用ユ) 乃至〇.〇五

○無晶形「ギタリン」(其集成頗ル不同ナリ賞用スベキ皮下注射劑ニア  
 ラズ) 1:100 (溶解薬トシハ酒精蒸留水) 一回〇.一乃至〇.三 (即チ「ギタリン」  
 各等分ノ混和液ヲ用ユ) 乃至〇.〇〇一乃至〇.〇〇三

○硫酸「ヂュボアキーチ」 1:500 一回〇.一乃至〇.二 (即チ硫酸「ヂュボアシ」  
 至〇.〇四) (即チ「エルゴチン」  
 〇.〇〇四)

○枸橼酸「エルゴチン」溶液 (製「グ」氏) (所謂「タンレー」Tanret 氏「エルゴチ  
 ン」ニシテ「エルゴチン」ノ〇.一「プロセント」溶液ナリ) 一回〇.三乃至一、  
 〇 (即チ「エルゴチン」  
 〇.〇〇三乃至〇.〇〇一)

○麥角越幾斯 日本藥 1:10 (溶解薬トシハ蒸留水備) 一回一〇乃至二〇 (即チ  
 越幾斯〇.1) (局方 里設林各等分ヲ用ユ) 乃至〇.1)

○焦性磷酸鐵加枸橼酸那篤留膜 (鐵劑中最モ皮下注射用ニ適スルモノ)  
 1:6 一回一〇以上 (焦性磷酸鐵加枸橼酸安母紐膜モ亦同一ノ量ニ於  
 テ供用スルヲ得)

○昇汞 1:100 一回〇.五乃至一〇 (即チ昇汞〇.〇〇〇) (バムベルグ Bam-  
 berger 氏「メプトン」水銀液モ亦同量ヲ以テ同一ノ目的ニ供用スルヲ  
 得)

○沃度水素酸「ヒヨスターチ」 1:500 一回〇.二乃至〇.五 (即チ沃度水素酸  
 〇.〇〇〇四乃) 筋肉顫振、振顫性麻痺等ニ用ユ

○亞砒酸加留膜液 1:4 一回〇.五乃至一〇 (即チ亞砒酸加留膜  
 液〇.一乃至〇.二) 鱗屑癬、舞  
 蹈病、筋肉顫振及ヒ佗ノ神經症ニ用ユ

○卵白化水銀液 スレ 1:100 一回〇.五乃至一〇

○鹽酸莫兒比涅 1:20 (鹽酸莫兒比涅一分ヲ純備利設林十分ニ温テ與ヘ) 一回〇、  
 ツ、溶解シ其溶液ニ蒸留水十分ヲ加ヘテ製ス)



- 一乃至〇・六(即チ鹽酸莫兒比涅〇) 幼兒ニハ〇・一已下(即チ鹽酸莫兒比涅〇五乃至〇〇五已下)
- 硫酸莫兒比涅 用法用量鹽酸莫兒比涅ニ同シ
- 撒里矢爾酸比蘇斯知偏密涅 1:500 一回〇・二乃至〇・五(即チ撒里矢爾酸比蘇斯知酒密涅ノ量〇、〇〇〇四)
- 鹽酸比蘇斯知偏密涅(鹽酸越攝里涅) 用法用量撒里矢爾酸比蘇斯知偏密涅ニ同シ
- 鹽酸必魯加兒必涅 1:50 一回一・〇乃至二・〇(鹽酸必魯加兒必涅〇〇二乃至〇〇四)
- 依的兒精(忽布滿氏液) 用量依的兒ニ同シ
- 硝酸斯篤里幾尼涅 1:100 一回〇・三乃至一・〇(即チ硝酸斯篤里幾尼涅〇)
- 硫酸斯篤里幾尼涅 用法用量硝酸斯篤里幾尼涅ニ同シ
- 印度大麻丁幾單味 一回〇・二乃至〇・五
- 勃拉篤里涅 1:100(溶解藥トシテ稀酒精ヲ用ユ) 一回〇・二乃至〇・五(即チ勃拉篤里涅〇〇二乃至〇〇五)

賞用ヌヘキモノニアラズ

### 第四篇

#### 吸入用藥品及其用量

- 已下各藥品ノ下 1:100, 1:50 等ト記シテ數字ノ下ニ溶解藥名ヲ記セサルモノハ皆其藥物一分ヲ蒸餾水百分五十分等ニ溶解スルモノト理解スヘシ又〇・五—1.0 或ハ一—二ト記スルハ主藥〇・五乃至一・〇分或ハ一乃至二分ヲ指スモノナリ
- 安息香酸 0.5—1.0:100 (稀酒精)
- 石炭酸 0.5—1.0:100
- 乳酸 1—2:100
- 鞣酸(單寧酸) 1—2:100 (蒸餾水又ハ偏里設林)



- 亞硝酸亞密爾 一二乃至五滴ヲ手帕ニ滴シテ吸入セシム
- 明礬 1—2:100
- 石灰水 蒸餾水等分ニ混和ス
- 結麗阿曹篤水 1—5:100
- 菱兒水 1—20:100
- 格魯兒水 蒸餾水等分ニ混和ス
- 苦扁桃水 1—3:100
- 硝酸銀 0.1—0.2:100
- 硼砂 1—2:100 用藥品ニ其用量
- 貌羅謨ト貌羅謨化加留謨 0.2:100
- 硫酸規尼涅 0.5:100
- 鞣酸規尼涅 0.02—0.1:100

- 糠酸古加乙涅 0.5:250
- 別刺敦那越幾斯 0.01—0.05:100
- 古紐謨越幾斯 0.04—0.15:100
- 非沃斯越幾斯 0.05—0.2:100
- 阿片越幾斯 0.05—0.1:100
- 過格魯兒化鐵溶液 0.5—1.0:100
- 純偏利設林 10:100 (或ハ稀釋セスメテ用ユ)
- 昇汞 0.05—0.1:100
- 炭酸加留謨 0.2—3.0:100
- 貌羅謨化加留謨 1—2:100
- 格魯兒酸加留謨 1—2:100
- 過滿俺酸加留謨 0.1—0.2:100



- 沃度化加留謨 0,1—0,5:100
- 沃度化加留謨ト純沃度 1—2(沃度化加留謨)+0,02(沃度):100
- 炭酸利手謨 0,2—2,0:100
- 搦酸莫兒比涅 0,03:100
- 安息香酸那篤留謨 1—2:100
- 重炭酸那篤留謨 0,5—2:100
- 炭酸那篤留謨 0,2—1,0:100
- 食鹽 0,2—2,0:100
- 鉛醋 0,2—1,0:100
- 印度大麻丁幾 0,5—1,0:100
- 沃度丁幾 0,1—10:100
- 阿片丁幾 0,2—0,5:100

第五篇

年齡用量比例表

年齡ニ比例スル藥物用量ノ多少ム、現今尙ホガウピウス氏ノ書則ニ據ルチ常トス、即チ二十歳ヨリ六十歳ニ至ル年齢ニ對スル用量ヲ本位ト定メテ、ト爲シ幼若ノ者ニハ左ノ比例ヲ以テ之ヲ差略スベシ

一歳已下	十五分ノ一	一歳ヨリ二歳	八分ノ一
二歳ヨリ三歳	六分ノ一	三歳ヨリ四歳	四分ノ一
四歳ヨリ七歳	三分ノ一	七歳ヨリ十四歳	二分ノ一
十四歳ヨリ二十歳	三分ノ二		

而シテ六十歳已上ノ年齢ニ於テモ漸次ニ本位ヨリ減却シ四分ノ三、三分ノ二、二分ノ一、等ノ比例ヲ以テスヘシ



第六篇

劇毒藥極量表

但シ本書ニ収載セ  
ル藥物ノミヲ掲ケ

藥名	一回ノ極量		一日ノ極量	
	瓦蘭謨量	氏量	瓦蘭謨量	氏量
亞砒酸	〇、〇〇五	大約十二分氏一	〇、〇二	大約三分氏一
石炭酸	〇、一	同一氏半	〇、五二	同七分半一
鹽酸亞錫莫兒比涅	〇、〇一	同六分氏一	〇、〇五	同四分氏三
苦扁桃水	二、〇	同三千氏一	八、〇	同二千式一
硝酸銀	〇、〇三	同半氏一	〇、二六	同三氏半
硫酸亞錫魯必涅	〇、〇〇一	同六十分氏一	〇、〇〇三	同二十分氏二
貌羅謨化樟腦	〇、三	同四氏半	二、〇	同三十氏
稀酸攝留謨	〇、三	同四氏半	一、五	同二十三氏

咖啡涅	〇、二二	同三氏	〇、六	同九氏半
古魯聖篤實	〇、二三	同四氏半	一、〇	同十五氏
硫酸銅	〇、一	同四氏半	〇、四	同六氏九
硫酸銅	一、〇	同十五氏	〇、五	同九氏半
別刺敦那越幾斯	〇、〇五	同四分氏三	〇、二	同二氏半
印度大麻越幾斯	〇、一五	同一氏半	〇、四	同六氏
古魯聖篤越幾斯	〇、〇五	同四分氏三	〇、二	同三氏半
非沃斯越幾斯	〇、二三	同二氏	一、〇	同十五氏
阿片越幾斯	〇、一五	同二氏半	〇、五	同七氏半
番木鱉越幾斯	〇、〇五	同四分氏三	〇、一五	同二氏半
別刺敦那葉	〇、二	同二氏半	〇、六	同九氏九
實菱答利斯葉	〇、二	同二氏半	一、〇	同十五氏八



菲沃斯基	〇、三	同四氏半	一、五	同二十三氏
藤黃	〇、三	同四氏半	一、〇	同十五氏
古羅誤(矢鳩答)葉	〇、三	同四氏半	二、〇	同三十氏
刺苦弄葛留謨	〇、三	同四氏半	一、〇	同十五氏
昇汞	〇、三	同半氏	〇、一	同十一氏半
赤色沃度化汞	〇、三	同半氏	〇、一	同十一氏半
黃色沃度化汞	〇、五	同四分氏三	〇、二	同三氏
赤色硫化汞(赤降汞)	〇、三	同半氏	〇、一	同十一氏半
結麗阿曹篤	〇、一	同半氏	〇、五	同七氏半
抱水格魯刺爾	三、〇	同四十五氏	六、〇	同九十氏
亞砒酸加留謨液	〇、五	同七氏半	二、〇	同三十氏
攪酸莫兒比涅	〇、三	同半氏	〇、一	同十一氏半

巴豆油	〇、〇五	同四分氏三	〇、一	同十一氏半
阿片	〇、一五	同二氏半	〇、五	同七氏半
燐	〇、〇一	同六十分氏一	〇、〇〇五	同十二分氏一
鉛糖(醋酸鉛)	〇、一	同半氏	〇、五	同七氏半
金硫黃	〇、二	同三氏	一、〇	同十五氏
剎度比爾林	〇、一	同半氏	〇、五	同七氏半
鹽酸必魯加兒必涅	〇、〇三	同半氏	〇、〇六	同十一氏
別刺敦那根	〇、一	同半氏	〇、四	同六氏
珊瑚寧	〇、一	同半氏	〇、三	同四氏半
噶酸斯篤里幾尼涅	〇、〇一	同六分氏一	〇、〇二	同三分氏一
吐酒石	〇、二	同三氏	〇、五	同七氏半
蒟刺巴脂	一、〇	同十五氏	三、〇	同四十五氏



別刺敦那丁幾	一、〇	同十五分	四、〇	同一分正
羯答利斯丁幾	〇、五	同七分半	一、五	同二分三
古爾矢屈謨丁幾	二、〇	同三分	六、〇	同一分半
古魯畢篤丁幾	一、〇	同十五分	三、〇	同四分五
實菱答利斯丁幾	一、五	同三分三	五、〇	同一分十五
沃度丁幾	〇、二	同三分	一、〇	同十五分
魯別里亞丁幾	一、〇	同十五分	五、〇	同一分十五
舍電華讓阿芙蓉液	一、五	同三分三	五、〇	同一分十五
阿片丁幾	一、五	同三分三	五、〇	同一分十五
曼陀羅華丁幾	一、〇	同十五分	三、〇	同四分五
番木籠丁幾	一、〇	同十五分	二、〇	同三分
勃拉篤里涅	〇、〇五	同十二分	一、〇	同三分

古爾矢屈謨酒	二、〇	同三分	六、〇	同四分半
硫酸亞鉛	〇、〇六	同四分	〇、三	同四分半
硫酸亞鉛	〇、〇四	同五分	〇、二	六分
纈草酸亞鉛	〇、〇六	同四分	〇、三	同四分半
三十份	〇、〇二	同八分	〇、一	三十分
四十份	〇、〇一	同十分	〇、〇五	三十分
五十份	〇、〇一	同八分	〇、〇五	三十分
六十份	〇、〇一	同七分	〇、〇四	三十分
八十份	〇、〇一	同五分	〇、〇三	三十分
百份	〇、〇一	同四分	〇、〇三	三十分

第七篇  
藥物量比較  
第一章 瓦蘭謨氏比較表



百分氏一	〇、〇〇五	四氏	〇、二四	百氏(五刃)	六、二五
八十分氏一	〇、〇〇七五	五氏	〇、三	五氏	一八、七五
六十分氏一	〇、〇〇一	六氏	〇、三六	五氏半	二〇、七五
五十分氏一	〇、〇〇二	七氏	〇、四二	六氏	二二、五
四十分氏一	〇、〇〇二五	八氏	〇、五	七氏	二六、二五
三十分氏一	〇、〇〇二	九氏	〇、五五	八氏(一刃)	三〇、〇
二十分氏一	〇、〇〇三	十氏(半刃)	〇、六	十氏	三七、五
十五分氏一	〇、〇〇四	十二氏	〇、七二	十六氏(二刃)	六〇、〇
十二分氏一	〇、〇〇五	十三氏	〇、七八	十八氏	六七、五
十分氏一	〇、〇〇六	十四氏	〇、八五	廿氏(二刃半)	七五、〇
		十五氏	〇、九	廿四氏(三刃)	九〇、〇

八分氏一	〇、〇〇七五	十六氏	一、〇	三氏半	一〇五、〇
六分氏一	〇、〇一	十八氏	一、一二	四氏	一二〇、〇
五分氏一	〇、〇一二	二十氏(一刃)	一、二五	四氏半	一三五、〇
四分氏一	〇、〇一五	三十氏(半刃)	二、〇	五氏	一五〇、〇
三分氏一	〇、〇二	三十二氏	二、二	五氏半	一六五、〇
二分氏一	〇、〇三	三十六氏	二、五	六氏	一八〇、〇
一氏	〇、〇六	四十氏(二刃)	三、〇	七氏	二〇〇、〇
一氏半	〇、〇一	五十氏(二刃半)	三、二	八氏	二四〇、〇
二氏	〇、〇二	六十氏(三刃)	三、七五	九氏	二七〇、〇
三氏	〇、〇一八	八十氏(四刃)	五、〇	十氏	三〇〇、〇

第二章 瓦蘭謨名及ヒ用量名目表  
 (上)瓦蘭謨名 (下)用量名目表



ミリ瓦	〇、〇〇一	千分一瓦	茶七	一丁	四、〇瓦
センチ瓦	〇、〇一	百分一瓦	半茶七	半丁	二、〇瓦
デシ瓦	〇、一	十分一瓦	食七	四丁	一五、〇瓦
瓦蘭謨	一、〇	瓦蘭謨位	半食七	二丁	八、〇瓦
デカ瓦	一〇、〇	十瓦	酒蓋	大約三丁	一〇〇、〇瓦
ヘクト瓦	一〇〇、〇	百瓦	咖啡碗	大約三丁	一〇〇、〇瓦
キロ瓦	一〇〇〇、〇	千瓦	刀尖	半丁	三、〇瓦
メガワ	一〇〇〇〇、〇	万瓦	小刀尖	一丁	一、二五瓦

醫通附錄終

永坂周二訂

醫通第五板五誤

丁	行	誤	正	一二一	一二一	脂肪	脂肪
一一	四	〇、〇一五	〇、〇二五	一三〇	八	Enteroneklosis.	Enterohelkosis.
一一	四	〇、五	五、〇	一四四	上欄	ト適	トノ
五三	一〇	患者ニ	患者ニ	二二三	上欄	候症	症候
六四	上欄	シ味	シ味	二九五	上欄	養ニ殺 々自堪……	養ニ堪 々自殺……
七五	五	ヲ患	ヲ患	三〇六	八	五〇、	五〇、
七九	三	合嗽	合嗽	三二六	九	〇、一、〇	〇、一、〇
八七	九	煨製	煨製	三三二	上欄	頭痛	頭痛
八八	九	單舍	單舍	三六四	九	稀水	稀鉛水
九七	三	〇五	〇五	三六四	一〇	單軟膏	單鉛軟膏
一一〇	四	蒟刺四	蒟刺巴	三七五	三	擦塗	塗擦
一一〇	四	蒟刺四	蒟刺巴	四四〇	三	超コ	超ユ







伊勢錠五郎同纂  
柴田承桂同纂

### ○臨床藥說

全一冊

定價金壹圓五拾錢

右ハ最近藥劑學ノ萃ヲ拔キ學生ノ備忘醫家ノ携帶ニ便宜ナル体裁ニ編纂シタル者ニシテ多數ノ新藥ヲ網羅シ(一)  
(二)(三)等ト明瞭ニ件項ヲ分チ種々ノ應用ヲ列記シ醫通及ヒ醫家十二要ト相待テ其用ヲ爲ス所ノ良書ナリ

伊勢錠五郎譯纂

### ○醫家十二要

全一冊

定價金八拾五錢

醫家殊ニ實地治療家ニ缺ク可カラサル十二項ノ要件即チ●体温測定法●病床檢尿法●創傷療法●嘔吐防禦麻醉  
法●視力檢査法(視力表ヲ附ス)●耳科摘要●裁判上屍體檢式●結核バチルレン檢査法●虎列刺バチルレン檢査  
法●小兒營養品說●救急療法●假死回蘇法ヲ専門各家最新ノ學說ニ隨テ畧述シ附スルニ日本著名諸續泉ノ分類  
及ヒ主治ヲ以テシ醫通及ヒ臨床藥說ト併立シ治療家ニ有益ナル三冊足ヲナスノ書ナリ

ドクトル、ベルツ氏著 櫻村清徳閱 伊勢錠五郎譯

### ○內科病論

第四版 上中下三冊 定價金三圓九拾五錢

村田謙太郎 伊勢錠五郎纂譯

### ○皮膚病梅毒論

皮膚病篇 全三冊 定價金一圓七拾五錢

柴田承桂譯述

### 衛生概論

第四版

全一冊

定價金一圓五十錢

柴田承桂譯述

### 顯微鏡用法

第二版

全一冊

定價金九十錢

下山順一郎纂譯 柴田承桂校補

### 檢尿法

全一冊

全一冊

定價金壹圓五十錢

飯盛擬造纂譯 丹波敬三 柴田承桂校補

### 物理學

第九版

上中下三冊

定價金三圓九十五錢

丹波敬三纂譯 下山順一郎校補

### 無機化學

第七版

前後二冊

定價金二圓五十錢

丹波敬三 下山順一郎 柴田承桂同譯

### 有機化學

第八版

前後二冊

定價金二圓五十錢

丹波敬三 柴田承桂 高橋秀松同譯

### 普通植物學

第六版

全一冊

定價金九十五錢

熊澤善庵 柴田承桂同纂

### 普通金石學

第二版

全一冊

定價金八十五錢



丹波敬三 柴田承桂同譯 高松數馬補輯  
普通動物學 第三板

全一册 定價金九十五錢

新宮涼園 武昌吉 柴田承桂同纂  
獨逸醫學辭典

全一册 定價金一圓四十錢

櫻村清徳 編輯  
伊勢銳五郎 柴田承桂 補輯

### ○日本藥局方隨伴

改正第二板 全一册 正價金壹圓九十錢

日本藥局方ハ藥劑ノ品性ヲ示スカ爲メ發布相成リタル重要ノ法則ニシテ其性質、製法、試法等ヲ明示セラレタルモノナレドモ各藥ノ主治効用ニ至テハ固トヨリ該方ノ記載スヘキ限リニアラス故ニ本書ニ於テハ藥局方各條ノ全文ヲ掲ケタル上毎條ノ下該藥ノ主治効能用法用量等ヲ精密ニ記載シ加フルニ歐米各國局方トノ比較本文中要點ノ參釋及ヒ必要ノ圖ヲ以テシ其他生藥ノ產地、基源、成分、化學藥ノ化學記號及ヒ化學上性質及ヒ各藥獨英佛ノ通名ヲモ収載シタル完全ノ書ナリ

勝山忠雄譯補 柴田承桂校閱  
調劑要術 第四板 全一册 定價金壹圓



終