

痧喉論義

古歛槐塘程翼安氏著於

渺唉闇義

維揚之後吾齋

洪
吾
齋

痧喉闡義

醫學至廣其理精微非饜飫經史融會貫通者不足以語此蓋書理明則事物之理無不明此醫之所以必重於儒者亦以其能明理而已世之業岐黃者比比皆是偶或應手奏效名重一時及與究本窮源囁嚅莫對此以運售而不足與言醫理者姑不具論卽先輩之著書林立未嘗不卓可傳第偏熱偏涼以及主補主散每師心自用各樹一幟其理雖明而不免偏重孰有能不掩人長不執已見仍其舊而補其不足如吾友翼安程君者君以諸生就鹽

吏與余有同舟誼朝夕過從幾歷寒暑讀書得間靡不入
古入座風生辨難莫竭第不欲以此自炫昨過訪於案頭
偶獲痧喉闡義一編蓋就陳耕道先生疫痧草中所未盡
發明者引伸其說將痧喉本末闡發無遺瘟疫二義辨論
尤確意雖創而有所折衷識獨精而不渾疑似洵善師古
而不泥古者也爰急憲從付梓以福斯民並綴數言於末
以誌欽慕云爾

光緒二年丙子零陵王治覃題

序

痧喉一症古無專書疫癟時行於今尤烈有心人所爲惻然動念也因究近代諸說莫不外狀其形內迷其理大概述所當然而於其所以然者鮮有發明爰不揆庸昧將疫毒發爲痧喉之故及夫疫之與

瘟其氣有別之義細意闡推暢敷厥旨至療治諸方則前人已備畧加編輯無事贅瘤曲暢旁通註明狀證俾操斯柄者得以按脈切理如見其肺肝焉

光緒丁丑古歙槐塘翼安甫程鏡
宇識於維揚之從吾齋

叙

其人必有濟世仁物之心而爲名位所屈抑曾無所藉手
碌碌浮沈鄉里間不得已而小試其術而亦足以活人者
則莫醫若矣顧醫之途至不一職諸周官專門以名其家
且不勝僂指更何論近世之紛紛者爲耶夫惟近世之習
而愈歧重以歐洲各國通商內地又挾其刀鋸彎割之微
不惜殘肌膚毀肢體以一倖其神奇之效是其心先不仁
果能有濟與否則尤爲未可知然必其病在肌膚在肢體
始得求其有濟而以至不仁者姑嘗試焉若步位僅方寸

地一有患楚遂畢性命於旦夕如咽喉者其病之源出於
臟腑而天行之疫時氣之癟與夫人事之一切不謹如發
痧爛喉者雖欲以至不仁者而姑嘗試以祈有濟於萬一
亦終苦於無所施前賢陳耕道疫痧草書久風行特於疫
所以發痧而症見於喉之義尙欠發明至於偏主於寒涼
猶後也新安程先生翼安就其書而擴充之著爲痧喉闡
義一書義無盡藏卽闡無止境讀是書者顧名以思亦知
先生之心不僅爲讓美前賢地乎抑吾重有感者歲在癸
巳中東構釁僕等草莽何知大計之得失迨和局告成竊

若我中人之事事不及曰本實以其人之聰明材力相去
者固萬萬也是書先十數年出己流傳日本爲其大阪井
醫官衙丹波氏所輯錄所謂證治通義全書者是書裒然
居首且深取其議論而大爲折服焉翼安先生本儒家子
幼充博士弟子員壯歲筮仕鹽官局嘗以醫名卽醫矣又
曷嘗以專治喉名出其餘技已足震動殊俗若此則吾中
人之聰明材力何遽自小也先生今年越六十矣先生老
矣獨濟世仁物之心猶卽是書而日求精而未有止古來
德足濟世而我心之仁與天心之仁相合往往享高年臻

大耋天殆寬以歲月以徐俟其成而其一生精力所專注
爰至美備詳盡之域則後之讀是書者其實貴更當何如
也

時光緒二十三年六月大暑南清河後學聞溥拜敘

痧喉闡義目錄

疫闡

傳染闡

痧喉闡

毒闡

爛喉卽痧闡

治疫要領

用藥勿拘成格

引證金匱辨訛

發痧每不爛喉爛喉多兼發痧

治喉防範胃

痧象

喉象

各種見象

熱極旁流

口臭爲內腐先機

口糜屬胃病

齒齦見象

雙解有三說

分別傳染感發感冒

疑似辨症

痧類分門

陰痧附錄

集疫痧草湯藥痧喉全方

集疫痧草擬議

集葉天士瘟疫二方

集朱鐵山疫挾襍感痧喉類方

集吳又可瘟疫傳染類方

喉閉三方

增補濕霧上騰

痧喉闡義

古漢經鏡字書

疫闡

天有非時之氣地有旱澇之偏上下相摩氤氳鼓盪以致
清陽不升濁陰不降蘊結於中者曰瘟障蔽於外者曰瘧
沉埋欲降而不得降者謂之霾冒務欲升而不得升者謂
之霧是皆天地沴鬱之氣漫無所洩感觸萬物役使行災
謂之天行故其役於物也如天之使役是故謂之疫其厲
於人也如雷之壯厲是故謂之瘑其感也潛滋而暗長故
積之也深其發也一洩而無遺故發之也暴而蒙其氣者

則無論草木鳥獸百穀昆蟲舉凡神機氣立根外根中者
莫不薰染及之故雞犬每斃於災瘡禾稼亦傷於蟲螣人
染之則痧喉互發累巷盈邨其肆虐實烈於八風而傳染
尤嚴乎六氣爰疫之中具有毒之一義存焉更當爲之一

闡

傳染闡

疫痧傳染而六氣八風不傳染何也緣六氣八風可知可
避而疫則不可知不可避也蓋六淫之氣本自太和而爲
歲氣司天浸淫過度此淫之所以名也然天地間苟無此

氣相推運行則生化收藏之道盈虛消長之機幾乎息矣
故岐伯謂六氣八風人當知避則是寒也人知其爲冷暑
也人知其爲熱風濕燥火人知其爲風濕燥火是六淫之
默運可驗而知矧八風之顯來莫知警避故雖嚴寒酷暑
之盛行疾風暴雨之驟至氣似猛於時行而必無傳染之
患者良以此能知能避故也惟疫也不可知或歲值不承
或天符不應或在泉所侮或司天獨勝其至也非時其行
也無定雜賦六淫之內流行八風之中冒玄府而不知感
呼吸而莫覺人在氣交之中蒙被氣化猶白之能受采苟

非堅實之質孰能涅而不淄以故彼染此傳如磁引鉄感
真深淺發爲重輕一夫抱疴四方風動易曰或繫之牛又
曰邑人之災故能與時消息五類行災雖知之而已染且
避之而盛傳矣可不畏哉

痧喉闔

疫痧時氣吸從口鼻併入太陰氣分者則爛喉併入陽明
血分者則發痧太陰者肺臟也主喉而屬氣陽明者胃腑
也主咽而屬肌肉喉通呼吸之氣行乎五臟咽爲飲食之
道六腑源頭故喉主天氣咽主地氣是以口鼻吸入咽喉

傳導之肺胃交承之一臟一腑同受疫邪一氣一血各呈其象故爛喉者色多白病在肺而屬氣發痧者色多赤病在胃而屬血而其實同爲一痧一發於咽喉之地一達於肌肉之間移步以換形因形而名別耳故在肺則曰爛喉在胃則曰發痧是以名爛喉痧

疫毒與瘟毒有別

毒邪傷形形因腫潰疫痧有之故曰疫中有毒疫者鬱也卽濁陰之地氣鬱結不散復役於人以爲癟故又謂之疫也前賢吳又可葉天士悉以瘟疫統論而吳鞠通則又統

爲溫病名義未分而其實瘧者溫也乃司天溫熱之氣蘊
釀流行蘊於萬物以成災是故謂之瘧也瘧症腫而不痺
者乃本司天蘊釀之溫氣疫症痺而兼腫者實根濁陰鬱
結之地氣疫毒濁瘟毒升一在氣一在血也經曰喉主天
氣咽主地氣天地者在氣則爲清陽濁陰在人則爲氣與
血也故疫症之中有爛喉發痧之別者乃分人身之清陽
濁陰與夫氣與血也人身手太陰主氣然其經實多氣少
血故爛喉之中有紅爛白腐之二者乃分太陰之氣與血
也人身足陽明主肌肉以其經氣血俱多故發痧之中有

丹痧白疹之二者實分陽明之氣與血也緣丹痧之發係
血爲毒干血卽敗壞而變色於是肌膚漸腫露出痧點外
呈卽是疫毒之邪游溢胃之經絡傳從血分達出譬猶他
邪之從汗解緣他邪無毒得汗可解獨疫邪有毒而毒必
炎形故或癢或痛或爛或癰血分之毒盡透乃已又考麻
痘二症麻發先天之陽毒痘發先天之陰毒雖發所當發
然必借天行時氣以引之而後人身之毒方出天行者疫
也由是以觀同氣相求疫能引發痘麻之毒則是疫中有
毒不待明矣然則痧喉一症先天之毒雖無時行之毒必

有症固不比於痘麻亦可借痘以罕譬而痧實發乎疫毒也又明矣

爛喉卽痧闡

爛喉卽痧乃氣血同病內外異形之故而雲間朱鐵山獨創痧本喉末之論是不知氣血之形當有別耳其論謂痧邪之發必先見咽喉腫痛是癟邪痧子爲本咽喉咳嗽爲末而諸醫偏重於咽喉而忽於痧子舍本求末執守內經諸痛屬火紅瘡爲熱之說急進寒涼遏伏癟邪以致體弱者病勢轉重而醫猶謂病重藥輕寒涼倍進痧毒內陷喉

閉疫升命歸泉路要知頭面腫赤乃痧毒外達之勢正當
表散開達毒自不留直待腫退痧回鼻流清涕方進涼血
清解靡不速效按鐵山初宜表散繼宜涼血之論誠可謂
知所先後矣若以發痧爲本而宜散爛喉爲末而宜涼則
是疫有二邪一病兩治緣痧邪之發氣血有分形痧喉無
本末治之之法皆當一本於痧均要先解後涼抑或涼解
雙用斷不能以痧爲本而宜散以喉爲末而宜涼也至內
經諸痛屬火紅癰爲熱二語諸醫執論痧喉何嘗不是第
經不又曰火鬱發之諸醫若更執此以治疫則於痧喉一

症當無剩義是內經之旨本詳明而領經之趣則自晦非執之咎實執而不化之咎若陳耕道疫痧方中所論表邪末也火熾本也二語確是深明本末之理而吾以爲無所本末痧喉一症名雖兩殊實則一痧分呈乎內外耳要知在氣在血屬肺屬胃均是一邪所發也

治疫要領

疫痧一症不外熱毒二氣互結而成熱爲火之餘故熱勝則腫毒爲穢之積故毒勝炎膚然熱非清涼不解而毒非芳香不除卽以清涼解毒芳香逐穢八字爲治疫要領再

視其氣血重輕隨症通變而治疫之法要不出此八字範圍至推拿針刺其法最古大旨多爲痺症而設痺者氣機阻閉不得流通之謂也針之取義如以管入水閉其上則下不出旁穿一隙則水自洩故人病痺不通卽刺經穴以通其氣推合毛竅以疎其氣非謂針刺可洩毒邪也蓋毒旣于經豈一針之微遂能將毒洩出故針法有補有瀉若陰虛火旺血不營經而爲阻痺或寒凝經絡而爲筋痺針之卽所以瀉其氣而使通又恐經氣過洩故又以針補而閉之若病非痺症可毋庸多用針刺徒傷經絡是以素問

謂升降出入無器不有出入閉則生機化息故針之用在乎通而非所以洩毒也

用藥勿拘成格

痧喉症不挾風寒外遏者只宜疏託外達忌用溫燥發表蓋疫爲陽邪而發散大都陽藥動則胃津腎液被刲消亡若無結胸內陷症者只宜甘涼泄熱忌用苦寒消導往往痧勢將達反爲寒涼遏伏故葉天士以發散消導爲疫家大戒意旨良深窃謂疫根於熱雖曰口鼻吸受肺胃感邪然以類相從君相二火亦當內應故每直布三焦逆傳胞

絡則邪在裏而不在表使以燥劑表之是重虛其表而反
實其裏勢將逼成內陷若從玄府染受者未侵營衛病在
表而不在裏使以下劑導之則裏氣愈虛表邪愈實亦將
引邪內陷故發散消導均有貽誤嘗攷諸家論說每謂初
失之表誤用寒涼將邪遏伏確論名言實有見地第恐拘
迂之輩不察表裏之由不分病勢輕重視寒涼爲畏途奉
發散爲圭臬成見實足貽害故虞山陳耕道謂治疫之要
當於一發之時見其勢之順逆宜散宜涼一決無誤斯爲
老眼此論誠有贍識獨折其衷故將前賢二說引而仲之

以明用藥之方重在勿拘成格

引證金匱辨訛

痧喉引證未見有人獨吳閩唐迎川誤將金匱論陽毒之爲病面赤斑斑如錦文咽喉痛吐膿血五日可治七日不可治升麻鱗甲湯主之細繹其義實與此証相類何會心者之絕少耶蓋以升麻升透厲邪鱗甲泄熱守神當歸和血調營甘草瀉火解毒正內經熱滯於內治以寒鹹佐以苦甘之旨而內有蜀椒雄黃似當置於陰毒方中或因傳寫之訛耳一轉移間則於陽毒陰毒尤爲貼切而人之用

之者亦鮮疑畏矣今遇此一証當於經義求之毋謂古人
之未及也在迎川之意以爲陽毒卽是疫痧不知金匱所
論乃風寒凝滯久蘊身中內腐氣機外傷肌肉病發氣分
者曰陽毒病發血分者曰陰毒實非疫癘時行之毒也迎
川蓋不知此故於蜀椒雄黃二義未識從治之方顛倒錯
置大乘金匱本旨卽以疫論原無取乎蜀椒雄黃縱使用
之亦當置於陽毒取其導火下行芳香解穢正是以火引
火從治之義陽毒恰好用之若在血分名曰陰毒者則是
陰血已爲蘊毒所傷豈有再加辛熱更灼其陰之理正宜

去此二藥僅用泄熱養陰治法至穩至當何謂傳寫之訛
况吐膿血爲痧喉絕少之症卽或有之亦係肺胃腐爛而
吐毒焰肆虐至此臟腑已不可堪安有不陷心胞須臾斃
命之理尙何待至五日而猶曰可治耶迎川誤引金匱亟
當爲之辨正

發痧每不爛喉爛喉多兼發痧闡

臟腑之質有勝有偏呼吸之司氣無二息若肺氣實而胃
氣虛者胃腑受邪宜發痧而不爛喉若肺氣虛而胃氣實
者肺臟感疫宜爛喉而不發痧何以發痧者每不爛喉爛

喉者多兼發痧緣肺主呼吸聲息飲食與胃相依況肺脉
起於中焦下絡胃之上口竇門之地肺家既見爛喉喉毒
隨吸入胃胃家吸受肺毒是以必兼發痧縱輕微不覺必
膚養依稀此爛喉無不發痧者以此又內經曰陽病者上
行極而下是以肺病累及於胃正上行極而下也順也胃
病不害於肺者乃疫爲陽邪不應下行極而上也亦順也
故發痧每不爛喉爛喉多兼發痧者又以此也

治喉防範胃

爛喉治肺固當然矣然宜防範及胃其故有二內景曰喉

在前其形堅健咽在後其質和柔前後雖有區分然在懸
雍以下會厭之間方分氣食二管爛處乃是咽喉交互之所肺胃未判之區安可治肺畧胃此胃之不可偏廢者一也又以咽喉呼吸聲息飲食與胃依隨如影之能從表更宜防範胃家此胃之不可偏廢二也故曰治喉防範胃卽是上工治未病

痧象

痧之順逆大都先發胸背而後四肢者順先自頭面而後腿足者亦順而痧之色要在紅勻不在多寡如鮮紅細碎

着手有痕者吉週遍均勻肌膚作癢者亦吉徐徐緩達從
裏透出者亦吉凡此之類雖多如雲錦亦不爲凶若驟如
紅紙者爲胃熱極盛色紫且黑者熱毒灼動陰血全黑者
胃爛不治然黑而亮者在氣血充足之人亟進涼血泄熱
間有一二挽回惟黑而暗者必死若痧雖黑四邊隱隱帶
有赤色者爲火鬱內伏大用涼血解毒尙冀轉紅可治若
驟形滅沒神色昏迷者爲內陷肌膚作癢者營衛猶和膚
燥無汗者毒灼液乾難於透達痧透後點土白泡繫繫者
并非痧疹互發乃是熱毒極盛一痧猶不足以盡其毒故

點上再加白泡泡大而有漿者多內痧後遺毒發於項頸者難治汙後痧隱者險四肢浮腫而亮者多敗於十日之間

喉象

喉中小粒其色多白者乃邪干太陰發於氣分之故俗有時喉白爛之名若素有伏寒或挾濕邪者爛痕亦多白色大都白爲肺金本色無繫重輕若白而且腐狀如粉皮者乃氣分大傷爲難治若白爛展開穿及鼻孔者俗名天白蟻難治若色現鮮紅者乃疫干太陰血分若紅點一二

吹藥多涎者熱雖盛而液尙未傷易治若吹藥而涎不生者津液大虧難治若痧透後而喉爛尤甚者爲外毒雖鬆內毒尙猛屬險症若喉內爛而外瘡且堅者爲毒結喉間無從發洩難治若爛至喉底不見好肉者爲敗象多斃於五日之內

爛喉而噴嚏者肺機開洩爲吉呃逆者毒火上逆爲凶嗰然而咳者毒火射其肺系爲險頻聲而咳者邪襲肺經爲吉爛喉而不咳嗽者爲險失音者肺熱葉焦氣促者熱盛灼金

各種見象

痧症而腫目赤者以疫爲陽邪而頭爲諸陽之會以陽重陽故頭目多見腫赤而吳又可溫疫論謂腫是兼有水腫而發又謂裏邪失下表裏氣滯而然按此二症或亦有之而疫之腫乃內經熱勝則腫之腫雖無兼症亦應見腫痧之脉宜絃數有序忌軟弱無序若沉而伏者爲邪未達出宜進疏托數大而空虛者爲正弱邪勝宜勿傷正氣陽症見陰脉者難治

面色紅而亮者爲火盛青而滯者爲毒盛內伏恍白而呆

者爲夙伏寒邪青黯而喉不爛或不甚爛者爲素伏濕邪
治之之法在寒濕附及者治參辛熱濕熱附及者治用辛
涼

鼻瘡者乃胃脉起于山根胃熱極而根源應之故瘡鼻紅
而瘍者乃鼻爲肺竅肺胃之氣均爲熱傷正氣不支而欲
絕初起一團黑色繞於鼻間者乃胃家伏毒已甚鼻衄者
乃胃脉下挾鼻孔胃熱湧血上行溢從鼻竅而出舌苔灰
而臧者爲濕霧上騰邪未化火純白而臧者爲素挾寒邪
均宜疏達舌赤多刺者爲邪已化火宜清化舌絳中黑者

爲津液虧耗宜救液舌白中絳者爲外束寒邪宜双解舌
絳且縮者爲熱陷心營宜育陰舌苔黃厚者爲胃熱將解
宜清胃熱

唇絳者乃陽明之脉環於唇爲胃液虧唇紫而裂者爲胃
液涸宜救液

譖語者爲邪陷心胞不譖語而鼾睡迷悶喉有痰聲者爲
毒霧濛閉清宮最防內陷

惡寒者爲初邪侵衛惡寒而後熱者乃邪既入衛則隨衛
氣以出入遂常熱而不復惡寒治之之法要乘其未熱之

先或寒熱交作之際疎而達之攔其入營之路

嘔惡者藉洩胃熱爲吉欲吐不吐乾惡神呆者爲胃邪將犯心營

便閉者胃有燥屎爲火結

腹痛者最忌爲悶痧

有汗者心液足爲吉無汗者心液虧防內隘
足無汗者乃疫爲陽病陽病之情應由上行極而下邪未
及於足陰故足應無汗非關汗出不遍也

熱極旁流

便溏而色黯者以大腸爲肺之表乃邪從表洩正是解機
若黑亮有光粘稠如漆者乃熱極旁流反爲不美蓋疫毒
之邪內干臟腑在正氣盛旺之人則邪流腸腑從便而洩
腑毒即可驅除若正虛邪實之人則邪布三焦滯留腸胃
劫動陰血化腐脂膏漫無所洩溢從地道旁流而出形似
淤血凝結而成不堪其臭有象之邪雖洩無形之毒方張
莫謂寇去城空乃是盈中溢外亟用重劑清化以淨臟腑
之邪未可再事狐疑誤認邪從表洩是熱極旁流一症爲
死生一大關鍵幸勿忽諸

口臭爲內腐先機

爛喉而口臭者有牙疳穿頸等症其氣皆發於口中非從喉內達出若無牙疳各症而臭穢之氣逼人從喉間達出者爲肺胃化腐之機蓋跡雖未形而機則已露爛喉之消息系乎口臭之重輕不徒喉爛之深淺若使一聞此氣無論爛與不爛亟進清涼化毒治其未病斯謂上工

口糜屬胃病

口爲脾之竅胃爲脾之表而胃之脉起鼻上額挾口循頰故胃熱極而上騰則口圜唇糜腫芒刺有膿色紅者疫熱

雖盛未入陰營色紫或黑者陰血已動乃爲險症然較之
口臭症屬畧輕若僅口糜而色不紫黑者尙非絕症第口
臭儘有不口糜而口糜斷無不口臭分別之處一自口中
呼出一僅唇外難聞法以上用輕宣下清胃熱因勢利導
上下兼賅方無遺漏

齒齦見象

齒乃腎之餘齦爲胃之絡胃陰灼耗則腎水之源難既濟
而坎中之火震爲雷胃液腎津源根一派齦牙唇齒脉絡
貫通故胃陽血動則齦中血色黃如敗醬胃熱極盛則齒

燥如石而有光腎陰血動則齦中血辦紫如黑漆腎液耗
乾則齒枯如骨而無彩甚至齒黑忽然脫落抑或穿頸牙
疳均爲極險之症亟用下奪之方以潛龍雷之火不使腎
水煎枯庶免陰從下竭更叅育陰之劑以冀赤地流膏勿
令胃液消亡致使陽從上厥

双解有三說

時行疫氣非風不傳故列子謂風爲大塊之嘵氣雖陰霆
不開之氣一遇風鼓盪之卽從其化而爲陽矣故疫屬陽
邪而陽淫熱疾初感在表雖屬惡寒然邪之來本於火熱

此双解之涼散兼施者一也至惡寒之故乃風傷於衛熱
傷於氣故衛氣不敵而退縮邪卽勝之而寒作矣陽邪鼓
動最速旣侵衛分旋隨衛氣以相出入又從衛化而爲熱
所病原在於衛本無損於陰營然久戀衛而不祛將風勝
則動熱勝則腫於是陽亢陰消陰亦灼耗而營傷矣所以
疎達養陰不能偏廢此双解法之所以當施者二也又若
初起神呆痧點隱約燥熱爛喉來勢猛烈者當此之際使
認症不清而以小劑嚥試直是優柔養奸必致釀成巨患
譬之車薪杯水適以增焰何能止炎若僅以苦寒從事不

加双解則是不通風火之情激成燎原之勢勢必猛烈尤
甚氣焰愈增推疫之氣從風從火風火相生變端甚速然
風之性宣疎而火之情尙達所以涼劑中必兼疎達也以
此蓋寒涼之性非下卽閉適與疎達相反實是拂其情性
何怪電掣風馳激之生變假如酷暑大熱赤日懸空雖驟
雨而無風不但氣不轉涼而反因之加熱正是熱爲雨遏
熱氣何自而宣但得微風疎動燥氣便覺消除使再加雨
潤之卽轉太和氣象此双解之所以當施尤貴重施者三
也

辨嘯圖書
分別傳染感發感冒

時行疫氣雖易染人未見盡人而染何也自召之也召之何由由夫人之氣質素弱藩籬又疎於是疫從口鼻而傳痧自肌膚而染者謂之傳染抑人正氣雖足而或外伏他邪則是素有伏邪更感時行而發者謂之感發更有外強中乾雖身無伏邪而賦質偏勝則是氣有所偏疫乘其偏而冒受者謂之感冒必也正氣內充更無夙疾少神志之煩絕勞頓之役不傳不染其殆庶幾

疑似辨正

岐伯曰不相染者正氣存內邪不可干是疫之入也必乘其虛然虛有內外故感有淺深氣有偏勝故症有疑似其在內氣實而外氣虛者雖感冒輕微亦應見微疾故認症難真辨之之法惟咳嗽膚癢脉象絃洪而帶數隱約痧形在所必見其襲于皮毛者則內應乎肺故目赤者以白珠屬肺膚癢者以肺主皮毛喉痛者以喉爲肺管溏洩者以大腸爲肺之表邪從表洩咳嗽者爲邪襲肺經是皆皮毛冒疫其象如此抑有皮毛閉密邪不能侵而或困乏其身四肢感冒者則內應乎脾而脾又與胃相爲表裏故肢癢

者以脾主四肢液乾者爲脾不輸津作渴者爲胃熱思飲
嘔惡者爲胃邪上越不思食者爲邪襲胃經不寐者爲胃
有燥屎發痧者爲邪達肌表是皆因正氣內充外冒疫邪
而不能循經入內者其象又如此均爲疑似之症最易誤
作他邪故特爲之辨別以明似是之非

痧類別門

痧之一症昔人概以斑疹痧麻目之獨麻一症係發先天
之陽毒外此則大塊如斑者曰癍細熾如錦者曰疹黍粒
如沙者曰痧而其實白疹發胃陽之邪丹痧洩胃陰之毒

陰陽赤白雖有區分癰疹痧麻悉歸胃腑故古人一概統論不分痧目科條吳又可則混於溫疫葉天士吳鞠通悉叙於溫病而時賢更于痧之中別出喉痧紅痧悶痧風痧瘡子疹子等目其名不一其義則同前論已詳言之矣乃若風痧等類譬猶強弩之末氣勢雖微中人亦利有不咳嗽不發熱不過喉間微痛皮膚作癢而已初本輕微人多輕忽苟忽之不治將釀成悶痧難于救藥其故以人既干邪則腠理常開衛氣漸馳而正弱正氣既弱則口鼻呼吸尤易內傳況復身中伏疫卽從腠理而循經隧由經隧而

千臟腑內外響應其勢甚速星星之火可以燎原故古人常謂禍忽于隱微病生于不覺誠人防其漸也至于悶痧形狀亦不過微惡寒熱痧點依稀狀與風痧相似獨神昏鼾睡面黯身青則大異于風痧良由感疫極深體弱難任無力發出或加他邪再束或爲涼藥誤投悶閉於中發洩不出勢成內陷而死故曰悶痧


陰痧附錄

俗有發痧一症卽古所謂暑月中惡陰凝腹痛之痞氣也旣非傳染復非疫癟俗曰脹痧烏痧釣腳痧絞腸痧等症

與疫相反而俗亦謂之痧者尤當附以辨明蓋疫痧者傳染時行而發陰痧者卒中惡氣而然惡氣者何卽矢氣也矢氣者乃濁穢所積襍挾陰邪感人之身如矢中的其氣陰凝故不傳染爰盛夏之時六陽盡發于外六陰盡藏于內故夏氣升而井水寒人身應乎天地臟腑應屬寒涼藩籬因而不密以故陰邪易于矢氣易入人則直射貫革痛楚難勝若無伏邪而感者立致容顏慘黯腹痛腸鳴閉阻氣機四肢厥冷祇須推拿採刮使血氣頻分頻合陽氣疏通矢氣遂從肌肉傳達而出漸露痧點外呈勿藥亦可自

愈然須一周日不能飲水飲則邪留經絡一遇寒涼憤鬱最易舉發不可不知若有伏邪而更干矢氣者則直射腸腑立致血脉凝泣營衛失司霍亂吐瀉釣腳絞腸痛不可耐厥逆身僵人事不省亟以辛熱溫通之品逐其凝寒芳香靈明之藥導其關竅俾氣血流暢陽和頓開亦可立愈故無論輕重而腹痛腸鳴在所不免良以腹內寒涼復襲矢氣于是腹爲寒凝而疼痛腸卽阻結而如絞此絞腸之所以名也至于釣腳乃足爲三陰脉絡發源之所陰從下受故傷陰絡陰絡凝泣脚不能伸而爲釣此釣脚之所以

名也救之不及命斃須臾是皆中惡腹痛痞氣陰凝之症
俗雖謂之發痧實與疫痧之痧有由異卽傳染與不傳染
所由分也



照錄虞山陳耕道先生疫痧草湯藥章

宇按陳耕道先生方法無一不是涼散兼施蓋深得夫表邪爲末火熾爲本之旨故立法有條不紊宜其百發百中效驗如神惟疫症之中或加內有挾濕或外折暑寒或宿痞畜血或邪實正虛均爲疫中常變之症不揣固陋採集前賢成法附於篇後以待同志叅稽

疎達之劑三首

痧邪在表火不內熾痧稀熱輕神清喉不爛此爲先達後清之法

葛根湯 治身熱神清瘍隱稀疎舌白脉鬱而喉不甚爛
者宜之

葛根 牛旁 荆芥 蟬衣 連翹 鬱金 甘草
桔梗

加減桔梗湯 治無汗瘍隱舌白脉鬱喉爛不甚者

葛根 牛旁 香鼓 枳壳 薄荷 馬勃 蟬衣
荆芥 防風 連翹 焦梔 赤芍 甘草

香豉飲 治瘍隱脉鬱喉腐舌燥症雖乍起津液不足神
雖清爽邪火內伏者宜之

香豉 牛蒡 荆芥 桔梗 連翹 焦梔 馬勃

大貝 人中黃

清散之劑

二首

疫痧重者疎散清化宜並進也表邪未除疎散固不可少疫毒內熾清化更不可遲表邪未也火熾本也症雖乍起而灼熱無汗痧隱成片喉爛神煩是火熾已甚若仍泥於無汗痧隱而必一味疎達恐愈疎而汗愈無痧愈隱矣愈達而神愈昏喉愈爛矣不顧治本之火而徒治表之邪舍本求末焉

能奏效故立清散一門表本兼賅邪火並治如常

山蛇擊首應尾觸處洞然

葛犀湯 治灼熱神昏煩燥喉腐脉弦痧隱成片不分夥

粒無汗舌垢者宜之

葛根 犀角 牛旁 桔梗 連翹 焦梔 蟬衣
荆芥 馬勃 查炭 甘中黃

犀豉湯 治喉爛痧隱脈弦神昏煩燥熱盛汗少舌絳口

渴症雖乍起而疫火燎原有內陷之勢神昏甚
者兼用萬氏牛黃丸

犀角 香豉 牛蒡 荆芥 連翹 焦梔 馬勃

大貝 蟬衣 赤芍 桔梗 甘草

清化之劑

方四首

疫痧之火迅而烈清化之劑不可緩尤不可輕若表邪未解內火已熾須見機於疫火未肆之前而先化其毒故散必兼清若毒焰已熾則是寇發再捕奏功難效矣倘表邪已解火熾方盛痧透脈絃喉爛舌絳口渴神煩此時清化不重用正如杯水救車薪決其無效

犀角地黃湯 治痧點已透火灼液虧脈弦數大喉爛舌
絳者宜之如火灼液虧舌絳喉爛卽痧未透發疎達品
中亦宜加之此湯乃化毒救液之妙劑也

犀角 地黃 丹皮 赤芍

犀羚二鮮湯 治痧點雖透而喉爛極甚脉弦大而口渴
神煩舌絳唇乾火熾液涸者宜之

犀角 羚羊角 鮮沙參 鮮生地 黑山梔

連翹 甘中黃 人中白 大貝母 金銀花

馬勃 陳金汁 元參 生石膏 川黃連

奪命飲 治疫極盛津液乾涸舌絳口渴神煩喉爛脉象
弦大痧點雲密者宜之

川連 石膏 扉尖 生地 丹皮 赤芍 青黛
馬勃 大貝 連翹 元參 金汁 羚羊角
鮮沙參 人中黃

清肺飲 治痧點已透喉爛漸減神爽熱淡而咳嗽未平
者宜之

桔梗 鮮沙參 羚羊角 連翹壳 生甘草
桑葉 鮮沙參 羚羊角 連翹壳 生甘草
桔梗 杜橘紅 川貝母

下奪之劑 方二首

下奪之劑不得已而爲之也表邪未解內火已熾
可以助疎遠之品而爲斬關之將者双解散是也
表邪已解火熾猶甚可以佐清化之品而有奪門
之能者四虎飲是也重劑可施於正強邪實之人
正強邪實而表邪未解者必無汗痧隱喉爛神煩
便閉脉實施之双解不亦宜乎表邪旣解者必得
汗痧密喉爛神燥脈實便閉進以四虎不亦宜乎
此重劑之所爲不得已而設也

雙解散 治痧點隱約喉爛氣穢神煩便閉目赤脉實病勢初起正強邪實者宜之

大黃 元明粉 葛根 牛蒡子 荆芥 大連翹

薄荷 蟬衣 枳壳 人中黃 桔梗

四虎飲 治痧雖透而喉爛極甚脉象弦數目赤便閉神煩舌絳疫火甚者宜之

大黃 黃連 犀角 石膏 知母 元參 生地

青黛 馬勃

救液之劑 方二首

救液是佐使之一法火盛液虧者必需之疫痧症
不離乎火火甚者液必虧病必危救液之品化其
毒於恬淡之中養其陰於未涸之候佐疏達之品
不嫌其凝寒佐清化之方無憂其液涸救液之劑
曷可緩哉

五鮮飲 治舌絳而乾脈弦數大痧隱而喉腐不甚者可
與葛根湯并服痧隱而喉爛者可與犀豉飲齊進

鮮沙參 鮮生地 鮮茅根 鮮蘆根 甘蔗汁

育陰煎 治痧透肌燥舌絳液乾喉爛便閉脈弦無神者

宜之

元版 獸甲 生地 丹皮 大貝母 金汁

麥冬 知母 鮮沙參 花粉 元參 犀角

附全錄疫痧草一切擬議

一爛喉症初起色紫而豔來勢甚猛卽用瘡醫大全痧疹論中方歸尾紫草桃仁蒲黃地丁等藥參酌出之頗能見效

一爛喉痧症或咽喉不甚腫痛初起時身現微紅似有似無之狀脉伏肢涼面白青唇紫口閉流涎目睛直視指甲

青滯胸腹飽脹氣促神昏四肢抽搐等症此悶痧也雖
百無一生亦不忍坐視其斃速用卧龍丹多吹兩鼻多
嚏爲吉隨用真蘇薄荷錢許煎湯磨太乙紫金錠二枚
頻灌之候形色少轉再酌進煎劑如無以上諸般閉象
不宜輕用吹嚏辛燥之藥

宇按悶痧一症多有卧龍丹難開其閉者故特附以棗
塞鼻隨息出入開喉啟閉一方於最後以補缺畧試無
不效功具回生幸勿輕視

一爛喉痧無論已暢未暢之時若咽喉痛腫不堪形色紫

膿尙未潰爛或已破未深而項外漫腫堅硬痰氣壅閉
湯水難容者急用喉針在喉之兩傍高腫處刺入分許
二三下咯去紫黑毒血隨時便可下藥亦不致於大潰
一刺喉痧用衣針刺兩手大指內側爪甲根分許卽少商
穴也刺入分許擠盡紫血最能開洩肺經熱毒

一爛喉內外不甚腫痛可進湯水不甚腫痛色淡不膿潰
爛過深者皆不必刺如脈細神昏毒已內陷者亦不必

刺

一爛喉痧嘔吐肢涼皆緣陽明疫邪壅閉以致腠理不開

氣結不舒斷不可作寒症治之以投辛溫如蒼朮厚朴半夏肉桂附子生薑之類又初見痧形似有似無驟然驚搐者亦不宜用苦寒鎮驚之藥如牛黃蘇合等丸此二症均宜透疹得暢自能漸愈如喉已潰爛芫荽觀音柳棉線紗櫻桃核一切忌用卽不潰爛疫痧溫熱均不相宜

一 疫痧草中犀角地黃一方似須曆後用書中雖未載明臨症務宜酌用

吹喉十寶丹 島治爛喉痧症無論已潰未潰腫痛色黯

並治痘毒以及痧疹後牙疳楊梅後毒結咽喉功能消腫止痛化毒生肌仙方也其效如神屢試屢驗萬勿增減是幸

西牛黃三分大貝母三分

去心蝦入中白五分

血琥珀五分大珍珠六分

另研入豆腐內煮去油

大梅片半分

潰爛不宜多用

人退甲四分

陰陽瓦炙焦如一時難覓卽用蝦龍骨四分亦可

鯖魚膽五分

大者佳陰乾收

用如無鯖魚膽卽用青葵核三枚代

馬勃三分硼砂四分

右藥共研極細末專治此症其他喉科各症自有喉

易經醫案
科吹藥未可概用

又漱喉方

鮮土牛膝根洗淨搗汁重湯燉溫頻頻漱之極效并治一切喉症消腫散血止痛化痰

又漱喉方

萬年青葉洗淨搗汁加滴醋少許頻漱其喉倘已破爛不可加醋

項腫敷方 卽時毒門中二物拔毒散而治痧疹後毒結項外漫腫堅硬無論其色紅白效驗如神潰處忌用

生白礬 透明雄精

紫金丹 專敷項外漫腫

尿池中多年碎磚木炭火煅紅再入醋內泡透再泡再
煅五六次取出研末每兩加入麝香一分用滴醋白蜜
各半熬滾調敷如塌皮形色紫豔用陳菜油加蛋清少
許調上治同前症

牙疳神方 治痧疹後走馬牙疳先用冬青葉煎水漱淨
再以此藥乾上

青黛一錢 西牛黃二分 煅人中白一錢 水片三分

大珍珠五分回龍骨一錢瓦上煅炭舊紅毛子炭一錢

小紅棗

七枚去核每個內入明雄少許煅炭

血餘炭一錢

右藥共研細末磁瓶收貯勿令洩氣

驅瘟辟邪法

生軍片二兩

棉茵陳一兩

茅蒼五錢

降香末一兩

拌勻不時燒烟薰之惟病人臥室不能用恐防嗆咳

集葉天士醫效秘傳治瘟疫二方

甘露消毒丹 治病從濕化發熱目黃胸滿丹疹泄瀉察其舌色或淡白或舌心焦乾濕邪猶在氣分者宜之

石菖蒲六兩 飛滑石十五兩 淡芩十兩 茵陳十一兩

藿香四兩 連翹四兩 白蔻四兩 薄荷四兩

川貝母五兩 木通五兩 射干四兩

神麴糊爲丸

神犀丹 治壯熱旬日不解神昏譫語斑疹當察其舌絳乾圓硬津涸液枯寒從火化邪已入營者用之

犀尖

六兩

生地

一斤

熬膏

香豉

八兩

連翹

十兩

黃芩

六兩

銀花

一斤

金汁

十兩

元參

七兩

花粉

四兩

紫草

四兩

板藍根

九兩

石菖蒲

六兩

用生地香豉金汁搗丸每丸重三錢開水送下

疫挾雜感集方

出朱鐵山痧喉論

宇按前錄疫痧草全方乃爲疫痧爛喉專症而設并無雜挾他邪者蓋挾寒挾濕均爲疫症之常爰採朱鐵山數方補其闕畧鉄山所論謂當察其發熱之始時令寒暄酌而治用尙嚴寒是挾雖桂枝葛根麻黃亦均可用勿以辛溫而遲疑此言誠非墨守經曰必先歲氣毋伐天和其斯之謂故其方中有升麻白芷蒼朮柴胡各禁藥雖惇治疫之旨然疫中係有是症故雖在禁而不得以禁之特爲錄出以備一格聊爲神而明之者之用耳

荆防葛根湯

治風寒外束皮膚閉密痧疹逡巡不出又

治形寒乍熱咽喉腫痛咳嗽胸悶鼻塞嘔惡兩目汪汪
手足指冷脈來濡數或現浮數宜服此湯

荆芥

錢半

防風

錢半

生甘草

四分

杏仁

三錢

便溏者勿用

桔梗

錢半

牛蒡子

三錢

蟬衣

一錢

炒枳壳

一錢

象貝

錢半

葛根

錢半

加減藿香正氣散

治內挾濕滯外感戾毒復爲暴寒折

伏表裏爲病陰陽不通現在形寒發熱面赤如粧痧隱
上吐下瀉腹痛如絞甚至發厥口禁目閉神昏最爲危

候多有朝發夕死若投寒涼清解有如操刃急用此散一二劑但得暢汗吐瀉厥痛漸止痧得焮赤扶過三日庶無妨礙此證吐瀉後津液大傷必然發渴思冷切忌甘蔗水梨寒涼之物

藿香一錢土藿梗錢半桔梗一錢陳皮一錢

茅术

一錢炒

厚朴一錢五分

炒

甘草四分

研

牛蒡子三錢炒研

赤苓

三錢

焦麵二錢

夏麵一錢五分

炒研

煨葛根一錢

蟬衣一錢

升麻葛根湯 治質體單弱痧不透達

升麻一錢 葛根一錢 赤芍八分 生甘草四分

加減透邪煎

當歸錢半 荆芥錢半 防風錢半 白芍錢半

牛蒡子三錢 升麻一錢 炙草四分 蟬衣一錢

酒炒

治痧不透達服升麻葛根湯後仍不達再進此湯

加減託裏舉癰湯

升麻一錢 柴胡一錢 當歸二錢 白芍一錢 白芷一錢

酒炒

穿山甲錢半 泡研 防風錢半 浮萍草二錢 炙甘草四分

服透邪煎後痧仍不達再服此湯

蘋荽酒

治痧隱不達或達而復沒服升麻葛根湯或透邪煎托
裏舉癰湯托之外用蘋荽兩許酒水各一碗煎滾以苦
蔴根蘸酒撲而擦之

時喉白爛吹藥方

真西黃二分生麻珠六分西琥珀五分青黛八分
象牙屑八分培脣壁錢五十箇卽扁螭蠅人退甲五分
馬勃粉三分上冰片一分培脣

研末吹喉

預防傳染解疫方

銀花

八分

桑葉

一錢

大麥冬

一錢

生甘草

四分

料豆

二錢

買衆

一錢

引用菉豆黑芝麻各五錢擣勻再取黃土一塊長流水攪去土入菉豆芝麻熬湯煎藥可解疫除熱保肺清金

傳變集方

出吳又可瘋疫論

字按疫挾雜邪前採諸方大畧已備惟疫本陽症變動
不常有上焦之邪羈脅脣膈而宜吐者有失下之黃痺畜
血而宜攻者有疫全在裏勿拘結冀宜注意於逐邪而
用三承氣者緣三承氣爲傷寒傳變而設傷寒時疫本
自不同而邪之流冒腑發爲傳變則同故吳又可沿疫
用之又有應下不下貽悞因循正虛邪實而補瀉兼施
者均爲疫痧中變出之症爰採吳又可遵張師仲景法
數方以補前篇之未及

瓜蒂散

治邪在胸膈心煩喜嘔欲吐不吐欲飲食而不得飲食
腹不滿卽傷寒中懊惱症治疫亦同宜此湯吐之

甜瓜蒂一錢 赤小豆二錢研碎 生山梔二錢

右用水二鍾煎一鍾後入赤小豆煎至八分先服其
半一時後不吐再服之盡而煩滿猶然者再煎服如
無瓜蒂以淡豆豉二錢代之

茵陳湯

治遺熱下焦小便不利邪無輸洩經氣鬱滯其傳爲癰

身目如金者宜之

茵陳二錢 山梔一錢 大黃五錢

水薑煎服

按茵陳爲治癰退熱之專藥黃因小便不利故用山梔除小腸屈曲之火當以發黃爲標小便不利爲本病原不在膀胱乃係胃家移熱又當以小便不利爲標胃實爲本是以大黃爲專功山梔次之茵陳又次之也設去大黃而服山梔茵陳是忘本治標焉能有效而或誤用茵陳五苓不惟不能退黃而反小便難

利何也爰茵陳五苓乃襍症發黃之方故非疫症之所宜也

桃仁承氣湯

治失下畜血邪羈下焦無以自洩血爲熱搏留于經絡敗爲紫血溢于腸胃腐爲黑血便色如漆大便反易卽本論中熱極旁流一症是也雖有結糞亦宜潤下結糞縱行真元已敗多至危殆或有狂喜善忘乃血中伏火波及心家仍從胃治

又謂因胃失下表裏壅閉鬱于經隧而爲發黃者宜之

大黃 芒硝 桃仁 當歸 茯藥 丹皮

抵當湯

治畜血結甚服桃仁力小而血結猶不能行者宜抵當
湯蓋非大毒猛厲之劑不足以抵當之故名

大黃

五錢

虻虫

二十枚

桃仁

五錢

水蛭

五分

炙乾研末爲末

黃龍湯

治正虛邪實補瀉兩施乃應下不下火毒壅閉耗液搏
血精神迨盡邪火猶存以致循衣摸床撮空理線筋惕
肉瞞支體振戰目不了了邪實正虛補之則邪甚攻之

氣不支兩無生理不得已用陶氏黃龍湯與其坐以待
斃不如仰藥而亡或可挽回萬一此方之用惟在虛不
甚虛實不甚實之際用之最妥

大黃 厚朴 只實 芒硝 人參 地黃 當歸
人參養營湯

治同黃龍湯症

人參 麥門冬 五味子 地黃 當歸身

白芍 知母 陳皮 甘草

三承氣湯逐邪非逐實說

三承氣湯本爲熱邪在裏逐邪而設非專爲結糞而設也若必俟結糞而後用之則血液已爲熱搏變症迭起是猶養虎遺患况多有溏糞失下變爲熱極旁流至死而糞不結者用承氣下之則毒邪消去脉証便鬆豈可拘拘于結糞而後下哉要知結糞是因燥致結非因結致燥也邪爲本熱爲標而結糞又爲標之標治當下其邪之本不必待結糞之標故三承氣雖能下結糞而係專爲下邪之藥非係專下結糞之藥也

又治人方肉食而病適來食積胃脘者用大小承氣連

下惟見臭水稀糞再於承氣湯中加人參一味雖三四
十日所停之完穀於是方下蓋承氣湯藉人參之力鼓
舞胃氣宿食始動也

小承氣湯 治痞與實者宜之

大黃五錢 厚朴一錢 枳實一錢

薑煎服

大承氣湯

治痞滿燥實用芒硝者以能更堅化實而潤燥也

大黃五錢 厚朴一錢 枳實一錢 芒硝三錢

薑煎服

調胃承氣湯

治無痞滿惟見燥實而有瘀熱宿結下焦者宜之

大黃

五錢

芒硝

二錢五分

甘草

一錢

薑煎服



採附成法通治喉症二方喉閉一方

人中白散 專治男婦大小口舌糜爛走馬牙疳並咽喉
腫痛牙床腐潰等症

建青黛一錢 硼砂一錢 人中白一錢 粉兒茶一錢
元明粉五分 馬勃五分 龍腦薄荷五分 梅片一分
西黃三分 珍珠五分

共研細末點擦患處

品雪二妙散 治紅白喉痧喉閉喉驚

硼砂四錢 牙硝二錢 水片三分 土牛膝五錢

喉閉塞鼻方 專治喉閉漿水不入將藥納棗塞入鼻中
使藥氣隨鼻息而入喉關乃開惟藥性燥烈不可着肉
敷點用紅棗切破一頭去核將藥少許納入棗內綃線
紮封棗口左痛塞右鼻右痛塞左鼻若小孩鼻小棗不
能塞或用棉花包藥紮塞亦可但不能令藥貼靠着肉
以免腫泡之患若喉閉勢重者用双棗兩鼻齊塞亦可
此方不但用之痧喉喉閉一症卽凡陽寒各種喉閉氣
息不通命在垂危者多具起死回生之力神妙異常未
可輕視

蟾酥

七分

細辛

四分

辰砂

三分

麝香

二分

半水片

二分

牙皂

四分

半夏

三分

辛夷

四分

剛子

四分

去油牛黃

二分

雄黃

四分

右研極細末磁瓶收貯

喉閉一症氣機阻閉藥不下嚙命在垂危雖遇良醫每多束手往往因閉絕命坐視不救縱施卧龍丹紫金丹開關各法終不能得一噴嚏者百無一生此方合藥塞入鼻中祇要膺前猶覺跳動氣息雖極細微但得一絲未絕者無不痰氣漸鬆人事轉醒有經數時而甦者有

周晝夜而起者應驗良多神效莫比故特附之以供採擇

增補濕霧上騰

曾有爛喉自春至冬纏綿不愈者視之則喉腐甚多而舌苔灰厚詢之則飲食畧梗不甚過痛腹中時脹日便稀溏診之則脈弱且緩觀之則色滯無華詢知爲寒濕之軀日久醞釀變爲濕霧上騰直冲喉管更加吸受時疫引發爛喉是寒濕者其本爛喉者其標誤用寒涼遏伏以致濕邪愈甚濁霧愈騰十月之長延纏不愈亦時喉僅有之創格也遂擬辛溫燥濕芳香悅脾連進朮附桂薑之品多劑而愈

板存揚州運司街浣花室